

# 全国中草药名鉴

上册

—中草药同物异名集—

中国中医研究院中药研究所

谢宗万 余友琴 主编

人民卫生出版社

# 全国中草药名鉴

上 册

—中草药同物异名集—

中国中医研究院中药研究所

主 编	谢宗万	余友苓		
编著者	余友苓	谢宗万	高淑英	施越华
	马凤英	王 玠		

人民卫生出版社

00370201



**图书在版编目(CIP)数据**

全国中草药名鉴/谢宗万,余友苓主编.-北京:人民卫生出版社,1996

ISBN 7-117-02185-3

I. 全… I. ①谢… ②余… III. 中草药-名录 N.R28  
2.71-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 15009 号

**全国中草药名鉴**

(上册、下册、索引)

谢宗万 余友苓 主编

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里 10 号)

人民卫生出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 278印张 10251千字

1996年5月第1版 1996年5月第1版第1次印刷

印数:00 001—3 000

ISBN 7-117-02185-3/R·2186 定价:468.20 元

[科技新书目 358—175]

## 序 言

祖国医药学是一个伟大的宝库,不仅有丰富的中草药资源,而且有悠久的用药传统,是中华民族几千年来文化宝库中的瑰宝。由于中草药具有疗效确切,毒副作用小,可以就地取材等特点,在现代人类呼唤回归自然,寻找、开发安全有效的天然药物,为实现世界卫生组织提出的在2000年达到人人获得卫生保健的目标下,中草药自然格外受到国内外的广泛关注。但是,我国中草药宝库中,已经搞清科属和拉丁学名的中草药究竟有多少?由于药名有古今时代的差异,全国各地又有民族称谓和地区方言的不同,一药多名和多药同名的情况极为普遍,这就给中草药采集、种植、经营、制药以及科研、临床使用等方面带来很多复杂问题,如果不了解这些问题,光是按名称用药,就容易张冠李戴,产生差错,《全国中草药名鉴》(以下简称《名鉴》)正是为了解决上述复杂问题而编写的一部专著。它采用古今结合、中西结合的科学方法,广泛收集中草药信息数据和已有科研成果,对中草药的科属、拉丁学名、植(动、矿)物名、药材名、文献名、地方名、功效以及同名异物等问题,进行了认真的研究、整理、审订,正本清源,力求弄清宝库中中草药的品种数目,并使之名实相符。其中不少材料是作者数十年来在全国各地亲自调查、鉴定和考证后得来的结果。

《名鉴》共收录全国中草药13200余条(772科)。其中植物药11470余条(369科)(包括藻类、真菌类、地衣类、苔藓类、蕨类、裸子植物、被子植物);动物药1630余条(403科);矿物药160余条。是目前国内公开出版的中草药文献中收载种数最多,古今药名最为齐全的著作。全书分上册、下册及索引三册出版。上册为中草药同物异名集,下册为中草药同名异物集。

上册——中草药同物异名集,分植物药、动物药、矿物药三部,各按自然分类系统排列。在分科以后按原植(动、矿)物拉丁学名字母次序排列,无正确学名者概不收录。种及种以下分类单位,按一物一条的原则均独立为专条。每条包括八项基本数据,依次为:代号(类、科、种顺序号),拉丁学名,植(动、矿)物名,药材名,文献名,地方名,功效,备考。“拉丁学名”和“植(动、矿)物名”尽量采用植物学、动物学或矿物学专著用名。“药材名”正名,则尽量沿用药学专著或本草用名,以求用名统一。但有些用名不当或古今之名同而物异者,均根据实际情况,审慎选订,俾作统一名称之参考。“文献名”是考证历代本草和方书、文献的结果,读者可以从历代本草药名追查其药材基源,更好地继承发扬祖国医药遗产,开发宝库。“地方名”则是广泛收集全国范围内现时习用的中草药名,力求详尽、准确,有助于从土名追查其药材基源,了解现时各地民间验方中所收中草药物品种,为鉴定、开发当地民间草药提供线索。“功效”简要记载其功能主治,可作临床用药及寻找新药时参考。“备考”大多记载异物同名品之混用情况及其他需要说明、注释的问题。上册为本书的主要部分。下册——中草药同名异物集,则是为了读者查阅方便起见,将上册的异物同名品简要地汇集一起,以中文名为词目,按首字笔画排序的一部中草药同名异物词典。《名鉴》书后有中文名、拉丁学名、科名等多种索引。

早在1957~1964年,编者之一谢宗万即开始收集资料,写出了《中药名汇》(手稿),其后又补充了70年代所出中草药小册子中的资料,至1978年正式成立以谢宗万、余友琴为首的课题组,进行《名鉴》的编订研究。1985年获得卫生部、国家中医药管理局的支持,进一步承担了以《名鉴》为基础,建立《电脑检索全国中草药名鉴数据库》的科研任务。本书上、下册正文及索引,全部由微机从数据库中提取和打印。在此,特向帮助我们完成数据库程序设计、录入、校对等建库任务的有

关单位领导和科技人员表示深切的感谢。

本书对中药学、中医学、植物学、动物学、农林学和矿物学等方面的科研、教学，药材的产供销经营管理及药品检验等有关工作人员都有一定的参考价值，还可供全国中草药审订、统一名称时参考。

由于我们水平有限，不足与失误之处定多，殷切希望广大读者多提批评意见，以便今后修订补充和改正。

编 者

1994年10月

## 凡 例

一、《全国中草药名鉴》分三册出版,上册为“中草药同物异名集”,下册为“中草药同名异物集”,另册为全书索引。

二、上册“中草药同物异名集”分植物药、动物药和矿物药三大部类。

植物药和动物药均根据自然分类系统按科归类,科内按属名、属内按种名的拉丁字母次序排列,种及种以下分类单位均独立为专条。矿物药目前尚无统一分类系统,本书是按主含元素及其化学符号为序的分类方法。

植、动、矿物药每条记录记载如下内容:

1. 代号:上册每条记录均有一个代号,一般为七位数的顺序号。编号组成的总原则是类科号加种号。第一位数字1—9为类号,分别代表:1藻类,2真菌类,3地衣类,4苔藓类,5蕨类,6裸子植物类,7被子植物类,8动物类,9矿物类。

植物药类:1—7类前四或五位数字为类科号(蕨类按秦仁昌系统,被子植物基本上按哈钦松系统,其他各类参照《高等植物图鉴》或有关专著的分类系统),后三或二位数字为科内种号,按拉丁学名字母次序生成。末位附加a、b者,系增补、修改时插入号。

动物药类:前五位数数为类、门、科号。科号按自然分类系统及本书实收动物药分科,从1—403连续编号。后二位数字为种号,按拉丁学名字母次序生成。最后一位附加a、b者,系增补时插入号。

矿物药类:代号的首位数字9为类号,第二位数字:1为主含金属元素类,2为主含非金属元素类,3为化石类,4为其他类。第三、四位数字为按主含元素分类并按元素的化学符号字母次序排序。最后三位数字为种号,按首列的拉丁名或英文名、汉语拼音字母次序生成,最后一位数附加a、b者,系增补时插入号。

这样按分类系统顺序生成的中草药代号,既反映了它在自然分类系统中的位置,同时也是本书中文名、拉丁学名的索引号。

2. 拉丁学名:以植(动)物学专著合用的拉丁学名为正名,如为异名,则在药学或其他植(动)物学著作中曾作正名的常见学名亦尽量收载,前加“—”分隔。有些误订、误用学名已在备考中加注者,均以“auct. non”的形式列入本条记录拉丁学名的异名中,以便检索。矿物药凡《药典》1990版收载者,其拉丁名均以《药典》为准。无适当拉丁名时,则以英文名(名后加注一个星“\*”号)或汉语拼音(名后加注两个星“\*\*”号)为正名,正异名之间亦以“—”相间隔。

3. 植(动、矿)物名:中草药原植(动、矿)物名原则上选用植(动、矿)物学专著的合用中文名称为正名,其后加注文献出处。该名已见于古文献者,其出处采用古、今文献并列。所列现代文献出处系指本书用名所引文献,非原出。有些植物名较早见于地方者,也有采用地方出处与文献出处并列的方式。如无恰当的植(动、矿)物名称时,则本书另拟中文名,后标“(拟)”字表示。

4. 药材名:药材正名原则上以现时通用的合用药名为正名。药材名相同,植(动、矿)物基原不同者,均分列专条。基原相同,药用部分不同、功效也不同,药材名亦随之而不同时,即选择合用的药材名并列作正名。药材名后加注的文献出处以药学文献为主,采取古今并列,先古后今。古代文献系指经本草考证认为系原出或较早见载的名称并与实物一致的文献,名实不符者除外。现代文

献系本书用名所引用文献,非原出。有些药材名较早见于地方者,也有采用地方出处与文献出处并列的方式。凡药材名加注《药典》者,均指《中华人民共和国药典》1990版。有些药材名选自地方名者,其后均加注地方出处。有些草药的药材正名由本书所拟者,名后均加注“(拟)”字,有些草药一时难以选出合用药材名时,则药材名暂时空缺。

5. 文献名:包括古代文献(本草、方书、医籍及经、史、子、集等)和现代文献中记载的药名和植(动、矿)物名。文献一般以时代先后为序。药材名有几个名称并列,其各自的文献名较多时即按相应的药用部分归类,然后再按所出文献的时代为序编排。所引文献原则上用全称,如常用或书名太长时,即用简称。文献的简称与全称对照详见附录。所引文献有同名异书时,一律于书名号之后,冠以作者或地方出处。文献名项的中文名不得与同一条记录的植(动、矿)物名或药材名相重复。现代文献中记载有地方出处的中文名一概列入地方名,原植(动、矿)物名则列入文献名。《药典》用名除在药材名项收列以外,其余各版《药典》曾用名亦在文献名项内选录。

6. 地方名:地方中文名按地名出处编列。地名出处包括大区名,省、地、县名,山名,水名,海名,岛名等。通常先列两个或两个以上省(市、自治区)通用的中文名,其后加注省(市、自治区)或大区出处。然后分省(市、自治区)列出各自的地方中文名,其后加注县或地区等出处。全国省(市、自治区)的排列按从北到南、从东到西的原则即按东北、华北、西北、华东、中南(含原华南)、西南的次序编排。具体顺序及省名规范为:黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、山东、江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南、西藏。

地方名项的中文名不得与同条记录的植(动、矿)物名、药材名、文献名相重复。

地方名和文献名项的中文名上标有双引号(“”)者,系少数民族语言音译名,其后均加注民族或地方、文献出处。

对地方名和文献名项中文名的误用名、异物同名等,根据用药实际情况,于中文名上加标方括号“[]”,以助识别。

本书引用及参考之国内外文献,下限一般至1990年止。

7. 功效:凡《药典》(1990版)收录的种类,功效以《药典》记载为准。其余以《全国中草药汇编》、《中药大辞典》的记载为基础,有些则以药材名出处文献记载的功效为依据,简述该药功能,用于何种病症。凡药用部分不同,药效有别者,则按药用部分分述之。对药材名相同的同属近缘植(动)物,或简述其功效,或只言功能,不再重复其主治。至于用法、用量、禁忌等均从略。对毒性显著的药材,一般注明“有毒”或“有大毒”。凡功效项缺如者系市场习见掺伪品种、混乱品种或正在研究开发中的新药原植(动)物。

8. 备考:一般包括下列内容:(1)对药名、品种考证结论的有关说明;(2)对混乱品种,只知在某地充何药,而不明其确切功效者;(3)文献杂志报导,经研究有开发前景或正在开发中的新药原植(动、矿)物;(4)矿物药对原矿物及其主含成分的说明;(5)植(动)物拉丁学名误用、误订情况注释;(6)其他有必要补充说明的问题。

备考中涉及的中文名和拉丁名一般不入本书中文名和拉丁名索引。其同名异物的名称一般已列入“同名异物集”。

三、下册“中草药同名异物集”以中文名为词目按首字笔画排序,将中文名同而基原拉丁学名不同的植、动、矿物药集中汇总,逐条列出同名异物品之代号、拉丁学名、所属类科及其原植(动、矿)物名及该中文名的文献或地方出处,并按代号顺序排列。本集包括上集记录各著录项中的全部同名异物,是一部纲要式的同名异物简明词典,如须进一步查阅功效或其他项目,可按代号查



阅上集专条。

四、目录及索引:本书上册目录,以类科号、类科中文名、类科拉丁名的对照表作为目录。下册编有中草药异物同名之中文名字头目录。按首字笔画数及起首两笔笔形顺序排列。本书索引有(1)关键字检字表。包括本书中文名索引、类科中文名索引、文献简称与全称对照索引中所含全部关键字,即①植、动、矿物中文名首字,②类科中文名首字,③出处文献名称首字。关键字按笔画数及第一、二笔笔形的横、竖、撇、点、折归类顺序;(2)中文名笔画索引。为植、动、矿物中文名混合索引。中文名首字相同时,第二、三个字的排序,大部分常用汉字按汉语拼音字母次序,少部分不常用字则按汉字的偏旁部首编列;(3)类科中文名索引;(4)类科拉丁名索引;(5)中草药原植(动、矿)物拉丁名索引。分别建立植物拉丁学名索引、动物拉丁学名索引、矿物拉丁名(含英文名、汉语拼音)索引;(6)引用文献简称与全称对照索引。

中文名及拉丁名之后的索引号,均为每条中草药之代号而非页码。

五、字体:本书所用字体,按照1964年文字改革出版社的《简化字总表》(第二版)进行简化,少数字在应用意义上可能产生混淆或尚无规范简体字者,仍采用繁体字。

## 内 容 提 要

本书是一部全面刊载全国中草药名称的专著,是目前国内公开出版物中收药种数最多、古今药名最齐全的工具书,分三册出版。上册为“中草药同物异名集”,共收中草药(植、动、矿)13200余条,每条刊载内容包括代号(类科种顺序号)、拉丁学名、植(动、矿)物名、药材名、文献名、地方名、功效、备考八项。药材正名是在文献查录、实际调查和本草考证的基础上厘订的,可作为统一中草药名时的参考。文献名的记载反映了历代本草用名和现代考查结果。地方名收集广泛、准确,便于从各地土名来追查其药材基原,为开发利用民间草药资源提供线索。下册为“中草药同名异物集”,将不同基原的中草药按同一中文名汇集一处,并按首字笔画排序,简要集中地反映了全国中草药异物同名的情况,可为读者检索和研究中药复杂品种提供方便。另一册为全书索引。

本工具书对中药学、中医学、本草学、植物学、动物学、农林学和矿物学方面的科研、教学、医疗以及中药材产供销、经营管理、药品检定等有关工作人员都有一定的参考价值。

## 目 录

## 一、藻类 Gamophyceae

1001	丝藻科 Ulotrichaceae	(1)	1018	胶须藻科 Rivulariaceae	(5)
1002	礁膜科 Monostromaceae	(1)	1019	红毛菜科 Bangiaceae	(5)
1003	石莼科 Ulvaceae	(1)	1020	海索面科 Nemalionaceae	(6)
1004	水绵科 Zygnemataceae	(2)	1021	粘皮藻科 Chaetangiaceae	(6)
1005	松藻科 Codiaceae	(2)	1022	石花菜科 Gelidiaceae	(6)
1006	轮藻科 Characeae	(2)	1023	胶粘藻科 Dumontiaceae	(7)
1007	网地藻科 Dictyotaceae	(2)	1024	珊瑚藻科 Corallinaceae	(7)
1008	海蕴科 Spermatochnaceae	(3)	1025	海萝科 Endocladaceae	(7)
1009	铁钉菜科 Ishigeaceae	(3)	1026	蜈蚣藻科 Grateloupiceae	(7)
1010	蜇藻科 Scytosiphonaceae	(3)	1027	江蓠科 Gracilariaceae	(8)
1011	绳藻科 Chordaceae	(3)	1028	红翎菜科 Solieriaceae	(8)
1012	昆布科 Laminariaceae	(3)	1029	沙菜科 Hypneaceae	(8)
1013	翅藻科 Alariaceae	(3)	1030	叉枝藻科 Phyllophoraceae	(9)
1014	鹿角菜科 Fucaceae	(4)	1031	杉藻科 Gigartinaceae	(9)
1015	马尾藻科 Sargassaceae	(4)	1032	仙菜科 Ceramiaceae	(9)
1016	念珠藻科 Nostocaceae	(5)	1033	红叶藻科 Delesseriaceae	(9)
1017	鞭枝藻科 Mastigocladaeae	(5)	1034	松节藻科 Rhodomelaceae	(9)

## 二、真菌类 Eumycophyta

2001	粉瘤菌科 Lycogalaceae	(10)	2017	多孔菌科 Polyporaceae	(15)
2002	霜霉科 Peronosporaceae	(10)	2018	牛肝菌科 Boletaceae	(19)
2003	酵母科 Saccharomycetaceae	(10)	2019	伞菌科 Agaricaceae	(20)
2004	曲霉科 Eurotiaceae	(10)	2020	灰包菇科 Seotiaceae	(23)
2005	麦角菌科 Clavicipitaceae	(10)	2021	腹菌科 Hymenogasteraceae	(24)
2006	鹿角菌科 Xylariaceae	(11)	2022	笼头菌科 Clathraceae	(24)
2007	肉座菌科 Hypocreaceae	(11)	2023	鬼笔菌科 Phallaceae	(24)
2008	马鞍菌科 Helvellaceae	(12)	2024	马勃菌科 Lycoperdaceae	(24)
2009	块菌科 Tuberaceae	(12)	2025	地星菌科 Geastraceae	(26)
2010	黑粉菌科 Ustilaginaceae	(12)	2026	灰锤菌科 Tulostomataceae	(26)
2011	木耳科 Auriculariaceae	(13)	2027	轴灰包菌科 Podaxaceae	(27)
2012	银耳科 Tremellaceae	(13)	2028	硬皮马勃菌科 Sclerodermataceae	(27)
2013	革菌科 Thelephoraceae	(14)	2029	鸟巢菌科 Nidulariaceae	(27)
2014	珊瑚菌科 Clavariaceae	(14)	2030	丛梗孢科 Moniliaceae	(27)
2015	鸡油菌科 Cantharellaceae	(14)	2031	无孢菌群 Mycelia Sterilia	(28)
2016	齿菌科 Hydnaceae	(14)			

## 三、地衣类 Lichenes

3001	皮果衣科 Dermatocarpaceae	(28)	3007	茶渍科 Lecanoraceae	(30)
3002	地茶科 Thamnoliaceae	(28)	3008	梅衣科 Parmeliaceae	(30)
3003	牛皮叶科 Stictaceae	(28)	3009	松萝科 Usneaceae	(32)
3004	网衣科 Lecideaceae	(28)	3010	地卷科 Peltigeraceae	(34)
3005	石蕊科 Cladoniaceae	(29)	3011	鸡皮衣科 Pertusariaceae	(34)
3006	脐衣科 Umbilicariaceae	(30)			

## 四、苔藓类 Bryophyta

4001	耳叶苔科 Frullaniaceae	(34)	4002	石地钱科 Rehouliaceae	(34)
------	--------------------	------	------	-------------------	------

## 目 录

7

4003	蛇苔科 Conocephalaceae	(34)	4012	提灯藓科 Mniaceae	(35)
4004	地钱科 Marchantiaceae	(34)	4013	珠藓科 Bartramiaceae	(35)
4005	泥炭藓科 Sphagnaceae	(34)	4014	蔓藓科 Meteoriaceae	(35)
4006	牛毛藓科 Ditrichaceae	(35)	4015	万年藓科 Climaciaceae	(36)
4007	曲尾藓科 Dicranaceae	(35)	4016	羽藓科 Thuidiaceae	(36)
4008	丛藓科 Pottiaceae	(35)	4017	柳叶藓科 Amblystegiaceae	(36)
4009	葫芦藓科 Funariaceae	(35)	4018	绢藓科 Entodontaceae	(36)
4010	壶藓科 Splachnaceae	(35)	4019	灰藓科 Hypnaceae	(36)
4011	真藓科 Bryaceae	(35)	4020	金发藓科 Polytrichaceae	(36)

## 五、蕨类 Pteridophyta

5001	松叶蕨科 Psilotaceae	(37)	5032	水蕨科 Parkeriaceae	(57)
5002	石杉科 Huperziaceae	(37)	5033	裸子蕨科 Gymnogrammaceae	(58)
5003	石松科 Lycopodiaceae	(38)	5034	车前蕨科 Antrophyaceae	(58)
5004	卷柏科 Selaginellaceae	(40)	5035	书带蕨科 Vittariaceae	(58)
5006	木贼科 Equisetaceae	(42)	5036	蹄盖蕨科 Athyriaceae	(59)
5007	七指蕨科 Helminthostachyaceae	(44)	5037	肿足蕨科 Hypodematiaceae	(60)
5008	阴地蕨科 Botrychiaceae	(44)	5038	金星蕨科 Thelypteridaceae	(60)
5009	瓶尔小草科 Ophioglossaceae	(45)	5039	铁角蕨科 Aspleniaceae	(62)
5011	莲座蕨科 Angiopteridaceae	(45)	5041	球子蕨科 Onocleaceae	(64)
5013	紫萁蕨科 Osmundaceae	(46)	5042	乌毛蕨科 Blechnaceae	(64)
5014	瘤足蕨科 Plagiogyriaceae	(47)	5043	岩蕨科 Woodsiaceae	(65)
5015	里白科 Gleicheniaceae	(47)	5045	鳞毛蕨科 Dryopteridaceae	(65)
5016	莎草蕨科 Schizaeaceae	(48)	5046	叉蕨科 Aspidiaceae	(69)
5017	海金沙科 Lygodiaceae	(48)	5047	实蕨科 Bolbitidaceae	(69)
5018	膜蕨科 Hymenophyllaceae	(49)	5049	舌蕨科 Elaphoglossaceae	(69)
5019	蚌壳蕨科 Dicksoniaceae	(49)	5050	肾蕨科 Nephrolepidaceae	(69)
5020	桫欏科 Cyatheaceae	(49)	5052	骨碎补科 Davalliaceae	(69)
5021	稀子蕨科 Monachosoraceae	(50)	5053	雨蕨科 Gymnogrammitidaceae	(70)
5022	碗蕨科 Dennstaedtiaceae	(50)	5054	双扇蕨科 Dipteridaceae	(70)
5023	鳞始蕨科 Lindsaeaceae	(50)	5056	水龙骨科 Polypodiaceae	(70)
5025	姬蕨科 Hypolepidaceae	(51)	5057	槲蕨科 Dryariaceae	(79)
5026	蕨科 Pteridiaceae	(51)	5060	剑蕨科 Loxogrammaceae	(80)
5027	凤尾蕨科 Pteridaceae	(51)	5061	苹科 Marsileaceae	(80)
5030	中国蕨科 Sinopteridaceae	(54)	5062	槐叶苹科 Salviniaceae	(80)
5031	铁线蕨科 Adiantaceae	(56)	5063	满江红科 Azollaceae	(81)

## 六、裸子植物类 Gymnospermae

6001	苏铁科 Cycadaceae	(81)	6007	罗汉松科 Podocarpaceae	(90)
6002	银杏科 Ginkgoaceae	(81)	6008	三尖杉科 Cephalotaxaceae	(91)
6003	南洋杉科 Araucariaceae	(82)	6009	红豆杉科 Taxaceae	(92)
6004	松科 Pinaceae	(82)	6010	麻黄科 Ephedraceae	(93)
6005	杉科 Taxodiaceae	(87)	6011	买麻藤科 Gnetaceae	(94)
6006	柏科 Cupressaceae	(88)			

## 七、被子植物类 Angiospermae

(一) 双子叶植物 Dicotyledoneae		7007	连香树科 Cercidiphyllaceae	(104)
7001	木兰科 Magnoliaceae	7008	番荔枝科 Annonaceae	(104)
7006	昆栏树科 Trochodendraceae	7011	樟科 Lauraceae	(107)
		7013	莲叶桐科 Hernandiaceae	(119)

7014	肉豆蔻科 Myristicaceae	(120)	7093	大风子科 Flacourtiaceae	(308)
7015	毛茛科 Ranunculaceae	(120)	7094	天料木科 Samydaceae	(310)
7017	金鱼藻科 Ceratophyllaceae	(161)	7098	怪柳科 Tamaricaceae	(311)
7018	睡莲科 Nymphaeaceae	(161)	7101	西番莲科 Passifloraceae	(312)
7019	小檗科 Berberidaceae	(163)	7103	葫芦科 Cucurbitaceae	(313)
7021	木通科 Lardizabalaceae	(174)	7104	秋海棠科 Begoniaceae	(324)
7023	防己科 Menispermaceae	(176)	7106	番木瓜科 Caricaceae	(327)
7024	马兜铃科 Aristolochiaceae	(184)	7107	仙人掌科 Cactaceae	(327)
7027	猪笼草科 Nepenthaceae	(192)	7108	山茶科 Theaceae	(328)
7028	胡椒科 Piperaceae	(192)	7112	猕猴桃科 Actinidiaceae	(333)
7029	三白草科 Saururaceae	(196)	7113	水东哥科 Saurauaceae	(336)
7030	金粟兰科 Chloranthaceae	(197)	7114	金莲木科 Ochnaceae	(336)
7032	罂粟科 Papaveraceae	(198)	7116	龙脑香科 Dipterocarpaceae	(336)
7036	白花菜科 Capparidaceae	(210)	7118	桃金娘科 Myrtaceae	(337)
7037	辣木科 Moringaceae	(212)	7119	玉蕊科 Lecythidaceae	(340)
7039	十字花科 Cruciferae	(212)	7120	野牡丹科 Melastomataceae	(340)
7040	堇菜科 Violaceae	(222)	7121	使君子科 Combretaceae	(345)
7041	木犀草科 Resedaceae	(226)	7122	红树科 Rhizophoraceae	(346)
7042	远志科 Polygalaceae	(226)	7123	金丝桃科 Hypericaceae	(347)
7045	景天科 Crassulaceae	(230)	7126	藤黄科 Guttiferae	(351)
7047	虎耳草科 Saxifragaceae	(236)	7128	椴树科 Tiliaceae	(352)
7048	茅膏菜科 Droseraceae	(247)	7128a	杜英科 Elaeocarpaceae	(355)
7052	沟繁缕科 Elatinaceae	(248)	7128b	斜翼科 Plagiopteraceae	(356)
7053	石竹科 Caryophyllaceae	(248)	7130	梧桐科 Sterculiaceae	(356)
7055	番杏科 Aizoaceae	(258)	7131	木棉科 Bombacaceae	(359)
7056	马齿苋科 Portulacaceae	(258)	7132	锦葵科 Malvaceae	(359)
7057	蓼科 Polygonaceae	(259)	7133	金虎尾科 Malpighiaceae	(367)
7059	商陆科 Phytolaccaceae	(276)	7135	古柯科 Erythoxylaceae	(367)
7061	藜科 Chenopodiaceae	(276)	7136	大戟科 Euphorbiaceae	(368)
7063	苋科 Amaranthaceae	(280)	7136a	虎皮楠科 Daphniphyllaceae	(388)
7064	落葵科 Basellaceae	(284)	7143	蔷薇科 Rosaceae	(388)
7065	亚麻科 Linaceae	(284)	7144	毒鼠子科 Dichapetalaceae	(427)
7066	蒺藜科 Zygophyllaceae	(285)	7145	蜡梅科 Calycanthaceae	(427)
7067	牻牛儿苗科 Geraniaceae	(286)	7148	豆科 Leguminosae	(428)
7069	酢浆草科 Oxalidaceae	(289)	7150	旌节花科 Stachyuraceae	(494)
7070	旱金莲科 Tropaeolaceae	(291)	7151	金缕梅科 Hamamelidaceae	(495)
7071	凤仙花科 Balsaminaceae	(291)	7152	杜仲科 Eucommiaceae	(497)
7072	千屈菜科 Lythraceae	(293)	7154	黄杨科 Buxaceae	(497)
7074	海桑科 Sonneratiaceae	(295)	7155	悬铃木科 Platanaceae	(499)
7075	石榴科 Punicaceae	(295)	7156	杨柳科 Salicaceae	(499)
7077	柳叶菜科 Onagraceae	(295)	7159	杨梅科 Myricaceae	(502)
7077a	菱科 Trapaceae	(298)	7161	桦木科 Betulaceae	(502)
7078	小二仙草科 Haloragidaceae	(299)	7163	壳斗科 Fagaceae	(504)
7078a	杉叶藻科 Hippuridaceae	(299)	7164	木麻黄科 Casuarinaceae	(510)
7079	水马齿科 Callitrichaceae	(299)	7165	榆科 Ulmaceae	(510)
7081	瑞香科 Thymelaeaceae	(300)	7167	桑科 Moraceae	(512)
7083	紫茉莉科 Nyctaginaceae	(304)	7169	荨麻科 Urticaceae	(523)
7084	山龙眼科 Proteaceae	(304)	7171	冬青科 Aquifoliaceae	(533)
7085	五桠果科 Dilleniaceae	(305)	7172	岩高兰科 Empetraceae	(536)
7087	马桑科 Coriariaceae	(306)	7173	卫矛科 Celastraceae	(536)
7088	海桐花科 Pittosporaceae	(306)	7178	翅子藤科 Hippocrateaceae	(544)
7091	红木科 Bixaceae	(308)	7179	茶茱萸科 Icacinaceae	(544)



7182	铁青树科 Olacaceae	(545)	7246	花柱草科 Stylidiaceae	(837)
7183	山柚子科 Opiliaceae	(545)	7247	花荵科 Polemoniaceae	(837)
7185	桑寄生科 Loranthaceae	(545)	7249	紫草科 Boraginaceae	(837)
7186	檀香科 Santalaceae	(550)	7250	茄科 Solanaceae	(841)
7189	蛇菰科 Balanophoraceae	(551)	7251	旋花科 Convolvulaceae	(852)
7190	鼠李科 Rhamnaceae	(552)	7252	玄参科 Scrophulariaceae	(859)
7191	胡颓子科 Elaeagnaceae	(558)	7253	列当科 Orobanchaceae	(876)
7193	葡萄科 Vitaceae	(561)	7254	狸藻科 Lentibulariaceae	(877)
7194	芸香科 Rutaceae	(571)	7256	苦苣苔科 Gesneriaceae	(877)
7195	苦木科 Simaroubaceae	(587)	7257	紫葳科 Bignoniaceae	(885)
7196	橄榄科 Burseraceae	(589)	7258	胡麻科 Pedaliaceae	(888)
7197	楝科 Meliaceae	(590)	7259	爵床科 Acanthaceae	(888)
7198	无患子科 Sapindaceae	(593)	7261	苦槛蓝科 Myoporaceae	(896)
7198a	七叶树科 Hippocastanaceae	(595)	7263	马鞭草科 Verbenaceae	(896)
7198b	钟萼木科 Bretschneideraceae	(596)	7263a	毒蛆草科(透骨草科)	
7200	槭树科 Aceraceae	(596)		Phrymataceae	(908)
7201	清风藤科 Sabiaceae	(598)	7264	唇形科 Labiatae	(908)
7204	省沽油科 Staphyleaceae	(599)			
7205	漆树科 Anacardiaceae	(600)		(二) 单子叶植物 Monocotyledoneae	
7206	牛栓藤科 Connaraceae	(604)	7266	水鳖科 Hydrocharitaceae	(946)
7206a	马尾树科 Rhoiteaceae	(604)	7267	泽泻科 Alismataceae	(946)
7207	胡桃科 Juglandaceae	(604)	7271	水麦冬科 Juncaginaceae	(947)
7209	山茱萸科 Cornaceae	(606)	7276	眼子菜科 Potamogetonaceae	(947)
7210	八角枫科 Alangiaceae	(609)	7280	鸭跖草科 Commelinaceae	(948)
7211	珙桐科 Nyssaceae	(610)	7281	须叶藤科 Flagellariaceae	(952)
7211b	锁阳科 Cynomoriaceae	(610)	7283	黄眼草科 Xyridaceae	(952)
7212	五加科 Araliaceae	(610)	7285	谷精草科 Eriocaulaceae	(952)
7213	伞形科 Umbelliferae	(621)	7286	凤梨科 Bromeliaceae	(953)
7214	山柳科 Clethraceae	(645)	7287	芭蕉科 Musaceae	(953)
7215	杜鹃花科 Ericaceae	(646)	7289	兰花蕉科 Lowiaceae	(954)
7215a	鹿蹄草科 Pyrolaceae	(654)	7290	姜科 Zingiberaceae	(954)
7219	岩梅科 Diapensiaceae	(656)	7291	美人蕉科 Cannaceae	(963)
7221	柿树科 Ebenaceae	(656)	7292	竹芋科 Marantaceae	(964)
7222	山榄科 Sapotaceae	(657)	7293	百合科 Liliaceae	(964)
7223	紫金牛科 Myrsinaceae	(658)	7296	雨久花科 Pontederiaceae	(998)
7224	安息香科 Styracaceae	(665)	7302	天南星科 Araceae	(999)
7225	山矾科 Symplocaceae	(666)	7303	浮萍科 Lemnaceae	(1010)
7228	马钱科 Loganiaceae	(668)	7304	黑三棱科 Sparganiaceae	(1011)
7229	木樨科 Oleaceae	(671)	7305	香蒲科 Typhaceae	(1011)
7230	夹竹桃科 Apocynaceae	(679)	7306	石蒜科 Amaryllidaceae	(1012)
7231	萝藦科 Asclepiadaceae	(688)	7307	鸢尾科 Iridaceae	(1014)
7232	茜草科 Rubiaceae	(701)	7310	百部科 Stemonaceae	(1018)
7233	忍冬科 Caprifoliaceae	(721)	7311	薯蓣科 Dioscoreaceae	(1019)
7235	败酱科 Valerianaceae	(730)	7313	龙舌兰科 Agavaceae	(1023)
7236	川续断科 Dipsacaceae	(733)	7314	棕榈科 Palmae	(1025)
7238	菊科 Compositae	(734)	7315	露兜树科 Pandanaceae	(1027)
7239	龙胆科 Gentianaceae	(805)	7321	蒟蒻薯科 Taccaceae	(1028)
7240	报春花科 Primulaceae	(815)	7322	田葱科 Philydraceae	(1028)
7241	蓝雪科 Plumbaginaceae	(823)	7323	水玉簪科 Burmanniaceae	(1028)
7242	车前草科 Plantaginaceae	(825)	7326	兰科 Orchidaceae	(1028)
7243	桔梗科 Campanulaceae	(827)	7327	灯心草科 Juncaceae	(1049)
7245	草海桐科 Goodeniaceae	(837)	7331	莎草科 Cyperaceae	(1050)

7332	禾本科 Gramineae	(1057)
------	---------------	--------

## 八、动 物 类

### (一)原生动物门 Protozoa

81001	草履虫科 Parameciidae	(1077)
-------	-------------------	--------

### (二)海绵动物门 Spongia

82002	筒骨海绵科 Haploscleridae	(1077)
-------	----------------------	--------

### (三)腔肠动物门 Coelenterata

83003	海榧螵科 Plumularidae	(1077)
83004	僧帽水母科 Physalidae	(1077)
83005	洋须水母科 Ulmaridae	(1077)
83006	霞水母科 Cyaneidae	(1077)
83007	根口水母科 Rhizostomatidae	(1077)
83008	海葵科 Actiniidae	(1078)
83009	银冠海葵科 Diadumenidae	(1078)
83010	海仙人掌科 Veretillidae	(1078)
83011	丛柳珊瑚科 Plexauridae	(1078)
83012	枇杷珊瑚科 Oculinidae	(1078)
83013	浜珊瑚科 Poripidae	(1078)
83014	笙珊瑚科 Tubiporidae	(1079)
83015	海底柏科 Melitodidae	(1079)
83016	矾花科 Gorgonidae	(1079)

### (四)环节动物门 Annelida

84017	沙蚕科 Nereidae	(1079)
84018	矾沙蚕科 Eunicidae	(1079)
84019	吻沙蚕科 Glyceridae	(1079)
84020	沙蠋科 Arenicolidae	(1079)
84021	巨蚓科 Megascleidae	(1079)
84022	正蚓科 Lumbricidae	(1080)
84023	医蛭科 Hirudinidae	(1080)
84024	山蛭科 Haemadipsaidae	(1081)
84025	星虫科 Sipuncidae	(1081)

### (五)软体动物门 Mollusca

85026	隐板石鳖科 Cryptoplacidae	(1081)
85027	铗石鳖科 Ischnochitonidae	(1082)
85028	鲍科 Haliotidae	(1082)
85029	帽贝科 Patellidae	(1083)
85030	马蹄螺科 Trochidae	(1083)
85031	蝶螺科 Turbinidae	(1083)
85032	滨螺科 Littorinidae	(1084)
85033	环口螺科 Cyclophoridae	(1084)
85034	田螺科 Viviparidae	(1084)
85035	锥螺科 Turritellidae	(1085)
85036	蟹守螺科 Cerithiidae	(1085)
85037	宝贝科 Cypraeidae	(1085)
85038	骨螺科 Muricidae	(1086)
85039	蛾螺科 Buccinidae	(1087)

85040	蝾螺科 Galeodidae	(1087)
85041	椎螺科 Olividae	(1087)
85042	涡螺科 Volutidae	(1087)
85043	海兔科 Aplysiidae	(1087)
85044	阿地螺科 Atyidae	(1088)
85045	海牛科 Dorididae	(1088)
85046	石磺海牛科 Homiodorididae	(1088)
85047	侧鳃海牛科 Pleurobranchidae	(1088)
85048	枝背海牛科 Dendronotidae	(1088)
85049	石磺科 Ociidae	(1088)
85050	锥实螺科 Lymnaeidae	(1088)
85051	玛瑙螺科 Achatinidae	(1088)
85052	肋齿螺科 Pleurodontidae	(1088)
85053	巴蜗牛科 Bradybaenidae	(1088)
85054	蛞蝓科 Limacidae	(1089)
85055	粘液蛞蝓科 Philomycidae	(1089)
85056	蚌科 Arcidae	(1089)
85057	贻贝科 Mytilidae	(1090)
85058	钳蛤科 Isognomonidae	(1091)
85059	珍珠贝科 Pteriidae	(1091)
85060	江珧科 Pinnidae	(1091)
85061	扇贝科 Pectinidae	(1092)
85062	海菊蛤科 Spondylidae	(1092)
85063	海月蛤科 Placunidae	(1092)
85064	牡蛎科 Ostreidae	(1092)
85065	珍珠蚌科 Margaritanidae	(1093)
85066	蚌科 Unionidae	(1093)
85067	蜆科 Corbiculidae	(1096)
85068	碎碟科 Tridacnidae	(1096)
85069	帘蛤科 Veneridae	(1096)
85070	蛤蜊科 Mactridae	(1098)
85071	斧蛤科 Donacidae	(1098)
85072	樱蛤科 Tellinidae	(1098)
85073	紫云蛤科 Psammobiidae	(1098)
85074	竹蛏科 Solenidae	(1098)
85075	海螂科 Myidae	(1099)
85076	海笋科 Pholadidae	(1099)
85077	枪乌贼科 Loliginidae	(1099)
85078	乌贼科 Sepiidae	(1099)
85079	柔鱼科 Ommastrephidae	(1100)
85080	蛸科 Octopodidae	(1100)

### (六)节肢动物门 Arthropoda

86081	铠茗荷科 Scalpellidae	(1101)
86082	茗荷科 Lepadidae	(1101)
86083	藤壶科 Balanidae	(1101)
86084	笠藤壶科 Tetraclitidae	(1101)
86085	缩头水虱科 Cymothoidae	(1101)
86086	浪漂水虱科 Cirolanidae	(1102)

86087	团水虱科 Sphaeromidae	(1102)	86139	蚊蛉科 Myrmeleontidae	(1120)
86088	栉水虱科 Asellidae	(1102)	86140	刺蛾科 Cochliidae	(1120)
86089	平甲虫科 Armadillidae	(1102)	86141	螟蛾科 Pyralidae	(1121)
86090	蜡鼠妇科 Porcellionidae	(1102)	86142	野螟科 Pyraustidae	(1121)
86091	潮虫科 Oniscidae	(1102)	86143	家蚕蛾科 Bombycidae	(1121)
86092	海蟑螂科 Ligiidae	(1102)	86144	天蚕蛾科 Saturniidae	(1121)
86093	对虾科 Penaeidae	(1102)	86145	粉蝶科 Pieridae	(1121)
86094	长臂虾科 Palaemonidae	(1103)	86146	凤蝶科 Papilionidae	(1122)
86095	龙虾科 Palinuridae	(1103)	86147	弄蝶科 Hesperidae	(1122)
86096	河虾科 Astacidae	(1104)	86148	蓑蛾科 Psychidae	(1122)
86097	螯蛄科 Upogebiidae	(1104)	86149	蝙蝠蛾科 Hepialidae	(1122)
86098	虾蛄科 Squillidae	(1104)	86150	灯蛾科 Arctidae	(1122)
86099	寄居蟹科 Paguridae	(1104)	86151	石蛾科 Phryganeidae	(1122)
86100	馒头蟹科 Calappidae	(1108)	86152	虻科 Tabanidae	(1122)
86101	蜘蛛蟹科 Majidae	(1108)	86153	蝇科 Muscidae	(1123)
86102	菱蟹科 Parthenopidae	(1108)	86154	狂蝇科 Oestridae	(1123)
86103	梭子蟹科 Portunidae	(1108)	86155	丽蝇科 Calliphoridae	(1123)
86104	溪蟹科 Potamonidae	(1108)	86156	步甲科(步行虫科) Carabidae	(1124)
86105	方蟹科 Grapsidae	(1109)	86157	鼓甲科 Gyrinidae	(1124)
86106	扇蟹科 Xanthidae	(1109)	86158	萤科 Lampyridae	(1124)
86107	石蟹科 Lithodidae	(1109)	86159	粉蠹科 Lyctidae	(1124)
86108	鲎科 Tatypleidae	(1110)	86160	隐翅虫科 Staphilinidae	(1124)
86109	钳蝎科 Buthidae	(1110)	86161	龙虱科 Dytiscidae	(1124)
86110	蝗蚱科 Ctenizidae	(1111)	86162	芫菁科 Meloidae	(1124)
86111	圆蛛科 Argiopidae	(1111)	86163	叩头虫科 Elateridae	(1126)
86112	壁钱科 Urocteidae	(1111)	86164	拟步甲科 Tenebrionidae	(1126)
86113	漏斗网蛛科 Agelenidae	(1111)	86165	天牛科 Cerambycidae	(1126)
86114	跳蛛科 Salticidae	(1111)	86166	沟胫天牛科 Lammiidae	(1127)
86115	球马陆科 Glomeridae	(1111)	86167	鳃角金龟科 Melolonthidae	(1127)
86116	圆马陆科 Strongylosomidae	(1112)	86168	金龟子科 Scarabaeidae	(1128)
86117	山蛩科 Spirobolidae	(1112)	86169	粪金龟科 Geotrupidae	(1128)
86118	蠕马陆科 Sphaerotheriidae	(1112)	86170	丽金龟科 Rutelidae	(1128)
86119	蜈蚣科 Scolopendridae	(1112)	86171	犀金龟科 Dynastidae	(1129)
86120	衣鱼科 Lepismatidae	(1113)	86172	花金龟科 Cetoniidae	(1129)
86121	蛭科 Aeschnidae	(1113)	86173	象甲科 Curculionidae	(1129)
86122	蜻科 Libellulidae	(1113)	86174	吉丁虫科 Buprestidae	(1129)
86123	蜚蠊科 Blattidae	(1113)	86175	蝶蠊科 Eumenidae	(1129)
86124	姬蠊科 Pseudomopidae	(1114)	86176	蜜蜂科 Apidae	(1129)
86125	鳖蠊科 Corydiidae	(1114)	86177	胡蜂科 Vespidae	(1130)
86126	鼻白蚁科 Rhinotermitidae	(1114)	86178	没食子蜂科 Cynipidae	(1131)
86127	螳螂科 Mantidae	(1114)	86179	土蜂科 Scolidae	(1131)
86128	蝗科 Acrididae	(1115)	86180	蚁科 Formicidae	(1132)
86129	螽斯科 Tettigoniidae	(1116)		(七) 苔藓动物门 Bryozoa	
86130	蟋蟀科 Gryllidae	(1116)	87181	胞孔苔虫科 Celleporidae	(1132)
86131	螻蛄科 Gryllotalpidae	(1117)		(八) 棘皮动物门 Echinodermata	
86132	蝉科 Cicadidae	(1117)	88182	海参科 Holothuriidae	(1132)
86133	樗鸡科 Fulgoridae	(1118)	88183	刺参科 Stichopodidae	(1133)
86134	胶蚧科 Lacciferidae	(1118)	88184	芋海参科 Molpadiidae	(1133)
86135	绵蚜科 Eriosomatidae	(1119)	88185	槭海星科 Astropectinidae	(1133)
86136	蚧科 Coccidae	(1119)	88186	砂海星科 Luidiidae	(1133)
86137	蝽科 Pentatomidae	(1120)			
86138	龟蝽科 Gerridae	(1120)			

88187	角海星科 Goniasteridae	(1133)
88188	太阳海星科 Solasteridae	(1134)
88189	棘海星科 Echinasteridae	(1134)
88190	海燕科 Asterinidae	(1134)
88191	海盘车科 Asteriidae	(1134)
88192	阳遂足科 Amphipruridae	(1134)
88193	刻肋海胆科 Temnopleuridae	(1134)
88194	毒棘海胆科 Toxopneustidae	(1135)
88195	球海胆科 Strongylocentrotidae	(1135)
88196	长海胆科 Echinometridae	(1135)
88197	蛛网海胆科 Arachnoididae	(1135)

(九) 脊索动物门 Chordata

89198	七鳃鳗科 Petromyzonidae	(1135)
89199	虎鲨科 Heterodontidae	(1136)
89200	六鳃鲨科 Hexanchidae	(1136)
89201	须鲨科 Orectolobidae	(1136)
89202	鲸鲨科 Rhinodontidae	(1136)
89203	锥齿鲨科 Carchariidae	(1136)
89204	姥鲨科 Cetorhinidae	(1136)
89205	猫鲨科 Scyliorhinidae	(1136)
89206	真鲨科 Carcharhinidae	(1137)
89207	皱唇鲨科 Triakidae	(1137)
89208	双髻鲨科 Sphyrnidae	(1137)
89209	角鲨科 Squalidae	(1138)
89210	锯鲨科 Pristiophoridae	(1138)
89211	扁鲨科 Squatinidae	(1138)
89212	锯鳐科 Pristidae	(1138)
89213	犁头鳐科 Rhinobatidae	(1138)
89214	鳐科 Rajidae	(1138)
89215	红鲂科 Daysatidae	(1139)
89216	燕鲂科 Gymnuridae	(1139)
89217	鲼科 Myliobatidae	(1140)
89218	蝠鲼科 Mobulidae	(1140)
89219	银鲛科 Chimaeridae	(1140)
89220	鲟科 Acipenseridae	(1140)
89221	白鲟科 Polyodontidae	(1141)
89222	鲟科 Clupeidae	(1141)
89223	鲱科 Engraulidae	(1141)
89224	鲑科 Salmonidae	(1142)
89225	香鱼科 Plecoglossidae	(1142)
89226	银鱼科 Salangidae	(1142)
89227	狗母鱼科 Synodidae	(1143)
89228	鲤科 Cyprinidae	(1143)
89229	鳅科 Cobitidae	(1148)
89230	平鳍鳅科 Homalopteridae	(1149)
89231	海鲇科 Ariidae	(1149)
89232	鲷科 Plotosidae	(1149)
89233	胡鲇科 Clariidae	(1149)
89234	鲇科 Siluridae	(1149)
89235	鲿科 Bagridae	(1149)
89236	鲟科 Sisoridae	(1150)

89237	鳗鲡科 Anguillidae	(1150)
89238	海鳗科 Muraenidae	(1150)
89239	海鳗科 Muraenesocidae	(1151)
89240	康吉鳗科 Congridae	(1151)
89241	糯鳗科 Echelidae	(1151)
89242	蛇鳗科 Ophichthyidae	(1151)
89243	颌针鱼科 Belonidae	(1152)
89244	鲻科 Hemirhamphidae	(1152)
89245	飞鱼科 Exocoetidae	(1152)
89246	鳐科 Gadidae	(1152)
89247	海龙科 Syngnathidae	(1152)
89248	烟管鱼科 Fistularidae	(1154)
89249	鲟科 Sphyrnidae	(1154)
89250	鲻科 Mugilidae	(1154)
89251	马鲛科 Polynemidae	(1154)
89252	鳢科 Ophiocephalidae	(1155)
89253	合鳃鳉科 Symbranchidae	(1155)
89254	鲈科 Serranidae	(1155)
89255	大眼鲷科 Priacanthidae	(1156)
89256	鳊科 Sillaginidae	(1156)
89257	方头鱼科 Branchiostegidae	(1156)
89258	鲈科 Garangidae	(1156)
89259	乌鲷科 Formionidae	(1156)
89260	鲷科 Leiognathidae	(1156)
89261	石鲈科 Pomadasysidae	(1156)
89262	石首鱼科 Sciaenidae	(1157)
89263	鲷科 Sparidae	(1158)
89264	金钱鱼科 Scatophagidae	(1158)
89265	隆头鱼科 Labridae	(1158)
89266	鰐科 Uranoscopidae	(1158)
89267	绵鲷科 Zoarcidae	(1158)
89268	篮子鱼科 Siganidae	(1158)
89269	带鱼科 Trichiuridae	(1159)
89270	鲭科 Scombridae	(1159)
89271	鲅科 Cybiidae	(1159)
89272	鲷科 Stromateidae	(1159)
89273	金枪鱼科 Thunnidae	(1160)
89274	攀鲈科 Anabantidae	(1160)
89275	塘鳢科 Eleotridae	(1160)
89276	豹虎鱼科 Gobiidae	(1160)
89277	弹涂鱼科 Periophthalmidae	(1161)
89278	鲉科 Scorpaenidae	(1161)
89279	毒鲉科 Synanceiidae	(1161)
89280	鲂科 Trigidae	(1161)
89281	六线鱼科 Hexagrammidae	(1162)
89282	鲷科 Platycephalidae	(1162)
89283	杜父鱼科 Cottidae	(1162)
89284	鲆科 Bothidae	(1162)
89285	鲽科 Pleuronectidae	(1162)
89286	鲷科 Soleidae	(1163)
89287	舌鲷科 Cynoglossidae	(1163)

89288	鲟科 Echenidae	(1163)	89338	鸠鸽科 Columbidae	(1188)
89289	三刺鲃科 Triacanthidae	(1163)	89339	鸚鵡科 Psittacidae	(1189)
89290	鳞鲃科 Balistridae	(1164)	89340	杜鹃科 Cuculidae	(1189)
89291	鲃科 Tetrodontidae	(1164)	89341	鸱鸃科 Strigidae	(1190)
89292	刺鲃科 Diodontidae	(1166)	89342	夜鹰科 Caprimulgidae	(1190)
89293	翻车鲃科 Molidae	(1166)	89343	雨燕科 Apodidae	(1190)
89294	鲛鲃科 Lophiidae	(1166)	89344	翠鸟科 Alcedinidae	(1191)
89295	蝙蝠鱼科 Oncocephalidae	(1166)	89345	戴胜科 Upupidae	(1191)
89296	海蛾鱼科 Pegasidae	(1167)	89346	啄木鸟科 Picidae	(1192)
89297	小鲃科 Hynobiidae	(1167)	89347	百灵科 Alaudidae	(1193)
89298	隐鳃鲃科 Cryptobranchidae	(1167)	89348	燕科 Hirundinidae	(1193)
89299	蝾螈科 Salamandridae	(1167)	89349	黄鹌科 Oriolidae	(1193)
89300	盘舌蟾科 Discoglossidae	(1167)	89350	棕鸟科 Sturnidae	(1194)
89301	蟾蜍科 Bufonidae	(1168)	89351	鸦科 Corvidae	(1194)
89302	雨蛙科 Hylidae	(1168)	89352	河乌科 Cinclidae	(1195)
89303	蛙科 Ranidae	(1169)	89353	鸛科 Troglodytidae	(1195)
89304	树蛙科 Rhacophoridae	(1170)	89354	鸛科 Muscipidae	(1195)
89305	姬蛙科 Microhylidae	(1170)	89355	绣眼鸟科 Zosteropidae	(1195)
89306	龟科 Testudinidae	(1170)	89356	攀雀科 Remizidae	(1196)
89307	海龟科 Cheloniidae	(1171)	89357	文鸟科 Ploceidae	(1196)
89308	棱皮龟科 Dermochelyidae	(1171)	89358	雀科 Fringillidae	(1196)
89309	鳖科 Trionychidae	(1172)	89359	獭科 Erinaceidae	(1197)
89310	鼈蜥科 Agamidae	(1172)	89360	鼯鼠科 Talpidae	(1197)
89311	壁虎科 Gekkonidae	(1173)	89361	狐蝠科 Pteropidae	(1198)
89312	石龙子科 Scincidae	(1174)	89362	菊头蝠科 Rhinolophidae	(1198)
89313	蜥蜴科 Lacertidae	(1174)	89363	蹄蝠科 Hipposideridae	(1198)
89314	蛇蜥科 Anguidae	(1174)	89364	蝙蝠科 Vespertilionidae	(1198)
89315	蟒科 Boidae	(1175)	89365	懒猴科 Lorisidae	(1199)
89316	游蛇科 Colubridae	(1175)	89366	猴科 Cercopithecidae	(1199)
89317	眼镜蛇科 Elapidae	(1177)	89367	猿科 Hylobatidae	(1200)
89318	海蛇科 Hydrophiidae	(1178)	89368	人科 Hominidae	(1200)
89319	蝰科 Viperidae	(1179)	89369	鲛鲤科 Manidae	(1201)
89320	鼉科 Alligatoridae	(1180)	89370	鼠兔科 Ochotonidae	(1201)
89321	鸕鹚科 Podicipedidae	(1180)	89371	兔科 Leporidae	(1202)
89322	鸬鹚科 Pelecanidae	(1181)	89372	鼯鼠科 Petauristidae	(1203)
89323	鸬鹚科 Phalacrocoracidae	(1181)	89373	松鼠科 Sciuridae	(1204)
89324	鹭科 Ardeidae	(1181)	89374	河狸科 Castoridae	(1205)
89325	鸛科 Ciconiidae	(1181)	89375	豪猪科 Hystricidae	(1205)
89326	鸭科 Anatidae	(1182)	89376	竹鼠科 Rhizomyidae	(1205)
89327	隼科 Falconidae	(1183)	89377	鼠科 Muridae	(1206)
89328	鹰科 Accipitridae	(1184)	89378	硬毛鼠科 Capromyidae	(1206)
89329	松鸡科 Tetraonidae	(1185)	89379	仓鼠科 Cricetidae	(1206)
89330	雉科 Phasianidae	(1185)	89380	露脊鲸科 Balaenidae	(1207)
89331	三趾鹑科 Turnicidae	(1187)	89381	灰鲸科 Eschrichtiidae	(1207)
89332	鸛科 Gruidae	(1187)	89382	鲸科 Balaenopteridae	(1207)
89333	秧鸡科 Rallidae	(1187)	89383	淡水豚科 Platanistidae	(1207)
89334	鸛科 Otidae	(1187)	89384	抹香鲸科 Physeteridae	(1208)
89335	鸛科 Scolopacidae	(1187)	89385	海豚科 Delphinidae	(1208)
89336	鸛科 Laridae	(1188)	89386	独角鲸科 Monodontidae	(1208)
89337	沙鸡科 Pteroclididae	(1188)	89387	鼠海豚科 Phocaenidae	(1208)



89388	领航鲸科 Globicephalidae	(1208)	89396	象科 Elephantidae	(1213)
89389	犬科 Canidae	(1208)	89397	儒艮科 Dugongidae	(1213)
89390	熊科 Ursidae	(1209)	89398	马科 Equidae	(1213)
89391	鼬科 Mustelidae	(1210)	89399	犀科 Rhinocerotidae	(1214)
89392	灵猫科 Viverridae	(1211)	89400	猪科 Suidae	(1215)
89393	猫科 Felidae	(1211)	89401	骆驼科 Camelidae	(1215)
89394	海狗科 Otariidae	(1213)	89402	鹿科 Cervidae	(1215)
89395	海豹科 Phocidae	(1213)	89403	牛科 Bovidae	(1218)

## 九、矿 物 类

### (一)主含金属元素类

9101	银(Ag)Argentum	(1221)
9102	铝(Al)Aluminium	(1222)
9103	金(Au)Aurum	(1222)
9104	钡(Ba)Baryum	(1222)
9105	铋(Bi)Bismuthum	(1222)
9106	钙(Ca)Calcium	(1223)
9107	铜(Cu)Cuprum	(1225)
9108	铁(Fe)Ferrum	(1226)
9109	汞(Hg)Hydrargyrum	(1228)
9110	钾(K)Kalium	(1229)
9111	镁(Mg)Magnesium	(1229)
9112	锰(Mn)Manganum	(1229)
9113	钠(Na)Natrium	(1229)
9114	铅(Pb)Plumbum	(1230)
9115	锡(Sn)Stannum	(1231)

9116	锌(Zn)Zincum	(1231)
------	-------------	--------

### (二)主含非金属元素类

9201	砷(As)Arsenium	(1232)
9202	硼(B)Borium	(1233)
9203	碳(C)Carbonium	(1233)
9204	氟(F)Fluorum	(1234)
9205	硫(S)Sulphur	(1234)
9206	硅(Si)及硅酸盐(SiO <sub>4</sub> )Silicium & Sal Silicatum	(1234)

### (三)化石类

9300	化石类 Fossils	(1238)
------	-------------	--------

### (四)其他类

9400	其他类 The others	(1239)
------	----------------	--------

## 一、藻类 Gamophyceae

### 1001 丝藻科 Ulotrichaceae

#### 1001001

*Ulothrix flacca* (Dillw.) Thur.

植物名 软丝藻《藻类名称》

地方名 浙江: 紫菜苔, 绿菜苔; 福建: 绿苔; 广东: 青苔。

功效 藻体: 清热利水, 软坚散结。用于水肿, 咳嗽, 痰结等。

### 1002 礁膜科 Monostromaceae

#### 1002001

*Monostroma angicava* Kjellm.

植物名 袋礁膜《藻类名称》

文献名 囊礁膜、绿塔礁膜《中药材科技》

功效 藻体: 清热化痰, 利水解毒, 软坚散结。

#### 1002002

*Monostroma crassifolia* Tseng et C. F. Chang

植物名 厚礁膜《中国海洋药物》

地方名 浙江: 海青菜。

功效 全藻: 清热解毒, 化痰利水, 软坚散结, 降胆固醇。用于喉炎, 咳嗽痰结, 水肿等。

#### 1002003

*Monostroma nitidum* Witttr.

植物名 礁膜《藻类名称》

地方名 浙江: 苔皮; 福建: 石菜(福安), 蛭被(前岐); 台湾: 大本青苔菜; 广东: 由菜, 绿苔(硃州岛)。

功效 藻体: 清热化痰, 利水解毒, 软坚散结。用于喉炎, 咳嗽痰结, 水肿等。

### 1003 石莼科 Ulvaceae

#### 1003001

*Enteromorpha clathrata* (Roth) Grev.

植物名 条浒苔《藻类名称》

药材名 干苔《食疗本草》

文献名 海苔菜《本草汇言》, 苔菜(姚可成《食物本草》)

地方名 青菜、苔条(上海、浙江); 上海: 海青, 海青菜; 浙江: 烂条。

功效 藻体: 软坚, 消结, 化痰。用于瘰疬, 瘰癧, 烦热鼻衄。

#### 1003002

*Enteromorpha compressa* (L.) Grev.

植物名 扁浒苔《藻类名称》

药材名 干苔《食疗本草》

文献名 苔菜《本草汇言》, 青苔、海苔《朝鲜植汇》

地方名 海青菜(山东、浙江); 辽宁: 筒菜; 浙江: 海青, 苔条, 烂苔, 海青苔。

功效 藻体: 清热解毒, 软坚散结, 止血。用于甲沟炎, 颈淋巴结肿大, 血衄等。

#### 1003003

*Enteromorpha flexuosa* (Wulf.) J. Ag.

植物名 曲浒苔《藻类名称》

地方名 广东: 海菜。

功效 藻体: 清热解毒, 软坚散结。用于颈淋巴结大, 疔疮疖肿等。

#### 1003004

*Enteromorpha intestinalis* (L.) Grev.

植物名 肠浒苔《藻类名称》

药材名 苔条(浙江)

地方名 海青菜(山东、浙江); 辽宁: 筒菜; 山东: 小海菜, 羊刀根, 海刀洋; 江苏: 绿苔, 海苔; 浙江: 海青, 烂苔。

功效 藻体: 清热解毒, 软坚散结。用于手背肿痛, 疮疖, 甲沟炎等。

#### 1003005

*Enteromorpha prolifera* (Muell.) J. Ag.

植物名 浒苔《藻类名称》

文献名 育枝浒苔《中药大辞典》

地方名 海菜(江苏、广东), 海青菜(浙江、山东); 浙江: 苔条, 海青, 烂苔。

功效 藻体: 用于口疔, 背痈, 甲沟炎, 颈淋巴结肿, 瘰癧。外用于消肿排脓。

#### 1003006

*Enteromorpha tubulosa* Kütz.

植物名 管浒苔《藻类名称》

地方名 浙江: 苔条, 烂条, 海青, 海青菜; 广东: 海菜。

功效 藻体: 清热解毒, 软坚散结, 止血。用于甲沟炎, 颈淋巴结肿大, 手背肿痛, 血衄等。

#### 1003007

*Enteromorpha linza* (L.) J. Ag.

植物名 缘管浒苔《藻类名称》

药材名 苔菜《汇编》

文献名 干苔、海苔、苔干、苔干菜、浒苔《汇编》

地方名 浙江: 苔条, 海青, 海青菜, 缘紫菜。

功效 藻体: 用于淋巴腺肿, 痔疾。

#### 1003008

*Ulva conglobata* Kjellm.

植物名 砾菜《藻类名称》

地方名 浙江: 苔条, 海青, 海青菜, 岩头菜; 福建: 绿菜, 猪母菜(平潭), 砺皮菜(莆田); 广东: [昆布](惠阳), 大腹消(饶平)。

功效 藻体: 清热解毒, 下水, 利小便。用于甲状腺肿, 中暑。

#### 1003009

*Ulva fasciata* Delile

植物名 裂片石莼(藻类名称)

地方名 福建: 猪母菜, 绿菜, 砺皮菜(平潭、莆田); 广东: 昆布, 大腹消(饶平), 海菜。

功效 藻体: 软坚, 利尿, 清热解毒。用于甲状腺肿, 中暑, 水肿等。

#### 1003010

*Ulva lactuca* L.

植物名 石莼(藻类名称)

药材名 石莼(本草拾遗)

文献名 海莴苣《中国植物图鉴》, 海白菜、菜石莼《中药志》, 白昆布、绿昆布《品种论述》

地方名 [昆布](福建、台湾、广东), 海菜(福建、广东、海南), 绿菜(浙江、福建); 浙江: 海青菜(舟山、宁波), 海青, 苔条, 岩头青; 福建: 猪母菜, 砺皮菜(平潭、莆田), 岐菜, 石被; 广东: 大腹消(饶平), 青菜婆(惠东), 纶布, 纸菜。

功效 藻体: 下水, 利小便。

#### 1003011

*Ulva linza* L.

植物名 长石莼(药用孢植)

药材名 海白菜(山东)

地方名 辽宁: 海莴苣(辽东半岛); 山东: 海菜, 海菠菜; 江苏: 海苔; 浙江: 海条, 海青, 海青菜; 福建: 猪母菜; 台湾: 大本青苔菜; 广东: 青菜。

功效 藻体: 清热解毒, 软坚散结, 利水降压。用于中暑, 颈淋巴结肿, 甲状腺肿, 疮疖, 小便不利, 水肿, 高血压等。

#### 1003012

*Ulva pertusa* Kjellm.

植物名 孔石莼(藻类名称)

药材名 石莼(本草拾遗)、《中药大辞典》

文献名 菜石莼《中药大辞典》

地方名 海白菜(北京、山东), [昆布](福建、台湾、广东); 辽宁: 海莴苣; 山东: 海菠菜(龙口); 浙江: 海青、海青菜(舟山), 海条(象山), 苔条, 岩头青; 福建: 猪母菜(平潭), 石被; 台湾: 大本青苔菜; 广东: 纸菜。

功效 藻体: 下水, 利小便。

### 1004 水绵科 Zygnemataceae

#### 1004001

*Spirogyra intorta* Jao

植物名 缠络水绵(药用孢植)

药材名 水绵(汇编)

文献名 脆水绵(汇编)

功效 藻体: 清热解毒。用于丹毒, 赤游, 漆疮, 烫

火伤。

#### 1004002

*Spirogyra longata* (Vauch.) Kuetz.

植物名 长形水绵(迪庆藏药)

药材名 水绵(迪庆藏药)

功效 藻体: 用于烫火伤。

#### 1004003

*Spirogyra nitida* (Dillw.) Link

植物名 光亮水绵(藻类名称)

药材名 水绵(纲目)、《浙江药植志》

地方名 浙江: 湖苔。

功效 藻体: 清热解毒。用于丹毒, 赤游, 漆疮, 烫火伤。

### 1005 松藻科 Codiaceae

#### 1005001

*Codium fragile* (Sur.) Hariot.

植物名 刺松藻(中国经济海藻志)

药材名 水松(本草经集注)

文献名 刺海松(拉汉抱称补遗)

地方名 辽宁: 鼠尾巴, 鼠尾藻; 山东: 青虫子(荣成、胶南), 鹿角菜; 浙江: 台条, 海青, 海青菜; 福建: 软软菜。

功效 藻体: 驱蛔虫, 消肿, 利尿, 催生。

### 1006 轮藻科 Characeae

#### 1006001

*Chara fragilis* Desv.

植物名 脆轮藻(藻类名称)

药材名 鱼草(山西医药)

文献名 车轴藻(中国植物图鉴)

功效 藻体: 祛痰, 止咳, 平喘。用于慢性气管炎, 咳嗽, 气喘, 胸闷。

#### 1006002

*Nitella expansa* T.F. Allen

植物名 膨胀丽藻(藻类名称)

药材名 水茴香藻(汇编)

文献名 拟轮藻(药用孢植)

地方名 贵州: 水茴香。

功效 藻体: 疏风清热, 利湿, 止渴。用于水呛咳, 风热感冒。外用于烫火伤。

### 1007 网地藻科 Dictyotaceae

#### 1007001

*Dictyopteris divaricata* (Okam.) Okam.

植物名 叉开网翼藻(藻类名称)

文献名 网翼藻(海洋药物)

功效 藻体: 富含抗坏血酸, 可作提取维生素 C 的药物原料。

#### 1007002

*Dictyota divaricata* Lamk.

植物名 叉开网地藻(藻类名称)

药材名 叉开网地藻《中国海洋药物》

地方名 浙江:网地藻。

功效 全藻:A、O型血凝集素。

### 1008 海蘊科 *Spermatochaceae*

#### 1008001

*Nemacystus decipiens* (Sur.) Kuck.

植物名 海蘊《藻类名称》

药材名 海蘊《本草拾遗》

地方名 山东:滑溜菜。

功效 藻体:消瘿,散结,下水。

### 1009 铁钉菜科 *Ishigeaceae*

#### 1009001

*Ishige foliacea* Okam

植物名 叶状铁钉菜《藻类名称》

药材名 铁钉菜(广东)

文献名 扁铁钉菜《南海药用生物》

地方名 福建:铁钉菜头,铁钉菜花;广东:铁线草,剪刀菜。

功效 藻体:驱蛔虫。

#### 1009002

*Ishige okamuriae* Yendo

植物名 铁钉菜《藻类名称》

药材名 铁钉菜《浙江药植志》

地方名 浙江:铁钉,铁钉草(洞头),海苔,破网;广东:铁菜(惠阳),铁线草、剪刀菜(惠来、惠东),摇鼓铃(惠东)。

功效 藻体:驱蛔虫。

### 1010 荳藻科 *Scytosiphonaceae*

#### 1010001

*Ectocarpus confervoides* (Roth) Le Jolis

植物名 水云《藻类名称》

功效 藻体:富含抗坏血酸,可作提取维生素C的药物原料。

#### 1010002

*Endarachne binghamiae* J. Ag.

植物名 鹅肠菜《藻类名称》

文献名 黑昆布、小海带《药用海洋生物》,土鹅掌菜《品种论述》

地方名 脚皮菜(福建、广东),[昆布](浙江、福建、湖南、广东);浙江:野海带;福建:鹅蛋菜;台湾:脚白菜,鸡肠菜;广东:土海带。

功效 藻体:消痰去火。用于淋巴结结核,干咳型结核。

#### 1010003

*Scytosiphon lomentarius* (Lyngb.) J. Ag.

植物名 荳藻《藻类名称》

地方名 海嘎线(辽宁、山东);辽宁:海麻线(大连);山东:捞子筋(日照);江苏:黄海菜、海菜管(连云港);浙江:海通草。

功效 藻体:用于干咳,喉炎,甲状腺肿大,颈淋巴结核。

### 1011 绳藻科 *Chordaceae*

#### 1011001

*Chorda filum* (L.) Lamx.

植物名 绳藻《藻类名称》

地方名 辽宁:海嘎子;山东:海麻线,麻绳菜。

功效 藻体:为提制褐藻酸钠、甘露醇等的药物原料。

### 1012 昆布科 *Laminariaceae*

#### 1012001

*Laminaria angustata* Kjellm.

植物名 狭叶海带《藻类名称》

药材名 狭叶昆布《抱植名称》

文献名 三石昆布《和汉药理学》

地方名 海南:昆布。

功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

#### 1012002

*Laminaria digitata* Lamx. --- *L. ochotensis* Miyabe

植物名 掌状昆布《英汉药理学词汇》

药材名 昆布《海洋药物》,掌状海带《藻类名称》

功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

#### 1012003

*Laminaria japonica* Aresch.

植物名 昆布《抱植名称》

药材名 昆布《吴普本草》、《药典》

文献名 纶布《吴普本草》,高丽昆布《广济方》,海带《名实图考》,东洋菜《朝鲜植汇》,海昆布、海布《和汉药理学》,海带根《中药大辞典》

功效 藻体:软坚散结,消痰,利水。用于瘰癧,瘰癧,睾丸肿痛,痰饮水肿;根:用于慢性气管炎,咳嗽,气喘,高血压,头晕。

备考 古今药用昆布均有异物同名情况。我国最早药用的昆布,亦即陶弘景时代所用的昆布,其原植物经作者考证应为 *Laminaria japonica* Aresch.。就其形态而言,符合昆布最先命名的含义(昆布意即形如长大的布),可认为是我国药用历史最悠久的昆布种类;而且在全国广大地区使用,又是药用昆布的主流品种,过去植物文献如《孢子植物名称》(1964)就称此为昆布。但现在有些文献反而不适当地改变其原植物之中文名,并同时相应的改变其属名、科名及目名。作者认为这种改变是不必要的,是由于对昆布的药用历史未加深究所造成的结果。*Laminaria japonica* Aresch.的原植物中文名仍应恢复其昆布之名。同时“*Laminariaceae*”也应恢复用“昆布科”而不用“海带科”之名。(明代以前的海带不是 *Laminaria japonica* Aresch.)

### 1013 翅藻科 *Alariaceae*

#### 1013001

*Ecklonia kurome* Okam.

植物名 鹅掌菜(浙江、福建)、《品种论述》  
 药材名 昆布《纲目》、《药典》  
 文献名 黑昆布、掌叶昆布、黑菜《品种论述》  
 地方名 浙江:面其菜,荒布,昆布菜,吐血菜;福建:木屐菜,五掌菜。

功效 藻体:软坚散结,消痰,利水。用于瘰疬,瘰癧,睾丸肿痛,痰饮水肿。

## 1013002

*Undaria pinnatifida* (Harv.) Suringar

植物名 裙带菜(姚可成《食物本草》)  
 药材名 昆布(浙江、江苏、河北、辽宁、吉林)、《品种论述》

文献名 海藻、甘藷《朝鲜植汇》  
 地方名 浙江:海芥菜(嵊泗),裙带,布菜(温州)。其他:若布、和布(日名)。

功效 藻体:软坚,行水。用于瘰癧,瘰疬,瘰疬,水肿,睾丸肿痛,带下。

1014 鹿角菜科 *Fucaceae*

## 1014001

*Pelvetia siliquosa* Tseng et C. F. Chang

植物名 鹿角菜《藻类名称》  
 药材名 鹿角菜《藻类名称》  
 文献名 枯枝藻、不毛叉藻《药用抱植》  
 地方名 辽宁:鹿角棒(金县);山东:鹿角豆(荣城),鹿角尖。

功效 藻体:软坚散结,镇咳化痰。用于甲状腺肿,颈淋巴结肿,支气管炎,咳嗽,肺结核等。

1015 马尾藻科 *Sargassaceae*

## 1015001

*Sargassum confusum* C. Ag.

植物名 北戴河马尾藻(拟)  
 药材名 混海藻《品种论述》  
 地方名 河北:海藻(北戴河)。  
 功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015002

*Sargassum enerve* Ag.

植物名 无肋马尾藻《藻类名称》  
 药材名 海藻《汇编》  
 文献名 马尾藻《纲目》,神马草、海阳草《新纲》,三角马尾藻《品种论述》  
 地方名 浙江:山头麦(温州)。  
 功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015003

*Sargassum fulvellum* Ag.

植物名 微肋马尾藻《藻类名称》  
 地方名 海藻(辽宁、河北、台湾);吉林:瘦海藻(长春);辽宁:淡海藻(营口)。  
 功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015004

*Sargassum fusiforme* (Harv.) Setch.

植物名 羊栖菜《漳浦县志》、《汇编》

药材名 海藻《本经》、《药典》

文献名 蕤《尔雅》,落首《本经》,藻《别录》,乌菜《罗源县志》,海带花《中药材手册》,小海藻《鉴别手册》,小叶海藻《品种论述》,羊栖菜马尾藻《藻类名称》

地方名 鹿角尖(辽宁、山东),海茜(浙江、福建);山东:海菜芽(荣成),杨角子,羊奶子;浙江:海大麦(嵊泗、象山、温州),大麦菜,破网;福建:六角菜,胡须泡,秧菜(福鼎),钓滚菜,玉海藻,灯笼海藻;广东:玉草,玉茜(海陵岛),海草(惠阳),茜米,龟鱼茜。

功效 藻体:软坚散结,消痰,利水。用于瘰疬,瘰癧,睾丸肿痛,痰饮水肿。

## 1015005

*Sargassum graminifolium* Turn.

植物名 草叶马尾藻《藻类名称》  
 文献名 糙叶马尾藻《中草药通讯》  
 地方名 浙江:海大麦,海茜菜,破网。  
 功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015006

*Sargassum hemiphyllum* (Turn.) Ag.

植物名 半叶马尾藻《藻类名称》  
 地方名 浙江:海蓑衣;福建:草茜;广东:海藻,海茜,玉海藻,矾菜。  
 功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015007

*Sargassum henslowianum* Ag.

植物名 柱枝马尾藻《药用抱植》  
 文献名 总状马尾藻《药用海洋生物》,亨氏马尾藻《藻类名称》  
 地方名 广东:海藻,海茜(惠阳),玉海藻。

功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015008

*Sargassum horneri* (Turn.) C. Ag.

植物名 铜藻《藻类名称》  
 文献名 柱囊马尾藻《药用抱植》  
 地方名 浙江:海柳麦(嵊泗),丁香屋;福建:草茜(莆田);广东:海藻,海茜,玉海藻,油菜、竹茜菜(饶干)。  
 功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015009

*Sargassum kjellmanianum* Yendo

植物名 海黍子《藻类名称》  
 药材名 海藻《汇编》  
 地方名 山东:谷穗子;福建:草茜。  
 功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015010

*Sargassum pallidum* (Turn.) Ag.

植物名 海蒿子《藻类名称》  
 药材名 海藻《本经》、《药典》  
 文献名 蕤《尔雅》,落首《本经》,藻《别录》,乌菜《罗源县志》,大叶海藻《品种论述》



地方名 三角藻(河北、辽宁);辽宁:大蒿子(旅顺),马尾藻;山东:海根菜(龙口),海藻菜,大谷穗;江苏:海草(连云港)。

功效 藻体:软坚散结,消痰,利水。用于瘰疬,瘰癧,睾丸肿痛,痰饮水肿。

## 1015011

*Sargassum polycystum* Ag.

植物名 匍枝马尾藻《藻类名称》

地方名 广东:海底藤,海苣,玉海苣。

功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

备考 据《鉴别手册》载:北京1964年曾以本品作海藻用。

## 1015012

*Sargassum serratifolium*

植物名 齿叶马尾藻《品种论述》

地方名 辽宁:海藻(营口)。

功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

备考 石产谷勉《朝鲜药学会杂志》报导,过去辽宁营口药用的海藻为本品。

## 1015013

*Sargassum siliqustrum* (Turn.) Ag.

植物名 裂叶马尾藻《藻类名称》

药材名 海藻《台湾中药材图鉴》

地方名 广东:海苣,玉海藻;其他:海菜,头发菜,马尾藻。

功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015014

*Sargassum thunbergii* (Mert.) O. Kuntze

植物名 鼠尾藻《藻类名称》

地方名 辽宁:谷穗子,谷穗果;山东:谷穗蒿;浙江:老鼠尾巴(舟山),老鼠尾;福建:草西马尾丝,卜卜菜,马尾,虎茜沱;广东:牛尾苣,海苣。

功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015014a

*Sargassum tortile* C. Ag.

植物名 三角藻《药材学》

药材名 海藻《药材学》

文献名 三棱马尾藻《品种论述》

地方名 台湾:[海带];广西:马尾藻、山头麦、羊栖菜、海萝(北海)。

功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1015015

*Sargassum vachellianum* Grev.

植物名 扁枝马尾藻《植分学报》

药材名 海藻(安徽)

文献名 闽粤马尾藻《汇编》,澳门马尾藻《药用海洋生物》,瓦氏马尾藻《中国海洋药物》

地方名 浙江:马尾藻,破网;福建:海苣;广东:博苣。

功效 藻体:软坚散结,消痰利水。

## 1016 念珠藻科 Nostocaceae

## 1016001

*Nostoc commune* Vauch.

植物名 地木耳(陕西、江西、四川)、《藻类名称》

药材名 葛仙米《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 地耳、地踏菇、鼻涕肉《野菜博录》,天仙菜、天仙米《纲目拾遗》,发菜《中国植物图鉴》

地方名 地软(陕西、甘肃、宁夏);吉林:地瓜皮(镇赉);内蒙古:地皮;陕西:[地衣];甘肃:滴达菜(兰州),地软子(天水),地见皮(张掖);四川:地松皮,地腊树。其他:水木耳。

功效 藻体:清热,收敛,益气,明目。用于夜盲症,脱肛。外用于烧烫伤。

1016002 见 1015014a

## 1017 鞭枝藻科 Mastigocladaceae

## 1017001

*Brachytrichia quoyi* (C. Ag.) Born. et Flah.

植物名 海雹菜《药用孢植》

功效 藻体:解毒利水。用于水肿。

## 1018 胶须藻科 Rivulariaceae

## 1018001

*Calothrix crustacea* Thuret

植物名 苔垢菜《藻类名称》

药材名 苔垢菜《中国海洋药物》

地方名 浙江:紫菜苔。

功效 藻体:清热解毒。用于水肿。

## 1018002

*Calothrix parasitica* (Chauv.) Thuret

植物名 寄生眉藻《藻类名称》

药材名 苔垢菜《药用海洋生物》

地方名 浙江:紫菜苔(南麂列岛)。

功效 藻体:利水解毒。用于水肿病。

## 1019 红毛菜科 Bangiaceae

## 1019001

*Bangia fusco-purpurea* (Dillw.) Lyngb.

植物名 红毛菜《藻类名称》

药材名 红毛菜《藻类名称》

文献名 红毛藻《植分学报》

地方名 浙江:紫菜台(金乡)。

功效 藻体:解毒,利水。

## 1019002

*Porphyra crispata* Kjellm.

植物名 绉紫菜《藻类名称》

地方名 浙江:素菜;广东:紫菜,乌菜。

功效 藻体:化痰软坚,清热利尿。用于瘰疬结气,水肿,淋病等。

## 1019003

*Porphyra dentata* Kjellm.

植物名 长紫菜《藻类名称》

文献名 紫菜、乌菜《南海药用生物》

地方名 浙江:索菜;福建:柳条菜。

功效 藻体:清热消肿,软坚补肾。用于甲状腺肿大,喉炎,水肿。

#### 1019004

*Porphyra haitanensis* T. J. Chang et B. F. Zheng

植物名 坛紫菜《藻类名称》

药材名 紫菜《食疗本草》

文献名 紫萁《纲目》,索菜《漳浦县志》,子菜《漳州府志》

地方名 广东:乌菜。

功效 藻体:清热,化痰,软坚,利水。用于甲状腺肿,高血压,气管炎等。

#### 1019005

*Porphyra marginata* Tseng et T. J. Chang

植物名 边紫菜《藻类名称》

文献名 刺边紫菜《中草药通讯》

功效 藻体:清热,软坚,利尿,消肿,降压。用于高血压,甲状腺肿,支气管炎,喉炎,水肿。

#### 1019006

*Porphyra suborbiculata* Kjellm.

植物名 圆紫菜《藻类名称》

文献名 乌菜《南海药用生物》

地方名 紫菜(山东、江苏、浙江、福建、广东、广西);浙江:索菜;福建:春菜。

功效 藻体:软坚,利水,清凉泄热。用于支气管炎,喉炎,甲状腺肿,高血压等。

#### 1019007

*Porphyra tenera* Kjellm.

植物名 甘紫菜《藻类名称》

药材名 紫菜《食疗本草》

文献名 紫萁《纲目》,紫英《本草从新》,子菜《漳州府志》,索菜《漳浦县志》,海衣、海苔、甘苔《满鲜植汇》,味附海苔、楔形紫菜《藻检》,冬菜、春菜、大礁菜《生物通报》

地方名 山东:紫塔膜菜;其他:铜皮菜(庙岛群岛)。

功效 藻体:化痰软坚,清热利尿。用于瘰疬,脚气,水肿,淋病。

#### 1019008

*Porphyra yezoensis* Ueda

植物名 条斑紫菜《藻类名称》

文献名 紫菜《中药材科技》

地方名 浙江:索菜。

功效 藻体:清凉泄热,利水消肿,软坚,补肾。用于甲状腺肿,高血压,支气管炎,喉炎,水肿,麻疹等。

### 1020 海索面科 Nemalionaceae

#### 1020001

*Nemalion pulvinatum* Grun.

植物名 叉枝海索面《海洋药物》

功效 藻体:驱蛔。

### 1021 粘皮藻科 Chaetangiaceae

#### 1021001

*Scinaia japonica* Setch.

植物名 日本鲜奈藻《藻类名称》

文献名 日本新那藻《海洋药物》

功效 藻体:驱蛔。

### 1022 石花菜科 Gelidiaceae

#### 1022001

*Acanthopeltis Japonica* Okam.

植物名 日本刺盾藻《藻类名称》

文献名 红藻《海洋药物》

功效 藻体:驱蛔。

#### 1022002

*Gelidium amansii* Lamx.

植物名 石花菜《藻类名称》

药材名 石花菜《纲目》、《汇编》

文献名 琼枝《纲目》,毛石花菜《药用抱植》

地方名 琼胶、琼脂、冻琼脂、洋菜、雪菜、洋粉、海菜粉、寒天(加工品)、鸡毛菜(山东、辽宁),冻菜(浙江、山东),凤尾(江苏、台湾);山东:牛毛菜(青岛),沙根子(日照);江苏:海草;福建:红丝(平潭);台湾:大本、小本(基隆)。

功效 藻体:驱蛔,缓泻,去上焦风热。

#### 1022003

*Gelidium cartilagineum* Gaill.

植物名 软骨石花菜《海洋药物》

功效 藻体:驱蛔。

#### 1022004

*Gelidium crinale* (Turn.) Lamx.

植物名 细毛石花菜《藻类名称》

地方名 山东:马毛;浙江:岩衣;广东:石花菜,狗毛菜(海丰)。

功效 藻体:清热解毒。用于肾盂炎,肠炎。

#### 1022005

*Gelidium divaricatum* Martens

植物名 小石花菜《藻类名称》

地方名 石花(浙江、福建);浙江:岩衣;福建:生冻草,石花菜;广东:狗毛菜(海丰)。

功效 藻体:清凉。用于痢疾,血小板病(散掉皮斑)。

#### 1022006

*Gelidium japonicum* (Harv.) Okam.

植物名 中肋石花菜《藻类名称》

文献名 鬼石花菜、石花胶《药用抱植》

功效 藻体:清热解毒。用于肠炎,肾盂炎;琼胶:用于慢性便秘。

#### 1022007

*Gelidium pacificum* Okam.

植物名 大石花菜《藻类名称》

地方名 浙江:鸡毛菜。

功 效 藻体:清热解毒。用于肠炎,肾盂炎。

## 1022008

*Gelidium pusillum* (Stackh.) Le Jol.

植物名 匍匐石花菜《中国海洋药物》

地方名 浙江:石花菜。

功 效 全藻:清热解毒。用于肠炎,肾盂肾炎。

## 1022009

*Gelidium subcostatum* Okam.

植物名 扁平石花菜《藻类名称》

功 效 藻体:驱蛔。

## 1022010

*Gelidium vagum* Okam.

植物名 异形石花菜《中国海洋药物》

地方名 浙江:石花菜。

功 效 全藻:清热解毒。

## 1022011

*Pterocladia tenuis* Okam.

植物名 鸡毛菜《藻类名称》

文献名 翼枝藻《药用抱植》

地方名 山东:冻菜渣渣(青岛);台湾:浅水藻(基隆)。

功 效 藻体:化痰软坚,清凉泻火。用于干咳痰结,喉炎;琼胶:用于慢性便秘。

## 1023 胶粘藻科 Dumontiaceae

## 1023001

*Dilsea edulis* Stackh.

植物名 红菜《海洋药物》

功效 藻体:驱蛔。

## 1023002

*Dudresnaya japonica* Okam.

植物名 日本屠氏藻《海洋药物》

功 效 藻体:驱蛔。

## 1024 珊瑚藻科 Corallinaceae

## 1024001

*Corallina officinalis* L.

植物名 珊瑚藻《藻类名称》

功 效 藻体:驱蛔虫。

## 1024002

*Corallina pilulifera* Postels et Ruprecht

植物名 小珊瑚藻《藻类名称》

功 效 藻体:驱蛔虫。

## 1024003

*Jania decussato-dichotoma* (Yendo) Yendo

植物名 交叉窝柄藻《海洋药物》

功 效 藻体:驱蛔虫。

## 1024004

*Lithophyllum okamurai* Fosl.

植物名 冈村石叶藻《中国海洋药物》

药材名 石叶藻(拟)

地方名 浙江:海浮石,浮石,石花,大花。

功 效 全藻:清肺化痰,软坚散结。用于咳嗽吐血,痰结粘稠,瘰疬,淋病。

## 1025 海萝科 Endocladiaceae

## 1025001

*Gloiopeltis furcata* (Post. et Rupr.) J. Ag.

植物名 海萝《尔雅》、《藻类名称》

药材名 鹿角菜《食性本草》

文献名 猴葵、鹿角《南越志》,赤菜《闽书》,山花菜《岭南采药录》,布海苔、布糊《和汉药名汇》

地方名 红菜(浙江、福建、广东);山东:牛毛,毛毛菜,牛毛菜;广东:胶菜(惠东、海丰、惠阳等),〔石花菜〕,〔红毛菜〕。

功 效 藻体:清热,消食,化痰。用于劳热,痰结,痞积,痔疾。

## 1025002

*Gloiopeltis tenax* (Turn.) J. Ag.

植物名 鹿角海萝《藻类名称》

文献名 布海苔、布糊《和汉药名汇》,鹿赤菜、猴葵《药用抱植》,海萝《中国海洋药物》

地方名 红菜(浙江、福建、广东),赤菜(福建、广东);广东:胶菜(台山)。

功 效 藻体:驱风除湿。用于风湿痛,关节酸痛。

## 1026 蜈蚣藻科 Grateloupiaceae

## 1026001

*Grateloupia divaricata* Okam.

植物名 叉开蜈蚣藻《藻类名称》

药材名 叉开蜈蚣藻《海洋药物》

功 效 藻体:驱蛔。

## 1026002

*Grateloupia elliptica* Holm.

植物名 掌状蜈蚣藻《中国经济海藻志》

功 效 藻体:软坚散结,消痰利水。

备 考 《品种论述》谓:《本草拾遗》所记载的南海“昆布”,可能为本品。

## 1026003

*Grateloupia filicina* C. Ag.

植物名 蜈蚣藻《藻类名称》

地方名 福建:海赤菜;广东:冬家烂、膏菜(惠来)。

功 效 藻体:清热解毒,驱虫。用于肠炎,风热喉炎,蛔虫病。

## 1026004

*Grateloupia livida* (Harv.) Yamada

植物名 舌状蜈蚣藻《藻类名称》

地方名 浙江:岩头菜;广东:佛祖菜(惠来),面菜(潮阳);海南:海菜。

功 效 藻体:用于蛔虫,鞭虫,蛲虫病。

## 1026005

*Grateloupia prolongata* J. Ag. --- *G. filicina* var. *prolongata* (J. Ag.) Tseng

植物名 长枝蜈蚣藻《中国海洋药物》

地方名 浙江:蜈蚣藻。

功效 全藻:清热解毒,驱虫。

#### 1026006

*Halymenia sinensis* Tseng et C. F. Chang

植物名 海膜《藻类名称》

功效 藻体:驱蛔虫。

#### 1026007

*Pachymenia carnosia* J. Ag.

植物名 厚膜藻《中国海洋药物》

地方名 浙江:[昆布]。

功效 全藻:软坚散结,消痰,利水。并为提取卡拉胶之原料。

#### 1026008

*Pachymeniopsis elliptica* (Holm.) Yamada

植物名 拟厚膜藻《中国海洋药物》

地方名 浙江:厚膜藻。

功效 全藻:提制卡拉胶原料。

#### 1026009

*Polyopes polydeoides* Okam.

植物名 海柏《藻类名称》

功效 藻体:清热,泻火。用于肠胃炎,胃痛及高血压。

### 1027 江蓠科 Gracilariaceae

#### 1027001

*Gracilaria bursa-pastoris* (Gmel.) Silva

植物名 脆江蓠《藻类名称》

文献名 蒲藻、白藻、扁江蓠《药用抱植》

地方名 浙江:龙须菜;福建:羊胡须(平潭);海南:海菜。

功效 藻体:清热,利水,化痰,软坚。用于癥结结气,小便不利,内热痰结。

#### 1027002

*Gracilaria constricta* C. F. Chang et B. M. Xia

植物名 缢江蓠《南海药用生物》

地方名 海南:海菜。

功效 藻体:清热,利水,化痰,软坚。

#### 1027003

*Gracilaria eucheumoides* Harv.

植物名 凤尾菜《藻类名称》

功效 藻体:可提取红藻胶,代替阿拉伯胶与西黄芪胶作鱼肝油乳的乳化剂。

#### 1027004

*Gracilaria textorii* (Sur.) J. Ag.

植物名 扁江蓠《藻类名称》

药材名 蒲藻《中国经济海藻志》

地方名 山东:风头。

功效 藻体:清热,利水,化痰,软坚。

#### 1027005

*Gracilaria verrucosa* (Huds.) Papenfuss --- *G. confervoides* (L.) Grev.

植物名 江蓠《藻类名称》

文献名 龙须菜《纲目》,海菜《漳浦县志》,线菜《闽志》

地方名 山东:牛毛;浙江:海粉干(象山);福建:竹筒菜(连江),毛头发;广东:发菜;海南:海面线,蚝菜,毛头菜,粉菜。

功效 藻体:清热,利水,化痰,软坚。

### 1028 红翎菜科 Solieriaceae

#### 1028001

*Eucheuma gelatinae* (Esper) J. Ag.

植物名 琼枝《纲目》、《藻类名称》

药材名 石花菜《日本本草》、《中药大辞典》

文献名 石华(郭璞《海赋》),海菜、草珊瑚《南越笔记》

地方名 广东:石芝,石衣菜,胶麒麟菜;海南:菜籽。

功效 藻体:润肺化痰,清热,软坚。用于支气管炎,痰结,癰瘤,肠炎,痔疾等。

#### 1028002

*Eucheuma muricatum* (Gmel.) Weber van Bosse

植物名 麒麟菜《藻类名称》

药材名 麒麟菜《纲目拾遗》

文献名 鸡脚菜《纲目》,鹿角菜《琉球国志略》,鸡胶菜《罗源县志》

功效 藻体:消痰。

#### 1028003

*Eucheuma okamurai* Yamada

植物名 珍珠麒麟菜《藻类名称》

药材名 麒麟菜《纲目拾遗》

文献名 珍珠菜、鸡脚菜《纲目》

地方名 广东:鹿角菜,鸡胶菜。

功效 藻体:消痰。

### 1029 沙菜科 Hypneaceae

1029001 见 1029002a

#### 1029002

*Hypnea cervicornis* J. Ag.

植物名 鹿角沙菜《藻类名称》

药材名 沙菜《药用抱植》

地方名 福建:藓藻。

功效 藻体:轻泻剂。用于慢性便秘等。

#### 1029002a

*Hypnea charoides* Lamx.

植物名 长枝沙菜《藻类名称》

功效 藻体:用于慢性便秘。

#### 1029003

*Hypnea japonica* Tanaka

植物名 冻沙菜《藻类名称》

地方名 广东:茜尾菜,撕尾冻,膏菜,钩菜,三家麻,海菜。

功效 藻体:制琼胶,用于慢性便秘。

#### 1029004

*Hypnea musciformis* (Wulf.) C. Ag.

植物名 钩沙菜《藻类名称》

功效 藻体;利尿。

### 1030 叉枝藻科 Phylloporaceae

#### 1030001

*Gymnangrus flabelliformis* Harv.

植物名 扇形叉枝藻《藻类名称》

文献名 叉枝藻《植分学报》,丝藻、软骨红藻《药用抱植》

地方名 山东:扁枝子,鲍鱼菜,猪毛菜。

功效 藻体;缓下。

### 1031 杉藻科 Gigartinaceae

#### 1031001

*Chondrus crispus* (Lyngb.) Stackh.

植物名 皱波角叉菜《藻类名称》

功效 藻体;为提制卡拉胶(角叉菜胶)的原料,医药方面用作抗凝血剂。

#### 1031002

*Chondrus ocellatus* Holm.

植物名 角叉菜《藻类名称》

药材名 角叉菜《汇编》

文献名 猴葵《纲目》,海萝(和汉药名汇)

地方名 鹿角菜(浙江、台湾)。

功效 藻体;可提取卡拉胶(Carrageenan)。

备考 藻体;从角叉菜中提取的卡拉胶,对B型流感与腮腺炎病毒有一定的干扰作用,并有抗胃蛋白酶或抗溃疡病作用。角叉菜胶可作缓泻剂,同时用于骨科,能促进结缔组织增生。

#### 1031003

*Gigartina intermedia* Suring.

植物名 小杉藻《藻类名称》

药材名 小松藻《汇编》

文献名 小杉海苔《植分学报》,小葡萄藻《药用抱植》

地方名 台湾:茶叶藻,茶米菜。

功效 藻体;提取卡拉胶。用于胃及十二指肠溃疡。

### 1032 仙菜科 Ceramiaceae

#### 1032001

*Campylaephora hypnaeoides* J. Ag.

植物名 钩凝菜《藻类名称》

药材名 钩仙菜(山东)

文献名 红藻《海洋药物》

地方名 山东:牛毛石花菜。

功效 藻体;用于慢性便秘。

#### 1032002

*Ceramium boydenii* Gepp.

植物名 轮枝仙菜《药用抱植》

文献名 波登仙菜《藻类名称》,红藻《海洋药物》

地方名 山东:糕菜,小糕;浙江:仙菜。

功效 藻体;制琼胶。用于慢性便秘。

#### 1032003

*Ceramium kondoi* Yendo

植物名 二叉仙菜《藻类名称》

文献名 三叉仙菜、小凝菜、海发《药用抱植》

地方名 辽宁:糕菜;山东:红蒿子;浙江:仙菜。

功效 藻体;制琼胶。用于慢性便秘。

#### 1032004

*Ceramium tenerrimum* (Mart.) Okam.

植物名 柔枝仙菜(拉汉海洋生物名称)

药材名 柔质仙菜《中国海洋药物》

地方名 浙江:仙菜。

功效 全藻;清热解毒。制琼胶的辅助原料。

### 1033 红叶藻科 Delesseriaceae

#### 1033001

*Caloglossa leprieurii* (Mont.) J. Ag.

植物名 鹧鸪菜(漳浦县志)、《藻类名称》

药材名 鹧鸪菜《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 美舌藻《汇编》

地方名 鲁地菜(福建、广东),乌菜(浙江、广东);浙江:岩头菜、岩衣(温州);福建:蛔虫菜(漳浦);广东:石炬(台山),池藻、竹环菜(潮阳)。

功效 全草;驱虫。用于蛔虫病,蛔虫性肠梗阻。

### 1034 松节藻科 Rhodomelaceae

#### 1034001

*Alsidium helminthochorton*

植物名 驱虫苔《海洋药物》

功效 藻体;驱蛔。

#### 1034002

*Chondria armata* (Kütz.) Okam.

植物名 树枝软骨藻《藻类名称》

文献名 树状软骨藻《药用海洋生物》

地方名 台湾:“拉拉撒”(卯美族语)。

功效 藻体;驱虫。用于蛲虫病,蛔虫病。

#### 1034003

*Chondria crassicaulis* Harv.

植物名 粗枝软骨藻《中国海洋药物》

文献名 粗茎软骨藻《中国海洋药物》

功效 全藻;驱蛔虫和蛲虫。

#### 1034004

*Digenia simplex* (Wulf.) C. Ag.

植物名 海人草《藻类名称》

药材名 海人草《汇编》

文献名 船底苔(和汉药理学),海鹿、老毒(新纲),鹧鸪菜[日名]、海仁草《汇编》

功效 藻体;驱虫。用于蛔虫病,排除粘液及婴儿胎毒等。

#### 1034005

*Enantiocladia latiuscula* (Harv.) Okam.

植物名 反枝藻《海洋药物》

功 效 藻体:驱蛔。

#### 1034006

*Laurencia okamurai* Yamada

植物名 冈村凹顶藻《藻类名称》

药材名 凹顶藻《中国海洋药物》

功 效 全藻:清热,软坚散结,化痰去痰,攻邪。

#### 1034007

*Ploysisiphonia morrowii* Harv.

植物名 内枝多管藻《藻类名称》

功 效 藻体:驱蛔。

#### 1034008

*Rhodomela larix* (Turn.) C. Ag.

植物名 松节藻《海洋药物》

功 效 藻体:驱蛔。

## 二、真菌类 *Eumycophyta*

### 2001 粉瘤菌科 *Lycogalaceae*

#### 2001001

*Lycogala epidendrum* (L.) Fr.

真菌名 粉瘤菌《西藏真菌》

功 效 子实体:外用干粘膜发炎。

### 2002 霜霉科 *Peronosporaceae*

#### 2002001

*Sclerospora graminicola* (Sacc.) Schrot.

真菌名 禾生指梗霉《中国真菌总汇》

药材名 糠谷老《山西中草药》

文献名 粟白发、粟指梗霉、看谷老、枪谷老、枪谷、老枪谷、老谷穗、谷子白发《中国药用真菌》

功 效 染病花序(包括卵孢子):清湿热,利小便,止痢。用于尿道炎,小便涩痛,体虚浮肿,心烦,口渴,小便少,痢疾,尿闭。

### 2003 酵母科 *Saccharomycetaceae*

#### 2003001

*Saccharomyces cerevisiae* Hansen

真菌名 酿酒酵母《中国真菌总汇》

药材名 啤酒酵母《汇编》

文献名 酵母菌、酿酒菌、麦酒酵母菌《中国植物图鉴》,药用酵母、压榨酵母、酵母(李《生药》)

功 效 菌体:用于消化不良,腹泻及胃肠充气,脚气病,多发性神经炎,糙皮病。

### 2004 曲霉科 *Eurotiaceae*

#### 2004001

*Monascus fuliginosus* Sato

真菌名 烟色红曲《真菌名称》

文献名 烟色红曲霉(杨、岳《药用真菌》)

功 效 菌体:可制红曲。用于消食健脾,赤白痢,跌打损伤等。

#### 2004002

*Monascus purpureus* Went.

真菌名 红曲《中国真菌总汇》

药材名 红曲《中国药用真菌》

文献名 紫红曲《真菌名称》,红曲霉、紫红曲霉、红大米、红糟《中国药用真菌》,紫色红曲霉《(药典)附录》

功 效 菌丝体及孢子:消食和胃,活血止痛,健脾燥胃。用于饮食停滞,胸膈满闷,消化不良,痰多,胃脘不开,痢疾,跌打损伤,妇女气血痛。

### 2005 麦角菌科 *Clavicipitaceae*

#### 2005001

*Claviceps microcephala* (Wallr.) Tul.

真菌名 小头麦角《中国真菌总汇》

药材名 小麦角(东北)

文献名 麦角菌《植物学大辞典》,小麦角菌《东北植物图志》,拂子茅麦角菌《汇编》

地方名 麦角(黑龙江、内蒙古);黑龙江:黑麦乌米。

功 效 菌核:收缩子宫。用于产后子宫出血,月经过多。

#### 2005002

*Claviceps miscanthi* Saw.

真菌名 芒麦角《真菌名称》

药材名 麦角《中药通报》

功 效 菌核:收缩子宫。

#### 2005003

*Claviceps paspali* Sder et Hall

真菌名 雀稗麦角《中国真菌总汇》

文献名 麦角菌《药学报》,雀稗麦角菌《中药通报》

功 效 菌核:收缩子宫。

#### 2005004

*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul.

真菌名 麦角菌《中国真菌总汇》

药材名 麦角《国药的药理学》

文献名 黑麦角菌《药学报》

地方名 浙江:紫麦角;湖北:麦灰包(神农架)。

功 效 菌核:有毒。收缩子宫,止血。用于产后子宫出血,偏头痛。

#### 2005005

*Cordyceps barnesii* Thwait.

真菌名 香棒虫草《中药通报》  
 药材名 香棒虫草《中药通报》  
 文献名 巴恩斯虫草《真菌名称》  
 地方名 山西:香蒲虫(舜王坪)。  
 功效 子座;补益药。

**2005006**

*Cordyceps cicadae* Shing

真菌名 蝉花《中国真菌总汇》  
 药材名 蝉花《图经》、《中药大辞典》  
 文献名 大蝉草、独角龙、乌角尖《中药大辞典》, 蝉生虫草《真菌名称》, 蝉虫草菌《真菌鉴定手册》  
 地方名 四川:虫花。  
 功效 带菌干燥虫体:镇惊熄风。用于小儿天吊, 惊痫, 痲疯, 夜啼, 心悸。  
 备考 《真菌名称》蝉花的学名为 *Cordyceps cicadica* Teng

**2005007**

*Cordyceps hawkesii* Gray

真菌名 亚香棒虫草《药用孢植》  
 药材名 亚香棒虫草《药用孢植》  
 文献名 霍克斯虫草《真菌名称》  
 功效 菌核、子座:有毒。保肺益肾, 补精益髓, 止血化痰。用于劳虚咳嗽, 阳痿遗精, 肺结核咯血等。

**2005008**

*Cordyceps liangshanensis* Zang, Liu et Hu

真菌名 凉山虫草《中草药》  
 药材名 凉山虫草《中草药》  
 文献名 冬虫夏草《四川通志》  
 地方名 四川:虫草(凉山州雷波区)。  
 功效 虫体及子座:补肺益肾。

**2005009**

*Cordyceps martialis* Speg.

真菌名 珊瑚虫草《药用真菌图鉴》  
 功效 该菌发酵物中含甘露醇:可供药用。

**2005010**

*Cordyceps militaris* (L. ex Fr.) Link

真菌名 蛹虫草《中国真菌总汇》  
 药材名 北蛹草《汇编》  
 文献名 北冬虫夏草《占野》, 蛹草《汇编》  
 地方名 吉林:冬虫夏草。  
 功效 子实体及虫体:益肺肾, 补精髓, 止血化痰。用于肺结核, 老人虚弱, 贫血虚弱, 肾虚腰疼。

**2005011**

*Cordyceps ophioglossoides* (Ehrenb.) Link

真菌名 大团囊虫草《中国真菌总汇》  
 药材名 大团囊虫草《中国药用真菌》  
 文献名 大团囊草《中国药用真菌》  
 地方名 云南:树生虫草。  
 功效 子座:活血, 调经。用于血崩和月经不调。

**2005012**

*Cordyceps ramosa* Teng

真菌名 分枝虫草《中国真菌总汇》

文献名 大团囊梗《虫草》, 分枝虫草菌《中草药》  
 地方名 浙江:[虫草]。  
 备考 浙江金华地区以此伪充虫草, 应注意鉴别。

**2005013**

*Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc.

真菌名 虫草《中国真菌总汇》  
 药材名 冬虫夏草《本草从新》、《药典》  
 文献名 夏草冬虫《黔囊》, 冬虫夏草菌《药材学》, 冬虫草《汇编》  
 地方名 “牙什扎更布”、“雅杂溪卜”(西藏、青海藏名); 台湾:春草; 四川:炉草, 灌草, 松潘草; 其他:冬虫, 春虫夏草。  
 功效 子座及幼虫尸体:补肺益肾, 止血化痰。用于久咳虚喘, 劳嗽咯血, 阳痿遗精, 腰膝酸痛。

**2005014**

*Cordyceps subolifera* (Hill) Berk. et Br. --- *Isaria cicadae* Miq.

真菌名 蝉茸《中国真菌总汇》  
 药材名 小蝉花《中药大辞典》  
 文献名 小蝉草、小蝉花、土蝉花《中药大辞典》, 蝉蛹草、蝉花、冠蝉、胡蝉、蛰、唐蛰、唐蛰、蛰《中国药用真菌》, 蛹茸、蝉茸菌、虫花《汇编》  
 地方名 浙江:金蝉花; 其他:蛰蛰蝉花、蛰蛰花。  
 功效 子座及寄主虫体:解痉, 散风热, 退翳障, 透疹。用于小儿惊风夜啼、咬牙、咳嗽、咽喉壅肿, 翳膜遮睛, 目赤肿痛, 视物不明, 隐涩难开, 痘疹遍身作痒, 小儿麻疹未透。

**2005015**

*Ustilaginoides virens* (Cooke) Tak.

真菌名 稻绿核菌《中国真菌总汇》  
 药材名 梗谷奴《纲目》  
 文献名 稻曲拟黑粉菌《中药大辞典》, 稻曲病菌《真菌名称》, 稻曲菌、丰年谷、丰年穗、稻绿核、梗稻谷奴《中国药用真菌》  
 功效 菌核及分生孢子:消炎, 杀菌。用于走马喉痹。

**2006 鹿角菌科 Xylariaceae****2006001**

*Xylaria nigripes* (Kl.) Sacc.

真菌名 黑柄炭角菌《中国真菌总汇》  
 药材名 乌灵参(四川峨眉)  
 文献名 地炭棍《药用孢植》, 黑柄鹿角菌《真菌鉴定手册》, 鸡枞蛋、鸡枞胆、鸡枞茯苓、广茯苓、乌丽参《成都中医学院学报》  
 地方名 四川:雷震子(峨眉山)。  
 功效 子座:用于烧烫伤等。

**2007 肉座菌科 Hypocreaceae****2007001**

*Engleromyces goetzii* P. Henn.

真菌名 肉球菌《中国药用真菌》

药材名 竹菌《中国药用真菌》

文献名 戈茨肉球菌《真菌名称》, 竹生肉球菌《药用真菌图鉴》

地方名 云南: 竹生竹球菌、竹生肉球、竹荷包、竹包、竹宝、竹寄生、“马斯利比”(彝语)、“闷巴”、“墨莫”、“馍馍”(纳西语)、“駭駭”、“马斯”(傈僳族语)。

功效 子座: 抗菌, 消炎。用于腮腺炎, 扁桃体炎, 喉炎, 胃炎, 胃溃疡, 急性肾炎, 无名肿毒和癌症。

#### 2007002

*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wollenw. --- *G. moniliforme* (Shel.) Wint. --- *Lisea fujikuroi* Saw.

真菌名 藤仓赤霉《中国真菌总汇》

药材名 赤霉菌《杨、岳《药用真菌》》

文献名 “九二〇”(制剂名)《杨、岳《药用真菌》》, 稻恶菌病菌《真菌鉴定手册》

功效 本菌制成的赤霉素通称“九二〇”: 外用于止痒, 收敛, 生肌。用于斑秃, 癣, 湿疹等。

#### 2007003

*Hypocrella bambusae* (B. et Br.) Sacc.

真菌名 竹小肉座菌《中国药用真菌》

药材名 竹砂仁《中国药用真菌》

文献名 竹果、竹生小肉座菌、竹花《中国药用真菌》, 竹枝寄生、竹红菌《中草药》

功效 子座: 用于风湿性关节炎, 胃痛。

#### 2007004

*Podostroma yunnanensis* M. Zang

真菌名 滇肉棒《中国药用真菌》

药材名 滇肉棒《中国药用真菌》

功效 子实体: 止血。

#### 2007005

*Shiraia bambusicola* P. Henn.

真菌名 竹黄菌《中草药》

药材名 竹黄《中国药用真菌》

文献名 竹肉《本草拾遗》, 竹赤团子、竹茧、竹赤斑菌、天竹花、淡竹花、淡菊花《中国药用真菌》, 淡竹黄、竹三七、血三七、竹参《汇编》

地方名 浙江: 赤团子, 竹花。

功效 子座及孢子: 祛风除湿, 活血舒筋, 镇咳化痰。用于风湿痹痛, 四肢麻木, 中风, 小儿惊风, 百日咳, 白带过多, 胃气痛。

### 2008 马鞍菌科 Helvellaceae

#### 2008001

*Morchella conica* Pers.

真菌名 顶尖羊肚菌《中国真菌总汇》

药材名 羊肚菜《中国药用真菌》

文献名 顶尖羊肚菜《汇编》, 圆锥羊肚菌《中国药用真菌》

功效 子实体: 益肠胃, 化痰理气。用于消化不良, 痰多气短。

#### 2008002

*Morchella crassipes* (Vent.) Pers.

真菌名 粗柄羊肚菌《中国真菌总汇》

药材名 羊肚菜《中国药用真菌》

文献名 粗腿羊肚菌《中国药用真菌》

功效 子实体: 益肠胃, 化痰理气。用于消化不良, 痰多气短。

#### 2008003

*Morchella deliciosa* Fr.

真菌名 小羊肚菌《中国真菌总汇》

药材名 羊肚菜《中国药用真菌》

文献名 美味羊肚菌《中国药用真菌》, 羊肚菌《药用孢植》

功效 子实体: 益肠胃, 化痰理气。用于消化不良, 痰多气短。

#### 2008004

*Morchella esculenta* (L.) Pers.

真菌名 羊肚菌《中国真菌总汇》

药材名 羊肚菜《中国药用真菌》

文献名 羊肚蘑、编笠菌《中国药用真菌》

功效 子实体: 益肠胃, 化痰理气。用于消化不良, 痰多气短。

### 2009 块菌科 Tuberaceae

#### 2009001

*Terfezia leonis* Tul.

真菌名 瘤孢地菇《药用真菌图鉴》

文献名 瘤孢假块菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体: 用于鼻息肉, 湿疣。

### 2010 黑粉菌科 Ustilaginaceae

#### 2010001

*Sphacelotheca cruenta* (Kuhn) Pott.

真菌名 高粱散黑粉菌《中国真菌总汇》

药材名 高粱乌米《汇编》

文献名 高粱轴黑粉菌《真菌名称》, 长轴高粱黑粉菌《汇编》, 长轴高粱黑粉《药用孢植》

功效 高粱病穗: 调经止血。用于月经不调, 血崩, 便血。

#### 2010002

*Sphacelotheca reiliana* (Kuhn) Clint.

真菌名 丝轴黑粉菌《中国真菌总汇》

药材名 高粱火焰苞《重庆草药》

文献名 黑穗菌《中药大辞典》

功效 幼穗感染病穗: 用于吐血, 便血, 红痢, 黑痢。

#### 2010003

*Sphacelotheca sorghi* (Link) Clint.

真菌名 高粱竖轴黑粉菌《中国真菌总汇》

药材名 高粱乌米《汇编》

文献名 高粱黑粉菌《汇编》

功效 高粱病穗: 调经止血。用于月经不调, 血崩, 便血。



**2010004***Ustilago crameri* Korn.

真菌名 粟黑粉菌《中国真菌总汇》

药材名 粟奴《纲目》、《汇编》

文献名 粟粒黑穗菌《中药大辞典》, 粟粒黑粉菌, 谷子黑穗、谷子黑粉《中国药用真菌》, 谷子黑粉菌《药用真菌图鉴》

地方名 湖北: 粟灰包(神农架)。

功效 冬孢子粉: 利小肠, 除烦懣。用于肠胃不舒, 消化不良, 胸中烦懣。

**2010005***Ustilago esculenta* P. Henn.

真菌名 菰黑粉菌《中国真菌总汇》

药材名 茭白《图经》

文献名 出隧、蘼蔬《尔雅》, 绿节《西京杂记》, 菰菜、茭苳《孟说》, 菰苳《本草拾遗》, 菰笋、菰手、茭笋《图经》, 茭把《纲目》, 茭瓜、茭耳菜《名实图考》, 茭白黑粉《中药大辞典》, 茭草黑粉菌、菇黑粉、菇菌、茭草黑粉《中国药用真菌》, 菰菌《药用真菌图鉴》

功效 菌瘦(茭白, 包括菌丝体和冬孢子粉): 解热毒, 除烦渴, 利二便。用于烦热, 消渴, 黄疸, 痢疾, 目赤, 风疮。

**2010006***Ustilago hordei* (Pers.) Lagerh.

真菌名 大麦坚黑粉菌《中国真菌总汇》

药材名 大麦奴《本草拾遗》、《中药大辞典》

功效 菌瘦: 解热疾, 清热解毒。

**2010007***Ustilago maydis* (DC.) Corda --- *U. zeae* (Schw.) Ung.

真菌名 玉蜀黍黑粉菌《中国真菌总汇》

药材名 玉米黑粉《汇编》

文献名 稔头、灰包《名实图考》, 玉米黑粉菌、玉米黑霉、棒子包《中国药用真菌》

地方名 湖北: 包谷火烟包(神农架)。

功效 孢子堆: 利肝脏, 益肠胃, 解毒。用于预防和治疗肝脏系统和胃肠道溃疡, 助消化, 通便。

**2010008***Ustilago nuda* (Jens.) Rostr.

真菌名 裸黑粉菌《中国真菌总汇》

药材名 麦奴《本草拾遗》、《汇编》

文献名 小麦黑粉《补缺肘后方》, 小麦奴《纲目》, 麦迹《名实图考》, 黑痘、麦散黑粉菌、麦子黑粉《中国药用真菌》, 麦散黑粉《中药大辞典》

地方名 江苏: 鬼麦, 霉麦; 湖北: 麦子烟灰包(神农架)。

功效 冬孢子粉: 发汗, 止痛, 清热解毒。用于伤寒及时气温病, 头痛, 无汗, 热极, 烦闷, 口噤。

**2011 木耳科 Auriculariaceae****2011001***Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw. --- *A. auricula-judae* (Bull. ex Fr.) Quel.

真菌名 木耳《中国真菌总汇》

药材名 木耳《本经》、《汇编》

文献名 橐《本经》, 树鸡《韩昌黎集》, 黑木耳《圣惠方》, 木橐、木菌、木纵、木蛾《纲目》, 云耳《药性切用》, 光木耳《抱朴子》

地方名 耳子(四川、陕西); 吉林: “勃肾”(朝名); 内蒙古: “米给沙木”(蒙名); 贵州: 细木耳; 其他: 木耳。

功效 子实体: 补气血, 润肺, 活血, 止血, 止痛。用于气虚血亏, 四肢抽搐, 肺虚咳嗽, 咯血, 吐血, 衄血, 崩漏, 便秘。

**2011002***Auricularia delicata* (Fr.) P. Henn.

真菌名 皱木耳《中国真菌总汇》

地方名 湖北: 构耳(神农架)。

功效 子实体: 补气血, 润肺, 止血。用于通便, 痔疮。

**2011003***Auricularia polytricha* (Mont.) Sacc.

真菌名 毛木耳《中国真菌总汇》

药材名 木耳《中国药用真菌》

地方名 四川: 耳子; 贵州: 粗木耳。

功效 子实体: 补气血, 润肺, 活血, 止血, 止痛。用于气虚血亏, 四肢抽搐, 肺虚咳嗽, 咯血, 吐血, 衄血, 崩漏, 便秘。

**2012 银耳科 Tremellaceae****2012001***Tremella aurantia* Schw. ex Fr. --- *Dacrymyces aurantius* (Schw) Farl.

真菌名 黄木耳《中国真菌总汇》

药材名 金耳《药用真菌图鉴》

功效 子实体: 滋阴润肺, 生津。

**2012002***Tremella cinnabarina* (Mont.) Pat.

真菌名 橙耳《药用真菌图鉴》

药材名 黄木耳《药用真菌图鉴》

文献名 朱砂色银耳《中国真菌总汇》

功效 子实体: 止泄, 益气。

**2012003***Tremella foliacea* Pers. ex Fr.

真菌名 茶银耳《中国真菌总汇》

药材名 茶银耳《中国真菌总汇》

文献名 血木耳、茶木耳《湖北中草药志》

功效 子实体: 用于妇科崩漏下血等。

**2012004***Tremella fuciformis* Berk.

真菌名 银耳《中国真菌总汇》

药材名 银耳《中国药用真菌》

文献名 桑鹅、五鼎芝《清异录》, 白木耳《本草再新》

地方名 白耳子(湖北、四川、贵州)。

功效 子实体: 滋阴, 润肺, 养胃, 生津。用于虚劳咳嗽, 痰中带血, 虚热口渴, 大便秘结, 高血压病, 血管

硬化。

#### 2012005

*Tremella mesenterica* Retz ex Fr.

真菌名 黄金银耳《中国真菌总汇》

药材名 金耳《中国药用真菌》

文献名 黄木耳《西藏中草药》, 金木耳、黄耳《中国药用真菌》

地方名 西藏: “茂若色尔布”(藏名)。

功效 子实体: 滋阴润肺, 生津。用于虚劳咳嗽, 咳血, 肺结核等。

### 2013 革菌科 Thelephoraceae

#### 2013001

*Thelephora vialis* Schw.

真菌名 莲座革菌《中国真菌总汇》

药材名 莲座革菌《中国药用真菌》

文献名 莲花菌《中国药用真菌》

地方名 云南: 十巴菌。

功效 子实体: 追风散寒, 舒筋活络。用于腰腿疼痛, 手足麻木, 筋络不舒, 四肢抽搐。

### 2014 珊瑚菌科 Clavariaceae

#### 2014001

*Clavicornia pyxidata* (Pers. ex Fr.) Doty

真菌名 杯冠珊瑚菌《中国真菌总汇》

药材名 杯珊瑚菌《滇南本草》整理本)

功效 菌体: 和胃气, 祛风, 破血, 缓中。

#### 2014002

*Clavulina cinerea* (Bull. ex Fr.) Schroet.

真菌名 灰色锁珊瑚菌《中国真菌总汇》

药材名 灰仙树菌《滇南本草》整理本)

功效 菌体: 和胃气, 祛风, 破血, 缓中。

#### 2014003

*Pterula umbrinella* Bres.

真菌名 钻顶羽扇菌《中国真菌总汇》

药材名 黑龙须菌《云南药录》

文献名 树头发《云南中草药选》

地方名 湖北: 野人毛; 四川: 人头发(西昌); 云南: 黑龙须(丽江), 银头发。

功效 菌丝体: 止咳止痛, 接骨消肿。用于肺结核。外用于骨折。

#### 2014004

*Ramaria flava* (Schaeff. ex Fr.) Quel. --- *Clavaria flava* Fr.

真菌名 黄枝珊瑚菌《中国真菌总汇》

文献名 黄珊瑚《滇南本草》整理本), 黄丛枝珊、疣孢黄丛枝《西藏真菌》, 变红黄丛枝菌《药用真菌图鉴》

地方名 云南: 帚菌。

功效 菌体: 和胃气, 祛风, 破血, 缓中。

#### 2014005

*Ramaria formosa* (Pers. ex Fr.) Quel.

真菌名 美丽枝珊瑚菌《中国真菌总汇》

药材名 帚菌《滇南本草》

文献名 符帚菌《滇南本草》, 粉红丛枝菌《滇南本草》整理本), 粉红枝珊瑚菌《西藏真菌》

地方名 云南: 扫把菌, 扫帚, 红扫把。

功效 菌体: 和胃气, 祛风, 破血, 缓中

#### 2014006

*Ramaria stricta* (Pers. ex Fr.) Quel.

真菌名 枝珊瑚菌《中国真菌总汇》

文献名 密枝木瑚《滇南本草》整理本)

地方名 云南: 帚菌。

功效 菌体: 和胃气, 祛风, 破血, 缓中

### 2015 鸡油菌科 Cantharellaceae

#### 2015001

*Cantharellus cibarius* Fr.

真菌名 鸡油菌《中国真菌总汇》

药材名 鸡油菌《中国药用真菌》

文献名 黄菌《滇南本草》, 鸡油蘑《占野》

地方名 鸡蛋黄(东北); 陕西: 鸡蛋黄菌, 杏菌; 湖北: 重阳菌(神农架)。

功效 子实体: 清目, 利肺, 益肠胃。用于预防视力失常, 眼结膜炎, 夜盲, 皮肤干燥, 粘膜失去分泌能力。也可以抵抗某些呼吸道及消化道感染的疾病。

#### 2015002

*Cantharellus minor* Peck

真菌名 小鸡油菌《中国真菌总汇》

功效 子实体: 清目, 利肺, 益肠胃。用于预防视力失常, 眼结膜炎, 夜盲, 皮肤干燥, 粘膜失去分泌能力。也可以抵抗某些呼吸道及消化道感染的疾病。

### 2016 齿菌科 Hydnaceae

#### 2016001

*Heridium caput-medusae* (Bull. ex Fr.) Pers.

真菌名 针猴头菌《中国真菌总汇》

药材名 小刺猴头菌《汇编》

文献名 小刺猴头《药用抱植》

功效 子实体: 利五脏, 助消化, 滋补, 抗癌。用于消化不良, 神经衰弱, 身体虚弱, 胃溃疡, 萎缩性胃炎等。

#### 2016002

*Heridium coralloides* (Scep. ex Fr.) Pers. ex Gray

真菌名 珊瑚状猴头菌《中国真菌总汇》

药材名 玉髯《中国药用真菌》

功效 子实体: 利五脏, 助消化, 滋补。用于消化不良, 神经衰弱, 身体虚弱, 胃溃疡。

#### 2016003

*Heridium erinaceus* (Bull. ex Fr.) Pers.

真菌名 猴头菌《中国真菌总汇》

药材名 猴头蘑《药用真菌图鉴》

文献名 刺猴菌、猬菌、猴头《中国药用真菌》

地方名 上海: 猴菇, 猴头菇; 西藏: “喝拉巴”(藏名)。

功 效 子实体:利五脏,助消化,滋补,抗癌。用于消化不良,神经衰弱,身体虚弱,胃溃疡,慢性胃炎等

2016004

*Sarcodon fuligineo-albus* (Fr.) Quel.

真菌名 褐盖肉齿菌《中国药用真菌》

文献名 光盖牛腮巴《中国药用真菌》

功 效 子实体:消炎,抗癌。

## 2017 多孔菌科 Polyporaceae

2017001

*Amauroderma macer* (Berk.) Pat.

真菌名 黑乌芝《中国真菌总汇》

文献名 黑漆假芝《中国的真菌》,黑漆乌芝《药用抱植》

功 效 子实体:消炎止血,祛瘀消积。用于急慢性肾炎,消化不良等。

2017002

*Amauroderma rude* (Berk.) Pat.

真菌名 皱盖乌芝《中国真菌总汇》

药材名 假灵芝《中国药用真菌》

文献名 皱盖假芝《中国的真菌》

功 效 子实体:消积,化瘀,消炎,止血。用于急性慢性肾炎,消化不良等。

2017003

*Bjerkandera adusta* (Willd. ex Fr.) Karst.

真菌名 烟管菌《中国真菌总汇》

文献名 黑管菌《长白山植物志》,烟色烟管菌《真菌的形态和分类》

功 效 子实体:入药。

2017004

*Bjerkandera fumosa* (Pers. ex Fr.) Karst.

真菌名 烟色烟管菌《中国真菌总汇》

文献名 亚黑管菌《中国药用真菌》

地方名 湖北:木菌(神农架)。

功 效 子实体:用于子宫癌。

2017005

*Bondarzewia montana* (Quel.) Sing. --- *Polyporus montanus* (Quel.) Ferry

真菌名 山地刺孢多孔菌《中国真菌总汇》

药材名 塔菰《药用真菌图鉴》

文献名 圆孔多孔菌、山地刺孢多孔《真菌名称》,〔灵芝〕、圆孢地花《药学报》

功 效 全体:解野菇中毒。

备 考 本品为灵芝的伪杂商品之一。

2017006

*Coriolus consors* (Berk.) Imaz. --- *Polystictus consors* (Berk.) Teng

真菌名 鲑贝革盖菌《药用真菌图鉴》

文献名 鲑贝芝、耙齿菌(杨、岳《药用真菌》)

功 效 子实体:发散剂。

2017007

*Coriolus hirsutus* (Wulf. ex Fr.) Quel. --- *Polyporus*

*hirsutus* (Wulf.) Fr.

真菌名 毛革盖菌《中国真菌总汇》

文献名 蝶毛菌《药用真菌图鉴》

功 效 子实体:除风湿,疗肺疾,止咳,化痰,生肌。

2017008

*Coriolus unicolor* (Bull. ex Fr.) Pat. --- *Polystictus unicolor* (Bull. ex Fr.) Lloyd

真菌名 单色革盖菌《中国真菌总汇》

药材名 单色云芝《中国药用真菌》

文献名 齿毛芝《中国药用真菌》

功 效 子实体:抗癌。

2017009

*Coriolus versicolor* (Fr. ex L.) Quel. --- *Polystictus versicolor* (L.) Fr.

真菌名 采绒革盖菌《中国真菌总汇》

药材名 云芝《中国药用真菌》

文献名 木云芝《抱植名称》,杂色云芝《真菌名称》,彩云革盖菌、瓦菌《药用真菌图鉴》

功 效 子实体:去湿,化痰,抗癌。用于肺疾、乙型肝炎、迁延性肝炎、慢性活动性肝炎及肝癌的预防和治疗。

2017010

*Cryptoporus volvarius* (Peck) Hubb.

真菌名 隐孔菌《中国真菌总汇》

药材名 松橄榄《滇南本草》

地方名 云南:树荷花,树疙瘩,荷包菌,木鱼菌,香木菌,黑迈。

功 效 子实体:止咳,平喘。用于痔疮。

2017011

*Fomes fomentarius* (L. ex Fr.) Kickx --- *Pyropolyporus fomentarius* (L. ex Fr.) Teng

真菌名 木蹄层孔菌《中国真菌总汇》

药材名 木蹄《中国药用真菌》

文献名 木紫芝《抱植名称》,桦菌芝《陕西中草药》

地方名 吉林:火绒菌,引火菌;湖北:木菌(神农架)。

功 效 子实体:消积,化瘀,抗癌。用于小儿积食,食道癌,胃癌,子宫癌。

2017012

*Fomes homodermus* Mont.

真菌名 硬壳层孔菌《药用真菌图鉴》

文献名 梓菌《药用真菌图鉴》

功 效 子实体:镇惊,止血,疗风,止痒。

2017013

*Fomitopsis officinalis* (Vill. ex Fr.) Bond. et Sing. ---

*Fomes officinalis* (Vill. ex Fr.) Ames --- *Fomes laricis* (Jacq.) Merr.

真菌名 药用拟层孔菌《中国真菌总汇》

药材名 苦白蹄《中国药用真菌》

文献名 落叶松茸《和汉药名汇》,阿里红《新疆中草药手册》,药用层孔菌《中国药用真菌》

地方名 新疆:落叶松茸,“哈日昆”(维名)。

功效 子实体:温肺化痰,降气平喘,祛风除湿,活血消肿,利尿,解蛇毒。用于咳嗽,哮喘,胃痛,胃酸过多,尿路结石,肾炎,慢性风湿关节炎,咽喉炎,牙周炎,毒蛇咬伤。

## 2017014

*Fomitopsis pinicola* (Sw. ex Fr.) Karst. --- *Fomes pinicola* (Sw. ex Fr.) Cooke

真菌名 松生拟层孔菌《中国真菌总汇》

文献名 胡孙眼(小泉《药植》),松生层孔菌《真菌名称》,红缘层孔《鉴别手册》,松生层孔、松拟层孔、红带菌《西藏真菌》,松红缘层孔菌《真菌鉴定手册》

地方名 湖北:松木菌(神农架)。

功效 子实体:解热,强心。

备考 江西发现混作灵芝用,应注意鉴别。

## 2017015

*Fomitopsis ulmaria* (Sow. ex Fr.) Bond. et Sing. --- *Fomes ulmarius* (Fr.) Gill.

真菌名 榆拟层孔菌《中国真菌总汇》

功效 子实体:补骨髓,固精脉。

## 2017016

*Fuscoporia punctata* (Fr.) Cunn.

真菌名 斑褐孔菌《中国真菌总汇》

功效 子实体:用于冠心病。

## 2017017

*Ganoderma arborescens* (Lam. ex Fr.) Pat.

真菌名 鹿角芝《真菌名称》

文献名 安倍那灵芝《中国真菌总汇》,灵芝《药学报》

功效 子实体:滋补,健脑,强壮,消炎,利尿,益胃。用于神经衰弱,心悸头晕,夜寐不宁,慢性肝炎,肾炎,支气管炎哮喘。积年胃病。误食毒菌中毒,冠心病。

## 2017018

*Ganoderma applanatum* (Pers. ex Grev.) Pat.

真菌名 赤色老母菌《中国药用真菌》

药材名 树舌《中国真菌总汇》

文献名 平盖灵芝《真菌名称》,扁木灵芝、扁芝、扁蕈、白斑腐菌《中国药用真菌》,皂角菌《汇编》,树耳朵、木灵芝《西藏真菌》,老母菌、枫树芝、柏树菌、梨菌《药用真菌图鉴》

地方名 [灵芝](河南、湖北);四川:老木菌(峨眉山)。

功效 子实体:抗癌,止痛,清热,化积,止血,化痰。用于食道癌,肺结核。

备考 河南、湖北发现误作灵芝用,应注意鉴别。

## 2017019

*Ganoderma capense* (Lloyd) Teng

真菌名 薄盖灵芝《中国真菌总汇》

文献名 薄树芝《真菌名称》

功效 菌体:用于慢性支气管炎。

备考 云南民间作灵芝入药。

## 2017020

*Ganoderma japonicum* (Fr.) Lloyd --- *G. sinense* Zhao,

Xu et Zhang --- *G. lucidum* var. *japonicum* (Fr.) Bres.

真菌名 紫芝《药用孢植》

药材名 紫芝《本经》、《中药大辞典》

文献名 二秀《楚辞》,茵、芝《尔雅》,木芝《本经》,灵芝草《滇南本草》,木灵芝《孢植名称》,黑芝、玄芝《中国药用真菌》,灵芝《汇编》

地方名 茵灵芝(陕西、安徽、江西、湖南、广东、四川、云南),灵芝菇(安徽、江西、湖南、广东),紫兰、紫蓝(陕西、广东、江西);山东:老虎座(烟台);江西:草灵芝(景德镇);湖南:红色茵,赤芝;云南:三秀芝,石芝,草芝,肉芝,茵芝,茵子;其他:木杆儿菌,老木菌。

功效 子实体:镇静,健胃。用于神经衰弱,失眠,消化不良,虚劳,咳嗽。

备考 《药用真菌图鉴》和《真菌名称》紫芝之学名为 *Ganoderma sinense* Zhao, Xu et Zhang

## 2017021

*Ganoderma lobatum* (Schw.) Atk.

真菌名 裂迭灵芝《中国真菌总汇》

文献名 层叠树舌、层迭树舌《鉴别手册》

备考 河北发现以此混作灵芝,应注意鉴别。

## 2017022

*Ganoderma lucidum* (Leyss. ex Fr.) Karst.

真菌名 灵芝《中国真菌总汇》

药材名 灵芝《中国药用真菌》

文献名 灵芝草、菌子、赤芝《滇南本草》,木灵芝《吉野》,血灵芝《中草药学》,红芝《中国药用真菌》,潮红灵芝《汇编》,丹芝《鉴别手册》

地方名 茵灵芝(山西、四川、云南);山西:福蕈,吉祥菌,万年蕈;四川:灵芝菌;西藏:过夏。

功效 子实体:镇静,健胃。用于神经衰弱,失眠,消化不良,虚劳,咳嗽。

## 2017023

*Ganoderma mastoporum* (Levl.) Pat.

真菌名 圆孔灵芝《中国真菌总汇》

药材名 无柄灵芝《药学报》

文献名 灵芝《药学报》

功效 子实体:镇静,健胃。用于神经衰弱,失眠,消化不良,虚劳,咳嗽。

## 2017024

*Ganoderma neo-japonicum* Imaz.

真菌名 新日本灵芝《真菌名称》

药材名 赤盖芝《(滇南本草)整理本》

地方名 云南:灵芝草。

功效 子实体:滋补,强壮,消炎,利尿,益胃。

## 2017025

*Ganoderma tenue* Zhao, Xu et Zhang

真菌名 密纹薄芝《药用真菌图鉴》

功效 子实体:镇静。用于急、慢性肝炎。

## 2017026

*Gloeophyllum subferrugineum* (Berk.) Bond. et Sing. ---

*Lenzites subferruginea* Berk.

真菌名 褐粘褶菌《药用真菌图鉴》

文献名 褶扇、黄色蝶菌《药用真菌图鉴》，褐色粘褶芝《西藏真菌》

功效 子实体：顺气，祛湿。

#### 2017027

*Griofola umbellata* (Pers. ex Fr.) Pilat --- *Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr.

真菌名 猪苓《中国真菌总汇》

药材名 猪苓《本经》、《药典》

文献名 豕零《庄子》，猥猪屎《本经》，豕彘《庄子》司马彪注，豨苓《韩昌黎集》，地桃乌《图经》，苓、茱苓、朱苓、猪苓、猪零、导河椹《新纲》，野猪粪、野猪屎《药材学》，粉猪苓《中国药用真菌》

地方名 辽宁：野猪食；青海：山猪粪；甘肃：猪屎；安徽：枫苓，亥苓；四川：猪屎苓，猪苓菌，黑猪苓，楼子菌（峨眉山）。

功效 菌核：利水渗湿。用于小便不利，水肿，泄泻，淋浊，带下。

#### 2017028

*Hexagonla apiaria* (Pers.) Fr.

真菌名 毛蜂窝菌《中国真菌总汇》

药材名 龙眼梳《中国药用真菌》

功效 子实体：宣肠，健胃，止酸。用于胃气痛。

#### 2017029

*Inonotus cuticularis* (Bull. ex Fr.) Karst. --- *Polyporus cuticularis* (Bull.) Fr.

真菌名 稀针孔菌《药用真菌图鉴》

文献名 薄皮纤孔菌《中国真菌总汇》，合树菌、桂花菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体：顺气，益神。用于狐臭，止血，胃病，麻疯病。

#### 2017030

*Laetiporus sulphureus* (Bull. ex Fr.) Bond. et Sing. ---

*Tyromyces sulphureus* (Bull. ex Fr.) Donk

真菌名 硫色绚孔菌《中国真菌总汇》

药材名 硫黄菌《中国药用真菌》

文献名 硫色干酪菌、硫黄多孔菌《中国药用真菌》

地方名 湖北：鸡冠菌（神农架）。

功效 子实体：调节机体，增进健康，抵抗疾病。

#### 2017031

*Lenzites betulina* (L.) Fr.

真菌名 桦茸柄菌《中国真菌总汇》

药材名 磨菇《中国药用真菌》

文献名 桦褶孔菌《中国药用真菌》，桦褶孔《神农架药录》

地方名 湖北：木渣菌（神农架）。

功效 子实体：追风散寒，舒筋活络。用于腰腿疼痛，手足麻木，筋络不舒，四肢抽搐。

#### 2017032

*Phellinus conchatus* (Pers. ex Fr.) Quel.

真菌名 贝针层孔菌《药用真菌图鉴》

药材名 鸡爪菌《药用真菌图鉴》

文献名 贝状木层孔菌《中国真菌总汇》

功效 子实体：活血，化积，解毒。

#### 2017033

*Phellinus densus* (Lloyd) Teng --- *Fomes densus* Lloyd

真菌名 厚贝针层孔菌《药用真菌图鉴》

药材名 苦槠菌《药用真菌图鉴》

文献名 密集木层孔菌《中国真菌总汇》

功效 子实体：杀虫，解热。用于疳积，血吸虫病。

#### 2017034

*Phellinus gilvus* (Schw.) Pat.

真菌名 粗皮针层孔菌《药用真菌图鉴》

文献名 淡黄木层孔菌《中国真菌总汇》

功效 子实体：补脾，祛湿，健胃。

#### 2017035

*Phellinus igniarius* (L. ex Fr.) Quel.

真菌名 火木层孔菌《中国真菌总汇》

药材名 桑黄《药性论》、《中药大辞典》

文献名 桑臣《药性论》，桑耳、桑菌、木穀《别录》，〔桑上寄生〕《证类本草》，桑橘《唐本草》，桑蛾、桑鸡《广菌谱》，胡孙眼《酉阳杂俎》，桑黄菇《纂要奇方》，针层孔菌《中国药用真菌》，针层孔《中药大辞典》

功效 子实体：用于血崩，血淋，脱肛泻血，带下，经闭。

#### 2017036

*Phellinus rimosus* (Berk.) Pilat --- *Pyropolyporus rimosus* (Berk.) Teng

真菌名 缝裂木层孔菌《中国真菌总汇》

药材名 裂蹄《中国药用真菌》

功效 子实体：用于血崩，血淋，脱肛泻血，带下，经闭。

#### 2017037

*Phellinus torulosus* (Pers.) Bourd. & Galz. --- *Fomes torulosus* (Pers.) Lloyd

真菌名 簇毛针层孔菌《药用真菌图鉴》

文献名 簇毛木层孔菌《中国真菌总汇》，宽棱针层孔、剑皮树菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体：理气，解毒。

#### 2017038

*Phellinus yucatanensis* (Murr.) Imaz. --- *Fomes yucatanensis* (Murr.) Sacc. et D. Sacc. --- *Pyropolyporus yucatanensis* Murr.

真菌名 尤地木层孔菌《中国真菌总汇》

药材名 桑黄《中国药用真菌》

文献名 桑花《药用菌谱》

功效 子实体：用于血崩，血淋，脱肛泻血，带下，经闭。

#### 2017039

*Polyporellus varius* (Fr.) Karst. --- *Polyporus elegans* (Bull.) Fr.

真菌名 多变拟多孔菌《真菌名称》

文献名 雅致多孔菌《真菌名称》，黄多孔菌、杂蘑

## 《中国药用真菌》

功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒。

## 2017040

*Polyporus grammoccephalus* Berk.

真菌名 棱盖多孔菌《中国真菌总汇》

文献名 [灵芝]、射纹树掌《药学报》

备考 灵芝的伪杂商品。

## 2017041

*Polyporus mylittae* Cooke et Mass. --- *Omphalia lapidescens* Schroet. --- *Mylitta lapidescens* Hor.

真菌名 雷丸《中国真菌总汇》

药材名 雷丸《本经》、《药典》

文献名 雷实《吴普本草》,雷矢《别录》,竹苓《纲目》,雷丸菌、竹林子、竹铃芝《中药志》,来丸、竹矢、竹铃子、白雷丸《中国药用真菌》

地方名 湖南:铁线吊蛋,竹节下蛋;广西:木连子;云南:“麻号麻里糯”(西双版纳傣语)。

功效 菌核:杀虫,消积。用于绦虫,钩虫,蛔虫病,虫积腹痛,小儿疳积。

## 2017042

*Polystictus vernicipes* (Berk.) Cooke

真菌名 漆柄云芝《中国真菌总汇》

文献名 [灵芝]、厚褐扇《药学报》

备考 本品为灵芝伪杂商品之一。

## 2017043

*Poria cocos* (Schw.) Wolf

真菌名 茯苓《中国真菌总汇》

药材名 茯苓《吴普本草》、《药典》

文献名 伏苓、伏菟《本经》,伏灵《史记》,茯苓《广雅》,茯神《别录》,伏神、赤茯苓《本草经集注》,更生《外台秘要》,松腴、不死面《记事珠》,绛晨伏胎《酉阳杂俎》,云苓《滇海虞衡志》,伏兔、茯苓皮、茯神木《纲目》,赤苓《本草再新》,赤茯《本草便读》,茯神心《卫生宝鉴》,茯神心木《本草备要》,松髓、木威僊《万名苑》,金翁、万苓精、万灵精《新纲》,茯苓菌《广西中药志》,茯苓个、茯苓块、茯苓皮《药典》,玉灵《中国药用真菌》,方苓块、片茯苓、云茯苓、白茯神、抱木茯神、抱茯神、抱木神、连皮茯苓、连皮苓《常用中药名辨》

地方名 松茯苓、野苓(湖南、湖北);山西:杜茯苓;安徽:白云苓,安苓;湖南:本苓;广西:松薯,松木薯,松苓,天生苓;四川:苓皮,茯皮;其他:白苓、方苓、皮白茯神、茯神羔、洋苓肉、福临、天片、坡片、久白、反白(商品名)。

功效 菌核:利水渗湿,健脾宁心。用于水肿尿少,痰饮眩悸,脾虚食少,便溏泄泻,心神不安,惊悸失眠。

## 2017044

*Pyropolyporus adamantinus* (Berk.) Teng --- *Fomes adamantinus* (Berk.) Cke.

真菌名 硬皮褐层孔菌《药用真菌图鉴》

文献名 铜青褐层菌《中国真菌总汇》

功效 子实体:用于胃气痛。

## 2017045

*Trametes cinnabarina* (Jacq.) Fr.

真菌名 朱红栓菌《中国真菌总汇》

药材名 朱砂菌《中国药用真菌》

文献名 红栓菌、胭脂栓菌《中国药用真菌》

功效 子实体:清热除湿,消炎解毒,止血。用于风湿性关节炎,气管炎,外伤出血。

## 2017046 见 2017050

## 2017047

*Trametes dickinsii* Berk.

真菌名 肉色栓菌《真菌名称》

文献名 迪金斯栓菌《中国真菌总汇》

地方名 河北:[灵芝]。

备考 河北发现混作灵芝用,应注意鉴别。

## 2017048

*Trametes orientalis* (Yasuda) Imaz.

真菌名 灰带栓菌《药用真菌图鉴》

药材名 白鹤菌《药用真菌图鉴》

文献名 东方栓菌《中国真菌总汇》

功效 子实体:用于炎症,肺结核,支气管炎,风湿病。

## 2017049

*Trametes palisoti* (Fr.) Imaz.

真菌名 紫赭栓菌《中国真菌总汇》

药材名 皂角菌《药用真菌图鉴》

文献名 皂荚蕈《纲目》、密褶菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体:驱风,止痒。

## 2017049a

*Trametes robiniophila* Murr.

真菌名 槐栓菌《真菌名词及名称》

药材名 槐耳《唐本草》

地方名 山东:槐娥。

功效 子实体:消炎、解毒。用于肝炎、肝癌等。

## 2017050

*Trametes sanguinea* (L. ex Fr.) Lloyd --- *Polyporus sanguineus* Fr.

真菌名 血红栓菌《中国真菌总汇》

药材名 枫菌《药用真菌图鉴》

文献名 红珊瑚《台湾中药材图鉴》

功效 子实体:清热除湿,消炎解毒,止血。用于风湿性关节炎,气管炎,外伤出血。

## 2017051

*Xanthochrous hispidus* (Bull. ex Fr.) Pat. --- *Inonotus hispidus* (Bull. ex Fr.) Karst. --- *Polyporus hispidus* (Bull.) Fr.

真菌名 粗毛褐孔菌《药用真菌图鉴》

药材名 槐蘑《药用真菌图鉴》

文献名 粗毛黄孔菌《中国真菌总汇》

功效 子实体:祛风,止血,败毒止痛。用于五痔脱肛,肠痔下血。

## 2017052

*Xanthochrous rheades* (Pers.) Pat. --- *Inonotus rheades* (Pers.) Pilat --- *Polyporus dryophilus* Berk.

真菌名 团核褐孔菌《药用真菌图鉴》

药材名 槐蘑《药用真菌图鉴》

文献名 鸟状纤孔菌《中国真菌总汇》

功效 子实体:祛风,止血,败毒止痛。用于五痔脱肛,肠痔下血。

## 2018 牛肝菌科 Boletaceae

## 2018001

*Boletinus cavipes* (Opat.) Kalchbr

真菌名 空柄小牛肝菌《中国真菌总汇》

药材名 杂蘑《中国药用真菌》

文献名 小牛肝菌《真菌名称》,空柄假牛肝《汇编》,空柄假牛肝菌《中国药用真菌》,台菇(杨、岳《药用真菌》)

功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒。

## 2018002

*Boletus albidus* Roq.

真菌名 卷边牛肝菌《中国真菌总汇》

文献名 卷边灰牛肝菌《滇南本草》整理本)

地方名 云南:牛肝菌,见手青。

功效 子实体:清热解烦,养血和中。

## 2018003

*Boletus brunneissimus* Chiu

真菌名 褐盖牛肝菌《中国真菌总汇》

文献名 茶褐牛肝菌《滇南本草》整理本)

地方名 云南:见手青,牛肝菌。

功效 子实体:清热解烦,养血和中。

## 2018004

*Boletus edulis* Bull. ex Fr.

真菌名 美味牛肝菌《中国真菌总汇》

药材名 美味牛肝菌《中国药用真菌》

文献名 美味牛肝、白牛肝《药用抱植》,大脚菇《药用真菌图鉴》

地方名 陕西:山乌茸,蘑菇;云南:牛肝菌,见手青。

功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒,四肢抽搐。

## 2018005

*Boletus magnificus* Chiu

真菌名 华丽牛肝菌《中国真菌总汇》

地方名 云南:见手青,牛肝菌。

功效 子实体:清热解烦,养血和中。

## 2018006

*Boletus regius* Krombh.

真菌名 桃红牛肝菌《中国真菌总汇》

药材名 牛肝菌《滇南本草》

地方名 云南:见手青。

功效 子实体:清热解烦,养血和中。

## 2018007

*Boletus rubellus* Krombh.

真菌名 血红牛肝菌《中国真菌总汇》

文献名 血色牛肝菌《滇南本草》整理本)

地方名 云南:见手青,牛肝菌。

功效 子实体:清热解烦,养血和中。

## 2018008

*Boletus speciosus* Frost

真菌名 小美牛肝菌《中国真菌总汇》

药材名 见手青《中国药用真菌》

文献名 粉盖牛肝菌《中国药用真菌》,华美牛肝菌《药用真菌图鉴》

地方名 云南:牛肝菌。

功效 子实体:清热解烦,养血和中。用于消化不良,腹胀。

## 2018009

*Leccinum nigrescens* (Richon et Roze) Sing. --- *Boletus crocipodius* Letel.

真菌名 黑疣柄牛肝菌《中国真菌总汇》

药材名 黄皮牛肝菌《滇南本草》整理本)

地方名 云南:见手青,牛肝菌,黄梨头。

功效 子实体:清热解烦,养血和中。

## 2018010

*Pulveroboletus ravenelii* Berk. et Curt.

真菌名 黄粉末牛肝菌《中国真菌总汇》

药材名 黄蘑菇《中国药用真菌》

文献名 黄粉牛肝菌、黄牛肝、黄衣牛肝、蘑菇、拉氏黄粉牛肝《中国药用真菌》,黄色猪口茸《汇编》,黄粉牛肝《药用抱植》,粉末牛肝菌《云南植物研究》,黄矮菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒。

## 2018011

*Suillus granulatus* (Fries) Kuntze --- *Boletus granulatus* Fries

真菌名 点柄乳牛肝菌《中国真菌总汇》

文献名 栗壳牛肝菌、点柄粘盖牛肝菌、蘑菇《中国药用真菌》

功效 子实体:用于大骨节病。

## 2018012

*Suillus grevillei* (Kl.) Sing. --- *S. elegans* (Fr.) Snell

真菌名 厚环乳牛肝菌《中国真菌总汇》

药材名 台蘑《中国药用真菌》

文献名 雅致乳牛肝菌《真菌名称》,厚环粘盖牛肝菌《中国药用真菌》

功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒。

## 2018013

*Suillus luteus* (Fr.) Gray --- *Boletus luteus* Fries

真菌名 褐环乳牛肝菌《中国真菌总汇》

药材名 松蘑《中国药用真菌》

文献名 土色牛肝菌、褐环粘盖牛肝菌、蘑菇《中国药用真菌》

地方名 广西:马肉菌(桂林)。  
功效 子实体:用于大骨节病。

**2018014**

*Tylophilus sinicus* (Chiu) Tai --- *Boletus sinicus* Chiu

真菌名 中华粉孢牛肝菌《中国真菌总汇》

文献名 中华粉孢牛肝(真菌名称), 中华牛肝菌(《滇南本草》整理本)

地方名 云南:见手青, 牛肝菌。

功效 菌体:清热除烦, 养血和中。

**2019 伞菌科 Agaricaceae****2019001**

*Agaricus arvensis* Schaeff ex Fr.

真菌名 野蘑菇《中国真菌总汇》

药材名 杂蘑菇《中国药用真菌》

文献名 田蘑菇、燕麦蘑菇《药用真菌图鉴》

功效 子实体:追风散寒, 舒筋活络。用于腰腿疼痛, 手足麻木, 筋络不舒。

**2019002**

*Agaricus bisporus* (Lange) Sing. --- *A. brunnescens* Peck

真菌名 二孢蘑菇《中国真菌总汇》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》

文献名 白蘑菇《中草药通讯》, 双孢蘑菇、洋蘑菇、洋菌、西洋草菇《中国药用真菌》, 洋茸、洋草《汇编》

功效 子实体:消食, 清神, 平肝阳。用于消化不良, 高血压病, 增加乳汁的分泌量。

**2019003**

*Agaricus campestris* L. ex Fr. --- *Psalliota campestris* Quel.

真菌名 蘑菇《中国真菌总汇》

药材名 蘑菇《日用本草》、《中药大辞典》

文献名 鸡足蘑菇、蘑菇草(广菌谱), 蘑菇草、肉草、鸡腿蘑菇《纲目》, 四孢蘑菇、原野蘑菇《中国药用真菌》, 雷窝子《药用真菌图鉴》

地方名 洋蘑菇(东北)。

功效 子实体:益肠胃, 化痰理气。用于预防脚气病, 消化不良, 乳汁分泌减少, 毛细血管破裂出血, 贫血等。

**2019004**

*Agrocybe cylindracea* (Fr.) Maire --- *Pholiota cylindracea* (Fr.) Gill.

真菌名 柱状田头菇《药用真菌图鉴》

药材名 柳菇《药用真菌图鉴》

文献名 茶新菇《药用真菌图鉴》

功效 子实体:利尿, 渗湿, 健脾, 止泻。

**2019005**

*Amanita agglutinata* (Berk. et Curt.) Sing. --- *Amanitopsis volvata* (Peck.) Sacc.

真菌名 片鳞鹅膏《中国真菌总汇》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》

文献名 白托柄菇、托柄菇、平缘托柄菇《中国药用真菌》, 片鳞托柄菇《西藏真菌》

功效 子实体:追风散寒, 舒筋活络。用于腰腿疼痛, 手足麻木, 筋络不舒。

**2019006**

*Armillaria mellea* (Vahl. ex Fr.) Karst. --- *Armillariella mellea* (Vahl. ex Fr.) Karst.

真菌名 小蜜环菌《中国真菌总汇》

药材名 榛蘑(吉野)

文献名 糖草《阜和覃谱》, 蜜环菌、蜜色环菌、蜜蘑、榛蘑、根索菌、根腐菌《中国药用真菌》, 假蜜环菌《真菌名称》, 蜜环草《汇编》, 榛草《药用真菌图鉴》

地方名 吉林:“该按姆波基”(朝名)。

功效 子实体:祛风活络, 强筋壮骨。用于羊痛风, 腰腿痛, 佝偻病。

**2019007**

*Armillariella tabescens* (Scop. ex Fr.) Sing. --- *Clitocybe tabescens* (Scop.) Bres.

真菌名 发光小蜜环菌《中国真菌总汇》

药材名 亮菌(江苏)

文献名 发光假蜜环菌《真菌名称》, 青杠钻《药用真菌图鉴》

地方名 江苏:假蜜环菌, 假蜜环草。

功效 菌丝体:抗菌消炎。用于胆囊炎, 肝炎, 阑尾炎, 中耳炎等。

**2019008**

*Catathelasma ventricosum* (Peck) Sing.

真菌名 梭柄乳头蘑《中国真菌总汇》

药材名 杉菌《图经》

文献名 杉松苞、松苞菇(《滇南本草》整理本)

功效 子实体:用于心脾暴痛。

**2019009**

*Collybia velutipes* (Curt. ex Fr.) Quel. --- *Flammulina velutipes* (Curt. ex Fr.) Sing

真菌名 毛柄金钱菌《中国真菌总汇》

药材名 冬菇《中国药用真菌》

文献名 构菌、金钱菌、毛脚金钱菌、冻菌《中国药用真菌》, 榎茸《汇编》, 朴菇《药用真菌图鉴》, “郎夏”(藏名)《西藏真菌》

地方名 湖北:三伏菌(神农架); 广西:朴菇。

功效 子实体:利肝胆, 益肠胃, 抗癌。用于预防和治疗肝脏系统及肠胃道溃疡, 增加儿童体高、体重。

**2019010**

*Coprinus atramentarius* (Bull.) Fr.

真菌名 墨汁鬼伞《中国真菌总汇》

药材名 鬼盖《别录》、《中药大辞典》

文献名 地盖《别录》, 鬼伞、朝生《本草经集注》, 鬼屋《本草拾遗》, 鬼菌《广菌谱》, 地苓、一夜茸《汇编》, 柳树蘑、柳树伞菌《西藏真菌》, 柳树钻《药用真菌图鉴》

功效 子实体:益肠胃, 化痰理气, 解毒, 消肿。用于助消化, 祛痰, 无名肿毒, 疮疽。

**2019011**

*Coprinus comatus* (Mull. ex Fr.) Gray

真菌名 毛头鬼伞《中国真菌总汇》



文献名 鬼盖、鸡腿蘑《中国药用真菌》,毛鬼伞《药用抱植》

功效 子实体:益胃,清神。用于痔疮等。

#### 2019012

*Coprinus sterquilinus* Fr.

真菌名 粪鬼伞《中国真菌总汇》

药材名 鬼盖《别录》、《中药大辞典》

文献名 地盖《别录》,粪生鬼伞、堆肥鬼伞《中国药用真菌》

功效 子实体:益肠胃,化痰理气,解毒,消肿。用于助消化,祛痰,无名肿毒和其他疮疖。

#### 2019013

*Comphidius viscidus* (L.) Fr. --- *G. rutilus* (Schaeff. ex Fr.) Lund. et Nannf.

真菌名 柳钉菇《药用真菌图鉴》

文献名 血红柳钉菇《中国真菌总汇》,肉蘑《药用真菌图鉴》

功效 子实体:用于神经性皮炎。

#### 2019014

*Inocybe rimosa* (Bull. ex Fr.) Quel.

真菌名 裂丝丝盖伞《中国真菌总汇》

药材名 土生皂荚菌(拟)

文献名 皂荚菌《滇南本草》、裂盖毛锈伞《《滇南本草》整理本》

功效 子实体:有大毒。用于积垢作痛,令微泻。

#### 2019015

*Lactarius insulsus* Fr.

真菌名 劣味乳菇《中国真菌总汇》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》

文献名 环纹苦乳菇《中国药用真菌》,环纹乳菇《药用抱植》,铜钱菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒。

#### 2019016

*Lactarius picinus* Fr.

真菌名 黑乳菇《中国药用真菌》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》

文献名 沥青色乳菇《真菌名称》

功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒。

#### 2019017

*Lactarius piperatus* (Scop.) Fr.

真菌名 辣乳菇《中国真菌总汇》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》

文献名 羊脂菌《滇南本草》,白乳菇、辣味乳菇《中国药用真菌》,台菇(杨、岳《药用真菌》),板栗菌、白奶浆菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒。

#### 2019018

*Lactarius vellereus* Fr.

真菌名 绒白乳菇《中国真菌总汇》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》

文献名 石灰菌、羊毛白乳菇、绒盖乳菇《药用真菌图鉴》

功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒。

#### 2019019

*Lactarius volemus* Fr.

真菌名 多汁乳菇《中国真菌总汇》

功效 子实体:清肺胃,去内热。

#### 2019020

*Lentinus edodes* (Berk.) Sing.

真菌名 香菇《中国真菌总汇》

药材名 香菇《随息居饮食谱》、《中药大辞典》

文献名 香蕈《日用本草》,香信《本草求原》,合草、椎蕈《食用植物图说》,椎蕈《下等植物分类学》,香菇、香信蘑《满鲜植汇》,冬菇《中国药用真菌》,冬草、菊花菇《汇编》,香纹《药用抱植》,厚菇、薄菇、花菇《药用真菌图鉴》

功效 子实体:益气助食,化痰理气。用于佝偻病,贫血,小便失禁,痘疮和麻疹不透,高血压,扁桃腺炎,食菌中毒,预防肝硬化,毛细血管破裂,牙床出血等。

#### 2019021

*Lentinus lepideus* Fr.

真菌名 洁丽香菇《中国真菌总汇》

药材名 豹皮菇《中国药用真菌》

功效 子实体:调节机体,增进健康,抵抗疾病。

#### 2019022

*Lepiota procera* (Scop. ex Fr.) Gray --- *Macrolepiota procera* (Scop. ex Fr.) Sing.

真菌名 高环柄菇《药用真菌图鉴》

文献名 高大环柄菇《中国真菌总汇》

功效 子实体:助消化,增健康。

#### 2019023

*Leucopaxillus giganteus* (Sow. ex Fr.) Sing. --- *Clitocybe gigantea* (Sow. ex Fr.) Quel.

真菌名 大白桩菇《中国真菌总汇》

药材名 口蘑《中国药用真菌》

文献名 雷蘑、青腿子、巨陡头《中国药用真菌》,大青蘑《药用真菌图鉴》

功效 子实体:宣肠益气,散血热,解表。用于小儿麻疹欲出不出,烦躁不安。

#### 2019024

*Marasmius androsaceus* (L. ex Fr.) Fr.

真菌名 安络小皮伞《中国药用真菌》

药材名 鬼毛针《中国药用真菌》

文献名 盾盖小皮伞、树头发《中国药用真菌》,茶褐小皮伞《药用真菌图鉴》

功效 菌索:止痛,消炎。用于跌打损伤,骨折疼痛,坐骨神经痛,三叉神经痛,偏头痛,眶上神经痛及风湿性关节炎。

## 2019025

*Marasmius oreades* (Bolt.) Fr.

真菌名 硬柄小皮伞《中国真菌总汇》

药材名 杂蘑《中国药用真菌》

文献名 仙环小皮伞《中国药用真菌》, 硬柄皮伞《药用真菌图鉴》

功效 子实体: 追风散寒, 舒筋活络。用于腰腿疼痛, 手足麻木, 筋络不舒。

## 2019026

*Marasmius perforans* (Fr.) Pat.

真菌名 臭小皮伞《中国药用真菌》

功效 菌索: 止痛, 消炎。用于跌打损伤, 骨折疼痛, 坐骨神经痛, 三叉神经痛, 偏头痛, 眶上神经痛及风湿性关节炎。

## 2019027

*Panellus stypticus* (Bull. ex Fr.) Karst.

真菌名 止血扇菇《中国真菌总汇》

药材名 止血扇菇《中国药用真菌》

文献名 鳞皮扇菇《中国的真菌》, 鳞皮扇菌、山葵菌《中国药用真菌》

功效 子实体: 止血。用于外伤出血。

## 2019028

*Panus conchatus* (Bull. ex Fr.) Fr.

真菌名 贝壳状革耳《中国真菌总汇》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》

文献名 紫革耳、光革耳《中国药用真菌》

功效 子实体: 追风散寒, 舒筋活络。用于腰腿疼痛, 手足麻木, 筋络不舒。

## 2019029

*Panus rudis* Fr.

真菌名 野生革耳《中国真菌总汇》

药材名 木上森《滇南本草》

文献名 革耳《滇南本草》整理本

功效 子实体: 外用于一切疮毒, 癰疽, 杨梅结毒, 无名肿毒。

## 2019030

*Paxillus involutus* (Batsch) Fr.

真菌名 卷边桩菇《中国真菌总汇》

药材名 台蘑《中国药用真菌》

文献名 卷伞菌、卷缘网褶菌、落褶菌《中国药用真菌》, 杂蘑《药用孢植》, 卷边网褶菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体: 追风散寒, 舒筋活络。用于腰腿疼痛, 手足麻木, 筋络不舒。

## 2019031

*Pleurotus citrinopileatus* Sing.

真菌名 金顶侧耳《中国真菌总汇》

药材名 榆蘑《吉林中草药》

文献名 金顶蘑《中药大辞典》

功效 子实体: 滋补强壮。用于虚弱痿症, 痢疾。

## 2019032

*Pleurotus ferulae* Lanzi

真菌名 阿魏侧耳《中国真菌总汇》

文献名 阿魏蘑菇《药用真菌图鉴》

功效 子实体: 用于胃病

## 2019033

*Pleurotus ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Quel.

真菌名 糙皮侧耳《中国真菌总汇》

药材名 侧耳《中国药用真菌》

文献名 侧耳、北风菌、蚝菌、杂蘑《中国药用真菌》, 平菇《中草药》, 青蘑、柯子菌、粗皮侧耳《药用真菌图鉴》

地方名 元蘑、冻蘑(东北); 吉林: 黄蘑。

功效 子实体: 追风散寒, 舒筋活络。用于腰腿疼痛, 手足麻木, 经络不舒。

## 2019034

*Pleurotus sapidus* (Schulz. apus Kalchbr.) Sacc.

真菌名 美味侧耳《中国真菌总汇》

文献名 榆蘑、美味北风菌《占野》

地方名 玉皇蘑(东北)。

功效 子实体: 强壮滋补。

## 2019035

*Pleurotus ulmarius* (Bull. ex Fr.) Quel.

真菌名 榆干侧耳《中国真菌总汇》

药材名 大榆蘑《药用孢植》

地方名 青海: 榆侧耳, 榆蘑。

功效 子实体: 滋补强壮, 止痢。用于虚弱, 萎症, 痢疾等。

## 2019036

*Russula alutacea* (Pers.) Fr.

真菌名 革质红菇《中国真菌总汇》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》

文献名 大红菇《中国药用真菌》, 台菇(杨、岳《药用真菌》)

功效 子实体: 追风散寒, 舒筋活络。用于腰腿疼痛, 手足麻木, 筋络不舒。

## 2019037

*Russula densifolia* (Sacc.) Gill.

真菌名 密褶红菇《中国真菌总汇》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》

文献名 密褶黑红菇、小黑菇《中国药用真菌》, 密褶黑菇(汇编), 火炭菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体: 追风散寒, 舒筋活络。用于腰腿疼痛, 手足麻木, 筋络不舒。

## 2019038

*Russula foetens* Pers. ex Fr.

真菌名 臭红菇《中国真菌总汇》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》

文献名 臭黄菇、鱼腥菇《中国药用真菌》, 油辣菇、腥红菇、牛犊菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体: 追风散寒, 舒筋活络。用于腰腿疼痛, 手足麻木, 筋络不舒。

## 2019039

*Russula integra* (L.) Fr.

真菌名 变色红菇《中国药用真菌》

药材名 蘑菇《中国药用真菌》  
文献名 全缘红菇《药用真菌图鉴》  
功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒。

**2019040**

*Russula nigricans* (Bull.) Fr.

真菌名 黑红菇《中国真菌总汇》  
药材名 蘑菇《中国药用真菌》  
文献名 稀褶红菇、大黑菇、黑蘑菇《中国药用真菌》,稀褶黑菇、猪仔菇、老鸦菌、火炭菌、火炭蕈《药用真菌图鉴》  
功效 子实体:追风散寒,舒筋活络。用于腰腿疼痛,手足麻木,筋络不舒。

**2019041**

*Russula vesca* Fr.

真菌名 菱红菇《中国真菌总汇》  
文献名 细弱红菇《药用真菌图鉴》  
功效 子实体:助消化,强体质。

**2019042**

*Russula vinosa* Lindbl.

真菌名 正红菇《药用真菌图鉴》  
药材名 红菇(拟)  
文献名 葡萄酒红菇《中国真菌总汇》,真红蕈《药用真菌图鉴》  
功效 子实体:用于产妇贫血。

**2019043**

*Russula virescens* (Schaeff.) Fr.

真菌名 变绿红菇《中国真菌总汇》  
药材名 青头菌《滇南本草》  
文献名 青冈菌、绿菇《中国药用真菌》  
功效 子实体:明目,泻肝火,散内热。用于眼目不明,内热,妇女气郁。

**2019044**

*Schizophyllum commune* Fr.

真菌名 裂褶菌《中国真菌总汇》  
药材名 裂褶菌《中国药用真菌》  
文献名 普通裂褶菌《真菌鉴定手册》,白参、树花《药用真菌图鉴》  
功效 子实体:滋补强身。

**2019045**

*Termitomyces albuminosus* (Berk.) Heim --- *Collybia albuminosa* (Berk.) Petch

真菌名 鸡枞菌《中国的真菌》  
药材名 鸡枞《纲目》、《汇编》  
文献名 鸡枞《尔雅》,鸡枞蕈《广菌谱》,鸡菌《庄子》,蚁夺《贵州通志》,蚁枞《云南府志》,鸡枞菜《本草求原》,鸡宗《七修类编》,鸡枞蕈《福建通志》,鸡脚蘑菇、三坛菌《中国药用真菌》  
地方名 鸡肉丝蕈(台湾、云南);福建:白蚁蕈,桐蕈;四川:三大菇(成都);云南:鸡脚蕈,伞把菇。

功效 子实体:益胃,清神。用于痔疮,心悸,肝炎等。

**2019046**

*Tricholoma conglobatum* Vitt.

真菌名 丛生口蘑《中国真菌总汇》  
药材名 松菌《滇南本草》  
文献名 块根蘑、松毛菌《(滇南本草)整理本》  
功效 子实体:用于小便不通或不禁,五淋白浊。

**2019047**

*Tricholoma gambosum* (Fr.) Gill.

真菌名 口蘑《中国真菌总汇》  
药材名 口蘑《中国药用真菌》  
文献名 虎皮香蕈《中国药用真菌》,香杏口蘑《药用真菌图鉴》,虎皮香杏《真菌的形态和分类》  
功效 子实体:宣肠益气,散血热,解表。用于小儿麻疹欲出不出,烦躁不安。

**2019048**

*Tricholoma matsutake* (Ito et Imai) Sing. --- *Armillaria matsutake* Ito et Imai

真菌名 松口蘑《中国真菌总汇》  
药材名 松茸《纲目》、《中药大辞典》  
文献名 松蘑《吉野》,松茸、鸡丝菌《药用真菌图鉴》,松菇《西藏真菌》  
地方名 松丁蘑(东北);西藏:“诺鲁姆”(藏名)。  
功效 子实体:益肠胃,理气止痛,化痰。用于渡浊不禁,腰腿酸痛,手足麻木。

**2019049**

*Tricholoma mongolicum* Imai

真菌名 蒙古口蘑《中国真菌总汇》  
药材名 口蘑《中国药用真菌》  
文献名 白蘑《中国药用真菌》  
功效 子实体:宣肠益气,散血热,解表。用于小儿麻疹欲出不出,烦躁不安。

**2019050**

*Tricholoma nudum* (Bull.) Quel. --- *Rhodopaxillus nudus* (Fr. ex Bull.) Maire --- *Lepista nuda* (Bull. ex Fr.) Cooke

真菌名 裸口蘑《中国真菌总汇》  
药材名 紫晶蘑《中国药用真菌》  
文献名 紫丁香蘑、酱口蘑《药用真菌图鉴》  
功效 子实体:含维生素 B<sub>1</sub>,能调节机体糖代谢,促进神经传导,预防脚气病。

**2019051**

*Volvariella volvacea* (Bull. ex Fr.) Sing.

真菌名 草菇《中国真菌总汇》  
药材名 草菇《中国药用真菌》  
文献名 稻草菇、兰花菇、秆菇、麻菇《药用真菌图鉴》  
功效 子实体:消暑去热,增益健康,抗癌。用于坏血病,降低血压,消暑去热,增进人体抗癌能力。

**2020 灰包菇科 Secotiaceae****2020001**

*Secotium agaricoides* (Czern.) Hollos

真菌名 灰菇包《中国真菌总汇》

药材名 马勃《中国药用真菌》

文献名 伞菌状灰菇包《真菌名称》, 伞状灰菇包《中国药用真菌》, 伞菌木柄包《真菌基础》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 利喉, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎, 鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 冻疮流水, 流脓, 食道及胃出血, 感冒咳嗽。

## 2021 腹菌科 Hymenogastraceae

### 2021001

*Rhizopogon piceus* Berk. et Curt.

真菌名 黑根须腹菌《中国真菌总汇》

药材名 黑络丸《中国药用真菌》

文献名 黑络丸菌《中国药用真菌》

功效 子实体: 止血。用于外伤出血。

## 2022 笼头菌科 Clathraceae

### 2022001

*Simblum gracile* Berk.

真菌名 黄柄笼头菌《药用真菌图鉴》

功效 子实体: 用于胃炎。

## 2023 鬼笔菌科 Phallaceae

### 2023001

*Dictyophora duplicata* (Bosc) Fischer

真菌名 短裙竹荪《中国真菌总汇》

功效 子实体: 用于痢疾。

### 2023002

*Dictyophora indusiata* (Vent. ex Pers.) Fischer

真菌名 长裙竹荪《药用真菌图鉴》

药材名 竹荪《中国真菌总汇》

功效 子实体: 用于痢疾。

### 2023003

*Dictyophora multicolor* Berk. et Br.

真菌名 杂色竹荪《中国真菌总汇》

药材名 黄裙竹荪《中国药用真菌》

文献名 网纱菇《药用真菌图鉴》

功效 子实体: 外用于脚气病。

### 2023004

*Dictyophora phalloidea* Desv.

真菌名 棒竹荪《真菌名称》

地方名 四川: 竹荪、竹参(峨眉山)。

功效 子实体: 滋补强壮。

### 2023005

*Phallus impudicus* L. ex Pers.

真菌名 白鬼笔《中国真菌总汇》

药材名 鬼笔《中国药用真菌》

文献名 鬼笔菌《中国药用真菌》

功效 菌柄及菌托: 活血, 除湿, 止痛。用于风湿痛。

### 2023006

*Phallus rubicundus* (Bosc) Fr. --- *P. rugulosus* Fischer

真菌名 深红鬼笔《中国真菌总汇》

药材名 红鬼笔《中国药用真菌》

文献名 鬼笔、朝生暮落花、狗溺台《本草拾遗》, 细皱鬼笔《中药大辞典》, 蛇卵菇《药用真菌图鉴》

地方名 四川: 鸡屎菌(峨眉山); 贵州: 狗鞭参, 蛇头菌。

功效 子实体: 散毒, 消肿, 生肌。外用于疮疽。

## 2024 马勃菌科 Lycoperdaceae

### 2024001

*Bovista plumbea* Pers.

真菌名 铅色灰球菌《中国真菌总汇》

药材名 马勃《中国药用真菌》

文献名 铅色灰球《药用真菌图鉴》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 利咽, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎, 声哑, 鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 冻疮, 食道及胃出血, 感冒后咳嗽。

### 2024002

*Bovistella radicata* (Dur. et Mont.) Pat.

真菌名 长根静灰球菌《中国真菌总汇》

文献名 长根静灰球《汇编》

功效 子实体: 止血。

备考 吉林、四川作马勃入药。

### 2024003

*Bovistella sinensis* Lloyd

真菌名 中国静灰球菌《中国真菌总汇》

药材名 马勃《中国药用真菌》

文献名 大口静灰球《鉴别手册》, 大口静灰球菌《汇编》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 利咽, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎, 声音嘶哑, 鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 冻疮流水, 流脓, 食道及胃出血, 感冒后咳嗽。

备考 吉林、陕西、广东、甘肃等作马勃药用。

### 2024004

*Calvatia caelata* (Bull. ex DC.) Morg.

真菌名 浮雕秃马勃《中国真菌总汇》

药材名 马勃《真菌名称》

文献名 龟裂马勃《中国药用真菌》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 利喉, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎, 声音嘶哑, 鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 冻疮流水, 流脓, 食道及胃出血, 感冒后咳嗽。

### 2024005

*Calvatia candida* (Rostk.) Hollos

真菌名 白秃马勃《中国真菌总汇》

药材名 白马勃《西藏真菌》

地方名 贵州: 马勃(梵净山)。

功效 子实体: 止血。

### 2024006

*Calvatia craniiformis* (Schw.) Fr.

真菌名 头状秃马勃《中国真菌总汇》

文献名 头状马勃《中药通报》, 灰包《药用真菌图鉴》

地方名 贵州:马勃(佛顶山、铜仁、黎平)。

功效 子实体:止血,生肌,消炎,消肿,止痛。

#### 2024007

*Calvatia gigantea* (Batach ex Fr.) Lloyd

真菌名 人秃马勃《中国真菌总汇》

药材名 马勃《别录》、《药典》

文献名 马疔《别录》,大马勃《汇编》,大颡马勃《中药大辞典》,灰包菌《简明中医辞典》,无柄马勃《药用真菌图鉴》

地方名 灰包(山西、山东);山西:巨马勃,马屁勃,马粪包;山东:灰马包。

功效 子实体:清肺利咽,止血。用于风热郁肺咽痛,咳嗽,音哑。外用于鼻衄,创伤出血。

#### 2024008

*Calvatia lilacina* (Mont. et Berk.) Lloyd --- *Calvatia cyathiformis* (Bose) Morg.

真菌名 紫色秃马勃《中国真菌总汇》

药材名 马勃《别录》、《药典》

文献名 马疔《别录》,马疔、马疔勃《本草经集注》,灰菇、灰菰《经验良方》,牛屎菰《纲目》,紫色马勃《汇编》,紫颡马勃《中药大辞典》,紫马勃《广西植物》,灰包菌《简明中医辞典》,药包、有柄马勃《药用孢植》

功效 子实体:清肺利咽,止血。用于风热郁肺咽痛,咳嗽,音哑。外用于鼻衄,创伤出血。

#### 2024009

*Lasiosphaera fenzlii* Reich.

真菌名 脱皮毛球马勃《中国真菌总汇》

药材名 马勃《别录》、《药典》

文献名 马疔《别录》,马屁勃《本草经集注》,马疔菌《蜀本草》,灰菇《经验良方》,马屁包《袖珍方》,牛屎菰《纲目》,灰包菌《形性鉴别》,马勃菌《广西中药志》,灰包、马粪包《药材学》,脱皮马勃《中国药用真菌》,脱被毛球马勃《真菌名称》

地方名 马尾勃、杜马勃(西北),马皮包、马皮泡(青海、宁夏、河北、四川),马屁泡(河北、湖南),灰菌(湖南、广西),鬼馒头(浙江、安徽),马泡(甘肃、安徽);吉林:“晋意兴”(朝名);河北:药包,马包,马蜂包;内蒙古:“瓜氏高高”(蒙名);甘肃:灰包包(岷县);青海:马尾菌,马妥,马白,浮马勃,轻马勃;新疆:“耶尔托孜朵克”(维名);山东:灰马包,刀创药;江苏:马泡灰,马疔勃,灰泡,灰婆婆;浙江:牛屎拍(常山),山蟹(建德),马屁(上虞);安徽:鬼点灯;河南:忽雷炮;广西:人头菌、牛屎菌、大气菌(南宁),鸡肾菌,地烟,马泡菌,狗头灰;四川:白马勃,灰马勃,“热籍”(藏名),灰包子。

功效 子实体:清肺利咽,止血。用于风热郁肺咽痛,咳嗽,音哑。外用于鼻衄,创伤出血。

#### 2024010

*Lycoperdon asperum* (Lev.) de Toni

真菌名 粗皮马勃《中国真菌总汇》

文献名 柄孢小灰包《西藏真菌》

地方名 贵州:马勃(梵净山)。

功效 子实体:止血。

#### 2024011

*Lycoperdon echinatum* Pers.

真菌名 长刺马勃《真菌名称》

文献名 褐长刺灰包《中药通报》

地方名 贵州:马勃(梵净山)。

功效 子实体:止血。

#### 2024012

*Lycoperdon hongkongense* Berk. et Curt.

真菌名 香港马勃《真菌名称》

文献名 香港灰包《中药通报》

地方名 贵州:马勃(梵净山)。

功效 子实体:止血。

#### 2024013

*Lycoperdon perlatum* Pers. --- *L. gemmatum* Batsch

真菌名 网纹马勃《中国真菌总汇》

药材名 马勃《中国药用真菌》

文献名 灰包、马包、马胞、灰菰、马屁菌、马屁勃、牛屎菰《新纲》,尘菰《中国植物图鉴》,网纹灰包《药用孢植》

地方名 马粪包(浙江、云南、湖北);河南:汗雷泡(新乡)。

功效 子实体:消肿,止血,清肺,利喉,解毒。用于慢性扁桃体炎,喉炎,声哑,鼻出血,外伤出血,疮肿,冻疮,食道、胃出血,感冒咳嗽。

#### 2024014

*Lycoperdon polymorphum* Vitt.

真菌名 多形马勃《中国真菌总汇》

药材名 马勃《云南中草药选》

文献名 蛇枕、牛屎菰《西园覃谱》,灰包、多形灰包《云南中草药选》

功效 子实体:消肿,止血,清肺,利喉,解毒。用于外伤出血,咽喉炎,肺脓肿,肺炎等。

#### 2024015

*Lycoperdon pusillum* Batsch ex Pers.

真菌名 小马勃《中国真菌总汇》

药材名 马勃《中国药用真菌》

文献名 小灰包、小包、小马屁包《中国药用真菌》

功效 子实体:消肿,止血,清肺,利喉,解毒。用于慢性扁桃体炎,喉炎,声音嘶哑,鼻出血,外伤出血,疮肿,冻疮流水,流脓,食道及胃出血,感冒后咳嗽。

#### 2024016

*Lycoperdon stellare* (Peck) Lloyd

真菌名 星芒状马勃《中国真菌总汇》

文献名 粗皮灰包《中药通报》

地方名 贵州:马勃(安顺)。

功效 子实体:止血。

#### 2024017

*Lycoperdon umbrinum* Pers.

真菌名 赭色马勃《中国真菌总汇》

文献名 粒皮灰包《西藏真菌》

地方名 贵州:马勃(安顺)。

功效 子实体:止血。

## 2024018

*Mycenastrum corium* (Guers.) Desv.

真菌名 皮树丝马勃《中国真菌总汇》

药材名 马勃《中国药用真菌》

文献名 栓皮马勃《中国药用真菌》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 利喉, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎, 声音嘶哑, 鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 冻疮流水, 流脓, 食道及胃出血, 感冒后咳嗽。

## 2025 地星菌科 Geastraceae

## 2025001

*Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morg. --- *Geastrum hygrometricum* Pers.

真菌名 硬皮地星《中国真菌总汇》

药材名 地星《汇编》

文献名 量湿地星《真菌名称》, 山蟹《中药大辞典》, 上尾菌《中草药学》, 量湿地星菌《真菌鉴定手册》

地方名 地蜘蛛(湖北、云南); 山东: 灰灰黄; 浙江: 石蟹; 湖北: 小灰包(神农架); 云南: 米屎菰。

功效 子实体、孢子: 清肺热, 活血, 止血。用于外伤出血, 咽喉炎, 气管炎, 肺炎, 鼻衄, 冻疮等。

## 2025002

*Geastrum triplex* (Jungh.) Fisch.

真菌名 尖顶地星《中国真菌总汇》

药材名 地星《中国药用真菌》

文献名 土星菌《中国药用真菌》, 马勃《汇编》

功效 孢子粉(包括孢丝): 消肿, 止血, 清肺, 利喉, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎。鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 食道及胃出血, 感冒咳嗽。

## 2026 灰锤菌科 Tulostomataceae

## 2026001

*Battarraea phalloides* (Dicks.) Pers.

真菌名 鬼笔状钉灰包《中国真菌总汇》

药材名 灰钉《中国药用真菌》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 利喉, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎。鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 食道及胃出血, 感冒咳嗽。

## 2026002

*Battarraea stevenii* (Libosch.) Fr.

真菌名 毛柄钉灰包《中国真菌总汇》

药材名 灰钉《中国药用真菌》

文献名 粗灰钉《中国药用真菌》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 利喉, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎, 鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 冻疮流水, 流脓, 食道及胃出血, 感冒咳嗽。

## 2026003

*Phellorinia inquinans* Berk.

真菌名 歧裂灰包《中国真菌总汇》

药材名 灰凤梨《中国药用真菌》

文献名 灰凤梨包《真菌形态基础》

功效 子实体: 消肿, 止血。外用于外伤出血, 冻疮流水。

## 2026004

*Schizostoma bailingmiaoense* Liu, Li et Du

真菌名 百灵庙裂顶灰锤《中国药用真菌》

功效 子实体: 止血。

## 2026005

*Schizostoma dengkouense* Liu, Li et Du

真菌名 磴口裂顶灰锤《中国药用真菌》

功效 子实体: 止血。

## 2026006

*Schizostoma ulanbuhense* Liu, Li et Du

真菌名 乌兰布和裂顶灰锤《中国药用真菌》

功效 子实体: 止血。

## 2026007

*Tulostoma bonianum* Pat.

真菌名 褐灰锤《中国药用真菌》

文献名 褐柄灰包《中国真菌总汇》

功效 子实体: 止血, 消肿, 清咽利喉。用于外伤出血, 扁桃体炎等。

## 2026008

*Tulostoma brevistipitatum* Liu, Li et Du

真菌名 短柄灰锤《中国药用真菌》

功效 子实体: 止血。

## 2026009

*Tulostoma brumale* Pers.

真菌名 灰锤《中国药用真菌》

文献名 柄灰包《中国真菌总汇》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 解毒。用于感冒, 外伤出血等。

## 2026010

*Tulostoma finkii* Lloyd

真菌名 小孢灰锤《中国药用真菌》

文献名 小孢柄灰包《中国真菌总汇》

功效 子实体: 止血, 消炎。用于外伤出血, 扁桃体炎。

## 2026011

*Tulostoma helanshanense* Liu, Li et Du

真菌名 贺兰灰锤《中国药用真菌》

功效 子实体: 止血。

## 2026012

*Tulostoma jourdanii* Pat.

真菌名 白灰锤《中国药用真菌》

药材名 灰锤《中国药用真菌》

文献名 小顶柄灰包《中国药用真菌》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 利喉, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎, 鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 食道及胃出血, 感冒咳嗽。

## 2026013

*Tulostoma laceratum* (Ehrenb.) Fr. --- *Schizostoma laceratum* Ehrenb.

真菌名 裂顶灰锤《中国药用真菌》

药材名 灰锤《中国药用真菌》  
文献名 裂顶柄灰包《真菌名称》, 星裂灰锤《中国药用真菌》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 利喉, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎, 鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 食道及胃出血, 感冒咳嗽。

## 2026014

*Tulostoma sabulosum* Liu, Li et Du

真菌名 沙漠灰锤《中国药用真菌》

功效 子实体: 止血。

## 2026015

*Tulostoma volvulatum* Borszcz.

真菌名 托灰锤《中国药用真菌》

文献名 托柄灰包《真菌名称》

功效 子实体: 止血消肿, 消炎解毒。用于扁桃体炎, 外伤出血等。

## 2027 轴灰包菌科 Podaxaceae

## 2027001

*Podaxis pistillaris* (L. ex Pers.) Fr.

真菌名 轴灰包《中国真菌总汇》

药材名 柄马勃《中国药用真菌》

文献名 鬼伞包《真菌形态基础》

功效 子实体: 消肿, 止血, 清肺, 利喉, 解毒。用于慢性扁桃体炎, 喉炎, 鼻出血, 外伤出血, 疮肿, 冻疮, 食道及胃出血, 感冒咳嗽。

## 2028 硬皮马勃菌科 Sclerodermataceae

## 2028001

*Pisolithus tinctorius* (Pers.) Coker et Couch ---

*Polysaccum pisocarpium* Fr.

真菌名 色豆马勃《中国真菌总汇》

药材名 豆包菌《中国药用真菌》

文献名 彩色豆马勃《真菌名称》, 豆包《中国药用真菌》

功效 子实体: 消肿, 止血。用于外伤出血, 冻疮流水、流脓, 食道及胃出血。

## 2028002

*Scleroderma aurantium* (Vail.) Pers. var. *spadiceum* (Schaeff.) Fr. --- *S. cepa* (Vail.) Pers.

真菌名 枣红硬皮马勃《中国真菌总汇》

文献名 光硬皮马勃《真菌名称》, 硬马勃、小圆子马勃《鉴别手册》

功效 子实体: 止血, 清热利咽。用于外伤出血, 痔疮出血, 扁桃体炎。

## 2028003

*Scleroderma polyrhizum* Pers. --- *S. geaster* Fr.

真菌名 多根硬皮马勃《中国真菌总汇》

药材名 硬皮马勃《中国药用真菌》

文献名 硬马勃、小圆子马勃《鉴别手册》, 星裂硬皮马勃《真菌名称》

功效 子实体: 消肿, 止血。外用于外伤出血, 冻

疮流水。

## 2028004

*Scleroderma verrucosum* (Vail.) Pers. subsp. *bovista* (Fr.) Sebek --- *S. bovista* Fr.

真菌名 灰疣硬皮马勃《中国真菌总汇》

药材名 硬皮马勃《中国药用真菌》

文献名 大孢硬皮马勃《真菌名称》

功效 子实体: 消肿, 止血。外用于外伤出血, 冻疮流水。

## 2029 鸟巢菌科 Nidulariaceae

## 2029001

*Cyathus stercoreus* (Schw.) de Toni

真菌名 粪生黑蛋巢菌《中国真菌总汇》

药材名 鸟巢菌《中国药用真菌》

文献名 粪生黑蛋巢《广西植物》

功效 子实体: 止胃痛。

## 2029002

*Cyathus striatus* Willd. ex Pers.

真菌名 降纹黑蛋巢菌《中国真菌总汇》

药材名 鸟巢菌《中国药用真菌》

功效 子实体: 止胃痛。

## 2030 丛梗孢科 Moniliaceae

## 2030001

*Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill.

真菌名 白僵菌《中国真菌总汇》

药材名 白僵蚕(本经)、《中药大辞典》

文献名 僵蚕《千金方》, 天虫《药材资料汇编》, 蚕白僵霉《真菌鉴定手册》, 球孢白僵菌《药用真菌图鉴》

地方名 僵虫(河北、山西)。

功效 僵死蚕体: 祛风解痉, 化痰散结。用于中风失音, 惊痫, 头风, 喉风, 喉痹, 瘰癧结核, 风疹瘾疹, 丹毒, 乳腺炎; 僵蛹: 退热, 止咳, 化痰, 镇静镇惊, 消肿等。用于癫痫, 高热惊厥, 流行性腮腺炎, 上呼吸道感染, 慢性气管炎, 遗尿, 扁桃体炎, 荨麻疹。

备考 僵蛹的形成, 也是由白僵菌寄生而得, 但药材与白僵蚕有别。

## 2030002

*Geotrichum candidum* Link

真菌名 白地霉《中国真菌总汇》

药材名 紫麦角《浙江药植志》

功效 菌丝: 用于消化不良, 脚气病等。

## 2030003

*Sepedonium chrysospermum* (Bull.) Fr.

真菌名 黄瘤孢《中国真菌总汇》

药材名 黄瘤孢《中国药用真菌》

文献名 黄麻球孢霉《中国的真菌》, 黄瘤孢菌《药用真菌图鉴》

功效 孢子粉: 止血。用于外伤出血。

**2031 无孢菌群 *Mycelia Sterilia*****2031001***Sclerotium* sp.

真菌名 无缝珠《中国药用真菌》  
 药材名 吐血莲《中国真菌总汇》  
 功效 菌核;止血。用于各种内出血。

**三、地衣类 *Lichenes*****3001 皮果衣科 *Dermatocarpaceae*****3001001***Dermatocarpon minutum* (L.) Mann.

植物名 皮果衣《汇编》

文献名 朱红革壳衣《中药大辞典》

地方名 陕西;黑石耳,石耳子,白石耳。

功效 全体;健胃消食,利水消胀。

备考 安徽芜湖、安庆、合肥等地区将本品混作石耳(*Umbilicaria esculenta* Miyoshi)入药,应注意鉴别。

**3002 地茶科 *Thamnoliaceae*****3002001***Thamnolia subuliformia* (Ehrh.) W. Culb.

植物名 雪地茶《中国地衣图鉴》

药材名 太白茶(陕西眉县)

地方名 陕西;石白茶、太白针(眉县)。

功效 全体;清热解渴,安神养心,明目。用于心中烦热,虚劳骨蒸,肺炎咳嗽,癫痫狂躁,神经衰弱,目涩,中暑,高血压病等。

**3002002***Thamnolia vermicularis* (Sw.) Ach. ex Schaer.

植物名 地茶《中国药用地衣》

药材名 雪茶《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 雪地茶《汇编》,石白茶、太白针《中国药用地衣》

地方名 太白茶(陕西、四川);陕西:蛎样地衣;四川:高山白茶(西昌)。

功效 全体;清热,安神。用于中暑,心中烦热,阴虚潮热,肺热咳嗽,神经衰弱,高血压病。

**3003 牛皮叶科 *Stictaceae*****3003001***Lobaria isidiosa* (Mull. Arg.) Vain.

植物名 裂芽肺衣《中国地衣图鉴》

文献名 珊瑚芽肺衣《植分学报》

地方名 陕西;老龙皮。

功效 全体;用于消化不良,肾炎水肿等症。

**3003002***Lobaria kurokawae* Yoshim.

植物名 光肺衣《中国地衣图鉴》

药材名 老龙皮《药学报》

地方名 陕西;石龙衣、老龙七(眉县)。

功效 全体;用于消化不良,肾炎水肿等症。

**3003003**

*Lobaria meridionalis* Vain. var. *subplana* (Asah.) Yoshim.

植物名 平滑南肺衣(拟)

药材名 老龙皮《中国地衣图鉴》

功效 全体;用于消食健胃,宽胸膈,利水,消炎,止痛。

**3003004***Lobaria pulmonaria* Hoffm. --- *Sticta pulmonacea* Ach.

植物名 肺衣《中国药用地衣》

药材名 牛皮叶《中药大辞典》

地方名 陕西:老龙皮(太白);湖北:地卷皮(神农架);四川:石苔花、石花(重庆);其他:兜衣,肺苔,肺苔草。

功效 全体;清热利湿,止崩漏。

**3003005**

*Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm. var. *meridionalis* Zahlbr.

植物名 南方肺衣(拟)

地方名 陕西:蛤蟆七。

功效 全体;健脾胃。用于肠胃病,奶积,食积。

**3003006***Lobaria retigera* (Ach.) Trevis.

植物名 网肺衣《植分学报》

药材名 老龙皮《植分学报》

地方名 陕西:兜衣,石龙皮,石龙衣,癞肚皮;广西:蛇皮苔,石花。

功效 全体;健脾利水,祛风止痒。用于消化不良,小儿疳积,肾炎水肿,腹水,皮肤瘙痒症。外用于烧烫伤,疮疡肿毒。

**3004 网衣科 *Lecideaceae*****3004001***Mycoblastus alpinus* (Fr.) Kernst.

植物名 高山黑红衣《中药大辞典》

药材名 石霜《中药大辞典》



功效 全体：止血，消炎，镇痛，涩精。用于梦遗。外用于外伤出血，烧、烫伤。

### 3005 石蕊科 Cladoniaceae

#### 3005001

*Cladonia amaurocraea* (Flk.) Schaer. --- *C. rangiferina* auct. non (L.) Web.

植物名 黑穗石蕊《中国药用地衣》

药材名 太白树《陕西中草药》

功效 全体：祛风，镇痛。用于头痛，偏头痛，并可作抗菌素原料。

备考 《陕西中草药》(1971) 学名误订为 *C. rangiferina* (L.) Web.

#### 3005002

*Cladonia arbuscula* (Rabh.) Rabh.

植物名 林石蕊《云南植物研究》

功效 全体：用于头晕目眩，高血压等。

#### 3005003

*Cladonia bacillaris* (Ach.) Nyl.

植物名 粉杆红石蕊《中国药用地衣》

功效 全体：可作抗菌素原料。

#### 3005004

*Cladonia bellidiflora* (Ach.) Schaer.

植物名 菊花石蕊《中国地衣图鉴》

功效 全体：为提取抗菌素原料。

#### 3005005

*Cladonia cyanipea* (Somm.) Vain.

植物名 黄粉石蕊《中国药用地衣》

功效 全体：可作抗菌素原料。

#### 3005006

*Cladonia floerkeana* (Fr.) Somm.

植物名 红头石蕊《中国药用地衣》

功效 全体：可作抗菌素原料。

#### 3005007

*Cladonia gracilis* (L.) Willd.

植物名 细石蕊《陕西中草药》

药材名 太白针《汇编》

文献名 太白鹿角《陕西中草药》

地方名 匙石蕊《陕西、湖北》；陕西：地蓬草；湖北：清水还阳、老君鹿角（神农架）。

功效 全体：清热止血，利尿消肿。用于急性结膜炎，睑缘炎，鼻衄，吐血，膀胱炎，小便不利。外用于黄水疮。

#### 3005008

*Cladonia macilenta* Hoffm. f. *squamigera* Vain.

植物名 瘦柄红石蕊《中国药用地衣》

功效 全体：可作抗菌素原料。

#### 3005009

*Cladonia macroceras* (Flk.) Ahti

植物名 长柄石蕊《中国地衣图鉴》

药材名 太白鹿角《中国地衣图鉴》

功效 全体：渗湿利水。用于利水，通淋，消

肿解毒等。

#### 3005010

*Cladonia mitis* Sandst.

植物名 软石蕊《中国药用地衣》

功效 全体：可作抗菌素原料。

#### 3005011

*Cladonia pleurota* (Flk.) Schaer.

植物名 粉杯红石蕊《中国药用地衣》

功效 全体：可作抗菌素原料。

#### 3005012

*Cladonia rangiferina* (L.) Web.

植物名 石蕊《中国药用地衣》

药材名 石蕊《本草拾遗》、《汇编》

文献名 石濡、石芥《别录》，云茶、蒙顶茶《纲目》，石蕊花《朱蕴斋医集》，石云茶《本草汇言》，云芝茶、蒙山茶《宦游笔记》，蒙阴茶《纲目拾遗》，酶苔《国药的药理学》，岩蕊《中国植物图鉴》，山石蕊《下等植物分类学》，太白树《中国地衣图鉴》

地方名 湖北：见水还阳（神农架）；四川：地花，雪茶（峨眉）；贵州：石花（黔南），刀伤药（梵净山）。

功效 全体：清热，化痰，凉肝，止血。用于烦热，口疮，咳血，吐血，偏正头痛，目翳昏花，热淋，黄疸，刀伤出血。

#### 3005013

*Cladonia stellaris* (Opiz.) Pouzar & Vezda --- *C. alpestris* (L.) Rabenh.

植物名 雀石蕊《药学报》

药材名 太白花《陕西中草药》

文献名 岭石蕊《陕西中草药》，山岭石蕊《汇编》，雀儿石蕊《中药大辞典》

地方名 陕西：高山石蕊。

功效 全体：平肝潜阳，调经止血。用于头晕目眩，高血压病，偏头痛，鼻衄，崩漏，月经不调，白带。

#### 3005014

*Cladonia submitis* Evans.

植物名 亚软石蕊《中国地衣图鉴》

功效 全体：为提取抗菌素原料。

#### 3005015

*Cladonia synatica* (L.) Hoffm.

植物名 林生石蕊《峨眉药植资源》

地方名 四川：雪茶（峨眉山），地花。

功效 全体：清热除湿，解表，凉血。

#### 3005016

*Cladonia verticillata* Hoffm.

植物名 千层石蕊《中药大辞典》

药材名 小喇叭《贵州草药》

地方名 贵州：地喇叭（正安），“树格达”（雷公山苗语）。

功效 全体：止血，清热。用于刀伤，咳血，烫伤。

#### 3005017

*Stereocaulon exutum* Nyl.

植物名 裸珊瑚枝《中国地衣图鉴》

药材名 石寄生《中国地衣图鉴》

功效 全体:凉血,止血。用于吐血,衄血,高血压等。

### 3005018

*Stereocaulon paschale* Hoffm.

植物名 东方珊瑚枝《中国地衣图鉴》

药材名 石寄生《陕西中草药》

文献名 指状珊瑚枝《陕西中草药》,东方衣《中药大辞典》

功效 全体:凉血,止血。用于吐血,衄血,高血压病。

## 3006 脐衣科 Umbilicariaceae

3006001 见 3006003a

### 3006002

*Umbilicaria esculenta* (Miyoshi) Minks --- *Gyrophora esculenta* Miyoshi

植物名 石耳《中国药用地衣》

药材名 石耳《日用本草》、《中药大辞典》

文献名 石木耳《饮片新参》

地方名 辽宁:地耳(宽甸),岩蕈;江西:岩菇,石壁花;湖北:石耳子(神农架)。

功效 全体:养阴,止血。用于劳咳吐血,肠风下血,痔漏,脱肛。

### 3006003

*Umbilicaria hypococcinea* (Jatta) Llanos --- *Gyrophora hypococcinea* Jatta

植物名 红腹石耳《中国地衣图鉴》

药材名 红石耳《陕西中草药》

文献名 红腹脐衣《植分学报》,黄底石耳《陕西中草药》

地方名 陕西:石耳子,红石耳子。

功效 全体:健胃消食,利水消胀,驱虫。

### 3006003a

*Umbilicaria proboscidea* (L.) Schrad. --- *Gyrophora proboscidea* Ach.

植物名 多盘石耳《中国地衣图鉴》

药材名 石瓣《滇南本草》

文献名 白地膏《滇南本草》,猪嘴石耳《滇南本草》(整理本)

功效 全体:用于赤白带下,便浊,五淋疼痛,敷诸疮,无名肿毒。

### 3006004

*Umbilicaria tornata* (Ach.) Del. --- *Gyrophora tornata* Ach.

植物名 黑脐衣《药用孢植》

药材名 黑石耳《汇编》

文献名 盘形石耳《中药大辞典》

地方名 陕西:黑石耳子,裂叶石耳。

功效 全体:健胃,消食,利尿,祛风湿,驱虫。用于消化不良,小儿疳积,痢疾,肠炎,虫积,赤白带下。

## 3007 茶渍科 Lecanoraceae

### 3007001

*Haematomma lapponicum* Ras.

植物名 岩石赤星衣《药学报》

药材名 石霜《药学报》

地方名 陕西:黄石霜、石花(眉县)。

功效 全体:消炎,镇痛,止血。用于外伤出血,并可抗菌素原料。

### 3007002

*Haematomma ventosum* (L.) Mass. --- *Lichen ventosus* L.

植物名 赤星衣《中国地衣图鉴》

药材名 石霜《中国地衣图鉴》

功效 全体:外用于收敛,止血,止痛。

### 3007003

*Lecanora affinis* Eversm. --- *Aspicilia vagans* Oxn.

植物名 风滚衣《中国地衣图鉴》

功效 全体:可以药用和食用。

## 3008 梅衣科 Parmeliaceae

### 3008001

*Anzia japonica* (Tuck.) Mull. Arg.

植物名 日本绵腹衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008002

*Anzia opuntiella* Mull. Arg. --- *A. gracilis* Asah.

植物名 仙人掌绵腹衣《中国地衣图鉴》

功效 全体:为提取抗菌素原料。

### 3008003

*Anzia ornata* (Zahlbr.) Asahina

植物名 镶边绵腹衣《中国药用地衣》

文献名 瘤绵腹衣《中国地衣图鉴》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008003a

*Cetraria asahinae* Sato --- *C. ornata* A. Z.

植物名 肾盘岛衣《中国地衣图鉴》

药材名 石花《南充中草》

地方名 四川:鲍藓(南充)。

功效 全体:凉血,利尿。用于外伤出血,火淋,风湿痒疹。

### 3008004

*Cetraria cucullata* (Bell.) Ach.

植物名 黄卷岛衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008005

*Cetraris delisei* (Bory) Th. Fr.

植物名 刺岛衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008006

*Cetraria islandica* (L.) Ach.

植物名 冰岛衣《中国药用地衣》

文献名 太白树《中国地衣图鉴》

功效 全体:可作抗菌素原料,健胃,镇静。

### 3008007

*Cetraria juniperina* (L.) Ach.

植物名 桧岛衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008008

*Cetraria nivalis* (L.) Ach. --- *Lichen nivalis* L.

植物名 雪岛衣《中国地衣图鉴》

功效 全体:为提取抗菌素原料。

### 3008009 见 3008003a

### 3008010

*Cetraria pinastri* (Scop.) Rohling.

植物名 黄花岛衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008011

*Lethariella cladonioides* (Nyl.) Krog --- *Cladonia fallax* auct. non Abbayes

植物名 金丝刷《中国药用地衣》

药材名 金刷把《陕西中草药》

功效 全体:镇静,止痛,收敛。用于神经衰弱,癫痫,精神分裂症,头目眩晕,跌打损伤。外用于烧烫伤。

备考 过去文献常将本品误订为 *Cladonia fallax* Abbayes

### 3008012

*Lethariella zahlbruckneri* (DR.) Krog --- *Usnea zahlbruckneri* DR. --- *Alectoria virens* auct. non Tayl.

植物名 金丝带《中国地衣图鉴》

药材名 金丝带《陕西中草药》

文献名 [绿树发]《陕西中草药》

地方名 陕西:金腰带(眉县)。

功效 全体:祛风活络,补肾壮阳,调经止血。用于腰腿疼痛,半身不遂,肾虚腰痛,阳痿,头晕,月经不调,白带。外用于创伤出血。

备考 有些文献将本品学名误订为 *Alectoria virens* Tayl.

### 3008013

*Parmelia borrieri* (Sm.) Yurn.

植物名 粉斑梅衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008014

*Parmelia camtschadalis* (Ach.) Eschw. ---

*Xanthoparmelia camtschadalis* (Ach.) Hale

植物名 旱梅衣《中国地衣图鉴》

功效 全体:为提取抗菌素原料

### 3008015

*Parmelia caperata* (L.) Ach.

植物名 皱梅衣《中国地衣图鉴》

药材名 地花《中国地衣图鉴》

文献名 梅花衣《植分学报》

功效 全体:清热。用于清热止渴,泻火。并可作

抗菌素原料。

### 3008016

*Parmelia cetrarioides* Del.

植物名 粉绿梅衣《中国地衣图鉴》

文献名 岛衣状梅衣《植分学报》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008017

*Parmelia enteromorpha* Ach. --- *Hypogymnia enteromorpha* (Ach.) Nyl.

植物名 指袋梅衣《中国地衣图鉴》

文献名 指袋衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008018

*Parmelia flaventior* Stirt.

植物名 黄化梅衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料

### 3008019

*Parmelia hypotrypa* Nyl. --- *Hypogymnia hypotrypa* (Nyl.) Rass.

植物名 黄袋梅衣《中国地衣图鉴》

文献名 黄袋衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008020

*Parmelia hypotrypella* Asah. --- *Hypogymnia hypotrypella* (Asah.) Rass.

植物名 粉黄袋梅衣《中国地衣图鉴》

文献名 黄粉袋衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008021

*Parmelia mexicana* Gyeln. --- *Xanthoparmelia mexicana* (Gyeln.) Hale

植物名 淡腹梅衣《中国地衣图鉴》

文献名 墨西哥梅衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008022

*Parmelia olivetorum* Nyl. --- *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) W. Culb. et C. Culb.

植物名 漂红梅衣《中国地衣图鉴》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008023

*Parmelia pseudolivetorum* Asah.

植物名 裂缘梅衣《中国地衣图鉴》

功效 全体:为提取抗菌素原料。

### 3008024

*Parmelia reticulata* Tayl.

植物名 网纹梅衣《植分学报》

药材名 石耳《台湾中药材图鉴》

文献名 网梅衣《中国药用地衣》

功效 全体:凉血解毒。外用于无名肿毒。

### 3008025

*Parmelia saxatilis* (L.) Ach.

植物名 藻纹梅衣《中国地衣初编》

药材名 石花《草木便方》、《汇编》

文献名 石苔花《草木便方》、乳花《北方本草》、地衣《东北药植图志》、藻纹梅花衣《汇编》、梅衣《药用孢植》、石梅衣《中国药用地衣》

地方名 梅鲜(山东、山西);内蒙古:“道立克”(蒙名);山东:石衣。

功效 全体:清热利湿,止崩漏。用于膀胱湿热,黄疸,风湿腰痛,崩漏。外用于皮肤搔痒,脚癣,小儿口疮,白癣风。

### 3008026

*Parmelia sinuosa* (Sm.) Ach.

植物名 深波状梅衣《植分学报》

文献名 黄条梅衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008027

*Parmelia taractica* Krmphbr --- *Xanthoparmelia taractica* (Krmph.) Hale

植物名 光滑梅衣《中国地衣图鉴》

文献名 拟菊叶梅衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3008028

*Parmelia tinctoria* Mah. et Gillet --- *Xanthoparmelia tinctoria* (Mah. et Gillet) Hale

植物名 暗腹梅衣《中国地衣图鉴》

功效 全体:为提取抗菌素原料。

### 3008029

*Parmelia tinctorum* Despr.

植物名 染料梅衣《植分学报》

药材名 白石花《汇编》

文献名 染色梅衣、石花《中草药》、梅衣《中国药用地衣》

地方名 陕西:虾蟆皮、石衣;台湾:石耳。

功效 全体:凉血解毒。外用于无名肿毒。

备考 安徽芜湖、安庆、合肥等地区以本品混充石耳(*Umbilicaria esculenta* Miyos)入药,应注意鉴别。据我国皮肤病研究所报导,本品对几种常见的致病性真菌有抗真菌的作用。

### 3008030

*Parmelia ulophyllodes* (Vain.) Savicz

植物名 卷叶梅衣《植分学报》

功效 全体:可作抗菌素原料。

## 3009 松萝科 Usneaceae

### 3009001

*Alectoria asiatica* Du Rietz.

植物名 亚洲树发《汇编》

药材名 头发七《陕西中草药》

地方名 陕西:黑丝草。

功效 全体:滋补肝肾,收敛止汗。用于头晕,心悸,肾虚体弱,遗精,盗汗。外用于黄水疮。

### 3009002

*Alectoria jubata* Ach.

植物名 树发《中国地衣图鉴》

药材名 头发七《陕西眉县》

地方名 陕西:人头发、黑丝草(眉县)。

功效 全体:利水消肿,收敛止汗。用于肾虚体弱。

### 3009003

*Alectoria ochroleuca* (Hoffm.) Mass.

植物名 金黄树发《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3009004

*Alectoria sulcata* (Lev.) Nyl.

植物名 沟槽树发《中国药用地衣》

文献名 沟树发《云南植物研究》、头发七《中国地衣图鉴》

功效 全体:补阴。用于肾虚体弱,滋阴补肾,清热祛风,并具抗癌活性。

### 3009005

*Evernia divaricata* (L.) Ach.

植物名 柔扁枝衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作香料和抗菌素原料。

### 3009006

*Evernia esorediosa* (Mull. Arg.) DR.

植物名 裸扁枝衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作香料及抗菌素原料。

### 3009007

*Evernia mesomorpha* Nyl.

植物名 扁枝衣《中国药用地衣》

功效 全体:可作香料及抗菌素原料。

### 3009008

*Lethariella sinensis* Wei et Jiang

植物名 中华金丝《迪庆藏药》

药材名 中华金丝《迪庆藏药》

功效 地衣体:消炎,解毒。

### 3009009

*Ramalina fastigiata* (Liljebl.) Ach.

植物名 丛生树花《中国地衣图鉴》

功效 全体:可作香精及抗菌素原料。

### 3009010

*Ramalina minuscula* Nyl. --- *R. dilacerata* (Hoffm.) Vain.

植物名 裂树花《中国地衣图鉴》

功效 全体:为香料和抗菌素原料。

### 3009011

*Ramalina roesleri* (Hochst.) Nyl.

植物名 肉刺树花《中国药用地衣》

功效 全体:可作香料及抗菌素原料。

### 3009012

*Ramalina sinensis* Jatta

植物名 中国树花《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3009013

*Usnea aciculifera* Vain. f. *abbreviata* Asah.

植物名 茶松萝《浙南本草新编》

药材名 茶树须《浙江药植志》

地方名 浙江:茶萝。

功效 全体:用于心肾水肿,尿潴留,尿道炎。

### 3009014

*Usnea diffracta* Vain.

植物名 环裂松萝《品种论述》

药材名 松萝《本经》、《汇编》

文献名 女萝《诗经》,松上寄生《纲目》,芎萝、蔓萝、蔓女萝、金钱草《新纲》,破茎松萝《陕西中草药》,松落《国药的药理学》,老君须《鉴别手册》

地方名 树挂(东北、河北),云雾草(陕西、浙江、安徽、上海、江西、湖北),[海风藤](四川、陕西、湖南、湖北、广西、江西),缩筋草(四川、江西);陕西:天蓬草;甘肃:飞天蜈蚣;青海:“赛什格”(藏名);浙江:胡须草;安徽:无根藤;江西:老龙须(安福),节松萝,节茎松萝;湖南:仙人头发,石丝线,金丝藤,飞山翅;广东:松树寄生;广西:接筋草;四川:天棚草,雪风藤,山挂面,龙须草,松络缩;云南:顺风飘、树头发、树花(红河)。

功效 全体:清肝,化痰,止血,解毒。用于头痛,目赤,咳嗽痰多,疟疾,瘰癧,白带,崩漏,外伤出血,痈肿,毒蛇咬伤。

备考 安徽的安庆地区曾将本品混充海风藤入药,应注意鉴别。

### 3009015

*Usnea florida* (L.) Wigg.

植物名 多果松萝《品种论述》

文献名 花松萝《汇编》,老君须《鉴别手册》

地方名 云南:松萝,[海风藤]。

功效 全体:清肝,化痰,止血,解毒。

### 3009016

*Usnea hossei* Vain.

植物名 江西松萝(拟)

地方名 江西:[海风藤](赣州)。

功效 全体:江西赣州有以此作海风藤。

### 3009017

*Usnea japonica* Vain.

植物名 日本松萝《中国地衣初编》

文献名 松萝、老君须《和汉药名汇》

功效 丝状体:清热解毒。

### 3009018

*Usnea longissima* Ach.

植物名 松萝《品种论述》

药材名 松萝《本经》、《汇编》

文献名 女萝《诗经》,松上寄生《纲目》,松上藤《药性奇方》,松落《国药的药理学》,芎萝、蔓萝、蔓女萝、金钱草《新纲》,长松萝《中国地衣图鉴》,长茎松萝《云南植物研究》

地方名 树挂(黑龙江、陕西),云雾草(西北、中南、西南),老君须(天津、湖北);陕西:天蓬草,树衣七(眉县);福建:茶施;湖北:树衣,树衣毛(神农架);湖南:石

飞丝;四川:山挂面,雪风藤,老人须,破石珠,石峰占铃草,普贤线;云南:树胡子,树花,顺风飘,树木衣(丽江),青儿藤(玉龙山),“飞龙”(西双版纳傣语);其他:观音线。

功效 全体:清肝,化痰,止血,解毒。

### 3009019

*Usnea longissima* Ach. var. *percellata* Mot.

植物名 睫毛松萝《品种论述》

地方名 云南:[海风藤](昆明)。

功效 全体:云南昆明以此为海风藤。

### 3009020

*Usnea montis-fuji* Mot.

植物名 变红长松萝《植分学报》

文献名 粗皮松萝、天蓬草、云雾草、树发七《中国药用地衣》

功效 全体:止血生肌,止痛,清肝明目,退云翳,降血压,调经。用于外伤止血,大便下血,急性结膜炎,角膜云翳,头痛,高血压,月经不调,崩漏,白带,痈肿及无名肿毒,可作抗菌素原料。

### 3009021

*Usnea pectinata* Tayl.

植物名 拟长松萝《中国地衣图鉴》

药材名 天蓬草《中国地衣图鉴》

功效 全体:止血生肌,清热止痛。外用于外伤止血,大便下血,无名肿毒等。并可为提取抗菌素原料。

### 3009022

*Usnea pseudomotis-fuji* Asahino

植物名 假变红长松萝(拟)

地方名 江西:[海风藤](赣州)。

功效 全体:江西赣州尚有以此为海风藤者。

### 3009023

*Usnea roseola* Vain.

植物名 红髓松萝《中国药用地衣》

文献名 玫瑰红松萝《中国地衣初编》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3009024

*Usnea rubescens* Stirt.

植物名 红皮松萝《中国药用地衣》

功效 全体:可作抗菌素原料。

### 3009025

*Usnea rubicunda* Stirt.

植物名 深红松萝《中国地衣图鉴》

功效 全体:为提取抗菌素原料。

### 3009026

*Usnea sinica* (Mot.) Chao, Hsu et Sun --- *U. longissima* Ach. var. *sinica* Mot.

植物名 中国松萝《中国地衣初编》

地方名 云南:[海风藤](昆明)。

功效 全体:四川、云南作海风藤用。

备考 松萝属植物含松罗酸、地衣酸等。松罗酸钠对肺炎脓症、烧伤化脓、阴道滴虫病等有效。松萝属某些品种还有抗癌作用。

**3010 地卷科 Peltigeraceae****3010001***Peltigera aphthosa* (L.) Willd.

植物名 绿皮地卷《中国地衣图鉴》

药材名 老龙皮《中国地衣图鉴》

功效 全体:用于消食,健胃,利水。

**3010002***Peltigera polydactyla* (Neck.) Hoffm.

植物名 多指地卷《中国地衣图鉴》

药材名 地卷草《滇南本草》

文献名 [虫草]、抓地松、石上青苔、地卷丝《滇南本草》,石青苔《名实图考》

功效 全体:用于鼻衄,跌打损伤。

**3011 鸡皮衣科 Pertusariaceae****3011001***Pertusaria velata* (Turn.) Nyl.

植物名 包被鸡皮衣《中国地衣图鉴》

药材名 石霜《中国地衣图鉴》

功效 全体:外用于收敛,止血,止痛。

**四、苔藓类 Bryophyta****4001 耳叶苔科 Frullaniaceae****4001001***Frullania moniliata* (Reiwardt, Bl. et Nees) Mont.

植物名 列胞耳叶苔《药用孢植》

地方名 陕西:地蓬草。

功效 全草:清心明目。用于目赤肿痛。

**4002 石地钱科 Rebouliaaceae****4002001***Reboulia hemisphaerica* (L.) Raddi.

植物名 石地钱《苔藓名称》

地方名 湖南:岩花,青天云。

功效 全草:清热解毒。用于疮疖肿毒,烧烫伤。

**4003 蛇苔科 Conocephalaceae****4003001***Conocephalum conicum* (L.) Dum.

植物名 蛇苔《苔藓名称》

药材名 蛇地钱《江西《草药手册》》

地方名 浙江:大蛇苔;安徽:石衣,砂砾蕈;江西:地皮斑(赣中、南昌),地皮花,石皮斑(奉新),云斑(赣州),一团云,小叶蛇地钱,小叶地钱,吸石针(宜黄),石壁青,七星丹(景德镇),杯里装珍珠(德兴)。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。外用于疔疮痈肿,烧、烫伤,毒蛇咬伤,外伤骨折。

**4003002***Conocephalum supradecompositum* (Lindb.) Steph.

植物名 小蛇苔《苔藓名称》

文献名 花叶蛇苔《药用孢植》

功效 全草:消肿止痛,解毒。用于疔疖,疔疮,蛇咬伤等。

**4004 地钱科 Marchantiaceae****4004001***Dumortiera hirsuta* (Sw.) Reinw., Bl. et Nee.

植物名 毛地钱《苔藓名称》

地方名 湖北:地龙皮(神农架);湖南:水象皮。

功效 全草:清热,解毒,消肿。用于毒蛇咬伤,刀伤,皮肤外伤,烧烫伤。

**4004002***Marchantia polymorpha* L.

植物名 地钱《苔藓名称》

药材名 地钱《贵州民间药物》

地方名 巴骨龙、龙眼草(陕西、四川),米海苔(河南、陕西);陕西:脓痂草(秦岭);河南:降龙草;湖北:龙衣(神农架);湖南:七星苔,蛇地钱;四川:石灵芝(绵阳),地龙皮(会理);贵州:地浮萍(黎平、安顺),一团云(剑河),地梭罗(罗甸),地衣(绥阳)。

功效 全草:解毒,祛瘀,生肌。外用于烧烫伤,骨折,毒蛇咬伤,疮痈肿毒,疔疮,癰。

**4005 泥炭藓科 Sphagnaceae****4005001***Sphagnum acutifolium* Ehrh.

植物名 尖叶泥炭藓《贵州药录》

功效 全株:清热解毒,明目,消肿。用于目赤肿痛,角膜白斑。

**4005002***Sphagnum palustre* L. --- *S. cymbifolium* (Enrh.) Hedw.

植物名 泥炭藓《苔藓名称》

文献名 拟大泥炭藓、大泥炭藓、日本泥炭藓、疏泉泥炭藓《苔藓名称》

地方名 湖南:“勒逼久”(瑶语)。

功效 全草:泻火,止咳。

**4005003***Sphagnum teres* (Schimp.) Aongstr.

植物名 细叶泥炭藓《苔藓名称》

文献名 [满天星]《陕西中草药》

功效 全草:清热明目,退云翳,消肿。用于角膜白斑,目赤肿痛。

#### 4006 牛毛藓科 Ditrichaceae

4006001

*Ditrichum pallidum* (Hedw.) Hamp.

植物名 黄牛毛藓《苔藓名称》

功效 全草:镇惊。用于小儿惊风。

#### 4007 曲尾藓科 Dicranaceae

4007001

*Oreas martiana* (Hopp. et Hornsch.) Brid.

植物名 山毛藓《苔藓名称》

药材名 牛毛七《陕西中草药》

地方名 贵州:刀口药。

功效 全草:养阴清热,安神定志,祛风除湿,止血镇痛。用于骨蒸潮热,神经衰弱,风湿疼痛,癫狂,外伤。

#### 4008 丛藓科 Pottiaceae

4008001

*Hydrogonium amplexifolium* (Mitt.) Chen.

植物名 卷叶石灰藓《苔藓名称》

功效 全草:清热止痢。用于细菌性痢疾等。

4008002

*Weissia controversa* Hedw. --- *W. viridula* Hedw. ex Brid.

植物名 小石藓《苔藓名称》

文献名 长口小石藓《苔藓名称》

地方名 浙江:垣衣。

功效 全草:清热解毒。用于鼻炎。

#### 4009 葫芦藓科 Funariaceae

4009001

*Funaria hygrometrica* Hedw.

植物名 葫芦藓《苔藓名称》

地方名 四川:[红孩儿](重庆),牛毛七(巴县),石松毛(长寿),火堂须。

功效 全草:除湿止血。用于瘀伤吐血,跌打损伤,湿气脚痛。

#### 4010 壶藓科 Splachnaceae

4010001

*Tetraplodon mnioides* (Hedw.) B. S. G. --- *T. bryoides* (Zieg.) Lindb.

植物名 并齿藓《苔藓名称》

地方名 陕西:太白针。

功效 全草:镇静安神。用于心慌心烦,痫症,中风不语。

#### 4011 真藓科 Bryaceae

4011001

*Bryum argenteum* Hedw.

植物名 真藓《苔藓名称》

文献名 垣衣、垣藓、天韭、鼠韭、苔邪《别录》,苔衣、屋游《纲目》,银叶真藓《中国藓类植物属志》

功效 全草:清热解毒。用于细菌性疾病,鼻窦炎等。

4011002

*Rhodobryum giganteum* (Schwaegr.) Par.

植物名 暖地大叶藓《苔藓名称》

药材名 回心草《云南中草药选》

文献名 南大叶藓《药用抱植》,太阳草《中草药》

地方名 湖北:梅花还阳(神农架);四川:太阳针;贵州:阿收鸡,岩柏枝,岩谷伞(雷公山);云南:苣心草,苣薪草(临沧),大叶藓(思茅),苏醒草(红河);其他:[石松],一把伞。

功效 全草:养心安神,清肝明目。用于心悸怔忡,神经衰弱。外用于目赤肿痛。

4011003

*Rhodobryum roseum* (Hedw.) Limpr.

植物名 大叶藓《苔藓名称》

药材名 回心草《云南中草药选》

文献名 矮丛大叶藓《汇编》,红大叶藓《中药大辞典》,一把伞《中草药》

地方名 四川:小青药(西昌);云南:铁脚一把伞,苣心草。

功效 全草:养心安神。

#### 4012 提灯藓科 Mniaceae

4012001

*Mnium cuspidatum* Hedw.

植物名 尖叶提灯藓《高植图鉴》

药材名 水木草《陕西中草药》

功效 全草:止血。用于鼻衄,崩漏。

#### 4013 珠藓科 Bartramiaceae

4013001

*Philonotis fontana* (Hedw.) Brid.

植物名 泽藓《苔藓名称》

文献名 溪泽藓《苔藓名称》

地方名 陕西:旱青苔(镇坪),阴阳草(安康)。

功效 全草:清热解毒。用于扁桃体炎,喉炎,疮疖等。

4013002

*Plagiopus oederi* (Brid.) Limpr.

植物名 寒地平珠藓《苔藓名称》

药材名 太阳针《陕西中草药》

文献名 平珠藓《中国藓类植物属志》

功效 全草:镇静定惊。用于失眠心慌,癫痫。

#### 4014 蔓藓科 Meteoriaceae

4014001

*Aerobryidium filamentosum* (Hook.) Fleisch.

植物名 毛扭藓《苔藓名称》  
 地方名 云南:石上青(思茅)。  
 功效 全草:清热,消炎。

**4014002**

*Barbella pendula* (Sull.) Fleisch.

植物名 多疣悬藓《苔藓名称》  
 文献名 悬藓《贵州药录》  
 功效 全株:清热解毒。用于肿疔。

**4014003**

*Floribundaria floribunda* (Doz. et Molk.) Fleisch.

植物名 丝带藓《苔藓名称》  
 功效 全草:用于刀伤出血。

**4014004**

*Meteoriella soluta* (Mitt.) Okam.

植物名 小蔓藓《苔藓名称》  
 地方名 江西:海风沙,海风丝。  
 功效 全草:止血消炎。用于外伤出血、胃肠出血、肺咯血。

**4015 万年藓科 Climaciaceae****4015001**

*Climacium dendroides* (Hedw.) Web. et Mohr.

植物名 万年藓《苔藓名称》  
 地方名 湖北:松枝还阳(神农架);贵州:天朋草  
 功效 全草:活血散瘀,止痛。

**4016 羽藓科 Thuidiaceae****4016001**

*Bryohaplocladium microphyllum* (Hedw.) R. Watanabe et Iwats. --- *Haplocladium microphyllum* (Hedw.) Broth. --- *H. microphyllum* ssp. *capillatum* (Mitt.) Reim.

植物名 细叶小羽藓《苔藓名称》  
 文献名 小叶小羽藓《汇编》,尖叶小羽藓《秦岭苔藓名录》  
 地方名 湖北:绿青苔。  
 功效 全草:清热解毒。用于急性扁桃体炎,乳腺炎,丹毒,疖肿,上感,肺炎,中耳炎,膀胱炎,尿道炎,附件炎,产后感染等急性炎症。

**4017 柳叶藓科 Amblystegiaceae****4017001**

*Cratoneuron filicinum* (Hedw.) Spruc.

植物名 牛角藓《苔藓名称》  
 文献名 短叶牛角藓《苔藓名称》  
 地方名 云南:金丹散(思茅)。  
 功效 全草:安神宁心。用于心慌心跳。

**4017002**

*Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst.

植物名 薄网藓《苔藓名称》  
 功效 全草:清热利湿。用于黄疸,尿路感染。

**4018 绢藓科 Entodontaceae****4018001**

*Entodon compressus* (Hedw.) C. Mull.

植物名 密叶绢藓《苔藓名称》  
 文献名 扁绢藓《浙江药植志》,扁枝绢藓《药用抱植》  
 地方名 云南:石苔。  
 功效 全草:利尿。用于水肿。

**4019 灰藓科 Hypnaceae****4019001**

*Hypnum plumaeforme* Wils.

植物名 大灰藓《苔藓名称》  
 文献名 多形灰藓、羽枝灰藓《苔藓名称》  
 地方名 湖南:“老别周”(蓝山县瑶语);贵州:岩毛。  
 功效 全草:清热解毒,生肌。用于开放性骨折。

**4019002**

*Taxiphyllum taxirameum* (Mitt.) Fleisch.

植物名 鳞叶藓《苔藓名称》  
 文献名 杉枝鳞叶藓《秦岭苔藓名录》,多枝鳞叶藓《汇编》,长叶鳞叶藓《苔藓名称》  
 功效 全草:用于外伤出血。

**4020 金发藓科 Polytrichaceae****4020001**

*Pogonatum alpinum* Hedw.

植物名 高山金发藓《高植图鉴》  
 地方名 湖北:金丝还阳(神农架)。  
 功效 全草:清热泻火。用于小儿惊风。

**4020002**

*Pogonatum inflexum* (Lindl.) Lac.

植物名 东亚小金发藓《苔藓名称》  
 药材名 小金发藓《苔藓名称》  
 文献名 东亚金发藓《高植图鉴》  
 地方名 贵州:红孩儿、止血药(贵阳)。  
 功效 全草:用于心血管系统疾病。可使动脉软化,增加冠脉血流量,对胸闷及心绞痛均有一定效果。

**4020003**

*Polytrichum commune* L. ex Hedw.

植物名 金发藓《苔藓名称》  
 药材名 土马鬃《嘉祐本草》、《汇编》  
 文献名 马鬃《纲目》,大金发藓《中国药植志》  
 地方名 千年枞(江西、湖南);陕西:太阳针;江苏:独根草(无锡中独山);江西:千年松,银根草,一寸松;湖北:金丝还阳;广西:坭松;四川:矮松树,万年杉[石松];贵州:小松柏,岩上小草,眼丹药,[-口血]。  
 功效 全草:清热解毒,凉血止血。用于久热不



退,盗汗,衄血,咯血,吐血,便血,崩漏,跌打损伤。外 | 用于疮疖。

## 五、蕨类 *Pteridophyta*

### 5001 松叶蕨科 *Psilotaceae*

#### 5001001

*Psilotum nudum* (L.) Erioseb.

植物名 松叶蕨《蕨类名称》

药材名 石刷把《四川中药志》

文献名 松叶兰《植物名汇》,铁石松《民药汇编》

地方名 浙江:岩扫帚(乐清);福建:石寄生(泉州),铁扫帚(闽侯、泉州),石须;广西:龙须草,竹寄生,羊须(龙州),岩松(德保);四川:铁刷把,铁扫把(成都),刷把连(峨眉山)。

功效 全草:祛风湿,利关节,活血通经。用于跌打损伤,风湿关节痛,坐骨神经痛,经闭。

### 5002 石杉科 *Huperziaceae*

#### 5002001

*Huperzia chinensis* (Christ) Ching --- *Lycopodium chinense* Christ

植物名 中华石杉《蕨类名称》

文献名 中华石松《植分学报》

地方名 云南:龙胡子,龙胡须,旱灵草,岩石松。

功效 全草:祛风除湿,清热。用于关节酸痛,带状疱疹。

#### 5002002

*Huperzia crispata* (Ching) Ching --- *Lycopodium crispatum* Ching

植物名 皱叶石杉《蕨类名称》

文献名 皱边石杉、千层塔《中草药》

地方名 四川:虱子草,矮杉树,秧子。

功效 全草:散瘀,消肿,解毒,止痛。

#### 5002003

*Huperzia herteriana* (Kumm.) Sen et Sen

植物名 锡金石杉《蕨类名称》

功效 全草:清热解毒,消肿止痛,舒筋活血。

#### 5002004

*Huperzia hwangshanensis* Ching et Chiu

植物名 黄山石杉《安徽采药录》

功效 全草:收敛止血,杀虫来虱。用于瘡伤吐血。外用于阴虱。

#### 5002005

*Huperzia longipetiolata* (Spring) C. Y. Yang ---

*Lycopodium serratum* Thunb. var. *longipetiolata* Spring

植物名 长柄石杉《中草药》

地方名 台湾:〔金不换〕。

功效 全草:消瘀,活络。

#### 5002006

*Huperzia omeiensis* (Ching et H. S. Kung) Ching et H.

S. Kung --- *Lycopodium omeiense* Ching et H. S. Kung

植物名 峨眉石杉《蕨类名称》

文献名 峨眉石松《植分学报》

地方名 湖北:铺地分筋(神农架);四川:虱子草、鹿子草(峨眉山)。

功效 全草:收敛止血,解毒消肿,灭虱。

#### 5002007

*Huperzia selago* (L.) Bernh. --- *Lycopodium selago* L.

植物名 石杉《蕨类名称》

药材名 小接筋草《陕西中草药》

文献名 小杉兰《占野》,卷柏状石松《中药大辞典》

地方名 辽宁:小接骨草(宽甸);江西:千层塔,短脚杉,蛇足草;云南:龙胡子、岩石松(文山)。

功效 全草:止血,续筋。外用于跌打损伤,外伤出血。

#### 5002008

*Huperzia serrata* (Thunb.) Trev. --- *Lycopodium serratum* Thunb.

植物名 蛇足石杉《蕨类名称》

药材名 千层塔《名实图考》、《汇编》

文献名 蛇足石松《东北草本志》,蛇足草《中国植物图鉴》

地方名 〔金不换〕(福建、台湾),虱子草(贵州、四川、广东、广西),狗牙齿(贵州、湖南),矮杉树(四川、湖南),矮松(江西、贵州);浙江:〔神仙对坐草〕(天目山);江西:打不死、天朋草(丰城),万年松、〔对座草〕(景德镇),跌打损伤草(吉水),蛇毕剥(南丰),下松(定南),干蒙草(赣州),高脚鹅不食,千里马(泰和);福建:金锁匙,横纹草,充天松,山柚柑、救命王(福州),搜山虎(清流),山葡萄茶(明溪),〔羊蹄跟〕(泉州);台湾:龙鳞草,七寸金;湖北:地柏枝、马齿还阳、岩马齿苋(鹤峰),金杉还阳、〔万年青〕(巴东);湖南:千金虫,〔刘寄奴〕(怀化),矮罗汉(古丈),狗牙菜(花垣),虱婆药、〔雪上一支蒿〕(新宁),两指半(汝城),千层楼,虱婆子草(衡山);广东:野沙箭、独脚松、千年松(惠阳);广西:虱婆草(资源),小还魂、细单公(梧州);四川:千金闸、千金棒、万年杉、铁板草(重庆),鹿子草(峨眉山);贵州:蛇交子(梵净山),毛背杠,生扯拢(石阡),直立石松,山芝;云南:杀蛆草、瓦尾(保山),细草莲、灾虱药(红河)。

功效 全草:有小毒。散瘀,消肿,解毒,止痛。用于跌打损伤,瘀血肿痛,内伤吐血。外用于痈疽肿毒,

毒蛇咬伤, 烧烫伤。

#### 5002009

*Huperzia sutchueniana* (Herter) Ching

植物名 四川石杉《安徽采药录》

功效 全草: 活血祛瘀, 消肿止痛, 清热解毒。用于跌打损伤, 瘀血肿痛。外用于无名肿毒, 水火烫伤。

#### 5002010

*Phlegmariurus carinatus* (Desv.) Ching --- *Palhinhaea carinatum* (Desv.) Fr. --- *Lycopodium carinatum* Desv.

植物名 龙骨马尾杉《蕨类名称》

药材名 大伸筋草《广西南宁》

文献名 龙骨石松《海南植志》, 龙骨灯笼草《药用抱植》

地方名 广东: 龙须草; 广西: 马尾千金草(天等), 大千金草(南宁), [鹿角草](龙州), 青蛇勒公(玉林)。

功效 全草: 祛风除湿, 消肿止痛。用于跌打损伤, 腰腿痛, 关节肿痛。

#### 5002011

*Phlegmariurus fargesii* (Herter) Ching --- *Lycopodium fargesii* Hert.

植物名 锐叶马尾杉《蕨类名称》

药材名 马尾伸筋草《汇编》

文献名 马尾石松《植分学报》, 金丝条马尾杉《广西药录》

地方名 广西: 马尾千金草(桂林), 马尾青青草, 飞龙, 千金草(金秀); 四川: 捆仙绳(雅安、峨眉、川东), 金丝条(凉山州), 大捆仙绳(峨眉山); 云南: 八股绳。

功效 全草: 祛风除湿, 舒筋活络。用于风湿关节痛, 肌肉挛急, 跌打扭伤, 肥大性脊椎炎, 类风湿性关节炎。

#### 5002012

*Phlegmariurus fordii* (Bak.) Ching

植物名 华南马尾杉《蕨类名称》

文献名 金钗草《植分学报》

地方名 广西: 石根子(金秀), 石子草(临桂), 石松柏(钟山)。

功效 全草: 清热解毒, 止咳, 止血, 生肌。用于气管炎, 哮喘, 尿路感染, 毒蛇咬伤, 外伤出血, 刀伤。

#### 5002013

*Phlegmariurus hamiltoni* (Spring.) Love et D. Love --- *Lycopodium hamiltonii* Spring.

植物名 全缘马尾杉《药用抱植》

药材名 青丝龙《湖南药物志》

文献名 哈氏石松《湖南药物志》, 哈氏马尾杉《蕨类名称》, 炳叶石松《药植简编》

地方名 湖南: 阴痧草, 阳痧草, 石松, 晒不死, 地松杉, 地青松杉, 杉松兰; 云南: 八股绳。

功效 全草: 清热破血, 消肿止痛。用于泄泻, 头痛, 高热, 咳嗽。外用于肿毒, 头虱。

#### 5002014

*Phlegmariurus phlegmarius* (L.) Holub --- *Lycopodium phlegmaria* L.

植物名 马尾杉《蕨类名称》

文献名 细穗石松《海南植志》, 台湾石松《台湾药植志》

地方名 广西: 牛尾草(上林), 六角草(那坡); 云南: 松灵芝, 树灵芝, 树胡须(红河), 龙胡子, 龙胡须, 旱灵芝, 岩石松(文山)。

功效 全草: 祛风止痛, 解毒消肿。外用于跌打劳伤, 风湿疼痛, 高热, 水肿, 毒蛇咬伤, 荨麻疹。

#### 5002015

*Phlegmariurus pulcherrimus* (Wall.) Love et D. Love

*Lycopodium pulcherrimum* Wall. ex Hook. et Grev.

植物名 美丽马尾杉《蕨类名称》

药材名 万年松《浙江天目药志》

文献名 美丽石松《植分学报》

地方名 浙江: [万年青]; 湖南: 松柏草(瑶族)。

功效 全草: 透疹解毒。用于麻疹不透。

#### 5002016

*Phlegmariurus sieboldii* (Miq.) Ching --- *Lycopodium sieboldii* Miq.

植物名 鳞叶马尾杉《蕨类名称》

药材名 马尾伸筋草《广西中药志》

文献名 绳索马尾杉《中药通报》, 马尾千金草《中药大辞典》

功效 全草: 舒筋, 活络, 祛风湿。用于跌打损伤, 肌肉痉挛, 筋骨疼痛。

#### 5002017

*Phlegmariurus squarrosus* (Forst.) Love et D. Love

植物名 粗糙马尾杉《蕨类名称》

地方名 广西: 马尾千金草(那坡)。

功效 全草: 用于坐骨神经痛, 风湿性腰痛。

### 5003 石松科 Lycopodiaceae

#### 5003001

*Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub --- *Lycopodium alpinum* L.

植物名 高山扁枝石松《蕨类名称》

文献名 高山石松《东北植药图志》

功效 全草: 活血, 镇痛, 强壮。用于关节痛, 跌打损伤, 小儿汗疹及皮肤湿疹; 孢子: 作石松子用。

#### 5003002

*Diphasiastrum anceps* (Wallr.) Ching

植物名 地刷子扁枝石松《蕨类名称》

药材名 地刷子《药用抱植》

地方名 辽宁: 伸筋草, 扁心草。

功效 全草: 祛风除湿, 止咳。用于风湿痛, 咳嗽。

#### 5003003

*Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub --- *Lycopodium complanatum* L.

植物名 扁枝石松《蕨类名称》

药材名 地刷子(东北)

文献名 过江龙、铺地虎、地蜈蚣、扫天晴明草、凤凰尾、凤凰草、舒筋草《滇南本草》, 长蔓石松《中国植物图

鉴》,地刷子石松《高植图鉴》,马尾舒筋《鉴别手册》

地方名 东北地刷子(东北);湖北:分金草(恩施),龙头伸筋草(利川);湖南:小伸筋(淑浦),大伸筋(新邵、新宁),仙人撒网,公鱼秧草,凤尾草(郴县),木金草(怀化),[筋骨草](资兴),[马尾松](蓝嘉);四川:黑乌骚、老蛇尾(成都),地柏芽(万县),[千金藤];贵州:伸筋草,扁心草,盘甲草;云南:猴子草(保山),猴子尾巴(丽江),乌龙不过江、过山龙(曲靖),扁叶石松(昆明)。

功效 全草:祛风活络。用于风湿关节痛。

#### 5003004

*Diphasiastrum veitchii* (Christ) Holub --- *Lycopodium veitchii* Christ

植物名 小扁枝石松《蕨类名称》

文献名 小石松《中国蕨类孢子形态》,筋子草《植分学报》,玉山石松《神农架药录》

地方名 湖北:刷子还阳(神农架);四川:伸筋草;云南:川滇石松。

功效 全草:消炎镇痛,祛风除湿,通经活络。用于关节痛,腰腿痛,刀伤,烫伤等。

#### 5003005

*Lycopodium casuarinoides* (Spring) Holub --- *Lycopodium casuarinoides* (Spring) Holub.

植物名 藤石松《蕨类名称》

药材名 舒筋草《四川中药志》

文献名 灯笼草《蕨类图说》,石子藤石松《高植图鉴》,石子藤《广州植志》,灯笼耳、藤子石松《植分学报》,狗尾舒筋《鉴别手册》

地方名 伸筋骨(西南),吊篮伸筋草(湖南、广西),[千金藤](四川、广西);浙江:猫藤(平阳);湖南:松筋藤,马尾伸筋,老虎须;广东:无病草(广州);广西:青筋藤,毛伸筋,灯笼勾,马尾松筋藤,[爬山虎],地松叶,吊篮伸筋(全州、贺县);四川:散龙(峨眉山)。

功效 全草:舒筋活血,祛风湿,止血。用于风湿关节痛,跌打损伤,月经不调,夜盲症。

#### 5003006

*Lycopodium annotinum* L.

植物名 单穗石松《蕨类名称》

药材名 分筋草《汇编》

文献名 蔓杉《植物学大辞典》,蔓杉石松、细齿石松《植分学报》,多穗石松《高植图鉴》,杉蔓石松《东检》,二年石松《药用孢植》

地方名 黑龙江:伸筋草,经年石松,松柏还阳;陕西:大伸筋草;湖北:铺地还阳、沙毛伸筋(神农架)。

功效 全草:祛风除湿,舒筋活血。用于跌打损伤,腰腿筋骨疼痛,风湿麻木。

#### 5003007

*Lycopodium annotinum* L. f. *brevifolia* Christ

植物名 短叶杉蔓石松《秦岭植志》

功效 全草:祛风湿,舒筋活血。用于跌打损伤,筋骨疼痛,风湿麻痹症。

#### 5003008

*Lycopodium japonicum* Thunb. --- *Lycopodium clavatum*

auct. non L.

植物名 石松《本草拾遗》、《蕨类名称》

药材名 伸筋草《分类草药性》、《药典》

文献名 过山龙、穿山藤《滇南本草》,宽筋藤《生草药性备要》,火炭葛《本草求原》,小伸筋《名实图考》,石松子、曲干草、大金鸡草《植分学报》

地方名 筋骨草(陕西、贵州),舒筋草(四川、贵州),凤尾伸筋(湖南、浙江、江西),金毛狮子草(江苏、江西、陕西、四川),狮子草(贵州、湖南、陕西),[蜈蚣草](四川、江西),竹圆蓼(四川、江苏),铺地蜈蚣(湖南、四川、广西),罗网藤(广东、广西),寸金草(湖北、四川);陕西:小伸筋草;江苏:吐丝草;浙江:蜈蚣藤(开化),大地毛公(东阳),缠身龙(武义),全身龙(丽水),盘龙草(衢县、永康),[穿山龙](云和),猫藤草(平阳),通伸草、山猫儿、老虎坐(泰顺),烂腰蛇(江山),飞蛇草(洞头),宽筋草(余姚),狮子尾,狮子毛(临安、丽水、云和),马尾生根,地套、地缘(景宁、文成);安徽:万岁藤;江西:青龙草,九龙草(庐山),龙角草,收猫草;福建:蟪斗草,猛独虎,五鸟翎,店猫草;湖北:伸筋还阳,树儿分筋,金腰带;湖南:绿毛伸筋,满绿通筋(新邵),茅松根(凤凰、通道),狮子花(蓝嘉),鱼子草(凤凰),斑鸠窠;广西:收鸡草,地松柏;四川:立筋草,铺筋草,抽筋草、分筋草、过筋草、地棚窝草(重庆),寸寸草,地梭罗,叉梭罗,地白牙,木石松,蜈蚣七,石蜈蚣,爬行蜈蚣,筋草,松筋草,阴阳蔓萝(武隆),“曲升得姆”(若尔盖藏名);云南:地刷子、猴子尾巴(红河),抓地龙(丽江),野人婆(昭通),爬山龙,毛巾草,隔山跳(曲靖)。

功效 全草:祛风除湿,舒筋活络。用于关节酸痛,屈伸不利;孢子:清热利水,通淋。用于尿道热通,砂淋,水肿,热病吐血等。

备考 过去国内文献常将本品学名误订为 *Lycopodium clavatum* L.

#### 5003009

*Lycopodium obscurum* L.

植物名 玉柏石松《蕨类名称》

药材名 玉柏《别录》、《汇编》

文献名 玉遂《别录》,千年柏、万年松《纲目》,树状石松《植分学报》

地方名 伸筋草(浙江、甘肃、湖北、四川);江西:凤尾伸筋;湖北:分筋草、树儿分筋、落地分筋(巴东),伸筋还阳、刷竹还阳、松柏还阳(神农架);四川:舒筋草,狗尾舒筋草,一柱香。

功效 全草:益气,止咳;孢子:作石松子用。

#### 5003010

*Palhinhaea cernua* (L.) Franco et Vasc. --- *Lycopodium cernua* L.

植物名 灯笼石松《广西药录》

药材名 铺地蜈蚣《福建民间草药》

文献名 凤尾草《滇南本草》,筋骨草、小伸筋、过山龙《名实图考》,水杉《植物学大辞典》,伸筋草《鉴别手册》,垂穗石松《高植图鉴》

地方名 石松(福建、广东),舒筋草(四川、贵州、云

南),绿毛伸筋(江西、湖南、陕西),凤尾伸筋(陕西、江西),狮子草(湖南、贵州、云南),灯笼草(广东、福建、浙江、四川);浙江:狮子毛;江西:伸筋藤(丰城),石蜈蚣(景德);福建:土木胶,猫子藤,猫儿陈(福安),土珊瑚,珊瑚草(泉州),店猫藤(安溪、南安),店猫草、鹰爪草(晋江),毛猫草(仙游),[鹿角草](惠安、莆田),龙角藤,龙机虎(三明),老虎须(宁化),虎须藤、葛柴骨藤(大田),石藤丝(永安);台湾:猫公刺,猫骨,毛毛,鹿绒草,鹿茸草,鹿茸毛,铁骨毛;湖南:醉鱼草、肺经草(常德),鱼子草,绿毛通筋草(衡山),合金草(龙山),路伸筋;广东:猫公草(英德、清远、南雄、始兴),猫毛青(翁源),柄猫子(曲江),柄狗(新丰),狗仔草(广州、佛冈),火焰药、藏鸡草(阳山),独脚流(连山);广西:石子藤,青筋草,青龙草,松筋草,蜈蚣草,山毛柏(南宁),马鹿角,敷地蜈蚣(桂林),猫儿草,猫尾草、塔草(北海),收汁草(陆川),地松柏;四川:立筋草,寸草、寸寸草(重庆),地蜈蚣(蓬溪);贵州:龙须草;云南:猴子背带、毛巾草、爬山龙(红河),青藤。

**功效** 全草:祛风湿,舒筋络,活血,止血。用于风湿拘疼麻木,肝炎,痢疾,风疹,赤目,吐血,衄血,便血,跌打损伤,烫、火伤。

#### 5003011

*Palhinhaea cernua* (L.) Franco et Vasc. var. *sikkimensis* (Muller) Ching

**植物名** 锡金灯笼草《孢子植物名词及名称》

**功效** 全草:祛风湿,舒筋络,活血,止血。

#### 5003012

*Palhinhaea hainanensis* Chun-yu Yang

**植物名** 海南灯笼石松《植物研究》

**功效** 全草:祛风湿,舒筋络,活血,止血。

#### 5003013

*Palhinhaea lufengensis* Chun-yu Yang

**植物名** 陆丰灯笼石松《中草药》

**功效** 全草:祛风湿,舒筋络,活血,止血。

### 5004 卷柏科 Selaginellaceae

#### 5004001

*Selaginella biformis* A. Br.

**植物名** 二形卷柏《蕨类名称》

**地方名** 贵州:地柏(从江)

**功效** 全草:清热解毒,降火消肿。用于烫火伤,无名肿毒,疔疮。

#### 5004002

*Selaginella braunii* Bak.

**植物名** 毛枝卷柏《汇编》

**文献名** 细毛卷柏《经植手册》,布朗卷柏《蕨类名称》,稀枝卷柏《神农架药录》

**地方名** 地柏枝(浙江、湖北、四川);浙江:岩柏草。

**功效** 全草:清热利湿,止血。

#### 5004003

*Selaginella caulescens* (Wall.) Spring

**植物名** 扇形卷柏《药用抱植》

**地方名** 台湾:[龙鳞草]。

**功效** 茎、叶:通经。

#### 5004004

*Selaginella davidii* Fr.

**植物名** 蔓出卷柏《蕨类名称》

**药材名** 爬地卷柏《汇编》

**文献名** 蔓生卷柏《秦岭植志》

**地方名** 云南:小过山龙,小过江龙(昆明)。

**功效** 全草:舒筋活络。用于风湿性关节炎,筋骨疼痛。

#### 5004005

*Selaginella delicatula* (Desv.) Alston

**植物名** 薄叶卷柏《蕨类名称》

**地方名** 湖北:地柏枝(巴东),岩卷柏、地柏碰(鹤峰),卷柏、卷柏草(神农架);海南:石上柏,石柏;广西:山柏枝(桂平);贵州:四叶柏,独立金鸡。

**功效** 全草:活血调经,清热解毒。用于妇女月经不調,跌打损伤。外用子烫火伤。

#### 5004006

*Selaginella diffusa* Alston

**植物名** 疏松卷柏《蕨类名称》

**功效** 全草:用于肝炎,痢疾,痢疖。

#### 5004007

*Selaginella doederleinii* Hieron

**植物名** 深绿卷柏《蕨类名称》

**药材名** 石上柏《汇编》

**文献名** 多德卷柏《浙南本草新编》,地侧柏《汇编》

**地方名** 浙江:岩扁柏(龙泉),过路蜈蚣(乐清);湖南:虾麻叶;广东:龙鳞草、龙鳞笔、金龙草(潮阳),企枝龙鳞(潮安);广西:山扁柏(昭平),水柏枝,山棍草,山梭草;四川:锅巴草,岩青,[石打穿](峨眉);贵州:梭罗草,地梭罗,大叶菜,大风尾草。

**功效** 全草:清热解毒,抗癌,止血。用于癌症,肺炎,急性扁桃体炎,眼结膜炎,乳腺炎。

#### 5004008

*Selaginella gebaueriana* Hand. -Mazz.

**植物名** 澜沧卷柏《贵州药录》

**功效** 全草:祛风散寒,除湿消肿。用于风湿痹痛,风寒咳嗽,烫火伤。

#### 5004009

*Selaginella heterostachys* Bak

**植物名** 异穗卷柏《蕨类名称》

**功效** 全草:清热解毒,凉血。用于蛇咬伤,外伤出血。

#### 5004010

*Selaginella involvens* (Sw.) Spring

**植物名** 宛州卷柏《蕨类名称》

**药材名** 宛州卷柏《图经》、《中药大辞典》

**文献名** [卷柏]《台湾药植志》

**地方名** 金花草(江西、福建),地侧柏(湖南、广西),石卷柏(福建、广西);江西:千年柏,孔雀尾;福建:[金不换],金扁柏,金扁桃,金丝凤尾草,凤凰草(明溪),凤

凰尾、红凤尾草、鸡胶裂、墙边柏、饼花草、花眉胶(闽东),红根子草(宁化),石莽草,田鸡爪,雉鸡尾,小号过流(大田);台湾:万年松,还魂草;河南:金扁担(新乡);湖北:树柏还阳(神农架);湖南:柏叶草,细叶金鸡尾,虎牙骨,虎毛草,松柏草,肺经草,肺痈草、鸡鸡尾(衡阳);广西:花肺金,茯苓蕨,飞扬蕨,烂皮蛇,扇卷柏;四川:地柏枝,地柏丫(蓬溪)。

功效 全草:凉血,止血,化痰,定喘,利水,消肿。用于吐血,衄血,脱肛下血,痰嗽,哮喘,黄疸,水肿,淋病,带下,烫伤。

#### 5004011

*Selaginella kraussiana* A. Br.

植物名 地柏《蕨类名称》

药材名 地柏《汇编》

文献名 [石打穿]《汇编》

地方名 广东:软枝龙鳞草、小号龙鳞草(潮阳);四川:翠羽草(南川);贵州:蜂药(黎平),翠云草(贵阳),石膏苔。

功效 全草:解毒,消肿,镇咳,祛痰。用于肺热咳嗽,火烫伤,痔疮,无名肿毒,蜂刺伤。

#### 5004012

*Selaginella labordei* Hieron.

植物名 细叶卷柏《蕨类名称》

药材名 细叶卷柏《汇编》

文献名 心基卷柏《药用抱植》

地方名 湖北:鸡爪还阳(神农架);四川:鸡脚草(峨边);贵州:毛利利;云南:柏地丁、地柏枝(玉溪)。

功效 全草:清热利湿,消炎退热,止血,止喘。用于伤风鼻塞,肝炎,胆囊炎,小儿高热惊厥,哮喘,浮肿,小儿疳积,口腔炎,鼻衄,月经过多,外伤出血,毒蛇咬伤,烧,烫伤。

#### 5004013

*Selaginella moellendorffii* Hieron.

植物名 江南卷柏《蕨类名称》

药材名 地柏枝《草木便方》、《汇编》

文献名 地柏《图经》,黄道卷柏《中草药学》

地方名 岩柏(浙江、四川),岩柏枝(陕西、贵州),孔雀毛、土黄连(安徽、江西);陕西:岩花(平利),千步还阳;浙江:岩柏草、石柏(天目山),墙柏(温州),红鸡草(平阳),饼草(泰顺);安徽:伤寒草,金花草(太和);江西:石金花,花叶野鸡草(吉水),黄叶狼鸡草(上饶);福建:[金不换],[金扁柏];台湾:龙鳞草(台北);广西:油面风(博白),铺地金牛,百叶草,百叶卷柏,烂皮蛇,寒枯草;四川:曲兰草,软鸡草,拨云草,通气草(峨眉)。

功效 全草:清热利湿,止血。用于急性黄疸型肝炎,全身浮肿,肺结核咯血,吐血,痔疮出血。外用于外伤出血,烧烫伤。

#### 5004014

*Selaginella monospora* Spring

植物名 单孢卷柏《蕨类名称》

文献名 单子卷柏《海南植志》

功效 全草:清热解毒。用于蛇咬伤。

#### 5004015

*Selaginella nipponica* Fr. et Sav.

植物名 伏地卷柏《蕨类名称》

药材名 小地柏《汇编》

文献名 宽叶卷柏《药用抱植》,日本卷柏《浙江药植志》

功效 全草:清热解毒,止血。用于吐血,痔疮出血,淋病,烫、火伤,外伤出血。

#### 5004016

*Selaginella omeiensis* Ching

植物名 峨眉卷柏《贵州药录》

功效 全草:凉血止血。用于各种出血症。

#### 5004017

*Selaginella picta* A. Br.

植物名 黑顶卷柏《蕨类名称》

功效 全草:凉血解毒。用于麻疹,咳血,吐血,胸痛,外伤出血。

#### 5004018

*Selaginella plana* Hieron.

植物名 长菱叶卷柏《台湾药植志》

功效 全草:用于头痛。

#### 5004019

*Selaginella pulvinata* (Hook. et Grev.) Maxim. --- *S. tamariscina* (Beauv.) Spring var. *pulvinata* (Hook. et Grev.) Alston

植物名 垫状卷柏《蕨类名称》

药材名 卷柏《本经》、《药典》

文献名 石莲花、回阳草、不死草、石莲牛、侧柏叶、鸣鹿卿《滇南本草》,老虎爪、长生草、万年松《汇编》,〔万年青〕《鉴别手册》,卷柏炭《药典》

地方名 [石花](四川、云南),还魂草(广西、云南);湖北:九死还阳(神农架);广西:九道生、晒不死(百色);四川:佛手草、高足还魂草、打不死、卷柏还魂草(重庆);云南:九死还魂草,岩花,长生不死草,神仙一把抓,一把抓,寸金草,野蒲草,石莲参。

功效 全草:活血通经。用于经闭痛经,瘀瘕痞块,跌扑损伤;卷柏炭:化瘀止血。用于吐血,崩漏,便血,脱肛。

#### 5004020

*Selaginella remotifolia* Spring

植物名 疏叶卷柏《蕨类名称》

地方名 贵州:水梭罗,家昌金。

功效 全草:凉血止血。用于各种出血症。

#### 5004021

*Selaginella rolandi-principis* Alston

植物名 海南卷柏《蕨类名称》

地方名 海南:鸡毛草,广西:滑石风(博白)。

功效 全草:清肝明目,凉血止血。用于肝炎,口糜。

#### 5004022

*Selaginella sanguinolenta* (L.) Spring --- *Lycopodium sanguinolentum* L.

植物名 圆枝卷柏(蕨类名称)  
 药材名 圆枝卷柏(贵州药录)  
 文献名 红枝卷柏(高植图鉴)  
 功效 全草:凉血止血。用于各种出血症。

## 5004023

*Selaginella sinensis* (Desv.) Spring

植物名 中华卷柏(蕨类名称)  
 药材名 地柏(北京本草)  
 地方名 河南:地柏枝。

功效 全草:清热利湿,止血消炎。用于下肢湿疹,急性黄疸型肝炎,胆囊炎,痢疾,外伤出血。

## 5004024

*Selaginella stauntoniana* Spring

植物名 旱生卷柏(蕨类名称)

功效 全草:活血散瘀,凉血止血。用于便血,尿血,子宫出血,跌打损伤,瘀血作痛等。

## 5004025

*Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring

植物名 卷柏(高植图鉴)  
 药材名 卷柏(本经)、(药典)

文献名 万岁(本经),豹足、求股、神投时(吴普本草),交时(别录),长生不死草(纲目),万年松(本草原始),长生草(花镜),石花(盛京通志),还魂草(分类草药性)

地方名 回生草(湖北、广西),还阳草(吉林、北京、山西、陕西、湖北、山东、江苏),九死还魂草(浙江、江苏、广东),[万年青](辽宁、山东),铁拳头(江苏、浙江、福建),老虎爪(河北、北京、山东),[佛手](内蒙古、辽宁),佛手草、佛手柏(吉林、辽宁),岩松(浙江、福建),拳头草(福建、湖南),打不死(广西、四川);吉林:“敖出色仁德毛”(蒙名),“巴肾”(朝名);北京:猫猫爪、猫猫爪(百花山);山西:阴阳草(中条山);陕西:水湿还阳草(白河);山东:拳手松(蒙山);江苏:岩头松;浙江:见水还阳草,不死草(平阳);福建:大还魂草(泉州),还魂丹,含生草,地石草(罗汉松);湖北:鸡爪还阳草、生卷柏(鹤峰);湖南:回阳草(黔阳、古丈、凤凰),石打不死(黔阳、新邵、溆浦、新宁),回春草(黔阳、溆浦),救命王、石兄弟、返阳草(长沙),见水活(古丈);广东:[瓦松],返魂草(潮阳);广西:山拳柏(南宁),一把抓(桂林);四川:高足还魂草,卷柏还魂草,伸筋草;贵州:抓地还魂草;其他:汤汤青,见水还阳。

功效 全草:活血通经,用于经闭痛经,瘀痞块,跌扑损伤;卷柏炭:化瘀止血。用于吐血,崩漏,便血,脱肛。

## 5004026

*Selaginella trachyphylla* A. Br.

植物名 粗叶卷柏(蕨类名称)

地方名 肺筋草(广东、广西);广西:落地鹰爪,石上柏(钟山)。

功效 全草:清热止咳,收敛止血。用于肺结核,便血,烫火伤。

## 5004027

*Selaginella uninata* (Desv.) Spring

植物名 翠云草(蕨类名称)

药材名 翠云草(群芳谱)、(汇编)

文献名 金鸡独立(王安卿采药志),翠翎草、矮脚凤毛(汪连仕采药书),孔雀花(粤志),神锦花、鹤翎草、凤尾草、开屏凤毛、翠羽草(纲目拾遗),龙须、剑柏(名实图考),蓝地柏(植物学大辞典)

地方名 绿绒草(广东、浙江),地柏叶、岩萍(湖南、广东);浙江:百脚草(宁波);安徽:罗蛛网,丝绒草;福建:回生草,还魂草,金鸡凤尾草、水鸡爪(闽南),龙麟草,龙爪草,白鸡爪,孔雀尾、果馅草;湖南:伸脚草(古丈);广东:山西草(英德),小还魂草(曲江),梅岭疳药(南雄);广西:绸缎草,百叶草,细风藤(南丹),金猫草(柳江);贵州:牛扯拢,虱子草,蜂药。

功效 全草:清热利湿,止血,止咳。用于急性黄疸型肝炎,胆囊炎,肠炎,痢疾,肾炎水肿,泌尿系感染,风湿关节痛,肺结核咳血。外用于疖肿,烧烫伤,外伤出血,跌打损伤。

## 5006 木贼科 Equisetaceae

## 5006001

*Equisetum arvense* L.

植物名 问荆(蕨类名称)

药材名 问荆(本草拾遗)、(汇编)

文献名 接续草(本草拾遗),公母草、接接草、空心草(中医药实验研究),笔管草、笔头菜(经植手册),土笔(食用植物图说),杉菜(中国土农药志)

地方名 节节草(内蒙古、陕西、安徽、江西、四川),节骨草、马蜂草、猪鬃草(东北),接骨草(陕西、山东、安徽),土麻黄(四川、河北);吉林:“雪地歌伊”、“邵口得歌伊”(朝名);辽宁:马鞭草(宽甸);河北:长姑草;内蒙古:疙节草,“傲尼苏乌布斯”(蒙名);陕西:大接骨草;山东:驴毛蒿(烟台);安徽:节子草;湖北:马尾草、麻黄(鹤峰),马尾松草(神农架);湖南:木贼草,寸姑草,笔头草;四川:黄蚂草,锁眉草(峨眉山),马草(蓬溪),马须,黑马草,笔筒草,土木贼,眉毛草。

功效 全草、根:利尿,止血。

## 5006002

*Equisetum arvense* L. var. *boreale* Milde

植物名 北问荆(东北药植志)

功效 全草:利尿,止血。

## 5006003

*Equisetum arvense* L. f. *campestre* (C. F. Schultz) Klinge --- *E. campestre* C. F. Schultz --- *E. arvense* L. var. *campestre* (C. F. Schultz) Milde

植物名 茎穗问荆(东北药用植物)

药材名 问荆(东北)

功效 全草:利尿,止血,清热疏风,止咳祛痰。用于小便不利,淋病,咯血,肠出血,鼻衄,月经过多,慢性气管炎,咳嗽气喘,腰痛。外用于跌伤骨折,浮肿。

## 5006004

*Equisetum debile* Roxb. --- *Hippochaete debile* (Roxb.)

Milde

植物名 笔管草《蕨类名称》

药材名 笔管草《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 木贼、节节草、斗眼草、豆根草《滇南本草》，纤弱木贼《汇编》

地方名 笔头草、笔筒草(广西、云南)，笔塔草(广西、广东)，木贼草(台湾、湖北、广东、广西)，接骨草(台湾、湖北)；台湾：接骨筒，台湾接骨草；湖北：笔筒子草、扫云丹(巴东)，脱节草(鹤峰)；湖南：土木贼草；广西：接骨蕨，马人参，塔笔，博节草；广东：土木贼(从化、新会、台山)，驳节草(河源、始兴、兴宁、五华)，笔塔盐(茂名、高州、化州、阳江、阳春)，驳骨草(增城)，驳眼草，驳节花、虾公脚、马节草(五华)，作作草(潮阳)，塔尾草；云南：锁眼草，铤草，“牙棒吞”(西双版纳傣语)。

功效 全草：用于感冒。

**5006005***Equisetum diffusum* D. Don

植物名 密枝问荆《药用抱植》

药材名 小笔管草(云南)

文献名 密枝木贼《药植简编》，散生木贼《蕨类名称》，散生问荆《广西药录》

地方名 广西：小笔筒草(乐业)，小木贼(那坡)；四川：马尾草、擦草(峨眉)；云南：“哈岔查让”(元江哈尼族语)。

功效 全草：利尿通淋，舒筋活络。用于尿路结石，风湿骨痛，跌打损伤。

**5006006***Equisetum elongatum* Wilia --- *Hippochaete elongatum* (Wilia) Milde

植物名 接骨草《药用抱植》

地方名 福建：节节草，节节菜。

功效 全草：散瘀，止痛，利尿。用于尿路感染，腰痛，骨折等。

**5006007***Equisetum hiemale* L. --- *Hippochaete hiemale* (L.) Borher.

植物名 木贼《蕨类名称》

药材名 木贼《嘉祐本草》、《药典》

文献名 木贼草《本草经疏》，铤草《盛京通志》，节节草《名实图考》

地方名 笔头草(东北、河北)，节骨草(东北)，接骨草(福建、湖南)，擦草(山西、四川)，笔管草(甘肃、浙江)；吉林：“邵口塞了”(朝名)；山西：无心草；内蒙古：“玛玛各克扎”(蒙名)；甘肃：发见草(岷县)，管草；青海：铤木草，刷碱草；福建：接骨筒(泉州)；湖南：响草，笔筒草，笔竿草；湖北：蛇草、蛰草(神农架)；其他：秃头草。

功效 地上部分：散风热，退目翳。用于风热目赤，迎风流泪，目生云翳。

**5006008** 见 5006009a**5006009***Equisetum hiemale* L. var. *affine* (Engelm.) A. A.

Eaton --- *E. robustum* A. Braun var. *affine* Engelm. --- *E. komarovi* Iljin --- *E. hiemale* L. var. *komarovi* (Iljin) Wang-Wei

植物名 亚木贼《东北草本志》

药材名 亚木贼《东北药用植物》

功效 全草：疏风散热，解肌，退翳。用于目赤肿痛，角膜云翳，迎风流泪，肠风下血，血痢，脱肛，疟疾，喉痛，痈肿，月经不断，胎动不安。

**5006009a***Equisetum hiemale* L. var. *ramigerum* A. Br.

植物名 分枝木贼《东北药植志》

功效 全草：收敛止血。用于肠出血，痔出血，利尿，发汗，眼病。

**5006010***Equisetum japonicum* Milde --- *Hippochaete japonicum* Milde

植物名 笔壳草《药用抱植》

地方名 四川：木贼，擦草。

功效 全草：散风退翳。用于目生云翳，迎风流泪。外用于脱肛。

**5006011***Equisetum palustre* L.

植物名 犬问荆《蕨类名称》

文献名 节节菜《药植图鉴》，接骨筒《实用中草药》，沼泽木贼《中药大辞典》，沼泽问荆《药用抱植》

地方名 问荆(新疆、四川)，节节草(福建、四川)；福建：洗碗草(宁德、闽东)，接骨草；四川：笔管草(峨眉)，土木箭，黑马草(成都)；贵州：骨节草，笔杆草，笔筒草。

功效 全草：疏风，明目，活血，舒筋。用于迎风流泪，翳膜遮睛，跌打损伤，肠风，血痔。

**5006012***Equisetum pratense* Ehrh.

植物名 草问荆《蕨类名称》

地方名 四川：问荆。

功效 全草：疏风清热，明目退翳，利尿，止血。用于目赤肿痛，眼生翳膜，热淋，小便不利，鼻衄，月经过多，崩漏。

**5006013***Equisetum ramosissimum* Desf. --- *Hippochaete ramosissimum* (Desf.) Milde

植物名 节节草《蕨类名称》

药材名 节节草《汇编》

文献名 笔筒草、通气草《草木便方》，眉毛草、土木贼《分类草药性》，分枝木贼《济南植物名录》，草麻黄《高植图鉴》，木贼《植分学报》

地方名 笔管草(安徽、四川、云南)，木贼草(浙江、台湾、湖北、湖南)，铤草(浙江、安徽)，节骨草(安徽、湖南)；山东：麻蒿(诸城、五莲)；安徽：木砂草；浙江：铤刀草(嘉兴、温州)，土麻黄，野麻黄，虾蟆竹，接管草(淳安)，擦草(丽水)，磨石草(仙居)；福建：节节菜，接骨草；台湾：接骨筒；河南：节疤草；湖北：扫云丹；四川：锁眉草；云南：斗眼草。

功 效 全草:清热利尿,明目退翳,祛痰止咳。用于目赤肿痛,角膜云翳,肝炎,咳嗽,支气管炎,泌尿系感染。

## 5006014

*Equisetum ramosissimum* Desf. var. *japonicum* Milde - -  
*E. ramosissimum* Desf. var. *glaucum* Nakai

植物名 日本节节草(拟)

药材名 节节草《东北药用植物》

文献名 笔筒草、通气草《草木便方》,土木贼、眉毛草《分类草药性》

地方名 节骨草(东北、福建、湖南)。

功 效 全草:祛风清热,除湿利尿,明目退翳,祛痰止咳。用于目赤肿痛,角膜云翳,肝炎,咳嗽,支气管炎,泌尿系感染,鼻衄,牙痛。

## 5007 七指蕨科 Helminthostachyaceae

## 5007001

*Helminthostachys zeylanica* (L.) Hook.

植物名 七指蕨《蕨类名称》

药材名 入地蜈蚣《广西药植图志》

地方名 蜈蚣草(台湾、广西),〔七叶一枝花〕(海南、广西);台湾:倒地蜈蚣,倒麒麟,地蜈蚣,过路蜈蚣,过路鹅江;广西:水蜈蚣(隆安),假七叶一枝花;其他:水上一枝花。

功 效 根茎:除热,祛瘀,止痛。用于瘡热咳嗽,痢疾,跌打内伤,瘀血疼痛。

## 5008 阴地蕨科 Botrychiaceae

## 5008001

*Botrychium lunaria* (L.) Sw.

植物名 小阴地蕨《蕨类名称》

药材名 小阴地蕨《蕨类名称》

文献名 扇羽阴地蕨《蕨类图说》,扇叶阴地蕨《东北草本植物志》,扇羽小阴地蕨《药用抱植》,蕨蕻《台湾药植志》

地方名 四川:高山独脚蒿(峨眉山)。

功 效 全草:清热解毒,止咳平喘。用于毒蛇咬伤,乳腺炎,咳嗽等。

## 5008002

*Botrypus lanuginosus* (Wall.) Holub --- *Botrychium lanuginosum* (Wall.) Holub

植物名 绒毛蕨蕻《蕨类名称》

药材名 独蕨蕻《思茅中草》

文献名 〔还阳参〕《中国植志》,绒毛阴地蕨《中药大辞典》,绒毛假阴地蕨《广西药录》

地方名 云南:独蕨蕨、细蕨蕨、肺心草、珊瑚根、蕨叶一枝蒿(红河),一朵云,蕨苗一枝蒿,蕨蕨草,蕨蕨蒿,金扇子,山斛,节节一枝蒿、长绒毛阴地蕨(昆明);其他:蕨蕻参。

功 效 全草或根茎:清热解毒,止咳平喘。用于毒蛇咬伤,乳腺炎,咽喉炎,咳嗽,肺结核,淋巴结肿,产后体虚,肝肾虚弱,疮毒,百日咳等。

## 5008003

*Botrypus strictum* (Underw.) Holub --- *Botrychium strictum* Underw

植物名 幼直蕨蕻《蕨类名称》

文献名 幼直阴地蕨《东北草本植物志》,幼直小阴地蕨《药用抱植》

地方名 陕西:抓地虎;湖北:一支蕨(神农架)。

功 效 全草:清热解毒。用于毒蛇咬伤。

## 5008004

*Botrypus virginianum* (L.) Holub --- *Botrychium virginianum* (L.) Sw.

植物名 蕨蕻《蕨类名称》

药材名 蕨蕻《汇编》

文献名 蕨蕻《名实图考》,假阴地蕨《药用抱植》

地方名 陕西:一朵云,春不见;湖北:一支箭、一支蕨(巴东),蕨乌七(鹤峰),蛇不见,独脚鸡;四川:散云丹(万县),大独脚蒿(峨眉山);其他:蕨蕻细辛,冷水七。

功 效 全草:清热解毒,消肿散结。用于肺脓疡,眼结膜炎,跌打损伤,蛇咬伤,颈淋巴结核。

## 5008005

*Botrypus yunnanensis* (Ching) Ching --- *Botrychium yunnanensis* Ching

植物名 云南蕨蕻《蕨类名称》

文献名 云南阴地蕨《中国植志》,云南小阴地蕨《药用抱植》

地方名 广西:蕨叶一枝蒿。

功 效 全草:清热解毒,止咳平喘。用于毒蛇与狂犬咬伤,乳腺炎,咽喉炎,肺结核,咳嗽等。

## 5008006

*Scepteridium daucifolium* (Wall.) Lyon --- *Botrychium daucifolium* Wall.

植物名 薄叶阴地蕨《蕨类名称》

文献名 西南小阴地蕨《药用抱植》

地方名 贵州:一朵云。

功 效 全草:清热解毒,补虚润肺,止咳化痰。用于肺热咳嗽,毒蛇咬伤,腮腺炎,乳腺炎等。

## 5008007

*Scepteridium japonicum* (Prantl) Lyon --- *Botrychium japonicum* Underw.

植物名 华东阴地蕨《蕨类名称》

文献名 日本阴地蕨《蕨类图说》,大花蕨《台湾药植志》,日本小阴地蕨《药用抱植》

功 效 全草及根茎:清热解毒,平肝明目。用于吐血,肿毒,瘰癧等。

## 5008008

*Scepteridium officinale* (Ching) Ching --- *Botrychium officinale* Ching

植物名 药用阴地蕨《蕨类名称》

药材名 一朵云《湖北中草》

文献名 药用小阴地蕨《药用抱植》

地方名 四川:蕨蕻细辛(金佛山)。

功 效 全草:清热,消肿,止咳。用于疮毒,淋巴结



肺,肺热咳嗽。

#### 5008009

*Scepteridium ternatum* (Thunb.) Lyon. - *Botrychium ternatum* (Thunb.) Sw. - *Botrypus ternatum* (Thunb.) Holub

植物名 阴地蕨《蕨类名称》

药材名 阴地蕨《图经》、《汇编》

文献名 一朵云《天宝本草》,花蕨《植物学大辞典》,假阴地蕨《广西药录》

地方名 小春花(浙江、福建、安徽、四川),蛇不见(浙江、安徽、福建),独脚金鸡(浙江、安徽),独脚鸡(贵州、湖南);陕西:春不见(紫阳),独秧七(西乡),春寒草;浙江:丹桂移星草,独脚狼衣(永嘉);福建:吊竹良枝、良枝草(福安、宁德),鹅红雀舌、细毛竹、平风草(福州);湖北:一支箭(恩施),一支蕨(巴东);湖南:破天云,散血叶(凤凰、古丈);广西:鸡爪连(富川),黄连七(资源);四川:背蛇生,冬草,蕨其细辛,决鸡细辛,鹅儿不吃草,独脚蒿;贵州:独立金鸡,郎其细辛,狼其细辛,小种底线补(花溪),地梭罗(独山);云南:蕨苗一枝蒿(保山),蕨叶一枝蒿,蕨苗一颗蒿,蕨叶一颗蒿,石软蕨菜,肺心草,箭柏,独蕨叶,独蕨茎、七叶一枝蒿(文山)。

功效 全草:清热解毒。用于痈肿疮毒,淋巴结核,角膜云翳,小儿高热惊风。

### 5009 瓶尔小草科 *Ophioglossaceae*

#### 5009001

*Ophioglossum adnascens* Ching

植物名 贴生一枝箭《药植简编》

文献名 贴生瓶尔小草《药植简编》

功效 全草:用于蛇咬伤。

#### 5009002

*Ophioglossum parvifolium* Grev. et Hook.

植物名 小叶瓶尔小草《蕨类名称》

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。

#### 5009003

*Ophioglossum pedunculatum* Desv.

植物名 尖头瓶尔小草《蕨类名称》

药材名 一枝箭《草木便方》、《中药大辞典》

文献名 青藤《分类草药性》,瓶尔小草、有梗瓶尔小草《汇编》

地方名 蛇咬子(四川、湖北),蛇须草(四川、云南);福建:蛇尾草;湖北:一支箭(神农架);四川:独叶一支箭,一矛一盾,一枝枪,小青藤,小一支箭,壮阳固;云南:独叶一枝蒿,矛盾草;其他:单枪一支箭。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于小儿肺炎,脘腹胀痛,毒蛇咬伤,疔疮肿毒。外用于急性结膜炎,角膜云翳,眼睑缘炎。

#### 5009004

*Ophioglossum petiolatum* Hook.

植物名 钝头瓶尔小草《蕨类名称》

地方名 陕西:一支箭,一根箭,单匹枪,瓶尔小草。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。

#### 5009005

*Ophioglossum reticulatum* L.

植物名 心脏叶瓶尔小草《蕨类名称》

文献名 心叶瓶尔小草、心叶一枝箭《药植简编》

地方名 一支箭(湖北、广西、四川)。

功效 全草:有小毒。清热解毒,消肿止痛。用于毒蛇咬伤,疮肿,乳痈,无名肿毒。

#### 5009006

*Ophioglossum thermale* Kom. - *O. angustum* Maxim.

植物名 狭叶瓶尔小草《蕨类名称》

药材名 一枝箭《草木便方》、《中药大辞典》

地方名 陕西:一支箭。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于蛇咬伤,肿毒,乳痈,跌打损伤。

#### 5009007

*Ophioglossum vulgatum* L.

植物名 瓶尔小草《蕨类名称》

药材名 瓶尔小草《名实图考》、《汇编》

文献名 独叶一枝枪《百草镜》,瓶尔草、瓶儿草、平儿草《名实图考》,一支箭《中国植志》

地方名 一枝枪(广西、云南),矛盾草(广西、贵州、四川);安徽:兔耳一枝箭,小尔草;湖南:八月一支箭(常德);广西:拨云草,一矛一盾,一枝箭(灵山、南宁、凤山、融安);四川:蛇咬子,小青藤,壮阳固;贵州:单枪一枝箭,蛇舌草,蛇吐须,蛇咬一支箭,吞弓含箭,独脚黄,杀人大将,穆桂英;云南:细独叶、蛇退草、蛇叶草、独叶草、独叶一支箭(红河),蛇头草(文山),蛇药一枝箭,独叶一枝蒿(昆明)。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于小儿肺炎,脘腹胀痛,淋症,风湿骨痛,毒蛇咬伤,疔疮肿毒。

### 5011 莲座蕨科 *Angiopteridaceae*

#### 5011001

*Angiopteris evecta* Hoffm

植物名 六角蕨《药用抱植》

地方名 福建:牛蹄迹,大风尾,度饥草,观音座莲。

功效 根茎:和中益胃,消炎止泻。用于肠炎,鹤膝风等。

#### 5011002

*Angiopteris fokiensis* Hieron. - *A. tenera* Ching - *A. shanyuanensis* Ching

植物名 福建观音座莲《蕨类名称》

药材名 马蹄蕨《汇编》

文献名 观音座莲《名实图考》,三元观音座莲、小果观音座莲《中国植志》,福建莲座蕨《中国经植志》

地方名 马蹄风(湖南、广西);浙江:山羊蹄(温州、平阳);江西:花花盘,石猪肝;福建:山猪肝;湖南:马蹄树,观音莲(土家族),地莲花;广东:牛蹄旁(乐昌);广西:马蹄香,马蹄附子,座莲蕨;贵州:土瓜。

功效 根茎:祛风,清热,解毒。用于风热咳嗽,疟腿,痈肿疮毒,蛇咬伤,功能性子宫出血。

#### 5011003

*Angiopteris hokouensis* Ching

植物名 河口观音座莲(蕨类名称)

文献名 河口莲座蕨(药用抱植)

功效 根茎:清热消肿,止咳散结。用于腮腺炎,痢疾,瘰疬,蛇咬伤,骨折。

## 5011004

*Angiopteris kwangsiensis* Ching

植物名 广西观音座莲(蕨类名称)

文献名 广西莲座蕨(药用抱植)

功效 根茎:清热止咳,散结,消肿。用于肺热咳嗽,腮腺炎,瘰疬,骨折,蛇咬伤。

## 5011005

*Angiopteris magna* Ching

植物名 大观音座莲(中国植志)

药材名 大马蹄蕨(汇编)

文献名 大莲座蕨(汇编)

地方名 云南:马蹄根,马蹄蕨,“故季马”(傣名),观音座莲。

功效 带叶柄的根茎:清热利湿,止血止痛。用于肠炎,痢疾,胃、十二指肠溃疡,肾炎水肿,肺结核咳血,崩漏,跌打肿痛。

## 5011006

*Angiopteris muralis* Ching

植物名 刺柄观音座莲(蕨类名称)

文献名 刺柄莲座蕨(药用抱植)

功效 根茎:清热散结,止咳消肿。用于蛇咬伤,骨折,瘰疬,肠炎,痢疾,腮腺炎。

## 5011007

*Angiopteris officinalis* Ching

植物名 定心散观音座莲(蕨类名称)

药材名 定心散(中药大辞典)

文献名 定心散莲座蕨(浙江药植志)

功效 带叶柄基部的根茎:安心神,通经络。用于神经衰弱,精神分裂症,热病抽搐,关节风痛,冠心病。

## 5011008

*Angiopteris omeiensis* Ching

植物名 峨眉观音座莲(蕨类名称)

文献名 峨眉莲座蕨(中药大辞典),峨眉半边莲(四川中草)

地方名 四川:观音莲、半边莲(峨眉山)。

功效 根茎:除风湿,利小便。用于风湿骨痛,肺病热咳,腮腺炎,小便不利,血痢,痈肿热毒。

## 5011009

*Angiopteris petiolulata* Ching

植物名 有柄观音座莲(蕨类名称)

文献名 有柄莲座蕨(药植简编)

地方名 四川:黑蕨(峨眉山)。

功效 根茎:通经利血;叶:用于目疾。

## 5011010

*Angiopteris robusta* Ching

植物名 强壮观音座莲(蕨类名称)

文献名 强壮莲座蕨(药用抱植)

功效 根茎:清热止咳,消肿散结。用于腮腺炎,肾炎,瘰疬,蛇咬伤,骨折,痈疖。

## 5011011

*Angiopteris sinica* Ching

植物名 中华观音座莲(蕨类名称)

文献名 中华莲座蕨(四川中药志)

地方名 四川:观音莲。

功效 根茎:清肺止咳,利水消肿,解毒。用于肺热咳嗽,小便不利,下肢浮肿,疮痈肿毒,虫蛇咬伤,外伤出血。

## 5011012

*Angiopteris yentangensis* G. H. Shing et C. Ling

植物名 雁荡莲座蕨(浙南本草新编)

地方名 浙江:定心散(乐清)。

功效 根茎:安神宁心,祛风解毒。用于神经衰弱,精神分裂症,冠心病,热病抽搐,关节风痛,涌泉疽,足发背,百日咳,便血等。

## 5011013

*Angiopteris yunnanensis* Hieron.

植物名 云南观音座莲(蕨类名称)

药材名 云南莲座蕨(药用抱植)

功效 根茎:清热消肿,止咳止血。用于腮腺炎,肺结核咳嗽咯血,痈疖,蛇咬伤,骨折。

## 5011014

*Archangiopteris henryi* Christ et Gies.

植物名 亨利原始观音座莲(蕨类名称)

药材名 鸡脚莲(湖南药物志)

文献名 原始莲座蕨(高植图鉴)

地方名 湖南:大风尾草,水贯众,竹节黄,小散血,南山鸡,马蹄蕨。

功效 全草:清热利尿,止泻。用于痢疾,多尿,心烦火盛。

## 5013 紫萁蕨科 Osmundaceae

## 5013001

*Osmunda cinnamomea* L.

植物名 桂皮紫萁(药植简编)

药材名 桂皮紫萁贯众(拟)

地方名 江西:贯众。

功效 根茎:有小毒。清热解毒,止血。用于腮腺炎,感冒,鼻出血。

## 5013002

*Osmunda cinnamomea* L. var. *asiatica* Fernald

植物名 分株紫萁(高植图鉴)

药材名 桂皮紫萁贯众(拟)

文献名 桂皮紫萁(鉴别手册)

地方名 吉林:贯众;辽宁:牛毛贯众,牛毛广东。

功效 根茎:清热解毒,止血,利尿。用于流感,气管炎,痢疾,功能性子宫出血,小便不利。

## 5013003

*Osmunda cinnamomea* L. var. *fokiense* Cop.

植物名 南方紫萁(高植图鉴)

药材名 福建紫萁贯众(拟)  
地方名 福建:贯众。  
功效 根茎:清热解毒,止血。

## 5013004

*Osmunda japonica* Thunb.

植物名 紫萁《蕨类名称》

药材名 紫萁贯众《中药志》

文献名 紫萁蕨《贵州药录》

地方名 贯众(江苏、浙江、河南、湖北、四川),大贯众(江苏、山东),蕨萁(安徽、浙江),薇(江苏、广西);山东:野鸡翎(烟台);安徽:水蕨芝,老母猪呼;浙江:老虎牙(临安),水骨菜(淳安),狼萁(建德),铁叶狼萁(余姚),浪荡光(丽水),大叶狼衣(金华地区),黄狼(黄岩);福建:鸡母子,千年烂;湖北:野人头,见血长,南京药(鹤峰),老虎台,老虎台衣(幼叶上之绵毛)(巴东),猫儿蕨(利川);湖南:毛老鼠,白线鸡尾,毛狗子,一把抓,檀树贯众;广西:猫瓜(龙胜),金贝草;四川:攀倒甍(南川),薇贯众,管仲,高脚贯众(南充),广冻苔(峨眉山);贵州:猫蕨,飞蛾七(绥阳),月亮草、波丝克蕨(贵阳);云南:黑龙背。

功效 根茎及叶柄基部:清热解毒,止血。用于预防感冒,鼻衄头晕,痢疾,崩漏;幼叶上之绵毛:外用于创伤出血。

## 5013005

*Osmunda javanica* Blume

植物名 宽叶紫萁《蕨类名称》

地方名 广东:爪哇蕨(广州)。

功效 根茎:清热解毒,止血杀虫。用于痈疖,腮腺炎,肠寄生虫,漆疮,风湿骨痛;嫩苗:用于外伤出血。

## 5013006

*Osmunda vachellii* Hook.

植物名 华南紫萁《蕨类名称》

药材名 华南紫萁贯众(拟)

地方名 广东:鲁萁(惠阳);广西:贯众(南宁、融安、兴安),大风尾蕨(金秀)。

功效 根茎:健脾利湿,舒筋活络,止血生肌。用于胃病,白带,尿血,外伤出血,烫火伤等。

## 5014 瘤足蕨科 Plagiogyriaceae

## 5014001

*Plagiogyria adnata* (Blume) Bedd.

植物名 瘤足蕨《蕨类名称》

文献名 高山疣足蕨《台湾药植志》

功效 根茎:用于血崩。外用于白秃。

## 5014002

*Plagiogyria distinctissima* Ching

植物名 镰叶瘤足蕨《蕨类名称》

地方名 江西:斗鸡草;广西:贯众(资源)。

功效 根茎:用于流行性感冒,麻疹。

## 5014003

*Plagiogyria euphlebia* Mett.

植物名 华中瘤足蕨《蕨类名称》

药材名 华中瘤足蕨《贵州药录》

功效 根茎:发表散寒,消肿止痛。用于风寒感冒,扭伤。

## 5014004

*Plagiogyria japonica* Nakai

植物名 华东瘤足蕨《蕨类名称》

地方名 广西:贯众。

功效 根茎:清热解毒。用于流感。

## 5014005

*Plagiogyria liankwangensis* Ching

植物名 两广瘤足蕨《蕨类名称》

功效 根茎:清热解毒。用于流行性感冒。

## 5015 里白科 Gleicheniaceae

## 5015001

*Dicranopteris ampla* Ching et Chiu

植物名 大芒萁《蕨类名称》

药材名 大芒萁《汇编》

文献名 大羽芒萁《蕨类图说》

功效 髓心、嫩苗:解毒止血。外用于蜈蚣咬伤,创伤出血。

## 5015002

*Dicranopteris linearis* (Burm.) Underw.

植物名 铁芒萁《蕨类名称》

药材名 芒萁骨《蕨类志属》

地方名 浙江:狼萁;江西:芦萁;福建:芒柴,山秧,芒萁草,蕨纲,龙枝草,龙萁(三明),洋蕨枝,黄菊枝(永安),赤蕨,柴葛(大田),茅草(明溪);湖南:芒萁、穿路萁(长沙),路萁子柴(衡山、永兴),路萁(蓝嘉),箬萁子柴(江华),鸡毛蕨(古丈),反蕨叶(溆浦),蜈蚣草(凤凰),冷猪窝(麻阳、凤凰),硬蕨萁、狼萁草(通道),蕨叶草(绥宁),铁心芦萁;四川:冷蕨萁;贵州:铁郎鸡(贵阳),篦子草(绥阳)。

功效 根茎:止痛,止血。用于狂犬咬伤,鼻衄。

## 5015003

*Dicranopteris pedata* (Houtt.) Nakai --- *D. linearis* (Burm.) Underw. var. *dichotoma* (Thunb.) Holtt. --- *D. dichotoma* (Thunb.) Bernh. --- *Gleichenia linearis* Clarke

植物名 芒萁《蕨类名称》

药材名 芒萁骨(李《药植》)

地方名 狼萁(浙江、江西),铁芒萁(浙江、安徽);浙江:烧火狼衣(天台);安徽:蕨蒿,铁爪蒿,铁脚芦萁,乌脚枪;江西:铁狼萁,路萁,小里白;福建:草芒,山芒,山蕨,虱棋草,乌萁,芒仔(闽南);湖南:穿路萁,路萁子柴,鸡毛蕨,箬萁子柴,反蕨叶,蜈蚣草,硬蕨萁,狼萁草,蕨叶草;广西:萁萁(陆川),蕨萁;四川:蚕窝草(峨眉山),大蕨萁(南充)。

功效 全草或根茎:清热利尿,化瘀,止血。用于鼻衄,肺热咳血,尿道炎,膀胱炎,小便不利,水肿,月经过多,血崩,白带。外用于创伤出血,跌打损伤,烧、烫伤,骨折,蜈蚣咬伤。

## 5015004

*Diplopterygium chinensis* (Ros.) DeVol --- *Dicranopteris chinensis* (Ros.) Nakai

植物名 中华里白《蕨类名称》

地方名 贵州：狼耳。

功效 根茎：用于骨折。

## 5015005

*Diplopterygium glaucum* (Thunb.) Nakai --- *Hicriopteris glauca* (Thunb.) Ching

植物名 里白《蕨类名称》

地方名 四川：大蕨耳，蕨耳。

功效 根茎髓部：止血。用于鼻出血。

## 5015006

*Diplopterygium laevis* (Christ) Nakai --- *Hicriopteris laevis* (Christ) Ching

植物名 光里白《蕨类名称》

功效 根茎：行气，止血。用于胃痛，鼻出血等。

## 5016 莎草蕨科 Schizaeaceae

## 5016001

*Schizaea digitata* (L.) Sw.

植物名 莎草蕨《蕨类名称》

功效 全草：清热解毒。用于感冒发热，扁桃体炎。

## 5016002

*Schizaea heterophyllum* (Dry.) J. Sm.

植物名 异叶莎草蕨《广西药录》

功效 全草：利尿，止痛，活血。

## 5017 海金沙科 Lygodiaceae

## 5017001

*Lygodium conforme* C. Chr.

植物名 海南海金沙《蕨类名称》

药材名 海金沙《广西陆川》

文献名 掌叶海金沙《蕨类图说》

地方名 广西：龙爪蕨《陆川》。

功效 全草：清热利尿。用于尿路结石，尿路感染，血尿，痢疾，并能拔弹片。

## 5017002

*Lygodium flexuosum* (L.) Sw.

植物名 曲轴海金沙《蕨类名称》

药材名 海金沙《广西龙州》

文献名 柳叶海金沙《蕨类图说》，长叶海金沙《广州植志》，大海金沙《台湾药植志》。

地方名 福建：猛鼓索，吊藤，加吊藤，左壮藤，坐转藤；广东：金砂藤，海金沙藤；广西：驳筋藤，戒指藤，缠藤《龙州》。

功效 全草及孢子：舒筋活络，清热利尿，止血消肿。用于风湿麻木，痢疾，尿路结石，尿路感染，跌打损伤等。

## 5017003

*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.

植物名 海金沙《蕨类名称》

药材名 海金沙《嘉祐本草》、《药典》

文献名 竹园菱《履巽岩本草》，海金沙草《纲目》，迷离网《生草药性备要》，鸡胶莽《质问本草》，斑鸠窝《草木便方》，左象藤、金线风、破网中、黄金塔《分类草药性》，左转藤《天宝本草》

地方名 金沙藤《广东、云南》，虾蟆藤《江西、福建、广东》，铁线藤《福建、湖南》，铁线草《广东、湖南、四川》，吐丝草《广东、江苏、云南》，鸡爪藤《浙江、福建》，鸡脚藤《江西、福建》，纺车藤《广西、福建》；浙江：上树狼耳《临安、江山、遂昌》，铜丝藤《东阳、义乌、丽水》，蔓篱丝藤《玉环、温州、乐清、瑞安》，披丝藤《龙泉》，龙须藤《杭州》，过篱青《文成》，老虎中计《永嘉》；安徽：铁脚蜈蚣，海珊瑚，羽草；江西：攀谷藤《大余》，爬古藤，铁蜈蚣，铁丝草，铁脚蜈蚣根，斑鸠子藤、戒指藤《信丰》；福建：蔓蔓藤，金金藤，见根藤，藤吊丝，鼎擦藤、毛须藤《闽南》，金线藤《闽东》，虾鸡藤子、加约藤、车芒藤、洗鼎藤、上茵陈《泉州》，禾网藤《周宁》，乱绞物《宁德》，牵藤凤尾草，丁吊丝，鼎吊藤，禾细藤，铜丝草，西毛藤《厦门》，铁钩杆草；台湾：珍中笔，鼎炊藤，凤尾草；湖南：满天云，硬筋藤，西牛藤，斑鸠巢，打鼓藤叶，烂木荆《嘉禾》，芒古藤，烂网根、王藤草《淑浦》，海银砂《长沙》，铁丝网《耒阳》，山布巾《怀化》；广东：海金沙藤《广州》，土金沙《乐昌》，牛草网《增城、博罗、东莞、阳春、阳江等》，牛担网《新会、台山》，牛头丝《湛江》，罗网藤《连平、龙州、广州》，牛抄芒《电白、高州、茂名》，牛儿林钱线草《番禺》，假蛙藤《五华》，铁线网《徐闻、海康、廉江、遂溪》，猛古藤《河源》，牛抄兜、崩古藤、手碌藤、蕨绕《粤北》，叮冬藤《朝阳》，叮当藤《饶平》，塘含吉《高要》，牛斗须藤，细样洗锅扫藤，洗锅扫藤；海南：望月藤《澄迈、琼海》，洗锅把，夏把藤，扫把藤，珍冬毛《琼中》，叶青《临高》；广西：磨姑藤，塞塞藤，松筋草，洗碗藤，爬墙蕨，金沙蕨，马筠草，牛抄倒，和网藤，黄蜂钵，牛斗茜《陆川》；四川：左转藤灰，黑须藤《重庆》，转转藤，金沙，海沙；贵州：须须藤，黑透骨，铁脚仙，乱头发；云南：铁丝蕨蕨，柱状藤，滇南海金沙《红河》，无根藤，天仙草，上树蕨耳；其他：草屏，大凿磨藤，坐赚藤，雉鸡情，老婆乱织，竹园菜。

功效 孢子：清利湿热，通淋止痛。用于热淋，砂淋，石淋，血淋，膏淋，尿道涩痛；藤叶或全草：清热解毒，利水通淋。用于尿路感染，尿路结石，白浊带下，小便不利，肾炎水肿，湿热黄疸，感冒发热，咳嗽，咽喉肿痛，肠炎，痢疾，烫伤，丹毒；根及根茎：清热解毒，利湿消肿。用于肺炎，乙型脑炎，急性胃肠炎，黄疸型肝炎，湿热肿胀，淋病。

## 5017004

*Lygodium microstachyum* Desv.

植物名 狭叶海金沙《蕨类名称》

地方名 台湾：鼎炊藤，珍中华，凤尾草，鼎刷藤。

功效 全草及孢子：利尿消炎。用于尿路感染，尿路结石，烫火伤。

## 5017005

*Lygodium scandens* (L.) Sw. --- *L. microphyllum* (Cav.) R.Br.

植物名 小叶海金沙《蕨类名称》

药材名 金沙藤《药典》

文献名 攀援海金沙《蕨类志属》, 台湾海金沙《台湾药植志》

地方名 广东: 石韦藤。

功效 全草及孢子: 利尿渗湿, 清热通淋。用于肾炎, 肝炎, 尿路感染。

#### 5017006

*Lygodium subflexuosum* Ching

植物名 拟曲轴海金沙《药植简编》

功效 全草: 用于砂淋, 外伤出血。

### 5018 膜蕨科 Hymenophyllaceae

#### 5018001

*Hymenophyllum barbatum* (v. d. B.) Bak.

植物名 膜蕨《蕨类名称》

文献名 华东膜蕨《高植图鉴》

地方名 湖北: 膜蕨草(神农架)。

功效 全草: 止血。外用于外伤出血。

#### 5018002

*Hymenophyllum khasyanum* Hook.

植物名 顶果膜蕨《蕨类名称》

地方名 四川: 小地柏枝, 滚龙草。

功效 全草: 止血生肌。外用于外伤出血。

#### 5018003

*Mecodium badium* (Hook. et Grev.) Cop.

植物名 蕨蕨《蕨类名称》

文献名 栗色路蕨《蕨类图说》, 棕路蕨《植分学报》

地方名 广西: 马尾草(金秀)。

功效 全草: 消炎生肌。用于烫火伤, 痈疖等。

#### 5018004

*Mecodium microsorum* (v. d. B.) Ching

植物名 小果蕨蕨《蕨类名称》

药材名 小果蕨蕨《安徽采药录》

功效 全草: 清热解毒, 生肌。用于痈疖。外用于水火烫伤。

#### 5018005

*Mecodium osmundoides* (v. d. B.) Ching

植物名 长柄蕨蕨《蕨类名称》

功效 全草: 消炎生肌。用于烫火伤, 痈疖。

#### 5018006

*Meringium denticulatum* (Sw.) Cop.

植物名 厚壁蕨《蕨类名称》

功效 全草: 外用于创伤出血。

#### 5018007

*Trichomanes auriculata* Blume --- *Vandenboschia auriculata* (Blume) Cop.

植物名 瓶蕨《蕨类名称》

药材名 热水莲《高植图鉴》

文献名 耳叶瓶蕨《蕨类图说》

地方名 广西: 海金沙(临桂)。

功效 全草: 止血生肌。外用于创伤出血。

#### 5018008

*Trichomanes naseana* Christ --- *Vandenboschia naseana* (Christ) Ching

植物名 漏斗瓶蕨《蕨类名称》

药材名 热水莲(四川峨眉)

功效 全草: 健脾和胃, 止血生肌。用于消化不良, 外伤出血等。

#### 5018009

*Trichomanes orientalis* C. Chr. --- *Vandenboschia orientale* (C. Chr.) Ching

植物名 华东瓶蕨《蕨类名称》

地方名 四川: 地枝莲, 地蕨蕨。

功效 全草: 止血生肌, 健脾消食。用于外伤出血, 消化不良。

### 5019 蚌壳蕨科 Dicksoniaceae

#### 5019001

*Cibotium barometz* (L.) J. Sm. --- *Cibotium assamicum* Hook.

植物名 金毛狗蕨《蕨类名称》

药材名 狗脊(根茎)《本经》、《药典》, 金狗脊黄毛(茸毛)《岭南采药录》

文献名 百枝《本经》, 狗脊、强脊《吴普本草》, 扶盖、扶筋《别录》, 苟脊《本草经集注》, 金狗脊《职典方》, 黄狗脊、金毛狗《分类草药性》, 金毛狗脊《本草备要》, 鯨口蕨《蕨类志属》, 毛狗《汉药写真集成》, 狗丝毛《中药志》, 生狗脊片、熟狗脊片、烫狗脊《药典》

地方名 金毛狮子(浙江、贵州、湖北), 毛狗头(湖南、安徽); 江西: 金狗毛薯; 福建: 老猴毛(南平), 猴毛头, 狗脊毛, 龙榔头、金毛猴(闽东), 金狗头, 金狗子, 狗仔毛, 毛将军; 台湾: 骨碎补; 湖北: 毛犬, 金狗尾; 湖南: 毛狗儿(宜章), 金丝毛(绥宁); 广西: 黄毛狗, 黄狗蕨, 黄狗头(桂平), 龙骨风(梧州), 金狗毛; 贵州: 三面青; 云南: “怕弯状”(傣语)。

功效 根茎: 补肝肾, 强腰脊, 祛风湿。用于腰脊酸软, 下肢无力, 风湿痹痛; 茸毛: 止血。外用于创伤出血。

### 5020 桫欏科 Cyatheaceae

#### 5020001

*Alsophila gigantea* Wall. ex Hook. --- *Cyathea gigantea* (Wall. ex Hook.) Holttum

植物名 大黑桫欏《中国树木志》

药材名 大桫欏《广西药录》

文献名 大桫罗《高植图鉴》

地方名 广西: 黑狗脊(博白)。

功效 叶: 跌打损伤; 全株: 用于风湿骨痛。

#### 5020002

*Alsophila pustulosa* H. Chr.

植物名 兰盆笔筒树《台湾药植志》

地方名 台湾:笔筒树,贯众,[狗脊]。

功效 木质部:促进血液循环,止咳。

#### 5020003

*Alsophila spinulosa* (Wall. ex Hook.) Tryon --- *Cyathea spinulosa* Wall. ex Hook.

植物名 桫欏《蕨类名称》

药材名 飞天螭蛸《岭南采药录》

文献名 刺桫欏《李《药植》》

地方名 山螭蛸(广东、广西),山棕(广东、四川),龙骨风(广东、广西、四川),树蕨、大贯众(广西、四川);广东:五花血藤(翁源),蕨木酒(连山),蕨基(南雄),吊狗柳(始兴),山芥(连南),贯众;四川:梭罗树(峨眉山)。

功效 茎干:有小毒。祛风利湿,活血祛瘀,清热止咳。用于风湿关节痛,跌打损伤,慢性支气管炎,肺热咳嗽,肾炎水肿,预防流感;茎内液汁:外用于癣症。

#### 5020004

*Alsophila taiwaniana* --- *Cyathea taiwaniana*

植物名 台湾桫欏《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾:[狗脊]。

备考 台湾以其根混作狗脊入药。

### 5021 稀子蕨科 Monachosoraceae

#### 5021001

*Monachosorum flagellare* Hayata

植物名 尾叶稀子蕨《蕨类名称》

功效 全草:用于痛风。

#### 5021002

*Monachosorum flagellare* (Maxim.) Hayata var. *nipponicum* (Makino) Tagawa

植物名 华中稀子蕨《药植简编》

地方名 广西:观音莲。

功效 全草:用于痛风。

#### 5021003

*Monachosorum henryi* Christ

植物名 稀子蕨《高植图鉴》

地方名 广西:观音莲(临桂)。

功效 全草:用于风湿骨痛。

### 5022 碗蕨科 Dennstaedtiaceae

#### 5022001

*Dennstaedtia pilosella* (Hook.) Ching

植物名 细毛碗蕨《蕨类名称》

地方名 贵州:篦子草。

功效 根茎:祛风除湿,通经活血。用于风湿关节炎,劳伤疼痛。

#### 5022002

*Dennstaedtia scabra* (Wall.) Moore

植物名 碗蕨《蕨类名称》

地方名 广西:贯众(富川)。

功效 全草:用于感冒发热。

#### 5022003

*Dennstaedtia scabra* (Wall.) Moore var. *glabrescens*

(Ching) C. Christ

植物名 光叶碗蕨《高植图鉴》

药材名 光叶碗蕨《安徽采药录》

功效 全草:清热,解表。用于风热感冒,头痛。

#### 5022004

*Dennstaedtia wilfordii* (Moore) Christ

植物名 溪洞碗蕨《蕨类名称》

药材名 万能解毒蕨《神农架药录》

功效 全草:清热解毒。用于跌打损伤。

#### 5022005

*Microlepia hancei* Prantl

植物名 华南鳞盖蕨《蕨类名称》

文献名 鳞盖蕨《蕨类图说》

地方名 广西:凤尾千斤草(阳朔),青蕨(玉林)。

功效 全草:去湿热。用于流行性感胃,风湿骨痛。

#### 5022006

*Microlepia marginata* (Houtt.) C. Chr.

植物名 边缘鳞盖蕨《蕨类名称》

文献名 边缘鳞盖蕨《蕨类图说》

地方名 浙江:小叶山鸡尾巴草。

功效 叶:用于疖肿。

#### 5022007

*Microlepia marginata* var. *bipinnata* Makino

植物名 二羽边缘鳞盖蕨《安徽采药录》

功效 全草:解毒,消肿。外用于下肢疖肿。

#### 5022008

*Microlepia strigosa* (Thunb.) Presl

植物名 粗毛鳞盖蕨《蕨类名称》

文献名 粗毛鳞盖蕨《蕨类图说》,鳞盖蕨《药用抱植》

功效 全草:去湿热。用于流行性感胃。

### 5023 鳞始蕨科 Lindsaeaceae

#### 5023001

*Lindsaea ensifolia* Sw.

植物名 剑叶鳞始蕨《蕨类名称》

文献名 双唇蕨《广西药录》

功效 全草:清热除湿。

#### 5023002

*Lindsaea intertexta* (Ching) Ching --- *Schizoloma intertextum* Ching

植物名 柳叶鳞始蕨(拟)

文献名 卵叶双唇蕨《中国植志》,柳叶双唇蕨《药用抱植》,卵叶鳞始蕨《蕨类名称》

地方名 广西:金花草(北流)。

功效 全草:止血,止痢。用于痢疾,跌打损伤。

#### 5023003

*Lindsaea orbiculata* (L.) Mett.

植物名 团叶鳞始蕨《蕨类名称》

文献名 团叶陵齿蕨《中国植志》

地方名 广东:高脚假铁线草(广州),金钱草;广西:黑脚蕨(灵山),七星蕨(平南)。

功 效 全草：用于痢疾；茎叶：用于疮疖。

### 5023004

*Stenoloma chusanum* (L.) Ching --- *Odontosoria chinensis* J. Sm. --- *sphenomeris chusana* Copel. --- *Sphenomeris chusana* var. *tenuifolia* C. Chr.

植物名 乌蕨《蕨类名称》

药材名 金花草《汇编》

文献名 [地柏枝]《药植图鉴》，乌韭《药用抱植》，乌韭蕨《广西中药志》

地方名 小野鸡尾(江西、四川)，小叶凤尾草(福建、海南)，小凤尾草、凤尾草、金鸡尾(广东、广西)，金鸡脱衣(湖南、贵州)，孔雀尾(福建、广东、广西)，雄鸡尾(浙江、江西、福建、广东)，野鸡尾(江西、广西、云南)，鸡尾草(浙江、福建)，山柏(福建、广东)，蜈蚣草(广西、云南)；上海：[紫背金牛]；安徽：分经草；浙江：小鸡尾草、细叶狼莪(宁波、东阳、天台)，乌竹、檣柏、花叶凤尾草、细叶凤凰尾、小凤凰尾(丽水)，大甲莪、细狼莪(乐清)，红薇草(诸暨)，金龟草、岩白草(东阳)；江西：雪仙草、扫雪花、凤凰标(德兴)，凤凰草(大余)，野莲子(石城)，红根子(会昌)，小叶野鸡尾(广昌)；福建：[土黄连]，青鸡尾胎(宁化)，绿金凤尾，假金花，乌脚芒，大号凤尾草、大地柏枝、散柏枝(南平)，水鸡爪，红根子草，幼脚笔，幼笔仔，细笔仔，苦其子草，环环草，上肉草，光奔仔，山凤尾，[野川连](平潭)，鸡脚连(沙县)；台湾：土川连，凤尾笔，凤尾华；湖南：小锦鸡尾，锦鸡尾，细金鸡尾(黔阳)，细叶金鸡尾(溆浦)，山黄连，散血草，散血叶，赤鸡尾，劲脚草，细叶蕨，蓉花草，地侧柏(衡山)；广东：牙齿芒(广州)，细叶凤尾草(从化、罗定、增城、乐昌、电白、阳江)，金英拖西(新兴)，石百(河源)，百叶(广宁、四会、德庆、封开、怀集)，假柏(高要)，鸡骨莪(增城、东莞)，牛筋草(粤北)，金花笔(潮阳、普宁、潮安)，猫爪菜(惠阳)；海南：铁路茶(儋县)；广西：皱面麻、青蕨(陆川)，擎天蕨，大金花草，火伤蕨，神花草，大叶金花草(桂林、南宁、玉林)，细凤尾草(兴安)，上树细辛草(富川)，小金花草(恭城)；四川：[野黄连]、[水黄连](峨眉)，水柏草，毛毛一枝蒿(西昌)；云南：蜢蚱参，野韭，菁鸡草。

功 效 叶：清热解毒。用于砒中毒，沙门氏菌所致食物中毒，野菰、木薯中毒，肠炎，痢疾；根茎：用于狂犬咬伤，毒蛇咬伤。

## 5025 姬蕨科 Hypolepidaceae

### 5025001

*Hypolepis punctata* (Thunb.) Mett.

植物名 姬蕨《蕨类名称》

文献名 岩姬蕨《蕨类图说》，下鳞蕨《台湾药植志》

地方名 广西：冷水蕨(金秀)。

功 效 全草、叶：清热解毒，收敛止痛。外用于烧烫伤，创伤出血。

### 5025002

*Hypolepis tenuifolia* (Forst) Bernh.

植物名 薄叶姬蕨《蕨类名称》

文献名 细叶下鳞蕨《台湾药植志》

功 效 叶：外用于敷疮毒。

## 5026 蕨科 Pteridiaceae

### 5026001

*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var. *latiusculum* (Desv.) Underw --- *P. aquilinum* Kuhn var. *japonicum* Nakai

植物名 蕨《中国植志》

药材名 蕨《本草拾遗》、《汇编》，蕨根《纲目》、《中药大辞典》，蕨粉[淀粉]《台湾药植志》

文献名 蕨《尔雅》，柔蕨《诗毛氏传疏》，拳菜[初生苗]、紫蕨[老者]《尔雅义疏》，蕨菜(崔禹锡《食经》)，蕨其《纲目》，蕨脚《医林纂要》，蕨鸡根《分类草药性》，龙头菜《广东新语》，吉祥菜《满蒙植汇》，拳头菜《满鲜植汇》

地方名 蕨儿菜(东北)，贯众(贵州、云南)，米蕨(四川、贵州)，如意菜(河北、江西)，拳头草(江苏、湖南)，龙爪菜(河北、安徽)；吉林：猫爪子，“高沙利”(朝名)；宁夏：蕨毛；山东：野鸡鸩；江苏：山凤尾、如意草(南京)，凤凰草(苏州)，鸡脚爬；浙江：乌糯葛其(天台)，乌糯，山甲其(乐清)；安徽：鸡爪菜，金花蕨，凤尾蕨，春核；江西：江蕨(占水)，拳芽菜；台湾：蕨猫叶，蕨猫草；湖北：粉蕨，蕨雾子、蕨锯台(神农架)；湖南：乌角[根茎]，小角[根茎]，小葛根，陈蕨花，蕨巴；广西：山蕨，荒地蕨，松栉蕨；四川：过山龙(成都)；贵州：甜蕨；其他：米蕨草，鸡爪蕨，蕨菜苗。

功 效 全草：清热，滑肠，降气，化痰；根茎：清热，利湿；淀粉：用于脱肛，脚气，风湿，虫螫，利尿等；叶：用于产后风湿骨痛。外用于创伤出血。

### 5026002

*Pteridium excelsum* (L.) Ching

植物名 蕨菜(昆明民药)

药材名 蕨菜《中药大辞典》

功 效 根茎：解疮毒。

### 5026003

*Pteridium revolutum* (Blume) Nakai

植物名 毛轴蕨《蕨类名称》

药材名 龙爪菜《汇编》

文献名 蕨菜《滇南本草》，密毛蕨《海南植志》，毛蕨《高植图鉴》，饭蕨《药用抱植》

地方名 贵州：苦蕨；云南：锯菜(昆明)。

功 效 根茎：驱风湿，利尿，解热，驱虫。用于脱肛，风湿关节炎，尿路感染，驱虫。

## 5027 凤尾蕨科 Pteridaceae

### 5027001

*Pteris actinopteroides* Christ

植物名 猪鬃凤尾蕨《中国植志》

文献名 还阳草《名实图考》，小凤尾蕨、片鸡尾草《药植简编》，猪鬃凤尾蕨《蕨类名称》

地方名 湖北：马尾蕨(神农架)；四川：猪毛草(峨

眉), 鸡公头(成都), 梭老草。

功效 全草: 清热解毒。用于狗咬伤, 烫、火伤, 刀伤, 淋浊, 白带。

#### 5027002

*Pteris biaurita* L.

植物名 狭眼凤尾蕨《中国植志》

功效 全草: 止血收敛。用于痢疾, 肠炎, 外伤出血。

#### 5027003

*Pteris cadieri* Christ --- *P. dimorpha* Cop.

植物名 条纹凤尾蕨《中国植志》

文献名 二形凤尾蕨《药植简编》

地方名 广西: 凤尾蕨(邕宁)。

功效 全草: 清热解毒。用于痢疾。

#### 5027004

*Pteris cretica* L. var. *laeta* (Wall. ex Ettingsh.) C. Chr. et Tard. - Blot --- *Pteris laeta* Wall.

植物名 粗糙凤尾蕨《中国植志》

药材名 亮凤尾草《云南中草药》

文献名 亮凤尾蕨《中药大辞典》

地方名 云南: 凤尾草, 黑枸杞(曲靖)。

功效 全草: 清热解毒, 活血利尿。用于痢疾, 肠炎, 小便淋痛, 痢疮疖肿, 骨折。

#### 5027005

*Pteris cretica* L. var. *nervosa* (Thunb.) Ching et S. H. Wu --- *P. nervosa* Thunb. --- *P. cretica* auct. non L.

植物名 凤尾蕨《中国植志》

文献名 大叶井口边草《蕨类图说》, 大叶凤尾《西藏中草药》, 大叶凤尾蕨《汇编》

地方名 凤尾草(陕西、湖南、四川、云南), 金鸡尾(湖北、云南、西藏), 井口边草(四川、云南); 陕西: 狼牙草; 甘肃: 剪子草, 大叶凤尾草; 浙江: 大井口边草; 台湾: 野鸡尾; 湖北: 凤尾(巴东); 湖南: 玉龙草(新化), 野鸡林(攸县), 楚箭草(保靖), 线鸡尾(怀化、蓝山、郴县); 四川: 大风尾草(峨眉山), 爬岩龙(会理); 云南: 背阴草, 鸡脚草, 井边草, 凤尾接骨草, 鸡爪凤尾草; 西藏: 双凤尾, “杂玛冬罗玛切瓦”(藏名)。

功效 全草: 清热解毒, 利湿, 消肿。

备考 《蕨类图说》(1957)学名 *P. cretica* L. 系误订。该种分布于欧洲及非洲, 我国不产。

#### 5027006

*Pteris crispato-serrulata* Ching

植物名 广西凤尾蕨《药植简编》

地方名 广西: 凤尾草。

功效 地下部分: 用于痢疾。

#### 5027007

*Pteris dactylina* Hook.

植物名 指叶凤尾蕨《蕨类名称》

药材名 金鸡尾《贵州民间药物》

文献名 掌凤尾蕨《蕨类图谱》, 掌羽凤尾蕨《药用抱植》

地方名 贵州: 凤尾草(贵阳、黎平、剑河); 云南: 五

叶灵芝、井栏草、鸡脚草、龙须草(文山)。

功效 全草: 清热利湿, 解毒。用于肠炎, 痢疾, 流行性腮腺炎, 淋巴结炎, 白带等。

#### 5027008

*Pteris deltoidea* Bak.

植物名 岩凤尾蕨《中国植志》

地方名 甘肃: 牛肋巴草; 湖南: 凤尾草, 粗金鸡尾, 楚箭草; 广东: 金边凤尾蕨(潮阳); 四川: 金鸡尾(成都), 鸡爪凤(峨眉山)。

功效 全草: 清肺胃热, 止泻消炎。用于腹泻, 久咳不止。

#### 5027009

*Pteris dispar* Kze.

植物名 刺齿半边旗《中国植志》

文献名 刺齿凤尾蕨《蕨类名称》

地方名 广西: 半边双(藤县), 半边旗(宁明), 半凤尾蕨(南宁)。

功效 全草: 清热解毒, 止血祛瘀。用于肠炎, 痢疾, 流行性腮腺炎, 疮毒, 跌打损伤等。

#### 5027010

*Pteris dissitifolia* Bak.

植物名 疏羽半边旗《蕨类名称》

药材名 大半边旗《海南植志》

文献名 大风尾蕨《药植简编》, 岩凤尾草《药用抱植》

功效 全草: 用于痢疾, 外伤出血。

#### 5027011

*Pteris ensiformis* Burm.

植物名 剑叶凤尾蕨《中国植志》

药材名 凤冠草《生草药性备要》、《中药大辞典》

文献名 凤凰草《生草药性备要》, 井边茜、凤尾草《岭南采药录》, 刀叶凤尾草《经植手册》, 剑叶凤尾草《台湾药植志》

地方名 三叉草(广东、广西); 浙江: 白脚鸡(温州); 广东: [翠云草], 井栏茜(仁化、英德、南雄), 井栏妥、鸡公尾(阳山), 五指草(新丰), 小凤尾, 小凤尾草(增城、湛江), 山凤尾, 红尾草(徐闻、海康、廉江、遂溪、高州等), 青脚凤尾毛(普宁), 雉鸡尾(罗定、曲江), 高脚雉鸡尾(河源), 虾蟆藤(五华), 鸡爪蕨(从化), 浪基(番禺), 细叶凤尾草(广州), 凤尾笔、井底笔(潮汕), 钻墙笔、土黄连(潮安、潮州、澄海), 乌脚笔(潮阳、揭阳、惠来), 五爪笔(潮州), 青脚鸡爪笔(揭阳), 乌脚鸡爪笔(澄海), 井口笔(普宁); 海南: 七叶(乐东); 广西: 鸡脚草(南宁), 半边草、白蕨(北流), 黑边草(上林); 云南: 凤尾蕨(华宁), 凤凰尾(通海)。

功效 全草: 清热, 利湿, 凉血, 解毒。用于痢疾, 疟疾, 黄疸, 淋病, 下血, 血崩, 跌打损伤, 扁桃腺炎, 腮腺炎, 疮毒, 湿疹。

#### 5027012

*Pteris ensiformis* Burm. var. *merrilli* (C. Chr.) S. H. Wu --- *Pteris merrilli* C. Chr. ex Ching

植物名 少羽凤尾蕨《中国植志》



文献名 假剑叶凤尾蕨《广西药录》  
地方名 广西:凤尾草(桂平)。  
功效 全草:用于痢疾,腹泻,吐血,咳血。

## 5027013

*Pteris excisa* Gaud.

植物名 溪边凤尾蕨《蕨类名称》  
药材名 溪边凤尾蕨《贵州药录》  
地方名 贵州:老蕨基菜。

功效 全草:清热解毒,祛风解痉。用于小儿惊风,腹泻,急性黄疸型肝炎。

## 5027014

*Pteris lauriei* Hieron.

植物名 傅氏凤尾蕨《中国植志》  
文献名 金钗凤尾蕨《高植图鉴》,东南亚凤尾蕨《药用抱植》  
功效 叶:收敛,止血。用于烫伤,外伤出血。

## 5027015

*Pteris henryi* Christ

植物名 狭叶凤尾蕨《中国植志》  
药材名 片鸡尾草《汇编》  
文献名 亨利凤尾蕨《蕨类图说》,新风尾草《药用抱植》  
地方名 贵州:骗鸡尾草、割鸡尾草(贵阳),小凤尾草(榕江),锯锯草(罗甸);四川:猪毛草(峨眉山)。  
功效 全草:清热解毒。用于烫、火伤、狂犬咬,刀伤。

## 5027016

*Pteris inaequalis* Bak.

植物名 变异凤尾蕨《蕨类名称》  
文献名 中华凤尾蕨《贵州药录》  
功效 全草:清热解毒,祛风除湿。用于腹泻,痢疾,小儿惊风,急性黄疸型肝炎,疮毒,水肿。

## 5027017

*Pteris insignis* Mett. ex Kuhn

植物名 全缘凤尾蕨《中国植志》  
地方名 江西:鸡脚莲,井口边草,巴墙草,五指草。  
功效 全草:清热解毒,利尿祛瘀。用于黄疸,痢疾,跌打损伤,咽喉肿痛,瘰癧,暑热血淋,热淋与各种出血。

## 5027018

*Pteris longipinna* Hayata

植物名 长叶凤尾蕨《中国植志》  
药材名 长叶凤尾蕨《台湾药植志》  
功效 根茎:用于毒蛇咬伤。

## 5027019

*Pteris multifida* Poir.

植物名 井栏边草《中国植志》  
药材名 凤尾草《名实图考》、《汇编》  
文献名 井口边草《本草拾遗》,小金星凤尾、铁脚鸡《履巉岩本草》,山鸡尾、井茜《生草药性备要》,井栏草、石长生《名实图考》,凤凰草《分类草药性》,井边茜《岭南采药录》,旋鸡头、闹鸡尾《中国药植志》,百脚鸡《药

植图鉴》,井边草《经植手册》,鸡足草、仙人掌草《台湾药植志》,井栏凤尾蕨《秦岭植志》

地方名 鸡脚草(安徽、江西、福建、湖北、广西、云南),五指草、鸡爪莲(江西、福建),背阴草(江苏、上海),凤凰尾(浙江、福建、广西、四川),野鸡尾(湖北、湖南、广西、四川),小凤尾(江西、广东),双凤尾(安徽、江西、上海、四川),金鸡爪(浙江、福建),雄鸡尾(福建、广东),乌脚鸡(江苏、浙江),凤尾莲(福建、湖南);陕西:狼牙草(安康),井口草;甘肃:牛肋巴草;江西:钻石箭(泰和),百脚草,龙须草(南昌),巴墙草;浙江:白脚鸡(温州、泰顺),臭尾(临安),鸡脚半(龙泉),铁狼箕(天台),小骨箕(临海),凤凰尾巴(嵊县);福建:井边凤尾(惠安),壁脚草,鸡爪脚爬(大田),鸡脚爪、鸡足叉(三明、永安、宁化),鸡脚黍、鸡下脚、鸡爪草、井口鸡胶舌(闽东),白鸡脚爪(福安),鸡脚风(建阳);湖南:线鸡尾、三把叉(蓝嘉),细鸡脚沙(通道),粗叶金鸡尾(溆浦),肺经草(新化);广东:井栏茜,小叶凤尾草,凤尾笔(潮阳、饶平、揭阳),井底笔、井口笔(潮安、普宁、揭阳),贴墙笔、[土黄连](潮安、澄海),乌脚笔(揭阳、惠来),青脚鸡爪笔(揭阳),乌脚鸡爪笔(澄海),白骨雏鸡尾(饶平),五爪笔(潮安),金边凤尾笔(南澳),中叶凤尾草(从化),短脚凤尾草(河源、连平),鸡脚枪(五华),短脚狼箕(新会);海南:铁骨公(乐东);广西:青蕨、青结(陆川),金边蕨,小凤尾草(全州),九把连环剑(阳朔);四川:腊肾草(长寿),阳山三角风,白脚凤尾(成都);云南:五叶灵芝。

功效 全草:清湿热,解毒,止血。用于痢疾,黄疸,肝炎,胃肠炎,乳腺炎,白带,崩漏。外用于外伤出血,烧、烫伤。

## 5027020

*Pteris plumbea* Christ

植物名 栗柄凤尾蕨《蕨类名称》  
地方名 陕西:凤尾草;广西:五爪鸡草(南丹),五齿剑(阳朔)。  
功效 全草:用于痢疾,蜈蚣咬伤,金疮,沙淋。

## 5027021

*Pteris semipinnata* L.

植物名 半边旗《中国植志》  
药材名 半边旗《岭南采药录》、《汇编》  
文献名 甘草凤尾蕨《蕨类图说》,甘草蕨《广州植志》  
地方名 半边蕨(广东、广西、江西),半边锯(广西、安徽),半边风药(四川、贵州),半边梳、半边莲(广东、广西),单片锯(湖南、江西),单边锯(广东、江西),单边旗(广东、四川),凤凰尾巴草(浙江、江西),凤尾草(安徽、广东);江西:雷公翼;福建:大号凤尾草,乌脚靴草,侧面虎(宁化),乌路基(清流),老虎山(明溪),山兰芎(三明);湖南:雁行草(衡山);广东:半边牙(广州、惠阳),黑骨芒(梅阁),铁线莲、雷公人(新会),龙眉笔(潮安),一片牙、缺角蜈蚣(兴宁、五华),井毛、凤尾毛(陆丰),大叶雄鸡尾(龙川),野莲草(乐昌),高脚芒(始兴),关刀笔,乌脚龙眉笔(潮阳、普宁),单边笔(普宁),

单边救主(五华),望仔藤;海南:小凤尾(海口);广西:半凤尾草(南宁),和尚梳(贵县)。

功效 全草:清热解毒,消肿止血。用于细菌性痢疾,急性肠炎,黄疸型肝炎,结膜炎。外用于跌打损伤,疮疡疖肿,湿疹,毒蛇咬伤。

#### 5027022

*Pteris vittata* L.

植物名 蜈蚣草《名实图考》、《中国植志》

药材名 蜈蚣草《汇编》

文献名 百叶尖《滇南本草》,长叶甘草蕨《鉴别手册》,蜈蚣蕨《药用抱植》

地方名 小贯众、小贯仲(云南、四川),舒筋草(甘肃、四川);甘肃:牛肋巴草;福建:金鸡孵蛋(厦门);广东:大仙鸡尾;广西:蜈蚣连、斩草剑(阳朔);四川:黑舒筋草(峨眉),牛肋巴,上天梯(宁南),篦子草,篦子舒筋草;云南:(狗脊),过山芦,凤尾蕨(玉龙山),百尖草,小蜈蚣草。

功效 全草或根茎:祛风活血,解毒杀虫。用于防治流行性感胃,痢疾,风湿疼痛,跌打损伤。外用于蜈蚣咬伤,疥疮。

#### 5027023

*Pteris wallichiana* Agardh --- *Litobrochia wallichiana* Fee --- *Campteris wallichiana* Moore

植物名 西南凤尾蕨《中国植志》

药材名 独蕨《峨山彝族药》

文献名 开三叉凤尾蕨《蕨类图说》,三叉凤尾蕨《药用抱植》

地方名 广东:凤尾草;广西:老泻风(临桂);云南:“罗别呕儿”(玉溪彝名)。

功效 根:行气消食,软坚散结。用于腹部包块,产后少腹痛,恶露不尽,胃脘胀满,肝气郁结;全草:用于痢疾,外伤出血。

### 5030 中国蕨科 Sinopteridaceae

#### 5030001

*Aleuritopteris argentea* (Gmel.) Fee --- *Cheilanthes argentea* Kunze

植物名 银粉背蕨《中国植志》

药材名 铜丝草(安徽、辽宁、宁夏)

文献名 五角叶粉背蕨《秦岭植志》,姬里白《中国植物图鉴》

地方名 通经草(山西、内蒙古、宁夏),〔翻白草〕(河北、北京、东北、甘肃),分经草(河北、河南、湖北),金丝草(山西、河南),金线草(吉林、山东),金牛草(山东、宁夏、华北、东北);河北:紫背金牛草;内蒙古:“芝阿瓦”(蒙名);陕西:猪鬃七,铁刷子,铁杆子,鸡爪山;甘肃:还阳草(榆中);宁夏:石崖茶;青海:“知加哈保”(藏名);山东:拳手草;浙江:止惊草,金线铜皮,铁骨草,明琥珀草(淳安);河南:小孩拳,〔伸筋草〕;湖南:天青地白,白蓝地草,白烤,铁丝蕨,卷叶凤尾草,凤尾路鸡,岩飞蛾,岩飞草;广西:白背莲(阳朔);云南:花叶猪鬃草,金联草;其他:娘娘拳头。

功效 全草:活血调经,补虚止咳。用于月经不调,闭经腹痛,肺结核咳嗽,咯血。

#### 5030002

*Aleuritopteris duclouxii* (Christ) Ching

植物名 裸叶粉背蕨《蕨类名称》

地方名 贵州:一把伞。

功效 全草:用于咯血,吐血,鼻衄,刀伤。

#### 5030003

*Aleuritopteris hopeana* (C. Chr.) Ching

植物名 小一把抓《玉溪中草药》

功效 全草:健脾胃,补中益气。用于感冒,小儿疳积,老年气虚。

#### 5030004

*Aleuritopteris pseudo-farinosa* Ching et S. K. Wu

植物名 粉背蕨《中国植志》

药材名 粉背蕨《江西民间草药》

文献名 假粉背蕨《植分学报》,拟粉背蕨《福建植志》,水狼其《汇编》

地方名 水郎鸡(贵州、四川);江西:铁脚凤尾草,鸡脚草;湖南:卷叶凤尾(衡山),岩飞蛾(凤凰),白烤,白兰地草(通道);四川:白极石(西昌);云南:黑猪鬃草(玉溪),大叶猪鬃。

功效 全草:祛痰止咳,利湿和瘀。用于百日咳,喉风,痢疾,泄泻,淋病,白带,月经不调,跌打损伤。

#### 5030005

*Aleuritopteris rufa* (Don) Ching --- *Cheilanthes rufa* Don

植物名 棕毛粉背蕨《中国植志》

药材名 硬一把抓《元江哈尼族药》

地方名 贵州:水郎鸡;云南:“墨章章哈”(元江哈尼语)。

功效 全草:益气升提,清热解毒。用于脱肛,子宫脱垂,小儿疳积,咽喉肿痛。

#### 5030006

*Aleuritopteris shensiensis* Ching --- *A. argentea* var. *obscura* (Christ) Ching --- *Cheilanthes argentea* Kze. var. *obscura* Christ

植物名 陕西粉背蕨《中国植志》

文献名 无粉银粉背蕨《东检》,无粉五角叶粉背蕨《秦岭植志》,无银粉背蕨《福建植志》,绿叶通经草《安徽采药录》

地方名 陕西:铁刷子,铁杆子,鸡爪山;湖北:铜丝还阳、铜丝分筋、金鸡脚(神农架)。

功效 茎叶:清热活血。用于闭经,利小便。

#### 5030007

*Aleuritopteris squamosa* (Hope et C. H. Wright) Ching

植物名 毛叶粉背蕨《中国植志》

药材名 小一把抓《云南药录》

功效 全草:健脾胃,补中益气。用于感冒,小儿疳积,虚弱。

#### 5030008

*Cheilosoria chusana* (Hook.) Ching et Shing --- *Cheilanthes chusana* Hook.

植物名 毛轴碎米蕨《中国植志》

药材名 川层草《广西药录》

文献名 舟山碎米蕨《广西药录》

地方名 细凤尾草、铁线路鸡(湖南、广西);湖北:乌金蕨(神农架);湖南:凤凰路鸡,小样线鸡尾;广西:献鸡尾,善鸡尾(兴安),斑鸡尾(东兰)。

功效 全草:止泻利尿,清热解毒,止血散血。用于痢疾,小便痛,喉痛,蛇咬伤,痈疖肿疡。

#### 5030009

*Cheilosoria mysurensis* (Wall. ex Hook.) Ching et Shing  
--- *Cheilanthes mysuriensis* Wall.

植物名 碎米蕨《中国植志》

文献名 毛轴碎米蕨《药用抱植》

功效 全草:清热解毒,收敛止血。用于蛇咬伤,痢疾,喉痛等。

#### 5030010

*Cheilosoria tenuifolia* (Burm.) Trev. --- *Cheilanthes tenuifolia* Sw.

植物名 薄叶碎米蕨《中国植志》

文献名 狭叶蕨《广州植志》,粉背蕨《台湾药植志》,狭叶碎米蕨《药植简编》

地方名 广西:山兰根(玉林)。

功效 枝叶:用于痢疾。外用于跌打损伤。

#### 5030011

*Doryopteris concolor* (Langsd. et Fisch.) Kuhn

植物名 黑心蕨《中国植志》

药材名 黑心蕨《药用抱植》

功效 全草:清热,利尿,止血。用于尿路感染,外伤出血。

#### 5030012

*Leptolepidium kuhnii* (Milde) Hsing et S. K. Wu ---  
*Cheilanthes kuhnii* Milde --- *Aleuritopteris kuhnii* (Milde) Ching

植物名 华北薄鳞蕨《中国植志》

药材名 小蕨蕨(贵州)

文献名 华北粉背蕨《高植图鉴》,小蕨蕨《贵州草药》

地方名 贵州:白粉蕨(毕节)。

功效 根茎、叶:润肺止咳,清热凉血。用于咳血,刀伤。

#### 5030013

*Leptolepidium subvillosum* (Hook.) Hsing et S. K. Wu  
--- *Aleuritopteris subvillosa* (Hook.) Ching

植物名 绒毛薄鳞蕨《中国植志》

文献名 绒毛粉背蕨《高植图鉴》

地方名 云南:小凤尾草。

功效 全草:清热解毒,消炎利尿,活络止痛。用于肝炎,咽喉炎,痢疾,肠炎,尿路感染,跌打肿痛,风湿等。

#### 5030014

*Notholaena chinensis* Bak.

植物名 中华隐囊蕨《中国植志》

文献名 华乃蕨《药植简编》

地方名 广西:山连(阳朔)。

功效 全草:用于痢疾。

#### 5030015

*Onychium contiguum* Hope

植物名 黑足金粉蕨《中国植志》

文献名 高山乌蕨《云南药录》,高山金粉蕨《药用抱植》

地方名 云南:铁脚草。

功效 全草:解毒止血。用于农药中毒,木薯中毒,外伤出血;根茎:利尿。用于水肿。

#### 5030016

*Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze

植物名 野雉尾金粉蕨《中国植志》

药材名 小野鸡尾(江西)

文献名 海凤丝《名实图考》,日本乌蕨《蕨类图说》,日本金粉蕨《抱植名称》,野鸡尾金粉蕨《秦岭植志》

地方名 金粉蕨(陕西、广西、云南),金鸡尾(湖南、贵州),小野鸡尾草(广西、甘肃),小叶凤尾草(广东、福建),小雉尾草(浙江、台湾、安徽、湖南),小野雉尾草(江西、江苏),野鸡尾(江西、陕西、广西),小金花草(广西、浙江),孔雀尾(福建、云南),凤凰尾(湖南、江西),土黄连(福建、江西、湖南、四川),草黄连(陕西、四川),地柏枝(湖北、四川、贵州),解毒蕨(广西、云南);陕西:毛黄连;甘肃:水黄连;浙江:土水莲,小叶狼耳,青脱兰基;江西:小叶鸡尾,凤凰标(景德),冷沟凤尾,万能解毒药;福建:凤尾连(安溪、惠安、南安、泉州、莆田、仙游),金精莲,血水草,草莲(厦门);台湾:马尾丝,小本凤尾连(丰原);湖北:岩柏枝(鹤峰);湖南:线鸡尾,白线鸡尾,野云连,野黄连,吊金草,细叶金鸡尾,大叶凤凰路鸡;广东:细叶鲁蕨(曲江),伯公花(乳源);广西:仙鹤尾,石孔雀尾(陆川),火伤蕨,线鸡尾草(兴安),黑蕨、光棍药(隆林),六零草、井芒蕨(北海),霜乱草(罗城),凤尾蕨(武鸣);四川:山黄连、柏香连(峨眉),三星草(西昌),阔尾七,小蕨蕨,光骨头草,鸡尾草,脆连子,野鸡尾草;贵州:水金鸡尾(榕江),“虾虾猛”(雷公山苗语);云南:串鱼草,人头发,金花草,石发、红蕨蕨、亮叶乌蕨(红河)。

功效 叶:清热解毒。用于砷中毒,沙门氏菌所致食物中毒,野菰、木薯中毒,肠炎,痢疾,肝炎。

#### 5030017

*Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze var. *lucidum* (Don) Christ --- *O. lucidum* (Don) Spring

植物名 栗柄金粉蕨《高植图鉴》

文献名 有光乌蕨《广西中药志》,有光金粉蕨《云南中草药选》

地方名 云南:〔人头发〕。

功效 全草:清热解毒,利湿,止血。用于黄疸型肝炎,流行性感,咳嗽,腮腺炎,扁桃腺炎,乳腺炎,肠炎,痢疾。外用于跌打损伤,骨折,创伤出血,狂犬咬伤。

#### 5030018

*Onychium moupinense* Ching

植物名 木坪金粉蕨《中国植志》

药材名 解毒蕨《神农架药录》

文献名 木坪乌蕨《蕨类图谱》, 宝兴金粉蕨《蕨类名称》

功效 全草: 清热解毒。

#### 5030019

*Onychium tenuifrons* Ching

植物名 蚀盖金粉蕨《蕨类名称》

文献名 狭叶金粉蕨《贵州药录》

功效 全草: 清热解毒, 利尿止血。用于疮毒, 小便不利。

### 5031 铁线蕨科 Adiantaceae

#### 5031001

*Adiantum bonatianum* Brause

植物名 毛足铁线蕨《中国植志》

药材名 毛足铁线蕨《药用抱植》

地方名 四川: 猪鬃草。

功效 全草: 清热解毒, 利尿。用于痢疾, 尿路感染, 乳腺炎等。

#### 5031002

*Adiantum capillus-junonis* Rupr.

植物名 团羽铁线蕨《中国植志》

药材名 翅柄铁线蕨《贵州草药》

文献名 乌脚芒、猪毛七、岩浮萍《高植图鉴》, 团羽铁线蕨《植分学报》

地方名 辽宁: 乌脚枪(宽甸); 贵州: 猪鬃草、猪鬃七、四川: 猪毛针(峨眉)。

功效 全草: 清热利尿, 活血通淋。用于痢疾, 血淋, 尿闭, 咳嗽, 伤痛, 乳痈, 瘰疬。

#### 5031003

*Adiantum capillus-veneris* L.

植物名 铁线蕨《中国植志》

药材名 猪鬃草《贵州方药》

地方名 铁丝草(广东、云南、陕西), 猪鬃漆、猪鬃七(贵州、湖北、陕西), 猪毛七(四川、陕西), 水猪毛七(四川、浙江), 石中珠(台湾、江西、四川); 江西: 狼毛漆; 福建: 鱼鳞草、乌脚芒(泉州); 湖北: 猪鬃还阳、铁丝分筋(神农架); 湖南: 青丝还阳, 铁丝路鸡, 碰碰草, 铁光棒, 铁丝分金; 广东: 铁丝芒, 铁线兰, 铁骨狼其, 黑骨狼其, 高脚铁军拐, 乌骨毛, 金钱茛, 面眉笔; 广西: 黑草(南丹); 四川: 小猪毛七, 岩浮萍, 猪毛肺筋草, 石长生; 云南: 猪鬃毛; 其他: 铁线草。

功效 全草: 清热, 消炎, 利尿。用于感冒发热, 肺热咳嗽, 咯血, 乳腺炎, 急性肾炎, 膀胱炎。外用于疔疮。

#### 5031004

*Adiantum capillus-veneris* L. f. *dissectum* (Mart. et Galeot.) Ching

植物名 条裂铁线蕨《中国植志》

文献名 深裂铁线蕨《秦岭植志》

功效 全草: 清热解毒, 软坚。用于颈淋巴结核。

#### 5031005

*Adiantum caudatum* L.

植物名 鞭叶铁线蕨《中国植志》

药材名 鞭叶铁线蕨《贵州草药》

文献名 过坛龙《蕨类志属》, 有尾铁线蕨、过山龙《高植图鉴》, 尾尖铁线草《台湾药植志》

地方名 广西: 孔雀尾(玉林), 两头根(大新), 黑脚蕨(苍梧); 四川: 小猪棕草(米易); 贵州: 岩虱子, 石虱子; 云南: 早猪棕草, 黑鸡脚。

功效 全草: 清热解毒, 利湿消肿。用于乳腺炎, 黄水疮。

#### 5031006

*Adiantum davidii* Franch.

植物名 白背铁线蕨《中国植志》

药材名 猪鬃刚(汇编)

地方名 猪鬃草(四川、贵州), 碎叶猪鬃草(四川、云南); 陕西: 猪鬃七, 铜丝草, 铁丝草; 四川: 猪毛刚; 云南: 小猪宗草。

功效 全草: 清热, 利尿, 通乳。用于膀胱炎, 血淋, 乳腺炎, 乳糜尿, 睾丸炎。

#### 5031007

*Adiantum edentulum* Christ f. *refractum* (Christ) X. Y.

Lin --- *Adiantum refractum* Christ

植物名 蜀铁线蕨《中国植志》

地方名 湖北: 铁线蕨、铁丝蕨(神农架)。

功效 全草: 止血。用于鼻血。

#### 5031008

*Adiantum fimbriatum* Christ --- *A. smithianum* (C. Chr.) Ching

1 长盖铁线蕨《蕨类名称》

1 长盖铁线蕨《药用抱植》

全草: 利尿, 祛痰, 通经。用于尿路感染, 支

月经不调等。

1 flabellulatum L.

1 扇叶铁线蕨《中国植志》

药材名: 乌脚枪(汇编)

文献名 过坛龙《名实图考》, 铁线草、黑骨芒、秧田草《岭南采药录》, 铁鲁其、乌蝇翼、小熊胆《岭南草药志》

地方名 乌脚鲁其(江西、广东、广西), 乌脚笔(福建、广东), 乌脚鸡(浙江、广西), 黑脚蕨(广东、广西), 黑骨芒其(湖南、广东), 铁脚鲁其(江西、广东), 铁罩篱、铁爪篱(安徽、江西、广东), 铁线蕨(安徽、广东); 浙江: 铁脚狼其, 铁狼其, 双甲草, 鸡骨草, 五爪蕨; 江西: 牛牙草(会昌), 黑骨鲁其、乌骨鲁其、乌足鲁其、金花鲁其(信丰); 湖南: 鸡爪莲, 鸡爪蕨(通道), 和粗油(汝桂), 铁线路其(衡山); 广东: 铁线网(电白、徐闻、海康、廉江、遂溪), 铁芦根(乐昌), 铁扫鲁其, 铁扫留(兴宁), 钱牌草(始兴), 黑骨狼其(增城、东莞、台山、新会), 黑脚 高州、化州、茂名、化县), 黑脚差(新兴), 黑骨全

串草(高要), 黑骨仔、铁骨仔(阳春), 黑骨草, 黑脚鲁箕, 黑线蕨、乌枪炮(广州), 乌脚塔、乌鲁箕(五华), 乌脚芒(阳江), 乌骨狼其草(从化), [龙鳞草]、[半连连]、钱串草、指甲草(惠阳); 海南: 铁骨草(儋县、琼中、乐东), 黑骨望(澄迈、琼海), 鸡尾草(临高); 广西: 五爪黑蕨, 螺厝蕨(南宁), 螺厝黑脚蕨, 扁叶铁线蕨, 黑骨蕨; 四川: 旱猪毛七, 黑足蕨, 大猪毛七、大猪毛芒(重庆), 猪毛肺筋草, 猪毛七; 云南: 猪棕草, “牙呼语”(西双版纳傣语)。

**功效** 全草: 清热利湿, 解毒, 去瘀消肿。用于感冒发热, 肝炎, 痢疾, 肠炎, 泌尿系结石, 跌打肿痛, 骨折。外用于疔疮, 烧烫伤, 蛇咬伤。

#### 5031010

*Adiantum gravesianum* Hance

植物名 白垩铁线蕨(蕨类名称)

地方名 贵州: 猪鬃草。

**功效** 全草: 清热解毒, 利水通淋。用于血淋, 乳腺炎, 睾丸炎, 乳糜尿, 膀胱炎, 吐血。

#### 5031011

*Adiantum malesianum* Ghatak

植物名 假鞭叶铁线蕨(蕨类名称)

地方名 贵州: 岩风子。

**功效** 全草: 用于淋症, 水肿, 乳癌, 疮毒。

#### 5031012

*Adiantum monochlamys* Eaton

植物名 单盖铁线蕨(中国植志)

药材名 石长生(本经)、(台湾药植志)

文献名 丹草(本经), 丹沙草(纲目), 红茂草、黔筋草(新纲), 通仙草、丹阳草(和汉药物学)

地方名 江西: 生肌草, 石中珠; 四川: 岩浮萍, 猪毛七, 猪宗草, 猪毛脚筋草, 水猪毛七; 其他: 铁线草; 贵州: 老虎草(水城)。

**功效** 根茎、叶: 有小毒。清热解毒, 消炎化痰。用于肺热咳嗽, 感冒, 肺结核吐血, 疥癣, 痈肿, 疔毒, 恶疮, 高热, 淋浊, 痢疾等。

#### 5031013

*Adiantum myriosorum* Bak.

植物名 灰背铁线蕨(中国植志)

药材名 铁扇子(四川中草)

地方名 过坛龙(四川、贵州); 湖北: 铁线还阳草(鹤峰), 猪毛七(恩施), 铁扫帚(兴山、巴东), 铁丝伸筋、铁线七(神农架); 四川: 铁杆猪毛七, 细蕨其, 蕨其莲, 铁拐耙(峨眉山)。

**功效** 全草: 清热利水。用于烫火伤, 跌打损伤, 小便癃闭, 冻疮。

#### 5031014

*Adiantum pedatum* L.

植物名 掌叶铁线蕨(中国植志)

药材名 铁丝七(陕西中草药)

文献名 鬼扇草(纲目拾遗), 铁线蕨草(台湾药植志)

地方名 铁丝草(陕西、甘肃); 陕西: 铜丝草(镇坪、

太白), 铁筷子(太白), 猪宗七(眉县); 甘肃: 过坛龙; 江西: 乌脚枪; 四川: 猪毛七, 铁扇子; 西藏: 铁线草, 铁线蕨, “热惹琼瓦”(藏名)。

**功效** 全株: 利水, 除湿, 通淋, 调经, 止痛。用于小便不利, 淋症, 血尿, 痢疾, 风湿肿痛, 月经不调, 崩漏, 白带, 牙痛。

#### 5031015

*Adiantum philippense* L.

植物名 半月形铁线蕨(中国植志)

药材名 黑龙丝(云南药录)

文献名 非岛铁线蕨(蕨类图说)

地方名 铁线蕨(广西、云南); 台湾: 龙兰草, 龙鳞草; 广西: 骨榜他(龙州); 云南: 白马分鬃, 猪鬃草。

**功效** 全草: 活血祛瘀, 利尿通乳, 止咳。用于乳汁不通, 乳腺炎, 膀胱炎, 尿道炎, 发热, 咳嗽, 产后瘀血, 血崩, 毒蛇咬伤。

#### 5031016

*Adiantum reniforme* L. var. *sinense* Y. X. Lin

植物名 荷叶铁线蕨(中国植志)

药材名 荷叶铁线蕨(药用抱植)

地方名 四川: 荷叶金钱草(万县)。

**功效** 全草: 清热解毒, 利尿通淋。用于肝炎, 尿路结石, 泌尿系感染, 中耳炎等。

#### 5031017

*Adiantum roborowskii* Maxim.

植物名 陇南铁线蕨(中国植志)

地方名 湖北: 铁子分筋(神农架)。

**功效** 全草: 止血。用于鼻衄。

#### 5031018

*Adiantum soboliferum* Wall. ex Hook.

植物名 翅柄铁线蕨(中国植志)

药材名 翅柄铁线蕨(药植简编)

**功效** 全草: 用于肺热咳嗽。

### 5032 水蕨科 Parkeriaceae

#### 5032001

*Ceratopteris pteridoides* (Hook.) Hieron. --- *Parkeria pteridoides* Hook. --- *Ceratopteris parkeri* J. Sm. --- *C. thalictroides* Tard. -Blot et C. Chr.

植物名 粗梗水蕨(中国植志)

药材名 水蕨(拟)

**功效** 茎叶: 用于胎毒, 消痰积。

#### 5032002

*Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn. --- *C. siliquosa* (L.) Copel.

植物名 水蕨(中国植志)

药材名 水蕨(纲目)、(汇编)

文献名 莛(吕氏春秋), 龙须菜(名实图考)

地方名 浙江: 水柏(宁波); 福建: 铁罗汉(泉州); 台湾: 水芹菜; 广西: (龙牙草), 水松草, 水铁树(贵县), 水扁柏(昭平), 水柏枝(平南)。

**功效** 全草: 活血, 解毒。用于痞积, 痢疾, 胎毒,

跌打损伤。

### 5033 裸子蕨科 *Gymnogrammaceae*

#### 5033001

*Coniogramme affinis* Hieron.

植物名 尖齿凤丫蕨《中国植志》

文献名 尖叶凤丫蕨《峨眉药植资源》

地方名 四川：马肋巴(峨眉山)。

功效 根茎：解毒消炎，强筋骨。

#### 5033002

*Coniogramme intermedia* Hieron.

植物名 普通凤丫蕨《中国植志》

药材名 黑虎七(陕西)、《汇编》

文献名 华凤丫蕨《蕨类图谱》，中华凤丫蕨《蕨类图说》，铁杆七《汇编》

地方名 黑龙七(陕西、湖北)；北京：菜中菜(房山)；陕西：竹节七(陇县)，称杆七，大风尾草，扇子七(镇坪)，大叶狗牙七；湖北：蕨鸡七(巴东)，大线鸡尾(鹤峰)；四川：金鸡草，过山龙，马力跨；贵州：老虎草(水城)。

功效 根茎：祛风湿，强筋骨，理气，活血。用于风湿性关节炎，腰痛，白带，跌打损伤。

#### 5033003

*Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels --- *Noto-gramme japonica* Presl

植物名 凤丫蕨《中国植志》

药材名 散血莲(江西、湖南)

文献名 [蛇眼草]《台湾药植志》，金引草(牧野日图)，日本凤丫蕨《台湾植志》

地方名 浙江：大叶凤凰尾巴草(临安)；湖南：活血莲(常德)；广西：铁蕨(金秀)，羊角草(阳朔)；贵州：眉凤草(荔波)。

功效 根茎及全草：祛风除湿，活血止痛，清热解毒。用于风湿筋骨痛，跌打损伤，瘀血腹痛，经闭，目赤肿痛，肿毒初起，乳腺炎。

#### 5033004

*Coniogramme rosthornii* Hieron.

植物名 乳头凤丫蕨《中国植志》

地方名 湖北：蕨鸡根、蕨鸡七(神农架)。

功效 根茎：用于腿痛。

#### 5033005

*Coniogramme sinensis* Ching

植物名 紫柄凤丫蕨《中国植志》

地方名 四川：马力跨、马肋巴(峨眉山)。

功效 根茎：清热解毒，凉血，强筋骨。

#### 5033006

*Gymnopteris bipinnata* Christ

植物名 川西金毛裸蕨《中国植志》

地方名 湖北：败毒草(神农架)。

功效 全草：解毒止痒。

#### 5033007

*Gymnopteris bipinnata* var. *auriculata* (Franch.) Ching

植物名 耳羽金毛裸蕨《中国植志》

药材名 败毒草《陕西中草药》

文献名 耳羽金毛裸蕨《高植图鉴》，耳形川西金毛裸蕨《秦岭植志》

地方名 贵州：石龙草(盘县)。

功效 全草：解毒止痒。用于风毒疮痒。

#### 5033008

*Gymnopteris vestita* (Wall. ex Presl) Underw.

植物名 金毛裸蕨《中国植志》

药材名 草蚂蚱莲《汇编》

文献名 象牙七《云南药录》

地方名 云南：土知母、毛茛蕨、龙头凤尾(昆明)，联公七，猫耳朵草。

功效 根茎：消炎，退热。用于伤寒高热；全草：用于胃气痛。

### 5034 车前蕨科 *Antrophyaceae*

#### 5034001

*Antrophyum obovatum* Bak.

植物名 长柄车前蕨《蕨类名称》

地方名 四川：金线标。

功效 全草：消炎，利关节。用于扁桃体炎，关节炎等。

#### 5034002

*Antrophyum reticulatum* (Forst.) Kaulf.

植物名 网状车前蕨《药植简编》

药材名 车前蕨《广西药录》

地方名 广西：水知母(龙州)。

功效 全草：用于热咳。

### 5035 书带蕨科 *Vittariaceae*

#### 5035001

*Vittaria filipes* Christ

植物名 细柄书带蕨《蕨类名称》

地方名 广西：回阳生(资源)。

功效 全草：活血止痛。用于跌打损伤，筋骨疼痛。

#### 5035002

*Vittaria flexuosa* Fee

植物名 书带蕨《蕨类名称》

药材名 书带蕨《浙江天目药志》

地方名 浙江：木莲金(天目山)；湖北：马尾还阳、霸王鞭(神农架)；湖南：石韭菜，大金刀，羊胡草，龙须，蛇舌草；广西：晒不死(平南)，柳叶蕨(龙胜)；四川：金线标(峨眉)；云南：热疾药，“衣雌吃那雌”(元江哈尼语)。

功效 全草：用于热淋。

#### 5035003

*Vittaria fudzinoi* Makino --- *Vittaria suberosa* Christ

植物名 平肋书带蕨《蕨类名称》

药材名 树韭菜《贵州民间药物》

地方名 浙江：木莲金(临安)；湖北：霸王鞭(神农架)；贵州：龙须草(都匀、独山、安顺)，气虎草。

功效 全草;理气,活血,止痛。用于胃痛,筋骨疼痛。

## 5035004

*Vittaria modesta* Hand.-Mazz.

植物名 小叶书带蕨《蕨类名称》

文献名 矮叶书带蕨《药用泡植》

功效 全草;舒筋活络。外用于跌打损伤,骨折等。

## 5036 蹄盖蕨科 Athyriaceae

## 5036001

*Allantodia chinensis* (Bak.) Ching

植物名 中华短肠蕨《蕨类名称》

功效 根茎;清热利湿。用于流行性感冒等。

## 5036002

*Allantodia dilatata* (Bl.) Ching --- *A. crinipes* (Ching) Ching

植物名 毛柄短肠蕨《蕨类名称》

文献名 膨大短肠蕨《植分学报》,大叶双囊蕨《台湾药植志》

地方名 广西;贯众(贵县)。

功效 根茎;清热利湿。用于流感等。

## 5036003

*Athyriopsis japonica* (Thunb.) Ching --- *Diplazium japonicum* (Thunb.) Bedd.

植物名 假蹄盖蕨《蕨类名称》

文献名 小叶凤凰尾巴草《浙江天目药志》,华东假蹄盖蕨、日本双盖蕨、日本假蹄盖蕨《药植简编》

功效 根茎、全草;用于目赤肿痛,肿毒初起,乳痈等。

## 5036004

*Athyrium brevifrons* Nakai --- *A. rubripes* Kom.

植物名 短叶蹄盖蕨《蕨类名称》

文献名 东北蹄盖蕨《高植图鉴》

地方名 河北;贯众(宣化)。

功效 根茎;止血。用于外伤出血。

## 5036005

*Athyrium delavayi* Christ

植物名 翅轴蹄盖蕨《蕨类名称》

地方名 四川;小旋鸡尾,细股黄连。

功效 根茎;消炎,杀菌。

## 5036006

*Athyrium goringianum* (Kze.) Moore --- *Aspidium goringianum* Kze.

植物名 细叶蹄盖蕨《蕨类名称》

药材名 大地柏枝《汇编》

文献名 贵州蹄盖蕨《药用泡植》,柯氏蹄盖蕨、东南蹄盖蕨《药植简编》

地方名 贵州;散柏枝,山柏。

功效 全草;解毒,止血。用于疮毒,痢疾,衄血。

## 5036006a

*Athyrium iseanum* Ros.

植物名 长江蹄盖蕨《蕨类名称》

地方名 江西;散柏枝,山柏,大地柏枝。

功效 全草;解毒,止血。用于疮毒,痢疾,鼻衄。

## 5036007

*Athyrium multidentatum* (Doell.) Ching

植物名 多齿蹄盖蕨《蕨类名称》

药材名 猴腿蹄盖蕨(辽宁、河北)

地方名 辽宁;猴腿(宽甸);河北;贯众。

功效 根茎;清热解毒。

## 5036008

*Athyrium nipponicum* (Mett.) Hance

植物名 华东蹄盖蕨《蕨类名称》

地方名 [金毛狗脊](华南);河北;野鸡膀子;山东;贯众(青岛);浙江;小叶山鸡尾巴草(临安);河南:[黑狗脊]。

功效 根茎或全草;清热解毒,消肿,止血。用于疮毒疖肿,衄血。

## 5036009

*Athyrium sinense* Rupr.

植物名 中华蹄盖蕨《蕨类名称》

文献名 狭叶蹄盖蕨《鉴别手册》

地方名 黑狗脊(陕西、山西、河南);河北;贯众;山西:[狗脊]。

功效 根茎;清热解毒。

## 5036010

*Athyrium strigillosum* (Wall.) Moore

植物名 软刺蹄盖蕨《蕨类名称》

文献名 糙毛蹄盖蕨《药植简编》,粗毛蹄盖蕨《药用泡植》

功效 全草;清热解毒,收敛止血。用于下肢疖肿,外伤出血。

## 5036011

*Athyrium subsinensis* Ching

植物名 蹄盖蕨《鉴别手册》

地方名 山西:[狗脊],[黑狗脊]。

功效 根茎;清热解毒。

备考 在山西充黑狗脊用。

## 5036012

*Athyrium yokoscense* (Fr. et Sav.) Christ

植物名 横须贺蹄盖蕨《蕨类名称》

文献名 禾秆蹄盖蕨《高植图鉴》,尖裂蹄盖蕨《药用泡植》

功效 根茎;解毒,止血。用于外伤出血等。

## 5036013

*Diplazium donianum* (Mett.) Tard. Biot

植物名 双盖蕨《蕨类名称》

文献名 金鸡尾《名实图考》,大羽双盖蕨《药植简编》

地方名 广西;梳篦叶(南宁)。

功效 全草;用于痛经,黄疸,外伤出血,蛇伤。

## 5036014

*Diplazium esculentum* Sw. --- *Callipteris esculenta*

(Retz.) J. Sm.

植物名 食用双盖蕨《台湾药植志》  
文献名 菜蕨《高植图鉴》  
地方名 台湾:过山猫,蕨猫,过沟菜。  
功效 嫩叶:解热。

**5036015***Diplazium zeylanicum* (Hook.) Moore

植物名 裂叶双盖蕨《高植图鉴》  
文献名 锡兰双盖蕨《蕨类名称》  
功效 全草:清热凉血,利尿通淋。用于尿路感染,肺结核咳血,乳腺炎等。

**5036016***Dryoathyrium boryanum* (Will.) Ching

植物名 介蕨《蕨类名称》  
地方名 贵州:贯众。  
功效 根茎:清热凉血,解毒杀虫。用于钩虫病,子宫出血,流感。

**5036017***Dryoathyrium henryi* (Bak.) Ching

植物名 鄂西介蕨《蕨类名称》  
地方名 湖北:蕨草根、蕨草(神农架)。  
功效 根茎:杀虫,解毒。

**5036018***Dryoathyrium okuboanum* (Makino) Ching

植物名 华中介蕨《蕨类名称》  
药材名 小叶山鸡尾巴草《浙江天目药志》  
文献名 深裂介蕨《药用孢植》,大久保横蕨《药植简编》  
地方名 浙江:横蕨。  
功效 叶:用于下肢疖肿。

**5036019***Lunathyrium acrostichoides* (Sw.) Ching --- *Athyrium acrostichoides* (Sw.) Diels

植物名 蛾眉蕨《蕨类名称》  
药材名 贯众《本经》、《汇编》  
文献名 亚美蹄盖蕨《中药志》,亚美蛾眉蕨《植分学报》,蛾眉蕨贯众《中药大辞典》  
地方名 河南:神箭根,小贯众(豫北、林县)。  
功效 根茎及叶柄残基:有小毒。清热解毒,止血。

**5036020***Lunathyrium giraldii* (Christ) Ching --- *Athyrium giraldii* Christ

植物名 陕西蛾眉蕨《高植图鉴》  
地方名 宁夏:贯众。  
功效 根茎及叶柄基:清热解毒。

**5036021***Lunathyrium vegetius* (Kitagawa) Ching --- *Athyrium pycnosorum* Christ var. *vegetius* Kitagawa

植物名 河北蛾眉蕨《秦岭植志》  
药材名 贯众(甘肃天水)  
功效 根茎及叶柄基:清热解毒。

**5036022***Triblennum lancea* (Thunb.) Ching --- *Diplazium subsinuatum* (Wall.) Tagawa - *D. lanceum* (Thunb.) Presl

植物名 假双盖蕨《蕨类名称》  
药材名 篦梳剑《福建中草药》  
文献名 单叶双盖蕨《高植图鉴》,单叶假双盖蕨《贵州药录》

地方名 矛叶蹄盖蕨(浙江、广西),小石剑(浙江、福建);浙江:石簪(临安);江西:石剑刀、一枝枪(石城),化骨丹,眉化早星,秤钩风;福建:宜青剑,水剑,单叶草,七星剑;湖南:剑叶卷莲,分金草,叶下青,小金刀,天蜈蚣,青根;广东:归门草、关门草(惠阳),蛇轮草,真身凤尾草,伤寒草,独叶蕨,两面剑;广西:山鸭蕨,手指甲,手甲草(岑溪),舌子风,联铁草,斩蛇剑(藤县);贵州:小连铁草,小粘铁草。

功效 全草:凉血,止血,利尿通淋。用于肺结核咳痰带血,热淋尿血,目赤肿痛。

**5037 肿足蕨科 Hypodematiaceae****5037001***Hypodematum crenatum* (Forsk.) Kuhn

植物名 肿足蕨《蕨类名称》  
药材名 肿足蕨《汇编》  
文献名 金丝矮陀陀《名实图考》  
地方名 (金毛狗)、(金毛狗脊)(河南、云南);河南:活血草,石猪鬃;广西:青蕨(陆川),小金狗(阳朔);四川:金毛狮子草;贵州:黄鼠狼;云南:松笔头,大搜山虎(昆明)。  
功效 全草或根茎:祛风利湿,止血,解毒。用于风湿关节痛。外用于疮毒。外伤出血。

**5037002***Hypodematum eriocarpum* (Wall.) Ching

植物名 光柄肿足蕨《蕨类名称》  
文献名 光轴肿足蕨《高植图鉴》  
地方名 湖北:金毛蕨(神农架);贵州:小黄鼠狼。  
功效 根茎:清热止痢。

**5038 金星蕨科 Thelypteridaceae****5038001***Ampelopteris prolifera* (Retz.) Cop.

植物名 星毛蕨《蕨类名称》  
功效 全草:清胃热,止痢。用于痢疾,胃炎等。

**5038002***Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai

植物名 渐尖毛蕨《蕨类名称》  
药材名 渐尖毛蕨《浙江天目药志》  
文献名 金星草《名实图考》,尖羽毛蕨《广西药录》  
地方名 浙江:小叶凤凰尾巴草;台湾:“可布可”(高山族语);广西:小水火蕨(北流)。  
功效 根及全草:消炎,健脾。用于烫伤,疳积等。

**5038003**



*Cyclosorus aridus* (Don) Tagawa

植物名 干旱毛蕨《蕨类名称》

地方名 广西:凤尾草(玉林)。

功效 茎、叶:清热解毒,止痢。用于细菌性痢疾。

#### 5038004

*Cyclosorus dentatus* (Forsk.) Ching

植物名 齿牙毛蕨《蕨类名称》

药材名 篦子舒筋草《四川中草》

地方名 广西:凤尾草(百色);四川:牛肋巴,舒筋草,小牛肋巴(南充)。

功效 根茎:舒筋,活络,散寒。用于风湿性筋骨痛,手指麻木,跌打损伤,瘰癧,痞块;全草:用于痢疾。

#### 5038005

*Cyclosorus gongylodes* (Schkuhr.) Link

植物名 毛蕨《蕨类名称》

地方名 四川:舒筋草,小牛肋巴,篦子草。

功效 全草:祛风除湿,舒筋活络。用于风湿骨节疼痛,肢体麻木。

#### 5038006

*Cyclosorus parasiticus* (L.) Farwell

植物名 华南毛蕨《蕨类名称》

文献名 金星草《药植简编》,密毛小毛蕨《台湾植志》

地方名 四川:冷蕨棵、大风寒(西昌)。

功效 根茎:除湿,止痢。用于风湿关节痛,痢疾。

#### 5038007

*Dictyocline griffithii* Moore

植物名 圣蕨《蕨类名称》

地方名 四川:铁甲草(长宁)。

功效 根茎:用于小儿惊风。

#### 5038008

*Dictyocline sagittifolia* Ching

植物名 戟叶圣蕨《广西药录》

地方名 广西:单叶蕨(金秀)。

功效 根茎:用于小儿惊风。

#### 5038009

*Macrothelypteris oligophlebia* (Bak.) Ching

植物名 针毛蕨《蕨类名称》

地方名 浙江:金鸡尾巴草(天目山),光叶金星蕨。

功效 根茎:清热,解毒,止血,消肿,杀虫。用于烫火伤,外伤出血,疖肿,驱蛔虫等。

#### 5038010

*Macrothelypteris oligophlebia* (Bak.) Ching var. *elegans* (Koidy.) Ching

植物名 雅致针毛蕨《秦岭植志》

文献名 稀毛针毛蕨《中药大辞典》,短毛针叶蕨《安徽采药录》

功效 根茎:用于水湿腹胀,疖毒。

#### 5038011

*Parathelypteris glanduligera* (Kze.) Ching --- *Thelypteris glanduligera* (Kze.) Ching

植物名 金星蕨《蕨类名称》

文献名 腺毛金星蕨《汇编》

地方名 四川:水蕨菜。

功效 叶:清热,止血。用于烫、火伤,吐血。

#### 5038012

*Phegopteris decursive-pinnata* (van Hall) Fee

植物名 延羽卵果蕨《蕨类名称》

地方名 浙江:延羽针毛蕨,狭羽金星蕨,小叶金鸡尾巴草;湖北:金鸡尾巴草根(神农架);广西:细凤尾草(阳朔)。

功效 根茎:利湿消肿,收敛解毒。用于水湿腹胀,疖毒溃烂,久不收口。

#### 5038013

*Pronephrium lakhinoyrense* (Ros.) Holtt.

植物名 红色新月蕨《蕨类名称》

功效 根茎:用于跌打损伤,疮疡肿毒。

#### 5038014

*Pronephrium nudatum* (Roxb.) Holtt. --- *P. multilineata* (Wall.) Ching --- *Abacopteris multilineata* (Wall.) Ching

植物名 多羽新月蕨《蕨类名称》

药材名 铁蕨鸡《贵州草药》

地方名 贵州:大羽新月蕨,散血莲。

功效 根茎:通经活络,理气利湿。用于劳损伤,胃气痛,痢疾,月经不调。

#### 5038015

*Pronephrium penangiana* (Hook.) Holtt. --- *Abacopteris penangiana* (Hook.) Ching

植物名 披针新月蕨《蕨类名称》

药材名 活血莲(湖北、湖南)

地方名 鸡血莲(湖北、湖南、四川),散血莲(湖南、贵州);湖南:土当归;广西:血七(龙胜);四川:过山龙,蕨其钻石黄,地苏木,冷蕨其;贵州:凤尾七,铁板金,铁蕨鸡。

功效 根茎、全草:散瘀血,除湿。用于跌打腰痛,血凝,气滞。

#### 5038016

*Pronephrium simplex* (Hook.) Holtt. --- *Abacopteris simplex* (Hook.) Ching

植物名 单叶新月蕨《蕨类名称》

药材名 草鞋青(广西)、《汇编》

地方名 鹅仔草(广东、广西);广东:方格草(惠阳)。

功效 全草:清热解毒,利咽消肿。用于急性扁桃体炎。

#### 5038017

*Pronephrium triphyllum* (Sw.) Holtt. --- *Abacopteris triphylla* (Sw.) Ching

植物名 三羽新月蕨《蕨类名称》

药材名 三枝标《汇编》

地方名 蛇退步(广东、广西);广东:蛇鳞草,入地蜈蚣;广西:三叉蕨(邕宁)。

功效 全草:解毒,消肿,止痒。用于疮痍肿毒,跌打损伤,水肿,湿疹,皮肤瘙痒。

## 5038018

*Pseudocyclosorus falcilobus* (Hook.) Ching

植物名 镰片假毛蕨《蕨类名称》

文献名 镰形假毛蕨《高植图鉴》

功效 叶：清热解毒，收敛。用于痢疾，肠炎，烫、火伤。

5039 铁角蕨科 *Aspleniaceae*

## 5039001

*Asplenium adiantum-nigrum* L.

植物名 黑色铁角蕨《蕨类名称》

药材名 铁角蕨《台湾药植志》

功效 根茎：可避孕。

## 5039002

*Asplenium austro-chinense* Ching

植物名 华南铁角蕨《蕨类名称》

药材名 华南铁角蕨《贵州药录》

功效 全草：消肿止痛，化湿利尿。用于白浊，前列腺炎，肾炎，烦渴，刀伤出血。

## 5039003

*Asplenium coenobiale* Hance

植物名 线裂铁角蕨《蕨类名称》

文献名 芒头铁角蕨《广西药录》

功效 全草：用于风湿痹痛，小儿麻痹，月经不调。

## 5039004

*Asplenium crinicaule* Hance

植物名 毛轴铁角蕨《蕨类名称》

地方名 贵州：细叶青。

功效 全草：清热解毒，透疹祛瘀。用于麻疹不透，无名毒疮。

## 5039005

*Asplenium ensiforme* Wall.

植物名 剑叶铁角蕨《高植图鉴》

地方名 广西：石浮（金秀）；贵州：阿西得，铁郎鸡。

功效 全草：用于胃脘痛。

## 5039006

*Asplenium falcatum* Lam.

植物名 镰叶铁角蕨《蕨类名称》

文献名 尖叶铁角蕨《广西药录》

地方名 广西：骨把（龙州）。

功效 全草：用于尿路感染，黄疸，高热，烧伤。

## 5039007

*Asplenium griffithianum* Hook.

植物名 厚叶铁角蕨《蕨类名称》

地方名 广西：旋鸡尾。

功效 根茎：清热利尿，消炎。用于黄疸，高热，烧伤等。

## 5039008

*Asplenium incisum* Thumb.

植物名 虎尾铁角蕨《蕨类名称》

药材名 地柏叶《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 万年柏《汇编》

地方名 浙江：丹雪凤尾，伤寒草，石蜈蚣，小叶凤尾草，小雄鸡尾，墙锦，岩春草（龙泉），洞里仙，止血丹（长兴），虎尾蕨；江西：石洞山。

功效 全草：清热，利湿，镇惊，解毒。用于肺热咳嗽，吐血，急性黄疸型肝炎，指头炎。

## 5039009

*Asplenium normale* Don

植物名 倒挂铁角蕨《蕨类名称》

地方名 倒挂草（广西、四川）。

功效 全草：清热解毒，止血。用于蜈蚣咬伤，外伤出血，痢疾等。

## 5039010

*Asplenium pekinense* Hance

植物名 北京铁角蕨《蕨类名称》

药材名 铁杆地柏枝《汇编》

文献名 万年柏《名实图考》

地方名 陕西：地柏枝，小叶鸡尾草，小凤尾草，大肥草（眉县），一柱香（陇县）；河南：血腥草（禹州）；四川：麻疮药（峨眉山）。

功效 全草：化痰止咳，止血。用于外感咳嗽，肺结核。外用于外伤出血。

## 5039011

*Asplenium planicaule* Wall. --- *A. yoshinagae* Makino var. *indicum* (Sledge) Ching et S. K. Wu

植物名 胎生铁角蕨《蕨类名称》

文献名 扁柄铁角蕨《蕨类图说》

地方名 铁骨连（四川、贵州）；湖北：孔雀尾、孔雀蕨（神农架）。

功效 全草：舒筋活血。用于腰痛。

## 5039012

*Asplenium praemorsum* Sw.

植物名 西南铁角蕨《蕨类名称》

药材名 凤尾铁角蕨《汇编》

地方名 云南：大猪鬃草，大凤尾草，铁角蕨，扫天晴明草，虎尾蕨（昆明）。

功效 全草：消炎，清热，利尿。用于痢疾，肠炎，咽喉炎，淋巴腺炎，膀胱炎，尿道炎，腱鞘炎。

## 5039013

*Asplenium prolongatum* Hook.

植物名 长生铁角蕨《蕨类名称》

药材名 定草根《云南中草药》

文献名 倒水莲《草木便方》，长叶铁角蕨《高植图鉴》，铁扁担《药植简编》

地方名 倒生根（湖南、广西）；湖北：青丝还阳；湖南：金鸡尾，黄金草，铁蕨菜，线鸡尾，野鸡尾，大血草，仙人架桥；广西：花老鼠，尾生根，石上凤尾草，凤凰尾（环江）；四川：倒生莲，树林珠（峨眉），二面快；贵州：盘龙莲；云南：刷把草（昭通）。

功效 全草：清热除湿，活血化痰，止咳化痰，利尿通乳。用于风湿疼痛，肠炎，痢疾，尿路感染，咳嗽痰多，跌打损伤，吐血，崩漏，乳汁不通。外用于骨折，创伤出血。

## 5039014

*Asplenium pseudolaserpitiifolium* Ching

植物名 大羽铁角蕨《蕨类名称》

地方名 福建:乌骨凤尾草。

功效 全草:强腰膝,驱风湿。用于腰腿痛和风湿关节炎。

## 5039015

*Asplenium ruta-muraria* L.

植物名 卵叶铁角蕨《蕨类名称》

文献名 银杏叶铁角蕨《台湾药植志》

功效 全草:清热利尿,活血通淋,祛痰。

## 5039016

*Asplenium sampsonii* Hance

植物名 岭南铁角蕨《蕨类名称》

地方名 广西:肥蕨。

功效 全草:清热化痰,止咳止血。用于痢疾,感冒,咳嗽,外伤出血等。

## 5039017

*Asplenium sarelii* Hook.

植物名 华中铁角蕨《蕨类名称》

药材名 地柏叶《汇编》

文献名 小蕨、青旗草、见血生《蕨类图说》

地方名 浙江:凤尾蕨;福建:野鸡尾;湖北:解毒蕨、土黄连(神农架);湖南:碎叶金花,退血草,地侧柏,小凤尾草,细金鸡尾,细叶野鸡尾,细叶路鸡,小野鸡尾,大叶胡黄连,线鸡尾,孔雀尾;广西:矮金花草(马山),小旋鸡尾(凤山);贵州:地柏枝,痢药;其他:金花草,凤凰尾,避风草,奶子草,石灰草。

功效 全草:清热解毒,止咳利咽,利湿消肿,止血止痛。用于流感,感冒,咳嗽,扁桃体炎,腮腺炎,目赤肿痛,肠炎,痢疾,乳汁不下。外用于疮肿疔毒,跌打损伤,湿疹,烧、烫伤,刀伤出血。

## 5039018

*Asplenium saxicola* Ros.

植物名 石生铁角蕨《蕨类名称》

文献名 粤铁角蕨《药植简编》

地方名 广西:鸡心草(桂林)。

功效 全草:清热润肺。用于肺结核,膀胱炎等。

## 5039019

*Asplenium tenuifolium* Don

植物名 细裂铁角蕨《蕨类名称》

文献名 火烧草《药植简编》

功效 全草:外用于刀伤出血,烫、火伤。

## 5039020

*Asplenium trichomanes* L.

植物名 铁角蕨《蕨类名称》

药材名 铁角凤尾草《名实图考》、《汇编》

地方名 石林珠(浙江、四川),金星草(浙江、陕西),一点血(浙江、湖南),蕨蕨(安徽、江西);陕西:猪鬃七,角蕨苗,角鸡苗,野川连;浙江:瓜子莲(临安),洞里仙(杭州、上虞、天台、仙居),石蜈蚣(诸暨),止血草,鸡毛草,鹿仙草,凤凰尾,凤尾蕨,乌骨草,铁狼衣;安徽:小

儿惊风草;江西:救死护伤,蜈蚣赶蛇(铜鼓),石上蜈蚣赶蛇;湖北:猪毛七(神农架);湖南:凤尾草,野鸡尾,金鸡两头连,岩间生,铁线路鸡,篦子草,蜈蚣草,小金鸡尾;广西:石壁连(阳朔),一扫光(龙胜)。

功效 全草:清热解毒,调经止血,收敛止带。用于小儿高热,白带,月经不调。外用于烧、烫伤,疮肿毒,毒蛇咬伤。

## 5039021

*Asplenium tripteropus* Nakai

植物名 三翅铁角蕨《高植图鉴》

功效 全草:利水通淋。用于腰痛,跌打损伤。

## 5039022

*Asplenium varians* Wall. ex Hook. et Grev.

植物名 变异铁角蕨《蕨类名称》

药材名 九倒生《贵州民间药物》

地方名 湖南:铁扫把,铁蕨草,斧头脑,线鸡尾,金鸡尾;贵州:铁狼蕨。

功效 全草:外用于刀伤,骨折。

## 5039023

*Asplenium wrightii* Eaton ex Hook.

植物名 狭翅铁角蕨《蕨类名称》

地方名 广西:人头发(金秀)。

功效 根茎:用于疮疡肿毒。

## 5039024

*Asplenium yunnanense* Fr. --- *Asplenium exiguum* auct. non Bedd.

植物名 云南铁角蕨《中药大辞典》

药材名 猪鬃凤尾草《昆明民药》

文献名 小铁角蕨《药植简编》,低头铁角蕨《蕨类名称》

地方名 云南:凤尾草,小凤尾草,小蕨蕨(红河),早明琼、云南虎尾蕨(昆明)。

功效 全草:清热,利尿,通乳。用于膀胱炎,血淋,乳腺炎,乳汁不通,乳糜尿,睾丸炎。

备考 《植分学报》(1985)称:*Asplenium exiguum* Bedd. 中国不产,过去鉴定为本种的,均为云南铁角蕨之误。

## 5039025

*Camptosorus sibiricus* Rupr.

植物名 过山蕨《蕨类名称》

药材名 马鞭草《河南中草》

地方名 河南:过桥草。

功效 全草:止血消炎,活血散瘀。用于外伤出血,子宫出血,血栓闭塞性脉管炎等。

## 5039026

*Ceterach officinarum* DC.

植物名 药蕨《蕨类名称》

功效 全草:止痢,通淋,散瘀,止痛。

## 5039027

*Neortopteris antrophyoides* (Christ) Ching

植物名 狭基巢蕨《蕨类名称》

文献名 斩龙剑《药植简编》,斩妖剑《药用抱植》

地方名 广西:真武剑(恭城、兴安),大瓦韦(南宁);贵州:老鹰七。

功效 全草:清热解毒,利尿通淋。用于急慢性肾炎,尿路感染。

## 5039028

*Neottopteris marlipoense* Ching

植物名 麻栗坡巢蕨(药植简编)

地方名 广西:[石韦](贵县)。

功效 全草:利水,通淋。

## 5039029

*Neottopteris nidus* (L.) J. Sm. --- *Asplenium nidus* (L.)

J. Sm. --- *Neottopteris rigida* (L.) J. Sm.

植物名 巢蕨(蕨类名称)

药材名 铁蚂蟥(云南)

地方名 台湾:山苏花,歪头菜;广西:雀巢蕨,牛脚芝,七星箭,公鸡尾;云南:尖刀如意散。

功效 全草:强筋壮骨,活血祛瘀。用于跌打损伤,骨折,阳痿等。

## 5039030

*Sinephropteris delavayi* (Fr.) Mickel

植物名 水鳖蕨(蕨类名称)

地方名 贵州:水客妈菜。

功效 全草:收敛止血。用于痢疾。

## 5041 球子蕨科 Onocleaceae

## 5041001

*Matteuccia intermedia* C. Chr.

植物名 中华荚果蕨(蕨类名称)

地方名 湖北:贯众,紫萁(神农架)。

功效 根茎:清热解毒,杀虫。

## 5041002

*Matteuccia orientalis* (Hook.) Trev.

植物名 东方荚果蕨(蕨类名称)

文献名 狗脊(本草图谱)

地方名 江西:贯众;湖北:毛贯众。

功效 全草:祛风止血。用于创伤出血;根茎:用于风湿痛。

## 5041003

*Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro

植物名 荚果蕨(蕨类名称)

药材名 荚果蕨贯众(中草药学)

文献名 贯众(图经),毛贯众(蕨类志属),小叶贯众(秦岭植志)

地方名 野鸡膀子(北京、河北),贯仲、黄瓜香(东北);河南:鬼箭;四川:凤头蕨(峨眉山)。

功效 根茎:清热解毒,止血。

## 5041004

*Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro var. *acutiloba* Ching

植物名 尖裂荚果蕨(秦岭植志)

功效 根茎:有小毒。清热解毒,止血。用于预防流行性感冒,麻疹,流行性乙型脑炎,流行性腮腺炎,便

血,尿血,鼻蛆。

## 5041005

*Onoclea interrupta* (Maxim.) Ching et Chiu --- *O. sensibilis* L. var. *interrupta* Maxim.

植物名 球子蕨(蕨类名称)

文献名 间断球子蕨(秦岭植志)

功效 根茎:清热解毒。北方有作贯众入药者。

## 5042 乌毛蕨科 Blechnaceae

## 5042001

*Blechnum orientale* L.

植物名 乌毛蕨(蕨类名称)

药材名 乌毛蕨贯众(中草药学)

文献名 黑狗脊(岭南采药录),东方乌毛蕨(蕨类志属),葵扇乌毛蕨(指示植物),山蕨猫(台湾药植志)。

地方名 贯众、贯仲、管仲(湖南、广东、广西),红蕨(广东、广西);台湾:山过猫;广东:大贯众,大号凤尾草(陆丰),大叶雄鸡尾(五华),雄鸡尾(高州、茂名),凤尾基(东莞、增城),凤尾毛(潮安),赤蕨(高鹤),赤蕨头,龙船蕨(广州),灵眉毛(普宁),清华蕨(从化);海南:大凤尾(海口、定安);广西:大凤尾草(南宁),葵扇草(临群),铁蕨,黑毛蕨;其他:神箭(叶)。

功效 根茎及叶柄残基:清热解毒;嫩叶:外用于消肿,拔毒,生肌。

## 5042002

*Brainea insignis* (Hook.) J. Smith

植物名 苏铁蕨(蕨类名称)

药材名 苏铁蕨贯众(中药大辞典)

地方名 贯众(广东、广西)。

功效 根茎:用于感冒。

## 5042003

*Chieniopteris harlandii* (Hook.) Ching --- *Woodwardia harlandii* Hook.

植物名 崇澍蕨(蕨类名称)

文献名 羽裂狗脊蕨(高植图鉴)

功效 根茎:祛风除湿。用于关节痛。

## 5042004

*Struthiopteris eburnea* (Christ) Ching --- *Blechnum eburneum* Christ

植物名 荚囊蕨(蕨类名称)

地方名 贵州:篦子草,天鹅抱蛋。

功效 根茎:清热利湿,理气止咳。

## 5042005

*Woodwardia japonica* (L.f.) Smith

植物名 狗脊蕨(蕨类名称)

药材名 贯众(本经)、(汇编)

文献名 狗脊贯众(中药志)

地方名 广西:黄狗蕨(梧州);四川:牛肋扇(峨眉)。

功效 根茎:解毒,祛风湿。用于流感,风湿痹痛,蛇咬伤。

## 5042006

*Woodwardia orientalis* Sw.

植物名 东方狗脊蕨《蕨类名称》  
 文献名 大叶狗脊、镰叶狗脊《药植图鉴》  
 地方名 贯众(湖南、福建);浙江:凤凰尾巴;湖南:老龙骨、狗脊;广西:扁鸡尾(龙胜);其他:凤凰尾。  
 功效 根茎:清热解毒。

## 5042007

*Woodwardia prolifera* Hook. et Arn. --- *W. orientalis* Sw. var. *prolifera* (Hook. et Arn.) Ching

植物名 胎生狗脊蕨《蕨类名称》  
 文献名 多子东方狗脊《蕨类图说》,多子狗脊《药用抱植》  
 地方名 福建:贯众。  
 功效 根茎:清热解毒。

## 5042008

*Woodwardia unigemmata* (Makino) Nakai

植物名 单芽狗脊蕨《蕨类名称》  
 药材名 狗脊贯众《中药志》  
 地方名 贯众(中南、四川);湖北:豆丝蕨、冷蕨(利川)、过冬青;湖南:真虾公草,细叶虎牙风;四川:牛肋扇(峨眉)。  
 功效 根茎及叶柄残茎:清热解毒,杀虫散瘀。用于感冒,疮痈肿毒,虫积腹痛,便血,血崩,预防流感及流行性脑膜炎。

## 5043 岩蕨科 Woodsiaceae

## 5043001

*Woodsia polystichoides* Eaton.

植物名 耳羽岩蕨《蕨类名称》  
 药材名 蜈蚣旗根《中药大辞典》  
 文献名 岩蕨《台湾植志》,蜈蚣旗《浙江天目药志》  
 功效 根茎:活血散瘀。外用于伤筋。

## 5045 鳞毛蕨科 Dryopteridaceae

## 5045001

*Arachniodes amoena* (Ching) Ching

植物名 美丽复叶耳蕨《蕨类名称》  
 药材名 美丽复叶耳蕨《安徽采药录》  
 功效 根茎:祛风散寒。用于关节疼痛。

## 5045002

*Arachniodes chinensis* (Ros.) Ching

植物名 中华复叶耳蕨《蕨类名称》  
 药材名 中华复叶耳蕨《贵州药录》  
 功效 全草:清热解毒,消肿散瘀。

## 5045003

*Arachniodes exilis* (Hance) Ching

植物名 刺头复叶耳蕨《蕨类名称》  
 文献名 复叶耳蕨、具芒汝蕨《药用抱植》  
 功效 根茎:清热收敛。用于痢疾,烫火伤。

## 5045004

*Arachniodes rhomboidea* (Wall.) Ching --- *Rumohra amabilis* Ching

植物名 斜方复叶耳蕨《蕨类名称》

文献名 可爱复叶耳蕨《浙江天目药志》  
 地方名 浙江:大叶鸭脚莲(临安),可爱汝蕨。  
 功效 根茎:用于关节疼痛。

## 5045005

*Arachniodes simplicior* (Makino) Ohwi

植物名 长尾复叶耳蕨《蕨类名称》  
 文献名 稀羽复叶耳蕨《药植简编》,黑狗脊《鉴别手册》  
 地方名 浙江:小叶金鸡尾巴草。  
 功效 根茎:清热解毒。用于内热腹痛。

## 5045006

*Cyrtomium balansae* (Christ) C. Chr.

植物名 镰羽贯众《高植图鉴》  
 文献名 巴兰贯众《蕨类图说》  
 地方名 广西:贯众。  
 功效 根茎:清热解毒。用于流感。

## 5045007

*Cyrtomium balansae* (Chr.) C. Chr. f. *edentatum* Ching

植物名 缺齿镰羽贯众《药植简编》  
 功效 根茎:清热解毒。用于流感。

## 5045008

*Cyrtomium caryotideum* (Wall.) Presl - *Cyrtomium falcatum* auct. non (L. fil) Presl

植物名 刺齿贯众《蕨类名称》  
 药材名 大昏鸡头《汇编》  
 文献名 贯众、蕨薇菜根《滇南本草》,齿缘贯众《华北经植志要》,尖耳贯众《蕨类图说》  
 地方名 江西:大叶兰芝(德兴),大叶鲁其(莲花);四川:大乌骨鸡(峨眉);贵州:牛尾贯众(瓮安);云南:水蕨薇。  
 功效 根茎:解毒,活血,利水。用于颈淋巴结核,疮毒,水肿,崩漏,跌打损伤。

备考 《滇南本草》原整理本第一卷,将本种学名误订为 *C. falcatum* (L. fil) Presl。

5045009

*Cyrtomium devexiscapulae* (Koidz.) Ching

植物名 披针贯众《蕨类名称》  
 药材名 披针贯众《贵州药录》  
 功效 根茎:活血散瘀,利水通淋。用于流感,水肿,跌打损伤,血崩,蛔积。

## 5045010

*Cyrtomium falcatum* (L.) Presl

植物名 全缘贯众《蕨类名称》  
 药材名 小贯众(四川)  
 文献名 贯众《华北经植志要》  
 地方名 广东:凤尾草,贯仲;四川:鸡脑壳,公鸡头,昏鸡头,大乌骨鸡(峨眉);云南:黑狗脊,药蕨。  
 功效 根茎及叶柄残基:有小毒。清热平肝,解毒止血。

## 5045011

*Cyrtomium fortunei* J. Sm.

植物名 贯众《蕨类名称》

药材名 小贯众《汇编》

文献名 贯众《名实图考》,鸡脑壳《草木便方》,鸡公头、鸡头枣、鸡老盖《分类草药性》,鸡头凤尾、乌鸡儿、鸱头鸡《民药汇编》,贯节、贯渠、草鸱头、[黑狗脊]、凤尾草《中国药植志》,镰叶草《中国植物图鉴》

地方名 管仲(安徽、江西、广西、四川),小金鸡尾(浙江、江西、湖南、广东),昏鸡头、乌骨鸡、公鸡头(四川、贵州);陕西:小晕鸡头、小鸡娃草(秦岭);浙江:大叶狼箕、地鸡头、凤凰衣、小叶贯众(金华),小叶山鸡尾、小狼箕、冷水禾、大叶凤凰尾;安徽:野鸡膀子、大叶鲁箕、龙蒿、水蕨其、顶天锤(太和);江西:老虎爪、黑狗脊草、水老鼠(景德),大叶兰芝(德兴);河南:小孩拳(南阳);湖北:鱼公草(神农架);湖南:虾公草、虎牙风、岩壁青、芽叶伸筋、檀木贯众、野鸡尾(衡阳),猫老壳、麻子婆(黔阳),水臣子、野鸡兜子(常德);广西:鸱鸡尾(西林);四川:乳痢草(长寿),田鸡头、鸡头草(南充);贵州:铁狼箕、铁狼鸡;云南:狗脊、蜈蚣草。

功效 根茎及叶柄残基:有小毒。清热平肝,解毒,止血。用于预防麻疹,流行性感冒,感冒,流行性脑脊髓膜炎,头晕目眩,高血压,痢疾,尿血,便血,崩漏,白带。

#### 5045012

*Cyrtomium fortunei* J. Sm. forma *polypterum* (Diels) Ching

植物名 多羽贯众(秦岭植志)

功效 根茎:清热解毒,凉血,降压。用于高血压,头晕头痛。

#### 5045013

*Cyrtomium hookerianum* (Presl) C. Chr.

植物名 尖羽贯众(蕨类名称)

药材名 尖羽贯众(贵州药录)

功效 根茎:活血散瘀,利水通淋。

#### 5045014

*Cyrtomium macrophyllum* (Makino) Tagawa

植物名 大叶贯众(蕨类名称)

文献名 大羽贯众《高植图鉴》

地方名 湖北:鱼公草、鱼公草根(神农架);四川:贯众、大乌骨鸡(峨眉山)。

功效 根茎:清热解毒,杀虫,止血。

#### 5045015

*Cyrtomium macrophyllum* f. *muticum* (Christ) Ching et Shing

植物名 甘肃大叶贯众(拟)

文献名 大叶贯众《蕨类图谱》

功效 根茎:清热解毒,止血。

#### 5045016

*Cyrtomium pachyphyllum* (Rosenst.) C. Chr.

植物名 厚叶贯众(蕨类名称)

功效 根茎:用于流感,蛔虫病。

#### 5045017

*Cyrtomium tukusicola* Tagawa

植物名 齿盖贯众(蕨类名称)

药材名 齿盖贯众《贵州药录》

功效 根茎:活血散瘀,利水通淋。

#### 5045018

*Dryopteris barbigera* (Moore) Ktze.

植物名 多鳞鳞毛蕨(蕨类名称)

文献名 芒齿鳞毛蕨《汇编》,髯毛鳞毛蕨《青藏药图》

地方名 青海:“热热尔”(藏名);云南:贯众。

功效 根茎:清热解暑。

#### 5045019

*Dryopteris bissetiana* (Bak.) C. Chr.

植物名 两色鳞毛蕨(蕨类名称)

药材名 两色鳞毛蕨(贵州药录)

功效 根茎:活血散瘀,利水通淋。用于流感,水肿,跌打损伤,血崩,蛔积。

#### 5045020

*Dryopteris championii* (Benth.) C. Chr. ex Ching

植物名 阔鳞鳞毛蕨(蕨类名称)

药材名 毛贯众(湖南药物志)

文献名 东南鳞毛蕨《浙江药植志》,卵鳞鳞毛蕨《药用抱植》

地方名 贯众(长江中游);湖南:小贯众,〔水龙骨〕,蕨鸡脑,蕨务子;广西:细叶土凤尾(阳朔)。

功效 根茎:清热解毒,止咳平喘。用于预防感冒,气喘,大便下血。

#### 5045021

*Dryopteris chrysocoma* (Christ) C. Chr.

植物名 金冠鳞毛蕨(蕨类名称)

地方名 云南:贯众(丽江)。

功效 根茎:清热解毒。

#### 5045022

*Dryopteris crassirhizoma* Nakai

植物名 绵马鳞毛蕨(蕨类名称)

药材名 绵马贯众《中药志》

文献名 绵马、毛贯众、冷蕨《满洲植汇》,凤尾草、白头草《朝鲜植汇》,连马《朝植乡名》,东绵马、日绵马(李《药植》),粗根鳞毛蕨《经植手册》,鸡膀鳞毛蕨《东北药植志》,粗茎鳞毛蕨《药材学》,绵马羊齿《中国经植志》,贯众、东北贯众、大贯众《汇编》

地方名 野鸡膀子、牛毛黄、牛毛广(东北);吉林:广东菜、猴腿;北京:大管仲;其他:亚洲绵马,朝鲜贯众。

功效 根茎及叶柄基部:有小毒。清热解毒,驱虫,止血。用于防治流感,虫积腹痛,崩漏(用炭);根茎:抗早孕。

#### 5045023

*Dryopteris cycadina* (Fr. et Sav.) C. Chr. --- *Dryopteris atrata* (Wall.) Ching

植物名 暗鳞鳞毛蕨(蕨类名称)

文献名 暗色鳞毛蕨《药用抱植》

地方名 云南:贯众(屏边、贡山)。

功效 根茎:清热解毒。

#### 5045024

*Dryopteris fibrilosa* (Clarke) Hand.-Mazz.

植物名 密鳞鳞毛蕨《蕨类名称》  
文献名 纤毛鳞毛蕨《汇编》  
地方名 云南:贯众。  
功效 根茎:清热解毒。

#### 5045025

*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott

植物名 欧洲鳞毛蕨《蕨类名称》  
药材名 欧绵马《药材学》  
文献名 绵马《汇编》  
地方名 新疆:贯众。  
功效 根茎:清热解毒,杀虫。

#### 5045026

*Dryopteris fuscipes* C. Chr.

植物名 黑足鳞毛蕨《蕨类名称》  
药材名 黑色鳞毛蕨根《中药大辞典》  
地方名 浙江:小叶山鸡尾巴草;其他:山鸡尾草。  
功效 根茎:用于毒疮溃烂久不收口。

#### 5045027

*Dryopteris hwangshanensis* Ching

植物名 黄山鳞毛蕨《浙江天目药志》  
药材名 黄山鳞毛蕨根《中药大辞典》  
地方名 浙江:小叶凤凰尾巴草。  
功效 根茎:用于目赤肿痛。

#### 5045028

*Dryopteris labordei* (Christ) C. Chr.

植物名 齿头鳞毛蕨《蕨类名称》  
文献名 青溪鳞毛蕨《药植简编》  
功效 根茎:用于痢疾,痛经,外伤出血。

#### 5045029

*Dryopteris lacera* (Thunb.) O. Ktze.

植物名 狭顶鳞毛蕨《蕨类名称》  
药材名 熊蕨《国药的药理学》  
地方名 湖北:蕨苣、金鸡脚、熊蕨根(神农架);其他:半边草。  
功效 根茎、叶基:用于驱绦虫。

#### 5045030

*Dryopteris laeta* (Kom.) C. Chr.

植物名 美丽鳞毛蕨《蕨类名称》  
药材名 花叶狗牙七《陕西中草药》  
文献名 华北鳞毛蕨《秦岭植志》  
地方名 山西:狗脊,黑狗脊;陕西:金毛狗脊(宜君、黄陵)。

功效 根茎:除风湿,强腰膝,降血压,清热解毒。用于脊柱疼痛,头晕,高血压。

#### 5045031

*Dryopteris laeta* (Kom.) C. Chr. var. *giraldii* (Christ)

Ching --- *Aspidium filix-mas* var. *giraldii* Christ

植物名 疏羽鳞毛蕨《秦岭植志》  
功效 根茎:除风湿,强腰膝,降压。用于脊柱疼痛,头晕,高血压。

#### 5045032

*Dryopteris lepidopoda* Hayata --- *D. khasiana* (Clarke) Ching

植物名 厚叶鳞毛蕨《蕨类名称》  
文献名 等宽鳞毛蕨《汇编》,喀西鳞毛蕨《云南药录》

地方名 云南:贯众。  
功效 根茎:清热解毒。

#### 5045033

*Dryopteris marginata* (Wall.) Christ

植物名 大叶鳞毛蕨《汇编》  
地方名 云南:湿地贯众,贯众。  
功效 根茎:清热解毒。

#### 5045034

*Dryopteris peninsulae* Kitagawa

植物名 半岛鳞毛蕨《蕨类名称》  
文献名 黑狗脊《鉴别手册》  
地方名 辽东鳞毛蕨(湖南、河南、山东);山东:小贯众(昆崙山);河南:贯众(商城、固始、新县)。  
功效 根茎:清热解毒。

#### 5045035

*Dryopteris uniformis* Makino

植物名 同形鳞毛蕨《蕨类名称》  
功效 根茎:止血,驱虫。用于崩漏,吐血,驱蛔虫,驱绦虫。

#### 5045036

*Dryopteris varia* (L.) O. Ktze.

植物名 变异鳞毛蕨《蕨类名称》  
文献名 异鳞鳞毛蕨《福建植志》  
地方名 浙江:小叶金鸡尾巴草;湖南:贯众。  
功效 根茎:清热解毒。

#### 5045037

*Phanerophlebiopsis blinii* (Levl.) Ching

植物名 粗齿黔蕨《蕨类名称》  
地方名 广西:点星蕨(金秀)。  
功效 根茎:用于腰痛,瘰癧。

#### 5045038

*Polystichum acanthophyllum* (Fr.) Christ

植物名 刺叶耳蕨《蕨类名称》  
药材名 凤尾贯众《昆明民药》  
文献名 贯众耳蕨《药用抱植》  
地方名 云南:贯众。  
功效 全草:用于便血,鼻衄,妇女崩漏。

#### 5045039

*Polystichum aculeatum* (L.) Schott

植物名 皮刺耳蕨《蕨类名称》  
文献名 耳蕨《药植简编》  
功效 根茎:祛风湿,强腰膝,补肝肾。

#### 5045040

*Polystichum acutidens* Christ

植物名 尖齿耳蕨《蕨类名称》  
药材名 尖齿耳蕨《贵州药录》  
功效 全草:清热解毒,收敛止血,止痛。用于胃

痛,肠炎,痢疾。

#### 5045041

*Polystichum amabile* J. Sm.

植物名 美叶凤尾蕨《台湾药植志》

功效 全草:用于含漱剂。

#### 5045042

*Polystichum braunii* (Spenn.) Fee

植物名 棕鳞耳蕨《蕨类名称》

药材名 耳蕨贯众《汇编》

文献名 布朗耳蕨《中药大辞典》

地方名 贯众(黑龙江、山西)。

功效 根茎:清热解暑。

#### 5045043

*Polystichum craspedosorum* (Maxim.) Diels

植物名 鞭叶耳蕨《蕨类名称》

功效 全草:清热解暑。

#### 5045044

*Polystichum deltodon* (Bak.) Diels

植物名 对生耳蕨《蕨类名称》

药材名 灰贯众《湖南药志》

地方名 湖南:蜈蚣草。

功效 全草:活血止痛,消肿,利尿。用于预防流感,跌打损伤,蛇咬伤。

#### 5045045

*Polystichum globosum* Hayata

植物名 台湾大铁蕨《台湾药植志》

功效 根茎:解热。

#### 5045046

*Polystichum hancockii* (Hance) Diels

植物名 小三叶耳蕨《蕨类名称》

地方名 广西:蛇舌草(资源)。

功效 全草:清热解暑。用于蛇咬伤、外伤等。

#### 5045047

*Polystichum lanceolatum* (Bak.) Diels

植物名 披针耳蕨《神农架药录》

药材名 双扣蕨根《神农架药录》

地方名 湖北:双扣(神农架)。

功效 全草:用于肋痛。

#### 5045048

*Polystichum lonchitis* (L.) Roth

植物名 矛状耳蕨《蕨类名称》

文献名 贯众《新疆中草药》

功效 根茎:清热解暑。

#### 5045049

*Polystichum makinoi* Tagawa

植物名 黑鳞耳蕨《蕨类名称》

文献名 黑鳞大耳蕨《浙江药植志》

地方名 浙江:大叶山鸡尾巴草;湖北:金足蕨(神农架)。

功效 根茎:用于痢疾,下肢疖肿。

#### 5045050

*Polystichum neolobatum* Nakai

植物名 新裂耳蕨《浙江天目药志》

文献名 革叶耳蕨《峨眉药植研究》

地方名 浙江:凤凰尾巴草;湖北:娃娃拳(神农架)。

功效 根茎:活血调经,补肾。

#### 5045051

*Polystichum omeiense* C. Chr.

植物名 峨嵋耳蕨《蕨类名称》

药材名 峨眉耳蕨《中国药植志》

文献名 树林株《中国药植志》

地方名 四川:石黄连、[万年青](峨眉山),草苓子。

功效 全草:清热利尿,利水。用于肺热,胃热,小便短赤作痛,大肠火结。

#### 5045052

*Polystichum polyblepharum* (Rom.) Presl

植物名 棕鳞大耳蕨《蕨类名称》

地方名 浙江:大叶金鸡尾巴草。

功效 根茎:清热解暑。用于菌痢,肠炎,乳痢。

#### 5045053

*Polystichum setiferum* (Forsk.) Moore ex Woytnar var.

*fargesii* (Christ) C. Chr.

植物名 黑鳞大耳蕨《药用抱植》

功效 根茎及叶:清热解暑。用于下肢疖肿,菌痢,肠炎等。

#### 5045054

*Polystichum shensiense* Christ

植物名 陕西耳蕨《蕨类名称》

地方名 陕西:小贯众。

功效 根茎:有小毒。清热解暑,止血。用于功能性子宫出血,吐血,预防流感和脑膜炎等。

#### 5045055

*Polystichum squarrosum* Fee

植物名 密鳞耳蕨《蕨类名称》

文献名 多鳞耳蕨《药用抱植》

功效 根茎:清热解暑,止血。用于功能性子宫出血,预防流感,麻疹。

#### 5045056

*Polystichum tripterum* (Kze.) Presl

植物名 三叉耳蕨《蕨类名称》

文献名 三叶耳蕨《药用抱植》,蛇舌草《高植图鉴》

地方名 湖北:毛蕨秧子、毛蕨根(神农架);贵州:小叶金鸡尾巴草。

功效 根茎:清热解暑,止痛。

#### 5045057

*Polystichum tsus-simense* (Hook.) J. Sm.

植物名 对马耳蕨《蕨类名称》

药材名 对马耳蕨《浙江天目药志》

地方名 河南:小贯众(商城、固始、新县);湖北:金鸡脚(神农架);四川:毛脚鸡;云南:小叶金鸡尾巴草。

功效 全草及根茎:清热解暑。用于各种肿毒初起,乳痢。



**5046 叉蕨科 Aspidiaceae****5046001***Hemigramma decurrens* (Hook.) Cop.

植物名 下延沙皮蕨《蕨类名称》

文献名 沙皮蕨《高植图鉴》

地方名 广西:五指蕨(上思)。

功效 根茎:用于痢疾。

**5046002***Quercifilix zeylanica* (Houtt.) Cop.

植物名 地耳蕨《蕨类名称》

功效 全草:用于红白痢,小便赤浊,小便短少,衄血,便血。

**5046003***Tectaria subpedata* (Harr.) Ching

植物名 掌状三叉蕨《蕨类名称》

文献名 鸟足状叉蕨《广西药录》

功效 全草:清热解毒。

**5046004***Tectaria subtriphylla* (Hook. et Arn.) Cop.

植物名 三叉蕨《蕨类名称》

药材名 大叶入地蜈蚣(广西融安)

文献名 三羽叉蕨《广西药录》

地方名 广西:鸡爪蕨(藤县)。

功效 叶:解毒止血,祛风湿。用于痢疾,刀伤,蛇咬伤,风湿骨痛等。

**5047 实蕨科 Bolbitidaceae****5047001***Bolbitis heteroclita* (Presl) Ching

植物名 长叶实蕨《蕨类名称》

药材名 鸭公尾(贵州)

地方名 广西:三叉剑(梧州),单刀石韦(邕宁)。

功效 根茎:凉血止血,止咳。用于吐血,咳嗽;全草:用于烧、烫伤,毒蛇咬伤。

**5047002***Bolbitis subcordata* (Cop.) Ching

植物名 华南实蕨《蕨类名称》

文献名 海南实蕨《药植简编》

功效 全草:凉血止血。清热解毒。用于毒蛇咬伤,痢疾,吐血等。

**5049 舌蕨科 Elaphoglossaceae****5049001***Elaphoglossum lencifolium* Ching

植物名 披针叶舌蕨《药植简编》

功效 全草:利尿。用于淋病。

**5050 肾蕨科 Nephrolepidaceae****5050001***Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen --- *N. cordifolia* (L.) Presl

植物名 肾蕨《蕨类名称》

药材名 肾蕨《四川中药志》

文献名 蜈蚣草《名实图考》,球蕨《台湾药植志》

地方名 天鹅抱蛋(广东、广西、四川、云南、贵州),凤凰蛋(广西、湖南、广东、福建、四川),凤凰卵(浙江、四川),石黄皮(广东、云南),篦子草(湖北、四川),蕨薯、狗猫卵[块茎](广东、广西),梳篦草、篦梳草、凉水果(四川、广东),毛鸡蛋(广西、云南);浙江:金鸡蛋(温州、乐清、平阳);福建:飞天蜈蚣、金鸡卵蛋、[神仙对坐草](泉州),金鸡尾、雄鸡蛋、猪仔莲核(仙游),芒蛋,金刚钻,狗莲核(福州),狗睾丸;台湾:山猪仔屎核,山猪生非;湖北:梳子草;广东:圆羊齿,蜈蚣草、石上丸(广州),蜈蚣珠、石枇杷(韶关),雄鸡橘(曲江),步斗蛇(连山、佛冈),颈头果(阳山),天鹅卵蛋(乳源);海南:猴子卵;广西:凤凰蕨,凤凰草、圆蕨(南宁),落地珍珠(陆川),天鹅蛋(平果),马骝卵(贺县);四川:麻雀蛋,牛肋巴草(蓬溪);贵州:蜈蚣蕨、[水槟榔](晴隆),冰果草(望谟);云南:何汗蕨(曲靖),蛇蛋参,石窝蛋,石蛋果(文山),水胡子(丽江),猴卵子、蕨蕨果(红河)。

功效 全草或块茎:清热利湿,宁肺止咳,软坚散积。用于感冒发热,咳嗽,肺结核咯血,痢疾,急性肠炎,小儿疳积,中毒性消化不良,泌尿系感染。外用于乳腺炎,淋巴结炎。

**5050002***Nephrolepis hirsutula* (Forst.) Presl

植物名 毛叶肾蕨《蕨类名称》

文献名 毛絨肾蕨《蕨类图说》

地方名 广东:马骝卵。

功效 块茎、全草:消积化痰。用于小儿疳积。

**5052 骨碎补科 Davalliaceae****5052001***Araiostegia perdurans* (Christ) Cop.

植物名 鳞轴小膜盖蕨《蕨类名称》

功效 全草:清热,祛风,驱蛔。用于风热感冒,蛔积腹痛。

**5052002***Araiostegia pulchra* (Don) Cop.

植物名 美小膜盖蕨《蕨类名称》

文献名 蜈蚣草《云南药录》

功效 根:驱蛔虫。

**5052003***Araiostegia yunnanensis* (Christ) Cop.

植物名 云南膜盖蕨《蕨类名称》

文献名 云南小膜盖蕨《中国植志》

地方名 广西:小冷蕨叶(凌云)。

功效 全草:清热,收敛。外用于烫火伤。

**5052004***Davallia austro-sinica* Ching

植物名 华南骨碎补《蕨类名称》

功效 根茎:用于腰腿痛,扭挫伤。

**5052005**

*Davallia divaricata* Blume --- *D. formosana* Hayata --- *D. orientalis* C. Chr.

植物名 大叶骨碎补(蕨类名称)

药材名 台湾骨碎补(拟)

文献名 高山骨碎补、凤尾草、马尾丝(台湾药植志)

地方名 小骨碎补(台湾、广西);广东:硬骨碎补,华南骨碎补。

功效 根茎:用于骨折,跌打损伤,风湿痹痛,牙痛,胃脘痛。

#### 5052006

*Davallia mariesii* Moore ex Bak. --- *D. bullata* Hook. et Bak.

植物名 海州骨碎补(品种论述)

药材名 海州骨碎补(证类本草)、(品种论述)

文献名 骨碎补(汇编)

地方名 山东:申姜,毛姜(昆崙山、青岛、崂山),铜丝草(海阳),石灵芝(五莲);台湾:猴姜。

功效 根茎:用于骨折,跌打损伤,风湿痹痛等。

#### 5052007

*Davallia sinensis* (Christ) Ching

植物名 中国骨碎补(蕨类名称)

地方名 广西:石岩鸡(临桂)。

功效 根茎:强筋骨,壮腰膝。用于跌打损伤,腰痛,小儿疳积。

#### 5052008

*Davallia subsolida* Ching --- *D. solida* Ching

植物名 亚阔叶骨碎补(蕨类名称)

地方名 台湾:骨碎补(恒春)。

功效 根茎:用于骨折,跌打损伤,风湿痹痛等。

#### 5052009

*Humata platylepis* (Bak.) Ching

植物名 半圆盖阴石蕨(蕨类名称)

地方名 广西:〔倒水莲〕(全州),白龙鸡(乐业);云南:白毛蕨,树蕨菜,阴石蕨。

功效 根茎:活血散瘀,接骨续筋。用于骨折,扭伤,腰腿痛。

#### 5052010

*Humata repens* (L. f.) Diels

植物名 阴石蕨(蕨类名称)

药材名 红毛蛇(广西本草选编)

文献名 平卧阴石蕨(蕨类志属),裂叶阴石蕨(药用抱植)

地方名 海南:石析蛇,老鼠尾,白毛蛇;广西:倒水莲,光莲,一把针(临桂);其他:石蚕。

功效 根茎:活血散瘀,清热利湿。用于风湿痹痛,腰肌劳损,白带,吐血,便血,尿路感染,肺脓疡。外用于跌打损伤,癰疮肿毒。

#### 5052011

*Humata tyermanni* Moore

植物名 圆盖阴石蕨(蕨类名称)

药材名 白毛蛇(汇编)

文献名 石蚕(图经),石奇蛇(生草药性备要),石祁

蛇(岭南采药录),海州骨碎补(中国植物图鉴)

地方名 老鼠尾(江西、福建、浙江、广西、湖南),〔石韦〕(华南、福建);江苏:鲜石蚕(苏州、常熟);浙江:白毛岩蚕(杭州、车阳、义乌、永康),白岩蚕(宁波、缙云、丽水),白毛石蚕(东阳、义乌),白花石蚕(永康),岩蚕(嵊县、鄞县、天台、杭州),石岩蚕(舟山),毛石蚕(临安);江西:白伸筋,白毛伸筋,白毛伸根,石伸筋,石伸根,石筋,石豆角(井冈山、南城);福建:土知母、墙蛇、石蚯蚓、飞线蜈蚣(闽东),鲜石茶(闽南),石蛇(华安),龙眼寄生、吊树猫、白猫、白龙须草(泉州),铁伞,小碎补,树蛇(南安、仙游、厦门),飞蛇草(莆田、惠安);广东:石龙笔(潮阳),石上鲁箕(曲江),上树蜈蚣(阳山),上树蛇(新丰),火绿药(连安),庵公草(广州);广西:上核树,骨蛇药,马骝尾(贵县),筋碎补,〔倒水莲〕,倒水莲蕨,石上蚂蟥(岑溪);云南:树蕨蕨,石母,地蜈蚣。

功效 根茎:祛风除湿,止血,利尿。用于风湿性关节炎,慢性腰腿痛,腰肌劳损,跌打损伤,骨折,黄疸型肝炎,吐血,便血,血尿。外用于疮疖。

#### 5052012

*Leucostegia immersa* (Wall.) Presl

植物名 大膜盖蕨(蕨类名称)

文献名 膜盖蕨(蕨类图说)

功效 根茎:活血祛瘀。用于腰痛,跌打损伤。

### 5053 雨蕨科 *Gymnogrammitidaceae*

#### 5053001

*Gymnogrammitis dareiformis* (Hook.) Ching ex Tard. -Blot et C. Chr.

植物名 雨蕨(蕨类名称)

地方名 云南:“哈达”(元江哈尼语)。

功效 根茎、全草:理气散结,利尿通淋。用于腹胀便秘,热淋,癃淋。

### 5054 双扇蕨科 *Dipteridaceae*

#### 5054001

*Dipteris chinensis* Christ

植物名 中华双扇蕨(蕨类名称)

地方名 广西:半边藕(金秀)。

功效 根茎:用于浮肿。

### 5056 水龙骨科 *Polypodiaceae*

#### 5056001

*Arthromeris lungtauensis* Ching

植物名 龙头节肢蕨(蕨类名称)

地方名 广西:倒省莲(全州);贵州:搜山虎(威宁)。

功效 根茎:清热利尿,止痛。用于骨折,小便不利。

#### 5056002

*Arthromeris mairei* (Brause) Ching

植物名 多羽节肢蕨(蕨类名称)

药材名 凤尾搜山虎(昆明民药)

文献名 波边节肢蕨(秦岭植志),西南节肢蕨(中药

## 大辞典]

地方名 [过山龙](四川、云南);四川:蚂蝗连(峨眉山),石连姜(西昌);云南:地蜈蚣,节肢蕨,毛消、毛虫药(红河),搜山虎(思茅、昆明、曲靖),[爬山虎](昆明),[凤尾草](玉溪),[钻地风](临沧),钻地蜈蚣(东川)。

功效 根茎:活络,消积滞,通大便,降火。用于食积胃痛,腹胀便秘,风湿筋骨疼痛,坐骨神经痛,目痛,牙痛,头痛。

## 5056003

*Aspidium hokutense* Hayata

植物名 北投网羊齿《台湾药植志》

地方名 台湾:凤尾草。

功效 茎、叶:用于风热感冒。

## 5056004

*Colysis bonii* Ching

植物名 琼越线蕨《蕨类名称》

文献名 彭氏线蕨《药植简编》

功效 全株:活血祛瘀,清热利尿。用于跌打损伤,尿路感染。

## 5056005

*Colysis digitata* (Bak.) Ching

植物名 掌叶线蕨《蕨类名称》

文献名 石壁莲《高植图鉴》

地方名 广西:[一包针](蒙山)。

功效 叶:活血祛瘀。用于跌打损伤。

## 5056006

*Colysis elliptica* (Thunb.) Ching

植物名 线蕨《蕨类名称》

地方名 广西:羊七莲(阳朔)。

功效 叶:清热利尿,消肿祛瘀。用于尿路感染,跌打损伤等;全草:用于肺结核。

## 5056007

*Colysis hemionitidea* (Wall.) Presl

植物名 断线蕨《高植图鉴》

地方名 广西:[石韦](贺县)。

功效 叶:清热解毒,利尿。用于小便短赤,尿路感染,毒蛇咬伤等。

## 5056008

*Colysis hemitoma* (Hance) Ching

植物名 胃叶线蕨《蕨类名称》

地方名 广西:三枝枪(昭平)。

功效 全草:用于外伤感染。

## 5056009

*Colysis henryi* (Bak.) Ching

植物名 矩圆线蕨《蕨类名称》

文献名 中狭线蕨《药用抱植》

地方名 浙江:大石韦;福建:篦梳剑(泉州);湖北:石韦(神农架)。

功效 全草:清肺热,利尿,通淋。用于咳血,尿血,骨折。

## 5056010

*Colysis leveillei* (Christ) Ching f. *angusta* (C. Chr.) Ching

植物名 狭绿叶线蕨《广西药录》

地方名 广西:爬山虎(永福)。

功效 全草:用于风湿骨痛,跌打损伤。

## 5056011

*Colysis longipedunculata* Ching et Y. X. Ling

植物名 长梗线蕨《广西药录》

地方名 广西:[石韦](龙州)。

功效 全草:用于烧、烫伤。

## 5056012

*Colysis morsei* Ching

植物名 龙州线蕨《广西药录》

功效 全草:用于胃脘痛,风湿骨痛。

## 5056013

*Colysis pothifolia* (Don) Presl

植物名 宽羽线蕨《蕨类名称》

地方名 湖南:[九龙盘];广西:一包金、[一包针](藤县),[骨碎补](桂平)。

功效 根茎:须根有小毒。祛风,散瘀,止痛。用于风湿腰痛,跌打损伤。

## 5056014

*Colysis wrightii* (Hook.) Ching

植物名 褐叶线蕨《蕨类名称》

地方名 湖南:小肺经草,钢锯草,蓝天草,叶下青,连天草。

功效 全草:行气祛瘀,镇咳祛痰。用于妇女虚癆咳嗽,痰干不易咳,妇女红崩白带。

## 5056015

*Colysis wui* (C. Chr.) Ching

植物名 瑶山线蕨《广西药录》

功效 全草:清热解毒。

## 5056016

*Drynoglossum heterophyllum* (C. Chr.) Ching

植物名 铁指甲《云南中草药》

地方名 云南:金鱼藤(大理)。

功效 全草:消肿镇痛,接骨止血。用于骨折,跌打损伤,外伤出血,中耳炎。

## 5056017

*Drynoglossum piloselloides* (L.) Presl

植物名 抱树莲《蕨类名称》

药材名 抱树莲《生草药性备要》、《汇编》

文献名 巧根藤、飞连草《岭南采药录》,星毛抱树莲《广州植志》

地方名 抱石莲、瓜子菜、飞蓬草(广东、广西);广西:瓜米菜(北海)。

功效 全草:清热解毒,止血消肿。用于黄疸,淋巴结核,腮腺炎,肺结核咯血,血崩,乳腺癌,跌打损伤。

## 5056018

*Drymotaenium miyoshianum* (Makino) Makino

植物名 丝带蕨《蕨类名称》

药材名 丝带蕨《浙江天目药志》

地方名 浙江: 木兰金(临安); 湖北: 木莲金, 韭菜还阳、铁丝还阳(神农架); 四川: 石箭, 大捆仙绳(峨眉山)。

功效 全草: 祛风, 镇惊。用于小儿惊风。

#### 5056019

*Lemmaphyllum carnosum* Presl

植物名 肉质伏石蕨《蕨类名称》

药材名 金鱼藤《玉溪中草药》

地方名 广西: 棚梗(龙州); 云南: 金碎叶、豆瓣鹿衔(玉溪), 鸡咀鹿衔(峨山), 石串连(澄江), 底线通筋(易门)。

功效 全草: 接骨, 催生, 除湿。用于小儿高热, 风湿, 难产, 中耳炎, 骨折。

#### 5056020

*Lemmaphyllum microphyllum* Presl --- *Drymoglossum microphyllum* C. Chr.

植物名 伏石蕨《蕨类名称》

药材名 螺厝草《本草拾遗》、《汇编》

文献名 镜面草《纲目》, 蟾儿草、地连钱《纲目拾遗》, 石龙、石茶《名实图考》, 抱树蕨《蕨类图谱》, 抱树莲《台湾药植志》

地方名 石耳坠、石耳垂(贵州、广东); 福建: 山豆瓣草, 血草, 金指甲、金茶匙、风不动(闽东), 牛虾草(泉州), 玉龙鳞; 湖南: 石瓜子(江华), 瓜子草, 瓜子莲(汝佳), 瓜子金(花垣); 广东: 石钱(连山、阳山), 瓜子藤(仁化), 石西瓜子(连县), 水龟藤、上树芽江(潮阳), 飞连草(广州); 海南: 猫龙草; 广西: 瓜子蕨、石瓜子草、过石风(桂林), 山瓜子(平南); 贵州: 痞子药(罗甸), 鱼鳖金星、苇则兰、接筋草(贵阳); 云南: 铁指甲, 金鱼藤, 杜仲寄生。

功效 全草: 清热解毒, 凉血止血, 润肺止咳。用于肺热咳嗽, 肺脓肿, 肺结核咯血, 咽喉肿痛, 腮腺炎, 痢疾, 淋巴结核, 衄血, 尿血, 便血, 崩漏。外用子疔疮肿毒, 皮肤湿痒, 中耳炎。

#### 5056021

*Lemmaphyllum microphyllum* Presl var. *lutchuense* (Nakai) C. Chr.

植物名 琉球伏石蕨《药植简编》

功效 全草: 清热解毒, 凉血止血, 润肺止咳。

#### 5056022

*Lemmaphyllum microphyllum* Presl var. *obvatum* (Harr.) C. Chr.

植物名 倒卵叶伏石蕨《福建植志》

文献名 两广伏石蕨《药植简编》

地方名 广东: 上树芽江、水龟藤(潮阳), 飞连草(广州), 山豆瓣草, 血草; 广西: 上石田螺(金秀)。

功效 全草: 用于梅毒。

#### 5056023

*Lepidogrammitis diversa* (Ros.) Ching --- *L. christensenii* Ching

植物名 披针骨牌蕨《蕨类名称》

地方名 广西: [万年青](资源)。

功效 全草: 清热, 除湿, 止血。用于风湿关节痛, 外伤出血, 小儿高热。

#### 5056024

*Lepidogrammitis drymoglossoides* (Bak.) Ching

植物名 抱石莲《高植图鉴》

药材名 鱼鳖金星《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 螺压儿、地桑、痢见草《救荒本草》, 接筋藤、[筋骨草]《滇南本草》, 瓜子金《名实图考》, 瓜子菜、瓜米菜《蕨类图说》, 鱼鳖草《中草药学》, 抱石骨牌蕨《秦岭植志》, 骨牌蕨《蕨类名称》

地方名 石瓜子(陕西、江西、湖北、湖南、四川、贵州), 抱树莲(福建、江西、广西), 瓜子莲(湖南、广西); 陕西: 石豆; 浙江: 金丝鱼鳖草(杭州、宁波、平阳), 仙人掌(温州), 龙鳞草(龙泉、乐清), 石龙鳞(温州、瑞安、永嘉、乐清), 岩瓜子(乐清), 地鳖草(景宁); 安徽: 骨牌草; 江西: 黄龙瓜子金(吉水), 天地牌(景德镇); 福建: 山豆瓣草, 风不动, 豆升草、金指甲、金茶匙(闽东), 伏石蕨(福州); 河南: 石指甲; 湖北: 瓜米还阳, 鱼剪草、石龙(神农架); 湖南: [肉石斛](永顺), 岩瓜子草(古丈), 擦不烂(保靖), 石瓜子莲(衡南); 四川: 金星草, 十指兰; 贵州: 瓜子草(贵阳)。

功效 全草: 清热解毒, 祛风化痰, 凉血祛瘀。用于小儿高热, 肺结核, 内、外伤出血, 风湿关节痛, 跌打损伤。外用子疔疮肿毒。

#### 5056025

*Lepidogrammitis pyriformis* (Ching) Ching

植物名 梨叶骨牌蕨《蕨类名称》

地方名 湖北: 鱼鳖草(神农架)。

功效 全草: 清热利水。用于淋症。

#### 5056026

*Lepidogrammitis subrostrata* (C. Chr.) Ching --- *L. rostrata* (Bedd.) Ching

植物名 喙叶骨牌蕨《蕨类名称》

药材名 骨牌草《汇编》

文献名 挂寄生《名实图考》, 骨牌蕨《高植图鉴》

地方名 广西: 上树咳; 云南: 瓜核草。

功效 全草: 清热利水, 除烦, 清肺气。用于淋沥癃闭, 热咳, 心烦。

#### 5056027

*Lepisorus angustus* Ching

植物名 狭叶瓦韦《蕨类名称》

功效 全草: 利尿, 通经, 消肿, 止痛。用于尿路感染, 月经不调, 跌打损伤。

#### 5056028

*Lepisorus bicolor* (Takeda) Ching

植物名 两色瓦韦《蕨类名称》

文献名 七星花古丹《高植图鉴》

地方名 贵州: 骗鸡尾。

功效 全草: 利尿通淋, 除湿。用于尿路感染, 风湿疼痛, 肠胃炎, 烫伤。

#### 5056029

*Lepisorus clathratus* (Clarke) Ching

植物名 网眼瓦韦(蕨类名称)

文献名 “折古赛头”(藏名)(《青藏药图》)

功效 全草:利水通淋,凉血,止血,解毒消肿。用于淋病,水肿,痢肿,瘰癧,咳嗽吐血,赤白痢疾,出血等。

#### 5056030

*Lepisorus contortus* (Christ) Ching

植物名 扭瓦韦(蕨类名称)

药材名 一皮草(峨眉药植)

文献名 “察贝”(藏名)(《青藏药图》)

地方名 陕西:石豇豆,太白石豇豆;湖北:一匹草(神农架)。

功效 全草:用于跌打损伤。

#### 5056031

*Lepisorus eilophyllus* (Diels) Ching

植物名 高山瓦韦(蕨类名称)

地方名 陕西:石豇豆,石小豆;湖北:韭菜还阳(神农架)。

功效 全草:祛风利湿,止血。用于风湿疼痛,腰痛,小便不利,白带,崩漏,鼻衄。

#### 5056032

*Lepisorus excavatus* (Bory.) Ching var. *scolopendrinus* (Don) Ching --- *L. scolopendrinus* (Ham. ex Don) Mehra et Bir

植物名 棕鳞瓦韦(孢子植物名词及名称)

药材名 瓦韦(《云南药录》)

文献名 凹瓦韦(《云南种录》)

功效 全草:消炎。

#### 5056033

*Lepisorus lewisii* (Bak.) Ching

植物名 庐山瓦韦(蕨类名称)

地方名 江西:七星草,骨牌草。

功效 全草:清热,消肿,止痛。用于肠炎,尿路感染,跌打损伤等。

#### 5056034

*Lepisorus macrosphaerus* (Bak.) Ching

植物名 大瓦韦(蕨类名称)

药材名 金星凤尾草(《滇南本草》)

地方名 宁夏:石茶,金星草;四川:瓦韦,七星凤尾;云南:小七星草,爬山狼,爬山猴。

功效 全草:清热解毒,除湿,利尿。用于小便短赤,腹胀,便秘,血崩等。

#### 5056035

*Lepisorus macrosphaerus* (Bak.) Ching var. *asterolepis* (Bak.) Ching --- *L. asterolepis* (Bak.) Ching

植物名 黄瓦韦(药用抱植)

药材名 黄瓦韦(贵州民间药物)

文献名 小瓦韦(《高植图鉴》),星鳞一皮草(《峨眉药植》)

地方名 大石韦(四川、贵州),骨牌草、瓦韦(宁夏、江西);宁夏:石茶,金星草;江西:独立一枝香(南昌),

剑丹,一枝枪;四川:七星凤尾(西昌);贵州:金鸡尾,七星剑,么金鸡。

功效 全草:用于尿路感染,肾炎。

#### 5056036

*Lepisorus marginatus* Ching

植物名 有边瓦韦(蕨类名称)

地方名 湖北:对月草,满天星(神农架)。

功效 全草:清热利尿。用于淋症。

#### 5056037

*Lepisorus morrisonensis* (Hay.) H. Ito

植物名 白边鳞瓦韦(迪庆藏药)

药材名 瓦韦(迪庆藏药)

功效 全草:利水通淋,清肺泄热,敛疮生肌。用于淋病,崩漏,肺热咳嗽,烫火伤,脓疡。

#### 5056038

*Lepisorus obscure-venulosus* (Hayata) Ching

植物名 粤瓦韦(蕨类名称)

地方名 江西:瓦韦(万年),独立一枝香(南昌),骨牌草(赣州),剑丹,一枝枪;湖南:草香莲,小金刀,叶下子,冲天由,(肺经草),子叶上叶,大叶骨牌草,大茅镰,骨牌伸筋;云南:鸡尾菜,七星草,小石韦。

功效 全草:用于胃肠炎。

#### 5056039

*Lepisorus oligolepidus* (Bak.) Ching --- *Polypodium oligolepidum* Bak.

植物名 多鳞瓦韦(蕨类名称)

文献名 鳞瓦韦(秦岭植志)

地方名 甘肃:二郎箭;台湾:金石韦;湖南:剑刀草,小毛镰,毛镰,镰刀草,大毛镰,大叶骨牌草,大金刀,骨牌伸筋,冷舌草,龙骨牌,开刀草,叶下子,剑头草,七支剑,两面刀。

功效 全草:消肿止痛,利尿,通络。用于肿毒,暑湿,疟疾,咳嗽吐血,痢疾,尿路感染等。

#### 5056040

*Lepisorus petiolosus* Ching et Y. X. Ling

植物名 具柄瓦韦(广西药录)

地方名 广西:花石韦(田阳)。

功效 全草:用于急性肾炎浮肿,小便不利,尿路感染。

#### 5056041

*Lepisorus pseudonudus* Ching

植物名 长瓦韦(蕨类名称)

药材名 长瓦韦(《中药大辞典》)

地方名 四川:七星凤尾草,“扎柏”(若尔盖藏名)。

功效 全草:清热利尿,祛湿通络,消肿止血,解硫黄毒。用于淋病,尿血,痢疾,癆热咳嗽,内伤吐血,金疮。

#### 5056042

*Lepisorus subdistans* Ching

植物名 近远叶瓦韦(广西药录)

地方名 广西:瓦韦(全州)。

功效 全草:用于咳嗽,骨折,跌打损伤。

## 5056043

*Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching

植物名 瓦韦(蕨类名称)

药材名 瓦韦(唐本草)、《汇编》

文献名 剑丹(名实图考), 一叶草(朝植乡名), 满天星(植物名汇)

地方名 七星草(北京、江苏、浙江), 七星剑(浙江、安徽、江西、广西), 骨牌草(江苏、浙江、安徽、湖南), 小叶骨牌草(浙江、江西); 浙江: 落星草(杭州、宁波、镇海、舟山), 移星草(德清), 退星草(仙居、乐清、龙泉); 安徽: 小石韦; 福建: 寄生剑、金星石韦、石韦(泉州); 湖南: 骨牌伸筋, 细骨牌草, 小舌头草, 子上叶, 大金刀; 广西: 一枝枪; 四川: 金鸡尾, 石茅莲(南充)。

功效 全草: 清热解毒, 利尿消肿, 止血, 止咳。用于尿路感染, 肾炎, 痢疾, 肝炎, 眼结膜炎, 口腔炎, 咽炎, 肺热咳嗽, 百日咳, 咯血, 血尿, 发背痈疮。

## 5056044

*Lepisorus ussuriensis* (Regel et Maack) Ching

植物名 乌苏里瓦韦(蕨类名称)

药材名 射鸡尾(贵州方药)

地方名 黑龙江: 乌苏里石韦, 石韦, 七星草; 宁夏: 金星草(银川); 湖南: 青根, 青叶红, 大石韦, 大金刀, 大骨牌草, 骨牌草, 剑刀草, 叶上子, 双蒜子, 七星剑, 岩红豆; 贵州: 人头发, 飞惊草, 铁包针。

功效 全株: 祛风, 利尿, 止咳, 活血。用于风湿疼痛, 小便不利, 咳嗽, 月经不调, 跌打损伤。

## 5056045

*Lepisorus waltonii* (Ching) Ching

植物名 戟叶瓦韦(药用抱植)

功效 全草: 利水通淋, 清泄肺热。用于肾炎水肿, 泌尿道感染, 尿道结石, 肺热咳嗽, 咯血, 支气管炎哮喘, 咽喉炎等症。

## 5056046

*Microsorium buergerianum* (Miq.) Ching

植物名 攀缘星蕨(蕨类名称)

文献名 东南星蕨(药植简编)

地方名 湖南: 辣节兔; 广西: 石韦(贺县)。

功效 全草: 清热利湿。用于尿路感染, 黄疸等。

## 5056047

*Microsorium dilatatum* (Bedd.) Sledge

植物名 羽裂星蕨(蕨类名称)

药材名 观音莲(峨眉药植)

地方名 广西: 海草(玉林)。

功效 叶: 用于跌打损伤, 疝气。

## 5056048

*Microsorium fortunei* (Moore) Ching

植物名 江南星蕨(蕨类名称)

药材名 大叶骨牌草(浙江)、《汇编》

文献名 线鸡尾、七星草(草木便方), 福氏星蕨(蕨类志属), 疏鳞星蕨(药用抱植)

地方名 七星剑(浙江、广西、福建、江西、安徽、陕西), 骨牌草(浙江、安徽), 剑刀蕨(广西、广东), 石韦、

大石韦(江苏、福建); 陕西: 赶蛇鞭(镇坪), 鹰毛草、顶针草、木板草、沿铁草、石剑、排云草(平利), 排骨草(白河); 江苏: 石韦草; 浙江: 大叶金星, 山海带(云和), 肥剑草(泰顺), 野塘蚕(景宁), 石荷叶(温州), 金带叶、独叶金鸡(宁波), 铁扁担、宝剑草(杭州); 安徽: 独叶一枝枪; 江西: 飞刀剑, 石庄剑, 独脚金鸡(景德), 华星蕨; 福建: 金星剑、大号七尾剑、牛舌黄、武当剑(泉州), 龙舌草, 岩七星剑, 虹霓剑, 大号石剑(仙游), 拉舌狗(明溪), 石刀青(宁化), 尖刀草; 湖北: 龙眼草, 二郎剑, 对月草(神农架); 广东: 大星蕨, 牛膀草; 广西: 剑刀草, 连贴草, 毛连草, 连田草、毛良草(桂林), 连天草, 铁包金, 大经刀草, 一包针; 四川: 金鸡尾, 石扁担, 七星凤尾草, 金星草、金钗、金钏、凤尾金星、凤尾草(成都), 旋鸡尾(峨眉山), 鸡公尾、单凤尾(重庆); 贵州: 割鸡尾、猪棕漆(贵阳); 其他: 一支剑。

功效 全草及根茎: 清热利湿, 凉血止血, 消肿止痛。用于黄疸, 痢疾, 尿路感染, 淋巴结核, 白带, 风湿关节痛, 咳血, 吐血, 便血, 衄血。外用于跌打损伤, 骨折, 毒蛇咬伤, 疔疮肿毒。

## 5056049

*Microsorium hymenoceros* (Kze.) Ching

植物名 滇星蕨(蕨类名称)

地方名 广西: 藤碎补(乐业)。

功效 全草: 活血散瘀, 消肿止痛, 止咳清热。用于跌打骨折, 肺热咳嗽。

## 5056050

*Microsorium membranaceum* (Don) Ching

植物名 膜叶星蕨(蕨类名称)

药材名 大瓦韦(云南中草药)

文献名 大风草(名实图考), 岩姜七(四川中药志)

地方名 广西: 大叶包针(南丹); 四川: 鸡脚莲、鸡足莲(会理), 光石韦(西昌); 云南: 爬山姜、小绿芫(保山), 老筋丹、木暗(思茅), 断骨粘(红河), 宝剑草(玉溪), 大石韦(元江、澄江、新平、玉溪), 铁蚂蝗(峨山)。

功效 全草: 清热利尿, 散瘀消肿。用于膀胱炎, 尿道炎, 水肿, 跌打损伤, 疔疮, 痈肿, 热结便秘。

## 5056051

*Microsorium punctatum* (L.) Cop.

植物名 星蕨(蕨类名称)

地方名 广东: 膀草(湛江); 广西: 野苦英(北流)。

功效 全草: 清热利尿。用于尿路感染, 痢疾。

## 5056052

*Microsorium steerei* (Harr.) Ching

植物名 广叶星蕨(蕨类名称)

文献名 台湾星蕨(药植简编), 斯第星蕨(广西药录)

地方名 广西: 鸡蹠(龙州)。

功效 全草: 用于膀胱炎, 脾脏肿大。

## 5056053

*Microsorium subpunctatum* Ching

植物名 近星蕨(药植简编)

文献名 清骨石韦(药植简编)

地方名 广西:龙石草。

功效 全草:清热解毒,利关节。

#### 5056054

*Neucheropteris palmatopedata* (Bak.) Christ

植物名 扇蕨《蕨类名称》

药材名 扇蕨《贵州民间药物》

文献名 半把伞、雄过山《名实图考》,掌状扇蕨《蕨类志属》

地方名 搜山虎(贵州、云南);四川:金沙箭、磨食药(西昌);云南:野脚板、八爪金龙(曲靖),野蕨菜(玉溪),箐鸡尾(峨山),虎爪搜山虎(易门)。

功效 根茎:清热利湿,理气通便。用于慢性胃炎,胃腹胀满,便秘,痢疾,膀胱炎,咽炎,风湿关节疼痛。

#### 5056055

*Neolepisorus ovatus* (Bedd.) Ching --- *N. sinensis* Ching

植物名 卵叶盾蕨《蕨类名称》

药材名 大金刀《湖南药物志》

文献名 水石韦、银茶匙、牌坊草《名实图考》,道蕨《植分学报》,盾蕨《高植图鉴》

地方名 湖北:宽石韦(神农架);湖南:青卷莲(衡山),肺经草;四川:兰蕨草(峨眉山);贵州:青竹标(贵阳),梳子草,西风剑,单叶扇蕨,单叶盾蕨。

功效 全草或叶:清热利湿,凉血止血。用于尿路感染,小便不利,咯血。外用于创伤出血,烧、烫伤。

#### 5056056

*Neolepisorus ovatus* (Bedd.) Ching f. *deltoideus* (Bak.) Ching

植物名 三角叶盾蕨《植分学报》

药材名 大金刀《汇编》

文献名 三角叶《秦岭植志》,盾蕨《浙江药植志》,羽裂盾蕨、西风剑、单叶扇蕨《汇编》

地方名 四川:飞行草,兰蕨草;贵州:青竹标、过江龙(绵屏)。

功效 全草或叶:清热利湿,凉血止血。

#### 5056057

*Neolepisorus ovatus* f. *doryopteris* (Christ) Ching

植物名 蟹爪叶盾蕨《高植图鉴》

地方名 贵州:爬岩鸡。

功效 根茎:清热凉血,利水通淋。用于尿血,便血,吐血,痢疾,风湿肿痛。

#### 5056058

*Neolepisorus truncatus* Ching et P. S. Wang

植物名 截基盾蕨《贵州药录》

功效 根茎:清热凉血,利尿,止血。用于痢疾,尿血,便血,风湿肿痛。

#### 5056059

*Phymatodes cuspidata* (D. Don) Alston --- *Phymatodes cuspidata* (D. Don) Alston

植物名 光亮瘤蕨《蕨类名称》

药材名 猪毛蕨《云南中草药选》

文献名 光亮蕨《蕨类图说》,光亮密网蕨《高植

图鉴》

地方名 广西:[骨碎补](玉林、武鸣),猴子姜;云南:绿爬山虎,大蕨菜,青竹标。

功效 根茎:小毒。活血,止痛,接骨,消肿。用于跌打损伤,骨折。

#### 5056060

*Phymatopsis conjuncta* Ching

植物名 交连假瘤蕨《蕨类名称》

文献名 交连假蕨蕨《秦岭植志》,交连假密网蕨《高植图鉴》

功效 根茎:清热凉血,化瘀生新。用于骨折,咯血,尿血,风湿痛,刀伤。

#### 5056061

*Phymatopsis crenatopinnata* (Clarke) Ching ---

*Phymatodes orentopinnata* (Clarke) Ching

植物名 紫柄假瘤蕨《蕨类名称》

药材名 女金芦《红河中草药》

文献名 紫柄假密网蕨《云南药录》,紫柄假蕨蕨《植分学报》

地方名 云南:扇把草、地蜈蚣、石蚕、石角、小骨碎补(红河),凤尾金星(大理、保山)。

功效 根:舒筋活络,导滞,消滞。用于腹胀,便秘,风湿骨痛,跌打损伤,腰腿痛,小儿惊风等;全草:用于吐血,咽喉炎,预防中暑,毒蛇咬伤,狂犬病,淋巴结核,尿路感染。外用于骨折。

#### 5056062

*Phymatopsis ebenipes* (Hook.) J. Sm.

植物名 黑鳞假瘤蕨《蕨类名称》

文献名 黑鳞假密网蕨、石岩浆《云南药录》

功效 根:用于狂犬病。

#### 5056063

*Phymatopsis engleri* (Luerss.) H. Ito --- *Polypodium engleri* Luerss

植物名 波缘假瘤蕨《福建植志》

文献名 恩氏假蕨蕨《植分学报》,恩氏假瘤蕨《蕨类名称》

功效 全草:清热,镇咳,解毒,驱风,镇惊,活血,散瘀。

#### 5056064

*Phymatopsis glaucopsis* (Fr.) Ching

植物名 刺齿假瘤蕨《蕨类名称》

药材名 鸭掌金星《云南药录》

文献名 刺齿假密网蕨《云南药录》

地方名 云南:(搜山虎)。

功效 根:用于腹泻。

#### 5056065

*Phymatopsis griffithiana* (Hook.) J. Smith

植物名 大果假瘤蕨《蕨类名称》

药材名 金星草《嘉祐本草》

文献名 金钗草《图经》,大金星凤尾《履巇岩本草》,凤尾草、七星草《纲目》,大果假蕨蕨《植分学报》,大果假密网蕨《高植图鉴》

地方名 广西:牛舌风,〔石韦〕(上林);四川:血白书。

功效 全草:清热,凉血,解毒。用于痢疾,肿毒,瘰癧,恶疮,暴赤火眼,淋病,肠炎。

#### 5056066

*Phymatopsis hastata* (Thunb.) Kitagawa --- *Polypodium hastatum* Thunb. --- *Phymatodes hastata* (Thunb.) Ching

植物名 金鸡脚〔蕨类名称〕

药材名 鹅掌金星草《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 辟瘟草、鸭脚金星草《百草镜》,独脚金鸡《纲目拾遗》

地方名 三叉剑、三叉箭(安徽、江西、湖北、湖南、广西),三角风(湖南、四川),七星草(江苏、广东、云南),七星丹(江西、广东),鸭脚草(浙江、福建、广东、湖北),鸭脚掌(江西、福建、广东),鸭脚珠(江西、福建),鸭婆脚(安徽、湖南),鸭爪掌、鸭脚金星(江苏、浙江),鸭掌金星草(浙江、江西),鹅掌金星(安徽、浙江、湖北、湖南、广西),双凤尾草(福建、四川),鸡脚爪(浙江、云南),金星草(福建、云南);陕西:七星箭,燕尾草,小石剑;浙江:鸡爪良姜(温州),鸭脚青(云和、丽水),鸭脚方(龙泉),鸭脚竹星(泰顺),远足金鸡(宁波);安徽:独立金鸡,鸭足金星(太和);江西:鸭脚斑(吉安),三叉剑枫(庐山),独脚金鸡草(景德镇);福建:鸭掌香,鸭掌星,鸭脚香(安溪、南安、晋江、永春),鸭脚爪(仙游),鸭踏香,鸭牛母脚(宁化),鸭掌金星、鸭妈掌(闽东),三角牛(德化),山爪英;湖南:鹅脚伸筋(长沙),三叉风(麻阳),盐桃草(新邵),〔鸡爪莲〕,脚子风(黔阳),鸡爪草(常德),山黄连(衡山);广东:鸭麻脚(始兴),鸭脚莲,鸭麻蹄、满山香、千里香(五华),二面刀(乳源),鸡屎莲(仁化),鸡爪、龙舌笔、独叶笔(潮阳),常脚金星(惠阳);广西:二叉曲,三叉虎,三滴血,三叉蕨;四川:金鸡蕨,一枝剑(峨眉山),金鸡足(绵阳),笔架草(南川),鸭脚金星,地毛虫(重庆);贵州:猪蹄叉、鸡脚叉(贵阳),乌毛丁;云南:阔鸡尾、小爬山虎、凤尾金星(红河),鹅掌草、小搜山虎、(爬山虎)(昆明)。

功效 全草:祛风清热,利湿解毒。用于小儿惊风,感冒咳嗽,小儿支气管炎,咽喉肿痛,扁桃体炎,中暑腹痛,痢疾,尿路感染,腹泻,筋骨疼痛。外用于痢疖,疔疮,毒蛇咬伤。

#### 5056067

*Phymatopsis hastata* f. *simplex* (Christ) Ching

植物名 单叶金鸡脚〔安徽采药录〕

药材名 金鸡脚〔安徽采药录〕

功效 全草:祛风,清热,利湿,解毒。用于小儿惊风,感冒咳嗽,小儿支气管肺炎,咽喉肿痛,扁桃体炎,中暑腹痛,痢疾,腹泻,泌尿系感染,筋骨疼痛;外用于疔疮疖疖,毒蛇咬伤。

#### 5056068

*Phymatopsis intermedia* (Ching) Ching

植物名 中间假瘤蕨〔蕨类名称〕

文献名 中间假密网蕨〔云南药录〕

地方名 云南:〔搜山虎〕(丽江)。

功效 根茎:用于腹泻。

#### 5056069

*Phymatopsis majoensis* (C. Chr.) Ching

植物名 宽底假瘤蕨〔蕨类名称〕

文献名 宽底假密网蕨〔高植图鉴〕

地方名 湖北:瓦韦、瓦韦根、瓦韦毛(神农架)。

功效 根茎:利尿,通经;星状毛:止血。用于刀伤。

#### 5056070

*Phymatopsis shensiensis* (Christ) Ching

植物名 陕西假瘤蕨〔蕨类名称〕

药材名 乌鸡骗〔贵州草药〕

文献名 陕西假密网蕨〔高植图鉴〕

地方名 湖北:水龙骨(神农架)。

功效 带根全草:清热利湿,祛风通经。

#### 5056071

*Phymatopsis trisecta* (Bak.) Ching

植物名 三出假瘤蕨〔蕨类名称〕

药材名 七星草〔滇南本草〕

文献名 鹅掌金星草《名实图考》,鸭脚草、三角风、七星剑《中草药学》,金星草《台湾药植志》

地方名 台湾:鸭脚把,鸭蹄草,鸭脚香,金鸡脚。

功效 全草:沙淋,血淋,白浊,冷淋。外用于疮毒。

#### 5056072

*Polypodiastrium argutum* (Wall.) Ching --- *Polypodium argutum* Wall.

植物名 尖齿拟水龙骨〔蕨类名称〕

药材名 台湾金星草〔台湾药植志〕

文献名 尖齿水龙骨〔高植图鉴〕

功效 根茎:解热。

#### 5056073

*Polypodiodes amoenum* (Wall. ex Mett.) Ching --- *Polypodium amoenum* Wall.

植物名 友水龙骨〔蕨类名称〕

文献名 水龙骨〔药用抱植〕

地方名 湖北:〔骨碎补〕,老龙骨(神农架);广西:猴子蕨(金秀)。

功效 根茎:清热解毒,祛风除湿。用于风湿关节疼痛,咳嗽,小儿高烧。外用于背痛,无名肿毒,骨折。

#### 5056074

*Polypodiodes nipponicum* (Mett.) Ching --- *Polypodium nipponicum* Mett.

植物名 水龙骨〔蕨类名称〕

药材名 水龙骨《名实图考》、《汇编》

文献名 草石蚕《纲目拾遗》,铁打粗《中国药植志》,日本多足蕨《药用抱植》

地方名 〔石豇豆〕(浙江、贵州),石龙(陕西、湖北),青石莲、青龙骨(江西、浙江),青石蚕(江苏、浙江、湖北);陕西:拐枣金钗(平利);江苏:石蚕(宜兴);浙江:岩蚕(东阳、天台、龙泉),岩



针(遂昌、黄岩), 磁蚕(景宁、龙泉、丽水), 无毛老鼠尾(平阳), 兰土柚(淳安), 青蚕(宁波), 青岩蚕、石岩蚕(嵊县), 石塔蚕(衢县), 鼠尾草(泰顺), 达藤骨箕(临海), 绿岩蚕(龙泉), [土黄连]; 安徽: 贴壁蜈蚣, 石豆角(太和); 江西: 绿脚代骨丹(丰城), 石藕、石蝴蝶、石姜、石莽(庐山), 石角(安福), 石金钩, 光石蚕, 铁篱巴, 铜兰(南丰); 湖北: 石龙骨(神农架); 湖南: 青根, 钻骨伸筋, 闻骨伸筋, 冷骨风, 石伸筋, 石蜈蚣, 鸡脚伸筋, 接骨风, 蜈蚣藤, 光棍树; 广西: 青莲, 青倒水莲, 倒水莲, 石倒水莲, [骨碎补], 蜈蚣蕨(钟山); 贵州: 岩鸡尾, [人头发](黎平), 骗鸡尾、割鸡尾(惠水), 青豆梗(铜仁)。

功效 根茎: 解毒退热, 祛风利湿, 止咳止痛。用于小儿高热, 咳嗽气喘, 急性结膜炎, 尿路感染, 风湿关节痛, 牙痛。外用于荨麻疹, 疮疖肿毒, 跌打损伤。

#### 5056075

*Polypodiodes pseudoamoenum* (Ching) Ching --- *Polypodium pseudoamoenum* Ching

植物名 中华水龙骨《蕨类名称》

文献名 假友水龙骨《高植图鉴》, [戟形石韦]《汇编》, 假水龙骨《药用抱植》

地方名 湖北: 毛龙骨、石龙骨、毛姜(神农架); 湖南: 大叶下红, 叶下红。

功效 全草: 清热, 止血, 祛痰。用于跌打失血, 白带。根茎在陕西作水龙骨入药。

#### 5056076

*Polypodium virginianum* L.

植物名 东北多足蕨《蕨类名称》

文献名 东北水龙骨《高植图鉴》, 小水龙骨《辽宁宽甸药录》

功效 全草: 止血, 破血。

#### 5056077

*Polypodium vulgare* L.

植物名 多足蕨《蕨类名称》

文献名 欧亚水龙骨《高植图鉴》

地方名 新疆: 水龙骨。

功效 根茎: 清热解毒, 平肝明目。用于尿路感染, 肠炎, 腹泻, 小儿高热惊风, 急性结膜炎, 手指疗毒, 急性关节炎。

#### 5056078

*Pyrrosia adnascens* (Sw.) Ching --- *Cyclophorus adnascens* Desv.

植物名 贴生石韦《蕨类名称》

药材名 贴生石韦《广西药录》

地方名 台湾: 树龙, 风不动; 广西: 上树咳(玉林), 上树龟, 石头蛇; 其他: 铺树莲, 假耳环。

功效 全草: 利尿。用于腮腺炎, 瘰癧, 蛇咬伤, 风湿痛。

#### 5056079

*Pyrrosia assimilis* (Bak.) Ching

植物名 相异石韦《蕨类名称》

药材名 小石韦《贵州民间药物》

文献名 相似石韦《高植图鉴》

地方名 石韦(广西、云南); 湖南: 破血丹, 青连香根, 小蛇头草, 小牛舌头, 三倍半; 广西: 反食草, 马蛇连天(桂林), 小连天草, 会仙草, 山蚂蝗; 贵州: 飞惊草(黔东南), 人头发(绥阳)。

功效 全草或根: 镇痉, 利尿, 止血。用于小儿惊风, 外伤出血。

#### 5056080

*Pyrrosia assimilis* (Bak.) Ching f. *lobata* (Wu) Ching

植物名 浅裂相异石韦《新华本草纲要》

文献名 瑶山石韦《药植简编》

功效 全草: 利尿通淋, 清热止血。

#### 5056081

*Pyrrosia bonii* (Christ) Ching

植物名 苗山石韦《药植简编》

文献名 波氏石韦《蕨类名称》

功效 全草: 利尿通淋, 清热止血。

#### 5056082

*Pyrrosia calvata* (Bak.) Ching

植物名 光石韦《蕨类名称》

药材名 光石韦《四川中草》

文献名 大叶石韦《鉴别手册》, 铁牛皮《汇编》。

地方名 石韦(湖南、广西); 陕西: 尖刀七, 光叶石韦; 湖南: 六鱼刀; 湖北: 铁扁担、批杷七(神农架); 四川: 牛皮凤尾草, 大石韦, 石莲姜, 岩莲鸡尾。

功效 全草: 清热止血, 消肿散结。用于泌尿系结石, 颈淋巴结结核。外用于外伤出血, 烧烫伤。

#### 5056083

*Pyrrosia davidii* (Bak.) Ching --- *P. pekinensis* (C. Chr.) Ching

植物名 华北石韦《蕨类名称》

药材名 石韦《本经》、《汇编》

文献名 石韮《本经》, 石皮《别录》, 金星草、石兰《纲目》, 生扯拢《分类草药性》, 小石韦、北京石韦《中药志》

地方名 石背柳(河北、内蒙古、陕西); 北京: 石板柳; 河北: 石柳子, 石管茶, 牛皮茶; 内蒙古: “哈敦-呼吉”(蒙名); 陕西: 小叶石韦, 石菜, 石茶, 刀口药, 飞刀剑; 山东: 独叶茶、猫耳茶(烟台); 河南: 石茶叶、刀尖药(新乡); 湖北: 铁板还阳(神农架)。

功效 全草: 利尿通淋, 清热止血。用于肺热咳嗽, 尿路感染, 血尿等。

#### 5056084

*Pyrrosia drakeana* (Fr.) Ching

植物名 毡毛石韦《蕨类名称》

药材名 石韦《本经》、《中药大辞典》

文献名 金剑口草《植物名汇》

地方名 陕西: 蜂子七; 四川: 毛石韦, 金瓢羹,

大石韦, 牛舌头 (奉节), 牛耳朵 (绵阳, 兴文), 野鸡各 (雷波), 生扯拢 (武隆、南川), 羊耳朵 (北川、平武), 大金刀 (巫溪)。

功效 全草: 利尿通淋, 清热止血。用于肺热咳嗽, 尿路感染, 血淋, 石淋等。

### 5056085

*Pyrrosia gralla* (Gies.) Ching

植物名 西南石韦 (蕨类名称)

药材名 石韦 (《中药大辞典》)

文献名 生扯拢 (《分类草药性》), 长柄石韦 (《云南药录》)

地方名 四川: 扁担草 (巫溪、青川、马尔康)。

功效 全草: 利尿通淋, 清热止血。

### 5056086

*Pyrrosia hastata* (Thunb.) Ching

植物名 戟叶石韦 (蕨类名称)

文献名 岩石韦 (《经植手册》), 石韦 (《汉药写真集成》)

地方名 湖南: 大叶下红, 叶下红。

功效 全草: 清热, 止血, 祛瘀。用于跌打损失, 妇女红白带。

### 5056087

*Pyrrosia houi* Ching

植物名 桂石韦 (《药植简编》)

功效 全株: 利尿通淋, 清热止血。

### 5056088

*Pyrrosia inaequalis* (Christ) Ching

植物名 阔叶石韦 (《药用抱植》)

文献名 不对称石韦 (《中药志》)

功效 全草: 收敛止血, 利尿通淋。用于尿路感染, 肾炎水肿, 外伤出血。

### 5056089

*Pyrrosia intermedia* Ching

植物名 中石韦 (《沈药学报》)

地方名 四川: 石韦。

功效 全草: 镇咳祛痰, 止血, 利尿。用于慢性气管炎, 肾炎。

### 5056090

*Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell. --- *Cyclophorus lingua* Desv. --- *Pyrrosia chinensis* Mirbel.

植物名 石韦 (蕨类名称)

药材名 石韦 (《本经》、《药典》), 石韦毛 (《医林纂要》), 石韦根 (《中药大辞典》)

文献名 石韃 (《本经》), 石皮 (《别录》), 金星草、石兰 (《纲目》), 生扯拢 (《分类草药性》), 飞刀剑、剑丹 (《名实图考》), 金汤匙、石背柳 (《中药材手册》), 反背红 (《峨眉药植》), 蜈蚣七、铺地蜈蚣七、一枝箭、木上蜈蚣 (《中药大辞典》)

地方名 石剑 (江西、福建、台湾、湖南、广西), 石茶 (东北), 金茶条 (江苏、江西), 金背茶匙、牛舌 (浙江、江西), 七星剑 (浙江、福建), [满天星] (华中), 象皮草 (湖南、江西), 肺经草、肺筋草、

肺金草 (湖南、广西); 吉林: 紫石韦 (长春); 辽宁: 大石菜 (营口); 北京: 岩花柳 (百花山); 河北: 牛皮茶; 江苏: 金茶匙; 安徽: 石茶叶, 蛇眼睛; 浙江: 小叶石韦 (东阳、建德), 小石韦 (临安、临海、鄞县), 石韦叶 (浙南), 尖刀草 (遂昌), 神仙拔剑 (平阳), 凤尾 (泰顺), 天九牌草 (桐乡); 江西: 虹霓剑, 红背化骨丹, 灰尖 (铜鼓); 福建: 虹霓剑草, 潭剑, 大号七星剑, 鹿含草 (泉州、南安、德化、仙游), 小号石剑 (仙游), 红小姐; 湖南: 小叶下红, 小爬山虎, 小肺经草, 一把剑, 飞剑草, 破血草, 蛇头草, 石韦伸筋, 连天草、三十六叩 (黔阳), 叶下红, 铜卷莲、剑叶卷莲 (衡山); 广东: 肺心草, 小木鸡, 田刀板 (仁化), 石上剑 (乳源); 广西: 马驹鞋, 镰铁草, 合金草, 山柴刀, 蛇舌风 (资源); 四川: 扁担草; 贵州: 金调羹; 云南: 柔软石韦; 其他: 石柳子。

功效 叶: 利尿通淋, 清热止血。用于热淋, 血淋, 石淋, 小便不利, 淋沥涩痛, 吐血, 衄血, 尿血, 崩漏, 肺热咳嗽; 根: 通淋, 消胀, 除劳热, 止血。用于淋病, 胸膈气胀, 虚劳蒸热, 吐血, 创伤出血; 毛茸: 外用于烫火伤。

### 5056091

*Pyrrosia martinii* (Christ) Ching

植物名 矩圆石韦 (蕨类名称)

功效 叶: 利尿通淋, 清热止血。

### 5056092

*Pyrrosia mollis* (Kze.) Ching

植物名 柔软石韦 (蕨类名称)

药材名 石韦 (《滇南本草》)

文献名 石韦根 (《滇南本草》), 飞刀剑 (《名实图考》)

地方名 小石韦 (广西、云南); 广西: 小经刀草 (富川); 四川: 石岩金 (峨眉); 贵州: 大石韦、大刀草 (贵阳), 牛舌条 (惠水); 云南: 星星草 (澄江), 瓦韦 (华宁、峨山), 毛石韦。

功效 全草: 利尿通淋, 清热止血。

### 5056093

*Pyrrosia petiolosa* (Christ) Ching --- *Polypodium petiolosa* Christ

植物名 有柄石韦 (蕨类名称)

药材名 石韦 (《本经》), 石韦毛 (《医林纂要》), 石韦根 (《中药大辞典》)

文献名 石韃 (《本经》), 石皮 (《别录》), 金星草、石兰 (《纲目》), 生扯拢 (《分类草药性》), 飞刀剑、剑丹 (《名实图考》), 金汤匙、石背柳 (《中药材手册》), 小叶石韦 (《鉴别手册》)

地方名 小石韦 (上海、江苏、台湾), 石茶 (东北、河北、内蒙古), 猫耳朵 (四川、山东); 黑龙江: 石菜; 吉林: 牛皮茶, “哎哥伊” (朝名); 辽宁: 血疾草; 河北: 独叶草, 石管茶, 岩花柳; 内蒙古: “巴日各白” (蒙名); 山东: 独叶茶 (烟台), 观音茶 (昆崙山、泰山), 八宝茶 (平邑), 丹叶草 (青岛); 浙江: 金背茶匙 (杭州); 河南: 刀尖药, 石茶叶;

湖北：金茶匙，金汤瓢；四川：金瓢羹，金瓢兀，金茶条，石耳朵，石剑红，牛耳朵石韦，瓦寄生，瓦苇，小尖刀，大尖刀。

功效 叶：利尿通淋，清热止血；根：通淋，消胀，除劳热，止血；茸毛：外用于烫火伤。

## 5056094

*Pyrrosia sheareri* (Bak.) Ching

植物名 庐山石韦《蕨类名称》

药材名 大石韦《汇编》

文献名 石韦《名实图考》，大连天草、箭戟蕨《中药大辞典》

地方名 浙江：大叶石韦（宁波、建德、天台、平阳、龙泉），光板石韦，石簪；江西：金石韦、金茶匙（庐山）；湖南：大叶下红，叶下红，岩人树，卷莲，小女儿红，石芝；广西：石笔（南宁），肺金草；四川：石韦（绵阳），猫耳朵，金瓢羹；其他：金背茶匙，牛口舌，石柳子。

功效 叶：利尿通淋，清热止血。

## 5056095

*Pyrrosia similis* Ching

植物名 相似石韦《蕨类名称》

文献名 灰背石韦《广西药录》

地方名 广西：石韦（天等、马山）。

功效 叶：利尿通淋，清热止血。

## 5056096

*Pyrrosia tonkinensis* (Christ) Ching

植物名 越南石韦《蕨类名称》

文献名 宽尾石韦《云南药录》

地方名 广西：石韦（马山）。

功效 全草：用于热咳，尿路感染。

## 5056097

*Saxiglossum angustissimum* (Gies.) Ching --- *S. taenioides* (C. Chr.) Ching

植物名 石蕨《蕨类名称》

药材名 石蕨《汇编》

地方名 陕西：石豇豆，石小豆，石缩衣，石筋，石茶叶（嵩县），乌金（山阳）；甘肃：石蜈蚣；浙江：鸭舌韦、鸭舌鱼鳖（天目山），苍条鱼鳖（杭州）；河南：石针，石豆角；湖北：铁丝还阳、赶山鞭（神农架）；湖南：卧龙草（新邵），马牙齿（古丈），瓜子草、三百棒（通道），打不死（龙山），单边（凤凰），穆桂英（吉首），疏经草（衡山），小救驾（麻阳）；广西：蚂蝗连天蕨，拟石韦，马黄七，连天草，小肺金，小线蕨，回阳生（资源）；四川：鸭石韦（峨眉山），止血草（绵阳）。

功效 全草：清热利湿，凉血止血。用于目赤，咽喉肿痛，小便不利，白带，风湿腰腿痛，咯血，吐血，衄血，崩漏。

## 5057 槲蕨科 Drynariaceae

## 5057001

*Drynaria baronii* (Christ) Diels --- *D. sinica* Diels

植物名 中华槲蕨《高植图鉴》

药材名 骨碎补《本草拾遗》、《药典》

文献名 华槲蕨《蕨类图说》，秦岭槲蕨《秦岭植物志》，烫骨碎补《药典》

地方名 石岩姜、爬岩姜（四川、贵州），猴姜（山西、宁夏、四川），毛姜（山西、宁夏、青海、甘肃），板蕨、爬崖子（甘肃、贵州）；山西：申姜；甘肃：崖姜（武都）；青海：毛辣姜，黄金狗，猴儿姜，“热然”（藏名）；台湾：大骨碎补；四川：石良姜、碎骨草（南桐），“喂江热热”（若尔盖藏名）。

功效 根茎：补肾强骨，续伤止痛。用于肾虚腰痛，耳鸣耳聋，牙齿松动，跌扑闪挫，筋骨折伤。外用于斑秃，白癜风；根茎鳞毛：用于外伤出血，火伤。

## 5057002

*Drynaria bonii* Christ

植物名 团叶槲蕨《高植图鉴》

地方名 陕西：猴姜；甘肃：板角，毛姜，毛儿姜，骆驼；广西：骨碎补（大新、百色），肉碎补（博白）。

功效 根茎：外用于骨折。

## 5057003

*Drynaria delavayi* Christ

植物名 川滇槲蕨《蕨类名称》

药材名 骨碎补《西昌中草药》

文献名 云南槲蕨《西昌中草药》

地方名 四川：碎补、爬岩姜（西昌）。

功效 根茎：祛风活络，补肾接骨。用于肾虚腰痛，腰肌劳损，风湿麻木，肾虚牙痛，骨折。

## 5057004

*Drynaria fortunei* (Kze.) J. Sm.

植物名 槲蕨《蕨类名称》

药材名 骨碎补《药性论》、《药典》

文献名 猴姜、猢狲姜《本草拾遗》，石毛姜《日华子本草》，石庵苣《开宝本草》，舒州骨碎补、戎州骨碎补《证类本草》，过山龙《名实图考》，石岩姜《草木便方》，石良姜《分类草药性》，观音桥《中国药植志》，骨碎补毛《福建民间草药》

地方名 肉碎补（广东、广西），爬岩姜、爬崖姜（湖南、湖北、四川、贵州、云南），爬山虎（湖南、云南），岩姜、崖姜（浙江、四川、贵州），岩连姜、猴子姜（湖南、广西），猴掌（福建、湖南、广西），猴生姜（江西、福建、湖南），石姜（江西、湖南），凤凰鸡（湖南、广东）；浙江：猴申姜（开化、兰溪、建德、遂昌、缙云），熊掌（开化），毛生姜（金华、遂昌），毛姜，申姜，鸡姜（泰顺）；安徽：飞蛇子（太和）；江西：樟姜；福建：猴里姜、猴已姜（闽东），悲天飞扬（上杭）；湖北：碎补还阳（神农架）；湖南：王姜（零陵），枫姜（郴县），石板姜（长沙、常德），猴脚板（常德）；广东：鸭利碎补，千夜锦，伏石鸡；广西：猢狲姜（南宁），猴子掌，猴掌姜（贵县），飞蛾草（凤山），大飞龙（容县）；四川：碎

朴, 碎卜, 碎甫, 巴岩姜, 巴毛虱 (峨眉), 吊兰, 石吊兰、树吊兰、石鸡儿 (成都), 树连姜; 云南: 树蜈蚣、猴子草、绿爬山虎、铁蕨蕨 (红河), 老鹰翅膀 (保山、红河), 麻鸡翅膀, 地蜈蚣, [搜山虎], 黄爬山虎, 利水竹 (临沧); 其他: 石碎补, 飞天鼠, 飞来凤, 牛飞龙, 乌孙姜。

**功效** 根茎: 补肾强骨, 续伤止痛。用于肾虚腰痛, 耳鸣耳聋, 牙齿松动, 跌扑闪挫, 筋骨折伤。外用于斑秃, 白癜风; 根茎鳞毛: 用于外伤出血, 火伤。

#### 5057005

*Drynaria propinqua* (Wall.) J. Smith

植物名 石莲姜蕨 (蕨类名称)

文献名 骨碎补 (名实图考), 近邻蕨 (四川中药志)

地方名 骨碎补 (广西、四川、云南); 湖南: 猴姜; 四川: 爬岩姜, 爬山姜, 石岩姜, 碎补; 云南: 老鹰翅膀。

**功效** 根茎: 用于跌打损伤。

#### 5057006

*Drynaria quercifolia* (L.) J. Sm.

植物名 栎叶蕨 (蕨类名称)

地方名 海南: 骨碎补, 树骨碎补, 树上猴姜。

**功效** 根茎: 外用于骨折。

#### 5057007

*Pseudodrynaria coronans* (Wall.) Ching --- *Polypodium coronans* Wall. --- *Drynaria coronans* Wall.

植物名 崖姜蕨 (蕨类名称)

药材名 崖姜 (汇编)

文献名 骨碎补、猴姜、胡孙姜 (本草拾遗), 石毛姜 (日华子本草), 过山龙 (名实图考), 石岩姜 (草木便方), 石良姜 (分类草药性)

地方名 大骨碎补 (福建、广东); 广东: 凤姜 (南雄、兴始), 石麒麟 (曲江), 穿石剑; 广西: 马骝姜 (平南), 玉麒麟 (北流); 云南: 王冠蕨、“故望” (西双版纳傣语)。

**功效** 根茎: 祛风除湿, 舒筋活络。用于风湿疼痛, 跌打损伤, 骨折, 中耳炎。

### 5060 剑蕨科 Loxogrammaceae

#### 5060001

*Loxogramme chinensis* Ching

植物名 中华剑蕨 (蕨类名称)

文献名 华剑蕨 (药植简编)

地方名 四川: 石虎 (峨眉山), 石龙。

**功效** 根茎: 清热解毒, 活血利尿。用于尿路感染, 劳伤, 狂犬咬伤。

#### 5060002

*Loxogramme salicifolia* (Makino) Makino

植物名 柳叶剑蕨 (蕨类名称)

地方名 湖北: 条石韦 (神农架); 广西: 肺癆草 (临桂、阳朔)。

**功效** 根茎: 清热解毒。用于犬咬伤, 尿路感染; 全草: 用于肺结核咳嗽。

### 5061 草科 Marsileaceae

#### 5061001

*Marsilea quadrifolia* L.

植物名 萍 (蕨类名称)

药材名 萍 (吴普本草)、(汇编)

文献名 蕒草 (山海经), 蘋 (诗经), 田字草、芣菜 (吴普本草), 大萍 (本草经集注), 水连绵 (本草拾遗), 四叶菜 (鸩言), 破铜钱 (纲目), 四眼菜 (分类草药性), 四叶草 (天宝本草), 四叶蕨 (蕨类志属), 四肾菜 (诗草木今释), 水上浮 (民间药与验方)

地方名 四叶萍 (陕西、江西、福建), 四叶莲 (安徽、江西、湖南、广东), 四瓣草 (安徽、河南、四川、云南), 十字草 (上海、安徽、福建、广西), 破铜钱草 (上海、浙江), 水铜钱 (江苏、浙江、湖南), 水盐酸 (福建、台湾), 萍 (陕西、安徽、四川); 陕西: 水灵台; 江苏: 水吐丝, 野勒墓 (苏州); 上海: 水草头, 水金花头, 野草头, 野连菜, 野极菜, 夜里串, 夜爬山, 姊妹草; 浙江: 水羚羊、四瓣莲船 (温州), 月字草 (文成), 田芥、田浆味酸 (瑞安); 安徽: 浮萍草, 钱番草 (太和); 江西: 四叶对 (婺源), 野花草 (吉水), 夜牵连, 大叶破铜钱 (庐山), 四叶破铜钱; 福建: 遍地拳 (晋江), 隔夜抽 (仙游), 水酸斋 (永安), 水葡萄酸 (明溪), 水浮钱、小湖藤 (宁化), 四蝶草, 山田芝, 四片金钱草, 四叶仔 (厦门), 四片金, 四叶珠, 夜牵藤, 惊田草, 晶草, 野猫合, 卤酸叶; 湖南: 夜翰 (霞浦), 田山芝, 水四片瓦、小四片瓦 (黔阳); 广东: 夜合草 (广州), 四瓣梅 (潮安); 海南: 水浮萍; 广西: 水对草 (陆川), 打架菜, 浮水莲 (贵县); 四川: 烂毛钱, 同字草、夜关门 (北碚); 贵州: 青萍 (贵阳), 水夜关门 (石阡)。

**功效** 全草: 清热解毒, 利尿消肿, 安神, 截疟。用于泌尿系感染, 肾炎水肿, 肝炎, 神经衰弱, 急性结膜炎。外用于乳腺炎, 疟疾, 疔疮疖肿, 蛇咬伤。

### 5062 槐叶草科 Salviniaceae

#### 5062001

*Salvinia natans* (L.) All. --- *S. rotundifolia* Willd.

植物名 槐叶草 (蕨类名称)

药材名 槐叶草 (汇编)

文献名 麻藻 (群芳谱), 蜈蚣萍、边箕萍 (纲目拾遗)

地方名 水百脚 (上海、浙江), 水蜈蚣 (浙江、湖南), 蜈蚣藻 (浙江、上海、江西), 大鱼萍 (福建、广西); 上海: 槐瓢、槐瓢, 槐藻, 水舌头草; 浙江: 长脚浮藻 (长兴), 百脚水草 (平湖), 萍 (常山); 福建: 马萍, 水浮蜈蚣 (泉州), 蜈蚣浮萍; 湖南: 水浮藻, 铁浮萍、百脚浮萍、蜈蚣草 (衡山);

广西：草鞋蕨，大蕨；四川：大浮飘（峨眉山）；贵州：大浮萍（雷公山），“包田麻”（雷公山苗语）。

功效 全草：清热解暑，活血止痛。外用于疔毒、痈肿，瘀血肿痛，烧、烫伤。

### 5063 满江红科 Azollaceae

#### 5063001

*Azolla imbricata* (Roxb.) Nakai

植物名 满江红《藻类名称》

药材名 满江红《纲目》、《汇编》

文献名 红浮萍《分类草药性》，草无根、水浮漂《天宝本草》

地方名 红浮飘、红浮藻（贵州、四川、江西）；江苏：红浮萍；浙江：紫藻、三角藻（临安），绿萍；江西：藻；广西：[紫背浮萍]，红漂浮，红浮藻（藤县）；四川：浮飘；贵州：[紫萍]。

功效 全草：发汗，祛风，透风，透疹。用于风湿疼痛，风瘙瘾疹，麻疹透发不出。外用于癬疮，火伤；根：润肺，止咳。用于瘡病，发汗利尿。

## 六、裸子植物类 *Gymnospermae*

### 6001 苏铁科 Cycadaceae

#### 6001001

*Cycas circinalis* L.

植物名 拳叶苏铁《中国植志》

药材名 旋叶苏铁《台湾药植志》

功效 心皮：用于外伤；种子：用于皮肤病；树皮、嫩叶：用于肿毒；树脂：用于恶疮；嫩叶粘液：用于肠胃气胀、吐血。

#### 6001002

*Cycas pectinata* Griff.

植物名 篲齿苏铁《中国植志》

文献名 凤尾蕉《纲目拾遗》

地方名 云南：凤凰蛋。

功效 叶：收敛止血，解毒止痛；花：理气止痛，益肾固精；种子：平肝，降压；根：祛风活络，补肾。

#### 6001003

*Cycas revoluta* Thunb.

植物名 苏铁《中国植志》

药材名 苏铁《汇编》

文献名 香蕉《群芳谱》，凤尾松《花镜》，干岁子、铁树、凤尾蕉《纲目拾遗》，铁树果、凤凰蛋（种子）《名实图考》，铁蕉《植物名汇》，避火蕉《树分》，辟火蕉《中国植志》

地方名 福建：铁榧（霞浦），铁榧蛋（福鼎），铁凤梨（泉州）；台湾：苏铁实，[无漏子]（种子）；广东：凤凰爪（心皮），金边凤尾、金鸡爪、大叶凤尾（惠阳）；广西：[凤尾草]（临桂），[凤尾蕨]、大风尾（陆川）；四川：铁甲松，铁树花，梭罗花，万年棕（重庆）。

功效 叶：收敛止血，解毒止痛。用于各种出血，胃炎，胃溃疡，高血压，神经痛，闭经，癌症；花：理气止痛，益肾固精。用于胃痛，遗精，白带，痛经；种子：平肝，降压。用于高血压；根：祛风活络，补肾。用于肺结核咯血，肾虚牙痛，腰痛，白带，风湿关节麻木疼痛，跌打损伤。

#### 6001004

*Cycas rumphii* Miq.

植物名 华南苏铁《中国植志》

文献名 刺叶苏铁《树分》，龙尾苏铁《海南植志》，印度苏铁《台湾药植志》，凤尾蕉《植物名汇》，[西谷米]（李《药植》）

地方名 广东：神仙米，凤凰蕨；海南：山瑞，仙税；广西：凤尾松。

功效 种子：用于创伤，湿疹，皮肤病；根：用于无名肿毒。

备考 “西谷米”应是棕榈科植物西谷椰子树 *Metroxylon sagu* Rottb. 茎内淀粉的加工品，产菲律宾、印度尼西亚等地，人称这种树为出“米”的树。

#### 6001005

*Cycas Siamensis* Miq.

植物名 云南苏铁《中国植志》

文献名 铁树、凤凰蛋《名实图考》，泰国苏铁《汇编》

地方名 广西：神仙米（龙州），山菠萝；云南：孔雀抱蛋（西双版纳、红河、思茅），暹罗苏铁，苏铁，象尾菜（思茅），凤尾蕉（红河），铁树果。

功效 种子：有毒。用于肠炎，痢疾，消化不良，呃逆，气管炎；根：用于痢疾肿毒。

### 6002 银杏科 Ginkgoaceae

#### 6002001

*Ginkgo biloba* L.

植物名 银杏《中国植志》

药材名 白果《日用本草》、《药典》，白果肉、白果汁《滇南本草》，白果叶《品汇精要》，白果树皮《滇南本草图说》，白果根《重庆草药》

文献名 灵眼《太仓州志》，[佛指甲]《浙江通志》，佛指柑《一握坤舆》，鸭脚子《纲目》，公孙树《汝南圃史》，鸭脚《宛陵集》，白杏、仁杏、[玉果]《清州植录》，叶树《植物名汇》，白果树《中国药植志》，白果仁、炒白果仁《药典》

地方名 蛾叶(江西、湖南),鸭掌树(陕西、北京);河北:银杏核;上海:白眼树;江苏:蒲扇;浙江:梅核;福建:鸭脚树(浦城、建瓯、建阳、崇安、邵武),公孙碧;湖南:鸭脚板。

功效 种子(白果):有毒。敛肺定喘,止带浊,缩小便。用于痰多喘咳,带下白浊,遗尿尿频;叶:敛肺,平喘,止痛。用于肺虚咳喘,冠心病,心绞痛;根或根皮:益气补虚弱。用于白带,遗精;树皮:外用于牛皮铜钱癣;白果肉:用于噎食反胃,白浊冷淋。外用于头风,眼疼;白果汁:外用于咽喉十八症。

### 6003 南洋杉科 Araucariaceae

#### 6003001

*Agathis dammara* (Lamb.) Rich. --- *A. alba* (Lam.) Foxw. --- *A. philippinensis* Warb. --- *Dammara alba* Lam.

植物名 贝壳杉《中国植志》

药材名 贝壳杉脂(拟)

文献名 菲律宾贝壳杉《台湾药植志》

功效 树脂:为硬膏、创伤膏及牙科用粘固粉等原料。

#### 6003002

*Araucaria cunninghamii* Sweet

植物名 南洋杉《中国植志》

功效 南洋杉酮:用于皮肤过敏。

备考 树脂名玳玛树脂。

### 6004 松科 Pinaceae

#### 6004001

*Abies chensiensis* Van Tiegh.

植物名 秦岭冷杉《中国植志》

药材名 秦岭冷杉果(拟)

文献名 枞树《中国裸植志》,陕西冷杉《华北经植志要》

地方名 陕西:蒲松果,冷杉果,松梅;湖北:泡杉、油杉、黄瓜梅、篦子杉、朴松实(神农架)。

功效 球果:调经,止血,消炎,止痛。

#### 6004002

*Abies delavayi* Franch.

植物名 苍山冷杉《中国植志》

药材名 大理冷杉果(拟)

文献名 高山枞《中国裸植志》,大理冷杉《汇编》,塔杉《中药大辞典》

地方名 四川:“唐则”(藏名),冷杉,冷杉果;云南:白泡树(宾川)。

功效 球果:理气散寒。用于发痧气痛,胸腹冷痛及小肠疝气。

#### 6004003

*Abies fabri* (Mast.) Craib

植物名 冷杉《中国植志》

药材名 冷杉果《峨眉药植资源》

文献名 枞《群芳谱》,峨眉冷杉《四川植志》

地方名 四川:塔杉,冷果(峨眉山),泡杉。

功效 球果:理气,散寒,止痛。

#### 6004004

*Abies fargesii* Franch. --- *A. sutchuenensis* (Franch.) Rehd. et Wils.

植物名 巴山冷杉《中国植志》

药材名 朴松实《陕西中草药》

文献名 鄂西冷杉、太白冷杉《树分》,川枞、华枞《中国裸植志》,洮河冷杉《经植手册》,四川冷杉《汇编》

地方名 陕西:杉木(秦岭),冷杉果,蒲松果,松墨(陕南);湖北:冷杉、猴毛杉(神农架)。

功效 球果:平肝熄风,调经,止血,止带。用于高血压病,头痛,头晕,心神不安,月经不调,崩漏,白带。

#### 6004005

*Abies holophylla* Maxim.

植物名 杉松《植分学报》

文献名 辽东冷杉《树分》

地方名 沙松、白松、臭松(东北);吉林:杉木。

功效 叶、树皮:用于熏洗风湿症。

#### 6004006

*Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim. --- *A. sibirico-nephrolepis* Takenouchi et Chien

植物名 臭冷杉《中国植志》

文献名 东陵冷杉《树分》,白枞《中国裸植志》,华北冷杉《华北经植志要》

地方名 臭松、白松、臭枞(东北);河北:白果枞,胡桃庐子、冷杉(小五台山),桃江庐子(涿鹿)。

功效 叶、树皮:长白山区民间用洗腰腿痛。

#### 6004007

*Abies spectabilis* (D. Don) Spach

植物名 西藏冷杉《中国植志》

药材名 西藏冷杉脂(拟)

文献名 喜马拉雅冷杉《树分》,喜马拉雅枞《中国裸植志》

地方名 青海:“松兴”(藏名)。

功效 松脂:用于肾炎,淋病。

#### 6004008

*Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don --- *Pinus deodara* Roxb.

植物名 雪松《中国植志》

地方名 香柏(北京、西藏)。

功效 叶、木材:止痢,止痛,止血,杀虫;松油:用于溃疡,皮肤病,麻风。

#### 6004009

*Keteleeria davidiana* (Bertr.) Beissn

植物名 铁坚油杉《中国植志》

文献名 铁坚杉《树分》,德氏油杉、牛尾杉、油杉《台湾药植志》

地方名 陕西:篦子松(陕南);四川:天枞(涪陵),铁杉(绵阳)。

功效 根部精油及种子油:用于皮肤病。

#### 6004010

*Keteleeria evelyniana* Mast.

植物名 云南油杉《中国植志》

药材名 杉松《云南药录》

文献名 云南杉松《中国树木学》

地方名 四川:杉老树(会理),〔罗汉松〕(西昌);云南:松壳络树(思茅),杉罗松(元江、通海),沙松树(华宁、澄江),杉树(昆明),黑杉松(景东、广南),滇油杉。

功效 根皮:祛瘀,消肿,接骨。用于跌打损伤,骨折,疮痈,漆疮。

#### 6004011

*Keteleeria fortunei* (Murr.) Carr.

植物名 油杉《中国植志》

药材名 油杉《福建药物志》

地方名 福建:松栝,〔杜松〕(福州、闽侯、闽清、莆田、南安、龙海),唐杉(惠安),〔松罗〕(南靖、云霄、漳州),水松(连城、上杭、永定);广东:海罗松(大埔)。

功效 根皮、叶:消肿解毒。用于深部脓肿,穿掌疔,痈肿初起。

#### 6004012

*Larix chinensis* Beissn.

植物名 太白红杉《中国植志》

文献名 太白落叶松《植分学报》

地方名 陕西:落叶松(太白山)。

功效 果实:平肝熄风,调经,止血,止带。

#### 6004013

*Larix gmelini* (Rupr.) Rupr. --- *L. dahurica* Laws. --- *L. dahurica* Turcz. f. *macrocarpa* Liou et Wang --- *L. gmelini* (Rupr.) Kuzen. var. *hsinganica* Yang et Y. L. Chou

植物名 落叶松《中国植志》

文献名 兴安落叶松、大果兴安落叶松、粉果兴安落叶松、齿果兴安落叶松《东北木本图志》

地方名 意气松、一齐松(东北)。

功效 松节油:止痛。

#### 6004014

*Larix kaempferi* (Lamb.) Carr. --- *L. leptolepis* (Sieb. et Zucc.) Gord.

植物名 日本落叶松《中国植志》

功效 松节油:止痛。

#### 6004015

*Larix olgensis* Henry --- *L. koreana* Nakai --- *L. olgensis* Henry var. *koreana* Nakai --- *L. olgensis* Henry f. *intermedia* Rakenouchi --- *L. olgensis* Henry var. *changpaiensis* Yang et Y. L. Chou

植物名 黄花落叶松《中国植志》

文献名 多鳞兴安落叶松《东北木本图志》,长白落叶松《树分》,朝鲜落叶松、长果长白落叶松《中国植志》

地方名 黄花松(东北)。

功效 松节油和松香:祛风,止痛。

#### 6004016

*Larix potaninii* Batalin

植物名 红杉《中国植志》

文献名 落叶松《中国裸植志》

地方名 青海:“仲美兴”(藏名)。

功效 树干内皮:用于痢疾,脱肛,气滞腹胀。

#### 6004017

*Larix principis-rupprechtii* Mayr --- *L. wulingshanensis* Liou et Wang

植物名 华北落叶松《中国植志》

文献名 雾灵落叶松、红插《东北木本图志》

地方名 落叶松、黄花松(东北);河北:黄杆;山西:松树。

功效 树脂、松节油:祛风,止痛。

#### 6004018

*Picea asperata* Mast. --- *P. heterolepis* Rehd. et Wils. --- *P. asperata* Mast. var. *heterolepis* (Rehd. et Wils.) Cheng

植物名 云杉《中国植志》

文献名 茂县云杉《树分》,茂县杉《中国裸植志》,异鳞云杉、大云杉、大果云杉《经植手册》,粗枝云杉《四川植志》

地方名 甘肃:白松;四川:刺杉(马尔康)。

功效 松脂:燥湿祛风,生肌止痛。

#### 6004019

*Picea jezoensis* Carr. var. *ajanensis* (Fisch.) Cheng et L. K. Fu --- *Picea ajanensis* Fisch. ex Trautv. et Mey.

植物名 卵果鱼鳞云杉《中国植志》

文献名 鱼鳞松《吉野》,鱼鳞云杉《东北木本图志》

地方名 白松(东北)。

功效 松节油和松香:祛风,止痛。

#### 6004020

*Picea jezoensis* Carr. var. *komarovii* (V. Vassil.) Cheng et L. K. Fu --- *P. komarovii* V. Vassil.

植物名 长白鱼鳞云杉《中国植志》

文献名 长白鱼鳞松《中国树木学》

地方名 鱼鳞松(东北);吉林:白松、鱼鳞云杉(长白山)。

功效 叶、枝、树皮蒸馏液:用于气管炎。

#### 6004021

*Picea jezoensis* Carr. var. *microsperma* (Lindl.) Cheng et L. K. Fu

植物名 鱼鳞云杉《中国植志》

文献名 鱼鳞杉《中国裸植志》

地方名 鱼鳞松(东北)。

功效 松脂:燥湿祛风,生肌止痛。

#### 6004022

*Picea koraiensis* Nakai --- *P. pungsanensis* Uyeki --- *P. tonaiensis* Nakai --- *P. intercedens* Nakai --- *P. koyamai* Shiras. var. *koraiensis* (Nakai) Liou et Wang

植物名 红皮云杉《中国植志》

文献名 沙树《树分》,带岭云杉《东北木本图志》,岛内云杉、丰山云杉、溪云《中国植志》

地方名 红皮臭、虎尾松、高丽云杉、小片鳞松、针松(东北);吉林:白松(长白山)。

功效 枝、叶、树皮:外用于风湿症。

#### 6004023

*Picea meyeri* Rehd. et Wils.

植物名 白杆《中国植志》

文献名 钝叶杉《中国裸植志》, 红杆云杉《东北木本图志》, 刺儿松《经植手册》, 毛枝云杉《中国植志》

地方名 红杆(河北、内蒙古); 河北; 白儿松, [罗汉松]。

功效 枝节: 祛风湿, 止痛; 花粉: 燥湿, 收敛止血; 叶: 祛风活血, 明目, 安神, 解毒, 止痒。

#### 6004024

*Picea retrodlexa* Mast.

植物名 鳞皮云杉《中国植志》

文献名 箭炉云杉《树分》, 密毛杉《中国裸植志》

功效 松脂: 燥湿祛风, 生肌止痛。

#### 6004025

*Picea smithiana* (Wall.) Boiss. - *P. morinda* (Loud.)

Link

植物名 长叶云杉《中国植志》

文献名 大果云杉《青藏药图》, 长叶杉《中国裸植志》

地方名 青海: “仲美兴”(藏名)。

功效 松脂: 用于肾炎, 淋病。

#### 6004026

*Picea wilsonii* Mast. --- *P. mastersii* Mayr --- *P. watsoniana* Mast.

植物名 青杆《中国植志》

文献名 杆木《名实图考》, 细叶松、方叶杉《中国裸植志》, 白杆云杉《东北木本图志》, 细叶云杉《经植手册》, 华北云杉《中国植志》

地方名 白杆(河北、内蒙古); 河北: 刺儿松, 黑杆松, 白杆松(东陵); 陕西: 紫木树(佛坪); 湖北: 红毛杉(神农架)。

功效 枝节: 祛风活血, 止痛; 花粉: 燥湿, 收敛止血。

#### 6004027

*Pinus armandi* Franch.

植物名 华山松《中国植志》

文献名 飞松子《纲目拾遗》, 青松、果松、抓实、梧实《徐霞客游记》, 五叶松《中国裸植志》

地方名 台湾: 红松柏, 松柏; 河南: 白松; 湖北: 白皮松(神农架); 四川: 骡松(峨眉山), 五须松; 云南: 吃松。

功效 枝节: 祛风湿, 止痛; 叶: 祛风活血, 明目, 安神, 解毒, 止痒; 花粉: 燥湿, 收敛止血; 种仁: 润肺, 滑肠。

#### 6004028

*Pinus bungeana* Zucc. et Endl.

植物名 白皮松《中国植志》

药材名 松塔《中草药学》

文献名 蛇皮松果、白松果《中草药学》, 白松塔《山西中草药》

地方名 孔雀松(陕西、甘肃、宁夏); 河北: 蟠龙松; 北京: 白果松; 山西: 松球, 松果, 樟树核桃; 山东: 虎皮松; 江苏: 蛇皮松; 河南: 白骨松, 三针松; 湖北: 岩白松。

功效 球果: 祛痰, 止咳, 平喘。用于慢性气管炎。

#### 6004029

*Pinus dabeshanensis* Cheng et Law --- *Pinus anhweiensis* Cheng et Y. W. Law

植物名 大别山五针松《中国植志》

文献名 安徽五针松《中国树木学》

功效 枝节: 祛风湿, 止痛; 叶: 祛风活血, 明目, 安神, 解毒, 止痒; 花粉: 燥湿, 收敛止血; 种仁: 润肺, 滑肠。

#### 6004030

*Pinus densata* Mast.

植物名 高山松《中国植志》

文献名 西康油松《树分》, 西康赤松《中国裸植志》

功效 松花粉: 收敛止血。

#### 6004031

*Pinus densiflora* Sieb. et Zucc.

植物名 赤松《中国植志》

药材名 松节《千金方》, 松花粉《汇编》

文献名 赤龙鳞《水类铃方》, 赤龙皮《纲目》, 日本赤松《树分》, 灰果赤松、短叶赤松、辽东赤松《东北木本图志》

地方名 松树(东北、山东); 山东: 白头松(崂山), 红顶松(威海)。

功效 松节: 祛风湿, 止痛; 花粉: 燥湿, 收敛止血。

#### 6004032

*Pinus elliottii* Engelm.

植物名 湿地松《中国植志》

地方名 台湾: 美松。

功效 树脂: 燥湿祛风, 生肌止痛。

#### 6004033

*Pinus griffithii* Me Clelland --- *P. excelsa* Wall. ex D. Don

植物名 乔松《中国植志》

文献名 “仲美兴”(藏名)《青藏药图》

功效 松脂: 用于肾炎, 淋病。

#### 6004034

*Pinus henryi* Mast. --- *P. massoniana* Lamb. var. *henryi* (Mast.) Wu

植物名 巴山松《中国植志》

文献名 短叶马尾松《植分学报》

功效 花粉: 燥湿, 收敛止血。

#### 6004035

*Pinus insularis* Endl.

植物名 岛松《中国植志》

功效 叶油: 驱蚊。

#### 6004036

*Pinus kesiya* Royle ex Gord. var. *langbianensis* (A. Chev.) Gaussen --- *P. langbianensis* A. Chev. all.

植物名 思茅松《中国植志》

地方名 云南: 松树, “埋便”(西双版纳傣语), 黄皮松、黑皮松(思茅)。

功效 松香、松节: 祛风湿, 止痛; 花粉: 燥湿, 收敛止血; 树皮: 收敛, 生肌; 嫩枝: 活血止痛。

#### 6004037

*Pinus koraiensis* Sieb. et Zucc.



植物名 红松《中国植志》

药材名 海松子《开宝本草》

文献名 松子《海药本草》, 海松《开宝本草》, 松子仁《本草衍义》, 新罗松、新罗松子《纲目》, 裸松《满蒙产药用植物》, 朝鲜五叶松《经植手册》, 朝鲜松《中国裸植志》

地方名 果松(东北); 占林; 红果松(长白山)。

功效 种子(海松子): 养液, 熄风, 润肺, 滑肠。用于风痹, 头眩, 燥咳, 吐血, 便秘; 花粉: 燥湿收敛; 松节: 祛风湿, 止痛; 松叶: 祛风活血, 明目安神, 解毒, 止痒; 种仁: 润肺, 滑肠。

#### 6004038

*Pinus kwantungensis* Chun ex Tsiang

植物名 华南五针松《中国植志》

文献名 广东松《经植手册》

地方名 广西: 野松树。

功效 树脂: 用于肌肉痛, 关节痛等。

#### 6004039

*Pinus latteri* Mason

植物名 南亚松(海南岛)、《中国植志》

文献名 越南松《中国裸植志》, 南洋二针松《植分学报》, 海南松《海南植志》

地方名 海南: 红松, 油松。

功效 树脂、松节油: 用于肌肉痛, 关节痛等。

#### 6004040

*Pinus luchuensis* Mayr

植物名 琉球松《中国植志》

功效 松节油、松香: 祛风, 止痛; 松油: 用于疥疮及马牛疮。

#### 6004041

*Pinus massoniana* Lamb.

植物名 马尾松《中国植志》

药材名 松花粉《唐本草》、《药典》, 松香、松笔尖《滇南本草》, 松节、松叶《别录》, 桐根《本草经集注》, 松节油《药典》, 松油、松球《纲目拾遗》, 松树皮、松子仁《汇编》

文献名 花粉: 松花、松黄《唐本草》; 树脂: 松脂、松膏、松肪《本经》, 松胶香《刘涓子鬼遗方》, [沥青]《卫生宝鉴》, 白松香《滇南本草》, 松胶《纲目》, 黄香《本草原始》, 松脂香《草木便方》; 松油: 松油《唐本草》, 沥青《纲目拾遗》; 幼枝尖端: 松树蕊《滇南本草》; 枝干结节: 黄松本节《圣惠方》, 油松节《药材资料汇编》; 叶: 猪鬃松叶《圣惠方》, 松毛《纲目》, 山松须《生草药性备要》; 球果: 松实《别录》; 树皮: 松根白皮《别录》, 松本皮《纲目》; 植名: 松《别录》, 山松《生草药性备要》, 枞树、台湾赤松《中国森林植志》

地方名 青松(浙江、安徽、湖南、江西、广东、广西), 枞松、黄鳞松(广东、广西), 松柏(福建、台湾); 江苏: 松榔头(苏州); 江西: 将军剑(泰和), 崇树; 福建: 青胡须(厦门), 橄香(泉州), 松毛胡(永安), 松柏须、松松须(大田), 枞柏, 岗杨; 台湾: 松萝; 湖南: 针叶松(衡山); 广东: 青松毛, 山松毛, 山松子, 松鸡, 松毛子; 广西: 松

木笔, 松苗(临群); 四川: 松元, 松树疙瘩, 虫树、老龙鳞(重庆), “撞贤”(若尔盖藏语), 厚皮松, 康松; 贵州: 松毛树, 丛毛树, “瓦更通”(黔东南侗语)。

功效 松花粉: 燥湿收敛, 止血。用于湿疹, 黄水疮, 皮肤糜烂, 脓水淋漓, 外伤出血, 尿布性皮炎; 节、挥发油(松节油): 祛风湿, 止痛。用于肌肉痛, 关节痛, 屈伸不利; 松叶: 祛风活血, 明目, 安神, 解毒, 止痒。用于流感, 风湿关节痛, 跌打肿痛, 夜盲症, 高血压病, 神经衰弱。外用于冻疮; 树干内皮(松树皮): 收敛, 生肌。外用于烧、烫伤, 小儿湿疹; 种仁(松子仁): 润肺, 滑肠。用于肺燥咳嗽, 慢性便秘; 树脂(松香): 有小毒。燥湿祛风, 生肌止痛。外用于痈疽疮疡, 湿疹, 外伤出血, 烧、烫伤; 球果(松球): 用于慢性气管炎; 幼根或根白皮(松根): 用于筋骨痛, 伤损吐血, 牙痛; 幼枝尖端(松笔尖): 活血止痛。用于跌打损伤, 小便淋痛; 火烧松枝沥液(松油): 用于疮疥及牛马疮。

#### 6004042

*Pinus massoniana* Lamb. var. *hainanensis* Cheng et L. K. Fu

植物名 雅加松《中国植志》

功效 松花粉等: 同马尾松。

#### 6004043

*Pinus morrisonicola* Hayata --- *P. formosana* Hayata ---

*Pinus uyematsui* Hayata

植物名 台湾五针松《中国植志》

文献名 台湾松《中国裸植志》, 台湾白松《经植手册》, 台湾五须松《植分学报》, 台湾五叶松《台湾药植志》

地方名 台湾: 山松柏, 短毛松。

功效 松节油、松脂: 祛风, 止痛; 松油: 用于疥疮; 叶: 止咳。

#### 6004044

*Pinus palustris* Mill. --- *P. longifolia* Salisb. --- *P. australis* Michx. f.

植物名 长叶松《中国植志》

文献名 北美长叶松《江苏植志》

地方名 大王松(福建、台湾)。

功效 松节油、松脂(松香): 祛风, 止痛。

#### 6004045

*Pinus pinaster* Ait.

植物名 海岸松《中国植志》

文献名 法国海岸松《台湾药植志》

功效 松脂(松香): 燥湿祛风, 生肌止痛。

#### 6004046

*Pinus pumila* (Pall.) Regel

植物名 偃松《中国植志》

文献名 矮松、千叠松《树分》

地方名 爬松(东北); 吉林: 爬地松(长白山区)。

功效 树枝蒸馏液: 用于慢性气管炎, 哮喘。

#### 6004047

*Pinus rigida* Mill.

植物名 刚松《中国植志》

文献名 美国矮三叶松、萌芽松《东北木本图志》，梗叶松《中国植志》，刚叶松《台湾药植志》，美国短叶松《山东树木志》

功效 松脂(松香):燥湿祛风,生肌止痛。

## 6004048

*Pinus roxburghii* Sarg.

植物名 西藏长叶松《中国植志》

文献名 喜马拉雅长叶松《植分学报》

功效 松脂(松香):燥湿祛风,生肌止痛。

## 6004049

*Pinus sibirica* (Loud.) Mayr. --- *P. cembra* L. var. *sibirica* Loud.

植物名 新疆五针松《中国植志》

药材名 松节、松花粉、松叶《汇编》

文献名 山松《生草药性备要》，西伯利亚红松《植分学报》

地方名 新疆:“卡热阿衣”(维名)。

功效 松节:祛风湿,止痛;花粉:燥湿,收敛止血;叶:祛风活血,明目,安神,解毒,止痒。

## 6004050

*Pinus sylvestris* L. var. *mongolica* Litv.

植物名 樟子松《中国植志》

文献名 海拉尔松《中国植志》，樟子松《高植图鉴》，欧洲赤松《吉野》

功效 叶:祛风活血,明目,安神,解毒,止痒;花粉:燥湿,收敛止血;松节:祛风湿,止痛;球果:祛痰,止咳,平喘。

## 6004051

*Pinus sylvestris* L. var. *sylvestriformis* (Taken.) Cheng et C. D. Chu --- *P. sylvestriformis* (Taken.) T. Wang ex Cheng

植物名 长白山松《中国植志》

文献名 长白赤松《东北经济木材志》，长果赤松《中国植志》

地方名 吉林:美人松(长白山)，赤松。

功效 松花粉:燥湿,收敛止血;松脂(松香):燥湿祛风,生肌止痛。

## 6004052

*Pinus tabulaeformis* Carr. --- *P. tabulaeformis* Carr. var. *tokunagai* (Nakai) Takenouchi --- *P. tabulaeformis* Carr. f. *jeholensis* Liou et Wang

植物名 油松《名实图考》、《中国植志》

药材名 松花粉《唐本草》、《药典》，油松节、松节油《药典》，松叶《别录》，松根《本草经集注》，松香、松笔尖《滇南本草》，松油、松球《纲目拾遗》，松树皮、松子仁《汇编》

文献名 花粉:松花、松黄《唐本草》;枝干结节:松节《别录》，黄松木节《圣惠方》;球果:松实《别录》，松球《纲目拾遗》，松塔《药典》;叶:猪鬃松叶《圣惠方》，松毛《简便单方》;松根:松根白皮《别录》;松香:松脂、松膏、松肪《本经》，松胶香《刘涓子鬼遗方》，〔浙青〕《卫生宝鉴》，白松香《滇南本草》，松胶《纲目》，黄香《本草原

始》，松脂香《草木便方》;松笔尖:松树蕊《滇南本草》;松油:松油《唐本草》，沥油《纲目拾遗》;松树皮:赤松皮《千金方》，赤龙鳞《永类铃方》，赤龙皮、松木皮《纲目》;植名:短叶松《中国植物志略》，短叶马尾松、东北黑松、紫翅油松《东北木本图志》，巨果油松《中国植志》

地方名 黑松(东北)，红皮松(河北、河南、山西)，松树(俗称);山西:松皮;内蒙古:“那日斯”、“唐出”(蒙名);青海:“仲象”(藏语);江苏:松郎头(苏州)。

功效 松花粉:燥湿,收敛,止血。用于湿疹,黄水疮,皮肤糜烂,脓水淋漓,外伤出血,尿布性皮炎;油松节、松节油:祛风湿,止痛。用于肌肉痛,关节痛,屈伸不利;松叶:祛风活血,明目,安神,解毒,止痒。用于流感,风湿关节痛,跌打肿,夜盲症,高血压病,神经衰弱,外用于冻疮;幼根或根白皮(松根):用于筋骨痛,伤损吐血,牙痛;树脂(松香):有小毒。燥湿祛风,生肌止痛。外用于痈疖疮疡,湿疹,外伤出血,烧、烫伤;幼枝尖端(松笔尖):活血止痛。用于跌打损伤,小便淋痛;松枝火烧沥油(松油):用于疮疥,马牛疮;球果(松球):祛痰,止咳,平喘;树干内皮(松树皮):收敛,生肌。外用于烧、烫伤,小儿湿疹;种仁(松子仁):润肺,滑肠。用于肺燥咳嗽,慢性便秘。

## 6004053

*Pinus taeda* L.

植物名 火炬松《中国植志》

地方名 江苏:台大松(南京)。

功效 松脂(松香)、松节油:祛风,止痛。

## 6004054

*Pinus taiwanensis* Hayata --- *P. hwangshanensis* Hsia

植物名 黄山松《中国植志》

文献名 台湾松《经植手册》，长穗松《中国裸植志》，台湾二针松《植分学报》，台湾二叶松《台湾药植志》

地方名 浙江:短叶松;台湾:新高赤松,山松柏,〔松萝〕。

功效 松花粉:燥湿,收敛止血;松节、松香:祛风湿,止痛;球果:祛痰,止咳,平喘。

## 6004055

*Pinus thunbergii* Parl.

植物名 黑松《中国植志》

药材名 松花粉《汇编》

文献名 日本黑松《树分》，白芽松《东北木本图志》

地方名 松毛(山东、上海);山东:松节、松子仁、松树内皮(烟台);上海:青松毛,松针,松花芯粉;其他:松花,油松节,松树节子。

功效 花粉:燥湿,收敛止血。

## 6004056

*Pinus yunnanensis* Franch.

植物名 云南松《中国植志》

药材名 松节、松笔头、松香《滇南本草》，松花粉、松针《汇编》

文献名 松树蕊、松脂《滇南本草》，青松《高植图鉴》，飞松《云南经植》

地方名 四川:松树疙瘩,油松节;贵州:黄松;云南:

长毛松、铁甲松(文山),地盘松。

功效 松节、松香:祛风湿,止痛;花粉:燥湿,收敛止血;松叶:祛风活血,明目,安神,解毒,止痒;嫩枝梢(松笔头):解毒。用于木薯、钩吻中毒。

#### 6004057

*Pinus yunnanensis* Franch. var. *pygmaea* (Hsueh) Hsueh  
--- *P. densata* Mast. var. *pygmaea* Hsueh

植物名 地盘松《中国植志》

药材名 地盘松球《滇南本草》

地方名 四川:矮子松(西昌),盘龙松、爬地松(冕宁),万年松(会东)。

功效 球果:用于疝气偏坠;根皮:活血通经,接骨止痛。用于接骨,风湿骨痛。

#### 6004058

*Pinus yunnanensis* Franch. var. *tenuifolia* Cheng et Law

植物名 细叶云南松《中国植志》

功效 树脂、松节油:用于肌肉痛,关节痛等。

#### 6004059

*Pseudolarix amabilis* (Nelson) Rehd. --- *P. kaempferi* (Lindl.) Gord.

植物名 金钱松《中国植志》

药材名 土荆皮《药典》

文献名 土槿皮《中国药植志》,金钱松皮《药材学》,金叶松、水松《中国裸植志》,荆皮树《汇编》

地方名 江苏:山槿树皮,荆树皮;浙江:水树(湖州),金松(杭州);安徽:杉罗松;江西:金树(庐山),落叶松;湖北:天枞。

功效 根皮或近根树皮:有毒。杀虫,止痒。用于疥癣瘙痒。

### 6005 杉科 Taxodiaceae

#### 6005001

*Cryptomeria fortunei* Hooibrenk ex Otto et Dietr. --- *C. kawaii* Hayata

植物名 柳杉《中国植志》

药材名 柳杉《浙江天目药志》

文献名 宝树《名实图考》,长叶孔雀松《中国裸植志》,长叶柳杉《高植图鉴》

地方名 泡杉(四川、云南);浙江:王杉(乐清),桉杉(丽水),华杉树(龙泉);江西:沙罗树,孔雀松;福建:天树(福州、长乐),榧木(松溪、政和);四川:柳杉树(峨眉山),孔雀杉,密条杉。

功效 根皮:解毒杀虫。外用于癣疮;果实:用于咳嗽,崩漏。

#### 6005002

*Cryptomeria japonica* (L. f.) D. Don

植物名 日本柳杉《中国植志》

文献名 孔雀松、榧杉、大杉、宝树、沙罗树、密条杉《中国裸植志》

地方名 安徽:水疮柏;台湾:杉仔,杉;广西:水杉木(南宁);其它:沙木姑。

功效 叶、种子:用于咳嗽。

#### 6005003

*Cunninghamia konishii* Hayata

植物名 台湾杉木《中国植志》

文献名 香杉《中国裸植志》,帝大杉《台湾药植志》

地方名 台湾:广东杉,福州杉。

功效 材部精油:祛痰,镇痛。用于淋病。

#### 6005004

*Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook. --- *C. sinensis* R. Br. ex Rich.

植物名 杉木《本草经集注》、《中国植志》

药材名 杉木《本草经集注》、《汇编》

文献名 桧、粘《尔雅》,杉材《别录》,杉《南方草木状》,杉木节《图经》,沙木、桧木、杉子、杉叶、杉皮《纲目》,杉木皮、杉木根《分类草药性》,杉节《生草药性备要》,杉木油《纲目拾遗》,捺梁、香木《植物名汇》,沙树、正杉、正木、大头树《中国裸植志》,杉果《民药汇编》,广叶杉《中药大辞典》

地方名 杉树(安徽、江西、福建、四川),刺杉(江西、安徽、江苏、山东);安徽:杉木刺,禾木;江西:木头刺;福建:杉柴,木屑油,罗柴(福州);台湾:糖杉,大点雨杉,杉仔,乌杉,香杉,温州杉;湖北:子杉、湖南杉(神农架);湖南:天蜈蚣(凤凰),千把刀(麻阳);广东:杉花[球果];广西:沙杉;四川:杉树根,沙木根,泡杉根,活杉(会理),平坝杉;云南:泡杉、秃杉(西畴),尖顶杉(马关),家杉(广南),榧杉(文山),水杉(砚山)。

功效 种子:用于疝气,遗精,白癫疯,乳痈;心材及树枝(杉木):辟秽,止痛,散湿毒,下逆气。用于漆疮,风湿毒疮,脚气,奔豚,心腹胀痛;叶:用于慢性气管炎,牙痛,天泡疮,烧伤;树皮:用于水肿,脚气,金疮,漆疮,烫伤;杉木节:用于脚气,痞块,骨节疼痛,带下,跌打血瘀;油脂:用于顽癣;根:用于淋病,疝气,痧移腹痛转筋,关节炎,跌打损伤,疥癣;嫩杉木苗(或鲜杉木皮):用于过敏性皮炎;杉木寄生:用于肺结核咳嗽,声嘶。

#### 6005005

*Glyptostrobus pensilis* (Staunt.) Koch

植物名 水松《南方草木状》、《中国植志》

文献名 水松须《生草药性备要》,水松皮《本草求真》,水松叶《岭南采药录》

地方名 福建:水莲松,水杉枫;湖南:[凤凰树],勒柏;广东:水松毛,水松柏。

功效 球果:化气止痛。用于胃痛,疝气痛;枝叶:用于风湿性关节炎,高血压;鲜叶:外用于皮炎;树皮:外用于烫伤。

#### 6005006

*Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng

植物名 水杉(湖北利川)、《中国植志》

药材名 水杉叶《神农架药录》

功效 叶:止痛。外用于痢疮肿毒。

#### 6005007

*Taiwania cryptomerioides* Hayata

植物名 台湾杉《中国植志》

文献名 台湾松《中国裸植志》, 台杉《高植图鉴》

地方名 台湾; 亚杉, 松萝。

功效 精油及木材: 供药用及香料用。

#### 6005008

*Taxodium distichum* (L.) Rich. --- *Cupressus distichum* L.

植物名 落羽杉《中国植志》

药材名 落羽杉《安徽采药录》

文献名 落羽松《树分》

功效 种子: 抗癌。用于鼻咽癌。

### 6006 柏科 Cupressaceae

#### 6006001

*Callitris quadrivalvis* Vent.

植物名 方苞非洲柏《台湾药植志》

药材名 山达脂《台湾药植志》

功效 树脂: 为硬膏原料及填齿料。

#### 6006002

*Calocedrus macrolepis* Kurz var. *formosana* (Florin)

Cheng et L. K. Fu --- *Libocedrus formosana* Florin

植物名 台湾翠柏《中国植志》

地方名 台湾: 肖楠, 黄肉柏。

备考 枝、叶: 在台湾药铺经常误作侧柏叶之代用品。

#### 6006003

*Chamaecyparis formosensis* Matsum.

植物名 红桧《中国植志》

文献名 台湾扁柏《经植手册》

地方名 台湾: 薄皮松栢, 松栢, 水古杉。

功效 精油及木材: 消炎利尿。

#### 6006004

*Chamaecyparis obtusa* (Sieb. et Zucc.) Endl.

植物名 日本扁柏《中国植志》

文献名 日本钝叶扁柏《江苏植志》

地方名 山东: 白柏(青岛); 台湾: 钝叶扁柏, (扁柏), 松栢, 厚壳松栢, 桧木。

功效 树脂及精油: 用于淋病, 利尿, 消毒; 叶: 解热, 利气, 镇咳。用于吐血, 腹痛, 淋病及肺病。

#### 6006005

*Chamaecyparis obtusa* (Sieb. et Zucc.) Endl. var. *formosana* (Hayata) Rehd. --- *C. taiwanensis* Masam. et Suzuki

植物名 台湾扁柏《中国植志》

文献名 [扁柏]《经植手册》

地方名 台湾: 黄桧, 厚壳, 松栢。

功效 叶: 解热, 镇咳, 去郁, 止血。用于肺结核。

#### 6006006

*Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl.

植物名 日本花柏《中国植志》

文献名 花柏《江苏植志》

地方名 广东: 五彩松。

功效 根、叶: 凉血止血, 舒筋活络; 叶: 用于内外

出血; 根: 用于风湿痛。

#### 6006007

*Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. cv. *Squarrosa* --- *C. pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. var. *squarrosa* (Zucc.) Beissn. et Hochst. ex Hochst.

植物名 绒柏《中国植志》

地方名 陕西: 粗花柏(西安); 广西: 云松。

功效 枝、叶: 用于风疹。

#### 6006008

*Cupressus funebris* Endl.

植物名 柏木《中国植志》

药材名 柏木《汇编》

文献名 香柏《三辅旧事》, 柏树叶、柏树子《分类草药性》, 柏树油《民药汇编》, 川柏《华北树木志》

地方名 柏树(浙江、四川等), 垂柏(广东、广西), [侧柏叶](浙江、湖北), 柏木树、柏香树(湖北、四川); 浙江: 璆琅柏(临安); 江西: 松栢(南丰); 河南: 密密柏, 密密松; 湖南: 扫帚柏; 四川: 香扁柏, 垂丝柏, (黄柏), 柏树果, 花香柏, 材柏, 唐柏; 云南: 宋柏(昆明)。

功效 种子: 祛风清热, 安神, 止血。用于发热烦躁, 小儿高热, 吐血; 叶: 止血生肌。外用于外伤出血, 黄癣; 树脂: 解风热, 燥湿, 镇痛。用于风热头痛, 白带。外用于外伤出血; 枝、叶、树皮: 有小毒。杀虫辟秽, 散结解毒。用于荨麻疹, 肺结核等; 球果: 解表, 和中, 止血。用于风寒感冒, 胃痛, 止血。

#### 6006009

*Cupressus sempervirens* L.

植物名 地中海柏木《中国植志》

文献名 洋柏《台湾药植志》

功效 木材、果实: 收敛, 驱虫。

#### 6006010

*Cupressus torulosa* D. Don

植物名 西藏柏木《中国植志》

文献名 喜马拉雅柏《树分》, 干柏杉《中国裸植志》, 藏柏《新华本草纲要》

地方名 西藏: 柏子仁, “香柏珠左”(藏名)。

功效 种子: 补心脾, 安神, 止汗, 润燥, 通便。用于心悸, 失眠, 健忘, 体虚多汗, 遗精, 大便燥结。

#### 6006011

*Fokienia hodginsii* (Dunn) Henry et Thomas

植物名 福建柏《中国植志》

文献名 建柏、滇柏《树分》, 广柏《中国裸植志》, 滇福建柏《经植手册》

地方名 福建: 杜柴, 杜树; 四川: 沱杉(江津); 云南: [柏树](马关), 红花树(文山), 阴沉木(西畴), 柏木(屏边)。

功效 心材: 行气止痛, 降逆止呕。用于胃脘痛, 噎膈, 呕吐。

#### 6006012

*Juniperus communis* L.

植物名 欧洲刺柏《中国植志》

文献名 杜松子、杜松实、杜松《新纲》, 璆琅柏《树

分),普通柏《中国裸植志》,欧桧《经植手册》

功效 果:胃痛,祛痰,利尿;油脂:外用于风湿关节炎,皮炎,肌肉风湿。

#### 6006013

*Juniperus formosana* Hayata --- *J. taiwaniana* Hayata

植物名 刺柏《名实图考》、《中国植志》

文献名 璎珞柏《花镜》,刺松《名实图考》,山刺柏《树分》,台桧《中国裸植志》,台湾柏《北京植志》

地方名 浙江:柏香,柏树;江西:杉柏,刺柏树,短柏木;福建:山杉;台湾:台湾桧;湖北:矮柏木(兴山),吊吊柏(神农架);四川:岩柏。

功效 根皮、树皮、叶、枝:清热解毒,杀虫。用于结核病,尿路感染,皮肤癣症;根:用于麻疹,身热不退。

#### 6006014

*Juniperus rigida* Sieb. et Zucc.

植物名 杜松《中国植志》

药材名 杜松子(吉林、宁夏)

文献名 刚桧《北研丛刊》,软叶杜松《中国植志》,棒儿松《树分》,刺松《科裁》,崩松《吉野》,桧松、刺柏《东北木本图志》,杜松实《国药的药理》

地方名 吉林:“脑干朱那木”(朝名);河北:刺儿松;内蒙古:“乌热格素图·阿日查”(蒙名)。

功效 球果:发汗,利尿,镇痛。用于风湿性关节炎,尿路感染,肾炎等。

#### 6006015

*Juniperus rigida* f. *modesta* (Nakai) Y. C. Chu --- *J. utilis*

*Koidz. var. modesta* Nakai

植物名 软叶杜松《东北药用植物》

药材名 杜松实(东北)

功效 球果:发汗,驱风,除湿,利尿,镇痛。用于水肿,生殖系统疾患,风湿性关节炎。

#### 6006016

*Juniperus sibirica* Burgsd. --- *Juniperus nana* Willd --- *J.*

*communis* L. var. *montana* Ait.

植物名 西伯利亚刺柏《中国植志》

文献名 山桧《北研丛刊》,矮桧《中国裸植志》,西伯利亚杜松《中国植志》,高山桧《东北木本图志》。

功效 球果:镇痛,利尿。用于痛风,排尿困难。

#### 6006017

*Platycladus orientalis* (L.) Franco --- *Thuja orientalis* L.

--- *Biota orientalis* (L.) Endl.

植物名 侧柏《纲目》、《中国植志》

药材名 侧柏叶《药性论》、《药典》,柏子仁《唐本草》、《药典》,柏枝节《唐本草》,柏脂《本草经集注》,柏根白皮《纲目》

文献名 柏《诗经》,桧《尔雅》,柏实《本经》,白皮《别录》,柏子、柏仁、柏皮《本草经集注》,日华子本草,扁柏《滇南本草》,柏子壳《纲目拾遗》,凡手柏《小泉药植》,崖柏、偏桧《植志》,云片柏《诗草木今释》,片柏《中草药学》。

地方名 [黄柏](华北),矮柏(陕西、甘肃、宁夏),松(东北、山东),扁松(河北、江苏),香树(湖北、湖南);

北京:板松;天津:松蟠;河北:厓柏,香柏,黄心柏;新疆:“阿尔哈”(维名);山东:柏树种(烟台),扫帚柏(黄县);江苏:扁桧(扬州);浙江:上柏(武义);江西:长青树(景德),板柏;福建:从柏(闽东),从柏叶(南平),竹板子(平和),线柏(明溪),细柏树(清流);河南:柏麦;湖北:香柯树(宣恩、利川);广东:喜柏;广西:柏枝树,土松香树;四川:侧柏子仁,侧柏枝,“热阿林”(藏名);云南:柏枝叶,扁柏叶(丽江),岩柏、柏刺(楚雄);其他:香柏叶,桧仁,侧柏仁。

功效 枝梢、叶(侧柏叶):凉血止血,生发乌发。用于吐血衄血,咯血,便血,崩漏下血,血热脱发,须发早白;种仁(柏子仁):养心安神,止汗润肠。用于虚烦失眠,心悸怔忡,阴虚盗汗,肠燥便秘;树脂汁(柏脂):用于疥癣,癰疮,秃疮,黄水疮,丹毒;树枝(柏枝节):用于风湿痹节风;根白皮(柏根白皮):用于烫伤。

#### 6006018

*Platycladus orientalis* (L.) Franco cv. *Sieboldii* --- *Biota orientalis* var. *nana* Carr.

植物名 千头柏《中国植志》

药材名 侧柏叶、柏子仁(安徽中草药)

地方名 侧柏(安徽、云南);山东:扫帚柏;浙江:于孙柏(杭州);河南:凤尾柏;湖北:香树(宣恩),香柯树(利川)。

功效 枝梢、叶:止血。

#### 6006019

*Sabina chinensis* (L.) Ant. --- *Juniperus chinensis* L.

植物名 圆柏《尔雅翼》、《中国植志》

药材名 圆柏《汇编》

文献名 桧《诗经》,栝《禹贡》,刺柏、刺松《本草汇言》,桧柏《纲目》,崖柏树、香木、柏心《满州植录》,白桧、白柏《满蒙树木图说》,红柏、翠树《中国药植图鉴》,柏槧、白身、白心、二色柏《诗草木今释》

地方名 观音柏(华中),柏木(江苏、贵州);北京:红心柏;河北:鸟柏(邢台);江苏:圆松(扬州);浙江:柏树,桧树(浙南);安徽:圆柏子,圆柏叶;福建:柏(宁化),冬青(诏安),扁柏(政和),桧香(福州、福清);湖北:米柏(郧西),鸡冠柏、桧叶(神农架);广西:松柏(钟山);四川:紫柏;云南:珍珠柏。

功效 枝、叶及树皮:有小毒。祛风散寒,活血消肿,解毒利尿。用于风寒感冒,肺结核,尿路感染。外用于荨麻疹,风湿关节痛;种子:补益心脾,润肠通便。用于血虚,心悸失眠,便秘。

#### 6006020

*Sabina chinensis* (L.) Ant. cv. *Kaizuca* --- *Juniperus*

*chinensis* L. var. *kaizuca* Hort. --- *Sabina chinensis* (L.)

Ant. var. *kaizuca* Cheng et W. T. Wang

植物名 龙柏《中国植志》

功效 枝叶:杀虫,止痒。用于皮肤湿疹。

#### 6006021

*Sabina davurica* (Pall.) Ant. --- *Juniperus davurica* Pall.

植物名 兴安圆柏《中国植志》

文献名 兴安桧、爬山松《东北木本图志》

功效 球果：止咳，平喘。

#### 6006022

*Sabina przewalskii* Kom. --- *Juniperus przewalskii* Kom.  
--- *J. zaidamensis* Kom. --- *Sabina zaidamensis* Kom.

植物名 祁连山圆柏《中国植志》

药材名 圆柏叶《沙漠药植》

文献名 祁连山圆柏、柴达木圆柏《中国树木学》，陇东圆柏、蒙古圆柏《树分》，柴达木桧《经植手册》

功效 叶：止血，镇咳。用于咯血，吐血，尿血，便血，子宫出血，鼻衄，百日咳。

#### 6006023

*Sabina recurva* (Buch.-Ham.) Ant. --- *Juniperus recurva* Buch.-Ham.

植物名 垂枝柏《中国植志》

文献名 曲枝柏《树分》，曲桧《中国裸植志》，弯枝桧《经植手册》

地方名 西藏：柏子仁。

功效 种仁：在西藏地区作柏子仁入药；叶：吐血，崩带，尿血，便血，赤痢。

#### 6006024

*Sabina salutaria* (Rehd. et Wils.) Cheng et W. T. Wang

植物名 方枝柏《中国植志》

文献名 方枝桧《经植手册》，方香桧《高植图鉴》，“甲秀”（藏名）《青藏药图》

地方名 甘肃：〔木香〕（舟曲）；四川：方香柏，深山柏。

功效 枝、叶、果：清热祛湿。

#### 6006025

*Sabina squamata* (Buch.-Ham.) Ant. --- *Juniperus squamata* Buch.-Ham. --- *Sabina squamata* (Buch.-Ham.) Ant. var. *fargesii* (Rehd. et Wils.) Cheng f. et L. K. Fu

植物名 高山柏《中国植志》

文献名 大香桧《树分》，陇桧、鳞桧《中国裸植志》，“甲秀”（藏名）《青藏药图》

地方名 刺柏（四川、云南）；四川：山柏，藏柏，香青，团香，盘香，岩刺柏、峨沉香（峨眉），岩柏枝、高山舒筋草（西昌），“八玛”（藏名）；云南：铺地柏（丽江）；西藏：浪柏，柏香。

功效 枝、叶、果：清热祛湿。用于风湿性关节炎，肾炎，月经不调；芳香油：用于痈疮，疥癣，痒疹；根：用于透疹。

#### 6006026

*Sabina tibetica* Kom. --- *Juniperus tibetica* Kom. --- *J. potaninii* Kom. --- *Sabina potaninii* Kom. --- *Juniperus distans* Florin

植物名 大果圆柏《中国植志》

文献名 西藏圆柏、西康圆柏《树分》，〔黄柏〕《中国裸植志》，藏桧、西康桧《经植手册》，甘川圆柏《中国树木学》，“秀巴”（藏名）《青藏药图》

功效 带叶绿枝及种子：清热，去湿，防腐，解毒。用于关节炎，肺炎，胆囊炎，疮疖，炭疽病。

#### 6006027

*Sabina virginiana* (L.) Ant. --- *Juniperus virginiana* L.

植物名 北美圆柏《中国植志》

文献名 铅笔柏《树分》，红柏（李《生药》）

功效 木材精油：用于堕胎；针叶：止血。

#### 6006028

*Sabina vulgaris* Ant. --- *Juniperus sabina* L. --- *Sabina arenaria* (Wils.) Cheng et W. T. Wang

植物名 叉子圆柏《中国植志》

文献名 新疆圆柏、天山圆柏、双子柏、砂地柏《中国树木学》

地方名 内蒙古：臭柏（乌审旗），“阿尔叉”、“霍宁-阿尔茨”（蒙名）；甘肃：爬柏（张掖）。

功效 枝、叶：祛风湿，活血止痛。用于风湿性关节炎，类风湿性关节炎，布氏杆菌病，皮肤瘙痒症；球果：用于小便不利，迎风流泪，视物不清，头痛。

#### 6006029

*Sabina wallichiana* (Hook. f. et Thoms.) Kom. --- *Juniperus wallichiana* Hook. f. et Thoms. ex Parl.

植物名 滇藏方枝柏《中国植志》

文献名 喜马拉雅圆柏《树分》，小果方枝柏《高植图鉴》，“秀朱”（藏名）《青藏药图》

功效 果：用于风湿性关节炎，失眠。

#### 6006030

*Thuja koraiensis* Nakai

植物名 朝鲜崖柏《中国植志》

文献名 长白侧柏《东北木本图志》，朝鲜柏《中国植志》，偃侧柏《高植图鉴》

功效 枝、叶：凉血止血，生发乌发；种仁：安心养神，止汗，润肠。

#### 6006031

*Thujopsis dolabrata* (L.f.) Sieb. et Zucc.

植物名 罗汉柏《中国植志》

药材名 罗汉柏叶、罗汉柏子《安徽采药录》

文献名 蜈蚣柏《中国植志》

功效 叶：抗癌。用于鼻咽癌；种子：抗病毒。用于病毒引起的疱疹。

### 6007 罗汉松科 Podocarpaceae

#### 6007001

*Dacrydium pierrei* Hickel

植物名 陆均松《中国植志》

文献名 泪柏《树分》，卧子松《中国裸植志》

地方名 海南：黄液松，红松，遍赏松，山松。

功效 全株：散热消肿。

#### 6007002

*Podocarpus forrestii* Craib et W. W. Smith

植物名 大理罗汉松《中国植志》

文献名 滇南罗汉松《名实图考》

地方名 云南：罗汉松（滇南）。

功效 球果：益中补气；种子：活血，补血，舒筋活络。

**6007003**

*Podocarpus imbricatus* Blume --- *P. javanicus* Merr. --- *P. kawae* Hayata

植物名 鸡毛松(海南)、《中国植志》  
文献名 爪哇罗汉松《中国植物图谱》, 岭南罗汉松、爪哇松《树分》, 异叶罗汉松《中国裸植志》  
地方名 海南: 黄松, 白松, 茂松, 竹叶松, 流鼻松, “千乙力”(黎语); 云南: 假柏木(屏边), 酸柏木(马关)。  
功效 全株: 消炎, 杀虫, 止痒。

**6007004**

*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) D. Don

植物名 罗汉松《中国植志》  
药材名 罗汉松《纲目拾遗》、《汇编》  
文献名 长青、罗汉松实《纲目拾遗》, 罗汉杉《中山传信录》  
地方名 土杉(台湾、福建、广西、四川); 广东: 江南柏叶, 江南侧柏叶; 广西: 南罗汉; 四川: 麻糖果树(雅安)。  
功效 球果: 益气补中。用于心胃气痛, 血虚, 面色萎黄; 根皮: 活血止痛, 杀虫。外用跌打损伤, 疥癣; 叶: 用于吐血, 咳血。

**6007005**

*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) D. Don var. *maki* Endl. --- *P. chinensis* Sweet

植物名 短叶罗汉松《中国植志》  
药材名 小叶罗汉松《汇编》  
文献名 短青《纲目拾遗》, 小罗汉松《树分》, 短叶土杉《高植图鉴》, 小叶土杉《汇编》  
地方名 罗汉松(浙江、四川); 广东: 江南柏叶, 江南侧柏叶。  
功效 种子: 活血, 补血, 舒筋活络。用于月经过多, 血虚面黄; 鲜根皮、叶: 用于风湿关节痛, 跌打肿痛; 球果: 益气补中; 根皮: 活血止痛, 杀虫。

**6007006**

*Podocarpus nagi* (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.

植物名 竹柏《中国植志》  
药材名 竹柏《纲目》  
文献名 大果竹柏《经植手册》, 竹叶球、黄鸡眼、船家籽、大叶沙木、假木槌、油炸籽、杜木《中国经植志》  
地方名 楞树(福建、台湾); 浙江: 榔树(平阳), 罗松; 江西: 糖鸡子, 鸣毒子, 黄贼树子; 福建: 罗汉柴(南平); 台湾: 山杉, 乌心石; 广东: 船家树(增城), 竹柏籽, 竹叶; 海南: 宝芳, 铁甲树; 广西: 猪肚树、猪肚木(临桂), 刀板松, 青柏木(鹿寨), 竹叶图(防城); 其他: 梁杉。

功效 叶: 用于外伤出血, 骨折; 树皮、根: 祛风除湿。

**6007007**

*Podocarpus neriifolius* D. Don

植物名 百日青《中国植志》  
文献名 脉叶罗汉松《中国植志》  
地方名 竹叶松(广东、广西); 江苏: 婆络柏(南通); 上海: 桃柏松; 广东: 江南柏, 江南侧柏; 海南: 竹柏松,

油松, 白松, 大叶竹柏松; 四川: 罗汉松(峨眉山); 云南: 紫柏(西畴); 其他: 罗树, 罗汉杉。

功效 枝、叶: 用于风湿, 骨折, 痧症; 果实: 益气补中。

**6007008**

*Podocarpus wallichiana* Kuntze

植物名 肉托竹柏《中国植志》  
文献名 大叶竹柏《树分》, 人叶罗汉松《中国裸植志》  
功效 枝叶、根: 用于关节红肿, 水肿。

**6008 三尖杉科 Cephalotaxaceae****6008001**

*Cephalotaxus alpina* (Li) L. K. Fu --- *Cephalotaxus fortunei* Hook. f. var. *alpina* Li

植物名 高山三尖杉《中国植志》  
文献名 圆桃杉《植分学报》  
地方名 云南: 密油果(维西)。  
功效 叶、枝、根、种子: 抗癌。

**6008002**

*Cephalotaxus fortunei* Hook. f. --- *C. fortunei* Hook. f. var. *concolor* Franch.

植物名 三尖杉《中国植志》  
药材名 三尖杉《汇编》  
文献名 头形杉《中国裸植志》, {粗榧}《中国植物图鉴》, 小叶三尖杉《树分》, 绿背三尖杉《中国植志》, 长叶圆头杉《峨眉植物图志》

地方名 水杉(福建、江西、湖南), 野榧子(安徽、福建), 血榧(安徽、浙江), 榧子(四川、贵州、安徽、江西), 狗尾松(湖北、湖南), 桃松(湖南、四川); 甘肃: 水柏子; 安徽: 药榧, 糖榧, 油榧子, 老鸡榧, 青榧, 野杉树; 浙江: 石榧(淳安), 水竹(浙南), 杜松, 涎树, 乌籽; 福建: 猪目枣(永泰), 山竹(松溪、政和), [柏树], 百紫(尤溪), 山荔枝(南平), 虎杉树; 江西: 杉柏(会昌), 温杉(庐山), [侧柏叶](景德镇), 山榧子, 明杉; 湖北: 三尖松(宜昌), 脱杉(利川), 千年矮(神农架); 湖南: 红榧, 梭罗树; 广东: 水罗沙, 山杉籽, 肚木子; 广西: 岩杉木(南丹), 杉巴果(资源); 四川: 藏杉、铁文杉(天全), 铁甲松(南充), 鱼骨松(绵阳); 云南: 桫松(石屏), 水田松, 水油子果(大姚), 密水油松(红河), 油果(丽江), 硬头松(彝良), 岩松(镇雄), 明油果。

功效 种子: 驱虫, 消积。用于蛔虫病, 钩虫病, 食积; 枝、叶: 抗癌。用于恶性肿瘤; 根: 抗癌, 瘰癧。

**6008003**

*Cephalotaxus harringtonia* (Forbes) Koch cv. *Fastigiata* --- *C. harringtonia* f. *fastigiata* Rehd.

植物名 柱冠粗榧《中国植志》  
文献名 柱冠日本粗榧《植分学报》  
功效 种子、全株: 含粗榧碱及其酯类化合物。

**6008004**

*Cephalotaxus lanceolata* K. M. Feng ex cheng et al.

植物名 贡山三尖杉《中国植志》  
功效 木材: 抗癌。

**6008005**

*Cephalotaxus latifolia* (Cheng et L. K. Fu) L. K. Fu--  
*Cephalotaxus sinensis* (Rehd. et Wils.) Li var. *latifolia*  
Cheng et L. K. Fu

植物名 宽叶粗榧《中国植志》

功效 叶、枝、种子、根：用于白血病及淋巴肉瘤。

**6008006**

*Cephalotaxus mannii* Hook. f. --- *C. hainanensis* Li

植物名 海南粗榧《中国植志》

文献名 印度三尖杉《树分》，藏杉《中国裸植志》，西双版纳粗榧《中国植志》，薄叶三尖杉、薄叶篦子杉《海南植志》，版纳三尖杉、南三尖杉《云南种录》

地方名 海南：红壳松，石榴松。

功效 全株：抗癌。

**6008007**

*Cephalotaxus oliveri* Mast.

植物名 篦子三尖杉《中国植志》

文献名 阿里杉《树分》，梳叶圆头杉《峨眉植物图志》，花枝杉《中国裸植志》

地方名 四川：扁柏《峨眉山》。

功效 全株：抗癌。

**6008008**

*Cephalotaxus sinensis* (Rehd. et Wils.) Li --- *C. sinensis*  
(Rehd. et Wils.) Li f. *globosa* (Rehd. et Wils.) Li

植物名 粗榧《中国植志》

药材名 粗榧子《汇编》

文献名 鄂西粗榧《树分》，中华粗榧《中草药学》，中华粗榧杉、粗榧杉《中国裸植志》，中国粗榧《中国树木学》，圆果粗榧《中草药通讯》

地方名 木榧（浙江、广西）；甘肃：水柏子；浙江：血榧、榧子（临安），野榧（临海），土香榧（天目山）；湖北：千年矮（神农架）；广东：竹叶粗榧，水杉子；海南：红壳松；广西：水松（乐业）；四川：水籽树（会东），油柏（西昌）。

功效 种子、根、茎、树皮：抗癌，润肺，消积，杀虫。

**6008009**

*Cephalotaxus wilsoniana* Hayata

植物名 台湾三尖杉《中国植志》

文献名 台湾粗榧《植分学报》

功效 枝、叶：含抗癌生物碱。

**6009 红豆杉科 Taxaceae****6009001**

*Amentotaxus argotaenia* (Hance) Pilger

植物名 穗花杉《中国植志》

药材名 杉枣（福建）

文献名 华西穗花杉《中国植志》

地方名 广西：喜杉，秃杉。

功效 根、树皮：用于跌打损伤，骨折。

**6009002**

*Taxus chinensis* (Pilger) Rehd.

植物名 红豆杉《中国植志》

地方名 卷柏、扁柏（四川、安徽）；浙江：赤榧；福建：

榧子木；湖北：红豆树（宣恩），观音杉，狗松树、红皮杉（神农架）；广西：酸巴果；四川：血柏（峨眉山），紫柏（宝兴），黄瓜米（合江）。

功效 叶：杀虫，止痒。用于疥癣；种子：消积，驱虫。

**6009003**

*Taxus chinensis* (Pilger) Rehd. var. *mairei* (Lemee et Levl.) Cheng et L. K. Fu --- *T. mairei* (Lemee et Levl.) S. Y. Hu ex Liu

植物名 南方红豆杉《中国植志》

文献名 美丽红豆杉《经植手册》，臭榧《中药大辞典》

地方名 浙江：赤榧（丰阳）；江西：海罗杉（遂川），红头水杉（井冈山）；福建：榧子木；广东：红豆杉，紫杉；广西：酸把果（全州），杉巴公；四川：杉公子（南川）；贵州：白银杉（松桃）；云南：紫金杉、密白泡（中甸），“林质”（丽江），雪柏（镇雄）。

功效 种子：驱虫。

**6009004**

*Taxus cuspidata* Sieb. et Zucc.

植物名 东北红豆杉《中国植志》

文献名 赤柏松《盛京通志》，紫柏松《蒙文汇书》，紫杉《树分》，宽叶紫杉《东北木本图志》，中国紫杉《中草药》

地方名 米树（东北）；吉林：紫叶杉。

功效 叶：通经，利尿。用于肾炎浮肿，小便不利，糖尿病。树皮：所含紫杉酚有抗白血病和抗肿瘤作用。

**6009005**

*Torreya fargesii* Franch.

植物名 巴山榧树《中国植志》

文献名 篦子杉《树分》，球果榧《中国裸植志》

地方名 湖北：野杉树，榧树；四川：铁头榧、紫柏（南川），天丛树、托杉（城口），篦子枞（万源），野熊树（南江）；云南：榧子。

功效 种子：杀虫，消积，便秘，痔疮，燥咳，手足风湿，小见蛔痞，疮毒，癌肿。

**6009006**

*Torreya grandis* Fort. ex Lindl. --- *T. grandis* Fort. var. *dielsii* Hu

植物名 榧树《本草纲目》，《中国植志》

药材名 榧子《唐本草》，《药典》

文献名 黏《尔雅》，彼子、披子《本经》，榧实《别录》，玉山果《东坡诗集》，赤果、玉榧《日用本草》，野杉《纲目》，钝叶榧树、小果榧树《树分》，凹叶榧、小果榧《中国裸植志》

地方名 榧子树、香榧（浙江、江西、福建）；浙江：圆榧，芝麻榧，了木榧，米榧，桫泡榧，细圆榧，大圆榧，香榧子、大榧、南榧（天目山），木榧，青果，三代果，草榧；安徽：药榧（黄山）；江西：野杉子。

功效 种子：杀虫消积，润燥通便。用于钩虫病，蛔虫病，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积，大便秘结；根皮：用于风湿肿痛。

**6009007**



*Torreya nucifera* (L.) Sieb. et Zucc.

植物名 日本榧树《中国植志》

文献名 榧、牛尾杉、野杉《植物名汇》, 油榧《种分》, 日榧《经植手册》, 榧实《李《药植》》

地方名 内蒙古: 榧子。

功效 种子: 消积, 驱虫; 根皮: 用于风湿肿痛。

6009008

*Torreya yunnanensis* Cheng et L. K. Fu

植物名 云南榧树《中国植志》

地方名 云南: 杉松果(丽江、维西), 榧子, 滇榧子, 云南榧子。

功效 种子: 杀虫, 消积, 润燥。

## 6010 麻黄科 *Ephedraceae*

6010001

*Ephedra distachya* L.

植物名 双穗麻黄《中国植志》

药材名 麻黄《新疆药植志》

文献名 二穗麻黄《药名汇编》

功效 草质茎: 发汗散寒, 宣肺平喘, 利尿消肿。

6010002

*Ephedra equisetina* Bunge

植物名 木贼麻黄《中国植志》

药材名 麻黄《本经》、《药典》

文献名 龙沙《本经》, 卑相、卑盐《别录》, 色道麻《汇编》, 生麻黄、西麻黄、净麻黄、炙麻黄、麻黄绒《常用中药名辨》, 木麻黄《鉴别手册》

地方名 麻黄松(北京、山东), 山麻黄(河北、山西、新疆); 内蒙古: “结力根”(蒙名); 新疆: “恰砍达”(维名)。

功效 草质茎: 发汗散寒, 宣肺平喘, 利尿消肿。用于风寒感冒, 胸闷咳嗽, 风水浮肿, 支气管哮喘。

6010003

*Ephedra fedtschenkoae* Pauls.

植物名 雌雄麻黄《中国植志》

地方名 西藏: 小麻黄(昌都)。

功效 草质茎: 发汗散寒, 宣肺平喘, 利尿消肿。

6010004

*Ephedra gerardiana* Wall.

植物名 山岭麻黄《中国植志》

文献名 矮麻黄《药材学》, 康藏麻黄《药植简编》

地方名 麻黄(西藏、云南)。

功效 地上部分: 发汗散寒, 宣肺平喘, 利尿消肿。

6010005

*Ephedra intermedia* Schrenk ex Mey.

植物名 中麻黄《中国植志》

药材名 麻黄《本经》、《药典》, 麻黄根《本草经集注》、《药典》

文献名 龙沙《本经》, 卑相、卑盐《别录》

地方名 内蒙古: “结力根”(乌审旗蒙名); 甘肃: 柴麻黄(文县); 青海: 麻黄草; 四川: 川麻黄; 其它: 崖黄, 色道麻。

功效 草质茎: 发汗散寒, 宣肺平喘, 利尿消肿。

用于风寒感冒, 胸闷喘咳, 风水浮肿, 支气管哮喘; 根、根茎: 止汗。用于自汗, 盗汗。

6010006

*Ephedra likiangensis* Florin

植物名 丽江麻黄《中国植志》

地方名 麻黄(四川、云南、贵州)。

功效 茎枝: 发汗散寒, 宣肺平喘, 利尿消肿。

6010007

*Ephedra likiangensis* Florin f. *mairei* (Florin) C. Y. Cheng

--- *E. saxatilis* Royle ex Florin var. *mairei* Florin

植物名 匍枝丽江麻黄《中国植志》

药材名 滇麻黄(拟)

文献名 麻黄《滇南本草》, 云南麻黄《云南药录》, 昭通麻黄《新华本草纲要》

功效 苗: 发汗, 散寒; 根节: 止汗。

6010008

*Ephedra minuta* Florin

植物名 矮麻黄《中国植志》

药材名 小麻黄《汇编》

文献名 川麻黄《四川中药志》

地方名 四川: “帐扯”(若尔盖藏名), 岩麻黄(阿坝)。

功效 茎、枝: 祛寒发汗, 平喘利尿, 散瘀升压。用于感冒无汗, 头痛身痛, 麻疹水肿。

6010009

*Ephedra monosperma* Gmel. ex Mey. --- *E. minima* Hao

植物名 单子麻黄《中国植志》

文献名 小麻黄《中国裸植志》

功效 草质茎: 发汗散寒, 宣肺平喘, 利尿消肿; 根: 止汗。

6010010

*Ephedra przewalskii* Stapf var. *kaschgarica* (Fedtsch. et Bobr.) C. Y. Cheng - *E. kaschgarica* Fedtsch. et Bobr.

植物名 喀什膜果麻黄《中国植志》

功效 嫩枝: 可作麻黄入药。

6010011

*Ephedra przewalskii* Stapf

植物名 膜果麻黄《中国植志》

文献名 蛇麻黄、曲枝麻黄《药植简编》, 曲尖麻黄《甘肃中草药》

地方名 麻黄(甘肃、青海)。

功效 草质茎: 发汗散寒, 宣肺平喘, 利尿消肿; 根: 止汗。

备考 本品在某一地区, 枝端常为病害感染因而卷曲, 实是一种病理现象, 非本种自然形态特征。

6010012

*Ephedra regeliana* Florin

植物名 细子麻黄《中国植志》

功效 嫩枝: 作麻黄入药。

6010013

*Ephedra saxatilis* Royle ex Florin

植物名 藏麻黄《中国植志》

地方名 麻黄(四川、云南、西藏); 云南: 云南麻黄。

功效 茎枝:发汗散寒,宣肺平喘,利水消肿。

#### 6010014

*Ephedra sinica* Stapf

植物名 草麻黄《中国植志》

药材名 麻黄《本经》、《药典》,麻黄根《本草经集注》、《药典》

文献名 狗骨〔根〕《尔雅》,龙沙《本经》,卑相、卑盐《别录》,赤根、中央节土、中黄节土《新纲》,苦椿菜《大同府志》,豆称草〔叶〕《生药》,华麻黄《中国植物图谱》

地方名 川麻黄(山西、河北),地松、马蜂草(华北);内蒙古:色道麻,“结力根”(蒙名);青海:“才登”(藏名);山东:海麻黄(无棣),麻黄草;其它:田麻黄,乏尖草。

功效 草质茎:发汗散寒,宣肺平喘,利水消肿。用于风寒感冒,胸闷喘咳,风水浮肿,支气管哮喘;根:止汗。用于自汗,盗汗。

### 6011 买麻藤科 Gnetaceae

#### 6011001

*Gnetum gracilipes* C. Y. Cheng

植物名 细柄买麻藤《中国植志》

功效 根、茎:用于跌打损伤。

#### 6011002

*Gnetum hainanense* C. Y. Cheng

植物名 海南买麻藤《中国植志》

功效 根、茎:用于跌打损伤,风湿骨痛。

#### 6011003

*Gnetum montanum* Markgr.

植物名 买麻藤《中国植志》

药材名 买麻藤《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 诺藤《本草经集注》,含水藤、大瓠藤《本草拾遗》,倪藤《汇编》,〔芦子〕、蛤蛤藤、见水生《中药大辞典》

地方名 搏节藤、山米藤、山花生(福建、广东);江西:野番豆(寻乌);福建:狗屎藤,乌目藤;台湾:驳节藤;广东:大眼藤(始兴),拳头药(乳源);海南:米麻藤,鸡母藤;广西:大节藤,力梅,水子棍藤,接骨藤,大麻骨风,木花生,双铁线,白钻,麻骨风(那坡),果米藤(贺县);云南:苦楝藤,“麻梅”(西双版纳傣语),老熊果、芭子苦楝、克梅(思茅),藤子果(屏边、金平)。

功效 藤:祛风活血,消肿止痛,化痰止咳。

#### 6011004

*Gnetum montanum* Markgr. f. *megalocarpum* Markgr.

植物名 大子买麻藤《中国植志》

地方名 云南:糯米果(西双版纳)。

功效 根、茎、叶:用于风湿骨痛,跌打损伤。

#### 6011005

*Gnetum parvifolium* (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun

植物名 小叶买麻藤《中国植志》

药材名 买麻藤《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 诺藤《本草经集注》,含水藤、大瓠藤《本草拾遗》,买子藤《广东通志》,古歪藤《汇编》

地方名 大节藤(福建、广西);江西:野番豆(寻乌);福建:山花生(厦门、龙溪、长汀、泉州、福清),倪藤(泉州),大目藤、目仔藤(龙溪地区),老熊果,白仔藤,接骨藤;广东:脱节藤(广宁、电白),竹节藤,春根藤,拦地青(新会),梅仔藤、脱节莲、驳节藤(惠阳),拳头药,米麻藤,米仔藤;海南:〔海风藤〕;广西:驳骨藤(陆川),乌骨风,麻骨风,黑藤,鸡节藤,鹤膝风,小木米藤,五层风,木花生,铁钻,〔金钱风〕,大眼藤,双铁线。

功效 藤、根、叶:祛风活血,消肿止痛,化痰止咳。用于风湿性关节炎,腰肌劳损,筋骨酸软,跌打损伤,支气管炎,溃疡病出血,蛇咬伤。外用于骨折。

#### 6011006

*Gnetum pendulum* C. Y. Cheng --- *Gnetum montanum* auct. non Markgr.

植物名 垂子买麻藤《中国植志》

药材名 苦楝藤《思茅本草》

地方名 云南:买麻藤、倪藤(思茅),藤子果、老熊果(屏边),糯米果(西畴)。

功效 藤:通气健胃,舒筋活络,祛风湿。用于消化不良,胃痛,跌打损伤,风湿性关节炎,腰腿痛;茎、果、叶:用于刀枪伤。

备考 《思茅本草》(1971)学名误订为 *Gnetum montanum* Markgr.

#### 6011007

*Gnetum pendulum* C. Y. Cheng f. *intermedium* C. Y. Cheng

植物名 短柄垂子买麻藤《中国植志》

功效 根、茎、叶:用于风湿骨痛。

## 七、被子植物类 Angiospermae

### (一)双子叶植物

#### Dicotyledoneae

#### 7001 木兰科 Magnoliaceae

#### 7001001

*Illicium arborescens* Hayata

植物名 台湾八角《高植图鉴》

文献名 红花八角《台湾药植志》

地方名 台湾:八角,八角仔,碗龙树。

功 效 果实:有毒。祛风散寒。

## 7001002

*Illicium brevistylum* A. C. Smith

植物名 短柱八角《高植图鉴补编》

药材名 短柱八角《广西药录》

地方名 广西:山八角、(丁香)(龙州)。

功 效 根:用于跌打,内伤吐血;果实:祛风,散寒,止痛,止呕,健胃。

## 7001003

*Illicium daihuense* Yamanoto

植物名 大武八角《台湾药植志》

文献名 恒春八角《台湾药植志》

功 效 果实:祛风散寒。

## 7001004

*Illicium difengpi* K. I. B. et K. I. M.

植物名 地枫《情分学报》

药材名 地枫皮《药典》

地方名 追地枫、[钻地枫](上海、浙江);广西:地枫、“枫榔”(都安瑶语),矮顶香(马山),南宁地枫皮,野八角(德保)。

功 效 树皮:有小毒。祛风湿,行气止痛。用于风湿关节痛,腰肌劳损。外用于蜈蚣咬伤。

## 7001005

*Illicium dunnianum* Tutch.

植物名 红花八角《高植图鉴补编》

药材名 樟木钻《广西本草选编》

地方名 广西:野八角,山八角,红花荷树,石莽草(上思)。

功 效 根:有毒。散瘀消肿,祛风止痛。外用于跌打肿痛,扭挫伤,骨折,风湿关节痛。

## 7001006

*Illicium henryi* Diels

植物名 红茴香《高植图鉴》

药材名 红茴香《四川中药志》

文献名 八角茴树《经植手册》,红毒茴《汇编》

地方名 [八角茴](江西、湖北),[八角茴香](陕西、湖北、贵州),[八角](贵州、湖北),土八角(四川、广西),野八角(湖北、广西、安徽);安徽:山木蟹;湖北:山大茴(利川、神农架),[大茴香](鹤峰);广西:桂花钻(龙胜);四川:土大香,土八角茴香(峨眉山);贵州:(红五加)(梵净山);云南:红花茴香,土茴香。

功 效 根、根皮:有大毒。散瘀止痛,祛风除湿。用于跌打损伤,风湿性关节炎,腰腿痛;果实:镇呕,行气止痛。用于胃寒作吐,膀胱疝气及胸前胀痛。

## 7001007

*Illicium henryi* Diels var. *multistamineum* Smith

植物名 多蕊红茴香《鉴别手册》

文献名 山大茴、山木蟹、[大茴]《新华本草纲要》

地方名 四川:[八角茴香](巫溪)。

功 效 根及根皮:作红茴香用。

备 考 果实:四川巫溪误作八角茴香用,应注意鉴别。

## 7001008

*Illicium jiadifengpi* B. N. Chang

植物名 假地枫皮《广西药录》

地方名 广西:[地枫皮],桂林地枫皮。

功 效 树皮:小毒。外用于风湿骨痛,跌打损伤。

## 7001009

*Illicium lanceolatum* A. C. Smith

植物名 披针叶茴香《高植图鉴补编》

药材名 莽草《本经》、《中药大辞典》

文献名 芒草《山海经》,石桂、红桂《梦溪笔谈》,鼠莽《纲目》,青桂、蜀道莽草《纲目拾遗》,红毒茴、窄叶红茴香《汇编》,狭叶茴香、红茴香叶、红茴香根《中药大辞典》

地方名 山木蟹、[红茴香](浙江、江西、湖南),野茴香(浙江、安徽),野八角(江西、安徽),[八角茴](陕西、浙江、江西);浙江:木蟹,木蟹树(平阳),木蟹柴、山吗哈(遂昌、温州),山桂花(昌化),[山大茴](龙泉、东阳、永康),[大茴](天台、昌化、余姚、淳安),红大茴,[上大茴](兰溪),闷痛香、大香树(龙泉),香蟹(嵊县),铁苦散(余姚),老根(临安),八角脚根(青田),黄楠(丽水),骨底搜(温州、泰顺);安徽:三钱三;江西:蒙董香(德兴),铁树翻天印(泰和),野熏香;福建:假茴香(浦城),八角子(平和),山八角(大田);贵州:土八角,野猫柴。

功 效 叶:有毒。祛风,消肿。用于头风,痈肿,皮肤麻痹,瘰癧,乳痈,喉痹,疔瘰,癰疥,疮疮,风虫牙痛;根、根皮:有大毒。祛风通络,散瘀止痛。用于跌打损伤,风湿痹痛,痈疽肿毒。

备 考 《纲目》转引《本经》、《图经》之莽草当为本种。《名实图考》中的“莽草”为卫矛科之雷公藤(*Tripterygium wilfordii* Hook. f.),不可混淆。本种果实有大毒,切不可作八角茴香用。某些地区混称八角茴、红茴香、红大茴或土大茴、八角子等,都有误作八角茴香用或食用的危险,应该引起注意。

## 7001010

*Illicium macranthum* A. C. Smith

植物名 大花八角《汇编》

地方名 广西:桂林地枫皮,[地枫皮];云南:恨叶树(腾冲),野八角(景东)。

备 考 树皮在广西为地枫皮(*I. difengpi* K. I. B. et K. I. M.)的伪品。本品有毒,不可入药。

## 7001011

*Illicium majus* Hook. f. et Thoms.

植物名 大八角《高植图鉴补编》

药材名 大八角《汇编》

地方名 野八角、神仙果(云南、广西),[八角茴香](广东、湖南);广西:桂林地枫皮,[地枫皮](资源)。

功 效 根、树皮:有毒。消肿止痛。外用于风湿骨痛,跌打损伤。

备 考 树皮在广西伪充地枫皮(*I. difengpi* K. I. B. et K. I. M.)有毒,应注意鉴别。

## 7001012

*Illicium micranthum* Dunn --- *I. wangii* Hu

植物名 小花八角《高植图鉴补编》

药材名 山八角《广西药录》

地方名 野八角(广东、广西、云南);广东:假八角、土八角、树救主(阳春)。

功效 根皮:有毒。行气止痛,散瘀消肿。外用于风湿骨痛,跌打损伤。

#### 7001013

*Illicium oligandrum* Merr. et Chun

植物名 少药八角《广西药录》

功效 树皮:外用于风湿骨痛,跌打损伤。

#### 7001014

*Illicium pachyphyllum* A. C. Smith

植物名 短梗八角《高植图鉴补编》

文献名 厚叶八角《拉汉种称》, [地枫皮]《贵州药录》

地方名 贵州:野猫柴(罗甸);广西:樟木钻(三江),毒八角(上思)。

功效 根、树皮:有毒。消肿止痛。用于风湿骨痛,跌打损伤。

#### 7001015

*Illicium religiosum* Sieb. et Zucc. --- *I. anisatum* L.

植物名 东毒茴《汇编》

药材名 东毒茴《汇编》

文献名 莽草、芒草、莽果、[八角]、日本大茴香《树分》,石桂、舶茴香《新纲》,东毒茴香《叶(生药)》,日本八角茴香《李(药植)》,日本茴香、有毒茴香《种分》,莽草树、毒八角茴香《药材学》,日本大八角《中国药植图鉴》,日本莽草《浙南本草新编》,大毒茴《汇编》,毒八角《中草药学》,莽草实《中草药》

地方名 台湾:碗龙树。

功效 叶、果:有大毒。外用于杀虫,生肌。

#### 7001016

*Illicium simonsii* Maxim. --- *I. yunnanense* Franch. ex Finet et Gagnep.

植物名 野八角《高植图鉴补编》

药材名 土八角《四川中药志》

文献名 川茴香《峨眉植物图志》,云南茴香《四川中药志》,云南八角《新华本草纲要》

地方名 山八角(四川、云南);四川:树八角、土大香(西昌);贵州:莽草,断肠草,上八角;云南:地八角,八角果(贡山),野茴香,臭八角(鲁甸)。

功效 叶、果:有剧毒。用于生肌,接骨,疮疖。

备考 有大毒,如误食立即喝盐水及酸水可解毒。

#### 7001017

*Illicium verum* Hook. f.

植物名 八角《本草求真》、《高植图鉴》

药材名 八角茴香《品汇精要》、《药典》,八角茴香油《药典》

文献名 舶茴香《纲目》,八角香、八角大茴《本草求真》,大茴香《卫生杂兴》,舶上茴香《脚气治法总要》,八月珠、角茴香《新纲》,原油茴《药材资料汇编》,八角茴、大八角《药材学》,大料、五香八角《汇编》,广茴香《鉴别

手册》,八角茴香树《中草药》,茴香油、八角油《中国树木志》

地方名 广西:四季果,花红(二、三月采收的果实),大红果、大造果(八、九月采收的果实)(龙津、百色);四川:广大香(成都);其他:西茴香,西八角,大茴。

功效 果实:温阳散寒,理气止痛。用于寒疝腹痛,肾虚腰痛,胃寒呕吐,脘腹冷痛;挥发油:芳香调味药,健胃药。

#### 7001018

*Kadsura angustifolia* A. C. Smith

植物名 狭叶南五味子《云南种录》

文献名 窄叶南五味子《中草药》,狭叶南五味子《新华本草纲要》

地方名 云南:小血藤(文山),大红袍,五香血藤。

功效 藤茎:用于跌打损伤,风湿骨痛;叶:外用于外伤出血。

#### 7001019

*Kadsura coccinea* (Lem.) A. C. Smith --- *K. chinensis* Hance ex Benth. --- *K. hainanensis* Merr.

植物名 黑老虎《岭南采药录》、《高植图鉴补编》

药材名 黑老虎根《中药志》

文献名 [五味子]《植物名汇》, [大血藤]《峨眉药植》,中国南五味子《观赏树木学》,冷饭团《高植图鉴》,饭团根、厚叶五味子《广西药录》,绯红南五味《汇编》

地方名 臭饭团(江西、广西、广东、云南),酒饭团、大叶南五味子、过山龙藤(广东、广西),大钻(江西、广西、云南),大饭团、大叶钻骨风、钻骨风(湖南、广西), [钻地风] (江西、湖南、广东),十八症(湖南、广东、广西),三百两银、透地连珠(江西、广东);福建:麒麟钻;湖南:红过山,外红消,万丈红, [小血藤], [小活血];广东:过山龙(阳春),娘饭团(五华、惠阳、仁化),饭汤拿(仁化),酒饭团根、江南五味子、[金不换] (广州),紫根藤(乳源),滑藤(连县),软羌(曲江);广西:红钻,红十八症,红大风藤,红大血藤,血藤(大苗山), [血见愁]、公饭团(桂平),大血散(那坡),大风藤(钟山),大钻骨风,大饭团子,大饭团藤(博白),大冷饭团,大样过山龙,大叶五味子,南五味子(马山), [过山香] (博白),入地麝香(藤县、平南、梧州),钻郎风(梧州),鸡肠风(蒙山、梧州),饭团子,饭团藤(陆川),软姜(岑溪);贵州: [五香血藤];云南:“密多罗”(红河),猩猩南五味子。

功效 根:行气活血,祛风止痛。用于风湿痹痛,痛经,脘腹痛,跌扑瘀痛;藤茎及叶:消肿解毒。用于跌打损伤,伤口感染。

#### 7001020

*Kadsura heteroclita* (Roxb.) Craib --- *Uvaria heteroclita* Roxb.

植物名 异形叶南五味子《高植图鉴补编》

药材名 大叶风沙藤(广东)、《汇编》

文献名 大梅花钻、[大血藤]《汇编》,大叶过山龙藤、异形南五味子《海南植志》

地方名 [海风藤] (内蒙古、广东、广西),大饭团(云南、广西),过山龙藤(海南、广西);湖北:大香血藤(神

农架);湖南:南蛇风;广东:过山风(广州、从化、阳春);广西:风藤,梅花钻,天泰(苍梧),红吹风,隔山吹火(梧州);贵州:五香大血藤;云南:地血香、绣球香、通天香、水密细藤(思茅),大风沙藤,大钻骨风,〔冷饭团〕,红大风藤,红十八症、大钻、追风散、吹风散(文山),〔鸡血藤〕,猪奶果、饭团果(屏边)。

**功效** 根、老藤:祛风除湿,理气止痛,活血散瘀。用于风湿痛,胃肠炎,痛经,跌打损伤;果实:补肾宁心,止咳祛痰。

## 7001021

*Kadsura interior* A. C. Smith

**植物名** 内南五味子(汇编)

**药材名** 顺宁鸡血藤(云南)

**文献名** 鸡血藤《顺宁府志》,中间南五味子《鉴别手册》

**地方名** 云南:散血香(耿马),滇南五味子,凤庆鸡血藤,葡果(景东)。

**功效** 根、老藤:补血行血,通经活络。

**备考** 本品为《纲目拾遗》记载鸡血藤膏之原料,但现时作药材用的鸡血藤,非本种。

## 7001022

*Kadsura japonica* (L.) Dunal

**植物名** 红骨蛇(高植图鉴补编)

**药材名** 红骨蛇(台湾中药材图鉴)

**文献名** 南五味子《台湾药植志》

**功效** 根:用于毒蛇咬伤,解热,止渴,镇痉,镇痛;果实:强壮,镇咳,祛痰,收敛。

## 7001023

*Kadsura longepedunculata* Finet et Gagnep. --- *K. peltigera* Rehd. et wils.

**植物名** 南五味子《纲目》、《高植图鉴》

**药材名** 红木香〔根〕《纲目拾遗》、《中药志》

**文献名** 紫金藤《图经》,山甘草《纲目》,金谷香、紫骨香、木腊(汪连仕《采药书》),广福藤〔茎〕、紫金皮〔根皮〕《纲目拾遗》,内风消《名实图考》,蔞、壮味、玄及、会及、嗽神、茎猪、六亭剂、〔金铃子〕、红内藤《新纲》,盘柱南五味子《树分》,蓝果南五味子《经植手册》,南浦、猓猓饭团《中国经植志》,浙江紫金皮《药材学》,五香血藤《贵州草药》,南五味子叶《福建民间草药》,南五味子根《药典》,长梗五味子《中药大辞典》

**地方名** 〔紫荆皮〕(浙江、江西、上海),〔五味子〕(浙江、江西、湖南、四川),小血藤(江西、湖南、云南),小红藤(中南),小钻、紧骨风(广东、广西),〔大血藤〕(湖北、湖南、四川、贵州),〔大活血〕〔茎藤〕(浙江、安徽、湖南),牛奶藤(江西、福建),过山龙、白山环藤(浙江、湖南、广东),红内消、内红消(江西、湖南),〔冷饭团〕(浙江、江苏、湖南),酒饭团(江西、安徽、广东),钻骨风(广东、广西、贵州);北京:〔川椴皮〕〔根皮〕;江苏:紫木香(宜兴);浙江:猓猓拳(景宁),〔穿山龙〕(平阳),硬饭团藤(天台),山饭藤(温州、永嘉、瑞安),冷饭包(临安),冷饭浦里袋(嵊县),香根藤(乐清),秤砣子(临安、淳安、东天目),泥底茶(云和),牛奶柿(江山),黄牛藤;安

徽:秤锤,秤锤子;江西:外红消(铜鼓),〔红藤〕(庐山),牛栏档,牛郎档(婺源、德兴),紫金标(景德镇);福建:〔土木香〕(福州、南平、宁德、龙岩),土五味、红鸡母(福州、福安),鸭公球莲,鸡母球(大田),鸡母拖、清气藤(闽东),猪生卵、猪心罗根(明溪),牛卵陀(清流、宁化),羊慢宽(三明),鼻屎铜金罗(清流),拿饭瓢(永安),拉谷钻根(宁化),米筛子,拳头莲,逢车头陈〔藤〕,老鸢丝草(福州),蜘蛛钻(龙海、漳州、仙游、晋江);湖南:内风藤,头藤,黄蜡藤,活血根,见血飞,〔小活血〕,小血,二血(淑浦),楼梯沙,〔钻地风〕(衡阳);湖北:盘柱香(咸宁);广东:大叶金不换、小号风沙藤(惠阳),红藤子(翁源),罗丝藤、罗利藤、软枝穿山龙、鸡安基罗、鸡角过(潮阳、揭阳、普宁),鸡化髻陀、饭娘团(五华),饭包藤、鸭饭球(饶平),冷饭藤、饭团藤(阳春),透地连珠、风沙藤(广州);广西:〔入地麝香〕,拳头草,血头果,小钻骨风(大瑶山);贵州:血藤,散血飞;云南:〔大红袍〕(文山)。

**功效** 根:祛风活血,理气止痛。用于胃、十二指肠溃疡,痛经,腹痛,风湿性关节痛,跌打损伤,疟疾;藤茎:活血祛风,消肿镇痛;叶:外用于痈疽疮疖,刀伤;果实:补肺益肾,化痰止咳。用于神经衰弱,阳痿滑精,肾虚腰痛,支气管炎。

## 7001024

*Kadsura oblongifolia* Merr.

**植物名** 冷饭藤《海南植志》

**药材名** 吹风散《文山中草药》

**文献名** 冷饭团《高植图鉴补编》

**地方名** 海南:饭团藤;广西:水灯盏、入地麝香(藤县),十八症、细风藤(玉林),吹风藤、红吹风藤(百色、德保),黑老虎(上林);贵州:五香血藤;云南:大钻、大叶南五味、红大风藤、红十八症(文山)。

**功效** 藤、根:祛风湿,和胃肠,行气止痛。用于感冒,风湿痹痛,腹泻,呕吐,跌打损伤;果实:敛肺益肾。用于失眠。

## 7001025

*Kadsura polysperma* Yang

**植物名** 多子南五味子《高植图鉴补编》

**文献名** 百叶大血藤《峨眉药植》,多子五味子《广西药录》

**功效** 果实:用于全身肿痛。

## 7001026

*Liriodendron chinense* (Hemsl.) Sarg.

**植物名** 鹅掌楸《高植图鉴》

**药材名** 鹅掌楸(汇编)

**文献名** 凹朴皮、鹅掌楸根《中药大辞典》

**地方名** 马褂树(广西、四川);浙江:凹朴(天目山),野厚朴;湖北:鸭掌树(鹤峰),马褂木、罗汉树、佛谷树、鸭脚板树(神农架),楸树;贵州:双瓢树,鬼头木,鬼子树(兴仁);云南:遮阳树(麻栗坡)。

**功效** 根、树皮:驱风除湿,止咳。用于风湿关节痛,风寒咳嗽。

## 7001027

*Liriodendron tulioifera* L.

植物名 北美鹅掌楸《高植图鉴》

文献名 美国鹅掌楸《汇编》, 百合木《山东树木志》

功效 树皮: 除湿止嗽。用于水湿风寒引起的咳嗽, 气急, 口渴, 四肢浮肿等。

7001028 见 7001038a

7001029

*Magnolia amoena* Cheng

植物名 天目木兰《高植图鉴》

药材名 天目木兰《浙江天目药志》

地方名 浙江: 木兰(临安)。

功效 花蕾: 利尿消肿, 润肺止咳。用于酒疸, 重舌, 痈毒, 咳嗽, 痰中带血。

7001030

*Magnolia biondii* Pamp. --- *M. fargesii* (Finet et Gagnep.) Cheng

植物名 辛夷《药学报》

药材名 辛夷《本经》、《药典》

文献名 辛夷、侯桃、房木《本经》, 新雉《甘泉赋》, 木笔、[迎春]《本草拾遗》, 木笔花《蜀本草》, 望春、猪心花、石莽《花镜》, 法氏木兰《树分》, 华中木兰《湖北植志》, 线萼辛夷《汇编》, 望春花《药典》, 望春玉兰《高植图鉴补编》

地方名 河南: 大毛桃, 大毛桃串鱼, 大毛桃猴巴掌, 二毛桃, 二毛桃串鱼, 驴奶头, 黄柄驴奶头, 黄柄老鼠屎, 老鼠屎串鱼, 老鼠屎猴巴掌, 翻毛鸡, 翻毛鸡串鱼; 湖北: 迎春树(郧西), 迎春花, 迎春花树(神农架); 其他: 河南辛夷。

功效 花蕾: 散风寒, 通鼻窍。用于风寒头痛, 鼻塞, 鼻渊, 鼻流浊涕。

7001031

*Magnolia biondii* Pamp. f. *flavescens* Z. Y. Gao

植物名 黄望春玉兰《河南科学院学报》

药材名 辛夷(河南)

功效 花蕾: 散风寒, 通鼻窍。

7001032

*Magnolia biondii* Pamp. f. *purpurascens* Law et Gao

植物名 紫望春玉兰《河南科学院学报》

药材名 辛夷(河南)

功效 花蕾: 散风寒, 通鼻窍。

7001033

*Magnolia campbellii* Hook. f. et Thoms. --- *M. mollicomata* W. W. Smith

植物名 滇藏木兰《高植图鉴补编》

文献名 滇藏玉兰《中药大辞典》, 本兰花《药植简编》, 二叶子厚朴《药学报》

地方名 辛夷[花蕾](西藏、云南); 云南: 土厚朴(罗平山、丽江), 夜合(丽江), [厚朴](维西), [大叶木兰]、大叶厚朴、贡山木兰(腾冲、贡山); 西藏: “大琼”(藏名)。

功效 花蕾: 西藏作辛夷入药; 树皮: 云南部分地区作厚朴入药。

7001034

*Magnolia coco* (Lour.) DC.

植物名 夜香木兰《树分》

文献名 夜合花《名实图考》, 夜合《高植图鉴补编》, 假厚朴《植物名汇》

地方名 [合欢花](广西、广东); 广西: 合欢木(北流、平南), 上厚朴(桂平), 夜香花(南宁)。

功效 花: 驳骨, 安五脏。用于跌打, 瘡癤, 淋浊带下, 肝郁气痛; 根皮: 散瘀除湿。

7001035

*Magnolia cylindrica* Wils.

植物名 黄山木兰《高植图鉴补编》

地方名 浙江: 木兰(东天目山); 湖北: 望春花(阳新)。

功效 花蕾: 利尿消肿, 润肺止渴。

7001036

*Magnolia delavayi* Franch.

植物名 山玉兰《高植图鉴》

药材名 山玉兰《汇编》

文献名 优昙花、波罗花、娑罗树、山娑罗《名实图考》, 夜合花《玉龙山药植》, 山厚朴《药植简编》

地方名 土厚朴(四川、云南); 四川: 野枇杷, 山枇杷; 云南: 野玉兰, 野厚朴(曲靖), 云南玉兰(大理、红河、临沧), 大榔榔叶(文山), 大叶子、大菠萝叶(昆明), 厚朴(峨山), 小玉兰, 山菠萝。

功效 树皮: 温中理气, 健脾利湿。用于消化不良, 慢性胃炎, 腹胀, 腹泻; 花或花蕾: 宣肺止渴。用于鼻炎, 支气管炎, 咳嗽。

7001037

*Magnolia denudata* Desr. --- *M. heptapeta* (Buc'hoz) Dandy

植物名 玉兰《群芳谱》、《高植图鉴补编》

药材名 辛夷《本经》、《药典》

文献名 玉兰花《滇南本草》, 白木莲《本草纲目启蒙》

地方名 望春花(陕西、浙江、江西、安徽、湖北、广西), 白玉兰(上海、河南、湖北、广西); 陕西: 姜朴(陕南); 浙江: [迎春花]; 江西: [江西厚朴]; 湖北: 望春树(罗田), 应春花, 辛一(神农架); 广东: 玉堂春(广州); 广西: 香花(陆川); 四川: 木花树(峨眉)。

功效 花蕾: 散风寒, 通鼻窍。用于风寒头痛, 鼻塞, 鼻渊, 鼻流浊涕; 花: 消痰, 益肺和气。

7001038

*Magnolia denudata* Desr. var. *dilutipurpurascens* Z. W. Xie et Z. Z. Zhao --- *M. conspicua* Salisb. var. *purpurascens* Maxim.

植物名 淡紫玉兰《药学报》

药材名 辛夷(安徽、江苏、浙江、江西、湖南)、《药学报》

功效 花蕾: 散风热, 通鼻窍。

7001038a

*Magnolia elliptimba* Law et Gao

植物名 椭圆叶玉兰《河南科学院学报》

药材名 辛夷(河南)

功效 花蕾:散风寒,通鼻窍。

#### 7001039

*Magnolia fistulosa* (Finet et Gagnep.) Dandy --- *M. paene-talauma* Dandy

植物名 长叶木兰《高植图鉴补编》

文献名 长叶玉兰《树分》

地方名 广西:含笑花木(天等)。

功效 树皮:消积。用于胃脘胀痛;叶、果实:用于风湿骨痛,咳嗽。

#### 7001040

*Magnolia globosa* Hook. f. et Thoms.

植物名 毛叶木兰《高植图鉴补编》

备考 据《中草药》(1985)称:有以花伪充厚朴花入药。

#### 7001041

*Magnolia grandiflora* L.

植物名 荷花玉兰《高植图鉴》

药材名 荷花玉兰《四川中药志》

文献名 洋玉兰《树分》,泰山木《种分》,大花玉兰《华北经植志要》,广玉兰《中国经植志》

地方名 浙江:木莲果、[木莲](杭州);湖南:[玉兰花],百花果;四川:[辛夷花](峨眉山)。

功效 花:疏风,散寒,止痛。用于外感风寒,头痛鼻塞;树皮:行气,燥湿,止痛。用于湿阻中焦,气滞不利的脘腹胀满,腹痛。

#### 7001042

*Magnolia kobus* DC.

植物名 日本辛夷《中国树木志》

文献名 辛夷《和汉药植》,皱叶木兰《高植图鉴补编》

地方名 四川:辛夷花。

功效 花蕾:用于头痛,疮毒,鼻痔等。

备考 本品原产日本、朝鲜,现我国青岛、杭州有栽培。

#### 7001043

*Magnolia liliflora* Desr. --- *M. quinquepetala* (Buc'hoz) Dandy

植物名 紫花玉兰《高植图鉴补编》

文献名 辛夷《本草衍义》,木笔花《名实图考》,玉璫、流夷、朝天莲、[报春花]《新纲》,杜春花、紫玉兰《中国经植志》, [姜朴花]《四川中药志》

地方名 春花(华东、河南);山西:毛辛夷,辛夷桃;陕西:木兰花;江苏:望春花;上海:春花树花;安徽:毛桃香;福建:木笔;广西:满岭红;四川:牛心子花(南充),会春花,辛夷花(峨眉山);云南:大叶枇杷(楚雄),茄兰(昆明);其他:红玉兰。

功效 花蕾:散风寒,通鼻窍。

备考 本种花蕾近代许多文献曾列为辛夷正品。据考证,宋代《本草衍义》中辛夷确为本种,现已不见于辛夷商品之中。

#### 7001044

*Magnolia obovata* Thunb. --- *M. hypoleuca* Sieb. et Zucc.

植物名 日本厚朴《高植图鉴补编》

药材名 和厚朴《新纲》、《中草药学》

文献名 厚朴花、淡白浮、柴朴《和汉药物学》,朝鲜厚朴《新纲》,厚朴(小泉《药植》)

功效 树皮:代厚朴用。

备考 本品原产日本,我国江苏有引种栽培。

#### 7001045

*Magnolia officinalis* Rehd. et Wils.

植物名 厚朴《高植图鉴》

药材名 厚朴《本经》、《药典》,厚朴花《饮片新参》、《药典》

文献名 厚皮《吴普本草》,重皮《广雅》,赤朴、逐杨[子]《别录》,烈朴《日华子本草》,厚朴实《纲目》,淡伯《新纲》,土厚朴《植物名汇》,厚朴果《四川中药志》,厚朴子《中药大辞典》

地方名 川朴(陕西、上海、湖北、四川),油朴(河南、湖北、四川),川朴花(湖北、四川),调羹花(贵州、四川);陕西:川根朴;湖北:厚朴树(神农架);湖南:桂皮花树(通道),灯照杆(邵阳);四川:油朴树(江津),紫油朴,紫油厚朴,万卷书,京庄,省庄,京八寸,羊耳朴,耳朴,尺朴,脑朴,朴花,川厚朴(峨眉山);其他:玉朴[芽],简朴,如意朴,如意卷厚朴(干皮),根朴,鸡肠朴(根皮),靴筒朴,靴角朴,靴兜子(近根部干皮),枝朴(枝皮)。

功效 干皮、根皮、枝皮:燥湿消痰,下气除满。用于湿滞伤中,脱痞吐泻,食积,气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳;花蕾(厚朴花):理气,化湿。用于胸脘痞闷胀满,纳谷不香;果实或种子:温中,理气,消食。

#### 7001046

*Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. ssp. *biloba* (Rehd. et Wils.) Cheng et Law --- *M. biloba* (Rehd. et Wils.) Cheng

植物名 凹叶厚朴《高植图鉴补编》

药材名 厚朴《药典》,厚朴花《饮片新参》、《药典》

文献名 庐山厚朴《树分》,裂叶厚朴《种分》,厚朴子《中药大辞典》

地方名 浙江:温厚朴,温朴(天目山),脑朴,简朴,根朴,温朴花,龙皇厚朴,湖南:毛厚朴(凤凰)。

功效 干皮、根皮、枝皮:燥湿消痰,下气除满。用于湿滞伤中,脱痞吐泻,食积,气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳;花蕾(厚朴花):理气,化湿。用于胸脘痞闷胀满,纳谷不香;果实或种子:温中,理气,消食。

#### 7001047 见 7001039

#### 7001048

*Magnolia pilocarpa* Z. Z. Zhao et Z. W. Xie

植物名 罗田玉兰《药学报》

药材名 辛夷(湖北、安徽)、《药学报》

功效 花蕾:散风寒,通鼻窍。

#### 7001049

*Magnolia rostrata* W. W. Smith

植物名 滇缅厚朴《高植图鉴补编》

药材名 云朴《药学报》

文献名 大叶木兰《树分》,贡山木兰《云南药录》,长喙厚朴《中国树木志》,大叶厚朴,贡山厚朴,腾冲厚朴《药学报》,长喙木兰《西藏植志》

地方名 云南:厚朴,大厚朴(腾冲)。

功效 树皮:燥湿消痰,下气除满。用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹泻便秘,痰饮喘咳。

#### 7001050

*Magnolia sargentiana* Rehd. et Wils. --- *M. conspicua* var. *emarginata* Finet et Gagnep. --- *M. emarginata* Cheng

植物名 凹叶木兰《高植图鉴补编》

药材名 马边辛夷、姜朴〔树皮〕《四川中草药通讯》

文献名 姜朴花、迎春花《中草药》

地方名 二月花(四川、云南);四川:迎春花(瓦山),辛夷(马边、天全),姜朴树(峨眉、峨边、洪雅),辛皮(洪雅),野厚朴,厚皮;云南:花树子、苞谷树(镇雄)。

功效 树皮:燥湿消痰,下气除满。用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹泻便秘,痰饮喘咳。

#### 7001051

*Magnolia sieboldii* K. Koch

植物名 天女花《高植图鉴》

文献名 辛夷包、迎春花《满鲜植汇》,天女木兰、小花木兰《树分》

地方名 辽宁:山牡丹(庄河、岫岩),玉兰,山芍药(本溪);浙江:木兰(东天目);湖北:辛夷花(汉口)。

功效 花蕾、花:用于鼻炎。

#### 7001052

*Magnolia sinensis* (Rehd. et Wils.) Stapf

植物名 圆叶木兰《高植图鉴补编》

药材名 枝子皮《四川中草药通讯》

文献名 圆叶玉兰《树分》,岩姜《药学报》,华木兰《经植手册》

地方名 四川:枝朴、〔姜朴〕(峨眉、洪雅),岩朴(峨眉)。

功效 树皮:四川民间代厚朴入药。

备考 本种不含厚朴酚等有效成分,不宜作姜朴使用。

#### 7001053

*Magnolia sinensis* (Rehd. et Wils.) Stapf var. *petrosa* Law et M. J. Chia

植物名 枝子皮《高植图鉴补编》

药材名 枝子皮(四川)、《药学报》

功效 树皮:四川地区代厚朴入药。

#### 7001054

*Magnolia soulangeana* Soul. -Bod.

植物名 二乔木兰《高植图鉴补编》

文献名 朱砂玉兰、苏郎辛夷《华北树木志》

功效 花蕾:用于头痛鼻炎。

#### 7001055

*Magnolia sprengeri* Pamp. --- *M. diva* Stapf --- *M. denudata* var. *purpurascens* Rehd. et Wils.

植物名 武当玉兰《高植图鉴补编》

药材名 辛夷《蜀本草》、《药典》

文献名 迎春树、大花玉兰《树分》,迎春树、大花木兰《经植手册》,朱砂玉兰《秦岭植志》,红花木兰《湖北植志》,迎春花《汇编》,姜朴花、迎春花、湖北木兰《中草药》

地方名 厚朴(四川、云南);陕西:姜朴(略阳);湖北:野厚朴(利川);四川:川姜朴,二月花、金山二月花(南充)。

功效 花蕾:散风寒,通鼻窍。用于风寒头痛,鼻塞,鼻渊,鼻流浊涕;树皮:燥湿消痰,下气除满。

#### 7001056

*Magnolia stellata* Maxim.

植物名 尾花木兰《中国树木志》

文献名 日本毛木兰《树分》,重华辛夷《华北经植志要》

地方名 贵州:梦花、八角树(雷公山)。

功效 树皮:祛风湿,止腹痛。

#### 7001057

*Magnolia wilsonii* (Finet et Gagnep.) Rehd. et Wils.

植物名 西康木兰《高植图鉴补编》

药材名 辛夷(云南丽江),枝子皮(四川)、《药学报》

文献名 龙女花《名实图考》,西康玉兰《树分》,天女花《云南种录》

地方名 四川:〔厚朴〕(乐山、雅安、西昌),川姜朴,西昌厚朴;云南:土厚朴,〔鸡蛋花〕(禄劝),小玉兰(丽江)。

功效 树皮:四川、云南部分地区代厚朴用;花蕾:散风寒,通鼻窍。

#### 7001058

*Manglietia chingii* Dandy

植物名 桂南木莲《高植图鉴补编》

文献名 山厚朴、野厚朴《药学报》,南方木莲《中药材》

地方名 湖南:〔厚朴〕;广西:大叶花(融水),假厚朴(容县);云南:牛耳南。

功效 树皮:消积,下气;叶、花、果实:消肿止痛。

#### 7001059

*Manglietia duclouxii* Finet et Gagnep.

植物名 盐津木莲《高植图鉴补编》

功效 树皮:贵州常作厚朴代用品入药。

#### 7001060

*Manglietia fordiana* Oliv.

植物名 木莲《高植图鉴补编》

药材名 木莲《酉阳杂俎》、《汇编》

文献名 黄心树《白香山集》,木兰、真木兰《纲目》,香港木莲《经植手册》

地方名 〔厚朴〕(湖南、广西);浙江:木莲果(昌化、金华、兰溪);广西:山厚朴(金秀),假厚朴(玉林),野枇杷(乐业),绿楠(南宁)。

功效 树皮、根皮:止咳,通便。用于实火便秘,老



人干咳等;果实:疏肝理气,润肺止咳。用于肝胃气痛,脘胁作胀,便秘,老年干咳。

备考 《纲目》附于木兰项下,谓是真木兰。

#### 7001061

*Manglietia insignis* (Wall.) Blume --- *Magnolia insignis* Wall.

植物名 红花木莲《高植图鉴补编》

文献名 美木莲《广西植录》,细花木莲《云南药录》,显著木莲《中草药》,古蔺厚朴《药学学报》

地方名 广西:大木莲;云南:[厚朴]、木莲花(腾冲),“密碰”(贡山),临沧土厚朴(临沧)。

功效 树皮:四川、云南等作厚朴入药。

#### 7001062

*Manglietia moto* Dandy

植物名 毛桃木莲《高植图鉴补编》

地方名 湖南:[厚朴];四川:[辛夷](马边)。

备考 树皮:湖南市场上称为“厚朴”,花蕾在四川马边充辛夷用。

#### 7001063

*Manglietia patungensis* Hu

植物名 巴东木莲《高植图鉴补编》

地方名 湖北:野辛夷(神农架);湖南:[厚朴]。

功效 树皮:用于高血压。

备考 湖南药材市场上充“厚朴”入药。

#### 7001064

*Manglietia szechuanica* Hu

植物名 四川木莲《高植图鉴补编》

药材名 柴朴、沐川朴花《四川中草药通讯》

地方名 四川:厚朴花、朴花、柴朴花、瓢儿花苞、姜朴花、姜朴、柴厚朴(沐川),瓢儿花,朴花树,二郎花(马边),岩朴(峨眉山)。

功效 树皮、花蕾:四川沐川分别作“柴厚朴”、“厚朴花”收购入药。

#### 7001065

*Manglietia yuyuanensis* Law

植物名 乳源木莲《高植图鉴补编》

药材名 木莲果《浙江药植志》

文献名 狭叶木莲《浙江药植志》

地方名 浙江:土厚朴,木莲。

功效 果实:疏肝理气,润肠止咳。用于肝胃气痛,脘胁作胀,便秘,老年干咳。

#### 7001066

*Michelia alba* DC.

植物名 白兰《高植图鉴补编》

药材名 白兰花《汇编》

文献名 白玉兰《树分》,缅桂花《云南种录》

地方名 [玉兰](广西、台湾),缅桂花(四川、云南),白缅花(广东、云南);福建:白木兰(福鼎),[玉兰花](泉州、漳州、诏安);台湾:银厚朴,秤簕迦;广东:白玉兰花;云南:白缅桂;四川:黄桷兰(峨眉山)。

功效 花、叶、根:芳香化湿,利尿,止咳化痰。用于泌尿系感染,小便不利,癰肿,支气管炎,百日咳,胸

闷,口渴,前列腺炎,白带。

#### 7001067

*Michelia champaca* L.

植物名 黄兰《高植图鉴》

药材名 黄缅桂《思茅中草药》

文献名 薝卜《经植手册》

地方名 台湾:旃檀迦,金厚朴;广西:黄玉兰(南宁);四川:黄桷兰(峨眉山);云南:[含笑],大黄桂、老樟巴(思茅),缅桂(河口),“炎仲哈”(傣名)。

功效 根:用于风湿骨痛;果实:用于消化不良,胃脘痛。

#### 7001068

*Michelia chapensis* Dandy

植物名 乐昌含笑《广西药录》

地方名 广西:南子香(龙州)。

功效 树皮、叶:用于胃脘痛,咳嗽。

#### 7001069

*Michelia crassipes* Law

植物名 紫花含笑《高植图鉴补编》

地方名 湖南:“尖端连水”(蓝山县瑶名)。

功效 枝、叶:活血散瘀,清热利湿。用于肝炎。

#### 7001070

*Michelia figo* (Lour.) Spreng.

植物名 含笑《高植图鉴补编》

文献名 含笑花《树分》

地方名 广西:茶连木(全州);四川:含笑梅(灌县),山节子(雅安)。

功效 叶:用于跌打损伤;花蕾:用于月经不调。

#### 7001071

*Michelia foveolata* Merr. ex Dandy

植物名 金叶含笑《高植图鉴补编》

药材名 金叶含笑《广西药录》

文献名 野木兰《广西植录》,广东白兰花《湖北植志》

地方名 湖北:野厚朴(利川);广西:山厚朴(蒙山),火力楠,牛耳楠,香糊楠,大兰树;云南:黄心子(屏边)。

功效 树皮:解毒,散瘀。

#### 7001072

*Michelia hedyosperma* Law

植物名 香子含笑《高植图鉴补编》

文献名 “麻罕”《西双版纳傣药志》,八角香兰《民族药志》

地方名 海南:黑枝苦梓;广西:香子楠。

功效 种子:消食和脾胃。用于胸膈痞满,腹痛,感冒。

#### 7001073

*Michelia macclurei* Dandy

植物名 醉香含笑《高植图鉴补编》

地方名 火力楠(广西、广东)。

功效 树皮、叶:用于跌打损伤,癰疮肿毒。

#### 7001074

*Michelia macclurei* Dandy var. *sublancea* Dandy

植物名 火力楠《植分学报》  
文献名 兰木《经植手册》  
地方名 广西:醉含笑、楠木、红楠木(南宁),棉毛含笑。

功效 树皮、根、叶:清热消肿。用于肠炎腹泻,跌打损伤,痈肿。

## 7001075

*Michelia maudiae* Dunn

植物名 深山含笑《高植图鉴补编》  
文献名 莫夫人含笑花《经植手册》,深山含笑花《高植图鉴》  
地方名 浙江:泡花树,野厚朴;广西:大叶楠,光叶白玉兰(金秀),光叶白兰花。  
功效 根、花:凉血,消炎。

## 7001076

*Michelia yunnanensis* Franch. ex Finet et Gagnep.

植物名 云南含笑《高植图鉴补编》  
文献名 含笑花、羊皮袋《滇海虞衡志》,皮袋香、山枝子《名实图考》  
地方名 云南:〔山栀子〕,山辛夷(昆明),十里香(丽江),金丝杜仲,石小豆。  
功效 根、花:清热解毒,收敛止血;根:用于崩漏;花:用于咽喉炎,鼻炎,结膜炎。

## 7001077

*Paramichelia bailonii* (Pierre) Hu

植物名 合果木《中国树木志》  
文献名 拟含笑《经植手册》,假含笑《云南种录》,合果含笑《植分学报》  
地方名 云南:山桂花,山缅桂(西双版纳),山桃树(思茅),黑心树(金平),圆棒头果(孔明山),“埋章巴”、“埋洪”(傣语),“朴郎”(爱尼族语),“盘和盘柱”(红河哈尼族语)。  
功效 根尖、树皮:消炎清热。用于风湿头痛。

## 7001078

*Schisandra arisanensis* Hayata

植物名 阿里山五味子《高植图鉴补编》  
文献名 台湾五味子《高植图鉴》  
功效 种子、果实:收敛固涩,益气生津,补肾宁心。

## 7001079

*Schisandra axillaris* Hook. f. et Thoms.

植物名 腋生五味子《贵州药录》  
地方名 贵州:青杠血藤(兴义)。  
功效 根:用于跌打损伤。

## 7001080

*Schisandra bicolor* Cheng

植物名 二色五味子《高植图鉴补编》  
药材名 二色内风消《浙江天目药志》  
文献名 两色五味子《种分》  
地方名 浙江:香苏子、〔北五味子〕(东天目)。  
功效 根、藤、果:理气活络,健脾。

## 7001081

*Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.

植物名 五味子《高植图鉴补编》  
药材名 五味子《本经》、《药典》  
文献名 葇、荜蓂《尔雅》,五味《本经》,玄及《吴普本草》,会及《别录》,北五味子《纲目》,面蓂《植物名汇》,朝鲜五味子《树分》  
地方名 北五味、辽五味、辽五味子、五梅子、山花椒(东北);吉林:“嗽密扎”(朝名);内蒙古:山花椒秧,“达达力格”、“乌拉勒古嘎纳”(蒙名);河南:木瓜蓂。  
功效 果实:收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久咳虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗,盗汗,津伤口渴,短气脉虚,内热消渴,心悸失眠。

## 7001082

*Schisandra glaucescens* Diels

植物名 灰五味子《中药志》  
药材名 花血藤《汇编》  
文献名 五味藤《植物名汇》,粉叶内风消《湖南药物志》,金山五味子《湖北植志》,粉背北五味《品种论述》  
地方名 湖北:饭巴团(利川),南五味,秤陀、五味子(神农架);湖南:内风消,内红消。  
功效 果实:清肺,补虚;藤:用于劳伤,甲状腺肿。

## 7001083

*Schisandra grandiflora* (Wall.) Hook. f. et Thoms. --- *S. grandiflora* Hook. f. et Thoms. var. *rubriflora* Rehd. et Wils.

植物名 大花五味子《高植图鉴补编》  
文献名 兴山北五味子《树分》,大花北五味子《经植手册》,红花五味子《中国经植志》,红花北五味子《药植简编》  
地方名 贵州:五香血藤,〔大血藤〕(贵阳),〔紫金藤〕(遵义),钻骨风(铜仁);云南:白花五味子。  
功效 果实:清肺,补虚;藤:用于劳伤,甲状腺肿。

## 7001084

*Schisandra henryi* Clarke

植物名 棱枝五味子《高植图鉴补编》  
药材名 黄皮血藤《四川中药志》  
文献名 大血藤《草木便方》,活血藤《天宝本草》,峨眉五味子《树分》,血藤《四川中药志》,翼梗五味子《高植图鉴》,翅枝五味子《湖北植志》,铁箍散《云南种录》,满山香《药植简编》,翼梗北五味子《峨眉药植研究》  
地方名 五味子(云南、四川),小血藤(广西、云南);浙江:粉叶内风消;广西:罗辖子,红梨藤(乐业),见风消;贵州:气藤(惠水);四川:川五味子、药五味(南川),西五味,西五味子,紫金血藤(重庆),饭耙藤(峨眉山);云南:大五味子(红河),大伸筋(玉溪),伸筋(通海、华宁),红九股牛(易门),红香血藤(澄江),香石藤,铁骨散,吊吊果(河口),“阿珠巴夜色”(哈尼族语)。  
功效 根、藤:祛风除湿,活血止痛。用于风湿骨痛,脉管炎,跌打损伤,骨折;果实:收敛固涩,益气生津,补肾宁心。

## 7001085

*Schisandra henryi* Clarke var. *longipes* A. C. Smith

植物名 长梗棱枝五味子(拟)  
文献名 长梗五味子《药植简编》  
功效 根、藤:祛风除湿,活血止痛。

## 7001086

*Schisandra henryi* Clarke var. *yunnanensis* A. C. Smith

植物名 云南五味子《汇编》  
文献名 滇五味子《药植简编》,吊花山椒《云南药录》,云南铁箍散《云南种录》  
地方名 贵州:五味子(兴仁),云南北五味子;云南:吊吊果、山花椒(红河),山五味子,白五味子(麻栗坡),吊吊香,“介嘿”(西双版纳傣语),香石藤,铁骨散,小血藤。

功效 果实:敛肺补肾,涩精止汗;根、茎、藤:舒筋止血,止痛生肌。用于咳嗽,食欲不振,自汗,盗汗,神经衰弱,肾虚腰痛,风湿骨痛,跌打扭伤。

## 7001087

*Schisandra incarnata* Stapf

植物名 兴山五味子《湖北植志》  
文献名 五味子《湖北中草药志》  
地方名 湖北:南五味、西五味,药五味子(神农架)。  
功效 果实:收敛,止泻,止咳。

## 7001088

*Schisandra lancifolia* (Rehd. et Wils.) A. C. Smith

植物名 披针叶五味子《中药志》  
药材名 香石藤《云南中草药》  
文献名 狭叶五味子《树分》,长叶五味子《云南种录》,香石藤果《中药大辞典》  
地方名 云南:小密细藤(思茅),满山香、小血藤(红河),黄袍(保山),八介、小花叶子、小花跌打(临沧),大钻地红(景谷),五味子,香藤果。

功效 全株:祛痰消肿,止血。用于跌打损伤骨折;果:补肾益智。用于神经衰弱。

## 7001089

*Schisandra micrantha* A. C. Smith

植物名 小花五味子《汇编》  
药材名 小花五味子藤《汇编》  
地方名 贵州:秤锤泡(镇远);云南:大伸筋,香石藤,铁骨散,黄袍,接筋藤,接骨藤、大黄袍、白袍(文山),小红藤,小密细藤,小血藤、满山香、爬山香、萝松根、鸡血藤(红河),血木通(玉溪),〔过山龙〕,〔五味子〕,锯齿叶。

功效 根、藤:祛风利湿,理气止痛。用于风湿骨痛,跌打损伤,胃痛,月经不调,肾炎。

## 7001090

*Schisandra neglecta* A. C. Smith

植物名 滇藏五味子《西藏植志》  
药材名 滇藏五味子《中药志》  
文献名 高原北五味子《药植简编》,小血藤《云南种录》

地方名 云南:吹风散。

功效 果实:在云南西北部作五味子用;藤、茎、根:用于预防流感。

## 7001091

*Schisandra propinqua* (Wall.) Baill. --- *Kadsura propinqua* (Wall.) Hook. f. et Thoms. var. *intermedia* A. C. Smith --- *K. propinqua* Wall.

植物名 合蕊五味子《高植图鉴补编》

药材名 黄龙藤《名实图考》、《汇编》

文献名 蒙自五味子《树分》,合蕊北五味子《经植手册》,中间型黄龙藤《云南药录》,五香藤、中间近缘五味子《云南中草药选》,中间五味子《中草药》,粗皮鸡血藤《品种论述》

地方名 五香血藤、小血藤(贵州、云南);四川:香巴戟(绵阳、蓬溪、成都),秤砣杆(绵阳),秤砣根、香叶子(成都、蓬溪),冷饭砣、冷饭团、糯碗豆(成都);贵州:五味藤(遵义);云南:五沙藤、血藤(曲靖),通气香,满山香(玉溪、红河),蛇毒药,拔毒散,铁骨散、倒钟树(红河),滑藤(红河、峨山),紫龙(泸西),大红袍(临沧、文山),小红袍,岩青叶(保山),鼓钉刺。

功效 果实:清热解毒,舒筋活血,消肿止痛。用于流感,毒蛇狂犬咬伤,风湿麻木,跌打损伤,月经不调,疮疖肿毒。

## 7001092

*Schisandra propinqua* (Wall.) Baill. var. *sinensis* Oliv.

植物名 铁箍散《高植图鉴》

药材名 铁箍散《汇编》

文献名 小血藤《草木便方》,钻骨风、八仙草(分类草药性),血糊藤《经植手册》,南五味子《鉴别手册》,中华五味子《中药志》,五香血藤《云南种录》

地方名 大血藤(湖北、陕西),土巴戟(四川、甘肃);陕西:天青地红(平利),野五味,红藤(紫阳);湖北:血藤,红钻岩金,钻岩筋(鹤峰),糯米叶子、内红消、爬山虎(巴东),血糊汤叶、血糊汤根、药葡萄(神农架);湖南:钻岩尖;四川:钻石风(巴县),〔香巴戟〕、〔鸡血藤〕(成都、西昌、重庆),冷饭砣,漩水碗,秤砣根,秤托子藤;云南:滑藤、爬岩香、满山香、香血藤(昆明),五香藤(玉溪),藤五香血藤,五味子。

功效 根、茎、藤:行气,止痛,活血,散瘀。用于风湿麻木,跌打损伤,胃痛,月经不调,血栓闭塞性脉管炎;叶:外用于疮疖,毒蛇咬伤,外伤出血。

## 7001093

*Schisandra pubescens* Hemsl. et Wils. --- *S. pubescens* Hemsl. var. *pubinervis* (Rehd. et Wils.) Smith --- *S. sphenanthera* var. *pubinervis* Rehd. et Wils.

植物名 毛叶五味子《中药志》

文献名 柔毛五味子《中国经植志》,毛北五味子、毛脉五味子《云南种录》,毛脉北五味子《峨眉药植研究》,毛五味子《中草药》

地方名 五味子(湖北、四川);湖北:北五味。

功效 果实:湖北、四川作五味子入药。

## 7001094

*Schisandra rubriflora* (Franch.) Rehd. et Wils. --- *S. grandiflora* var. *rubriflora* Rehd. et Wils.

植物名 红花五味子《中药志》

药材名 滇五味(汇编)

文献名 红花北五味子《药植简编》, 红血藤《中草药通讯》, 猩红五味子《云南种录》

地方名 云南: 五味子(丽江), (过山龙)(大理), 五香血藤。

功效 果实: 镇咳, 止汗; 茎藤: 活血, 祛风, 除湿。

#### 7001095

*Schisandra sphaerandra* Stapf

植物名 球蕊五味子《中药志》

药材名 五香藤《云南药录》

文献名 小叶兴山五味子《树分》, 华西北五味子《经植手册》

地方名 云南: 小血藤、滑藤、满山香(曲靖), 过山龙、山包谷(丽江), 五叶血藤, 小密细藤, 接筋藤, 黄袍, 萝松根; 西藏: 五味子, 山花椒。

功效 果实: 西藏作五味子代用品; 根、茎藤: 舒筋活络, 除湿止痛。

#### 7001096

*Schisandra sphaerandra* Stapf f. *pallida* A. C. Smith

植物名 白花球蕊五味子《西藏植志》

文献名 圆药五味子《汇编》, 淡色满山香《云南种录》

地方名 云南: 山包谷(禄劝); 西藏: 五味子, 山花椒, “达智”(藏名)。

功效 果实: 西藏作五味子入药。

#### 7001097

*Schisandra sphenanthera* Rehd. et Wils.

植物名 华中五味子《高植图鉴补编》

药材名 五味子《图经》、《药典》

文献名 [大血藤]《草木便方》, 活血藤《天宝本草》, 木瓜藤《树分》, 西北五味子、楔药北五味子《经植手册》, 西五味子《四川中药志》, 南五味子《药典》, 华中北五味子《峨眉药植研究》

地方名 山五味子(西北), 血藤(四川、云南), 北五味子(安徽、江西); 浙江: 红铃子、香苏、秋割(临安), 红皮子(云和), 牛奶藤(开化); 湖北: 秤杆麻(鹤峰); 湖南: 内风消, 小血藤, 岩枇杷, 糯饭它它, 野五味子藤; 广西: 老鼠葡萄(全州); 四川: 西五味, 川五味子, 紫金血藤(重庆); 贵州: 五香血藤, [北五味](湄潭); 云南: (络石藤)(富民、安宁), 吊吊香、满山香(思茅), 过山龙(丽江), 香石藤(昆明), 山苞谷。

功效 果实: 收敛固涩, 益气生津, 补肾宁心。用于久嗽虚喘, 梦遗滑精, 遗尿尿频, 久泻不止, 自汗, 盗汗, 津伤口渴, 短气脉虚, 内热消渴, 心悸失眠; 藤茎或根: 养血消瘀, 理气化湿。

#### 7001098

*Schisandra viridis* A. C. Smith

植物名 绿叶五味子《高植图鉴补编》

文献名 绿五味子《中药志》

地方名 湖南: 内风消, 小血藤, “叫阿姆”、“叫敢姆”(侗语); 广东: 风沙藤(乳源); 广西: 过山风。

功效 全株: 用于荨麻疹, 带状疱疹; 果实: 在湖南、安徽也作五味子入药。

### 7006 昆栏树科 Trochodendraceae

#### 7006001

*Trochodendron aralioides* Sieb. et Zucc.

植物名 昆栏树《中国植志》

药材名 昆栏树《台湾药植志》

地方名 台湾: 鸟麟, 山车, 云叶, 水柯子。

功效 树皮: 绀创膏原料。

### 7007 连香树科 Cercidiphyllaceae

#### 7007001

*Cercidiphyllum japonicum* Sieb. et Zucc. var. *sinense* Rehd. et Wils.

植物名 毛叶连香树《中国树木志》

药材名 连香树《中药大辞典》

文献名 银叶连香树《树分》, 山白果《高植图鉴》, 中华连香树《云南种录》

地方名 陕西: 五君树(宝鸡); 湖北: 野白果树、[白杨](神农架); 四川: 圆樗(峨眉)。

功效 果: 用于小儿惊风抽搐肢冷。

#### 7007002

*Cercidiphyllum japonicum* Sieb. et Zucc.

植物名 连香树《中国树木志》

药材名 连香树《浙江天目药志》

文献名 紫荆叶木《树分》, 日本连香树(拉汉种称)

地方名 浙江: 芭蕉香清(临安); 陕西: 五君树(宝鸡); 湖北: [白果], 野白果树、[白杨](神农架)。

功效 果: 用于小儿惊风抽搐肢冷。

### 7008 番荔枝科 Annonaceae

#### 7008001

*Annona cherimola* Mill.

植物名 毛叶番荔枝《中国植志》

文献名 耐冷番荔枝《台湾药植志》

功效 果肉: 用于溃疡发炎, 肿疮化脓。

#### 7008002

*Annona glabra* L.

植物名 圆滑番荔枝《中国植志》

药材名 牛心果(广西、广东)

文献名 滑叶番荔枝《广西药园药录》

功效 果实: 健脾胃; 叶: 用于慢性气管炎。

#### 7008003

*Annona muricata* L.

植物名 刺果番荔枝《中国植志》

文献名 刺番荔枝《台湾药植志》

地方名 海南: 红毛榴莲。

功效 根: 祛风活络, 止痛; 果实: 用于坏血病, 赤痢。

#### 7008004

*Annona reticulata* L.

植物名 牛心番荔枝《中国植志》

药材名 牛心梨《台湾药植志》

地方名 广西:牛心果(宁明)。

功效 根:用于热病,癫痫,惊风;叶:用于慢性气管炎;果实:健脾胃。

#### 7008005

*Annona squamosa* L.

植物名 番荔枝《名实图考》、《中国植志》

地方名 台湾:佛头果,释迦果,番梨;广东:〔林擒〕(潮州);广西:唛螺陀(南宁),洋波罗、蚂蚁果(龙州);贵州:土荔枝(梵净山)。

功效 根:用于痢疾,精神抑郁,脊髓病;叶:收敛解毒。用于小儿脱肛,恶疮肿痛;果实:健脾胃。

#### 7008006

*Artabotrys hexapetalus* (L. f.) Bhand. --- *A. uncinatus* (Lam.) Merr. --- *A. odoratissimus* R. Br. ex ker.

植物名 鹰爪花《广群芳谱》、《中国植志》

文献名 鹰爪《草木典》,鹰爪《中国植物学杂志》,鹰爪花《树分》

地方名 鹰爪兰(广东、海南);福建:五爪兰;其他:鹰爪桃,鸡爪兰,香花。

功效 根:用于疟疾;果实:外用于颈淋巴结核。

#### 7008007

*Artabotrys hongkongensis* Hance

植物名 香港鹰爪花《中国植志》

文献名 港鹰爪《中国植物学杂志》,香港鹰爪《海南植志》

地方名 广西:钩枝藤、野鹰爪藤(上思),铁钩藤(来宾)。

功效 全株:用于风湿骨痛;钩:用于狂犬咬伤。

#### 7008008

*Cananga odorata* (Lam.) Hook. f. et Thoms. --- *Canangium odoratum* Baill.

植物名 依兰《中国植志》

文献名 加拿楷《中国植物学杂志》,依兰香《热带植物研究》,夷兰《种称》。

地方名 台湾:花中花,香水树;云南:“锅棵剥版那”(傣语)。

功效 花:用于疟疾,头痛,眼炎,痛风,哮喘;叶:外用于癣。

#### 7008009

*Cananga odorata* (Lam.) Hook. f. et Thoms. var. *fruticosa* (Craib) J. Sincl.

植物名 小依兰《中国植志》

文献名 小夷兰《植分学报》

功效 花:用于疟疾,哮喘;叶:外用于癣。

#### 7008010

*Desmos chinensis* Lour. --- *D. cochinchinensis* auct. non Lour.

植物名 假鹰爪《中国植志》

药材名 鸡爪风《广西中草药》

文献名 酒饼叶、山橘叶《岭南采药录》,〔狗牙花〕《树分》,山指甲《中国植物学杂志》,鸡爪藤《中国经植志》

地方名 鸡爪枝、鸡爪香、假酒饼叶、假鹰爪兰、胜光子(广东、广西);广东:鸡脚趾(东莞、惠阳),鸡爪仔、鸡爪笼、鸡脚笼(惠来),鸡爪树(惠阳),鸡爪叶(高要),鸡爪果、爪芋根(英德),小酒饼叶(台山),小椰、叠碗树(惠阳、阳江),甜酒娘,假莺爪;海南:半夜兰,串珠,串珠酒饼叶,穿珠酒饼,酒饼藤,鸡脚笋;广西:披罗梢,碎骨王,碎骨黄,碎骨藤(藤县),宝塔子、酒饼叶根、鸡爪兰、鸡爪珠(南宁),鸡爪木(桂平、平南),鸡爪根(桂林),鸡肘风(玉林),鸡香木(大新),灯笼草(天等),灯笼花(北流),五爪虎、五爪龙(西林),双柱木(平南),黑节竹(梧州),复轮藤(武鸣),波蔗、朴蛇(龙州),鸡特梢(合浦),“都蝶”(壮语),白叶木。

功效 根及全株:祛风利湿,健脾理气,祛瘀止痛。用于风湿关节痛,产后风痛,产后腹痛、流血不止,痛经,胃痛,腹胀,消化不良,腹泻,肾炎水肿,跌打损伤。

备考 《海南植志》、《高植图鉴》等文献曾将学名误订为 *D. cochinchinensis* Lour.

#### 7008011

*Desmos dumosus* (Roxb.) Saff.

植物名 毛叶假鹰爪《中国植志》

文献名 云南山指甲《植分学报》

地方名 广西:灯笼木(天等),都蝶(隆安);云南:火神(河口)。

功效 根:用于风湿骨痛,疟疾;叶:用于疟疾,水肿,风疹,疥癣等。

#### 7008012

*Desmos grandifolius* (Finet et Gagnep.) C. Y. Wu et P. T. Li

植物名 大叶假鹰爪《中国植志》

地方名 广西:鸡爪风(百色)。

功效 全株:用于产后风痛。

#### 7008013

*Fissistigma bracteolatum* Chatter.

植物名 多苞瓜馥木《中国植志》

药材名 排骨灵《云南中草药选》

地方名 云南:〔瓜馥木〕,〔满山香〕。

功效 根皮:舒筋,活血,消炎,止血。用于跌打损伤,骨折,外伤出血。

#### 7008014

*Fissistigma cavaleriei* (Levl.) Rehd. --- *Uvaria cavaleriei* Levl.

植物名 独山瓜馥木《中国植志》

药材名 独山瓜馥木《贵州药录》

地方名 贵州:乌骨藤。

功效 根:活血通络,祛风除湿,强筋骨。用于风湿,跌打骨痛。

#### 7008015

*Fissistigma chloroneurum* (Hand. -Mazz.) Tsiang

植物名 阔叶瓜馥木《中国植志》

地方名 广西:牛奶藤(龙州),香藤。

功效 茎:用于跌打损伤。

#### 7008016

*Fissistigma glaucescens* (Hance) Merr.

植物名 白叶瓜馥木《中国植志》

药材名 乌骨藤《贵州民间药物》

文献名 白背瓜馥木《药植简编》

地方名 广东:古来风(南雄),确络风(粤北),山榄藤(佛冈),乌龟藤(始兴),鸡爪风(连山),大棕古狸峡(高要),大叶酒饼藤(怀集);广西:火索藤(金秀),牛耳枫(靖西)。

功效 根:祛风除湿,通经活血,止血。用于风湿骨痛,跌打损伤,月经不调,骨折,外伤出血。

**7008017**

*Fissistigma minuticalyx* (McGr. et W. W. Smith) Charr.

植物名 小萼瓜馥木《中国植志》

文献名 大通息香《新华本草纲要》

地方名 云南:黑皮跌打,大力丸、大霸王、过山王(思茅、西双版纳)。

备考 根与多花瓜馥木 *F. polyanthum* (Hook. f. et Thoms.) Merr. 混用。

**7008018**

*Fissistigma oldhamii* (Hemsl.) Merr.

植物名 瓜馥木《中国植志》

药材名 钻山风(江西、广西)

文献名 广香藤《名实图考》,毛瓜馥木《树分》

地方名 江西:铁牛钻石、香藤(吉水),狐狸桃(龙南);台湾:藤龙眼;湖南:狗舌风,黑风藤,“雪朋仲”(侗语);广东:山龙眼藤(梅县),狗夏茶(乐昌),飞扬藤(从化);广西:铁钻(灵川),降香藤、小香藤、香藤风、火索藤、笼藤(融水),古风子。

功效 根、藤:祛风活血,镇痛。用于坐骨神经痛,关节炎,跌打损伤。

**7008019**

*Fissistigma oldhamii* (Hemsl.) Merr. var. *longistipitatum* Tsiang

植物名 长柄瓜馥木《中国植志》

地方名 广西:酒饼果(防城)。

功效 根:用于风湿骨痛。

**7008020**

*Fissistigma polyanthum* (Hook. f. et Thoms.) Merr.

植物名 多花瓜馥木《植分学报》

药材名 黑风藤(广西)

文献名 拉公藤《汇编》

地方名 广东:拉藤公(怀集),酒饼子公(茂名);广西:牛耳风(南宁),牛利藤,石头子(昭平),石指酸藤(桂平、全州),石挠藤、拉公根、雷公根(金秀),槟榔木(博白),七蛇风(富川),通血香,酒饼藤(上思);贵州:乌骨藤;云南:黑皮跌打、通气香、大力王(思茅),野辣椒(河口),麻哈哈(富宁),“埋罕”(傣语)。

功效 根、藤:祛风湿,强筋骨,活血止痛。用于小儿麻痹后遗症,风湿性关节炎。

**7008021**

*Fissistigma retusum* (Levl.) Rehd.

植物名 凹叶瓜馥木《中国植志》

文献名 头序瓜馥木《植分学报》

地方名 广西:牛耳枫(隆林、靖西)。

功效 根、茎:用于小儿麻痹后遗症,风湿骨痛。

**7008022**

*Fissistigma uonicum* (Dunn) Merr.

植物名 香港瓜馥木《中国植志》

文献名 港瓜馥木《中国植物学杂志》

地方名 广东:打鼓藤(增城),山龙眼藤(梅县);广西:角洛子藤(上思),大酒饼子,大香藤,大酒饼叶(南宁)。

功效 茎:祛风除湿,消肿止痛。

**7008023**

*Goniorthalamus amuyon* (Blanco) Merr.

植物名 台湾哥纳香《中国植志》

功效 种子:用于腹胀痛。

**7008024**

*Goniorthalamus donnaiensis* Finet et Gagnep.

植物名 田方骨《中国植志》

地方名 广西:山芭蕉(防城)。

功效 茎:用于跌打损伤,骨折。

**7008025**

*Milusa chunii* W. T. Wang

植物名 野独活《中国植志》

文献名 细梗密榴木《中国植物学杂志》,密榴木《植物学名词审查本》,算盘子密榴木《广西植录》。

地方名 广西:木吊灯(宾阳),铁皮青(融安)。

功效 根:用于胃脘痛,肾虚腰痛。

**7008026**

*Milusa sinensis* Finet et Gagnep.

植物名 中华野独活《中国植志》

文献名 中华密榴木《植分学报》

地方名 广西:山黄皮(德保),野黄皮(凤山)。

功效 根:用于肾虚腰痛。

**7008027**

*Polyalthia nemoralis* A. DC. --- *P. oligogyna* Merr. et Chun

植物名 陵水暗罗《中国植志》

药材名 黑皮根(广州部队《中草药》)

地方名 广东:落坎薯。

功效 根:健脾益胃,补肾固精。用于慢性胃炎,食欲不振,四肢无力,遗精。

**7008028**

*Polyalthia plagioneura* Diels

植物名 斜脉暗罗《中国植志》

地方名 广东:厚皮林(阳春);广西:九层皮(融水),九重皮(大苗山)。

功效 树皮:用于腹痛,蛇咬伤。

**7008029**

*Polyalthia suberosa* (Roxb.) Thw.

植物名 暗罗《新华本草纲要》

地方名 海南:眉尾木,山观音,老人皮,鸡爪树。

功效 根:止痛,散结气。

**7008030***Uvaria calamistrata* Hance

植物名 刺果紫玉盘《中国植志》

地方名 海南:山香蕉(文昌),毛荔枝藤(临高);广西:细叶酒饼木(天等)。

功效 茎皮:收敛。

**7008031***Uvaria grandiflora* Roxb.

植物名 山椒子(广东高州)、《中国植志》

文献名 葡萄木《中国植物学杂志》

地方名 海南:川血乌,红肉梨(东方),山芭蕉罗(万宁),各路子藤(定安)。

功效 根:用于咽喉肿痛。

**7008032***Uvaria microcarpa* Champ. ex Benth. --- *Uvaria macrophylla* Roxb. var. *microcarpa* auct. non (Champ. ex Benth.) Finet et Gagnep.

植物名 紫玉盘《中国植志》

地方名 广东:油椎(广州),牛刀树(潮安、惠来、普宁),山梗子(乐昌),广肚叶(宝安),行蕉果(新会),乌囊藤、牛蒡子(湛江),缸瓮树(肇庆),焦藤(茂名);海南:牛头罗、牛刀老(文昌、澄迈、琼海),山芭豆(万宁),[草乌](澄迈);广西:酒饼婆(陆川),酒饼叶(南宁、北流),酒饼木(岑溪、北流、博白、防城),酒饼子、十八风藤(宁明),小十八风藤(桂平),石龙叶(梧州、苍梧),土枇杷、黄毛筠(梧州),牛奶果(防城)。

功效 根、叶:健胃行气,祛风止痛。用于风湿,跌打损伤,腰痛。

备考 有些文献将学名误订为 *U. macrophylla* Roxb. var. *microcarpa* (Champ. ex Benth.) Finet et Gagnep.**7008033***Uvaria tonkinensis* Finet et Gagnep.

植物名 扣匹(广西龙津)、《中国植志》

文献名 越南紫玉盘(广西植录),东京紫玉盘(植分学报)

地方名 海南:乌藤;广西:大叶藤(大新)。

功效 根、茎:用于尿路感染。

**7008034***Uvaria tonkinensis* Finet et Gagnep. var. *subglabra* Finet et Gagnep.

植物名 乌藤(海南)、《中国植志》

功效 根、茎:用于尿路感染。

**7008035***Xylopiavielana* Pierre

植物名 木瓣树《中国植志》

功效 茎皮:用于胃脘痛。

**7011 樟科 Lauraceae****7011001***Actinodaphne cupularis* (Hemsl.) Gamble

植物名 红果黄肉楠《中国植志》

文献名 红果楠《树分》

地方名 四川:红树(天全),山茶,铁桢楠;贵州:凉药(镇远),小楠木(正安),一把伞。

功效 根、叶:解毒消炎。用于烫火伤,脚癣,痔疮。

**7011002***Actinodaphne lecomtei* Allen --- *Actinodaphne reticulata* auct. non Meissn.

植物名 柳叶黄肉楠《中国植志》

文献名 黄肉楠《树分》

地方名 四川:山桂花、石桢楠(峨眉山)。

功效 根皮:祛风除湿,行气止痛,活血调经。

备考 《树分》(1937)将本种学名误订为 *A. reticulata* Meissn.**7011003***Actinodaphne obovata* (Nees) Blume

植物名 倒卵叶黄肉楠《中国植志》

药材名 七叶一把伞《云南中草药》

文献名 倒卵叶六驳《中药大辞典》

地方名 云南:假蕤衣叶(屏边),“莫苏”(屏边哈尼语),“把漂”(河口瑶语);西藏:“恰嘎兴”(墨脱门巴语)。

功效 树皮:舒筋活络,接骨。外用于骨折。

**7011004***Actinodaphne omeiensis* (Liou) Allen

植物名 峨眉黄肉楠《中国植志》

地方名 四川:石桢楠、长叶楠、山桂花(峨眉山)。

功效 根皮:祛风除湿,行气止痛,活血调经。

**7011005***Actinodaphne pilosa* (Lour.) Merr.

植物名 毛黄肉楠《中国植志》

药材名 香胶木《陆川本草》

地方名 茶胶树、刨花树、胶木(广东、广西);广东:香胶(湛江),刨花,毛樟(徐闻);广西:亚婆胶(陆川),山枇杷、瓢花木(龙州),刨花木、老人木(博白),牛耳胶(南宁),毛六驳,十字架(扶绥壮语)。

功效 树皮、叶:祛风,消肿,散瘀,解毒。用于跌打损伤;根:用于胃病,坐骨神经痛。

**7011006***Beilschmiedia brevipaniculata* Allen

植物名 短序琼楠《中国植志》

功效 叶:消炎消肿。用于跌打损伤。

**7011007***Beilschmiedia intermedia* Allen

植物名 琼楠《中国植志》

药材名 琼楠《广西药录》

文献名 二色琼楠《广西植录》

地方名 海南:荔枝公(东方);广西:番鬼榄(博白)。

功效 果实:消肿散结。用于跌打。

**7011008***Beilschmiedia tsangii* Merr.

植物名 网脉琼楠《中国植志》

文献名 怀德琼楠《海南植志》  
地方名 云南:牛奶奶果(威信)。  
功效 根、树皮:止血。用于刀伤出血。

## 7011009

*Cassytha filiformis* L.

植物名 无根藤《中国植志》

药材名 无根藤《汇编》

文献名 过天藤《生草药性备要》,无爷藤、流离网、黄鱼藤《岭南采药录》,蟠缠藤《台湾药植志》。

地方名 无爹藤、无娘藤(广东、广西),无头藤(广东、广西、福建),罗网藤(广东、福建);福建:山面线(厦门),豆马癩(福州),面下叶(泉州),打蛇珠;台湾:无根草;广东:淫藤(新会),胶藤、无叶草(肇庆),潺藤(新会、台山),潺藤仔、流一植(阳春),铁线藤、亚妈志(揭阳),打藤头(东莞),金丝藤、马尾丝(潮安),红沙(高明),白饭藤(普宁、惠来、饶平),白饭仔(饶平),白饭菜(普宁),亚婆沙(高要、高鹤),电藤(罗定、始兴),面线藤、妈人兰、兜精藤(潮阳),〔天仙藤〕;海南:无头草(那大),铁纸草(琼山),金结(临高);广西:无吊藤(北流),无地生根,无根小草(藤县),〔菟丝子〕(北流),飞天藤(平南),飞藤,雾水藤(苍梧、南宁),青雾水藤(藤县、梧州),青丝藤,蜈蚣藤,半天云(陆川),“丝尤”(忻城壮语),代法巧(龙州);云南:“嘿罕”(西双版纳傣语)。

功效 全草:有小毒。清热利湿,凉血止血。用于感冒发热,疟疾,急性黄疸型肝炎,咯血,尿血,泌尿系统结石,肾炎水肿,皮肤湿疹,多发性疖肿。

备考 本种寄生于马桑科马桑(*Coriaria sinica* Maxim.)、马钱科胡蔓藤(*Gelsemium elegans* Benth.)和豆科鱼藤(*Derris trifoliata* Lour.)上者有毒禁用。

## 7011010

*Cinnamomum appelianum* Schewe

植物名 毛桂《中国植志》

药材名 毛桂《广西药录》

文献名 毛樟《高植图鉴》

地方名 假桂皮(云南、广西),山桂枝(广西、四川);江西:土肉桂(大余);广西:山桂(苍梧、藤县),桂皮树,桂皮柱(资源),香桂子,山桂皮;四川:香沾树,三条筋(北碚);贵州:柴桂。

功效 树皮:用于腰膝冷痛,虚寒泄泻。

## 7011011

*Cinnamomum austro-yunnanense* H. W. Li

植物名 滇南桂《中国植志》

地方名 云南:野肉桂(河口)。

功效 树皮:散寒止痛。

## 7011012

*Cinnamomum austrosinense* H. T. Chang

植物名 华南桂《中国植志》

文献名 华南樟《中国植志》

地方名 江西:大叶辣樟树(遂川),大叶樟(龙南),野桂皮(安福),肉桂(大余)。

功效 树皮:散寒止痛。用于风湿骨痛,疥癣;果实:用于虚寒胃痛。

## 7011013

*Cinnamomum bejolghota* (Buch.-Ham.) Sweet --- *C. obtusifolium* (Roxb.) Nees

植物名 钝叶桂《中国植志》

药材名 大叶山桂《汇编》

文献名 钝叶樟《海南植志》

地方名 山桂(广东、云南);广东:山肉桂、山玉桂(茂名);海南:鸭母桂,鸭母楠,老母楠,香桂楠,奉楠,山桂楠;云南:假桂皮、土桂皮、土肉桂、柴桂、桂枝(红河),老母猪桂皮(马关),泡木(金平),青樟木(临沧),三条筋,胶桂(思茅),小粘香,小粘药,“梅宗英龙”(西双版纳傣语)。

功效 树皮:温中散寒,理气止痛,止血,接骨。用于胃寒疼痛,虚寒泄泻,风湿骨痛,腰肌劳伤,阳痿,闭经。外用于外伤出血,骨折,蛇咬伤。

## 7011014

*Cinnamomum bodinieri* Levl. --- *C. hupehanum* Gamble

植物名 猴樟《中国植志》

药材名 猴樟《贵州草药》

文献名 猴樟果《中药大辞典》

地方名 〔香樟〕(湖北、四川、贵州、云南、陕西、甘肃),〔樟树〕(湖北、陕西、甘肃);甘肃:〔樟木〕;湖北:牛筋条,牛荆树,大香桂子树;湖南:猴夹木(芷江);四川:香树(峨眉山),楠木(灌县);贵州:大胡椒树(兴义)。

功效 根皮、果实:驱风,行气,温中,镇痛。用于胃肠炎,风寒感冒,风湿麻木,劳伤疼痛,火烫伤。

## 7011015

*Cinnamomum burmannii* (C. G. & Th. Nees) Blume --- *C. chinense* Blume

植物名 阴香《中国植志》

药材名 阴香《岭南采药录》、《汇编》

文献名 坎香草、阴草《生草药性备要》,阴香叶、阴香皮、阴香根、山肉桂、山玉桂、香胶叶《岭南采药录》,广东桂皮《树分》,爪哇桂皮(楼《生药》),桂皮《中草药学》,胶桂《中药大辞典》

地方名 假玉桂、桂木(广东、广西),土肉桂(广东、广西、台湾),土桂枝、牛桂枝(广东、湖南),香桂(广东、海南、广西、湖南),山桂(广东、福建);福建:野桂(福州、松溪、政和、福安),土桂(福鼎、永春、明溪),柴桂(宁德),假肉桂(建瓯、长汀、南平);湖南:山桂枝;广东:土山肉桂(潮阳),大叶樟(茂名),假桂枝(湛江、从化、阳春、高州、化州等),假桂树,桂树,香胶子(阳江、阳春),潺桂(广州),老贼骨(兴宁),炳继树(惠东),月桂,鸭母桂,坎香,广桂油,广桂叶油;海南:“桂秧”(苗语),香柴(保亭),〔八角〕,野玉桂树,野桂树(儋县),野樟树(那大);广西:小桂皮,“中美谷”(上思壮语);云南:阿尼茶(玉溪),粘连树,香桂树,桂樟。

功效 树皮、根皮、叶、枝:祛风散寒,温中止痛。用于虚寒胃痛,腹泻,风湿关节痛。外用于跌打肿痛,疮疖肿毒,外伤出血。

## 7011016

*Cinnamomum burmannii* (C. G. & Th. Nees) Blume f.



heyneanum (Nees) H. W. Li --- *C. burmannii* (C. G. & Th. Nees) Blume var. *angustifolium* (Hemsl.) Allen

植物名 狭叶阴香《中国植志》

药材名 顺江木《云南中草药》

文献名 狭叶天竺桂《树分》

地方名 云南:羊桂香、三股筋、大舒筋活血(红河), 狭叶樟。

功效 树皮、根皮、叶、枝:祛风散寒,温中止痛。用于风湿骨痛,跌打损伤。

#### 7011017

*Cinnamomum camphora* (L.) Presl --- *C. camphora* (L.) Sieb. var. *nominale* Hayata ex Matsum & Hayata --- *C. camphora* (L.) Nees et Eberm. var. *glaucescens* (Braun) Meisn. --- *C. nominale* (Hayata) Hayata

植物名 樟《中国植志》

药材名 樟《本草拾遗》、《汇编》

文献名 豫樟《山海经》,彭候《搜神记》,樟木、樟材《本草拾遗》,樟木瘤节《圣惠方》,韶脑《神效方》,樟脑、潮脑《品汇精要》,脑子《本经逢原》,香樟树皮《玉局方》,樟树子、樟树叶、樟树皮、樟皮、樟梨《纲目拾遗》,樟公《花木考》,香樟、香樟根《分类草药性》,樟冰《新纲》,樟木皮《生草药手册》,香樟木、油脑、树脑《药材资料汇编》,樟树、洋冰《中药志》,台冰《中药大辞典》,桉油《药典》

地方名 油樟(江西、湖南、广东、广西、安徽),芳樟(湖南、贵州),乌樟(台湾、江西、湖南、四川),香樟树(江苏、浙江、四川),香樟子(贵州、云南),樟木子(广西、广东、云南),本樟(台湾、湖南),红樟木(湖南、广西),香蕊(广东、江西);浙江:樟树梨(冬季自落果);江西:樟角(铜鼓);福建:樟柴(福安),水里樟(福鼎、福安);台湾:桉樟,臭樟,山乌樟,山臭樟,花樟;湖南:猴樟木(凤凰),樟脑树,小叶樟;海南:樟子,樟木蔻(果);广西:樟扣(果),吹风散(木部),地风行(根),鸡骨香(根薯),樟木薯(北流),樟木叶(博白),山樟树(玉林、贵县),独足樟(柳江、梧州、忻城),瑶人柴(融水);四川:山沉香(重庆),甲沉香(烂船板),香叶树(德昌),香通、香木通、香通片(根)、[土沉香](重庆、蓬溪),樟木树(西昌),樟树根(蓬溪),“朶窝”(藏名),樟脑树根;贵州:大木姜子,走马胎(根)。

功效 根、木材、树皮、果实、叶:理气活血,祛风除湿,止痛;根、木材:用于感冒头痛,胃寒痛,风湿骨痛,跌打损伤,克山病;皮、叶:外用于慢性下肢溃疡,皮肤瘙痒,熏烟可驱杀蚊子;果:用于胃腹冷痛,食滞,腹胀,胃肠炎;脑:通窍,杀虫,止痛;挥发油:皮肤刺激药。用于神经痛。

#### 7011018

*Cinnamomum cassia* Presl --- *C. aromaticum* Nees

植物名 肉桂《中国植志》

药材名 肉桂《唐本草》、《药典》,桂枝《伤寒论》、《药典》,肉桂油《纲目拾遗》、《药典》

文献名 桂木《山海经》,梔、木桂《尔雅》,桂树《尔雅》郭璞注,菌桂、牡桂《本经》,桂、止唾《吴普本草》,

桂心、紫桂《药性论》,大桂、筒桂《唐本草》,官桂、板桂《图经》,辣桂《仁斋直指方》,柳桂《本草别说》,肉桂子、肉桂脂《百草镜》,桂丁、桂子《纲目拾遗》,桂丁香《上海炮制规范》,加新肉桂《中国植物图鉴》,桂皮油《药典》,企边桂、土桂楠、油桂、黄瑶桂、桂通、桂尔通、条桂、桂碎《药材学》,油肉桂、紫油桂、赤油桂、上肉桂、上油桂、上官桂、广肉桂、黄瑶肉桂、蒙自肉桂、绿水桂、川桂枝《常用中药名辨》,桂盅(果托)、桂芋(叶柄)《新华本草纲要》

地方名 福建:连桂;广东:桂魁皮,桂通碎,桂楠,桂衣碎,桂枝柴,西板桂,西企桂,油桂通,官桂树;广西:糠桂,山桂(龙州);四川:“贤察”(藏名);云南:玉桂,香官桂;其他:夹桂,春桂,秋桂,桂叶,小桂,桂枝头。

功效 树皮(肉桂):补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。用于阳痿,宫冷,腰膝冷痛,肾虚作喘,阳虚眩晕,目赤咽痛,心腹冷痛,虚寒吐泻,寒疝,奔豚,经闭,痛经;嫩枝(桂枝):发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸,奔豚;肉桂油:驱风,健胃;果托(桂盅)、叶柄(桂芋):用于胃痛。

#### 7011019

*Cinnamomum cassia* Blume var. *macrophyllum* Chu

植物名 大叶清化桂《中草药》

药材名 肉桂《中草药》

文献名 清化玉桂、越南肉桂、进口肉桂《中草药》

功效 树皮:补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。用于阳痿,宫冷,腰膝冷痛,肾虚作喘,阳虚眩晕,目赤咽痛,心腹冷痛,虚寒吐泻,寒疝,奔豚,经闭,痛经。

#### 7011020

*Cinnamomum glanduliferum* (Wall.) Nees

植物名 云南樟《中国植志》

药材名 臭樟《汇编》

地方名 香樟(四川、云南),樟树(云南、陕西);四川:白樟;云南:樟木、樟木果、樟木子(曲靖),樟木树(峨山),樟叶树(楚雄),樟脑树、香樟树(思茅、玉溪、峨山、曲靖、新平),香樟木(玉溪),果东樟(嵩明、富源、楚雄),大叶黑樟(昌宁),红樟,青皮树(滇中),冰片树(勐遮),“朋麻醒”、“埋松”(傣语);西藏:香叶树(察隅)。

功效 枝叶、果实、木材、树皮:祛风散寒,理气止痛。用于风湿骨痛,胃痛,胃肠炎,跌打损伤,感冒。

#### 7011021

*Cinnamomum iners* Reinw. ex Blume

植物名 大叶桂《中国植志》

地方名 云南:假桂皮,土肉桂,土桂皮、三股筋、顺江木、三股丝(文山)。

功效 树皮:温中散寒,消肿,止血,接骨。用于关节疼痛,感冒头痛,牙痛,胃痛,腹痛。外用于外伤出血,骨折。

#### 7011022

*Cinnamomum japonicum* Sieb. --- *C. pedunculatum* Nees --- *C. insularimontanum* Hayata --- *C. pseudoloureii*

Hayata --- *C. chekiangense* Nakai

植物名 天竺桂《中国植志》

药材名 天竺桂《海药本草》、《汇编》

文献名 桂皮《本草经集注》，山桂、月桂《纲目》，桂子《纲目拾遗》，天竺桂实《中国医学大辞典》，浙樟《中国经植志》，台湾肉桂《台湾中药材图鉴》，浙江樟《江西植志》，土桂皮《中药大辞典》，浙江桂《浙江药植志》

地方名 土肉桂(台湾、江西、湖南、安徽、云南)，山肉桂(福建、台湾、安徽)；浙江：大叶天竺桂，大叶香桂，竺香，桂香，昌桂(临安)；安徽：桂枝树，土桂枝，官桂；福建：野桂(闽东)，土桂，山玉桂，天竹桂；台湾：假肉桂，桂枝，海山肉桂，阿里参；湖南：山桂皮，野桂枝；广东：假桂树；贵州：香桂。

功效 树皮、果实：暖脾胃，散风寒，通血脉。用于腹冷胸满，呕吐噎膈，风湿痹痛，跌打瘀滞，血痢肠风。

#### 7011023

*Cinnamomum jensenianum* Hand. -Mazz.

植物名 野黄桂《中国植志》

文献名 稀花樟《中国植志》，景生樟《广西药录》，山玉桂《汇编》

地方名 桂皮树(江西、湖南)，三条筋树(湖北、四川)；广东：糖瓜木(英德)；广西：官桂皮(灌阳)，〔官桂〕(全州、灌阳、灵川)；贵州：香桂。

功效 树皮、嫩枝：暖脾胃，散风寒，通血脉。

#### 7011024

*Cinnamomum kwangtungense* Merr.

植物名 红辣槁树《中国植志》

文献名 广东樟《贵州药录》

地方名 广东：红叶辣汁树(从化)；贵州：香桂(毕节)。

功效 树皮：温经散寒，行气活血，止痛。

#### 7011025

*Cinnamomum longepaniculatum* (Gamble) N. Chao ex H. W. Li --- *C. inunctum* (Nees) Meissn. var. *longepaniculatum* Gamble --- *Cinnamomum inunctum* auct. non (Nees) Meissn.

植物名 油樟《中国植志》

文献名 雅樟《树分》

地方名 四川：香叶子树，樟树(雅安)，〔香樟〕，〔黄葛树〕，樟木。

功效 树干、枝叶：含芳香油可供药用。

备考 《树分》(1937)、《高植图鉴》(1972)学名误订为 *C. inunctum* (Nees) Meissn.

#### 7011026

*Cinnamomum mairei* Levl. --- *C. argenteum* Gamble

植物名 银叶桂《中国植志》

药材名 川桂《汇编》

文献名 银叶樟《树分》，桂皮树《经植手册》，川桂皮《中国经植志》

地方名 四川：官桂，桂皮，关桂(平武)，樟桂、香官桂(峨眉山)；其他：冠桂。

功效 树皮：温经散寒，行气活血，止痛。用于感

冒风寒，胃腹冷痛，痛经，风湿关节痛。外用于跌打损伤，骨折。

#### 7011027

*Cinnamomum micranthum* (Hayata) Hayata *C. kanabirai* Hayata

植物名 沉水樟《中国植志》

文献名 有樟《植物名汇》，牛樟《台湾药植志》

地方名 江西：黄樟树；广东：水樟、臭樟(始兴)；

功效 樟油及樟脑：供药用。

#### 7011028

*Cinnamomum migao* H. W. Li

植物名 米橘《中国植志》

地方名 广西：“麻告”(富宁壮语)，大果樟(天峨)

功效 果实：消积。用于腹痛。

#### 7011029

*Cinnamomum mollifolium* H. W. Li

植物名 毛叶樟《中国植志》

地方名 云南：“罗木米”、“中沙海”、“中俄”、“中朗俄”、“中朗”(西双版纳傣语)，香茅樟，毛叶芳樟。

功效 根、木材、树皮、果实、叶：理气活血，祛风除湿。

#### 7011030

*Cinnamomum osmophloeum* Kanehira

植物名 台湾上玉桂《树分》

文献名 土肉桂《中国植志》

地方名 台湾：土玉桂，假肉桂。

功效 树皮：用于腹痛，风湿痛，创伤出血。

#### 7011031

*Cinnamomum pauciflorum* Nees

植物名 少花桂《中国植志》

地方名 广西：土桂皮(融水)；四川：岩桂，香桂(筠连)，三条筋，三股筋，香叶子树，臭乌樟；贵州：臭樟。

功效 树皮、根：开胃，健脾。

#### 7011032

*Cinnamomum pittosporoides* Hand. -Mazz.

植物名 刀把木《中国植志》

文献名 假肉桂《云南经植》

地方名 云南：大果香樟(大姚)，桂皮树(屏边)。

备考 云南地区有以其树皮充桂皮用者。

#### 7011033

*Cinnamomum porrectum* (Roxb.) Kosterm. --- *C. parthenoxylum* (Jack) Nees

植物名 黄樟《中国植志》

药材名 黄樟《汇编》

地方名 〔樟木〕(江西、广东、云南)，〔香樟〕(云南、贵州、四川)；江西：猴樟(井冈山)，大叶樟(赣南)，油樟；广东：黑骨樟，浪樟；海南：海南香(琼中)，〔樟树〕，香湖，香喉，黄樟，山椒；广西：假樟(防城)，伏牛树(百色、上思)，牛睡树(那坡)，都苏(融水苗语)，瑶人柴；四川：香叶子树；贵州：野樟，臭樟木；云南：樟脑(曲靖)，樟脑树(勐海)，樟木树(红河)，臭樟(思茅)，蒲香树(龙陵)，“书期”、“诗匹”、“梅崇”、“朋麻醒”、“中折吐”、“中

亥”、“中火光”、“中广”、“中俄”、“中民”(傣名)。

功效 根或茎:温中散寒,消食化滞。用于胃肠炎,胃寒腹痛,消化不良,百日咳,痢疾,风湿性关节炎,疟疾,跌打损伤;果:解表退热。用于高热感冒,麻疹,百日咳,痢疾;叶:外用止血。

#### 7011034

*Cinnamomum septentrionale* Hand.-Mazz. --- *C. inunctum* (Nees) Meissn. var. *albosericeum* Gamble

植物名 银木《中国植志》

文献名 油樟《秦岭植志》

地方名 [香樟](陕西、四川);四川:香樟树、香棍子(天全),[土沉香](江北)。

功效 根:樟脑含量较高,可制取樟脑。

#### 7011035

*Cinnamomum subavenium* Miq. --- *C. randaiense* Hayata --- *C. chingii* Metc.

植物名 香桂《中国植志》

药材名 香桂皮《浙江药植志》

文献名 桂皮《本草经集注》,细叶香桂《中国经植志》,长果桂《浙江药植志》。

地方名 土肉桂(江西、福建);浙江:葛桂(临安),细叶月桂,香树皮,月桂,三条筋;安徽:细叶香樟;江西:香樟树(遂川);台湾:山肉桂,山芎舅;湖南:桂香子树,桂皮树,山桂枝,山椒子;云南:假桂皮(西畴)。

功效 树皮、枝皮、根及根皮:祛寒镇痛,行气健胃。用于风湿痹痛,创伤出血。

#### 7011036

*Cinnamomum tamala* (Buch.-Ham.) Nees et Eberm.

植物名 柴桂《中国植志》

药材名 柴桂(云南景东)

文献名 三条筋树《树分》,冠桂《药植简编》,川桂《汇编》,柴樟《中药大辞典》

地方名 桂皮(云南、四川、湖北),桂枝(陕西、西藏),[官桂](陕西、湖北、四川),三条筋(云南、陕西);四川:官桂皮,米桂,臭官桂(峨眉山);云南:三股筋(思茅、瑞丽),哈尼茶(玉溪),辣皮树(景东),[肉桂](潞西);西藏:“兴擦”(藏名)。

功效 树皮:温经散寒,行气活血,止痛。用于感冒风寒,胃腹冷痛,痛经,风湿关节痛。外用于跌打损伤,骨折。

#### 7011037

*Cinnamomum wilsonii* Gamble --- *C. wilsonii* Gamble var. *multiflorum* Gamble --- *Cinnamomum tamala* auct. non (Buch.-Ham.) Nees et Eberm.

植物名 川桂《中国植志》

药材名 川桂《汇编》

文献名 黄花川桂《树分》

地方名 三条筋(湖北、陕西),官桂(陕西、湖北、四川),柴桂(四川、云南、湖北);湖北:香桂树(神农架);广东:桂树;广西:官桂皮(兴安、临桂);四川:大叶香叶子树(宝兴),臭马桂(宜宾),臭樟、臭樟木(米易),香桂(茂县),桂皮树(巫山),板桂,筒桂,朴桂,桂皮;贵

州:野肉桂,乌药;云南:桂皮香,[肉桂](蒙自)。

功效 树皮:散风寒,止呕吐,除湿痹,通经脉。用于呕吐,噎膈,胸闷腹痛,筋骨痛,腰膝冷痛,跌打损伤。

备考 有的文献将学名误订为 *C. tamala* (Buch.-Ham.) Nees et Eberm.

#### 7011038

*Cinnamomum zeylanicum* Blume --- *Laurus cinnamomum* Roxb.

植物名 斯里兰卡肉桂《汇编》

药材名 斯里兰卡肉桂《汇编》

文献名 锡兰桂皮《药材学》,锡兰肉桂《中国植志》

功效 树皮内皮(肉桂):补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。用于阳痿,宫冷,腰膝冷痛,肾虚作喘,阳虚眩晕,目赤咽痛,心腹冷痛,虚寒吐泻,寒疝,奔豚,经闭,痛经。

#### 7011039

*Readaphne caudata* (Nees) H. W. Li --- *Lindera caudata* (Nees) Hook. f.

植物名 香面叶《中国植志》

药材名 香面叶《汇编》

文献名 毛叶三条筋、黄脉山胡椒《思茅中草药》,尾叶山胡椒、尾叶钓樟《广西植录》。

地方名 云南:香油果、香油树(新平),香叶(元江),毛香叶(富宁),细香叶(易武),白香叶、叶叶菜(屏边),朴香果,假桂皮(马关),三桠乌药(西畴),三股筋、栏干木、乳香树(腾冲),樟香树、狗骨头(龙陵),干茎树(文山),“黄腊”(河口哈尼语)。

功效 根、皮、叶:止血生肌,理气止痛。用于跌打损伤,外伤出血,胸痛,咳嗽。

#### 7011040

*Laurus nobilis* L.

植物名 月桂《中国植志》

药材名 月桂子《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 不时长《和汉药物》,老利儿《中国植物图鉴》,月桂树《中国经植志》,月桂实《国药的药理学》

地方名 上海:[肉桂],香桂;广西:山桂皮。

功效 果实:用于疥癣,解河豚鱼毒;月桂油:用于肿毒,肠疝痛,脱臼,挫伤,痛风等。

#### 7011041

*Lindera aggregata* (Sims) Kosterm. --- *L. strychnifolia* (Sieb. et Zucc.) F. - Vill.

植物名 乌药《中国植志》

药材名 乌药《本草拾遗》、《药典》,乌药子《证类本草》、《中药大辞典》

文献名 旁其《本草拾遗》,魑魃、矮樟、天台乌药《纲目》,旁箕茶[叶]《医林纂要》,研药、台麻、台乌、房花、比目沉香《新纲》

地方名 台乌药(浙江、广西),铜钱树(浙江、江西),铜钹树(浙江、山东),三条筋(安徽、河南),香叶子(浙江、湖南),香叶子树(江西、福建、湖南、广东、广西、四川),香叶树(河南、湖南),香桂樟(陕西、湖南、四川),细叶樟(江西、广东),千打锤(广东、广西),雷公树(湖

南、广东),白叶柴(陕西、湖南、广东、四川),糯米柴(西南),斑皮柴(浙江、湖北);陕西:米米叶(略阳),叫叫叶(南郑),三百棒(平利);甘肃:米粒子、背背叶(文县);浙江:撩头柴(临安),螃蟹柴(金华地区),铜钱柴(建德),铜钱柴根,香柴(平阳),乌药儿,王斑皮柴;安徽:独脚樟,油果柴,老来香;江西:旁皮卵(景德镇),白背树,鲫鱼姜,山樟(庐山),盐鱼子柴(莲花),青蛙树叶(婺源),蓝叶子、侧鱼樟(泰和);福建:子孙柴(邵武),钱柴头(福安),钱琪柴(宁德),钢铁叶(泰宁),鲫鱼柴(连城、宁化),鲫鱼礁、萝卜仔(三明),螃蟹蛋(福鼎),胖果子樵(宁化),哔哔柴(政和、松溪),进钱仔(同安),乒乓只(沙县),乌樟(福州),印子秋(明溪);河南:洗手叶;湖南:牛眼睛(郴县),牛眼睛树,牛眼睛(衡山),光十;广东:猫药(潮安、广州),金狗仔、剑挂树、白衣树根(乐昌),白叶子树(始兴),鲫鱼胆,老贼骨(河源、连平、紫金、兴宁),樟树树(湛江、阳江、阳春、茂名),千金树(五华),土玉桂(兴宁、紫金),台药(清远、高鹤、高要),田螺皮(兴宁),红毛树;海南:山二女(乐东);广西:樟拐(北海),鸡骨香(玉林),吹风散、上青下白(南宁),坡樟木(陆川);四川:铁滑子,胡椒子。

**功效** 块根:顺气止痛,温肾散寒。用于胸腹胀痛,气逆喘急,膀胱虚冷,遗尿尿频,疝气,痛经;果实:用于阴毒伤寒。

#### 7011041a

*Lindera aggregata* (Sims) Kosterm. var. *playfairii* (Hemsk.) H. P. Tsui --- *Lindera playfairii* (Hemsl.) Allen

**植物名** 小叶乌药《中国植志》

**文献名** 小叶钓樟《海南植志》,白叶子《中国经植志》

**地方名** 乌药、乌药公(广东、广西),香桂樟(湖南、四川);广东:小辣子,立椅辣子,细叶乌药,田螺皮,吊樟树,白叶籽,白叶柴。

**功效** 根:消肿止痛。用于跌打损伤。

#### 7011042

*Lindera angustifolia* Cheng

**植物名** 狭叶山胡椒《中国植志》

**药材名** 见风消《名实图考》、《汇编》

**文献名** 水牛筋《华北树木志》

**地方名** 雷公叶、雷公杆、雷公条、五雷消、见肿消、正见风消、细叶见风消(江西、湖南);江苏:樟木香,朴落飞(宜兴),小鸡条;安徽:山胡椒,油金条,黄叶落,香叶子树;江西:鸡婆子(赣南、上饶),炸死枫、冬不落(德兴);湖南:长叶见风消(衡阳);广西:状子木、赶狗樟、钻骨风(陆川)。

**功效** 根、茎、叶:祛风利湿,舒筋活络,解毒消肿。用于感冒,头痛,消化不良,胃肠炎,痢疾,风湿关节痛,麻木,跌打损伤,痈肿疮毒,荨麻疹,颈淋巴结结核。

#### 7011043

*Lindera chunii* Merr.

**植物名** 鼎湖钓樟《中国植志》

**药材名** 千打锤(广州部队《中草药》)

**地方名** [台乌]、假桂(广西、广东);广东:白胶木(信宜),耙齿钩、台乌球(鼎湖),天打锤(东莞、增城、番禺、五华等),千斤担(新会、台山);海南:山桂(儋县、海口、定安、屯昌),铁丝树(澄迈、琼海);广西:[乌药](苍梧、容县、北流、陆川、平南),耙齿木、牛梳木(平南),木香子。

**功效** 根:行气止痛,散瘀消积。用于跌打,风湿骨痛。

#### 7011044

*Lindera communis* Hemsl.

**植物名** 香叶树《中国植志》

**药材名** 香果脂《药典》,小粘叶《云南中草药选》

**文献名** 大香叶子树《植物名汇》,香叶樟《药植简编》,香果树《药典》。

**地方名** 香叶子(浙江、湖北);浙江:疗疮树(温岭);江西:千金树(遂川);福建:大香叶;湖北:香桂子(恩施),青林子(鹤峰),小麻油,水东瓜(神农架);广东:千斤树(惠阳、连平),千斤香(和平),[冬青树](惠阳),冷青子(梅县),大辣子,台乌子,山立椅;广西:香胶木(陆川),土冬青树(岑溪),一面光(柳州);四川:冷水丹(西昌),小白樟(会理),[楠木](灌县),白香桂,毛尖茶,铁化子,假细叶樟(盐边);贵州:野木姜子(梵净山);云南:小红果(文山、西畴),香果,香油果(西畴),大香果树(腾冲),臭樟,臭果树(金平、凤庆、澜西),臭果油树,臭油果、豆青香、拔疮药、红木姜、红果叶(红河),红果树(文山、双柏、蒙自、金平),红油果(思茅),红香籽油果(广南),亮叶香,亮叶子树(文山),[万年青](楚雄),山鸡椒,山八角树(元江),山八角树(思茅、景东),山胡椒、乌头树(景东),黄木姜子(金平),黄柴子,细叶假樟,狗屎香桂子,野青果,糯米树(砚山),罗汉香。

**功效** 叶、茎皮:散瘀消肿,止血止痛,解毒。用于骨折,跌打肿痛,外伤出血,疮疖肿痛;种子油脂:作栓剂基质。

#### 7011045

*Lindera erythrocarpa* Makino --- *L. thunbergii* Makino

**植物名** 红果山胡椒《中国植志》

**药材名** 詹糖香《别录》

**文献名** 铁钉木《本草新注》,红果钓樟《高植图鉴》

**功效** 枝叶:用于风水肿毒。

#### 7011046

*Lindera fragrans* Oliv.

**植物名** 香叶子《中国植志》

**药材名** 香叶子《贵州药录》

**文献名** 小叶香叶树《湖北植志》,香叶山胡椒《云南种录》

**地方名** 陕西:香樟叶(陕南);四川:[乌药](峨眉山)。

**功效** 树皮、枝、叶:温经通脉,行气散结。用于胃痛,胃溃疡,消化不良。

#### 7011047

*Lindera fruticosa* Hemsl. --- *Litsea fruticosa* (Hemsl.) Gamble

植物名 绿叶甘檀《中国植志》

文献名 灌木山胡椒《贵州药录》, 卵叶木姜子《西北油脂植物》

地方名 陕西: 黄花子(南郑); 浙江: 系系篾子(西天目山); 湖北: [官桂]、香叶树(鹤峰), 老鹰茶(利川); 广西: 矮香叶树; 贵州: 猪木姜(剑河)。

功效 果实: 用于腹痛, 消化不良。

#### 7011048

*Lindera glauca* (Sieb. et Zucc.) Blume

植物名 山胡椒《中国植志》

药材名 山胡椒《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 牛蒡条、见风消《分类草药性》, 野胡椒《名实图考》, 柽檀《植物名汇》, 木胡椒《指示植物》, 臭积柴、勾樟《中药大辞典》

地方名 牛筋树(河南、四川、山东、浙江), 诈死枫(江西、福建、湖北、广东), 假死柴(陕西、浙江、安徽、湖北、湖南、四川), 假死树(江西、河南), 雷公槁(湖北、湖南、四川、贵州), 雷公电(陕西、四川), 雷公树(陕西、湖南), 洗手叶(陕西、河南), 见肿消(湖南、广东), 大叶见风消(江西、湖南), 震天雷(湖南、贵州); 陕西: 铁箍散(镇坪、旬阳), 雷公树叶、黄渣叶(镇坪), 黄渣子(宁强), 牛筋条; 山东: 崂山棍(崂山), 山姜(昆俞山), 山姜辣(海阳); 江苏: 水平条(新海连), 羊耳朵(宜兴); 浙江: 山花椒、山龙苍(临安), 七方柴(龙泉、云和), 吃风柴, 黄叶郎(天台、临海), 黄泥罗, 黄落壳; 安徽: 刺牛精, 香叶子, 香筋条, 油金树, 油金条, 红叶柴, 红叶果子, 红果棵子, 黄叶树, 黄金柞, 牛拴条, 胡椒树; 江西: 榨子枫(铜鼓、吉水、景德), 楂子红(九江、赣南), 枯死柴, 白叶枫(南丰), 白叶子树, 老来红(景德), 冬不落叶(德兴), 红叶槎、花叶槎(庐山), 臭樟子(信丰); 福建: 狗古柴(明溪), 灶积枫(清流), 臭橘子, 臭籽, 六月干; 湖北: 狗骨头, 狗骨头叶, 狗骨头树, 狗骨头树子, 狗骨子, 油金槁(兴山), 木姜子, 铁骨伞; 湖南: 见毒消(衡山), 见风消子, 败毒消, 川姜, 雷公叶, 雷公树子, 雷公钩, 雷公母, 黄腊条, 伪死柴, 油金柚, 尿桶板, 山胡椒子, [黑胡椒]; 广东: 死不落叶, 假死枫(惠阳), 不知春(梅县); 广西: 假干柴、舜树(桂林), 见风干, 鸡米风, “都药肉”(融水苗语), “美棵略”(三江侗语), “哉高姑颠”(金秀瑶语); 四川: 牛筋条根、黄杠宝(南川), 雷公子, 雷公尖; 贵州: 雷公炸(瓮安), 雷风木(镇远), 照乌子(铜仁)。

功效 根、叶、果: 祛风活络, 解毒消肿, 止血止痛; 根: 用于风湿麻木, 筋骨疼痛, 跌打损伤, 脾肿大, 虚寒胃痛, 肾炎水肿, 风寒头痛; 叶: 外用于外伤出血, 疔疮肿毒, 毒蛇咬伤, 全身发痒; 果: 用于中风不语, 心腹冷痛。

#### 7011049

*Lindera megaphylla* Hemsl. --- *L. oldhami* Hemsl.

植物名 黑壳楠《中国植志》

地方名 [楠木](陕西、湖北、四川), 八角香、红心楠树(湖北、四川); 湖北: 大楠木, 枇杷楠, 鸡屎楠, 猪屎楠(兴山); 四川: 花兰; 贵州: 岩柴(黎平)。

功效 根、枝、树皮: 驱风除湿, 消肿止痛。用于咽喉肿痛, 风湿麻木疼痛。

#### 7011050

*Lindera metcalfiana* Allen var. *dictyophylla* (Allen) H. P. Tsui --- *L. dictyophylla* Allen

植物名 网叶山胡椒《中国植志》

文献名 网脉山胡椒、网脉钓樟《广西植录》

地方名 云南: 山香果、化楠木(腾冲), 连杆果(芒市), [台乌], 吹叶树。

功效 果实: 暖腰膝。用于血吸虫病。

#### 7011051

*Lindera obtusiloba* Blume --- *L. cercidifolia* Hemsl.

植物名 三桠乌药《中国植志》

药材名 三钻七《汇编》

文献名 [郁金花]、黄梅木《满蒙野卉》, 红叶甘檀《树分》, 三桠钓樟《东北木本图志》, 桂子树《中国树木志略》, 紫荆叶钓樟《甘肃经植》, 香叶子《高植图鉴》

地方名 陕西: [山胡椒], 山辣子(紫阳), 三钻风, 升子树叶, 甘檀树(渭南); 甘肃: [官桂](文县); 山东: 崂山棍(青岛), 假崂山棍(崂山、牙山), [山姜](昆俞山), 山棉花(五莲), 檀军; 江苏: 生姜树(连云港); 浙江: 绿绿柴, 矮脚枫(临安); 河南: 香丽木, 猴楸树, 甘檀; 湖北: 木姜子(恩施), 鸭脚板、铜钱巴(神农架); 四川: 三角枫, 大山胡椒。

功效 树皮、叶: 活血舒筋, 散瘀消肿。用于跌打损伤, 瘀血肿痛, 疮毒。

#### 7011052

*Lindera obtusiloba* Blume var. *heterophylla* (Mei-ssn.) H. P. Tsui

植物名 滇藏钓樟《中国植志》

功效 树皮: 活血舒筋, 散瘀消肿。用于跌打损伤, 瘀血肿痛。

#### 7011053

*Lindera obtusiloba* Blume f. *villosa* (Blume) Kitag. --- *L. obtusiloba* Blume var. *villosa* Blume --- *Benzoin obtusilobum* (Blume) O. Kuntze f. *villosum* (Blume) Nakai

植物名 毛叶三桠钓樟《东北药用植物》

地方名 辽宁: 山辣姜、迎山黄(庄河), 南姜(旅顺), 芦桂(金县); 其他: 黄梅木、横白木(朝鲜)。

功效 树皮: 舒筋活血, 散瘀消肿。用于跌打损伤, 瘀血肿痛。

备考 朝鲜汉药以树皮作“乌药”的代用品, 用于气郁性消化不良, 头痛, 脚气。

#### 7011054

*Lindera prattii* Gamble

植物名 峨眉钓樟《高植图鉴补编》

药材名 峨眉钓樟《贵州药录》

文献名 峨眉山胡椒《拉汉英种称》

地方名 贵州: 台乌。

功效 枝、果: 理气止痛, 杀虫, 除湿。用于风寒头痛, 胃痛, 血吸虫病; 根: 用于早期尿结石。

## 7011055

*Lindera pulcherrima* (Wall.) Benth. var. *attenuata* Allen

植物名 香粉叶《中国植志》

文献名 尾叶美丽山胡椒《广西植志》, 尾叶美丽钓樟《药植简编》, 大叶香叶树《湖北植志》

地方名 湖南: 香叶, 香叶树, 山叶树, 乌药苗; 广西: 三条筋(资源、全州), 假桂皮(资源), 尖叶樟; 贵州: 桂香叶, 豆奶根。

功效 树皮: 清凉, 消食。用于腹痛。

## 7011056

*Lindera pulcherrima* (Wall.) Benth. var. *hemsleyana*

(Diels) H. P. Tsui --- *L. strychnifolia* (Sieb. et Zucc.)

F. - Vill. var. *hemsleyana* Diels --- *L. hemsleyana* (Diels) Allen

植物名 川钓樟《中国植志》

文献名 长叶乌药《高植图鉴》, 峨眉山胡椒《广西植志》, 湄潭台乌《贵州药录》

地方名 香叶(湖南、贵州), 三条筋(四川、贵州), [乌药](云南、贵州); 湖南: 香叶树, 山叶树, 乌药苗; 广西: 假桂皮, 尖叶樟; 四川: 香叶子(宝兴), 香桂子, 关桂, 铁健子, 响亮楠, 皮香树; 贵州: [台乌](湄潭), 白背叶(惠水), 三根筋(榕江), 糯叶(贵阳); 云南: 山香桂、[官桂](镇雄); 其他: [山豆根]。

功效 根: 止血, 生肌, 排石, 顺气宽中。

## 7011057

*Lindera reflexa* Hemsl.

植物名 山樫《中国植志》

药材名 山樫根《中药大辞典》

文献名 野樟树《名实图考》

地方名 钓樟(江西、浙江、湖北), 山姜树(湖南、广西), 大叶山樫(浙江、湖南); 浙江: 副山苍(临安), 米珠, 甘樫, 大叶钓樟; 安徽: 生姜树; 江西: 木姜子, 铁脚樟; 湖南: 山麝香, 山胡椒, 猴红树, [隔山香], 野山椒, 观音香, 鬼浆树, 矮脚樟, 过气樟, [豹皮樟], 大樟叶, 香叶子, 辣樫子; 广西: 矮姜树(富川), [山姜]; 贵州: 猪木姜。

功效 根或根皮: 止血消肿, 行气止痛。用于癰疔, 过敏性皮炎, 胃痛, 刀伤出血。

## 7011058

*Lindera serchuenensis* Gamble

植物名 四川山胡椒《中国植志》

药材名 石桫楠根《中药大辞典》

文献名 石桫楠(树分), 四川钓樟《中药大辞典》

地方名 四川: 兰花树、百兆金(天全), 木碗子、川钓樟(峨眉山)。

功效 根: 外用于疮毒。

## 7011059

*Lindera thomsonii* Allen --- *L. gamblena* Allen

植物名 三股筋香《中国植志》

药材名 臭油果《云南药录》

地方名 云南: 三股筋, 大香果(腾冲), 香桂子、白香叶、野香油果(西畴), 桂皮皮哈”(元江哈尼语), “郎白

达松洗”(贡山独龙语)。

功效 树皮、枝、叶、果: 祛风散寒, 接筋接骨。用于风寒感冒, 胃腹寒痛。外用于骨折; 果油: 用于蚊虫叮咬。

## 7011060

*Lindera tonkinensis* Lec.

植物名 假桂钓樟《中国植志》

文献名 河内钓樟《海南植志》

地方名 广西: 假桂(防城)。

功效 树皮、叶: 祛瘀活血, 散寒止痛。

## 7011061

*Lindera umbellata* Thunb.

植物名 大叶钓樟《高植图鉴》

药材名 钓樟根皮《别录》、《中药大辞典》, 枕材《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 豫樟《山海经》, 桢《尔雅》, 枕木《史记正义》, 乌樟《中国经植志》, 干樫木《华北经植志要》, 绿叶甘樫、小叶甘樫《经植手册》。

地方名 甘肃: [官桂](文县); 宁夏: 土官桂(六盘山); 山东: 山辣木、山姜(昆俞山); 湖北: 丁丁王(黄兴山); 湖南: 光狗棍(根皮)、野樟树(衡山)。

功效 根、根皮: 用于奔豚, 脚气, 水肿, 疥癣, 创伤出血; 木材(枕材): 用于咳嗽痰饮, 积聚胀满。

7011062 见 7011041a

## 7011063

*Litsea auriculata* Chien et Cheng

植物名 天目木姜子《中国植志》

药材名 天目木樫子《浙江天目药志》

地方名 浙江: 芭蕉杨(临安)。

功效 果实、根皮: 用于缘虫病; 叶: 外用于筋骨损伤。

## 7011064

*Litsea coreana* Levl. var. *sinensis* (Allen) Yang et P. H.

Huang --- *Actinodaphne lancifolia* (Sieb. et Zucc.)

Meissn. var. *sinensis* Allen

植物名 豹皮樟《中国植志》

文献名 豺皮樟《浙江天目药志》, 扬子黄肉楠《高植图鉴》, 扬子木姜子《浙江药植志》, 白柴、香叶子、过山香、山肉桂《中药大辞典》

地方名 浙江: 剥皮枫、花壳柴(临安)。

功效 树皮: 用于胃脘胀痛; 根: 用于水肿。

## 7011065

*Litsea cubeba* (Lour.) Pers.

植物名 山鸡椒《中国植志》

药材名 澄茄子《四川中药志》

文献名 山胡椒《滇南本草》, 味辣子《分类草药性》, 山番椒、山苍树、乾果树、香叶、赛樟树、半澄茄、沉茄《中国药植志》, 山鸡眼《科种》, 山苍子《汇编》, 革澄茄《药典》

地方名 山苍子树、唱仔木、(满山香)、赶狗樟、洞皮撞(广东、广西), 山姜子(广东、广西、湖南、福建), 木姜子(广东、广西、江西、四川), 豆豉姜(根)(广东、广西、

湖南), 澄茄(浙江、江西、安徽、云南), 野胡椒(广西、云南), 过山香(江西、湖南、广东、云南), 香树子(浙江、安徽), 香叶子(湖南、安徽), 山樟(福建、广东、广西); 陕西: 山鸡树; 浙江: 山豆樟(乐清), 山椒叶(临海), 山金椒、山苍柴、鸡粪柴(泰顺), 山乌樟、乌樟树、典樟(平阳), 黄柏连(余姚), 白金剪(温州), 香柴(诸暨), 香柴子, 香落叶(天台), 香高柴(衢县), 香粉树籽; 江西: [广木香], 香叶树(庐山), 香桂香叶, 山汤籽; 福建: 臭枳柴(闽清、宁德、大田), 臭樟子(同安、南平、古田、清流、宁化), 臭籽(大田), 臭柴、臭子柴、臭子叶、臭枳樟、山川臭(闽东), 臭油脂树, 姜姆柴(清流), 小叶樟(明溪), 小叶山苍子、苍子(大田), 苍子因(三明), 洋苍子(永安), 乌樟子(厦门), [金不换] 串乱子, 岩树, 勾樟, 有樟子(建阳、建瓯), 理气柴(宁德); 湖南: 辣姜子、郎子树、香叶子柴(衡山), 香山子(衡阳), 山椒子, 歪歪子树; 广东: 椒花, 山汤树(五华、高要、高鹤、紫金), 山花子, 山柳根, 山香根(潮安、潮阳), 山辣(潮阳), 苍子树(广宁), 枪子, 枪子树(肇庆), 枪子蕊(根), 蚊姜树, 乌皮樟, 白救主、广九樟(湛江), 辣姜叶(罗定), 辣鼻子, 辣樟、风樟(增城、东莞), 满山李, 满山桂(花县), 铁将军、臭凤茅(阳春), 野樟, 串干树, 千里香; 海南: 姜树(琼海), 金狗子, 金猴树; 广西: 土澄茄, 鸡骨香、[青皮](龙州), 木樟子(凤山), 木姜(田阳), 笋果藤(藤县), 白风樟、细叶樟(玉林), 细叶豆豉姜、小叶豆豉姜(隆林), 小木姜(乐业), 樟姜(德保), 樟平木(北流), 山樟树(来宾), 臭姜、党子木(苍梧), 苍子木, 姜蕰子, 粉果木(岑溪、藤县), 生汤根(贵县), [乌药]、末药(桂平), 牛鞭药, “美教芩”(壮语); 四川: 滑树叶(重庆), 青檀树; 云南: 木香子(镇源、思茅、耿马), 大筑子皮(思茅), 青皮树(耿马), “沙海藤”(思茅、西双版纳傣语), “雪白”(傣语), 臭油果树。

**功效** 果实: 温中散寒, 行气止痛。用于胃寒呕逆, 脘腹冷痛, 寒疝腹痛, 寒湿, 小便混浊; 根: 用于风湿骨痛, 四肢麻木, 腰腿痛, 跌打损伤, 感冒头痛, 胃痛; 叶: 外用于痈疽肿痛等。

**备考** 我国古本草“革澄茄”为进口的胡椒科 *Piper cubeba* L. 之果实。近代国内多用本种果实充之。二者化学成分不同, 故改称“澄茄子”, 以有别于古本草进口之“革澄茄”。

## 7011066

*Litsea euosma* W. W. Sm.

**植物名** 清香木姜子《中国植志》

**地方名** 湖南: [毕澄茄]; 广东: [鸡骨香](阳山、英德、清远), 大力王(连县、曲江); 广西: 驱蚊树, 水苍, 水苍树, 大豆豉姜(隆林); 四川: 木姜子[根], 山苍子, 澄茄子; 贵州: 木椒子(兴义); 云南: 山胡椒(龙陵), 大姜子果(金平), “毛梅桑”(沙族语)。

**功效** 果实: 祛风行气, 健脾利湿。用于胃寒痛, 呕吐, 痧症。

## 7011067

*Litsea glutinosa* (Lour.) C. B. Rob.

**植物名** 潺槁树《高植图鉴》

**药材名** 潺槁树《岭南采药录》、《汇编》

**文献名** 残槁强《岭南采药录》, 潺槁木姜子《中国植志》, 潺槁木姜《海南植志》

**地方名** 潺树、山胶木(广东、广西); 福建: 春龟树(晋江、龙溪地区); 广东: 山槁子(广州), 潺槁木, 羊古树(陆丰、惠来、普宁); 海南: 油槁树, 胶槁, 青野槁, 山狗羊, 三苦花(儋县、琼中、乐东), 春金(定安、屯昌); 广西: 青胶木、羞古羊(北海), 香胶木(北海、平南、龙州), 山槁树, 野槁木(博白), 青桐胶(容县), 大疳根(平南), [牛耳枫](柳江), 山加龙(天等), [楠木]、厚皮楠(南宁), “美大喊”(大新壮语), “枯南考”(武鸣壮语), “革容”(都安瑶语); 云南: “埋米望”(西双版纳傣语), 大香樟(孟腊), 香皮树(云县), 树杜仲、树仲、牛膀皮(施甸), 粘香树(路西), 豆腐渣(临沧), 瑞丽杜仲(瑞丽)。

**功效** 树皮、叶、根: 清湿热, 消肿毒, 止血, 止痛; 叶、茎皮: 外用于腮腺炎, 疮疖痈肿, 乳腺炎初起, 跌打损伤, 外伤出血; 根: 用于腹泻, 跌打损伤, 腮腺炎, 糖尿病。

## 7011068

*Litsea glutinosa* (Lour.) C. B. Rob. var. *brideliifolia* (Hayata) Merr.

**植物名** 白野槁树《中国植志》

**地方名** 广东: 厚叶樟(徐闻); 海南: 野槁树, 圆尾槁(澄迈), 青榔槁木(那大)。

**功效** 树皮、根皮: 清湿热, 消肿毒。用于恶疮。

## 7011069

*Litsea hupehana* Hemsl.

**植物名** 湖北木姜子《中国植志》

**文献名** 鄂木姜子《峨眉药植研究》

**地方名** 四川: 白春茶、老鹰茶(峨眉山)。

**功效** 叶: 止泻痢。

## 7011070

*Litsea ichangensis* Gamble

**植物名** 宜昌木姜子《中国植志》

**药材名** 小木姜子(贵阳)

**地方名** 湖北: 狗姜子树(宜恩), 野胡椒子树(神农架)。

**功效** 果、根: 理气健脾, 解毒燥湿。用于消化不良, 胸腹胀痛, 水泻, 发痧。

## 7011071

*Litsea mollis* Hemsl. --- *L. mollifolia* Chun

**植物名** 毛叶木姜子《中国植志》

**地方名** 山胡椒(四川、湖北); 湖北: 木姜子, 山苍子, 野木姜子, [毕澄茄], [澄茄子], 狗胡椒, 香桂子, 打姜子(神农架); 广西: 山姜子(龙州); 四川: 猴香子, 木香子; 云南: 大木姜(彝良)。

**功效** 根: 祛风消肿。用于跌打损伤; 果实: 去湿毒。

## 7011072

*Litsea monopetala* (Roxb.) Pers

**植物名** 假柿木姜子《中国植志》

**文献名** 假柿木姜《海南植志》, 柿叶木姜《广西植

录)

地方名 广东:假沙梨(琶江),假柿树(广州);海南:纳橘,母猪橘(尖峰岭、吊罗山),山菠萝树、山口羊(澄迈);广西:接口木(南宁、凌云);云南:毛腊树(泸水),毛黄木、水冬瓜、木姜子(河口),葫芦木(屏边),大叶楠木(龙陵)。

功效 叶:外用于骨折,脱臼。

7011073

*Litsea moupinensis* Lec. var. *szzechuanica* (Allen) Yang et P. H. Huang

植物名 四川木姜子《中国植志》

地方名 四川:[毕澄茄], [澄茄子]。

备考 果实:四川民间混作毕澄茄入药。

7011074

*Litsea populifolia* (Hemsl.) Gamble

植物名 杨叶木姜子《中国植志》

文献名 圆叶木姜子、猴香子、马木姜子《中国经植志》

地方名 老鸦皮(四川、云南);四川:[澄茄子](峨眉山);云南:老鸦皮米米,木香子。

功效 根:温中散寒,止痛,降气,消食止呕。

7011075

*Litsea pungens* Hemsl.

植物名 木姜子《中国植志》

药材名 木姜子《贵州民间药物》,木椒根《贵州草药》

文献名 木江籽《中国经植志》,湘木姜《药植简编》,马木姜《中国油脂植物手册》,木姜子叶、木姜子茎、滑叶树《中药大辞典》

地方名 山胡椒(四川、湖南、浙江),辣姜子(陕西、甘肃);陕西:黄花儿(南郑、宁强);甘肃:白达木(武都);湖北:木樟子,狗姜子(神农架);湖南:山姜子(新宁、凤凰、麻阳),山椒;四川:木香子,猴香子, [澄茄子],兰香树,生姜树,木姜子根;贵州:腊梅柴(安龙),山苍子(黔南);云南:香桂子。

功效 果实、叶:祛风行气,健脾利湿。用于胸腹胀痛,消化不良,腹泻,中暑吐泻。外用于疮疡肿毒;茎:用于小儿腹胀;根:祛风散寒,温中理气。用于胃脘冷痛,风湿关节疼痛。

7011076

*Litsea rotundifolia* Hemsl.

植物名 圆叶豺皮樟《中国植志》

文献名 圆叶豺皮樟(拉汉英种称)

功效 根:用于风湿骨痛。

7011077

*Litsea rotundifolia* Hemsl. var. *oblongifolia* (Nees) Allen  
--- *L. chinensis* Blume --- *Actinodaphne chinensis* Nees

植物名 豺皮樟《中国植志》

药材名 豺皮樟(泉州本草)

文献名 海南豺皮樟、椭圆叶豺皮木姜《海南植志》,豺皮黄肉楠《高植图鉴》,圆叶木姜子《台湾植志》

地方名 白柴、香叶子(四川、福建);浙江:山胡椒;

福建:过山香、山肉桂(厦门、泉州),山荔枝, [天竺桂](泉州);广东:白叶仔,白背稔(惠阳),白勒仔树、山龙眼(广州、惠阳),山百历(普宁、潮安、兴宁),山熊胆(梅县),山象皮(肇庆),白稔子、泥稔(从化、增城),大灰木(广州),咸鱼头(台山),清香剑、 [十大功劳](新会),香勒,香勒菜(古井),老贼骨(和平),贼佬骨(清远),贼老药,野莲子(乐昌),牛乳子树(五华、始兴),历子(惠来、普宁), [土木香],硬钉树,假面果,嗜嗜木。

功效 根:祛风除湿,行气止痛,活血通经。用于风湿性关节炎,腰腿痛,跌打损伤,痛经,胃痛,腹泻,水肿。

7011078

*Litsea rubescens* Lec.

植物名 红叶木姜子《中国植志》

文献名 野春桂《名实图考》,红脉木姜子《汇编》,樟树果、樟树根《中药大辞典》

地方名 山胡椒(四川、云南);四川:木姜子、红木姜子(西昌),木吴莫(德昌),野气辣子、大山胡椒(万源),野木姜(忠县);云南:獐獐果,油渣枝(会泽),油榨条、鸡油果(嵩明),青皮树(富宁),木姜树(屏边),泡香树、山茴香(保山),山苍子(临沧),假山胡椒(玉溪),叶上花(武定),辣姜子(腾冲),老母猪山胡椒(凤庆),马木姜子(禄劝),“摸里”(贡山独龙族);西藏:[樟树],“兴噶卜尔”(藏语)。

功效 果实:祛风散寒,消食化滞。用于肠胃炎,胃寒腹痛,食滞,腹胀;根:用于风湿骨痛,跌打损伤,感冒头痛。

7011079

*Litsea sericea* (Nees) Hook. f.

植物名 绢毛木姜子《中国植志》

文献名 绢丝楠《树分》

地方名 木姜子(甘肃、云南);云南:[毕澄茄],山胡椒,土桂枝。

功效 果实:利尿,防腐,祛痰,驱风,健胃。

7011080

*Litsea veitchiana* Gamble --- *L. chenii* Liou

植物名 钝叶木姜子《中国植志》

文献名 木香木姜子《高植图鉴》

地方名 四川:木香子,木姜子(成都、重庆、绵阳、峨眉山), [澄茄子](绵阳、成都、峨眉山),滑树叶、山胡椒(重庆), [山苍子]。

功效 果实:祛风行气,健脾利湿。

7011081

*Litsea verticillata* Hance

植物名 轮叶木姜子《中国植志》

药材名 过山风《广东中草药》

文献名 槁木姜《海南植志》

地方名 牛拉力、跌打佬(广东、广西);广东:槁树,假五加,英雄剑(粤北),五指青、铁打王(惠阳),红番鹅树;海南:槁姜;广西:大五托、川掌莲(苍梧),山七托、五叉虎(平南)。

功效 根、叶、树皮:祛风通经,活血消肿,止痛。



用于风湿性关节炎,腰腿痛,四肢麻痹,痛经,跌打肿痛。

#### 7011082

*Machilus grijsii* Hance

植物名 黄绒润楠《中国植志》

文献名 黄楠《树分》,黄桢楠《海南植志》

地方名 江西:野枇杷、寻乌(井冈山),牛胶铁(赣南);广东:跌打王、香楠树、香胶树(惠阳)。

功效 全株:散瘀消肿,止血,消炎。

#### 7011083

*Machilus ichangensis* Rehd. et Wils.

植物名 宜昌润楠《中国植志》

文献名 大叶楠《树分》,宜昌楠《中国经植志》

地方名 湖北:竹叶楠(兴山),楠木(神农架);湖南:豪樟;四川:[樟树];贵州:岩柴,威灵仙。

功效 茎、叶、树皮:用于吐泻。外用于转筋,足水肿。

#### 7011084

*Machilus leptophylla* Hand. - Mazz.

植物名 薄叶润楠《中国植志》

药材名 大叶楠《浙江天目药志》

文献名 华东楠《中国经植志》,华东润楠《广西植志》,落叶桢楠《高植图鉴》,长叶润楠《中国树木志》,豪樟、竹叶楠《中药大辞典》

地方名 浙江:火善肚(临安),茱卷皮。

功效 树皮:有小毒。散瘀消肿,镇痛软坚。用于跌打损伤,菌痢。

#### 7011085

*Machilus salicina* Hance

植物名 柳叶润楠《中国植志》

文献名 柳叶桢楠《海南植志》

地方名 海南:水边楠;广西:柳楠(上思);云南:牛眼樟(景洪)。

功效 叶:用于肿毒。

#### 7011086

*Machilus thunbergii* Sieb. et Zucc.

植物名 红楠《中国植志》

药材名 红楠《浙江天目药志》

文献名 红楠皮《中药大辞典》,红润楠《中国树木志》。

地方名 山东:[冬青],小楠木;浙江:白漆柴、乌樟(临安),[杓樟](昌化),吊樟(宁波),表樟(龙泉),表香柴(丽水),楠柴(平阳),沙浆樟;安徽:野樟树;台湾:猪脚楠,楠仔木;广西:斗猪木(宾阳);四川:小楠。

功效 根皮及树皮:止呕止泻。外用舒筋活血。

#### 7011087

*Machilus velutina* Champ. ex Benth.

植物名 绒毛润楠《中国植志》

药材名 猴高铁《汇编》

文献名 绒楠《树分》,绒毛桢楠《中国经植志》

地方名 野枇杷(浙江、江西、福建),山枇杷(江西、福建),香胶木(广东、广西、江西);浙江:掠头柴;福建:

胶木柴(宁化、清流),楠树(明溪),鸭梅樵头(清流),山羊奶(三明),江南香,香柴(南靖),香头柴(龙岩),郎香柴(南平、浦城),牛角铁(武平),牛角柴(平和);广东:牛较铁树,西湖楠,猴哥铁(粤北)。

功效 根、叶:化痰止咳,消肿止痛,收敛止血。用于支气管炎。外用于烧烫伤,外伤出血,痈肿,骨折。

#### 7011088

*Machilus yunnanensis* Lec. --- *M. yunnanensis* Lec. var. *duclouxii* Lec. --- *M. bracteata* Lec.

植物名 滇润楠《中国植志》

药材名 云南冻青叶《汇编》

文献名 云南楠《中国经植志》,有苞桢楠《四川中草》,滇桢楠《高植图鉴》,滇桢《云南药录》

地方名 四川:白香樟,铁香樟,香桂子,狗爪樟,臭樟;云南:滇楠,云南楠木,冻青叶(昆明)。

功效 叶:清热消炎,解毒消肿。用于跌打损伤,骨折,烧伤,腮腺炎,疮毒,风湿;根、树皮、果实:温中行气,止痛。用于胃腹胀痛,急性胃肠炎。

#### 7011089

*Neocinnamomum caudatum* (Nees) Merr. --- *N. yunnanense* Liou Ho --- *N. poilanei* Liou Ho

植物名 滇新樟《中国植志》

药材名 白桂《云南药录》

地方名 广西:茶枫,“加修”(龙津壮语);云南:沙藤叶、一股筋(通海、红河),香味叶(红河),羊角香(玉溪),“梅根”(西双版纳傣语),“白乐基”(玉溪峨山彝语)。

功效 叶、根皮、茎皮:祛瘀活血,散寒止痛。用于风湿关节疼痛,跌打瘀血肿痛,骨折,痛经,风寒感冒,麻疹,皮疹,寒性胃痛,腹胀,半身不遂。

#### 7011090

*Neocinnamomum delavayi* (Lec.) Liou --- *Cinnamomum delavayi* Lec. --- *Neocinnamomum parvifolium* (Lec.) Liou

植物名 新樟《中国植志》

药材名 云南柴桂《汇编》

文献名 云南桂《树分》,少花新樟《高植图鉴》

地方名 [柴桂](云南、四川);四川:小官桂、三条筋(西昌),[白背叶](德昌),香桂子(米易),香叶子(盐边、金阳);云南:香叶、楠木香、三股筋(昆明),荷花香(保山),荷叶香(大姚),香叶树(楚雄、武定),梅叶香(弥渡、楚雄、富民),野香叶树(楚雄),羊角香(鹤庆),[肉桂树](丽江)。

功效 叶、枝、树皮:祛风活络,散寒止痛,止血。用于风湿痹痛,跌打损伤疼痛。外用于止血。

#### 7011091

*Neocinnamomum lecomtei* Liou --- *N. hainanianum* Allen

植物名 海南新樟《中国植志》

药材名 木大力王《广西本草选编》

地方名 广西:“美共”(三江侗语)。

功效 全株:有小毒。祛风湿,舒筋络,活血散瘀,行气止痛。用于风湿骨痛,跌打损伤,腰肌劳损,神经

痛,乙型脑炎后遗症,小儿麻痹后遗症。

## 7011092

*Neocinnamomum mekongense* (Hand.-Mazz.)  
Kosterm. --- *Cinnamomum delavayi* Lec. var. *mekongense* Hand.-Mazz.

植物名 沧江新樟《中国植志》

文献名 三股筋《药植简编》

功效 叶:祛风湿,舒筋络。外用于骨折。

## 7011093

*Neolitsea aurata* (Hay.) Koidz. --- *Tetradenia aurata* Hay.

植物名 新木姜子《中国植志》

文献名 新木姜《高植图鉴》,金叶新木姜《中国树木志》

地方名 浙江:山苍(东天目);湖南:野玉桂(宜章)。

功效 根、树皮、种子:理气止痛,消肿。用于胃脘胀痛,水肿。

## 7011094

*Neolitsea aurata* (Hay.) Koidz. var. *chekiangensis* (Nakai) Yang et P. H. Huang --- *N. chekiangensis* Nakai

植物名 浙江新木姜子《中国植志》

文献名 浙新木姜《中国经植志》

地方名 浙江:香桂,假桂花,红皮树。

功效 树皮:用于胃脘胀痛。

## 7011095

*Neolitsea cambodiana* Lec. --- *N. ferruginea* Merr.

植物名 锈叶新木姜子《中国植志》

文献名 红桐树《高植图鉴》,锈叶新木姜《海南植志》

地方名 福建:山坑紫(南平);广东:辣汁树(大埔),石槁(鼎湖山),大叶樟(怀集);广西:白背樟(华江),香胶木(苍梧)。

功效 叶:外用于疮疥。

## 7011096

*Neolitsea chunii* Merr.

植物名 鸭公树《中国植志》

文献名 大新木姜《广西药园药录》,大叶新木姜子《湖北植志》

地方名 大叶樟(广东、广西);广东:青胶木(封川),呖卜籽;广西:假樟(武鸣),假桂皮;云南:大香籽(富宁)。

功效 种子:理气止痛,消肿。用于胃脘胀痛,水肿。

## 7011097

*Neolitsea levinei* Merr.

植物名 大叶新木姜子《中国植志》

文献名 大叶新木姜《高植图鉴》,假肉桂《广西药园药录》

地方名 广东:厚壳桂(梅县),土玉桂(乐昌);广西:假玉桂,玉桂(桂平),崩沱药(贺县),刀山虎(阳朔),一百二百(兴安)。

功效 根:用于白带,痢疮肿毒。

## 7011098

*Neolitsea polycarpa* Liou

植物名 多果新木姜子《中国植志》

地方名 云南:野桂皮,香桂叶(西畴),土桂皮(文山)。

备考 中文名与桂皮相混。

## 7011099

*Neolitsea zeylanica* (Nees) Merr.

植物名 南亚新木姜子《中国植志》

文献名 南亚新木姜《高植图鉴》

功效 根:祛风止痛。

## 7011100

*Persea americana* Mill.

植物名 鳄梨《中国植志》

药材名 鳄梨《广西药录》

文献名 樟梨《经植手册》

地方名 油梨(广东、广西、云南)。

功效 果实:用于糖尿病。

## 7011101

*Phoebe bournei* (Hemsl.) Yang --- *Machilus bournei* Hemsl.

植物名 闽楠《中国植志》

文献名 毛丝桢楠《高植图鉴》

地方名 福建:楠木,竹叶楠;广西:兴安楠木;四川:桢楠,光叶楠,巴楠。

功效 木材、枝叶、树皮:用于吐泻。外用于转筋,足水肿。

## 7011102

*Phoebe forrestii* W. W. Sm.

植物名 长毛楠《中国植志》

地方名 云南:白苏木(峨山),“西哈尼突”(玉溪峨山彝语);西藏:红楠木(察隅)。

功效 叶、茎皮:舒筋活血,祛瘀止痛。

## 7011103

*Phoebe nanmu* (Oliv.) Gamble

植物名 滇楠《中国植志》

文献名 楠木、桢楠《高植图鉴》

功效 木材、枝叶、树皮:用于吐泻。外用于转筋,足水肿。

## 7011104

*Phoebe neurantha* (Hemsl.) Gamble

植物名 白楠《中国植志》

功效 根皮、树皮:理气温中,利水消肿。

## 7011105

*Phoebe sheareri* (Hemsl.) Gamble

植物名 紫楠《中国植志》

药材名 紫楠《中药大辞典》

文献名 紫楠、金丝楠、金丝楠《中国经植志》

地方名 枇杷木(浙江、江西);浙江:小叶嫩楠柴(临安),楠木,石环树、山枇杷(丽水、云和),野枇杷(建德、江山、泰顺),猪脚楠(泰顺);江西:大叶紫楠(吉水);广西:黄心楠,见风消(全州)。

功 效 树皮、枝叶：用于脚气，浮肿，气逆腹胀；根：用于跌打损伤，催产。

## 7011106

*Phoebe sheareri* (Hemsl.) Gamble var. *omeiensis* (Yang) N. Chao --- *P. neurantha* (Hemsl.) Gamble var. *omeiensis* Yang

植物名 峨眉楠《中国植志》

文献名 峨眉紫楠《中国树木志》

地方名 四川：峨眉白楠(峨眉山)。

功 效 根：活血祛瘀，止痛。

## 7011107

*Phoebe zhennan* S. Lee et F. N. Wei --- *Phoebe nanmu* auct. non (Oliv.) Gamble

植物名 楠木《中国植志》

药材名 楠木《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 楠《广韵》，柟木(任昉《述异记》)，楠材《别录》，楠木皮《海药本草》，赤梗《一切经音义》，王楠《造林要义》，雅楠《树分》

地方名 湖北：香楠(利川)；四川：桢楠(成都)。

功 效 木材、枝叶、树皮：用于吐泻。外用于转筋，足水肿。

备 考 《树分》、《高植图鉴》学名误订为 *P. nanmu* (Oliv.) Gamble

## 7011108

*Sassafras randaiense* (Hayata) Rehd.

植物名 台湾檫木《中国植志》

文献名 畛大山檫木《药学通报》

功 效 根或茎叶：用于风湿，腰肌劳损，扭挫伤筋，胃病。

## 7011109

*Sassafras tzumu* (Hemsl.) Hemsl. --- *Pseudosassafras laxiflora* (Hemsl.) Nakai

植物名 檫木《中国植志》

药材名 檫木《汇编》

文献名 檫《集韵》，荆黄楸(齐民要术)，蔡木、檫蔡木《名实图考》，檫树、黄楸树《树分》

地方名 花楸树(云南、四川)，天鹅枫(浙江、江西)，枫荷桂(浙江、广东、广西)，梓木(江西、湖北)；浙江：南檫，山檫(平阳)；安徽：青檫；江西：紫木(新建、南昌)，落叶樟(全南、龙南)，高山樟；福建：桐梓树，梨火烘，假杉木、铁柴(闽东)，索树(永安)，獭柴(闽北)，鸭脚掌(龙溪、闽侯)；湖北：黄楸，三叉叶树(神农架)；广东：刷木(封川)；广西：半枫樟(桂平)，[半枫荷]，独脚樟(梧州)，[樟木](大瑶山)，黄花儿(乐业)；贵州：“徒手巴”(雷公山苗语)；云南：鹅脚板(威信)。

功 效 根或茎、叶：祛风逐湿，活血散瘀。用于扭挫伤，腰肌劳损。

## 7013 莲叶桐科 Hernandiaceae

## 7013001

*Hernandia sonora* L. --- *H. ovigera* L. --- *H. peltata* Meisn.

植物名 莲叶桐《中国植志》

地方名 台湾：腊树，血桐。

功 效 种子：泻剂；树干基部心材：用于出血症。

## 7013002

*Illigera aromatica* S. Z. Huang et S. L. Mo

植物名 香青藤《广西植物》

地方名 广西：黑吹风、吹风散(龙州、邕宁、宁明、大新)，“勾林”(龙州壮语)。

功 效 藤茎：用于风湿痛。

## 7013003

*Illigera brevistaminata* Y. R. Li

植物名 短蕊青藤《中国植志》

药材名 短蕊青藤《贵州药录》

功 效 根、茎：祛风除湿，散瘀止痛。用于风湿麻木，小儿麻痹，跌打损伤，风湿骨痛。

## 7013004

*Illigera celebica* Miq. --- *I. platyandra* Dunn

植物名 宽药青藤《中国植志》

药材名 大青藤《广西药园药录》

文献名 瑶山青藤《广西药园药录》

地方名 广西：麻骨风(南宁)，白吹风散(龙州)；云南：“保龙师”(傣语)。

功 效 根、藤茎：祛风除湿，行气止痛。用于风湿骨痛，肥大性脊椎炎。

## 7013005

*Illigera cordata* Dunn

植物名 心叶青藤《中国植志》

地方名 四川：牛尾参(会东)，翼果藤(凉山)；云南：黄鳝藤(开远)，小白袍(永仁)，毛叶血藤(红河)，大风藤(屏边)。

功 效 根：驳骨，止痛，消肿，破瘀，通经。

## 7013006

*Illigera grandiflora* W. W. Smith et J. F. Jeff.

植物名 大花青藤《中国植志》

地方名 云南：青藤、红豆七(龙陵)，通气跌打(沧源)，风车藤(耿马)。

功 效 根、藤：消肿解热，散瘀。外用于跌打接骨。

## 7013007

*Illigera henryi* W. W. Simith

植物名 蒙自青藤《中国植志》

功 效 根、藤茎：用于风湿骨痛。

## 7013008

*Illigera parviflora* Dunn

植物名 小花青藤《中国植志》

地方名 福建：翅果藤；广西：黑九牛，谷风藤(凤山县)，细叶青(昭平)；贵州：鹰爪风，九牛藤。

功 效 根、藤茎：祛风除湿。用于风湿骨痛，小儿麻痹后遗症。

## 7013009

*Illigera pseudoparviflora* Y. R. Li

植物名 尾叶青藤《中国植志》

地方名 贵州：三叶血藤，乌龙大救驾。

功效 根、茎：祛风除湿，散寒止痛。用于跌打损伤，风湿麻木，月经不调。

## 7013010

*Illigera rhodantha* Hance --- *Illigera cordata* auct. non Dunn

植物名 红花青藤《中国植志》

文献名 毛青藤《广西植物》

地方名 广西：三叶青藤、三姐妹、三姐藤、三姐妹藤（上林），三叉藤（佳平），三枝藤（龙州），三娘藤根，三娘娘，（白芷）（容县），黑吹风藤（凤山），千打锤（石龙），（穿破石）（北流、桂平、平南），伏地虎（苍梧、岑溪），青藤红根，状元红（北流），黄蜂叶（贵县）。

功效 根、藤茎：祛风除湿，消肿止痛。用于风湿骨痛，跌打肿痛，蛇咬伤，小儿疳积。

备考 《广西植志》（1971）将本种学名误订为 *I. cordata* Dunn

## 7013011

*Illigera rhodantha* Hance var. *angustifolliolata* Y. R. Li

植物名 狭叶青藤《中国植志》

功效 藤茎：祛风除湿，消肿止痛。

## 7013012

*Illigera rhodantha* Hance var. *dunniana* (Levl.) Kubitzki

植物名 锈毛青藤《中国植志》

文献名 贵州青藤《广西植物》

地方名 广西：三叶桐藤（天峨）。

功效 根、藤茎：祛风除湿。用于风湿骨痛；叶：消肿。

## 7013013

*Illigera trifoliata* (Griff.) Dunn ssp. *cucullata* (Merr.) Kubitzki --- *I. cucullata* Merr.

植物名 兜状青藤《中国植志》

文献名 青藤、藤骨脆、三叶冬青《药植简编》，兜状三叶青藤《云南植志》

功效 根、茎藤：用于风湿骨痛，跌打肿痛，喉痛，蛇咬伤。

## 7014 肉豆蔻科 Myristicaceae

## 7014001

*Horsfieldia hainanensis* Merr.

植物名 海南风吹楠《中国植志》

文献名 海南荷斯菲木《海南植志》，假玉果《高植图鉴》，海南假玉果《药植简编》，海南霍而飞《广西药录》

地方名 海南：“咪梭”（黎语），水枇杷；广西：（血竭）（龙州）。

功效 树皮、叶：用于小儿疳积。

## 7014002

*Myristica cagayanensis* Merr.

植物名 台湾肉豆蔻《中国植志》

文献名 兰屿肉豆蔻《台湾药植志》

功效 假种皮、种仁：健胃，调味。

## 7014003

*Myristica fragrans* Houtt.

植物名 肉豆蔻《中国植志》

药材名 肉豆蔻《药性论》、《药典》

文献名 迦拘勒《本草拾遗》，〔豆蔻〕《续传信方》，肉果《纲目》，脾家瑞气《新纲》，肉豆蔻花（假种皮）、肉豆蔻油（李《生药》），肉豆蔻、肉果花、肉豆蔻（叶《生药》），玉果花《药材资料汇编》，统肉果、顶头肉《药材学》，肉豆蔻衣《中药志》，煨肉果、肉豆蔻树《常用中药名辨》。

地方名 云南：“麻尖”（傣语）；西藏：“扎滴”（藏名）。

功效 种仁：温中行气，涩肠止泻。用于脾胃虚寒，久泻不止，脘腹胀痛，食少呕吐。

## 7015 毛茛科 Ranunculaceae

## 7015001

*Aconitum acutiusculum* var. *aureopilosum* W. T. Wang

植物名 展毛尖萼乌头《中国植志》

药材名 藏草乌《迪庆藏药》

地方名 云南：“榜那”（藏名）。

功效 块根：有大毒。退烧，止痛，缓下。用于流感，炭疽病，风湿痛；叶、花：有小毒。消炎，止痛。用于发热性疼痛，头痛，牙痛。

## 7015002

*Aconitum alatavicum* Worosch.

植物名 细叶乌头《新疆药植志》

药材名 新疆细叶草乌（拟）

文献名 草乌、乌头《新疆中草药》

功效 块根：有大毒。散风寒，除湿，止痛。用于风湿性关节炎，布氏菌病，跌打损伤，肋间神经痛，腰脚冷痛。

## 7015002a

*Aconitum albobolaceum* Korn.

植物名 两色乌头《中国植志》

文献名 〔狼毒〕、〔秦艽〕、草乌《满蒙植汇》，白花乌头《中药通报》

功效 块根：有毒。镇痛，镇痉。

## 7015003

*Aconitum ambiguum* Reichb.

植物名 兴安乌头《中国植志》

药材名 兴安草乌（拟）

地方名 草乌（东北）。

功效 块根：有毒，镇痛，镇痉。用于风湿。

## 7015004

*Aconitum anthoroideum* DC.

植物名 拟黄花草乌头《中国植志》

药材名 新疆黄花草乌头（拟）

文献名 新疆乌头《高植图鉴》

地方名 新疆：黄花草乌头。

功效 块根：有毒，用于跌打损伤，止血。

## 7015005

*Aconitum apetalum* (Huth) B. Fedtsch.

植物名 空茎乌头《中国植志》

备考 块根：有毒。民间混作乌头入药。

## 7015006

*Aconitum austroyunnanense* W. T. Wang

植物名 滇南草乌《中国植志》

药材名 滇南草乌《云南省药品标准》

文献名 滇南乌头《药学报》

地方名 云南:小黑牛(景东),树乌头(文山),大草乌、七星草乌(红河),铜皮(滇南)。

功效 块根:有大毒。用于风寒湿痹,中风瘫痪,跌打损伤。

#### 7015007

*Aconitum barbatum* Pers.

植物名 细叶黄乌头《中国植志》

文献名 细叶黄乌头《东检》

地方名 内蒙古:〔牛扁〕;陕西:大扁地叶,九连环,九鼎连环草,龙膝。

功效 全株:有毒。祛风止痛,散瘀止血,消肿拔毒。

#### 7015008

*Aconitum barbatum* var. *hispidum* DC. --- *A. sibiricum* Poiret

植物名 西伯利亚乌头《中国植志》

药材名 马尾大芫(保定)

文献名 〔北乌头〕《沈药学报》,展毛牛扁《药学报》,镜泊乌头《东北草本植志》,藏青乌《药典》

地方名 内蒙古:黑秦芫,黑大芫,大芫。

功效 块根:有毒。镇痛。用于风湿等症。

备考 秦芫。

#### 7015009

*Aconitum barbatum* var. *puberulum* Ledeb. --- *A. ochranthum* C. A. Mey.

植物名 牛扁《中国植志》

药材名 牛扁《本经》,《汇编》

文献名 扁特、扁毒《唐本草》,马尾大芫《鉴别手册》

地方名 河北:曲芍,翻叶莲;山西:扁桃叶根;内蒙古:黄花乌头,黑大芫,〔辫子芫〕,“巴塔根一浩日”(蒙名)。

功效 根:有毒。祛风止痛,止咳,平喘,化痰。用于慢性支气管炎,腰腿痛,关节肿痛。外用于疥癣,淋巴结核。

#### 7015010

*Aconitum benzilanense* T. L. Ming

植物名 奔子栏乌头《迪庆藏药》

药材名 藏草乌《迪庆藏药》

地方名 云南:“榜那”(藏名)。

功效 块根:有大毒。退烧,止痛,缓下。用于流感,炭疽病,风湿痛;叶、花:有小毒。消炎,止痛。用于发热性疼痛,头痛,牙痛。

#### 7015011

*Aconitum birobidshanicum* Worosch.

植物名 带岭乌头《中国植志》

地方名 黑龙江:草乌。

功效 块根:祛风,除湿,散寒,止痛。用于风寒湿痹,肢体关节冷痛,心腹冷痛。

#### 7015012

*Aconitum brachypodum* Diels

植物名 短柄乌头《中国植志》

药材名 雪上一枝蒿《汇编》

文献名 白蒿乌头《药学报》

地方名 铁棒锤(甘肃、青海);四川:三转半;云南:一支蒿(丽江、曲靖、华坪)。

功效 块根:有大毒。祛风除湿,镇痛。用于风湿痛,跌打损伤。

#### 7015013

*Aconitum brachypodum* var. *crispulum* W. T. Wang

植物名 曲毛短柄乌头《中国植志》

药材名 雪上一枝蒿《品种论述》

文献名 伏毛短柄乌头《汇编》,曲毛雪上一枝蒿《品种论述》

地方名 四川:三转半、铁棒锤(金川),“满干”(藏名)。

功效 块根:有大毒。祛风,除湿,镇痛。

#### 7015014

*Aconitum brachypodum* var. *laxiflorum* Fletcher et Lauener

植物名 展毛短柄乌头《中国植志》

药材名 雪上一枝蒿《云南、四川》

文献名 疏花短柄乌头《汇编》,展毛雪上一枝蒿《品种论述》

地方名 四川:蒿乌(冕宁),三转半(西昌)。

功效 块根:有大毒。祛风,除湿,镇痛。

#### 7015015

*Aconitum bracteolosum* W. T. Wang

植物名 显苞乌头《中国植志》

药材名 藏草乌《迪庆藏药》

地方名 云南:“榜那”(藏名)。

功效 块根:有大毒。退烧,止痛,缓下。用于流感,炭疽病,风湿痛;叶、花:有小毒。消炎,止痛。用于发热性疼痛,头痛,牙痛。

#### 7015016

*Aconitum brevicaratum* (Finet et Gagnep.) Diels

植物名 短距乌头《中国植志》

药材名 大草乌(云南永胜)

文献名 短距牛扁《云南种录》

功效 块根:有毒。用于局麻。

#### 7015017

*Aconitum brevicaratum* var. *lauenerianum* (Fletcher) W. T. Wang

植物名 弯短距乌头《中国植志》

药材名 草乌(云南剑川)

文献名 弯短距牛扁《云南种录》

功效 块根:有毒。用于局麻。

#### 7015018

*Aconitum brunneum* Hand. -Mazz.

植物名 褐紫乌头《中国植志》

地方名 青海:“邦玛”(藏名)。

功 效 块根：用于肉食中毒。

## 7015019

*Aconitum bulleyanum* Diels

植物名 滇西乌头《中国植志》

药材名 都刺《名实图考》、《云南种录》

地方名 云南：草乌、堵刺。

功 效 根：有毒。解毒止痛。

## 7015020

*Aconitum cannabinifolium* Franch. ex Finet et Gagnep.

植物名 大麻叶乌头《中国植志》

药材名 草乌《陕西终南山》

地方名 湖北：岩乌头、岩羊角七《神农架》。

功 效 块根：有毒。散寒祛湿，舒筋活络。

## 7015021

*Aconitum carmichaeli* Debx. --- *A. wilsonii* Stapf ex Veitch --- *A. lushanense* Migo

植物名 乌头《本经》、《中国植志》

药材名 川乌《金匱要略》、《药典》，附子《本经》、《药典》

文献名 董《庄子》，芡《尔雅》，鸡毒《淮南子》，乌喙、奚毒、即子、天雄、白幕、射网《本经》，薊子《许慎《说文》》，蓂、千秋、毒公、果负、耿子、帝秋、侧子《吴普本草》，木鳖子《雷公炮炙论》，川乌头、草乌头《侯宁极《药谱》》，独白草《续汉书》，土附子《日华子本草》，龙州乌头《证类本草》，草乌《济总录》，漏篮子《彰明附子记》，竹节乌头、金鸡、黑附子、漏篮子、鸳鸯菊《纲目》，双兰菊《和汉药考》，泥附子、盐附子、黑顺片、白附片、附片、淡附片、《药典》，庐山乌头《药植图说》

地方名 九子不离母《四川、云南》，盐乌头、乌药《四川、陕西》；山西：老乌；甘肃：黑乌药、大乌药；新疆：断肠草；江西：六药《庐山》，小脚乌《景德》；河南：五毒《鸡公山》；湖北：羊角七《均县》，关东乌头《神农架》；广西：百宝丹、大麻药《三江》；四川：洋艾《南川》，草乌子、鹅儿花、铁花《峨眉山》；贵州：乌兜、耗子头《贵阳》；云南：麝香脚《昭通》，小草乌《景东、富源》，大草乌、十二无脚、白乌《昭通》，九子不离娘《红河》，金乌《景东》。

功 效 母根《川乌》：有毒。祛风除湿，温经止痛。用于风湿痹痛，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛，麻醉止痛；子根《附子》：有毒。回阳救逆，补火助阳，逐风寒湿邪。用于亡阳虚脱，肢冷脉微，阳痿，宫冷，心腹冷痛，虚寒吐泻，阴寒水肿，阳虚外感，寒湿痹痛。

## 7015022

*Aconitum carmichaeli* var. *hwangshanicum* W. T. Wang et Hsiao --- *A. chinense* var. *hwangshanicum* W. T. Wang et Hsiao

植物名 黄山乌头《中国植志》

药材名 草乌《华东》

文献名 华东乌头《浙江天目药志》

地方名 浙江：乌头、吓虎打《西天目山》，山芝麻《宁波》，草白附；安徽：草乌头，蓝附子，鸡头草，鸭头；江西：草乌子。

功 效 块根：有毒。用于跌打损伤，无名肿毒，制

箭毒。

## 7015023

*Aconitum carmichaeli* var. *pubescens* W. T. Wang et Hsiao

植物名 毛叶乌头《中国植志》

药材名 大乌头《秦岭植志》

文献名 毛草乌《品种论述》

地方名 陕西：乌药，草乌，乌头；甘肃：大乌药《宕昌》，密毛草乌。

功 效 块根：散寒祛湿，舒筋活络。

## 7015024

*Aconitum carmichaeli* var. *tripartitum* W. T. Wang

植物名 深裂乌头《中国植志》

药材名 草乌《江苏》

功 效 块根：有毒。散寒祛湿，舒筋活络。

## 7015025

*Aconitum carmichaeli* var. *truppelianum* (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao --- *A. chinense* Paxt. --- *A. kitagawae* Nakai --- *A. liaorungense* Nakai --- *A. carmichaeli* var. *fortunei* (Hemsl.) W. T. Wang et Hsiao

植物名 展毛乌头《中国植志》

药材名 草乌《华东》

文献名 草乌头《侯宁极《药谱》》，浙乌头、僧鞋菊、鹦哥菊《纲目拾遗》，华东乌头《中药志》，华草乌《汇编》，旅大乌头《拉汉种称》，辽东乌头《东北草本植志》。

地方名 山东：蛭蛭花根《烟台》；江苏：小脚乌《盱眙、云台山》，吓唬打；湖北：羊角七《神农架》；广东：黑叶乌；贵州：乌桃子《黔阳》；云南：金鸡，两头尖，九子不离母。

功 效 母根：有毒。祛风除湿，温经止痛。

## 7015026

*Aconitum cavaleriei* Levl. et Vant.

植物名 黔川乌头《中国植志》

地方名 贵州：水八角莲《安龙》。

功 效 根：用于胃痛。

## 7015027

*Aconitum changianum* W. T. Wang

植物名 察瓦龙乌头《中国植志》

药材名 铁罗汉《丽江中草药》

地方名 云南：维西黑乌草《丽江》。

功 效 根：有大毒。祛风除湿，活血通络，止痛。用于局部麻醉，风湿麻木。外用于腰腿痛，关节扭伤。

## 7015028

*Aconitum chasmanthum* Stapf

植物名 展花乌头《中国植志》

功 效 块根：有毒。祛风除湿，活血通络，止痛。

## 7015029

*Aconitum chilienshanicum* W. T. Wang

植物名 祁连山乌头《中国植志》

药材名 草乌《青海、甘肃》

功 效 块根：有毒。祛风除湿，活血通络，止痛。

## 7015030

*Aconitum contortum* Finet et Gagnep.

植物名 苍山乌头《中国植志》

药材名 七星草乌(云南大理)

地方名 云南:五虎下西川(施甸)。

功效 块根:有毒。祛风湿,祛寒,止痛。

#### 7015031

*Aconitum coreanum* (Levl.) Rapaics --- *A. delavayi* var. *coreanum* Levl. --- *A. koreanum* Raym. --- *A. komarovii* Steinb.

植物名 黄花乌头《中国植志》

药材名 关白附《中药志》

文献名 白附子《别录》,竹节白附、乌头白附《品种论述》,美丽乌头《叶(生药)》

地方名 黄乌拉花、黄靛靛花、乌拉花、山喇叭花、靛靛花(东北);吉林:朝鲜白附子(延边);辽宁:大黄啦叭花、鼠尾草根、两头菜(铁岭),药虱子草、白花子(凤城),鸡爪莲(金县),胭粉豆(辽阳);河北:百步草;内蒙古:“巴宝嘎尔卜”(蒙名)。

功效 块根:有毒。祛风痰,逐寒湿,定惊痫。用于中风痰壅,口眼歪斜,头痛,癫痫,风湿痹痛,破伤风,面部疔瘤,疮疡疥癣,皮肤湿痒。

#### 7015032

*Aconitum crassicaule* W. T. Wang

植物名 粗茎乌头《中国植志》

药材名 紫草乌(云南)

功效 块根:有毒。祛风除湿,止痛。

#### 7015033

*Aconitum delavayi* Franch.

植物名 马耳山乌头《中国植志》

药材名 草乌(云南)

地方名 云南:水草乌、堵拉(鹤庆)。

功效 块根:有毒。祛风湿,散寒,止痛。

#### 7015034

*Aconitum dolichorhynchum* W. T. Wang

植物名 长柱乌头《中国植志》

药材名 藏草乌(迪庆藏药)

地方名 云南:“榜那”(藏名)。

功效 块根:有大毒。退烧,止痛,缓下。用于流感,炭疽病,风湿痛;叶、花:有小毒。消炎,止痛。用于发热性疼痛,头痛,牙痛。

#### 7015035

*Aconitum duclouxii* Levl.

植物名 宾川乌头《中国植志》

药材名 堵拉(云南)

地方名 云南:小白撑(曲靖)。

功效 块根:有大毒。散瘀通络,麻醉止痛。用于跌打损伤,骨折,风湿麻木,关节痛,外伤出血。

#### 7015036

*Aconitum duclouxii* var. *ecalcaratum* Fletcher et Lauener

植物名 无距宾川乌头《中国植志》

药材名 云南草乌(云南)

文献名 无距乌头《品种论述》

地方名 云南:(白药)(剑川)。

功效 块根:有毒。用于镇痛,祛风湿。

#### 7015037

*Aconitum elliotii* var. *doshongense* (Lauener) W. T. Wang

植物名 短梗墨脱乌头《中国植志》

功效 块根:有剧毒。西藏墨脱一带居民用其制作箭毒。

#### 7015038

*Aconitum episopale* Levl. --- *Aconitum delavayi* auct. non Franch.

植物名 紫乌头《中国植志》

药材名 紫草乌《汇编》

文献名 化血丹《玉龙本草》

地方名 藤乌(贵州、云南);贵州:贵州堵喇;云南:堵喇(鹤庆),黑心解(玉龙),小黑牛(景东),草乌(凤庆),野弩箭药(维西)。

功效 块根:有毒。祛风除湿,温经止痛。

备考 《高植图鉴》(1972)学名误订为 *A. delavayi* Franch.

#### 7015039

*Aconitum excelsum* Reichb.

植物名 紫花高乌头《中国植志》

文献名 紫花乌头《植分学报》。

功效 块根:有毒。用于疮疖,跌打损伤。

#### 7015040

*Aconitum funetianum* Hand.-Mazz. --- *A. sinomontanum* var. *angustius* auct. non W. T. Wang

植物名 赣皖乌头《中国植志》

药材名 草乌(浙江、江西)

文献名 五裂叶牛扁、蔓乌头《浙江天目药志》,鸡脑王《药学报》

地方名 浙江:大叶藤乌头(东天目),缙兰花;江西:破叶莲

功效 块根:有毒。祛寒湿,止痛。用于跌打损伤,去风湿,消炎,毒蛇咬伤,无名肿毒。

备考 《浙江天目药志》(1965)将本种误订为 *A. sinomontanum* var. *angustius* W. T. Wang;《新华本草纲要》(1988)将本种与高帽乌头合并,学名改为 *A. pterocaulis* Kordz.

#### 7015041

*Aconitum fischeri* Reichb.

植物名 薄叶乌头《中国植志》

药材名 辽乌头《拉汉种称》

文献名 山东草乌《药植简编》

功效 块根:有毒。祛风除湿,温经止痛。

#### 7015042

*Aconitum fischeri* var. *arcuatum* (Maxim.) Regel --- *A. arcuatum* Maxim.

植物名 弯枝乌头《中国植志》

药材名 草乌(东北)

文献名 大唇乌头《沈药学报》,高茎乌头《东北植药图志》,大花乌头《品种论述》,弧枝乌头《拉汉种称》

功 效 块根:有大毒。祛风除湿,温经止痛

## 7015043

*Aconitum flavum* Hand. -Mazz

植物名 伏毛铁棒锤《中国植志》

药材名 铁棒锤《陕西中草药》

地方名 雪上一枝蒿(四川、青海);甘肃:小草乌,(两头尖),[断肠草],磨三转,小鸟,小乌药;宁夏:一支蒿;青海:[乌药],草乌,野乌药,“门青”(藏名)。

功 效 块根:有大毒。祛风止痛,散瘀止血,消肿拔毒。

## 7015044

*Aconitum formosanum* Tamura

植物名 台湾乌头《中国植志》

药材名 台湾乌头《中草药》

功 效 块根:有大毒。祛风除湿,温经止痛。

## 7015045

*Aconitum forrestii* Stapf --- *A. likiangense* Chen et Liu

植物名 丽江乌头《中国植志》

药材名 黄草乌(云南丽江)

功 效 块根:有毒。祛风除湿,温经止痛。

## 7015046

*Aconitum forrestii* var. *albovillosum* (Chen et Liu) W. T. Wang

植物名 毛果丽江乌头《高植图鉴补编》

地方名 四川:草乌(木里)。

功 效 块根:有毒,祛风除湿,温经止痛。

## 7015047

*Aconitum franchetii* Finet et Gagnep.

植物名 大渡乌头《中国植志》

文献名 卢定乌头《中草药》

功 效 块根:民间作草乌用。

## 7015048

*Aconitum geniculatum* Fletcher et Lauener

植物名 膝瓣乌头《中国植志》

地方名 云南:大草乌。

功 效 块根:有毒。祛风散寒,除湿止痛。

## 7015049

*Aconitum gezaense* W. T. Wang et L. Q. Li

植物名 格咱乌头《迪庆藏药》

药材名 藏草乌《迪庆藏药》

地方名 云南:“榜那”(藏名)。

功 效 块根:有大毒。退烧,止痛,缓下。用于流感,炭疽病,风湿痛;叶、花:有小毒。消炎,止痛。用于发热性疼痛,头痛,牙痛。

## 7015050

*Aconitum gymnandrum* Maxim.

植物名 露蕊乌头《中国植志》

地方名 青海:[泽兰](民和),“丝拉那保曼巴”(藏名);四川:“罗砧巴”(川西北部藏名);西藏:乌头。

功 效 根、叶、花:有大毒。驱风镇痛;根:用于关节痛;花:用于麻风;叶:用于驱虫;种子:用于肝痛、淋病,胃病等。

## 7015051

*Aconitum handelianum* Comber

植物名 剑川乌头《中国植志》

药材名 草乌头(云南)

功 效 块根:有毒。云南剑川作草乌用。

## 7015052

*Aconitum hemisleyanum* Pritz.

植物名 瓜叶乌头《中国植志》

药材名 藤乌《汇编》

文献名 蔓乌头、藤乌头《浙江天目药志》

地方名 羊角七(陕西、湖北),草乌(四川、湖北、陕西、湖南、浙江);陕西:老汉背娃娃;河南:盐脑子(嵩县);湖北:藤儿乌(长阳),乌毒(西部),磨三转(神农架);四川:血乌、见血封喉(峨眉山);云南:弩箭头(维西)。

功 效 块根:有大毒。活血镇痛,搜风祛湿。用于风湿疼痛,跌打损伤。外用于无名肿毒,疥疮。

## 7015053

*Aconitum hemisleyanum* var. *circinatum* W. T. Wang

植物名 拳距瓜叶乌头《中国植志》

药材名 血乌(四川峨眉)

文献名 滇西乌头《药学报》

地方名 峰乌(湖北、四川、云南),草乌(湖北、湖南、四川);四川:见血封喉;云南:铁头和尚(施甸)。

功 效 块根:有大毒。外用于疥疮,无名肿毒。

## 7015054

*Aconitum henryi* Pritz

植物名 川鄂乌头《中国植志》

药材名 藤乌(湖北)

地方名 湖北:藤儿乌、草乌、羊角七(神农架)。

功 效 块根:有毒。温经散寒,祛风止痛。

## 7015055

*Aconitum hirsutum* Lauener

植物名 同嘎乌头《药学报》

功 效 块根:有毒。西藏作草乌用。

## 7015056

*Aconitum jaluense* Kom. --- *A. triphyllum* Nakai var. *manshuricum* Nakai

植物名 鸭绿乌头《中国植志》

药材名 草乌(东北)

文献名 东北三叶乌头《拉汉种称》

地方名 附子(东北)。

功 效 块根:有毒。东北作草乌用。

## 7015057

*Aconitum jaluense* var. *glabrescens* Nakai

植物名 光梗鸭绿乌头《中国植志》

药材名 草乌(东北)

文献名 东北乌头《东北药植志》

地方名 小叶芦、蓝花菜、五毒根、蓝靛鞭花(东北)。

功 效 块根:有毒。东北当地作草乌用。

## 7015058

*Aconitum karakolicum* Rapais



植物名 多根乌头《中国植志》

药材名 新疆草乌(拟)

地方名 新疆:草乌。

功效 块根:有毒。祛风除湿,温经止痛。用于神经痛,牙痛,关节炎等。

#### 7015059

*Aconitum kirinense* Nakai

植物名 吉林乌头《中国植志》

药材名 草乌(吉林)

地方名 靰鞡花(东北)。

功效 块根:有毒。祛风除湿,温经止痛。用于胃寒疼痛。

#### 7015060

*Aconitum kirinense* Nakai var. *australe* W. T. Wang

植物名 毛果吉林乌头《中国植志》

地方名 湖北:麻布七(神农架)。

功效 根:有毒。祛风除湿,活血止痛。

#### 7015061

*Aconitum kongboense* Lauener

植物名 工布乌头《中国植志》

药材名 西藏雪上一枝蒿《品种论述》

地方名 西藏:“朋阿那布罗玛查瓦”、“朋阿那博”、“蓬阿那博”(藏名),雪上一枝蒿。

功效 块根:有剧毒。消炎止痛,祛风除湿。用于炭疽病。外用于跌打损伤,毒虫咬伤。

#### 7015062

*Aconitum kongboense* var. *villosum* W. T. Wang

植物名 展毛工布乌头《中国植志》

药材名 西藏雪上一枝蒿(拟)

地方名 西藏:白花乌头《拉萨》

功效 块根:有剧毒。消炎止痛,祛风除湿

#### 7015063

*Aconitum kongboense* Lauener var. *polycarpum* W. T. Wang et L. Q. Li

植物名 多果工布乌头《迪庆藏药》

药材名 藏草乌《迪庆藏药》

地方名 云南:“榜那”(藏名)。

功效 块根:有大毒。退烧,止痛,缓下。用于流感,炭疽病,风湿痛;叶、花:有小毒。消炎,止痛。用于发热性疼痛,头痛,牙痛。

#### 7015064

*Aconitum kusnezoffii* Reichb.

植物名 北乌头《中国植志》

药材名 草乌、草乌叶《药典》

文献名 乌头《本经》,草乌芽、制草乌《药典》

地方名 宽裂北乌头、蓝靰鞡花、鸡头草、蓝附子、五毒根(东北),北草乌(河北、内蒙古),百步草(辽宁、河北),小叶芦(辽宁、山西);黑龙江:五毒花根(哈尔滨),毒根草;辽宁:蓝花菜(彰武、德原);河北:鸭头、鸦头、燕头,穴种,火秧,芽草,芽子,药羊蒿,小叶鸦儿芦;山西:靰鞡花;内蒙古:“蔓钦”、“聚阿音·那布其”、“滴废崩那格”(蒙名),独根草;甘肃:〔乌药〕;河南:小乌头。

功效 块根:有大毒。祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝作痛,麻醉止痛;叶:有小毒。清热,消炎,止痛。用于热病发热,泄泻腹痛,头痛,牙痛。

#### 7015065

*Aconitum legendrei* Hand. -Mazz.

植物名 冕宁乌头《中国植志》

功效 块根:有毒。祛风除湿,温经止痛。

#### 7015066

*Aconitum leiwigense* W. T. Wang

植物名 类乌齐乌头《中草药》

药材名 雪上一枝蒿(西藏昌都)

功效 块根:有毒。在西藏昌都地区以此作雪上一枝蒿收购并运销上海。

#### 7015067

*Aconitum leucostomum* Worosch.

植物名 白喉乌头《中国植志》

功效 块根:有毒。祛风除湿。

#### 7015068

*Aconitum liangshanicum* W. T. Wang

植物名 凉山乌头《中国植志》

药材名 凉山雪上一枝蒿(拟)

地方名 四川:草乌、雪乌(越西),蒿乌(冕宁),雪上一枝蒿、三转半(西昌)。

功效 根:有剧毒。止血镇痛,散瘀消肿,驱风除湿。用于跌打损伤,外伤出血,风湿关节痛,神经性皮炎,扭伤,骨折,无名肿毒,瘫痪。

#### 7015069

*Aconitum lonchodontum* Hand. -Mazz.

植物名 长齿乌头《中国植志》

文献名 鄂西乌头《神农架药录》

地方名 湖北:羊角七、草乌(神农架)。

功效 块根:有毒。祛风湿,散寒止痛。

#### 7015070

*Aconitum longecassidatum* Nakai --- *A. pterocaulis* Koidz.

植物名 高帽乌头《中国植志》

药材名 东北黑大羌(拟)

文献名 〔秦羌〕《满州植录》

功效 根:舒筋活血,祛风镇痛,败毒。用于肠炎,菌痢。

备考 《新华本草纲要》(1988)将棘皖乌头(*A. finetianum* Hand. -Mazz.)并入本种,并将学名改订为 *A. pterocaulis* Koidz.

#### 7015071

*Aconitum longilobum* W. T. Wang

植物名 长裂乌头《中国植志》

地方名 西藏:“杜志陆马”(藏名)。

功效 块根:剧毒。止痛。用于发烧,炭疽病。

#### 7015072

*Aconitum ludlowii* Exell

植物名 江孜乌头《中国植志》

药材名 江孜雪上一枝蒿(拟)

功效 块根;有毒。西藏作雪上一枝蒿入药。

## 7015073

*Aconitum macrorhynchum* Turcz. --- *A. macrorhynchum* var. *octocarpum* P. K. Chang et B. Y. Wang

植物名 长喙乌头(拉汉种称)

药材名 草乌(东北植药图志)

文献名 细叶乌头《中国植志》,大嘴乌头《东检》

地方名 乌头(东北)。

功效 块根;有毒。镇痛镇痉。用于风湿。

## 7015074

*Aconitum milinense* W. T. Wang

植物名 米林乌头《高植图鉴补编》

地方名 西藏;草乌。

功效 块根;有毒。西藏作草乌用。

## 7015075

*Aconitum monticola* Steinb.

植物名 山地乌头《中国植志》

功效 块根;有毒。祛风除湿,理气止痛。

## 7015076

*Aconitum nagarum* Stapf --- *A. venetorum* Diels --- *A. bullatifolium* var. *homotrichum* W. T. Wang

植物名 保山乌头《中国植志》

药材名 保山附片《汇编》

文献名 光果皱叶乌头《药植简编》,雪上一枝蒿《中草药学》,泡叶乌头《中药鉴定学》

地方名 云南:小黑牛、水乌头、山乌头、草乌(保山),一枝蒿,水草乌,七星草乌,蓝花草乌,鹅掌叶乌头。

功效 子根;有剧毒。通络止痛。

## 7015077

*Aconitum nagarum* var. *heterotrichum* Fletcher et Lauener --- *A. bullatifolium* Levl.

植物名 小白撑《中国植志》

药材名 小白撑(云南)、《云南中草药》

文献名 皱叶乌头《高植图鉴》

地方名 云南:黄蜡一支蒿(昭通),雪上一支蒿,白弩箭药(维西)。

功效 块根;剧毒。祛风散寒,活络止痛。用于腰肌劳损,风湿关节痛。

## 7015078

*Aconitum nagarum* var. *heterotrichum* f. *dielsianum* (Airy-Shaw) W. T. Wang --- *A. bullatifolium* var. *dielsianum* (Airy-Shaw) Fletcher et Lauener

植物名 无距小白撑《中国植志》

药材名 小黑牛《名实图考》

地方名 云南:黄蜡一枝蒿。

功效 块根;剧毒。祛风湿,镇痛。

## 7015079

*Aconitum nagarum* var. *lasiandrum* W. T. Wang --- *A. subrosulatum* Hand. -Mazz.

植物名 宜威乌头《中国植志》

药材名 雪上一枝蒿《汇编》

文献名 弥勒乌头《中草药》

地方名 云南:草乌(宣威),一支蒿(富源)。

功效 块根;有毒。祛风,除湿,镇痛。

## 7015080

*Aconitum naviculare* (Bruhl.) Stapf

植物名 船盔乌头《中国植志》

药材名 榜嘎《民族药志》

文献名 船形乌头《西藏中草》

地方名 西藏:“榜嘎尔”(藏名)。

功效 块根或地上部分;有毒。清热利湿。用于各种传染病引起的热症,如肝炎,流感,天花,麻疹等。

## 7015081

*Aconitum nemorum* M. Pop.

植物名 林地乌头《中国植志》

药材名 草乌(新疆)

功效 块根;有毒。祛风止痛,散瘀消肿。

## 7015082

*Aconitum ouvardianum* Hand. -Mazz.

植物名 德钦乌头《中国植志》

功效 块根;有毒。在云南贡山一带居民用以制作箭毒。

## 7015083

*Aconitum ouvardianum* Hand. -Mazz. var. *pilopes* W. T. Wang et L. Q. Li

植物名 毛爪德钦乌头《迪庆藏药》

药材名 藏草乌《迪庆藏药》

地方名 云南:“榜那”(藏名)。

功效 块根;有大毒。退烧,止痛,缓下。用于流感,炭疽病,风湿痛;叶、花;有小毒。消炎,止痛。用于发热性疼痛,头痛,牙痛。

## 7015084

*Aconitum paniculigerum* Nakai

植物名 圆锥乌头《中国植志》

文献名 圆锥序乌头《中药志》

地方名 草乌头、草乌(东北)。

功效 块根;有毒。辽宁和吉林作草乌用。

## 7015085

*Aconitum paniculigerum* Nakai var. *wulingense* (Nakai) W. T. Wang --- *A. wulingense* Nakai

植物名 疏毛圆锥乌头《中国植志》

地方名 辽宁:草乌。

功效 块根;有毒。辽宁民间作草乌用。

## 7015086

*Aconitum pendulum* Busch --- *A. szechenyianum* Gay.

植物名 铁棒锤《中国植志》

药材名 铁棒锤《西北、西南》

文献名 黑草乌叶、黑草乌《药典》

地方名 雪上一支蒿(甘肃、四川、云南),铁牛七(陕西、西藏);陕西:八百棒;青海:草乌,野乌药,〔川乌〕,〔白芷〕,“门青”(藏名);四川:一支箭(若尔盖),三转半(茂汶)。

功效 块根;有大毒。祛风止痛,散瘀止血,消肿

拔毒。用于风湿关节痛,腰腿痛,跌打损伤,淋巴结核(未破),痈疮肿毒;叶:用于跌打损伤,痈肿,疮疖。

**7015087**

*Aconitum piepunense* Hand.-Mazz.

植物名 中甸乌头《中国植志》

地方名 云南:草乌(中甸)。

功效 块根:有毒。云南北部地区作草乌用。

**7015088**

*Aconitum polyschistum* Hand.-Mazz.

植物名 多裂乌头《中国植志》

药材名 大雪上一枝蒿《品种论述》

地方名 四川:一枝蒿、三转半(茂汶),铁棒锤,雪上一枝蒿。

功效 块根:有毒。镇痛,除湿消肿。用于跌打损伤,无名肿毒。

**7015089**

*Aconitum pomeense* W. T. Wang

植物名 波密乌头《中国植志》

地方名 西藏:“蓬阿那博”(藏名)。

功效 块根:有毒。镇痛,除湿消肿。

**7015090**

*Aconitum pseudogeniculatum* W. T. Wang

植物名 拟膝瓣乌头《中国植志》

药材名 大草乌(四川)

功效 块根:有毒。祛风散寒,除湿止痛。

**7015091**

*Aconitum pseudohuiliense* Chang ex W. T. Wang

植物名 雷波乌头《高植图鉴补编》

地方名 四川:草乌(雷波)。

功效 块根:有毒。作草乌用。

**7015092**

*Aconitum pseudostaphianum* W. T. Wang

植物名 拟玉龙乌头《中国植志》

地方名 云南:黑心解,堵喇。

功效 块根:解乌头毒。

**7015093**

*Aconitum pulchellum* Hand.-Mazz.

植物名 美丽乌头《中国植志》

文献名 小白撑《云南中草药》。

功效 块根:有毒。活血祛瘀,活络止痛。用于腰肌劳损,风湿关节痛。

**7015094**

*Aconitum pulchellum* Hand.-Mazz. var. *racemosum* W. T. Wang

植物名 长序美丽乌头《中国植志》

药材名 榜玛《迪庆藏药》

功效 根:消喉热,解毒。用于喉病,劳损发烧,肉食中毒,乌头中毒。

**7015095**

*Aconitum racemosum* Franch.

植物名 岩乌头《中国植志》

文献名 崖乌头草(叶《生药》)。

地方名 岩乌(四川、湖北);四川:铁攀乌(峨眉山),岩乌子(南川);贵州:雪上一枝蒿(清镇),小鸟头(毕节)。

功效 块根:有毒。镇痛。用于跌打损伤。

**7015096**

*Aconitum racemosum* var. *grandibracteolatum* W. T. Wang

植物名 巨苞岩乌头《中国植志》

文献名 巨苞乌头《高植图鉴》

地方名 四川:岩乌、岩乌头(峨眉山)。

功效 块根:有毒。祛风除湿。外用于疮毒。

**7015097**

*Aconitum raddeanum* Regel

植物名 大苞乌头《中国植志》

文献名 草乌《东北植药图志》

功效 块根:有毒。镇痛,镇痉。

**7015098**

*Aconitum richardsonianum* Lauener

植物名 直序乌头《中国植志》

地方名 西藏:“棚压好博”(藏名)。

功效 块根:用于风湿关节炎及炭疽病。

**7015099**

*Aconitum richardsonianum* var. *pseudosessiliflorum* (Lauener) W. T. Wang --- *A. richardsonianum* var. *crispulum* W. T. Wang

植物名 伏毛直序乌头《中国植志》

药材名 西藏草乌(拟)

文献名 草乌、细叶草乌《西藏中草》

功效 块根:有剧毒。用于风湿性关节炎等。

**7015100**

*Aconitum rotundifolium* Kar. et Kir.

植物名 圆叶乌头《中国植志》

药材名 草乌(新疆)

文献名 乌头《新疆药植志》。

地方名 新疆:“阿克泊泊”(维名)。

功效 块根:有毒。镇痛,除腐生肌。

**7015101**

*Aconitum scaposum* Franch.

植物名 花葶乌头《中国植志》

地方名 湖北:一口血(西部),笋尖七(巴东),〔苦参〕、草乌(兴山),土秦艽(神农架)。

功效 块根:有毒。祛风除湿。

**7015102**

*Aconitum scaposum* var. *hupehanum* Rapaics --- *A. jucundum* Diels

植物名 等叶花葶乌头《中国植志》

药材名 紫花牛扁《拉汉种称》

文献名 秀丽乌头《六盘山药录》,拟鞘柄乌头《神农架药录》

地方名 湖北:一口血(神农架)。

功效 根:有小毒。止痛止血,祛风胜湿。

**7015103**

*Aconitum scaposum* var. *vaginatum* (Pritz.) Rapaics --  
*A. vaginatum* Pritz.

植物名 聚叶花葶乌头《中国植志》

药材名 鞘柄牛扁《药学报》

文献名 藤儿七(叶《生药》), 鞘叶乌头《四川中草》,  
鞘柄乌头《高植图鉴》

地方名 活血莲(贵州、湖南、陕西、湖北), [穿心莲]  
(四川、云南); 湖北: 独儿七、笋尖七(西部), 一口血(神农架); 四川: 墨七、土莎莲、峨山草乌(峨眉山); 贵州:  
夜落金钱(梵净山)。

功效 根: 有小毒。行气止痛, 活血调经。用于胃痛, 月经不调, 跌打损伤, 骨折肿痛等。

备考 《新华本草纲要》(1988)将本种并入花葶乌头(*A. scaposum* Franch.)

#### 7015104

*Aconitum sczukinii* Turcz. -- *A. volubile* var. *latisectum* Regel

植物名 宽叶蔓乌头《中国植志》

药材名 藤乌头《高植图鉴》

文献名 草乌、宽叶乌头《东北植药图志》, 宽裂乌头  
《秦岭植志》, 宽裂蔓乌头《药学报》

地方名 陕西: 金牛七、火烟子(太白)。

功效 块根: 有毒。祛风除湿, 温经止痛。

#### 7015105

*Aconitum sessiliflorum* (Finet et Gagnep.) Hand.  
-Mazz.

植物名 缩梗乌头《中国植志》

药材名 铁棒七(四川若尔盖)

文献名 无梗乌头《云南种录》

地方名 四川: 雪上一枝蒿。

功效 块根: 有大毒。祛风, 除湿, 镇痛。

#### 7015106

*Aconitum shensiense* W. T. Wang

植物名 陕西乌头《中国植志》

药材名 铁牛七(陕西太白)

地方名 铁棒锤(甘肃、陕西); 陕西: [乌药], 火焰子  
(周至)。

功效 块根: 有大毒。祛风止痛, 散瘀消肿。

#### 7015107

*Aconitum sinomontanum* Nakai

植物名 高乌头《中国植志》

药材名 麻布七(陕西、湖北、四川)

文献名 穿心莲牛扁《药学报》, 穿心莲乌头《秦岭  
植志》, 穿心莲《云南种录》

地方名 破骨七、麻布袋(贵州、四川), 通天袋、通天  
袋(陕西、湖北); 河北: 龙蹄叶(内丘); 陕西: 九连环(太  
白山), 统仙袋、网子七、蓑衣七(白河), 背网子(平利),  
龙骨七(周至), 龙膝(山阳), 瓣子七、花花七(洵阳); 甘  
肃: 瓣子根; 湖北: 口袋七、麻布口袋、碎骨还阳、上秦艽  
(神农架), [秦艽](恩施); 贵州: 曲药; 云南: 七连环(镇  
雄)。

功效 根: 有毒。祛风除湿, 理气止痛, 活血散瘀。

用于风湿腰痛, 痧气腹痛, 胃痛, 心悸, 跌打损伤, 瘰癧,  
疮肿。

#### 7015108

*Aconitum sinomontanum* var. *angustum* W. T. Wang --

*A. angustum* W. T. Wang -- *A. lycoctonum* auct. non  
L.

植物名 狭盔高乌头《中国植志》

药材名 狭盔牛扁(拟)

文献名 扁特《唐本草》, 牛扁《图经》, 草乌、便特《植  
物名汇》, 丽人草《和汉药标本目录》, 九连环《药植简  
编》, 狼毒乌头《拉汉种称》

地方名 广西: 野草乌(全州); 四川: [狼毒](阿坝自  
治州)。

功效 根: 有毒。用于疮疖, 跌打损伤。

备考 有的文献学名误订为 *A. lycoctonum* L.

#### 7015109

*Aconitum sinonapelloides* W. T. Wang

植物名 拟缺刻乌头《中国植志》

地方名 四川: 草乌(西昌)。

功效 块根: 有大毒。祛风散寒, 镇痛。用于风湿  
关节痛, 挫伤, 局麻, 牙痛。

#### 7015110

*Aconitum soongaricum* Stapf

植物名 准噶尔乌头《中国植志》

药材名 草乌(新疆)

地方名 新疆: “阿克帕尔泊”(维名)。

功效 块根: 有毒。祛风除湿, 温经止痛。

#### 7015111

*Aconitum spicatum* Stapf -- *A. balfourii* auct. non Stapf

植物名 亚东乌头《中国植志》

药材名 黑草乌《药典》

文献名 藏草乌《药植简编》, 乌头《汇编》

地方名 西藏: “傍阿那布”(藏名), 草乌。

功效 块根: 有剧毒。用于风湿性关节炎等症。

备考 《西藏中草》学名误订为 *A. balfourii* Stapf

#### 7015112

*Aconitum stapfianum* Hand. -Mazz.

植物名 玉龙乌头《中国植志》

药材名 玉龙藤乌《云南种录》

地方名 藤乌(贵州、四川); 四川: 弩箭药(西昌),  
“都拉”(藏名); 云南: 黑心解(丽江、怒江), 草乌、乌头、  
藤子草乌(丽江)。

功效 块根: 有大毒。祛风除湿, 散寒止痛。用于  
风湿骨痛, 外伤红肿, 小儿麻痹后遗症, 皮炎。

#### 7015113

*Aconitum stramineiformum* Chang ex W. T. Wang

植物名 草黄乌头《迪庆藏药》、《中国植志》

药材名 藏草乌《迪庆藏药》

地方名 云南: “傍那”(藏名)。

功效 块根: 有大毒。退烧, 止痛, 缓下。用于流  
感, 炭疽病, 风湿痛; 叶、花: 有小毒。消炎, 止痛。用于  
发热性疼痛, 头痛, 牙痛。

## 7015114

*Aconitum stylosum* Stapf

植物名 显柱乌头《中国植志》  
地方名 云南:草乌(贡山),大草乌,小黑牛草(玉龙山)。  
功效 块根:有毒。云南西北部作草乌用。

## 7015115

*Aconitum sungpanense* Hand.-Mazz.

植物名 松潘乌头《中国植志》  
药材名 火焰子《陕西中草药》  
地方名 草乌(青海、甘肃、宁夏、陕西、云南),铁棒锤(甘肃、四川);陕西:千锤打(洋县),蔓乌药(略阳),蔓乌头、羊角七(安康),金牛七(凤县、太白山),〔乌药〕;四川:铁棒七(绵阳);云南:藤乌。

功效 块根:有大毒。祛风止痛,散瘀消肿。用于跌打损伤,风湿性关节炎。外用于痈疔肿毒。

## 7015116

*Aconitum taipaicum* Hand.-Mazz.

植物名 太白乌头《中国植志》  
药材名 金牛七《陕西中草药》  
地方名 陕西:铁棒锤,乌头,乌药。  
功效 块根:有大毒。祛风止痛,散瘀消肿。用于风湿疼痛,跌打损伤。

## 7015117

*Aconitum tanguticum* (Maxim.) Stapf

植物名 甘青乌头《中国植志》  
药材名 雪乌《四川》  
文献名 青藏乌头《秦岭植志》,康定乌头《拉汉种称》,康古特乌头、榜嘎《民族药志》  
地方名 陕西:山附子(太白);四川:辣辣草(马尔康),“翁阿鲁”(若尔盖藏名),“翁格尔”、“文格尔”(藏名)。  
功效 全草:有毒。清热解毒,止痛。用于肝炎,胆囊炎,肺炎,流感,食物中毒。

## 7015118

*Aconitum tenuicaule* W. T. Wang

植物名 细茎乌头《中国植志》  
药材名 藏草乌《迪庆藏药》  
地方名 云南:“榜那”(藏名)。  
功效 块根:有大毒。退烧,止痛,缓下。用于流感,炭疽病,风湿痛;叶、花:有小毒。消炎,止痛。用于发热性疼痛,头痛,牙痛。

## 7015119

*Aconitum tongolense* Ulbr.

植物名 新都桥乌头《中国植志》  
药材名 藏草乌《迪庆藏药》  
文献名 东俄洛乌头《中国植志》  
地方名 云南:“榜那”(藏名)。  
功效 块根:有大毒。退烧,止痛,缓下。用于流感,炭疽病,风湿痛;叶、花:有小毒。消炎,止痛。用于发热性疼痛,头痛,牙痛。

## 7015120

*Aconitum transectum* Diels

植物名 直缘乌头《中国植志》  
药材名 大草乌(云南丽江)  
文献名 横裂乌头《拉汉种称》  
地方名 云南:草乌、小黑牛(丽江),黑草乌。  
功效 块根:有毒。用于风湿。

## 7015121

*Aconitum tschangbaischanense* S. H. Li et Y. H. Huang  
---*A. artemisiaefolium* Bar. et Skv.

植物名 长白乌头《中国植志》  
药材名 草乌(吉林)  
文献名 蒿叶乌头《东检》  
功效 块根:有毒。吉林长白山区作草乌用。

## 7015122

*Aconitum umbrosum* (Korsh.) Kim. --- *A. paishanense* Kitag.

植物名 草地乌头《中国植志》  
药材名 黑大羌(内蒙古)  
文献名 阴地乌头《拉汉种称》  
地方名 内蒙古:大羌,马尾大羌,〔辫子秦羌〕。  
功效 块根:有毒。祛风除湿。

## 7015123

*Aconitum villosum* Reichb.

植物名 白毛乌头《中国植志》  
地方名 云南:草乌(大理)。  
功效 块根:有大毒。祛风除湿,温经止痛;叶:清热,消炎,止痛。

## 7015123a

*Aconitum vilmorinianum* Kom.

植物名 黄草乌《中国植志》  
药材名 大草乌(云南)  
文献名 昆明乌头《高植图鉴》,滇草乌、乌头《汇编》  
地方名 草乌(贵州、云南),藤草乌(四川、贵州);贵州:藤乌(水城);云南:小黑牛(景东),脱节参(固旧),昆明都喇,堵拉。  
功效 块根:有剧毒。祛风散寒,除湿止痛。用于跌打损伤,风湿,手足厥冷。

## 7015124

*Aconitum vilmorinianum* var. *altifidum* W. T. Wang ---  
*A. stapfianum* auct. non Hand.-Mazz.

植物名 深裂黄草乌《中国植志》  
药材名 藤乌(贵州)  
文献名 西南乌头《高植图鉴》  
地方名 贵州:紫金龙(威宁);云南:紫草乌,堵喇。  
功效 块根:有毒。驱风除湿,解毒镇痛。用于毒疮,风湿关节炎。

备考 《贵州草药》(1970)学名误订为 *A. stapfianum* Hand.-Mazz.;《新华本草纲要》(1988)将本种并入紫乌头(*A. episopale* Levl.)

## 7015125

*Aconitum volubile* Pall. ex Koelle

植物名 蔓乌头《中国植志》

药材名 藤草乌《品种论述》

文献名 狭叶蔓乌头《东检》, 细茎蔓乌头《东北植物志》, 草乌头《汉药写真集成》, 羊角七、藤儿乌(叶《生药》), 藤乌头(拉汉种称)

地方名 草乌(东北); 黑龙江: 鸡头草; 陕西: 照地红(宝鸡), 火烟子、野乌药(太白); 甘肃: 五毒花根, 乌头, 黑附子; 广西: 百宝丹; 四川: “真哈”(藏名)。

功效 块根; 有毒。镇痛镇静。用于神经痛, 风湿痛。

#### 7015126

*Aconitum volubile* var. *pubescens* Regel---*A. ciliare* DC.

植物名 卷毛蔓乌头《中国植志》

地方名 草乌(东北)。

功效 块根; 有毒。镇痛镇静。

#### 7015127

*Aconitum wardii* Fletcher et Lauener --- *A. wardii* f. *flavidum* Fletcher et Lauener

植物名 滇川乌头《中国植志》

药材名 滇川牛扁《迪庆藏药》

文献名 卡普的洛《迪庆藏药》

功效 地上全草; 清热。用于肺疫热, 感冒咳嗽。

#### 7015128

*Aconitum yangii* W. T. Wang et L. Q. Li

植物名 竞生乌头《迪庆藏药》

药材名 藏草乌《迪庆藏药》

地方名 云南: “榜那”(藏名)。

功效 块根; 有大毒。退烧, 止痛, 缓下。用于流感, 炭疽病, 风湿痛; 叶、花: 有小毒。消炎, 止痛。用于发热性疼痛, 头痛, 牙痛。

#### 7015129

*Aconitum yangii* W. T. Wang et L. Q. Li var. *villosulum* W. T. Wang et L. Q. Li

植物名 展毛竞生乌头《迪庆藏药》

药材名 藏草乌《迪庆藏药》

地方名 云南: “榜那”(藏名)。

功效 块根; 有大毒。退烧, 止痛, 缓下。用于流感, 炭疽病, 风湿痛; 叶、花: 有小毒。消炎, 止痛。用于发热性疼痛, 头痛, 牙痛。

#### 7015130 见 7015002a

#### 7015131 见 7015123a

#### 7015132

*Actaea asiatica* Hara --- *A. spicata* L. var. *asiatica* (Hara) S. H. Li et Y. H. Huang

植物名 类叶升麻《中国植志》

药材名 绿豆升麻(四川、贵州)

地方名 白毛三七(甘肃、四川), 升麻(四川、湖北); 湖北: 绿衣升麻(利川), 红升麻(巴东、神农架); 四川: 野春芽、野黄连(达县), 小绿升麻(峨眉山); 贵州: 马尾升麻(松桃)。

功效 根茎, 全草; 祛风止咳, 清热解毒。用于感冒头痛, 百日咳。外用于犬咬伤。

#### 7015133

*Actaea erythrocarpa* Fisch.

植物名 红果类叶升麻《中国植志》

功效 根茎; 祛风止咳, 清热解毒。

#### 7015134

*Adonis aestivalis* L.

植物名 夏侧金盏花《中国植志》

药材名 夏福寿草(拟)

文献名 夏日神草(叶《生药》)

功效 全草; 强心。

#### 7015135

*Adonis amurensis* Regel et Radde

植物名 侧金盏花《桂海虞衡志》、《中国植志》

药材名 冰凉花(东北)

文献名 献岁菊《台湾府志》, [雪莲]《西域见闻录》, 长春菊《事物纪原》, 岁菊《漳州府志》, 福寿草《现代实用中药》

地方名 冰里花、顶冰花、[雪莲花](东北); 吉林: 冰郎花。

功效 全草; 强心, 利尿, 镇静。用于急性和慢性心功能不全, 心脏性水肿, 癫痫。

#### 7015136

*Adonis brevistyla* Franch. --- *A. davidi* Franch. --- *A. delavayi* Franch.

植物名 短柱侧金盏花《中国植志》

药材名 短柱福寿草《药学报》

文献名 短柱侧金盏《云南种录》

地方名 四川: 水黄连, 金山水黄连。

功效 全草; 强心。用于黄疸, 咳嗽, 哮喘, 解热毒。

#### 7015137

*Adonis chrysocytha* Hook. f. et Thoms.

植物名 金黄侧金盏花《中国植志》

药材名 新疆福寿草(拟)

文献名 金色冰凉花《新疆药志》

地方名 新疆: 福寿草、侧金盏花。

功效 根或全草; 强心, 利尿, 镇静。用于心悸, 充血性心力衰竭等。

#### 7015138

*Adonis coerulea* Maxim.

植物名 蓝侧金盏花《中国植志》

药材名 蓝花福寿草(拟)

文献名 蓝花侧金盏《高植图鉴》

地方名 甘肃: 侧金盏花; 青海: “贾子豆罗”(藏语)。

功效 全草; 外用于疮疥, 牛皮癣等。

#### 7015139

*Adonis sibirica* Patr. ex Ledeb.

植物名 北侧金盏花《中国植志》

药材名 西伯利亚福寿草(拟)

地方名 内蒙古: 西伯利亚冰里花(兴安岭)。

功效 全草; 强心, 利尿, 镇静。

#### 7015140

*Adonis sutchuenensis* Franch.

植物名 蜀侧金盏花《中国植志》

药材名 四川福寿草(拟)

文献名 四川侧金盏《汇编》

地方名 陕西:毛黄连,毛连。

功效 全草:有小毒。清热燥湿,镇静。用于痢肿疮毒,目赤肿痛,呕吐泻痢,心悸不眠,癫痫。

#### 7015141

*Adonis tianschanica* (Adolf) Lipsch.

植物名 天山侧金盏花《中国植志》

药材名 天山福寿草(拟)

地方名 新疆:福寿草。

功效 全草:强心,利尿,镇静。

#### 7015142

*Adonis vernalis* L.

植物名 春侧金盏花《中国药植志》

药材名 春福寿草(楼《生药》)

文献名 春日神草(叶《生药》),西洋福寿草(小泉《药植》)。

功效 全草:强心,利尿,镇静。

#### 7015143

*Anemone altaica* Fisch. ex C. A. Mey.

植物名 阿尔泰银莲花《中国植志》

药材名 九节离(河南)

文献名 九节夫《中国药植图鉴》,菊形双瓶梅《中药志》,太原菖、京菖蒲、陕西菖、九节菖《药材学》,寸菖蒲、节蒲《品种论述》

地方名 九节菖蒲(山西、陕西),〔石菖蒲〕(山西、宁夏、湖北),菖蒲(山西、甘肃、河南),小菖蒲、外菖蒲(广东、四川),京玄参(山西、陕西、四川);山西:节菖蒲,九节难;陕西:玄参(太白山),鸡瓜莲(华阴),菊叶双瓶梅;甘肃:金玄参;新疆:“依格尔”(维名);湖北:穿骨七。

功效 根茎:开窍化痰,醒脾安神。用于热病神昏,癫痫,神经官能症,耳鸣耳聋,胸闷腹胀。外用于疔疮疮癰。

备考 “九节菖蒲”在历代本草文献中均指天南星科石菖蒲(*Acorus gramineus* Soland.)的根茎,非本品。

#### 7015144

*Anemone amurensis* (Korsh.) Kom.

植物名 黑水银莲花《中国植志》

药材名 东北银莲花草(拟)

文献名 黑龙江银莲花《高植图鉴》

功效 全草:用于麻痹,月经不调,胃痛,痛风,积水,百日咳等。

#### 7015145

*Anemone begoniifolia* Levl. et Vant.

植物名 卵叶银莲花《中国植志》

药材名 卵叶银莲花草(拟)

文献名 卵叶双瓶梅《云南种录》

地方名 云南:“迷香规羽”(红河)。

功效 全草:外用于疮毒。

#### 7015146

*Anemone davidii* Franch.

植物名 西南银莲花《中国植志》

药材名 铜骨七《四川中草》

地方名 四川:血乌(峨边),草乌(天全),疔药(川西),铜灯台、海螺七(南川),鹅掌草、草乌子(峨眉山);贵州:白接骨莲、红接骨莲、棉絮头(梵净山),戛戛羊(安顺),饿老虎(镇远),钻骨风(德江)。

功效 根茎:活血祛瘀,补肾壮阳。用于跌打损伤,腰肌劳损,阳痿。外用于疔疮,尤名肿毒。

#### 7015147

*Anemone demissa* Hook. f. et Thoms.

植物名 展毛银莲花《中国植志》

药材名 垂枝莲《西北》

文献名 垂枝银莲花《四川野生经济志》

地方名 青海:“素嘎”(藏名);四川:垂枝银莲;云南:高山雪莲花,〔毛茛〕,小将军(玉龙山)。

功效 籽、茎叶:有毒。外用于体癣,创伤,防腐杀菌;根茎:用于疟疾,恶疮。

#### 7015148

*Anemone dichotoma* L.

植物名 二歧银莲花《中国植志》

药材名 银莲花根(拟)

地方名 〔土黄芩〕(吉林、贵州);吉林:银莲花(兴安);贵州:〔白头翁〕、见风青、见风兰、鬼打青、乌骨鸡、野棉花(贵阳),羊九,狗脚迹。

功效 根茎:解毒止痢,舒筋活血。用于痢疾,跌打损伤,风湿关节炎。外用于疮痍肿毒。

#### 7015149

*Anemone flaccida* F. Schmidt --- *A. baicalensis* var. *laevigata* Gray --- *A. laevigata* (Gray) Koidz.

植物名 鹅掌草《中国植志》

药材名 地乌《贵州民间药物》

文献名 林荫银莲花《高植图鉴》

地方名 浙江:二轮草,二轮七,蜈蚣三七(临安);四川:草乌子(峨眉山);贵州:黑地雷、地雷(贵阳),金串珠。

功效 根茎:解毒,祛风除湿。用于风湿痛,跌打损伤。

#### 7015150

*Anemone howellii* Jerr. et W. W. Smith

植物名 拟卵叶银莲花《中国植志》

药材名 腾冲银莲花根(拟)

文献名 腾冲秋牡丹《云南种录》

地方名 云南:黄升麻(保山)。

功效 根:解热止痛。

#### 7015151

*Anemone hupehensis* Lem. --- *Anemone japonica* auct. non Sieb. et Zucc.

植物名 打破碗花花《中国植志》

药材名 打破碗花花《四川中草》

文献名 野棉花、铁线海棠《名实图考》,湖北秋牡丹

## 《经植手册》

地方名 秋牡丹(陕西、湖北、西南), 秋芍药、压竹花(西南), 青水胆(陕西、湖南); 陕西: 一把抓、大头翁、山棉花、大草花、拐角七、铁蒿、(漏芦); 甘肃: 白头翁; 湖北: 满天飞、盖头花、铁钎、铁丝筋(巴东); 湖南: 五雷火、断根草、野棉花树、遍地爬(黔阳); 四川: 重庆白头翁、野棉花根(重庆), 棉花草、打破碗子、打破碗(成都); 贵州: 霸王草(湄潭), 猫爪草(乐业), 五匹风; 云南: 老鼠棉花衣(龙陵)。

功效 根茎及鲜草: 有毒。利湿, 驱虫, 祛瘀。用于痢疾, 肠炎, 蛔虫病, 跌打损伤。外用于体癣, 脚癣, 灭蛆、孑孓。

备考 《中国药植志》(1955)学名误订为 *Anemone japonica* Sieb. et Zucc.

## 7015152

*Anemone hupehensis* Lem. f. *alba* W. T. Wang

植物名 水棉花《中国植志》

药材名 白背打破碗花花(拟)

文献名 白背湖北银莲花《药植简编》, 打破碗花花、秋芍药、野秋牡丹《中草药学》

地方名 山棉花(陕西、云南); 陕西: 火草花(略阳、勉县); 广西: 猫爪草; 四川: 一扫光; 贵州: 五匹风; 云南: 野棉花(红河、屏边), 满天星(昆明), 花升麻、绿升麻(楚雄), 老鼠棉花衣(龙陵)。

功效 根、叶: 有毒。清热除湿, 活血祛瘀, 截疟。用于痢疾, 疟疾, 淋病, 难产, 死胎, 食积, 风湿关节痛, 外伤所致内出血。外用于疮疡。

## 7015153

*Anemone hupehensis* var. *japonica* (Thunb.) Bowles et Stearn --- *A. japonica* (Thunb.) Sieb. et Zucc.

植物名 秋牡丹《中国植志》

药材名 秋牡丹根(拟)

文献名 压竹花《名实图考》, 秋芍药《花镜》, 一扫光、单臂草《中草药图谱》

地方名 野棉花(湖南、四川、贵州、云南); 陕西: (漏芦); 上海: 四川白头翁; 浙江: 吹牡丹、土牡丹(临安), 山菊花(淳安、临安), 胡菊花(丽水); 湖南: 小野棉花、五雷火、遍地爬; 四川: 打破碗花(西昌), 打破碗花花(成都、西昌), 打破碗根、火草根(成都), 白头翁, 重庆白头翁, 野棉花根; 贵州: 六月寒。

功效 根茎及鲜草: 有毒。利湿, 驱虫, 祛瘀。用于钩虫病, 疟疾, 感冒, 防治流感。外用于股癣, 体癣。

## 7015154

*Anemone imbricata* Maxim. --- *A. obtusiloba* D. Don ssp. *imbricata* (Maxim.) Bruhl

植物名 叠裂银莲花《中国植志》

地方名 青海: “素嘎”(藏名)。

功效 花、茎、叶: 用于消炎, 烧伤。

## 7015155

*Anemone obtusiloba* D. Don

植物名 钝裂银莲花《中国植志》

地方名 青海: “素杂哇”(藏名)。

功效 叶、花、果、根及根皮: 补血, 暖体, 消积, 去湿, 愈疮, 排脓。用于病后体温不足, 淋病, 慢性气管炎, 末梢神经麻痹。外用于关节积黄水, 黄水疮。

## 7015156

*Anemone obtusiloba* ssp. *ovalifolia* Bruhl --- *A. geum* Levl. --- *A. ovalifolia* (Bruhl) Hand. -Mazz.

植物名 疏齿银莲花《中国植志》

文献名 卵叶银莲花《秦岭植志》, 钝裂银莲花《高植图鉴》

地方名 陕西: 毛叶千紫花(太白)。

功效 全草: 止血。

## 7015157

*Anemone raddeana* Regel

植物名 多被银莲花《中国植志》

药材名 两头尖《品汇精要》、《药典》

文献名 竹节香附《药典》, 关东银莲花《经植手册》, 红背银莲花《东北药植原色图志》

地方名 黑龙江: 芮草玉梅; 山东: 老鼠屎(烟台、昆嵛山)。

功效 根茎: 有毒。祛风湿, 消痈肿。用于风寒湿痹, 四肢拘挛, 骨节疼痛, 痈肿溃烂。

## 7015158

*Anemone reflexa* Steph. --- *A. altaica* auct. non Fisch.

植物名 反萼银莲花《中国植志》

药材名 反萼银莲花根(拟)

功效 根茎: 开窍化痰, 醒脾安神。

备考 《陕西中草药》图 341(1971)学名误订为 *A. altaica* Fisch.

## 7015159

*Anemone rivularis* Buch.-Ham. ex DC.

植物名 草玉梅《名实图考》、《中国植志》

药材名 虎掌草《滇南本草》、《汇编》

文献名 溪畔银莲花、五朵云、宿嘎《高植图鉴》

地方名 见风青、见风蓝(贵州、云南), 野棉花(广西、云南、西藏); 陕西: 土黄芹(凤县); 湖北: 水乌头(五峰), 铁橛、老虎掌(神农架); 广西: 鹅掌草(靖西), 五倍叶, 打破碗花花; 四川: 老虎爪, 施必, 小霸王(盐边), 散血草, 铁灯台(宁南), 鬼打青(峨眉山); 贵州: 羊九(贵阳、遵义), [土黄芩](清镇), 地丁子(惠水), 乌骨鸡, 狗脚迹; 云南: 汉虎掌(临沧、丽江), 土黄芪、大狗脚迹(彝良、昭通), 小绿升麻、见风黄(保山), 密马常、野鸡菜(文山), 白花虎掌草(文山、红河), 白花舌头草(昆明), 虎掌叶(昭通、怒江), 摆子草(丽江), [黄芩](龙陵、腾冲), 破旧草(彝良); 西藏: “素杂哇”(阿里藏名); 其他: [白头翁]。

功效 根茎: 有小毒。清热解毒, 止咳祛痰, 截疟。用于咽喉肿痛, 咳嗽痰多, 淋巴结炎, 痢疾。

## 7015160

*Anemone rivularis* var. *flore-minore* Maxim. --- *A. rivularis* var. *barbulata* --- *A. barbulata* Turcz. ex Fedts.

植物名 小花草玉梅《中国植志》

药材名 小花草玉梅根(拟)



文献名 河岸银莲花《品种论述》

地方名 陕西:土黄芹(凤县),头角莲(宁陕),山辣椒;甘肃:[白头翁];宁夏:破牛膝;湖北:灯台七、九牛造(神农架)。

功效 根茎:健胃消食,散瘀消积。用于肝炎,阴疽。外用于瘀肿作痛。

#### 7015161

*Anemone rossii* S. Moore

植物名 细茎银莲花《中国植志》

药材名 小银莲花根(拟)

文献名 小银莲花《东北草本植志》,朝鲜银莲花、散风散《药植简编》

功效 根茎:祛风湿,消痈肿。

#### 7015162

*Anemone rupicola* Camb.

植物名 岩生银莲花《中国植志》

药材名 岩秋牡丹根(拟)

文献名 岩秋牡丹《云南种录》,岩银莲花《经植手册》,石龙芮《云南药录》

功效 根茎:用于恶疮,疟疾。

#### 7015163

*Anemone stolonifera* Maxim.

植物名 匍枝银莲花《中国植志》

药材名 匍枝银莲花草(拟)

文献名 走茎银莲花《植分学报》,三花白头翁《台湾药植志》

地方名 台湾:三轮草。

功效 全草:镇静,镇痛。

#### 7015164

*Anemone tomentosa* (Maxim.) Pei --- *A. japonica* var. *tomentosa* Maxim. --- *A. vitifolia* var. *tomentosa* (Maxim.) Finer et Gagnep.

植物名 大火草《中国植志》

药材名 大火草根《中药大辞典》

文献名 绒毛秋牡丹《云南种录》

地方名 野棉花(陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、云南),毛秋牡丹(陕西、甘肃、宁夏、四川),山棉花(甘肃、河南),[白头翁](甘肃、宁夏);陕西:大头翁(太白);甘肃:[漏芦](兰州),打火草;宁夏:打破碗花花;广西:秋芍药;四川:土白头翁(重庆),野棉花根。

功效 根:有小毒。化痰,散瘀,截疟,杀虫。用于疮疖痈肿,顽癣,疟疾,痢疾,劳伤咳嗽,小儿疳疾,跌打损伤。

#### 7015165

*Anemone trullifolia* Hook. f. et Thoms. var. *linearis* (Bruhl) Hand. -Mazz. --- *A. trullifolia* var. *souliei* Finet et Gagnep.

植物名 条叶银莲花《中国植志》

药材名 条叶银莲花根(拟)

文献名 “布尔青”(藏名)《青藏药图》

功效 花、根:用于慢性气管炎,末梢神经麻痹;全草:用于背部及脊椎骨痛。

#### 7015166

*Anemone vitifolia* Buch. -Ham. ex DC.

植物名 野棉花《中国植志》

药材名 野棉花《滇南本草》、《汇编》

文献名 满天星《滇南本草》,山棉花《鉴别手册》

地方名 [漏芦](陕西、甘肃),[白头翁](陕西、甘肃、四川、河南),打破碗花花(湖南、四川、云南);湖南:铁蒿(古丈),清水胆(新晃),小野棉花(永顺);四川:土白头翁(南川);云南:水棉花,接骨莲,野牡丹、大星宿草(昆明),土羌活(昆明、曲靖)。

功效 根茎:有小毒。祛风散瘀,利湿,驱虫,截疟。用于跌打损伤,风湿骨节痛,肠炎,痢疾,蛔虫病,疟疾,黄疸,胃寒痛,咳嗽气喘,内外伤出血。

#### 7015167

*Aquilegia atrovinosa* M. Pop. ex Gamajun

植物名 暗紫楼斗菜《中国植志》

地方名 新疆:楼斗菜。

功效 全草:有小毒。清热凉血,调经止痛,止痢。用于月经不调,腹痛,功能性子宫出血,痢疾。

#### 7015168

*Aquilegia ecalcarata* Maxim. --- *Semiaquilegia simulatrix* Drumm. et Hutch.

植物名 无距楼斗菜《中国植志》

药材名 野前胡《贵州草药》

地方名 陕西:黄风;四川:官前胡;贵州:千年耗子屎(梵净山)。

功效 根或全草:清热解表,生肌拔毒。用于感冒头痛,黄水疮久不收口。

#### 7015169

*Aquilegia incurvata* Hsiao

植物名 秦岭楼斗菜《中国植志》

药材名 银扁担《陕西中草药》

地方名 陕西:灯笼草。

功效 根:有小毒。祛瘀生新,镇痛祛风。

#### 7015170

*Aquilegia oxysepala* Trautv. et Mey.

植物名 尖萼楼斗菜《中国植志》

文献名 漏斗菜《东北中草》

地方名 血见愁(吉林、黑龙江),大姜真苗(华北);吉林:楼斗菜;黑龙江:猫爪花,猫爪草。

功效 带根全草:通经活血。

#### 7015171

*Aquilegia oxysepala* f. *pallidiflora* (Nakai) Kitag.

植物名 黄花尖萼楼斗菜《中国植志》

功效 带根全草:通经活血。

#### 7015172

*Aquilegia oxysepala* var. *kansuensis* Bruhl

植物名 甘肃楼斗菜《中国植志》

药材名 石蛋七(湖北)

地方名 湖北:大铁造(巴东)。

功效 全草:清热败火。用于牙痛,喉痛。

#### 7015173

*Aquilegia parviflora* Ledeb.

植物名 小花楼斗菜《中国植志》

药材名 楼斗菜《汇编》

地方名 漏斗菜(东北);辽宁:钩钩(庄河);黑龙江:〔血见愁〕(漠河),猫爪花。

功效 带根全草;调经止血。用于月经不调,经期腹痛,功能性子宫出血,产后流血。

7015174

*Aquilegia viridiflora* Pall.

植物名 楼斗菜《中国植志》

药材名 楼斗菜《救荒本草》

地方名 血见愁(黑龙江、内蒙古),漏斗菜(东北),小姜真苗(华北);陕西:乌梢抄;内蒙古:“乌日勒其-乌布斯”(蒙名)。

功效 带根全草;调经止血,清热解毒。用于月经不调,功能性子宫出血,痢疾,腹痛。

7015175

*Aquilegia yabeana* Kitag. --- *A. oxysepala* var. *yabeana* (Kitag.) Munz

植物名 华北楼斗菜《中国植志》

药材名 紫花菜(山东)

文献名 紫霞楼斗《中国经植志》,热河楼斗菜《沈阳学报》

地方名 山西:五岭花(中阳);山东:什锦子菜(泰山);湖北:小前胡、木兰(神农架)。

功效 根;祛风表寒。用于风寒感冒。

7015176

*Asteropyrum cavaleriei* (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch. --- *Isopyrum cavakriei* Levl. et Vant.

植物名 裂叶星果草《中国植志》

药材名 鸭脚黄连《广西中药志》

地方名 广西:五角莲,〔鸡爪莲〕、〔黄连〕(资源),土黄连(全州、大瑶山);四川:地黄连,一颗星(峨眉山);贵州:水黄连(松桃),水八角(贵阳);其他:鸡脚莲。

功效 带根全草;清热解毒,除湿利水。用于细菌性痢疾,急性肠炎,黄疸,腹水,急性结膜炎;全草:用于疮疡溃烂,外伤出血。

7015177

*Asteropyrum peltatum* (Franch.) Drumm. et Hutch.

植物名 星果草《中国植志》

药材名 地黄连(四川)

文献名 盾形星果草《品种论述》

地方名 湖北:土黄连(神农架)。

功效 带根全草;清热解毒,泻火。

7015178

*Atragene tianschanica* N. Favl

植物名 天山赛铁线莲《北方中草药》

功效 藤茎:用于闭经,乳汁不通,肾炎水肿,胞衣不下。

7015179

*Beesia calthaefolia* (Maxim.) Ulbr. --- *Cimicifuga calthaefolia* Maxim.

植物名 铁破锣《中国植志》

药材名 铁破锣《汇编》

文献名 苘片美花草《广西植录》,单叶升麻《高植图鉴》

地方名 土黄连(陕西、甘肃),贝西花(陕西、甘肃、广西、四川、贵州),一口血(陕西、河南);陕西:野大救驾,真紫苑(镇坪、镇巴),太白黄连、黄三七(太白山),鸡爪黄连(凤县),葫芦七(洋县、佛坪);甘肃:白毛三七,山黄连(文县);湖北:金耳还阳(恩施),就地还阳、先苦后甜、铁牛七(神农架);四川:咬菜(南江),马蹄细辛(峨眉山),土细辛,白细辛,猴儿七,岩黄连;贵州:定木香(松桃);云南:〔滇豆根〕、〔山豆根〕(丽江、大理),〔细辛〕(丽江)。

功效 根茎:祛风散热,清热解毒,镇痛。用于风热感冒,风湿骨痛,目赤肿痛,咽喉痛。外用于疮疖。

7015180

*Calathodes oxycarpa* Sprague

植物名 鸡爪草《中国植志》

药材名 鸡爪草《四川中药志》

功效 全草:祛风除湿,解毒消炎。用于风湿麻木,瘰癧。

7015181

*Calathodes polycarpa* Ohwi

植物名 多果鸡爪草《中国植志》

药材名 多果鸡爪草《贵州药录》

功效 全草:用于风湿麻木,鸡爪风,瘰癧。

7015182

*Callianthemum taipaicum* W. T. Wang

植物名 太白美花草《中国植志》

药材名 重叶莲《陕西中草药》

功效 全草:清热解毒。用于小儿肺炎。

7015183

*Caltha natans* Pall.

植物名 白花驴蹄草《中国植志》

功效 全草:外用于皮肤病,烫伤。

7015184

*Caltha palustris* L.

植物名 驴蹄草《中国植志》

药材名 驴蹄草《汇编》

文献名 猿猴草《中国植物图鉴》

地方名 黑龙江:驴蹄菜(哈尔滨);甘肃:白细辛;浙江:马蹄草(天目山);四川:“当啷呼热”(藏名),〔土细辛〕(绵阳),土紫苑,马蹄叶;贵州:〔小马蹄当归〕(梵净山),水葫芦(绥阳),水八角、人头发(贵阳),立金花;其他:獐耳细辛,驴蹄子草。

功效 全草:有毒。祛风止痛,清热利湿,解毒。用于头风疼痛,风湿关节痛。外用于烧烫伤,毒蛇咬伤。

7015185

*Caltha palustris* var. *membranacea* Turcz. --- *C. membranacea* (Turcz.) Schipcz. --- *C. membranacea* var. *grandiflora* S. H. Li et Y. H. Huang

植物名 膜叶驴蹄草《中国植志》  
 药材名 薄叶驴蹄草《东检》  
 文献名 大花驴蹄草《东北草本植志》  
 地方名 黑龙江: 猴猴草; 陕西: 假细辛(陇县); 浙江: 马蹄草、驴蹄草(东天目)。  
 功效 全草、根; 用于发痧, 跌伤, 扭伤, 皮肤病。

## 7015186

*Caltha palustris* var. *sibirica* Regel --- *C. sibirica* (Regel) Tolm.

植物名 三角叶驴蹄草《中国植志》  
 文献名 驴蹄草《东北草本植志》  
 功效 全草; 有毒。用于热病, 瘰癧。外用于烧伤, 化脓性创伤, 皮肤病。

## 7015187

*Caltha scaposa* Hook. f. et Thorns. --- *C. palustris* L. var. *scaposa* Maxim.

植物名 花葶驴蹄草《中国植志》  
 药材名 小驴蹄草《高原中草》  
 文献名 马蹄叶《四川中药志》, 多蕊驴蹄草《四川野生经植志》  
 地方名 四川: “当啷啷热”(藏名), [紫苑](达县), 驴蹄草(若尔盖)。

功效 全草: 祛风止痛, 清热利湿, 解毒。用于头风疼痛, 风湿关节痛。外用于烧、烫伤, 毒蛇咬伤。

## 7015188

*Cimicifuga acerina* (Sieb. et Zucc.) Tanaka

植物名 小升麻《中国植志》  
 药材名 小升麻(河北、四川)  
 文献名 槭叶升麻《中草药学》, 竹根漆、回龙七《植物名汇》, 金龟草《秦岭植志》  
 地方名 绿升麻(河北、湖北、四川), 马蹄草、三叶升麻(四川、贵州), 五角莲(陕西、浙江), 升麻(四川、湖北); 河北: 小北升麻; 陕西: 三面刀, 开喉箭、茶七(平利), 上天梯, 土黄连, 鸡爪连(柞水), 帽瓣七, 黑三七(镇坪), 马蹄七(旬阳); 甘肃: 白毛三七; 浙江: 金丝三七(天目山); 湖北: 米升麻(鹤峰), 白升麻(五峰), 万年根(巴东); 四川: 拐枣七(金佛山), 棉花七, 熊掌七, 南川升麻, 大叶升麻(峨眉山); 贵州: 黑八角莲、黑细辛(大方)。

功效 根茎: 有小毒。清热解毒, 活血消肿, 理气止痛, 降压。用于咽喉肿痛, 劳伤, 跌打损伤, 高血压。

## 7015189

*Cimicifuga acerina* f. *purpurea* Hsiao

植物名 紫花小升麻《中国植志》  
 文献名 紫花金龟草《秦岭植志》  
 功效 根: 散风解毒。用于咽喉干痛, 胃热等。

## 7015190

*Cimicifuga brachycarpa* Hsiao

植物名 短果升麻《中国植志》  
 药材名 短果升麻《贵州药录》  
 功效 根茎: 清热解毒, 疏风发汗。用于胃冷痛, 斑疹不透。

## 7015191

*Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim.

植物名 兴安升麻《中国植志》  
 药材名 升麻《药典》  
 文献名 鬼脸升麻《纲目》, 地龙芽《盛京通志》, 苦龙芽菜《铁岭县志》, 东北升麻《中国药植图鉴》, 鸦脚七《满蒙植汇》, 绿升麻《鉴别手册》

地方名 北升麻(河北、北京、山西), 窟窿牙根(东北、河北、内蒙古), 苦老菜根、龙眼根、龙牙根、牯牛卡根、牯牛卡架、苦升菜(东北); 北京: 苦力芽根, 壮菜(百花山); 河北: 苦力芽(承德), 苦菜根、龙芽菜(张家口), 苦菜秧, 苦壮, 龙芽; 山西: 臭麻(晋中专区); 内蒙古: “布力叶-乌布斯”、“普如木槽”(蒙名); 陕西: 黑升麻(太白)。

功效 根茎: 发表透疹, 清热解毒, 升举阳气。用于风热头痛, 齿痛, 口疮, 咽喉肿痛, 阳毒发斑, 脱肛, 子宫脱垂。

## 7015192

*Cimicifuga foetida* L.

植物名 升麻《中国植志》  
 药材名 升麻《本经》、《药典》  
 文献名 周升麻《本经》, 鸡骨升麻《本草经集注》, 鬼脸升麻、川升麻《纲目》, 绿升麻《医学广笔记》, 龙眼根《简明中医辞典》

地方名 臭麻(华北), 西升麻(西北); 陕西: 黑升麻(太白); 甘肃: 攀道争, 紫升麻; 安徽: 毫升麻; 湖北: 狗尾升麻(巴东), 空升麻; 四川: 火麻草; 贵州: 毛药; 西藏: “甲恣独罗”(藏名); 其他: 鸭脚七(俗), 马尿杆, 火筒杆。

功效 根茎: 发表透疹, 清热解毒, 升举阳气。用于风热头痛, 齿痛, 口疮, 咽喉肿痛, 阳毒发斑, 脱肛, 子宫脱垂。

## 7015193

*Cimicifuga foetida* var. *foliolosa* Hsiao

植物名 多小叶升麻《中国植志》  
 文献名 升麻《中国经植志》, 绿升麻、鸡骨升麻《陕甘宁青中草药选》  
 地方名 青莓: “当更那保”(藏名), 马尿杆, 火筒杆。  
 功效 根茎: 发表透疹, 升阳举陷, 解毒。

## 7015194

*Cimicifuga foetida* var. *velutina* Franch. ex Finet et Gagnep.

植物名 毛叶升麻《中国植志》  
 药材名 毛叶升麻《中药志》  
 功效 根茎: 发表透疹, 清热解毒, 升举阳气。

## 7015195

*Cimicifuga heracleifolia* Kom.

植物名 大三叶升麻《中国植志》  
 药材名 升麻《药典》  
 文献名 绿升麻《鉴别手册》  
 地方名 关升麻、龙眼根、牯牛架根、牯牛卡架、窟窿牙根、苦力芽(东北)。

**功效** 根茎：发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑，脱肛，子宫脱垂。

**7015196**

*Cimicifuga nanchuenensis* Hsiao

植物名 南川升麻《中国植志》

地方名 四川：绿豆升麻(南川)。

**功效** 根茎：发表透疹，清热解毒，升举阳气。

**7015197**

*Cimicifuga simplex* Wormsk.

植物名 单穗升麻《中国植志》

药材名 细条升麻(拟)

文献名 野菜升麻《经植手册》，毛三七《满蒙植汇》，升麻《汇编》

地方名 臭麻(华北)；辽宁：龙眼根，牯牛卡架；浙江：野升麻、大叶毛狼(临安)；湖北：羽叶升麻(神农架)；四川：绿升麻，绿豆升麻，正升麻(南川)。

**功效** 根茎：发表透疹，清热解毒，升举阳气。

**7015198**

*Clematis acutangula* Hook. f. et Thoms.

植物名 锐角发汗藤《云南种录》

地方名 云南：细麦藤(镇康)。

**功效** 根茎：通淋利尿。

**7015199**

*Clematis aethusifolia* Turcz.

植物名 芹叶铁线莲《中国植志》

文献名 透骨草《经植手册》，细叶铁线莲《华北经植志要》

地方名 北京：白拉秧秧，驴断肠；内蒙古：断肠草，狗肚子筋，“那日布其·敦日牙木格”(蒙名)；青海：“叶芒朵保”(藏名)。

**功效** 全草：有毒。祛风利湿，解毒止痛。用于风湿筋骨疼痛，下肢浮肿，痈疽肿毒。用于胃包囊虫，肝包囊虫病。

**7015200**

*Clematis aethusifolia* var. *latisepta* Maxim.

植物名 宽芹叶铁线莲《中国植志》

文献名 芹叶铁线莲《东检》

地方名 山西：透骨草。

**功效** 全草：祛风利湿，解毒止痛。

备考 铁线透骨草商品中有本种。

**7015201**

*Clematis akoensis* Hayata

植物名 阿猴木通花藤《台湾药植志》

药材名 阿猴木通花藤(台湾)

**功效** 根：用于淋病。

**7015202**

*Clematis apiifolia* DC.

植物名 女萎《中国植志》

药材名 女萎《唐本草》、《汇编》

文献名 蔓楚《唐本草》，牡丹蔓《植物学大辞典》，小叶鸭脚力刚《浙江天目药志》

地方名 [千里光](江苏、浙江)，小木通(贵州、云南)；安徽：(威灵仙)，方藤；浙江：花木通(舟山地区)，乌阳藤(平阳)，风藤、白棉纱、一把抓(丽水、云和)，铜匙藤(昌化)，芹叶铜灵仙；福建：百根草；湖南：木通(长沙、邵阳)，木通草(汝桂)，山木通、穿山藤(双峰)，白木通(凤凰)，苏木通(涟源)，万年藤，附支(新邵)，白龙须(长沙)；云南：粗糠藤、川木通(文山)。

**功效** 根、茎藤或全株：有小毒。消炎消肿，利尿通乳。用于肠炎，痢疾，甲状腺肿大，风湿关节痛，尿路感染，乳汁不下。

备考 《本经》之女萎系指玉竹(萎蕤)而言，与此有别。

**7015203**

*Clematis apiifolia* var. *obtusidentata* Rehd. et Wils. ---

*C. obtusidentata* (Rehd. et Wils.) H.J. Eichler

植物名 钝齿铁线莲《中国植志》

药材名 川木通《汇编》

文献名 钝齿女萎《经植手册》，大齿铁线莲《鉴别手册》

地方名 木通(湖南、广西、贵州)，毛女萎(湖北、西南)；湖南：山木通；广西：水瓜子木通(蒙山)；贵州：棉花藤(兴仁)；云南：细木通、“鱼屋利”(楚雄彝语)。

**功效** 茎藤：清热利尿，通经下乳。用于水肿，淋病，小便不通，关节痹痛，经闭乳少。

**7015204**

*Clematis argenteilucida* (Levl. et Vant.) W. T. Wang ---

*C. grata* Wall. var. *grandidentata* Rehd. et Wils. --- *C. grata* var. *argenteilucida* (Levl. et Vant.) Rehd.

植物名 粗齿铁线莲《中国植志》

药材名 川木通(四川)、《汇编》

文献名 大木通《名实图考》，银色铁线莲《秦岭植志》，大叶鸭脚力刚《浙江天目药志》，粗齿木通、大齿木通《药植简编》，大齿铁线莲《四川野生经植志》，银大木通《品种论述》

地方名 小木通(河北、四川、贵州、湖南)，线木通(浙江、湖北)，黄藤通(湖南、广西)，木通(湖北、湖南、四川)；陕西：大蓑衣藤、白头公公(秦岭)，清风藤；湖北：糠壳藤(宣恩)；湖南：丝瓜藤；四川：毛木通，粗糠藤(涪陵)，母猪藤(宜宾)，记性花(达县)；贵州：摧筋藤。

**功效** 根：行气活血，祛风湿，止痛。用于跌打损伤，瘀血疼痛，风湿筋骨痛，肢体麻木；茎、叶：杀虫解毒。用于失音声嘶，杨梅疮毒，虫疮久烂，难产横生。

**7015205**

*Clematis armandii* Franch. --- *C. biondiana* Pavol. --- *C. ornithopus* Ulbr.

植物名 小木通《名实图考》、《中国植志》

药材名 川木通《药典》

文献名 紫木通《滇南本草》，山木通《树分》，淮木通、木通《中药志》，大木通《中国药植志》，类山木通《广西植录》，大川木通《汇编》

地方名 三叶木通(广东、四川、云南、广西)，铁脚灵仙、小黑药(湖南、云南)，威灵仙(浙江、湖南、广西、四

川、云南),粗糠藤(四川、贵州);陕西:蓑衣藤(秦岭、巴山);江苏:黑老腿、小驴肠子(新海连);湖北:野淮通(利川),铁线莲(神农架);湖南:九连芥,威灵生;广东:水木通(韶关);广西:土木通(容县、隆林、武宣),假威灵仙(邕宁),大灵仙,满山响,藤通,老虎须(贺县),竹叶木通,铁耙齿;四川:三叶藤、宝剑木(西昌),油木通,白木通,槐通,万年藤,白头子,蜀木通;贵州:铁马鞭(镇远),猪糠藤;云南:黄防己(保山),滑叶木通(新平、红河),花木通(玉溪),大黑木通(华宁),金木通、硬藤叶(红河),毒鱼藤,康花藤,乱根草(富民),大叶木通、辣木通(曲靖)。

**功效** 藤茎:清热利尿,通经下乳。用于水肿,淋病,小便不通,关节痹痛;经闭乳少。

## 7015206

*Clematis brevicaudata* DC.

**植物名** 短尾铁线莲《中国植志》

**文献名** 林地铁线莲《东检》,心叶铁线莲《品种论述》,短尾木通《云南种录》

**地方名** 山木通(宁夏、内蒙古、贵州);内蒙古:“敖赫日·敖日亚木格”(蒙名);陕西:链架拐(略阳),石通;宁夏:川木通;山东:铁扫帚(莒南、五莲、崂山),黑老婆秧(平邑),威灵仙(沂源、崂山),老牛仙(滕县),山姜辣(荣成);贵州:红钉耙藤(榕江),小木通(独山、镇远、威宁),木通(湄潭),丁耙菜(罗甸)。

**功效** 茎藤:清热利尿,通乳,消食,通便。用于尿道感染,尿频,尿道痛,心烦尿赤,口舌生疮,腹中胀满,大便秘结,乳汁不通。

## 7015207

*Clematis buehnaniana* DC.

**植物名** 毛木通《中国植志》

**文献名** 香铁线莲《广西植志》

**功效** 全草:消炎,利尿,止痛。用于扁桃体炎,咽喉炎,尿道炎,膀胱炎。

## 7015208

*Clematis buehnaniana* var. *vitifolia* Hook. f. et Thoms.

**植物名** 膜叶毛木通《中国植志》

**功效** 全草:通窍,利水,活血,化瘀。

## 7015209

*Clematis chinensis* Osbeck

**植物名** 威灵仙《名实图考》、《中国植志》

**药材名** 威灵仙《威灵仙传》、《药典》

**文献名** 能消《开宝本草》,威灵仙《苏沈良方》,威灵仙《珍珠囊》,灵仙《药品化义》,铁脚威灵仙《纲目》,黑脚威灵仙《生草药性备要》,九草阶、风车《现代实用中药》,铁杆威灵仙《药材资料汇编》,华中威灵仙《经植手册》

**地方名** 老虎须(陕西、浙江、江西、福建、广东、广西、四川、贵州),铁扫帚(陕西、山东、安徽、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、四川),铁脚灵仙(江苏、江西、湖北、广西、四川、贵州),铁灵仙(河北、江苏、湖南),灵仙藤(湖南、广东、四川),土灵仙、杜灵仙(华东),黑须公(广东、广西),黑茜(江苏、安徽),百条根(浙江、福

建、贵州),七寸风(湖南、广东、广西、四川),九里火(浙江、福建),[千金拔]、[千斤拔](江西、湖南、广西),小木通(浙江、江西、福建、湖南、湖北、四川),山辣椒秧子(东北),青龙须(湖北、广西、云南);陕西:[青风藤](秦岭),小叶花木通;山东:软灵仙[根],黑老婆秧(平邑),老牛仙(滕县),山姜辣(荣成);江苏:鲜须苗(南京),牛闲草、牛杆草(铜山),铁扫帚根(徐州);浙江:乌头力刚(临安),移星草(建德、嵊县),岩壁须、路洗帚(嵊县);安徽:[过山龙],乌头瓜,白钱草;江西:虾公须(景德);福建:[铁线莲](晋江),铁线根(武平),生线藤(明溪),百根草,[山羊角],羊角须(闽侯),三角牛(大田),本威灵仙(南安、惠安),剪刀槌(宁化),乌子花根(清流),隔山照(三明),南胶藤(霞浦),药王草(永定),山附子(福鼎);台湾:候仙;湖北:蓑衣藤、九龙须(神农架);湖南:[剪刀草],剪刀风,一把锁,[落得打],[马蹄草],九芩串,九成介,九牛穿,山辣子,[穿山甲],[避蛇生],[满山香],对子草,仙花草,铁耙头,[开喉箭];广东:乌骨胆草(潮阳、潮安),芝楂藤根,假猪春筋(河源),[胆草](从化、东莞),多须公(增城);广西:小威灵(贺县),小威灵仙(贵县),粉灵仙(富川),马灵仙(玉林),[木通藤],辣椒藤(陆川),一抓根(上林);四川:黑灵仙,藤威灵仙,九十九条根,一把米,老牛须(南川);贵州:[黑骨头],黑木通;云南:小黑药(文山),灵仙藤根。

**功效** 根、根茎:祛风除湿,通络止痛。用于风湿痹痛,肢体麻木,筋脉拘挛,屈伸不利,骨哽咽喉。

## 7015210

*Clematis chingii* W. T. Wang

**植物名** 两广铁线莲《中国植志》

**地方名** 广西:百色威灵仙,老虎师藤(桂林),康壳藤(乐业)。

**功效** 根、花:用于风湿骨痛,咳嗽。

## 7015211

*Clematis chrysocoma* Franch.

**植物名** 金毛铁线莲《中国植志》

**药材名** 金丝木通《汇编》

**文献名** 风藤草《滇南本草》,黄毛铁线莲《经植手册》,金毛木通《云南中草药选》

**地方名** 大木通(贵州、云南),小木通(云南、湖北);四川:黄花大淮通;贵州:黄钉耙藤(榕江),蜂糖花(望谟),野木通(威宁);云南:山棉花(丽江、昆明),花木通,铁脚威灵(曲靖、禄劝),大风藤棵、马尾巴(曲靖),九头狮子草(玉溪),五爪金龙(东川),紫木通。

**功效** 根、茎:利尿消肿,祛风湿,活血化瘀。用于肾炎水肿,小便不利,风湿关节炎,活血化瘀,闭经,跌打损伤,骨折;花:止血,止带。用于鼻衄,崩漏,白带。外用于烧、烫伤。

## 7015212

*Clematis clarkeana* Levl. et Vant.

**植物名** 平坝铁线莲《中国植志》

**文献名** 柳叶见血飞《药植简编》

**地方名** 贵州:拦路虎(剑河),喉痛药(惠水)。

功效 根:解毒,清热利尿;茎藤:用于风湿性关节炎,用于类风湿关节炎。

## 7015213

*Clematis connata* DC. --- *Clematis trullifera* auct. non (Thunb.) Finet et Gagnep.

植物名 合柄铁线莲《中国植志》

药材名 盘盘木通《云南丽江》

文献名 大发汗藤《名实图考》

地方名 贵州:小木通(兴义);云南:木通,白木通(丽江),大木通(昆明),接骨草(景东)。

功效 茎、叶:清热,利尿;根:用于哮喘。

备考 《高植图鉴》(1972)学名误订为 *Clematis trullifera* (Thunb.) Finet et Gagnep.

## 7015214

*Clematis courtoisii* Hand. - Mazz. --- *Clematis florida* auct. non Thunb.

植物名 大花威灵仙《中国植志》

药材名 大花威灵仙《湖南衡山》

文献名 大花铁线莲《浙江药植志》

地方名 浙江:铁线莲、威灵仙(西天目),光板银样力刚(东天目)。

功效 全草:外用于蛇咬伤;根:解毒,利尿,祛瘀。用于腹胀,大小便闭结,牙痛,风火眼起星翳等。

备考 有些文献将学名误订为 *C. florida* Thunb.

## 7015215

*Clematis crassifolia* Benth.

植物名 厚叶铁线莲《中国植志》

文献名 厚叶威灵仙《药植简编》

功效 根、茎:用于风湿骨痛,小儿惊风,咽喉肿痛,蛇咬伤。

## 7015216

*Clematis crassipes* Chun et How

植物名 粗柄铁线莲《中国植志》

功效 全草:用于风湿骨痛,腰膝冷痛。

## 7015217

*Clematis crassipes* Chun et How var. *pubipes* W. T. Wang

植物名 毛序粗柄铁线莲《广西药录》

地方名 广西:三叶木通(上思)。

功效 全草:用于风湿骨痛,腰膝冷痛。

## 7015218

*Clematis fasciculiflora* Franch.

植物名 簇花铁线莲《经植手册》

药材名 滑叶藤《云南药录》

文献名 山金银《云南种录》

地方名 四川:小木通;云南:小叶五香血藤、小粘药(昆明),三爪金龙(嵩明),山金银花,木通(玉龙山)。

功效 根、叶:行气消炎,祛瘀生新,祛风除湿。用于气滞腹胀,风湿筋骨痛,跌打损伤。外用于骨折,疮疖,乳痈红肿,刀伤出血。

## 7015219

*Clematis filamentosa* Dunn

植物名 丝铁线莲《中国植志》

药材名 甘木通《广东》

文献名 眼蛇药《汇编》

地方名 广西:棉藤(龙胜),喉疳根(宾阳)。

功效 叶:镇静,镇痛,降压。用于红眼病,头痛,高血压病。

## 7015220

*Clematis finetiana* Levi. et Vant. --- *C. pavoliniana* Pamp.

植物名 山木通《中国植志》

药材名 山木通《名实图考》、《汇编》

文献名 威灵仙、铁皮威灵仙《中药志》

地方名 木通(湖南、湖北、四川),考虎须(浙江、江西、福建),小木通(广东、云南),铁脚灵仙(安徽、广西);陕西:铁杆灵仙;江苏:黑根;浙江:大叶光板力刚(东天目),铁脚威灵仙,铁灵仙,铁笏帚,铜威灵仙,土灵仙,杜灵仙,天火钻,过山照,九里花,老虎毛,雪球藤;江西:千斤拔(吉水),天仙菊(奉新),水灵仙,冲倒山(婺源);福建:搜山虎(清流、宁化),粉灵仙(松溪、政和),九己陈、九尾巴(周宁);湖南:蓑衣藤,万年藤,光木通;广西:硬骨灵仙(都安);贵州:大木通;云南:小木通藤,山棉花,马尾巴,里木通(化宁),三叶木通(玉溪)。

功效 根、茎、叶:祛风湿,通经络,止痛。用于风湿关节肿痛,肠胃炎,疟疾,乳痈,牙疳,目生星翳。

## 7015221

*Clematis florida* Thunb.

植物名 铁线莲《中国植志》

药材名 铁线莲《名实图考》、《汇编》

文献名 番莲《花镜》,转子莲《种分》

地方名 上海:蜘蛛花;浙江:铜威灵仙,威灵仙;江西:大蓼,光板根,山木通、大木通(景德);广西:金包银,龙须草(临桂)。

功效 根、全草:利尿,理气通便,活血止痛。用于小便不利,腹胀,便秘。外用于关节痛,虫蛇咬伤。

## 7015222

*Clematis florida* var. *plena* D. Don

植物名 重瓣铁线莲《中国植志》

药材名 重瓣铁线莲《经植手册》

文献名 铁线牡丹《滇南本草》

地方名 云南:铁线牡丹花。

功效 全株:有小毒。温暖脾胃,止呕呃逆。

## 7015223

*Clematis fruticosa* Turcz.

植物名 灌木铁线莲《中国植志》

文献名 直立铁线莲《高原中草》

功效 全株:用于腹胀,便秘,风火牙痛,目翳。外用于虫蛇咬伤。

## 7015224

*Clematis fusca* Turcz. --- *C. karntscharica* Bong. --- *C. fusca* f. *obtusifoliola* Kuntze

植物名 褐毛铁线莲《中国植志》

药材名 褐毛威灵仙《品种论述》

文献名 褐紫铁线莲《高植图鉴》, 褐花铁线莲《经植手册》

地方名 灵仙、山辣辣秧(东北); 黑龙江: 威灵仙(哈尔滨)。

功效 根: 祛风湿, 调经。

#### 7015225

*Clematis fusca* var. *violacea* Maxim.

植物名 紫花铁线莲《中国植志》

文献名 满州褐花铁线莲《经植手册》

功效 根: 祛风湿, 调经。

#### 7015226

*Clematis ganpiniana* (Levl. et Vant.) Tamura --- *C. brevicaudata* DC. var. *lissocarpa* Rehd. et Wils. --- *C. brevicaudata* var. *ganpiniana* (Levl. et Vant.) Hand.-Mazz.

植物名 扬子铁线莲《中国植志》

药材名 涪潭木通(贵州药录)

文献名 平滑果短尾铁线莲《拉汉种称》, 镇平铁线莲《湖北植志》

地方名 木通(贵州、广西); 贵州: “奶家丁忙”(雷公山苗名)。

功效 藤: 止痛, 利尿。

#### 7015227

*Clematis ganpiniana* var. *subsericea* (Rehd. et Wils.) C. T. Ting --- *C. brevicaudata* DC. var. *subsericea* Rehd. et Wils.

植物名 毛叶扬子铁线莲《中国植志》

药材名 涪潭小木通(贵州)

文献名 丝毛短尾铁线莲《经植手册》

地方名 四川: 粗粮藤(凉山); 贵州: 小木通(涪潭)。

功效 藤、叶: 清热利尿, 通乳, 消食, 通便。

#### 7015228

*Clematis ganpiniana* (Levl. et Vant.) Tamura var. *tenuispala* (Maxim.) C. T. Ting

植物名 毛果扬子铁线莲《中国植志》

文献名 丝柄短尾铁线莲《秦岭植志》

功效 根、茎: 用于小便不利, 风湿骨痛。

#### 7015229

*Clematis glauca* Willd.

植物名 粉绿铁线莲《中国植志》

药材名 苕苕草《沙漠药植》

文献名 灰绿铁线莲《沙漠药植》

地方名 内蒙古: 透骨草, 黄花铁线莲; 四川: “叶猛纳火”(西昌藏名)。

功效 全草: 祛风湿, 止痒。用于慢性风湿性关节炎, 关节疼痛。外用于疮疖, 痒痒症。

#### 7015230

*Clematis gouriana* Roxb. ex DC.

植物名 小蓑衣藤《中国植志》

药材名 小花木通《云南种录》

文献名 木通、小叶铁线莲《中药志》, 范氏木通《药

材学》, 长卵铁线莲《湖北植志》

地方名 威灵仙(台湾、贵州); 陕西: 老龙须; 台湾: 串鼻龙; 四川: 小木通(峨眉); 贵州: 大车藤, 白车藤, 虫牙药(兴仁、兴义); 其他: 山棉花。

功效 茎、根: 行气活血, 祛风湿, 止痛。用于跌打损伤, 瘀滞疼痛, 风湿性筋骨痛, 肢体麻木。

#### 7015231

*Clematis gracilifolia* Rehd. et Wils.

植物名 薄叶铁线莲《中国植志》

文献名 瘦叶铁线莲《经植手册》, 丝毛铁线莲《四川野生经植志》, 细叶四喜牡丹《云南种录》

功效 全株: 用于腹胀, 便秘, 风火牙痛, 目翳。外用虫蛇咬伤。

#### 7015232

*Clematis gratopsis* W. T. Wang --- *C. grata* Wall. var. *lobulata* Rehd. et Wils.

植物名 金佛铁线莲《中国植志》

药材名 绿木通《湖北植志》

地方名 小木通(湖北、广西); 湖北: 山木通(神农架); 广西: 木通, 藤通, 木通藤, 藤通草。

功效 藤、根: 行气活血, 祛风湿, 止痛。

#### 7015233

*Clematis henryi* Oliv.

植物名 单叶铁线莲《中国植志》

药材名 雪里开《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 地雷根《中草药学》

地方名 雪里开花、蛇松子(浙江、湖南), 拐子药、救命王、地雷(湖南、四川), [威灵仙](浙江、江西、安徽、广西); 湖北: 铁线莲(神农架); 广西: 野灵仙(贺县); 四川: [木通](南川), 川木通(峨眉山)。

功效 根: 行气止痛, 活血消肿。用于胃痛, 腹痛, 跌打损伤, 跌扑晕厥, 支气管炎。外用于腮腺炎。

#### 7015234

*Clematis heracleifolia* DC. --- *C. heracleifolia* var. *ichangensis* Rehd. et Wils. --- *C. heracleifolia* var. *davidiana* (Decne. ex Verlot) Kuntze --- *C. tubulosa* Turcz.

植物名 大叶铁线莲《中国植志》

文献名 木通花《经植手册》, 卷萼铁线莲《东北草本植志》, 宜昌木通花《拉汉种称》, 牡丹藤、草牡丹《浙江天目药志》, 草本女娄《中国植物图鉴》

地方名 山东: 气死大夫(烟台、济南), 老母猪挂打子(青岛)。

功效 全株: 清热解毒。祛风除湿。用于肠炎, 痢疾, 风湿关节痛。外用于疮疖肿毒, 结核性溃疡, 瘰管。

#### 7015235

*Clematis hexapetala* Pall. --- *C. angustifolia* Jacq. --- *C. hexapetala* f. *dissecta* (Yabe) Kitag. --- *C. hexapetala* f. *breviloba* (Freyn) Nakai

植物名 棉团铁线莲《中国植志》

药材名 威灵仙《药典》

文献名 山蓼《救荒本草》, 山蓼铁线莲、立威灵仙、

六瓣铁线莲(科裁), 狭叶铁线莲(经植手册), 狭叶威灵仙(中药通报), 棉花铁线莲(中草药学), 铁脚威灵仙、细叶棉团铁线莲(东北药植志), 小叶棉团铁线莲、大叶棉团铁线莲(东北草本植志)

地方名 棉花团、山辣椒秧、黑薇、黑须根(东北), 山棉花(东北、河北、内蒙古), [山姜](辽宁、山东), 棉花团子(黑龙江、河北、内蒙古); 黑龙江: 棉花团花, 棉花子花; 吉林: 棉花花(镇赉); 辽宁: 棉花茧子(朝阳), 野棉花(辽中), [透骨草](沈阳), 驴笼头菜(建昌、绥中); 内蒙古: “依日给”(蒙名); 陕西: [竹叶细辛](黄龙寺沟); 山东: 软灵仙, 黑老婆秧、山竹子、铁扫帚根(烟台), 铁扫帚(蒙山、青岛)。

功效 根、根茎: 祛风除湿, 通络止痛。用于风湿痹痛, 肢体麻木, 筋脉拘挛, 屈伸不利, 骨哽咽喉。

## 7015236

*Clematis hexapetala* var. *tchefouensis* (Debx.) S. Y. Hu

植物名 长冬草(中国植志)

药材名 铁扫帚(山东、江苏)

文献名 烟台山蓼(山东经植)

地方名 山东: 威灵仙(沂源、崂山), 老牛仙(滕县), 山姜辣(荣成), 黑老婆秧(烟台、平邑), 软灵仙(根); 江苏: 黑狗筋(赣榆)。

功效 根: 祛风, 除湿, 通经, 镇痛。用于风湿关节痛, 肌肉痛, 鱼骨哽喉。

## 7015237

*Clematis huchouensis* Tamura

植物名 吴兴铁线莲(中国植志)

药材名 金剪刀草(浙江)

文献名 湖州铁线莲(浙江药植志)

地方名 浙江: 金剪刀, 铜脚威灵仙(临安), 河边威灵仙(嘉兴), 枯枝活叶藤(杭州)。

功效 全草: 驱风消肿。用于深部脓肿, 风湿性关节炎, 脑瘤。

## 7015238

*Clematis intricata* Bunge

植物名 黄花铁线莲(中国植志)

文献名 铁线透骨草(医学指南)

地方名 透骨草(华北、陕西、宁夏); 河北: 软苗透骨草; 山西: 辣蓼子; 内蒙古: 狗豆蔓; 宁夏: 狗肠草; 西藏: “叶芒赛保”(阿里藏名); 其他: 断肠草, 狗断肠。

功效 全草、叶: 祛风除湿, 解毒, 止痛。用于风湿筋骨疼痛, 疮疖肿毒。

## 7015239

*Clematis kerriana* Drumm. et Crai

植物名 细木通(中国植志)

药材名 细木通(云南药录)

地方名 小木通(广西、云南); 广西: 威灵仙。

功效 藤、根: 利尿, 通经。用于疟疾, 麻风。

## 7015240

*Clematis kirilowii* Maxim.

植物名 太行铁线莲(中国植志)

地方名 山东: 威灵仙, 黑老婆秧; 江苏: 老牛杆, 黑

狗筋。

功效 根: 祛风除湿, 通络止痛。

## 7015241

*Clematis koreana* Kom.

植物名 朝鲜铁线莲(中国植志)

功效 果实上的柔毛压成粉末: 用于疮, 痔疮。

## 7015242

*Clematis lancifolia* Bur. et Franch.

植物名 披针叶铁线莲(中国植志)

文献名 长叶大蓼(云南种录)

地方名 四川: 八爪筋(米易)。

功效 根: 清热解毒, 杀菌。

## 7015243

*Clematis lasiandra* Maxim.

植物名 毛蕊铁线莲(中国植志)

药材名 小木通(中国药植志)

文献名 丝瓜花(中国药植志), 毛蕊发汗藤(云南种录)

地方名 木通(广西、四川); 陕西: 土木通(太白); 浙江: 铃钟锯子力刚(东天目), 威灵仙; 湖北: 过山龙, 山木通(神农架); 湖南: 水木通。

功效 茎藤: 舒筋活血, 去湿止痛, 解毒利尿。用于筋骨疼痛。外用子无名肿毒。

## 7015244

*Clematis leschenaultiana* DC.

植物名 锈毛铁线莲(中国植志)

药材名 滇淮木通(名实图考)

文献名 齿叶铁线莲(海南植志), 毛木通(中药志), 齿叶发汗藤(云南种录)

地方名 木通(广东、四川); 广西: 威灵仙(桂平), 蜂糖花(凤山), 野棉花、马郎花(罗城), 金盏藤(阳朔), 满山响, 老虎须(那坡); 贵州: 见血飞(安龙); 云南: 小木通。

功效 根: 清邪气, 解蛇毒, 去骨哽喉; 花: 用于四肢疼痛; 叶: 用于疮毒。

## 7015245

*Clematis leschenaultiana* DC. var. *denticulata* Merr.

植物名 细齿金盏藤(广西药录)

功效 全株: 用于风湿骨痛, 毒蛇咬伤, 小便不利。

7015246 见 7015268

## 7015247

*Clematis loureiriana* DC. --- *C. loureiriana* DC. var. *subpeltata* (Wall.) Hand. -Mazz.

植物名 菝葜叶铁线莲(中国植志)

药材名 紫木通(广东、云南)

文献名 盾叶铁线莲(拉汉种称), 金木通(药植简编)

地方名 云南: 金丝木通(思茅), 滑叶木通(玉溪), 辣木通(元江), 大见血飞(通海), “牙喝贺因”(西双版纳傣语), 铁线莲。

功效 全草: 通经活络, 利尿, 消炎, 解表, 退热。用于感冒, 疟疾, 膀胱炎, 尿道炎, 尿闭, 闭经。



## 7015248

*Clematis macropetala* Ledeb.

植物名 长瓣铁线莲《中国植志》

药材名 四喜牡丹《经植手册》

文献名 大萼铁线莲《东检》, 长瓣铁线莲《高植图鉴补编》

地方名 陕西: 神仙草, [寻骨风] (镇坪); 青海: “叶芒那保”(藏名)。

功效 全草: 健胃, 消食。用于消化不良, 恶心, 除痰, 去痞块; 根: 用于风湿。

## 7015249

*Clematis meyeniana* Walp.

植物名 毛柱铁线莲《中国植志》

药材名 土木通(广西)

文献名 华南铁线莲《中药志》, 南铁线莲《汇编》

地方名 威灵仙(广西、广东、福建、云南), 木通(广东、广西、四川); 福建: 木接藤; 广西: 灵仙(岑溪、北流、陆川、博白、玉林), 假威灵(南宁), 木通藤(乐业), 纸霉藤、红禾秆藤根(北流), 藤三叉(昭平), 黄防己(忻城), 老虎须(陆川), 老虎须藤、吹风藤(上思); 四川: 川木通(峨眉山); 云南: 柳叶见血飞, 见血飞, 见血愁, 大花木通, 大舒筋活血, 大伸筋。

功效 根、根茎: 祛风除湿, 通络止痛。

## 7015250

*Clematis meyeniana* var. *granulata* Finet et Ganep.

植物名 沙叶铁线莲《中国植志》

药材名 三叶土木通(拟)

文献名 具粒铁线莲《广东兽药》, 沙叶山木通《云南种录》

地方名 广东: 三叶木通、软骨过山龙(惠阳), 威灵仙(根)(增城、罗定、乐昌、阳江、阳春、电白), 灵仙(湛江、江门), 灵仙草(高州), 蛇目草(徐闻、海康、廉江、遂溪); 海南: 鹰爪藤(海口、琼中、定安、屯昌); 广西: 老虎须(岑溪), 老爷须。

功效 全株: 清热利尿, 通经活络。用于水肿, 乳汁不通, 风湿骨痛。外用于疮痍疔肿。

## 7015251

*Clematis montana* Buch.-Ham. ex DC.

植物名 绣球藤《名实图考》、《中国植志》

药材名 川木通《药典》

文献名 四喜牡丹《名实图考》, 四朵梅《天宝本草》, 四季牡丹《中国经植志》, 山铁线莲《经植手册》, 木通《四川中药志》

地方名 花木通(陕西、广西、湖北、四川); 陕西: [清风藤]、大淮通、老龙须(山阳), 金凤藤, 淮木通(秦岭); 甘肃: 葛条(岷县); 湖北: 柴木通(巴东); 四川: 山木通, 油木通(绵阳), 白木通(重庆、南川), 白花木通, 大木通, 毛木通(蓬溪), 三角枫, 金钱木通(万县), 一把米、九十九条根(成都)。

功效 茎藤: 清热利尿, 通经下乳。用于水肿, 淋病, 小便不通, 关节痹痛, 经闭乳少。

## 7015252

*Clematis montana* var. *grandiflora* Hook.

植物名 大花绣球藤《中国植志》

药材名 红木通(湖北)

文献名 红花大淮通《经植手册》, 大花四喜牡丹《云南种录》, 红花木通《药植简编》

地方名 湖北: 柴木通(神农架); 四川: 木通、川木通(峨眉山)。

功效 茎藤: 清热利尿, 通经下乳。

## 7015253

*Clematis montana* var. *ilacina* Lemoine

植物名 淡紫花绣球藤(拟)

药材名 大淮通(拟)

文献名 丁香色大淮通《经植手册》, 淡紫花木通《药植简编》, 绣球藤《鉴别手册》

功效 藤茎: 清热利尿, 通经下乳。

## 7015254

*Clematis montana* var. *wilsonii* Sprag.

植物名 晚花绣球藤《高植图鉴补编》

药材名 川木通(四川峨眉山)

文献名 威氏绣球藤《峨眉药植研究》

地方名 四川: 木通(峨眉山)。

功效 茎: 清热, 利水, 通利血脉。

## 7015255

*Clematis ochotensis* (Pall.) Poir. --- *C. platysepala*

(Trautv. et Mey.) Hand.-Mazz. --- *C. alpina* var.

*chinensis* Maxim. --- *C. sibirica* L. var. *ochotensis*

(Pall.) S. H. Li et Y. H. Huang --- *C. nobilis* Nakai

植物名 半钟铁线莲《中国植志》

文献名 高山铁线莲《东北草本植志》, 宽萼铁线莲《高植图鉴》

功效 根: 祛风湿。

## 7015256

*Clematis orientalis* L.

植物名 东方铁线莲《中国植志》

功效 全草: 祛风湿, 止痒; 茎: 清热利水, 通经活络。

## 7015257

*Clematis otophora* Franch. ex Finet et Gagnep.

植物名 宽柄铁线莲《中国植志》

文献名 抱茎铁线莲《湖北植志》

地方名 湖北: 野木通(神农架)。

功效 根、茎: 利尿, 镇痛, 通经。

## 7015258

*Clematis parviloba* Gardn. et Champ.

植物名 裂叶铁线莲《中国植志》

药材名 苦瓜藤通(广西)

文献名 小裂木通《云南种录》

功效 藤、根: 用于风湿骨痛。

## 7015259

*Clematis patens* Morr. et Decne.

植物名 转子莲《中国植志》

药材名 转子莲《名实图考》

文献名 大花铁线莲《东北草本植志》

地方名 威灵仙(东北)。

功效 根:用于痛风。

#### 7015260

*Clematis pterae* Hand.-Mazz. --- *C. gouriana* Roxb.  
var. *finetii* Rehd. et Wils.

植物名 钝萼铁线莲《中国植志》

药材名 木通藤《云南药录》

文献名 木通、风藤草、风藤草根、风藤草尖《滇南本草》,小果木通《云南种录》

地方名 威灵仙(湖北、云南);湖北:绿木通、柴木通(兴山),铁线莲(神农架);贵州:三爪通(兴仁);云南:细木通、小木通(红河、丽江、保山),小木通藤、山木通,山棉花,马尾巴,心慌藤,“你么慌是”(楚雄彝名)。

功效 藤茎:清热利尿,通利血脉。

#### 7015261

*Clematis pogonandra* Maxim. --- *C. prattii* Hemsl.

植物名 须蕊铁线莲《中国植志》

药材名 黄花大淮通《药植简编》

文献名 冉丝铁线莲《湖北植志》;黄花铁线莲《四川野生经植志》

地方名 湖北:花木通(神农架);四川:木通、川木通(峨眉山)。

功效 藤茎:清热利尿,通经下乳。

#### 7015262

*Clematis potaninii* Maxim.

植物名 美花铁线莲《中国植志》

文献名 藏四喜牡丹《云南种录》

功效 藤茎:祛风湿;清肺热,止痢,消食。

#### 7015263

*Clematis pseudopogonandra* Finet et Gagnep.

植物名 西南铁线莲《中国植志》

药材名 西藏花木通《汇编》

文献名 假须蕊铁线莲《药植简编》,须蕊发汗藤《云南种录》

地方名 西藏:铁线莲,花木通,“一忙噶尔布”(藏名)。

功效 茎藤:清热利尿。用于水肿,膀胱炎,尿道炎,口舌生疮,久痢脱肛,乳汁不通。

#### 7015264

*Clematis quinquefoliolata* Hutch.

植物名 五叶铁线莲《中国植志》

药材名 柳叶见血飞《云南中草药》

地方名 云南:大舒筋活血、大伸筋、辣药(红河),见血飞、血见愁、大花木通(玉溪)。

功效 根:祛风除湿,温中理气,散瘀止痛。用于风湿关节痛,跌打损伤,扭挫伤,骨痛,痛经,偏头痛,神经痛,面神经麻痹,鱼骨哽喉。

#### 7015265

*Clematis ranunculoides* Franch.

植物名 毛茛铁线莲《中国植志》

文献名 绣球藤《滇南本草》,毛茛状铁线莲《高植图

鉴》

地方名 云南:铁线牡丹、山棉花(玉溪),回龙草(峨山),九头狮子草(通海),小九头狮子草(昆明),小九股牛(华宁),红毛木通,牛打架、大鼓子(玉龙山),灯笼花、“灯笼衣”(峨山彝语),白木通(丽江),细木通(红河)。

功效 根、全草:清热解毒,祛瘀活络,利尿。用于疖痈,尿闭,乳腺炎,跌打损伤。

#### 7015266

*Clematis rehderiana* Craib

植物名 长花铁线莲《中国植志》

文献名 垂花发汗藤《云南种录》

地方名 四川:木通(川西)。

功效 全株:清心降火,利尿。用于口舌生疮,乳汁不通,肠炎痢疾,肾炎淋病。

#### 7015267

*Clematis repens* Finet et Gagnep.

植物名 曲柄铁线莲《中国植志》

药材名 曲柄铁线莲《广西药录》

功效 根、茎:用于风湿骨痛。

#### 7015268

*Clematis rubifolia* Wright --- *C. leschenaultiana* DC. var. *rubifolia* (Wright) W. T. Wang

植物名 莓叶铁线莲《中国植志》

文献名 红叶铁线莲《广西药录》,莓叶发汗藤《云南种录》

地方名 广西:老虎须(那坡);云南:毛木通,粗糠藤、花木通(红河),“牙喝贺聿”(西双版纳傣语);其他:细木通。

功效 根、全草:除湿利尿,清血解毒。用于风湿关节痛,跌打损伤,尿道炎,膀胱炎,便血,口腔溃疡,胎盘难下,乳汁不通,月经不调。

#### 7015269

*Clematis serratifolia* Rehd.

植物名 齿叶铁线莲《中国植志》

地方名 四川:“叶猛孕鲁”(若尔盖藏名)。

功效 根茎:有小毒。除风利湿,利尿止泻,腹胀肠鸣。

#### 7015270

*Clematis sibirica* (L.) Mill. --- *C. alpina* ssp. *sibirica* Kuntze

植物名 西伯利亚铁线莲《中国植志》

药材名 天山木通(新疆)

文献名 新疆木通《新疆中草药》

地方名 新疆:花木通,“青格力克”(维名);西藏:透骨草。

功效 茎枝:清心火,泄湿热,通血脉。用于尿道炎,小便不利,急性膀胱炎,尿血,尿道涩痛;根:祛风湿。

#### 7015271

*Clematis stans* Sieb. et Zucc.

植物名 直立铁线莲《浙江药植志》

地方名 浙江:牡丹藤(临安),草牡丹。

功效 根、全草:祛风除湿,解毒消肿。

#### 7015272

*Clematis tangutica* (Maxim.) Korsh. --- *C. orientalis* var. *tangutica* Maxim.

植物名 甘青铁线莲《中国植志》

文献名 唐古特铁线莲《经植手册》,陇塞铁线莲《甘肃经植》,铁线莲《沙漠药植》

地方名 木通(青海、新疆);青海:“亦蒙”(藏名)。

功效 全草:祛风湿,止痒。

#### 7015273

*Clematis terniflora* DC. --- *C. paniculata* Thunb. --- *C. maximowicziana* Franch. et Sav.

植物名 圆锥铁线莲《中国植志》

药材名 铜脚威灵仙(陕西、浙江、江苏、江西、安徽)

文献名 仙人草《本草拾遗》,铁脚威灵仙、木药子《纲目》,黄药子《名实图考》,白花威灵仙《科种》,毛木通《药植简编》,赤药、红药子《中国药植志》,锥花铁线莲《汇编》

地方名 [大蓼](东北),威灵仙(江苏、浙江、湖南);陕西:白花木通;上海:灵仙;江苏:黑茜,黑狗茜;浙江:小叶力刚(东天目),九里虎,铜灵仙,铜威灵,白花藤(衢县),活神仙,蟹珠眼草,赤叶,红叶子;湖北:木通花藤,木通(神农架);湖南:老龙须;广西:[山木通]。

功效 根、根茎:祛风除湿,通络止痛。

#### 7015274

*Clematis terniflora* var. *mandshurica* (Rupr.) Ohwi --- *C. mandshurica* Rupr. --- *C. liaotungensis* Kitag.

植物名 辣蓼铁线莲《中国植志》

药材名 威灵仙《药典》

文献名 东北铁线莲《东北药植志》,辣铁线莲《中国经植志》,山辣椒《沈药学报》

地方名 铁脚威灵仙、黑薇、黑尾、山辣椒秧、山辣椒秧子(东北),野辣椒秧、野辣椒秧子(黑龙江、吉林);吉林:风车草,“嘎嗽一朴”(朝名);辽宁:驴笼头菜根,铁丝根,[山姜](彰武)。

功效 根、根茎:祛风除湿,通络止痛。用于风湿痹痛,肢体麻木,筋脉拘挛,屈伸不利,骨哽咽喉。

#### 7015275

*Clematis trullifera* (Franch.) Finet et Gagnep.

植物名 杯柄铁线莲《中国植志》

药材名 金线木通(四川)

功效 全草:通淋利尿,通乳。用于小便热痛,乳汁不通,经闭,口疮。

#### 7015276

*Clematis uncinata* Champ. --- *C. uncinata* var. *bitermata* W. T. Wang

植物名 柱果铁线莲《中国植志》

药材名 威灵仙(广东、广西、江西、浙江、福建、贵州)、《中药志》

文献名 光果铁线莲《经植手册》,具钩威灵仙《品种论述》,钩形木通《种分》,老虎须藤《汇编》

地方名 淮木通(广西、四川),通草、木通(四川、贵州),花木通(浙江、湖北);浙江:叶光板力刚(东天目),猪娘藤;广东:老虎须藤;广西:老虎须,千斤藤,水木通(贺县),土木通(苍梧、忻城),白木通(蒙山),白茯苓(龙州);四川:革叶铁线莲,川木通(峨眉山);贵州:铁脚威灵仙,一把扇、连根够(雷公山),黑木通(清镇),黑骨头(贵阳),黑车藤(息烽);云南:钩铁线莲,癞子藤。

功效 根、叶:祛风除湿,舒筋活络,止痛。用于风湿痹痛,关节不利,四肢麻木,跌打损伤,诸骨哽喉。

#### 7015277

*Clematis uncinata* var. *coriacea* Pam.

植物名 皱叶铁线莲《中国植志》

文献名 革叶铁线莲《高植图鉴》。

地方名 湖北:灵仙(神农架)。

功效 根:祛风除湿,舒筋活络,镇痛;叶:用于外伤出血。

#### 7015278

*Clematis urophylla* Franch.

植物名 尾叶铁线莲《中国植志》

文献名 尾叶发汗藤《云南种录》

地方名 小木通(广西、湖北);广西:木通、万年藤(桂林)。

功效 藤茎:祛风利湿,通经活络。

#### 7015279

*Clematis yunnanensis* Franch.

植物名 云南铁线莲《中国植志》

药材名 辣木通(云南曲靖)

文献名 云南发汗藤《云南种录》

地方名 四川:小木通,牛打架;云南:三叶木通,山木通,大花木通,大叶木通,[牛角](贡山)。

功效 全株:祛风利湿,止痛,利尿。用于风湿筋骨痛,偏头痛,腰痛,小便不利。外用于头癣。

#### 7015280

*Consolida ajacis* (L.) Schur --- *Dephinium ajacis* L.

植物名 飞燕草《中国植志》

药材名 飞燕草《中国药植图鉴》

文献名 小草乌《中国植物图鉴》,翠雀《广州植志》

地方名 上海:萝卜花;其他:千鸟草,紫飞燕草。

功效 种子:用于喘息,水肿;根:用于腹痛。

#### 7015281

*Coptis chinensis* Franch. --- *C. teeta* Wall. var. *chinensis* (Franch.) Finet et Gagnep.

植物名 黄连《中国植志》

药材名 黄连《本经》、《药典》

文献名 王连《本经》,支连《药性论》,仙姑草《纲目拾遗》,宜连、上草、拣连、净黄连、滴胆芝《新纲》,酒黄连、姜黄连、萸黄连《药典》

地方名 味连、川连、鸡爪连、鸡爪黄连(东北、华北、

陕西、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川), 山黄连(福建、江西), 野黄连(陕西、广东); 浙江: 土黄连; 福建: 苦连草(福州); 广东: 华黄连(广州); 四川: 光连, 黄连须, 剪口连[叶柄基部], 千子连[全叶柄], 黄连渣; 贵州: 大红虫; 其他: 尾连, 嘉定连, 老山连。

**功效** 根茎: 清热燥湿, 泻火解毒。用于湿热痞满, 呕吐, 泻痢, 黄疸, 高热神昏, 心火亢盛, 心烦不寐, 血热吐衄, 目赤吞酸, 牙痛, 消渴, 痈肿疔疮。外用于湿疹, 湿疮, 耳道流脓。

## 7015282

*Coptis chinensis* var. *breviseptala* W. T. Wang et Hsiao

**植物名** 短萼黄连《中国植志》

**药材名** 黄连(安徽、广西、福建)

**地方名** 土黄连(福建、浙江、安徽、广东、广西); 浙江: 浙黄连; 福建: 益丹草(宁化), 小叶凤尾草(建阳), 山柏(莆田); 广东: 土川连(从化); 广西: 米黄连(兴安), 野黄连。

**功效** 根茎: 清热燥湿, 泻火解毒。

## 7015283

*Coptis deltoidea* C. Y. Cheng et Hsiao

**植物名** 三角叶黄连《中国植志》

**药材名** 黄连《本经》、《药典》

**文献名** 川连《药学报》, 峨眉家连、雅连《中药志》, 酒黄连、姜黄连、萸黄连《药典》

**地方名** 四川: 峨眉连, 家黄连, 刺盖连(峨眉山); 其他: 嘉定连。

**功效** 根茎: 清热燥湿, 泻火解毒。用于湿热痞满, 呕吐, 泻痢, 黄疸, 高热神昏, 心火亢盛, 心烦不寐, 血热吐衄, 目赤吞酸, 牙痛, 消渴, 痈肿疔疮。外用于湿疹, 湿疮, 耳道流脓。

## 7015284

*Coptis japonica* Makino

**植物名** 日本黄连《药材学》

**药材名** 因州黄连《鉴别手册》

**文献名** 黄连、大叶黄连、王连、支连、上草、栝连、净黄连、滴胆芝《和汉药考》, 洋连、日光连、因州连《品种论述》

**功效** 根茎: 清热燥湿, 泻火解毒。

**备考** 本种我国不产, 由天津港进口。

## 7015285

*Coptis omeiensis* (Chen) C. Y. Cheng---*C. chinensis* var. *omeiensis* Chen

**植物名** 峨眉黄连《中国植志》

**药材名** 黄连(四川峨眉)、《中药志》

**文献名** 峨眉岩连《四川野生经济植物志》, 峨眉野连《中药志》, 野连《品种论述》

**地方名** 四川: 岩连、岩黄连、野黄连、凤尾连(峨眉山)。

**功效** 根茎: 清热燥湿, 泻火解毒。

## 7015286

*Coptis omeiensis* var. *stolonifera* S. L. Zhang

**植物名** 草黄连《峨眉药植研究》

**地方名** 四川: 草连、野连(峨眉山)。

**功效** 根茎: 清熱解毒, 燥湿, 止痢。

## 7015287

*Coptis quinquefolia* Miq.

**植物名** 五叶黄连《中国植志》

**文献名** 眠月黄连、黄连、五加叶黄连《台湾药植志》, 梅花黄连《台湾中药材图鉴》

**地方名** 台湾: 凤尾连。

**功效** 根茎: 清热燥湿, 泻火解毒。

## 7015288

*Coptis quinquesecta* W. T. Wang

**植物名** 五裂黄连《中国植志》

**文献名** 云连《药学报》

**地方名** 云南: 黄连。

**功效** 根茎: 清热燥湿, 泻火解毒。

## 7015288a

*Coptis teeta* Wall.

**植物名** 西藏黄连《中国中药杂志》

**地方名** 西藏: 黄连, “娘恣雅雅巴”(藏名)。

**功效** 同云南黄连。

**备考** 《中国植物志》以本品为“云南黄连”。

## 7015289

*Coptis teeta oides* C. Y. Cheng

**植物名** 云南黄连《中国中药杂志》

**药材名** 黄连《汇编》

**文献名** 云连《汇编》, 滇连、炸麻连《滇南本草》, 酒黄连、姜黄连、萸黄连《药典》

**地方名** 云南: 家黄连, 滇黄连, 苦连(丽江)。

**功效** 根茎: 清热燥湿, 泻火解毒。用于湿热痞满, 呕吐, 泻痢, 黄疸, 高热神昏, 心火亢盛, 心烦不寐, 血热吐衄, 目赤吞酸, 牙痛, 消渴, 痈肿疔疮。外用于湿疹, 湿疮, 耳道流脓。

**备考** 华西医科大学主张以 *Coptis teetoides* C. Y. Cheng 为云南黄连, 而以 *Coptis teeta* Wall. 为西藏黄连。

## 7015290

*Delphinium albocoeruleum* Maxim. --- *D. albocoeruleum* var. *pumilum* Huth---*D. tanguticum* Huth

**植物名** 白蓝翠雀花《中国植志》

**文献名** “夏冈哇”(藏名)、矮白蓝翠雀《青藏药图》

**功效** 全草及花: 消肠炎, 止腹泻。

## 7015291

*Delphinium albocoeruleum* var. *przewalskii* (Huth) W. T. Wang

**植物名** 贺兰翠雀花《中国植志》

**地方名** 宁夏: [乌药](贺兰山)。

**功效** 全草: 杀虫。煮水可杀跳蚤和虱子等。

## 7015292

*Delphinium angustirhombicum* W. T. Wang

**植物名** 狭菱形翠雀花《迪庆藏药》

**药材名** 雀果贝《迪庆藏药》

**功效** 花: 清热, 解邪毒。用于瘟病时疫, 皮肤病。

## 7015293

*Delphinium anthriscifolium* Hance

植物名 还亮草《中国植志》

药材名 还亮草《名实图考》

文献名 还魂草、对叉草、蝴蝶菊《名实图考》

地方名 安徽:野红萝卜;浙江:鱼灯苏、车子野茺荑(临安);广西:牛疔草(临桂), 芝荑上(兴安), 野彩菊;其他:蛇啣草。

功效 全草:有毒。祛风通络。用于半身不遂, 风湿筋骨疼痛。

## 7015294

*Delphinium anthriscifolium* Hance var. *calleryi* (Franch.) Finet et Gagnep.

植物名 卵瓣还亮草《中国植志》

文献名 还魂草、对叉草、蝴蝶菊《名实图考》

功效 全草:用于痈疮肿毒, 跌打损伤。

## 7015295

*Delphinium anthriscifolium* var. *majus* Pamp.

植物名 大花还亮草《中国植志》

地方名 湖北:飞燕草(神农架);贵州:绿花草(剑河)。

功效 全草:清热解毒, 祛痰止咳。用于重舌, 肺癆咳嗽。

## 7015296

*Delphinium beesianum* W. W. Sm.

植物名 宽距翠雀花《中国植志》

药材名 底木萨《迪庆藏药》

功效 全草:止痢, 止痛, 愈疮, 干“黄水”, 除虱。用于腹泻, 寒痢, 热痢, 脓泻, 小肠疼痛, “黄水”病, 疮痛, 伤口。

## 7015297

*Delphinium biternatum* Huth

植物名 三出翠雀花《中国植志》

文献名 黄花飞燕草《新疆中草药》

功效 全草:祛风燥湿, 止痛定惊。

## 7015298

*Delphinium bonvalotii* Franch. --- *D. fargesii* auct. non Franch.

植物名 川黔翠雀花《中国植志》

文献名 川西翠雀花《峨眉药植研究》, 峨山草乌《四川中药志》

地方名 四川:[乌头]、铁脚草乌(峨眉)。

功效 根:有毒。镇痛, 祛风除湿。用于半身不遂, 风湿筋骨疼痛。外用于痈疮瘰癧。

备考 《四川中药志》(1960)将本种学名误订为 *D. fargesii* Franch.

## 7015299

*Delphinium bonvalotii* var. *eristylum* (Levl.) W. T. Wang --- *D. eristylum* Levl. --- *D. davidii* auct. non Franch.

植物名 毛梗川黔翠雀花《中国植志》

地方名 贵州:水乌头, 水川乌。

功效 根:用于无名肿毒。

备考 《贵州草药》(1970)学名误订为 *D. davidii* Franch.

## 7015300

*Delphinium brunonianum* Royle

植物名 囊距翠雀花《中国植志》

文献名 囊距翠雀《西藏中草药》, 囊距飞燕草《汇编》

地方名 西藏:“甲果贝”、“普沟勃”(藏名)

功效 全草:凉血解毒, 祛风止痒。用于流感, 皮肤痒疹, 蛇咬伤等症。

## 7015301

*Delphinium bulleyanum* Forrest ex Diels

植物名 拟螺距翠雀花《中国植志》

药材名 雀果贝《迪庆藏药》

功效 花:清热, 解邪毒。用于瘟病时疫, 皮肤病。

## 7015302

*Delphinium caeruleum* Jacq. ex Camb.

植物名 蓝翠雀花《中国植志》

文献名 滴木沙《高植图鉴》

地方名 西藏:“雀冈”(藏名), “恰冈哇”(阿里地区藏名)。

功效 地上部分:用于肠热腹泻, 肝胆疾病。

## 7015303

*Delphinium candelabrum* Ostf.

植物名 奇林翠雀花《中国植志》

功效 花:在西藏供药用。

## 7015304

*Delphinium candelabrum* var. *monanthum* (Hand. -Mazz.) W. T. Wang --- *D. monanthum* Hand. -Mazz.

植物名 单花翠雀花《中国植志》

地方名 青海:“德木萨”(藏名)。

功效 全草:温中, 止泻。用于胃肠冷痛, 泄泻。

## 7015305

*Delphinium ceratophorum* Franch.

植物名 角萼翠雀花《中国植志》

文献名 角花翠雀、虎耳兰《汇编》, 翠雀一枝蒿《药植简编》

地方名 贵州:[一枝蒿](盘县);云南:虱子药(丽江)。

功效 根:有毒。镇痛。用于跌打肿痛。

## 7015306

*Delphinium ceratophorum* Franch. var. *brevicorniculatum* W. T. Wang

植物名 短角萼翠雀花《中国植志》

药材名 雀冈《迪庆藏药》

功效 地上部分:清热, 止泻痢。用于肠热腹泻, 痢疾, 肝胆热病。

## 7015307

*Delphinium chefoense* Franch.

植物名 烟台翠雀花《中国植志》

文献名 烟台翠雀《山东经植》

地方名 山东:山鸦雀儿(栖霞), 山鸦雀花(牙山),

苦莲、[鸡爪莲](威海)。

功效 全草:水浸液可杀苍蝇及孑孓。

备考 根:在山东威海等地混充黄连用,应注意鉴别。

#### 7015308

*Delphinium chenii* W. T. Wang

植物名 白缘翠雀花《中国植志》

药材名 底木萨《迪庆藏药》

功效 全草:止痢,止痛,愈疮,干“黄水”,除虱。用于腹泻,寒痢,热痢,脓泻,小肠疼痛,“黄水”病,疮痛,伤口。

#### 7015309

*Delphinium chrysotrichum* Finet et Gagnep. --- *D. tsarongense* var. *patentipilum* W. T. Wang

植物名 黄毛翠雀花《中国植志》

药材名 洛赞巴《迪庆藏药》

功效 地上部分:清热,止泻,止痛。用于热泻,腹胀腹痛。

#### 7015310

*Delphinium coleopodum* Hand. -Mazz.

植物名 鞘柄翠雀花《中国植志》

文献名 带角飞燕草《玉龙山药植》

地方名 云南:毒虱草、毒蝇草(玉龙山)。

功效 根:有毒。温中止痛,杀虫。用于小儿肚寒腹痛,劳伤痛。

#### 7015311

*Delphinium consolida* L.

植物名 琉璃翠雀花(拟)

文献名 琉璃飞燕草《台湾药植志》

功效 种子:有毒。用于利尿,痉挛性哮喘,水肿。外用于灭头虱。

#### 7015312

*Delphinium davidii* Franch.

植物名 谷地翠雀花《中国植志》

文献名 峨山草乌《四川中药志》,四川翠雀、峨眉翠雀《植分学报》

地方名 四川:乌头、草乌(峨眉);贵州:水乌头(都匀、正安),水川乌(绥阳)。

功效 根:有毒。镇痛,祛风除湿。用于中风半身不遂,风湿筋骨痛。外用于疮痍癰疽。

备考 《植分学报》(1962)学名误订为 *D. sutchuenense* Franch.

#### 7015313

*Delphinium delavayi* Franch.

植物名 滇川翠雀花《中国植志》

药材名 小草乌《云南中草药》

文献名 滇北翠雀花《高植图鉴》

地方名 云南:细草乌(红河),鸡足草乌(曲靖、昆明),[土黄连],草黄连,筛子花,“罗高”(楚雄彝名)。

功效 根:祛风湿,止痛,镇惊。用于风湿痛,癰疽,蛔虫等。

#### 7015314

*Delphinium delavayi* var. *pogonanthum* (Hand. -Mazz.)

W. T. Wang --- *D. pogonanthum* Hand. -Mazz.

植物名 须花翠雀花《中国植志》

文献名 须花飞燕草《云南药录》

地方名 贵州:白升麻(威宁);云南:紫桔梗(玉龙山)。

功效 根:清热解表,升阳。用于风热头痛,水泻。

#### 7015315

*Delphinium densiflorum* Duthie ex Huth

植物名 密花翠雀花《中国植志》

文献名 “文阿玛保”(藏名)《青藏药图》

功效 全草:解乌头毒。

#### 7015316

*Delphinium clarum* L. var. *sericeum* W. T. Wang

植物名 绢毛高翠雀花《中国植志》

备考 《新华本草纲要》称:高翠雀碱有箭毒样作用。

#### 7015317

*Delphinium elatum* L.

植物名 高茎翠雀《庐山裁植》

文献名 高飞燕草《新疆中草药》

功效 全草:祛风燥湿,止痛定惊。

#### 7015318

*Delphinium grandiflorum* L. --- *D. grandiflorum* var. *chinense* Fisch. ex DC. --- *Chienia honanensis* W. T. Wang

植物名 翠雀《名实图考》、《中国植志》

药材名 翠雀草(东北)

文献名 蓝蝴蝶《满州植录》,辣子草《陕甘宁植志》,大花飞燕草《经植手册》,猫眼花《中药通报》,翠菊花《东北中草》,后衣花《沙漠药植》,河南翠菊花《神农架药录》

地方名 鸽子花(东北),鸡爪连(黑龙江、吉林、北京),[百部](陕西、宁夏);吉林:[土黄连](镇赉、通榆);辽宁:蓝鸽子花(新武);河北:百部草(北部);内蒙古:摇咀咀花,“布日-其其格”(蒙名);陕西:黄洒花,飞燕草;甘肃:鹦哥草;宁夏:蓝鸽子草(银川);上海:萝卜花;安徽:瓣根草;湖北:树儿乌头、啄木冠花(神农架);四川:“玉珠色注”(藏名)。

功效 全草:有大毒。泻火止痛,杀虫。用于牙痛,关节痛,疮痍溃瘍,杀虫,灭虱、蝇、蛆等。

#### 7015319

*Delphinium grandiflorum* var. *glandulosum* W. T. Wang

植物名 腺毛翠雀《中国植志》

地方名 甘肃:鹦哥花;安徽:灭虱草,瓣根草;江苏:蓝盞棵。

功效 根及全草:有毒。泻火止痛,杀虫。用于风热牙痛。

#### 7015320

*Delphinium grandiflorum* var. *mosoynese* (Franch.)

Huth --- *D. mosoynense* Franch.

植物名 裂瓣翠雀《中国植志》

地方名 云南:飞燕草,小草乌,细草乌。

功效 块根:散瘀消肿,止痛。用于跌打损伤,风湿肌痛,胃肠痛,慢性支气管炎,小儿疳积,小儿肺炎,小儿腹泻,腹胀,小儿高热惊厥。外用于疮疡。

#### 7015321

*Delphinium gyalanum* Marq. et Shaw --- *D. lasiocarpum* Tamura --- *D. kawaguchii* Tamura

植物名 拉萨翠雀花《中国植志》

功效 根:祛风除湿。

#### 7015322

*Delphinium honanense* var. *piliferum* W. T. Wang

植物名 毛梗翠雀花《中国植志》

地方名 陕西:云雾七(平利)。

功效 根:活血,止痛。用于头痛,腰背痛,腹痛,劳伤。

备考 《陕西中草药》(1971),本种学名误订为 *D. giraldii* Diels.

#### 7015323

*Delphinium iliense* Huth

植物名 伊犁翠雀花《中国植志》

文献名 飞燕草、伊犁飞燕草《新疆中草药》

功效 全草:有毒。祛风燥湿,止痛定惊。用于风湿痛,胃痛,小儿惊风,跌打损伤。

#### 7015324

*Delphinium kamaonense* var. *glabrescens* (W. T. Wang) W. T. Wang --- *D. pseudograndiflorum* W. T. Wang

植物名 展毛翠雀花《中国植志》

文献名 展毛翠雀“下冈哇”(藏名)《青藏药图》

地方名 四川:“稀吐”(川西部藏名)。

功效 全草及花:消炎药,止腹泻;根:除风湿。外敷疮癣。

#### 7015325

*Delphinium korshinskianum* Nevski

植物名 东北高翠雀花《中国植志》

文献名 东北高翠雀(东北草本植志)

功效 全草:杀虫,灭蝇和蟑螂。

#### 7015326

*Delphinium likiangense* Franch.

植物名 丽江翠雀花《中国植志》

地方名 云南:虱子药(丽江)。

功效 叶:干后磨成粉可杀虱子。

#### 7015327

*Delphinium maackianum* Regel --- *D. maackianum* f. *albiflorum* S. H. Li et Z. F. Fang

植物名 宽苞翠雀花《中国植志》

文献名 乌头叶翠雀《吉野》

功效 根:调经。

#### 7015328

*Delphinium omeiense* W. T. Wang --- *D. davidii* auct. non Franch.

植物名 峨眉翠雀花《中国植志》

地方名 四川:峨山草乌、铁脚草乌(峨眉山)。

功效 根:镇痛,祛风除湿。用于中风半身不遂,风湿筋骨疼痛。外用于痈疮瘤赘。

备考 有些文献将本种学名误订为 *D. davidii* Franch.

#### 7015329

*Delphinium potaninii* Huth --- *D. fargesii* Franch. --- *D. campylocentrum* auct. non Maxim.

植物名 黑水翠雀花《中国植志》

文献名 弯距翠雀花《秦岭植志》,卷距飞燕草《汇编》,峨山飞燕草《中药大辞典》

地方名 四川:[乌头](峨眉),峨山草乌(峨眉山);贵州:[牛扁](毕节)。

功效 根:有毒。祛风除湿,温经通络,止痛。用于风湿筋骨痛,麻木,瘫痪。

备考 《秦岭植志》(1974)学名误订为 *D. campylocentrum* Maxim.

#### 7015330

*Delphinium pseudopulcherrimum* W. T. Wang

植物名 宽萼翠雀花《中国植志》

文献名 假美丽翠雀花《高植图鉴》

功效 根:用于止痛,跌打,流感,蛇咬伤,湿疹。

#### 7015331

*Delphinium pylzowii* Maxim.

植物名 大通翠雀花《中国植志》

地方名 青海:“下冈哇”(藏名)。

功效 地上部分:用于肠炎腹泻,肝病等症。

#### 7015332

*Delphinium pylzowii* var. *trigynum* W. T. Wang

植物名 三果大通翠雀花《中国植志》

文献名 青甘翠雀《青藏药图》

功效 全草:用于肠炎。

#### 7015333

*Delphinium siwanense* Franch. var. *leptopogon* (Hand. -Mazz.) W. T. Wang --- *D. leptopogon* Hand. -Mazz.

植物名 细须翠雀花《中国植志》

地方名 甘肃:英哥草。

功效 全草:杀虫。

#### 7015334

*Delphinium smithianum* Hand. -Mazz.

植物名 定兴翠雀花《中国植志》

药材名 底木萨《迪庆藏药》

功效 全草:止痢,止痛,愈疮,干“黄水”,除虱。用于腹泻,寒痢,热痢,脓泻,小肠疼痛,“黄水”病,疮痛,伤口。

#### 7015335

*Delphinium souliei* Franch.

植物名 川甘翠雀花《中国植志》

文献名 “恰冈哇”(藏名)《青藏药图》

功效 地上部分:用于肠热腹泻,肝胆疾病。

#### 7015336

*Delphinium sparsiflorum* Maxim.

植物名 疏花翠雀花《中国植志》

文献名 疏花翠雀《六盘山药录》

功效 根:活血,止痛。

#### 7015337

*Delphinium spirocentrum* Hand.-Mazz.

植物名 螺距翠雀花《中国植志》

药材名 雀果贝《迪庆藏药》

功效 花:清热,解邪毒。用于瘟疫时疫,皮肤病。

#### 7015338

*Delphinium tatsienense* Franch.

植物名 康定翠雀花《中国植志》

药材名 惊风药《西昌中草药》

文献名 小草乌《名实图考》,打箭炉翠雀《贵州药录》

地方名 四川:鸡爪乌(川西),千草乌(会理),人神药(会东);贵州:公虎图辣(威宁),虎图辣;云南:细草乌(红河),冷水药、耗子脚板(会泽),虎头兰(昭通)。

功效 根:有毒。止痛镇静,祛风除湿。用于小儿惊风,高烧,风湿,胃痛,牙痛,跌打损伤等。

#### 7015339

*Delphinium tenui* Levl.

植物名 长距翠雀花《中国植志》

药材名 洛赞巴《迪庆藏药》

功效 地上部分:清热,止泻,止痛。用于热泻,腹胀腹痛。

#### 7015340

*Delphinium thibeticum* Finet et Gagnep. --- *D.*

*thibeticum* var. *subintegrum* Finet et Gagnep. --- *D.*

*thibeticum* var. *schizophyllum* Hand.-Mazz. --- *D.*

*pyncocentroides* W. T. Wang --- *D. pyncocentroides* var.

*latisectum* W. T. Wang

植物名 澜沧翠雀花《中国植志》

药材名 雀果贝《迪庆藏药》

地方名 云南:毒蝇草(中甸)。

功效 花:清热,解邪毒。用于瘟疫时疫,皮肤病。

#### 7015341

*Delphinium tongolense* Franch.

植物名 川西翠雀花《中国植志》

文献名 草乌头草《植物名汇》

功效 根:有毒。止痛镇静,祛风除湿,杀虫。

#### 7015342

*Delphinium trichophorum* Franch.

植物名 毛翠雀花《中国植志》

地方名 青海:“嘎布得罗”(藏名);四川:白狼毒;西藏:“抢把拿朵”(昌都藏名)。

功效 地上部分:退烧。用于感冒;根:镇痛,祛风湿。外用于痈,疮,癣。

#### 7015343

*Delphinium trichophorum* var. *platycentrum* W. T. Wang

植物名 粗距毛翠雀花《中国植志》

文献名 宽距毛翠雀、“嘎布得罗”(藏名)(西藏药图)

功效 地上部分:退烧。用于感冒。

#### 7015344

*Delphinium trifoliatum* Finet et Gagnep.

植物名 三小叶翠菊花《中国植志》

药材名 三小叶翠菊花《贵州药录》

功效 根:镇痛除湿,祛风活血。用于中风,半身不遂,瘰疬。

#### 7015345

*Delphinium yangii* W. T. Wang

植物名 竞生翠雀花《迪庆藏药》

药材名 洛赞巴《迪庆藏药》

功效 地上部分:清热,止泻,止痛。用于热泻,腹胀腹痛。

#### 7015346

*Delphinium yunnanense* Franch

植物名 云南翠雀花《中国植志》

药材名 月下参《滇南本草》

地方名 小草乌、鸡脚草乌(云南、四川),〔倒提壶〕(贵州、云南);云南:米草乌(昆明),小灵丹、细草乌(红河),矮槐(玉溪),“诺哪西哩”(玉溪彝语)。

功效 根:有毒。温经通络,祛风除湿,散寒止痛。用于风湿关节痛,胃寒痛,跌打损伤。外用于疔疮。

#### 7015347

*Dichocarpum auriculatum* (Franch.) W. T. Wang et

Hsiao --- *Isopyrum auriculatum* Franch.

植物名 耳状人字果《中国植志》

地方名 四川:母猪草(川西南),猪风草、一朵云(峨眉),山黄连。

功效 全草:利湿,解毒,止咳化痰。用于虚肿。外用于瘰疬。

#### 7015348

*Dichocarpum basilare* W. T. Wang et Hsiao

植物名 基叶人字果《中国植志》

地方名 四川:地五加(宜宾)。

功效 全草:用于风湿,水肿。

#### 7015349

*Dichocarpum dalzielii* (Drumm. et Hutch.) W. T. Wang

et Hsiao

植物名 蕨叶人字果《中国植志》

地方名 广东:野黄连、龙节七(从化);贵州:岩节连(兴仁)。

功效 根:消肿败毒。用于红肿疮毒等症。

#### 7015350

*Dichocarpum fargesii* (Franch.) W. T. Wang et Hsiao

植物名 纵肋人字果《中国植志》

药材名 扇叶人字果《汇编》

地方名 湖北:人字草(神农架);贵州:野黄瓜(雷公山),“家莫里”(雷公山苗语)。

功效 全草:有小毒。健脾益胃,清热明目。用于消化不良,火眼。

#### 7015351

*Dichocarpum franchetii* (Finet et Gagnep.) W. T. Wang

et Hsiao



植物名 小花人字果《中国植志》  
功效 全草：用于消化不良，目赤肿痛。

**7015352**

*Dichocarpum hypoglaucum* W. T. Wang et Hsiao

植物名 粉背叶人字果《中国植志》  
地方名 贵州：岩结连；云南：岩黄连。  
功效 根：消肿散毒。

**7015353**

*Dichocarpum trifoliolatum* W. T. Wang et Hsiao

植物名 三小叶人字果《中国植志》  
地方名 四川：羊不吃、三脚蝉(筠连)。  
功效 全草：驱风。

**7015354**

*Eranthis stellata* Maxim.

植物名 黄花菟葵(拟)  
文献名 菟葵《中国植志》  
功效 茎苗：用于尿酸结石，小便淋沥不清。外用于各种恶疮，蛇咬伤。  
备考 《中国植志》以本品为菟葵。《唐本草》谓菟葵花白似梅，但本品花黄色，故以称黄花菟葵为宜。又松村任三《植物名汇》以 *E. pinnatifida* Maxim. 为菟葵，《本草新注》及《中国植物图鉴》谓此即《唐本草》之菟葵。《拉汉种称补编》则以 *E. hyemalis* Salisb. 为菟葵。鄂家林考证认为《唐本草》之菟葵为锦葵科植物 *Malva verticillata* L. (《中药材》1991)。

**7015355**

*Halerpestes cymbalaria* (Pursh) Green --- *Ranunculus cymbalaria* Pursh --- *Halerpestes sarmentosa* (Adans.) Kom.

植物名 水葫芦苗《中国植志》  
药材名 水葫芦苗《救荒本草》、《西藏本草》  
文献名 圆叶碱毛茛、裂叶碱毛茛《东北草本植志》  
地方名 西藏：“曲露柏拉”(藏名)；其他：九百棒。  
功效 全草：利水消肿，祛风除湿。用于关节炎及各种水肿等。

**7015356**

*Halerpestes tricuspid* (Maxim.) Hand. -Mazz.

植物名 三裂碱毛茛《中国植志》  
地方名 西藏：“索冬巴”(阿里地区藏名)。  
功效 全草：清热解毒。用于烧伤，烫伤。

**7015357**

*Helleborus niger* L.

植物名 嚏根草《拉汉英种称》  
文献名 黑儿波《经植手册》，九牛七《药植简编》  
功效 根茎及根：有毒。具强心和抗肿瘤作用。

**7015358**

*Helleborus thibetanus* Franch. --- *H. chinensis* Maxim. --- *H. viridis* L. var. *thibetanus* (Franch.) Finet et Gagnep.

植物名 铁筷子《中国植志》  
药材名 铁筷子《陕西中草药》  
地方名 陕西：黑毛七(太白山)，小山桃儿七，小桃

儿七(凤县)，九百棒，九龙丹、九莲灯、九朵云、鸳鸯七(镇坪)，见春花(平利)，双铃草；湖北：铁造(神农架)。

功效 根茎及根：有小毒。清热解毒，活血散瘀，消肿止痛。用于膀胱炎，尿道炎，疮痈肿毒，跌打损伤。

**7015359**

*Hepatica henryi* (Oliv.) Steward --- *H. yamatutai* Nakai

植物名 川鄂獐耳细辛《中国植志》  
地方名 湖北：水黄连、上黄连(神农架)；四川：三角海棠(峨眉山)。

功效 根及根茎：清热，解毒，泻火。用于目赤肿痛。

**7015360**

*Hepatica nobilis* Schreb. var. *asiatica* (Nakai) Hara

植物名 獐耳细辛《中国植志》  
药材名 獐耳细辛《纲目》、《品种论述》  
地方名 安徽：蝴蝶草，野菱角菜；浙江：幼肺三七(东天目山)，牛肺三七(泰顺)。

功效 根茎：用于劳伤，筋骨酸痛。外用于皮肤病，风湿病。

**7015361**

*Isopyrum anemonoides* Kar. et Kir. --- *Paraquilegia anemonoides* (Kar. et Kir.) Ulbr.

植物名 扁果草《中国植志》  
文献名 宿萼假楼斗菜《阿里考察报告》  
地方名 西藏：“叶矛对斤”(阿里地区藏语)。  
功效 块根：用于跌打损伤，出枪弹，下胎衣及死胎。

**7015362**

*Isopyrum manshuricum* Kom. --- *Semiaquilegia manshurica* Kom.

植物名 东北扁果草《中国植志》  
功效 块根：在黑龙江一带作天葵子用。

**7015363**

*Kingdonia uniflora* Balf. f. et W. W. Smith

植物名 独叶草《中国植志》  
功效 全草：健胃，祛风，调经。

**7015364**

*Leptopyrum fumarioides* (L.) Reichb. --- *Isopyrum fumarioides* L.

植物名 蓝蓼草《中国植志》  
文献名 葶叶莱托飘《陕甘宁植志》  
功效 全草：用于心血管疾病，胃肠道病和伤寒。

**7015365**

*Naravelia pilulifera* Hance

植物名 两广锡兰莲《中国植志》  
文献名 拿拉藤《科属词典》，锡兰莲《海南植志》  
地方名 广西：毛昔(博白)，[延胡索](龙州)，小本通(宁明)，威灵仙(天等)。  
功效 根、茎：用于风湿骨痛，小便不利。

**7015366**

*Naravelia zeylanica* (L.) DC.

植物名 锡兰莲《中国植志》

药材名 罗藤(元江哈尼族药)

地方名 云南:“哈遮野尼”(元江哈尼语)。

功效 根:健脾消食,舒筋活络。用于饮食积滞,胃寒腹痛,跌打劳伤,腰腿疼痛。

#### 7015367

*Nigella damascena* L.

植物名 黑种草(中国植志)

地方名 上海:黑子草。

功效 种子:用于催乳,解凝,利尿等。

#### 7015368

*Nigella glandulifera* Freyn et Sint.

植物名 腺毛黑种草(中国植志)

药材名 黑种草子(药典)

文献名 瘤果黑种草(药典)

地方名 新疆:“斯亚旦”(维名);云南:黑种草,“景哪”(西双版纳傣名);西藏:“色拉那博”(藏名)。

功效 种子:补肾健脑,通经,通乳,利尿。用于耳鸣健忘,经闭乳少,热淋,石淋。

#### 7015369

*Nigella sativa* L.

植物名 香黑种草(药典)

药材名 香黑种草子(药典)

文献名 黑种草、家黑种草(新疆中草药),“斯亚旦”(维名)、“斯惹纳博”(藏名)(民族药志)

功效 幼苗和种子:散寒,通经,活血,健脑。用于月经不调,风寒感冒,心悸,失眠,尿路结石;种子:用于肝炎,肝肿大,胃寒。

#### 7015370

*Oxygraphis glacialis* (Fisch.) Bunge

植物名 鸦跖花(中国植志)

文献名 “塞交赛保”(藏名)(青藏药图)

功效 全草:疏风散寒,开窍通络,消炎镇痛。

#### 7015371

*Paeonia anomala* L.

植物名 窄叶芍药(中国植志)

药材名 窄叶赤芍(拟)

文献名 毛果芍药(经植手册),变叶赤芍(中药志),奇特芍药(品种论述),毛实芍药(陕西中草药),西北草芍药(汇编)

地方名 赤芍、[臭牡丹](甘肃、新疆);陕西:芍药;甘肃:野药(卓尼),[野牡丹],[牡丹](临洮);新疆:草芍药,“巧克鲁克”(维名)。

功效 根:活血化瘀,解毒消肿。用于月经不调,血崩脐腹痛,中耳炎头痛,急性乳腺炎。

#### 7015372

*Paeonia anomala* L. var. *intermedia* (C.A. Mey.) O. et B. Fedtsch. --- *P. hybrida* Pall.

植物名 块根芍药(中国植志)

药材名 块根芍药(中国植志)

文献名 新疆赤芍(新疆中草药手册),新疆芍药(中药志)

地方名 赤芍(新疆、甘肃);甘肃:野芍(卓尼),[牡

丹](临洮),[臭牡丹],芍药。

功效 根:活血化瘀,解毒消肿。

#### 7015373

*Paeonia delavayi* Franch.

植物名 紫牡丹(树分)

药材名 赤丹皮(云南)

文献名 [野牡丹](中国植志),滇藏牡丹(新华本草纲要)

地方名 (赤芍)(四川、云南、西藏);四川:西昌丹皮;云南:云白芍[去根皮]。

功效 根皮:用于吐血,尿血,血痢,痛经等。

#### 7015374

*Paeonia delavayi* Franch. var. *angustiloba* Rehd. et Wils. --- *P. potanini* Kom.

植物名 狭叶牡丹(中国植志)

药材名 狭叶牡丹皮(拟)

文献名 乌花牡丹、窄叶牡丹(品种论述),狭叶野牡丹(云南种录),赤芍(中草药通讯)

地方名 云南:赤丹皮

功效 根皮:用于吐血,尿血,血痢,痛经等。

#### 7015375

*Paeonia delavayi* Franch. var. *lutea* (Delavay ex Franch.) Finet et Gagnep. --- *P. potanini* Kom. var. *triloboides* (Stapf ex Stern) Stern --- *P. lutea* Delavay ex Franch.

植物名 黄牡丹(中国植志)

药材名 黄牡丹皮(西藏)

文献名 金莲牡丹(植分学报),丹皮(中国经植志),西昌丹皮(新华本草纲要)

地方名 [野牡丹](云南、四川);四川:白牡丹、黄芍药(西昌);云南:野白芍、[赤芍](剑川、鹤庆),牡丹根(昆明),[芍药],狗头赤芍,五花头,[白芍](曲靖、昆明);西藏:“白玛色尔布”(藏语)。

功效 根皮:清热凉血,散瘀止痛,通经。用于吐血,衄血,头痛,腰痛,关节痛,烦热,月经不调。

#### 7015376

*Paeonia lactiflora* Pall. --- *P. albiflora* Pall. - *P. lactiflora* var. *hirta* (Regel) Chu

植物名 芍药(本经)、(中国植志)

药材名 白芍、赤芍(药品化义)、(药典)

文献名 其积、解仓、涎、馥容、[白术](吴普本草),犁食、铤(别录),离草(韩诗外传),可离(崔豹古今注),赤芍药、白芍药(本草经集注),金芍药(图经),将离、花相(纲目),毛脉芍药(东北药植志),野生芍药(中国经植志),野芍药(沙漠药植)

地方名 山芍药(黑龙江、内蒙古、山西、宁夏),东芍(东北、浙江);吉林:“含巴高”(朝名);辽宁:山芍药花根;内蒙古:山赤芍,“乌兰-察那”、“苏尔得马日卜”(蒙名);甘肃:宝鸡白芍,西白芍;新疆:“阿克巧克鲁克”(维名),杭白芍;江苏:芍药根(吴县);浙江:杭芍(东阳、磐安、缙云),临安白芍(临安);安徽:亳芍、亳白芍(亳县);湖南:家白芍;四川:川白芍,川芍(中县、渠县、

铜梁); 云南: 草芍药。

功效 带皮根(赤芍): 清热凉血, 散瘀止痛。用于温毒发斑, 吐血衄血, 目赤肿痛, 肝郁胁痛, 经闭痛经, 癌瘕腹痛, 跌打损伤, 痈肿疮疡; 去皮根(白芍): 平肝止痛, 养血调经, 敛阴止汗。用于头痛眩晕, 胁痛, 腹痛, 四肢挛痛, 血虚萎黄, 月经不调, 自汗, 盗汗。

#### 7015377

*Paeonia lactiflora* Pall. var. *trichocarpa* (Bunge) Stern --- *P. albiflora* Pall. var. *trichocarpa* Bunge --- *P. yui* Fang

植物名 毛果芍药《中国植志》

药材名 芍药《药学报》

文献名 毛芍药《药学报》

地方名 云南: 赤芍(维西)。

功效 带皮根: 清热凉血, 散瘀止痛; 去皮根: 平肝止痛, 养血调经, 敛阴止汗。

#### 7015378

*Paeonia mairei* Levl. --- *P. oxypetala* Hand. -Mazz. --- *P. mairei* Levl. f. *oxypetala* (Hand. -Mazz.) Fang

植物名 美丽芍药《中国植志》

药材名 狗头赤芍(四川宝兴)

文献名 尖瓣芍药《经植手册》, 尖瓣美丽芍药《药植简编》, 狗头芍药《中药志》, 赤芍丹皮《品种论述》

地方名 甘肃: 小山芍药; 四川: 白芍(万源、广元), [牡丹皮](西昌), 赤芍(峨眉山)。

功效 根: 泻肝火, 活血通经。

《植研》11(2): 85, 1991, 丁开宇、刘鸣运认为: 东北草芍药是红花型 *P. ovolata* Maxim., 而白花型应是由芍药 *P. japonica* Miyabe et Takada, 两者不宜相混。

#### 7015379

*Paeonia obovata* Maxim. --- *P. oreogeton* S. Moore --- *P. obovata* Maxim. var. *glabra* Makino --- *P. obovata* Maxim. f. *oreogeton* (S. Moore) Kitagawa

植物名 草芍药《中国植志》

药材名 赤芍《汇编》

文献名 红芍药《圣济总录》, 卵叶芍药、白花卵叶芍药《东北药植志》, 白花草芍药《中药通报》, 倒卵光叶芍药《品种论述》

地方名 山芍药(东北、华北、陕西、甘肃、宁夏、湖北、贵州), 野芍药(北京、甘肃、浙江、贵州), 山丹花、西赤芍、铁杆菊(西北), 土白芍(北京、东北); 辽宁: 参幌子, 山赤芍, 狗头参(建昌); 河北: 山芍药根, 白芍药花; 青海: 臭牡丹根; 江西: 京赤芍(庐山); 湖南: 野赤芍; 贵州: 岩芍药(都匀、麻江), 岩赤芍(贵阳), 臭芍药, 山白芍药。

功效 根: 散瘀血, 清血热。用于胸胁疼痛, 腹痛, 目赤, 痛经, 闭经, 吐血, 衄血, 痢痛, 跌打损伤。

#### 7015380

*Paeonia obovata* Maxim. var. *willmottiae* (Stapf) Stern --- *P. willmottiae* Stapf

植物名 毛叶草芍药《中国植志》

药材名 毛叶芍药《四川中药志》

地方名 赤芍(四川、湖北), 野芍药(陕西、湖北); 陕

西: 宝鸡白芍, 毛芍(太白), 白芍; 四川: 土白芍(若尔盖)。

功效 根: 散瘀血, 清血热。

#### 7015381

*Paeonia sinjiangensis* K. Y. Pan

植物名 新疆芍药《中国植志》

药材名 新疆芍药《药学报》

功效 根: 清热凉血, 散瘀止痛。

#### 7015382

*Paeonia suffruticosa* Andr. --- *Paeonia moutan* Sims --- *P. yunnanensis* Fang

植物名 牡丹《本经》、《中国植志》

药材名 牡丹皮《珍珠囊》、《药典》

文献名 鹿韭、鼠姑《本经》, 百两金《唐本草》, 富贵花《滇南本草》, 吴牡丹、花王、木芍药《纲目》, 洛阳花、犬香国色《广群芳谱》, 条丹皮《汇编》, 云南牡丹《植分学报》

地方名 粉丹皮(山西、陕西、湖北、湖南、安徽、四川), 丹皮(华北、西北、江苏、安徽、浙江、四川、湖北), 凤丹(安徽、四川); 山西: 山丹皮(野生品), 抽骨丹皮; 陕西: 牡丹根皮, 黑丹皮(细小不去外皮), 刮丹皮[刮去外皮]; 青海: 紫丹皮, “拉豆玛尔保”(藏名); 新疆: “牡丹坡司提”(维名); 山东: 东丹; 安徽: 凤丹皮(凤凰山), 瑶丹皮(瑶沙山), 瑶丹, 姚丹; 湖北: 香丹皮, 红丹皮(神农架); 湖南: 铁牛角(宜章), 潮丹; 四川: 垫丹, 垫江丹皮, 川丹, 刮丹[刮去表皮, 抽去木心], 抽丹[抽去木心], 根丹, 统庄粉丹, 统庄丹根, 灌县丹皮, 茂汶丹皮; 其他: 正牡丹, 九牡丹。

功效 根皮: 清热凉血, 活血散瘀。用于温毒发斑, 吐血衄血, 夜热早凉, 无汗骨蒸, 经闭痛经, 痈疮肿毒, 跌打损伤。

#### 7015383

*Paeonia suffruticosa* Andr. var. *papaveracea* (Andr.) Kerner --- *P. papaveracea* Andr.

植物名 紫斑牡丹《中国植志》

药材名 紫斑牡丹皮(拟)

文献名 绛纱笼玉(牡丹谱), 秋水洛神(树分)

地方名 陕西: 牡丹(秦岭), 丹皮, 粉丹皮, 西北丹皮, 西丹皮; 湖北: 树儿牡丹(神农架)。

功效 根皮: 清热凉血, 活血化瘀。

#### 7015384

*Paeonia suffruticosa* Andr. var. *spontanea* Rehd.

植物名 矮牡丹《中国植志》

药材名 矮牡丹皮(拟)

文献名 山牡丹《品种论述》

地方名 上海: 牡丹; 陕西: 西丹皮, 野牡丹(延安)。

功效 根皮: 清热凉血, 活血化瘀。

#### 7015385

*Paeonia szechuanica* Fang

植物名 四川牡丹《中国植志》

药材名 西昌丹皮(四川)

文献名 川牡丹《汇编》

地方名 四川:丹皮(马尔康、丹巴、金川)。

功效 根皮:清热凉血,活血化瘀。

#### 7015386

*Paeonia veitchii* Lynch

植物名 川赤芍《中国植志》

药材名 赤芍《药典》

文献名 毛果赤芍《四川野生经济志》,川芍药《中药志》,毛果芍药《品种论述》,狭叶牡丹《西藏中草》

地方名 陕西:红芍(太白山);青海:臭牡丹,“拉豆”(藏名);四川:刮皮赤芍,原皮赤芍,牛尾赤芍(峨眉山),条赤芍。

功效 根皮:清热凉血,散瘀止痛。用于温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,瘕瘕腹痛,跌打损伤,痈肿疮疡。

#### 7015387

*Paeonia veitchii* Lynch var. *woodwardii* (Stapf ex Cox) Stern

植物名 毛赤芍《中国植志》

药材名 赤芍(四川)

功效 根:清热凉血,散瘀止痛。

#### 7015388

*Paraquilegia microphylla* (Royle) Drumm. et Hutch.

植物名 拟楼斗菜《中国植志》

文献名 假楼斗菜《西藏中草》,小叶假楼斗菜《汇编》

地方名 青海:“叶矛对斤”(藏名);四川:“益母宁精”(川西北藏名),高山天葵子(若尔盖);西藏:“榆莫得乌锦”(藏名)。

功效 全草:活血散瘀,止痛止血。用于跌打损伤,拔除异物,外伤出血,子宫出血,下死胎。

#### 7015389

*Pulsatilla ambigua* Trucz. ex Pritz.

植物名 高山白头翁《新疆中草》

文献名 蒙古白头翁《中国植志》,北白头翁《东北草本植志》,新疆白头翁《汇编》

地方名 内蒙古:“伊尔贵”(蒙名);青海:白头翁,翁草;宁夏:内蒙白头翁。

功效 根:清热解毒,凉血止痢。用于阿米巴痢,菌痢,淋巴结核。

#### 7015390

*Pulsatilla campanella* Fisch. ex Regel et Tiling

植物名 钟萼白头翁《中国植志》

药材名 小花白头翁《新疆》

文献名 阿尔泰白头翁《汇编》

地方名 新疆:白头翁,“阿克巴西欧提”(维名)。

功效 根:清热解毒,凉血止痢。用于菌痢,淋巴结核。

#### 7015391

*Pulsatilla cernua* (Thunb.) Bercht. et Opiz. --- *Anemone cernua* var. *koreana* Yabe ex Nakai --- *Anemone cernua* Thunb. --- *Pulsatilla koreana* Nakai ex Mori.

植物名 朝鲜白头翁《中国植志》

药材名 朝鲜白头翁《东北草本植志》

文献名 白头翁《中药志》,猫头花《拉汉种称》

地方名 毛姑朵花(东北)。

功效 根:清热解毒,凉血止痢。

#### 7015392

*Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel --- *Anemone chinensis* Bunge

植物名 白头翁《中国植志》

药材名 白头翁《本经》、《药典》

文献名 野丈人、胡王使者《本经》,奈何草《吴普本草》,白头公《本草经集注》,白头翁草《圣济总录》,粉乳草、粉草、白头草《履巇岩本草》,虎掌花《名实图考》。

地方名 毛姑朵花(东北、河北、山西、山东),老婆子花(吉林、河北、山西、山东),老姑花(辽宁、山东),老公花(辽宁、山东),老翁花(山西、山东、湖北),老和尚头(山西、安徽、江苏),耗子尾巴花(辽宁、黑龙江、河北),耗子花根(吉林、黑龙江);黑龙江:〔漏芦〕;吉林:“哈尔米高”(朝鲜名),老太太花根;辽宁:猫爪子花,巨巨花(凌原),翁草;北京:犄角花,犄犄花,兔兔花,机机花根,鸡鸡花,鸡菊花;天津:北白头翁;河北:崩崩花,菊菊苗,菊菊花根,鸡苗花根,毫笔花,老姑叶,老婆花,兔花根,秃花根(张家口);山西:毛头花;内蒙古:“斯尔敖恩”(蒙名),老姑草(赤峰);陕西:羊胡子花(蓝田、周至),老虎花(山阳),莲花升麻、兔儿花、秃儿花(宜川),驴耳朵花(宝鸡);青海:毛娃娃;山东:老姑子花、老母猪花、老布袋花(烟台),老婆子花根;江苏:老人发根(盱眙),大将军草,大将军草根(邳县),山大蒜(睢宁),山鸡豆(新海连);安徽:老白毛;河南:头痛棵;湖北:八百锤(当阳),披毛鬼、小棕包(神农架);四川:“扑芒杂娃”(藏名);其他:毛女花,秃头花,猫姑花,大碗花,连合夜,猫独花。

功效 根:清热解毒,凉血止痢。用于热毒血痢,阴痒带下,阿米巴痢。

#### 7015393

*Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel var. *kissii* (Mandl) S. H. Li et Y. H. Huang --- *Pulsatilla kissii* Mandl

植物名 金县白头翁《中国植志》

药材名 金县白头翁《东北药用植物》

功效 根:清热解毒,凉血止痢,消炎镇痛。用于细菌性痢疾,阿米巴痢疾,胃肠炎,子宫炎,睾丸炎,疝痛,闭经,鼻衄,痔疮出血,白带;地上全草:用于腰膝肢节风痛,浮肿,心脏病;花:用于疟疾寒热,白秃头疮。

#### 7015394

*Pulsatilla dahurica* (Fisch.) Spreng. --- *Anemone dahurica* Fisch. ex DC.

植物名 兴安白头翁《中国植志》

药材名 兴安白头翁《东北植药图志》

文献名 白头翁《东北植药图志》

地方名 毛姑朵花、老婆花、老姑都花、耗子花根(东北),〔漏芦〕(黑龙江、吉林);内蒙古:老婆子花根。

功效 根:清热解毒,凉血止痢。

#### 7015395

*Pulsatilla millefolium* (Hemsl. et Wils.) Ulbr.

植物名 西南白头翁《中国植志》

药材名 蜘蛛草《西昌中草药》

文献名 多叶白头翁《西昌中草药》, 千叶白头翁《云南种录》

功效 全草: 有小毒。清热解毒。用于阿米巴痢疾, 疮毒搔痒。

#### 7015396

*Pulsatilla patens* (L.) Mill.

植物名 肾叶白头翁《中国植志》

文献名 掌裂白头翁《沈药学报》, 掌叶白头翁《汇编》

地方名 白头翁(内蒙古、长白山区)。

功效 根: 清热解毒, 凉血止痢。

#### 7015397

*Pulsatilla patens* var. *multifida* (Pritz.) S. H. Li et Y. H. Huang --- *P. multifida* (Pritz.) Juz.

植物名 掌叶白头翁《中国植志》

文献名 北白头翁《东北植药图志》

地方名 白头翁(东北)。

功效 根: 清热解毒, 凉血止痢。

#### 7015398

*Pulsatilla sukaczewii* Juz.

植物名 黄花白头翁《中国植志》

药材名 黄花白头翁《汇编》

地方名 内蒙古: 白头翁。

功效 根: 清热解毒, 凉血止痢。

#### 7015399

*Pulsatilla turczaninowii* Kryl. et Serg.

植物名 细叶白头翁《中国植志》

药材名 细叶白头翁《东北植药图志》

文献名 细裂白头翁《汇编》

地方名 白头翁(东北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏); 内蒙古: 毛姑朵花, “古拉盖-加云-花儿”(蒙名)。

功效 根: 清热解毒, 凉血止痢。

#### 7015400

*Ranunculus amurensis* Kom.

植物名 披针毛茛《中国植志》

药材名 披针叶毛茛《汇编》

文献名 长叶毛茛《东北草本植志》

地方名 四川: “索当巴”(若尔盖藏名)。

功效 全草: 有小毒。发散风热。用于疮肿痒疹, 筋骨疼痛。

#### 7015401

*Ranunculus arvensis* L.

植物名 田野毛茛《中国植志》

功效 全草: 清热解毒, 凉血止痢。

#### 7015402

*Ranunculus brotherusii* Freyn

植物名 鸟足毛茛《中国植志》

文献名 高原毛茛《青藏药图》

地方名 青海: “吉察”(藏名)。

功效 地上部分: 用于脾胃虚寒, 浮肿, 淋病。

#### 7015403

*Ranunculus cantoniensis* DC.

植物名 禺毛茛《中国植志》

药材名 白扣草《生草药性备要》、《中药大辞典》

文献名 [鹿蹄草]《生草药性备要》, 假芹菜《岭南采药录》, 广州毛茛《湖北植志》, 钩果毛茛《上海植录》

地方名 回回蒜(广西、云南、贵州), [千里光](江苏、上海), 白灸草(广东、广西); 广东: 野芹菜(五华、朝阳、曲江、阳山、南雄等), 疔药(翁源), 点草(汕头), 毛芹菜(广州), 黄花草, 斗药(连南), 退膜草(连县), 光明草, 去膜菜, 刁子芹(兴宁); 广西: 鸛子草, 毛茛, 梅花草, 水斤菜(大新), 鸭掌草(平南); 四川: 鸭脚板、白胡芹菜(西昌); 云南: 黄花虎掌草, 田芹菜(玉溪), 水旱芹(峨山), 水芹草(元江、峨山), [老鸦蒜](澄江), 棒头草(江川), 山芝麻棵(新平), 小虎掌草(保山), 毛水虎掌草, 癩痢头草(通海)。

功效 根或全草: 利湿, 消肿, 止痛, 退翳, 截疟, 杀虫。

#### 7015404

*Ranunculus chinensis* Bunge

植物名 苗苗蒜《中国植志》

药材名 回回蒜《救荒本草》、《汇编》

文献名 水胡椒、蝎虎草《救荒本草》

地方名 小回回蒜(辽宁、河北、宁夏、新疆), 鹅巴掌、鸭脚板(河北、宁夏、贵州), 黄花草(河北、贵州), 野桑椹(河北、内蒙古、新疆), 山辣椒(北京、山东), [紫菀](黑龙江、辽宁); 河北: 回回蒜毛茛; 内蒙古: “乌素泰-浩鲁达顺-其其格”(蒙名); 陕西: [过路黄](宁陕), 老虎爪子(洋县); 山东: 山辣子(淄博); 浙江: 绒毛犬脚迹; 四川: 辣子草(绵阳), 辣辣草; 贵州: [土细辛], 土芹菜, 毛脚板; 云南: [水杨梅](昆明、曲靖), 小桑子、糯虎掌(昆明), 小虎掌草、水虎掌草、青果草(曲靖), 黄花虎掌草, 毛茛水胡椒。

功效 全草: 有毒。消炎退肿, 平喘, 截疟。外用: 于肝炎, 角膜云翳, 牛皮癣。

#### 7015405

*Ranunculus ficariifolius* Levl. et Vant.

植物名 西南毛茛《中国植志》

药材名 卵叶毛茛《云南种录》

功效 茎叶: 用于疟疾。

#### 7015406

*Ranunculus glareosus* Hand.-Mazz.

植物名 砾地毛茛《中国植志》

药材名 梭沙毛茛《云南种录》

功效 全草: 用于镇痛, 祛风湿。

#### 7015407

*Ranunculus gmelinii* DC.

植物名 小掌叶毛茛《中国植志》

药材名 小叶毛茛《东北草本植志》

功效 全草、根: 消肿, 发泡剂。

#### 7015408

*Ranunculus japonicus* Thunb.

植物名 毛茛《中国植志》

药材名 毛茛《本草拾遗》、《汇编》

文献名 水茛、毛建《肘后方》,毛建草、猴蒜《本草拾遗》,天灸《梦溪笔谈》,毛茛、白灸《纲目》,蟹草、金凤花《药草满州》,千里光、烂肺草《中国药植图鉴》,毛蕨《台湾药植志》

地方名 老虎草(上海、江苏、湖南),老虎须(江西、福建),老虎爪草(甘肃、上海),老虎脚爪草(上海、江苏),老虎脚迹(浙江、江西、湖北),老虎脚板草(上海、浙江、江西),老虎脚底板(江苏、浙江),犬脚迹(安徽、浙江、福建),狗脚迹(安徽、浙江、湖北),五虎草(浙江、湖北),毛老虎、冲到头(安徽、江西),毛芹菜(安徽、江苏、江西、福建),野芹菜(安徽、江西、福建、湖南、广东),黄花草(浙江、湖南),鸭脚板(江西、广西);吉林:“把高衣沙”(朝名);内蒙古:“浩鲁达顺-其其格”(蒙名);陕西:鱼疔草;甘肃:小火焰子(天水);上海:虎脚草、毛香芹、五角星草、延星草、毛脚水胡芹;山东:老虎踢地板、山辣椒(烟台),老兰菜(昆嵛山),辣辣椒(青岛、崂山);江苏:老虎脚迹草、瞌睡草(苏州),瞌睡果子草、时果叶子、毛药芹、天灸草、鹤膝草、虎脚板草;浙江:老鼠脚底板、驮猫脚迹(丽水、云和、温州、瑞安),白虎脚蹄(平阳),猫爪草(潜阳),猫儿脚迹,猫脚迹、九虫咬、印胞草(嵛县),九重芥(建德、江山),辣草,黄花草,火筒青,狗蹄脚(淳安),木碗头花(余姚),地老虎、虎爪草(宁波),虎脚蹄(平阳),五爪龙藤(临海),蟹珠丹(开化),毛鸭脚草(临安);安徽:黄疽草,老虎爪,野鸭爪;江西:毛脚鸡(新建),狗脚板(宜黄、景德镇),猫用草(泰和),[土细辛](铜鼓),鹅掌草,水老虎(庐山);福建:余毒草,水芹菜(晋江、厦门),[水杨梅](永春、龙溪),水胡椒,蝎虎草,山芹菜(龙海、泉州),三脚虎(泉州、仙游、大田),一把火(松溪),九里火(福鼎、霞浦),狗脚趾(光泽、邵武、福州、福安、宁德、霞浦),鸭母掌,鹅毛管;河南:牙疼草;湖北:毛野芹菜,起泡草,猴子脚板;湖南:毛芹菜(长沙、衡山、黔阳),田知母(黔阳、永顺),回回蒜(衡山),黄辣草(黔阳);广东:点草(潮阳、潮安);广西:小梅花草,假芹菜(钟山),独活(那坡),黄花草;四川:辣子草(绵阳),辣辣草,小辣辣菜,椒麻细辛,鸭足草,地扭子;贵州:扑地棕(绥阳),盐地棕,鬍子药(榕江),鬍子草,一包针(都匀),摆子药(福泉);云南:黄花虎掌草。

功效 带根全草;有毒。利湿,消肿,止痛,退翳,截疟,杀虫。外用于胃痛,黄疸,淋巴结核,翼状胬肉,角膜云翳,灭蛆,杀子。

#### 7015409

*Ranunculus japonicus* var. *smirnovii* (Ovcz.) L. Liou --- *R. smirnovii* Ovcz.

植物名 兴安毛茛《中国植志》

药材名 大叶毛茛《东北草本植志》

地方名 黑龙江:毛茛、毛芹、毛香芹(哈尔滨)。

功效 带根全草;利湿,消肿,止痛,退翳,截疟,杀虫。

#### 7015410

*Ranunculus japonicus* Thunb. var. *monticola* Kitag. --- *R. paishanensis* Kitag. --- *R. acris* L. var. *monticola* (Kitag.) Tamura --- *R. paishanensis* Kitag. f. *oreodoxa* (Kitag.) kitag.

植物名 白山毛茛《中国植志》

药材名 白山毛茛《东北药用植物》

功效 全草及根;有毒。利湿。消肿止痛,退翳,截疟,杀虫。用于疟疾,黄疸,火眼,偏头痛,胃痛,牙痛,风湿关节痛,鹤膝风,痈肿,恶疮,疥癣,淋巴结核,翼状胬肉,角膜云翳。一般不内服,外用捣敷或煎水洗。

#### 7015411

*Ranunculus japonicus* Thunb. f. *plena* Y. C. Chu et D. C. Wu

植物名 重瓣毛茛《东北药用植物》

药材名 毛茛(东北)

功效 全草及根;有毒。利湿,消肿,止痛,退翳,截疟,杀虫。用于疟疾,黄疸,火眼,偏头痛,胃痛,牙痛,风湿关节痛,鹤膝风,痈肿,恶疮,疥癣,淋巴结核,翼状胬肉,角膜云翳。

#### 7015412

*Ranunculus japonicus* Thunb. var. *pratensis* Kitag. --- *R. japonicus* Thunb. subsp. *akagiensis* (Hiyama) Tamura var. *pratensis* (Kitag.) Tamura

植物名 草地毛茛《东北草本植志》

药材名 草地毛茛《东北药用植物》

功效 全草及根;有毒。利湿,消肿止痛,退翳,截疟,杀虫。用于疟疾,黄疸,火眼,偏头痛,胃痛,牙痛,风湿关节痛,鹤膝风,痈肿,恶疮,疥癣,淋巴结核,翼状胬肉,角膜云翳。

#### 7015413

*Ranunculus lingua* L.

植物名 长叶毛茛《中国植志》

功效 全草;清热解毒,凉血止痢。

#### 7015414

*Ranunculus membranaceus* Royle --- *R. puichellus* var. *sericeus* Hook. f. et Thoms.

植物名 棉毛茛《中国植志》

药材名 绢毛毛茛《青藏药图》

地方名 青海:“结察”(藏名)。

功效 全草、种子;用于消化不良,腹水,脱肛,蛔虫病。

#### 7015415

*Ranunculus polii* Franch. ex Hemsl.

植物名 肉根毛茛《中国植志》

药材名 肉根毛茛《浙江天目药志》

地方名 浙江:小叶奶管晚(东天目)。

功效 块根;散结,消肿。

#### 7015416

*Ranunculus puichellus* C. A. Mey.

植物名 美丽毛茛《中国植志》

药材名 美丽毛茛《中国植志》  
 文献名 雅毛茛《阿里考察报告》  
 地方名 西藏：“结察”(阿里藏名)。  
 功效 全草、种子：用于消化不良，腹水，脱肛，蛔虫病。

## 7015417

*Ranunculus repens* L. --- *R. repens* L. var. *major* Nakai  
 植物名 匍枝毛茛《中国植志》

功效 叶及根：消肿。用于恶疮，并可作发泡剂。

## 7015418

*Ranunculus sceleratus* L. --- *Hecatonia palustris* Lour.

植物名 石龙芮《中国植志》

药材名 石龙芮《本经》、《汇编》

文献名 苦葶《尔雅》，鲁果能、地槿《本经》，天豆、姜苔、水姜苔《吴普本草》，石熊〔子〕、彭根《别录》，葶葵《尔雅》郭璞注，芮子《本草拾遗》，鹧孙头草《履巉岩本草》，胡椒菜、油灼灼《救荒本草》，鬼见愁《名实图考长编》，治齿草《植物名汇》，石龙牙《满州植录》，石龙芮子《中药大辞典》

地方名 野芹菜(黑龙江、华东、广西、四川、云南)，水芹菜(安徽、福建、广西)；吉林：鸭巴掌；内蒙古：“乌热勒合格-其其格”(蒙名)；江苏：鸡脚爬草(苏州)；安徽：猫脚迹；福建：无毛野芹菜(莆田、仙游、安溪)，小号水芹菜(南安、惠安)，小号无毛水芹菜(厦门、同安)；广西：假芹菜(藤县)，黄花菜；四川：辣子草(绵阳)；云南：水毛茛，水虎掌草，水黄瓜香，打锣锤，铜锤，和尚菜，清香草，小水杨梅(昆明)。

功效 全草：有毒。消肿，拔毒，散结，截疟。外用：于淋巴结核，疟疾，痈肿，蛇咬伤，慢性下肢溃疡；种子：用于心热烦渴，阴虚失精，风寒湿痹，截疟。

## 7015419

*Ranunculus sieboldii* Miq.

植物名 扬子毛茛《中国植志》

药材名 毛茛(华东)

文献名 辣子草、鸭脚板草、野芹菜《分类草药性》，半匍匐毛茛《广西植志》

地方名 水辣菜(湖北、贵州)；浙江：绒毛犬脚迹(东天目)；江西：水老虎、水杨梅、三月黄花绣球草、老虎须(庐山)；湖南：毛芹菜、黄花草(衡山)，毛建草，虎脚板草(常德)；湖北：老虎脚迹(神农架)；四川：地胡椒，鸭脚草。

功效 全草：利湿，消肿，止痛，截疟，杀虫。

## 7015420

*Ranunculus tachiroei* Franch. et Sav.

植物名 长嘴毛茛《中国植志》

药材名 长喙长茛《沈药学报》

功效 根：作中药用。

## 7015421

*Ranunculus tanguticus* (Maxim.) Ovcz. --- *R. affinis* var. *tanguticus* lus. *leiocarpus* Maxim. --- *Ranunculus brotherusii* auct. non Freyn

植物名 高原毛茛《中国植志》

药材名 高原毛茛《中国植志》

地方名 西藏：“结察”(藏名)。

功效 全草：清热解毒。用于淋巴结核等。

备考 《高植图鉴》(1972)将本种学名误订为 *R. brotherusii* Freyn

## 7015422

*Ranunculus ternatus* Thunb. --- *R. extorris* Hance --- *R. zuccarinii* Miq.

植物名 猫爪草《中国植志》

药材名 猫爪草《药典》

文献名 小毛茛《中国植物图鉴》，茨柏《和汉药标本目录》

地方名 三散草(浙江、湖南)；安徽：鸭脚板；浙江：大叶奶管吮(临安)；台湾：小金凤花，鹭仔草；湖南：黄花草；广西：金花草(兴安)；四川：“麦朵卡嘛”(藏名)。

功效 块根：散结，消肿。用于淋巴结核核未溃。

## 7015423

*Ranunculus trigonus* Hand. -Mazz.

植物名 棱喙毛茛《中国植志》

药材名 三角毛茛《云南药录》

地方名 云南：黄花虎掌草(蒙自)。

功效 根：用于口干舌燥。

## 7015424

*Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Makino --- *Isopyrum adoxoides* DC. --- *Aquilegia adoxoides* (DC.) Ohwi

植物名 天葵《中国植志》

药材名 天葵子〔块根〕、《药典》，天葵〔全草〕《滇南本草》

文献名 紫背天葵《雷公炮炙论》，紫背天葵子《医宗汇编》，紫背天葵根、千年老鼠屎《纲目拾遗》，雷丸草《外丹本草》，夏无踪《名实图考》，小乌头《植物学大辞典》

地方名 天葵草(上海、江苏、浙江)，老鼠屎(陕西、浙江、江西、福建、湖南、广西)，蛇不见(江苏、浙江)，千年耗子屎(福建、四川)；江苏：老鼠屎草(常熟)，老鼠屎；浙江：老鸦粪(遂昌)，老鼠屎(常山、金华、丽水)，老鼠奶，千年老鼠屎(兰溪、衢县、开化、义乌)，一粒老鼠屎，一粒金丹(桐乡)，独粒老鼠屎(嵊县)，天羊屎(武义)；江西：天葵根；湖北：小乌芋(鹤峰)；湖南：旱铜钱草、野乌头子(通道)，鸡腿(长沙)，散血珠，天去子；广西：落地羊(兴安)，旱田草(桂林)；贵州：羊毛疔药(罗甸)，金耗子屎，地丁子(贵阳)；四川：耗子屎。

功效 块根：清热解毒，消肿散结。用于痈肿疔疮，乳痈，瘰癧，毒蛇咬伤；全草：消肿，解毒，利水；种子：用于妇人血崩，带下。

## 7015425

*Souliea vaginata* (Maxim.) Franch.

植物名 黄三七《中国植志》

药材名 黄三七《陕西中草药》

文献名 长果升麻《高植图鉴》，苏里草《科属词典》

地方名 野黄连(甘肃、四川)；陕西：太白黄连，太白土黄连，土黄连(眉县)。

**功效** 根茎:泻火解毒,清心除烦。用于眼结膜炎,口腔炎,咽炎,肠炎,痢疾,疮疖肿毒。

**7015426** 见 7015447a

**7015427**

*Thalictrum acutifolium* (Hand.-Mazz.) Boivin

植物名 尖叶唐松草《中国植志》

文献名 大叶马尾连《浙江天目药志》

地方名 浙江:大叶马尾黄连(天目山),尖嘴唐松草;湖北:石笋还阳(巴东);湖南:马尾黄连,鸡脚七。

**功效** 根:清热解毒。用于急性肝炎,下痢腹痛,目红肿痛,疮疖肿毒。

**7015428**

*Thalictrum alpinum* L.

植物名 高山唐松草《中国植志》

药材名 三叶惊风草(云南丽江)

地方名 云南:惊风草(丽江);新疆:马尾黄连。

**功效** 全草:清热,镇惊,祛风。用于小儿惊风;根、根茎:清热,解毒,健胃,泻火。

**7015429**

*Thalictrum alpinum* var. *elatum* Ulbr. --- *T. esquirolii* Levl. et Vant.

植物名 直梗高山唐松草《中国植志》

药材名 惊风草《汇编》

文献名 复叶披麻草《昆明民药》,直梗唐松草《四川中药志》

地方名 四川:小青草、小白草(米易),甜水连、一朵云(西昌),星宿草;云南:亮星草、亮叶子草、岩连、草岩连(曲靖),〔披麻草〕(昆明),紫金丹、大疳药(弥勒),“色特咪鹿吉”(楚雄彝名),疳积散。

**功效** 全草:清热解毒,定惊,消积。用于小儿肺炎,小儿惊风,小儿疳积;根:清热燥湿,凉血解毒。用于烦热口渴,胸闷呕吐,吐血,衄血,湿热泻痢,目赤口疮,痈肿疔毒,湿热发黄。

**7015430**

*Thalictrum alpinum* var. *elatum* f. *puberulum* W. T. Wang et S. H. Wang

植物名 毛叶高山唐松草《中国植志》

药材名 元江岩黄连(拟)

地方名 云南:岩黄连(元江),“恶麻期波”(元江哈尼语)。

**功效** 根:清热解毒,止痛。用于脾胃实热,风火牙痛,无名肿毒,风热眼痛,口腔糜烂。

**7015431**

*Thalictrum alpinum* var. *microphyllum* (Royle) Hand.-Mazz.

植物名 柄果高山唐松草《中国植志》

药材名 细花草(云南曲靖)

地方名 云南:喜花草、三月参、小棕树、亮叶子、眼疳药、八仙草、白水脐疳药(曲靖)。

**功效** 根:清热燥湿,凉血解毒。

**7015432**

*Thalictrum aquilegifolium* L. var. *sibiricum* Regel et

Tiling --- *T. contortum* L. --- *T. aquilegifolium* L. ssp. *asiaticum* (Nakai) Kitag.

植物名 唐松草《中国植志》

药材名 小金花(东北)

文献名 矮斗菜叶白蓬草《经植手册》,翅果唐松草《中国药植志》,翼果白蓬草《东北草本植志》

地方名 马尾黄连(新疆、贵州);吉林:猫爪子;内蒙古:上黄连;山东:草黄连(即墨),马尾连(烟台、青岛),黑汉子腿,紫花顿;浙江:高山野花草(东天目);四川:红莲(若尔盖);贵州:山黄连(湄潭)。

**功效** 全草或根茎:清热解毒。用于肺热咳嗽,咽喉炎,腹泻,痈肿疮疖等。

**7015433**

*Thalictrum atriplex* Finet et Gagnep.

植物名 狭序唐松草《中国植志》

药材名 西藏水黄连(拟)

地方名 西藏:水黄连。

**功效** 根茎和根:清热解毒,祛风凉血,消炎,止痢。用于结膜炎,传染性肝炎,痈肿疔疮,痢疾等。

**7015434**

*Thalictrum baicalense* Turcz.

植物名 贝加尔唐松草《中国植志》

药材名 马尾连(四川、青海)

文献名 球果白蓬草《东北草本植志》

地方名 马尾黄连(四川、云南、内蒙古、西北);青海:土黄连(民和);四川:红莲(若尔盖藏名)。

**功效** 根、根茎:清热,燥湿,解毒。用于痢疾,眼结膜炎。

**7015435**

*Thalictrum baicalense* var. *megalostigma* Boivin

植物名 长柱贝加尔唐松草《中国植志》

文献名 川甘唐松草《高植图鉴》,长柱唐松草《秦岭植志》

地方名 四川:马尾黄连(若尔盖)。

**功效** 根:清热,燥湿,解毒。

**7015436**

*Thalictrum cirrhosum* Levl.

植物名 星毛唐松草《中国植志》

**功效** 根:清热解毒。

**备考** 昆明、大理一带代黄连用。

**7015437**

*Thalictrum collinum* Wallr.

植物名 新疆唐松草《新疆药植志》

地方名 新疆:马尾黄连,土黄连(木垒河、博克达山)。

**功效** 根、根茎:清热解毒,健胃,泻火。

**7015438**

*Thalictrum cultratum* Wall. --- *T. deciternatum* Boiv.

植物名 高原唐松草《中国植志》

药材名 马尾莲《汇编》

地方名 马尾黄连(云南、四川);云南:草黄连(丽江、中甸),蚊子花(中甸)。



功 效 根、根茎：清热，燥湿，解毒。用于痢疾，肠炎，肝炎，感冒，麻疹，痢肿，疮疖，结膜炎。

## 7015439

*Thalictrum dasycarpum* Fisch. et Lall.

植物名 粗果唐松草《汇编》

文献名 紫唐松草《中草药学》

功 效 根：有抗癌作用。

## 7015440

*Thalictrum delavayi* var. *mucronatum* (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et S. H. Wang

植物名 角药偏翅唐松草《中国植志》

地方名 贵州：土黄连。

功 效 根：清热利湿，解毒消肿。用于肝炎，赤眼，漆疮，麻疹不出，丹毒，小儿惊风，消化不良，吐血。

## 7015441

*Thalictrum delavayi* Franch.

植物名 偏翅唐松草《中国植志》

药材名 马尾连(四川、云南)

文献名 马尾黄连《中国经植志》，双翅白蓬草《经植手册》，南马尾连《云南种录》

地方名 四川：金丝黄连；云南：水黄连(文山)，草黄连(丽江)，土黄连(丽江、腾冲)，大马尾连。

功 效 根、根茎：清热燥湿，泻火解毒。用于痢疾，肠炎，急性黄疸型肝炎，白带，牙龈肿痛，急性结膜炎，疮肿等。

## 7015442

*Thalictrum delavayi* var. *decorum* Franch.

植物名 宽萼偏翅唐松草《中国植志》

文献名 马尾黄连《药学报》

地方名 云南：唐松草。

功 效 根：消炎，散毒。用于痢疾。

## 7015443

*Thalictrum faberi* Ulbr. --- *T. macrophyllum* Migo

植物名 大叶唐松草《中国植志》

药材名 大叶马尾连《浙江天目药志》

文献名 大蓬草《中草药》

地方名 浙江：蓝蓬草(东天目)，马尾黄连(天台)。

功 效 根及全草：清热解毒，利湿。用于目赤，热痢，黄疸，胃热，瘰疬。

## 7015444

*Thalictrum fargesii* Franch. ex Finet et Gagnep.

植物名 西南唐松草《中国植志》

地方名 湖北：扫帚七(神农架)。

功 效 根：清热，燥湿，解毒。

## 7015445

*Thalictrum finetii* Boivin

植物名 滇川唐松草《中国植志》

地方名 四川：马尾连(峨眉山)；云南：千里马(丽江)。

功 效 根及根茎：清热，燥湿，解毒。

## 7015446

*Thalictrum flavum* L.

植物名 黄唐松草《中国植志》

药材名 新疆马尾连(拟)

地方名 新疆：马尾连。

功 效 根：清热，燥湿，解毒。

## 7015447

*Thalictrum foetidum* L.

植物名 腺毛唐松草《中国植志》

文献名 香唐松草《高植图鉴》

地方名 唐松草(西藏、新疆)，马尾黄连(西藏、新疆、四川)；陕西：岩老鼠屎；新疆：土黄连，“马木让其尼”(维名)；西藏：“贡布莪正”(藏名)。

功 效 根及根茎：清热解毒，祛风凉血，消炎，止痢。用于结膜炎，传染性肝炎，痢肿疔疮，痢疾等。

## 7015447a

*Thalictrum foetidum* var. *glabrescens* Takeda

植物名 扁果唐松草《中国植志》

文献名 无毛香唐松草《药学报》

功 效 根：清热，燥湿，解毒。

## 7015448

*Thalictrum foliolosum* DC.

植物名 多叶唐松草《中国植志》

药材名 马尾连(四川、云南)、《中药志》

文献名 多叶白蓬草《四川中药志》

地方名 马尾黄连(四川、云南)；四川：金丝黄连，马尾连根头、德昌马尾连(德昌)；云南：草黄连(丽江)，唐松草(江川)，土黄连(通海、华宁)，蚊子草、金丝马尾(红河)，水黄连(文山)，筛子花。

功 效 根：清热，燥湿，解毒。用于肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛。

## 7015449

*Thalictrum fortunei* S. Moore

植物名 华东唐松草《中国植志》

药材名 华东马尾连(拟)

文献名 华东南唐松草、白蓬草《中草药学》

地方名 马尾黄连(安徽、浙江、陕西)；江苏：马尾连，粒子氢氮草(苏州)。

功 效 全草：消肿，解毒，明目，止泻。用于痢疾，腹泻，淋巴结核，眼结膜炎。

## 7015450

*Thalictrum glandulosissimum* (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et S. H. Wang --- *T. foetidum* L. var. *glandulosissimum* Finet et Gagnep.

植物名 金丝马尾连《中国植志》

药材名 马尾连《纲目拾遗》、《中药志》

文献名 多腺唐松草《中药志》

功 效 根、根茎：清热，燥湿，解毒。用于热盛心烦，痢疾，肠炎，结膜炎，咽喉炎，痢肿疔疮。

## 7015451

*Thalictrum glandulosissimum* var. *chaotungense* W. T. Wang et S. H. Wang --- *T. chaotungense* W. T. Wang et S. H. Wang

植物名 昭通唐松草《中国植志》

药材名 马尾连《纲目拾遗》、《中药志》  
地方名 云南：马尾黄连(昭通)。  
功效 根、根茎：清热，燥湿，解毒。

## 7015452

*Thalictrum ichangense* Lecoy. ex Oliv.

植物名 盾叶唐松草《中国植志》  
药材名 岩扫把《贵州草药》  
文献名 盾叶白蓬草《东北草本植志》  
地方名 湖北：石蒜还阳(巴东、兴山、神农架)，羊耳，[小淫羊藿]；四川：倒地拍(乐山)，倒地抽(峨眉山)；贵州：龙眼草(清镇)；广西：水香草(乐业、凌云)，[连钱草](临桂)。

功效 根、全草：祛风，清热解毒。用于小儿惊风抽搐，鹅口疮，丹毒游风，黄疸，风疹，驱蛔等。

## 7015453

*Thalictrum isopyroides* C. A. Mey.

植物名 紫茎叶唐松草《中国植志》  
药材名 马尾连(新疆)  
文献名 疏花唐松草、马尾黄连《新疆药植志》  
功效 根、根茎：清热，解毒，健胃，泻火。

## 7015454

*Thalictrum javanicum* Blume

植物名 爪哇唐松草《中国植志》  
药材名 马尾连《云南蒙自》  
文献名 金丝马尾连《药学报》  
地方名 四川：羊不食(峨眉山)；云南：千里马(玉龙山)，马尾黄连(蒙自)；西藏：“鹤整”(藏名)。  
功效 根：解热。用于疟疾，炭疽病；全草：用于关节炎。

## 7015455

*Thalictrum macrorhynchum* Franch.

植物名 长喙唐松草《高植图鉴补编》  
地方名 湖北：雨点子草(神农架)。  
功效 根及根茎：清热利湿，消肿。

## 7015456

*Thalictrum microgynum* Lecoy. ex Oliv.

植物名 小果唐松草《中国植志》  
药材名 石黄草(湖北)  
地方名 湖北：石笋还阳(神农架)，石笋一枝花(巴东)，老虎香、狗头升麻(鹤峰)，血经草(建始)，雨点草(恩施)；四川：飞蛾七、岩风七(南川)；其它：铁大乌草。  
功效 全草：用于石黄(即全身黄肿，眼睛发黄)；根：用于跌打损伤，骨折肿痛。

## 7015457

*Thalictrum minus* L.

植物名 亚欧唐松草《中国植志》  
文献名 小唐松草(汇编)，小白蓬草《经植手册》  
地方名 贵州：马尾黄连(贵阳)，土黄连，龙眼草，水黄连、金鸡脚、铁脚鸡(清镇)，马尾芹。  
功效 根及根茎：清热，燥湿，解毒。

## 7015458

*Thalictrum minus* var. *hypoleucum* (Sieb. et Zucc.)

*Miq.* --- *T. thunbergii* DC. --- *T. minus* var. *clarum* Lecoy.

植物名 东亚唐松草《中国植志》

药材名 烟锅草《陕西中草药》

文献名 秋唐松草《秦岭植志》，小果白蓬草《东北草本植志》，小金花《中国植物图鉴》，唐松草、马尾黄连《沙漠药植》

地方名 江苏：囊本(云台山)；北京：佛谷指甲，穷汉子腿；陕西：小唐松草；湖北：尖刀草(神农架)；广西：石骨连(临桂)；贵州：金鸡脚下黄(松桃)。

功效 根：有小毒。清热解毒，除湿。用于牙痛，急性皮炎，痔疮出血，湿热黄疸。

## 7015459

*Thalictrum morii* Hayata

植物名 楔叶唐松草《中国植志》

文献名 森氏唐松草《台湾药植志》

功效 根：外敷肿毒。

## 7015460

*Thalictrum omeiense* W. T. Wang et S. H. Wang ---

*Thalictrum actaeifolium* auct. non Sieb. et Zucc.

植物名 峨眉唐松草《中国植志》

药材名 倒水莲《四川中药志》

文献名 类叶升麻叶唐松草《品种论述》

地方名 四川：水黄连、野海棠、黄芩、软水黄连(峨眉山)。

功效 全草：清热，燥湿，止痢。用于湿热黄疸，腹痛泻痢，疟疾寒热，目赤肿痛。

备考 《四川中药志》(1960)学名误订为 *T. actaeifolium* Sieb. et Zucc.

## 7015461

*Thalictrum petaloideum* L.

植物名 瓣蕊唐松草《中国植志》

文献名 肾叶唐松草《中国药植志》，花唐松草《吉野》，肾叶白蓬草《东北草本植志》，秋唐松草《中国药植图鉴》

地方名 马尾黄连(河北、内蒙古、宁夏、四川)；辽宁：猫爪子(长白山)；山西：马尾连；内蒙古：土黄连，“查存-其其格”(蒙名)；陕西：烟锅草；青海：“知尔儿曼巴”(藏名)；四川：“忽伦”(若尔盖藏名)。

功效 根：健胃消食，清肝明目，清热解暑。用于黄疸型肝炎，胃痛，腹泻，消化不良，结膜炎，小儿热症及痘疹不出。

## 7015462

*Thalictrum petaloideum* var. *supradecompositum*

(Nakai) Kitag. --- *T. supradecompositum* Nakai

植物名 狭裂瓣蕊唐松草《中国植志》

文献名 卷叶唐松草《沙漠植志》

地方名 内蒙古：“保日吉给日-查存-其其格”(蒙名)。

功效 根：用于渗出性皮炎，肠炎，痢疾等。

## 7015463

*Thalictrum przewalskii* Maxim.

植物名 长柄唐松草《中国植志》

文献名 拟散花唐松草《高植图鉴》, 直梗白蓬草《东北草本植志》, 甘青唐松草《拉汉种称》

地方名 青海: 土黄连(民和); 湖北: 南前胡(巴东、神农架), 鸡骨升麻(神农架)。

功效 根: 清热燥湿, 泻火解毒; 果实: 用于肝炎, 肝肿大, 肝包虫等。

#### 7015464

*Thalictrum ramosum* Boivin --- *Thalictrum fortunei* auct. non S. Moore

植物名 多枝唐松草《中国植志》

药材名 软水黄连《四川中药志》

地方名 水黄连(四川、广西); 广西: 上黄连(凤山); 四川: 软杆子黄连(绵阳), 软杆子水黄连、金鸡脚下黄、黄脚鸡(成都), 地黄连, 多枝水黄连, 肺经草(巴县); 贵州: 马尾黄连(贵阳)。

功效 全草: 清热燥湿, 泻火解毒。用于目赤肿痛, 湿热泻痢, 黄疸。外用于疮疖肿毒。

备考 《四川中药志》(1960)学名误订为 *T. fortunei* S. Moore.

#### 7015465

*Thalictrum reniforme* Wall.

植物名 美丽唐松草《中国植志》

地方名 西藏: “鹅整”(藏名)。

功效 根: 用于炭疽病等。

#### 7015466

*Thalictrum reticulatum* Franch.

植物名 网脉唐松草《中国植志》

药材名 草黄连(云南、丽江)

地方名 云南: 马尾连、马毛黄连(曲靖), 土黄连(丽江), 筛子花。

功效 根: 清热, 燥湿, 解毒。

#### 7015467

*Thalictrum robustum* Maxim. --- *T. clematidifolium* Franch. --- *T. falcatum* Pamp.

植物名 粗壮唐松草《中国植志》

文献名 红蓬草、白蓬草《植物名汇》

地方名 湖北: 老虎香(神农架)。

功效 根及根茎: 清热燥湿, 泻火解毒。

#### 7015468

*Thalictrum rutifolium* Hook. f. et Thoms.

植物名 芸香叶唐松草《中国植志》

地方名 西藏: “奥甲决拉”(藏名)。

功效 根茎、根: 用于结膜炎, 传染性肝炎, 痢肿疮疖, 痢疾; 花、叶: 用于关节炎。

#### 7015469

*Thalictrum saniculaeforme* DC.

植物名 叉枝唐松草《中国植志》

地方名 云南: [黄连]、马尾黄连(临沧)。

功效 根: 用于痢疾。

#### 7015470

*Thalictrum semiscandens* W. W. Smith

植物名 攀援唐松草《云南种录》

药材名 水风藤(云南文山)

功效 根、叶: 用于黄疸型肝炎。

#### 7015471

*Thalictrum simplex* L.

植物名 箭头唐松草《中国植志》

文献名 野唐松草《占野》, 箭头白蓬草《东北草本植志》, 黄唐松草《中国经植志》

地方名 内蒙古: “楚斯”(蒙名); 新疆: 马尾黄连。

功效 根及根茎: 清热解毒, 健胃, 泻火。

#### 7015472

*Thalictrum simplex* var. *brevipes* Hara --- *Thalictrum simplex* auct. non L. --- *Thalictrum angustifolium* auct. non L.

植物名 短梗箭头唐松草《中国植志》

药材名 硬杆水黄连《四川中草》

文献名 水黄连《百草镜》, 硬水黄连《四川中药志》

地方名 内蒙古: 马尾黄连; 青海: “丝拉那保”(藏名); 四川: 黄脚鸡, 金鸡足下黄(成都), 黄唐松草。

功效 全草: 清热, 利尿。用于黄疸, 腹水, 小便不利。外用于眼结膜炎。

备考 《四川中药志》(1960)的硬水黄连学名误订为 *T. simplex* L.。《中国药植志》(1964)的箭头唐松草的图为本种, 但学名 *T. angustifolium* L. 也属误订。

#### 7015473

*Thalictrum simplex* L. var. *affine* (Ledeb.) Regel

植物名 锐裂箭头唐松草《中国植志》

药材名 类箭头唐松草《东北药用植物》

功效 全草或根: 清热, 利尿, 解毒。用于黄疸, 腹水, 小便不利, 热盛心烦, 肠炎, 痢疾, 哮喘, 麻疹合并肺炎, 咽喉炎, 结膜炎, 痈肿, 疮疖, 鼻疖。

#### 7015474

*Thalictrum smithii* Boivin

植物名 鞭柱唐松草《中国植志》

地方名 四川: 水黄连(马尔康)。

功效 全草: 清热明目。用于头晕, 腹痛, 下痢等症。

#### 7015475

*Thalictrum smithii* Boivin var. *gynodioecum* W. T. Wang et S. H. Wang

植物名 雌全鞭柱唐松草(拟)

药材名 水黄连(四川西部)

地方名 四川: 软水黄连、倒水连(马尔康)。

功效 全草: 清热明目。用于头晕, 目疼, 腹痛, 下痢等。

#### 7015475a

*Thalictrum squamiferum* Lecoy.

植物名 石砾唐松草《中国植志》

文献名 鳞唐松草《阿里考察报告》

地方名 四川: “札阿钟”(甘孜藏名)。

功效 全草: 用于发烧。

#### 7015476

*Thalictrum squarrosum* Steph. ex Willd.

植物名 展枝唐松草《中国植志》

药材名 猫爪子(东北)

文献名 歧序唐松草《中国经植志》, 展枝白蓬草《东北草本植志》

地方名 内蒙古: 坚唐松草, “地格达-纳呼”(鸟审旗蒙名)。

功效 地上部分: 清热解毒, 健胃, 制酸, 发汗。

7015477

*Thalictrum trichopus* Franch.

植物名 毛发唐松草《中国植志》

药材名 珍珠莲《云南中草药》

文献名 毛柄唐松草《品种论述》, 细丝唐松草《汇编》

地方名 马尾黄连(云南、四川); 四川: 鸡爪连、鸡爪黄连(西昌), 水黄连。

功效 根: 清热解毒, 利湿。用于小儿高热, 肺炎, 百日咳, 膀胱炎, 肠炎, 痢疾。

7015478

*Thalictrum tuberiferum* Maxim.

植物名 深山唐松草《中国植志》

文献名 深山白蓬草《东北草本植志》

功效 根: 清热解毒。

7015479

*Thalictrum umbricola* Ulbr.

植物名 阴地唐松草《江西药录》

功效 根: 清热, 解毒, 利湿。

7015480

*Thalictrum uncatum* Maxim.

植物名 钩柱唐松草《中国植志》

文献名 马尾连、弯柱唐松草《药学学报》

地方名 湖北: 土黄连(神农架); 云南: 弩箭药(中甸)。

功效 根及根茎: 清热泻火, 燥湿。

7015481

*Thalictrum uncinulatum* Franch.

植物名 弯柱唐松草《中国植志》

药材名 弯柱唐松草《贵州药录》

功效 根: 清热凉血, 理气。用于胸膈饱胀, 风丹, 痔疮出血, 无名毒疮, 吐血, 鼻衄。

7015482

*Thalictrum virgatum* Hook. f. et Thoms. --- *T. virgatum* var. *stipitatum* Franch.

植物名 帚枝唐松草《中国植志》

文献名 柄帚唐松草《品种论述》

地方名 云南: 阴阳和(昆明、丽江), 马尾连, 惊风草(丽江)。

功效 根、根茎: 止胃痛。

7015483

*Thalictrum viscosum* C. Y. Wu

植物名 粘唐松草《中国植志》

地方名 云南: 马尾连。

功效 根: 清热解毒。

7015484

*Thalictrum wangii* Boivin

植物名 丽江唐松草《中国植志》

药材名 丽江唐松草《迪庆藏药》

文献名 藏药唐松草《迪庆藏药》

功效 全草。用于关节炎, 杀虫, 止痢; 根: 用于炭疽病。

7015485 见 7015475a

7015486

*Trollius altaicus* C. A. Mey.

植物名 阿尔泰金莲花《中国植志》

药材名 阿尔泰金莲花《新疆中草药》

地方名 新疆: 金莲花。

功效 花: 清热解毒。用于扁桃体炎, 急性中耳炎, 肺炎咳嗽, 尿路感染。

7015487

*Trollius asiaticus* L.

植物名 宽瓣金莲花《中国植志》

药材名 金莲花《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 亚洲金莲花《经植手册》

地方名 山西: 金梅草, 金疙瘩(晋北天镇)。

功效 花: 清热解毒。用于上感, 扁桃体炎, 咽炎, 急性中耳炎, 急性鼓膜炎, 急性结膜炎, 急性淋巴管炎, 口疮, 疔疮。

7015488

*Trollius buddae* Schipcz.

植物名 川陕金莲花《中国植志》

药材名 骆驼七(陕西太白)

功效 根: 活血, 破瘀。

7015489

*Trollius chinensis* Bunge --- *T. asiaticus* L. var. *chinensis* Maxim.

植物名 金莲花《中国植志》

药材名 金莲花《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 旱金莲《五台山志》, 金梅草《山西通志》, 旱地莲、金芙蓉《纲目拾遗》

地方名 山西: 金疙瘩; 内蒙古: “阿拉坦花-其其格”(蒙名)。

功效 花: 清热解毒。用于感冒, 扁桃体炎, 咽炎, 急性中耳炎, 急性鼓膜炎, 急性结膜炎, 急性淋巴管炎, 口疮, 疔疮。

7015490

*Trollius farreri* Stapf

植物名 矮金莲花《中国植志》

药材名 五金草(陕西)

地方名 陕西: 一枝花(太白)。

功效 全草: 用于伤风感冒。

7015491

*Trollius farreri* Stapf var. *major* W. T. Wang

植物名 大叶矮金莲花《中国植志》

药材名 大叶矮金莲花《迪庆藏药》

文献名 “榜色”(藏名)《迪庆藏药》,大叶金莲花《云南种录》

功效 花、果实:清热,解毒。用于胆痛,肉食中毒。

## 7015492

*Trollius japonicus* Miq.

植物名 长白金莲花《中国植志》

药材名 长白金莲花《沈药学报》

文献名 山地金莲花《东北草本植志》

地方名 吉林:金莲花(长白山)。

功效 花:清热解毒。

## 7015493

*Trollius ledebourii* Reichb.

植物名 短瓣金莲花《中国植志》

药材名 短瓣金莲花《沈药学报》

文献名 金梅草《牧野日图》,西伯利亚金莲花《经植手册》

功效 花:清热解毒。

## 7015494

*Trollius ledebourii* Reichb. f. plena (Kitag.) Y. C. Chu  
--- *Trollius ledebourii* Reichb. var. *polysepalus* Regel & Tiling f. plena Kitag.

植物名 短重瓣金莲花《东北药用植物》

功效 花:清热解毒,平喘,消炎,抑菌。用于上呼吸道感染,急、慢性扁桃体炎,咽炎,急性中耳炎,急性鼓膜炎,急性结膜炎,急性淋巴管炎,口疮,疔疮。

## 7015495

*Trollius macropetalus* Franch.

植物名 长瓣金莲花《中国植志》

药材名 长瓣金莲花《东北草本植志》

地方名 大瓣金莲花(吉林、黑龙江)。

功效 花:清热解毒。

## 7015496

*Trollius pumilus* D. Don

植物名 小金莲《中国植志》

药材名 矮金莲花《青藏药图》

文献名 矮金梅草《拉汉种称》

地方名 四川:小乌药;西藏:“梅多赛尔庆”(藏名)。

功效 花:止血消炎,愈创解毒。用于疮疖痈疽,外伤等。

## 7015497

*Trollius ranunculoides* Hemsl.

植物名 毛茛状金莲花《中国植志》

文献名 西藏鸡爪草《汇编》

地方名 四川:金莲花,鸡爪草,“墨妥色尔坚”(藏名)。

功效 全草:用于风湿麻木,淋巴结核,鸡爪风;花:用于化脓创伤。

## 7015498

*Trollius yunnanensis* (Franch.) Ulbr.

植物名 云南金莲花《中国植志》

地方名 四川:毛红莲(西昌)。

功效 根:用于疟疾。

## 7015499

*Urophyssa henryi* (Oliv.) Ulbr.

植物名 尾囊草《中国植志》

文献名 尾囊果《高植图鉴》

地方名 湖南:岩萝卜;贵州:岩蝴蝶(贵阳),夜落金钱。

功效 根、根茎:用于跌打损伤,疟疾。外用于外伤出血,冻疮等。

## 7017 金鱼藻科 Ceratophyllaceae

## 7017001

*Ceratophyllum demersum* L.

植物名 金鱼藻《中国植志》

药材名 金鱼藻《汇编》

文献名 藻、聚藻《纲目》,松藻《中国植物图鉴》,金鱼草《中药材科技》,细草《四川中药志》

地方名 湖北:浪叶泡(均县),虾须草;广西:灯笼丝;四川:软草,鱼草(重庆)。

功效 全草:止血。用于吐血。

## 7017002

*Ceratophyllum oryzetorum* Komar.

植物名 五刺金鱼藻《中国植志》

文献名 五刺金鱼草《中药材科技》,十叶金鱼藻《东检》

功效 全草:清热。用于腮腺炎。

## 7018 睡莲科 Nymphaeaceae

## 7018001

*Brasenia schreberi* J. F. Gmel.

植物名 莼菜《中国植志》

药材名 莼《别录》、《中药大辞典》

文献名 荇《诗经》,屏风《楚辞》,凫葵《毛诗传》,葇《说文》,水葵(陆玕《诗疏》),水芹《齐民要术》,露葵《颜氏家训》,丝莼《唐本草》,〔马蹄草〕、缺盆草《经验良方》,锦带、稚莼、葵莼、猪莼《纲目》,马栗草《现代实用中药》

地方名 江苏:莼头菜;四川:水案板。

功效 茎、叶:清热,利水,消肿,解毒。用于热痢,黄疸,痈肿,疔疮。

## 7018002

*Euryale ferox* Salisb. ex Konig et Sims

植物名 芡《周礼》、《药典》

药材名 芡实《纲目》、《药典》

文献名 卵菱《管子》,鸡雍《庄子》,鸡头实、雁喙实《本经》,鸡头、雁头、鸟头、荇《方言》,芡子《本草经集注》,荇菜《食性本草》,水流黄《东坡杂记》,水鸡头《经验方》,鸡头盘、花荇《图经》,芡荇《滇南本草》,鸡头菜、芡实根《纲目》,芡粉《纲目拾遗》,鸡头子、芡盘、芡嘴《名实图考》,菱矛、龟头、吴鸡、鹄头、雁膳、雁实、鸡豆、鸡足、鸡头菱、鸡味儿、芡子、芡鸡壅、水中丹、水陆丹、居塞莲、藕梢菜《新纲》,北芡实、白皮芡实、红皮芡实、

圆头、池头、南塘头、《药材学》，芡实米(李《药植》)

地方名 鸡头米(东北、河北、山东、江苏、上海、浙江、江西、河南、广西、湖北)，芡实(河北、广西)，鸡头荷(安徽、江西)，鸡头苞(江西、湖北)，鸡头莲(山东、江苏、河南、江西、四川、广西)；河北：刺莲蓬实；江苏：刀芡实、鸡头果(镇江)，苏黄(南通)，黄实(泰州)，苏芡、刀芡(南通)，土芡实(徐州)；上海：南芡实、野鸡头；安徽：葵荇荷(安庆)；江西：刺莲；福建：猫头刺、泉芡实(泉州)；台湾：莲婆、俭食子；湖南：天青地红、水粮叶(长沙)；广西：刺莲藕(苍梧、临桂)，笨术、假莲藕、湖南根；四川：红莲子、芡实叶、刺荷叶、鸡头莲叶、鸡嘴莲叶、鸡公头、鸡脑壳、鸡头麻。

功效 种仁：益肾固精，补脾止泻，祛湿止带。用于梦遗滑精，遗尿尿频，脾虚久泻，白浊，带下；叶：用于胞衣不下，吐血；花茎：止烦泻，除虚热；根：用于疝气，白浊，白带，无名肿毒。

#### 7018003

*Nelumbo nucifera* Gaertn.

植物名 莲(别录)、《中国植志》

药材名 莲子《本草经集注》、《药典》，莲子心〔胚芽〕《食性本草》、《药典》，莲须〔雄蕊〕《本草通串》、《药典》，莲房〔花托〕、荷叶《食疗本草》、《药典》，莲花《日华子本草》，荷叶蒂〔叶基部〕《本草拾遗》，荷梗《本草再新》，藕(别录)，藕节《药性论》、《药典》

文献名 荷《诗经》，芙渠《尔雅》，芙蓉、水芝(崔豹《古今注》)，莲藕《纲目》；果实、种子：药、菰《尔雅》，藕实、水芝丹《本经》，莲实(《尔雅》郭璞注)，泽芝《古今注》，石莲子《别录》，石莲肉《局方》，莲肉《纲目》，莲衣《药品化义》，莲皮《本草再新》，玉蛹、珠实、珠玺、湖目、紫的、藕子《新纲》，甜石莲(广西中药志)，莲米、白莲米《四川中药志》，莲仁、莲子肉、白莲肉、湘莲子、湘莲肉、建莲子、建莲肉、老莲子、甜莲子、壳莲子、带皮莲子(常用中药名辨)；胚芽：薏《尔雅》，苦薏《图经》，莲薏《纲目》，莲心《本草再新》，莲子蕊《中国经植志》；雄蕊：金樱草《品汇精要》，莲花须《医学正传》，莲花蕊《孙天仁集效方》，莲蕊须、佛座须《纲目》；花托：莲蓬壳《海上方》，莲壳《儒门事亲》，陈莲蓬壳《妇人经验方》，莲蓬、莲房炭(常用中药名辨)；花：菡萏《诗经》，荷花《毛诗传》，水花(崔豹《古今注》)，白荷花露《纲目拾遗》，白莲花露《随息居饮食谱》；叶：莲《尔雅》，败荷叶《圣济总录》，荷叶心《水类铃方》，贴水荷叶《经验良方》，荷钱〔嫩叶〕、藕荷〔贴水叶〕、菱荷〔出水叶〕《纲目》，莲叶、藕叶《药材学》；叶基部：荷鼻《本草拾遗》，荷蒂《圣惠方》，莲蒂《岭南采药录》；叶柄：藕杆《随息居饮食谱》，荷叶梗、寸荷梗、荷梗段(常用中药名辨)；根茎及节：藕实茎《本经》，光旁(陆玑《诗疏》)，藕茎、藕丝菜〔细瘦根茎〕《纲目》，藕粉、藕节粉《纲目拾遗》，藕澄粉《本草求真》，藕节疤《中药志》，南藕节、老藕节、雪藕节、藕节炭(常用中药名辨)

地方名 药藕草《华中》；山西：莲蓬子；江苏：光藕节(苏州、泰州)，杜莲须(苏州)；浙江：荷花瓣；湖北：湖莲子，红莲米；其他：藕花。

功效 种子(莲子)：补脾止泻，益肾涩精，养心安神。用于脾虚久泻，遗精带下，心悸失眠；胚芽(莲子心)：清心安神，交通心肾，涩精止血。用于热入心包，神昏谵语，心肾不交，失眠遗精，血热吐血；花托(莲房)：化瘀止血。用于崩漏，尿血，痔疮出血，产后瘀阻，恶露不尽；雄蕊(莲须)：固肾涩精。用于遗精滑精，带下，尿频；花：活血止血，去湿消风；叶(荷叶)：清热解暑，升发清阳，凉血止血。用于暑热烦渴，暑湿泄泻，脾虚泄泻，血热吐衄，便血崩漏；荷叶炭：收涩化瘀止血，用于多种出血症，产后血晕；叶基部(荷叶蒂)：清暑去湿，和血安胎；根茎(藕)：益血，止血，调中，开胃；根茎节(藕节)：止血，消瘀。用于吐血，咯血，尿血，崩漏。

#### 7018004

*Nuphar bornetii* Levl. et Vant.

植物名 贵州萍蓬草《中国植志》

药材名 龙背莲《贵州民间药物》

文献名 子母莲、野藕《中药大辞典》

地方名 贵州：〔水龙骨〕，子午莲。

功效 根茎：滋补清热。用于劳伤虚损。

#### 7018005

*Nuphar japonicum* DC.

植物名 日本萍蓬草《中药大辞典》

文献名 骨髓、骨莲《和汉药物学》，川骨《中国植物图鉴》，萍蓬草《台湾药植志》

功效 种子、根茎：补虚，健胃，止血。用于产前产后出血，刀伤，神经衰弱。

#### 7018006

*Nuphar oguraense* Miki

植物名 龙背莲《药植简编》

地方名 贵州：〔水龙骨〕，子母莲(贵阳)，野藕(绥阳)。

功效 根茎：补虚。

#### 7018007

*Nuphar pumilum* (Timm.) DC.

植物名 萍蓬草《中国植志》

药材名 萍蓬草《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 水栗、水栗子、水栗包《纲目》，萍蓬子(姚可成《食物本草》)，川骨、兔葵、骨莲《新纲》，萍蓬莲《华东水植》，短萍蓬《药植简编》，水萍蓬、矮萍蓬《中药大辞典》

地方名 浙江：黄金莲；湖南：水荷藕，大莲藕，白莲藕、水藕(衡阳)；广西：水面一盏灯；其他：地龙根，腰带莲。

功效 种子：助脾厚肠；根茎：补虚，健胃，调经。

#### 7018008

*Nuphar sinensis* Hand.-Mazz.

植物名 中华萍蓬草《中国植志》

药材名 中华萍蓬草《贵州药录》

功效 根茎：滋阴润燥，清热止汗。用于阴虚盗汗，劳损，神经衰弱，刀伤。

#### 7018009

*Nymphaea odorata* Ait.

植物名 香睡莲《台湾药植志》

功效 根:收敛。用于白带,石淋,疮疡等。

#### 7018010

*Nymphaea tetragona* Georgi --- *Nymphaea tetragona* Georgi var. *crassifolia* (Hand.-Mazz.) Y. C. Chu

植物名 睡莲《中国植志》

药材名 睡莲《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 睡莲菜、瑞莲《岭南杂记》,子午莲《纲目拾遗》,此碧花《名实图考》,水浮莲《科裁》,大花睡莲《东北草本植志》

地方名 广西:水莲花(桂平);贵州:玉荷花,水耗子

功效 花:用于消暑解醒,小儿急慢惊风。

### 7019 小檗科 Berberidaceae

#### 7019001

*Berberis aemulans* Schneid.

植物名 峨眉小檗《高植图鉴》

地方名 四川:三颗针(峨眉山)。

功效 根:清热解毒,消炎抗菌,止痢。

#### 7019002

*Berberis aggregata* Schneid.

植物名 锥花小檗《高植图鉴》

文献名 小黄连刺《四川中药志》

地方名 甘肃:猫儿刺(天水),小黄檗刺、黄檗子(文县、武都);湖北:黄柏刺(神农架);四川:刺黄芩,老鼠刺。

功效 根:清热解毒,抗菌消炎。用于目赤,赤痢,吐血瘀伤,咽喉肿痛,腹泻,齿痛,耳心痛,跌打损伤红肿等。

#### 7019003

*Berberis aggregata* var. *intergregifolia* Ahrendt.

植物名 全缘叶锥花小檗《四川中药志》

文献名 全缘锥花小檗《云南种录》

地方名 四川:小黄连刺(川西)。

功效 根和茎:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019004

*Berberis ambrosiana* Schneid.

植物名 拟刺红珠《植分学报》

文献名 三颗针《植分学报》

功效 根:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019005

*Berberis amoena* Dunn

植物名 美丽小檗《植分学报》

文献名 三颗针《植分学报》

功效 根:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019006

*Berberis amurensis* Rupr.

植物名 黄芦木《名实图考》、《高植图鉴》

药材名 小檗《唐本草》、《汇编》

文献名 子檗《本草经集注》,山石榴《唐本草》,酸溜溜《植物名汇》,东北小檗《经植手册》,黑水小檗《中国

药植志》,大叶小檗《东北植药图志》,阿穆尔小檗《华北经植志要》,雀心《华北树木志》,刺檗《山东树木志》,伏牛花《科裁》

地方名 狗奶子(东北),三棵针(吉林、内蒙古),刺黄檗(山西、陕西);黑龙江:刀口药,黄连,〔枸杞子〕,〔地骨皮〕;吉林:〔五加皮〕,刺拐棒(延边);辽宁:狗奶根(庄河、凤城);河北:二黄连(张家口);内蒙古:“希拉-毛都”(蒙名),山黄柏;陕西:刺黄柏(秦岭),〔黄檗〕(太白山);宁夏:〔黄柏〕(六盘山区);四川:“红莲”(若尔盖藏名)。

功效 根、茎、枝:清热燥湿,泻火解毒。用于细菌性痢疾,胃肠炎,副伤寒,消化不良,黄疸,肝硬化腹水,泌尿系感染,急性肾炎,扁桃体炎,口腔炎,支气管炎。外用子中耳炎,目赤肿痛,外伤感染。

#### 7019007

*Berberis anhweiensis* Ahrendt

植物名 安徽小檗《浙江药植志》

药材名 刺黄柏《浙江天目药志》

功效 根、茎、树皮:清热,燥湿,利尿,杀虫。用于黄疸,目疾,热痢下血,淋浊带下,疮疡热毒。

#### 7019008

*Berberis atrocarpa* Schneid.

植物名 深黑小檗《中药志》

文献名 黑果小檗《云南种录》,深黄小檗《新华本草纲要》

地方名 贵州:三颗针,鸡脚刺,刺黄连,刺黄芩,刺黄柏。

功效 根、根皮:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019009

*Berberis atrocarpa* Schneid. var. *subintegra* Ahrendt

植物名 乐桂小檗《湖南药物志》

功效 根、茎:清热解毒。用于火眼,疮疖肿毒。

#### 7019010

*Berberis brachypoda* Maxim.

植物名 短柄小檗《秦岭植志》

药材名 三颗针《分类草药性》、《中药大辞典》

文献名 毛叶小檗《高植图鉴》,小檗《汇编》,伏牛花、黄皮刺《陕甘宁植志》

地方名 小黄檗、刺黄连(陕西、甘肃、宁夏),〔黄柏〕(宁夏、河南);甘肃:酸梨刺;青海:黄刺皮;湖北:大叶三颗针、小黄包树(神农架)。

功效 根皮或茎皮:清热,利湿,散瘀。用于赤痢,黄疸,咽痛,目赤,跌打损伤。

#### 7019011

*Berberis brevisepala* Hayata

植物名 红枝小檗《台湾药植志》

文献名 台湾檗木《台湾药植志》

功效 根:用于毒蛇咬伤。

#### 7019012 见 7019065

#### 7019013

*Berberis caroli* Schneid.

植物名 鄂尔多斯小檗《沙漠植志》

功效 茎皮、根皮：燥湿，解毒泻火。

## 7019014

*Berberis cavaleriei* Levl.

植物名 贵州小檗《新华本草纲要》

地方名 贵州：三颗针、刺黄连、鸡脚刺（贵阳）。

功效 根：清热解毒。用于痢疾，肠炎，结膜炎。

## 7019015

*Berberis chingii* Cheng

植物名 鸡脚刺《贵阳民间药草》

文献名 安徽小檗《高植图鉴》，木黄连《药植简编》

地方名 三颗针（甘肃、湖南、广东、云南）；贵州：刺黄芩，刺小檗，刺黄连（贵阳），玉妹刺。

功效 根：清热解毒。

## 7019016

*Berberis chrysosphaera* Mulligan

植物名 黄球小檗《西藏植志》

文献名 金黄球小檗《植分学报》

功效 根、茎：清热解毒，抗菌消炎。

## 7019017

*Berberis circumserrata* Schneid.

植物名 秦岭小檗《高植图鉴》

文献名 黄花刺《秦岭植志》，歪头小檗《汇编》

地方名 陕西：三颗针，刺黄檗、老鼠刺（秦岭）；青海：〔黄檗〕；甘肃：小檗；湖北：高山黄包刺（神农架）。

功效 根皮：清热解毒，抗菌消炎。

## 7019018

*Berberis dasystachya* Maxim.

植物名 直穗小檗《高植图鉴》

药材名 黄刺皮《青海中草药》

文献名 直序小檗《汇编》，密穗小檗《秦岭植志》

地方名 〔黄柏〕（青海、宁夏）；青海：黄三刺皮，“吉尔尔”（藏名）；河南：珊瑚刺，〔山黄柏〕；湖北：大三颗针（神农架）。

功效 茎皮：清热燥湿，泻火解毒。用于热痢便血，湿热黄疸，下肢肿痛，潮热盗汗，风火目痛，口糜，舌疮，乳腺炎及疮疮初起。

## 7019019

*Berberis diaphana* Maxim.

植物名 鲜黄小檗《高植图鉴》

药材名 黄刺皮《青海中草药》

文献名 黄花刺《树分》，歪头小檗《汇编》

地方名 三颗针（陕西、青海）；宁夏：〔黄柏〕（六盘山区）；青海：黄刺，黄檗。

功效 根：清热燥湿，泻火解毒。

## 7019020

*Berberis dictyoneura* Schneid.

植物名 细脉小檗《秦岭植志》

功效 根皮：抗菌消炎。用于眼结膜炎。

## 7019021

*Berberis dictyophylla* Franch.

植物名 刺红珠《高植图鉴》

文献名 网脉小檗《药植简编》

地方名 青海：“吉尔哇”（藏名）；贵州：三颗针；西藏：“吉儿巴”（藏名）。

功效 根皮：清热解毒，抗菌消炎。用于火眼，刀伤，痢疾等。

## 7019022

*Berberis dictyophylla* Franch. var. *epruinosa* Schn.-eid.

植物名 无粉刺红珠《西藏植志》

文献名 黑石珠、三颗针《中药大辞典》，藏三颗针《药植简编》

功效 根皮、茎皮：清热，利湿，散瘀。用于赤痢，黄疸，咽痛，目赤，跌打损伤。

## 7019023

*Berberis dielsiana* Fedde

植物名 首阳小檗《高植图鉴》

文献名 第氏小檗《中国药植志》，黄檗刺《秦岭植志》，大黄连、黄皮刺《陕甘宁植志》，黄小檗《品种论述》

地方名 〔山黄柏〕（河南、陕西）；山西：黄皮针刺；陕西：小叶黄檗，〔黄檗〕（太白），三颗针（陕北），〔刺黄柏〕（宁强）；河南：〔黄柏〕；其他：尖叶三颗针。

功效 根：清热，退火，抗菌。

## 7019024

*Berberis dolichobotrys* Fedde

植物名 长穗小檗《秦岭植志》

地方名 陕西：〔黄檗〕（太白）。

功效 根、树皮：清热解毒，抗菌消炎。

## 7019025

*Berberis dubia* Schneid.

植物名 置疑小檗《秦岭植志》

地方名 青海：〔黄檗〕（民和）；四川：“吉尔雍”（藏名）。

功效 根、根皮：清热燥湿，泻火解毒。用于痢症肿毒，肠炎不泻，目赤肿痛。

## 7019026

*Berberis ferdinandi-coburgii* Schneid. --- *B. kunmingensis* auct. non C. Y. Wu

植物名 大叶小檗《云南种录》

药材名 昆明鸡脚黄连《昆明民药》

文献名 土黄连、石妹刺《滇南本草》，昆明鸡脚刺《药植简编》，昆明小檗《植分学报》，刺黄连《云南药录》

地方名 三颗针、鸡脚刺（四川、云南）；云南：鸡脚黄连（昆明、保山），大黄连、黄连刺（红河），〔黄连〕（曲靖）。

功效 根茎：清热燥湿，泻火解毒。用于肠炎，痢疾，淋病，咽喉肿痛，烫伤，疮痈。

备考 本品学名有的文献曾订为 *B. kunmingensis* C. Y. Wu

## 7019027

*Berberis francisci-ferdinandi* Schneid.

植物名 大黄檗《秦岭植志》

文献名 三颗针《植分学报》

功效 根或根皮：清热燥湿，泻火解毒。

## 7019028



*Berberis gagnepainii* Schneid.

植物名 湖北小檗《高植图鉴》

文献名 土黄连《滇南本草》

地方名 湖北:黄花刺(建始)。

功效 根或茎叶:清热燥湿,泻火解毒。

#### 7019029

*Berberis gagnepainii* Schneid. var. *lanceifolia* Ahrendt

--- *B. veitchii* Schneid.

植物名 蓝果小檗《高植图鉴》

文献名 小檗《峨眉药植资源》

地方名 四川:三颗针(峨眉山)。

功效 根、茎:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019030

*Berberis gagnepainii* Schneid. var. *subovata* Schneid.

植物名 瓦屋小檗《秦岭植志》

功效 根:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019031

*Berberis gilgiana* Fedde

植物名 崂峪小檗《秦岭植志》

文献名 小叶黄檗《植分学报》

功效 根、茎:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019032

*Berberis giraldii* Hesse

植物名 毛脉小檗《秦岭植志》

功效 根:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019033

*Berberis gyalalica* Ahrendt

植物名 波密小檗《西藏植志》

文献名 西藏小檗《中药志》

地方名 西藏:三颗针。

功效 根或根皮:清热燥湿,泻火解毒。

#### 7019034

*Berberis hemsleyana* Ahrendt

植物名 拉萨小檗《西藏植志》

地方名 西藏:三颗针,“吉儿把加勃”(藏名)。

功效 根及根皮:清热解毒,抗菌消炎。用于眼病,痢疾。

#### 7019035

*Berberis henryana* Schneid.

植物名 巴东小檗《高植图鉴》

文献名 川鄂小檗《秦岭植志》

地方名 陕西:三颗针,黄檗,追风子(太白山);湖北:小叶三颗针(神农架)。

功效 根或根皮:清热燥湿,泻火解毒;果实:用于小儿惊风。

#### 7019036

*Berberis heteropoda* Schrenk

植物名 黑果小檗《植分学报》

药材名 黑果小檗《新疆中草药手册》

地方名 新疆:刺黄檗,“则热克”(维吾尔),小檗,三颗针。

功效 根、根皮、茎皮:清热燥湿,泻火解毒。

用于痢疾,肠炎,咽炎,口腔炎,湿疹,痈肿;果实:用于高血压。

#### 7019037

*Berberis hobsonii* Ahrendt

植物名 毛梗小檗《西藏植志》

功效 根:清热降火。

#### 7019038

*Berberis hsuyunensis* Hsiao et Sung

植物名 叙永小檗《植分学报》

功效 根:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019039

*Berberis humido-umbrosa* Ahrendt

植物名 阴湿小檗《新华本草纲要》

功效 根:清热降火,抗菌消炎。

#### 7019040

*Berberis ignorata* Schneid.

植物名 藏黑小檗《新华本草纲要》

功效 根皮:用于眼疾。

#### 7019041

*Berberis iliensis* Popov

植物名 伊犁小檗《新疆药物志》

文献名 伊宁小檗《植分学报》

地方名 新疆:小檗。

功效 根、茎:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019042

*Berberis intergerrima* Bunge

植物名 全缘小檗《沙漠药植》

药材名 三颗针(新疆)

功效 根、枝内皮:清热燥湿,泻火解毒。

#### 7019043

*Berberis jamesiana* Forrest et W. W. Smith

植物名 川滇小檗《高植图鉴》

地方名 西藏:“吉儿把”(藏名)。

功效 根或根皮:清热燥湿,泻火解毒。用于口腔炎,咽喉炎,结膜炎,急性肠炎及痢疾。

#### 7019044

*Berberis johannis* Ahrendt

植物名 腰果小檗《西藏植志》

文献名 西藏小檗《植分学报》

地方名 西藏:三颗针,“吉儿把兴戈薄”(藏名)。

功效 根:用于眼病,冻伤,皮肤病等。

#### 7019045

*Berberis julianae* Schneid.

植物名 豪猪刺《中草药学》

药材名 小檗《汇编》

文献名 九连小檗《经植手册》

地方名 三颗针(湖北、广西、四川、甘肃),老鼠刺(广西、湖北),铜针刺(甘肃、陕西);甘肃:黄柏刺,〔刺黄柏〕;湖北:山黄连(利川),三甲刺(兴山),黄荆刺(建始),猪儿刺(竹溪),土黄连、刺黄连、黄包针(神农架);四川:同针刺(达县);云南:鸡足黄连,小黄连刺,石妹刺(昆明);贵州:鸡脚刺,阳角花根;其他:狗

奶子, 酸醋溜。

功效 根、根皮、茎、茎皮: 清热燥湿, 泻火解毒。用于细菌性痢疾, 胃肠炎, 副伤寒, 消化不良, 黄疸, 肝硬化腹水, 泌尿系感染, 急性肾炎, 扁桃体炎, 口腔炎, 支气管肺炎。外用于中耳炎, 目赤肿痛, 外伤感染。

备考 豪猪刺, 有的文献写成“獠猪刺”、“獠猪刺”、“蚝猪刺”等, 宜正名为“豪猪刺”

#### 7019046

*Berberis julianae* Schneid. var. *oblongifolia* Ahrendt

植物名 长叶豪猪刺《湖北植志》

药材名 小黄包树《神农架药录》

功效 根: 清热解毒, 抗菌消炎。

#### 7019047

*Berberis julianae* Schneid. var. *patungensis* Ahrendt

植物名 巴东豪猪刺《湖北植志》

药材名 巴东豪猪刺《神农架药录》

地方名 湖北: 黄柏刺针(神农架)。

功效 根: 清热, 泻火, 解毒。

#### 7019048

*Berberis kansuensis* Schneid.

植物名 甘肃小檗《秦岭植志》

药材名 甘肃小檗《甘肃中草》

文献名 黄染木《朝植乡名》

地方名 甘肃: 黄檗; 宁夏: 黄柏(六盘山区); 青海: 黄刺皮。

功效 根皮或茎皮: 清热燥湿, 泻火解毒。用于肠炎痢疾, 肝炎, 胆囊炎, 眼结膜炎等。

#### 7019049

*Berberis kawakamii* Hayata

植物名 台湾小檗《高植图鉴》

文献名 黑实檗木《台湾药植志》, 三颗针《中药志》

地方名 台湾: 土黄芩。

功效 根或根皮: 清热燥湿, 泻火解毒。

#### 7019050

*Berberis lecomtei* Schneid.

植物名 光叶小檗《云南种录》

文献名 [黄连]《云南药录》

地方名 云南: 三颗针, 土黄连。

功效 根: 清热解毒。

#### 7019051

*Berberis lempurgiana* Ahrendt

植物名 长柱小檗《植分学报》

药材名 长柱小檗《浙江药植志》

地方名 浙江: 黄檗、土黄檗(天台、宁波), 三颗针。

功效 根: 清热解毒, 抗菌消炎。用于急性肠胃炎, 眼结膜炎, 口腔炎, 咽喉炎, 痢疾, 无名肿毒, 丹毒, 湿疹, 烫伤, 吐血劳伤, 跌打损伤。

#### 7019052

*Berberis ludlowii* Ahrendt

植物名 大花小檗《植分学报》

功效 根: 清热解毒, 抗菌消炎。

#### 7019053

*Berberis munggetensis* Hayata

植物名 杜小檗《药植简编》

药材名 小檗《广西药录》

功效 根、茎: 清热解毒, 抗菌消炎。

#### 7019054

*Berberis multifolia* Stapf

植物名 毛叶小檗《秦岭植志》

功效 根及茎: 清热解毒, 抗菌消炎。

#### 7019055

*Berberis morrisonensis* Hayata

植物名 玉山小檗《台湾药植志》

文献名 阿里小檗《新华本草纲要》

功效 叶: 用于毒蛇伤; 根皮: 清热解毒, 抗菌消炎。当地民间当黄芩用。

#### 7019056

*Berberis oritrepha* Schneid.

植物名 显脉小檗《秦岭植志》

地方名 陕西: 黄檗刺, 三颗针。

功效 根、茎: 清热解毒, 抗菌消炎。

#### 7019057

*Berberis paraspecta* Ahrendt

植物名 鸡脚莲《云南种录》

地方名 云南: [黄柏] (丽江)。

功效 根: 清热解毒, 抗菌消炎。

#### 7019058

*Berberis paravirescens* Ahrendt

植物名 拟变绿小檗《新华本草纲要》

功效 根: 外用于眼疾。

#### 7019059

*Berberis pingjiangensis* Q. L. Chen et B. M. Yang

植物名 平江小檗《植分学报》

文献名 土黄连《植分学报》

功效 根、茎: 清热解毒, 抗菌消炎。

#### 7019060

*Berberis pingshanensis* Sung et Hsiao

植物名 屏山小檗《植分学报》

地方名 四川: 大刺黄连、三颗针(屏山)。

功效 根: 清热解毒, 抗菌消炎。

#### 7019061

*Berberis poiretii* Schneid.

植物名 细叶小檗《高植图鉴》

药材名 三颗针《中药志》

文献名 [黄柏]《植物名汇》, 泡小檗《东检》, 刺黄连《简明中医辞典》, 波氏小檗《中国药植志》

地方名 针雀、酸醋柳(华北), 北常山(辽宁、华北), 狗奶子、红狗奶子(东北), 山常山(北京、河北); 辽宁: 土常山、酸梗米(建平), [常山](凌源), 雀心(绥中、建昌、凌源), [黄连](朝阳); 北京: 刺刺榴; 河北: 酸狗奶子, 刺溜溜, 红梗米; 甘肃: 刺黄檗, 黄刺皮, 刺黄柏。

功效 根: 清热燥湿, 泻火解毒。用于痢疾, 肠炎, 黄疸, 咽痛, 上呼吸道感染, 目赤, 急性中耳炎。

#### 7019062

*Berberis poiretii* Schneid. var. *biseminalis* P. Y. Li

植物名 二籽针雀《秦岭植志》

地方名 陕西:〔黄柏〕(商县)。

功效 根:清热,去火,消炎,解毒。

#### 7019063

*Berberis polyantha* Hemsl.

植物名 刺黄花《高植图鉴》

药材名 三颗针《中药志》

文献名 多花小檗《经植手册》

地方名 四川:刺黄芩(马尔康)。

功效 根:清热燥湿,泻火解毒。用于痢疾,肠炎,黄疸,咽痛,上呼吸道感染,目赤,急性中耳炎。

#### 7019064

*Berberis pratii* Schneid.

植物名 拟多花小檗《植分学报》

地方名 四川:三颗针,刺黄连。

功效 根或根皮:清热燥湿,泻火解毒。

#### 7019065

*Berberis pruinosa* Franch. --- *B. Candidula* Schneid.

植物名 粉叶小檗《植分学报》

药材名 大黄连刺《曲靖本草》

文献名 大黄连《名实图考》,白粉小檗《药植简编》,宽叶小檗、粉白小檗《西昌中草药》,宽叶鸡脚黄连《中药大辞典》

地方名 三颗针(四川、云南);云南:土黄连(曲靖),鸡脚黄连,石妹刺,刺黄连(昆明),黄脚刺、刺黄树(丽江),鸡脚刺。

功效 根或根皮:清热燥湿,泻火解毒。用于尿赤肿痛,牙龈肿痛,咽喉肿痛,腮腺炎,疖疮肿毒,菌痢,腮腺炎,乳腺炎,急性黄疸型肝炎,预防感冒;果:消食排气。用于食积腹胀。

#### 7019066

*Berberis pubescens* Pamp.

植物名 柔毛小檗《植分学报》

功效 根:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019067

*Berberis purdomii* Schneid.

植物名 延安小檗《秦岭植志》

地方名 陕西:〔黄檗〕(陕北)。

功效 根、根皮:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019068

*Berberis replicata* W. W. Smith

植物名 折转小檗《云南药录》

文献名 卷叶小檗《云南种录》

地方名 云南:土黄连。

功效 根:用于热淋疼痛,胃中实火,牙龈肿痛,小儿乳蛾炸腮。

#### 7019069

*Berberis reticulata* Byhouwer

植物名 网脉小檗《秦岭植志》

功效 根:清热解毒,抗菌消炎。用于肠炎,痢疾。

#### 7019070

*Berberis sanguinea* Franch.

植物名 血红小檗《植分学报》

地方名 四川:三颗针。

功效 根:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019071

*Berberis sargentiana* Schneid.

植物名 刺黑珠《高植图鉴》

药材名 三颗针《分类草药性》、《四川中药志》

文献名 铜针刺《天宝本草》

地方名 湖北:〔寻骨风〕(巴东),黄精刺(建始);四川:黑石珠,刺黄芩,金罐子,同针刺,藤刺黄;贵州:刺黄连,鸡脚刺。

功效 根皮、茎皮:清热,利湿,散瘀。用于赤痢,黄疸,咽痛,目赤,跌打损伤。

#### 7019072

*Berberis sibirica* Pall.

植物名 刺叶小檗《华北树木志》

药材名 小檗《中药大辞典》

文献名 西北小檗《青海本草》

地方名 三颗针(东北);内蒙古:酸狗奶子。

功效 根及茎枝:清热燥湿,泻火解毒。

#### 7019073

*Berberis silva-taroucana* Schneid.

植物名 华西小檗《高植图鉴》

药材名 三颗针(四川理县)

地方名 湖北:黄包刺棵子(神农架);四川:大圆叶三颗针(峨眉),大山黄刺(茂县);云南:土黄连(曲靖、玉溪、楚雄)。

功效 根、茎:清热解毒,抗菌消炎。

#### 7019074

*Berberis silvicola* Schneid.

植物名 兴山小檗《湖北植志》

药材名 兴山小檗《神农架药录》

地方名 湖北:三颗针(神农架)。

功效 根:清热,泻火,解毒。

#### 7019075

*Berberis silvicola* Schneid. var. *angusta* Ahrendt

植物名 狭叶兴山小檗《神农架药录》

地方名 湖北:三颗针(神农架)。

功效 根:清热,泻火,解毒。

#### 7019076

*Berberis soulieana* Schneid. --- *B. stenophylla* Hance

植物名 猫刺小檗《中药志》

药材名 三颗针《分类草药性》、《中药志》

文献名 假豪猪刺《中药大辞典》,拟豪猪刺、豪猪刺《药典》,康定小檗《云南种录》

地方名 猫儿刺、老鼠刺(陕西、甘肃),刺黄连(湖北、陕西);陕西:刺黄柏(山阳),通针刺(略阳),母猪刺(宁强);甘肃:铜针刺;湖北:排骨筋(崇阳)。

功效 根及茎皮:清热燥湿,泻火解毒。用于痢疾,肠炎,黄疸,咽痛,上呼吸道感染,目赤,急性中耳炎。



辛, 火焰叉; 云南: 竹参七(镇雄)。

功效 根、根茎: 有小毒。散瘀止血, 祛风止痛。用于跌扑损伤, 风湿痹痛, 月经不调, 产后瘀血腹痛, 皖腹疼痛。

#### 7019090

*Diphylleia grayi* F. Schmidt

植物名 山荷叶《高植图鉴》

药材名 山荷叶《中草药学》

文献名 东北山荷叶《汇编》, 八角莲、八角金盘《中草药学》

功效 根茎: 破瘀, 通淋, 止痛。用于跌打损伤, 筋骨疼痛, 毒蛇咬伤, 尿路结石, 血淋, 喉头炎, 痢疮疮疖。

#### 7019091

*Diphylleia sinensis* Li

植物名 南方山荷叶《中药志》

药材名 窝儿七《陕西中草药》

文献名 华山荷叶《高植图鉴》, 中国山荷叶《中草药学》, 南山荷叶《云南种录》

地方名 陕西: 一碗水, 窝儿参, 凹儿七, 阿儿七(太白), 一把伞, 旱荷; 湖北: 江边一碗水(巴东), 金鞭七(神农架), 金边七, 黄包袱。

功效 根茎: 有毒。活血化瘀, 解毒消肿。用于风湿性关节炎, 腰腿疼痛, 骨蒸, 癆热, 跌打损伤, 月经不调, 少腹结痛, 痢肿。

#### 7019092

*Dysosma aurantiocaula* (Hand. -Mazz.) Hu --- *Podophyllum aurantiocaula* Hand. -Mazz.

植物名 云南八角莲《植分学报》

药材名 多花八角莲《湖南药物志》

文献名 山荷叶、八角金盘《药植简编》, 七角莲《汇编》

地方名 湖南: 八角莲; 贵州: 白八角莲。

功效 块茎: 有小毒。散结活瘀, 消肿止痛, 解毒清热。用于腹痛, 痢疮, 肿毒, 蛇咬伤, 淋巴结炎, 腮腺炎, 跌打损伤。

#### 7019093

*Dysosma difformis* (Hemsl. et Wils.) T. H. Wang --- *Podophyllum difforme* Hemsl. et Wils. --- *P. triangula* Hand. -Mazz.

植物名 小八角莲《高植图鉴》

药材名 包袱七(湖北恩施)、《汇编》

文献名 半碗水、铁骨散《汇编》

地方名 湖南: 荷叶莲、药中王(隆回苗族), 包袱莲, 单叶一枝花, 一块砖; 广西: 红八角莲(全州); 四川: 八角莲、金盘(峨眉山)。

功效 根茎: 有小毒。清热解毒, 活血散瘀, 消肿止痛, 祛痰消癭。用于淋巴结肿, 腮腺炎, 肺炎, 扁桃腺炎, 胃痛, 腹痛, 痢疾, 无名肿毒, 毒蛇咬伤。

#### 7019094

*Dysosma lichuanensis* Z. Cheng

植物名 乌云伞《湖北植志》

地方名 湖北: 血丝金盆(恩施)。

功效 根茎及根: 有毒。解毒, 止痛。用于跌打损伤, 劳伤疼痛, 蛇伤, 痢疮疮毒。

#### 7019095

*Dysosma majorensis* (Gagnep) Ying --- *Podophyllum majorensis* Gagnep.

植物名 贵州八角莲《植分学报》

地方名 贵州: 白八角莲, 梨子草, 叶下花。

功效 根茎: 生肌, 止血, 止痛, 散瘀; 叶、根: 祛风活络, 行气止痛。

#### 7019096

*Dysosma pleiantha* (Hance) Woods. *Podophyllum pleianthum* Hance --- *Dysosma chengii* (Chien) Keng f. --- *Podophyllum hispida* Hao

植物名 六角莲《高植图鉴》

药材名 八角莲《纲目拾遗》、《中药志》

文献名 鬼臼、九臼、爵犀、马目毒公《本经》, 天臼、雀犀、马目公、解毒《吴普本草》, 毒母草《图经》, 独脚莲、独荷叶《土宿本草》, 旱荷《庚辛玉册》, 鬼药、羞天花、术律草、瑞田草、山荷叶、八角盘、唐婆镜《纲目》, 独脚连、八角连、金星八角、草八角、独叶一枝花、马目夺公、红孩儿、独脚一枝花、干荷《纲目拾遗》, 金魁莲《分类草药性》, 郑氏八角莲《中药材科技》, 台湾鬼臼《种分》, 毛八角莲《广西植录》

地方名 一把伞(云南、四川、广西), 一碗水(湖北、陕西), 八角金盘(江西、福建、浙江), 叶下花(湖北、贵州), 白八角莲、独荷草(四川、贵州); 陕西: 九龙盘、八卦七、八角七(洵阳), 八角并盘七(白河), 叶下珠(安康), 金盘三七(宝鸡); 浙江: 金盘托蕊(天目山); 湖南: 荷叶三七(常德), 一块砖、荷叶莲(衡阳); 广东: 一朵云; 广西: 马眼莲, 叶下果(百色); 贵州: 水八角莲、梨子草(雷山), 旱八角。

功效 根茎: 有小毒。清热解毒, 化痰散结, 祛瘀消肿。用于痢肿, 疔疮, 瘰癧, 咽喉肿痛, 跌打损伤, 毒蛇咬伤。

#### 7019097

*Dysosma veitchii* (Hemsl. et Wils.) Fu --- *Podophyllum veitchii* Hemsl. et Wils.

植物名 川八角莲《高植图鉴》

药材名 八角莲(四川、云南)

文献名 八角金盘、金盘、银盘《中草药通讯》, 红八角莲《中草药》

地方名 四川: 血丝金盆(南川), 白八角莲, 山荷叶, 独脚莲, 独荷草; 云南: 独叶一枝花, 独角莲, 八角盘, 五朵云, 一把伞(彝良), 山荷花(嵩明); 其他: 维忌鬼臼。

功效 根茎: 清热解毒, 化痰散结, 祛瘀消肿。用于痢肿, 疔疮, 瘰癧, 喉蛾, 跌打损伤, 蛇咬伤。

#### 7019098

*Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng --- *Podophyllum versipelle* Hance

植物名 八角莲《高植图鉴》

药材名 八角莲《中药志》

文献名 鬼臼、爵犀、马目毒公、九臼《本经》, 天臼、

雀犀《马口公》、解毒《吴普本草》、羞寒花《益部方物略记》、害母草《图经》、八角盘《通志》、独脚莲、独荷草《土宿本草》、旱荷《庚辛玉册》、山荷叶、羞天花、术律草、山荷草、唐婆镜、瑛田草、鬼药《纲目》、金星八角、独叶一枝花《汪连仕采药书》、八角莲草《名实图考》、金魁莲《分类草药性》、八角乌《中草药学》

地方名 八卦莲(福建、湖南)、一把伞(广东、广西);陕西:八台七、神仙碗、九龙盘、窝儿七;福建:一粒珠、千斤锤(松溪、政和)、八角莲叶、八角金盘(福州、福鼎、福安、霞浦);湖北:一碗水(神农架)、江边一碗水(保康)、兴山八角莲、八瓜麻(鹤峰)、金边七(巴东)、独荷莲;湖南:铁菱角(辰溪)、九牌龙(华容)、包袱莲(大庸);广西:红八角莲(全州);四川:独荷叶、血丝金盘、金边八角莲(峨眉)、八角荷、孩儿撑伞草(成都)。

功效 根茎:有毒。清热解毒,化痰散结,祛瘀消肿。用于痈肿、疔疮、瘰癧、咽喉肿痛、跌打损伤、毒蛇咬伤;叶:用于哮喘、背痈溃烂。

## 7019099

*Epimedium acuminatum* Franch.

植物名 粗毛淫羊藿《植分学报》

药材名 淫羊藿《云南药录》

文献名 尖叶淫羊藿《中药志》、渐尖淫羊藿《湖北植志》

地方名 广西:羊藿(乐业);贵州:紫花淫羊藿;云南:三枝九叶草(昆明)、小定药(保山、昭通、曲靖、丽江)、仙灵脾。

功效 全草:用于风湿痹痛、阳痿。

## 7019100

*Epimedium baojingensis* Q. L. Chen et B. M. Yang

植物名 保靖淫羊藿《植分学报》

功效 全草:壮阳。

## 7019101

*Epimedium brevicornum* Maxim.

植物名 淫羊藿《植分学报》

药材名 淫羊藿《本经》、《药典》

文献名 刚前《本经》、仙灵脾《雷公炮炙论》、仙灵毗《柳柳州集》、放杖草、弃杖草、千两金、干鸡筋、黄连祖《日华子本草》、三枝九叶草《图经》、羊藿根《分类草药性》、小叶淫羊藿《东北植药图志》、心叶淫羊藿《药材学》、短角淫羊藿《秦岭植志》

地方名 陕西:野黄连(平利)、野蔓莲、含阴草;甘肃:〔鬼见愁〕(武都);青海:羊藿叶;湖南:三叉骨、肺经草、铁菱角;贵州:牛角花、铜丝草、铁打杆;其他:鸡爪莲、黄连花、羊藿、淫羊藿根。

功效 地上部分:补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,筋骨痿软,风湿痹痛,麻木拘挛,更年期高血压症;根:用于虚淋,白浊,白带,月经不调,小儿雀盲,痈疽成脓不溃。

## 7019102

*Epimedium davidii* Franch.

植物名 宝兴淫羊藿《植分学报》

药材名 淫羊藿《滇南本草》

文献名 兴阳草《滇南本草》、华西淫羊藿《湖北植志》

地方名 湖北:三咳草(鄂西);四川:三枝九芦草;云南:三枝九叶草,小定药,仙灵脾。

功效 全草:祛风除湿,补肾壮阳,止咳。

## 7019103

*Epimedium elongatum* Komarov

植物名 川西淫羊藿《植分学报》

药材名 淫羊藿(四川)

文献名 长杆淫羊藿《四川中药志》、长柄淫羊藿《汇编》、长梗淫羊藿《药植简编》

地方名 四川:羊藿。

功效 地上部分:补肾阳,强筋骨,祛风湿。

## 7019104

*Epimedium grandiflorum* Morr.

植物名 大花淫羊藿《华北经植志要》

药材名 淫羊藿《质问本草》

功效 地上部分:补肾阳,强筋骨,祛风湿。

## 7019105

*Epimedium hunanense* (Hand. -Mazz.) Hand. -Mazz.

植物名 湖南淫羊藿《植分学报》

药材名 淫羊藿(湖南)

地方名 广西:阴阳合。

功效 全草:用于阳痿,男子精少不育,风湿骨痛。

## 7019106

*Epimedium koreanum* Nakai

植物名 朝鲜淫羊藿《植分学报》

药材名 淫羊藿(东北)、《药典》

文献名 东北淫羊藿《汇编》、大叶淫羊藿《中药大辞典》

地方名 辽宁:羊藿叶;吉林:“沙姆吉”(朝语)。

功效 地上部分:补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,筋骨痿软,风湿痹痛,麻木拘挛,更年期高血压症。

## 7019107

*Epimedium leptorrhizum* Stearn

植物名 黔岭淫羊藿《植分学报》

文献名 近裂淫羊藿《湖北植志》

地方名 淫羊藿(湖北、贵州);贵州:紫花淫羊藿,铁打杆。

功效 地上部分:补肾阳,强筋骨,祛风湿;根茎:降火祛风。用于风湿,劳伤,眩晕。

## 7019108

*Epimedium pubescens* Maxim.

植物名 柔毛淫羊藿《秦岭植志》

药材名 淫羊藿《药典》

文献名 毛叶淫羊藿《四川中药志》

地方名 湖北:三枝九叶草(神农架);四川:羊藿;其他:钓鱼杆,黄连花。

功效 地上部分:补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,筋骨痿软,风湿痹痛,麻木拘挛,更年期高血压症。

## 7019109

*Epimedium sagittatum* (Sieb. et Zucc.) Maxim.

植物名 箭叶淫羊藿《中国药植志》

药材名 淫羊藿(江西)、《药典》

文献名 三枝九叶草《高植图鉴》

地方名 羊角风(中南), 羊角叶(广东、广西), 仙灵脾(四川、浙江、湖北、广西), 铁箭头(江西、浙江), 三叉风(湖南、江西), 羊合叶(广西、江西); 江西: 铁蚊虫(婺源), (铁脚威灵仙)(景德镇), 阴阳合(德兴), (鸡爪莲), 三角莲; 福建: 牛角花, 三角耙(闽北), 乏力草(闽北、福州), 铁连阔叶(福安); 湖北: 铁连角(巴东), (鸡爪黄连)(崇阳), 淫羊合、铁角莲(神农架); 湖南: 桂鱼风(溆浦), 菊鱼风、三叉骨、山查姑、铁耙头(黔阳); 广西: 羊藿(乐业), (土黄连)(贺县), 肺叶草(桂林), 羊藿叶; 四川: 淫羊花, 天仁合(达县), 放木草、千两金(武隆); 贵州: 铁鹞子, 铁打杆。

功效 地上部分: 补肾阳, 强筋骨, 祛风湿。用于阳痿遗精, 筋骨痿软, 风湿痹痛, 麻木拘挛, 更年期高血压症。

## 7019110

*Epimedium sagittatum* var. *glabratum* T. S. Ying

植物名 光叶淫羊藿《贵州药录》

地方名 贵州: 黄花淫羊藿。

功效 全株: 补肾壮阳, 祛风镇痛, 止咳。

## 7019111

*Epimedium sutchuenense* Franch.

植物名 四川淫羊藿《湖北植志》

药材名 淫羊藿(湖北、四川)

功效 地上部分: 补肾阳, 强筋骨, 祛风湿。

## 7019112

*Epimedium wushanense* T. S. Ying

植物名 巫山淫羊藿《药典》

药材名 淫羊藿《药典》

功效 地上部分: 补肾阳, 强筋骨, 祛风湿。用于阳痿遗精, 筋骨痿软, 风湿痹痛, 麻木拘挛, 更年期高血压。

## 7019113

*Jeffersonia dubia* (Maxim.) Benth. et Hook. f. ---  
*Plagiorhegma dubium* Maxim.

植物名 鲜黄连《高植图鉴》

药材名 鲜黄连《汇编》

文献名 洋虎耳草《中国植物图鉴》, [黄连]《满蒙野卉》, 铁绿草《种分》, 朝鲜黄连(徐《生药》), 朝黄连、铁丝草《东北药植志》

地方名 假细辛(东北), 土黄连、毛黄连(辽宁、吉林); 吉林: 常黄连; 辽宁: 细辛幌子。

功效 根茎及根: 清热燥湿, 凉血止血。用于肠炎, 痢疾, 消化不良, 腹痛, 发热, 烦躁, 眼结膜炎, 口疮, 扁桃腺炎, 衄血, 吐血, 痢疽, 疖肿, 外伤感染。

## 7019114

*Leontice altaica* Pall.

植物名 阿尔泰牡丹草《高植图鉴》

文献名 阿勒泰狮足草《新疆药植志》, 阿尔泰狮足草《中卓药通讯》

地方名 新疆: [元胡], [延胡索]。

备考 块茎在新疆误作延胡索用, 应注意鉴别。

## 7019115

*Leontice inserta* Pall.

植物名 奎屯牡丹草《中卓药通讯》

备考 块茎在新疆混作延胡索用, 应注意鉴别。

## 7019116

*Leontice kiangnanensis* P. L. Chiu

植物名 江南牡丹草《植分学报》

地方名 浙江: 山玄胡, 玉龙擎珠。

功效 根茎: 用于跌打损伤。

## 7019117

*Mahonia bealei* (Fort.) Carr.

植物名 阔叶十大功劳《高植图鉴》

药材名 功劳木[茎]《药典》

文献名 十大功劳《名实图考》, 淡黄连《分类草药性》, 土黄连、[黄柏树]、皮氏黄连竹、大叶黄柏、刺黄檗《中国药植志》, 部瓜山树、猫儿头《中国药植图鉴》

地方名 土黄柏(浙江、福建、湖北、江西), 刺黄连(四川、湖北、湖南), 刺黄柏(福建、四川、陕西、湖南、江苏、云南), 老鼠刺(四川、陕西、湖南), 老鼠黄连(广西、湖南), [黄柏](福建、江西、湖北), 八角羊(福建、湖南), 刺黄芩(陕西、贵州); 浙江: 十大功劳叶, 八角刺(淳安), 土黄檗(平阳); 江西: 黄天竹; 福建: 川柏(光泽), 黄柏刺(沙县、南平、上杭), 功劳柴(福安), 鼠怕草(闽东); 湖北: 山黄芩(兴阳), 西风竹, 大猫儿刺(建始), 黄杨散(巴东), 黄柏刺树(神农架); 湖南: 伞把黄连, 大老鼠黄, 老鼠黄, 黄杨木, 羊角莲, 羊角黄连, [功劳叶], 野黄柏, 山黄连; 广西: 石黄连, [黄连](来宾), 木黄连(平南、凌云、乐业、德保), 土木黄连(那坡), 树黄连(平乐), 黄连刺(富川), [川连](融安), [黄藤](贵县、大瑶山), [黄芩](苍梧), [土黄芩]、老鼠勒(昭平), 老鼠木(凤山), [鸟不宿], 老鼠子刺, 黄连树, 美黄连(环江毛难族), 红莲(罗城仫佬族), 必莲(都安); 四川: 高山刺黄柏(峨眉山); 其他: 山黄柏, 功劳黄连, 公道老、公道老。

功效 茎、根: 清热燥湿, 泻火解毒。用于湿热泻痢, 黄疸, 目赤肿痛, 胃火牙痛, 疮疖, 痢肿, 痢疾, 黄疸型肝炎; 果实: 清热, 理湿。用于潮热骨蒸, 泄泻, 崩带淋浊; 叶: 清热补虚, 止咳化痰。

## 7019118

*Mahonia calamicaulis* Spare et Fisch.

植物名 芦茎十大功劳《西藏植志》

药材名 西藏十大功劳《汇编》

功效 根、茎: 清湿热, 解毒; 果实: 清热, 理湿。

## 7019119

*Mahonia confusa* Sprague

植物名 湖北十大功劳《高植图鉴》

功效 全株: 清火解毒。

## 7019120

*Mahonia decipiens* Schneid.

植物名 鄂西十大功劳《湖北植志》

地方名 湖北:刺黄连(兴山)。

功效 根:清湿热,解毒;果实:清火。

#### 7019121

*Mahonia dolichostylis* Takeda

植物名 长柱十大功劳《云南种录》

地方名 四川:十大功劳(西昌)。

功效 茎皮:清热,解毒,燥湿。

#### 7019122

*Mahonia eurybracteata* Takeda

植物名 宽苞十大功劳《新华本草纲要》

地方名 四川:刺黄芩,炭黄芩。

功效 根:清肺热,泻火。

#### 7019123

*Mahonia fargesii* Takeda

植物名 大叶刺黄柏《汇编》

文献名 刺黄连《药植简编》

地方名 贵州:十大功劳,刺黄芩,老鼠刺;其他:大叶黄柏。

功效 茎皮:清热,解毒,燥湿。用于肠炎,痢疾,风热感冒,湿疹,火眼,头晕耳鸣,黄疸。

#### 7019124

*Mahonia flavida* Schneid.

植物名 黄叶十大功劳《云南种录》

药材名 刺黄柏《云南药录》

文献名 刺黄连《药植简编》,黄苞十大功劳《云南药录》,黄十大功劳《汇编》

地方名 云南:土黄柏(玉溪),大黄连,酸腌菜果。

功效 茎皮:清热,解毒,燥湿。用于感冒,黄疸型肝炎,肠炎,痢疾,腹泻,高血压,跌打损伤。

#### 7019125

*Mahonia fordii* Schneid.

植物名 广东十大功劳《新华本草纲要》

文献名 山黄连《药植简编》,十大功劳《广西药录》

功效 根、茎:清热,解毒,燥湿。用于痢疾,腹泻。

#### 7019126

*Mahonia fortunei* (Lindl.) Fedde

植物名 细叶十大功劳《药典》

药材名 功劳木〔茎〕《药典》

文献名 十大功劳《名实图考》,猫儿头、刀瓜山树《中国药植志》,细叶十大功劳《广西植志》,刺黄柏《四川中药志》,狭叶十大功劳《中药志》

地方名 刺黄连(湖北、湖南),土黄芩(浙江、福建),土黄柏(福建、广东),土黄连(福建、广西、广东、湖南),竹叶黄连(广东、湖南),黄天竹(福建、上海),西风竹(福建、江西);上海:紫天竹;湖南:小黄连,山黄芩,老鼠黄,老鼠刺;广东:木黄连;广西:小叶刺黄连(桂林);四川:刺黄芩、老虎刺(成都)。

功效 茎、根:清热燥湿,泻火解毒。用于湿热泻痢,黄疸,目赤肿痛,胃火牙痛,疮疖,痈肿,痢疾,黄疸型肝炎;果实:清热,利湿。用于潮热骨蒸,泄泻,崩带

淋浊;叶:清热补虚,止咳化痰。

#### 7019127

*Mahonia ganpinensis* (Levl.) Fedde

植物名 密叶十大功劳《云南种录》

药材名 刺黄柏《中国药植志》

文献名 山黄连《中国药植志》,湖北十大功劳《湖北中草药志》,甘平十大功劳《四川中药志》,土黄连、土黄柏、黄白刺《鉴别手册》

地方名 土黄芩(湖北、四川);湖北:(水黄连)(宣恩);四川:木黄连,老鼠刺,刺黄芩,山黄芩;野黄芩;云南:大大功劳(新平)。

功效 根、茎:清湿热,解毒;果:清热理湿;叶:清热补虚,止咳化痰。

#### 7019128

*Mahonia gracilipes* (Oliv.) Fedde

植物名 细梗十大功劳《汇编》

药材名 刺黄柏《中国药植志》

文献名 老鼠刺、本黄连《草木便方》,刺黄芩《天宝本草》,十大功劳、土黄连、土黄柏、黄白刺《鉴别手册》,山黄芩、野黄芩《民药汇编》,峨眉刺黄连《汇编》,峨眉刺黄柏《峨眉药植研究》

地方名 四川:土黄芩,山黄连。

功效 根:清热,利湿,消肿,解毒。用于各种热性病,痢疾,胃肠炎,肺结核。外用于烫伤,湿疹;果实:清热退火。

#### 7019129

*Mahonia hancockiana* Takeda

植物名 蒙自十大功劳《云南种录》

文献名 有刺黄连《云南药录》

地方名 云南:土黄连,十大功劳。

功效 叶、茎、根:清热解暑,化痰止咳。用于肺结核咳嗽,咳血,风热赤眼,肠炎,痢疾。

#### 7019130

*Mahonia huiliensis* Hand.-Mazz.

植物名 会理十大功劳《西昌中草药》

地方名 四川:十大功劳,刺黄柏,刺黄连。

功效 根、茎、皮:清热,解毒,燥湿。

#### 7019131

*Mahonia japonica* (Thunb.) DC.

植物名 华南十大功劳《高植图鉴》

药材名 十大功劳(华南)

文献名 菠黄连〔根〕《中药大辞典》,刺黄柏、黄白刺《鉴别手册》

地方名 土黄柏(广东、福建),土黄连(广东、云南);浙江:十大功劳叶,功劳叶,功劳木;台湾:〔黄柏〕;湖南:羊角黄连、八角羊(衡山);云南:大土黄连。

功效 根、叶、茎干:清湿热,解毒。

#### 7019132

*Mahonia lomariifolia* Takeda --- *M. alexandri* Schneid.

植物名 长小叶十大功劳《迪庆藏药》

药材名 十大功劳《迪庆藏药》

功效 根、茎:清热解暑,敛“黄水”。用于腹泻,眼



红肿,热性病,“黄水”病,疮疖。

#### 7019133

*Mahonia longibracteata* Takeda

植物名 长苞十大功劳《云南种录》

地方名 云南:牛肋巴刺(禄劝),大黄连(嵩明),小黄柏。

功效 根、茎、皮:清湿热,解毒。

#### 7019134

*Mahonia mairei* Takeda

植物名 滇刺黄柏《汇编》

药材名 十大功劳《云南药录》

文献名 大黄连《云南种录》

地方名 广西:茱红连(那坡);云南:牛肋巴刺(禄劝),刺黄柏、鸡脚黄连(玉溪)。

功效 根、茎:用于痢疾,肝炎,感冒,咳嗽,目赤肿痛,肺炎,烧、烫伤。

#### 7019135

*Mahonia napaulensis* DC.

植物名 尼泊尔十大功劳《西藏植志》

功效 茎、根:清热解毒。用于痢疾。

#### 7019136

*Mahonia oiwakensis* Hayata

植物名 追分十大功劳《台湾药植志》

功效 根、茎:清湿热,解毒。

#### 7019137

*Mahonia polyodonta* Fedde

植物名 多齿十大功劳《湖北植志》

药材名 多齿十大功劳《神农架药录》

地方名 湖北:刺黄连树(神农架)。

功效 根:清热解毒,泻火除湿。

#### 7019138

*Mahonia retinervis* Hsiao et Y. S. Wang

植物名 网脉十大功劳《植分学报》

地方名 广西:木黄连(马山)。

功效 全株:清湿热。

#### 7019139

*Mahonia shenii* Chun

植物名 无刺十大功劳《新华本草纲要》

药材名 广西十大功劳《汇编》

文献名 席氏十大功劳《广西中药志》,北江十大功劳《广西植志》,沈氏十大功劳《广西药录》,光叶十大功劳《广西本草选编》,十大功劳、刺黄柏、土黄柏、黄柏刺《鉴别手册》

地方名 木黄连、土黄连(广东、广西);广东:[黄藤](惠阳);广西:黄连刺(大瑶山),[黄柏](平南),[黄连](平南、龙州),大黄连(大苗山)。

功效 根、茎:清心胃火,解毒。用于阳黄,热痢,赤眼,急性胃肠炎,泌尿系感染。外用于枪伤,烫、火伤。

#### 7019140

*Mahonia sheridaniana* Schneid.

植物名 长阳十大功劳《湖北植志》

药材名 刺黄连《神农架中草药》

地方名 湖北:老鼠刺,刺黄芩,刺黄柏。

功效 根、茎:清热,泻火,明目。用于肠炎,痢疾,流感,目赤肿痛,黄疸型肝炎,湿疹,疮毒,烧、烫伤。

#### 7019141

*Mahonia subimbricata* Chun et F. Chun

植物名 半覆瓦十大功劳《广西植志》

地方名 土黄连(江西、广西);江西:木黄连;广西:[黄连](陆川),皇天照,散血丹(天等),小功劳(那坡)。

功效 根、茎:清心胃火,解毒。

#### 7019142

*Mahonia taronensis* Hand.-Mazz.

植物名 独龙十大功劳《云南种录》

地方名 广西:木黄连(马山),上黄连,长叶山黄连(忻城)。

功效 根:清心胃火,解毒。

#### 7019143

*Nandina domestica* Thunb.

植物名 南天竹《高植图鉴》

药材名 南天竹《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 南天烛、江州南烛《图经》,阑天竹《群芳谱》,杨桐、红杷子《纲目拾遗》,天烛子《三奇方》,大椿《花镜》,南竹叶《百花镜》,南天实(小泉《药植》),天竹子、文实《药材学》,小铁树《广西中药志》,蓝目竹、拦天竹、南天竺、木椿《中草药通讯》

地方名 山黄芩(湖南、广东),山黄连(广西、四川) 钻石黄(上海、四川),[鸡爪黄连](湖南、广西),天竹、天竹子(陕西、浙江),南竹子(江苏、浙江),天竹叶(上海、浙江);江苏:南竺子(南通、云台山、震泽),天竺果,天竹果,黄天竹子;上海:白天南,白南天;浙江:红枸杞;江西:土黄柏(泰和),金姚散(萍乡);福建:观音竹、白天竹(福州、永安),天竹仔(福清、福鼎、厦门、莆田),天南爆天竹(光泽),南天竹根,南方竹、闽山竹(闽东),老竹黄;湖南:老鼠刺(凤凰),珍珠盖凉伞(靖县),生黄芩(衡南),南竹根(长沙),[黄芩];广西:[土黄连](北流、玉林、贵县、柳江)[黄连](柳江),木黄连(贵县、桂平),细叶山黄连(忻城),三叶黄连(田阳),土甘草(临桂),万寿竹;四川:刺黄连(万县),花香竹,山莲;贵州:猫儿伞,斑鸠窝,岩黄连,南烛子。

功效 根、茎:清热除湿,通经活络。用于感冒发热,眼结膜炎,肺热咳嗽,湿热黄疸,急性胃肠炎,尿路感染,跌打损伤;果:有小毒。止咳平喘。用于咳嗽哮喘,百日咳;叶:用于感冒,百日咳,目赤肿痛,瘰疬,血尿,小儿疳积。

#### 7019144

*Sinopodophyllum emodi* (Wall.) Ying --- *Podophyllum*

*emodi* Wall. ex Royle --- *Podophyllum emodi* Wall. var.

*chinensis* Sprague --- *Dysosma delavayi* (Franch.) Hu ---

*Sinopodophyllum hexandrum* (Royle) Ying

植物名 桃儿七《植分学报》

药材名 桃儿七(陕西太白)、《中药志》

文献名 印度普达非伦(李《生药》),西藏鬼臼《高植

图鉴》,印鬼臼《中草药通讯》,鬼臼果《青海中草》,藏鬼臼《药典》,足叶草、华鬼臼、竹叶草《药学学报》

地方名 鸡素苔(陕西、甘肃);陕西:铜筷子、桃耳七(太白);甘肃:羊蒿瓜(卓尼),果果肚,蒿果,(龙胆),七龙胆(宕昌、岷县);青海:蒿瓜,荷瓜,圈瓜,“奥毛赛”(藏语);湖北:鬼打死(罗田);四川:八月瓜(阿坝),墨地,“睬甲洼”(若尔盖藏语);西藏:小叶莲,“奥莫色”、“奥勒莫色罗玛琼瓦”(藏语),鹅木塞。

功效 果实:有小毒。调经活血。用于血瘀经闭,难产,死胎,胎前不下;根、根茎:祛风湿,止咳止痛,活血解毒。用于风湿关节痛,跌打损伤,心胃痛,风寒咳嗽,月经不调。

## 7021 木通科 Lardizabalaceae

### 7021001

*Akebia longeracemosa* Matsum.

植物名 长序木通《高植图鉴》

地方名 台湾:通草。

功效 木质茎:利尿,镇痛。

### 7021002

*Akebia quinata* (Thunb.) Decne.

植物名 木通《高植图鉴》

药材名 木通〔茎藤〕《食性本草》,预知子〔果实〕《药典》

文献名 通草、附支《本经》,丁翁《吴普本草》,丁父《广雅》,藟藤《本草经集注》,万年藤《药性论》,燕覆、乌桕《唐本草》,燕藟子《食疗本草》,畜藟子、拿子《本草拾遗》,桴椌子《食性本草》,覆子、仙沼子《日华子本草》,野木瓜《救荒本草》,木通子《本草汇言》,八月瓜《分类草药性》,八月扎《饮片新参》,压惊子《医林纂要》,八月槿、藟藤茎、木葛藤《植物名汇》,倚商、出样珊瑚《新纲》,羊开口、玉支子《中药志》,八月果、五叶木通《汇编》,活血藤《中草药学》

地方名 八月炸(江苏、湖南);山东:裂瓜蔓子(烟台),山地瓜(昆崙山),山黄瓜(崂山),五叶茶(荣成);江苏:[海风藤](云台山),八月炸藤(盱眙),八月瓜藤(江宁),黄狗卵子、野香蕉(苏州),野茄子,痲子颈藤(吴县);浙江:八月公公、狗面(长兴),小木通(德清),小叶五叶拿(龙泉),落霜红(杭州),冷饭包(嵊县),八月子(宁波),吊朴藤(天台、临海、仙居),五叶花(乐清),五叶水沟绳(丽水),七囊(温州),沙藤、〔拿藤〕(昌化、潜阳),切泡(临安),山瓜、山瓜藤(黄岩),刀阔藤(临海);安徽:裂卵果,八月槿,牛卵袋,拉拉果,野毛蛋;江西:牛卵子(吉水、南丰);湖南:腊瓜;广西:抓风药(金秀);四川:木通果,百日瓜,牵藤瓜,〔牛母瓜〕,石瓜(成都)。

功效 藤茎、根(木通):清热利尿,通经活络,镇痛,排脓,通乳;果实(预知子):舒肝理气,活血止痛,利尿,杀虫。用于脘肋胀痛,经闭痛经,小便不利,蛇虫咬伤。

### 7021003

*Akebia quinata* Decne. var. *polyphylla* Nakai

植物名 多叶木通《秦岭植志》

功效 藤茎:泻火,利尿,下乳,通淋;果实:用于腰痛,外用子蛇虫咬伤。

### 7021004

*Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz.

植物名 三叶木通《高植图鉴》

药材名 三叶木通《汇编》,预知子《药典》

文献名 野木通《救荒本草》,木通子《本草汇言》,八月瓜《分类草药性》,八月扎《饮片新参》,压惊子《医林纂要》,藟藤茎、木葛藤《植物名汇》,八月炸《华北经济志要》

地方名 八月炸(浙江、甘肃),八月瓜藤(山西、江苏、广东),八月槿(山西、江苏、湖北、广东),羊开口、哪瓜、木王瓜(江西、湖南),野毛蛋(江西、安徽),〔拿藤〕(浙江、江西);陕西:牛皮瓜;江苏:活血藤,甜果木通;浙江:大木通(德清),瓜藤、三叶瓜藤(仙居),三叶耕绳(丽水),三叶拿绳,三叶拿、花木通(龙泉),九节风藤(温州),狗骨柴(乐清);安徽:三叶络藤,落藤,罗藤,〔南藤〕;江西:牛卵子(南昌、景德、德兴),椰子,黄狗肾,黄蜡骨藤,炸瓜,猪腰子,小木通,拉道藤(安福),爆肚拿,三叶拿藤(德兴);湖南:八月哪,八月九;广西:三叶藤(全州);四川:九重根(万县),〔海风藤〕(成都)。

功效 藤茎、根(木通):清热利尿,通经活络,镇痛,排脓,通乳;果实(预知子):舒肝理气,活血止痛,利尿,杀虫。用于脘肋胀痛,经闭痛经,小便不利,蛇虫咬伤。

### 7021005

*Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. var. *australis* (Diels) Rehd.

植物名 白木通《高植图鉴》

药材名 白木通《汇编》,预知子《药典》

文献名 野木瓜《救荒本草》,木通子《本草汇言》,八月瓜《分类草药性》,八月扎《饮片新参》,压惊子《医林纂要》,三叶孛藤《名实图考》

地方名 三叶木通(湖北、湖南、四川、云南、安徽),八月瓜藤(四川、广西、安徽),牛卵子(江西、广西),八月炸(安徽、湖南);陕西:拉道藤(宝鸡),老驴蛋;江苏:活血藤;河南:杵瓜藤;湖北:八月槿,小八月槿(建始),小八月瓜,广血藤;湖南:狗腰藤、狗榔(衡阳),羊开口、八月拿、狗腰子(衡山),哪瓜、黄狗肾、杨扎藤、黄蜡骨藤、水王瓜、炸瓜、猪腰子(常德),木王瓜、木老瓜(黔阳);广西:甜果木通(凌云),地海参,狗卵藤磅,三叶藤(资源、全州);四川:[海风藤](成都),八月藤,百日瓜,百日瓜藤,百日红,八月瓜根、〔巴戟〕、〔土巴戟〕(重庆);贵州:牛广瓜(贵阳、清镇、平坝);云南:[青木香](玉溪),青防己(新平),六角槿(腾冲),羊腰子果(文山),小木通。

功效 藤茎、根(木通):清热利尿,通经活络,镇痛,排脓,通乳;果实(预知子):舒肝理气,活血止痛,利尿,杀虫。用于脘肋胀痛,经闭痛经,小便不利,蛇虫咬伤。

### 7021006

*Decaisnea fargesii* Franch.

植物名 猫儿屎《高植图鉴》

药材名 猫屎瓜《华北经植志要》

文献名 石瓜《品汇精要》,矮杞树(狄尔士《中国植录》),猫儿子《经植手册》

地方名 鬼指头(甘肃、陕西),鸡肠子(四川、云南);陕西:猫屎筒(石泉);湖北:猫屎岗,小苦糖,猫屎枫(建始);四川:猫瓜,拉抱,鬼指梅,岩漆树(南川),八月瓜;贵州:“都哥杆”(雷公山苗名),水冬瓜;云南:羊角立(漾濞),羊角子(丽江),齿果(会泽),粘连子、老乌吃(嵩明),猫屎包(凤庆)。

功效 根、果实:清肺止咳,祛风除湿。用于肺结核咳嗽,风湿关节痛,阴痒。外用于肛门周围糜烂。

#### 7021007

*Holboellia angustifolia* Wall.

植物名 狭叶牛姆瓜《汇编》

药材名 狭叶八月瓜《中药志》

文献名 八瓜龙、橙藤《植物名汇》,牛姆瓜《树分》

地方名 四川:八月瓜《峨眉山》,小八月瓜,八月扎,木通。

功效 藤茎及成熟果实:利湿,通乳,解毒,止痛。

#### 7021008

*Holboellia coriacea* Diels

植物名 鹰爪枫《高植图鉴》

药材名 鹰爪八月瓜(拟)

地方名 八月扎(浙江、上海、江苏、安徽),预知子(上海、江苏、安徽);浙江:木通,大叶青藤、牛卵泡(临安),大叶耕绳(丽水),山瓜藤(临海);湖北:破骨风(巴东);贵州:乌龙大救驾(独山);云南:牛千斤、八月瓜、革质八月瓜(丽江),大五爪金龙(昆明)。

功效 根、果:祛风活血。用于风湿筋骨痛;茎:用于跌打损伤。

#### 7021009

*Holboellia fargesii* Reaub.

植物名 五风藤《高植图鉴补编》

药材名 五风藤八月瓜(拟)

文献名 五月瓜藤《经植手册》,五叶瓜藤、野人瓜、紫花牛姆瓜《高植图鉴》

地方名 八月瓜、预知子、腊藤(湖北、云南);湖北:七月腊(鹤峰),七月瓜(恩施),野梅、豆子(巴东),破棉絮,八月楂,九月黄子、七叶藤、药实藤(神农架);广西:狗板藤(全州);四川:木节草(南江);贵州:假荔枝,小八瓜,云南:八月果(禄劝),黄蜡白果藤(昭通),蜡支(维西)。

功效 藤茎及成熟果实:利湿,通乳,解毒,止痛。

#### 7021010

*Holboellia grandiflora* Reaub.

植物名 牛姆瓜《高植图鉴》

药材名 牛姆瓜《高植图鉴》

文献名 大花牛姆瓜《经植手册》

地方名 贵州:六月瓜。

功效 果实:舒肝理气,活血止痛,利尿杀虫。

#### 7021011

*Holboellia latifolia* Wall.

植物名 八月瓜《高植图鉴补编》

文献名 五月藤《植物名汇》,五风藤《高植图鉴》

地方名 八月扎(云南、西藏);云南:阔叶八月瓜、大木通、三叶木通(红河),宽叶牛姆瓜,三叶莲、五爪龙(文山),刺藤果(景东),南木香(楚雄),牛腰子果,牛懒袋果(双柏);西藏:预知子,“巴月郭”(藏语)。

功效 藤茎及成熟果实:利湿,通乳,解毒,止痛。

#### 7021012

*Holboellia parviflora* (Hemsl.) Gagnep.

植物名 小花八月瓜《高植图鉴补编》

文献名 八月瓜《云南中草药》,小花鹰爪枫《云南种录》

地方名 云南:三叶莲(文山),〔南木香〕(楚雄),大木通、牛腰子果(红河)。

功效 根:利湿通络。用于急性肾炎,尿路感染,尿潴留,水肿,口舌发炎,乳汁不通,胃痛,风湿骨痛,跌打损伤,骨折;果:纳气止痛。用于疝气痛,子宫脱垂,睾丸炎。

#### 7021013

*Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. --- *Holboellia cuneata* Oliv.

植物名 大血藤《高植图鉴》

药材名 大血藤(罗思举《简易草药》)、《药典》

文献名 血藤《图经》,红皮藤《任城日记》,〔千年健〕,见血飞、〔血竭〕(罗思举《简易草药》),大活血《名实图考》,红藤《药典》

地方名 牛麻藤(湖北、四川),五花血藤(四川、贵州),血通(四川、陕西),血灌肠(江西、湖南),山红藤(浙江、河南、广东、云南),活血藤(陕西、江苏、安徽、江西、福建、河南、湖南、广西),鸡血藤(北京、东北、华北、陕西、山东、江西、福建、湖北、四川),红血藤(浙江、湖北),花血藤(湖南、四川、贵州),赤沙藤(江苏、浙江),八卦藤(浙江、福建);陕西:过山龙,五花七(洋县、周至),五花血通(略阳),大血通,花木通;江苏:沙藤;浙江:〔海风藤〕,黄省藤(温州、遂昌、云和、丽水、青田、龙泉),黄爽藤(泰顺),黄菊花心(临海),黄香绳,黄散藤,卦藤,黄藤,白藤(嵊县),红菊花心(温州、临海),红心血藤、红槟榔(乐清),鱼藤(天台),安徽:碗藤,血管藤(太和);江西:大活血藤(庐山),风藤(萍乡);福建:黄梗藤、黄鸡藤、血陈根、红牛鼻陈(闽东);湖北:红木通(罗田),牛麻(建始);湖南:穿尖龙(古丈),半血莲(郴县),过血藤(宜章),省藤、大血(凤凰),缚藤(衡山);广东:血风藤(韶关),老婆藤(仁化);广西:藏心藤,槟榔钻,梅藤(富川),半绷藤(陆川),金锁石(柳江),大红藤;四川:血木通(成都、长寿、北碚、蓬溪),钻地风(重庆),放光藤(峨眉),化血丹(巴县),老鸦棉藤;贵州:大活藤,五香血藤,“阿格收”(苗语);云南:小红藤(景东)。

功效 藤茎:清热解毒,活血,祛风。用于肠痈腹痛,经闭痛经,风湿痹痛,跌扑肿痛。

备考 《名实图考》载大血藤为本种,但所引《简易草药》云“大血藤即千年健”,故后人常将千年健(*Homalomena occulta* (Lour.) Schott)误名为“大血藤”,两者不应混用,宜注意鉴别。

## 7021014

*Sinofranchetia chinensis* (Franch.) Hemsl.

植物名 串果藤《高植图鉴》

药材名 串果藤《药植简编》

地方名 陕西:木通;湖北:三叶淮通、淮木通(神农架);四川:红藤。

功效 藤茎:清热利尿,通经活络。

## 7021015

*Stauntonia alata* Merr.

植物名 大酸藤《广西植录》

药材名 大酸藤《广西中药志》

地方名 广西:四方藤(大瑶山)。

功效 藤茎:祛风。

## 7021016

*Stauntonia brachyanthera* Hand.-Mazz.

植物名 黄蜡果《高植图鉴补编》

药材名 短穗七叶莲(拟)

文献名 短药野木瓜《广西植录》,短穗野木瓜、七叶莲《中草药通讯》

地方名 广西:萝卜藤(全州),蒙姑芦(融水)。

功效 藤、叶:用于外感风寒,头痛胸闷,吐泻腹胀;果实:用于小便不利,肾下垂。

## 7021017

*Stauntonia cavaleriana* Gagnep.

植物名 西南野木瓜《高植图鉴补编》

药材名 六月瓜《汇编》

地方名 广西:九叶木通(临桂);云南:野木瓜、使藤子(红河)。

功效 根、藤、果:调气补虚,止痛,止痢。用于风湿骨痛,劳伤咳嗽,肾虚腰痛,小便不利,疝气痛,痢疾。

## 7021018

*Stauntonia chinensis* DC.

植物名 木通七叶莲《汇编》

药材名 七叶莲《高植图鉴补编》

文献名 五爪金龙《名实图考》,假荔枝《中国经植志》,野木瓜《高植图鉴》

地方名 沙藤(浙江、湖南);浙江:拿绳,拿藤(江水、云和、泰顺),牛卵子,牛娘头刺(余姚),大耕绳(云和),五月拿藤(龙泉、遂昌);江西:八月挪、八月楂、七叶挪(庐山),乌藤(丰城),挪包(寻乌);福建:拉藤(连城、长汀、建宁、闽侯);广西:牛藤、红鸭脚、糯藤(梧州);贵州:八月瓜(湄潭),七叶木通;其他:绕绕藤。

功效 根、全株:祛风止痛,舒筋活络,利尿消肿。用于风湿性关节炎,跌打损伤,各种神经性疼痛,水肿,小便不利,月经不调。

## 7021019

*Stauntonia glauca* Merr. et Metc.

植物名 粉叶野木瓜《高植图鉴补编》

文献名 白背野木瓜《药植简编》

功效 全株:用于风湿骨痛,跌打损伤,胃及十二指肠溃疡,急性胃炎等。

## 7021020

*Stauntonia hexaphylla* (Thunb.) Decne.

植物名 那藤《广西本草选编》

药材名 牛藤《汇编》

文献名 简子《救荒本草》,野人瓜《经植手册》,野木瓜《国药的药理学》,土牛藤、鸭脚莲《药植简编》,六叶野木瓜《台湾药植志》,七姐妹藤《广西植录》,糯藤《中草药通讯》

地方名 台湾:郁子。

功效 藤茎:止痛,利尿,清热利湿,解毒。用于风湿关节痛,手术后疼痛。

## 7021021

*Stauntonia hexaphylla* (Thunb.) Decne. f. *intermedia* Wu

植物名 五指那藤《高植图鉴补编》

药材名 那藤七叶莲(拟)

地方名 广西:七叶莲(全州、贺县),那藤、牛藤(梧州)。

功效 茎、叶:祛风止痛,舒筋活络。用于风湿骨痛,跌打损伤;果实:用于疝气。

## 7021022

*Stauntonia hexaphylla* (Thunb.) Decne. var. *urophylla* (Hand.-Mazz.) Wu

植物名 尾叶那藤《高植图鉴补编》

药材名 尾叶七叶莲(拟)

文献名 木通七叶莲《汇编》,尾叶野木瓜《药植简编》,尾叶假荔枝《中药大辞典》,野木瓜《中草药通讯》

地方名 广东:七叶莲,鸭脚莲,七叶藤。

功效 根、全株:散瘀止痛,利尿消肿。用于风湿性关节炎,跌打损伤,各种神经性疼痛,水肿,小便不利,月经不调。

## 7021023

*Stauntonia maculata* Merr.

植物名 斑叶野木瓜《高植图鉴》

功效 全株:用于风湿骨痛,跌打损伤,胃及十二指肠溃疡,急性胃炎等。

## 7023 防己科 Menispermaceae

## 7023001

*Arcangelisia gushanlung* H. S. Lo

植物名 古山龙《高植图鉴补编》

药材名 古山龙《汇编》

文献名 [雷公藤]《中草药》,“何更梅”(瑶族名)《民族药志》

地方名 黄藤、黄连藤(海南、云南);海南:黄肚木通,黄胆榄,“黄丁课”(崖县黎语);云南:大黃藤(红河)。

功效 藤茎:清热泻火,解毒。用于热盛心烦,肠炎,细菌性痢疾。外用于眼结膜炎,疔肿;根皮、茎皮:

用于疟疾。

备 考 有的文献曾将学名误订为 *A. loureiri* (Pierre) Diels

#### 7023002

*Aspidocarya uvifera* Hook. f. et Thoms.

植物名 球果藤《高植图鉴补编》

地方名 贵州:土防己(毕节),青藤、淮通(遵义)。

功 效 根:调理气血,通淋利水。用于风湿疼痛,劳伤疼痛,水肿。

#### 7023003

*Cissampelos pareira* L. var. *hirsuta* (Buch. ex DC.) Forman

植物名 锡生藤《高植图鉴补编》

药材名 亚乎奴《药典》

文献名 金丝荷叶《中草药学》,傣肌松〔提取物〕《药典》

地方名 云南:鼠耳草,“亚呼噜”、“亚红龙”、“雅红隆”、“牙昏噜”(思茅傣语)。

功 效 全株:消肿止痛,止血,生肌。用于外伤肿痛,创伤出血;傣肌松(亚乎奴碱的碘甲烷盐):横纹肌松弛药。用于外乎手术中使横纹肌松弛。

#### 7023004

*Cocculus laurifolius* DC.

植物名 樟叶木防己《高植图鉴》

药材名 衡州乌药《图经》、《中药大辞典》

文献名 矮脚樟《物理小识》,研药、房花、台麻《新纲》,苦三七《药植简编》

地方名 海南:乌药;广西:〔木防己〕(乐业),十八症、牛十八(来宾),怀十八、九皮英(忻城),托食茶、消食树(融安),山桂枝(昭平);贵州:小青藤,马哥罗。

功 效 根或全株:顺气,解郁,温中,止痛。用于高血压,头痛,疝气,腹痛,风湿腿痛。

#### 7023005

*Cocculus orbiculatus* (L.) DC. --- *Menispermum trilobum* (Thunb.) DC. --- *Cocculus trilobus* (Thunb.) DC. --- *C. sarmentosus* (Lour.) Diels --- *C. sarmentosus* (Lour.) Diels var. *pauciflorus* Y. C. Wu

植物名 木防己《云南植志》

药材名 木防己《药性论》、《汇编》

文献名 青藤香《阳春县志》,鼓儿藤《树分》,毛木防己《广州植志》,〔巴戟〕《四川野生经植志》,匍茎木防己、少花匍茎木防己《植分学报》,日本木防己《拉汉英种称》

地方名 青藤(陕西、浙江、江西、福建、湖南、广西、四川、贵州),青藤根(江苏、湖南、广东、云南),〔清风藤〕(四川、河南),小青藤(江苏、浙江、江西、湖南、湖北、贵州、云南),青木香(台湾、河南、湖南、四川),土木香(江苏、浙江、江西),土防己(陕西、浙江、江西、福建、湖南、广东),金锁匙、银锁匙(广东、广西),百蛇基、乌龙(江西、湖南),老鼠藤、风藤(福建、湖南),钻骨龙(江西、广东),〔铁牛入石〕(福建、台湾);陕西:白藤(宁陕),黑皮土射、步蛇、百蛇(宝鸡),青葛根;山东:小葛子(莒南),小金葛(烟台、荣成),海葛子(崂山),山葛子

(青岛),狗条子(苍山),狗葛子;江苏:小葛藤、难尿个子(南京),葛条(徐州),铜丝柯(宜兴);浙江:牛木香(昌化),苦藤(建德、缙云、丽水、云和),白木香(杭州、金华、兰溪、衢县、义乌),瞢鼓藤、白金丝蛇、大阳藤(温州),棉丝藤、棉纱藤(乐清),野防己、枫藤(平阳),黑木香(嵊县、天台),蛤蟆藤(常山、衢县、遂昌),占皮藤(肯田),野番薯(江山),金丝吊蛤蟆(开化),羊鼓藤(义乌),大股藤(东阳),田鸡藤(浦江),青绳儿;安徽:籐箩藤、水膏药、糯米藤、野鸡钮藤(滁县);江西:〔巡骨风〕(铜鼓),黑皮青木香,地盘龙、〔淮通〕(庐山);福建:猛虎阵(福安),青藤仔(周宁、宁德、南平、泉州、松溪等),千斤坠(福州、古田、厦门),圆藤根(福清),倒地铃(诏安),〔穿山龙〕(清流、宁化),蒿秋藤(霞浦),鼓仔藤,斗笠藤,吊钩藤,山藤,老鼠耳藤,铁线草,丝线吊葫芦,蔓鼓藤;台湾:白山番薯,牛入石,〔板南根〕;河南:滇防己;湖南:八卦根,藤苦参,蛇毒消,黄蜡藤,惊风藤,盘古风,过山龙,股藤,小股藤,家同藤,〔穿山甲〕,夜牵牛,野牵牛,毛风藤,石板藤,〔山豆根〕,牛串子;广东:金石榄(湛江、罗定),甘榄(新会、台山),紫背金锁匙,百解薯,凤凰肠(惠阳);海南:山番薯;四川:青檀香,追风散(西昌),〔土巴戟〕,〔巴戟天〕,〔轮环藤〕(根);贵州:大风藤(贵阳),杀毒(绥阳),追风伞(兴义);云南:小飘根(昭通),小暗消(红河),小接骨丹(昆明),细毛藤(玉溪),臭藤子、〔黄藤〕(西畴)。

功 效 根:祛风止痛,利尿消肿,解毒,降血压。用于风湿关节痛,肋间神经痛,急性肾炎,尿路感染,高血压病,风湿性心脏病,水肿。外用于毒蛇咬伤;茎、叶:祛风,除湿,消肿。用于诸风麻痹,痰湿流注,脚膝痠痒,胃痛,痧气痛。

#### 7023006

*Cocculus orbiculatus* (L.) DC. var. *mollis* (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara --- *C. mollis* Wall. ex Hook. f. et Thoms. --- *C. lenissimus* Gagnep. --- *C. mokiangensis* Lien

植物名 毛木防己《云南植志》

药材名 毛木防己(广东、广西)

文献名 密毛木防己、墨江木防己《植分学报》

地方名 金锁匙、金石榄(广东、广西);贵州:马哥罗(兴仁),小一支箭(铜仁),小青藤、透骨丹(贵阳),木防己,青藤;云南:防己(昆明)。

功 效 根、茎:用于风湿骨痛,水肿,痈疮肿毒。

#### 7023007

*Cyclea barbata* (Wall.) Miers

植物名 毛叶轮环藤《高植图鉴补编》

药材名 银不换(海南)、《中药大辞典》

地方名 广东:毛簕箕藤、藤救主、金锁匙(阳春),大叶金锁匙,山豆根;海南:散血丹,九条牛,猪肠换;广西:有毛箕箕藤,银锁匙,金线风。

功 效 根、茎:清热解毒,利湿通淋,散瘀止痛。用于热感冒,咽喉疼痛,痢疾,砂淋,跌打损伤。

#### 7023008

*Cyclea densiflora* (Yamamoto) Y. C. Tang et H. S. Lo ---

*C. gracillima* Diels

植物名 密花轮环藤《高植图鉴补编》

文献名 纤细轮环藤《广西植物》

功效 根：用于风热感冒，咽喉炎，湿热泄泻，尿道炎，牙痛，跌打损伤。

## 7023009

*Cyclea hypoglaucula* (Schauer) Diels --- *C. migoana* Yamamoto

植物名 粉叶轮环藤《云南植志》

药材名 金线风《广东、广西》、《汇编》

文献名 粉背轮环藤《汇编》，福建轮环藤《药理学报》

地方名 百解藤《广东、广西、湖南》，金锁匙、银锁匙、青藤仔、〔山豆根〕、假山豆根、有毛粪箕笃《广东、广西》；广东：走马游城（南雄、乳源），黑皮蛇（台山、开平），龙乌吉（徐闻、海康、廉江、遂溪），百解；海南：金不换（澄迈、琼海），蛤仔藤（临高、澄迈）；广西：寄山龙（桂林），廿四风藤（玉林），山苦参（藤县），铲箕藤（平南），〔黄药〕（贺县），五马巡城（昭平），〔满天星〕（龙州），小防己（武鸣），〔升麻〕（柳江），槟榔花、单鞭救主（北流、陆川、博白、邕宁），凉粉藤（岑溪），拷津藤（大新），豆腐藤（容县），〔苦参〕（蒙山、昭平），〔独脚乌柏〕，粪箕藤，粪箕笃，清凉棚（罗城）。

功效 根、茎：镇痛，镇静，有肌松作用。用于咽喉肿痛，咳嗽，风火牙痛，毒蛇咬伤，高血压病。

## 7023010

*Cyclea insularis* (Makino) Hatusima

植物名 海岛轮环藤《高植图鉴补编》

功效 根：用于风湿病。

## 7023011

*Cyclea polypetala* Dunn --- *C. hainanensis* Merr.

植物名 铁藤《高植图鉴补编》

药材名 轮环藤《汇编》

文献名 海南轮环藤《海南植志》，离瓣轮环藤《湖北植志》，多瓣轮环藤《拉汉英种称》

地方名 广西：裸叶黑（龙州）；云南：百解藤、须龙藤、牵藤暗消（红河）。

功效 根、叶：清热解毒，利尿止痛。用于咽喉炎，白喉，尿路感染，尿路结石，牙痛，胃痛，风湿骨痛。外用于痈疮，无名肿毒，毒蛇咬伤。

## 7023012

*Cyclea racemosa* Oliv.

植物名 轮环藤《高植图鉴》

药材名 轮环藤《中药志》

文献名 小青藤香《贵州民间药物》

地方名 青藤（四川、贵州），良藤（云南、广东），滚天龙（贵州、广东），〔山豆根〕，（广东、四川）；陕西：白解藤；湖北：青藤香（利川），棉青藤；四川：大蛇参（峨眉山），毛青藤；贵州：青藤细辛（贵阳），〔淮通〕。

功效 根：有小毒。理气，止痛。用于急性胃肠炎，中脘腹痛，风湿疼痛，蛇咬伤。

## 7023013

*Cyclea sutchuenensis* Gagnep.

植物名 四川轮环藤《高植图鉴补编》

文献名 尖尾轮环藤《药植简编》

地方名 广西：光叶金锁匙；贵州：〔隔山消〕。

功效 根、茎：用于腹痛。

## 7023014

*Cyclea tonkinensis* Gagnep.

植物名 小花轮环藤《云南植志》

文献名 越南轮环藤《植分学报》，南轮环藤《高植图鉴补编》

地方名 金线风、银锁匙《广东、广西》；广西：槟榔花（罗城）；云南：〔青藤〕（河口）。

功效 根、茎：用于风湿骨痛，咽喉肿痛。

## 7023015

*Cyclea watii* Diels

植物名 西南轮环藤《高植图鉴补编》

药材名 西南轮环藤《贵州药录》

功效 根：解毒散寒，理气止痛。用于风寒湿痹，消化不良，腹泻，毒蛇咬伤。

## 7023016

*Diploclisia affinis* (Oliv.) Dueks --- *Diploclisia chinensis* auct. non Merr.

植物名 秤钩风《高植图鉴》

药材名 秤钩风《名实图考》、《中药志》

文献名 花秤钩风《药植简编》，中华秤钩风《湖北植志》

地方名 青风藤（浙江、湖南、湖北、陕西），防己（湖南、广西）；湖南：湘防己，过山龙，追骨风，穿山藤，土防己；广西：花防己，电藤，散血藤尖；贵州：追风伞。

功效 根及老茎：祛风湿，活血，利尿。用于风湿关节痛，跌扑损伤，小便不利。

备考 有些文献曾将学名误订为 *D. chinensis* Merr.

## 7023017

*Diploclisia glaucescens* (Bl.) Diels

植物名 苍白秤钩风《高植图鉴》

药材名 苍白秤钩风《汇编》

文献名 苍白粉绿秤钩风《广西植录》

地方名 湖南：过山龙；广东：土防己；海南：蛇总管；广西：茎花防己，九层皮（博白），穿墙风（玉林），黄鳍藤，〔防己〕。

功效 藤茎：清热解毒，祛风除湿。用于风湿骨痛，尿路感染，毒蛇咬伤；叶：用于梅毒，胆囊炎，淋病。

## 7023018

*Fibraurea recisa* Pierre --- *Fibraurea tinctoria* auct. non Lour.

植物名 藤黄连《汇编》

药材名 藤黄连《四川中药志》

文献名 〔黄藤〕《纲目》，黄连藤《中国药植图鉴》，〔雷公藤〕《中草药》，刺黄连《中药志》，〔天仙藤〕《高植图鉴补编》

地方名 假黄藤、〔山大黄〕《广东、广西》，大黄藤《广

西、云南);广西:[土黄连](南宁),黄大沙,[神筋藤](德保),[接骨木](那坡),山大王(博白);云南:"汪当"(瑶语),"满格朗"(苗语)。

**功效** 根、茎、叶:有小毒。清热解毒,利湿。用于预防流行性脑脊髓膜炎,发热头痛,急性扁桃体炎,咽喉炎,眼结膜炎,急性胃肠炎,痢疾,黄疸;根、叶:外用于疮疖,烧、烫伤。

**备考** 有些文献曾将藤黄连的学名误订为 *F. tinctoria* Lour. (该种产印尼、马来西亚、越南等地,我国不产),应予纠正。

#### 7023019

*Hypserpa nitida* Miers

植物名 夜花藤《高植图鉴》

药材名 夜花藤《汇编》

文献名 细红藤《广西植录》, 亮叶夜花藤《云南种录》

地方名 湖北:小青藤(利川);云南:"吼喃浪"(傣语)。

**功效** 全株:凉血止血,利尿消炎。用于咳血,咯血,吐血,便血,外伤出血。

#### 7023020

*Menispermum dahuricum* DC.

植物名 蝙蝠葛《高植图鉴》

药材名 北豆根《药典》

文献名 蝙蝠藤《中草药学》, 北山豆根《秦岭植志》

地方名 山豆根(东北、华北、山东、江苏),黄条香(东北、河北、山西),黄根(四川、辽宁、山西、福建),清风藤(江苏、山东),什子苗(东北),爬山秧子(黑龙江、吉林);黑龙江:大布杉子;吉林:野鸡豆子,狗屎豆,狗葡萄根,磨石豆根,"嘎马得贝衣棍"(朝名);辽宁:光光啞(辽东、辽南),狗葡萄秧(锦县),山地瓜秧(凤城),疯魔藤(抚顺),媳妇尖菜(辽西);北京:黑狗筋,宽框茶,好老婆尖,黄带子,晃晃茶;河北:野豆根、红心草、火炮叶、关东棵秧、黑老婆蔓子根、山豌豆根子、山番苣(保定);内蒙古:"宁巴"(蒙名),"哈日一敖日阳古"(蒙名),山豆秧根,苦豆根;陕西:马串铃(眉县);青海:黄结;山东:小葛香,小葛子(昆崙山、莒南、章丘),杨柳子棵,烟袋窝,烟袋锅子(昌潍),山花子根,光光叶(沂水、淄川、莱芜),光光叶根、金葛子(烟台),光光茶(昆崙山、牙山),青黄藤(昆崙山),疯狗草(崂山),鸭鸡食,聋汉耳朵;江苏:青藤,青风藤(镇江);浙江:小青藤(德清),黄根藤(长兴、桐庐),金百脚(余杭)。

**功效** 根茎:清热解毒,祛风止痛。用于咽喉肿痛,肠炎痢疾,风湿痹痛。

#### 7023021

*Menispermum dahuricum* DC. f. *pilosum* (Schneider) Kitag. --- *M. dahuricum* DC. var. *pilosum* Schneider

植物名 毛蝙蝠葛《东北草本志》

药材名 毛蝙蝠葛《东北药用植物》

**功效** 根茎:清热解毒,利尿消肿,祛风湿,解热镇痛,降低血压,理气化湿,止咳平喘,通便。用于扁桃体

炎,急性咽喉炎,牙龈肿痛,肺热咳嗽,气管炎,哮喘,湿热黄疸,痈疽肿毒,便秘,风湿痹痛,痢疾,肠炎,胃痛腹胀,麻木,水肿,脚气。

#### 7023022

*Pachygone sinica* Diels

植物名 华粉绿藤《高植图鉴补编》

药材名 粉绿藤《广西药录》

地方名 广西:广西粉绿藤。

**功效** 根、茎:祛风除湿,止痛。用于妇女产后风湿骨痛。

#### 7023023

*Pachygone valida* Diels --- *Limnaciopsis valida* (Diels) H. S. Lo

植物名 粉绿藤《高植图鉴补编》

文献名 肾子藤《云南植志》

地方名 云南:疟疾草。

**功效** 根茎:祛风除湿,活血镇痛。用于风湿骨痛。

#### 7023024

*Parabaena sagittata* (Wall.) Miers ex Hook. f. et Thoms.

植物名 连蕊藤《高植图鉴补编》

药材名 连蕊藤《广西药录》

**功效** 叶:通便。用于便秘。

#### 7023025

*Pericampylus glaucus* (Lam.) Merr. --- *Pericampylus incanus* (Colebr.) Miers --- *P. formosanus* Diels --- *P. trinervatus* Yamamoto --- *P. omeiensis* Lien

植物名 细圆藤《广西植物》

药材名 小广藤《汇编》

文献名 峨眉细圆藤、台湾细圆藤《植分学报》,台湾青藤、三脉青藤《台湾药植志》

地方名 蓬莱藤(海南、台湾);广东:蛤仔藤,盐藤;海南:猪菜藤;广西:[山豆根](富川、大瑶山),山箕笃(大瑶山),奋箕公(昭平),大星藤(凌云),拉风藤(梧州),铁锁匙(桂平),铁线藤(大新),银锁匙(龙州),模榔花(南丹),车线藤,青藤(天峨),台湾蛤仔藤;四川:广藤,土藤;贵州:黑风藤;云南:黑风散。

**功效** 全株:通经络,除风湿,镇痉。用于风湿麻木,腰痛,小儿惊风,破伤风,跌打损伤;根:用于肺病,止咳,止血。

#### 7023026

*Pycnarrhena fasciculata* (Miers) Diels

植物名 密花藤《高植图鉴补编》

药材名 密花藤《中草药》

**功效** 根、茎:清热解毒,祛风除湿。

#### 7023027

*Pycnarrhena poilanei* (Gagnep.) Forman

植物名 硬骨藤《高植图鉴补编》

**功效** 根:消肿止痛。

#### 7023028

*Sinomenium acutum* (Thunb.) Rehd. et Wils. --- *Menispermum diversifolium* Miq.

植物名 青藤《纲目》、《药典》

药材名 青风藤《药典》

文献名 清风藤《图经》，寻风藤《纲目》，滇防己《名实图考》，石解、房苑、房慈、载君行《新纲》，防己《四川中药志》，风龙《高植图鉴补编》，日本汉防己（李《药植》）

地方名 木防己（河南、四川），汉防己（江苏、浙江、安徽、江西、河南、贵州、云南），大风藤、大枫藤（湖北、河北），大叶青藤、〔海风藤〕、土木通（江苏、浙江）；陕西：追骨风；浙江：青绳、苦藤（天台），大叶青绳儿；安徽：青木通、五角藤；湖南：过山龙、羊雀木、鼓藤、豆荚藤、白味莲、〔穿山甲〕；四川：家有藤、土藤（武隆），广藤（万源），淮木通（通江）；贵州：大青木香（绥阳、贵阳），大青藤（都匀、罗甸），岩见愁（息烽），排风藤（惠水），淮通（湄潭）；云南：青防己，追风散，百回藤；其他：〔青木香〕，〔土木香〕，吹风散，条防己，黑防己。

功效 藤茎：祛风湿，通经络，利小便。用于风湿痹痛，关节肿胀，麻痺痒。

备考 1. 河南省以本品地上藤茎为木防己，以地下粗根为汉防己。2. 日本药用防己亦为此种。

#### 7023029

*Sinomenium acutum* (Thunb.) Rehd. et Wils. var. *cinereum* Rehd. et Wils.

植物名 毛青藤《药典》

药材名 青风藤《药典》

文献名 滇防己《名实图考》，毛防己《树分》，大防己《种分》，灰毛青藤《云南种录》，汉防己《秦岭植志》

地方名 青藤（陕西、贵州、云南），防己（河南、贵州）；陕西：〔木通〕，大青藤（平利），追骨风、爬地枫（镇坪）；河南：通条；湖北：毛汉防己（神农架）；四川：海风藤；贵州：〔排风藤〕（惠水），〔淮通〕〔茎〕；云南：吹风散，追风散、黑防己（曲靖），育防己。

功效 藤茎：祛风湿，通经络，利小便。用于风湿痹痛，关节肿胀，麻痺痒。

#### 7023030

*Sinomenium omeiense* Fang

植物名 峨眉青藤《中国药植志》

文献名 峨眉防己《药植简编》

地方名 四川：青藤（彭水）。

功效 藤茎：祛风湿，通经络，利小便。

#### 7023031

*Stephania brachyandra* Diels

植物名 白线薯《高植图鉴补编》

药材名 白线薯《药植简编》

文献名 短蕊千金藤《植分学报》

地方名 广西：石琴薯（平南）；贵州：牛滚瓜（水城）；云南：山乌龟，红山乌龟，红藤山乌龟，一滴血（思茅），一点血，黄山乌龟（红河），“波摸硬”、“报别”（傣语）。

功效 块根：清热解毒，止痛消炎。

#### 7023032

*Stephania cepharantha* Hayata ex Yamamoto --- *S. disciflora* Hand. -Mazz.

植物名 金线吊乌龟《名实图考》、《高植图鉴》

药材名 白药子《图经》、《汇编》

文献名 白药《唐本草》，山乌龟《名实图考》，盘花地不容《中国经植志》，头花千金藤《浙江天目药志》，台湾千金藤《台湾药植志》，白药根《简明中医辞典》

地方名 白大药（江西、广西），金线吊葫芦（江西、浙江、福建），山菱薯（广东、广西）；陕西：蟹爬坡、乌龟七（镇坪）；浙江：〔粉防己〕，金丝吊蛤蟆（长兴、仙居、天目山），金线吊田鸡（德清），金线吊鳖（淳安、衢县、东阳、余姚、宁波等），金丝牛、止噤喉（温州、乐清），〔白木香〕（临安、兰溪、常山），〔白首乌〕（临安），白虾蟆（东阳），白药脂（浙南），爬山乌龟（仙居），青藤、〔紫金牛〕（乐清、温州、泰顺），〔木防己〕（龙泉），击击钗（舟山），羞羞钗（奉化），黑木香（嵊县）；江西：〔乌龟〕（南丰、丰城），铁秤砣（吉安），大叶青木香；福建：倒地拱（松溪、政和），风琴何首乌（闽侯）；台湾：玉唉，玉唉葛藤，〔防己〕；湖北：千斤吊乌龟（神农架）；湖南：细三角藤；广东：独脚乌柏（翁源），石蟾蜍，乌龟梢；广西：黄白药（富川），砂堡藤（博白），扣子藤；四川：地乌龟（合川）。

功效 块根：散瘀消肿，止痛。用于痈疽肿毒，腮腺炎，毒蛇咬伤，升高白细胞。

#### 7023033

*Stephania delavayi* Diels --- *S. graciliflora* Yamamoto

植物名 一文钱《高植图鉴补编》

药材名 一文钱《思茅本草》

文献名 纤花千金藤《植分学报》，石蟾蜍《药学报》

地方名 广西：青藤、藤子内消（隆林）；云南：金钱暗消（通海、红河），金丝荷叶、金丝暗消、荷叶暗消、小黑藤、独脚乌柏（思茅、玉溪），藤子暗消、铜钱暗消（红河），铜钱根（思茅），山乌龟，小寒药，金不换。

功效 根：理气止痛，祛风除湿，清热解毒。用于急慢性胃炎，食滞气胀，风湿关节炎，腰痛等。

备考 过去许多文献曾误将 *S. delavayi* Diels 作为地不容之学名，应予纠正。

#### 7023034

*Stephania dicentrifera* H. S. Lo et M. Yang

植物名 荷包地不容《高植图鉴补编》

文献名 山乌龟、荷包地不容《药学报》

功效 块根：清热解毒，散瘀止痛。

#### 7023035

*Stephania dielsiana* Y. C. Wu --- *Stephania sinica* auct. non Diels

植物名 血散薯《高植图鉴补编》

药材名 血散薯《中药志》

文献名 黔桂千金藤《广西植录》

地方名 山乌龟、金不换、独脚乌柏（广东、广西）；广东：一滴血；广西：一点血（金秀），石蟾薯，石琴薯；四川：地乌龟（南川）；云南：地不容（文山）。

功效 块根：清热解毒，散瘀止痛。用于胃痛，神经痛，牙痛，胃肠炎，咽喉炎，上呼吸道感染，跌扑损伤，毒蛇咬伤，痈疮，瘰疬。



备考 过去不少文献常将本品学名误订为 *S. sinica* Diels

## 7023036

*Stephania dolichopoda* Diels

植物名 大叶地不容《云南植志》

药材名 大叶地不容《中药志》

文献名 长柄千金藤、山乌龟《云南种录》。

功效 块根：消肿止痛，镇静。

## 7023037

*Stephania elegans* Hook. f. et Thoms. --- *Stephania subpeltata* auct. non H. S. Lo --- *Stephania sutchensis* auct. non H. S. Lo

植物名 雅丽千金藤《高植图鉴补编》

文献名 雅致千金藤《汇编》，三角叶千金藤《云南种录》

地方名 西藏：防己，千金藤，察隅八勒噶。

功效 根或藤茎：清热解毒，利尿消肿，祛风止痛。

备考 有些文献曾将 *S. subpeltata* H. S. Lo 及 *S. sutchensis* H. S. Lo 误订为本品。

## 7023038

*Stephania epigaea* H. S. Lo --- *Stephania delavayi* auct. non Diels

植物名 地不容《高植图鉴补编》

药材名 地不容《滇南本草》、《汇编》

文献名 地不容《滇南本草》，地芙蓉《名实图考》，乌龟梢、金丝荷叶《滇南本草图谱》

地方名 山乌龟（四川、贵州、云南），金不换（云南、贵州），金线吊乌龟、金线钓乌龟（云南、四川）；四川：小寒药，周身寒，川滇千金藤（西昌），〔蛇莲〕；贵州：〔金钱草〕，金藤（兴义）；云南：地乌龟、抱母鸡、肚拉（昆明），地胆、白地胆（曲靖），一文钱（保山），荷叶暗消、乌龟抱蛋（红河），“波摸硬”（傣名），育山乌龟，土千金藤。

功效 块根：有毒。清热解毒，截疟，镇痛。用于痈疽肿毒，喉闭，疟疾，胃痛。

备考 “地不容”名出《唐本草》，一名解毒子，所指产地在山西，非本种。过去许多文献将本种学名误订为 *S. delavayi* Diels（一文钱）。“地不容”有硕大块根，“一文钱”无块根，可资区别。

## 7023039

*Stephania excentrica* H. S. Lo

植物名 江南地不容《高植图鉴补编》

文献名 山乌龟《药学报》

地方名 广西：夜牵牛（乐业）；贵州：〔青木香〕。

功效 块根：清热解毒，消肿止痛。

## 7023040

*Stephania forsteri* (DC.) A. Gray

植物名 光千金藤《高植图鉴补编》

药材名 光千金藤《广西药录》

功效 根：消肿止痛，排脓。

## 7023041

*Stephania hainanensis* H. S. Lo et Tsoong

植物名 海南地不容《高植图鉴补编》

文献名 山乌龟《中药志》

地方名 海南：金不换。

功效 块根：清热解毒，镇痛。

## 7023042

*Stephania herbacea* Gagnep. --- *Stephania sinica* auct. non Diels

植物名 草质千金藤《高植图鉴》

地方名 湖北：铜罗七（鄂西），乌龟七；四川：乌龟梢，乌龟条。

功效 果：舒筋活血；茎枝：清热消炎；根：清热解毒，消肿止痛。外用于对口疮，烫火伤，外伤等。

备考 有些文献常将 *S. sinica* Diels 的幼株误定为本种。本种无块根，应注意鉴别。

## 7023043

*Stephania bernandifolia* (Willd.) Walp. --- *Stephania sinica* auct. non Diels

植物名 桐叶千金藤《高植图鉴补编》

文献名 毛背千金藤《湖北植志》，南千金藤《云南种录》，〔汝兰〕《四川中药志》

地方名 千金藤（广西、贵州、云南）；广西：青藤（隆林），车线藤，小防己；贵州：青藤香（独山）；云南：“莫吆罕”（西双版纳傣名）。

功效 根、叶：散血解毒，祛风湿，消饱胀。用于风湿，疮疮，中暑，痢疾，腮腺炎，口腔炎。外用于止痛。

备考 本种无块根，有些文献将 *S. sinica* Diels（汝兰，有硕大块根），误订为本种学名，应注意鉴别。

## 7023044

*Stephania intermedia* H. S. Lo

植物名 河谷地不容《云南植志》

药材名 河谷地不容《中草药》

功效 块根：止痛。

## 7023045

*Stephania japonica* (Thunb.) Miers --- *Menispermum japonica* Thunb. --- *Cocculus japonicus* DC. --- *Stephania sinica* auct. non Diels

植物名 千金藤《高植图鉴》

药材名 千金藤《本草拾遗》、《汇编》

文献名 粪箕藤、细三角藤《中国药植志》

地方名 粉防己〔根〕（浙江、福建），小青藤（湖北、江西）；江苏：早蚌埠莲（常熟）；浙江：膏药（乐清），天膏药（长兴、温州、仙居、杭州），朝天膏药（长兴），铁膏药（温州），合板草（鄞县），金瓜子（普陀），白药子（杭州），青藤，〔黄藤〕（杭县）；安徽：水膏药；江西：大叶青木香（吉水、景德），广土木香（吉安、景德），粪箕笃、地膏药（庐山）；福建：铁板膏药，千金坠（罗源），紫宫娥（晋江），香菇藤（泉州、惠安），红猴面藤（莆田、仙游），木防己（南安）；台湾：犁壁藤、犁壁草、鼎低膊（台北），鹤陈，倒吊痲；湖北：小针线包叶（罗田）；湖南：公老鼠藤，野桃草，爆竹消。

功效 根或藤茎：清热解毒，利尿消肿，祛风止痛。用于咽喉肿痛，牙痛，胃痛，水肿，脚气，尿急尿痛，小便不利，外阴湿疹，风湿关节痛。外用于跌打损伤，毒蛇

咬伤, 痈肿疮疖。

备考 本种根圆柱形, 无块根。有些文献误将 *S. sinica* Diels (汝兰, 有巨大块根) 订为本种, 应注意鉴别。

#### 7023046

*Stephania kuingnanensis* H. S. Lo et M. Yang

植物名 桂南地不容《高植图鉴补编》

地方名 广西: 山乌龟(龙州)。

功效 块根: 消肿止痛。

#### 7023047

*Stephania kwangsiensis* H. S. Lo

植物名 广西地不容《高植图鉴补编》

药材名 广西地不容《广西药录》

地方名 山乌龟(广西、云南); 广西: 金不换(那坡), 大金不换、(青风藤)(百色), (青藤)(隆林), 独脚古藤(藤县)。

功效 块根: 消炎, 止痛, 镇静。用于胃脘痛, 痢疾, 提取颅痛定之原料。

#### 7023048

*Stephania longa* Lour. --- *S. japonica* (Thunb.) Miers  
var. *hispidula* Yamamoto

植物名 粪箕笃《高植图鉴》

药材名 粪箕笃《岭南采药录》、《汇编》

文献名 硬毛千金藤《植分学报》, 刚毛千金藤《台湾药植志》

地方名 梨壁藤(福建、广东、广西), 犁头藤(福建、广东), (千金藤)(福建、广西); 福建: 铁板膏药草, 铁线藤, 和尚藤(厦门), 栲弱粘, 山膏药(福州、连江、平潭), 寄丝藤(永安), 红石猴(莆田、仙游), 香茹藤(泉州、惠安), 缚鱼藤(闽侯), 紫官娥(晋江), 银不换(闽清), 三角耙(松溪、政和), 蛇姆龟(宁德); 广东: 蛤蚧草(番禺), 蛤蚧藤(番禺、广州、花县), 蛤仔藤(饶平、海丰), 黎摘藤(揭阳), 七厘藤(肇庆、广宁、四会、德庆), 百解(湛江、化州), 三角藤(白沙), 三角苻(白沙、花县), 簕笃藤(新会), 疔草(潮州), 方钉草(潮安、潮州), 青蛙藤(潮阳), 马刀肚(海丰), 蛭子藤(陆丰), 水斗叶(广州), 田鸡草; 海南: 蛤母尿尿, 黎苻, 犁藤, 犁壁叶(海口、琼山、定安、屯昌), 假犁藤(澄迈), 秤锤藤(澄迈、琼海), 金不换(琼山); 广西: (山豆根), 雷钵嘴、叁箕草、飞天雷公(南宁、那坡), 松紧藤(德保), 车线藤, 瓢羹菜, 犁头草(龙州), 撮箕笃、撮箕藤(忻城), 铲箕笃、庠斗藤(贵县), 铲箕足(平南), 粪箕足(玉林), 粪箕君(容县、北流), 蛇头藤。

功效 全株: 清热解毒, 利尿消肿。用于肾盂肾炎, 膀胱炎, 慢性肾炎, 肠炎, 痢疾, 毒蛇咬伤。外用于痈疖疮疡, 化脓性中耳炎。

#### 7023049

*Stephania mshanica* H. S. Lo et B. N. Chang

植物名 马山地不容《高植图鉴补编》

药材名 马山地不容《广西药录》

文献名 山乌龟《药学报》

功效 块根: 止痛, 镇静, 提取颅痛定之原料。

#### 7023050

*Stephania micrantha* H. S. Lo et M. Yang

植物名 小花地不容《高植图鉴补编》

药材名 小花地不容《广西药录》

文献名 山乌龟《药学报》

功效 块根: 止痛, 镇痛, 提取颅痛定之原料。

#### 7023051

*Stephania sasakii* Hayata

植物名 兰屿千金藤《台湾药植志》

文献名 红豆葛藤(李《药植》), 台湾千金藤《植分学报》, 兰屿汉防己《中草药》

功效 根、茎: 镇痛, 催吐, 抗结核菌。

#### 7023052

*Stephania sinica* Diels --- *Stephania bernandifolia* auct. non Walp.

植物名 汝兰《高植图鉴补编》

药材名 汝兰《四川中药志》

地方名 山乌龟(云南、贵州), 金线吊乌龟(四川、云南); 江西: 金线吊蛤蟆(庐山); 湖北: 乌龟七, 铜锣七(巴东), 白药(恩施); 四川: (蛇莲), 白药片; 贵州: 地乌龟(剑河), 吊金龟。

功效 块根: 有小毒。清热解毒, 健胃止痛, 散瘀消肿。用于咳嗽, 咽痛, 口舌生疮, 呕吐腹泻, 胃痛, 痢疾, 跌打损伤, 风湿。

备考 “汝兰”之名初见于《四川中药志》(1960), 但学名误订为 *S. bernandifolia* Walp. 有的文献将 *S. dielsiana* Y. C. Wu (血散薯) 的学名误订为 *S. sinica* Diels. “汝兰”有硕大块根, 枝、叶折断处无红色液汁, 可资区别。

#### 7023053

*Stephania subpeltata* H. S. Lo

植物名 西南千金藤《云南植志》

药材名 西南千金藤《中药通报》

文献名 高原千金藤《高植图鉴》

功效 全株: 清热解毒, 消肿止痛。用于疮疡肿毒, 咽喉痛, 风湿热痹, 胃热疼痛。

#### 7023054

*Stephania succifera* H. S. Lo et Y. Tsoong

植物名 小叶地不容《高植图鉴补编》

地方名 海南: 金不换, 山乌龟。

功效 块根: 清热解毒, 镇痛。用于各种内、外伤疼痛, 神经痛, 疟疾, 菌痢, 上呼吸道感染, 急性胃肠炎, 慢性胃病, 风火牙痛, 口腔炎。外用于蛇咬伤, 跌打损伤, 疮毒等。

#### 7023055

*Stephania sutchuenensis* H. S. Lo --- *Stephania elegans* auct. non Hook. f. et Thoms.

植物名 四川千金藤《高植图鉴补编》

地方名 四川: 小山豆根(乐山), (山豆根)(峨眉)。

功效 条状主根: 清热解毒, 止痛杀虫。用于咽喉肿痛, 牙痛, 疮痈, 痔疮。

备考 有些文献如《四川常用中草药》(1971)将学名误订为 *S. elegans* Hook. f. et Thoms. 应注意鉴别。

## 7023056

*Stephania tetrandra* S. Moore

植物名 粉防己《高植图鉴补编》

药材名 防己《药典》

文献名 瓜防己《本草原始》, 汉防己《新纲》, 倒地拱、独脚蟾蜍根《药材学》, 石蟾蜍《中国药植志》

地方名 粉寸己(上海、浙江), 土防己(浙江、福建、湖南), [土木香](安徽、江西、福建), 白木香(浙江、安徽), 山乌龟(浙江、福建、湖南、广东、广西), 乌龟梢(广东、广西), 金线吊乌龟(福建、广西), 金线吊葫芦(浙江、福建), 金线吊蛤蟆、九节葫芦(安徽、江西), 四蕊千金藤(浙江、江西), 猪大肠(湖北、湖南); 浙江: 金丝吊篮(丽水、鄞县), 金丝蛇(温州); 江西: 木防己(定南); 福建: 吊金钟(大田), 土桂(宁化), 杜白(泉州、莆田), 地虹(莆田、仙游、泉州、龙溪), 根鞭、青藤根(泉州); 台湾: 大回魂; 湖南: 金线风, 山兰根, 老鸦藤, 乌龟藤, 山防己, 大肚狼; 广东: 石蟾蜍(乐昌、电白、高州), 蟾蜍薯, 独脚乌柏(连山、南雄、始兴、乐昌、连县), 防杞(粤北), 万丈深(兴宁); 海南: 长根金不换; 广西: 铜秤锤、秤锤郎(桂林), 拐满另(乐业), 石含茹, [白药]; 贵州: 夜牵牛(锦屏)。

功效 块根: 利水消肿, 祛风止痛。用于水肿脚气, 小便不利, 湿疹疮毒, 风湿痹痛, 高血压症。

## 7023057

*Stephania viridiflavens* H. S. Lo et M. Yang

植物名 黄叶地不容《高植图鉴补编》

药材名 黄叶地不容《广西药录》

地方名 广西: 金不换(那坡), 山乌龟。

功效 块根: 止痛镇静, 消炎。为提取颅痛定之原料。

## 7023058

*Stephania yunnanensis* H. S. Lo

植物名 云南地不容《高植图鉴》

药材名 地不容《中药志》

文献名 山乌龟《药学报》

功效 块根: 有小毒。清热解毒, 镇痛, 截疟。用于痢疽肿毒, 喉闭, 疟疾, 胃痛。

## 7023059

*Tinomisium phytocrenoides* Kurz

植物名 广西大叶藤《植分学报》

功效 叶: 刀伤止血; 根茎: 广西民间作黄藤用。

## 7023060

*Tinomisium tonkinense* Gagnep.

植物名 大叶藤《高植图鉴补编》

药材名 大叶藤《汇编》

地方名 广西: 奶汁藤, (黄藤), (龙州), 假黄藤(靖西、凌云), 猫猫能, 越南大叶藤, 大银藤(那坡), 大红莲(忻城), [藤黄连], [土防己](靖西), 血见仇、血见愁(天等); 贵州: 绿花七(凤岗); 云南: 黄藤子。

功效 根、藤茎: 壮筋骨, 活血通络。用于风湿骨痛, 小儿麻痹后遗症, 肥大性脊椎炎。外用于骨折; 叶: 用于外伤出血。

## 7023061

*Tinospora capillipes* Gagnep.

植物名 纤梗青牛胆《高植图鉴补编》

药材名 金果榄《纲目拾遗》、《药典》

文献名 圆角金果榄《药材学》, [山慈菇]《鉴别手册》, 圆叶金果榄《广西本草选编》, 毛柄青牛胆《中药志》

地方名 金苦榄、金古榄、九牛胆、金牛胆(广东、广西); 广东: 九龙胆, [金狮藤](汕头、潮州), 金甘榄、甘榄(新会、台山), 山应菜(潮阳), 常藤山应菜(潮州), 凤凰肠(海丰), 假薯子(陆丰), 乙斗金、白咀玉、单边救主、蛤九藤(普宁), [百解](化州); 海南: [金不换]、犁壁叶(琼山), 通心志(澄迈、琼海); 广西: 铜秤锤, [金银袋], (龙州), 金狗胆(龙胜、凤山、苍梧、岑溪、大新), 黄金古(柳江), 青果榄, 三石菇, [独脚乌柏], 明子防己。

功效 块根: 清热解毒, 利咽, 止痛。用于咽喉肿痛, 痈疽疔毒, 泄泻, 痢疾, 脘腹热痛。

备考 《广西植物》(1986)将本种并入 *T. sagittata* (Oliv.) Gagnep.。我们认为两者叶形、分布地区均有区别, 故仍分列为两种。

## 7023062

*Tinospora cordifolia* Miers

植物名 心叶青牛胆《中药通报》

文献名 心叶宽筋藤、宽筋藤《中药材》

地方名 西藏: “勒哲”(藏名)。

功效 茎枝: 清热祛痰。用于风热时疫, 流感, 咽喉痛, 肺炎, 风湿疼痛等。

## 7023063

*Tinospora crispa* (L.) Miers ex Hook. f. et Thoms.

植物名 皱叶青牛胆《高植图鉴补编》

药材名 千里找根《云南中草药选》

文献名 皱波青牛胆《云南中草药选》, 皱皮青牛胆《云南药录》

地方名 云南: 小赖藤, 绿藤, 绿包藤、癞浆包藤(思茅), 隔夜找娘, 青牛胆(西双版纳), “克赛麻奈”(傣名), “柯罗”(思茅傣语), “嘿柯罗”(西双版纳傣语)。

功效 藤茎: 清热解毒, 驱虫。用于疟疾, 蛇咬伤, 痈疮疖肿, 无名肿毒。

## 7023064

*Tinospora dentata* Diels

植物名 台湾青牛胆《高植图鉴补编》

文献名 齿叶青牛胆《植分学报》, 具齿青牛胆《中药通报》

功效 块根: 清热解毒, 利咽止痛。

## 7023065

*Tinospora sagittata* (Oliv.) Gagnep. --- *T. imbricata* S. Y. Hu --- *T. szzechuanensis* S. Y. Hu

植物名 青牛胆《广西植物》

药材名 金果榄《纲目拾遗》、《药典》

文献名 金桔榄《药性考》, 金苦榄《柑园小识》, 地胆、天鹅蛋《分类草药性》, 扇子苦藤《植物名汇》, 金苦胆《中药通报》, 覆瓦叶青牛胆《广西药录》, 覆瓦叶金果

榄《广西中草药》,箭叶青牛胆(《滇南本草》整理本),叠基青牛胆、四川青牛胆《植分学报》

地方名 [山慈菇]、[山茨菇](陕西、山西、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南),金牛胆、金古榄(四川、中南),九牛胆(陕西、湖南、广西),九龙胆(陕西、湖北、广西、贵州),九牛子(江西、安徽),地苦胆(陕西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南),金线吊葫芦(广西、云南);陕西:九连珠(安康),九连子,山石菇,铜秤锤;江西:黄蓍子、金包银(泰和);湖北:八步拿,九连环,九子莲,青鱼胆(神农架),散血蛋、散血胆(利川),半边劳;湖南:地蛋(溆浦、凤凰),破石珠、破岩珠(凤凰);广东:尖叶金果榄;广西:金袋(百色),金榄(陆川、博白),甘古榄(北流);四川:大叶地苦胆,〔蛇莲〕;云南:〔万丈深〕、八面风(楚雄),鸡心吊葫芦(思茅),丘香蛋(红河),苦地胆。

功效 块根:清热解毒,利咽,止痛。用于咽喉肿痛,痈疽疔毒,泄泻,痢疾,脘腹热痛。

#### 7023066

*Tinospora sagittata* (Oliv.) Gagnep. var. *craveniana* (S. Y. Hu) Lo --- *T. craveniana* S. Y. Hu --- *T. intermedia* S. Y. Hu

植物名 峨眉青牛胆《高植图鉴补编》

文献名 江西青牛胆、中型青牛胆《植分学报》

功效 块根:清热解毒,利咽止痛。

#### 7023067

*Tinospora sagittata* (Oliv.) Gagnep. var. *yunnanensis* (S. Y. Hu) Lo --- *T. yunnanensis* S. Y. Hu

植物名 云南青牛胆《高植图鉴补编》

地方名 金果榄(广西、云南);云南:苦地胆,尖叶金果榄。

功效 块根:清热解毒,利咽止痛。

#### 7023068

*Tinospora sinensis* (Lour.) Merr. --- *Menispermum malabaricum* Lam.

植物名 中华青牛胆《高植图鉴补编》

药材名 宽筋藤《汇编》

文献名 青宽筋《陆川本草》

地方名 吊天藤、伸筋藤、透筋藤、无地生须(广东、广西),软筋藤(广西、云南);广东:舒筋藤(广州、阳春),无爷藤(英德),椿根藤(韶关、新丰、连南),春筋藤(河源、海口、定安、屯昌),春筋根,大椿根藤(翁源),大宽筋(阳春、从化),大叶宽筋藤(增城、罗定、电白、乐昌),大叶无爷藤(从化),倒吊藤(湛江),伸根藤(仁化),山筋藤(徐闻、海康、廉江、遂溪),胡绵根(乐昌);海南:松根藤,伤根藤;广西:松筋藤(北海、田东、田阳、那坡),大松身,接筋藤(隆林),吼筋藤(北海),宽根藤(桂平、南宁),圆宽根藤(柳江),白宽根藤(北流、平南),软骨青筋藤(博白),双根藤(龙州),转弯藤(大新),打不死,砍不死(南宁);云南:大接筋藤,牛挣藤(文山),人青蛇、大绿藤(红河),绿藤子,接骨藤;西藏:“勒哲”(藏名)。

功效 藤茎:舒筋活络,祛风止痛。用于风湿痹

痛,坐骨神经痛,腰肌劳损,跌打损伤。

#### 7023069

*Tinospora thorelii* Gagnep.

植物名 发冷藤《高植图鉴补编》

药材名 发冷藤《广西药录》

地方名 广西:〔金鸡纳〕(宁明),金鸡纳藤。

功效 茎、叶:用于疟疾,发热。

### 7024 马兜铃科 Aristolochiaceae

#### 7024001

*Aristolochia austroszechuanica* Chien et C. Y. Cheng

植物名 川南马兜铃《高植图鉴补编》

药材名 大叶青木香《汇编》

地方名 四川:土防己,青木香。

功效 块根:解毒排脓,行气止痛。用于骨、关节结核,慢性骨髓炎,脘腹胀痛,毒蛇咬伤。

备考 《中国植志》(1988)将本种并入广西马兜铃(*A. kwangsiensis* Chun et How ex C. F. Liang)。

#### 7024002

*Aristolochia austroyunnanensis* S. M. Hwang

植物名 滇南马兜铃《中国植志》

药材名 滇南马兜铃《广西药录》

功效 根:消炎。用于肠胃炎,肝炎。外用于湿疹。

#### 7024003

*Aristolochia calcicola* C. Y. Wu

植物名 青香藤《云南中草药》

药材名 南木香(云南曲靖)、《汇编》

文献名 大叶南木香《品种论述》

地方名 毛藤香(四川、云南);四川:毛防己、猫耳朵(西昌);云南:青木香(昭通),青藤香,土木香,楠木香,大青藤(华宁),大内消(曲靖),腰子果(峨山),地檀香,蛇生根,“含糯那瓷”(楚雄彝名)。

功效 根、根茎、藤:理气止痛,祛风活血。

#### 7024004

*Aristolochia cathcartii* Hook. f.

植物名 管兰香(云南)、《中国植志》

地方名 云南:管南香,萝卜防己,白背马兜铃(滇南),土木香。

功效 块根:祛瘀,生肌,凉血,行气,止痛。用于胃痛,胃肠炎,风湿痛,跌打肿痛。

#### 7024005

*Aristolochia championii* Merr. et Chun --- *A. longifolia* Champ. ex Benth.

植物名 长叶马兜铃《中国植志》

药材名 三筒管《广西中草药》

文献名 山总管《汇编》,百总管《中草药》

地方名 广西:百解薯(北流),千金薯(贵县),竹叶薯(平南),金银带(来宾),山东杆、长叶山东杆(玉林),一面风(罗城),水川薯,白金古榄(那坡),白金苦榄,白金果榄,白金苦,〔金果榄〕,银袋,“方己弄”(金秀瑶语);四川:小地檀香、小寒药(西昌),绊藤香;贵州:〔青

藤)(兴义),捆仙绳。

功效 块根:清热解毒。用于急性肠胃炎,痢疾。

#### 7024006

*Aristolochia chlamydophylla* C. Y. Wu ex S. M. Hwang

植物名 苞叶兜铃《中国植志》

药材名 苞叶马兜铃《广西药录》

地方名 广西:十九断、十八钻(那坡)。

功效 根:用于肠胃炎,肝炎,肾炎,肝硬化腹水。外用于湿疹。

#### 7024007

*Aristolochia cinnabarina* C. Y. Cheng et J. L. Wu

植物名 四川朱砂莲《高植图鉴补编》

药材名 朱砂莲(四川、云南)、《分类草药性》

文献名 避瘟雷《蜀本草》,透水雷《分类草药性》,花叶马兜铃《峨眉药植资源》

地方名 背蛇生、躲蛇生(四川、云南);四川:避蛇生(南川),避水雷、辟水雷、碧血雷、鼻血雷、雷见怕、雷恨草、[朱砂七]、牛血莲、狗儿莲、一点血(乐山、宜宾、凉山州);云南:毕石雷、古里(文山)。

功效 块根:有小毒。清热解毒,消肿止痛。用于肠炎,痢疾,胃溃疡,咽喉肿痛,毒蛇咬伤,痈疗肿毒,外伤出血。

#### 7024008

*Aristolochia contorta* Bunge

植物名 北马兜铃《中国植志》

药材名 马兜铃[果]《药性论》、《药典》,天仙藤《图经》、《药典》,青木香[根]《本草蒙筌》、《药典》

文献名 果实:马兜零《蜀本草》,马兜苓《珍珠囊》,兜铃《本草述钩元》,玉皇瓜《沈阳县志》;地上部分:都淋藤、三百两银《补缺肘后方》,兜铃苗《圣惠方》,马兜铃藤《普济方》,青木香藤《本草备要》;根:马兜铃根《肘后方》,土青木香、独行根、兜零根《唐本草》,独行木根《纲目》,土木香《本草正》,〔山豆根〕、金锁匙《满鲜植汇》

地方名 臭铃铛、葫芦罐(东北、河北、甘肃),茶叶包(东北、河北、山西),吊挂篮子(河北、甘肃),斗铃、马斗铃、后老婆罐(东北),马灯笼(西北),臭瓜蛋、臭瓜瓜(山西、陕西),臭罐罐(河北、内蒙古);吉林:豆绿根;辽宁:山漏斗、桃筐(新宾);北京:臭罐子;河北:臭葫芦,套脚兰,山香根(张家口),两金藤;山西:马斗铃蔓子,河沟梢;内蒙古:老婆罐,“呼格纳”、“玛怒”(蒙名),万丈龙;陕西:臭罐侧根,臭瓜芳蛋,臭拉秧子,野木香根,痒辣菜,铁扁担(太白);甘肃:小木通;山东:后老婆罐子(沂水、蒙山、海阳、威海、荣成),甘棵子(莱阳),三角草(临沂),棟木香罐(崂山、淄博),马虎铃铛(崂山),皮匠姜子、臭瓜姜(烟台),兜落根,若瓜姜,后娘藤;湖北:蛇参。

功效 果实:清肺降气,止咳平喘,清肠消痔。用于肺热喘咳,痰中带血,肠热痔血,痔疮肿痛;地上部分:行气活血,利水消肿。用于脘腹刺痛,关节痹痛,妊娠水肿;根:解毒,消肿,降血压。

#### 7024009

*Aristolochia cucurbitifolia* Hayata

植物名 瓜叶马兜铃(台湾)、《中国植志》

文献名 南瓜叶马兜铃《汇编》

地方名 台湾:〔黄藤〕,青木香。

功效 藤茎:调经,清血;根:用于毒蛇咬伤等。

#### 7024010

*Aristolochia cucurbitoides* C. F. Liang

植物名 葫芦叶马兜铃《中国植志》

药材名 葫芦叶马兜铃《广西药录》

文献名 岗被马兜铃《高植图鉴补编》

功效 根:消肿止痛。用于疮痍肿毒。

#### 7024011

*Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc.

植物名 马兜铃《中国植志》

药材名 马兜铃[果实]《千金方》、《药典》,天仙藤《图经》、《药典》,青木香[根]《本草蒙筌》、《药典》

文献名 果实:马兜零《蜀本草》,马兜苓《珍珠囊》,兜铃《本草述钩元》;茎叶:都淋藤、二百两银《补缺肘后方》,兜铃苗《圣惠方》,马兜铃藤《普济方》,青木香藤《本草备要》;根:马兜铃根《肘后方》,土青木香、独行根、兜零根《唐本草》,云南根《图经》,独行、木香、三百两银药《纲目》,土木香《本草正》,青藤香《草木便方》,蛇参根《分类草药性》,百两金、土麝《中医药实验研究》

地方名 痒辣菜、臭拉秧子、野木香根(江西、湖南、江苏),野木香(安徽、福建),万丈龙(福建、湖南、广西),三百两(江苏、福建),蛇参、蛇参果(四川、贵州),南马兜铃(华东),定海根(湖南、广西);山西:臭瓜蛋[果],臭瓜蛋根;陕西:铁扁担,横根子(宝鸡);江苏:长痧藤、天星藤(南京),天仙藤根、水本香根、水木香果(南通),木香根、木香根藤(无锡),马兜铃根子(徐州),小灯笼,野香瓜,天苏藤(苏州),一点气;上海:痧药草[藤],水木香;浙江:香藤、痧药根(平湖),根藤果(嵊县);安徽:臭豹孚子;江西:痧药(赣中),土麝香(德兴、占水),白青木香(铜鼓),肚痛怕(吉水),江西密罐;福建:银药(福州),香米藤(南安),虾蟆藤(福安),三百银药;河南:马泡铃;湖北:独心根,山菊花[花](巴东),小条青木香;湖南:天仙果[果实],〔天仙子〕[种子],〔山豆根〕,箭头草(黔阳),刁铃;广西:“骂结吨”(罗城仫佬语),“麻丢铃”(金秀瑶语),“裸嫩当”、“筛古藤”(壮语);四川:清藤香、清木香(眉山、简阳),兜铃果;贵州:蛇儿参;云南:大暗消(文山)。

功效 果实:清肺降气,止咳平喘,清肠消痔。用于肺热喘咳,痰中带血,肠热痔血,痔疮肿痛;地上部分:行气活血,利水消肿。用于脘腹刺痛,关节痹痛,妊娠水肿;根:解毒,消肿,降血压。

#### 7024012

*Aristolochia fangehi* Y. C. Wu ex L. D. Chou et S. M.

Hwang --- *Aristolochia westlandii* auct. non Hemsl.

植物名 广防己《中国植志》

药材名 广防己《药典》

文献名 防己《恩平县志》,木防己《阳春县志》,大砂药《汇编》,防己马兜铃《高植图鉴补编》

地方名 藤防己、防杞、百解头(广东、广西);天津:水防己;广东:滇防己;广西:真防己(玉林),大沙根(容县),王纪藤(大瑶山);贵州:墨蛇胆。

功效 根:祛风止痛,清热利水。用于湿热身痛,风湿痹痛,下肢水肿,小便不利。

备考 过去有些文献将广防己学名误订为 *A. westlandii* Hemsl.

#### 7024013

*Aristolochia fordiana* Hemsl.

植物名 通城虎(广西)、《中国植志》

药材名 通城虎(广西中草药)

文献名 吊气还魂《药植简编》,福德马兜铃《中药大辞典》

地方名 广东:大血散(罗定、电白),风萎(阳江、阳春、增城、乐昌),血药,血萎;广西:五虎通城(北流),[一点血],定心草(上林),万丈藤,凤晒(陆川),大散血,“天然草”(恭城瑶语),“奇巧”(大新壮语);贵州:青藤香、小古藤(威宁);云南:毕血林(红河),血藤暗消,暗消,艾消。

功效 根或全草:有小毒。祛风止痛,解毒消肿。用于心胃气痛,风湿骨痛,跌打损伤,小儿惊风,毒蛇咬伤。

#### 7024014

*Aristolochia gentilis* Franch. --- *A. gracillima* Hemsl.

植物名 优贵马兜铃《中国植志》

文献名 高贵马兜铃、纤细马兜铃《云南种录》,极细马兜铃《贵州药录》

地方名 贵州:朱砂莲(惠水、安龙)。

功效 根:清热,解毒,镇痛。

7024015 见 7024038a

#### 7024016

*Aristolochia hainanensis* Merr.

植物名 海南马兜铃《中国植志》

药材名 海南马兜铃《广西药录》

地方名 广西:假青黄藤(上思)。

功效 叶:外用于眼痛;根:祛风,解湿热,消炎。

#### 7024017

*Aristolochia heterophylla* Hemsl. --- *A. kaempferi* Willd. f. *heterophylla* (Hemsl.) S. M. Hwang

植物名 异叶马兜铃《中国植志》

药材名 汉中防己《品种论述》

文献名 防己、解离《本经》,异形马兜铃《中药志》,翼叶马兜铃《四川野生经济植物志》,木防己《鉴别手册》

地方名 青木香(根)(湖北、湖南、陕西);陕西:土防己,〔木香〕(山阳),天仙藤,大叶青藤;四川:广元防己(广元),〔山豆根〕,小南木香;贵州:贵州木防己,青藤香,百解药;云南:马兜铃(昭通)。

功效 根:行水,泻下焦湿热。用于水肿腹胀,湿热脚气,手足挛痛,癰疮疮肿。

#### 7024018

*Aristolochia heterophylla* Hemsl. var. *linearifolia* S. M. Hwang

植物名 窄叶马兜铃《神农架药录》

药材名 藤香《神农架药录》

地方名 湖北:青木香(神农架)。

功效 根茎及根:行气止痛。

#### 7024019

*Aristolochia howii* Merr. et Chun

植物名 南粤马兜铃《中国植志》

文献名 侯氏马兜铃《海南植志》

地方名 海南:“汪喉和”,“雅布伦”(黎语)。

功效 块根:抗菌,消炎,解毒。用于高热,肺炎,喉痛。

#### 7024020

*Aristolochia impresinervis* C. F. Liang

植物名 凹脉马兜铃《中国植志》

药材名 凹脉马兜铃《广西药录》

地方名 广西:穿石藤(武鸣)。

功效 全株:祛风活络,止血镇痛。用于风湿骨痛,胃痛,肠炎,小儿麻痹后遗症。

#### 7024021

*Aristolochia kaempferi* Willd. --- *A. mollis* Dunn --- *A. shimadai* Hayata

植物名 大叶马兜铃《中国植志》

药材名 淮通《中国药植图鉴》

文献名 薰鼓藤《中国植物图鉴》,淮通藤、〔木通〕《中国药植图鉴》,柔毛马兜铃《汇编》,柔叶马兜铃《福建药物志》,金丝藤《高植图鉴补编》

地方名 马兜铃、青木香(甘肃、福建),土青木香(广东、广西);浙江:香藤、苦藤;福建:香里藤,青香藤,金腰带,梨头草;台湾:台湾马兜铃,天仙藤,木香,地黄蒲,痢药草,藤馨,痧药草;广东:金藤藤;贵州:过山接(梵净山);云南:藤子暗消,南木香。

功效 根、茎、果实:清热解毒,活血,健脾利湿。用于消化不良,止咳。

#### 7024022

*Aristolochia kaempferi* Willd. f. *thibetica* (Franch.) S. M. Hwang --- *A. feddei* Levl.

植物名 川西马兜铃《中国植志》

药材名 背蛇生(云南)

文献名 滇东马兜铃《云南种录》

地方名 四川:毛叶小寒药,岩蚌壳,山豆根;云南:躲蛇生、避蛇灵、躲蛇草(红河),楠木香,小寒药,小楠木香。

功效 根、藤:抗菌消炎,镇痛。用于胃炎,腹冷痛。

#### 7024023

*Aristolochia kwangsiensis* Chun et How ex C. F. Liang

植物名 广西马兜铃《中国植志》

药材名 管南香《汇编》

文献名 圆叶马兜铃《广西本草选编》,大叶马兜铃《广西植志》

地方名 萝卜防己(广西、云南),青木香(四川、贵州);福建:南蛇藤;广西:百解薯(北流),大百解薯(岑州)。

溪),总管,大总管(龙州、忻城),大蛇总管(龙州),大叶山总管,圆叶山总管,金银袋(百色、凌云),马练铃(罗城仫佬语),“嚼铎”(都安瑶语),椴广木香、九管(壮语),葫瓜莲(凌云);贵州:地雷,黑地雷,大青木香(黔南);云南:白背马兜铃,土木香。

功效 块根:有小毒。清热解毒,理气止痛,凉血止血。用于急性胃炎,胃、十二指肠溃疡,咽喉炎,肺结核,跌打损伤。外用于外伤出血,疮疮肿毒,毒蛇咬伤。

#### 7024024

*Aristolochia lasiops* Sptapf

植物名 鄂西马兜铃《神农架药录》

地方名 湖北:土青木香、马兜铃(神农架)。

功效 根:行气止痛;茎:通经络;果实:镇咳,祛痰。

#### 7024025

*Aristolochia longgonensis* C. F. Liang

植物名 弄岗马兜铃《中国植志》

文献名 弄岗通城虎《广西植物》,弄岗通城虎《广西药录》

功效 全株:用于小儿高热,跌打损伤。

#### 7024026

*Aristolochia manshuriensis* Kom. --- *Hocquartia manshuriensis* (Kom.) Nakai

植物名 木通马兜铃《中国植志》

药材名 关木通《药典》

文献名 马木通《东北植药图志》,东北木通《药学报》,木通藤《东北本草》,苦木通《品种论述》,东北马兜铃《药典》,潼木通、童木通、子木通《常用中药名辨》

地方名 木通(东北、河北、山西、陕西、甘肃、江苏、上海),指木通、细木通(东北),山木通、山大通(西北),万年藤(东北、河北);北京:正木通。

功效 藤茎:清心火,利小便,通经下乳。用于口舌生疮,心烦尿赤,水肿,热淋涩痛,白带,经闭乳少,湿热痹痛。

#### 7024027

*Aristolochia mollissima* Hance

植物名 寻骨风《中国植志》

药材名 寻骨风《名实图考》、《汇编》

文献名 绵毛马兜铃《江苏南部种册》

地方名 清骨风〔根〕、毛香(江苏、安徽),〔白毛藤〕(山东、江苏、上海、安徽),猫耳朵〔叶〕(江苏、湖北、河南),穿地筋、毛风草(江苏、河南),猫耳朵草(江苏、山东、河南);河北:〔广金钱草〕;山东:烟袋锅,巡骨风;江苏:穿地节(云台山),黄木香、地丁香(苏州),猪耳朵(镇江),毛风香,毛香根叶,〔山豆根〕(邳县);上海:兔耳草;浙江:马鞭;安徽:追骨风,土广木香,猫香、猫耳朵香、通筋草(滁县);江西:白面风,兔子耳,行骨疯(铜鼓),毛马兜铃,毛骨风;河南:猴耳草,鸭娃根,猫耳根,猫耳香;湖北:毛和尚(巴东),〔清木香〕〔根〕,白毛片;湖南:光斑鸠,肺经草,盲盲草,毛毛草,白喉箭,土豆荚,〔清风藤〕,寻风藤,鹅婆娘;广西:老鼠眼;四川:大寒药;贵州:〔防己〕、毛远志(水城)。

功效 根或全草:祛风,活络,止痛。用于风湿筋

骨痛,跌打损伤,胃腹疼痛,疝痛,疟疾,痢肿。

#### 7024028

*Aristolochia moupinensis* Franch.

植物名 宝兴马兜铃《中国植志》

药材名 淮通《中药志》

文献名 木香马兜铃《中国经植志》,马边马兜铃《贵州药录》,穆坪马兜铃、岩藤香《鉴别手册》,淮通马兜铃《中药大辞典》

地方名 〔木防己〕(云南、贵州),〔防己〕、马兜铃(四川、云南);四川:淮木通,怀通、木通(峨眉),木香(沧溪),青木香(南江),大地檀香、追风散、大寒药(西昌),大半药(会东),藤藤黄(古蔺),老蛇藤(冕宁);贵州:青藤香(威宁),岩见愁,排风藤;云南:理防己,南木香(禄劝),大内消;西藏:“八勒噶”(藏名)。

功效 根、藤:清热利湿,行水下乳,排脓止痛。用于湿热小便不利,水肿,尿路感染,阴道滴虫,风湿关节痛,湿疹,荨麻疹,痢肿。

#### 7024029

*Aristolochia obliqua* S. M. Hwang

植物名 偏花马兜铃《中国植志》

地方名 云南:〔汉防己〕(剑川)。

功效 根:用于消化不良,胃病气胀。

#### 7024030

*Aristolochia ovatifolia* S. M. Hwang --- *Aristolochia feddei* auct. non Levl.

植物名 卵叶马兜铃《中国植志》

地方名 四川:大寒药;贵州:木防己,青木香。

功效 根茎:清热解毒,消炎止血。

备考 《中国植志》(1988)称:《高植图鉴补编》(1982)学名误订为 *A. feddei* Levl.

#### 7024031

*Aristolochia ringens* Vahl

植物名 孔雀花(植分学报)

功效 根:用于骨科疾病。

#### 7024032

*Aristolochia saccata* Wall.

植物名 袋形马兜铃《中国植志》

文献名 囊状马兜铃《药植简编》,囊花马兜铃《汇编》

地方名 西藏:马兜铃,青木香,马兜铃藤。

功效 果实:清热降气,止咳平喘。用于慢性支气管炎,肺热咳嗽,百日咳。

#### 7024033

*Aristolochia salweenensis* C. Y. Cheng & J. S. Ma

植物名 怒江马兜铃(植分学报)

功效 根:用于胃病。

#### 7024034

*Aristolochia scytophylla* S. M. Hwang et D. Y. Chen

植物名 革叶马兜铃《中国植志》

药材名 革叶马兜铃《广西药录》

地方名 广西:银袋(乐业)。

功效 块根:止痛,消炎。

## 7024035

*Aristolochia tagala* Champ.

植物名 耳叶马兜铃《中国植志》

药材名 假大薯《广西中药志》

文献名 卵叶雷公藤《海南植志》, 卵叶马兜铃《高植图鉴》, 锤果马兜铃《拉汉种称》, 滇南马兜铃《云南中草药选》, 黑面防己《汇编》

地方名 [马兜铃] (广西、云南); 海南: [木防己], 麻疯龙, 马刀令; 广西: [青木香] (贵县、桂平、武鸣), [土木香], 通城虎, 大叶通城虎, 假通城虎 (苍梧), 假防己 (玉林), [防己], 红薯苦 (忻城), [广防己], 地川风 (七林), 鬼灯笼 (横县); 云南: 小提萝, 百解, 藤子防己, 暗消, 大暗消, [土木香]。

功效 根: 清热解毒。用于无名肿毒, 瘰癧, 疔疖, 疮疡, 痢疾, 毒蛇咬伤, 风湿骨痛; 种子: 用于喉炎。

## 7024036

*Aristolochia thwaitesii* Hook. f.

植物名 海边马兜铃《中国植志》

地方名 广东: [石蟾蜍] (珠海)。

功效 块根: 消炎解毒。用于咽喉肿痛。

## 7024037

*Aristolochia transsecta* (Chatt.) C. Y. Wu --- *Isotrema transsecta* Chatt.

植物名 粉质花马兜铃《中国植志》

药材名 蝴蝶暗消《汇编》

文献名 云南青木香《药植简编》, 粉质青木香、青藤香《汇编》, 箭叶马兜铃《峨眉药植资源》

地方名 四川: 黄木香 (峨眉山); 云南: [青木香] (红河、思茅), 葫芦暗消、鸡脚暗消 (红河), 马斗铃 (思茅), 藤子内消。

功效 根: 行气健胃, 祛风止痛。用于消化不良, 胃痛, 腹胀, 风湿性关节炎。

## 7024038

*Aristolochia tuberosa* C. F. Liang et S. M. Hwang ---

*Aristolochia kaempferi* auct. non Willd.

植物名 广西朱砂莲《高植图鉴补编》

药材名 白朱砂莲 (拟)

地方名 朱砂莲 (广西、贵州); 广西: 天然草 (恭城), 万丈龙 (资源), 一点血 (全州、资源); 贵州: 九月生; 云南: 背蛇生, 毒蛇药, 避蛇生, 朱砂灵, “菇里”、“古里” (弥勒、罗平彝语)。

功效 块根: 消肿止痛。用于痢疾, 胃脘痛, 肺结核, 毒蛇咬伤。

备考 有的文献曾将本种学名误订为 *A. kaempferi* Willd.

## 7024038a

*Aristolochia tubiflora* Dunn --- *Aristolochia gentilis* auct. non Franch.

植物名 管花马兜铃《中国植志》

药材名 通血雷《汇编》

文献名 小马兜铃《高植图鉴补编》, 蛇伤草《四川中药志》

地方名 避蛇生 (四川、贵州、云南), 一点血 (广西、湖南); 浙江: 铃钟藤细辛 (天目山), 小青根 (乐清), 金丝儿; 福建: 一条鞭、横根子 (宁德、三明), 毒草; 湖北: 鼻血雷 (巴东), 鼻血莲, 急解索、地解索、碧血雷 (恩施); 湖南: 红叶青木香, 南木香; 广东: 红血药、血药 (阳春), 红白药; 四川: 避水雷, 避蛇雷、过山林、大叶蛇参 (巫溪), 独一味、小独一味 (汉源); 贵州: 避蛇参, 白朱砂莲, 九月生 (贵定、独山); 云南: 毕石牛, 避蛇灵。

功效 根: 清热解毒, 止痛。用于胃脘痛。外用于毒蛇咬伤; 果实: 用于咳嗽。

备考 《中国植志》(1988) 称: 《高植图鉴补编》(1982) 将本种学名误订为 *A. gentilis* Franch.

## 7024039

*Aristolochia versicolor* S. M. Hwang --- *A. westlandii* auct. non Hemsl.

植物名 变色马兜铃《中国植志》

药材名 白金果榄 (广西)

文献名 百解《药植简编》, 百解马兜铃《汇编》, 银袋《植分学报》

地方名 清藤香 (四川、广西); 广东: 过石珠 (阳山); 广西: 白金古榄、银带 (龙州), 苦凉藤 (靖西), 山总管, 百总管, 百解香, [藤防己]; 贵州: 捆仙绳 (独山); 云南: 青香藤。

功效 块根: 清热解毒, 消肿止痛。用于肠胃炎, 腮腺炎, 瘰癧, 乳痈, 咽喉肿痛湿疹。

备考 《植分学报》(1975)、《高植图鉴补编》(1982), 曾将本种学名误订为 *A. westlandii* Hemsl. 有些中草药文献曾将本品误作“广防己” (*A. fangchi* Wu), 均应注意鉴别。

## 7024040

*Aristolochia yunnanensis* Franch. --- *Aristolochia westlandii* auct. non Hemsl. - *Aristolochia kaempferi* auct. non Willd.

植物名 云南马兜铃《中国植志》

药材名 小南木香 (云南昆明、红河)

地方名 贵州: 藤七 (兴义); 云南: 小寒药, 小苦藤, 细木香, [土木香], 打鼓藤, 串石藤 (楚雄), 白防己 (保山), 金不换、地檀香、暗消、藤子暗消 (思茅), 毛叶子寒药 (东川), 化肉藤、化肉丹 (红河), 追风散。

功效 根、藤: 理气止痛, 祛风活血。用于胃痛, 腹胀, 腹痛, 消化不良, 风湿骨痛, 跌打损伤。

备考 有的文献曾将 *A. kaempferi* Willd. 和 *A. westlandii* Hemsl. 误订为本种。

## 7024041

*Asarum albomaculatum* Hayata

植物名 白斑细辛《台湾植志》

功效 全草: 祛风散寒, 止痛。

## 7024042

*Asarum brevissimum* Franch.

植物名 短柱细辛 (四川城口)、《中国植志》

功效 全草: 祛风散寒, 止痛。

## 7024043



*Asarum caudigerellum* C. Y. Cheng et C. S. Yang

植物名 短尾细辛《中国植志》

药材名 土细辛(拟)

文献名 圆叶细辛《植分学报》, 毛乌金、乌金七《新华本草纲要》

地方名 四川: 苔叶细辛, 接气草; 贵州: 马蹄细辛, 黑脚猫。

功效 根茎: 用于腹痛; 全草: 四川部分地区习作细辛用。

#### 7024044

*Asarum caudigerum* Hance --- *A. leptophyllum* Hayata

植物名 尾花细辛《中国植志》

药材名 土细辛(四川、广东、广西)、《高植图鉴》

文献名 假金耳环《药学通报》, 圆叶细辛《中药志》, 薄叶细辛《贵州药录》, 长尾细辛《汇编》, 尾瓣细辛《云南种录》

地方名 杜衡(广东、云南), [金耳环](广西、广东、云南); 福建: 马蹄香、马蹄金(福州、古田、霞浦、福鼎、建阳、崇安、清流、武平), 仙蕨(尤溪); 湖南: 毛乌金, 胡椒七; 广东: [香茹草](连县); 广西: [细辛](贺县、龙州), 圆细辛(桂林), 马蹄细辛(凌云), [山慈姑](苍梧、贵县、大瑶山), 土公英(博白), 山田高(北流), 地胡椒(凤山), 独叶牡丹(忻城), 追风草(田林), “桑和糖”(三江侗语), “阔乖”(罗城仫佬语), “全粘”(都安瑶语); 四川: 有尾细辛, 杂细辛; 贵州: 倒插花, 白倒插花, 白三百棒, 顺河香; 云南: 小麻药(红河), 蜘蛛香, 折珠香。

功效 根、全草: 驱风镇痛, 解毒消肿, 止咳平喘。

#### 7024045

*Asarum caudigerum* Hance var. *cardiophyllum* (Franch.) C. Y. Cheng et C. S. Yang

植物名 花叶尾花细辛《中国植志》

药材名 土细辛(四川)、《中药材科技》

地方名 四川: 杂细辛; 贵州: 三百棒, 红三百棒。

功效 全草: 散寒止咳。四川部分产区作细辛入药。

#### 7024046

*Asarum caulescens* Maxim.

植物名 双叶细辛《中国植志》

药材名 土细辛(四川)

文献名 细辛《四川中药志》

地方名 乌金草、苔叶细辛(湖北、陕西、甘肃、四川); 陕西: 拐拐细辛(南郑); 湖北: 毛乌金七(鹤峰), 毛叶细辛(神农架、竹溪); 广乌金草(神农架); 广西: 假细辛; 四川: 大宁细辛, 大乌金草; 贵州: 马蹄香(梵净山)。

功效 全草: 散风寒, 止咳, 镇痛。用于风寒感冒, 咳嗽头痛, 劳伤身痛。

#### 7024047

*Asarum chinense* Franch. --- *Asarum fargesii* Franch.

植物名 川北细辛《中国植志》

药材名 土细辛(四川)

文献名 小叶细辛草《植物名汇》, 江南细辛《福建植志》, 莲花叶细辛《药植简编》, 中国细辛《湖北植志》

地方名 莲花细辛(江西、四川、湖北、湖南); 浙江: 马蹄香(浙南), 马蹄细辛(乐清); 福建: 杜衡, 红底马蹄金; 四川: 苔叶细辛, 红叶细辛, 花叶细辛。

功效 全草及根: 祛寒开窍, 行气止痛。

#### 7024048

*Asarum crispulatum* C. Y. Cheng et C. S. Yang

植物名 皱花细辛《中国植志》

药材名 土细辛(四川)、《中药材科技》

地方名 四川: 盆草细辛(南川), 大花杜衡。

功效 全草: 用于蛇咬伤。

备考 四川部分产地收购自销作细辛用。

#### 7024049

*Asarum debile* Franch.

植物名 铜钱细辛《中国植志》

药材名 杂细辛(四川)

地方名 胡椒七、铜钱乌金(湖北、陕西、四川); 湖北: 小铜钱乌金, 乌金草, 毛叶细辛; 四川: 小乌金草, 毛细辛。

功效 全草: 理气止痛。用于感冒风寒, 风湿痹痛。

#### 7024050

*Asarum delavayi* Franch.

植物名 川滇细辛《中国植志》

药材名 土细辛(四川峨眉)、《高植图鉴》

文献名 滇细辛《云南种录》

地方名 四川: 苔叶细辛, 牛蹄细辛、牛尾细辛(峨眉); 贵州: 山椒、土棘(梵净山), 山椒根(松桃), 箭叶细辛(梵净山)

功效 全草: 有小毒。祛风散寒, 温肺止咳, 开窍止痛。用于感冒咳嗽, 胃痛, 关节疼痛, 牙痛。

#### 7024051

*Asarum epigynum* Hayata --- *Geotaenium epigynum* (Hayata) Maekawa

植物名 上花细辛《台湾植志》

文献名 台湾细辛《高植图鉴》

功效 全草: 祛风散寒, 止痛。

#### 7024052

*Asarum forbesii* Maxim. --- *Asarum blumei* auct. non Duch.

植物名 杜衡《中国植志》

药材名 杜衡《别录》、《汇编》

文献名 怀、衡薇香(《大戴礼记》), 杜、土卤(《尔雅》), 楚衡(《范子计然》), 上杏(《博物志》), 马蹄香(《唐本草》), 杜衡葵(《尔雅翼》), 土细辛(《土宿本草》), 皱儿草(《太仓州志》), 杜葵(《纲目》), 南细辛(《医林纂要》), 土荇、木杏、杜细辛、马蹄辛、金锁匙(《新纲》), 苔叶细辛(《高植图鉴》), 马细辛(《汇编》)

地方名 马蹄细辛(江苏、浙江); 江苏: 马辛(溧阳、苏州), 马丁香、真马辛、丁香草、[灵芝草](苏州); 浙江: 泥里花(临安), 土里开花(昌化); 安徽: [灯笼花]; 江西: 马蹄香细辛(吉安), 双龙麻消(宜春), 土里开花土里谢(庐山), 大救驾; 湖北: [马蹄金]。

**功效** 全草：祛风，散寒，止痛。用于风寒头痛，关节疼痛，痰饮咳嗽。外用于牙痛。

**备考** 过去文献曾将古本草中的杜衡考订为 *A. blumei* Duch., 该种产于日本，我国不产，这种考订结果，显然是错误的。

## 7024053

*Asarum fukienense* C. Y. Cheng et C. S. Yang

植物名 福建细辛《中国植志》

药材名 土细辛(拟)

地方名 薯叶细辛、土里开花(江西、安徽);浙江;杜衡(浙南);福建:细辛,马脚蹄。

**功效** 全草:祛寒开窍,行气止痛。

## 7024054

*Asarum geophilum* Hemsl.

植物名 地花细辛《中国植志》

药材名 土细辛(广东、广西)

文献名 花叶细辛《广西中药志》,圆叶细辛《广西本草选编》,矮细辛《植分学报》,铺地细辛《贵州植志》,大块瓦《中药志》

地方名 细辛(广东、广西);广东:[金耳环],(山慈姑);广西:一块瓦,摘耳根(那坡);贵州:马蹄香(剑河),白三百棒。

**功效** 根:疏散风寒,宣肺止咳。用于风寒感冒,咳嗽,哮喘,蛇咬伤。

## 7024055

*Asarum grandiflorum* Hayata var. *colocasiifolium* Hayata

植物名 芋叶细辛《台湾药植志》

**功效** 叶:用于腹痛,创伤,梅毒等。

## 7024056

*Asarum heterotropoides* Fr. Schmidt var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag.

植物名 辽细辛《本草原始》、《中国植志》

药材名 细辛《本草经集注》、《药典》

文献名 少辛《纲目》,玉番丝、绿须姜《新纲》,东北细辛、万病草《东北草本植志》,北细辛《高植图鉴》,金盆草《中药材手册》

地方名 辽宁:细参,烟袋锅花;山东:大药、铃铛花(崂山);江苏:山人参;江西:马蹄香(安福);河南:山细辛,独叶草。

**功效** 全草:祛风散寒,通窍止痛,温肺化痰。用于风寒感冒,头痛,牙痛,鼻塞鼻渊,风湿痹痛,痰饮喘咳。

**备考** 《神农本草经》所载之细辛,是指华细辛而言。辽细辛之名见于《本草原始》,但最初使用的记载应推《本草经集注》。因陶弘景云“今用东阳、临海者,形段乃好,而辛烈不如华阴、高丽者”。此处所述产于高丽的细辛,当主要指本品而言。

## 7024057

*Asarum himalaicum* Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.

植物名 单叶细辛《中国植志》

药材名 土细辛(陕西、甘肃、宁夏、四川、西藏)

文献名 马蹄细辛《植物名汇》,水细辛《中药

志》,盆草细辛《四川中药志》,石南七细辛《中国经植志》,毛细辛《秦岭植志》,西南细辛《汇编》,南坪细辛《中药材科技》

地方名 细辛(陕西、甘肃、宁夏、四川、西藏);陕西:白细辛,毛叶细辛(陕南、太白山);四川:石南七(华莹山),大字细辛,荇叶细辛(西昌);贵州:土獭蜘蛛香(威宁);西藏:“大弥”(藏名)。

**功效** 全草:祛风散寒,通窍止痛。

## 7024058

*Asarum hypogynum* Hayata

植物名 下花细辛《台湾植志》

**功效** 全草:祛风散寒,止痛。

## 7024059

*Asarum ichangense* C. Y. Cheng et C. S. Yang

植物名 小叶马蹄香《中国植志》

药材名 土细辛(江西、湖南)

文献名 宜昌细辛《汇编》

地方名 细辛(江西、湖南),马蹄香(浙江、江西、湖北、湖南);江西:莲花细辛;湖南:马蹄细辛,红背观音莲,毛细辛,消化草,地葫芦,四两麻;其他:杜衡。

**功效** 全草:祛风散寒,止痛。

## 7024060

*Asarum inflatum* C. Y. Cheng et C. S. Yang

植物名 灯笼细辛《中国植志》

地方名 四川:荇叶细辛(苍溪)。

**功效** 全草:四川苍溪叫荇叶细辛,代细辛入药。

## 7024061

*Asarum infrapurpleum* Hayata --- *Helerotropa infrapurea* (Hayata) Maekawa ex Nemoto

植物名 下紫细辛《中国植志》

文献名 里紫细辛《台湾植志》

**功效** 全草:祛风散寒,止痛。

## 7024062

*Asarum insigne* Diels --- *A. gracilipes* C. S. Yang ex C. F. Liang --- *A. longepedunculatum* O. C. Schmidt

植物名 金耳环《中国植志》

药材名 金耳环(广东、广西)

文献名 瑶山金耳环、长柄金耳环《植分学报》,慈菇叶细辛、纤梗细辛、长梗细辛《汇编》,长细辛《中药志》,长花轴细辛(广州空军《中草》)

地方名 土细辛(湖北、广西、广东),[山慈菇、山茨菇](广东、广西、福建);福建:红底马蹄金、马蹄香(南平);湖北:杜衡,荇叶细辛;广东:野茨菇(连山、阳山);广西:盘龙草、马蹄子(富川),山薯(桂平),山连(贺县),山鸬鹚(苍梧),一块瓦,龙须草(灵川),龙丝,细辛(永福、龙胜),马蹄细辛,小犁头(桂林),“丘尽”(融水侗语),“扁化”(金秀瑶语)。

**功效** 全草:有小毒。温经散寒,祛痰止咳,散瘀消肿。用于风寒咳嗽,哮喘。外用于跌打损伤,毒蛇咬伤。

**备考** 本品具浓烈麻辣味,为广东“跌打万花油”的主要原料之一。

## 7024063

*Asarum longerhizomatosum* C. F. Liang et C. S. Yang

植物名 长茎金耳环《中国植志》

地方名 广西:金耳环(南宁、武鸣、东兴),一块瓦(东兴)。

功效 全草:有小毒。用于风寒咳嗽,哮喘。外用风湿骨痛。

## 7024064

*Asarum macranthum* Hook. f.

植物名 大花细辛《中国植志》

药材名 土细辛(广西)

文献名 [山慈菇]《鉴别手册》,长花细辛《福建植志》,细辛《台湾药植志》

功效 根及全草:用于毒蛇咬伤。

## 7024065

*Asarum magnificum* Tsiang ex C. S. Yang et C. S. Yang

植物名 祁阳细辛《中国植志》

药材名 大细辛《江西药录》

地方名 江西:南细辛;广东:[山慈菇],土细辛。

功效 全草:在浙江和广东部分地区作土细辛入药。

## 7024066

*Asarum magnificum* Tsiang ex C. S. Yang et C. S. Yang

var. *dinghugense* C. Y. Cheng et C. S. Yang

植物名 鼎湖细辛《中国植志》

地方名 广东:[山慈菇](阳江)。

功效 全草:类似祁阳细辛。

## 7024067

*Asarum maximum* Hemsl.

植物名 大叶马蹄香(湖北)、《中国植志》

药材名 大细辛《中药材科技》

文献名 大叶细辛《中药志》

地方名 土细辛(四川、湖北);湖北:马蹄细辛(宜昌);广东:[山慈菇];四川:细辛。

功效 根:镇咳,止痛,并治蛇伤。

备考 《高植图鉴》1:541, 1972“大花细辛”*A. maximum* Hemsl. 系误订,实为 *A. insigne* Diels

## 7024068

*Asarum nanchuanense* C. S. Yang et J. L. Wu

植物名 南川细辛《中国植志》

药材名 土细辛(拟)

地方名 四川:荇叶细辛、山花椒(南川)。

功效 全草:祛风除湿,止痒。

## 7024069

*Asarum petelotii* O. C. Schmidt

植物名 红金耳环《中国植志》

地方名 云南:金耳环(屏边)。

功效 全草:散寒,止咳,消肿。

## 7024070

*Asarum porphyronotum* C. Y. Cheng et C. S. Yang

植物名 紫背细辛《中国植志》

药材名 土细辛(四川)

地方名 四川:花脸王。

功效 全草:驱风寒,治蛇咬伤。

备考 1. 全草在四川灌县作川滇细辛(*A. delavayi* Franch.)用。2. 李时珍曰:“按《土宿本草》云,土细辛叶圆如马蹄,紫背者良,江南荆湖川陕闽广俱有之。”本品叶背色紫,四川有产,“紫背者良”此语,其所指虽非止一种,但由其所言产区而言,可能包括此种。但本种据杨春澍、徐植灵等报告挥发油中含有致癌物质,此点,值得重视,宜作进一步研究。

## 7024071

*Asarum porphyronotum* C. Y. Cheng et C. S. Yang var.

*atrovirens* C. Y. Cheng et C. S. Yang

植物名 深绿细辛《中国植志》

药材名 土细辛《中药材科技》

地方名 四川:川细辛(青城山)。

功效 全草:驱风寒,治蛇咬伤。

## 7024072

*Asarum pulchellum* Hemsl.

植物名 长毛细辛《中国植志》

药材名 乌金草(湖北)

文献名 黑毛细辛《中草药学》,白毛细辛《湖北植志》,美丽细辛《贵州药录》

地方名 毛乌金、牛毛细辛(湖北、四川);四川:土细辛、荇叶细辛(南川),杂细辛,水细辛,毛乌金草,细辛(巫溪、南川、峨眉、灌县);贵州:白三百棒(兴义)。

功效 全草及根:用于胃痛,腹痛,癆伤。

## 7024073

*Asarum renicordatum* C. Y. Cheng et C. S. Yang

植物名 肾叶细辛《中国植志》

地方名 安徽:马蹄香。

功效 全草:祛风散寒,通窍止痛。

## 7024074

*Asarum sagittarioides* C. F. Liang --- *A. thunbergii* auct. non A. Br.

植物名 慈菇叶细辛(拟)

药材名 土金耳环(广西)

文献名 山细辛《药植简编》,粗根细辛《广西植录》,岩慈菇《高植图鉴补编》,山慈菇草《中药材》,〔山慈菇〕《中国植志》

地方名 广西:红金耳环,〔金耳环〕(桂平、玉林),山菇(桂平),细辛(融安、大瑶山),土细辛(蒙山),小辛(藤县),青叶细辛(金秀),盘龙草(富川)。

功效 全草:祛风止痛。用于跌打损伤,毒蛇咬伤。

备考 1. 过去文献常将本种误订为 *A. thunbergii* A. Br. 2. 我国历代本草和现时中药山慈菇,均系兰科植物杜鹃兰(毛慈菇),或百合科植物老鸦瓣(光慈菇)(*Tulipa edulis* Baker),《植分学报》和《中国植志》将本种之植物名定为“山慈菇”实属欠妥。

## 7024075

*Asarum sieboldii* Miq.

植物名 细辛《中国植志》

药材名 细辛《本经》、《药典》

文献名 小辛《本经》，细草《吴普本草》，少辛《纲目》，西细辛《本草原始》，毛番丝、绿须姜《新纲》，华细辛《药典》

地方名 金盆草(湖北、四川)；陕西：白细辛(秦岭)；山东：大药、铃铛花(崂山)；浙江：金钟细辛(临海)，高山泥里花(东天目)；安徽：卧龙丹；江西：土里开花土里谢(庐山)；河南：独叶草；湖北：苕细辛、气辛(神农架)，马蹄香；四川：盆草细辛，大宁细辛，苕叶细辛(武隆)。

功效 带根全草：祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。用于风寒感冒，头痛，牙痛，鼻塞鼻渊，风湿痹痛，痰饮喘咳。

#### 7024076

*Asarum sieboldii* Miq. f. *seoulense* (Nakai) C. Y. Cheng et C. S. Yang --- *Asiasarum heterotropoides* Fr. Schmidt var. *seoulense* (Nakai) Maekawa

植物名 汉城细辛《中国植志》

药材名 细辛《药典》

文献名 毛柄细辛《汇编》，辽细辛《药典》

地方名 吉林：万病草(长白山)。

功效 全草：祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。用于风寒感冒，头痛，牙痛，鼻塞鼻渊，风湿痹痛，痰饮喘咳。

#### 7024077

*Asarum splendens* (Maekawa) C. Y. Cheng et C. S. Yang --- *Asarum chingchengense* C. Y. Cheng et C. S. Yang --- *Asarum maximum* auct. non Hemsl. --- *Asarum blumei* auct. non Duch.

植物名 青城细辛《中国植志》

药材名 花脸细辛《四川中药志》

地方名 苕叶细辛(湖北、四川)，土细辛(湖北、四川、广西)；湖北：马蹄香、大乌金草(神农架)；四川：花叶细辛，花脸猫，花脸王、花侧耳根(巴县)，翻天印，[杜衡]，苦叶细辛；贵州：水马蹄，山花椒，大救驾，三百棒。

功效 全草：有小毒。散寒解毒，祛风止痛，化痰止咳。用于感冒风寒头痛，身痛，风湿痹痛，痰饮喘咳，瘰癧。

备考 有的文献把本种学名误订为 *A. maximum* Hemsl. 也有些误订为 *A. blumei* Duch. 的。

#### 7024078

*Asarum sprengeri* Pamp.

植物名 南漳细辛《湖北植志》

功效 全草：祛风散寒，止痛。

#### 7024079

*Asarum taitonense* Hayata

植物名 大屯细辛《中国植志》

药材名 台东细辛《台湾中药材图鉴》

文献名 本细辛《台湾中药材图鉴》，小花细辛、台东杜衡《台湾药植志》

功效 根、根茎：用于神经痛，腹痛。

#### 7024080

*Asarum wulingense* C. F. Liang

植物名 五岭细辛《中国植志》

药材名 土细辛(湖南、贵州)

地方名 倒插花(湖南、贵州)，山慈菇(广东、湖南)；广西：盘蛇莲(全州)，盘龙草(富川)

功效 根：用于蛇咬伤；全草：用于牙痛。

#### 7024081

*Saruma henryi* Oliv.

植物名 马蹄香《中国植志》

药材名 冷水丹《陕西中草药》

地方名 高脚细辛(陕西、四川)；陕西：[金线草]；湖北：黄花细辛(神农架)；四川：[毛细辛]；贵州：狗肉香。

功效 根、根茎：温中散寒，理气止痛。用于胃寒痛，心前区痛，关节痛；鲜叶：外用于疮疡。

备考 《中国植志》误以本品为《唐本草》之马蹄香，按《唐本草》是以马蹄香为杜衡之别名，但非指本种而言。

### 7027 猪笼草科 Nepenthaceae

#### 7027001

*Nepenthes mirabilis* (Lour.) Druce --- *Phyllamphora mirabilis* Lour.

植物名 猪笼草《英萃龙府》、《中国植志》

药材名 猪笼草《汇编》

文献名 猴子笼《汇编》

地方名 广东：猪仔笼(广州、惠阳)，担水桶(惠阳)，雷公瓶(湛江)，鬼尿桶(阳春)；海南：猴子埕，公仔瓶，雷公壶，石兰；广西：捕虫草(陆川)，伯公担水桶(陆川、北流)。

功效 全草：清热止咳，利尿，降压。用于风热咳嗽，肺燥咯血，百日咳，尿路结石，糖尿病，高血压病。

### 7028 胡椒科 Piperaceae

#### 7028001

*Peperomia cavaleriei* C. DC.

植物名 硬毛草胡椒《中国植志》

药材名 硬毛草胡椒《广西药录》

地方名 广西：指甲草(靖西)。

功效 全草：用于皮肤湿疹。

#### 7028002

*Peperomia dindygulensis* Miq.

植物名 石蝉草《中国植志》

药材名 石蝉草《汇编》

地方名 散血丹(广西、云南)；福建：石含铃(长寿)，石松舅(漳州)，菱草(福州)，猪母苋(泉州)，痢草(永春)，耳坠草(长乐)；广西：火伤叶(天等)，火伤草，胡椒草(凌云)，肥积草，石瓜子(龙州)，三叶稔(融安)；云南：豆瓣七、豆瓣绿、石马菜、红豆瓣(思茅)，散血胆，地石榴。

功效 全草：清热化痰，利尿消肿，祛瘀散结。用于支气管炎，哮喘，肺结核，肾炎，水肿，胃癌，食道癌。外用于跌打损伤，烧、烫伤，痈肿疮疖。

#### 7028003

*Peperomia duclouxii* C. DC.

植物名 短穗草胡椒《中国植志》

药材名 短穗草胡椒《新华本草纲要》

地方名 云南:豆瓣绿。

功效 全草:用于风湿性关节炎,跌打损伤,支气管炎等。

## 7028004

*Peperomia heyneana* Miq.

植物名 蒙自草胡椒《中国植志》

药材名 散血丹《汇编》

文献名 狗骨豆瓣绿《汇编》,海尼豆瓣绿《中药大辞典》,蒙自豆瓣绿《云南种录》

地方名 狗骨头(广西、云南);云南:去死回生(文山)。

功效 全草:散瘀止血。用于胃出血,鼻衄。

## 7028005

*Peperomia pellucida* (L.) Kunth

植物名 草胡椒《中国植志》

药材名 草胡椒《广西本草选编》

文献名 透明草《云南种录》

地方名 广西:豆瓣绿。

功效 全草:散瘀止血。用于跌打肿痛,外伤出血,烧烫伤。

## 7028006

*Peperomia tetraphylla* (Forst. f.) Hook. et Arn. --- *P. reflexa* (L. f.) A. Dietr.

植物名 豆瓣绿《中国植志》

药材名 豆瓣绿《名实图考》、《汇编》

文献名 豆瓣鹿衔草《名实图考》,四瓣金钗《汇编》

地方名 岩豆瓣(广西、云南),小四块瓦、一柱香、岩花(四川、云南);广西:三花草(那坡),三四叶,大疳药(罗城),胡椒草(凌云、乐业),瓜子草、石苋菜、狗猎散(龙州),豆瓣菜,晒不死,圆叶瓜子菜;四川:岩筋草、石还魂(峨眉山),佛座草,椒草(西昌);贵州:瓜子鹿衔,瓜子细辛,岩石莲;云南:豆瓣如意草、豆瓣如意(昆明、红河),豆瓣打不死、豆瓣草、四块瓦、“客阶”、指甲草(红河),石上开花(玉溪),石上瓦浆(大理),草椒,三年草(文山)。

功效 全草:祛风除湿,止咳祛痰,活血止痛。用于风湿筋骨疼痛,肺结核,支气管炎,哮喘,百日咳,肺脓疡,小儿疳积,痛经。外用于跌打损伤,骨折。

## 7028007

*Peperomia tetraphylla* (Forst. f.) Hook. et Arn. var. *sinensis* (C. DC.) P. S. Chen et P. C. Zhu

植物名 毛叶豆瓣绿《中国植志》

药材名 毛叶豆瓣绿《新华本草纲要》

功效 全草:用于风湿性关节炎,跌打损伤,支气管炎等。

## 7028008

*Piper arboricola* C. DC.

植物名 小叶爬崖香(台湾)、《中国植志》

地方名 广西:小毛茛,十八风藤(桂平)。

功效 全株:止痛,健胃,祛痰。

## 7028009

*Piper austrosinense* Tseng

植物名 华南胡椒《中国植志》

药材名 华南胡椒《广西药录》

文献名 弯穗茛《高植图鉴》

地方名 广西:山茛(防城)。

功效 全草:消肿止痛。用于牙痛,跌打损伤。

## 7028010

*Piper berle* L.

植物名 萎叶《中国植志》

药材名 茛蒿《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 枸酱《汉书》,葍子《广志》,浮留藤《唐本草》,土华菱《食疗本草》,扶留、扶留藤、扶恶土、萎藤《纲目》,葍叶《本经逢原》,梧叶、萎油、萎叶油《纲目拾遗》,萎子《名实图考》,荖叶《闽书南产志》,大毕拔《成都县志》,青荖叶《岭南采药录》

地方名 青葍、萎苣(广东、广西);台湾:荖藤,荖草,大风藤,土荖藤;广东:青荖,香荖,葍苣、槟榔葍(岭南);广西:槟榔荖(北海);云南:芦子,“黑摆”(西双版纳傣语),大芦子。

功效 果穗(茛蒿):温中,下气,散结,消痰。用于心腹冷痛,吐泻,虫痛,咳逆上气;叶:祛风燥湿,杀虫止痒。用于风寒咳嗽,胃痛,风毒脚气,疥癬,脚癣,烫伤;叶油(蒸馏所得芳香油):外用于手足肿痛,耳痛,刀伤,背痈,疖毒,杨梅疮,痔漏。

## 7028011

*Piper boehmeriaefolium* (Miq.) C. DC. --- *Chavica boehmeriaefolia* Miq.

植物名 荖叶葍《中国植志》

药材名 芦子兰《汇编》

文献名 荖叶山葍《中药大辞典》,葍麻叶胡椒《汇编》

地方名 广东:山箕,假山茛藤;广西:荖叶葵,野胡椒,大肠风;云南:叶子兰、芦子藤、大麻疙瘩、小麻疙瘩、野荖(思茅),小麻叶(西双版纳),“牙说痒”(西双版纳傣语),歪叶子兰。

功效 全株:祛风散寒,理气止痛。用于感冒,胃痛,痛经,跌打损伤,风湿骨痛。

## 7028012

*Piper boehmeriaefolium* (Miq.) C. DC. var. *tonkinense* C. DC.

植物名 光轴荖叶葍《中国植志》

药材名 十八症(广西、广东、云南)

文献名 光轴荖葍《中药大辞典》

地方名 广西:大肠风(武鸣),石条花(宾阳);云南:歪叶子兰,小麻疙瘩。

功效 根、全株:祛风除寒,去瘀止痛。用于感冒,风湿筋骨痛,痛经,闭经,胃寒疼痛。外用于毒蛇、蜈蚣咬伤。

## 7028013

*Piper bonii* C. DC.

植物名 覆毛胡椒《中国植志》  
 药材名 覆毛胡椒《广西药录》  
 功效 全草：祛风除湿。用于跌打损伤。

## 7028014

*Piper cubeba* L.f.

植物名 草澄茄《品种论述》  
 药材名 毕澄茄《雷公炮炙论》  
 文献名 澄茄《海药本草》，毗陵茄子《开宝本草》，毕茄《本草求真》

功效 果实：温暖脾肾，健胃消食。用于食积气胀，脘腹冷痛，反胃呕吐，肠鸣泄泻，痢疾，痰癖。

备考 本种分布于印尼、马来西亚及印度等地。古本草之草澄茄应为此种，但现时国内市售之草澄茄多为樟科山鸡椒 *Litsea cubeba* (Lour.) Pers. 的果实。

## 7028015

*Piper hainanense* Hemsl.

植物名 海南蒟《中国植志》  
 药材名 海南蒟《汇编》  
 地方名 海南：山胡椒；广西：海南蒟，上树胡椒（邕宁）。

功效 全株、根：祛风除湿，健胃止痛。用于风湿关节痛，消化不良，胃痛，腹胀。外用于慢性溃疡，湿疹。

## 7028016

*Piper hancei* Maxim. --- *P. matthewii* Dunn

植物名 山蒟《中国植志》  
 药材名 山蒟《广州部队《中草药》》  
 文献名 两广蒟《广西植录》，绿藤《汇编》，标蒟《药植简编》

地方名 石南藤（浙江、福建、广东、广西、湖南、云南），山蒟（广东、广西、云南），海风藤（浙江、福建、湖南），南藤（江西、华南），风藤（广东、广西、福建），小风藤（广东、浙江）；江西：香藤；福建：臭荖藤（南靖）；广东：酒饼藤（连平），也侧苗（始兴），山姜，血姜（化县），山荖叶（潮阳），山男藤，水荖，钻骨风，上树蛇，见风追，过节风，千节风，细样山蒟藤，藤兰，抱蛇，假草荖，满天香，三角枫（乳源瑶族）；广西：石蒟，爬岩香，廿四症（昭平），上树风，辣椒姜（博白），穿壁风（玉林），上木瓜荖，落地金钱（平南），山乌龟（阳朔），爬岩鸡（乐业），野荖藤，山荖藤，红花吊刀竹（钟山），双头棍（藤县）；云南：细芦子、小麻药（红河），“寒诺那比”（楚雄彝名），寸香，风气药，芦藤。

功效 茎叶：祛风湿，强腰膝。用于风湿痛，风寒骨痛，腰膝无力，肌肉萎缩，咳嗽气喘。

## 7028017

*Piper kadsura* (Choisy) Ohwi --- *Piper futo-kadsura* Sieb. et Zucc.

植物名 风藤（台湾）、《中国植志》  
 药材名 海风藤《本草再新》、《药典》  
 文献名 石南藤、石南叶、搜山虎《滇南本草》，南藤《满鲜植汇》，巴岩香《中药志》，本草拔《台湾中药材图鉴》，细叶青荖藤《高植图鉴》

地方名 上海：[清风藤]；浙江：满坑香（泰顺、云和）；台湾：荖藤，大风藤，大风陈，真风藤，山荖叶，风陈，爬岩香；贵州：岩胡椒；云南：野杜衡，小雀藤。

功效 藤茎：祛风湿，通经络，止痹痛。用于风寒湿痹，肢节疼痛，筋脉拘挛屈伸不利。

## 7028018

*Piper kawakamii* Hayata

植物名 恒春胡椒《中国植志》  
 文献名 川上氏爬岩香、川上氏荖叶《台湾药植志》  
 地方名 台湾：善仔荖叶，恒春风藤。  
 功效 叶：用于腹痛。

## 7028019

*Piper laetispicum* C. DC.

植物名 大叶蒟《中国植志》  
 药材名 大叶蒟《广西药园药录》  
 地方名 海南：野胡椒，山胡椒；广西：小肠风（邕宁）。

功效 全株：祛风消肿，活血通经，温中散寒。用于风湿，跌打损伤，蛇咬伤，牙痛，痛经，胃痛，流感，感冒。

## 7028020

*Piper longum* L.

植物名 草拔《酉阳杂俎》、《中国植志》  
 药材名 毕菱《开宝本草》，《药典》，草荖根《本草拾遗》，《中药大辞典》  
 文献名 阿梨诃陀《酉阳杂俎》，毕勃《本草拾遗》，遍拔《扶南传》，堪圣（侯宁极《药谱》），蛤蒟《赤雅》，毕菱《大明会典》，鼠尾《中药志》，必拔《和汉药标本目录》  
 地方名 天津：必不；云南：“丽拔”（西双版纳傣语）；西藏：“毕毕灵”（藏名）。

功效 果穗：温中散寒，下气止痛。用于脘腹冷痛，呕吐，泄泻。外用于牙痛，偏头痛；根：用于五癆七伤，阴汗，寒疝核肿，妇人内冷无子等。

## 7028021

*Piper martinii* C. DC.

植物名 毛山蒟《中国植志》  
 文献名 马丁胡椒《广西药录》  
 地方名 广西：石南藤（苍梧、藤县、博白、桂林），石蒟（北流），表藤（富川），假荖藤（龙州）；贵州：爬岩香。  
 功效 全株：用于风湿，跌打损伤，肿痛，关节痛，疳积。

## 7028022

*Piper mullesua* D. Don

植物名 短蒟（海南）、《中国植志》  
 地方名 云南：扭子跌打、细芦子藤、细蒟子藤（思茅），九节风，芦子藤。  
 功效 全株：舒筋活络，散瘀消肿，止血止痛。用于风湿性关节炎，四肢麻木，骨折，跌打损伤。

## 7028023

*Piper mutabile* C. DC.

植物名 变叶胡椒《中国植志》  
 药材名 变叶胡椒《广西药录》

功效 全草：祛风消肿。用于跌打损伤。

#### 7028024

*Piper nigrum* L.

植物名 胡椒《唐本草》、《中国植志》

药材名 黑胡椒《药典》

文献名 味履支《酉阳杂俎》，浮椒《东医宝鉴》，玉椒《通雅》，章木椒《新纲》，古月《药材学》

地方名 安徽：黑川，白川；浙江：黑古月，白古月；广西：白胡椒，黑胡椒，白胡椒；四川：“波洼热”（若尔盖藏名）；云南：“麻拔因”（西双版纳傣语）；西藏：“普烈”（藏名）。

功效 果实：温中散寒，下气，消痰。用于胃寒呕吐，腹痛泄泻，食欲不振，癫痫痰多；根：用于脚气，发痧，心腹寒痛，呕吐，泄泻，寒疝。

#### 7028025

*Piper paepuloides* Roxb.

植物名 芦子藤《汇编》

药材名 芦子《汇编》

文献名 短序柄胡椒《红河中草药》

地方名 云南：九节风、芦子疙瘩、细麻药（红河），细芦子藤（思茅）。

功效 全株：温中散寒，活络止痛，解表消肿。用于感冒咳嗽，跌打损伤，风湿骨痛，胃痛，腹胀痛，月经不调，痛经，产后腹痛，牙痛，毒蛇咬伤，外伤出血。外用于骨折，烫伤，疮毒，乳腺炎。

#### 7028026

*Piper puberulilimbum* C. DC.

植物名 毛叶胡椒《中国植志》

文献名 毛叶野姜《云南种录》，玉溪天仙藤《汇编》

地方名 云南：石南藤，绒毛胡椒。

功效 全草：祛风除湿，止痛。用于胃痛，风湿关节痛，跌打损伤。

#### 7028027

*Piper puberulum* (Benth.) Maxim.

植物名 毛蒟《中国植志》

药材名 毛蒟《汇编》

文献名 石蒟《汇编》，绒毛胡椒《中药大辞典》

地方名 浙江：海风藤；四川：石南藤，南藤（峨眉山），爬岩香（南川）；广西：山蒟、假山蒟、假蒟藤、假鸡（龙州），上石伞（天叶），大麻散（大新），老虎散（那坡），土羌活（靖西），小墙风（凌云），软筋藤，小毛蒟，小毛蒟（百色）；云南：色此（红河），野芦子。

功效 全株：祛风活血，行气止痛。用于风湿性腰腿痛，跌打损伤，胃腹疼痛，产后风痛。

#### 7028028

*Piper pubicatum* C. DC.

植物名 岩参《中国植志》

文献名 岩生《新华本草纲要》

地方名 云南：山蒟。

功效 茎：健胃，消炎，镇痛。用于胃肠炎，胃溃疡，痢疾，牙痛。

#### 7028029

*Piper retrofractum* Vahl --- *Piper officinarum* (Miq.) C.

DC.

植物名 假蒟《中国植志》

文献名 爪哇长果胡椒《台湾药植志》，蒟蒻（徐、赵《生药》）

功效 果实：用于头痛，鼻渊，疝痛，胃肠气胀。

备考 本品主产东南亚国家，我国广州和台湾有栽培。

#### 7028030

*Piper sarmentosum* Roxb.

植物名 假蒟《中国植志》

药材名 假蒟《生草药性备要》、《中药大辞典》

文献名 蛤蒟、酸苦瓜、封口好《生草药性备要》，假蒟、蛤老《岭南采药录》，假蒟果穗《中药大辞典》

地方名 青蒟（广东、广西），猪拔菜（海南、云南）；广东：假绿野、称星根、[毕拔]（英德），假蒟花，异品毕拔（广州），臭蒟（潮安），碧卜蒟，迫博蒟，蒟拔蒟，[南蒟]，臭蒟，不拨子，鹤蒟，山蒟蒻草，结句草，细叶青蒟藤；海南：猪蒟菜，八盆菜（定安）；广西：假蒟（平南、博白），假蒟叶（梧州、龙州），蛤蒟、蒟蒻（北流、玉林），山蒟（北流），大柄蒟、马路蒟（平南），[毕拔]（贵县），蒟蒻藤（平南），巴岩香（凤山），蒟草，广蒟香（乐业），八菜（那坡），蛤蒟蒻（贵县），白鱼蓼，青蒟；贵州：爬岩香，风气藤；云南：小芦子（红河），芦子藤，钻骨风（思茅），钻地风，毕拔菜，蒟拔子，叶子藤，叶子兰。

功效 根：用于疟疾，脚气，牙痛，痔疮；叶：温中，行气，祛风，消肿。用于胃寒痛，腹痛气胀，风湿腰痛，产后气虚脚肿，跌打肿痛，外伤出血；果穗：温中暖胃，驱风行气。用于腹胀腹痛，肠炎腹泻，食欲不振，肾炎水肿，风湿痛。

#### 7028031

*Piper szemaocense* C. DC.

植物名 思茅胡椒《中国植志》

文献名 思茅野姜《云南种录》

地方名 云南：芦子藤。

功效 叶：外用于骨折。

#### 7028032

*Piper wallichii* (Miq.) Hand.-Mazz. --- *Piper aurantiacum* Wall. ex C. DC. --- *Piper wallichii* (Miq.) Hand.-Mazz. var. *hupehense* (C. DC.) Hand.-Mazz. --- *P. henryi* C. DC.

植物名 石南藤（四川、湖南）、《中国植志》

药材名 石南藤《图经》、《汇编》

文献名 南蒟《开宝本草》，丁父、丁公寄《别录》，丁公藤《本草拾遗》，风蒟《纲目》，蓝蒟《名实图考》，湖北胡椒、橙黄色胡椒《中药大辞典》

地方名 海风藤（福建、湖北），石楠藤（湖北、湖南、四川），爬岩香（湖北、四川）；福建：臭风藤（泉州）；湖北：岩清香、巴岩香、赶山鞭、铁栏杆（巴东）；广东：细叶青竹蛇、山蒟、石委藤、三角风（粤北），石蒟藤；广西：大麻散（大新），落地金钱（平南）；四川：岩叶枫（峨眉），软筋藤（西昌）；贵州：寸香。

功效 茎、叶或全株：祛风湿，强腰膝，镇痛，止咳。

用于风湿痹痛,腰膝无力,痛经,风寒感冒,咳嗽气喘。

#### 7028033

*Piper yunnanense* Tseng

植物名 蒟子(云南)、《中国植志》

地方名 云南:大麻疙瘩(景谷),芦子兰,叶子兰,芦子藤。

功效 茎叶:祛风散寒,舒筋活络,散瘀止痛。用于流感,胃痛,痛经,跌打损伤,风湿骨痛。

#### 7028034

*Zippelia begoniaefolia* Blume

植物名 齐头绒《中国植志》

地方名 广西:山菱;云南:野胡椒(河口),藤子毕拔。

功效 全株:祛风湿,行气止痛。外用于风湿,跌打损伤。

### 7029 三白草科 Saururaceae

#### 7029001

*Gymnotheca chinensis* Decne.

植物名 裸蒴《中国植志》

药材名 百步还魂《广西《园林药录》》

文献名 百部还魂《广西中药志》

地方名 湖南:裸蒴,摘耳荷;广西:上细辛(南宁),还魂草,狗笠耳,水百步还魂草

功效 全草:祛风活血,解毒消肿。用于跌打内伤,风湿,慢性痢疾。外用于乳腺炎,蜈蚣咬伤。

#### 7029002

*Gymnotheca involucrata* Pei

植物名 白苞裸蒴《中国植志》

药材名 水折耳《贵州民间药物》

文献名 白折耳、圆叶蕺菜《药植简编》,总苞裸蒴《中药大辞典》

地方名 四川:白侧耳根(峨眉),白猪鼻孔。

功效 全草:用于肺癆咳嗽,跌打损伤,腹胀水肿,白带,白浊。

#### 7029003

*Houttuynia cordata* Thunb.

植物名 蕺菜《唐本草》、《中国植志》

药材名 鱼腥草《履巉岩本草》、《药典》

文献名 岑草《吴越春秋》,蕺《别录》,菹菜《唐本草》,紫背鱼腥草《履巉岩本草》,紫蕺《救急易方》,鱼腥草苗子《纲目》,臭猪巢《医林纂要》,侧耳根《遵义府志》,猪鼻孔《天宝本草》,九节莲《岭南采药录》,重药《现代实用中药》,鱼鳞草《汇编》

地方名 [臭灵丹]、佛耳菜(湖南、广东),狗耳腥(湖南、广西),臭菜(浙江、广东、广西),臭草(上海、浙江、江西),狗腥草(陕西、湖北),猪母耳、猪姆耳(福建、广东),狗折耳、九节耳、狗贴耳、猪贴耳(江西、广东),[肺形草](福建、贵州);陕西:泽儿根,拆耳根,足根;甘肃:狗腥根,腥气草;江苏:脚臭草;上海:鸡心草,鸡虱草,鸡药草;浙江:结义梗(昌化),臭耳朵草(东天目),臭根草(淳安),臭猪草(开化),臭胆味(温州、青田),臭答草(诸暨),红艸草(天台),草扎儿(龙泉、乐清),秋甲鳞

(遂昌),秋打尾,臭质草;江西:臭节草(吉水),臭猪菜(婺源),猪耳朵,猪耳菜(景德镇),足耳根,足耳草,狗子耳,野花麦,猪脚爪;福建:乞曹(明溪),吉茶(宁化、清流),吉朝(三明),竹茶根(大田),竹茶狗、贴草、吉莉朝(永安),[鹅不食](惠安),草撮、红桔朝、臭蕺(闽东),臭腥草(泉州),臭积草,鱼鳞真珠草,鱼鳞腥腺草;河南:狗蝇子草;湖南:奶头草、辣子草、鸡儿根(凤凰),臭芥麦(衡阳),臭牡丹;广东:代刀草(潮安、潮州、澄海),吉耳菜(广州),狗贴木(五华),狗塔耳、蟑螂菜(惠来),狗夹耳(潮阳),[佛耳草](潮汕、新会),鼻血菜(阳山),臭溜(广宁),猪婆耳(南雄);广西:摩臭草(金秀),狗耳菜;四川:翻背红(重庆),翻转红(成都),侧儿根,蕺足根;云南:壁虱菜,[苔叶细辛]。

功效 地上部分:清热解毒,利水消肿。用于肺癆吐脓,痰热咳嗽,热痢,热淋,痈疮肿毒。

#### 7029004

*Saururus chinensis* (Lour.) Baill. --- S. loureiri Decne.

植物名 三白草《中国植志》

药材名 三白草《唐本草》、《药典》

文献名 三白根《补缺肘后方》,水木通《纲目拾遗》,百节藕《名实图考长编》,塘边藕《生草药性备要》,地藕《眼科要览》,白舌骨《汇编》

地方名 白二白(江西、湖南、广西),三叶白(浙江、江西、广东),三白头、[白头翁](江苏、浙江),水莲藕、[钻地风]、箭地风(广东、广西),白面菇(广东、广西、云南),白花莲(江西、广东),过塘藕(福建、广东、广西),土玉竹(浙江、福建);陕西:二白根、二白草(太白山),二百草,二百根,三百根;浙江:状元花(潜阳、临安),水竹(缙云),水竹叶、猢猻骨头草(平湖),大水白(嵊县、义乌、浦江),三张白(泰顺、温州、平阳),半叶白(武义),半张叶(金华),白头草(缙云、龙泉),田丁白(泰顺),猢猻草(嘉兴);安徽:天性草,天性草根;江西:九节藕(丰城),白通(庐山),[过山龙](浮梁),过山塘(安远),三点白,水牛草,水九节莲,白叶莲;福建:田三白、白黄脚(闽东),三白莲(福州),乳草(莆田),金芦笋(泉州),旱藕根(永春),五叶白,五路白,白水鸡,白桔朝,白花照水莲;湖北:[接骨丹](神农架);湖南:[青鱼胆](零陵),湖鸡蛋,湖鸡腿、美女腿(长沙),白鱼腥草,双独蛇;广东:水荖(阳江、阳春、惠来、化州、电白),水边兰(五华、清远),水藕叶(花县),[水檳榔](海丰),水蹄(阳春、韶关),白尾刁(英德、翁源、仁化、曲江、增城),白面藕(广州),田基藕(阳山),过水蜈蚣(始兴),鸡台草(潮州),鸡迟风(陆丰),臭荖(揭阳、南澳、潮阳),透地龙(河源),鹅子丰(翁源),鹅掌风(新丰),蛇通管(阳江);海南:水荖(澄迈、禾东、琼中、儋县、琼海),地碎菜;广西:田鸡七(宁明),过塘莲(南宁),钻地龙(北海),水伴深乌(乐业),白莲藕,白面骨;四川:水接骨(重庆);贵州:沟露(荔波)。

功效 块茎:清热解毒,利尿消肿。用于小便不利,淋沥涩痛,白带,尿路感染,肾炎水肿。外用于疮疡肿毒,湿疹。



## 7030 金粟兰科 Chloranthaceae

## 7030001

*Chloranthus elatior* Link. - *Chloranthus officinalis* Blume

植物名 鱼子兰《花经》、《中国植志》

药材名 节节茶《汇编》

文献名 药用金粟兰《中国木本植物属志》, 滇桂金粟兰《广西植志》

地方名 云南: 野珠兰(屏边), 酸叶黑节草、石风节(元江), 九节风(玉溪)。

功效 全株: 通经活络, 散瘀止血。用于感冒, 肾结石, 子宫脱垂, 产后流血, 癫痫, 跌打劳伤, 风湿麻木, 关节炎, 偏头痛。外用用于骨折。

## 7030002

*Chloranthus fortunei* (A. Gray) Solms-Laub.

植物名 丝穗金粟兰《中国植志》

药材名 水晶花《名实图考》

文献名 细穗金粟兰《广西药园药录》, 银线金粟兰《广西植志》

地方名 玉珠兰(华南), 四块瓦(湖北、广西), 银线草(浙江、福建); 山东: 老妈妈花(崂山); 浙江: 四叶对(天目山), 四叶莲; 福建: 四对草(福州); 湖南: 四大金刚, 四大天王; 湖北: 鸟毛七、化血七(宜昌); 广东: 四叶一枝花; 广西: [土细辛] (贵县、武鸣、来宾、百色等), 豆皮香(罗城), [细辛] (玉林), 白开喉箭(凤山), 四子莲。

功效 根、全草: 有小毒。驱风理气, 活血散瘀。用于风湿痹痛, 痢疾, 腹泻, 胃痛, 咳嗽, 干血癆, 跌打损伤, 疮疖肿毒。

备考 《名实图考》“水晶花”有二图, 本品为水晶花附图之二。

## 7030003

*Chloranthus henryi* Hemsl.

植物名 宽叶金粟兰《中国植志》

药材名 四块瓦《草木便方》、《中药大辞典》

文献名 四大天王《草木便方》, 四儿风《分类草药性》, 大叶及己《浙江天目药志》, 长梗金粟兰《广西植志》

地方名 浙江: 四叶对(浙南); 湖北: 四大金刚, 四大瓦块、牛膝草(巴东), 马尾七(鹤峰), 一扫光(恩施), 小牛膝(五峰); 湖南: [土细辛]。

功效 全草和根: 祛风, 除湿, 活血, 散瘀。

## 7030004

*Chloranthus henryi* Hemsl. var. *hupehensis* (Pamp.) K. F. Wu --- *C. hupehensis* Pamp.

植物名 湖北金粟兰《中国植志》

地方名 陕西: 四叶七(镇巴)。

功效 全草: 有毒。祛风胜湿, 活血理气。

## 7030005

*Chloranthus holostegius* (Hand.-Mazz.) Pei et Shan --- *C. fortunei* (A. Gray) Solms-Laub. var. *holostegius* Hand.-Mazz.

植物名 全缘金粟兰《中国植志》

药材名 黑细辛金粟兰(拟)

文献名 西南金粟兰《贵州植志》

地方名 [土细辛] (云南、广西), 四大金刚、四大天王(四川、云南), 四块瓦(广西、四川、云南); 云南: 平头细辛, 四叶金(红河), 黑细辛(思茅), 红线草, 四对叶、四叶细辛(文山); 贵州: 对叶四块瓦。

功效 全草及根: 有小毒。祛风除湿, 消肿止痛。用于感冒, 风湿痛, 淋巴腺炎, 疮痈, 跌打损伤, 骨折。

## 7030006

*Chloranthus japonicus* Sieb. --- *Tricercandra japonica* (Sieb.) Nakai

植物名 银线草《程骢秋水诗抄》、《中国植志》

药材名 银线草《福建民间草药》

文献名 四大天王《名实图考》, 眉扫草《满州植录》, 猪耳细辛, 四叶细辛《满蒙植汇》, 一黄珊《满蒙野卉》, 鬼督邮《中国有毒植物》

地方名 灯笼花(吉林、辽宁), 四叶对(江西、安徽、浙江), 四块瓦(广西、湖南、陕西), 四大金刚(福建、陕西); 吉林: 灯笼草; 辽宁: 分叶芹, 芬叶蒿, 山油菜, 杨梅草, 胡龙眼; 陕西: 四代草(蓝田), 天王七, 四叶七(镇巴、华阴), 白毛七(柞水), 金刚七、拐拐细辛(太白山); 浙江: 接骨四叶对; 福建: 四叶金, 四叶梅, 四对金, 四叶莲, 万根丹(泉州), 四叶剪(霞浦); 湖南: 四季青, 四匹箭(麻阳), 四匹风, 四叶风(淑浦); 广西: [土细辛]。

功效 根及根茎: 有毒。祛风胜湿, 活血理气。用于风湿痛, 劳伤, 感冒, 胃气痛, 经闭, 白带, 跌打损伤, 疖肿。

## 7030007

*Chloranthus multistachys* Pei

植物名 多穗金粟兰《中国植志》

药材名 四叶细辛《中药大辞典》

文献名 四大天王《名实图考》

地方名 四块瓦(陕西、江西、湖北、四川); 陕西: 白毛七(柞水); 江西: 四叶对(吉水、婺源), 四大金刚(婺源), 野猪兰花; 湖北: 四眼牛膝(巴东); 湖南: 红七; 广西: 大四块瓦。

功效 根及全草: 活血散瘀, 祛风解毒。用于跌打骨折, 腰腿痛, 感冒, 白带, 疖肿, 皮肤瘙痒。

## 7030008

*Chloranthus oldhami* Solms-Laub.

植物名 台湾金粟兰《中国植志》

文献名 东南金粟兰《高植图鉴》, 卵苞金粟兰《广西植志》, 四叶莲《台湾药志》

地方名 福建: 四叶金、四对草(福州、闽侯、长乐), 四大金刚, 四叶细辛, 四叶花, 四门天王, 四大天王, 对对剪; 台湾: 台湾及己; 广西: [土细辛], 六块瓦, 四块瓦。

功效 全草: 活血祛瘀, 消肿解毒。用于经闭, 产后瘀血痛, 产后风, 风湿痛, 胃痛, 荨麻疹, 肺病, 背病, 多发性脓肿, 跌打损伤, 脱臼, 毒蛇咬伤。

## 7030009

*Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. et Schult.

植物名 及己《中国植志》

药材名 及己《别录》、《汇编》

文献名 〔獐耳细辛〕《纲目》，四叶细辛、四大金刚《名实图考》，四叶莲《纲目拾遗》，四叶对《高植图鉴》，锯齿粟兰《中国木本植物属志》

地方名 〔土细辛〕(湖南、广东、广西)，四块瓦(安徽、湖北、广西、贵州)，四大天王(安徽、河南、湖南、贵州)，四叶一枝花(安徽、广东)，四叶金(福建、广西)，人参幌子(东北)，老君须(河南、湖南)；浙江：四门天王(尤泉)，四张瓦(洞头)；福建：四大王(光泽)，四对金(古田)，对对剪(福安)；河南：四匹风，土四块瓦(花垣)；湖北：小牛膝，小四块瓦(利川)，马尾七，对叶七，灯台(鹤峰)，一扫光，马尾七灯台；湖南：牛细辛，四叶箭，四叶麻，金薄荷(永顺)；贵州：四儿风，对叶四块瓦。

功效 全株；有毒。舒筋活络，祛风止痛，消肿解毒。用于跌打损伤，风湿腰痛，疔疮肿毒，毒蛇咬伤。

备考 1. 湖南等地曾将及己称为土细辛、牛细辛，充细辛用。及己有毒，功效与细辛不同，不应代用；2. 獐耳细辛为毛茛科 *Hepatica friloba* Chaix, 《纲目》以此作及己的别名，近代植物学工作者沿用也是不适当的。

#### 7030010

*Chloranthus sessilifolius* K. F. Wu

植物名 四川金粟兰《中国植志》

地方名 四川：四块瓦，四大天王，红毛七。

功效 根、根茎：用于跌打损伤。

#### 7030011

*Chloranthus sessilifolius* K. F. Wu var. *austro-sinensis* K. F. Wu

植物名 华南金粟兰《中国植志》

药材名 华南金粟兰《广西药录》

地方名 广西：四块瓦(罗城)。

功效 全草：散瘀活血。用于跌打损伤。

#### 7030012

*Chloranthus spicatus* (Thunb.) Makino

植物名 金粟兰《周之岐树艺书》、《中国植志》

药材名 珠兰《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 真珠兰、鱼子兰《花经》，茶兰《花镜》，鸡爪兰《纲目拾遗》，珍珠兰《药性考》，珠兰根《中药大辞典》

地方名 野珠兰、兰花米(华东)；浙江：兰花子、兰米子(杭州)；福建：鸭脚兰(福州)；台湾：鸡脚兰；广西：大骨兰(天等)，[鸡骨香](南宁)，[米兰]；四川：树兰；云南：“莫滇”(傣语)，叶枝兰(保山)，小疙瘩(思茅)，“洛办洛七”(爱尼语)。

功效 根：有毒。祛风湿，接筋骨。用于感冒，风湿关节疼痛，跌打损伤；茎叶：用于风湿疼痛，痲痹，跌打损伤，刀伤出血。

#### 7030013

*Hedyosmum orientale* Merr. et Chun

植物名 雪香兰《中国植志》

药材名 雪香兰《广西药录》

地方名 广西：吹风散(防城)。

功效 全株：祛风。用于风湿骨痛。

#### 7030014

*Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai --- *Chloranthus glaber* (Thunb.) Makino

植物名 草珊瑚《汝南圃史》、《中国植志》

药材名 肿节风《汇编》

文献名 接骨金粟兰、九节茶、观音茶《生草药性备要》，[接骨木]《名实图考》，九节风《分类草药性》，驳节茶《岭南采药录》，草珠兰《修订增补天宝本草》，光粟兰《中国木本植物属志》，珊瑚《牧野目图》，见肿消、驱骨风《中草药》，竹节草《中国植志》

地方名 九节花(广西、四川)，九节兰、接骨草(福建、湖南)，接骨莲(湖北、广东)，[鸡骨香]、驳骨茶(广东、广西)，肿节香、铁拳头(江西、湖北)，接骨茶(广西、贵州)，骨风消(江西、广西)，嫩头子(陕西、四川)；浙江：野靛(温州、青田)；福建：隔年红、九节红、九节浦、十月红(闽东)，[万年青](将乐)，学士茶(龙溪、南平、宁化)，鸭脚节(大田)，[接骨丹]、[山茶]、半天癩、九节青(诏安)，鸭脚草、驳接兰(清流)，珊瑚花，山牛夕(武平)，野田青(南平)，山南(宁化)，赤紫草，鸡脚节，节菴兰，青藤叶，牛折草，牛膝豆；江西：节节竹，驳接风，接骨香(泰和、德兴)；湖北：肿节花，四叶七，牛膝草，[竹根七](巴东)；湖南：[大威灵仙]，青甲子，[满山香]；广东：[牛膝头](连平)，驳骨兰(惠阳)，蛙节茶(潮安)，鸡爪兰，大节茶，吉贝茶，九节莲，驳节兰，老贼骨；海南：山牛耳青，假山蓝草，驳节连树，竹节茶，藕节兰；广西：鸡膝风，鸡良茶(容县)，[山胡椒]，山栏(苍梧)，山兰根，大力牛(贵县)，[大青]，十八枝枪(玉林)，火星木(桂平)，九节级(贺县)，铁郎伞(南丹)，驳骨消(陆川)，驳骨草(乐业)，[鼠尾草](临桂)，沙青，南天子，虎皮草，鸬鹚茶，节骨茶；四川：[铜脚灵仙](重庆)，[铜灵仙]，[灵仙](南川)，[威灵仙]，铁足大仙；贵州：白野靛，野土靛；云南：鱼子兰，珍珠兰(思茅)，九节草(广南)，叶枝兰，小疙瘩。

功效 全株：抗菌消炎，祛风通络，活血散结。用于肺炎，阑尾炎，急性蜂窝组织炎，风湿痹痛，跌打损伤，骨折，肿瘤。

备考 《名实图考》“接骨木”有二条，第三十八卷之“接骨木”为本种。

#### 7030015

*Sarcandra hainanensis* (Pei) Swamy et Bailey ---

*Chloranthus hainanensis* Pei

植物名 海南草珊瑚《中国植志》

地方名 广东：骨节菜；海南：山牛耳青，驳节连树；广西：山泽兰(梧州)；云南：九节风(屏边)，“汝无糯鸡”(楚雄彝名)，山羊耳，劳伤药，接骨草，大疙瘩。

功效 全草：消肿止痛，通利关节。外用接骨。

### 7032 罂粟科 Papaveraceae

#### 7032001

*Adlumia asiatica* Ohwi

植物名 荷包藤《新华本草纲要》

地方名 合瓣花(东北)。

功效 全草:镇痛。用于各种疼痛。

### 7032002

*Argemone mexicana* L.

植物名 麝香粟《高植图鉴》

文献名 刺罂粟《药植简编》,老鼠筋《台湾药植志》

功效 全株:消炎,止痛,利胆,祛痰,止泻。用于黄疸水肿,缓泻,皮肤病等。

### 7032003

*Chelidonium majus* L. --- *C. majus* L. var. *grandiflorum* DC.

植物名 白屈菜《高植图鉴》

药材名 白屈菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 地黄连、牛金花《植物名汇》,〔胡黄连〕《满洲植录》,白屈菜根、大花白屈菜《中药大辞典》

地方名 山黄连(东北、河北、内蒙古),断肠草(辽宁、北京、甘肃),假黄连(东北),土黄连(东北、河南、山东、山西、青海);辽宁:八步紧,山西瓜;北京:鲜黄连;河北:断肠散;内蒙古:“素图-黄伦”(蒙名);陕西:雄黄草,小野人血草、小人血七(平利),观音草(洋县),〔见肿消〕(柞水、镇巴);安徽:离隔草;河南:水黄草(卢氏);湖北:岩黄连,小血竭;其他:草之王(日名)。

功效 全草:有毒。清热解毒,止痛,止咳。用于胃炎,胃溃疡,腹痛,肠炎,痢疾,黄疸,慢性气管炎,百日咳。外用于水田皮炎,毒虫咬伤;根:破瘀消肿,止血止痛。用于瘀伤瘀血,月经不调,痛经,消化性溃疡病,蛇咬伤。

### 7032004

*Corydalis adrienii* Prain

植物名 美紫堇《高植图鉴补编》

药材名 美丽紫堇《迪庆藏药》

文献名 “玉珠丝瓦”(藏名)《迪庆藏药》

功效 叶或全草:清热。用于流感,传染性热病,潜伏热症,宿热。

### 7032005

*Corydalis adunca* Maxim.

植物名 灰绿黄堇《高植图鉴》

地方名 云南:“师子色巴”(德钦藏名);西藏:“八夏格”(藏名)。

功效 全草:清热解毒,止血。用于退热,止血。

### 7032006

*Corydalis alpestris* C. A. Mey. --- *Corydalis pauciflora* (Steph.) Pers. var. *latiloba* Maxim.

植物名 高山延胡索《迪庆藏药》

药材名 高山延胡索《迪庆藏药》

文献名 少花延胡索《迪庆藏药》,小花紫堇《云南种录》

功效 全草:凉血,止血。用于月经过多,崩漏,鼻衄,淋病。

### 7032007

*Corydalis ambigua* Cham. et Schlecht. --- *C. ambigua*

Cham. et Schlecht. var. *amurensis* Maxim.

植物名 东北延胡索《云南植物研究》

药材名 东北延胡索《汇编》

文献名 延胡索《本草拾遗》,圆叶延胡索《东北药植志》

地方名 山延胡索、土元胡(东北);黑龙江:黑河延胡索;吉林:元胡,玄胡索。

功效 块茎:活血散瘀,理气止痛。用于胃痛,胸腹痛,痢痛,痛经,月经不调,产后瘀血腹痛,跌打损伤。

### 7032008

*Corydalis ambigua* Cham. et Schlecht. f. *lineariloba* (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su

植物名 线裂东北延胡索《云南植物研究》

药材名 东北延胡索(拟)

文献名 狭裂东北延胡索《吉野》,线叶延胡索《东北药植志》,线叶东北延胡索《东北草本植志》

地方名 延胡索、玄胡索(东北)。

功效 块茎:活血散瘀,理气止痛。

### 7032009

*Corydalis ambigua* Cham. et Schlecht. f. *pectinata* (Kom.) Kitag. --- *C. remota* Fisch. var. *pectinata* Kom.

植物名 栉裂东北延胡索《云南植物研究》

药材名 东北延胡索(拟)

文献名 栉叶延胡索《东北药植志》,栉裂叶东北延胡索《中草药》

地方名 延胡索、玄胡索(东北)。

功效 块茎:活血散瘀,理气止痛。

### 7032010

*Corydalis ambigua* (Pall.) Cham. et Schlecht. var. *rotundiloba* Maxim.

植物名 圆裂东北延胡索《高植图鉴补编》

药材名 东北延胡索(拟)

文献名 圆叶东北延胡索《中草药》

地方名 延胡索、玄胡索(东北)。

功效 块茎:活血散瘀,理气止痛。

### 7032011

*Corydalis ambigua* Cham. et Schlecht. f. *dentata* Y. H. Chou

植物名 齿裂东北延胡索《新华本草纲要》

地方名 延胡索(东北)。

功效 块茎:活血散瘀,理气止痛。

### 7032012

*Corydalis ambigua* Cham. et Schlecht. f. *multifida* Y. H. Chou

植物名 多裂东北延胡索《新华本草纲要》

地方名 延胡索(东北)。

功效 块茎:活血散瘀,理气止痛。

### 7032013

*Corydalis appendiculata* Hand. -Mazz.

植物名 小距紫堇《高植图鉴补编》

文献名 小草乌《云南药录》

地方名 云南:〔雪上一枝蒿〕。

功效 根：用于月经不调，止血，散瘀，麻醉。

## 7032014

*Corydalis balansae* Prain

植物名 台湾黄堇《云南植物研究》

药材名 台湾黄堇《中药材》

文献名 黄花地锦苗《名实图考》

地方名 山东：〔黄连〕；浙江：鸡屎草，臭草，臭虫草；广西：黄荷包牡丹，“合艺”（壮语）。

功效 全草：清热，止痛。用于跌打损伤。

## 7032015

*Corydalis balfouriana* Diels

植物名 天葵叶紫堇《迪庆藏药》，苍山紫堇《云南种录》

文献名 “玉珠丝瓦”（藏名）《迪庆藏药》

功效 叶或全草：清热。用于流感，传染性热病，潜伏热症，宿热。

## 7032016

*Corydalis benecincta* W. W. Smith

植物名 囊距紫堇《高植图鉴补编》

药材名 拔德瓦《迪庆藏药》

文献名 美圈紫堇《云南种录》

功效 全草：清疫热。用于瘟疫发烧，流感。

## 7032017

*Corydalis binderae* Fedde ssp. *pseudohamata* (Fedde) Z. Y. Su

植物名 假川北钩距黄堇《迪庆藏药》

药材名 东日丝瓦《迪庆藏药》

功效 地上部分或叶：清热，止渴，消肿。用于诸热，胆热，隐热，火烧伤，瘟病时疫。

## 7032018

*Corydalis bungeana* Turcz.

植物名 地丁紫堇《中药大辞典》

药材名 苦地丁《汇编》

文献名 小草《正仓院药物》，地丁草《高植图鉴》，紫堇《内蒙古中草药》，桃花紫堇《东北药植志》

地方名 紫花地丁（辽宁、河北、内蒙古、山东、北京、山西）；辽宁：草地丁（绥中）；河北：苦丁棵；内蒙古：“呼茶吐·其其格”（蒙名）；山东：小鸡菜、苦丁（烟台）；四川：〔水黄连〕（西昌）。

功效 全草：清热解毒，活血消肿。用于流行性感，上呼吸道感染，支气管炎，急性肾炎，黄疸，肠炎，疔疮肿毒，淋巴结核，眼结膜炎，角膜溃疡。

## 7032019

*Corydalis buschii* Nakai

植物名 东紫堇《东北草本植志》

药材名 东紫堇《长白山植药志》

功效 球茎：镇痛，解痉。用于头痛，痛经，胃肠痉挛痛。

## 7032020

*Corydalis calciola* W. W. Sm.

植物名 灰岩紫堇《云南植物研究》

文献名 丽江马尾黄连、紫堇《云南药录》

功效 根：消炎，解毒。用于痢疾。

## 7032021

*Corydalis campulicarpa* Hayata

植物名 台东紫堇《台湾药植志》

功效 根：镇痛

## 7032022

*Corydalis cashmeriana* Royle var. *ecristata* Prain

植物名 无冠克什米尔紫堇《西藏植志》

地方名 西藏：“雀子郡”（藏名）。

功效 全草：止血。用于刀伤，枪伤出血。

## 7032023

*Corydalis cheilanthifolia* Hemsl.

植物名 碎米蕨叶黄堇《高植图鉴补编》

文献名 地黄连《湖北植志》

地方名 四川：地白子（巫溪）。

功效 根：清热解毒，泻火。

## 7032024

*Corydalis chrysosphaera* Marq. et Airy-Shaw

植物名 金球黄堇《西藏植志》

地方名 西藏：“东丝儿”（藏名）。

功效 全草：解热止痛。用于胃炎，溃疡病，痢疾，坐骨神经痛。

## 7032025

*Corydalis conspersa* Maxim.

植物名 斑花黄堇《云南植物研究》

文献名 密花黄堇《高植图鉴补编》

地方名 西藏：“曲冬欧嘎”（藏名）。

功效 全草：有毒。清热解毒，杀虫。用于水肿，退热。外用治疥癣。

## 7032026

*Corydalis crispa* Prain

植物名 皱波黄堇《西藏植志》

地方名 西藏：“隆恩”（藏名）。

功效 全草：清热解毒，消肿镇痛，止血。用于四肢疼痛，水肿，解毒，止血。

## 7032027

*Corydalis curviflora* Maxim.

植物名 曲花紫堇《云南植物研究》

文献名 弯花紫堇《高植图鉴》，秦岭弯花紫堇《秦岭植志》

地方名 甘肃：“玉周丝哇”（夏河藏语）；青海：“恰布子子巧”（藏名）。

功效 全草：止血。用于鼻衄及月经过多。

## 7032028

*Corydalis curviflora* Maxim. var. *rosthornii* Fedde

植物名 具爪曲花紫堇《西藏植志》

地方名 西藏：“雀仔却”（藏名）。

功效 全草：清热解毒。用于止血，退热。

## 7032029

*Corydalis dasyptera* Maxim.

植物名 迭裂黄堇《高植图鉴》

文献名 “格周”（藏名）《青藏药图》

地方名 青海:〔黄连〕(门源);四川:“东日色尔瓦”、“塞尔吉”(若尔盖藏名)。

功效 全草;有毒。用于肠胃病,感冒;花、根:解热,镇痛,消炎。

#### 7032030

*Corydalis dasyptera* Maxim. var. *tenuiflora* C. Y. Wu et T. Y. Shu

植物名 细花达裂黄堇《新华本草纲要》

地方名 西藏:“降恩”、“寸冬欧需”(藏名)。

功效 全草;清热解毒,消肿镇痛。用于骨折,跌打损伤。

#### 7032031

*Corydalis davidii* Franch.

植物名 南黄紫堇《高植图鉴补编》

地方名 湖北:啄木冠草(神农架);四川:老龙草,上黄芩,黄断肠草。

功效 带根全草:清热,解毒,镇痛。用于骨折,跌打损伤,痢肿,无名肿毒。

#### 7032032

*Corydalis decumbens* (Thunb.) Pers. --- *C. amabilis* Migo

植物名 伏生紫堇《高植图鉴》

药材名 夏天无(江西)、《药典》

文献名 一粒金丹、洞里神仙、野延胡、飞来牡丹《百草镜》,无柄紫堇《浙江药植志》,伏延胡索、日本延胡索、延胡索《台湾药植志》

地方名 土元胡(江苏、安徽);江西:土玄胡,夏无踪,炮竹花(庐山),落水珠。

功效 块茎:行气活血,通络止痛。用于高血压偏瘫,小儿麻痹后遗症,坐骨神经痛,风湿性关节炎,跌扑损伤。

#### 7032033

*Corydalis delavayi* Franch.

植物名 苍山紫堇《高植图鉴补编》

文献名 丽江紫堇《高植图鉴》

地方名 云南:〔马尾黄连〕。

功效 根茎:镇痛,用于骨折,跌打损伤。

#### 7032034

*Corydalis delphinoides* Fedde

植物名 飞燕黄堇《云南种录》

药材名 翠雀状黄堇《迪庆藏药》

文献名 副品帕夏嘎《迪庆藏药》

功效 地上部分:清热解毒。用于肝、胆及血分实热,血热引起的疼痛。

#### 7032035

*Corydalis densispica* C. Y. Wu

植物名 密穗黄堇《西藏植志》

功效 全草;有毒。解毒,杀虫。用于退热。外用于顽癣,牛皮癣,疮毒,毒蛇咬伤。

#### 7032036

*Corydalis denuclato-bractenta* Fedde

植物名 伪苞黄堇《西藏植志》

地方名 西藏:“隆恩”、“银瑞”、“爪商”(藏名)。

功效 全草;清热解毒,消肿止痛。用于肺炎,四肢疼痛,水肿。

#### 7032037

*Corydalis edulis* Maxim.

植物名 紫堇《高植图鉴》

药材名 紫堇《图经》、《汇编》

文献名 楚葵、蜀莓、苔菜、水卜菜《图经》,赤芹、紫芹、起贫草《轩辕述宝藏论》,紫苞根《安徽中草药》,紫堇花《中药大辞典》

地方名 断肠草、闷头花(陕西、四川);河北:〔山黄连〕;陕西:蝎子花(城固、安康、柞水),麦黄草(柞水);安徽:鹰嘴草,野芹菜,虾子草,粪桶草;河南:〔水黄连〕;湖北:牛尿草(竹溪);四川:羊不吃(峨眉山);贵州:野花生(兴义);云南:“莽之多七”(楚雄彝名),乳苦草。

功效 根或全草;有毒。清热解暑。用于中暑头痛,腹痛,尿痛,肺结核咯血。外用于化脓性中耳炎,脱肛,疮疡肿毒,蛇咬伤;花:用于脱肛;根:用于顽癣,牛皮癣,疮疖肿毒,毒蛇咬伤。

#### 7032038

*Corydalis fangshanensis* W. T. Wang ined.

植物名 房山紫堇《北京植志》

药材名 石黄连《新华本草纲要》

地方名 河北:石连,土黄连。

功效 根:清热下火。用于疮毒,退热等。

#### 7032039

*Corydalis flavifibrillosa* C. Y. Wu ined.

植物名 四川黄花草(拟)

地方名 四川:断肠草(茂汶)、黄花草。

功效 全草:清热解毒。用于热性病,清热降火等。

#### 7032040

*Corydalis fumariaefolia* Maxim. --- *C. remota* Fisch. ex Maxim. var. *fumariaefolia* Kom. --- *C. ambigua* Cham. et Schlecht. f. *fumariaefolia* (Maxim.) Kitag.

植物名 堇叶延胡索《云南植物研究》

文献名 延胡索《安徽中草药》

地方名 安徽:玄胡,元胡。

功效 块茎:行气,活血,止痛。用于脘腹疼痛,血滞痛经,头痛,小儿非嵌顿性疝,脑血管意外所致偏瘫。

#### 7032041

*Corydalis fumariaefolia* Maxim. var. *incisa* Pop. --- *C. turtchaninovii* Bess. f. *fumariaefolia* (Maxim.) Y. H. Chou

植物名 栉苞堇叶延胡索《云南植物研究》

文献名 堇叶齿瓣延胡索《东北草本植志》

功效 块茎:活血散瘀,理气止痛。

#### 7032042

*Corydalis gigantea* Trautv. et Mey.

植物名 巨紫堇《东北草本植志》

文献名 黑水巨紫堇《东检》

功效 地上茎及根茎:镇痛。

#### 7032043

*Corydalis glaucescens* Regel

植物名 灰叶延胡索《高植图鉴补编》

药材名 新疆延胡索(拟)

文献名 西延胡索《本草原始》, 新疆元胡《新疆药植志》, 粉绿延胡索《汇编》, 玄胡、玄胡索《中草药通讯》

地方名 新疆: “塔格地尼”(维名), 元胡, 延胡索。

功效 块茎: 行气止痛, 活血散瘀。用于行经腹痛, 胃疼, 神经性疼痛, 疝气痛, 腰痛。

## 7032044

*Corydalis gracillima* C. Y. Wu --- *C. gracilis* Franch. auct. non Le

植物名 纤细黄堇《高植图鉴补编》

文献名 小黄断肠草《四川中药志》

功效 全草: 有毒。清热解暑, 利尿杀虫。用于肺病咳血, 小儿惊风, 止痢止血, 暑热泻痢, 湿热黄疸, 肿毒, 目赤。外用于疥癣, 疮毒, 毒蛇咬伤等。

## 7032045

*Corydalis hamata* Franch.

植物名 钩距黄堇《西藏植志》

地方名 西藏: “都力色布”(芒康藏名), “都拉色布”(藏名)。

功效 全草: 清热, 止血。用于退热, 止血等。

## 7032046

*Corydalis hemidicentra* Hand. -Mazz.

植物名 三叶紫堇《高植图鉴》

药材名 三叶紫堇《迪庆藏药》

文献名 “菟德瓦”(藏名)《迪庆藏药》, 半荷包紫堇《云南种录》

功效 全草: 清疫热。用于瘟疫发烧, 流感。

## 7032047

*Corydalis hendersonii* Hemsl. --- *C. nepalensis* Kitam-ura

植物名 尼泊尔黄堇《高植图鉴》

地方名 西藏: “日棍”(藏名)。

功效 根: 清热解暑, 凉血。用于热症, 高血压。

## 7032048

*Corydalis heterocarpa* Sieb. et Zucc. --- *C. platycarpa* Makino

植物名 宽果紫堇《新华本草纲要》

功效 全草: 有毒。收敛, 消肿, 止痒。用于疮毒, 顽癣, 带状疱疹。

## 7032049

*Corydalis humosa* Migo

植物名 土元胡《云南植物研究》

药材名 土元胡《江苏植药志》

文献名 上延胡《中药大辞典》, 元胡《中药志》

地方名 延胡索(山东、河南); 江苏: 苏延胡, 玄胡(睢宁、云台山)。

功效 块茎: 行气止痛, 活血散瘀。

## 7032050

*Corydalis impatiens* (Pall.) Fisch.

植物名 赛北紫堇《高植图鉴》

地方名 四川: 断肠草。

功效 全草: 清热解暑。用于肿痛, 疥癣疮毒, 蛇咬伤, 刀伤; 根: 止痛。

## 7032051

*Corydalis incisa* (Thunb.) Pers.

植物名 刻叶紫堇《高植图鉴》

药材名 紫花鱼灯草《浙江天目药志》

文献名 地锦苗《救荒本草》, 天奎草《名实图考》, 断肠草《草木便方》, 刻裂紫堇《四川中药志》, 裂包紫堇《江西草药》, 川断肠草《中草药学》, 黄花地锦苗《汇编》

地方名 浙江: 烫伤草; 四川: 金山急性子, 羊不吃。

功效 全草: 有毒。解毒杀虫。用于疮毒, 癞痢头, 顽癣, 毒蛇咬伤。

## 7032052

*Corydalis kianschouensis* Poeller.

植物名 山东延胡索《中药材科技》

地方名 山东: 土元胡。

功效 块茎: 行气止痛, 活血散瘀。

## 7032053

*Corydalis kingii* Prain

植物名 帕里紫堇《西藏植志》

地方名 西藏: “介巴铜达”(藏名)。

功效 全草: 止血收敛。用于刀伤, 枪伤, 止血等。

## 7032054

*Corydalis kokiana* Hand. -Mazz.

植物名 狭距紫堇《高植图鉴》

药材名 狭距紫堇《迪庆藏药》

功效 全草: 退烧, 止血。用于传染病及感冒发烧, 疮疖, 外伤。

## 7032055

*Corydalis latiloba* (Franch.) Hand. -Mazz.

植物名 宽裂紫堇《云南种录》

地方名 四川: 岩黄黄(金阳)。

功效 全草: 清热解暑。

## 7032056

*Corydalis ledebouriana* Kar. et Kir.

植物名 对叶延胡索《中草药》

文献名 元胡、对叶元胡《新疆药植志》, 薯根延胡索《云南植物研究》

地方名 新疆: 土元胡。

功效 块茎: 行气止痛, 活血散瘀。

## 7032057

*Corydalis linarioides* Maxim. --- *C. schlechteriana* Fedde

植物名 铜锤紫堇《秦岭植志》

药材名 铜棒锤(太白山)、《陕西中草药》

文献名 条裂紫堇《高植图鉴》, 柳穿鱼紫堇《峨眉药植资源》, 铜棒紫堇《云南植物研究》

地方名 陕西: 细叶铜棒锤(太白); 青海: “申打包尔娃”(藏语)。

功效 块根: 有毒。活血化痰, 祛风湿, 止痛。用于跌打损伤, 风湿疼痛, 皮肤瘙痒。

## 7032058

*Corydalis longicalcarata* H. Chuang ined. --- *Corydalis*

*esquirolii* auct. non Levl.

植物名 川黄堇《新华本草纲要》

文献名 山香、山香根《四川中药志》

地方名 四川：高山羊不吃，老龙草（峨眉山）。

功效 根茎和根：有小毒。清湿热，止痛。用于心胃气痛，胆经热病。

备考 据《新华本草纲要》称：《四川常用中草药》（1972）学名 *C. esquirolii* Levl. 系误订。

#### 7032059

*Corydalis menfolia* Wall.

植物名 细叶黄堇《西藏植志》

地方名 青海：“麦强日尔瓦”、“银周色尔瓦”（藏名）

功效 全草：镇静利胆，解热抗菌。用于心血管系统疾病，败血症。外用于创伤感染。

#### 7032060

*Corydalis melanochlora* Maxim.

植物名 暗绿紫堇《高植图鉴》

地方名 西藏：“麦强日尔瓦”、“银周色尔瓦”（藏语）。

功效 全草：镇静利胆，解热抗菌。用于败血症，创伤感染。

#### 7032061

*Corydalis mucronifera* Maxim. --- *Corydalis boweri* Hemsl.

植物名 扁柄黄堇《高植图鉴补编》

文献名 短茎紫堇《药学报》，尖突黄堇《西藏植志》，黄花紫堇《汇编》

地方名 青海：“至马朵共”；西藏：“东丝”、“冬丝儿”（藏名）。

功效 全草：清热止痛。用于胃炎，溃疡病，痢疾，坐骨神经痛。

#### 7032062

*Corydalis napuligera* C. Y. Wu

植物名 细花紫堇《西藏植志》

地方名 西藏：“介巴铜达”（藏名）。

功效 全草：止血，收敛。用于刀伤，枪伤，止血，疮疖等。

#### 7032063

*Corydalis nigro-angulata* C. Y. Wu

植物名 黑顶黄堇《西藏植志》

地方名 西藏：“省格色把”（藏语）。

功效 茎、花：解热。

#### 7032064

*Corydalis ochotensis* Turcz.

植物名 黄紫堇《高植图鉴》

功效 全草：清热解毒，利尿，止痢。用于疮毒肿痛，痢疾，肺结核咯血。

#### 7032065

*Corydalis ochotensis* Turcz. var. *raddeana* Regel

植物名 小黄紫堇《高植图鉴补编》

功效 全草：清热解毒，利尿，止痢。用于疮毒，肿痛，痢疾，肺结核咯血。

#### 7032066

*Corydalis octocornuta* C. Y. Wu

植物名 淡花紫堇《西藏植志》

功效 地上部分及花：解热。

#### 7032067

*Corydalis ophiocarpa* Hook. f. et Thoms.

植物名 蛇果黄堇《高植图鉴补编》

文献名 蛇果紫堇《秦岭植志》

地方名 断肠草（四川、云南）；湖北：臭香草（巴东），花斑鸠（神农架）；西藏：“扎桑”，“帕夏嘎”（藏名）。

功效 根及全草：清热解毒。用于痈毒肿痛。

#### 7032068

*Corydalis pachypoda* (French.) Hand. - Mazz.

植物名 粗梗黄堇《高植图鉴补编》

文献名 粗柄紫堇《云南种录》

地方名 云南：〔马尾连〕、〔土黄连〕（丽江），“日紧巴”（德钦藏语）。

功效 根：清热消炎。

#### 7032069

*Corydalis pallida* (Thunb.) Pers.

植物名 黄堇《高植图鉴》

文献名 珠果紫堇《东北草本植志》，玉门透骨草《沙漠药植》，黄花地丁《植物名汇》，深山黄堇《汇编》，山黄堇《种分》

地方名 山东：千人耳子（崂山）；浙江：鸡粪草；甘肃：〔透骨草〕（玉门）；河南：水黄连（商城）；湖北：小前胡、三支麻（鹤峰），闷头花（神农架）；广西：〔土黄连〕、护心草（苍梧），〔鸡爪连〕（苍梧、凤山），菊花黄连（靖西），石黄连（凤山），番薯秧（那坡），黄花紫堇（桂林），野芹菜，岩黄连，黄花鸡距草；贵州：断肠草，路连芹，岩胡。

功效 根：有毒。清热解毒，杀虫。用于热毒痢疮，无名肿毒，皮肤顽癣。

#### 7032070

*Corydalis polygalina* Hook. f. et Thoms.

植物名 远志黄堇《西藏植志》

地方名 西藏：“介巴铜达”（藏名）。

功效 全草：止血，收敛。用于刀伤，枪伤，止血，疮疖。

#### 7032071

*Corydalis polyphylla* Hand. - Mazz.

植物名 多叶紫堇《高植图鉴补编》

地方名 云南：“瑞金巴”、“日紧巴都拉”（中甸藏语）。

功效 根：清热解毒。

#### 7032072

*Corydalis pseudoschlechteriana* Fedde

植物名 粗毛黄堇《高植图鉴》

药材名 甲打丝瓦（迪庆藏药）

功效 根：用于发热流感。

#### 7032073

*Corydalis racemosa* (Thunb.) Pers.

植物名 小花黄堇《高植图鉴》

药材名 黄堇《浙江天目药志》

文献名 黄花断肠草《四川中药志》,白断肠草、白刺梨果《云南植物研究》

地方名 鸡屎草(福建、河南),粪桶草(浙江、福建),臭桐草(浙江、福建);陕西:猪肠草;浙江:黄花鱼灯草(临安),臭桐彭(临海、青田、温州),烂堂鸡屎草(临海),大叶粪缸草(云和、丽水),烫伤草(乐清);安徽:野水芹,虾子草;河南:石莲,水黄连;湖南:鱼子草;广西:[鸡爪连](乐业),[黄连],飞黄莲(罗城),野芹菜(桂林),黄荷包牡丹;四川:肠断草,断肠草、羊不吃(峨眉山)。

功效 全草:清热利湿,止痢,止血。用于暑热泻痢,肺病咳血,小儿惊风,目赤肿痛,流火,疥癣,疮毒肿痛,毒蛇咬伤。

#### 7032074

*Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. --- *C. turtschaninovii* Bess.

植物名 齿瓣延胡索《云南植物研究》

药材名 延胡索《本草拾遗》、《汇编》

文献名 蓝雀花、延黄索、蓝花菜《高植图鉴》

地方名 玄胡索(辽宁、黑龙江、北京),元胡(辽宁、黑龙江、山东),土元胡(东北、山东),山延胡索(东北、辽宁),蓝花豆、东北元胡(东北)。

功效 块茎:活血散瘀,理气止痛。用于胃痛,胸腹痛,疝痛,痛经,月经不调,产后瘀血腹痛,跌打损伤。

#### 7032075

*Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. var. *heteroclita* (K. T. Fu) C. Y. Wu et Z. Y. Su

植物名 异叶齿瓣延胡索《云南植物研究》

药材名 山延胡索《秦岭志》

功效 块茎:活血散瘀,行气止痛。用于小腹痛,痛经,胸膈疼痛,跌打损伤,瘀血肿痛,寒疝阴肿。

#### 7032076

*Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. f. *haitaoensis* Y. H. Chou et Ch. Q. Xu --- *C. haitaoensis* (Y. H. Chou) Lian

植物名 海岛延胡索《东北草本植志》

功效 块茎:活血散瘀,行气止痛。

#### 7032077

*Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. f. *lineariloba* (Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su --- *C. turtschaninovii* Bess. f. *lineariloba* (Maxim.) Kitag.

植物名 线裂齿瓣延胡索《云南植物研究》

药材名 山延胡索(拟)

文献名 线齿瓣延胡索《中药大辞典》,狭裂延胡索《高植图鉴》,线叶齿瓣延胡索《高植图鉴补编》,玄胡索、蓝花菜、蓝花豆、蓝雀花《北方本草》

地方名 延胡索(东北、河北、山西),玄胡、元胡(河北、山西);河北:山巴豆。

功效 块茎:用于活血散瘀,行气止痛。

#### 7032078

*Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. f. *non-apiculata* (Ohwi) C. Y. Wu et Z. Y. Su

植物名 无尖齿瓣延胡索《云南植物研究》

药材名 山延胡索(拟)

地方名 辽宁:延胡索。

功效 块茎:活血散瘀,行气止痛。

#### 7032079

*Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. f. *papillosa* (Kitag.)

C. Y. Wu et Z. Y. Su

植物名 瘤叶齿瓣延胡索《中草药》

药材名 山延胡索(拟)

文献名 瘤叶延胡索《高植图鉴补编》

地方名 延胡索(东北)。

功效 块茎:活血散瘀,行气止痛。

#### 7032080

*Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. f. *pectinata*

(Kom.) Y. H. Chou

植物名 栉裂齿瓣延胡索《云南植物研究》

药材名 山延胡索(拟)

文献名 栉裂齿瓣延胡索《高植图鉴补编》

地方名 延胡索(东北)。

功效 块茎:活血散瘀,行气止痛。

#### 7032081

*Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. f. *rotundiloba*

(Maxim.) C. Y. Wu et Z. Y. Su

植物名 圆齿瓣延胡索《云南植物研究》

药材名 山延胡索(拟)

地方名 延胡索(东北)。

功效 块茎:活血散瘀,行气止痛。

#### 7032082

*Corydalis repens* Mandl. et Muhl.

植物名 全叶延胡索《北京植志》

药材名 上延胡索(山东)

文献名 元胡《中药志》,土玄胡《高植图鉴补编》

地方名 黑龙江:匍匐延胡索;山东:土元胡,玄胡。

功效 块茎:行气止痛,活血散瘀。用于胃腹疼痛。

#### 7032083

*Corydalis rheinbabeniana* Fedde

植物名 扇苞黄堇《高植图鉴补编》

地方名 西藏:“甲打色尔娃”、“甲打白歪”(藏名)。

功效 根茎:活血镇痛,行气散瘀,清血毒。

#### 7032084

*Corydalis saxicola* Bunting --- *Corydalis thalictrifolia* Franch.

植物名 石生黄堇《高植图鉴补编》

药材名 岩黄堇《云南种录》

文献名 唐松草叶紫堇《湖北植志》

地方名 岩黄连、岩连(湖北、广西、四川、贵州);湖北:闷头花(神农架);广西:[土黄连],[鸡爪连];四川:干岩纤;云南:“瓦资莫瓷”(楚雄彝名),岩胡。

功效 根及全草:清热解毒,利湿,止痛,止血。用于肝炎,腮腺炎,口舌糜烂,火眼,牙痛,腹痛。

#### 7032085



*Corydalis scaberula* Maxim.

植物名 粗糙黄堇《高植图鉴补编》

文献名 粗糙紫堇、“贾大丝哇”(藏名)《青藏药图》,微糙紫堇《中草药》

地方名 四川:“多勒什”、“勒巴”(甘孜藏名)。

功效 块茎:清热解毒。用于发烧,流行性感冒。

#### 7032086

*Corydalis schanginii* (Pall.) B. Fedtsch.

植物名 长花延胡索《高植图鉴补编》

药材名 新疆土延胡索(拟)

文献名 长距元胡《新疆药志》,长距延胡索《中草药通讯》

地方名 新疆:土元胡、元胡、玄胡、玄胡索,新疆元胡。

功效 块茎:活血散瘀,行气止痛。用于行经腹痛,胃痛,神经痛,疝气痛,腰痛,两胁痛。

#### 7032087

*Corydalis sheareri* S. Moore --- *C. suaveolens* Hance

植物名 尖距紫堇《高植图鉴》

药材名 护心胆《广西本草选编》

文献名 地锦苗《名实图考》,红花鸡距草《中药大辞典》

地方名 湖北:晕头花;广西:紫花荷包牡丹,紫荷包牡丹,红荷包牡丹,水连(柳江),花麦漆(临桂),苦心胆;四川:鹿耳草(峨眉山),蛇含七,大羊不吃;贵州:七寸高,三月烂,飞菜。

功效 块根、全草:有小毒。解毒,止痛,消肿。用于湿热胃痛,腹痛泄泻,痢疮肿毒,目赤肿痛,毒蛇咬伤。

#### 7032088

*Corydalis sheareri* var. *bulbillifera* Hand.-Mazz.

植物名 珠芽紫堇《高植图鉴》

功效 块根:镇痛。

#### 7032089

*Corydalis solidia* (L.) Sw.

植物名 山延胡索《山东经植》

药材名 山延胡索《山东》

地方名 山东:土元胡。

功效 块根:活血散瘀,行气止痛。

#### 7032090

*Corydalis spathulata* Prain ex Craib

植物名 匙苞黄堇《西藏植志》

地方名 西藏:“东丝儿”(藏名)。

功效 全草:解热止痛。用于胃炎,溃疡性炎症,痢疾,坐骨神经痛。

#### 7032091

*Corydalis speciosa* Maxim. --- *C. pallida* Pers. var. *speciosa* (Maxim.) Komap.

植物名 珠果黄堇《高植图鉴》

文献名 狭裂珠果紫堇《东北草本植志》,珠果黄堇《长白山植药志》

地方名 吉林:念珠黄堇,念珠紫堇,胡黄堇。

功效 全草:清热解毒,消肿。用于痢疮热疖,无名肿毒,角膜炎充血。

#### 7032092

*Corydalis straminea* Maxim.

植物名 草黄堇《高植图鉴》

文献名 “玉周丝哇”(藏名)、草黄花紫堇《青藏药图》

功效 根茎:用于流行性感冒。

#### 7032093

*Corydalis stricta* Steph.

植物名 直茎黄堇《高植图鉴》

文献名 直立紫堇《药典》,直茎紫堇《药学报》

功效 全草:清热解毒。用于痢疮肿毒。

#### 7032094

*Corydalis taliensis* Franch. --- *C. stenantha* Franch.

植物名 金钩如意草《滇南本草》、《高植图鉴》

药材名 五味草《滇南本草》

文献名 水金钩如意《云南中草药》,水如意《药学报》,地茎苗《汇编》

地方名 四川:断肠草、大理紫堇(西昌);云南:野元菱(曲靖),〔水黄连〕(玉溪)。

功效 全草:清热消炎,清肝明目。用于肝炎,痢疾,肠炎,风湿骨痛,肺热咳嗽,牙痛,明目退翳。

#### 7032095

*Corydalis temulifolia* Franch.

植物名 大叶紫堇《高植图鉴补编》

文献名 城口紫堇《湖北植志》

地方名 湖北:冷草(鹤峰),网头花、鸡冠子草(神农架);四川:山臭草,断肠草。

功效 全草:清热解毒。用于外伤出血,坐板疮。

#### 7032096

*Corydalis ternata* (Nakai) Nakai

植物名 三裂延胡索《云南植物研究》

药材名 山延胡索(拟)

文献名 三叶延胡索《中草药》

功效 块茎:活血散瘀,行气止痛。

#### 7032097

*Corydalis thyrsiflora* Prain

植物名 锥花黄堇《高植图鉴补编》

地方名 西藏:“扎桑”(藏名)。

功效 全草:镇痛消肿。用于止血,肿痛,高血压,胃痛。

#### 7032098

*Corydalis tomentella* Franch.

植物名 毛黄堇《湖北植志》

药材名 毛黄堇《汇编》

地方名 湖北:岩黄连(巴东);四川:千岩堇(南川)。

功效 全草:祛瘀止痛,凉血,止血。用于跌打损伤,咯血,吐血,胃痛,肝郁胁痛。

#### 7032099

*Corydalis tongolensis* Franch.

植物名 东谷黄堇《云南种录》  
 药材名 新都桥黄堇《迪庆藏药》  
 文献名 副品帕夏嘎《迪庆藏药》  
 功效 地上部分;清热解毒。用于肝、胆及血分实热,血热引起的疼痛。

## 7032100

*Corydalis trachycarpa* Maxim.

植物名 糙果紫堇《高植图鉴》  
 文献名 “当日丝哇”(藏名)《青藏药图》  
 地方名 四川;“甲多网巴”(藏名)。  
 功效 块茎;清热解毒。用于流感发烧及各种炎症。

## 7032101

*Corydalis tsayulensis* C. Y. Wu et H. Chuang

植物名 察隅紫堇《西藏植志》  
 地方名 西藏;“叭咪呷”(察隅藏名),“吓戈”(藏名),“孤桑”(江达藏名)。  
 功效 全草;消炎,止血。

## 7032102

*Corydalis watanabei* Kitagawa --- *C. repens* Mandl et Mubid. var. *watanabei* (Kitag.) Y. H. Chou

植物名 角瓣延胡索《东北草本植志》  
 地方名 吉林;延胡索(长白山)。  
 功效 块茎;活血行瘀,行气止痛。

## 7032103

*Corydalis wilsonii* N. E. Br.

植物名 川鄂黄堇《高植图鉴》  
 地方名 四川;大救驾(峨眉山)。  
 功效 全草;行气止痛,活血祛瘀。

## 7032104

*Corydalis yanhusuo* W. T. Wang --- *C. turtshianinovii* Bess. f. *yanhusuo* Y. H. Chou et C. Q. Hsu

植物名 延胡索《云南植物研究》  
 药材名 延胡索《纲目》、《药典》  
 文献名 延胡《雷公炮炙论》,玄胡索《济生方》,元胡索《药品化义》,玄胡《江苏植录》,元胡《中药志》  
 地方名 浙江;竹叶延胡索;江西;球根紫堇。  
 功效 块茎;活血,利气,止痛。用于胸胁、脘腹疼痛,经闭痛经,产后瘀阻,跌打肿痛。

备考 据考证:《本草拾遗》之延胡索为东北、河北产之齿瓣延胡索(*Corydalis remota* Fisch. ex Maxim.)及其变型,《纲目》、《本草述》之延胡索则是产浙江、江西之本种。

## 7032105

*Corydalis yunnanensis* Franch.

植物名 黄水金钩如意(云南)、《新华本草纲要》  
 功效 全草;祛风湿,止痛,明目退翳。用于风湿痛,目翳等。

## 7032106

*Dactylicapnos scandens* (D. Don) Hutchins.

植物名 藤铃儿草《高植图鉴》  
 药材名 紫金龙《云南中草药》

文献名 指叶紫堇《广西植录》,攀援指叶紫堇《汇编》

地方名 广西;倒劈藤;云南;黑牛藤、川山七、串枝莲(大理),串三七,穿三七,豌豆跌打(澜沧、江城),大麻药(思茅),豌豆七(红河),野豌豆,跌打药,山豌豆,滋坚轮,“乌给女”(楚雄彝名),大麻寒(绿春)。

功效 根;有小毒。镇痛,止血。用于胃痛,神经性头痛,牙痛,外伤肿痛,出血,高血压。

## 7032107

*Dactylicapnos torulosa* (Hook. f. et Thoms.) Hutchins.

植物名 大藤铃儿草《高植图鉴》  
 药材名 岩当归《云南药录》  
 地方名 贵州;野豌豆。  
 功效 全草;有毒。清热消肿,活血止痛。用于无名肿毒,毒蛇咬伤,骨髓炎。

## 7032108

*Dicentra macrantha* Oliv.

植物名 大花荷包牡丹《高植图鉴》  
 地方名 四川;灌肠草(武隆);贵州;红当归(贵定、铜仁、贵阳);云南;丁三七(昭通)。  
 功效 根;用于头痛,腹痛。

## 7032109

*Dicentra spectabilis* (L.) Lem.

植物名 荷包牡丹《名实图考》、《高植图鉴》  
 药材名 荷包牡丹根(汪逢仕《采药书》)、《中药大辞典》

文献名 土当归、活血草《纲目拾遗》,鱼儿牡丹《花镜》,铃儿草《苏州府志》,华鬘草、鲃钩草、瓔珞牡丹、藤牡丹《牧野日图》,锦囊花《朝植乡名》

地方名 湖北;荷包花(利川、鹤峰),荷包莲、人头七(神农架),耳环花(鹤峰)。

功效 根茎;散血,消疮毒,除风,和血;全草;镇痛,解痉,利尿。用于胃痛,胃痉挛。

## 7032110

*Dicranostigma leptopodum* (Maxim.) Fedde

植物名 秃疮花《高植图鉴》  
 药材名 秃疮花《陕西中草药》  
 地方名 陕西;勒马回(渭南),秃子花。  
 功效 全草;清热解毒,消肿止痛,杀虫。用于扁桃腺炎,牙痛,淋巴结核。外用于头癣,体癣。

## 7032111

*Eomecon chionantha* Hance

植物名 血水草《高植图鉴》  
 药材名 血水草《汇编》  
 文献名 黄水芋、黄水草(贵州民间药物)  
 地方名 广扁线(四川、贵州),〔水黄连〕(浙江、江西),一口血(湖北、湖南),黄芋芽(江西、贵州、湖北);浙江;小羊儿(遂昌);江西;〔鸡爪连〕,黄芋荷(兴国),片莲,扒山虎;福建;〔土黄连〕(闽西),八角金盘(南平);湖北;人血草、散血草、黄水草、血灌大肠(巴东),血见参(五峰),金血草(恩施);湖南;小号筒,小绿号筒,疏子;广西;〔马蹄草〕(兴安),斗蓬草(资源),猴子

七(临桂),兜蓬菜,雪花霏粟;四川:金腰带,捆仙绳;云南:瓦莲(文山苗语)。

功效 根茎及根、茎叶;有小毒。清热解毒,用于眼结膜炎。外用于毒蛇咬伤,疔疮疖肿,疥癣,湿疹。

## 7032112

*Eschscholtzia californica* Cham.

植物名 花菱草《高植图鉴》

文献名 金英花《中国植物图鉴》

地方名 广西:金英草。

功效 全草:催眠,镇痛。

## 7032113

*Glaucium squamigerum* Kar. et Kir.

植物名 鳞果海野罂粟《沙漠药植》

文献名 野罂粟《沙漠药植》

功效 果壳:止咳,定喘,止泻。

## 7032114

*Glaucium tenue* Regel et Schmalh.

植物名 海罂粟《新疆中草药》

功效 果实:敛肺,固涩,镇痛。

## 7032115

*Hylomecon japonica* (Thunb.) Prantl et Kundig --- *H. vernalis* Maxim.

植物名 荷青花《高植图鉴》

药材名 拐枣七《陕西中草药》

文献名 鸡蛋黄菜《东北草本志》

地方名 陕西:大叶老鼠七(柞水),乌筋七(镇坪);浙江:刀豆三七(临安),水菖三七;湖北:补血草,小莱子七(巴东);四川:鸡血七、兔儿参、白血七(南川)。

功效 根:祛风湿,舒筋活络,散瘀消肿,止痛,止血。用于风湿性关节炎,跌打损伤。

## 7032116

*Hylomecon japonica* (Thunb.) Prantl et Kundig var. *dissecta* (Franch. et Savat.) Fedde

植物名 多裂荷青花《湖北植志》

地方名 湖北:一枝花(神农架),菜子七(恩施、五峰)。

功效 根茎:用于毒蛇咬伤,小儿湿气,高烧,咳嗽。

## 7032117

*Hylomecon japonica* (Thunb.) Prantl var. *subincisa* Fedde

植物名 锐裂荷青花《秦岭植志》

地方名 湖北:水芹菜(神农架)。

功效 根:祛风湿,舒筋活络,散瘀消肿,止血,止痛。

## 7032118

*Hypecoum erectum* L.

植物名 角茴香《高植图鉴》

药材名 角茴香《汇编》

文献名 细叶角茴香《沙漠药植》,小对叶草《四川中药志》,直立角茴香《西藏植录》

地方名 黄花茵陈、[茵陈](山西、河南);甘肃:野茴香;内蒙古:“蒿宁其其格”(蒙名);河南:咽喉草,麦黄

草,黄花草,雪里青;浙江:射香草(天台),草黄(舟山),黑旱莲(奉化);四川:奶浆草(峨眉山);其他:[山黄莲]。

功效 全草:有小毒。清热解毒。用于咽喉肿痛,目赤。

## 7032119

*Hypecoum leptocarpum* Hook. f. et Thoms. --- *H. chinensis* Franch.

植物名 节裂角茴香《高植图鉴》

药材名 节裂角茴香《中药大辞典》

文献名 细果角茴香《陕甘宁青中草药选》,角茴香、中国角茴香《北京中草》

地方名 北京:[山黄莲];山西:[茵陈],黄花茵陈;河南:咽喉草,麦黄草,黄花草,雪里青,亮帽英;云南:紫防风;西藏:“巴巴达”、“巴尔巴达”、“哇日哇哒”(藏名)。

功效 全草:解热去火。用于咽喉痛,目赤。

## 7032120

*Macleaya cordata* (Willd.) R. Br.

植物名 博落回《高植图鉴》

药材名 博落回《本草拾遗》、《汇编》

文献名 落回《酉阳杂俎》,号筒草、勃勒回《名实图考长编》,号筒青《土农药志》,山号筒、山麻骨《中国土农药志》,山炎筒《农药植物手册》,勃迢回《中国药植志》,黄薄荷《高植图鉴》

地方名 号筒杆(江西、安徽、广西),喇叭筒(浙江、安徽、福建),号筒(浙江、湖北),山大筒(浙江、福建),空洞草(浙江、贵州),号筒树(安徽、江西),菠萝筒(江西、福建);浙江:獬豸竹,角罗吹,号角斗竹,亚麻筒,山梧桐(杭州),喇叭竹(衢县、龙泉),喇叭草,蛤蟆竹,麻骨,天来火管,蒲罗吹(泰顺),响榔(乐清);安徽:筒杆,吹火筒,蛇罗麻,哈哈筒,哈哈树,夹拉糊,落回号;江西:土霸王(新建),乌龙帅(定南),土药王(泰和),梧桐梗,叭啦筒,大叶莲;福建:洗五角(崇安),海骨子,地步罗(邵武),号角樵(宁化),喇叭苗(南平),喇叭葫(浦城);湖北:黄杨杆(巴东);湖南:通大海(凤凰),泡通珠(长通),边天蒿(怀化),通天大蒿(永顺),号筒管,“穿岔拉”(苗语);广东:救命王(粤北),通心竹、桐清棒、救命藤、地陀罗(乐昌);广西:滚地龙,翻牛白(富川),葫芦竹(钟山),三钱三,号筒梗(阳朔),号筒木,[土大蒿],狮子爪;四川:鸡蛋红,胖婆娘(万县)。

功效 全草:有大毒。杀虫,祛风解毒,散瘀消肿。用于跌打损伤,风湿关节痛,痈疽肿毒,下肢溃疡,阴道滴虫,湿疹,烧烫伤,杀蛆虫。

## 7032121

*Macleaya microcarpa* (Maxim.) Fedde

植物名 小果博落回《高植图鉴》

药材名 小果博落回《汇编》

文献名 小果博落回《甘肃中草》

地方名 陕西:泡桐杆(眉县),黄婆娘、野麻子(佛坪),黄浆苔;甘肃:野狐杆,吹火筒(文县),博落回;湖北:黄水棵子、胖婆娘、空洞参(神农架)。

功 效 全草：有大毒。杀虫，祛风解毒，散瘀消肿。

## 7032122

*Meconopsis barbiseta* C. Y. Wu et X. Zhuang

植物名 久治绿绒蒿《中草药》

地方名 西藏：“欧贝完保”（藏名）。

功 效 全草或花：清热，舒肝。用于肝炎，肺炎，肺结核，胆囊炎，胃溃疡。

## 7032123

*Meconopsis chelidoniifolia* Bur. et Franch

植物名 橐果绿绒蒿《高植图鉴补编》

药材名 蒿枝七（四川）、《汇编》

文献名 黄花绿绒蒿《高植图鉴》

地方名 湖北：假鸦片（神农架）；四川：断肠草，拟千金子，裂叶蒿，都辣，银乌、合乌（峨眉山）；西藏：“木琼”（藏名）。

功 效 全草：有小毒。补气，止血，镇咳。

## 7032124

*Meconopsis henrici* Bur. et Franch.

植物名 川西绿绒蒿《高植图鉴补编》

文献名 蓝花绿绒蒿《汇编》

地方名 四川：“阿夏择尔我”（藏名）；西藏：“阿夏择哦”（藏名）。

功 效 全草：镇痛调经，活血散瘀。用于胃痛，痛经，跌打损伤。

## 7032125

*Meconopsis horridula* Hook. f. et Thoms.

植物名 多刺绿绒蒿《高植图鉴》

药材名 多刺绿绒蒿《西藏中草》

文献名 “刺儿恩”（藏名）《月王药诊》

地方名 青海：“才完”（藏名）；云南：刺参、条参、鸡脚参、红毛洋参（丽江），雪参（中甸）；西藏：“乌巴拉色尔布”（藏名）。

功 效 全草：有小毒。补气益肾，活血化痰，镇痛。用于跌打损伤，骨折，胸背痛。

## 7032126

*Meconopsis horridula* Hook. f. et Thoms. var. *racemosa* (Maxim.) Prain

植物名 总序绿绒蒿《高植图鉴补编》

文献名 总状绿绒蒿《高植图鉴》，总状花绿绒蒿《青藏药图》，“刺儿恩”（藏名）《月王药诊》

地方名 青海：“才完”（藏名）；云南：土高丽参、雪参、刺参、条参、鸡脚参、红毛洋参、红毛阳参（丽江）。

功 效 花：清热解毒。用于肺炎，传染性肝炎，骨折；根：补气益肾。用于气虚下陷，浮肿，脱肛，久痢，哮喘。

## 7032127

*Meconopsis horridula* Hook. f. et Thoms. var. *spinulifera* L. H. Zou

植物名 刺瓣绿绒蒿《中草药》

文献名 “刺儿恩”（藏名）《月王药诊》

功 效 全草：解热，止痛，接骨，除湿。用于风热头痛，跌打骨折，湿热关节肿痛。

## 7032128

*Meconopsis impedita* Prain

植物名 滇西绿绒蒿《高植图鉴补编》

地方名 青海：“欧贝”（藏名）。

功 效 全草：清热除湿，利肺。用于肝炎，肺炎，湿热水肿。

## 7032129

*Meconopsis integrifolia* (Maxim.) Franch.

植物名 全缘叶绿绒蒿《高植图鉴》

药材名 全缘叶绿绒蒿《汇编》

文献名 全缘绿绒蒿《高植图鉴》，绿绒蒿《高原中草》

地方名 “阿拍色鲁”（四川、西藏藏名）；青海：“欧贝赛保”（藏名）；四川：鹿绒菜（茂汶）；云南：黄芙蓉、鸦片花（丽江）；西藏：“慕琼单圆”、“吾白恩布”（藏名）。

功 效 全草：有小毒。清肺热，除湿利尿。用于咳嗽，肺炎，肝炎，湿热水肿。

## 7032130

*Meconopsis lancifolia* (Franch.) Franch. ex Prain

植物名 长叶绿绒蒿《高植图鉴补编》

药材名 绿绒蒿《民族药志》

文献名 具叶绿绒蒿《云南药录》

功 效 全草：清热，利尿，消炎，止痛。用于肺炎，肝炎，胆囊炎，水肿。

## 7032131

*Meconopsis nepaulensis* DC.

植物名 尼泊尔绿绒蒿《高植图鉴补编》

文献名 “埃贝赛保”（藏名）《西藏植志》

地方名 西藏：“欧贝赛保”（藏名）；云南：山萼笋（禄劝）。

功 效 全草：清热，止咳，利湿。用于肺炎，肝炎，湿热黄疸，皮肤病，头痛，痛经，白带，肠胃炎，湿热水肿，伤口久不愈合。

## 7032132

*Meconopsis oliveriana* Franch. et Prain

植物名 柱果绿绒蒿《高植图鉴补编》

地方名 湖北：黄鸦片草（神农架）。

功 效 全草：清热解毒，镇静，定喘。

## 7032133

*Meconopsis paniculata* (D. Don) Prain

植物名 锥花绿绒蒿《高植图鉴补编》

文献名 圆锥绿绒蒿《青藏药图》

地方名 青海：“欧贝赛保”（藏名）。

功 效 全草：有小毒。清肺热，除湿利尿。

## 7032134

*Meconopsis pseudohorridula* C. Y. Wu et H. Chuang

植物名 拟多刺绿绒蒿《西藏植志》

文献名 多刺绿绒蒿《中草药》

地方名 西藏：“刺儿蒿”（藏名）。

功 效 全草：解热，止痛，接骨，除湿。用于风热头痛，跌打骨折，湿热关节肿痛。

## 7032135

*Meconopsis pseudovenusta* Taylor

植物名 拟秀丽绿绒蒿《高植图鉴补编》

文献名 “欧贝”(藏名)、秀丽绿绒蒿《中草药》

功效 全草:清热除湿,利肺。用于肝炎,肺炎。

#### 7032136

*Meconopsis punicea* Maxim.

植物名 红花绿绒蒿《高植图鉴》

药材名 红花绿绒蒿《中药大辞典》

文献名 绿绒蒿《高原中草》

地方名 青海:“欧贝玛保”(藏名);四川:“阿柏几麻鲁”(藏名)。

功效 花茎及果实:镇痛,止咳,固涩,抗菌。用于遗精,白带,肝硬化。

#### 7032137

*Meconopsis quintuplinervia* Regel

植物名 五脉绿绒蒿《高植图鉴》

药材名 绿绒蒿《青海中草》

文献名 五脉叶绿绒蒿《中草药》,野毛金莲《高植图鉴》,五脉绿绒蒿花《青藏药图》,毛叶兔耳风《陕西中草药》

地方名 陕西:毛果七(太白);青海:“欧贝完保”(藏名)。

功效 全草:镇痉熄风,定喘,清热解毒。用于小儿惊风,肺炎,咳嗽。

#### 7032138

*Meconopsis simplicifolia* (D. Don) Walp

植物名 单叶绿绒蒿《高植图鉴补编》

地方名 青海:“木琼”(藏名)。

功效 全草:清热,止痛,通淋,除湿。用于肺热咳嗽,肝炎,肺炎,淋浊,湿热水肿。

#### 7032139

*Meconopsis torquata* Prain

植物名 毛瓣绿绒蒿《高植图鉴补编》

地方名 青海:“欧贝”(藏名)。

功效 全草:有小毒。清热除湿,利肺。用于肝炎,肺炎,湿热水肿等。

#### 7032140

*Meconopsis zangnanensis* L. H. Zhou

植物名 藏南绿绒蒿《西藏植志》

地方名 西藏:“木琼”(藏名)。

功效 全草:止痛,通淋,除湿。用于肺热咳嗽,肺炎,肝炎,淋浊,湿热水肿。

#### 7032141

*Papaver nudicaule* L.

植物名 野罂粟《东北草本植志》

文献名 野罂粟壳《汇编》,光叶罂粟《兴安植群》,“莱汗古丽”(维名)《沙漠药植》

地方名 山米壳、山大烟、毛罂粟(吉林、内蒙古);吉林:山罂粟,野大烟;内蒙古:“胡里干-查萨”、“莫都格罔拉”(蒙名)。

功效 果实:有毒。敛肺,固涩,镇痛。用于慢性肠炎,慢性痢疾,久咳,喘息,胃痛,神经性头痛,偏头

痛,痛经,白带,遗精,脱肛。

#### 7032142

*Papaver nudicaule* L. var. *amurense* Busch.

植物名 黑水野罂粟《汇编》

药材名 野罂粟壳(拟)

文献名 山大烟《黑龙江中草》,黑水罂粟《中药大辞典》

地方名 黑龙江:野大烟花。

功效 果实:有毒,敛肺,固涩,镇痛。用于腹痛,肠炎腹泻,痢疾,痛经,头痛,久咳喘息。

#### 7032143

*Papaver nudicaule* L. var. *chinense* (Regel) Fedde ---

*Papaver nudicaule* L. ssp. *rubro-aurantiacum* Fedde var.

*chinense* (Regel) Fedde --- *P. nudicaule* L. ssp. *rubro-*

*aurantiacum* (DC.) Fedde

植物名 山罂粟《高植图鉴》

药材名 野罂粟壳(河北)

文献名 裂叶野罂粟《汇编》,华罂粟《东北草本植志》,野罂粟《内蒙古中草》

地方名 山大烟、野大烟(河北、内蒙古);内蒙古:“哲日利格-娜木”(蒙名),山米壳;湖北:野鸦片(神农架);云南:藏金莲(中甸)。

功效 果实:有毒。镇痛,止咳,定喘,止泻。

#### 7032144

*Papaver nudicaule* L. var. *croceum* (Ledeb.) Kitag. --

*Papaver croceum* Ledeb.

植物名 粗毛野罂粟《东北药用植物》

功效 果实或带花的全草:有毒。镇痛,固涩,止泻痢,敛肺,止咳,定喘。用于神经性头痛,偏头痛,月经痛,肠炎,痢疾,腹泻,久咳,喘息,便血,遗精,白带,脱肛,急慢性胃炎,胃溃疡,胃腹疼痛。

#### 7032145

*Papaver nudicaule* L. var. *rubro-aurantiacum* Fisch. ex

DC. f. *ledebourianum* (Lundstrom) Kitag. -- *Papaver*

*ledebourianum* Lundstrom

植物名 黄花兴安野罂粟《东北药用植物》

功效 果实或带花的全草:有毒。镇痛,固涩,止泻痢,敛肺,止咳,定喘。用于神经性头痛,偏头痛,月经痛,肠炎,痢疾,腹泻,久咳,喘息,便血,遗精,白带,脱肛,急慢性胃炎,胃溃疡,胃腹疼痛。

#### 7032146

*Papaver nudicaule* L. var. *saxatile* Kitag.

植物名 岩野罂粟《东北药用植物》

文献名 岩罂粟《东北草本植志》

功效 果实或带花的全草:有毒。镇痛,固涩,止泻痢,敛肺,止咳,定喘。用于神经性头痛,偏头痛,月经痛,肠炎,痢疾,腹泻,久咳,喘息,便血,遗精,白带,脱肛,急慢性胃炎,胃溃疡,胃腹疼痛。

#### 7032147

*Papaver orientalis* L.

植物名 东方罂粟《北京植志》

文献名 鬼罂粟《台湾药植志》

功 效 全草:止泻,镇痛。

## 7032148

*Papaver pseudo-radicatum* Kitag.

植物名 白山罂粟《东北草本植志》

文献名 山罂粟《长白山植志》

地方名 吉林:山大烟,高山罂粟。

功 效 全草:镇痛,止泻。

## 7032149

*Papaver rhoeas* L.

植物名 虞美人《广群芳谱》、《高植图鉴》

药材名 丽春花《图经》、《中药大辞典》

文献名 丽春草《图经》,龙羊草、丛兰艾、仙女蒿、定参草《纲目》,赛牡丹、锦被花《游默斋花谱》,舞草《群芳谱》,百般娇、蝴蝶满园春、虞美人草《花镜》,孔冠花、虞美人草花《新纲》,莨苳莲《植物名汇》,雏罂粟《叶生药》)

地方名 湖北:烟花、川菊(神农架);云南:铁线牡丹。

功 效 花、果、全草:有毒。镇咳,镇痛,止泻。用于咳嗽、腹痛、痢疾。

## 7032150

*Papaver somniferum* L.

植物名 罂粟《图经》、《拉汉英种称》

药材名 罂粟壳《滇南本草》、《药典》

文献名 罂子粟《本草拾遗》,御米、象谷、米囊、囊子《开宝本草》,御米壳《医学启源》,粟壳《易简方》,莺粟《滇南本草》,鸦片、阿片、阿芙蓉《纲目》,米谷花、米囊花、御米花《花镜》,亚片《随息居饮食谱》,罂粟泡、霞片、罂粟脂、米壳、名米囊、芥子壳、莺粟壳、罂粟子、白米《新纲》,火烟、羊古米《叶生药》,乌烟、大土《药材学》,粟壳、罂子粟壳、米囊子壳《汇编》

地方名 莨苳莲、生菜莲(东北);台湾:乌烟花;云南:“呀芬”(西双版纳傣语),大烟,大烟土。

功 效 果壳及乳汁:敛肺,涩肠,止咳,止痛。用于久咳,久泻,脱肛,脘腹疼痛。

备 考 《唐本草》之“底野迦”,为古代含鸦片之中药制剂。

## 7032151

*Stylophorum lasiocarpum* (Oliv.) Fedde

植物名 人血草《高植图鉴》

药材名 大人血七《陕西中草药》

文献名 野人血《高植图鉴》,毛果金罂粟《药植简编》

地方名 陕西:野人血草(平利),大金盆,人血七(镇坪);湖北:豆叶七(巴东)。

功 效 全草:活血调经,散瘀止痛。用于月经不调,跌打损伤。

## 7036 白花菜科 Capparidaceae

## 7036001

*Capparis acutifolia* Sweet

植物名 独行千里《高植图鉴补编》

药材名 独行千里《汇编》

文献名 膜叶槿果藤《中药大辞典》,马槟榔、屈头鸡、膜叶山柑《药植简编》,膜叶马槟榔《广西本草选编》,独虎龙《汇编》

地方名 广东:扣钮子(乳源),黑钩榕,〔独脚连〕、黑皮蛇、挖不尽、单兵救主、单鞭救主(中山、新会);广西:〔穿破石〕(苍梧、平南),勒儿根(平南),落地金鸡(博白),下洞底、落杆薯、土苍术(北流)。

功 效 根、叶:有毒。活血散瘀,解痉止痛。用于风湿关节痛,筋骨不舒,咽喉肿痛,牙痛,痉挛性腹痛,闭经、外用于疮疖肿毒,跌打损伤。

## 7036002

*Capparis bodinieri* Levl. --- *C. acutifolia* Sweet ssp. *bodinieri* (Levl.) Jacobs --- *C. viminalis* Hook. f. et Thoms. var. *bodinieri* (Levl.) B. S. Sun

植物名 野香橼花《名实图考》、《高植图鉴》

药材名 猫胡子花《云南中草药》

文献名 小毛毛花《名实图考》,黔桂槿果藤《中药大辞典》,波氏马槟榔《广西药录》,扭扣子《中草彩图》

地方名 广西:老蛇药(隆林);云南:青刺尖(玉溪),刺珠(大理),米汤果树,苦树、野蜜桶、野香橼、刺菜、槿果藤、山柑、羊山咪树(红河),叶上花。

功 效 全株:舒筋活络,清热解毒。用于扁桃腺炎,牙痛,大疮,痔疮,毒蛇咬伤,跌打损伤。

## 7036003

*Capparis cantoniensis* Lour.

植物名 广州山柑《高植图鉴》

药材名 广州山柑《广西药录》

文献名 广州槿果藤《广州植志》,广州马槟榔《植称补编》,广东山柑《云南药录》

地方名 广东:假橙(岭南);广西:屈头鸡(陆川),过山龙;云南:牛眼睛果。

功 效 根:用于咳嗽,跌打损伤;种子:用于咽喉肿痛,胃脘痛,癰瘤。

## 7036004

*Capparis chingiana* B. S. Sun

植物名 野槟榔《云南植志》

文献名 凤山槿果藤《广西植录》

地方名 广西:山水槟榔(德保)。

功 效 种子:有毒。驱虫。

## 7036005

*Capparis hastigera* Hance

植物名 槿果藤《海南植志》

功 效 根、叶:有毒。活血散瘀,解痉止痛。

## 7036006

*Capparis horrida* L. f.

植物名 刺蝴蝶木《台湾药植志》

功 效 根皮:镇静,健胃。

## 7036007

*Capparis masaikai* Levl.

植物名 马槟榔《高植图鉴补编》

药材名 马槟榔《品汇精要》、《汇编》

文献名 马金囊、紫槟榔《群芳谱》,水槟榔、太极子《滇南本草》,马金南《纲目》,屈头鸡《简明中医辞典》,翅果槌果藤《广西植录》,马大白《药材学》

地方名 广西:驳骨藤,〔山木通〕;云南:山槟榔(西畴)。

功效 种子:清热解渴,催产。用于热病口渴,咽喉炎,恶疮肿毒,难产。

## 7036008

*Capparis membranifolia* Kurz --- *C. viminea* Hook. f. et Thoms.

植物名 雷公桔(海南)、《高植图鉴补编》

文献名 纤枝槌果藤《海南植志》,柳枝山柑《广西植录》,纤枝山柑《汇编》

地方名 广西:老虎木(南宁),黑皮木、假盆(龙州),掘不尽(凌云),假黄皮,槟榔儿,黑口叶。

功效 根:有小毒。舒筋活络,消肿止痛。用于胃痛,腹痛,风湿关节痛,跌打扭伤。

## 7036009

*Capparis pterocarpa* F. Chun

植物名 水槟榔《广西中药志》

药材名 水槟榔《广西中药志》

文献名 翅果槌果藤《广西植录》

地方名 广西:屈头鸡(靖西、德保、百色、凤山),山木通,马槟榔。

功效 种子:清热,生津,止渴。用于伤寒热病,暑热口渴,麻疹,喉痛,食滞胀满,肿毒,难产。

## 7036010

*Capparis pubifolia* B. S. Sun

植物名 毛叶山柑《高植图鉴补编》

药材名 毛叶山柑《广西药录》

功效 根:用于淋巴肉瘤。

## 7036011

*Capparis spinosa* L.

植物名 山柑《高植图鉴补编》

药材名 老鼠瓜(新疆)、《汇编》

文献名 刺山柑《高植图鉴》,欧白花菜《台湾药植志》,勾刺槌果藤《汇编》

地方名 新疆:槌果藤,野西瓜,抗旱草,波里克果(维名)。

功效 根皮、果、叶:有毒。祛风,散寒,除湿。用于急性慢性风湿性关节炎,布氏杆菌病;叶:外用于痛风病。

## 7036012

*Capparis subsessilis* B. S. Sun

植物名 无柄山柑《高植图鉴补编》

药材名 无柄山柑《广西药录》

功效 叶:用于毒蛇咬伤。

## 7036013

*Capparis urophylla* F. Chun

植物名 小绿刺《高植图鉴补编》

文献名 尾叶山柑《汇编》,尾叶槌果藤《广西本草选编》

功效 叶:解毒消肿。用于毒蛇咬伤。

## 7036014

*Capparis versicolor* Griff.

植物名 屈头鸡《高植图鉴补编》

药材名 屈头鸡《汇编》

文献名 锡朋槌果藤《海南植志》,保亨槌果藤《广西植录》,〔山木通〕《高植图鉴》,树屈头鸡《药植简编》。

地方名 马槟榔(广东、广西);广东:牛眼睛(阳春),圆头鸡(惠阳),九吉炎,九菱树,勒角,槌果藤,龙葵树;广西:郁头鸡(博白),郁颈鸡(平南),入山虎(苍梧),金鸡子(玉林),疳鸡子(桂平),狗猫橙。

功效 果实:有毒。止咳平喘。用于咳嗽,胸痛,哮喘;根:外用于跌打损伤,骨折。

## 7036015

*Capparis yunnanensis* Craib et W. W. Smith

植物名 苦子马槟榔《高植图鉴补编》

地方名 云南:〔马槟榔〕(陇山)。

备考 种子:有小毒,不能入药,必须与马槟榔严格区分。

## 7036016

*Capparis zeylanica* L.

植物名 牛眼睛《高植图鉴补编》

文献名 锡兰蝴蝶木《台湾药植志》

功效 根:清热。

## 7036017

*Cleome gynandra* L.

植物名 白花菜(汪颖《食物本草》)、《高植图鉴》

药材名 白花菜子《汇编》

文献名 羊角菜《纲目》,屢析草《生草药性备要》,风蝶草《牧野日图》,白花菜根《中国药植图鉴》

地方名 臭豆角(北京、河北、安徽),臭花菜(安徽、河南、广东);北京:臭老婆根;山东:猪屎草,臭狗粪(郯城),白花菜(微山);江苏:羊角菜子;福建:白花仔草(厦门),王梅草(漳浦),五爪龙(泉州),五梅草;台湾:白菜仔菜,白花仔菜头;河南:臭菜花;广东:臭菜、臭草(潮阳)。

功效 种子:有小毒。祛风散寒,活血止痛。用于风湿疼痛,腰痛,跌打损伤,痔疮;全草:用于疟疾,风湿痹痛。

## 7036018

*Cleome spinosa* Jacq.

植物名 醉蝶花《高植图鉴》

文献名 西洋白花菜《植物学大词典》,紫龙须《广西植录》

功效 全草、种子:有小毒。散寒止痛,通血脉,解毒,杀虫止痒。

## 7036019

*Cleome viscosa* L. --- *Polanisia icosandra* (L.) Wight et Arn.

植物名 黄花草《高植图鉴》

药材名 臭矢菜《广西本草选编》

文献名 〔黄花草〕《纲目》,毛龙须《广西植录》,向天

瘡《台湾药植志》,紫龙须《药植简编》

地方名 浙江:蚝猪钻麻(临安);江西:野油菜;广西:羊角草(龙州、防城)。

功效 全草:有毒。散瘀消肿,去腐生肌。用于跌打肿痛,疮痍溃烂;种子:用于小儿疳积。

#### 7036020

*Crateva falcata* (Lour.) DC.

植物名 镰叶鱼木《广西植录》

药材名 树头菜《云南药录》

地方名 云南:鸡爪菜,“帕采”(傣语)。

功效 根:清热解毒,舒筋活络。用于肝炎,痢疾,腹泻,疟疾,风湿关节炎。外用:蛇咬伤。

#### 7036021

*Crateva unilocularis* Buch.-Ham.

植物名 树头菜《高植图鉴补编》

药材名 树头菜《名实图考》、《汇编》

文献名 鱼木《台湾药植志》,龙头花、鸡爪菜《中药大辞典》

地方名 台湾:三脚皮,三脚掉,三脚憋,牛角歪;海南:苦洞树,虎王;广西:四方灯笼(北流),鼓槌果(防城),鹅脚木(南宁)。

功效 树皮、叶:破血,退热。用于催产,胃痛,扁桃腺炎,关节痛。

#### 7036022

*Stixis suaveolens* (Roxb.) Pierre

植物名 六萼藤《高植图鉴》

药材名 斑果藤《西双版纳傣药志》

文献名 罗志藤《海南植志》

地方名 云南:“嘿麻乱狼”(西双版纳傣语)。

功效 根茎:用于咳嗽,咳血,平喘。

### 7037 辣木科 Moringaceae

#### 7037001

*Moringa oleifera* Lam.

植物名 辣木《中国植志》

药材名 辣木《台湾药植志》

功效 根:利尿,消食,平喘。用于脓疡及结肠疾患。

### 7039 十字花科 Cruciferae

#### 7039001

*Arabis alaschanica* Maxim.

植物名 贺兰山南芥《中国植志》

文献名 阿拉善南芥《内蒙古植志》,阿拉善南芥菜《中草药》

地方名 内蒙古:“阿拉善乃·少布都海”(蒙名);四川:白花南芥,穴乌萝卜。

功效 全草:用于食物中毒,退烧。

#### 7039002

*Arabis flagellase* Miq.

植物名 匍匐南芥《中国植志》

药材名 匍匐南芥《中国药植志》

文献名 鬐草《植物学大辞典》

功效 全草:清热解暑。

#### 7039003

*Arabis paniculata* Franch. -- *A. alpina* L. var. *purpurea* W. W. Smith

植物名 圆锥南芥《中国植志》

药材名 圆锥南芥《中国药植志》

功效 种子:解热退烧。

#### 7039004

*Arabis pendula* L.

植物名 垂果南芥《中国植志》

药材名 垂果南芥《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古:“文珠什赫其”(蒙名),野白菜;新疆:大蒜芥;四川:垂果南芥菜,唐芥,扁担蒿。

功效 果实:清热,解毒,消肿。用于疮痈肿毒,阴道炎,阴道滴虫;种子:退烧。

#### 7039005

*Arabis pendula* L. var. *hypoglauca* Franch

植物名 粉绿垂果南芥《中国植志》

功效 果实:清热,解毒,消肿。用于疮痈肿毒,阴道炎,阴道滴虫。

#### 7039006

*Armoracia rusticana* (Lam.) Gaertn.

植物名 辣根《中国植志》

药材名 辣根《中草药》

文献名 西洋山薺菜《植物学大辞典》,马萝卜《经植手册》

功效 根:利尿,兴奋。外用有引赤发泡作用。

#### 7039007

*Brassica alboglabra* Bailey

植物名 芥蓝《农政全书》、《中国植志》

药材名 芥蓝菜《福建药物志》

文献名 擘蓝《农政全书》

功效 根:解毒,清咽,平喘。用于喉痛,气喘,风热感冒、预防白喉;茎、叶:散积痰;叶、种子:解面毒。

#### 7039008

*Brassica alboglabra* Bailey var. *oleifera* Makino

植物名 油苦菜《云南种录》

地方名 云南:糙叶菜《昆明》,油菜。

功效 种子油:用于烫火灼伤,湿疹。

#### 7039009

*Brassica campestris* L. --- *Brassica campestris* L. var. *oleifera* DC.

植物名 芸苔《唐本草》、《中国植志》

药材名 芸苔子《千金·食治》、《汇编》

文献名 胡菜《通俗文》,寒菜《百病方》,苔菜《埤雅》,芸苔菜《日用本草》,苔芥《沛志》,菜子油《摄生众妙方》,油菜《纲目》,〔香油〕《本经逢原》,青菜《随息居饮食谱》,野油菜《药植简编》

地方名 甘肃:辣菜,臭菜;江苏:菜苔;福建:油菜仔;四川:红油菜,油菜子,菜子。

功效 种子:行气祛瘀,消肿散结。用于痛经,产后



瘀血腹痛,恶露不净。外用于痈疽肿痛;茎叶:散血,消肿。用于劳伤吐血,血痢,丹毒,热毒疮,乳痈。

#### 7039010

*Brassica campestris* L. var. *purpuraria* L. II. Bailey

植物名 紫菜苔《中国植志》

药材名 紫菜苔《贵州药录》

地方名 贵州:菜花。

功效 种子:破气行血,消肿止痛。用于小儿惊风,产后气血痛,痔漏,走游风;叶:外用于痈肿。

#### 7039011

*Brassica caulorapa* Pasq. --- *B. oleracea* L. var. *caulorapa* DC. --- *B. oleracea* L. var. *gonylodes* Kern.

植物名 擘蓝《中国植志》

药材名 擘蓝《中国植志》

文献名 甘蓝《本草拾遗》,西士蓝、[大叶冬蓝]《名实图考》,茄连、撇蓝《延绥镇志》,玉蔓菁《山西通志》,茺蓝《滇南本草》,球茎甘蓝《中国植物图鉴》

地方名 芥蓝头(广东、广西);内蒙古:玉头;上海:甘蓝菜;四川:薛蓝;云南:茄蓝。

功效 球茎:用于小便淋浊,大便下血,肿毒,脑漏;叶:用于食积,痰积,恶疮。

#### 7039012

*Brassica chinensis* L. --- *B. napus* L. var. *chinensis* (L.) O. E. Schulz

植物名 青菜《中国植志》

药材名 菘子、菘菜《本草经集注》、《中药大辞典》

文献名 夏菘《农政全书》,菘菜子《圣惠方》,白菜《饮膳正要》,白菘《滇南本草》,霉干菜、冬菜、干冬菜《纲目拾遗》,陈干菜《本草再新》,乌金白、鸡毛菜、[油菜]《中国经植志》,小油菜《经植手册》

地方名 芸苔子(上海、江苏、湖南),小白菜(四川、广东、江苏、湖北);甘肃:散白菜;江苏:油白菜,小占菜;台湾:菘;广东:江门白菜;四川:乌金白菜、瓢儿白菜、矮油菜子(成都)。

功效 幼株(菘菜):解热除烦,通利肠胃。用于肺热咳嗽,便秘,丹毒,漆疮;种子(菘子):用于痰喘,清肺气,化痰。

#### 7039013

*Brassica integrifolia* (West) O. E. Schulz

植物名 苦芥《中国植志》

药材名 苦芥子《中国药植志》

文献名 [青菜]、[苦菜]、紫苦菜《滇南本草》,全叶芥《海南植志》,全缘芥《广西植录》

地方名 云南:“帆怕干”(傣名)。

功效 种子:发汗。用于风湿,高热抽搐,妄语,痉挛,神经痛;基生叶:凉血热,寒胃,发肚中诸积,利小便。

#### 7039014

*Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss.

植物名 芥菜《千金·食治》、《中国植志》

药材名 芥子《别录》、《药典》

文献名 芥《别录》,大芥《方言》,芥菜子《孙天仁集

效方》, [青芥子]《分类草药性》,刺芥《本草新注》,春不老《种分》,药芥子、大芥菜、辣菜、春菜《中国蔬裁》,黄芥子《药典》

地方名 芥末(东北),冲菜(湖南、福建、云南);福建:挂菜(晋江),霜不老(建阳);湖北:腊菜(神农架);四川:蛮菜子、红苕菜(成都);云南:宽叶苦菜。

功效 种子:温肺豁痰利气,散结通络止痛。用于寒痰喘咳,胸胁胀痛,痰滞经络关节麻木、疼痛,痰湿流注,阴疽肿毒。

#### 7039015

*Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. var. *gracilis* Tsen et Lee

植物名 油芥菜《中国植志》

地方名 高油菜(华北);江苏:黄芥子(镇江)。

功效 种子:温化寒痰,通络止痛。

#### 7039016

*Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. var. *multisecta* Bailey

植物名 多裂叶芥《中国植志》

文献名 银丝芥《经植手册》,多裂芥(《滇南本草》整理本)

地方名 云南:金丝芥,千筋菜。

功效 种子:温化寒痰,通络止痛。

#### 7039017

*Brassica napobrassica* (L.) Mill.

植物名 芜菁甘蓝《经植手册》

药材名 大头菜子《汇编》

文献名 大头菜《秦岭植志》,芥菜疙瘩、水芥《高植图鉴》

地方名 芥疙瘩(甘肃、陕西),布留克(东北);甘肃:大头芥;江苏:洋大头(南京、吴江),水芥子,洋大头菜。

功效 种子:泻湿热,散热毒。用于黄疸,便秘,目疾,乳痈,小儿头疮,无名肿毒,骨疽不愈。

#### 7039018

*Brassica narinosa* Bailey

植物名 塌棵菜《中国植志》

药材名 塌菜《姚可成《食物本草》》、《中药大辞典》

文献名 踏古菜、太占菜《云南种录》

地方名 内蒙古:塌地白菜;江苏:瓢儿菜,乌塌菜,雪里青(苏南),塌古菜。

功效 全草:滑肠,疏肝,利五脏。

#### 7039019

*Brassica nigra* Koch

植物名 黑芥《药材学》

药材名 黑芥子《药材学》

文献名 排菜、欧洲黑芥子《台湾药植志》,辣芥子、紫芥子、小芥子、花芥子(叶《生药》),幽芥、辛芥、菜子芥《经济植物学》

功效 种子:用于中毒危急时,作催吐药。用于不省人事,窒息危笃,牙痛,风湿牙痛,急性局部痛,肺炎,支气管炎及其他呼吸疾患。

#### 7039020

*Brassica oleracea* L. var. *acephala* DC.

植物名 皱叶椰菜《云南种录》

文献名 芥蓝菜《台湾药植志》，卷心菜《江苏植志》

地方名 江苏：甘蓝，包菜，莲花白；广西：叶牡丹，花羽衣甘蓝；云南：羽衣甘蓝。

备考 叶及茎之水浸液在试管中对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌有抗生性。

#### 7039021

*Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L.

植物名 花椰菜《中国植志》

文献名 菜花《秦岭植志》，花菜《湖北植志》，洋花菜《云南种录》

功效 叶：清热。

#### 7039022

*Brassica oleracea* L. var. *capitata* L.

植物名 甘蓝《中国植志》

药材名 甘蓝《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 蓝菜《千金·食治》，西土蓝《本草拾遗》，葵花白菜《名实图考》，球白菜《台湾药植志》，卷心菜《汇编》

地方名 疙瘩白、大头菜（东北）、莲花白（四川、云南）、椰菜（广东、广西）、包菜（江苏、广西）；北京：洋白菜；内蒙古：圆白菜；甘肃：莲花菜；陕西：包包菜，包心菜；云南：葵花白，高脚莲花白。

功效 叶：清热，止痛。用于胃及十二指肠溃疡，疼痛。

#### 7039023

*Brassica pekinensis* (Lour.) Rupr.

植物名 白菜《纲目》、《中国植志》

药材名 黄芽白菜《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 菘《别录》，黄芽菜《咸淳临安志》，黄矮菜、夜交菜《戒庵漫笔》，黄牙白《科属词典》，北京白菜《种分》，山东大白菜《中国蔬菜》

地方名 卷心白（四川、云南）；北京：大白菜；内蒙古：“薄京-查干-诺高”（蒙语）；上海：山东菜；广东：结球白菜，绍菜（广州）；四川：黄秧白（峨眉山）。

功效 叶球：养胃，利小便；叶、根：外用用于两腮肿痛，漆疮。

#### 7039024

*Brassica rapa* L.

植物名 芜菁《中国植志》

药材名 芜菁《别录》、《中药大辞典》

文献名 葍《诗经》，须、菹芜《尔雅》，葍苢《尔雅》孙炎注），芜菁子《别录》，蔓菁子《千金方》，蔓菁《唐本草》，九英菘《食疗本草》，九英蔓菁《本草拾遗》，芜菁花《证类本草》，鸡毛菜《本草衍义》，大头菜、狗头芥《医林纂要》，汕头菜、柿饼萝卜《名实图考》

地方名 扁萝卜、圆根（云南、西藏）；北京：变萝卜；内蒙古：地蔓菁，“蔓-金”（蒙名）；甘肃：洋根；浙江：盘菜；台湾：圆菜头；四川：假哥头。

功效 块根及叶：开胃下气，利湿解毒。用于食积不化，黄疸，消渴，热毒风肿，疔疮，乳痈；种子：明目，清热，利湿。用于青盲，目暗，黄疸，痢疾，小便不利；花：

补肝明目。

#### 7039025

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.

植物名 芥《别录》、《中国植志》

药材名 芥菜《千金·食治》、《汇编》

文献名 葍、芥实《尔雅》，芥菜子《千金·食治》，芥菜花《履巉岩本草》，护生草、葍实《纲目》，苜蓿菜、鸡心菜《医林纂要》，净肠草《名实图考》

地方名 地米菜（台湾、贵州、湖北、云南），只只菜（台湾、福建），地菜（广东、广西、河南、四川），野菜（江苏、上海），芥菜菜（黑龙江、内蒙古、吉林、河南、华东），枕头草（上海、四川），田芥（华东），菱角菜（广东、福建），沙芥（山西、河北）；黑龙江：粽子菜（哈尔滨）；吉林：“给劳给”（朝名）；河北：娘娘指甲；内蒙古：“阿布嘎-淖嘎”（蒙名）；甘肃：刮锅铲，粽子草，芨芨；青海：小铲铲草，“索尔哇”（藏语）；山东：辣菜；江苏：野菜儿（苏北）；浙江：香蕹菜，香芹娘，香料娘，香田芥，清明草，饭银头草；安徽：香芥菜，喜喜菜，石翠花；江西：枫树草，三月三，班西草（泰和）；福建：上巴菜，芥只菜、蒲蝇花（闽东），荷包菜（厦门），班心菜（宁化），三角菜（龙海），鸡喙菜（建阳），懿旨菜；台湾：扇子草；河南：麦地菜，麦芥芥菜；湖北：地菜花；湖南：鸡肉菜（醴陵）；广东：香包草（潮阳），三角草（普宁），耳勾草（饶平），鸡羽菜（兴宁）；广西：假水菜，鸡翼菜，榄鼓菜（梧州）；四川：地地菜，烟盒草，烟盒菜，雀雀菜，洋筋草，雀儿菜，曲曲菜；贵州：鸡脚菜。

功效 全草：凉血止血，清热利尿。用于肾结核尿血，产后子宫出血，月经过多，肺结核咯血，高血压病，感冒发热，肾炎水肿，泌尿系结石，乳糜尿，肠炎；种子：去风，明目。用于目痛，青盲，翳障；花：用于痢疾，崩漏。

#### 7039026

*Cardamine engleriana* O. E. Schulz

植物名 光头山碎米荠《中国植志》

药材名 野芥菜《神农架药录》

功效 全草：止咳平喘，利水。

#### 7039027

*Cardamine flexuosa* With.

植物名 弯曲碎米荠《中国植志》

药材名 碎米荠《汇编》

文献名 碎米子、[菹菜]《种分》，曲枝碎米荠《汇编》，[葍苢]《汉药写真集成》，朝鲜葍苢子《中药通报》

地方名 野芥菜、白带草、米花香芥菜（浙江、江西）；福建：萝卜草（浦田、仙游）；湖北：小芥子七（神农架）；四川：碎米草；云南：小叶地豇豆，地甘豆（昆明），惊解姜。

功效 全草：清热利湿。用于尿道炎，膀胱炎，痢疾，白带。外用用于疔疮。

#### 7039028

*Cardamine flexuosa* With. var. *debilis* (D. Don) T. Y. Cheo et R. C. Fang

植物名 柔弯曲碎米荠《中国植志》

药材名 柔弯曲碎米荠《广西药录》  
功效 全草:清热利湿,健胃,止泻。

## 7039029

*Cardamine griffithii* Hook. f. et Thoms.

植物名 山芥碎米荠《中国植志》  
文献名 山芥菜《云南种录》  
功效 全草:清火解热。

## 7039030

*Cardamine hirsuta* L.

植物名 碎米荠《野菜谱》、《中国植志》  
药材名 碎米荠《汇编》  
文献名 焯菜、辣米子《名实图考》、〔葶苈〕《汉药写真集成》、野芹菜《植物名汇》、硬毛碎米荠《广西药录》  
地方名 上海:白带草;湖南:雀儿菜。  
功效 全草:清热利湿。用于尿道炎,膀胱炎,痢疾,白带。外用于疔疮。  
备考 焯菜应是十字花科植物 *Rorippa islandica* (Oed.) Borb., 但《名实图考》所绘显然是碎米荠。

## 7039031

*Cardamine impatiens* L.

植物名 弹裂碎米荠《中国植志》  
药材名 大碎米荠《云南种录》  
文献名 水菜花《植物名汇》、水花菜《台湾植志》  
地方名 湖北:小腊菜(神农架);四川:野菜子(峨眉山)。  
功效 全草:清热利湿,解毒利尿。用于白带,淋漓,痢疾,胃痛,疔毒,月经不调。

## 7039032

*Cardamine impatiens* L. var. *eriocarpa* Dc.

植物名 毛果碎米荠《江西药录》  
功效 全株:清热利湿,消肿治痢,明目。

## 7039033

*Cardamine leucantha* (Tausch) O. E. Schulz

植物名 白花碎米荠《中国植志》  
药材名 菜子七《汇编》  
文献名 山芥菜《东检》、白花石芥菜《高植图鉴》  
地方名 吉林:假芹菜;宁夏:〔石菖蒲〕;湖北:石腊子菜(神农架);湖南:〔角蒿〕。  
功效 全草:清热解毒,化痰止咳;根茎:解痉镇咳,活血止痛。用于百日咳,跌打损伤。

## 7039034

*Cardamine lyrata* Bunge

植物名 水田碎米荠《中国植志》  
药材名 水田碎米荠《贵州草药》  
文献名 水田芥《中国植物图鉴》、小水田芥《植物学大辞典》  
地方名 内蒙古:“奥存-照古其”(蒙语);贵州:“阿英久”(贵州苗语)。  
功效 全草:清热解毒,祛翳。用于角膜云翳,痢疾,吐血。

## 7039035

*Cardamine macrophylla* Willd.

植物名 大叶碎米荠《中国植志》

药材名 普贤菜(四川峨眉山)

文献名 石芥菜《中国药植志》

地方名 四川:丘乳巴,石格菜。

功效 全草:消肿,补虚,健脾。用于虚劳内伤,头晕,体倦乏力,红崩,白带等症。

## 7039036

*Cardamine macrophylla* Willd. var. *polyphylla* (D. Don)

T. Y. Cheo et R. C. Fang

植物名 多叶碎米荠《中国植志》

药材名 石芥花《云南种录》

地方名 湖北:家乡菜(神农架)。

功效 全草:利小便,止痛。用于败血症;根:止咳平喘。

## 7039037

*Cardamine pratensis* L.

植物名 草甸碎米荠《中国植志》

文献名 草地碎米荠《汇编》

地方名 内蒙古:“诸古音-照古其”(蒙语);青海:“羔鸟”(藏语)。

功效 果:用于心脏病,胃病,眼病;叶:用于坏血病。

## 7039038

*Cardamine scaposa* Franch. --- *C. denudata* O. E. Schulz

植物名 裸茎碎米荠《中国植志》

地方名 陕西:落叶梅(平利)。

功效 全草:清热解毒,用于疔疮。

## 7039039

*Cardamine scutata* Thunb. --- *C. regeliana* Miq.

植物名 圆齿碎米荠《中国植志》

文献名 碎米荠《台湾药植志》

功效 种子:利尿。

## 7039040

*Cardamine tangutorum* O. E. Schulz

植物名 紫花碎米荠《中国植志》

药材名 石芥菜(四川)

文献名 “曲热巴”(藏语)《青藏药图》,唐古石芥花《云南种录》

地方名 宁夏:〔石菖蒲〕;四川:石格菜。

功效 全草:清热利湿。用于黄水疮,外伤出血;花:用于筋骨疼痛。

## 7039041

*Cardamine trifoliolata* Hook. f. et Thoms. --- *Cardamine scoriarum* W. W. Sm. --- *Cochlenria scoriarum* (W. W. Smith) Hand. -Mazz.

植物名 三小叶碎米荠《中国植志》

文献名 豆叶碎米荠《云南种录》,菱叶碎米荠《新华本草纲要》

功效 全草:用于风湿症。

## 7039042

*Cardamine urbaniana* O. E. Schulz

植物名 华中碎米荠《中国植志》

药材名 菜子七《湖北中草药志》

文献名 大叶石芥花《云南种录》

地方名 湖北:半边菜(竹溪),大菜子七(神农架);四川:妇人参、普贤菜(峨眉山)。

功效 根茎、全草:止咳,化痰,活血,止泻。用于百日咳,慢性支气管炎,小儿腹泻,跌打损伤等。

#### 7039043

*Cheiranthus cheiri* L.

植物名 桂竹香《中国植志》

药材名 桂竹香《台湾药植志》

文献名 紫罗兰《科裁》,香紫罗兰、黄紫罗兰(华北观赏植物),黄紫罗兰花、香紫罗兰花《台湾药植志》

地方名 上海;华尔花。

功效 花、根:通经,镇痛,镇痉,解凝,泻下。用于心脏病,麻痹,肾虚,泻下,通经;种子:壮阳。

#### 7039044

*Cheiranthus forrestii* (W. W. Smith) Hand. - Mazz.

植物名 匍匐桂竹香《中国植志》

文献名 滇桂竹香《云南种录》

地方名 云南:桂竹香。

功效 种子:解毒止呕。

#### 7039045

*Cheiranthus roseus* Maxim.

植物名 红紫桂竹香《中国植志》

文献名 “甲贝”(藏名)《青藏药图》

功效 全草:清热解毒。

#### 7039046

*Cochlearia henryi* (Oliv.) O. E. Schulz

植物名 柔毛岩芥《中国植志》

药材名 毛腊菜《神农架药录》

文献名 川鄂辣根《神农架药录》

地方名 四川:乾岩腔。

功效 全草:清热解毒。用于痈疽肿痛,红肿疮毒。

#### 7039047

*Cochlearia officinalis* L.

植物名 岩芥《中国植志》

药材名 岩芥《新华本草纲要》

文献名 辣根菜《拉汉种称》

功效 全草:用于抗坏血病,消化不良,牙痛及口腔病。

#### 7039048

*Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl

植物名 播娘蒿《救荒本草》、《中国植志》

药材名 甜葶苈子(华东)

文献名 莠《诗经》,萝《尔雅》,莠蒿、藿蒿《尔雅注》,萝蒿《诗传》,萩《说文》,米蒿《救荒本草》,抱娘蒿《纲目》,葶苈《新纲》,眉毛蒿、眉眉蒿、婆婆蒿、(黄蒿)《中国药植志》,华东葶苈子《中药大辞典》,南葶苈《中药通报》,葶苈子、南葶苈子《药典》

地方名 麦蒿(山东、江苏、甘肃),米米蒿(河南、山东、江苏),野芥菜(河北、陕西、内蒙古),麦蒿子(甘肃、

河北),布娘蒿(甘肃、青海);河北:芝麻眼草;内蒙古:“汗毕勒”(蒙名),〔苦葶苈〕;甘肃:苦芥子,〔黄蒿子〕;青海:“象才那保”(藏名),甜葶苈,辣辣盖,辣辣子;新疆:“乔棍坦”(维语);山东:麦里蒿,麦苈蒿,山东甜葶苈;江苏:线香子(泰州),丁栗,扫地娘(苏北),眉毛蒿子;福建:翁杠研(福州);湖北:蜈蚣草(郧西);河南:密密蒿。

功效 种子:泻肺平喘,行水消肿。用于痰涎壅肺,喘咳痰多,胸胁胀满,不得平卧,胸腹水肿,小便不利,肺原性心脏病水肿;地上部分:用于炭疽病。

#### 7039049

*Dimorphostemon glandulosus* (Kar. et Kir.) V. Golubk. --- *Torularia glandulosa* (Kar. et Kir.) Vass.

植物名 腺异蕊芥《中国植志》

文献名 腺毛念珠芥《青藏药图》,具腺异蕊芥《中草药》

地方名 青海:“切乌拉普”(藏名)。

功效 全草:用于解食物中毒。

#### 7039050

*Dontostemon dentatus* (Bunge) Ledeb.

植物名 花旗杆《中国植志》

药材名 花旗竿《中国药植志》

文献名 齿叶花旗竿《东检》

地方名 山东:苦葶苈、葶苈子、米蒿(牙山)。

功效 全草、种子:利小便。

#### 7039051

*Draba eriopoda* Turcz.

植物名 毛和葶苈(拟)

文献名 毛葶苈《中国植志》

功效 种子:清热祛痰,利尿定喘。

#### 7039052

*Draba ladyginii* Pohle

植物名 线果和葶苈(拟)

药材名 线果和葶苈子(拟)

文献名 线果葶苈《秦岭植志》,苞序葶苈《中国植志》

地方名 四川:穴乌萝卜。

功效 全草:清热解毒,消炎,祛痰平喘,解食物中毒。

#### 7039053

*Draba nemorosa* L. -- *D. nemorosa* L. var. *hebecarpa* Lindbl.

植物名 和葶苈《中医药研究杂志》

文献名 葶苈《中国植志》

地方名 筛子底(黑龙江、辽宁、吉林、山东);吉林:猫耳杂;内蒙古:“哈木比乐”(蒙名);山东:剪子股(费县),雀儿不食(牙山);浙江:小山时娘;湖北:地米菜(神农架);四川:“摘呷哇”、“真呷哇”(若尔盖藏名)。

功效 种子:与葶苈子相似。

备考 近代很多植物学与中草药方面的书均以此为本草之“葶苈”。实际上我国各地商品葶苈多不是本种。《证类本草》、《纲目》、《名实图考》记载的葶苈亦非

此种,而日本文献记载的葶苈确为本品。故作者将植物名与药材名均改称为“和葶苈”,并建议将 *Draba* L. 改称“和葶苈属”。

#### 7039054

*Draba nemorosa* L. f. *latifolia* Marsch.

植物名 宽叶和葶苈(拟)

文献名 宽叶葶苈《中国植志》,“切乌拉普”(藏名)《青藏药图》

功效 全草:健胃,解毒。用于食物中毒,消化不良。

#### 7039055

*Draba nemorosa* L. var. *leiocarpa* Lindbl.

植物名 光果和葶苈(拟)

文献名 光果葶苈《中国植志》,猫耳菜《兴安植群》

地方名 四川:“真呷注”(若尔盖藏名)。

功效 种子:类似葶苈子。

#### 7039056

*Draba oreades* Schrenk

植物名 喜山和葶苈(拟)

文献名 毛葶苈、“希五拉普”(藏名)《青藏药图》,喜山葶苈《中国植志》,山葶苈《云南种录》

地方名 陕西:石波菜。

功效 全草:助消化,消炎。用于肉食中毒等病;种子:利水,祛痰平喘。

#### 7039057

*Eruca sativa* Mill.

植物名 芝麻菜《名实图考》、《中国植志》

药材名 金堂葶苈《汇编》

文献名 臭芥子《中国药植志》,苦葶苈《四川中药志》,臭萝卜子、香油菜《汇编》

地方名 芸芥(西北、东北);黑龙江:香油罐;辽宁:臭菜(北镇);内蒙古:“麻吉—诺高”(蒙语),臭芥;青海:瓢儿菜;新疆:“芝麻黄”;四川:臭萝卜,葶苈子。

功效 种子:降肺气,利肺水。用于陈久性咳嗽。

#### 7039058

*Erysimum aurantiacum* (Bunge) Maxim. --- *Erysimum bungei* (Kitag.) Kitag.

植物名 糖芥《中国植志》

药材名 糖芥《中草药学》

地方名 内蒙古:“乌兰-高恩淘格”(蒙名)。

功效 全草及种子:强心利尿,健脾和胃,消食。用于心悸,浮肿,消化不良;种子:清血热,镇咳强心。

#### 7039059

*Erysimum cheiranthoides* L. --- *E. macilentum* Bunge

植物名 小花糖芥《中国植志》

药材名 小花糖芥《中草药学》

文献名 桂竹糖芥《东北药植志》,糖芥、浅波缘糖芥《中草药学》,桂竹香糖芥《汇编》,黄草《上海中医药杂志》

地方名 〔葶苈子〕(山东、河北、内蒙古、北京);内蒙古:打水水花,金盏盏花,“希和日—赫其”(蒙名);陕西:野菜子(宁陕、石泉);山东:〔葶苈〕(烟台),〔苦葶苈

子〕。

功效 全草或种子:有小毒。强心利尿。用于心力衰竭。

#### 7039060

*Erysimum diffusum* Ehrh.

植物名 灰毛糖芥《中国植志》

文献名 糖芥《西藏中草》,披散糖芥《中药大辞典》

地方名 西藏:“冈托巴”(藏名)。

功效 全草、种子:清血热,镇咳,强心。用于虚劳发热,肺结核咳嗽,久病心力不足,解肉食中毒。

#### 7039061

*Erysimum flavum* (Georgi) Bobrov --- *E. altaicum* C. A. Meyer

植物名 蒙古糖芥《中国植志》

药材名 蒙古糖芥《新华本草纲要》

文献名 阿尔泰糖芥《内蒙古植志》

地方名 内蒙古:“阿尔泰音—高恩淘格”(蒙名)。

功效 全草:用于心脏病。

#### 7039062

*Hesperis matronalis* L.

植物名 欧亚香花芥《中国植志》

文献名 紫香花草《东北草本植志》,紫花南芥《中国植志》

功效 叶及种子:利尿,发汗。

#### 7039063

*Iberis pectilata* L.

植物名 蜂蜜花《西双版纳傣药志》

地方名 云南:“井娘”(傣语),红香草。

功效 种子:用于头昏目眩,心慌呕吐,湿热中暑。

#### 7039064

*Isatis indigotica* Fortune --- *Isatis tinctoria* L. var. *indigotica* (Fortune) T. Y. Cheo et K. C. Kuan --- *Isatis tinctoria* auct. non L.

植物名 菘蓝《唐本草》、《中国植志》

药材名 大青叶《药典》,板蓝根《纲目》、《药典》,青黛《药性论》、《药典》

文献名 蓝淀《本草拾遗》,青靛《普济方》,靛青《邓子禹家抄方》,蓝靛《纲目》,靛青根《本草便读》,蓝靛根《分类草药性》,靛根《形性鉴别》,靛花《简明中医辞典》,大青、菘青《中药志》,草大青《汇编》

地方名 内蒙古:“德瓦”(蒙名);江苏:大靛(南通),大蓝(如皋),大蓝叶,大蓝根,靛青叶;四川:北板蓝根(峨眉山);其他:蓝靛叶。

功效 叶(大青叶):清热解毒,凉血消斑。用于温邪入营,高热神昏,发斑发疹,黄疸,热痢,疔疮,喉痹,丹毒,痈肿;根(板蓝根):清热解毒,凉血利咽。用于温毒发斑,舌绛紫暗,疔疮,喉痹,烂喉丹痧,大头瘟疫,丹毒,痈肿;茎叶加工品(青黛):清热解毒,凉血,定惊。用于温毒发斑,血热吐衄,胸痛咳血,口疮,疔疮,喉痹,小儿惊风。

备考 过去许多药学和植物学文献,曾将本种学名误订为 *Isatis tinctoria* L. (欧洲菘蓝,原产欧洲,我国

仅个别地区引种栽培。)

### 7039065

*Isatis minima* Bunge

植物名 小果菘蓝《中国植志》

功效 根、叶：清热解毒，凉血，消斑，利咽，定惊。

### 7039066

*Isatis oblongata* DC.

植物名 长圆果菘蓝《中国植志》

药材名 矩叶大青《种称补编》

文献名 大青叶《和汉药名汇》，青靛《满鲜植汇》，东北菘蓝、江南大青《东北药植志》，大青、青黛《药材学》

功效 全草及根：清热解毒，消炎。用于伤寒，口腔溃疡，咽喉炎，扁桃腺炎，鼻衄，菌痢。

### 7039067

*Isatis tinctoria* L.

植物名 欧洲菘蓝《中国植志》

功效 叶、根：清热、解毒，凉血。

备考 原产欧洲，我国个别地区（北京、南京）有栽培。

### 7039068

*Lepidium apetalum* Willd.

植物名 葶苈《本经》、《中医药研究杂志》

药材名 葶苈子《药典》

文献名 大室、大适《本经》，葶藶、丁历《别录》，赤须子《炮炙论》，曹州葶苈《图经》，麦秸菜《救荒本草》，辣辣菜《名实图考》，丁乐、丁苈、帝力、苦草、良医匕首《新纲》，腺独行菜《东检》，雀扑拉、筷子头《东北药植志》，腺茎独行菜《中国经植志》，小辣辣、麻麻子《沙漠药植》，小花独行菜《中草药学》，拉拉罐、白花草《中药大辞典》，无瓣独行菜《长白山植志》，北葶苈子、独行菜《药典》，辣麻《中国药植志》

地方名 苦葶苈（华北），辣辣根（内蒙古、甘肃、河北、东北），辣麻麻（东北、内蒙古、山西），羊辣罐子（东北）；吉林：沙莽，“苏米那依依两”（朝名）；天津：宁津草，芝麻眼草；内蒙古：〔甜葶苈〕，〔甜葶苈子〕，“鲁音一苏亚一乌布斯”（蒙名），“达力羊牙干”、“隆绍特”、“昌古”、“光土各不加”（蒙名）；陕西：尿溜溜；青海：“察洩”（藏名），辣辣盖，辣辣子，拉拉盖子；山东：辣蒿；湖北：葶苈草（神农架）；西藏：“茶戳巴”（藏名）；其他：羊辣罐（北方）。

功效 种子：泻肺平喘，利水消肿。用于痰涎壅肺，喘咳痰多，胸胁胀满，不得平卧，胸腹水肿，小便不利，肺原性心脏病水肿；地上部分（宁津草）：用于肠炎，腹泻，细菌性痢疾。

### 7039069

*Lepidium cuneiforme* C. Y. Wu

植物名 楔叶葶苈（拟）

药材名 楔叶葶苈子（拟）

文献名 中华独行菜《甘肃本草》，楔叶独行菜《中国植志》

功效 种子：泻肺平喘，行水消肿。

### 7039070

*Lepidium densiflorum* Schrad.

植物名 密花葶苈（拟）

药材名 密花葶苈子（拟）

文献名 密花独行菜《中国植志》

功效 种子：利尿，平喘。用于咳嗽，水肿。

### 7039071

*Lepidium latifolium* L.

植物名 宽叶葶苈（拟）

药材名 宽叶葶苈子（拟）

文献名 羊辣辣《中国经植志》，宽叶独行菜《中国植志》，辣芥《沙漠药植》

地方名 止痢草（陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古），葶苈子（陕西、甘肃、青海）；辽宁：白花子；内蒙古：“希古崔克”（蒙名），大辣辣。

功效 全草：清热燥湿。用于菌痢，肠炎腹泻。

### 7039072

*Lepidium latifolium* L. var. *affine* C. A. Mey.

植物名 光果宽叶葶苈（拟）

药材名 光果宽叶葶苈子（拟）

文献名 羊辣辣、大辣辣、宽叶独行菜《高植图鉴》，光果宽叶独行菜《中国植志》，北独行菜《东检》

地方名 葶苈子（陕西、甘肃、青海）。

功效 种子：泻肺平喘，行水消肿。

### 7039073

*Lepidium perfoliatum* L.

植物名 抱茎葶苈（拟）

药材名 抱茎葶苈子（拟）

文献名 抱茎独行菜《中国植志》，穿叶独行菜《东检》

功效 全草：利尿，抗坏血病。

### 7039074

*Lepidium rudemale* L.

植物名 柱毛葶苈《中医药研究杂志》

药材名 柱毛葶苈子（拟）

文献名 独行菜《种称》，柱腺独行菜《东检》，野独行菜《汇编》，柱毛独行菜《中国植志》

地方名 葶苈子（宁夏、甘肃、内蒙古）；河北：辣辣菜，白花草（保定），拉拉，麻麻（张家口）；内蒙古：辣麻麻。

功效 种子：泻肺定喘，行水消肿。

### 7039075

*Lepidium sativum* L.

植物名 大辣辣菜（拟）

药材名 大辣辣菜（拟）

文献名 独行菜《中草药学》，家独行菜《中国植志》

地方名 新疆：“台尔台孜”（维名）。

功效 全草：用于利尿，坏血病，疟疾；种子：用于气管炎，疥癣。

备考 B. E. Read 将本品误订为《救荒本草》的“独行菜”，现时植物学文献即随之将 *Lepidium* 误订为“独行菜属”。经作者考证，《救荒本草》中的独行菜，不能证实为 *Lepidium* 属植物，而古今正品葶苈子确为

Lepidium 属植物。因之,建议将 Lepidium 属的中文译名由独行菜属为改称为葶苈属,与此有关的“独行菜族”,也应改称为“葶苈族”。

## 7039076

*Lepidium virginicum* L.

植物名 琴叶葶苈《中医药研究杂志》

药材名 葶苈子(华东、东北、华北)

文献名 辣辣菜《救荒本草》,琴叶独行菜《东北草本植志》,北美独行菜《中国植志》,美洲独行菜《中药大辞典》

地方名 大叶香芥菜(浙江、江西、湖南),辣辣根(东北),独行菜(浙江、台湾),北葶苈子、苦葶苈(华北);山东:辣菜;江苏:拉拉根,星星菜,小白菜,马菱;湖南:六月雪;贵州:瓜子草,瓜米菜。

功效 种子:泻肺定喘,利尿消肿。用于痰饮喘咳,胸肋胀痛,水肿尿少,肺原发性心脏病。

## 7039077

*Malcolmia africana* (L.) R. Brown

植物名 涩芥《中国植志》

药材名 紫花芥《西藏中草》

文献名 马康草《中国植志》,离蕊芥《高植图鉴》

地方名 甘肃:麦拉拉;青海:千果草;江苏:涩叶子(丰县),大麦芥菜;西藏:〔葶苈子〕,“葵兀萝卜”(藏语)。

功效 种子:祛痰定喘,泻肺行水。用于咳逆痰多,脾虚肿满,胸腹积水,胸肋胀满,肺病。

## 7039078

*Megacarpaea delavayi* Franch.

植物名 高河菜《名实图考》、《中国植志》

功效 全草:清热。

## 7039079

*Nasturtium officinale* R. Br. --- *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek --- *Sisymbrium nasturtium-aquaticum* L.

植物名 豆瓣菜《名实图考》、《中国植志》

药材名 西洋菜干《生草药手册》、《中药大辞典》

文献名 无心菜《名实图考》,西洋菜《上海蔬菜品种志》,水蔊菜、和兰芥《经植手册》,水菜《中国蔬菜》,水芥菜《中药大辞典》,水芥子《台湾药植志》,水田芥《拉汉种称》

地方名 河北:水生菜;四川:水葶苈(峨眉山)。

功效 全草:清热解毒,凉血止痛,助消化。用于气管炎,肺热咳嗽,泌尿系统炎症,疔毒痈肿,皮肤瘙痒,促进新陈代谢。

备考 国外资料报导,本种熟食,用于通经,流产,避孕。

## 7039080

*Neomartinella violaeifolia* (Levl.) Pilg.

植物名 蕨叶芥《中国植志》

文献名 马庭芥《湖北植志》

地方名 湖北:破风头(巴东),小岩白菜(竹溪);广西:麝香草(环江)。

功效 全草:清热解毒。用于疮痈肿毒。

## 7039081

*Pegaeophyton scapiflorum* (Hook. f. et Thoms.) Marq. et Shaw --- *Cochlearia scapiflorum* Hook. f. et Thoms.

植物名 单花芥《中国植志》

药材名 高山辣根菜《青藏药图》

文献名 无茎芥《药典》,高山无茎芥《甘肃中草》,葶苈《云南种录》,单花芥《中国药植志》

地方名 青海:“苏罗杂布”、“苏罗杂保”(藏名)。

功效 全草:解食物中毒,退烧。用于肺咯血,肺热咳嗽。外用于刀伤。

## 7039082

*Pugionium calcaratum* Kom.

植物名 阿拉善沙芥《沙漠植志》

文献名 距沙芥《沙漠植志》

功效 全草:消食,行气,止痛,解毒。用于消化不良,胃肠胀气。

## 7039083

*Pugionium cornutum* (L.) Gaertn.

植物名 沙芥《中国植志》

药材名 沙芥《沙漠药植》

文献名 沙芥菜《内蒙古中草药》,山萝卜《沙漠药植》,山羊沙芥《内蒙古植志》

地方名 沙盖(陕西、宁夏);内蒙古:沙萝卜,沙白菜,“沙拉格老”、“额勒森-老崩”、“泽尔勒格-洛万”、“额乐孙罗邦”(蒙语)。

功效 全草:行气止痛,消食,解毒。用于胃肠胀气,消化不良;根:止咳,清肺热。用于子气管炎。

## 7039084

*Pugionium dolatratum* Maxim.

植物名 斧翅沙芥《中国植志》

药材名 斧形沙芥《中草药》

文献名 沙芥、宽翅沙芥《沙漠药植》

地方名 内蒙古:绵羊沙芥,“乌日格-额乐孙罗邦”(蒙名)。

功效 全草:行气,止痛,消食,解毒,止咳,清肺热。用于胃肠胀气,消化不良,食物中毒,气管炎。

## 7039085

*Raphanus sativus* L.

植物名 萝卜《食疗本草》、《中国植志》

药材名 莱菔子《本草衍义补遗》、《药典》

文献名 葵、芦菔、蕒菜、苣(尔雅),萝藦(《汉书》晋灼注),芦菔(说文),罗服(潜夫论),菰藟(广雅),服(唐灼注),紫菰、菜菔(唐本草),菰葵(经典释文),紫花菰、温菰、萝菰、楚菰、秦菰(图经),萝卜子(日华子本草),葵子(癸辛杂识),仙人骨(博济方),土酥(蔬食谱),红萝卜杆、红萝卜杆叶、白萝卜杆、白萝卜杆叶《滇南本草》,莱菔菜《本草从新》,红萝卜《汝南圃史》,地骷髅《纲目拾遗》,萝卜缨《本草再新》,透心红(宁州志),老萝卜头《分类草药性》,老人头《天宝本草》,唐菁子、羌精子、登菰子、楚菰子、菰菰子、土酥子、温菰子、萝卜子、萝爬子、芦菔子、紫花菰子《新纲》,破地椎《诗草木今释》,菜

服用、地枯萝《现代实用中药》,地枯菱《药材学》,枯萝卜《汇编》,萝卜《广州植志》

地方名 菜头(福建、浙江、台湾),有莲花(东北);北京:旱萝卜子;青海:白萝卜子;山东:灯笼红萝卜,脆萝卜,仙人头;江苏:萝卜甲(叶)、气萝卜(老根)(徐州),空菜菔(苏州),菜菔英(南通、镇江),菜菔菜,萝卜黄,霜露菜,萝卜母,空萝卜,萝卜空;浙江:菜菔樱;台湾:内腹子;河南:卜子;湖南:菜萝卜,地灯笼,寿星头;广西:萝卜米(北流),大萝卜,窝萝卜,萝卜菜;四川:满园花,〔诸葛菜〕(成都),“罗吾”(藏名)。

功效 种子(菜菔子):消食除胀,降气化痰。用于饮食停滞,脘腹胀痛,积滞泻痢,痰壅喘咳;干枯老根(地骷骸):宣肺化痰,消食,利水。用于咳嗽多痰,食积气滞,脘腹痞闷胀痛,水肿喘满,噤口痢疾;鲜根(萝卜):消积滞,化痰热,下气,宽中,解毒。用于食积胀满,痰嗽失音,吐血,衄血,消渴,痢疾,偏正头痛;根叶(菜菔叶):消食,理气。用于胸膈痞满作呃,食滞不消,泻痢,喉痛,妇女乳肿,乳汁不通。

#### 7039086

*Raphanus sativus* L. var. *longipinnatus* Bailey

植物名 长羽裂萝卜《中国植志》  
药材名 地骷骸(根)、菜菔子(种子)《中草药》  
文献名 菜菔《唐本草》,长羽叶萝卜《中国药植志》  
地方名 广东:萝卜,萝卜白;云南:紫花菘,芦菘,菜菔秧。

功效 种子:消食除胀,降气化痰;干枯老根:宣肺化痰,消食,利水;鲜根:消积滞,化痰热,下气,宽中,解毒;基生叶:消食,理气,通乳。

#### 7039087

*Raphanus sativus* L. var. *raphanustroides* (Makino) Makino

植物名 蓝花子《中国植志》  
药材名 滨菜菔《台湾植志》  
地方名 广西:满园花,茹菜;云南:冬菜子。  
功效 种子:宽中下气。

#### 7039088

*Rorippa dubia* (Pers.) Hara --- *Rorippa montana* (Wall.) Small. --- *Nasturtium montanum* Wall.

植物名 无瓣蔊菜《中国植志》  
药材名 野油菜《高植图鉴》  
文献名 塘葛菜《岭南采药录》,蔊菜《江苏南部种册》

地方名 〔葶苈子〕(江西、安徽、上海),大叶香芥菜(江苏、浙江),地豇豆(云南、贵州、四川);陕西:水辣辣菜,辣辣菜(勉县);上海:江剪刀草;安徽:银银菜,野辣菜;福建:山芥菜,独根菜,山萝卜,金丝菜,山油菜(清流),黄花仔(三明),大叶鸡心菜,假挂菜子(寿宁);湖南:铁油菜,黑鱼草;广东:田葛菜,野葛菜(广州),假菜仔(普宁),骨菜(惠阳),天芥菜(潮阳),天葛菜(汕头),萍菜(揭阳);广西:鸡肉菜;四川:干油菜,野菜子,地菜子(南充),清明菜;贵州:石豇豆,铁菜子;云南:野萝卜菜(保山),野青菜(玉溪),惊解豆、地平豆(丽江),狗屎

菜、小芥菜、小青菜(红河),小青豆,惊豆。

功效 全草:祛痰,止咳,清热解毒,活血通经;茎叶:外用于肿痛。

#### 7039089

*Rorippa elata* (Hook. f. et Thoms.) Hand. Mazz.

植物名 高蔊菜《中国植志》  
药材名 高蔊菜《迪庆藏药》  
文献名 冈托巴曼巴《迪庆藏药》  
地方名 四川:〔苦菜〕,〔葶苈〕。  
功效 种子:解烦热,解毒。用于肺病,血症,食物中毒

#### 7039090

*Rorippa globosa* (Turcz.) Hayek --- *Nasturtium globosum* Turcz. --- *Rorippa globosa* (Turcz.) Thell. --- *Rorippa islandica* auct. non (Oed.) Borb.

植物名 风花菜《中国植志》  
药材名 风花菜《救荒本草》,《植分学报》  
文献名 银条菜《救荒本草》,水蔓菁《江苏植志》,球果蔊菜《高植图鉴》,圆果蔊菜《广州植志》

功效 全草:清热利尿,解毒,消肿。用于黄疸,水肿,淋病,咽痛,痢肿,烫火伤。

备考 《植分学报》(1980)称:《救荒本草》之“风花菜”原植物应为本种,非 *R. islandica* (Oed.) Borb.

#### 7039091

*Rorippa indica* (L.) Hieron --- *Rorippa indica* (L.) Bailey --- *Nasturtium indicum* (L.) DC.

植物名 印度蔊菜《江苏南部种册》  
药材名 江剪刀草《汇编》  
文献名 水萝卜《救荒本草》,〔葶苈〕《名实图考》,甜葶苈《和汉药标本目录》,蔊菜《中国植志》,塘葛菜《岭南采药录》

地方名 野菜子(上海、四川);甘肃:水辣辣;青海:“盖菜”(藏语);江苏:香芥菜;上海:江剪刀,野芥菜子,野菜花,野雪里蕻;浙江:野油菜,大叶香芥菜;台湾:山芥菜,白骨山葛菜;海南:清蓝菜;湖北:刚板菜、〔铁苋菜〕(神农架);四川:干油菜,天菜子;云南:鸡肉菜,辣米菜,地豇豆,山蔊菜,鸡油菜,野萝卜菜,野青菜,惊解豆,地平豆,小青豆,惊豆。

功效 全草:祛痰,止咳,清热解毒,活血通经。用于慢性支气管炎,咽喉肿痛,感冒发热,透发麻疹,闭经,风湿性关节炎,糖尿病。外用于疮疖肿痛,背疽等。

#### 7039092

*Rorippa islandica* (Oed.) Borb. --- *Rorippa palustris* (Leyss.) Bess. --- *Nasturtium palustre* DC. --- *Rorippa indica* auct. non (L.) Hieron

植物名 蔊菜《中医药研究杂志》  
药材名 蔊菜《纲目》  
文献名 蔊菜《本草拾遗》,辣米菜《纲目》,沼生蔊菜《中国植志》,〔风花菜〕《高植图鉴》,水萝卜《秦岭植志》  
地方名 江苏:香芥菜(铜山);四川:“叶香”(若尔盖藏名);云南:水葶苈,水前草,〔葶苈〕,地豇豆。

功效 全草:清热解毒,镇咳,利尿。用于感冒发



热,咽喉肿痛,肺热咳嗽,慢性气管炎,急性风湿性关节炎,肝炎,小便不利。外用于漆疮,蛇咬伤,疔疮痈肿

备考 1、现代不少文献多认为本章中的“蕤菜”学名为 *Rorippa indica* (L.) Hieron. 经作者考证,《本草纲目》的蕤菜,其叶明显羽状深裂,应该是 *R. islandica* (Oed.) Borb. 2、过去有些文献将本种定为《救荒本草》之“风花菜”也属误订。真正的风花菜应是 *R. globosa* (Turcz.) Hayek

#### 7039093

*Sinapis alba* L. --- *Brassica hirta* Moench. --- *B. alba* (L.) Rabenh

植物名 白芥《唐本草》、《中国植志》

药材名 白芥子《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 胡芥《蜀本草》,蜀芥《纲目》,辣菜子《中药志》,芥子《药典》

地方名 白芥末子(山东、陕西),苦芥子(陕西、四川);陕西:苦菜子;甘肃:芥;新疆:“阿克克恰”(维吾尔);山东:白芥末种(烟台);安徽:白辣菜子。

功效 种子:温肺豁痰利气,散结通络止痛。用于寒痰喘咳,胸胁胀痛,痰滞经络,关节麻木、疼痛,痰湿流注,阴疽肿毒。

#### 7039094

*Sisymbrium heteromallum* C. A. Meyer

植物名 垂果大蒜芥《中国植志》

药材名 垂果大蒜芥《中国药植志》

文献名 弯果蒜芥《东检》,“盖菜”(藏名)《青藏药图》,“冈妥巴”(藏名)《中国药植志》

地方名 内蒙古:“文吉格日一哈木白”(蒙名)。

功效 全草:用于淋巴结核。外用于脂肪瘤;种子:清血热,镇咳化痰,强心及解毒。用于虚劳咳嗽,气管炎,百日咳,久病心力不足,解肉食中毒等。

#### 7039095

*Sisymbrium irio* L.

植物名 水蒜芥《中国植志》

药材名 水蒜芥《中国药植志》

文献名 水芥菜(拉汉种称),台湾播娘蒿《台湾植志》

功效 种子:用于治疗小血疹,疳感染,非特异性热病。

#### 7039096

*Solms-Laubachia dolichocarpa* Y. C. Lan et T. Y. Cheo

植物名 长果丛蕨《中国植志》

药材名 长果丛蕨《中国药植志》

地方名 四川:“索裸格鲁”(藏名)。

功效 全草:清热利肺。用于肺炎。

#### 7039097

*Solms-Laubachia eurycarpa* (Maxim.) Botsch. --- *Parrya eurycarpa* Maxim.

植物名 宽果丛蕨《中国植志》

文献名 “苏罗苏扎”(藏名)《青藏药图》

地方名 西藏:“梭罗加博”(藏名),巴蓼草。

功效 全草:清热利肺。用于肺炎,肺脓肿,气管

炎,感冒

#### 7039098

*Solms-Laubachia latifolia* (O. E. Schulz) Y. C. Lan et T. Y. Cheo --- *Solms-Laubachia pulcherrima* Muschl. var. *latifolia* O. E. Schulz

植物名 宽叶丛蕨《中国植志》

药材名 丛蕨《迪庆藏药》

功效 根茎:清肺热,止咳,止血。用于肺炎,咳嗽,痰中带血。

#### 7039099

*Solms-Laubachia linearifolia* (W. W. Smith) O. E. Schulz --- *Parrya linearifolia* W. W. Smith

植物名 线叶丛蕨《中国植志》

药材名 鸡掌七《云南药录》

文献名 线形叶丛蕨《云南药录》

地方名 云南:鸡掌掌。

功效 全草:止血消炎,续筋接骨,益气补血。用于外伤出血,骨折,病后体虚,贫血。

#### 7039100

*Solms-Laubachia minor* Hand. -Mazz.

植物名 细叶丛蕨《中国植志》

药材名 丛蕨《迪庆藏药》

功效 根茎:清肺热,止咳,止血。用于肺炎,咳嗽,痰中带血。

#### 7039101

*Solms-Laubachia platycarpa* (Hook. f. et Thoms.) Botsch. --- *Parrya platycarpa* Hook. f. et Thoms.

植物名 总状丛蕨《中国植志》

药材名 总状丛蕨《中国药植志》

地方名 西藏:“扫罗慕布”(藏名)。

功效 全草:清肺热,镇咳,止血。用于肺炎咳嗽,痰中带血等症。

#### 7039102

*Solms-Laubachia pulcherrima* Muschl.

植物名 丛蕨《中国植志》

药材名 丛蕨《中国药植志》

地方名 西藏:“索鲁卡鲁”(藏名)。

功效 全草:有小毒。清热解毒。用于发热,风热,肺热咳嗽,感冒发烧,肝旺耳鸣,头晕目眩等症。

#### 7039103

*Thlaspi arvense* L.

植物名 蔊蕨《中国植志》

药材名 蔊蕨《本经》、《汇编》

文献名 蔊析、大蔊、马辛、析蕨子《本经》,析目、荣目、马驹《吴普本草》,大芥《别录》,老芥《尔雅》郭璞注,遏蓝菜《救荒本草》,〔甜葶苈子〕、〔麦蓝菜〕《滇南本草》,老鼓草《中国药植志》,瓜子草《中药志》,〔葶苈子〕《中草药》,蔊蕨苗《沙漠药植》

地方名 〔败酱草〕(江苏、浙江、上海、甘肃、安徽、中南);辽宁:洋辣罐;山西:〔犁头草〕;内蒙古:“横格日格—乌布斯”(蒙名),野榆钱;陕西:犁头菜、蔊目;甘肃:花花草、苦桔、斜铲铲;青海:“折朵哇”(藏

名),大铲铲草;山东:小山菠菜(牙山);江苏:罗汉草,香虫草,臭壁草,光明子,灯盏蒿(灌云),乌蓝菜(阜宁),苏败酱;上海:罗汉菜;安徽:[苦菜],拨郎鼓子棵;河南:[羊蹄],布郎鼓,大芥菜,辣辣根;湖北:南败酱,麦嘎公(神农架);四川:"则尔娃"(藏名),野油菜,响铃草,苦工菜,雀儿菜;贵州:牛虱子;云南:土葶苈,〔甜葶苈〕,〔苦葶苈〕〔洱源〕。

**功效** 地上部分:清肝明目,和中,解毒。用于目赤肿痛,消化不良,脘腹胀痛,肝炎,阑尾炎,疮疖痈肿;种子:祛风除湿,和胃止痛。用于风湿性关节炎,腰痛,急性结膜炎,胃痛,肝炎。

**备考** 《植物名实图考》之蕨蕨,就其所绘之图观之,其果实为倒三角形,应是荠菜,而非蕨蕨。

## 7039104

*Torularia humilis* (C. A. Mey.) O. E. Schulz --- *T. piasezkii* (Maxim.) Botsch. --- *T. maximowiczii* Botsch.

**植物名** 蛭果芥《中国植志》

**文献名** 串珠芥,细叶串珠芥《秦岭植志》,“切乌拉普”(藏名)《青藏药图》,直毛串珠芥《植分学报》

**功效** 全草:健胃,解毒。用于食物中毒,消化不良。

7040 堇菜科 *Violaceae*

## 7040001

*Viola acuminata* Ledeb.

**植物名** 鸡腿堇菜《高植图鉴补编》

**药材名** 红钵头草(陕西)

**文献名** 鸡脚堇菜《东检》,走边疆《陕西中草药》

**地方名** 堇菜、鸡腿菜、鸡蹬菜(东北);山东:针针花(泰山),山茄子(威海);湖北:大犁头草(神农架)。

**功效** 叶:清热解毒,消肿止痛。用于肺热咳嗽,跌打肿痛,疮疖肿毒。

7040002 见 7040023a

7040003 见 7040004

## 7040004

*Viola betonicifolia* Smith --- *V. caespitosa* D. Don --- *V. betonicifolia* Smith ssp. *nepalensis* W. Beck. --- *V. patrinii* var. *nepalensis* Ging

**植物名** 戟叶堇菜《中国植志》

**药材名** 钵头草《草木便方》、《中药大辞典》

**文献名** 堇菜《救荒本草》,小叶犁头草、戟叶犁头草《广西植录》,尼泊尔堇菜《高植图鉴》

**地方名** 箭叶堇菜(江苏、台湾、四川),紫花地丁(浙江、四川、云南),犁头草(湖南、广西、云南);江苏:地丁草;安徽:白花地丁;台湾:瓮菜黄,应菜黄;湖南:犁口草,犁头尖,鬼打伞;四川:青地黄瓜,地黄瓜;贵州:野半夏;云南:耗子核桃、虎寨阿墨(红河),地草果。

**功效** 全草:清热解毒,散瘀消肿。用于肠痈,疔疮,红肿疮毒,黄疸,淋浊,目赤生翳。

## 7040005

*Viola betonicifolia* Smith var. *oblongo-sagittata* (Nakai)

**植物名** 矩圆箭叶堇菜(拟)

**文献名** 戟叶堇菜、戟叶紫花地丁《台湾药植志》

**功效** 根:用于肿毒,疥癣,黄疸,腹痛。

## 7040006

*Viola biflora* L.

**植物名** 双花堇菜《高植图鉴》

**文献名** 孪生堇菜《拉汉英种称》,短距堇菜《东北草本植志》,短距黄花堇菜《云南种录》

**地方名** 陕西:紫金钱草(眉县);青海:“大莫永登”(藏名);云南:谷穗补(丽江)。

**功效** 花、叶:用于创伤,接骨。

## 7040007

*Viola biflora* L. var. *hirsuta* W. Beck.

**植物名** 硬毛双花堇菜《云南种录》

**地方名** 云南:谷穗补,〔小黑牛〕。

**功效** 根茎:用于小儿奶毒,跌打损伤,急性肺炎,肺出血。

## 7040008

*Viola chaerophylloides* (Regel) W. Beck.

**植物名** 南山堇菜《高植图鉴》

**药材名** 胡堇草《图经》

**文献名** 胡堇菜《浙江药植志》

**地方名** 浙江:〔蜈蚣草〕(临安),泥鳅草(乐清);湖南:冲天伞。

**功效** 全草:用于风热咳嗽,气喘无痰,毒蛇咬伤,跌打肿痛,外伤出血。

## 7040009

*Viola collina* Bess.

**植物名** 球果堇菜《中国植志》

**药材名** 地核桃《贵州民间方药集》

**文献名** 毛果堇菜《高植图鉴》

**地方名** 大细辛(内蒙古、新疆);陕西:六月霜,怀胎草(镇巴);江苏:瘡背草(南京);福建:银地匙、白毛叶地丁草、忍冬草(泉州);贵州:山核桃,箭头草,匙头菜,地丁子(惠水),紫花地丁。

**功效** 全草:清热解毒,消肿止血。用于疔疽肿毒,疔疮,中耳炎,肺痈,跌打损伤,刀伤出血。

## 7040009a

*Viola concordifolia* C. J. Wang --- *Viola cordifolia* W. Beck. --- *Viola japonica* auct. non Langsd.

**植物名** 心叶堇菜《中国植志》

**药材名** 犁头草(华东)、《汇编》

**地方名** 地丁草(内蒙古、山东、江苏、浙江、广西),紫花地丁(内蒙古、江苏、湖北);北京:如意草;内蒙古:“吉斯-地格达”(蒙名);陕西:钵头草(紫阳),犁头菜;山东:山茄子(烟台);江苏:瘡背草(南京);浙江:紫地丁;安徽:堇菜,疔疮草,瘡背草,小蓝花;江西:三角草,犁头尖,烙铁草,夜叉头;福建:犁壁草(厦门);贵州:钵口菜,犁嘴草,犁尖菜,玉如意,剪刀菜,箭头草,地黄瓜(贵阳);云南:耳钩草。

**功效** 全草:清热解毒,凉血消肿。用于急性结膜炎,咽喉炎,急性黄疸性肝炎,乳腺炎,痈疽肿毒,化脓性骨髓炎,毒蛇咬伤。

备考 过去不少文献多将本种误订为 *V. japonica* Langsd. 此种日本堇菜中国不产。

## 7040010

*Viola confusa* Champ.

植物名 短毛堇菜《高植图鉴补编》

文献名 毛堇菜《广西植录》, 纹乱堇菜《药植简编》

地方名 浙江: 紫花地丁; 湖北: 地丁(神农架)。

功效 全草: 拔毒生肌。用于痈疮肿毒, 目赤肿痛。

7040011 见 7040009a

## 7040012

*Viola davidii* Franch.

植物名 深圆齿堇菜《高植图鉴补编》

地方名 贵州: 马蹄草。

功效 全草: 清热解毒, 散瘀消肿。用于风火眼肿, 鬃子, 巴骨痠, 骨折, 无名肿毒; 叶: 外用于狗咬伤。

## 7040013

*Viola delavayi* Franch.

植物名 灰叶堇菜《高植图鉴》

药材名 黄花堇菜《云南中草药》

文献名 黄花地草果《滇南本草》, 踏膀药《汇编》, 具茎黄花堇菜《云南种录》

地方名 土细辛(四川、云南); 四川: 惊风草(西昌); 云南: 黄花草, 黄花棵, 黄花地丁, 黄花细辛, “娃碌塞”(楚雄彝名), 小黄药。

功效 带根全草: 温经通络, 除湿止痛。用于慢性风湿关节炎, 小儿麻痹后遗症。

## 7040014

*Viola diamantiaca* Nakai

植物名 大叶堇菜《高植图鉴补编》

药材名 大钵头草《汇编》

地方名 陕西: 白钵头草(平利), 寸节七。

功效 全草: 清热解毒, 止血。用于疮疖肿毒, 麦粒肿, 毒蛇咬伤, 外伤出血。

## 7040015

*Viola diffusa* Ging.

植物名 蔓茎堇菜《高植图鉴补编》

药材名 匍匐堇菜《汇编》

文献名 七星莲《名实图考》, 地白草《天宝本草》, 蔓茎堇菜《广西植录》, 匍匐堇菜《江西草药》

地方名 抽脓白(陕西、浙江), 黄瓜草(浙江、广西), 黄瓜香(陕西、湖南、湖北、广西、贵州、云南), 黄瓜菜(湖南、湖北、广西、贵州), 黄花草(江西、湖南), 野白菜(江西、福建、贵州); 陕西: 提脓草, 石白菜(泽县、留坝), 地崩草(洵阳), 九头草(白河), 小黄瓜香(镇坪), 黄瓜叶(宝鸡); 浙江: 抽脓拔; 安徽: 一粒谷; 江西: 伏地堇, 四季青, 雪里青(德兴), [六月雪](景德镇), 白狗草(婺源); 福建: 天芥菜草, 白菜仔, 白毒子草, 鸡鸡粘草, 菜干香(松溪、政和), 蛇毒子(永安), 地匙黄, 玉茶匙, 银茶匙、刀瓜菜、白水苦哉(清流), 白瓢菜(明溪), 白土子(三明), 白丁草(大田), 白疔草(厦门), 罗水苦哉(宁化), 西瓜香; 台湾: 茶匙黄; 湖北: 地白蜡、黄花香(神农

架); 湖南: 细通草, 毛毛藤, 毛毛香(沅陵), 牙爪藤(绥宁), 天井草(衡山), 六月霜(永兴), 地丁香(新化), 踏地兰(黔阳); 广西: 七星草(梧州、柳江), 虾蟆草(罗城), 地王草、细苦菜公(资源), 匙羹草、四季白菜(平南), 水芥菜(北流), 三天好(兴安), 白米草药(隆林), 白犁头草, 白花犁头草; 四川: 白地黄瓜, 毛叶地黄瓜, 狗儿草, 疯狗药、小野白菜(西昌), 地黄瓜(峨眉山), 地白菜; 贵州: 黄花草(都匀); 云南: 冷毒草(文山、红河), 扁担挑(红河); 其他: 披散堇菜。

功效 全草: 清热解毒, 消肿止痛。用于肝炎, 百日咳, 目赤肿痛。外用于跌打损伤, 蛇虫咬伤, 烫伤。

## 7040016

*Viola diffusoides* C. J. Wang --- *V. diffusa* Ging var. *glabella* H. de Boiss.

植物名 光茎堇菜《中国植志》

文献名 光匍伏堇《浙南本草新编》, 九州堇菜《台湾药植志》

地方名 台湾: 茶匙痕。

功效 叶: 用于肿毒; 全草: 用于胸部疾患, 咳嗽。

## 7040017

*Viola dissecta* Ledeb.

植物名 裂叶堇菜《高植图鉴》

药材名 疔毒草《吉林中草药》

地方名 四川: “亚尔母堂”(藏名)。

功效 全草: 清热解毒, 消痈肿。用于无名肿毒, 疮疖, 麻疹热毒。

## 7040018

*Viola dissecta* Ledeb. f. *pubescens* (Rgl.) Kitag. --- *V. pinnata* L. var. *dissecta* Ledeb.

植物名 短毛裂叶堇菜《沙漠植志》

功效 全草: 清热解毒, 消痈肿。用于疮疖, 无名肿毒。

## 7040019

*Viola duclouxii* W. Beck.

植物名 紫点堇菜《云南种录》

地方名 云南: 白花地丁, 山白花, 刀口药。

功效 全草: 用于无名肿毒, 刀伤, 喉头肿痛。

## 7040020

*Viola formosana* Hayata

植物名 台湾堇菜《台湾药植志》

地方名 台湾: 蜡壳钱, 红蜡壳草, 红锅盖草。

功效 全草: 用于小儿疾患, 痛经, 红崩白带, 腹痛下痢, 风湿痛等。

## 7040021

*Viola grandisepala* W. Beck. --- *V. brunneostipulosa* Hand. -Mazz.

植物名 阔萼堇菜《高植图鉴补编》

文献名 长茎堇菜、褐托堇菜《高植图鉴》, 阔叶堇菜、大萼堇菜、峨眉堇菜《云南种录》

地方名 四川: 狗儿草(峨眉山)。

功效 全草: 解毒消炎, 止血。

## 7040022

*Viola grypoceras* A. Gray

植物名 紫花堇菜《高植图鉴》

药材名 地黄瓜《贵州民间方药集》

文献名 曲角堇《种分》, 紫花堇《广西植录》

地方名 湖南: 肾气草(衡山); 广西: 犁头七、犁头草(临桂); 四川: 水地黄瓜(南充); 贵州: 白蒂黄瓜, 铧嘴菜, 黄反香。

功效 全草: 清热解毒, 止血, 化瘀消肿。用于无名肿毒, 刀伤, 跌打肿痛。外用于慢性喉痛红肿。

#### 7040023

*Viola grypoceras* A. Gray var. *pubescens* Nakai

植物名 柔毛紫花堇菜《秦岭植志》

文献名 曲角堇《药植简编》

功效 全草: 清热解毒, 止血, 化瘀消肿。

#### 7040023a

*Viola hamiltoniana* D. Don --- *Viola alata* Burgersd. ---

*V. arcuata* Blume

植物名 如意草《中国植志》

药材名 如意草《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 白三百棒《云南中草药》, 水白地黄瓜《药植简编》, 弧茎堇菜《拉汉英种称》

地方名 四川: 草三百, 黄花堇菜、生扯拢(峨眉山); 云南: 红三百棒(昭通), 犁头草, 箭头草, 绿白色地草果。

功效 全草: 温经通络, 止血接骨。外用于开放性骨折, 外伤出血。

#### 7040024

*Viola henryi* H. de Boiss.

植物名 巫山堇菜《中国植志》

文献名 紫叶堇菜《高植图鉴补编》

地方名 湖北: 铧头草(神农架)。

功效 全草: 清热解毒, 泻火, 消肿。

#### 7040025

*Viola inconspicua* Blume

植物名 长萼堇菜《高植图鉴》

药材名 犁头草(江西、广东、广西)、《汇编》

文献名 铧头草《草木便方》

地方名 紫花地丁(江西、浙江、福建、湖南、广东、广西), 地丁草、耳钩草、耳勾草、犁头菜(广东、广西), [犁头尖](江西、湖南), 犁嘴草(福建、云南), 箭头草(江西、福建); 江西: 小叶犁头草(德兴), 烙铁草, 三角草, 夜叉头; 福建: 剪刀刀, 凉亭菜, 羊陈菜, 羊铁菜, 杨合菜; 湖南: 见肿消, [散血草], 罐头尖; 广东: 长萼犁头草(罗定、增城), 犁壁草(兴宁、五华), 犁口草(广州), 犁嘴菜, 耳钩花(潮阳、普宁), 蓝花耳钩草(潮安、潮州), 粪箕笃(陆丰), 土地丁; 海南: 剪刀菜、玉如意(海口、定安、屯昌); 广西: [羊蹄草](桂林、融安), 紫地丁(梧州), 犁头嘴草, 犁尾蕨草, 小野芋, 鸡舌广, 如意草, 铧口尖(乐业); 贵州: 铧尖菜(兴义); 云南: 地黄瓜。

功效 全草: 清热解毒, 凉血消肿。用于急性结膜炎, 咽喉炎, 急性黄疸型肝炎, 乳腺炎, 痈疖肿毒, 化脓性骨髓炎, 毒蛇咬伤。

#### 7040026

*Viola kiangsiensis* W. Beck.

植物名 江西堇菜《高植图鉴补编》

药材名 高脚犁头草(广西)

功效 全草: 清热解毒, 凉血消肿。

#### 7040027

*Viola lactiflora* Nakai

植物名 白花堇菜《中国植志》

文献名 紫花地丁《和汉药名汇》, 宽叶白花堇菜《高植图鉴》

功效 全草: 用于五癆七伤, 全身疼痛。

#### 7040028

*Viola mandshurica* W. Beck. --- *Viola mandshurica* W. Beck. var. *cilita* Nakai

植物名 东北堇菜《高植图鉴》

药材名 紫花地丁《汇编》

文献名 地丁《食用植物图说》

地方名 满州堇菜(东北), 堇堇菜(东北、台湾); 陕西: 铧头草(宁陕)。

功效 全草: 清热解毒, 凉血消肿。用于疔疮肿毒, 痈疽发背, 丹毒, 毒蛇咬伤。

#### 7040029

*Viola mandshurica* W. Beck. f. *albiflora* P. Y. Fu et Y. C. Teng

植物名 白花东北堇菜《东北草本植志》

功效 全草: 清热解毒, 消炎消肿。

#### 7040030

*Viola minor* Makino

植物名 小堇菜《台湾药植志》

功效 叶、果实: 用于肿毒。

#### 7040031

*Viola mirabilis* L.

植物名 奇异堇菜《高植图鉴补编》

文献名 伊吹堇菜《中国植物图鉴》, 见肿消《药植简编》

功效 叶: 解毒消肿。

#### 7040032 见 7040032a

#### 7040032a

*Viola moupinensis* Franch. --- *V. vaginata* auct. non Maxim.

植物名 菫《礼记》、《中国植志》

药材名 鸡心七《汇编》

文献名 [细辛]《滇南本草》, 乌蘼连《贵州民间药物》, 大叶堇《广西植录》, 具鞘堇菜《药植简编》, 鞘柄堇菜《汇编》, [黄堇]、穆坪堇菜《云南种录》

地方名 陕西: 筋骨七(洋县); 湖北: 马蹄还阳、蜈蚣七(神农架); 广西: 一碗水(全州); 四川: 生扯拢、涎塌棒(峨眉山), 连草, 荳草(西昌), 土细辛, 宝兴堇菜; 贵州: 乌泡连, 山羊臭(威宁), 如意草, 母犁头菜; 云南: 白三百棒、红三百棒(昭通), 三百棒。

功效 全草、根茎: 清热解毒, 温经通络, 活血, 止血, 生肌排脓, 接骨。用于跌打损伤, 咳血。外用于乳

深炎,刀伤,开放性骨折,疔疮肿毒。

#### 7040033

*Viola nipponica* Maxim.

植物名 葵堇《药植简编》

地方名 广东:店空虎、白花散血草、人参草(潮阳),有粟草(普宁),店孔风(揭阳),生毛耳钩草(潮安);四川:地黄瓜(成都);贵州:地核桃、小种马蹄细辛(贵阳)。

功效 全草:清热,解毒,消肿。

#### 7040034

*Viola odorata* L.

植物名 香堇菜《药植简编》

文献名 香堇根《和汉药理学》,洋芝兰《植物名汇拾遗》,紫罗兰《中国经植志》,二月蓝《科裁》,香堇《经植手册》

地方名 上海:地丁,维奥拉;台湾:香堇菜花。

功效 花、根:防腐,祛痰,止泻,清凉,镇痛。用于伤风咳嗽,百日咳,疔疮,失眠等。

#### 7040035

*Viola oxycentra* Juz.

植物名 新疆香堇《汇编》

文献名 香堇《新疆中草药》

地方名 新疆:紫花地丁,“必乃甫谢”(维名)。

功效 全草:清热,解毒,消肿。

#### 7040036

*Viola patrinii* DC.

植物名 白花地丁《中国植志》

药材名 白花地丁《滇南本草》、《汇编》

文献名 银剪刀《纲目拾遗》,地黄瓜《分类草药性》,犁头尖《植物名汇》,呼脓白《民间草药与验方》,地丁《中国经植志》,白花堇菜《高植图鉴补编》

地方名 紫花地丁(甘肃、陕西、四川);山东:二月兰(青岛);四川:青地黄瓜,白地黄瓜、烙铁草、犁头草(重庆),铧头草(峨眉山),“杠脱洼”(藏名);云南:白犁头尖;其他:堇菜,犁头尖,旱堇,旱芹。

功效 全草:除风火,散瘀血,通经,消肿,解毒。用于疮毒红肿,疔疮,淋浊,狂犬咬伤,火眼,咽肿痛。

#### 7040037 见 7040037a

#### 7040037a

*Viola philippica* Cav. --- *V. philippica* Cav. ssp. *munda* W. Beck. --- *V. philippica* Cav. ssp. *malesica* W. Beck. --- *V. yedoensis* Makino --- *V. alisoviana* Kiss. --- *V. stenocentra* Hayata ex Nakai

植物名 紫花地丁《中国植志》

药材名 紫花地丁《纲目》、《药典》

文献名 箭头堇《普济方》,羊角子《乾坤生意秘传》,地草果《滇南本草》,独行虎《纲目》,地丁《本经逢原》,地丁草《本草再新》,宝剑草《名实图考》,辽堇菜《中国植物图鉴》,北堇菜、马来堇菜、光萼堇菜《药植简编》,野堇《鉴别手册》,光瓣堇菜《高植图鉴》,白毛堇菜《汇编》,云南堇菜《滇南本草》整理本,马蹄堇菜《中药大辞典》,台湾如意草《台湾药植志》,野堇菜《中国植志》

地方名 犁头草(陕西、福建、广西、云南),铧头草、地黄瓜(四川、云南),如意草(内蒙古、新疆),堇菜瘡(福建、台湾);河北:金银草;陕西:犁铧头、犁铧草(安康地区);山东:山茄子(威海);江苏:金剪刀;上海:猫耳朵草,疔疮草;浙江:红水牛花、剪刀股(嵊县);江西:金盞银盞,拔疗草;福建:犁铧尖(宁德),犁铧嫩草(周宁、罗源),犁头标、犁头嘴(松溪、政和),[犁头尖](福安),应菜瘡(厦门),尖尾青蛙旺,六月绿花草,耳钩草(罗源);台湾:鸡食黄,鹊鸟花;河南:紫花菜;银京菜;湖北:苦地丁;广西:马蹄草(临桂);贵州:五匹风;云南:地头草,地头果,地茄子,犁嘴菜,剪刀菜。

功效 全草:清热解毒,凉血消肿。用于疔疮肿毒,痈疽发背,丹毒,毒蛇咬伤。

#### 7040038 见 7040037a

#### 7040039

*Viola pilosa* Blume --- *V. serpens* Wall. ex Ging.

植物名 匍匐堇菜《高植图鉴》

药材名 冷毒草《文山中草药》

地方名 云南:地黄瓜(文山)。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于蛇咬伤。

#### 7040040

*Viola principis* H. de Boiss.

植物名 柔毛堇菜《高植图鉴》

文献名 紫叶堇菜《云南种录》

地方名 湖北:黄花地丁(神农架);广西:草本黄花(临桂);贵州:白阿飞。

功效 全草:清热解毒,散结。用于痈疮肿毒,乳痈。

#### 7040041

*Viola prionantha* Bunge

植物名 早开堇菜《高植图鉴》

文献名 尖瓣堇菜《东北草本植志》,锯花堇菜《云南种录》

地方名 紫花地丁(东北、华北、湖北)。

功效 全草:清热解毒,凉血,消肿。

#### 7040042

*Viola rhodosepala* Kitag.

植物名 红萼堇菜《东北草本植志》

功效 全草:清热解毒,散瘀消肿。

#### 7040043

*Viola rossii* Hemsl.

植物名 辽宁堇菜《高植图鉴补编》

文献名 洛雪堇菜《江苏植录》

功效 全草:清热解毒,凉血消肿。

#### 7040044

*Viola schneideri* W. Beck.

植物名 浅圆齿堇菜《高植图鉴补编》

地方名 广西:紫背草(凌云)。

功效 全草:用于痈疮肿毒,目赤肿痛。

#### 7040045

*Viola selkirkii* Pursh ex Gold

植物名 深山堇菜《中国植志》

药材名 深山堇菜《神农架药录》

地方名 陕西：一口血(秦岭)；湖北：白花地丁(神农架)。

功效 全草：清热解毒，消炎，消肿。

7040046 见 7040037a

7040047

*Viola stewardiana* W. Beck.

植物名 庐山堇菜《高植图鉴补编》

地方名 湖北：犁头草(神农架)。

功效 全草：清热解毒，凉血消肿。

7040048

*Viola tianshanica* Maxim.

植物名 天山堇菜《民族药志》

地方名 新疆：“天山比那夫西”(维名)。

功效 全草：清热解毒。用于感冒发烧，疗疮肿毒，淋巴结肿大。

7040049

*Viola triangulifolia* W. Beck.

植物名 三角叶堇菜《高植图鉴补编》

文献名 蔓地犁《广西植录》

地方名 广西：扣子兰(恭城)。

功效 全草：清热解毒。用于结膜炎。

7040050

*Viola tricolor* L. - *V. tricolor* L. var. *hortensis* DC.

植物名 三色堇《高植图鉴》

药材名 三色堇《中国药植图鉴》

文献名 游蝶草《和汉药物学》，蝴蝶堇《叶(生药)》，三色堇菜《中国植物图鉴》，蝴蝶花《中国药植图鉴》，游蝶花《台湾药植志》，蝴蝶梅《经植手册》

地方名 北京：鬼脸花；江苏：猫面花，猫脸花；上海：蝶蝶衣，猫儿头，猫儿脸，盼西。

功效 全草：清热解毒。用于咳嗽，小儿瘰癧。

7040051 见 7040032a

7040052

*Viola variegata* Fisch. ex Link

植物名 斑叶堇菜《中国植志》

药材名 斑叶堇菜《内蒙古中草药》

文献名 拂菜紫花地丁《陕甘宁植志》

地方名 内蒙古：“阿拉嘎·尼勒·其其格”(蒙名)；陕西：见肿消(凤县)，大蹄(旬阳)。

功效 叶：凉血止血。用于创伤出血。

7040053

*Viola verecunda* A. Gray

植物名 堇菜《尔雅》、《高植图鉴》

药材名 堇菜《汇编》

文献名 苦堇《尔雅》，堇、堇葵《唐本草》，堇堇菜《救荒本草》，玉如意《纲目拾遗》，箭头草《山西通志》

地方名 如意草(山西、浙江、台湾)；浙江：带血犁头草(临安)，胜利草(仙居)，白老碗(泰顺)，三角金砖(龙泉)；台湾：葡堇菜；广东：白花蚶壳草(潮阳)，落水金钱、倒地红(潮安)；广西：田螺师(陆川)，水兰豆(宾阳)；贵州：罐嘴菜，消毒药，消毒草，小犁头草，地黄瓜。

功效 全草：清热解毒，止咳止血。用于肺热咯血，扁桃体炎，眼结膜炎，腹泻。外用于疮疖肿毒，外伤出血，蝮蛇咬伤。

7040054 见 7040037a

7040055

*Viola yunnanensis* W. Beck. et H. de Boiss.

植物名 云南堇菜《高植图鉴补编》

文献名 滇堇菜《云南种录》

地方名 云南：紫罗兰，昆明堇菜。

功效 全草：用于小儿疳积。

7040056

*Viola yunnanfuensis* W. Beck.

植物名 滇中堇菜《高植图鉴补编》

文献名 紫罗兰、云南堇菜《汇编》，昆明堇菜《云南种录》

地方名 四川：铧头草，箭头草(西昌)。

功效 全草：清热解毒。用于痢疾疮疡。

## 7041 木犀草科 Resedaceae

7041001

*Reseda odorata* L.

植物名 木犀草《中国植志》

药材名 木犀草《台湾药植志》

文献名 香草《上海植录》

功效 花：利尿，祛痰。

## 7042 远志科 Polygalaceae

7042001

*Polygala angustifolia* Koidz.

植物名 窄叶远志(拟)

文献名 狭叶远志《江西药录》

功效 根：安神，祛痰。

7042002

*Polygala arcuata* Hayata

植物名 台湾远志《高植图鉴补编》

功效 叶、茎：镇痉。

7042003

*Polygala arillata* Buch.-Ham.

植物名 荷包山桂花《名实图考》、《高植图鉴补编》

药材名 鸡根(云南)、《汇编》

文献名 木本远志《种分》，鸡根远志《汇编》，黄花远志《高植图鉴》

地方名 江西：黄花鸡子、黄花接骨(泰和)，黄花鸡骨(南丰)，黄金卵(瑞金)，吊吊黄(井岗山)，念健(龙南)；福建：观音寸，观音串，观音坠，黄花金龟，黄花金挂，黄鸡花，倒吊孩儿；广西：黄花侧水莲(西林、德保)；四川：白皮树，鸡儿花(西昌)，阳雀花，树参，树人参、天(峨眉山)；云南：小荷包(保山)，鸡儿根、桂花岩托(大理、红河)，鸡肚子根(景东、大理、红河)，鸡肚子果(思茅)，[金不换](曲靖、红河)，小鸡角，瓦磁杯，甜远志，黄花侧水莲(红河)，洋雀花(丽江)，吊吊花，吊吊果(蒙自)，荷包山桂花，“牙喃嫩”(西双版纳傣语)，倒血

灵(马关),小鸡花、小鸡脚花(禄劝),老母鸡嘴(河口),辣树(潞西),金雀(大理白族),金儿女,花岩陀,黄杨参,白糯米;其他:吊黄。

功效 根皮:补气活血,祛风利湿。用于肺结核,产后虚弱,月经不调,白带,子宫脱垂,肝炎,风湿疼痛,跌打损伤。

#### 7042004

*Polygala arvensis* Willd. --- *P. telephioides* Willd. --- *P. kinii* Courtois

植物名 小花远志《高植图鉴》

药材名 金牛草《中药志》

文献名 细金牛草、小兰青《岭南采药录》,金氏远志《品种论述》,小金牛草《汇编》

地方名 细叶金不换(广东、广西);福建:刀莲癩、当年癩、多年癩、道尼癩、猫仔癩(闽南);广东:七寸金、单鞭救主(潮安),细金不换草(广州),小金牛,多年红,紫背金牛,紫花地丁,细牛草,土元金;海南:坡白草;广西:红丝线(隆林),瓜子金(三江);贵州:辰沙草(贵阳);云南:肥儿草,疳积草。

功效 带根全草:散瘀止血,化痰止咳,解毒消肿。用于咳嗽胸痛,肺结核,咳血,尿血,便血,月经不调,跌打损伤,小儿麻痹后遗症,肝炎,毒蛇咬伤。

#### 7042005

*Polygala barbellata* S. K. Chen

植物名 髯毛远志《云南植志》

地方名 云南:(接骨丹)(屏边)。

功效 根:用于腰痛。

#### 7042006

*Polygala caudata* Rehd. et Wils.

植物名 尾叶远志《高植图鉴》

药材名 乌棒子(贵州)、《汇编》

地方名 水黄杨木(广西、贵州);广西:木本远志,野桂花;云南:毛籽红山桂。

功效 根:止咳,平喘,清热利湿。用于咳嗽,支气管炎,黄疸型肝炎。

#### 7042007

*Polygala crotalarioides* Buch. -Ham. ex DC.

植物名 西藏远志《高植图鉴补编》

文献名 西南远志《中草药》,猪屎豆远志《药植简编》

地方名 四川:地花生,猪大肠,翻转红;贵州:蚌壳草,灯草;云南:"娘母良"(佤族语)。

功效 根:补心安神,祛痰。用于血虚,心悸,失眠多梦,咳嗽痰少。

#### 7042008

*Polygala dunniana* Levl.

植物名 贵州远志《高植图鉴补编》

药材名 贵州远志《贵州药录》

功效 根:养心安神,止咳化痰。用于咳嗽多痰,失眠。

#### 7042009

*Polygala fallax* Hemsl. --- *P. aureocauda* Dunn --- *P.*

*forbesii* Chodat

植物名 黄花倒水莲《高植图鉴》

药材名 黄花倒水莲《汇编》

文献名 假黄花远志《高植图鉴》,黄花远志《福建药物志》,尾叶远志《广西植录》

地方名 观音串(福建、广东、广西),吊吊黄(湖南、广东),鸡仔树、黄花参(广东、广西),倒吊黄(福建、广东);江西:黄花大远志;福建:观音坠(南靖、平和),黄花金盃(龙溪、古田、福州),黄花金盃(三明),黄花鸡骨草(福州),黄鸡媛子(武平),大远志,黄花假远志;湖南:木本远志,节端莲(瑶名);广东:倒吊黄,杓圈参,吊黄,鸡仔杆,倒水莲,倒吊莲,鱖鱼草、韩信草(潮阳),地金牛(四会、广宁),金牛仔,金牛草(潮安、普宁),大金牛草,大金不换,大金牛,多年红,安心草,麻利红(陆丰),五娘草、千里马、叶叶一枝花(五华),大叶紫金牛、叶叶花(粤北),金不换(广州),隔叶一枝花、合掌草(新会),叶里藏花(阳春),蛇通管(茂名、化州),生油麻(东莞),大兰青,大金草,鸚鵡茶,黄金印,念健,紫背金牛;广西:鸡仔胚(富川),鸡仔木叶(钟山),鸡仔兰(恭城),田古(大瑶山),扭计王(平南),护色吊(苍梧),兜订黄(玉林),倒顶王(容县),鸭仔兜(蒙城瑶语),一身保暖,黄花吊水莲(藤县、富川),光叶倒水莲,大青蛇草,塘角鱼菜,接骨仙草,老鸦草,仙头草,蚊公草,银不换,稔膜草,松根根;其他:假指味风。

功效 根或全草:补气益血,健脾利湿,活血调经。用于病后体虚,腰膝酸痛,跌打损伤,黄疸型肝炎,肾炎水肿,子宫脱垂,白带,月经不调。

#### 7042010

*Polygala furcata* Royle

植物名 叉枝远志《高植图鉴》

文献名 肾果小扁豆《广西药录》

功效 全草:用于小儿疳积。

#### 7042011

*Polygala glomerata* Lour. --- *P. chinensis* L.

植物名 球花远志《品种论述》

药材名 大金牛草《汇编》

文献名 蛇总管、鸚鵡茶、紫背金牛、金不换《生草药性备要》,大兰青、大金草《岭南采药录》,肥儿草《药性考补遗》,大叶金不换《中草药学》

地方名 大金不换(广东、广西),疳积草(广西、云南);广东:大青蛇草(广州),合掌草、鱖鱼草(新会),大叶紫背金牛(始兴、仁化、连南),叶叶花(曲江),叶叶一枝花(新丰、阳山),石胶草(英德),叶里藏花(阳春);海南:大金牛,金牛草,坡白草,金牛远志;广西:金包银(贺县),厚皮柑(北流、贵县),骨煎草、独足疳、六耳零、丝骨木、箭药(平南),电气药(桂平),熊骨木(南宁),六甲风(三江),银不换,稔膜草,松根根;贵州:午时合;云南:合叶、合叶草、侧生花远志(红河),赋虫药(河口)。

功效 全草:清热解毒,祛痰止咳,活血散瘀。用于咳嗽胸痛,咽炎,支气管炎,肺结核,百日咳,肝炎,小儿麻痹后遗症。外用于疳疔,疔肿,跌打损伤,毒蛇咬伤。

**7042012**

*Polygala glomerata* Lour. var. *villosa* C. Y. Wu et S. K. Chen

植物名 长毛华南远志《广西药录》

地方名 广西:银不换(邕宁)。

功效 全草:祛积,消肿止痛。

**7042013**

*Polygala hongkongensis* Hemsl. var. *stenophylla* (Hayata) Migo

植物名 狭叶香港远志《江苏植志》

文献名 狭叶港远志《药植简编》,香港远志《浙江药植志》,狭叶远志《广西药录》

功效 全草:祛痰止咳,活血消肿,解毒止痛。用于咽喉炎,小儿疳积,跌打损伤。

**7042014**

*Polygala hybrida* DC.

植物名 新疆远志《高植图鉴补编》

药材名 远志《新疆中草药》

功效 全草:祛痰利窍,益智安神。用于心悸失眠,咳嗽痰喘,百日咳。外用于癰肿。

**7042015**

*Polygala japonica* Houtt.

植物名 瓜子金《高植图鉴》

药材名 瓜子金《名实图考》、《汇编》

文献名 金锁匙、神砂草、地藤草《名实图考》,远志草《分类草药性》,要、小草、尔草、细草、苦要、婁绕、余粮、棘菟、阿只草、醒心杖《新纲》,和远志《中国药植志》,日本远志《李《生药》》,灵神草《朝植乡名》

地方名 二月花(广西、贵州),瓜子草(陕西、湖北、湖南、广西、四川),小远志(广西、贵州、云南),小英雄(江西、广西),土远志(安徽、福建),月月红(福建、河南),地丁草(浙江、广西),竹叶地丁(江苏、浙江、安徽、贵州),辰砂草(陕西、广西、四川、贵州),金牛草(河南、湖北),通性草(江苏、广东),铁钓竿(浙江、福建、台湾),散血丹、疔疔草(安徽、江西),黄瓜仁草(陕西、江西、广东);陕西:小草远志(镇坪、秦岭),土大烟(宝鸡),瓜米草(太白、镇坪、秦岭);江苏:下淋草(盱眙),产后草;浙江:小叶地丁草(开化、淳安),小叶瓜子草、柳叶紫花地丁(天台),铁洗帚、高脚瓜子草(临安);安徽:紫花菜;江西:散血草;福建:四季春(泉州),瓜子瘡(厦门),扭伤草,红骨丹,红骨苍蝇翼,挑年瘡,拉筋草,不老舌,圆叶伯劳舌,齿病草,鸦片草,山芙蓉,铁尺干,耳挖草;台湾:七寸金,蚰仔草,细仔草,铁吊杆;河南:乱马回;湖北:赖马回;湖南:金钥匙(常德),黄子草(溆浦),女儿红,瓜子莲,铁线风,对月草,荷包草,木瓜子莲,金珠草,沉香草,金线口,抽风竿;广东:铁门门,蛤蚧王(广州、从化),黄仙竹(南海);广西:小金不换、银不换(南宁),小冰香(隆林),紫金花(隆林、玉林),小红叶(柳江),小夜关门、麻雀草(凤山),白粘草(龙州),红根草(融安),红纱草(兴安),蛇药儿(桂林),钱线风(龙胜),骨线藤、瓜子莲(资源),节节花(藤县),毒蛇药(玉林),紫背金牛(贵县),金不换(容县、贵县、象州、柳江、

忻城),细金不换(崇左),蓝花草,石子莲,蛇草舌,过路蛇,狗牙草;四川:拦路枝、小金盆、鸡拍翅(重庆),〔山黄连〕,赤油胆,蛇舌草;贵州:瓜米细辛,〔鱼胆草〕,惊风草,地风消,铁箭风,接骨红;云南:直立细辛、苦草(曲靖),小丁香,火草杆、地丁、慢惊药、蓝花地丁(红河),苦远志

功效 全草:祛痰止咳,活血消肿,解毒止痛。用于咳嗽,痰多,慢性咽喉炎。外用于跌打损伤,疔疮肿毒,毒蛇咬伤。

**7042016**

*Polygala koi* Merr.

植物名 曲江远志《高植图鉴补编》

文献名 高氏远志《广西药录》

地方名 广西:一包花(大瑶山),红花倒水莲(武鸣)。

功效 全草:用于咳嗽,咽喉肿痛,小儿疳积,月经不调。

**7042017**

*Polygala latouchei* Franch.

植物名 大叶金牛《高植图鉴补编》

药材名 大叶金牛《广西药录》

文献名 红背蓝《品种论述》

地方名 江西:天青地紫;广西:一包花(金秀)。

功效 全草:清热解毒,祛痰止咳,活血散瘀。

**7042018**

*Polygala persicariaefolia* DC.

植物名 萼叶远志《高植图鉴补编》

文献名 桃叶远志《云南中草药》,蓼叶远志《高植图鉴》

地方名 广西:辣味根;贵州:远志;云南:黄瓜仁草(红河),紫饭豆(元江),“背当努尼尼杂”(元江哈尼语),瓜子金

功效 全草:祛风除湿,消肿止痛。用于咽喉肿痛,四肢关节痛,疮疡肿毒。

**7042019**

*Polygala saxicola* Dunn

植物名 岩生远志《高植图鉴补编》

地方名 广西:鸡脚爪(上林)。

功效 根:滋补强壮,止咳。

**7042020**

*Polygala sibirica* L.

植物名 西伯利亚远志《高植图鉴》

药材名 远志《药典》

文献名 阿只草、醒心杖、余粮《新纲》,地苣草、灵神草《满蒙产药植》,千里光《华北药集》,大远志、女儿红、青玉丹草、婁《中国药植志》,卵叶远志《华北经植志要》,宽叶远志《中药大辞典》

地方名 紫背金牛(东北),金牛草(东北、河北),瓜子金(东北、云南);青海:野胡麻;山东:小叶远志(崂山),粉子草(五莲);福建:铁甲草(松政);台湾:七寸金,蚰仔草,铁钓竿;广西:招蛇头(兴安),细沙药(南宁);四川:瓜子草、辰砂草、青鱼胆、痧药(绵阳),远志



草;贵州:小地风消;云南:神砂草(文山、大理),蓝花地丁(玉溪),〔地丁〕(红河),〔万年青〕(丽江),小丁香,〔紫花地丁〕;其他:阔叶远志,竹叶地丁,土远志。

功效 根:安神益智,祛痰,消肿。用于心神不交,失眠多梦,健忘惊悸,神志恍惚,咳痰不爽,疮疡肿毒,乳房肿痛。

#### 7042021

*Polygala sibirica* L. var. *megaphylla* Franch.

植物名 大冠远志《云南种录》

药材名 小蓝花地丁(云南)、《汇编》

文献名 苦远志〔根皮〕、紫花地丁、丁蒿、地丁《滇南本草》,大冠西伯利亚远志《药植简编》,小丁香《云南中草药选》

地方名 瓜子金(吉林、云南);四川:瓜子莲;云南:蓝花地丁草,小万年青,小远志,红花地丁,辰砂草。

功效 全草:消炎,止痛,拔毒,生肌。用于腮腺炎,小儿肺炎,胃肠炎,胃痛,疔疮,牙痛,风湿筋骨痛。外用于疮疖,关节脱臼,跌打劳伤。

#### 7042022

*Polygala subposita* S. K. Chen

植物名 和合草《中草药》

药材名 和合草《纲目拾遗》

文献名 合情草《纲目拾遗》,排钱金不换《云南植物研究》

地方名 贵州:午时合,对叶接骨草;云南:合掌草,合叶草。

功效 全草:清热解毒。用于感冒发热,喉炎,扁桃腺炎,淋巴腺炎,胃痛,疮疖红肿,外伤出血,骨折。

#### 7042023

*Polygala tatarinowii* Regel

植物名 小扁豆《名实图考》、《高植图鉴》

药材名 东北金牛草(拟)

地方名 小远志(东北、湖北、四川),金牛草、紫背金牛(东北);台湾:本草;湖北:一碗泡(神农架);贵州:遍地青;云南:“吴乌模”(楚雄彝名),猪大肠,野豌豆草(红河)。

功效 根:益智安神,散郁,化痰。用于神经衰弱,心悸,健忘,失眠,痰多咳嗽,支气管炎。

#### 7042024

*Polygala tenuifolia* Willd.

植物名 远志《高植图鉴》

药材名 远志《本经》、《药典》

文献名 蓼《诗经》,蓼绕、蓼菀《尔雅》,棘菀、小草、细草《本经》,阿门草、醒心杖、灵神草《满洲植录》,远志肉、远志根、远志梗、远志骨、细叶远志《中药大辞典》,小鸡腿、小鸡根《中草药》

地方名 小草根(青海、山东),光棍茶(辽宁、内蒙古、甘肃);辽宁:光棍茶根;河北:小鸡棵,小鸡科,山扁头根;山西:小鸡苗,山胡麻;内蒙古:“宝贝嘎日义”、“吉如根其其格”(蒙名);陕西:十二月花,米儿茶,草远志,野扁豆;青海:“切乌森玛”(藏名);山东:线儿茶(莱阳),线茶,小茶叶,小鸡草;江苏:小青草、远志筒(徐

州),青小草(清江、徐州),山茶叶(铜山),山茶叶根,山茶叶棵;安徽:狭叶远志,柳叶地丁;河南:茶棵;其他:燕子草。

功效 根:安神益智,祛痰,消肿。用于心肾不交,失眠多梦,健忘惊悸,神志恍惚,咳痰不爽,疮疡肿毒,乳房肿痛;茎、叶:主益精,补阴气,止虚损、梦泄。

#### 7042025

*Polygala tricornis* Gagnep. --- *P. floribunda* Dunn

植物名 密花远志《高植图鉴补编》

药材名 脐树根《云南药录》

地方名 广西:黄花远志(上思);云南:小鸡花,多花远志,罗尼远志。

功效 根:滋补强壮。

#### 7042026

*Polygala tricornis* Gagnep. var. *obcordata* C. Y. Wu et S. K. Chen

植物名 小叶密花远志《云南植物研究》

功效 根:散风祛湿,舒筋活血。

#### 7042027

*Polygala wattersii* Hance

植物名 长毛远志《高植图鉴》

药材名 山桂花(四川南川)、《汇编》

文献名 瓦特远志、华石兰《广西药录》,西南远志《广西植录》,大毛籽黄山桂《云南植志》

地方名 湖北:岩菊花、银不卖(巴东),岩花子树(神农架);四川:木本瓜子金、木本远志(南川),山楂花,千锤打,药五皮。

功效 根、叶:活血解毒。用于乳腺炎;树皮:滋补强壮,舒筋散血。用于跌打损伤。

#### 7042028

*Salomonina cantoniensis* Lour.

植物名 齿果草《高植图鉴》

药材名 一碗泡《云南药录》

文献名 吹云草《南宁药志》,莎萝菲《海南植志》

地方名 广东:川风、吹坡草、烹坡草(阳春);广西:公儿草(苍梧),过山蛇,斩蛇剑,过路蛇,吹魂草、还魂草(南宁);云南:小腻药(红河),细黄药(屏边)。

功效 全草:活血散瘀,除湿止痛。用于肾炎,风湿关节痛,跌打损伤,血崩,骨折。

#### 7042029

*Salomonina oblongifolia* DC. --- *S. ciliata* (L.) DC.

植物名 椭圆叶齿果草《高植图鉴补编》

文献名 糙毛齿果草《高植图鉴》,缘毛莎萝菲《海南植志》,斩蛇剑《药植简编》

地方名 广西:缘毛一碗泡,金瓜草(上林)。

功效 全草:用于痈疮肿毒,毒蛇咬伤。

#### 7042030

*Securidaca inappendiculata* Hassk.

植物名 蝉翼藤《高植图鉴补编》

药材名 玉林刁了棒(拟)

地方名 蝉翼木(海南、广西、云南);江西:九龙根;广西:一摩消,刁了棒(金秀),丢了棒(百色、玉林),“当

低相悲”(金秀县瑶语),血皮藤(防城),五味藤,象皮藤;云南:“中哪项”(西双版纳傣语),“中哪藤”(傣语);其他:五马巡城。

功效 根:活血散瘀,消肿止痛,清热利尿。用于急性肠胃炎,,跌打损伤;茎叶:用于过敏性皮疹。

### 7045 景天科 Crassulaceae

#### 7045001

*Bryophyllum pinnatum* (L. f.) Oken -- *Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.

植物名 落地生根《中国植志》

药材名 落地生根《岭南采药录》、《汇编》

文献名 土三七、叶生根《名实图考》,复叶落地生根《广西药录》

地方名 打不死(广西、四川、云南),晒不死、根茶(华南);福建:古仔灯、新娘灯(武平、漳州、龙海),天灯笼、枪刀草(泉州),枪刀叶(武平、南靖、平和、泉州),大疔瘡、大还魂(厦门),刀没痕(福清、福州);台湾:倒莲蓬,倒吊莲,到吊莲,生刀草,生刀药,脚目草,脚母草,大翻魂,大番魂;湖北:还原草;广东:三七仔、还魂草(阳春),叶落地根(惠阳),瓦顶草(东莞),落地青(潮安),落地生(潮阳),三七、千斤砍(湛江),枪刀药、吊灯花、水膏药、灯笼花(潮安),大号少刀药(陆平);海南:三炮、风叶(琼中);广西:厚面皮,着生药,伤药,石三七(梧州),叶爆牙、大三七(陆川),厚叶三七(贵县),刀斩药(合浦);云南:烧不死、“完胡埃”(傣名)。

功效 全草或根:解毒消肿,活血止痛,拔毒生肌。外用于疮疡肿毒,乳腺炎,丹毒,瘰疬,外伤出血,跌打损伤,骨折,烧、烫伤,中耳炎。

#### 7045002

*Graptopetalum poraguayensis* (N. E. Br.) E. Walth.

植物名 肉莲《广西药园药录》

功效 全草:消肿。

#### 7045003

*Hylotelephium angustum* (Maxim.) H. Ohba --- *Sedum angustum* Maxim.

植物名 狭穗八宝《中国植志》

文献名 狭穗景天《高植图鉴》

地方名 陕西:狮儿草(太白)。

功效 全草:理气。

#### 7045004

*Hylotelephium erythrostictum* (Miq.) H. Ohba --- *Sedum erythrostictum* Miq. --- *Sedum alboroseum* Baker

植物名 八宝(北京)、《中国植志》

药材名 景天《本经》、《汇编》

文献名 戒火、慎火《本经》,火母、据火、救火《别录》,慎火草《千金方》,护花草、拔火、谨火《履巉岩本草》,挂臂青《本草蒙筌》,护火、辟火《纲目》,火丹草《本经逢原》,火焰草、八宝草、佛指甲《名实图考》,火炊灯《分类草药性》,石头菜、长药景天、对叶景天《东检》,龙鳞草、辨庆草《新纲》,白花蝎子草《经植手册》,白景天《种分》,八仙草、吐血草《简明中医辞典》,九死还魂草

《中国药学杂志》

地方名 活血三七(内蒙古、浙江);吉林:八宝菜;内蒙古:“查干一矛钙一伊得”(蒙名);陕西:还魂草(宁强);上海:鸡眼花;江西:脚趾叶(南丰),鸡眼草(景德镇),石别豆(婺源);浙江:脚猪草(衢县),脚疔草;福建:绣球花,跖蹬草,胶念草、美人草(闽东);湖北:苞菜还阳(神农架);湖南:土三七,橡皮七(溆浦),观音扇(永顺),打不死(新宁、永顺),蚕豆七(衡山),九头三七,见肉生(古丈);四川:胡豆七,脚指甲。

功效 全草:祛风清热,活血化瘀,止血止痛。用于喉炎,荨麻疹,吐血,小儿丹毒,乳腺炎。外用于疔疮痈肿,跌打损伤,鸡眼,烧烫伤,毒蛇咬伤,带状疱疹,脚癣。

#### 7045005

*Hylotelephium mingjinianum* (S. H. Fu) H. Ohba --- *Sedum mingjinianum* S. H. Fu

植物名 紫花八宝《中国植志》

药材名 紫花景天《汇编》

文献名 省头草《名实图考》,石蝴蝶《浙江天目药志》,名金景天《中国植志》,黄山景天《广西植录》

地方名 浙江:猫舌草(临安、长兴),螳螂头、红叶脚趾草、脚趾叶(嵊县),〔大青〕、五里香、岩竹、岩脚趾、丁字草、丁拔(乐清),尖叶脚疔草(青田);广西:打不死(全州)。

功效 全草:活血生肌,止血解毒。用于挫伤,小儿惊风,胸膜炎,吐血,毒蛇咬伤,腰肌劳损,烫伤,带状疱疹。

#### 7045006

*Hylotelephium purpureum* (L.) Holub --- *Sedum purpureum* (L.) Schult. --- *S. telephium* L. var. *purpureum* L.

植物名 紫八宝《中国植志》

文献名 紫花景天《北京中草》,紫景天《东北草本植志》

功效 全草:消炎解毒。用于目赤,丹毒,咽喉肿痛。

#### 7045007

*Hylotelephium sieboldii* (Sweet ex Hook.) H. Ohba --- *Sedum sieboldii* Sweet ex Hook.

植物名 圆扇八宝《中国植志》

文献名 豌豆七《药植简编》,圆扇景天《湖北植志》,金钱掌、仙人宝《经植手册》

功效 全草:祛风清热,活血化瘀,止血止痛。

#### 7045008

*Hylotelephium spectabile* (Bor.) H. Ohba --- *Sedum spectabile* Bor.

植物名 长药八宝《中国植志》

文献名 长药景天、石头菜《东检》,蝎子掌《拉汉种称》

地方名 湖南:景天;广东:狗头三七,九头三七。

功效 全草:活血化瘀,止血止痛。

#### 7045009

*Hylotelephium verticillatum* (L.) H. Ohba --- *Sedum verticillatum* L.

植物名 轮叶八宝《中国植志》

药材名 轮叶景天《汇编》

文献名 楼台还阳、酱子草、三角还阳《汇编》，打不死《中药大辞典》

地方名 陕西：一代宗（镇坪），还魂草；湖北：岩三七，胡豆七。

功效 全草：解毒，消肿，止血。用于创伤，无名肿毒，蛇咬及蝎螫。

#### 7045010

*Kalanchoe laciniata* (L.) DC. --- *Kalanchoe gracilis* Hance

植物名 伽蓝菜《中国植志》

药材名 伽蓝菜《汇编》

文献名 齿叶落地生根《中草药学》，裂叶落地生根《经植手册》，小灯笼草、大还魂《台湾植志》，大返魂草《台湾药植志》

地方名 鸡爪三七（福建、广东、广西）；江西：高凉菜；福建：五爪田七（龙海）；广东：小三七（怀集），天安有田漆（电白），蟹钳草（阳江），假川连（广州），鸡脚三七（潮阳），鸡脚御、金汤匙（潮安），青背天葵，鸡爪田七，瓦筒草（南海），[金鸡纳]（湛江），假田七（罗定），五爪三七；广西：鹧鸪脚（北海），土三七。

功效 全草：清热解暑，散瘀消肿。用于跌打损伤，毒蛇咬伤，疮疡脓肿，烧、烫伤，湿疹，外伤出血。

#### 7045011

*Kalanchoe spathulata* DC.

植物名 匙叶伽蓝菜《中国植志》

药材名 匙叶伽蓝菜《中药大辞典》

文献名 篦叶灯笼草《台湾药植志》，匙状伽蓝菜《高植图鉴》

地方名 台湾：倒莲蓬，倒吊莲；广东：落叶生根；广西：生川莲（梧州），白背子草。

功效 全草：清凉解毒。用于痢疮肿毒，眼热赤痛，中耳炎。

#### 7045012

*Kalanchoe verticillata* Elliot

植物名 羊吊钟《广西药园药录》

文献名 羊吊钟《广西本草选编》

地方名 广西：玉吊钟，落地生根。

功效 全草：清热解毒。用于烧、烫伤，外伤出血，疮疖红肿。

#### 7045013

*Orostachys cartilagineus* A. Bor.

植物名 狼爪瓦松《中国植志》

药材名 辽瓦松《东北药植志》

文献名 狼牙瓦松《中草药学》，乾滴落《东北药植志》，瓦松《药植简编》

地方名 白天草、天王铁塔草、铁脚婆罗门草（东北）；吉林：石莲花，酸塔；内蒙古：“扎枯出克”（蒙名）。

功效 地上部分：止血，敛疮。

#### 7045014

*Orostachys erubescens* (Maxim.) Ohwi

植物名 晚红瓦松《中国植志》

药材名 瓦松《中草药学》

文献名 向天草《庚辛玉册》，瓦花《摘元方》，昨叶荷草《浙江药植志》，天蓬草《中药材手册》

地方名 上海：瓦莲花；浙江：岩松、岩脂（嵊县），岩笋（仙居）。

功效 全草：清热解暑，止血，利湿，消肿。用于吐血，鼻衄，血痢，肝炎，疟疾，热淋，痔疮，湿疹，痈毒，疔疮，烫、火伤。

#### 7045015

*Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger

植物名 瓦松《中国植志》

药材名 瓦松《唐本草》、《汇编》

文献名 昨叶何草《唐本草》，屋上无根草《经验良方》，向天草《庚辛玉册》，佛手草、百合草《纲目拾遗》，天蓬草《中药材手册》，铁脚婆罗门草、天王铁塔草《本草新注》，酸窝窝《内蒙古植志》，流苏瓦松《江苏南部种册》，干滴落《东北药植志》

地方名 塔景天（陕西、甘肃、宁夏），厝莲、石莲花（山东、福建），瓦莲花（浙江、四川），瓦葱（湖北、四川）；辽宁：酸塔，塔松，兔子拐杖，干吊鳖，石塔花，狼爪子，酸溜溜，狼牙草，[旱莲草]，梁黄黄；河北：猫头草，瓦塔；内蒙古：“斯琴-额布斯”、“爱日格-额布斯”（蒙名）；青海：“克秀巴”（藏名）；山东：脚巴丫子，脚趾丫，老婆指甲（蓬莱），羊蹄子（费县）；浙江：瓦宝塔，岩松，岩笋，瓦玉，屋松；福建：婆婆指头，万年松，瓦莲，爪莲花；湖北：老瓦松，屋瓦上松；四川：瓦屋花（峨眉山），瓦霜。

功效 地上部分：止血，敛疮。用于血痢，便血。外用于疮口久不愈合。

#### 7045016

*Orostachys japonicus* (Maxim.) Berg. --- *Sedum malacophyllum* var. *japonicum* (Maxim.) Frod.

植物名 瓦花《汇编》

药材名 瓦松《唐本草》、《汇编》

文献名 昨日何草《唐本草》，天王铁塔草、铁脚婆罗门草《满蒙野卉》，向天草《简明中医辞典》，日本瓦松《吉野》

地方名 干滴落（东北）；河北：瓦上松；山东：婆婆指头、脚趾丫、万年松、老婆指甲（烟台）；福建：疔草（福州）。

功效 地上部分：止血，敛疮。用于血痢，便血。外用于疮口久不愈合。

#### 7045017

*Orostachys malacophyllum* (Pall.) Fisch.

植物名 钝叶瓦松《中国植志》

文献名 石莲华《宋学士全集》，瓦松《满洲植录》

地方名 内蒙古：“矛回日-斯琴-额布斯”、“矛回日-爱日格-额布斯”（蒙名）。

功效 地上部分：止血，敛疮。

**7045018***Orostachys spinosus* (L.) C. A. Mey.

植物名 黄花瓦松《中国植志》

药材名 刺叶瓦松《汇编》

文献名 黄瓦松《吉野》

功效 地上部分: 止血, 敛疮。

**7045019***Rhodiola algida* (Ledeb.) Fisch. et C. A. Mey. var. *jeniseense* Maxim.

植物名 喜冷红景天《青藏药图》

文献名 “苏罗玛保”(藏名), 《青藏药图》, 冷红景天《中草药》

功效 花、根: 用于肺炎, 神经麻痹症。

**7045020***Rhodiola algida* (Ledeb.) Fisch. et Mey. var. *tangutica* (Maxim.) S. H. Fu

植物名 唐古红景天《中国植志》

药材名 红景天《药典》

文献名 唐古特红景天、“朵都尔”(藏名)《药典》

地方名 青海: “苏罗玛保”(藏名)。

功效 根及根茎: 清热解毒, 燥湿。用于肺热, 瘟病, 四肢肿胀。

**7045021***Rhodiola crenulata* (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba ---*Rhodiola euryphylla* (Frod.) S. H. Fu

植物名 大花红景天《中国植志》

文献名 宽瓣红景天《植分学报》, 宽叶景天、圆景天《拉汉种称》

地方名 青海: “苏罗玛保”(藏名); 云南: 大红七、大和七(丽江)。

功效 根茎: 用于劳伤, 风湿, 止血, 肺结核, 气管炎。

**7045022***Rhodiola dumulosa* (Franch.) S. H. Fu --- *Sedum dumulosum* Franch. --- *Sedum wulingense* (Nakai) Kitagawa

植物名 小丛红景天《中国植志》

药材名 凤尾七《陕西中草药》

文献名 香景天《拉汉种称》, 雾灵景天《东检》

地方名 陕西: 凤尾草, 凤凰草; 四川: “索鲁玛鲁”(若尔盖藏名)。

功效 全草或根: 补血, 调经, 养阴。用于月经不调, 阴虚潮热, 头晕目眩, 妇女虚劳。

**7045023***Rhodiola forrestii* (Hamet) S. H. Fu

植物名 长圆红景天《中国植志》

文献名 川滇景天、少花云南景天《拉汉种称》

功效 根: 益智强壮。

**7045024***Rhodiola henryi* (Diels) S. H. Fu

植物名 菱叶红景天《中国植志》

药材名 豌豆七《四川中药志》

文献名 还阳参景天《拉汉种称》, 云南景天《西昌中

草药》, 姜皮短陀陀《药植简编》, 一代宗《湖北植志》, 白三七《陕西中草药》

地方名 陕西: 打不死、还阳参(太白山), 三面七、[接骨丹](洛南), 三步接骨丹(柞水), 三匹七(洵阳); 湖北: 岩还阳、岩老鼠(巴东), 岩田三七、岩见血参、岩豌豆(鹤峰), 水三七、十步还阳、大救驾(神农架); 四川: 白陀陀, 胡豆七(会东); 云南: “海腮奶”(楚雄彝名), 豆瓣七, 玉蝴蝶。

功效 根及全草: 止泻痢, 消肿止痛。用于痢疾, 腹泻, 喉炎, 跌打损伤, 风湿疼痛。

**7045025***Rhodiola kirilowii* (Regel) Maxim.

植物名 狭叶红景天《中国植志》

药材名 红景天《药典》

文献名 大株红景天、“朵都尔”(藏名)《药典》, 狮子七《陕西中草药》, 高壮景天《拉汉种称》, 长茎红景天《植分学报》

地方名 陕西: 狮子草(眉县), 九头狮子七(太白山), 淫疙瘩。

功效 根及根茎: 清热解毒, 燥湿。用于肺热, 瘟病, 四肢肿胀。

**7045026***Rhodiola rosea* L.

植物名 红景天《中国植志》

药材名 红景天(吉林、新疆、山西、河北)

文献名 亚参《药植简编》

功效 全草: 滋补强壮。

**7045027***Rhodiola rotundifolia* (Frod.) S. H. Fu --- *Sedum yunnanense* Franch. var. *rotundifolia* Frod.

植物名 圆叶红景天《中国植志》

文献名 山蚕豆《云南药录》

功效 全草: 用于跌打损伤。

**7045028***Rhodiola sachalinensis* A. Bor.

植物名 库叶红景天《中国植志》

文献名 红景天《长白山植药志》, 高山红景天《中草药》

地方名 吉林: 高山景天。

功效 全草: 用于滋补强壮, 老年性心机能衰竭, 阳痿, 糖尿病, 肺结核, 贫血, 神经病, 低血压。

**7045029***Rhodiola sacra* (Prain ex Hamet) S. H. Fu

植物名 圣地红景天《中国植志》

药材名 红景天《西藏中草》

文献名 圣景天《拉汉种称》, 全瓣红景天《中药大辞典》

地方名 青海: “参嘎尔”(藏名); 西藏: “扫罗玛尔布”(藏名)。

功效 全草: 清肺, 止咳, 止血, 止带。用于肺热咳嗽, 咯血, 白带。外用于跌打损伤, 烧、烫伤。

**7045030**

*Rhodiola scabrida* (Franch.) S. H. Fu

植物名 粗糙红景天《中国植志》

药材名 鸡掌七《云南中草药》

文献名 糙景天《拉汉种称》

地方名 云南:雪松(东川、曲靖)。

功效 全草:止血消炎,续筋接骨,益气补血。用于外伤出血,骨折,红白痢疾,病后体虚,贫血。

#### 7045031

*Rhodiola wallichiana* (Hook.) S. H. Fu

植物名 粗茎红景天《中国植志》

文献名 粗干景天《拉汉种称》

功效 根:用于跌打,风湿腰痛,血崩,五更泻,血白痢,吐血。

#### 7045032

*Rhodiola wallichiana* (Hook.) S. H. Fu var. *cholaensis* (Præg.) S. H. Fu

植物名 大株粗茎红景天《中国植志》

文献名 大株红景天《植分学报》,“杂都尔”(藏名)《西藏药图》

功效 根茎:清热退烧。用于肺炎发烧,腹泻。

#### 7045033

*Rhodiola yunnanensis* (Franch.) S. H. Fu --- *Sedum yunnanense* Franch. --- *Sedum valerianoides* Diels

植物名 云南红景天《中国植志》

药材名 豆叶七(云南)、《汇编》

文献名 染铜皮《名实图考》,云南景天《拉汉种称》

地方名 陕西:三四七,还阳草;贵州:黄花参;云南:姜皮矮陀陀、玉蝴蝶(昆明);豆叶狼毒(楚雄),金剪刀(昭通),蚕豆七(丽江),上三七,石宝塔,蜈蚣七,野蚕豆,山蚕豆,绿豆连,三台观音,铁脚莲,金耗子。

功效 全草:消炎,消肿,接筋骨。用于风湿骨痛,乳腺炎,疔疮。外用于开放性骨折。

7045034 见 7045037b

#### 7045035

*Sedum aizoon* L. --- *Sedum aizoon* L. var. *floribundum* Nakai --- *Sedum aizoon* L. var. *glabrifolium* (Kitagawa) Kitagawa

植物名 费菜《救荒本草》、《中国植志》

药材名 景天三七《江苏药材志》

文献名 黄参《滇南本草》,土三七《名实图考》,景天三七根《中国药植图鉴》,长生景天《经植手册》,禹州鲜三七《中药通报》,细叶费菜《中国植物图鉴》,乳毛上三七、多花景天三七《东检》,乳毛景天三七《汇编》

地方名 见血散(内蒙古、浙江、湖北),养心草(浙江、江西、福建、湖北),蝎子草(河北、江苏、山东),六月莲(陕西、甘肃、宁夏),广三七(江苏、安徽),墙头三七(浙江、湖北),还阳草(山东、湖北);辽宁:[豆瓣菜](宽甸);河北:石头花;山西:血山草;内蒙古:“木盖音一依德”、“矛钙一伊得”(蒙名),血连根;陕西:六月霜、收丹皮(柞水),石菜兰(眉县),六月淋(凤县),九莲花(镇坪);江苏:八仙草、生三七、鲜三七(南京),大马菜,牛尾巴,黄花菜(江宁),吐血草;浙江:[活血丹];安徽:止

血草,伤力根,脚板草,厚头草;江西:九头三七;福建:同生草(莆田),血草(仙游);湖北:刀口草,山马兜,打死还阳,[金不换](恩施),豆包还阳(五峰),豆瓣还阳(巴东、兴山),[田三七](鹤峰、五峰),四季还阳、六月还阳(神农架);四川:“呷堆”(若尔盖藏名),紫云七(峨眉山);贵州:小种三七,三白棒,还魂草。

功效 全草:散瘀,止血,安神。用于溃疡病,肺结核,支气管扩张及血小板减少性紫癜等血液病的中小量出血。外用于外伤出血,烦躁不安。

7045036 见 7045037a

#### 7045037

*Sedum aizoon* L. f. *angustifolium* Franch. --- *S. aizoon* L. var. *yamatutai* Kitag.

植物名 狭叶费菜《东北草本植志》

药材名 狭叶费菜《东北药用植物》

功效 根及全草:散瘀,止血,安神,镇痛。用于溃疡病,支气管扩张,血小板减少性紫癜等血液病的中小量出血,衄血,吐血,咯血,牙龈出血,便血,尿血,消化道出血,子宫出血,心悸,烦躁不安,失眠。外用于跌打损伤,外伤出血,烧烫伤。

#### 7045037a

*Sedum aizoon* L. f. *latifolium* (Maxim.) S. H. Fu

植物名 宽叶费菜《中国植志》

文献名 宽叶土三七《东检》

地方名 湖北:土三七(神农架)。

功效 全草:活血。用于疮疖;根:止血,活血,止痛。

#### 7045037b

*Sedum aizoon* L. var. *scabrum* Maxim.

植物名 乳毛费菜《东北药用植物》

功效 根及全草:散瘀,止血,安神,镇痛。用于溃疡病,支气管扩张,血小板减少性紫癜等出血,衄血,吐血,咯血,牙龈出血,便血,尿血,消化道出血,子宫出血,心悸。外用于跌打损伤,外伤出血,烧烫伤。

#### 7045038

*Sedum alfredii* Hance --- *Sedum formosanum* N. E. Br.

植物名 东南景天《中国植志》

药材名 石上瓜子菜《汇编》

文献名 变叶景天《拉汉种称》,鸭仔虫菜《广西植录》,台湾景天《高植图鉴补编》

地方名 石板菜(浙江、四川);广东:石面马兜兜、石面瓜子菜(连县),石上老鼠耳、生肉药、白瓜子菜(惠阳);其他:马屎兜

功效 全草:清热凉血,消肿拔毒。

#### 7045039

*Sedum amplibracteatum* K. T. Fu

植物名 大苞景天《中国植志》

文献名 苞叶景天《湖北植志》,山胡豆《植物名汇》

地方名 陕西:一朵云(凤县);湖北:鸡爪七、活血草(神农架);四川:灯笼草(峨眉山)。

功效 全草:活血,止痛。

#### 7045040

*Sedum angustifolium* Z. B. Hu et X. L. Huang

植物名 狭叶垂盆草《植分学报》

功效 全草：用于肝炎。

#### 7045041

*Sedum bulbiferum* Makino --- *Sedum alfredii* Hance var. *bulbiferum* (Makino)Frod.

植物名 珠芽景天《中国植志》

药材名 珠芽半支《汇编》

文献名 零余子佛甲草《植物学大辞典》，小箭草、狗牙菜《四川中药志》，零余子景天《拉汉种称》，珠牙石板菜《种分》，马尿花《高植图鉴补编》

地方名 陕西：马蹄汗（宁强）；江苏：马尿花，半支莲；浙江：珠牙佛甲草；广西：土川莲；四川：狗牙瓣。

功效 全草：散寒，理气，止痛，截疟。用于食积腹痛，风湿瘫痪，疟疾。

#### 7045042

*Sedum dielsii* Harnet

植物名 乳瓣景天《中国植志》

文献名 乳瓣山景天《拉汉英种称》

地方名 湖北：小石板菜《神农架》。

功效 全草：清热解毒，活血止痛。

#### 7045043

*Sedum drymarioides* Hance

植物名 大叶火焰草《中国植志》

药材名 龙鳞草《汇编》

文献名 毛佛甲草《台湾植志》，荷莲豆景天《拉汉种称》，光板猫叶草《浙江天目药志》

地方名 浙江：荷莲豆叶景天；江西：石菟菜；广西：毛石辣草，毛舌辣草《柳城》。

功效 叶及全草：清热解毒，消肿止痛。用于鼻息肉，过敏性鼻炎。

#### 7045044

*Sedum elatinoides* Franch.

植物名 细叶景天《中国植志》

药材名 崖松《陕西中草药》

文献名 沟繁缕景天《拉汉种称》，疣果景天《秦岭植志》

地方名 陕西：小鹅儿肠，半边莲（平利）；湖北：伙连子草《神农架》；四川：白点菜，岩板草药。

功效 带根全草：清热解毒，止痢。用于小儿丹毒，细菌性痢疾，阿米巴痢疾，睾丸炎。外用于烧、烫伤。

#### 7045045

*Sedum emarginatum* Migo --- *S. makino* Maxim. var. *emarginatum* (Migo)S. H. Fu

植物名 凹叶景天《中国植志》

药材名 马牙半支《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 马牙苣《奇方类编》，酱瓣半支、旱半支《百草镜》，酱瓣草《汪连仕采药书》，酱板豆草《周益生家宝方》，铁梗半支、山半枝《纲目拾遗》，豆瓣菜《种分》，马牙半支莲《高植图鉴》，石板菜《高植图鉴补编》，圆叶佛甲草《四川中药志》，马齿苋景天《广西药园药录》

地方名 打不死《陕西、江西、湖北》，石马齿苋《江西、湖南、四川》，佛甲草《浙江、湖南》；江西：石马苋（吉安），山马苋（德兴），小叶马齿苋（景德镇、婺源），狗牙齿，《龙芽草》；陕西：九月寒；湖北：石板还阳、石雀还阳（巴东），岩板菜《鹤峰》；湖南：佛指甲；四川：六月雪、六月寒（重庆），豆瓣草《峨眉》，狗牙瓣（南川），水佛甲（绵阳），还魂草。

功效 全草：清热解毒，止痛，止血。用于肝炎，痢疾，吐血，衄血，便血，月经过多。外用于跌打损伤，痈疖，疔疮，带状疱疹。

#### 7045046

*Sedum filipes* Hemsl.

植物名 小山飘风《中国植志》

地方名 湖北：豆瓣还阳《神农架》。

功效 全草：用于外伤。

#### 7045047

*Sedum japonicum* Sieb. ex Miq. --- *S. chrysastrum* Hance

植物名 日本景天《中国植志》

药材名 狗牙半支《纲目拾遗》

文献名 佛甲草、石板菜《植物名汇》，景天草《新纲》，黄花万年草《中国植物图鉴》，黄花香《拉汉种称》，深山佛甲草《广西植录》

地方名 干滴落《东北》。

功效 全草：祛风清热，活血化瘀，止血止痛。

#### 7045048

*Sedum kamtschaticum* Fisch. --- *S. aizoon* L. ssp. *kamtschaticum* (Fisch.)Frod.

植物名 横根费菜《汇编》

药材名 景天三七《汇编》

文献名 堪察加景天《中国植志》，〔费菜〕《中药大辞典》，石板菜、黄菜子《植物名汇》，北景天《东检》，金不换《北京植志》

地方名 养心草《浙江、福建、湖南》；浙江：土三七、墙头三七《温州》，生刀药《洞头》；福建：倒山黑豆，七叶草《闽东》，晏海豆升，回生草，岛山黑定，爪上模，血草《晋江》；湖南：马三七、白三七、胡椒七、〔三七〕《宁乡》，〔田七〕《永兴》，土田三七《衡山》，铜打不死，晒不干；四川：胡豆七；贵州：小种三七，养鸡草，还魂草《湄潭》；其他：见血散，血山草，破血丹，六月淋。

功效 根或全草：散瘀止血，安神镇痉。用于血小板减少性紫癜，衄血，吐血，咯血，牙龈出血，消化道出血，子宫出血，心悸，烦躁失眠。外用于跌打损伤，外伤出血，烧烫伤。

#### 7045049

*Sedum leucocarpum* Franch.

植物名 白果景天《中国植志》

药材名 岩松《昆明民药》

地方名 云南：黄花香松、瓦松《昆明》，白景天。

功效 全草：清热消炎。用于肝炎，中耳炎，烫伤。

#### 7045050

*Sedum lineare* Thunb.

植物名 佛甲草《中国植志》

药材名 佛甲草《图经》、《中草药学》

文献名 火烧草、火焰草《履巇岩本草》, 佛指甲《纲目》, 半支莲《医宗汇编》, 石莲华《新纲》, 禾雀舌《岭南采药录》, 枉开口《本草推陈》, 指甲草《汇编》

地方名 禾雀喇(广东、广西), 万年草(福建、云南), 鼠牙半枝莲(江苏、安徽、江西、湖北), 鼠牙半枝(江苏、浙江、四川), 铁指甲(江苏、广西), 狗牙菜(陕西、广西); 江苏: 黄开口草(南通), 马牙半支, 虎牙半支; 浙江: 尖叶佛甲草, 狗牙齿; 安徽: 细叶马齿苋, 石马齿苋, 脐风草; 江西: 金枪药, 猪牙齿(婺源), 尖甲草; 福建: 午时花, 小叶刀敏草, 半枝莲(顺昌、清流、宁化), 仙人指甲(福州、霞浦), 豆夹仔(松溪、政和), 瓦茜(长汀); 台湾: 金莉插; 河南: 小马齿菜; 湖南: 狗牙半支, 狗牙子草(衡山); 广西: 土三七、虎牙草(全州), 雀仔舌(苍梧), 麻雀舌(南宁), 养鸡草, 辽王(桂林), 瓜子莲(河池); 四川: 尖叶小石指; 贵州: 狗牙瓣, 小佛指甲, 还魂草; 云南: “六鸡苦七”(楚雄彝名), 岩地丁, 细叶打不死。

功效 全草: 清热解毒, 消肿, 止血。用于咽喉肿痛, 目赤, 痢疾, 漆疮, 带状疱疹, 痈肿丹毒, 烫火伤出血。

#### 7045051

*Sedum major* (Hemsl.) Migo --- *Sedum filipes* Hemsl. var. *major* Hemsl.

植物名 山飘风《中国植志》

地方名 湖北: 瓢儿菜、猪耳朵(神农架); 贵州: 打不死。

功效 全草: 用于鼻蛆。

#### 7045052

*Sedum makinoi* Maxim.

植物名 圆叶景天《中国植志》

药材名 马牙半支《纲目拾遗》

文献名 圆叶佛甲草《中药大辞典》

地方名 陕西: 五爪龙(紫阳)。

功效 全草: 清热解毒, 止痛, 止血。

#### 7045053

*Sedum morrisonense* Hayata

植物名 玉山佛甲草《中国植志》

药材名 玉山佛甲草《台湾药植志》

文献名 新高山景天《拉汉种称》, 玉山景天《高植图鉴补编》

功效 叶: 外用于创伤。

#### 7045054

*Sedum multicaule* Wall.

植物名 多茎景天《中国植志》

药材名 佛指甲《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 瓦松《滇南本草》, 滇瓦花《汇编》, 滇瓦松《云南种录》

地方名 云南: 石花、石根(丽江), 九头狮子草、岩如意(曲靖)。

功效 全草: 清热解毒, 止血, 祛风湿。用于喉炎, 扁桃体炎, 口腔炎, 角膜云翳, 高血压, 风热头痛, 风湿关节痛。外用于湿疹, 疮毒。

#### 7045055

*Sedum odontophyllum* Frod.

植物名 齿叶景天《中国植志》

药材名 红胡豆七《汇编》

地方名 湖北: 打死还阳(神农架); 四川: 打不死、大红袍(峨眉), 打不死, 天黄七(南川)。

功效 全草: 止血, 消肿, 止痛。用于咳嗽吐血, 腰痛。外用于痈疽肿毒。

#### 7045056

*Sedum polytrichoides* Hemsl.

植物名 鲜状景天《中国植志》

文献名 柳叶景天《东检》

功效 全草: 清热解暑。用于疔疮痈疖。

#### 7045057

*Sedum quaternatum* Praeg.

植物名 四叶景天《中国植志》

文献名 四叶佛甲草《浙南本草新编》, 四部景天《拉汉种称》

地方名 浙江: 四叶对(浙南)。

功效 全草: 用于跌打内伤。

#### 7045058

*Sedum sarmentosum* Bunge

植物名 垂盆草《中国植志》

药材名 垂盆草《药典》

文献名 半枝莲《药镜》, 鼠牙半支《百草镜》, 瓜子草、佛指甲、狗牙草《分类草药性》, 火连草、豆瓣菜、金钱挂、水马齿苋、野马齿苋《植物名汇》, 大佛甲草、凤尾七《满蒙野卉》, 卧茎景天《东检》, 匍行景天《经植手册》, 石指甲《四川中药志》, 狗牙半支《汇编》

地方名 狗牙瓣(陕西、四川), 狗牙齿(江苏、上海、浙江、湖南), 狗牙半支莲(江苏、湖北), 三叶佛甲草(江苏、浙江、福建), 爬景天(北京、陕西); 陕西: 石头牙(太白山), 佛甲草(宁强、陇县), 指甲菜(太白), 豆瓣菜; 江苏: 地蜈蚣草; 上海: 太阳花, 枉开口; 浙江: 白蜈蚣(温州); 安徽: 吊石青, 鼠牙半枝莲, 蜈蚣草, 过路蜈蚣, 牙齿苋; 江西: 猪牙齿(井冈山); 福建: 扁叶佛甲草; 湖北: 石瓣菜(鹤峰), 火焰草, 马牙半支莲(神农架); 湖南: 打不死, 大狗牙; 广西: 三七仔(藤县), 土三七(陆川), 黄瓜子草(龙州、柳江), 鸡舌草(罗城), 鱼骨梗(北流), 瓜子莲, 匍茎佛甲草; 贵州: 养鸡草(贵阳), 还魂草。

功效 全草: 清热利湿, 解毒。用于湿热黄疸, 小便不利, 痈肿疮疡, 急性慢性肝炎。

#### 7045059

*Sedum stellariifolium* Franch.

植物名 火焰草《中国植志》

文献名 佛甲草《名实图考》, 繁缕叶景天《东检》, 繁缕景天《北京植志》。

地方名 北京: 卧儿菜; 湖北: 小屋儿肠(神农架); 四川: 红瓦松。

功效 全草: 清热解毒, 凉血止血。用于咽喉肿痛, 热毒疮肿, 丹毒及血热吐血, 咯血, 鼻蛆。

#### 7045060

*Sedum subtile* Maxim.

植物名 细小景天《中国植志》

药材名 小万年草《汇编》

文献名 小万年青《药植简编》, 小莲花《浙南本草新编》, 姬莲花《拉汉种称》

地方名 广西: 鲛鱼草; 贵州: 石豆瓣。

功效 全草: 清热凉血, 散瘀止痛。用于跌打损伤, 痔疮出血。

7045061

*Sedum tetractmum* Prod.

植物名 四芒景天《中国植志》

药材名 石上开花《贵州民间药物》

文献名 四射景天《拉汉种称》

地方名 贵州: 岩莲花(贵阳)

功效 全草: 清热凉血, 补虚。用于咳嗽, 虚弱, 痔疮出血。

7045062

*Sinocrassula indica* (Decne.) Berger --- *Sedum indicum* (Decne.) Hamet *Crassula indica* Decne.

植物名 石莲《中国植志》

药材名 红花岩松(云南、昆明)、《汇编》

文献名 岩松《昆明民药》, 印度华景天《广西药录》, 印度石莲花《广西植录》

地方名 湖北: 莲花还阳, 碎骨还阳, 狗牙还阳; 广西: 土三七(贵县), 蛇舌莲(南宁); 贵州: 石上开花, 岩莲花; 云南: 佛指甲, 黄花岩松(红河), 堆山花, 石莲花, 石松, 华景天; 西藏: 山瓦松。

功效 全草: 有毒。清热解毒, 止血止痛。用于咽喉肿痛, 痢疾, 崩漏, 便血。外用于疮疡久不收口, 烧、烫伤。

## 7047 虎耳草科 Saxifragaceae

7047001

*Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. et Savat. --- *Astilbe davidii* (Franch.) Henry

植物名 落新妇《本草经集注》、《植分学报》

药材名 红升麻(陕西、甘肃)、《汇编》

文献名 小升麻《本草拾遗》, 毛三七《植物名汇》, 收麻、雄麻、雄脚、黑蛇根《新纲》, 南红升麻《云南种录》

地方名 虎麻(东北、内蒙古), 升麻(东北、湖北、山西、四川), 阴阳虎(浙江、江西); 内蒙古: “巴日斯-敖鲁素”(蒙名); 陕西: 金毛七、[金毛狗](太白); 山东: 乌足升麻; 浙江: 猪猡三七(临安), 野升麻, 三角钻(临海), 天格公(嵊县), 金毛狮子, 金花狮子(天台), 金猫儿, 金毛三七(临安、嵊县); 安徽: [荞麦三七], [红毛三七], 消食丹, 野椿草; 河南: 红头牛, 外庄升麻, [地榆]; 湖南: 土苍术; 四川: 术活, 火烧药(会东), 铁杆升麻(会理), 红三七(达县), 鸡翅膀; 贵州: 马尾参, 山花七, “阿根八”(雷公山苗语), 铁大钳, 金尾蟾。

功效 根茎或全草: 散瘀止痛, 祛风除湿。用于跌打损伤, 手术后疼痛, 风湿关节痛, 毒蛇咬伤。

7047002

*Astilbe grandis* Stapf ex Wils. --- *A. chinensis* var. *koreana* Kom. --- *A. koreana* (Kom.) Nakai --- *A. austrosinensis* Hand.-Mazz.

植物名 大落新妇《植分学报》

药材名 红升麻(华南)

文献名 华南落新妇《汇编》, 华南升麻《广西药录》, 朝鲜落新妇, 长白山植药志, 大花落新妇《中草药通讯》, 大叶落新妇《江西药录》

地方名 广西: 水三七(富川), 东升麻, 水升麻(全州), 水红柳(恭城); 湖南: 土升麻, 土苍术, 毛三七(城步苗族), 钻山狗, 大疙瘩七(土家族); 四川: 升麻(南充), 铁杆砣(江津); 贵州: 马尾参, 山花七, 野红稗, 大溜疙瘩。

功效 根茎: 散瘀止痛, 祛风除湿

7047003

*Astilbe japonica* Gray

植物名 泡盛落新妇《中国经植志》

文献名 升麻《中国经植志》

功效 根茎或全草: 散瘀止痛, 祛风除湿。

7047004

*Astilbe longicarpa* (Hayata) Hayata

植物名 长果落新妇《台湾药植志》

功效 果: 用于感冒。

7047005

*Astilbe rivularis* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 溪畔落新妇《高植图鉴》

药材名 红升麻《云南中草药选》

文献名 水滨落新妇《汇编》, 水滨升麻《鉴别手册》, 溪畔红升麻《云南种录》

地方名 云南: 水滨升麻, 水寒药, 假升麻(文山), 假淫羊藿, 假淫羊草, 野泽兰, 野高粱, 大药片(楚雄), 活根, 黄药(昭通), 滇淫羊藿, 野羊藿。

功效 根茎: 活血散瘀, 祛风除湿, 止痛。用于跌打损伤, 风湿疼痛, 慢性胃炎, 黄水疮流脓。

7047006

*Astilbe rivularis* Buch.-Ham. ex D. Don var. *myriantha* (Diels) J. T. Pan --- *A. myriantha* Diels --- *A. virescens* Hutchins.

植物名 多花落新妇《植分学报》

药材名 红升麻《陕西中草药》

文献名 绿花落新妇《中国经植志》, 多花红升麻《秦岭植志》

地方名 陕西: 金毛七, 铁杆升麻(眉县); 四川: [淫羊藿](叙永), 小牛胃花(峨眉)。

功效 根茎: 祛风发表, 镇痛。用于伤风感冒, 头痛, 偏头痛。

7047007

*Astilboides tabularis* (Hemsl.) Engler

植物名 大叶子《高植图鉴》

文献名 [山荷叶]《长白山植药志》

地方名 吉林: 佛爷伞, 大脖子。

功效 根及全草: 收涩, 固肠, 止泻。用于腹泻。



**7047008***Bergenia cordifolia* (Haw.) Sternb.

植物名 心叶岩白菜《药植简编》

药材名 盘龙七《陕西中草药》

地方名 陕西:石白菜(太白山),地白菜(凤县)。

功效 根茎:急性慢性胃炎,浮肿,崩漏,白带,淋症,痢疾,黄水疮,疥疮等。

**7047009***Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch

植物名 厚叶岩白菜《汇编》

药材名 岩白菜《中药志》

文献名 岩白菜、矮白菜《名实图考》,岩壁菜《中国药植志》

地方名 四川:红花岩白菜(峨眉山)。

功效 全草:用于咳嗽,哮喘,吐血,咳血,头晕等。

**7047010** 见 7047011**7047011***Bergenia purpurascens* (Hook. f. et Thoms.) Engl. --- *B. purpurascens* (Hook. f. et Thoms.) Engl. var. *delavayi* (Franch.) Engl. et Irrn.

植物名 印度岩白菜《中国植志》

药材名 岩白菜《分类草药性》,《中国药植志》

文献名 岩白菜、矮白菜《名实图考》,岩壁菜《中国药植志》,西南岩白菜《药植简编》,石白菜、红岩七《简明中医辞典》,云南岩白菜《药典》

地方名 岩七(四川、云南);四川:大红袍(冕宁),山厚皮菜,白花岩白菜(峨眉山);贵州:[石蚕];云南:“埃苏蒙”(丽江纳西语),红缎子、紫梗、蓝花岩陀(丽江),观音莲(昭通),独脚岩白菜,铁脚岩白菜,生葛芭,大岩白菜,矮菖蒲(宁蒗普米族),岩菖蒲,金丝岩陀,石山菖蒲,反背红,八龙九道箍,雪头开花,亮叶子。

功效 根或全草:收敛止泻,止血止咳,舒筋活络。用于腹泻,痢疾,食欲不振,内外伤出血,肺结核咳嗽,风湿疼痛,跌扑损伤。

**7047012***Bergenia scopulosa* T. P. Wang

植物名 秦岭岩白菜《秦岭植志》

药材名 盘龙七《陕西眉县、秦岭》

文献名 地白菜《汇编》,石白菜《中药大辞典》

功效 根茎:补脾健胃,收涩固肠,除湿利水,活血。用于急性慢性肠胃炎,浮肿,崩漏,白带,淋症,痢疾,黄水疮,秃疮,疥癣。

**7047013***Cardiandra moellendorffii* (Hance) H. L. Li

植物名 草绣球《浙江药植志》

药材名 紫阳花(浙江)、《汇编》

文献名 人心药《湖北植志》,草紫阳花《植称补编》

地方名 浙江:牡丹三七(临安)。

功效 根茎:活血祛瘀。用于跌打损伤。

**7047014** 见 7047022a**7047015***Chrysosplenium absconditcapsulum* J. T. Pan

植物名 敝果金腰《高植图鉴》

药材名 亚吉玛《植分学报》

功效 全草:清热解毒。对传染病引起的高烧症有效。

**7047016***Chrysosplenium serreanum* Hand. Mazz. --- *C. alternifolium* L. var. *sibiricum* Seringe --- *C. alternifolium* auct. non L.

植物名 五台金腰《中国植志》

药材名 金腰子《长白山植志》

文献名 互叶金腰《植分学报》

功效 全草:用于尿路感染,膀胱炎,排尿困难,子宫脱垂等

备考 有的文献将本种学名误订为 *Chrysosplenium alternifolium* L.**7047017***Chrysosplenium davidianum* Decne. ex Maxim.

植物名 锈毛金腰《高植图鉴》

文献名 锈毛金腰《峨眉药植资源》,穆坪猫眼草《云南种录》

地方名 四川:蚂蟥绣(峨眉山)。

功效 全草:祛风解毒。用于蚂蟥咬伤。

**7047018***Chrysosplenium delavayi* Franch.

植物名 肾萼金腰《高植图鉴》

药材名 肾萼金腰《广西药录》

功效 全草:用于小儿惊风,烫伤,痈疮肿毒。

**7047019***Chrysosplenium forrestii* Diels

植物名 贡山金腰《高植图鉴补编》

文献名 “亚吉玛”(藏名)《植分学报》

功效 全草:清热解毒。

**7047020***Chrysosplenium grayanum* Maxim.

植物名 金腰《汇编》

文献名 金钱苦叶草《浙江天目药志》

地方名 浙江:猫眼草。

功效 全草:排脓解毒。外用于黑头疔疮。

备考 《牧野日图》谓“猫儿眼睛草”系误用名。

**7047021***Chrysosplenium henryi* Franch.

植物名 蛻叶金腰《高植图鉴补编》

药材名 蛻叶金腰《贵州药录》

地方名 湖北:野包耳菜(神农架)。

功效 全草:清热消肿,祛风解毒。风热感冒,风丹,小儿惊风,疔疮肿毒。

**7047022***Chrysosplenium hydrocotylifolium* Levl. et Van.

植物名 天胡荽金腰《植分学报》

药材名 大虎耳草《贵州草药》

功效 全草:清热解毒,祛风解表。用于风丹,疔疮。

## 7047022a

*Chrysosplenium japonium* (Maxim.) Makino

植物名 日本金腰(高植图鉴补编)

文献名 大虎耳草《药植简编》, 珠芽金腰子《东北草本植志》

功效 全草: 清热解毒, 祛风解表。

## 7047023

*Chrysosplenium macrophyllum* Oliv.

植物名 大叶金腰(高植图鉴)

药材名 虎皮草《陕西中草药》

文献名 大叶猫眼草《云南种录》, 大叶金腰草《药植简编》, 大叶金腰子《秦岭植志》, 猪耳巴《汇编》

地方名 马耳朵草(浙江、云南); 陕西: 猪耳朵, 牛耳朵, 大脚片(镇坪); 浙江: 坑菜(龙泉), 龙舌草(临安); 安徽: 岩乌金菜; 湖北: 乌耳肺筋、马耳草(神农架); 湖南: {岩白菜}, 毛白菜, 闷头鸡; 四川: 岩窝鸡; 贵州: 大虎耳草; 云南: 龙备草(彝良)。

功效 叶: 清热解毒, 生肌收敛。用于脓疮, 烫火伤。

## 7047024

*Chrysosplenium nudicaule* Bunge

植物名 裸茎金腰(高植图鉴)

文献名 裸茎金腰子《青藏药图》

地方名 青海: “亚吉玛”(藏语)。

功效 全草: 利胆, 止呕。用于黄疸及多种痘病, 吐黄水。

## 7047025

*Chrysosplenium sinicum* Maxim.

植物名 中华金腰(高植图鉴)

药材名 金腰子《汇编》

文献名 华金腰子《东检》, 中华金腰子《秦岭植志》

地方名 “牙鸡马”(四川、西藏藏名); 浙江: 金钱苦叶草(临安), 猫眼草。

功效 全草: 清热, 利尿, 退黄, 排石。用于黄疸型肝炎, 膀胱炎, 胆道结石。

## 7047026

*Deinanthus caerulea* Stapf

植物名 叉叶蓝(高植图鉴补编)

药材名 银梅草《神农架药录》

地方名 湖北: 四块瓦(神农架)。

功效 根茎: 活血散瘀, 止痛。

## 7047027

*Deutzia amurensis* (Regel) Airy-Shaw

植物名 东北溲疏(高植图鉴)

药材名 东北溲疏《长白山植药志》

功效 皮: 用于感冒, 支气管炎等症。

## 7047028

*Deutzia discolor* Hemsl.

植物名 异色溲疏(高植图鉴补编)

药材名 通天窍《神农架药录》

地方名 湖北: 山梅花(神农架)。

功效 全株: 清热, 除烦, 利尿。

## 7047029

*Deutzia glauca* Cheng

植物名 黄山溲疏(高植图鉴)

药材名 黄山溲疏《药植简编》

功效 根、叶: 清热利尿, 补肾, 截疟, 解毒, 接骨。

## 7047030

*Deutzia glomeruliflora* Thunb

植物名 球花溲疏(高植图鉴)

文献名 团花溲疏《药植简编》

功效 全株: 截疟, 解热。

## 7047031

*Deutzia hypoglaucula* Rehd.

植物名 粉背溲疏(高植图鉴补编)

文献名 粉背叶溲疏《神农架药录》

地方名 湖北: 山梅花(神农架)。

功效 枝、叶: 清热利尿, 除烦。

## 7047032

*Deutzia ningpoensis* Rehd.

植物名 宁波溲疏(高植图鉴)

药材名 宁波溲疏《浙江天目药志》

文献名 老鼠竹《中药大辞典》

地方名 浙江: 空心副常山(临安), 细叶空心柴(丽水), 水杆柴(乐清)。

功效 根、叶: 清热利尿, 补肾, 截疟, 解毒, 接骨。用于感冒发热, 小便不利, 夜尿, 疟疾, 疥疮, 骨折。

## 7047033

*Deutzia parviflora* Bunge

植物名 小花溲疏(高植图鉴)

药材名 小花溲疏《药植简编》

文献名 唐溲疏《东北木本图志》

功效 皮: 解热。

## 7047034

*Deutzia scabra* Thunb.

植物名 溲疏(高植图鉴)

药材名 溲疏《本经》、《中药大辞典》

文献名 巨骨《别录》, 空木、卯花《植物学大辞典》, 空疏《树分》, 紫阳花《科裁》

功效 果实: 除邪气, 止遗溺; 根: 利尿退热, 消肿解毒。

备考 据江西铜鼓草医称, 全植物有剧毒, 内服宜慎用。

## 7047035

*Deutzia setchuenensis* Franch.

植物名 川溲疏(高植图鉴)

药材名 川溲疏《湖南药物志》

文献名 四川溲疏、夏季石藤《树分》

地方名 湖北: 长叶山梅花(神农架); 湖南: 四肢通; 四川: 通天窍(南充)。

功效 枝、叶、果: 有小毒。化食, 利尿, 活络, 镇痛。用于毒蛇咬伤, 病人昏迷, 膀胱炎, 小儿疳积, 风湿关节痛, 风湿疮毒。

## 7047036

*Deutzia taiwanensis* (Maxim.) Schneid.

植物名 台湾溲疏《高植图鉴》  
药材名 台湾溲疏《台湾药植志》  
地方名 台湾:〔常山〕、〔蜀漆〕。  
功效 根:用于解热,截疟。

#### 7047037

*Deutzia vilmorinae* Lem.

植物名 毛脉溲疏《神农架药录》  
地方名 湖北:鸡骨头树(神农架)。  
功效 枝叶:清热,除烦,利尿。

#### 7047038

*Dichroa damingshanensis* Y. C. Wu

植物名 大明常山《高植图鉴补编》  
药材名 大明常山《广西药录》  
地方名 广西:野蓝叶(平果)。  
功效 根、叶:用于风湿骨痛。

#### 7047039

*Dichroa febrifuga* Lour.

植物名 常山《高植图鉴》  
药材名 常山《本经》、《药典》  
文献名 恒山、互草、蜀漆《本经》,蜀漆叶、七叶《吴普本草》,鸡骨常山《本草经集注》,翻胃木(侯宁极《药谱》),黄常山、茗叶常山《中国药植志》,川常山《药材学》,南常山《中草药学》  
地方名 白常山(江西、贵州);湖南:四茅、赵子龙(长沙),大金刀(凤凰);广西:鸡骨风(博白),风骨木(靖西),常山竹七、蜀七(岑溪),假走马胎,正常山,土常山(隆林、昭平);四川:野兰子;贵州:摆子药;云南:一枝蓝,大常山,树盘根,“俄比比尼”(哈尼族语),野肠痧(西畴),“过摆留”(哈尼语);贵州:对叶生(兴义)。

功效 根:有毒。截疟,劫痰。用于疟疾。

#### 7047040

*Dichroa yaosanensis* Y. C. Wu

植物名 罗蒙常山《高植图鉴》  
文献名 瑶山常山《广西药录》  
地方名 广西:人骨风(北流)。  
功效 根:用于风湿骨痛,产后风。

#### 7047041

*Hydrangea angustipetala* Hayata --- *H. umbellata* Rehd.

植物名 伞形绣球《高植图鉴补编》  
药材名 土常山《图经》、《中药大辞典》  
文献名 蜜香草《图经》,甜茶《饮片新参》,伞形八仙花《种分》,伞形绣球花《中国植物图鉴》,伞花绣球、伞花八仙、绣球八仙《汇编》  
地方名 浙江:甜菜、斩心菜、常山(龙泉),黄山吊(泰顺),龙骨藤(遂昌)。  
功效 根、叶:有小毒。截疟,劫痰。

#### 7047042

*Hydrangea anomala* D. Don

植物名 冠盖绣球《高植图鉴》  
药材名 冠盖绣球《广西药录》  
文献名 蔓生八仙花《秦岭植志》,奇形绣球《广

西植录》

地方名 四川:鸡寡子(屏山);贵州:对叶花。

功效 叶:用于胸腹胀满,疟疾。外用于皮肤疥癣。

#### 7047043

*Hydrangea aspera* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 马桑绣球《云南种录》

药材名 土常山《汇编》

文献名 蜜香草《图经》,牛舌条、了皮、红枝挂苦树《植物名汇》,甘菜《中国药植图鉴》

地方名 上海:〔蜀漆〕;浙江:甜茶(天台、黄岩);湖北:白马桑,崖马桑;四川:腊莲(峨眉),〔石花〕(宜宾、屏山),凉皮树(西昌、会东),癩痢花;云南:〔常山〕(丽江、思茅),癩皮树。

功效 树皮、枝:接骨筋,利湿截疟。用于痢疾,疟疾,骨折。

#### 7047044

*Hydrangea chinensis* Maxim. --- *H. obovatifolia* Hayata

植物名 中国绣球《高植图鉴》

文献名 野八仙、华八仙花《台湾药植志》

地方名 台湾:〔常山〕,常山树,常山尼,土常山;广西:脱皮龙(三江);贵州:粉团花。

功效 根:祛瘀止痛,活血生新。用于骨折,跌打损伤。

#### 7047045

*Hydrangea davidii* Franch.

植物名 西南绣球《高植图鉴》

文献名 马边绣球《广西植录》,大卫绣球《广西药录》

地方名 四川:〔通草〕(西昌、会东)。

功效 根、叶及茎的髓心:用于疟疾,麻疹,小便不通。

#### 7047046

*Hydrangea glabrifolia* Hayata

植物名 小叶八仙花《台湾药植志》

功效 根:截疟。

#### 7047047

*Hydrangea hypoglauca* Rehd.

植物名 白背绣球《高植图鉴补编》

地方名 湖北:光皮树(神农架)。

功效 根:除风痰,截疟疾。

#### 7047048

*Hydrangea kwangsiensis* Hu

植物名 广西绣球《广西药录》

地方名 广西:汗斑草、蚂蚁树(融水)。

功效 根、叶:用于跌打损伤,刀伤出血。

#### 7047049

*Hydrangea linkweiensis* Chun

植物名 临桂绣球《高植图鉴补编》

地方名 四川:白常山(石柱)。

功效 根、叶:解热,截疟,风湿骨痛。

#### 7047050

*Hydrangea longipes* Franch.

植物名 长柄绣球《高植图鉴补编》

地方名 湖北:绣球花《神农架》。

功效 叶:止血。用于外伤出血。

#### 7047051

*Hydrangea longipes* Franch. var. *rosthornii* (Diels) W. T.

Wang - *H. rosthornii* Diels

植物名 大枝绣球《高植图鉴补编》

药材名 大枝绣球《广西药录》

文献名 线苞八仙花《秦岭植志》, 南川绣球《广西植志》, 乐恩绣球《云南种录》

地方名 湖北:八仙花《神农架》; 广西:合骨韦(灌阳)。

功效 叶:清热抗疟; 根:用于半身不遂, 跌打损伤。

#### 7047052

*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Seringe --- *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Seringe ex DC. f. *hortensia* (Sieb.) Wils.

植物名 绣球《高植图鉴》

药材名 绣球花《汇编》

文献名 吗哩花《漳州府志》, 洋粉团《纲目拾遗》, 紫绣球、八仙花《名实图考》, 大八仙花《树分》, 粉团花《现代实用中药》, 粉团、洋绣球《种分》, 八仙绣球《中药大辞典》, 田园绣球《药植简编》, 阴绣球《经植手册》

地方名 台湾:紫阳花; 四川:〔常山〕〔盐边〕。

功效 根、叶、花:有小毒。清热, 解毒, 截疟。用于疟疾, 心惊悸, 烦躁。

#### 7047053

*Hydrangea macrosepala* Hayata

植物名 大萼八仙花《台湾药植志》

功效 根:用于头痛。

#### 7047054

*Hydrangea paniculata* Sieb.

植物名 圆锥绣球《高植图鉴》

药材名 上常山(浙江、湖南)、《湖南药物志》

文献名 绣球《群芳谱》, 粉团花、玉粉团《纲目拾遗》, 〔白花丹〕《高植图鉴》, 圆锥八仙花《山东树木志》

地方名 水亚木(江西、台湾、广西); 浙江:甜茶; 湖南:液咪柴, 鼻咪柴; 广西:白杨梅、银花树(全州), 白花木(大瑶山), 榧瘦疏, 驳骨木(金秀); 其他:白花莲, 绿竹杆。

功效 根:有小毒。截疟退热, 消积和中。用于疟疾, 食积不化, 胸腹胀满; 花:消湿, 破血。用于肾囊风。

#### 7047055

*Hydrangea paniculata* Sieb. var. *grandiflora* Sieb.

植物名 大花圆锥绣球《中药大辞典》

药材名 上常山(浙江天目药志)

文献名 粉团花《纲目拾遗》

功效 花:消湿, 破血; 根:截疟。

#### 7047056

*Hydrangea pubinervis* Rehd.

植物名 毛脉绣球《药植简编》

文献名 排毛绣球花《高原中草》

地方名 四川:土常山(若尔盖)。

功效 根:有小毒。截疟退热, 消积和中。

#### 7047057

*Hydrangea robusta* Hook. f. et Thunb.

植物名 粗壮绣球《西藏植志》

功效 叶:清热抗疟。

#### 7047058

*Hydrangea stenophylla* Merr. et Chun

植物名 柳叶绣球《高植图鉴补编》

地方名 江西:土常山。

功效 根、叶:解热抗疟。

#### 7047059

*Hydrangea strigosa* Rehd.

植物名 腊莲绣球《高植图鉴》

药材名 土常山《图经》、《汇编》

文献名 蜜香草《图经》, 甜茶《饮片新参》, 甘茶《中国药植图鉴》, 硬毛八仙花《种分》, 腊莲《树分》, 腊莲八仙花《秦岭植志》, 羊耳朵树《高植图鉴》, 大叶土常山、大叶老鼠竹《中药大辞典》, 硬毛绣球《浙江药植志》

地方名 湖北:思茅腐皮《神农架》; 湖南:白常山, 白花常山; 四川:癩痢花, 癩痢; 贵州:鸡路裤。

功效 根:有小毒。截疟退热, 消积和中。用于疟疾, 食积不化, 胸腹胀满。

#### 7047060

*Hydrangea strigosa* Rehd. var. *angustifolia* (Hemsl.) Rehd.

植物名 窄叶腊莲绣球《云南种录》

文献名 土常山《西昌中草药》, 狭叶腊莲八仙花《秦岭植志》

功效 根:截疟退热, 消积和中。

#### 7047061

*Hydrangea strigosa* Rehd. var. *macrophylla* Rehd.

植物名 阔叶腊莲绣球《广西药录》

地方名 湖北:扁担叶、野枇杷树《神农架》。

功效 根:用于跌打损伤。

#### 7047062

*Hydrangea villosa* Rehd.

植物名 柔毛绣球《高植图鉴》

地方名 广西:〔鸡骨常山〕〔环江〕。

功效 根、叶:有小毒。截疟退热, 消积和中; 花:收敛, 用于子宫脱垂。

#### 7047063

*Hydrangea xanthoneura* Diels

植物名 挂苦绣球《高植图鉴》

药材名 六蛾戏珠《汇编》

文献名 黄脉绣球花《中国植物图鉴》, 黄脉八仙花《秦岭植志》, 黄脉绣球《云南种录》, 仙桃盘《植分学报》

地方名 陕西:八仙花(终南山、太白山); 四川:凝墙棒(峨眉山), 黄枝桂苦子树。

功效 根:活血祛瘀, 续筋接骨。用于骨折。

## 7047064

*Hydrangea yunnanensis* Rehd.

植物名 云南绣球《高植图鉴补编》

药材名 通花常山《西昌中草药》

文献名 云南绣球花《西昌中草药》, 滇绣球花《中国植物图鉴》

地方名 甜茶(西南); 广西: 滇绣球; 四川: 大常山, (黄常山);

功效 根: 清热解毒, 消食截疟。用于消化不良, 乳汁不通, 乳腺炎, 疟疾, 疟疾。

## 7047065

*Itea amoena* Chun

植物名 秀丽鼠刺《高植图鉴》

药材名 秀丽鼠刺《广西药录》

功效 根、叶: 用于风湿。

## 7047066

*Itea chinensis* Hook. et Arn.

植物名 老鼠刺《高植图鉴》

药材名 老鼠刺《广西药录》

文献名 鼠刺《广西植录》

地方名 福建: 糯米树(明溪), 青皮柴细叶樟(清流), 生死樵(宁化), 狗萱(三明); 广东: 髓菜; 广西: 石山杠、大力牛(平南), 鸡嘴果(邕宁), 硬翻桃(防城); 四川: 金嘴子(峨眉)。

功效 根、叶: 活血消肿, 止痛。用于风湿痛, 跌打。

## 7047067

*Itea chinensis* Hook. et Arn. var. *angustata* Wu

植物名 狭叶鼠刺《药植简编》

功效 根、花: 用于风湿痛, 跌打。

## 7047068

*Itea chinensis* Hook. et Arn. var. *oblonga* (Hand. - Mazz.) Wu

植物名 矩形叶鼠刺《高植图鉴》

药材名 银牙莲(浙江、云南); 《汇编》

文献名 矩叶老鼠刺《广西药录》, 长圆叶鼠刺《广西植录》, 牛皮树《高植图鉴补编》, 糯米林、青皮柴《汇编》

地方名 鸡骨柴(浙江、云南); 江西: 老茶王, 华鼠刺; 广西: 两面青(苍梧); 其他: 鼠刺。

功效 根、花: 祛风除湿, 滋补强壮, 止咳, 解毒, 消肿。用于劳伤脱力, 产后风痛, 跌打损伤。

## 7047069

*Itea coriacea* Wu

植物名 厚叶鼠刺《高植图鉴》

药材名 厚叶鼠刺《广西药录》

地方名 广西: 野山茶(临桂)。

功效 叶: 用于刀伤出血。

## 7047070

*Itea glutinosa* Hand. - Mazz.

植物名 腺鼠刺《高植图鉴》

药材名 腺鼠刺《广西药录》

地方名 湖南: 白花树(瑶名); 广西: 牛母树、优牛树

(资源), 炸莲木(全州)。

功效 根: 续筋接骨, 强壮筋骨; 树二层皮、叶: 用于毒蛇咬伤。

## 7047071

*Itea ilicifolia* Oliv.

植物名 月月青《高植图鉴补编》

药材名 月月青《贵州药录》

地方名 湖北: 老鼠刺(神农架)。

功效 根: 清热止咳, 滋补肝肾。用于虚劳咳嗽, 咽喉下痛, 火眼, 肾虚眼昏。

## 7047072

*Itea indochinensis* Merr. var. *pubinervia* (H. T. Chang)C. Y. Wu --- *Itea pubinervia* Chang

植物名 毛脉鼠刺《广西药录》

地方名 广西: 小熊胆(金秀), 益母树(三江)。

功效 叶: 消肿, 止血。用于刀伤出血, 骨折。

## 7047073

*Itea indochinensis* Merr.

植物名 毛鼠刺《高植图鉴补编》

药材名 毛鼠刺《广西药录》

功效 茎: 用于跌打损伤。

## 7047074

*Itea yunnanensis* Franch.

植物名 滇鼠刺《高植图鉴补编》

药材名 滇鼠刺《贵州药录》

功效 根: 滋补肝肾, 止咳。用于虚劳咳嗽, 咽喉下痛, 火眼, 肾虚眼昏。

## 7047075

*Kirengeshoma palmata* Yatabe

植物名 黄山梅《浙江药植志》

药材名 黄山梅《汇编》

地方名 浙江: 马珠子、铃钟三七(临安); 安徽: 少女花(黄山)。

功效 根茎: 舒筋活血, 滋补强壮。用于虚劳过度, 全身酸痛麻木。

## 7047076

*Mukdenia rossii* (Oliv.) Koidz.

植物名 槭叶草《东北草本植志》

药材名 槭叶草《长白山植药志》

地方名 辽宁: 爬山虎, 腊八菜, 丹顶草。

功效 全草: 用于心动过速。

## 7047076a

*Parnassia brevistyla* (Brieg.) Hand. - Mazz.

植物名 短柱梅花草《新华本草纲要》

功效 全草: 用于内伤出血, 清热。

## 7047077

*Parnassia davidii* Franch.

植物名 半边蝶《广西药录》

功效 全草: 利水通淋。

## 7047078

*Parnassia delavayi* Franch.

植物名 突隔梅花草《高植图鉴》

药材名 肺心草《云南中草药》

文献名 芒药苍耳七《秦岭植志》

地方名 陕西:荞麦草;四川:鸡肫草(峨眉山);贵州:水折耳;云南:白侧耳,黄草、小白花、山慈菇、马尿草、马蹄草、紫葳草(曲靖),大苍耳七,梅花草。

功效 全草:清热润肺,消肿止痛。用于肺结核,腮腺炎,淋巴腺炎,喉炎,白带,热毒疮肿。

#### 7047079

*Parnassia farreri* W. E. Evans

植物名 贡山梅花草《云南种录》

功效 全草:用于无名肿毒,背痛,明目补肾;花:退云翳。

#### 7047080

*Parnassia foliosa* Hook. f. et Thoms.

植物名 白耳菜《高植图鉴》

药材名 白耳菜《汇编》

文献名 白折耳根《高植图鉴》

地方名 诗人草(安徽、江西);浙江:光板,金苔板,金钱灯塔草(临安),苍耳七,白须草;贵州:白侧耳,叫天鸡。

功效 带根全草:镇咳,止血,利湿。

#### 7047081

*Parnassia mysorensis* Heyne ex Wight et Arn.

植物名 凹瓣梅花草《高植图鉴补编》

地方名 贵州:岩参。

功效 全株:清肺热,止咳止血。用于肺虚咳嗽,咳血。

#### 7047081a

*Parnassia oreophila* Hance

植物名 细叉梅花草《新华本草纲要》

功效 全草:用于退烧。

#### 7047082

*Parnassia palustris* L. --- *P. palustris* L. var. *multisecta* Ledeb.

植物名 梅花草《高植图鉴》

药材名 梅花草《汇编》

文献名 苍耳七《内蒙古植志》,多毛梅花草《药植简编》

地方名 内蒙古:“孟根一地格达”(蒙名)。

功效 全草:清热解毒,止咳化痰。用于细菌性痢疾,咽喉肿痛,百日咳,咳嗽多痰。

#### 7047083

*Parnassia wightiana* Wall. ex Wight et Arn.

植物名 鸡眼梅花草《高植图鉴》

药材名 鸡肫草(四川、贵州)、《汇编》

文献名 苍耳七《植物名汇》,黄梅花草《经植手册》,鸡肫梅花草《高植图鉴》,鸡肫梅花草《西藏植志》,韦氏苍耳七《四川中药志》

地方名 陕西:猫耳草,鸡儿草,荞麦叶(太白);甘肃:疔疮草(文县);四川:水侧耳,梅花草,白侧耳根,水侧耳根,金钱七,铜钱草;贵州:白侧耳,白折耳,白耳菜,白须草。

功效 全草:清肺止咳,利尿除湿。用于久咳咯血,疟疾,肾结石,胆石症,白带,跌打损伤。

#### 7047084

*Penthorum chinense* Pursh.

植物名 扯根菜《救荒本草》、《高植图鉴》

药材名 赶黄草(四川)、《汇编》

文献名 半娇红、水鸡红《纲目拾遗》,水淬蓝《天宝本草》

地方名 水杨柳(四川、贵州);辽宁:洗衣草(宽甸);江西:红杆菜(井冈山);湖北:刷竹草(神农架);湖南:红柳信,红曲草,水柳信,水桃草,水苋菜,流痰草,双线草;贵州:水泽兰,〔泽兰〕。

功效 全草:利尿除湿,祛瘀止痛。用于黄疸,水肿,跌打损伤肿痛。

#### 7047085

*Philadelphus dasycalyx* (Rehd.) S. Y. Hu

植物名 毛萼山梅花《高植图鉴补编》

功效 根皮:用于疟疾挫伤,腰肋疼痛,胃痛,头痛。

#### 7047086

*Philadelphus henryi* Koehne

植物名 滇南山梅花《高植图鉴补编》

药材名 山梅花《名实图考》、《汇编》

文献名 毛叶山梅花《汇编》

地方名 云南:毛叶木通。

功效 茎、叶:清热利湿。用于膀胱炎,黄疸型肝炎。

#### 7047087

*Philadelphus incanus* Koehne

植物名 山梅花《高植图鉴补编》

药材名 山梅花《神农架药录》

地方名 湖北:鸡骨头(神农架)。

功效 茎、叶:清热,利湿,泻火。

#### 7047088

*Philadelphus pekinensis* Rupr. var. *laxiflorus* Cheng

植物名 疏花太平花《药植简编》

功效 根皮:用于疟疾,挫伤,腰肋疼痛,胃痛,太阳头痛。

#### 7047089

*Philadelphus sericanthus* Koehne

植物名 绢毛山梅花《高植图鉴》

药材名 山梅花根皮《中药大辞典》

文献名 白花杆《药植简编》。

地方名 浙江:建德山梅花、〔土常山〕(临安);湖北:山蜡梅(神农架)。

功效 根皮:用于疟疾,挫伤,腰肋疼痛,胃痛。

#### 7047090

*Philadelphus sericanthus* Koehne var. *kulingensis* (K.) Hand. -Mazz.

植物名 牯岭山梅花《江西药录》

地方名 江西:山梅花,〔土常山〕。

功效 根皮:用于疟疾,挫伤,腰肋疼痛,胃痛。

**7047091**

*Philadelphus subcanus* Koehne --- *P. sericanthus* Koehne  
var. *rehderianus* Koehne

植物名 毛柱山梅花《高植图鉴补编》

文献名 大叶山梅花《药植简编》

功效 根皮：用于疟疾挫伤、腰肋疼痛，胃痛，头痛。

**7047092**

*Philadelphus tenuifolius* Rupr.

植物名 堇叶山梅花《高植图鉴补编》

药材名 堇叶山梅花《长白山植药志》

功效 花：用于神经系统的强壮剂和利尿剂；根：用于痔疮。

**7047093**

*Pileostegia tomentella* Hand.-Mazz.

植物名 星毛冠盖藤《高植图鉴》

药材名 青棉花藤(江西)、《汇编》

地方名 广西：山枇杷(贺县)。

功效 根、藤、叶、花：祛风除湿，散瘀止痛，接骨；叶：止咳。

**7047094**

*Pileostegia viburnoides* Hook. f. et Thoms.

植物名 冠盖藤《高植图鉴》

药材名 青棉花藤(浙江)、《汇编》

文献名 竹马、竹麻、大藤、纸加藤《中药大辞典》

地方名 浙江：红棉花藤(临安)，猴头藤(平阳、永嘉、温州、乐清、丽水、青田)；台湾：白椿根；广西：(王不留行)，三百两银；贵州：青棉花，大一枝花。

功效 根、藤、花、叶：祛风除湿，散瘀止痛，接骨。用于腰腿酸痛，风湿麻木。外用于跌打损伤，骨折，外伤出血。

**7047095**

*Ribes acuminatum* Wall.

植物名 尖叶茶藨(拉汉英种称)

药材名 尖叶茶藨《神农架药录》

地方名 湖北：山麻子(神农架)。

功效 果实：清热生津，止渴。

**7047096**

*Ribes alpestre* Wall. ex Decne.

植物名 大刺茶藨《高植图鉴》

文献名 刺李《高原中草》，长刺茶藨子《秦岭植志》，高山醋栗《云南种录》，刺茶藨子《西藏植志》

地方名 四川：“茶茹”(藏名)；西藏：醋栗(拉萨)；其他：酸缸。

功效 果实：用于萎缩性胃炎，胆汁缺乏病。

**7047097**

*Ribes ambiguum* Maxim.

植物名 四川蔓茶藨《药植简编》

文献名 南醋木《广西药录》，南醋栗《广西植录》

功效 种子：通经，利尿。用于水肿。

**7047098**

*Ribes burejense* Fr. Schmidt --- *Grossularia burejensis*

(Fr. Schmidt) Berger

植物名 刺梨《高植图鉴补编》

药材名 刺梨《北京中草》

文献名 刺果茶藨、刺儿李、刺李、山梨《高植图鉴》

功效 种子：消水肿，调经。

**7047099**

*Ribes davidii* Franch.

植物名 革叶茶藨《高植图鉴补编》

药材名 石夹生《云南药录》

地方名 云南：石甲生，小活血，小石生。

功效 全草：活血祛瘀，舒筋理气。用于风湿性关节炎，月经不调，经闭腰痛，产后腹痛，痢疾。

**7047099a**

*Ribes diacanthum* Pall.

植物名 云南山梅花《新华本草纲要》

文献名 西南山梅花《西藏植志》

功效 根皮：活血止痛。用于疟疾，挫伤，腰肋疼痛。

**7047100**

*Ribes emodense* Rehd.

植物名 糖茶藨《高植图鉴》

药材名 糖茶藨《汇编》

文献名 糖茶藨子《秦岭植志》

地方名 西藏：“色果策尔玛卖巴”(藏名)。

功效 茎内皮、果实：清热解毒。用于肝炎。

**7047101**

*Ribes fasciculatum* Sieb. et Zucc. var. *chinense* Maxim.

植物名 华茶藨《高植图鉴》

药材名 大蔓茶藨《高植图鉴》

文献名 蔓茶藨子《树分》，大蔓茶藨子《药植简编》，簇花醋栗《云南种录》

地方名 浙江：三升米(临安)；湖北：茶刺泡(神农架)。

功效 根：用于妇女虚热乏力，月经不调，痛经；果实：清热，生津，止渴。

**7047102**

*Ribes glaciale* Wall.

植物名 冰川茶藨《高植图鉴补编》

地方名 湖北：燕子树(神农架)。

功效 根：清虚热，调经止痛。

**7047103**

*Ribes henryi* Franch.

植物名 睫毛茶藨《高植图鉴补编》

药材名 钻石风《贵州民间药物》

文献名 睫毛茶藨子《贵州药录》

地方名 贵州：岩马桑(大方)。

功效 根：舒筋活络，祛瘀止血。用于风湿，劳伤，吐血。

**7047104**

*Ribes janczewskii* Pojark.

植物名 茶藨子《新疆中草药》

药材名 茶藨子《新疆中草药》

地方名 新疆:哈熊果。

功效 果实、根皮:滋补强壮,舒筋活血,祛瘀止痛。用于维生素缺乏症,关节炎,赤白痢疾,月经不调,高血压,肾炎。

#### 7047105

*Ribes longeracemosum* Franch.

植物名 长串茶藨(高植图鉴补编)

地方名 湖北:铁青胆(神农架)。

功效 根:祛风湿,止痛。

#### 7047106

*Ribes manshuricum* (Maxim.) Kom.

植物名 东北茶藨(高植图鉴补编)

药材名 醋栗(吉林)、《汇编》

文献名 东北茶藨子《药植简编》

地方名 黑龙江:醋李,次马落衣;吉林:狗葡萄,山樱桃,灯笼果;山东:山麻子。

功效 果实:解表。用于感冒。

#### 7047107

*Ribes manshuricum* (Maxim.) Kom. var. *subglabrum* Kom. --- *Ribes mandshurica* (Maxim.) Kom. f. *subglabrum* (Kom.) Kitag.

植物名 疏毛东北茶藨(高植图鉴补编)

文献名 疏毛山麻子《高植图鉴》,光叶东北茶藨《东北药用植物》

功效 果实:解表。用于感冒。

#### 7047108

*Ribes maximowiczii* Batal.

植物名 刺果茶藨(高植图鉴补编)

地方名 湖北:刺山麻果(神农架)。

功效 根:祛风除湿。用于风湿关节疼痛。

#### 7047109

*Ribes moupinense* Franch.

植物名 宝兴茶藨(高植图鉴补编)

文献名 宝兴茶藨子《贵州药录》

地方名 湖北:山麻子(神农架)。

功效 根:祛风除湿,活血调经。

#### 7047110

*Ribes tenue* Jancz.

植物名 细枝茶藨(高植图鉴)

药材名 细醋栗《云南种录》

文献名 狭萼茶藨子《秦岭植志》,细枝茶藨子《药植简编》

地方名 浙江:三升米;湖北:茶刺果树(神农架)。

功效 根:清虚热,调经止痛。用于虚热,乏力,月经不调,痛经。

#### 7047111

*Rodgersia aesculifolia* Batal.

植物名 鬼灯檠(高植图鉴)

药材名 索骨丹《汇编》

文献名 老蛇盘《汇编》,毛荷叶《植物名汇》,水五龙《峨眉药植》,七叶鬼灯檠《中国药植志》,索骨丹根《药典》

地方名 红药子(陕西、甘肃、宁夏),黄药子(陕西、福建),猪屎七(陕西、甘肃、四川),瓣台山(陕西、甘肃),牛角七(陕西、湖北、湖南);陕西:老汉水、(金毛狗)(太白),秤杆七(镇坪),天蓬伞(柞水),苕七(旬阳),麻鹑子(陇县),猪尿筒(商洛),猪尿筒七;甘肃:撮合扇,作合山;河南:宝剑叶,骡子球、红骡子(嵩县),山蕲(鲁山);湖北:老蛇莲(巴东);四川:慕荷,大红袍,蛇疙瘩、(六月寒),通关道、乌云伞(峨眉山);云南:毛青红,枇杷莲,枣儿红。

功效 根茎:消炎解毒,收敛止血。用于腹泻,菌痢,便血。外用于子宫脱垂,外伤出血。

#### 7047112

*Rodgersia pinnata* Franch.

植物名 羽叶鬼灯檠《中国植志》

药材名 岩陀《红河中草药》

文献名 羽叶岩陀《药典》,蛇疙瘩《汇编》,羽叶老蛇盘《药植简编》,羽状鬼灯檠《高植图鉴》,毛头寒《四川中药志》

地方名 大红袍(四川、云南);四川:毛头寒药,红寒药,毛头七(会东),朱砂七(德昌);云南:半边伞、红升麻、红姜、紫姜、岩七(红河),九叶岩陀,血满草、接骨丹(玉龙山),“坎陀”(傈僳名),“都绍阿路嘎”(苗名);其他:芋头七。

功效 根茎:解热,祛风,收敛。用于感冒头痛,风湿骨痛,肠炎,菌痢,外伤出血。

#### 7047113

*Rodgersia podophylla* A. Grav

植物名 矢车草《台湾药植志》

药材名 盘龙七(西北)

文献名 鬼灯檠《中国植志》

功效 叶:解热。

#### 7047114

*Rodgersia sambucifolia* Hemsl.

植物名 西南鬼灯檠(高植图鉴)

药材名 岩陀《云南中草药选》

文献名 鬼灯檠《科种》,岩托《药植简编》

地方名 四川:毛头寒药,毛头七;贵州:野黄姜,毛青杠;云南:红姜,枣儿红(曲靖),九叶岩陀(丽江),蛇格答(鲁甸),血三七,毛七,毛头三七,岩陀陀,毛青红(昭通),“埃陀”(傈僳名),“都绍阿路嘎”(苗名)。

功效 根茎:解热,祛风,收敛。用于感冒头痛,风湿骨痛,肠炎,菌痢,外伤出血。

#### 7047114a

*Saxifraga aculeata* Balf. f. --- *S. mengtzeana* Engl. et Irmsch. var. *cordatifolia* Engl. et Irmsch.

植物名 卵心叶虎耳草《中国植志》

药材名 心叶虎耳草《汇编》

文献名 心叶蒙自虎耳草《汇编》,大虎耳草《云南药录》

地方名 云南:岩耳巴,反背红、红岩草(红河),小反背红。

功效 全草:有小毒。清热解毒,凉血止血。用于



麻疹, 高热, 咳嗽, 支气管炎, 皮肤过敏, 月经不调, 产后腹痛。

## 7047115

*Saxifraga atrata* Engl.

植物名 黑虎耳草《高植图鉴补编》

文献名 黑化虎耳草《高植图鉴》

地方名 青海: “阿仲恭保”(藏名)。

功效 花: 退烧。用于肺病, 肺炎等。

## 7047116

*Saxifraga brunonis* Wall. ex Seringe

植物名 喜马拉雅虎耳草《高植图鉴补编》

文献名 “直打洒曾曼巴”(藏名)《青藏药图》, 褐虎耳草《云南种录》

功效 全草: 豁痰。用于肺结核, 脓胸等症。

## 7047117

*Saxifraga divaricata* Engl. et Irmsch.

植物名 叉枝虎耳草《高植图鉴》

文献名 “阿仲嘎保”(藏名)《青藏药图》

功效 花: 清热利肺。用于肺炎, 淋病, 淋巴结核, 高血压。

## 7047118

*Saxifraga diversifolia* Wall. ex Ser.

植物名 异叶虎耳草《高植图鉴补编》

地方名 贵州: 虎耳草(盘县)。

功效 全草: 清热凉血, 祛风镇静。用于风丹, 风湿, 惊风。

## 7047119 见 7047131a

## 7047120

*Saxifraga flagellaris* Willd. ex Sternb. ssp. *megistantha* Hand. -Mazz.

植物名 大花虎耳草《高植图鉴》

药材名 松蒂《迪庆藏药》

文献名 鞭枝虎耳草《迪庆藏药》

功效 全草: 清肝、胆热, 清疮热, 干脓。用于治“培根”与“赤巴”合病, 肝热、胆热、诸热, 肠病, 疮痢。

## 7047121

*Saxifraga fortunei* Hook. f.

植物名 齿瓣虎耳草《中国植志》

文献名 华中虎耳草《高植图鉴》

功效 全草: 用于中耳炎(捣汁滴耳)。

## 7047122

*Saxifraga gemmuligera* Engl.

植物名 小芽虎耳草《高植图鉴补编》

文献名 “邦参布柔”(藏名)《青藏药图》

地方名 西藏: “邦灿吾口”(藏名)。

功效 全草: 清热利肺, 用于肺脓肿及其他慢性肺炎。

## 7047123

*Saxifraga laciniata* Nakai et Takeda --- *S. takedana* Nakai

植物名 长白虎耳草《中国植志》

文献名 斑瓣虎耳草《东检》, 条裂虎耳草《高植图鉴》

地方名 四川: “哩登”(若尔盖藏名)。

功效 全草: 除湿利尿, 行血祛瘀, 消肿。用于咳嗽, 咯血, 黄疸, 骨折筋伤, 白带, 疮疖。

## 7047124

*Saxifraga melanocentra* Franch.

植物名 黑蕊虎耳草《高植图鉴补编》

文献名 黑心虎耳草《高植图鉴》

地方名 西藏: “针色达奥”(藏名)。

功效 地上部分: 补血, 散瘀。

## 7047125 见 7047114a

## 7047126

*Saxifraga montana* H. Smith

植物名 山地虎耳草《高植图鉴》

文献名 “寒交赛保”(藏名)《青藏药图》

地方名 陕西: 金柴胡(太白); 西藏: “塞仁交木”(藏名)。

功效 花或全草: 用于头痛, 神经痛。

## 7047127

*Saxifraga nangxianensis* J. T. Pan

植物名 朗县虎耳草《高植图鉴补编》

文献名 “直打洒曾曼巴”(藏名)《青藏药图》

功效 全草: 豁痰。用于肺结核, 脓胸。

## 7047128

*Saxifraga parva* Hemsl.

植物名 小虎耳草《高植图鉴补编》

药材名 小虎耳草《汇编》

功效 全草: 清肺止咳, 凉血解毒。用于肺热咳嗽, 月经过多。外治中耳炎, 腮腺炎, 疮, 疖, 烧烫伤。

## 7047129

*Saxifraga pasumensis* Marq. et Shaw. f. *integrifolia* Jeeir

植物名 伞梗虎耳草《西藏中草》

地方名 西藏: 松木蒂。

功效 全草: 清热解毒, 清利肝胆。用于传染性肝炎, 风热感冒。

## 7047130

*Saxifraga przewalskii* Engl.

植物名 青藏虎耳草《西藏植志》

药材名 青藏虎耳草《青藏药图》

文献名 大通虎耳草《高植图鉴》, 大同虎耳草《高植图鉴补编》

地方名 青海: “松吉斗”(藏名)。

功效 全草: 清肝胆之热, 健胃。用于肝炎, 胆囊炎, 流行性感胃发热, 消化不良。

## 7047131

*Saxifraga punctata* L.

植物名 斑点虎耳草(吉林)《高植图鉴》

药材名 斑点虎耳草《长白山植志》

功效 全草: 用于疔疮肿毒。

## 7047131a

*Saxifraga rufescens* Balf. f. var. *flabellifolia* C. Y. Wu et J. T. Pan --- *S. flabellifolia* Franch.

植物名 扇叶虎耳草《中国植志》

文献名 扇叶形虎耳草《贵州药录》

地方名 湖北:叉叶虎耳草(神农架)。

功效 全草:清热凉血,祛风镇静。用于风丹,风湿,惊风。

#### 7047132

*Saxifraga saginoides* Hook. f. et Thoms.

植物名 漆姑虎耳草《高植图鉴补编》

文献名 “松吉斗”(藏名)《植分学报》

功效 全草:清热解毒。用于肝炎,胆囊炎。

#### 7047133

*Saxifraga sanguinea* Franch.

植物名 红虎耳草《高植图鉴补编》

文献名 “松滴”(藏名)《青藏药图》,“松吉斗”(藏名)《植分学报》。

功效 全草:清热解毒。用于胆囊炎,肝炎。

#### 7047134

*Saxifraga signatella* Marq. --- *S. brunneopunctata* H. Sm.

植物名 藏中虎耳草《西藏植志》

功效 全草:清热解毒,清利肝胆。

#### 7047135

*Saxifraga stolonifera* Curt. --- *S. sarmentosa* L.

植物名 虎耳草《中国植志》

药材名 虎耳草《履巉岩本草》、《汇编》

文献名 石荷叶《纲目》,金丝草《花镜》,金线吊芙蓉、老虎耳《生草药性备要》,系系叶《简易草药》,天荷叶、金丝荷叶《现代实用中药》,丝棉吊梅《中国药植志》,金线荷叶《民药汇编》

地方名 耳聾草(福建、广西),耳朵草(浙江、安徽、福建),通耳草(陕西、甘肃),猫耳朵(陕西、甘肃、湖南),滴耳草(陕西、河南),铜钱草(浙江、广西、云南),猪耳草(安徽、福建),丝丝草(河南、湖南),金线莲、猪耳朵(江西、福建),狮子耳(福建、广东);浙江:红丝络,红线草,红线绳,水耳朵,月下红,叶下红,老虎耳朵草(临安、江山);福建:铜架杯(闽东),老虎耳朵(宁化),鼎片盖(南平),土金线莲(大田),猴耳朵(松政);江西:烂耳草(莲花),金丝叶,豚耳草(泰和),澄耳草;台湾:锦耳草;湖北:疼耳草;湖南:佛耳草,蟹壳草(通道),捺耳草(安仁);广东:金笑梅、丝线吊芙蓉(广州),虎耳羔(潮阳),蚕耳药(南雄),积雪草(乳源),丝线吊金钟(翁源);广西:铜钱菜(忻城、罗城),石耳朵(资源),石耳草;四川:石丹药,绣耳草(会理),金钱荷叶;贵州:普耳草;云南:天青地红,反背红。

功效 全草:消炎,解毒。用于急性中耳炎,风热咳嗽。外用于大泡性鼓膜炎,风疹瘙痒。

#### 7047136

*Saxifraga tangutica* Engl.

植物名 唐古特虎耳草《中国植志》

文献名 甘青虎耳草《高植图鉴》

地方名 青海:“松吉斗”、“迭达”(藏名);西藏:“赛滴”、“桑斗”(藏名)。

功效 全草:清肝胆之热,健胃。用于肝炎,胆囊炎,流行性感冒发热,消化不良。

#### 7047137

*Saxifraga umbellulata* Hook. f. et Thoms.

植物名 小伞虎耳草《高植图鉴补编》

文献名 “松滴”(藏名)《青藏药图》

功效 全草:清热解毒,清利肝胆。用于胆囊炎,肝炎,咯血等,风热感冒。

#### 7047138

*Saxifraga umbellulata* Hook. f. et Thoms. f. *pectinata* Marq. et Shaw

植物名 篦齿虎耳草《西藏植志》

功效 全草:清热解毒,清利肝胆。用于黄疸性肝炎,胆囊炎,风热感冒。

#### 7047139

*Saxifraga unguiculata* Engl.

植物名 爪瓣虎耳草《高植图鉴补编》

文献名 “赛滴”(藏名)《青藏药图》,爪虎耳草《高植图鉴》

功效 全草:清热解毒,清利肝胆。用于胆囊炎,肝炎。

#### 7047140

*Schizophragma hydrangoides* Sieb. et Zucc.

植物名 绣球钻地风《高植图鉴补编》

文献名 钻地风《药植简编》。

功效 根皮:驱风活血,丝虫病。

#### 7047141

*Schizophragma hypoglaucum* Rehd.

植物名 白背钻地风《高植图鉴补编》

药材名 散血藤《四川中药志》

文献名 粉叶钻地风《中药大辞典》

地方名 钻地风(四川、云南);四川:利筋藤。

功效 藤茎:祛风湿,解热毒。用于瘀血凝滞,筋骨风痛,疮毒红肿。

#### 7047142

*Schizophragma integrifolia* (Franch.) Oliv.

植物名 钻地风《高植图鉴》

药材名 钻地风《名实图考》、《汇编》

文献名 全叶钻地风《药植简编》,全缘钻地风《江西药录》,追地枫《药材资料汇编》

地方名 桐叶藤(浙江、湖南);湖北:假叶树(神农架);四川:利筋藤(峨眉山)。

功效 根及藤:舒筋活络,祛风活血。用于风湿筋骨痛,四肢关节酸痛,丝虫病。

#### 7047143

*Schizophragma integrifolia* (Franch.) Oliv. f. *denticulata* (Rehd.) Chun

植物名 小齿钻地风《高植图鉴》

药材名 齿缘钻地风《浙江天目药志》

文献名 齿叶钻地风《药植简编》

功效 根:祛风湿,解热毒。用于瘀血凝滞,筋骨痛,疮毒红肿等症。

#### 7047144

*Schizophragma integrifolia* var. *glaucescens* Rehd. --- *S.*

*glaucescens* (Rehd.) Chun

植物名 粉绿钻地风《高植图鉴补编》

药材名 粉绿钻地风《贵州药录》

功效 根皮:祛风活血,止痛。用于风湿脚气,四肢关节酸痛。

#### 7047145

*Tanakaea omeiensis* Nakai

植物名 峨眉草《高植图鉴》

地方名 四川:峨眉岩雪草。

功效 全草:息风定惊,清热。

#### 7047146

*Tiarella polyphylla* D. Don

植物名 黄水枝《高植图鉴》

药材名 黄水枝《汇编》

文献名 紫背金钱《广西植录》,喘息药《经植手册》

地方名 博落(陕西、四川、云南);陕西:〔虎耳草〕(眉县);湖北:防风七(巴东);云南:水前胡(漾濞)。

功效 全草:清热解毒,活血祛瘀,消肿止痛。用于痈疽肿毒,跌打损伤,肝炎,咳嗽气喘。

### 7048 茅膏菜科 Droseraceae

#### 7048001

*Drosera anglica* Hudson

植物名 线叶茅膏菜《东检》

药材名 线叶茅膏菜《东北药用植物》

功效 地上部分:解痉,镇咳祛痰,消炎平喘,抗菌止痢。用于支气管炎,支气管喘息,喉炎,百日咳,赤白痢疾。

#### 7048002

*Drosera burmannii* Vahl

植物名 锦地罗《中国植志》

药材名 锦地罗《生草药性备要》、《中药大辞典》

文献名 怎地罗、朵芙蓉花《生草药性备要》,一朵芙蓉《岭南采药录》,小毛毡苔《福建药物志》,落地金钱《汇编》,五柱毛毡苔《中药大辞典》

地方名 江西:钻骨散、草立珠(德兴);安徽:油麻草(太和);台湾:金钱草;福建:金雀梅(厦门、漳州、泉州、同安),地红花(福州),天地花(泉州、晋江),山梅花(莆田),猎狸甲(宁德),金笑梅,雀梅,笑梅;广东:丝线串铜钱(惠阳);海南:钉地金钱,夜落金钱,乌蝇草;广西:金钱吊芙蓉(南宁),狗脊草(博白),文钱红(陆川),地金钱(防城)。

功效 全草:清热利湿,凉血解毒,化痰消积。用于肠炎,痢疾,咽喉肿痛,肺热咳嗽,咯血,衄血,小儿疳积。

#### 7048003

*Drosera indica* L.

植物名 长叶茅膏菜《中国植志》

地方名 捕蝇草(海南、广西);广东:螳螂草(湛江);海南:满露草。

功效 全草:用于风湿关节炎,疳疔初起。外用于跌打损伤,中耳炎,荨麻疹。

#### 7048004

*Drosera indica* L. var. *albiflora* Mak.

植物名 白花长叶茅膏菜《台湾药植志》

地方名 海南:乌蝇草。

功效 根:外用于肿毒。

#### 7048005

*Drosera peltata* Smith

植物名 盾叶茅膏菜《中国植志》

药材名 茅膏菜《本草拾遗》

文献名 石龙牙草《名实图考》

地方名 广西:恋爱草(岑溪),〔夏枯草〕(桂平),露珠草、流泪草(忻城),觅魂草、无风自动草(临桂),松毛金(兴安),马山掉(柳江);云南:地胡椒、苍蝇网(大姚)。

功效 全草:用于头晕,胸痛,痢疾,内伤,疔疮,疥癬;叶:补血,接筋骨。

#### 7048006

*Drosera peltata* Smith var. *glabrata* Y. Z. Ruan

植物名 光萼茅膏菜《中国植志》

药材名 茅膏菜《本草拾遗》、《植分学报》

文献名 盾叶茅膏菜《高植图鉴》

地方名 捕虫草(福建、广东),一粒金丹、落地珍珠、陈伤子(浙江、广东);江苏:黄金丝,滴水不干;安徽:土里珍珠;广西:地下明珠,眼泪草。

功效 全草:消炎,除湿,散结。

#### 7048007

*Drosera peltata* Smith var. *lunata* (Buch.-Ham.) C. B. Clarke

植物名 新月茅膏菜《中国植志》

药材名 茅膏菜《本草拾遗》、《简明中医辞典》

文献名 捕虫草、落地珍珠《简明中医辞典》,苍蝇网《云南种录》

地方名 广西:地下明珠,一粒金丹;四川:山胡椒草;云南:山君子(红河),珍珠草(丽江),苍蝇草,捕蝇草,地珍珠,野高粱。

功效 根及全草:有毒。用于解疮毒,跌打瘰癧等。

#### 7048008

*Drosera peltata* Smith var. *multisepala* Y. Z. Ruan --- *D. peltata* Smith var. *lunata* auct. non Clarke

植物名 茅膏菜《中国植志》

药材名 茅膏菜《本草拾遗》、《汇编》

文献名 石龙芽草《名实图考》,山胡椒《分类草药性》,盾叶茅膏菜《高植图鉴》

地方名 落地珍珠(浙江、安徽、江西),捕虫草(安徽、福建、云南),捕蝇草(浙江、云南),一粒珠(浙江、福建),一粒金丹(浙江、湖南、广东、四川),陈伤子(浙江、广东),地下明珠(湖南、广西),地胡椒(江西、云南),筋骨草(四川、云南),铁秤砣(江西、湖南),蚊子草(湖南、四川),泥里珠(浙江、安徽);江苏:黄金丝,滴水不干;浙江:山砒霜,寸金黄,一滴金丹;江西:土地子,草立珠(德兴),铁秤锤,落地金珠,钻骨散,油麻草(泰和);福

建:食虫草(福州、晋江),柔鱼草(厦门),鲢鱼脚草(晋江),兰花子草(宁化);湖南:夏无踪,白花叶,地下珍珠,内宝珠,金线吊葫芦,老虎子(长沙),内宝珍珠,吃虫草(衡山),老虎药,眼泪王(城步);广西:露珠草、流泪草(忻城),无风自动草(临桂),恋爱草(岑溪),〔夏枯草〕(桂平),觅魂草,松毛金(兴安),马山掉(柳江);四川:胡椒草,地红珠,露水草,山胡椒草,牛打架,打古子,苍蝇王;贵州:山地皮。

功效 全草:有毒。用于胃痛,赤白痢,小儿疳积,跌打损伤。外用于瘰癧。

备考 过去文献有将本品误订为 *D. peltata* Smith var. *lunata* Clarke

## 7048009

*Drosera rotundifolia* L.

植物名 圆叶茅膏菜《中国植志》

药材名 毛毡苔《汇编》

文献名 毛毡草(小泉《药植》),茅膏菜《东检》

功效 全草:祛痰,止咳。用于支气管炎,百日咳。

## 7048010

*Drosera spatulata* Labill.

植物名 匙叶茅膏菜《中国植志》

文献名 地毡草《泉州本草》

地方名 广东:钉地金钱(潮阳),落地金钱、金钱花、旗杆草(潮安),癖草(普宁),皇帝涎(揭阳);福建:地红花,小毛毡草,小毛毡苔(泉州),金雀梅,金雀花,天地花。

功效 全草:清热解渴,凉血通淋。用于感冒,肺痈,咳嗽,口渴,吐血,咯血,淋病,喉蛾,疔疮。

## 7048011

*Drosera spatulata* Labill. var. *loureirii* (Hook. et Arn.) Y. Z. Ruan

植物名 宽苞茅膏菜《中国植志》

功效 叶:用于牙病。

## 7052 沟繁缕科 Elatinaceae

## 7052001

*Bergia ammannioides* Roxb. ex Roth

植物名 田繁缕《中国植志》

药材名 田繁缕《广西本草选编》

文献名 假水苋菜《云南种录》,密花草《汇编》

地方名 广西:蜂刺草,节节花(钟山);云南:火开荆(金屏)。

功效 全草:清热解毒。用于尿路感染,痈疽,口腔炎。

## 7053 石竹科 Caryophyllaceae

## 7053001

*Agrostemma githago* L. --- *Lychnis githago* Scop. --- *L. segetum* --- *Githago segetum* Link --- *G. segetum* (Lam.) Desfontaines

植物名 麦毒草《东北药用植物》

文献名 麦仙翁《高植图鉴》

功效 全草:用于百日咳,妇女子宫出血。

## 7053002

*Arenaria barbata* Franch. var. *hirsutissima* W. W. Sm.

植物名 极硬毛无心菜《云南种录》

药材名 须花参《云南中草药》

文献名 硬髯毛无心菜《西藏植志》

地方名 云南:七姐妹。

功效 根:补肾壮阳。用一肾虚腰痛。

## 7053003

*Arenaria capillaris* Poiret.

植物名 线叶蚤缀《品种论述》

文献名 毛叶老牛筋《高植图鉴补编》

地方名 辽宁:〔银柴胡〕。

备考 辽宁个别地区以其根部混作银柴胡。本植物为地区习惯用药。

## 7053004

*Arenaria juncea* Bieb.

植物名 灯心蚤缀《汇编》

药材名 山银柴胡《品种论述》

文献名 毛轴蚤缀《中药通报》,灯心草蚤缀《高植图鉴》,老牛筋《高植图鉴补编》,小无心菜《中药志》

地方名 羊胡子草、〔银柴胡〕(东北、华北);黑龙江:达子金;河北:黄胡;内蒙古:山羊胡子,“朝恩黑拉嘎纳”(蒙名)。

功效 根:活血散瘀,消肿止痛,化腐生肌,长骨

## 7053005

*Arenaria juncea* B. var. *abbreviata* Kitag.

植物名 短灯心蚤缀《品种论述》

地方名 辽宁:〔银柴胡〕(彰武)。

功效 根:活血散瘀,消肿止痛。

## 7053006

*Arenaria juncea* Bieb. var. *glabra* Regel --- *A. tonsa* Kitag.

植物名 光轴鹅不食《东北药用植物》

文献名 光蚤缀《东检》

地方名 辽宁:千头草(新金)。

功效 根:清热凉血。用于虚劳骨蒸,阴虚久疟,小儿疳积,肝炎。

## 7053007

*Arenaria kansuensis* Maxim.

植物名 甘肃雪灵芝《高植图鉴补编》

药材名 雪灵芝(四川)、《汇编》

文献名 甘肃蚤缀《高植图鉴》,甘肃无心菜《云南种录》

地方名 四川:“睬阿中”(藏名)。

功效 全草:滋阴养血,益肾壮骨。用于肺燥咳嗽,咳血,血虚风痹,筋骨疼痛,肾虚眩暈。

## 7053008

*Arenaria kansuensis* Maxim. var. *ovata* Petal. Y. W. Tsui et L. H. Zhou

植物名 卵 - 芝《高植图鉴补编》

药材名 卵 - 芝《植分学报》

文献名 卵瓣蚤缀《青藏药图》,甘肃蚤缀《民族药志》

地方名 青海:“阿仲尕保”、“阿仲嘎博”(藏名)。

功效 根:退热,止咳,降血压,滋补。用于肺炎,淋病,淋巴结核,高血压病,子宫病。

#### 7053009

*Arenaria lancangensis* L. H. Zhou

植物名 澜沧雪灵芝《云南种录》

药材名 澜沧雪灵芝《迪庆藏药》

文献名 雪灵芝《迪庆藏药》

功效 全草:止咳退烧。用于肺炎,支气管炎。

#### 7053010

*Arenaria melanandra* (Maxim.) Mattf.

植物名 黑蕊无心菜《西藏药志》

功效 全草:利湿,消炎,消肿。用于腹水。

#### 7053011

*Arenaria napuligera* Franch.

植物名 小块根无心菜《云南种录》

药材名 滇藏无心菜《迪庆藏药》

文献名 “丘拉扑”(藏名)《迪庆藏药》

功效 全草:消食,解毒。用于消化不良,肉食中毒。

#### 7053012

*Arenaria petiolata* Hayata

植物名 具柄无心菜《高植图鉴补编》

文献名 台湾蚤缀《台湾药植志》

功效 叶:外用于肿毒。

#### 7053013

*Arenaria przewalskii* Maxim.

植物名 西北蚤缀《高植图鉴》

药材名 福祿草《高植图鉴补编》

文献名 高原蚤缀《青藏药图》

地方名 青海:“都子冈先”(藏名)。

功效 全草:清热润肺。用于肺结核,肺炎。

#### 7053014

*Arenaria serpyllifolia* L.

植物名 无心菜《高植图鉴补编》

药材名 小无心菜《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 离隔草《本草拾遗》

地方名 雀儿蛋(陕西、四川),铃铃草(湖南、云南),大叶米栖草(浙江、湖南),〔鹅不食〕(江苏、广西、云南),〔鹅不食草〕(山东、浙江、湖南、贵州),蚤缀(陕西、山东、浙江、湖北、湖南、贵州、云南),〔谷精草〕(陕西、甘肃、河南);陕西:星子草(石泉),鹅肠子草(蓝田),蚂蚁草(太白),灯笼草(宁陕),鸡肠子草;山东:冷柱子(昆崙山),雀抖撇(崂山),米婆菜(牙山);浙江:白莲子草(泰顺);湖北:毛鹅耳肠(神农架);广东:鱼肠菜,雀枝菜;贵州:蘼药,金顶珠,红孩儿。

功效 全草:有毒。清热,明目。止咳。用于肺结核,急性结膜炎,麦粒肿,咽喉痛,蛇咬伤。

#### 7053015

*Arenaria tapanshanensis* Tsui

植物名 大板山蚤缀《青藏药图》

地方名 青海:“贝治牙扎”(藏名)。

功效 全草:清热,利湿,消炎,消肿。用于腹水。

#### 7053016

*Brachystemma calycinum* D. Don

植物名 短瓣花《高植图鉴》

药材名 短瓣花《汇编》

文献名 白牛膝、太极草、狗寻子、狗褥子、狗夺子《滇南本草》,藤牛膝《品种论述》,短瓣石竹《广西植录》

地方名 广西:〔上牛夕〕,〔土牛膝〕(那坡),小儿新先、钟仁局(田林),扣人荡、生烟叶(龙州),抽筋草,松筋藤;云南:〔牛膝〕,短瓣藤,藤牛夕。

功效 带根全草:清热解毒,舒筋活络;根:用于白喉,风湿痹痛,跌打损伤,月经不调,病后虚弱;茎、叶:外用于手足痉挛,骨折。

#### 7053017

*Cerastium arvense* L.

植物名 卷耳《高植图鉴》

文献名 田野卷耳《东检》

地方名 青海:“欧斗”(藏名)。

功效 全草:滋阴补阳。

#### 7053018

*Cerastium caespitosum* Gilib.

植物名 簇生卷耳《高植图鉴》

地方名 浙江:高脚鼠耳草、婆婆指甲草(临安),破花繁草(绍兴);四川:鹅秧菜(峨眉山);云南:小白棉参、小儿惊风药(玉龙山)。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于感冒,乳痈初起,疔疽肿痛。

#### 7053019

*Cerastium glomeratum* Thuill. --- *Cerastium viscosum* L.

植物名 球序卷耳《高植图鉴补编》

药材名 婆婆指甲菜《救荒本草》、《中药大辞典》

文献名 瓜子草《名实图考》,粘毛卷耳《汇编》,圆序卷耳《西藏植志》

地方名 浙江:高脚鼠耳草;湖北:鹅耳肠草(神农架);湖南:山马齿苋,天青地白,铺地黄,岩马齿苋,卷耳;四川:大鹅儿肠,大鹅秧菜。

功效 全草:清热,解表,降压,解毒。用于感冒发热,高血压病。外用于乳腺炎,疔疮。

#### 7053020

*Cerastium wilsonii* Takeda

植物名 鄂西卷耳《高植图鉴补编》

地方名 湖北:大鹅耳肠(鹤峰)。

功效 叶:清热泻火。用于火疮。

#### 7053021

*Cucubalus baccifer* L.

植物名 狗筋蔓《高植图鉴》

药材名 狗筋蔓《救荒本草》、《汇编》

文献名 小九牯牛《滇南本草》

地方名 抽筋草(四川、贵州),九股牛(广西、云南),白牛膝(云南、湖北);陕西:接筋草(宁强);甘肃:鸡肠

子草(文县);湖北:大鹅儿肠(鹤峰),舒筋草、石灰草、缩筋草(神农架);湖南:和筋草(永顺);广西:白牛七、抽筋菜;四川:土参须子(万县),铁栏杆、筋骨草、催筋草;贵州:大种鹅儿肠(贵阳),大抽筋草,大老鸹草;云南:[王不留行]、被单草(丽江),九股牛藤(临沧),长深根(临沧、文山),水筋骨(曲靖),称筋散(思茅),白牛夕(保山),高果果乌(红河),“白莫则”(哈尼语),小九股牛、小九古牛(昆明),土条参,小被单草,大被单草,大鹅肠菜。

**功效** 根:接骨生肌,散瘀止痛,祛风除湿,利尿消肿。用于骨折,跌打损伤,风湿关节痛,小儿疳积,肾炎水肿,泌尿系感染,肺结核。外用用于疮疡疖肿,淋巴结结核。

## 7053022

*Cucubalus baccifer* L. var. *japonicus* Miq.

植物名 日本狗筋蔓《中药大辞典》

药材名 和筋草《湖南药物志》

文献名 [王不留行]、剪金花《朝鲜植汇》,华东狗筋蔓《药植简编》

地方名 湖南:大鸡肠草(古丈),鹅儿肠(凤凰);贵州:大种鹅儿肠,鸡参,抽筋草。

**功效** 全草:利大,小肠。用于呕吐,小便闭,风寒气痛,跌打损伤。

## 7053023

*Dianthus antifolia* Fisch.

植物名 线叶瞿麦(汇编)

文献名 线形瞿麦《药植简编》

地方名 甘肃:瞿麦。

**功效** 地上部分:清热利尿,活血。

## 7053024

*Dianthus barbatus* L. var. *asiaticus* Nakai

植物名 头石竹《长白山植志》

地方名 吉林:瞿麦(长白山);湖北:红菊花(恩施)。

**功效** 全草:清热利尿,活血。

## 7053025

*Dianthus caryophyllus* L.

植物名 麝香石竹《高植图鉴补编》

药材名 大花石竹《广西植录》

文献名 长生草《本草新注》,和兰石竹《种分》,香石竹《中国植物图鉴》,狮头石竹《云南种录》,红茂草《台湾药植志》

地方名 康乃馨(山东、江苏);云南:洋丁香。

**功效** 全草:用于痢疽疮肿。

## 7053026

*Dianthus chinensis* L. --- *D. amurensis* Jacq.

植物名 石竹《高植图鉴》

药材名 瞿麦《本经》、《药典》

文献名 鹅毛石竹、绣竹《洛阳花木记》,洛阳花《纲目》,藟麦、石菊《秘传花镜》,中国石竹《中国植物图鉴》,黑水石竹《东北药植志》,东北石竹《高植图鉴》,野麦、竹节草《简明中医辞典》,瞿麦穗《常用中药名辨》

地方名 巨麦、石柱花(东北),石竹子花(东北、河

北、内蒙古、山东),石竹子(东北、安徽),十样锦(山东、安徽);吉林:“排冷伊高楼”(朝名),石柱花;北京:十样锦子花,石竹梅;河北:石竹草,十样景花;内蒙古:“刀牛克”、“枚刀克”、“巴沙卡”、“巴希卡-其格”(蒙名);陕西:山石竹,野石竹,〔银柴胡〕〔镇坪〕,红接骨丹(柞水);甘肃:竹子花,石板花;山东:山竹(莱阳),山竹子、山茶叶、山石竹子、石帚花(烟台),石竹花,石竹茶;安徽:闹羊舟,白花石竹(黄山);台湾:剪绒花,瞿麦子;广西:洋丁香,青水红(北流);四川:竹叶梅(峨眉山)。

**功效** 地上部分:利尿通淋,破血通经 用于热淋,血淋,石淋,小便不通,淋沥涩痛,月经闭止。

## 7053027

*Dianthus chinensis* L. var. *morii* (Nakai) Y. C. Chu

植物名 高山石竹《长白山植志》

地方名 吉林:瞿麦(长白山)。

**功效** 全草、根:清热利尿,活血。

## 7053028

*Dianthus chinensis* L. f. *ignescens* (Nakai) Kitag. ---

*Dianthus chinensis* L. var. *ignescens* Nakai

植物名 火红石竹《东北草本植志》

药材名 火红石竹《东北药用植物》

**功效** 带花全草:清热,消炎,利尿,活血,破血通经。用于泌尿系感染,结石,小便不利,尿血,水肿,淋病,月经不调,闭经,妇女外阴瘙痒或糜烂,皮肤湿疹,浸淫疮毒,目赤障翳,痈肿;根:用于肿瘤。

## 7053029

*Dianthus chinensis* L. var. *liaotungensis* Y. C. Chu

植物名 长萼石竹《东北草本植志》

药材名 长萼石竹《东北药用植物》

**功效** 带花全草:清热,消炎,利尿,活血,破血通经。用于泌尿系感染,结石,小便不利,尿血,水肿,淋病,月经不调,闭经,妇女上阴瘙痒或糜烂,皮肤湿疹,浸淫疮毒,目赤障翳,痈肿;根:用于肿瘤。

## 7053030

*Dianthus chinensis* L. var. *longisquama* Nakai et Kitag.

植物名 长苞石竹《东北草本植志》

药材名 长苞石竹《东北药用植物》

**功效** 带花全草:清热,消炎,利尿,活血,破血通经。用于泌尿系感染,结石,小便不利,尿血,水肿,淋病,月经不调,闭经,妇女外阴瘙痒或糜烂,皮肤湿疹,浸淫疮毒,目赤障翳,痈肿;根:用于肿瘤。

## 7053030a

*Dianthus japonicus* Thunb.

植物名 两面青《新华本草纲要》

**功效** 全株:用于跌打,毒疮等。

## 7053031

*Dianthus longicalyx* Miq. --- *D. superbus* L. var. *longicalycinus* (Maxim.) Willms --- *D. superbus* L. var. *oreadum* (Hance) Pamp.

植物名 长萼瞿麦《高植图鉴补编》

药材名 野瞿麦草《神农架药录》

文献名 瞿麦、巨麦《满洲植录》,长萼石竹《湖北植

志)

地方名 江苏:巨麦草(苏州),石竹(铜山),野麦(清江);湖北:野瞿麦(神农架)。

功效 全草:清热利尿。

#### 7053032

*Dianthus orientalis* Adams

植物名 缝裂石竹《高植图鉴补编》

文献名 东方石竹《汇编》

地方名 宁夏:瞿麦。

功效 地上部分:清热利尿,活血。

#### 7053033

*Dianthus subulifolius* Kitag.

植物名 丝叶石竹《吉野》

文献名 蒙古石竹《药植简编》

地方名 锥石竹、瞿麦、巨麦(东北)。

功效 地上部分:清热利尿,活血。

#### 7053034

*Dianthus superbus* L.

植物名 瞿麦《高植图鉴》

药材名 瞿麦《本经》、《药典》

文献名 大菊、蓬麦《尔雅》,巨句麦《本经》,大兰《别录》,地面《齐民要术》,山瞿麦《千金方》,南天竺草《圣济总录》,麦句姜《纲目》,剪绒花《医林纂要》,龙须、四时美、杜老草子、圣龙草子《新纲》,瞿麦子《台湾药植志》,瞿麦德《鉴别手册》

地方名 野麦(江苏、湖北),石竹子花(山东、安徽),竹节草(山东、福建);河北:剪刀花,碟子花,木碟花,剪红纱花;陕西:接骨丹(柞水),麦禾七(太白);甘肃:稠子花(文县);青海:石竹儿;山东:山竹(莱阳),山竹子、山茶叶、山石竹子、石帚花(烟台);江苏:大石竹(新海连),巨麦(镇江),巨麦草(苏州),石柱花(徐州),鬼麦(淮阴);安徽:石竹草,五彩石竹;福建:白石竹(光泽);湖北:淋症草;湖南:竹节器,金银子;四川:“亚格玛”(藏名),竹叶梅(峨眉山);贵州:竹节梅;其他:大碟花。

功效 地上部分:利水通淋,破血通经。用于热淋,血淋,石淋,小便不通,淋漓涩痛,月经闭止。

#### 7053035

*Dianthus superbus* L. var. *speciosus* Reichenb.

植物名 高山瞿麦《长白山植药志》

地方名 吉林:瞿麦(长白山)。

功效 地上部分:清热利尿,活血。

#### 7053036

*Dianthus versicolor* Fisch.

植物名 兴安石竹《内蒙古中草药》

文献名 北石竹《药植简编》

地方名 瞿麦(东北)。

功效 地上部分:清热利尿,活血。

#### 7053037

*Dianthus versicolor* Fisch. ex Link var. *subulifolius* (Kitag.) Y. C. Chu

植物名 蒙古石竹《长白山植药志》

地方名 吉林:瞿麦(长白山)。

功效 全草:根:清热利尿,活血。

#### 7053038

*Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Roem. et Schult.

植物名 荷莲豆草《高植图鉴》

药材名 对叶莲(台湾)

文献名 青芳草《台湾药植志》,水蓝青、水冰片、穿线蛇《高植图鉴》

地方名 台湾:河乳豆草,乳豆草;广西:串莲草(隆林),水荷兰(桂平);四川:粉丹草,惊悸藤(峨眉山);贵州:团叶鹅儿肠,地花生,痞子药;云南:月亮草(腾冲),野豌豆草。

功效 全草:清热解毒,利尿通便,活血消肿。用于慢性肾炎,小儿疳积,肝炎,痢疾肿毒。

#### 7053039

*Drymaria diandra* Blume --- *D. cordata* auct. non (L.) Willd.

植物名 二蕊荷莲豆《云南种录》

药材名 荷莲豆草《汇编》

地方名 荷莲豆(广东、广西、四川、云南),野豌豆(广西、四川);福建:月光草(永春),十二时草(安溪),田日星(平和),金玉藤(仙游),倒藤匙(泉州),龙兰草,龙鳞草,白疔草,过路蜈蚣,金线春,野灵藤;广东:水青草,青蛇仔;海南:有米菜;广西:串钱草(玉林、北流),川莲草(贵县),必草(北流),水荷兰(贵县、平南),水荷兰豆根(桂平),牛筋藤(龙州),扣子草(乐业),水天珠,水青蛇、野雪豆、倒水莲(惠阳),水流冰(南宁、梧州),荷兰草(藤县),青钱草、假牙兰(平南),虎眼草、钻地风(德保),眼镜草;四川:对节草(米易),小白藤(西昌),粉丹草;贵州:痞子药(兴义),地花生,团叶鹅儿肠,痞子草;云南:“沙腊”(西双版纳傣名),百花龙胆草(文山),苦桃花、哈煮马哈、野豌豆尖、野豌豆草(红河)。

功效 全草:清热解毒,利尿通便,活血消肿,退翳。全草鲜品捣烂外敷治疣。

备考 过去文献常将本品误订为 *Drymaria cordata* (L.) Willd.

#### 7053040

*Gypsophila acutifolia* Fisch.

植物名 石头花《高植图鉴补编》

药材名 黑皮银柴胡(内蒙古)

文献名 尖叶丝石竹《内蒙古中草药》,狭叶丝石竹、黄接骨丹《陕西中草药》,尖叶霞草、山马菜《中药大辞典》,尖叶石头花《沙漠植志》

地方名 黑柴胡、〔银柴胡〕(内蒙古、山西、陕西、甘肃);内蒙古:香菜花;陕西:石栏菜、〔过路黄〕、山银柴胡(商县)。

功效 根:清虚热,凉血。

#### 7053041

*Gypsophila acutifolia* Fisch. var. *chinensis* Regel

植物名 中华尖叶丝石竹《品种论述》

地方名 河北:〔银柴胡〕。

功效 根:清虚热,凉血。

## 7053042

*Gypsophila acutifolia* Fisch. var. *gmelini* Regel --- *G. gmelini* Bunge

植物名 光梗丝石竹《青藏药图》

药材名 山银柴胡《品种论述》

文献名 光梗尖叶丝石竹《品种论述》

地方名 河北:〔银柴胡〕(张家口);陕西:白柴胡;青海:“苏巴达息”(藏名)。

功效 全草:止咳,化痰。用于咳嗽,耳聋等病。

## 7053043

*Gypsophila davurica* Turcz. ex Fenzl

植物名 草原石头花《高植图鉴补编》

药材名 山银柴胡《品种论述》

文献名 兴安银柴胡《东检》,兴安丝石竹《汇编》,北丝石竹、达乌里丝石竹、草原霞草《沙漠药植》

地方名 马尾草(东北);黑龙江:兴安石头花,肥皂草,黑龙江商陆,〔商陆〕;辽宁:〔银柴胡〕(凌源),山扫帚菜、山蚂蚱菜(海城);内蒙古:“兴安乃·哲格任·陶鲁钙”(蒙名)。

功效 根:逐水,利尿。用于水肿胀满,胸胁满闷,小便不利。

## 7053044

*Gypsophila licentiana* Hand. -Mazz.

植物名 窄叶丝石竹《中药志》

药材名 黑皮银柴胡(甘肃)、《品种论述》

文献名 尖叶丝石竹《汇编》,条叶丝石竹《品种论述》

地方名 甘肃:〔银柴胡〕,石柱花根,驴干粮;宁夏:山银柴胡,〔柴胡〕。

功效 根:清热凉血。

## 7053045

*Gypsophila oldhamiana* Miq.

植物名 长蕊石头花《高植图鉴补编》

药材名 山银柴胡《品种论述》

文献名 欧石头花《东检》,宽叶丝石竹《汇编》,霞草《秦岭植志》

地方名 〔银柴胡〕(辽宁、山东、安徽、河南),丝石竹(山东、江苏、安徽),〔商陆〕(辽宁、内蒙古、山西、河北);陕西:黄接骨丹(柞水);山东:山蚂蚱,山蚂蚱菜,蚂蚱菜(沂水、沂源),兔子自音,〔桔梗〕;江苏:山麻茶(灌云),山马菜(连云港);河南:银胡;湖北:黄孝商陆(黄冈、孝感),山马齿苋(大悟)。

功效 根:清虚热,凉血。用于阴虚潮热,久疟,小儿疳积。

## 7053046

*Gypsophila pacifica* Kom.

植物名 大叶石头花《高植图鉴补编》

药材名 山银柴胡《品种论述》

文献名 细梗丝石竹《东北植药图志》,细梗石头花、假商陆《药植简编》

地方名 商陆(东北、华北、河南);吉林:石头花,蚂蚱菜,山蚂蚱菜,山雀蓝;辽宁:〔银柴胡〕(大连、营口)。

功效 根:逐水,利尿。

## 7053047

*Gypsophila paniculata* L.

植物名 圆锥石头花《高植图鉴补编》

药材名 山银柴胡《品种论述》

文献名 线形粗麦《中国植物图鉴》,小米抚子《牧野口图》,锥花丝石子《华北经植志要》,圆叶丝石竹《鉴别手册》,锥花丝石竹《汇编》,锥花霞草《江苏植志》,丝石竹《沙漠药植》

地方名 〔满天星〕(华北),〔商陆〕(东北);新疆:〔银柴胡〕,“阿克波则坦”(维名)。

功效 根:清虚热,凉血。用于肺结核潮热。

## 7053048

*Lepyroclis holosteoides* (C. A. Mey.) Fenzl ex Fisch. et Mey.

植物名 薄蒴草《西藏植志》

地方名 青海:娘娘菜,“象治尔保”(藏名)

功效 全草:利肺,托疮。用于肺病及痈疽疔疮。

## 7053049

*Lychnis coganta* Maxim.

植物名 浅裂剪秋罗《高植图鉴》

文献名 毛缘剪秋罗《宽甸药植普查》

功效 带根全草:用于发汗,生津;根:清热止痛,止泻。

## 7053050

*Lychnis coronata* Thunb.

植物名 剪夏罗《高植图鉴》

药材名 剪夏罗《浙江天目药志》

文献名 剪红罗《证治要诀》,剪春罗《纲目》,碎剪罗《秘传花镜》,剪金花、雄黄花《名实图考》

地方名 浙江:山茶田、山药田(天台),阔叶鲤鱼胆(临安);湖北:金钱花(五峰);湖南:小七。

功效 全草、根:解热,镇痛,消炎,止泻。用于感冒,关节炎,腹泻。外用于带状疱疹。

## 7053051

*Lychnis fulgens* Fisch.

植物名 大花剪秋罗《高植图鉴》

文献名 仙翁花《药物试植报告》

地方名 贵州:小尖叶参。

功效 带根全草:用于发汗,生津,小儿疳积,失眠。

## 7053052

*Lychnis miqueliana* Rohrb.

植物名 全缘剪秋罗《品种论述》

文献名 女娄菜剪秋罗《鉴别手册》,〔山银柴胡〕《品种论述》

地方名 〔银柴胡〕(陕西、甘肃);陕西:白柴胡(山阳)。

备考 根:在甘肃和陕西部分地区误作银柴胡入药,应注意鉴别。

## 7053053

*Lychnis senno* Sieb. et Zucc.



植物名 剪秋罗《高植图鉴》

药材名 剪秋罗《汇编》

文献名 剪红纱花《纲目》，汉宫秋、[地黄连]《群芳谱》，剪秋纱《花镜》

地方名 四川：散血沙；安徽：水龙胆；湖北：[龙胆草]（兴山），假龙胆（神农架）；湖南：甜胆草，甜龙胆；其他：鞠翠花。

功效 全草及根：清热，止痛止泻。用于感冒，风湿性关节炎，腹泻。外用于带状疱疹。

#### 7053054

*Lychnis wilfordii* (Regel) Maxim.

植物名 丝瓣剪秋罗《高植图鉴补编》

功效 带根全草：用于发汗，生津。

#### 7053055

*Melandrium apetalum* (L.) Fenzl

植物名 无瓣女娄菜《云南种录》

药材名 无瓣女娄菜《迪庆藏药》

功效 根：泻下。

#### 7053056

*Myosoton aquaticum* Moench. --- *Malachium aquaticum* (L.) Fries --- *Stellaria aquatica* (L.) Scop.

植物名 牛繁缕《高植图鉴》

药材名 牛繁缕《汇编》

文献名 鹅肠菜《纲目》

地方名 鹅儿肠（台湾、广西、湖北、云南），鹅肠草（陕西、甘肃），鸡卵菜（陕西、甘肃）；辽宁：水鹅肠菜（宽甸）；陕西：壮筋丹；甘肃：石灰菜；浙江：白头娘草（余姚、鄞县），鸡娘草（逐昌、黄岩）；台湾：[鸡肠草]，[茶匙痲]；湖北：鹅肥菜；贵州：石灰草；云南：抽筋草（昆明），伸筋藤（思茅）。

功效 全草：清热凉血，消肿止痛，消积通乳。用于小儿疳积，牙痛，痢疾，痔疮，肿毒，乳腺炎，乳汁不通。外用于疮疖。

#### 7053057

*Polycarpaea corymbosa* (L.) Lam.

植物名 白鼓钉《高植图鉴》

药材名 星色草《汇编》

文献名 白花草、白灯鼓《药学报》

地方名 [白头翁]（福建、台湾、广东）；福建：辛苦草、过饥草（泉州），蚌仔草（龙溪），疳积草（厦门）；广东：广白头翁、满天星、声色草（广州）；海南：满天星草。

功效 全草：清热解毒，除湿利尿。用于急性细菌性痢疾，肠炎，实证腹水，消化不良。

#### 7053058

*Polycarpon indicum* (Retz.) Merr.

植物名 多莢草《高植图鉴》

地方名 云南：“多烈瓦”（西双版纳傣语）。

功效 全草：有毒。用于牛皮癬，麻瘋。

#### 7053059

*Psammosilene tunicoides* W. C. Wu et C. Y. Wu

植物名 金铁锁《高植图鉴》

药材名 金铁锁《滇南本草》、《汇编》

文献名 昆明沙参《名实图考》，[沙参]《高植图鉴》，麻参《云南中草药》

地方名 独丁子（四川、云南）；四川：小马桑，巴地蜈蚣（木里）；贵州：独钉子；云南：独定子（昆明），对叶七（丽江），白马分鬃（保山），夜翻草、独根、白暗消、小麻药、独脚暗消（红河），金丝矮陀陀（昆明、红河），土人参，夷方草，蜈蚣七，独鹿角姜，百步穿扬，穿石甲，爬地蜈蚣，异翻叶，铃儿草根、象牙七（玉龙山）。

功效 根：有毒。祛风活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，风湿疼痛，胃痛。外用于创伤出血。

#### 7053060

*Pseudostellaria heterophylla* (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm. --- *Krascheninnikovia heterophylla* Miq. --- *K. raphanorrhiza* (Hemsl.) Kryn.

植物名 孩儿参《饮片新参》、《高植图鉴》

药材名 太子参《本草从新》、《药典》

文献名 异叶假繁缕《高植图鉴》，对批七《汇编》

地方名 童参（山东、上海、安徽）；陕西：异叶孩儿参；山东：四叶参，四叶菜；湖北：米参。

功效 块根：益气健脾，生津润肺。用于脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，气阴不足，自汗口渴，肺燥干咳。

备考 太子参《本草从新》、《纲目拾遗》收载之，但所指为辽参之小者，与本品不同。

#### 7053061

*Pseudostellaria heterophylla* Pax ex Pax et Hoffm. f. *holopetala* Kitag.

植物名 全瓣孩儿参《东北药植志》

功效 块根：益气健脾，生津润肺。

#### 7053062

*Pseudostellaria heterophylla* Pax ex Pax et Hoffm. var. *stenopetala* Kitag.

植物名 辽宁孩儿参《东北药植志》

功效 块根：益气健脾，生津润肺。

#### 7053063

*Pseudostellaria maximowicziana* (Franch. et Sav.) Pax

植物名 矮小孩儿参《高植图鉴补编》

文献名 假繁缕《高植图鉴》，孩儿参《陕西中草药》

地方名 陕西：棒棒草（华山）。

功效 块根：益气健脾，生津润肺。用于肺虚咳嗽，脾虚泄泻，小儿出虚汗，心悸，口干等。

#### 7053064

*Pseudostellaria sylvatica* (Maxim.) Pax --- *Krascheninnikovia sylvatica* Maxim.

植物名 狭叶孩儿参《高植图鉴补编》

文献名 林生孩儿参《秦岭植志》，细叶孩儿参《云南种录》，狭叶假繁缕《高植图鉴》，窄叶太子参《西藏植志》，森林假繁缕《宽甸药植普查》

地方名 陕西：疙瘩七（太白山）。

功效 块根：益气健脾，生津润肺。

#### 7053065

*Sagina japonica* (Sweet) Ohwi

植物名 漆姑草《高植图鉴》

药材名 漆姑草《本草拾遗》、《汇编》

文献名 漆姑《本草经集注》、瓜槌草、牛毛粘《名实图考》、星秀草《汇编》

地方名 蛇牙草(江苏、湖北、湖南)、地松毛(福建、四川)、地松(江西、贵州);江苏:猪毛草(如东);浙江:小叶米米西草(临安)、地兰(温州)、胎乌草(泰顺)、退瘀草;安徽:风米菜;江西:鼻药;福建:小粉干草(宁化)、湿水草(莆田)、双叶珠(永春)、水佛手(泉州);广西:踏地草(全州);湖北:大爪草(兴山)、虎爪草(鹤峰)、虎牙草;四川:针包草(峨眉山)、羊儿草(南川)、小红娘、漫水草、三不跳;贵州:大龙叶、鼯鼻药;云南:羊毛草(昭通)、[鹅不食草](玉龙山)。

功效 全草:散结消肿,解毒止痒。用于白血病,漆疮,痈肿,淋巴结核,龋齿痛。

#### 7053066

*Sagina japonica* (Sweet) Ohwi var. *parviflora* (Burrill) Dary C. Y. Wu

植物名 小花漆姑草《药植简编》

药材名 小花漆姑草《药植简编》

文献名 珍珠草《滇南本草》、瓜槌草、牛毛粘《名实图考》

地方名 云南:星秀草(曲靖)、羊毛草(昭通)、星色草、肉肉草、漆姑草(红河)、凉风草、萝卜湿草、[鹅不食草]。

功效 全草:清热解毒,利水。

#### 7053066a

*Sagina saginoides* (L.) Karsten

植物名 珍珠草《滇南本草》、《新华本草纲要》

地方名 云南:星秀草、羊毛草、萝卜湿草。

功效 全草:用于面寒痛。

#### 7053067

*Saponaria officinalis* L.

植物名 肥皂草《高植图鉴补编》

文献名 石碱花《科种》

地方名 [王不留行](东北);台湾:石碱草。

功效 根:有毒。祛瘀,利尿。用于梅毒,慢性皮肤病。

#### 7053068

*Silene adenantha* Franch. --- *Melandrium adenantherum* (Franch.) Hand. - Mazz.

植物名 腺花女娄菜《云南种录》

地方名 云南:老鸹筋(彝良)、黑牵牛(镇雄)。

功效 根:用于疮疖。

#### 7053069

*Silene aprica* Turcz. ex Fisch. et Mey. --- *Melandrium apricum* (Turcz.) Rohrb.

植物名 女娄菜《高植图鉴》

药材名 女娄菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 河中府王不留行《证类本草》、桃色女娄菜《东检》、毛叶女娄菜《陕甘宁植志》、山银柴胡《鉴别手册》、女娄菜《浙江药植志》

地方名 对叶草(贵州、云南)、[银柴胡](陕西、甘肃);北京:王不留行;内蒙古:“黄浩-乌布斯”、“拔色嘎-嘎勒”(蒙名);甘肃:苍蝇花(武都);青海:“下泡子”(藏名);山东:大米罐(昆崙山);浙江:大叶金石榴(临安);福建:山牡丹、真珠红、真珠痕(厦门);贵州:罐罐花、罐罐草、对叶菜;云南:[野罂粟](昆明);其他:剪金花、金盏银台子。

功效 全草:健脾,利尿,通乳。用于乳汁少,体虚,浮肿,小儿疳积。

#### 7053070

*Silene conoidea* L.

植物名 麦瓶草《高植图鉴补编》

药材名 麦瓶草《汇编》

文献名 净瓶《名实图考》、麦瓶花《鉴别手册》、米瓦罐《高植图鉴》

地方名 [天仙子](河北、陕西);陕西:梅花瓶、麦瓶(石泉)、麦瓶子(蓝田)、麦黄菜(宁陕);江苏:灯笼草;河南:广皮菜、羊蹄棵、红不英菜、面页菜、面条菜、面条棵、胡炳菜、麦石榴、捞饭棵、甜甜菜、瓢嘴;湖北:灯笼泡(宜昌)、瓶罐草(神农架);四川:香炉草。

功效 全草:清热凉血,止血调经。用于鼻衄,吐血,尿血,肺脓疡,月经不调。

#### 7053071

*Silene delavayi* Franch. --- *Melandrium delavayi* (Franch.) Hand. - Mazz.

植物名 西南蝇子草(拟)

药材名 凉三七《云南中草药》

文献名 西南女娄菜《西藏植志》、洱源上桔梗《云南种录》、[路党参]《玉龙山药植》

地方名 云南:[桔梗](保山、大理)。

功效 根:解热止痛。用于感冒,跌打损伤。

#### 7053072

*Silene firma* Sieb. et Zucc. --- *Melandrium firmum* (Sieb. et Zucc.) Rohrb.

植物名 粗壮女娄菜《高植图鉴补编》

文献名 硬叶女娄菜《浙江天目药志》、坚硬女娄菜《中药大辞典》、砂女娄菜《品种论述》、萨摩人参《牧野日图》

地方名 王不留、王牡牛(华东);陕西:[山银柴胡];浙江:大叶金石榴;湖北:[银柴胡](五峰)、白柴胡(神农架);四川:“夷巴”(藏名)、女娄菜(若尔盖)。

功效 全草:催乳,调经,清热解毒,除湿利尿。用于咽喉肿痛,中耳炎。

#### 7053073

*Silene fortunei* Vis.

植物名 蝇子草《高植图鉴》

药材名 蝇子草《汇编》

文献名 鹤草、洒线花《名实图考》、古绵草《植物名汇》、山银柴胡《鉴别手册》

地方名 [银柴胡](陕西、甘肃、安徽、湖北、广西)、野蚊子草(江苏、浙江、安徽、广西)、苍蝇花(陕西、安徽、广西);河北:粘苍蝇花;陕西:蚊子草、土桔梗(眉

县),白接骨丹(柞水),柴胡(安康地区),粘蝇草;江苏:脱力草(吴县);浙江:水白参,蛇王草,绿杨青,小叶鲤鱼胆,白花壶瓶,银壶瓶(东阳、嵊县、绍兴、宁波、象山),瞿麦沙参(嵊县),八月白、白瞿麦(衢县),白花瞿麦、小仙桃草、白葫芦(宁波),土党参、土瞿麦(温州、乐清、平阳),土沙参(永嘉、乐清、泰顺、洞头),白沙参(乐清、泰顺);安徽:消浮参,消浮草,白花石竹,瘰癧根;台湾:白瞿麦,旧麦;湖北:白柴胡(郧西),羽毛石竹(均县),一枝花、金柴胡(神农架)。

功效 带根全草及根:清热利湿,解毒消肿。用于痢疾,肠炎。外用于蝎蛇咬伤,扭挫伤,关节肌肉酸痛;种子:用于避孕。

## 7053074

*Silene jensisensis* Willd. --- *S. tenuis* Willd. var. *jensisensis* Rohrb.

植物名 旱麦瓶草(汇编)

药材名 山银柴胡(汇编)

文献名 山蚂蚱(高植图鉴补编),麦瓶草(东检)

地方名 黄柴胡(山东、山西),〔银柴胡〕(吉林、河北、山东、江苏、上海、河南、广西、贵州);内蒙古:山蚂蚱草,“希日苏古恩乃-其黑”(蒙名);山东:铁柴胡,山菜根,山马踏菜,山蚂蚱菜;四川:“缘梳”(若尔盖藏名)。

功效 根:用于阴虚劳症,潮热,骨蒸,盗汗。

备考 宁夏发现本品大量掺伪于柴胡之中(高达40%)。

## 7053075

*Silene jensisensis* Willd. var. *oliganthella* (Nakai ex Kitag.) Y. C. Chu

植物名 长白旱麦瓶草(长白山植志)

功效 根:用于阴虚劳症,潮热,骨蒸,盗汗。

## 7053076

*Silene jensisensis* Willd. f. *dasyphylla* (Turcz.) Schischk. --- *S. jensisensis* Willd. var. *dasyphylla* (Turcz.) Kitag.

植物名 薄毛旱麦瓶草(东北草本植志)

药材名 薄毛旱麦瓶草(东北药用植物)

功效 根:清热,凉血,生津。用于阴虚劳症,潮热,烦温,骨蒸,盗汗,小儿疳积,肝炎。

## 7053077

*Silene jensisensis* Willd. f. *parviflora* (Turcz.) Schischk.

植物名 小花旱麦瓶草(东北草本植志)

药材名 小花旱麦瓶草(东北药用植物)

功效 根:清热,凉血,生津。用于阴虚劳症,潮热,烦温,骨蒸,盗汗,小儿疳积,肝炎。

## 7053078

*Silene jensisensis* Willd. f. *setifolia* (Turcz.) Schischk.

植物名 丝叶旱麦瓶草(东北草本植志)

药材名 丝叶山银柴胡(拟)

地方名 银柴胡(辽宁、河北、内蒙古、山东)。

功效 根:清热,凉血,生津。用于阴虚劳症,潮热,烦温,骨蒸,盗汗,小儿疳积,肝炎。

备考 在辽西、内蒙古、河北、山东等省区曾以根当“银柴胡”使用,属“山银柴胡”之类,品质次于银柴胡。

## 7053079

*Silene jensisensis* Willd. var. *viscifera* Y. C. Chu

植物名 兴安旱麦瓶草(东北草本植志)

药材名 兴安山银柴胡(拟)

地方名 银柴胡(辽宁、河北、内蒙古、山东)。

功效 根:清热,凉血,生津。用于阴虚劳症,潮热,烦温,骨蒸,盗汗,小儿疳积,肝炎。

备考 在辽西、内蒙古、河北、山东等省区曾以根当“银柴胡”使用,属“山银柴胡”之类,品质次于银柴胡。

## 7053080

*Silene lankongensis* Franch. --- *Melandrium lankongense* (Franch.) Hand. -Mazz.

植物名 洱源蝇子草(高植图鉴补编)

药材名 洱源瓦草(云南种录)

地方名 云南:滇白前,大白七,九股牛,母金铁锁,拖倒甌,白前(昆明),〔金铁锁〕;其他:〔麻牛夕〕。

功效 根:清热止咳,消炎止痛。用于风热咳嗽,感冒,支气管炎,跌打损伤,疼痛,风湿痛,黄水疮,急性胃肠炎,外伤出血,牙痛。

## 7053081

*Silene macrostyla* Maxim.

植物名 长柱蝇子草(高植图鉴补编)

地方名 山西:〔银柴胡〕(五台山)。

功效 根:清热,凉血。

## 7053082

*Silene olgiana* B. Fedtsch.

植物名 沙生蝇子草(沙漠植志)

文献名 巴哈尔瓶子草(沙漠植志)

功效 根:清热凉血。

## 7053083

*Silene repens* Patr. --- *S. tenuis* var. *rubescens* Franch.

植物名 蔓茎蝇子草(高植图鉴补编)

药材名 山银柴胡(内蒙古)、〔品种论述〕

文献名 匍生蝇子草(高植图鉴),紫茎九头草(汇编),蔓麦瓶草(东检),蔓茎鹤草(秦岭植志),旱麦瓶、毛萼蝇子草(沙漠植志),大花蝇子草(云南种录),红苞纤维女娄菜(云南药录)

地方名 柴胡花(东北);内蒙古:“拔色嘎-纳克”、“哲乐图-苏古恩乃-其黑”(蒙名);陕西:葫芦草(陕北);青海:“下孢子”(藏名);云南:九头草,鸡舌草,瘤头参;其他:竹节防风。

功效 根:清热,利尿,通经。

## 7053084

*Silene rubicunda* Franch. --- *Melandrium rubicundum* (Franch.) Hand. -Mazz.

植物名 九子参(云南种录)

药材名 九子参(云南大理)

文献名 红女娄菜(汇编)

地方名 云南:滇西瞿麦,〔瞿麦〕(大理)。

功效 带花植株:利尿,通经。用于水肿,闭经。量大时易引起孕妇流产。

#### 7053085

*Silene songarica* (Fisch., Mey. et Ave-Lall.) Bocquet --- *Melandrium brachypetalum* (Horn.) Fenzl.

植物名 松花江蝇子草(拟)

文献名 兴安女娄菜《高原中草》,短瓣女娄菜《云南种录》,准噶尔蝇子草〔误译〕《高植图鉴补编》

地方名 四川:“麦巴”(若尔盖藏名)。

功效 全草:清热凉血,降压除湿,解毒退热。用于耳鸣黄痘,咽喉肿痛。

备考 按《植物学名解释》, *Songaricus* 意即“松花江流域的”(吉林、黑龙江), *Songoricus* 方译为“准噶尔的”(新疆),《高植图鉴补编》对此学名译称“准噶尔蝇子草”系误译,故本书改译为松花江蝇子草。

#### 7053086

*Silene szechuanensis* Williams --- *Melandrium viscidulum* (Franch.) F. N. Williams var. *szechuanense* (Williams) Hand. -Mazz.

植物名 滇白前《名实图考》、《云南种录》

药材名 瓦草《滇南本草》

文献名 〔白前〕《滇南本草》,青骨藤、四川粘毛女娄菜《汇编》,四川稍粘女娄菜《中草药学》,四川粘萼女娄菜《贵州植志》

地方名 四川:瓦片菜(峨眉山),瓦片草,虎尾参(会理);云南:金柴胡(丽江),大牛膝(恩茅),九大牛(红河),小九粘牛草,瓦草参。

功效 根:有小毒。镇痛,止血,清热,利尿。用于跌打损伤,风湿骨痛,胃腹疼痛,支气管炎,尿路感染。外用于外伤出血,疮疖肿毒。

备考 据《云南植物研究》9(1):27,1987载称,《滇南本草》之“瓦草”,学名应为 *S. viscidula* Franch. 本学名 *S. szechuanensis* Williams = *S. asclepiadea* Franch. 则是掌脉蝇子草而非瓦草。志此供进一步研究参考。

#### 7053087

*Silene tatarinowii* Regel --- *S. tatarinowii* Regel var. *albiflora* Franch. --- *Melandrium tatarinowii* (Regel) Tsui

植物名 石生蝇子草《高植图鉴补编》

文献名 白花紫萼女娄菜《湖北植志》,石生麦瓶草《东北草本植志》,紫萼女娄菜《秦岭植志》,山女娄菜《高植图鉴》

地方名 〔太子参〕(湖北、四川);北京:麦瓶草,蝇子草,脱骨草;河北:〔北沙参〕(承德);甘肃:连参;湖北:土洋参(利川),鹅耳七(巴东),〔孩儿参〕,米参、拉筋草(神农架)。

功效 根:补虚,益精,健胃肠。

备考 本品之根在不同地区已发现冒充党参、太子参和北沙参销售者,应注意鉴别。

#### 7053088

*Silene tenuis* Willd.

植物名 细蝇子草《高植图鉴补编》

药材名 九头草(云南)、《汇编》

文献名 〔银柴胡〕、细叶蝇子草《品种论述》,纤细鹤草《秦岭植志》

地方名 云南:〔瞿麦〕,黄金铁,马柴胡、金柴胡(玉龙山),细叶独根(路南),癞头参,小九股牛(昆明)。

功效 根、枝梢:清热,利尿,通经。用于小便不利,尿痛,尿血,闭经。

#### 7053089

*Silene viscidula* Franch. --- *Melandrium viscidulum* (Franch.) F. N. Williams --- *Silene bodinieri* Levl. --- *S. mairei* Levl.

植物名 粘萼蝇子草《高植图鉴补编》

药材名 粘毛瓦草《云南种录》

文献名 稍粘女娄菜《中草药学》,粘女娄菜《西藏植志》,粘萼女娄菜《贵州植志》,瓦草《云南植物研究》

地方名 云南:〔白前〕(曲靖),金柴胡(丽江),大牛膝(思茅)。

功效 根、全草:麻醉,消炎,止咳,利尿。用于肺热咳嗽,热淋,产后手术痛及子宫收缩痛,跌打损伤,风湿,刀伤,急性肠胃炎。

#### 7053090

*Stellaria anhweiensis* Migo

植物名 安徽繁缕《浙江药植志》

功效 全草:清热解毒,化瘀止痛,催乳;茎、叶:活血,祛瘀,下乳,催生。

#### 7053091

*Stellaria chinensis* Regel --- *S. hassiana* Loes.

植物名 中国繁缕《高植图鉴》

文献名 华繁缕《江苏植志》

地方名 湖北:鸦雀子窝(宜昌)。

功效 全草:清热解毒,化瘀止痛,催乳;茎、叶:活血,祛瘀,下乳,催生。

#### 7053092

*Stellaria delavayi* Franch.

植物名 大叶繁缕《云南种录》

文献名 西南繁缕《云南植物研究》

地方名 云南:〔青葙子〕。

功效 种子:祛雾,明目。用于眼病。

#### 7053093

*Stellaria dichotoma* L.

植物名 叉歧繁缕《高植图鉴》

文献名 叉繁缕《沙漠植志》

地方名 内蒙古:“图门-章给拉嘎”(蒙名)。

功效 根或全草:清热凉血。用于盗汗骨蒸,结核潮热,久疟发热。

#### 7053094

*Stellaria dichotoma* L. var. *lanceolata* Bunge --- *S. gypsophiloides* Fenzl

植物名 银柴胡《高植图鉴》

药材名 银柴胡《本草原始》、《药典》

文献名 银胡《本草求真》,沙参儿、土参《中药志》,丝石竹繁缕《药植简编》,披针叶繁缕《云南植物研究》,

狭叶歧繁缕《内蒙古中草药》,〔沙参〕《沙漠植志》

地方名 内蒙古:“卓勒格老”(乌审旗蒙名),白根子;陕西:牛肚根;山东:山菜根,山马踏菜根。

功效 根:清虚热,除痞热。用于阴虚发热,骨蒸劳热,小儿疳积。

#### 7053095

*Stellaria dichotoma* L. var. *linearis* Fenz

植物名 线叶叉繁缕《东北草本植志》

药材名 线叶银柴胡(拟)

功效 根:清热凉血。用于虚劳发热,阴虚久症,小儿疳积,消瘦发热,肝炎。

#### 7053096

*Stellaria diversiflora* Maxim.

植物名 泽繁缕《汇编》

功效 全草:清热解毒,化瘀止痛,催乳;茎、叶:活血,祛瘀,下乳,催生。

#### 7053097

*Stellaria florida* Fisch.

植物名 多花繁缕《品种论述》

地方名 湖北:〔白花蛇舌草〕(巴东)。

备考 本品为在采集中误认误采的混淆品,不能作白花蛇舌草用。

#### 7053098

*Stellaria henryi* Williams

植物名 湖北繁缕《湖北植志》

功效 种子:通水顺气,止喘。

#### 7053099

*Stellaria media* (L.) Cyr.

植物名 繁缕《高植图鉴》

药材名 繁缕《图经》、《汇编》

文献名 蕺、蕺菜《尔雅》,繁菱《别录》,滋草《千金·食治》,〔鸡肠草〕《唐本草》,鹅肠菜《滇南本草》,鹅儿肠菜、蕺菜《纲目》,鸡肝《和汉药物学》

地方名 鹅儿肠(四川、贵州),鹅肠草(浙江、湖南);江苏:鹅馄饨;浙江:小鸡草,鸡肚肠草(嘉善、衢县、开化),鱼肚肠草(桐乡);福建:鸡肠越(松溪、政和);湖北:鹅耳伸筋(巴东),屋心肠(神农架);湖南:五爪龙(大庸);广东:圆酸菜、野墨菜(惠阳);广西:和尚菜(苍梧),乌云草,狗蚤菜;云南:小被单草,被单草,鸡儿肠,抽筋草。

功效 全草:清热解毒,化瘀止痛,催乳。用于肠炎,痢疾,肝炎,阑尾炎,产后瘀血腹痛,子宫收缩痛,牙痛,头发早白,乳汁不下,乳腺炎,跌打损伤,疮痈肿毒。

备考 《本草纲目》将繁缕与鸡肠草并列为两条。李时珍曰:繁缕,茎蔓甚繁,中有一缕,故名,俗呼鹅儿肠菜,象形也。味甘。在论鸡肠草时说:鸡肠味微苦,咀之涎滑,茎中无缕,色微紫,花亦紫色。按本品花为白色,故非《纲目》之鸡肠草。

#### 7053100

*Stellaria monosperma* Buch.-Ham. --- *Stellaria crispata* Wall.

植物名 单子繁缕《云南植物研究》

文献名 皱叶繁缕《湖北植志》,独籽繁缕《云南种录》

地方名 贵州:大种鹅儿肠、通经草(贵阳),寸金草,老鹅精,黑牵牛,藤牛膝,大鹅儿肠。

功效 全草、根:清热解毒,化瘀止痛,催乳。用于胃痛,黄疸,大便下血,月经不调,小儿积食,疔疮,风湿骨痛,腰膝酸软。

#### 7053101

*Stellaria neglecta* Weihe

植物名 寒繁缕《汇编》

文献名 鹅肠繁缕《高植图鉴补编》,易忽繁缕《云南种录》,繁缕《新乡中草》,鹅儿肠《汇编》,小鸡草、鱼肚肠草《中药大辞典》

地方名 浙江:鸡肚肠草;河南:鸡儿肠(新乡)。

功效 全草:解毒祛瘀,清热利尿,下乳。用于痔疮,肿痛,阑尾炎,热淋,尿路感染。

7053102 见 7053100

#### 7053103

*Stellaria saxatilis* Buch.-Ham. ex D. Don --- *Stellaria vestita* Kurz --- *S. stellatopilosa* Hayata --- *S. hamiltoniana* Majumdar var. *vestita* (Kurz) Majumdar

植物名 石生繁缕《高植图鉴》

药材名 抽筋草《滇南本草》

文献名 虫儿被单《滇南本草》,星毛繁缕《云南种录》,石繁缕《红河中草药》,笄姑草《云南植物研究》

地方名 接筋草(陕西、湖北),石灰草(陕西、四川);陕西:小叶伸筋草、毛叶伸筋草(柞水),小伸筋草;湖北:糯米藤(神农架);广西:竹枝草;四川:〔筋骨草〕、湖广草、繁缕(成都),须须草(西昌),筋骨菜、白筋骨草(峨眉);云南:单背叶、金缠菜、青姑草、滇繁缕(昆明),小被单草、小鹅肠草(红河),〔青箱子〕(玉龙山),大娥娣菜、大鹅肠菜(文山),被单草,地精草。

功效 全草:有小毒。利湿,活血止痛。用于黄疸型肝炎,浮肿,白带,跌打损伤,风湿关节疼痛。外用于骨折,疮疖。

#### 7053104

*Stellaria uliginosa* Murr. --- *S. alsine* Grimm. --- *S. alsine* Grimm. var. *undulata* (Thunb.) Ohwi

植物名 雀舌草《救荒野谱》、《高植图鉴》

药材名 天蓬草《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 雪里花《纲目拾遗》,吴檀《植物学大辞典》,小青草《满鲜植汇》,滨繁缕《东检》,石灰草、抽筋草《汇编》

地方名 瓜子草(浙江、福建);浙江:指甲草,雪里开花;福建:兰衣参(福州),金线吊葫芦,寒草;湖北:〔葶苈子〕(巴东);湖南:文集草,〔鹅儿肠〕;广西:麻丝菜(藤县),黄瓜草(资源),天蓬菜;四川:小红娘。

功效 全草:祛风散寒,续筋接骨,活血止痛,解毒。用于伤风感冒,风湿骨痛,疮痈肿毒,跌打损伤,骨折,蛇咬伤。

备考 《纲目拾遗》雪里花有二,卷四与卷七各一,卷七所记载者,类似本品,但无图,故用《名实图考》之

名为药材正名。

### 7053105

*Stellaria yunnanensis* Franch.

植物名 云南繁缕《高植图鉴补编》

药材名 千针万线草《滇南本草》、《汇编》

地方名 云南:麦参(昆明),〔筋骨草〕(文山),〔青粘子〕(玉龙山),小胖药(红河、曲靖),大鹅肠菜。

功效 根:健脾补肾。用于病后体虚,贫血,头晕,耳鸣,腰酸,遗精,月经不调,白带,小儿疳积。

### 7053106

*Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke --- *V. pyramidata* Medic. --- *V. vulgaris* Host.

植物名 麦蓝菜《救荒本草》、《秦岭植志》

药材名 王不留行、《本经》、《药典》

文献名 王不留行《吴普本草》,剪金花、禁宫花《日华子本草》,金剪刀草《稗史》,不留行、金盏银台《纲目》,麦蓝子《甘泉县志》,奶米《救荒本草》,莪蒿、不流行、剪金子、长鼓草、道灌草、金钟草、疮草《新纲》,剪金草《中国药植志》,兔耳草《中药大辞典》

地方名 王不留(东北、河北、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、湖北、四川),大麦牛(江苏、安徽),留行子(山东、浙江、湖北、四川);河北:不留子(保定),不母留,麦加菜;内蒙古:“素勒呼-乌热”、“阿拉坦-谁没给力格-其格”(蒙名);甘肃:豆蓝子;山东:王母牛,王牧牛,牧牛;江苏:兔儿草(镇江),翘翘子(南通、盐城),灯盏窝(淮阴);安徽:麦郎菜,金盏银盆,伤力草;河南:麦连子,妈不流,胖婆娘脚;湖北:麦嘎公(神农架);湖南:山瞿麦,大样王不留行,吊心草;广西:灯笼草(兴安);四川:对月草,王不留行子(峨眉山)。

功效 种子:活血通经,下乳消肿。用于乳汁不下,经闭,痛经,乳痈肿痛。

## 7055 番杏科 Aizoaceae

### 7055001

*Mollugo lotoides* (L.) Kuntze --- *M. hirta* Thunb.

植物名 星毛粟米草《高植图鉴》

药材名 虎咬痕《台湾药植志》

文献名 毛粟米草《台湾药植志》

地方名 台湾:虎咬黄。

功效 茎、叶:用于食积,解毒。外用于肿疡。

### 7055002

*Mollugo oppositifolia* L. --- *M. spargula* L.

植物名 簇花粟米草《药植简编》

文献名 米碎草、圆根草《汇编》

地方名 广东:假莞茜(增城、罗定、乐昌),〔飞扬草〕(高要、高鹤),沙葛(河源),酒西草(五华);海南:麦山草(乐东),墨草(澄迈)。

功效 全草:清热解毒,利湿。

### 7055003

*Mollugo pentaphylla* L. --- *M. stricta* L.

植物名 粟米草《高植图鉴》

药材名 粟花草《名实图考》、《汇编》

文献名 公草《名实图考》,地麻黄《贵州民间药物》,米花草《中草药》

地方名 浙江:鸭脚瓜子草(天目山);台湾:铁钩草,朱子草,祐仔仁,出生漏草;河南:降龙草;广东:瓜仔草、瓜疮草(潮阳);广西:尺蛇草;四川:〔指甲花〕;贵州:地杉树(惠水)。

功效 全草:清热解毒,利湿。用于腹痛泻泄,感冒咳嗽,皮肤风疹。外用于眼结膜炎,疮疖肿毒。

### 7055004

*Tetragonia tetragonioides* (Pall.) Kuntze --- *T. expansa* Murr.

植物名 番杏《高植图鉴》

药材名 番杏《质问本草》、《汇编》

文献名 滨莼菜《本草推陈》,法国菠菜《高植图鉴》

地方名 上海:外国菠菜;福建:白番杏,白红菜,白番苋,海瑞香、白冬枫(闽南);云南:洋菠菜。

功效 全草:清热解毒,祛风消肿。用于胃癌,食管癌,子宫颈癌。

## 7056 马齿苋科 Portulacaceae

### 7056001

*Portulaca grandiflora* Hook.

植物名 大花马齿苋《高植图鉴》

药材名 午时花《汇编》

文献名 松叶牡丹《植物学大辞典》,金丝杜鹃《中国植物图鉴》,草杜鹃《汇编》,雀喇草、〔了哥喇〕《药植简编》

地方名 〔半支莲〕(陕西、江西、广西),太阳花(湖北、广东、贵州);江苏:〔半枝莲〕;江西:洋马齿苋;台湾:乞儿碗,六月雪;广东:肩烂草(潮阳),小叶肩烂草、土红药(澄海),一点红、火把草、乞食草(潮安),肩疗草(普宁),刀草(惠来),枪刀草(海丰),马排菜、酸菜(新会),禾雀喇、雀子喇(粤北);广西:万年草,打砍不死,〔佛甲草〕(南宁);贵州:还魂草。

功效 地上全草:散瘀止痛,解毒消肿。用于跌打损伤。外用于疮疖肿毒。

### 7056002

*Portulaca oleracea* L.

植物名 马齿苋《高植图鉴》

药材名 马齿苋《本草经集注》、《药典》

文献名 马苋《本草经集注》,马齿草《雷公炮炙论》,马齿苋子《开宝本草》,五行草《图经》,马齿菜《圣惠方》,马齿龙芽《宝藏论》,五方草、长命菜、九头狮子草《纲目》,酸苋、安乐菜《医林纂要》,野苋《和汉药物学》,雪比淋《朝植乡名》,汰苋《食用植物图说》,五色苋、鼠齿苋《新纲》,长命苋《中国药植志》

地方名 马尿苋(广东、四川、贵州),瓜子菜(安徽、福建、湖北、湖南、广东、广西、云南),猪母菜(浙江、福建、台湾、广东),蚂蚱菜(辽宁、陕西、山东、江西、广西),长寿菜(河北、江西),马蜂菜、晒不死(安徽、河南),瓜子苋(浙江、福建、云南),蚂蚁菜(东北、广东),马蛇子菜(东北、山西),老鼠耳、鱼鳞菜(广东、广西),

酸味菜(广东、贵州),猪母耳(浙江、福建),猪母草、猪母乳(福建、台湾),瓜子金(福建、云南),麻绳菜(北京、云南),马食菜(黑龙江、河北、安徽),酱板草(上海、浙江、湖南);黑龙江:蚂舌菜;北京:妈蒿菜;河北:马生菜;内蒙古:“娜仁-掉嘎”、“扫马”(蒙名);陕西:瓜米菜(镇巴);甘肃:马士菜;山东:马苋菜(烟台),马绳菜(昌乐、潍县、莱芜、广饶),马踏菜;江苏:蛇草(南京),酱瓣头草(苏州、常熟),地马菜(云台山),马子菜(泰县),马菜、马马菜、安乐草、猪莼草、猪长草、猪酸酸、酱败草、酱瓣草(连云港、射阳);上海:牛舌头草,猪钻头,猪沙沙草;浙江:豆板菜(文成、永嘉),和尚菜(平阳),猪娘宽(嵊县),瓜子板草;江西:瓜仁菜(奉新),耐暑草(新建),耐旱菜;福建:五行菜(福州、闽侯、福安、周宁、泉州),瓠子菜、瓠瓜菜(清流),沙苋(三明),浮子菜(明溪),猪母苋(大田),米达苋(永安),白猪母菜,白猪母乳菜,白赤米苋,白狮岳,五色菜,五彩云,朱羽菜,豆片菜,孝花菜,尊辣菜,狮岳菜(福州、闽侯、福安、同安),狮子草;河南:马齿;湖北:马牙菜;湖南:发米菜;广东:蜆壳菜、蜆肉菜、妈妈菜(广州),酸甜菜(阳江、阳春),马排菜(新会),红猪母菜,红胶墙(潮汕),红骨猪母菜(饶平),山滑菜、猪母酸(海丰),红马齿苋、胶墙菜(潮阳、潮州),狗头狮草(惠来),马耳环(五华),酸仔菜(仁化),红柑墙(揭阳),麻仁草,鼠齿草,猪耳草,马拘菜;海南:肥猪菜,五方菜(海口);广西:木板菜(北海),瓜子草(南宁);四川:打不死,长生草;贵州:酸味菜;云南:小瓜子菜(文山),马齿苋菜,豆瓣菜;其他:胖胖菜。

**功效** 地上部分:清热解毒,凉血止血。用于热毒血痢,痢肿痔疮,湿疹,丹毒,蛇虫咬伤,便血,痔血,崩漏下血。

#### 7056003

*Portulaca pilosa* L.

**植物名** 毛马齿苋《广西药录》

**文献名** 多毛马齿苋《广西植录》,贼老落《药植简编》,日中花、[半枝莲]《云南种录》

**地方名** 台湾:午时草,嘴草,禾雀舌;广西:还魂草(桂平),狗咬草。

**功效** 茎、叶:用于红白痢。外用于疮毒。

#### 7056004

*Portulaca pilosa* L. var. *hortualis* Bailey

**植物名** 田园毛马齿苋《药植简编》

**文献名** 毛马齿苋《广西药录》

**地方名** 广西:山松、狗咬药(玉林),土田七(陆川),还魂草(桂平),贼佬药(北流),麻雀利。

**功效** 全草:解毒,消炎,止痛,止血,利尿。用于跌打,关节炎,烫火伤,蛇咬伤,犬咬伤,小儿丹毒,白带。

#### 7056005

*Portulaca quadrifida* L.

**植物名** 四裂马齿苋《云南种录》

**文献名** 小马齿苋《云南药录》

**地方名** 云南:[地锦]。

**功效** 全草:止痢杀菌。用于痢疾,肠炎,腹泻,湿

热性黄疸,内痔出血,乳汁不足,小儿疳积,黄水疮,下肢慢性溃疡。

#### 7056006

*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. --- *T. patens* (L.) Willd.

**植物名** 土人参《高植图鉴》

**药材名** 土人参《滇南本草》、《汇编》

**文献名** 土洋参、上高丽参《纲目拾遗》,米花《牧野日图》,水人参《天宝本草》,波世兰《中国药植志》,锥花土人参《中国经植志》,假人参《台湾药植志》

**地方名** 地洋参(浙江、河南),栝兰(浙江、江西、河南、湖北、云南),参草(陕西、广西),上参(福建、广西),[红参](湖北、四川),野洋参(广西、四川),[高丽参](四川、云南),飞来参(广东、云南);陕西:[力参];浙江:野东洋参;江西:山高丽参(婺源),山洋参、野参(泰和),野高丽参(吉水);福建:土红参(闽东),上东洋参、假东洋参(泰宁),白观音苋(松政),观音菜(霞浦),紫人参(福州、闽侯、泉州),煮饭花(华安、漳州),[野人参];台湾:参,参仔叶;湖北:野大力参(神农架);广东:人苾苻(电白、茂名),玉参(阳江、阳春),灯香草(廉江、遂溪);广西:土党参、瓦坑头(龙胜),西洋参(陆川),土白芍(蒙山),石兰参(梧州),申时花,桃参,假洋参,假参,煮雀花;四川:东洋参;云南:瓦参(昆明、红河),土花旗参(昆明),洋参(红河);其他:番仔参。

**功效** 根、叶:补中益气,润肺生津。用于气虚乏力,体虚自汗,脾虚泻泄,肺燥咳嗽。

#### 7056007

*Talinum triangulare* (Jacq.) Willd. --- *T. crassifolium* (Jacq.) Willd.

**植物名** 棱轴土人参《广西药录》

**药材名** 土人参(广西、湖北)

**功效** 根:补中益气,润肺生津。用于肺热咳嗽,月经不调。

### 7057 蓼科 Polygonaceae

#### 7057001

*Antenoron filiforme* (Thunb.) Roberty et Vautier ---

*Polygonum virginianum* L. var. *filiforme* Nakai ---

*Polygonum filiforme* Thunb.

**植物名** 金线草《高植图鉴》

**药材名** 金线草《汇编》

**文献名** 海根《本草拾遗》,重阳柳、蟹壳草《花镜》,毛蓼、白马鞭《名实图考》,[土牛膝]《草本图说》,[金丝草]《本草新注》,勿尔吉蓼《中国北部植图》,金线蓼《云南种录》

**地方名** 人字草(浙江、广西),[红牛膝](甘肃、湖北),九龙盘(湖南、广东、广西),大叶人字草(福建、广西),大叶辣蓼(浙江、湖南),山蓼(江西、湖南),铁菱角(福建、湖南、广西),蓼子七(陕西、四川);陕西:鸡血七(太白山),猪子蓼(略阳),红三七;浙江:铁棱角三七、铁箍散、菱角三七(天目山),[肺形草];江西:大土牛膝(婺源),大蓼、破片草、野苋菜(德兴),[红毛三七](庐

山), 辣蓼叶(泰和), 一串红, [土三七], 铁拳头, 野蓼; 福建: 大叶金线、大叶蓼、师父药头(松溪、政和); 湖北: 破血子(神农架); 湖南: 九节风, 红七珠, 红花铁菱角, 红公鸡, 老君草, 重阳草(衡山); 广东: 铁卷头; 广西: 一把梳(富川), 天打槌(昭平), 四龙草(龙州), 心辣蓼、起风叶(大瑶山), 红毛毡(苍梧), 血丝九龙盘, 红蓼子草, 小一口血, 辣蓼子草, 蓼辣草(全州), 虎耳草(钟山), 慢惊草; 四川: 一群羊, 平羊草, 四不像, 宗子羊(成都); 贵州: 水线花, 水线花, 川黄, 飞疗药, 毛血草, 毛药, 打神鞭, 花养菜, 捶不烂, 铁秤锤; 云南: 起风草; 其他: 鸡心七。

**功效** 全草: 凉血止血, 祛瘀止痛。用于吐血, 肺结核咯血, 子宫出血, 淋巴结核, 胃痛, 痢疾, 跌打损伤, 骨折, 风湿痹痛, 腰痛。

## 7057002

*Antenorox filiforme* (Thunb.) Roberty et Voutier var. *kachinum* (Nieuwland) Hara

**植物名** 毛叶红珠七(云南种录)

**地方名** 云南: 小红袍(麻栗坡)。

**功效** 全草: 止泻。用于红白痢, 白带, 心胃气痛, 调经, 跌打损伤。

## 7057003

*Antenorox neofiliforme* (Nakai) Hara

**植物名** 短毛金线草(高植图鉴)

**药材名** 短毛金线草(汇编)

**文献名** 短毛金线草《药植简编》, 稀毛金线草(湖北植志)

**地方名** 人字草(浙江、广西), 蓼子七(陕西、河南、四川); 陕西: 鸡血七(太白山), 猪蓼子(略阳); 浙江: 八字草(乐清、泰顺), [肺形草](温州、乐清); 湖北: 大火鸟(兴山), 节节参(鹤峰), [红牛膝](恩施), 铜钞、铜榔头(巴东), 红三七(神农架); 四川: 金线草根; 贵州: 捶不烂。

**功效** 全草: 活血散瘀, 理气止痛。用于月经不调, 跌打肿痛, 骨折, 外伤出血。

## 7057004

*Calligonum mongolicum* Turcz.

**植物名** 沙拐枣(高植图鉴)

**药材名** 沙拐枣(沙漠药植)

**文献名** 头发草(沙漠药植)

**地方名** 内蒙古: “托尔洛格”、“托松-托尔洛格”、“乌兰图列-阿德左尔”(蒙名)。

**功效** 全草: 用于小便混浊, 皮肤皲裂。

## 7057005

*Coccoloba uvifera* L.

**植物名** 树蓼(台湾药植志)

**功效** 树皮: 用于痢疾。

## 7057006

*Fagopyrum dibotrys* (D. Don) Hara --- *Fagopyrum cymosum* (Trev.) Meisn. --- *Polygonum dibotrys* D. Don --- *P. cymosum* Trev.

**植物名** 金荞麦(西藏植志)

**药材名** 金荞麦(名实图考)、《湖北中草药志》

**文献名** 赤地利(唐本草), 五毒草(本草拾遗), 金锁银开、天荞麦(李氏卓秘), 山荞麦(纲目), 开金锁(本草从新), 见肿消、土三七、乳香草、奶草、金不换、蓝荞头(纲目拾遗), 喊骨头、透骨消(名实图考), 野荞子(分类草药性), 铁石子(天宝本草)

**地方名** 苦荞头(陕西、江西、湖南、四川、贵州), 荞子七(湖南、四川), 天花麦(浙江、福建), 荞麦七(湖北、广西), 荞麦三七(陕西、浙江、河南、湖北、湖南、广东), 野南荞(湖南、四川), 野荞麦(江西、四川、云南), 万年荞(西南); 陕西: [乌药](凤县), 荞麦七, 荞当归(平利); 甘肃: 苦荞七; 江苏: 铁甲将军草; 上海: 苦荞麦根, 金荞麦根; 浙江: 花麦(温州); 安徽: 野乌麦; 江西: 花麦(德兴), 铜拳头(泰和), 铁拳头(吉安、泰和); 福建: 臭荞麦, 野苦麦; 湖北: 猴子七, 荞麦当归(神农架); 湖南: 荞三七(黔阳), 天荞麦, 铁菱角; 广西: 大加味菜(忻城), 野三角麦(大苗山), 酸荞麦(南宁); 四川: 兰苡头, 苦苡, 南苡头, 铁实子(西昌), 家苡荞(峨眉), 苦荞, 野苡子; 云南: [土茯苓], 血娃娃(曲靖), [地榆](临沧), 野荞菜(文山), 野荞, 野苦荞头, 野荞根, 泽兰女尼(楚雄彝名)。

**功效** 根及根茎: 清热解毒, 祛风利湿。用于咽喉肿痛, 痢疾, 瘰癧, 肝炎, 肺病, 筋骨酸痛, 头风, 胃痛, 菌痢, 白带, 蛇伤, 狂犬病, 红斑狼疮。

**备考** 《证类本草》卷十与《本草纲目》卷十七“大黄”项下“鼎州出一种羊蹄大黄……亦呼为金荞麦”及《本草纲目》卷十九“羊蹄”别名金荞麦, 均与本品为同名异物。

## 7057007

*Fagopyrum esculentum* Moench. --- *F. sagittatum* Gilib. --- *Polygonum fagopyrum* L. --- *Fagopyrum vulgare* Hill

**植物名** 荞麦(高植图鉴)

**药材名** 荞麦(千金·食治)、(汇编)

**文献名** 乌麦、苡麦(日用本草), 荞麦苗(救荒本草), 荞麦面、荞麦精、荞麦叶、花荞、甜荞(纲目), 荞子(草木便方), 净肠草(名实图考), 流注草(中药大辞典)

**地方名** 三角麦(甘肃、福建、广西、四川), 花麦(甘肃、广西), 甜麦(福建、台湾); 广东: 三角丹、驳骨莲(粤北), 三角风、疳积草、消骨蓉(惠阳); 广西: 甜荞麦; 四川: 荞麦粉。

**功效** 茎、叶: 降压, 止血。用于高血压, 毛细血管脆弱性出血, 防治中风, 视网膜出血; 种子: 健胃, 收敛。用于止虚汗。

## 7057008

*Fagopyrum gracilipes* (Hemsl.) Dammer --- *Polygonum gracilipes* Hemsl.

**植物名** 细茎荞麦(湖北植志)

**地方名** 湖北: 野荞麦(神农架)。

**功效** 全草: 清热解毒, 活血散瘀, 健脾利湿; 叶: 消肿。用于跌打损伤。

## 7057009

*Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn. --- *Polygonum*



tataricum L.

植物名 苦荞麦《高植图鉴》

药材名 苦荞麦《纲目》、《汇编》

文献名 鞑靼荞麦《种分》, 鞑靼蓼《中国北部植图》, 野南荞《中药大辞典》

地方名 苦荞(湖北、四川、云南), 苦荞头(四川、贵州); 内蒙古: “哲日勒格-萨嘎达”(蒙名), 野荞麦; 陕西: 荞叶七; 湖北: 老鸦荞(神农架); 四川: 荞麦七; 贵州: 万年荞, 野兰荞; 云南: 苦乔, “帕孟”(傣名)。

功效 块根: 理气止痛, 健脾利湿。用于胃痛, 消化不良, 腰腿疼痛, 跌打损伤; 苦荞皮(作枕): 明目。

#### 7057010

Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey  
--- Muehlenbeckia platyclada (F. Muell. ex Hook.)  
Meissn.

植物名 竹节蓼《秦岭植志》

药材名 竹节蓼《汇编》

文献名 水蓼《花镜》, 扁茎蓼《秦岭植志》

地方名 蜈蚣草、扁竹(台湾、广西), 百足草(广东、广西); 江苏: 对节草; 上海: 竹节山草, 百脚山草; 福建: 大本飞天蜈蚣, 斑竹相思(泉州); 台湾: 寒忌竹, 鹅江草; 广东: 飞天芽江、金足百足(潮阳), [石斛](兴宁); 广西: 石百步(岑溪), 上石百足、飞天蜈蚣、铁扭边(苍梧、贵县), 观音竹(平南、岑溪、蒙山、藤县), 侧柏(昭平), 蜈蚣竹(忻城), 扁竹花, 斩蛇剑, 竹节草, 上篱草, 虾脚草, 石百足; 其他: 鸡爪蜈蚣。

功效 茎、叶、全草: 行血祛瘀, 消肿止痛。用于痈疮肿毒, 跌打损伤, 毒蛇及蜈蚣咬伤。

#### 7057011

Oxyria digyna (L.) Hill

植物名 肾叶山蓼《高植图鉴》

药材名 山蓼《汇编》

文献名 肾叶高山蓼《东北草本植志》, 肾叶酸模《云南种录》

地方名 酸浆菜(吉林、陕西), [鹿蹄叶](东北); 青海: “罗肖”(藏名)。

功效 全草: 清热利湿。用于肝气不舒, 肝炎, 坏血病。

#### 7057012

Oxyria sinensis Hemsl.

植物名 中华山蓼《汇编》

地方名 四川: 红马蹄乌; 云南: [马蹄草], 金边莲(路南), 蓼子七(丽江), 酸猪草, 铜矿草。

功效 根茎和叶: 舒筋活络, 活血定痛。用于跌打损伤, 腿痛。

#### 7057013

Polygonum alopecuroides Turcz.

植物名 狐尾蓼《东北草本植志》

药材名 狐尾蓼《内蒙古中草药》

文献名 拳参蓼《兴安植群》, 筒鞘叶拳参《东北植药图志》, 紫参、长叶拳参《中草药通讯》

功效 根茎: 有小毒。清热、解毒, 凉血止血。

7057014 见 7057015a

#### 7057015

Polygonum amphibium L.

植物名 两栖蓼《高植图鉴》

药材名 两栖蓼《汇编》

文献名 水荭、天蓼《中国北部植图》

地方名 贵州: 小黄药。

功效 全草: 清热利湿, 解毒杀虫。用于痢疾, 尿血, 潮热多汗, 无名毒疮, 肥人性脊椎炎。

#### 7057015a

Polygonum amplexicaule D. Don

植物名 抱茎蓼《湖北植志》

地方名 湖北: 血三七(巴东、保康), 红三七(兴山); 其他: 岩血竭。

功效 根茎: 顺气解痉, 散瘀止血, 止痛, 生肌, 抗菌消炎。用于外伤出血, 跌打损伤及胃痛。

#### 7057016

Polygonum amplexicaule D. Don var. sinense Forb.

植物名 中华抱茎蓼《秦岭植志》

药材名 鸡血七《陕西中草药》

文献名 华抱茎蓼《湖北植志》, 中华蓼《云南种录》

地方名 陕西: 红孩儿, 红血儿(南郑), 鸡心七、荞麦七(长安), 蜈蚣七、倒生莲(镇坪); 湖南: 血三七, 血地榆。

功效 根茎: 有小毒。清热解毒, 收敛止泻, 活血止痛。用于菌痢, 胃肠炎, 跌打损伤, 外伤出血。

#### 7057017

Polygonum attenuatum V. Petrov ex Kom. --- Bistorta attenuata (V. Petrov) Chien

植物名 毛耳叶蓼《汇编》

文献名 毛叶耳蓼《东北草本植志》, 毛耳叶拳参《吉野》, 毛叶拳参《东北植药图志》

功效 根茎: 有小毒。清热解毒, 凉血止血。

#### 7057018

Polygonum aubertii L. Henry --- Bilderdykia aubertii (L. Henry) Moldeuke

植物名 木藤蓼《秦岭植志》

药材名 木藤蓼《药典》

文献名 丛叶蓼《湖南药物志》, 康藏何首乌《经植手册》

地方名 青海: “勒折”(藏名)。

功效 茎枝: 清热, 祛风, 去湿, 利尿, 补血。用于肺病, 感冒发烧, 风湿性关节炎等; 根茎: 外用于烧烫伤, 毒蛇咬伤。

#### 7057019

Polygonum aviculare L.

植物名 篇蓄《高植图鉴》

药材名 篇蓄《本经》、《药典》

文献名 扁竹《本草经集注》, 篇莧、水篇筑《说文》, 编草《水经注》, 蓄辩、篇蔓《吴普本草》, 地篇蓄、编竹《履巉岩本草》, 扁蓄《救荒本草》, 粉节草、道生草《纲目》, 篇竹草《尔雅义疏》, 王台、百节、百节草、铁绵草

《新纲》，篇蓄蓼《名实图考》，扁竹蓼、乌蓼《中国药植志》，大扁鹊、铁锈锈《汇编》

地方名 路边草(江苏、浙江)，竹节草(江苏、上海、四川)，竹叶草(山东、云南)，地蓼(陕西、西藏)，扁猪牙、猪牙草、猪牙菜(东北)；吉林：“马加坡儿”(朝名)；内蒙古：“吉得十出各麻”、“布都纳音-苏勒”、“加哈英-诺戈”(蒙名)，扁竹竹(包头)，篇竹竹；陕西：牛筋草；青海：“尼阿罗哇”(藏名)，羊尾巴，犏犏筋；新疆：“库西唧提力缺甫”(维名)；山东：篇子草(昆崙山)，珠芽草(莒南、费县、平邑、沂水、沂源)，扁珠草(滕县)，扁蓄子芽(崂山)；江苏：大蓼片(南京)，牛鞭草(苏北)，竹鞭菜(连云港、射阳)，七星草，节节草，蚂蚁草，桌面草，铁片草，猪圈草；上海：红蜘蛛丝，旱蓼草，野落帚，紫包草，踏勿草，塌皮洛帚；浙江：牛索面(乐清、洞头)，扁血草(杭州)；安徽：斑鸠台；福建：曲仔药(松政)，小山桂，泻痢草，野山桂；河南：铁疙瘩皮；湖北：通淋草，雉头草(神农架)；湖南：妹子草；四川：大扁蓄(峨眉山)，扁蓄草(南川)；贵州：疳积药，野铁扫把，路柳。

功效 地上部分：利尿通淋，杀虫，止痒。用于膀胱热淋，小便短赤，淋漓涩痛，皮肤湿疹，阴痒带下。

#### 7057020

*Polygonum aviculare* L. var. *vegetum* Ledeb. --- *P. heterophyllum* Lindl.

植物名 异叶蓼《东北草本植志》

药材名 篇蓄《本经》、《汇编》

文献名 竹叶菜《名实图考》，王刍、百节、百节草、铁锦草《新纲》，多茎篇蓄《湖北植志》，大叶篇蓄《江苏植志》，扁辨、道生草、扁竹蓼《中国药植志》，篇蓄蓼《兴安植群》

地方名 扁猪牙、猪牙菜(东北)，乌蓼(甘肃、山西、河南)，猪牙草(东北、山西、江苏、安徽)，路边草(江苏、安徽)；江苏：扁蔓、蚂蚁草(苏州)，篇蓄草，猪圈草(徐州)，篇蓄叶(清江、泰州)，桌面草(云台山)，七星草、铁片草(盱眙)，竹节草(镇江)，节节草；安徽：斑鸠柴，红白菜，铁链草，母冬草；江西：粉节草(德兴)；湖南：白霍辣、白辣柳(长沙)，白老鸡草(衡山)，节节青(辰溪、溆浦、常德)，妹子草(靖县)，铁线草(常德)；四川：小扁蓄、凤眼灵芝、六角灵芝(成都)，篇竹草，大篇蓄，地蓼，扁竹；云南：古巴草(昆明)，竹篇蓄，碎米草，锅巴草。

功效 全草：清热利尿，解毒驱虫。用于泌尿系感染，结石，肾炎，黄疸，细菌性痢疾，蛔虫病，蛲虫病，疥癣湿痒。

#### 7057021

*Polygonum barbatum* L. --- *P. barbatum* var. *gracile* (Danser) Steward

植物名 毛蓼《高植图鉴》

药材名 毛蓼《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 四季青《名实图考》

地方名 蓼子草(湖南、四川)；湖南：小辣蓼草，小柳辣子，竹叶菜，红梗草，米辣蓼，柳辣子，野辣蓼树，辣蓼，辣蓼草；广西：小毛蓼，水辣蓼(岑溪、昭平)；四川：小红蓼子草，小蓼子草，红蓼子，红蓼子草，辣蓼子，细

刺毛蓼，水线花，飞疔药；云南：(香草)(临沧)，髯毛蓼。功效 全草或根：外用于痈肿，疔疮，瘰癧。

#### 7057022

*Polygonum bistorta* L. --- *P. lapidosum* Kitag.

植物名 拳参《中药志》

药材名 拳参《图经》、《药典》

文献名 紫参《本经》，淄州拳参《大观本草》，牡蒙、马行《纲目》，石生蓼《东北草本植志》，砾地拳参《东北植药图志》

地方名 刀剪草(河北、内蒙古)，刀枪药(河北、湖南)，山虾、山虾子、拳蓼(山东、江苏)，狗尾巴吊(东北)，[草河车](东北、北京、内蒙古、新疆、江苏、浙江、河南、湖北、湖南)，倒根草(东北、新疆、河南、湖南)，[重楼](东北、新疆、江苏、湖南)；河北：刀剪药，疙瘩参，破伤药，铜罗；内蒙古：[山槟榔]，“莫合日”(蒙名)；山东：虾参(昆崙山，荣成、泰安、沂水、淄博)，山参(五莲)，小牛舌头，拳头参(泰安)，地虾(烟台)，倒头草(莱阳)，山柳柳，回头参，[石蚕]，夏参；浙江：红重楼；安徽：红苍术；湖北：马尾七(巴东)，红蚤休(罗田)，活血莲(恩施)，红内消；四川：土马风，涩疙瘩，一口血(南川)；贵州：鸢头鸡、[地榆]、地蜂子(贵阳)，红三七，红地榆，地蚕子；其他：青参，五乌花，童肠。

功效 根茎：清热解毒，消肿，止血。用于赤痢，热泻，肺热咳嗽，痈肿，瘰癧，口舌生疮，吐血，衄血，痔疮出血，毒蛇咬伤。

#### 7057023

*Polygonum bungeanum* Turcz.

植物名 柳叶刺蓼《高植图鉴》

文献名 本氏蓼《中国北部植图》，蚂蚱腿《药植简编》

功效 种子：清热明目。但在个别地区曾误作水红花子用。

#### 7057024

*Polygonum caespitosum* Blume --- *Polygonum posumbu* Hamilt.

植物名 丛枝蓼《高植图鉴》

药材名 辣蓼草(湖北、广西)

文献名 簇蓼《广西植录》，长尾叶蓼《东北草本植志》

地方名 红辣蓼(广东、广西)；湖北：水红花蓼，野红辣蓼(巴东)，家马蓼(通山)，水红辣蓼；广东：埋辣蓼；广西：辣蓼(平南)，蓼辣草(乐业)，石莽草，辣蓼儿；贵州：钻之连；云南：水红花，丛生蓼，小蓼草，马辣子，红杆辣蓼，野辣子根；其他：石辣蓼。

功效 全草、根、叶：祛风利湿，散瘀止痛，解毒消肿，杀虫止痒。

#### 7057025

*Polygonum campanulatum* Hook. f.

植物名 钟花蓼《西藏植志》

文献名 猪蓼子草《分类草药性》

地方名 神血宁(贵州、云南)；贵州：花养莲，节节红。

**功效** 全草:润肺止咳,清热解毒,活血。用于肺热咳嗽,咯血,劳热多汗,失眠,无名肿毒,阴疽瘰癧,月痕病。

## 7057026

*Polygonum capitatum* Buch. -Ham. ex D. Don

**植物名** 头花蓼(湖北植志)

**药材名** 石辣蓼(广西中药志)

**文献名** 回生草(植物名汇),辣蓼(广西药录)

**地方名** 四季红(贵州、云南);湖北:青影子(鹤峰);广西:小红蓼、小红藤(隆林),石莽草(凌云、乐业、隆林),沙滩子;四川:铜矿草(峨眉山);贵州:省丁草;云南:火留草(西畴),火溜草、满地红、太阳花(文山),太阳草(红河),小红草,小铜草,石头花,石头菜,红酸杆,惊风草,绣球草,火溜草,草石椒(昆明),酸酱草(景东),红花地丁;其他:水绣球。

**功效** 全草:解毒,散瘀,利尿通淋。用于痢疾,肾孟炎,膀胱炎,尿路结石,风湿痛,跌打损伤,疮疡湿疹。

## 7057027

*Polygonum chinense* L.

**植物名** 火炭母(高植图鉴)

**药材名** 火炭母草(图经)、《中药大辞典》

**文献名** 火炭毛(生草药性备要),乌炭子(名实图考长编),运药(分类草药性),旱辣蓼、鸡粪蔓(植物名汇),火炭星(岭南草药志),地蜈蚣(桂林药志),黄泽兰、[金不换](云南种录)。

**地方名** 地蜈蚣、蜈蚣草(广东、广西),斑鸠饭(湖南、广东),鸠饭草(福建、湖南),饭藤、乌饭藤(福建、广东);浙江:清明山水,龙山水,山树乌(温州、瑞安),山乌山米(乐清),深毛乌(平阳);安徽:蓼子,水晶草;福建:乌白饭藤(泉州),水沙柑子、乌白饭藤(福州、厦门、宁德、晋江、莆田),白米饭(大田),水担钩叶(宁化),水薤菜(三明),大沙柑草(武平),白水饭、冷饭菜、冷饭草、红根藤、退水沙、剃刀越、清饭子、罐菜兜(厦门),酸柳仔(松溪、政和),酸管杖(寿宁),鹧鸪饭(厦门、福州、闽侯、福清、福鼎、三明),信饭藤(闽南),山莽麦草;台湾:川七,红骨清饭藤,红骨冷饭藤,冷饭藤,鸡蔓,清饭藤;湖北:养麦当归(恩施),老蛇筋(利川),鸡骨七、接骨笋(巴东),芥子七,养花莲,散血草,〔接骨丹〕;湖南:山养莲,天养麦,〔水黄连〕,桔麦草,贼骨草,野养,溜子七;广东:炎炭藤(高州、茂名、化州、湛江等),火炭草(海康、徐闻、廉江、遂溪、湛江),火炭须(增城、乐昌、阳江、阳春、电白),火炭煤(高要),火潭煤(番禺),火炭药(罗定),火炭尿(英德),横梗席,假杨梅(东莞),天师印(东莞),鹊糖梅、麻梗蔗、红梅仔叶(新会),毛甘蔗、盲更蔗(广州),白饭草(潮汕),白饭菜、枯锥饭(惠来),白米饭桃(潮安、澄海),老虎尿(澄海),火炭只药(饶平),水拖沙(潮州),沙坝仔、白饭仔(陆丰),喉科学(兴宁),乌饭菜、蜈蚣藤(潮阳),大叶沙滩子,沙滩子(乐昌);海南:鹊红梅,水推沙,马岗仔,火炭苗,假糖梅;广西:老鼠蔗、水洋流(北流),火炭藤(昭平、博白),火炭头(平南),若米(龙州),火炭公(北海),酸苗(河池);四川:红泽兰(西昌),旱药,黄鳝藤(峨眉山);贵州:野辣蓼,酸

广台,大红袍;云南:中华蓼、蓼草。

**功效** 全草:清热解毒,利湿消滞,凉血止痒,明目退翳。用于痢疾,肠炎,消化不良,肝炎,感冒,扁桃体炎,咽喉炎,白喉,百日咳。外用于角膜云翳,霉菌性阴道炎,白带,乳腺炎,疖肿,小儿脓疱疮,湿疹,毒蛇咬伤;根:用于气虚头昏,耳鸣,耳聋,白带,跌打损伤。

## 7057028

*Polygonum chinense* L. var. *hispidum* Hook. f.

**植物名** 粗毛火炭母(贵州植志)

**药材名** 火炭母(中药志)

**文献名** 刚毛火炭母(云南种录)

**地方名** 广西:一条龙(龙州),火炭草(藤县),火炭菜(来宾),火炭藤(梧州、北流、陆川、博白、贵县),老鼠蔗(玉林),红崩砂草(柳江),黄平藕(鹿寨);贵州:土三七,大碎米草;云南:小红人,野辣子草,野辣蓼。

**功效** 全草:清热解毒,利湿止痒,明目退翳。用于痢疾,肠炎,扁桃体炎,咽喉炎。外用于角膜云翳,子宫颈炎,霉菌性阴道炎,皮炎湿疹。

## 7057029

*Polygonum chinense* L. var. *malaicum* (Danser) Steward

**植物名** 卵叶火炭母(贵州植志)

**药材名** 卵叶火炭母(贵州药录)

**功效** 全草:清热解毒,祛风除湿。用于风湿脚气,小儿惊风,痢疾,白喉,眼翳,阴道炎,足癣,疮毒。

## 7057030

*Polygonum chinense* L. var. *umbellatum* Makino ---

*Polygonum chinense* L. var. *thunberginum* Meisn.

**植物名** 冷饭藤(台湾中药材图鉴)

**文献名** 旱辣蓼、赤地利(中国植物图鉴),旱药(汇编)

**地方名** 台湾:〔三七〕,红骨冷饭藤,鸡粪蔓,火炭毛;福建:乌白饭草(泉州),乌连芦、乌饭、乌饭叶、白饭、老鸭饭、鹧鸪饭、酸管杖(闽东);四川:胖根藤、赤藤荔、五毒草(南川);贵州:酸汤杆,土地榆,黄地榆。

**功效** 全草:益气行血,祛风解热。用于病后体虚,身热,头晕,气虚耳鸣,月经不调,白带。

## 7057031

*Polygonum ciliinerve* (Nakai) Ohwi --- *P. multiflorum*

*Thunb.* var. *ciliinerve* (Nakai) Setward

**植物名** 毛脉蓼(湖北植志)

**药材名** 朱砂七(西北)、《汇编》

**文献名** 红药、赤药、红药子、秦州红药子(图经)

**地方名** 〔朱砂莲〕(陕西、湖北、贵州),黄药子(西北、湖北),雄黄连(湖北、湖南),〔何首乌〕(甘肃、宁夏);陕西:毛葫芦,血三七(山阳),猴血七(镇坪),莽馒头;湖北:散血蛋(宜恩、恩施);湖南:鸡血莲、点血(常德);贵州:血苕。

**功效** 块根:有小毒。清热解毒,止痛,止血,调经。用于扁桃体炎,胃炎,肠炎,痢疾,尿路感染,吐血,衄血,便血,功能性子宫出血,月经不调。外用于跌打损伤,外伤出血。

## 7057032

*Polygonum convolvulus* L.

植物名 卷茎蓼《高植图鉴》

文献名 卷茎蓼《秦岭植志》

地方名 内蒙古：“楚都尔乌布斯”（蒙名）；陕西：荞麦葛（太白山）；贵州：烙铁头。

功效 全草：清热解毒，利湿止痒。

#### 7057033

*Polygonum coriaceum* Sam.

植物名 革叶蓼《汇编》

文献名 草血竭《药植简编》，伴蛇莲《广西植录》，革叶拳参《云南种录》

地方名 广西：马蜂七、拳参（凌云），鸡爪大王（桂平），倒生根（全州）；云南：地蜂子。

功效 根茎：有毒。清热解毒。用于急性细菌性痢疾，口腔炎，牙龈炎，痈肿，痔疮，火伤。

#### 7057034

*Polygonum criopolitanum* Hance

植物名 蓼子草《湖北植志》

药材名 蓼子草《湖南药物志》

地方名 湖南：小蓬莲，细叶一枝莲。

功效 全草：祛风解表，清热解毒。用于感冒，毒蛇咬伤（红头蛇）。

#### 7057035

*Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. --- *P. reynoutria* Makino --- *Persiosaria cuspidata* Nakai

植物名 虎杖《高植图鉴》

药材名 虎杖根《别录》、《药材学》

文献名 苓《诗经》，藟、大苦、藟《尔雅》，大虫杖《药性论》，苦杖、虎杖叶《本草拾遗》，酸杖、斑杖《日华子本草》，攀倒甍《图经》，酸桶笋《救荒本草》，斑庄根《滇南本草》，红药子《纲目》，〔乌不踏〕《医林纂要》，酸根、斑根、黄药子《名实图考》，酸溜根、土地榆《分类草药性》，酸通、雄黄连《天宝本草》，蛇总管《岭南采药录》，端阳、下烟、刚药台、高粱笋子《植物名汇》，武杖、枯杖、甜著、甘除根、醋筒草、酸桶草《新纲》，赤药、金阳草《诗草木今释》

地方名 酸汤杆（陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南），阴阳莲（浙江、广东、广西），金杨草（华中），大叶蛇总管（湖北、广东、广西），花斑竹（上海、河南、湖南、广东、广西、四川），〔山大黄〕（江西、福建、江苏、浙江、河南、广东、广西），〔土大黄〕（浙江、江西、福建、广东、广西），土黄连（广东、广西），九龙根（江苏、上海），活血丹（江苏、江西），活血龙（福建、浙江），活血莲（安徽、湖北），紫金龙（山东、江苏、安徽），酸筒杆（湖北、广西）；陕西：胖官头（洋县），斑草（略阳），山茄子、散血草、黄龙七（太白），接骨丹（华阴），搬倒甍；山东：川筋龙（泰山），和血龙、舒筋龙（蒙山）；江苏：大活血，血藤，紫叶（沛县），钻地风（东海）；上海：大活血龙，紫金龙根；浙江：大叶龙山水、大叶赤地利（洞头），金光笋（平阳），火烫竹（永嘉），空心竹（温州），猢猻竹（乐清），霜杆头（文成、泰顺），猴竹根，金锁王；安徽：寒筋草，海草花，斑红根，紫龙根，紫金草，酸杆筒，酸溜；江西：水

黄芩，酸米筒（婺源），酸筒梗（吉安），酸筒管（莲花）；福建：大号醋筒管、臭筒管（宁化），牛脚头（三明），白杓（永安），血三七、青竹笋（大田），汗脚、换脚（明溪），赤灌脚、贯脚、醋筒管（清流），透骨消草（武平），黄三七（厦门、南安、安溪、泉州、晋江），罐菜兜（光泽）；台湾：川七；河南：刚牙根，风连根；湖北：二月杆，刚油茺子、铜笋（石首），黄叶杆（五峰、咸丰），酸甲根（鹤峰），酸梗子（巴东），刚叶雾子、黄杨杆（神农架）；广东：小叶水高厘（普宁），箸笋管（兴宁），马龙鱼、黄根仔（潮阳），蛇抱管（广州）；广西：大黄（贵县、桂平），大力黄（陆川、玉林），大电根（北流），大力王（陆川），大丹根，三芒根（柳江），三满根（平南），阴阳草（陆川、博白、桂平、平南、龙州），美来草（德保），贯骨风（玉林），黄干蓼（大苗山、武鸣、容县），黄羌头，黄干头，红贯脚（陆川），干脚（合浦），红莲，马鹿角；四川：大泽兰、花竹根（会理），花斑竹根（成都）；贵州：〔黄地榆〕、〔地榆〕（遵义），号筒草，号筒杆；云南：九股牛（思茅），荞叶矮陀（临沧），荞叶岩陀，金丝岩陀（思茅、保山、临沧），金薄荷（红河），大接骨（大理），〔水大黄〕（曲靖），“比比罕”（傣名），花杆牛漆、花酸杆（红河），黄钻，榔头，〔竹节参〕（昆明），白花岩陀；其他：〔野黄连〕，斑龙紫，酸笋子，霜勺

功效 根茎、根：祛风利湿，散瘀定痛，止咳化痰。用于关节痹痛，湿热黄疸，经闭，癥瘕，咳嗽痰多，水火烫伤，跌扑损伤，痈肿疮毒。

#### 7057036

*Polygonum cynanchoides* Hemsl.

植物名 萝藦蓼《品种论述》

药材名 肿血藤（贵州）、《汇编》

文献名 毛血藤、荞麦蔓《汇编》，牛皮消蓼《秦岭植志》，牛皮消叶蓼《湖北植志》，肿血藤《贵州药录》

地方名 陕西：黄姜蔓（略阳）；贵州：白介药，云钩莲，云扣莲，百解药，荞叶细辛。

功效 根：敛肺止咳，行气化湿，镇痛清热。用于肺结核咳血，百日咳，胃气痛，风湿关节痛。

#### 7057037

*Polygonum denticulatum* Huang

植物名 绛头《云南中草药》

药材名 绛头《云南中草药》

文献名 血蓼《贵州植志》

地方名 酱头（贵州、云南）；贵州：朱砂莲，九节节；云南：大红药（楚雄），血七、血地胆（曲靖），赤地胆。

功效 块根：清热解毒，调经止血。用于痢疾，消化不良，胃痛，崩漏，月经不调，产后腹痛。外用于疔疮初起，外伤出血。

#### 7057038

*Polygonum dielsii* Levl.

植物名 黑果拔毒散《云南种录》

地方名 云南：辣蓼（大理）。

功效 根：用于闭经，子宫下垂。

#### 7057039

*Polygonum dissitiflorum* Hemsl.

植物名 稀花蓼《高植图鉴》

药材名 稀花蓼《湖南药物志》

文献名 箭叶蓼《广西药录》、疏花蓼《广西药录》

地方名 湖南：白回归，连牙梗；云南：水莽，“喇克喇勒”（元江哈尼语）。

功效 全草：清热解毒，止痛止泻。用于毒蛇咬伤，腹痛泄泻，肺炎。

#### 7057040

*Polygonum divaricatum* L. --- *Pleuropterypyrum divaricatum* Nakai

植物名 叉分蓼《高植图鉴》

药材名 叉分蓼《汇编》

文献名 分叉蓼《东北草本植物志》，分枝蓼、叉枝蓼、酸浆《沙漠药植》

地方名 酸不溜（辽宁、吉林、河北、内蒙古），酸不浆（黑龙江、吉林）；黑龙江：「酸浆」；内蒙古：“西莫勒德格”，“乌亥尔塔尔纳”（蒙名）；青海：“尼牙罗”，“尼阿罗”（藏名）。

功效 老根：祛寒，温肾。用于寒症，阴囊出汗；全草：清热，消积，散瘀，止泻。用于大小肠积热，癰瘤，热泻腹痛。

#### 7057041

*Polygonum emodi* Meisn.

植物名 竹叶舒筋《云南种录》

药材名 红藤蓼《汇编》

文献名 倒枝蓼《西藏植物志》

地方名 四川：红伸筋草，散血莲（西昌）；云南：血筋藤，舒筋草，鹿脚通筋草（曲靖），「黄藤」（东川），「蜈蚣草」，「大活血」。

功效 全草：舒筋活血。用于跌打损伤，风湿痛。

#### 7057042

*Polygonum emodi* Meisn. var. *dependens* Diels

植物名 悬垂竹叶舒筋《云南种录》

药材名 悬垂蓼《云南药录》

地方名 云南：风湿草。

功效 全草：用于风湿病。

#### 7057043

*Polygonum forrestii* Diels

植物名 云支花《贵州植物志》

药材名 云支花《贵州药录》

功效 全草：清热利湿，活血调经。用于月经不调，肠炎，无名肿毒，瘰癧，皮肤瘙痒。

#### 7057044

*Polygonum griffithii* Hook. f. --- *Polygonum calostachyum* Diels

植物名 美穗拳参《云南种录》

药材名 长梗拳参（拟）

文献名 长梗蓼《迪庆藏药》

功效 根茎：止寒泻，止痛。用于泻痢，腹痛。

#### 7057045

*Polygonum hastato-sagittatum* Makino

植物名 披针叶蓼《西藏植物志》

文献名 箭叶蓼《广西药录》

地方名 广西：水浸风（恭城），沙滩草（陆川），水流红（博白、陆川）。

功效 全草：用于蛇咬伤。

#### 7057046

*Polygonum hydropiper* L. --- *Persicaria hydropiper* Spach.

植物名 水蓼《纲目》、《高植图鉴》

药材名 辣蓼草《本草求真》、《中药大辞典》

文献名 蓼《诗经》，蓼、虞蓼、蓼虞《尔雅》，蓼实《本草》，泽蓼《尔雅》郭璞注），辛菜《说文》，蓼芽菜《救荒本草》，辣蓼、生草药性备要），蓼子《补缺肘后方》，水蓼子《东医宝鉴》，卜蓼《满洲植录》，苦蓼《福州草药》，竹叶菜《汉音韵府》，柳蓼、川蓼《植物学大辞典》，胡椒蓼《兴安植物志》，胡辣蓼《东北植物志》，辛蓼《诗草木今释》

地方名 水辣蓼（内蒙古、浙江），水胡椒（吉林、内蒙古），红辣蓼（湖北、广东、广西），斑焦草（湖南、广西），蓼子草（福建、四川），白辣蓼（陕西、甘肃、青海、广东）；辽宁：水公子，辣花子；内蒙古：“乌森-西莫勒德格”，“聂洛”（蒙名）；浙江：小叶辣蓼；安徽：辣蒿，辣蓼子棵，蓼蓼花；福建：打竹（三明），辛辣子（永安），辣草（清流），辣椒草（明溪）；湖北：小马蓼，辣蓼子（巴东）；广东：水流仙（湛江），马了（饶平），马了嫩（海丰、潮阳），马蓼嫩（汕头、海丰），白花马了梗（潮安、潮阳），白花马了嫩（潮阳），红马蓼（定安、屯昌），红脚马了嫩（南澳、潮安、潮州），红脚马蓼嫩（揭阳），乌记草（潮安、潮州），旱蓼（广州），红花竹菜（普宁）；广西：细辣蓼（梧州），柳辣草，假辣蓼，黄蓼（南宁），痛骨消（陆川）；四川：药蓼，红蓼子草、药蓼子草（重庆）；云南：蓼草（昆明），水荭花、红杆菜、酸杆草、撮期（红河），“牙坏狼”（西双版纳傣语），竹叶舒筋，辣子草（曲靖），辣柳草（保山）。

功效 根：除湿，祛风，活血，解毒。用于痢疾，泄泻，脘腹绞痛，风湿骨痛，月经不调，皮肤湿疹；果实：温中利水，破瘀散结。用于吐泻腹痛，癰积痞胀，水气浮肿，癰肿疮疡，瘰癧。

#### 7057047

*Polygonum hydropiper* L. var. *hispidum* (Hook. f.) Steward

植物名 粗毛水蓼《贵州植物志》

药材名 粗毛水蓼《贵州药录》

文献名 泽蓼、辣蓼《纲目》，水蓼《广西药录》

地方名 广西：小辣蓼。

功效 全草：除湿，化滞。用于痢疾，月经不调，肠炎，无名肿毒，瘰癧，皮肤瘙痒。

#### 7057048

*Polygonum japonicum* Meisn.

植物名 蚤茜蓼《浙南本草新编》

药材名 蚤茜草《本草拾遗》、《汇编》

文献名 紫蓼《花镜》

地方名 江苏：水虺蚣（连云港），香烛干子（六合）；四川：小蓼子草、红蓼子（重庆），六神曲子（成都），蓼子草；其他：辣蓼。

**功效** 全草：散寒，活血，止痢。用于腰膝寒痛，麻疹，菌痢。

## 7057049

*Polygonum jucundum* Meissn.

**植物名** 愉悦蓼(江苏植志)

**文献名** 显花蓼《药植简编》，紫苞蓼《云南种录》，山蓼《广西药录》

**地方名** 上海：蚕茧草；广西：五毒草(临群)。

**功效** 全草：用于痢疾，肠炎。外用于蛇、犬咬伤，湿疹，顽癣。

## 7057050

*Polygonum lanigerum* R. Br.

**植物名** 绵毛叶蓼(《滇南本草》整理本)

**文献名** 水红花子《云南种录》

**地方名** 云南：蓼子草。

**功效** 全株：除湿化滞，止痢杀虫，消炎解毒。

## 7057051

*Polygonum lapathifolium* L. --- *Polygonum nodosum*

Pers. --- *Persicaria nodosa* (Pers.) Opiz

**植物名** 酸模叶蓼《高植图鉴》

**药材名** 大马蓼《汇编》

**文献名** 猪蓼子草《分类草药性》，蓼草《汇编》，水红蓼子、辣蓼草子《商品名》《中药大辞典》

**地方名** 水红子(江苏、山东)，水红花子(黑龙江、河北、江苏、湖北)，水蓼(河北、江苏)，水辣蓼(广西、四川)，马蓼(吉林、江西)，蓼子草(江西、四川)，旱苗蓼(山东、江苏、江西、湖北、四川)，旱辣蓼(内蒙古、台湾)，辣蓼(江西、广东、广西、四川)，蛤蟆腿(东北)，节蓼(吉林、湖北、四川)；河北：水荭子(安国)，斑蓼；内蒙古：“乌合热·西莫勒德格”(蒙名)；江苏：龙贯(新沂)，白伴子(邳县)，羊腊杆子(仪征)；江西：红蓼(德兴)，辣椒草(奉新)；湖北：柳辣子(鹤峰)，红辣蓼(神农架)；广东：白辣蓼；广西：鱼蓼(龙州)，假辣蓼(陆川)；四川：小蓼子草、红蓼子(重庆)。

**功效** 全草：清热解毒，利湿止痒。用于肠炎，痢疾。外用于湿疹，颈淋巴结结核。

## 7057052

*Polygonum lapathifolium* L. var. *salicifolium* Sibth. ---

*P. nodosum* Pers. var. *incanum* Ledeb.

**植物名** 绵毛酸模叶蓼《湖北植志》

**药材名** 辣蓼草《江苏植药志》

**文献名** 辣蓼草子、水红蓼子《中药大辞典》，绵毛大马蓼《贵州植志》，柳叶大马蓼《云南种录》

**地方名** 辣蓼(福建、河南)，水红花子(江苏、河北)；江苏：[天仙子]；浙江：酸模叶蓼，旱苗蓼；福建：苦蓼；湖北：辣蓼子(神农架)；云南：大马蓼，白辣蓼。

**功效** 全草：清热解毒，消肿止痛。用于肿疡，痢疾，腹痛。

## 7057053

*Polygonum laxmanni* Lepech.

**植物名** 白山蓼《东北草本植志》

**药材名** 白山蓼《长白山植志》

**功效** 全草：发汗除湿，消食止泻。

## 7057054

*Polygonum longisetum* De Bruyn --- *P. caespitosum* Bl. var. *longisetum* (De Bruyn) Steward

**植物名** 长鬃蓼《秦岭植志》

**药材名** 马蓼《纲目》、《云南种录》

**文献名** 假长尾叶蓼《东北草本植志》，假长尾蓼《中药大辞典》，球花水蓼《广西植录》

**地方名** [辣蓼](江苏、浙江、贵州)；湖北：小蓼子草(神农架)；湖南：白辣蓼。

**功效** 全草：清热解毒，利湿止痒；种子：消痰破积，健脾利湿。

## 7057055

*Polygonum macranthum* Meisn.

**植物名** 大花蓼《贵州植志》

**药材名** 大花蓼《贵州药录》

**地方名** 贵州：双舒筋。

**功效** 全草：抗休克。用于昏厥。

## 7057056

*Polygonum macrophyllum* D. Don --- *P. aphaerostachyum* Meisn.

**植物名** 大叶蓼《中药大辞典》

**药材名** 蝎子七《陕西中草药》

**文献名** 球花蓼、《汇编》，球穗蓼《秦岭植志》，头花蓼《青藏药图》，圆穗蓼《湖北植志》

**地方名** 紫蓼、白粉(西北)；陕西：白蝎子七；青海：“拉冈”(藏名)；湖北：土蜂子、蜂子帽(巴东)；云南：草血竭，马腰老；西藏：拳参。

**功效** 根茎：清热解毒，散瘀止血。

## 7057057

*Polygonum mandshuricum* Skv.

**植物名** 普通蓼《东北草本植志》

**药材名** 普通蓼《长白山植志》

**地方名** 篇蓄(东北)。

**功效** 地上部分：清热，利尿，杀虫；根：外用于镇痛。

## 7057058

*Polygonum manshuriense* V. Petr. ex Komar. --- *Bistorta manshuriensis* Kom.

**植物名** 耳叶蓼《东北草本植志》

**药材名** 拳参《汇编》

**文献名** 耳叶拳参《吉野》，北拳参《东北植药图志》

**地方名** 倒根草(东北)，[重楼](吉林、辽宁)；吉林：“沙嘎普尔”(朝名)；四川：“那贡娃”(藏名)，[草河车]，紫参。

**功效** 根茎：有小毒。清热，解毒，消肿，止血。

## 7057059

*Polygonum microcephalum* D. Don

**植物名** 小头蓼《湖北植志》

**地方名** 湖北：蓼子草(神农架)。

**功效** 全草：清热解毒，止泻。

## 7057060

*Polygonum molle* D. Don

植物名 绢毛蓼《西藏植志》

药材名 绢毛蓼《广西药录》

功效 全草：用于痢疾、中毒。

#### 7057061

*Polygonum molle* D. Don var. *rude* (Meisn.) A. J. Li

*P. rude* Meisn.

植物名 倒毛蓼《西藏植志》

药材名 九牯牛(贵州)、《中药大辞典》

文献名 野蓼《药植简编》, 黑酸杆《云南种录》

地方名 云南：〔地柏〕, 羊耳朵, 酸兰, 蓼草。

功效 全草：通经, 镇痛。用于月经不调, 劳伤。

#### 7057062

*Polygonum multiflorum* Thunb.

植物名 何首乌《高植图鉴》

药材名 何首乌《何首乌传》、《药典》, 制何首乌、首乌藤《药典》

文献名 地精、野苗、交藤、夜合、桃柳藤《何首乌传》, 赤斂《理伤续断秘方》, 首乌《经验方》, 陈知白《开宝本草》, 红内消《外科精要》, 赤葛、九真藤《斗门方》, 山奴、山哥、山伯、山翁、山精、马肝石、疮帚《纲目》, 夜交藤《本经逢原》, 苘草、蛇草《汉音韵府》, 交茎、金香草《新纲》, 多花蓼《中国北部植图》, 蔓莪菜《牧野日图》, 夜交藤根《药材学》

地方名 黑首乌(安徽、河南), 棋藤(江苏、上海), 铁称陀(陕西、湖南、贵州), 九其藤、申枝莲(湖南、四川、贵州), 鲜首乌、制首乌、熟首乌(华东), 外红藤(湖北、湖南); 河北：山首乌; 甘肃：田猪头(文县); 青海：〔黄药子〕; 山东：赤首乌, 赤何首乌; 江苏：药乌藤(泰县), 药首乌(南京); 上海：其藤; 安徽：和尚乌, 望肿消; 福建：野番薯、野番茹(武平); 台湾：川七, 白鸡屎藤, 红骨蛇; 湖南：土豆箕(常德), 大犁头草、称托叶(黔阳), 叶菟兔、黎头青(邵阳), 鸡屎藤、秤陀消、犁口菜(凤凰), 何相公(安化), 伸头草(怀化、黔阳); 广东：土首乌(增城、罗定、乐昌、电白、阳江), 首红, 乌肝石, 红线藤, 红藤仔, 红藤头, 野黄茨, 野盘菜; 广西：千线藤(藤县), 发藤菜(兴安), 九贞藤, 挂犁青(资源); 四川：地八仙, 活苕藤(达县), 何首乌藤, 淫挖痞(峨眉山); 云南：小独根(临沧), 黄花乌根(红河), 紫乌藤(昆明), 血娃娃, 虎掌果蓼。

功效 块根：解毒, 消痈, 润肠通便。用于瘰癧疮痈, 风疹痒疹, 肠燥便秘, 高脂血症; 制何首乌：补肝肾, 益精血, 乌须发, 强筋骨。用于血虚萎黄, 眩晕耳鸣, 须发早白, 腰膝酸软, 肢体麻木, 崩漏带下, 久疟体虚, 高脂血症; 藤茎(首乌藤)：养血安神, 祛风通络。用于失眠多梦, 血虚身痛, 风湿痹痛。外用于皮肤痒疹。

#### 7057063

*Polygonum nepalense* Meisn. --- *P. alatum* Buch.-Ham. ex Spreng. --- *Polygonum alatum* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 尼泊尔蓼《高植图鉴》

文献名 野荞麦草《贵州植志》, 小猫眼、野荞子《汇编》

地方名 头状蓼(东北); 陕西：荞麦草; 湖北：水荞麦(兴山), 马蓼草(通山); 广西：山谷蓼; 四川：猫儿眼睛(峨眉山); 贵州：野荞菜。

功效 全草：收敛固肠。用于红白痢疾, 大便失常, 关节疼痛。

#### 7057064

*Polygonum niteus* (Fisch. et Mey.) Petrov

植物名 亮果蓼《中药通报》

药材名 拳参(甘肃、青海、新疆)

功效 根茎：清热, 解毒, 收敛。

#### 7057065

*Polygonum ochotense* V. Petr. ex Kom.

植物名 倒根蓼《东北草本植志》

药材名 拳参(吉林长白山)

文献名 白山拳参《东北植药图志》

地方名 倒根草(东北); 吉林：〔重楼〕。

功效 根茎：清热, 解毒, 收敛。

#### 7057066

*Polygonum orientale* L. --- *Polygonum orientale* L. var. *pilosa* Meisn. --- *Persicaria cochinchinensis* (Lour.) Kitag.

植物名 红蓼《高植图鉴》

药材名 水红子(滇南本草)、《药典》

文献名 游龙《诗经》, 荭、茺古《尔雅》, 荭草、鸿蔬《别录》, 龙薺《唐本草》, 大蓼、水荭《本草拾遗》, 白水荭苗、苕《救荒本草》, 蓼草《滇南本草》, 水荭子《本草衍义》, 水荭花《摘元方》, 荭草实《纲目》, 朱蓼《花镜》, 荭蓼《汉音韵府》, 苦苞蓼子草、薺、蓼花、何草花、狗尾巴花《植物名汇》, 大毛蓼《植物学大辞典》, 毛荭草《中草药学》, 东方蓼《中国药植志》, 东方马蓼《中国药植志》, 东方马蓼《古野》

地方名 九节龙(江西、湖南), 大叶辣蓼(浙江、福建), 水红(山东、江苏、安徽), 水红子(江苏、上海), 水红花(河北、内蒙古、新疆、山东、河南), 水荭米子、水蓬棵、红蓼花、蓼实、蓼实子(东北), 家蓼(新疆、四川), 大蓼子(安徽、四川), 家辣蓼(上海、湖北), 酒药草(上海、浙江); 吉林：狗尾巴吊, 蓼吊子; 河北：水萍花子、水萍吊子、狗尾巴花子(保定), 水蓬棵子; 内蒙古：“乌兰-混迪”、“出模塞”(蒙名); 陕西：老鸡腿、鸡大腿(户县、周至); 山东：水公子花(荣成), 河蓼子; 江苏：大蜈蚣(连云港), 水晶花(宝应), 狗条斗, 丁辣草子, 〔大仙子〕; 上海：川蓼子, 水红牛尾巴花, 风湿草, 龙骨头, 抱辣蓼草; 浙江：天红; 安徽：酒曲花, 大水红, 大麻, 水辣蓼子, 马蓼, 蓼子; 江西：高节风(吉水), 大红其(宜黄), 博节风(定南), 红曲草(婺源); 福建：八字蓼, 丹药头(松溪、政和), 节节风(光泽), 吊吊花(浦城), 骨子凤(宁化、清流), 辣蓼(周宁), 大号红辣蓼, 大叶红夹竹, 捣花; 河南：大红花, 山红花, 白胖蓼; 湖北：小马蓼(罗田), 泡米子, 散血七, 辣蓼子, 撞米子; 湖南：大接骨, 果麻, 追风草, 过节九节风(郴县), 毛腊叶(衡南), 红花草茎(汝桂), 〔血竭〕(常宁); 广东：大辣蓼(海南岛); 广西：飞毒草(乐业), 泡花(阳朔), 背花草(大瑶山), 塘边蓼(邕

宁),爆花子(全州),木蓼,水红花草;四川:家蓼子草(峨眉山);贵州:水泻花,水红花草;云南:红苕;其他:狼尾巴花。

功效 果实:散血消癥,消积止痛。用于癥瘕痞块,癰疽肿痛,食积不消,胃脘胀痛。

## 7057067

*Polygonum pacificum* V. Petr.

植物名 太平洋蓼《东北草本志》

文献名 心叶拳参《药植简编》

功效 根茎:清热解暑,凉血止血。

## 7057068

*Polygonum paleaceum* Wall.

植物名 草血竭《高植图鉴》

药材名 草血竭《滇南本草》、《汇编》

文献名 回头草、土血竭《滇南本草》,红茎蓼《四川中药志》,小公弓《汇编》

地方名 地蜂子(四川、云南),拳参(贵州、云南);湖北:蜂王七、牛儿大黄(神农架);四川:一口血,淫吃痞,地马蜂,迁头鸡,迁头鸡儿、老上蜂(西昌),口头鸡,蛇疙瘩(米易);贵州:血三七,〔地榆〕(遵义);云南:山高梁(昭通),弓腰老,老腰弓(临沧),地黑蜂、地蜈蚣(红河),黑地蜂,金黄鸡,凤凰鸡,救兵粮(丽江),观音倒座(保山、思茅、临沧),〔紫参〕(昆明),紫花根,睡头蜂,草子。

功效 根茎:破瘀,调经,止血,消食。用于跌打损伤,血瘀经闭,食积胃痛。外用于外伤出血。

## 7057069

*Polygonum paleaceum* Wall. var. *pubifolium* Sam.

植物名 毛叶草血竭《四川中药志》

功效 根茎:破瘀,调经,止血,消食。

## 7057070

*Polygonum palmatum* Dunn

植物名 掌叶蓼《贵州植志》

药材名 掌叶蓼《贵州药录》

地方名 湖南:蜀葵蓼;广西:屈草;贵州:大辣蓼,九龙头子;云南:猪草。

功效 全草:活血化瘀,清热利湿。用于血崩,吐血,衄血,外伤出血,赤痢,月经过多。

## 7057071

*Polygonum paniculatum* Blume var. *rude* (Meisn.) Steward

植物名 粗高山蓼《贵州植志》

地方名 贵州:九牯牛。

功效 全草:通经,镇痛。用于月经不调,跌打损伤。

## 7057072

*Polygonum perfoliatum* L.

植物名 杠板归《高植图鉴》

药材名 杠板归(龚廷贤《万病回春》)、《汇编》

文献名 〔雷公藤〕《救生苦海》,犁头刺藤《物理小识》,金须斜(汪连仕《采药书》),老虎刺《生草药性备要》,霹雳木、方胜板、倒金钩、烙铁草、倒挂紫金钩、犁

尖草、括把草、龙仙草、鱼尾花、三木棉《纲目拾遗》,刺犁头,蛇不过,急改索,退血草《名实图考》,虎舌草《天宝本草》,有笏犁牛草《岭南采药录》,老虎笏、花头公草《植物名汇》,赤辟荔、石见皮《新纲》,穿叶蓼、贯叶蓼《东北草本志》,有勒火炭藤《广西中药志》,急解索《汇编》

地方名 河白草、湖白草(华东),拉狗蛋(辽宁、内蒙古),蛇倒退(陕西、上海、安徽、湖北、广西、四川、贵州、云南),蛇牙草(广西、四川、云南),蛇退草(湖北、四川),〔犁头尖〕(江西、福建),〔犁头刺〕(福建、广西、四川),〔犁头草〕(浙江、福建),犁头藤(安徽、江西、福建),猫爪刺、猫抓刺(四川、云南),降龙草(陕西、湖北),倒挂金钩(上海、江西、四川),蛇不钻(湖北、湖南),老虎刺(湖南、广东);河北:蚂蚱腿;陕西:小白藤(南郑),小血藤、长虫草(宁强),蛇见退(镇坪、柞水),倒拉牛(卢氏);山东:拉拉秧(莒南),白拉秧(沂水);上海:水马铃;浙江:三角枫(浙东),七雷公藤;安徽:豆腐干草,珍珠藤,绿叶金珠,酸猫猫菜;江西:三角藤,豆干草,酸藤;福建:三角酸,有刺三角延酸(龙溪),有刺鸬鹚饭(福州、闽清、罗源),拦路虎,有刺犁头藤(福州、闽清、福清、莆田、仙游),蛇咬草、蛇茅草(明溪),蛇王藤(邵武、宁化),老虎舌(龙岩),猪母藤(清流),犁头标、羊不食、古诺饭(闽东),三角湖(大田),猴爬梯、猪母刺(三明),毕绞头(永安),蛇蜈藤、锯子棘、吊子草、翠子草、倒吊金钩、蛇麻药(宁化),串心草、蛇王草、犁嘴角草、犬脚骨、有刺犁头草、三角莲、三脚扒、三角盐酸、三脚蟹、三角符、虎鞭刺、吊钩刺(泉州);台湾:犁壁刺,犁壁藤;湖南:白大老、鸦酸(永顺),猫公刺(衡山、衡阳),鸟不喜(占丈),不重草(麻阳、黔阳),月斑鸠(花垣),猫仔刺(江华),猫化勒(衡山),鸡婆刺、急解锁、豆腐儿酸(溆浦),刺贯头、雷公刺、猫耳草(衡阳);广东:猫风车(梅县),刺老(潮安),花麦筋(翁源),大猫刺,〔白花蛇舌草〕;广西:有刺粪箕笃(南宁),倒爪莲、蚂蚱刺(桂林),甲鳝藤(昭平),蛇不过草(折城),一木两叶(贵县),〔白筋〕(北流、博白、陆川),白麦(龙州),大蜈蚣,大蜈脚,巴楂勒,马拉勒,狗利钱,蚂蚱筋,火炭藤,火轮箭,贡得红,青蛇丹;四川:大酸藤、拦蛇风、虎芽草、鱼牙草、狼牙草(成都),南蛇风;贵州:地葡萄(贵阳),刺马蹄,刺酸浆,酸米米,酸汤菜;云南:穿心草(红河),穿破叶。

功效 地上部分:利水消肿,清热解毒,止咳。用于肾炎水肿,上呼吸道感染,百日咳,泻痢,湿疹,疖肿,毒蛇咬伤;根:用于口疮,痔疮瘻管。

## 7057073

*Polygonum pergracile* Hemsl. --- *P. suffultum* Maxim. var. *pergracile* (Hemsl.) Samuelss.

植物名 细穗支柱蓼《湖北植志》

药材名 细拳参《云南种录》

文献名 细穗红三七《秦岭植志》,紫参《新中医药》

地方名 安徽:铁蜈蚣(黄山);湖北:算盘七,红三七。

功效 根茎:散瘀消肿,活血止痛,止血,止泻。用



于劳伤腰痛, 肿痛, 胃痛, 痢疾, 外伤出血及无名肿毒。

#### 7057074

*Polygonum persicaria* L. - *Persicaria vulgaris* Webb et Moq.

植物名 桃叶蓼《东北草本植志》  
药材名 马蓼《台湾药植志》  
文献名 青蓼、春蓼《花镜》  
地方名 四川: 蓼子草(成都); 其他: 牛耳朵菜, 野芥菜。  
功效 全草: 发汗除湿, 消食止泻。

#### 7057075

*Polygonum pinetorum* Hemsl.

植物名 松荫蓼《湖北植志》  
文献名 松林蓼《秦岭植志》, 峨眉蓼《峨眉药植研究》  
地方名 湖北: 降蛇草(神农架); 四川: 蓼子七(峨眉山)。  
功效 根茎: 祛风化痰; 全草: 清热解毒, 利湿。

#### 7057076

*Polygonum plebeium* R. Brown

植物名 米子蓼《广西药录》  
药材名 小篇蓄《湖北、湖南、四川、云南》、《汇编》  
文献名 腋花蓼《海南植志》, 铁马齿苋《云南种录》, 习见蓼《四川中药志》  
地方名 小叶扁蓄(四川、云南), 扁蓄(广东、广西、四川); 江苏: 猪牙草(铜山); 福建: 节节红、节节花、红节草(福清), 虱蓖草(漳浦); 湖南: 黑鱼草; 广东: 米碎草、糟麻草(惠阳); 广西: 地齿(藤县), 地兔草(宾林); 四川: 水扁蓄(西昌); 云南: 水米草, 汗多草, 细叶锅巴草, 姑巴草, 扁竹, 锅巴菜。  
功效 地上部分: 清热, 利尿, 杀虫。用于尿路感染, 黄疸, 湿疹, 女阴溃瘍, 阴道滴虫。

#### 7057077

*Polygonum polystachyum* Wall. ex Meisn.

植物名 多穗蓼《汇编》  
药材名 辣蓼《西藏中草》  
文献名 多枝蓼《药植简编》, 多穗假虎杖《云南种录》  
地方名 西藏: “恣恣萨曾”(藏名)  
功效 全草: 有小毒。除湿, 化滞。

#### 7057078

*Polygonum pseudopalmatum* Hoo

植物名 鸭脚蓼《广西药录》  
文献名 掌叶蓼《药植简编》  
地方名 广西: 鸭爪风、鸡爪风(苍梧), 鸭脚风(博白), 鹅掌风、水桐油(岑溪), 水木瓜(北流)。  
功效 全草: 拔毒。用于疮疡肿毒, 疥癬。

#### 7057079

*Polygonum pubescens* Blume - *Polygonum flaccidum* Meisn. - *Polygonum hydropiper* L. var. *flaccidum* (Meisn.) Steward

植物名 辣蓼《汇编》

药材名 辣蓼《汇编》

文献名 软茎水蓼《湖北植志》, 斑蕪草《中国药植图鉴》, 辣蓼草《江苏植药》, 垂蓼《云南种录》, 软水蓼《广西药录》

地方名 旱辣蓼、红辣蓼(广西、贵州); 江西: 辣马蓼, 辣椒草; 福建: 青蓼, 蝙蝠草(泉州); 贵州: 蓼子草, 辣柳草; 其他: 柔毛蓼

功效 全草: 有小毒。除湿, 化滞。用于痢疾, 肠炎, 食滞。外用于皮肤瘙痒, 灭蛆。

#### 7057080

*Polygonum runcinatum* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 缺腰叶蓼《中药大辞典》  
药材名 小翠药《西昌中草药》  
文献名 赤胫散《名实图考》, 皂角根《分类草药性》, 苦茶头草《中国药植图鉴》, 蛇头蓼《药植简编》, 羽叶蓼《西藏植志》

地方名 [九龙盘](广西、贵州、云南), 花蝴蝶(贵州、云南), 南蛇头、蛇头草(广西、云南); 湖北: 飞蛾七(恩施), 红花蓼(巴东), 晓叶七(鹤峰), 老牙齿(神农架); 湖南: 广川草, 田枯七, 莽黄连, 甜荞莲, 脚肿草; 广西: 头花痒(兴安), 盘脚莲(凤山), 蝴蝶草(临桂); 四川: 火炭母(西昌), 苗七(武隆), 花脸晕药, 红皂药; 贵州: 上三七, 花扁担, 花脸莽, 莽子连, 红泽兰, 花边蓼, 拐枣七, 鸡脚七, 散血丹, 散血莲; 云南: [血当归], 白当归, 草见血, 黄泽兰, “金拖火”(彝名), 野酸菜(玉溪、峨山), 草血血, 花叶天, 金不换, 狗酸特, 化血丹(昆明), 土竭力, 土血力

功效 根及全草: 清热解毒, 活血消肿。用于痢疾, 白带, 血热头痛, 红崩, 经闭, 虚火咳嗽, 赤白痢, 痈毒恶疮。

#### 7057081

*Polygonum runcinatum* Buch.-Ham. ex D. Don var. *corymbosum* Huang, ined.

植物名 伞房花缺腰叶蓼(拟)  
文献名 伞房花赤胫散《贵州植志》  
功效 根茎及全草: 消肿解毒。用于蛇咬伤, 疔疳。

#### 7057082

*Polygonum runcinatum* Buch.-Ham. ex D. Don var. *sinense* Hemsl.

植物名 华缺腰叶蓼《中药大辞典》  
药材名 赤胫散《名实图考》、《汇编》  
文献名 华赤胫散《湖北植志》, 花赤胫散《四川中药志》, 缺腰叶蓼《云南种录》, 苦茶头草《中国北部植图》, 中华赤胫散《峨眉药植研究》

地方名 花蝴蝶(广西、云南), 莽子莲(湖南、贵州); 湖北: 大莽花草(鹤峰), 莽子七(恩施), 莽叶七(五峰); 湖南: 广川草、甜荞莲(花垣), 田枯七(龙山), 花脚莽麦、亚腰山蓼(衡山), 莽黄连(永顺), 脚肿草(通道); 四川: 大猫花, 花脸晕药, 花蓼子草(峨眉山); 贵州: 土三七(惠水), 血结莲、散血连、红泽兰(遵义), 九龙盘, 花叶天, 花脸莽, 鸡脚七, 拐枣七, 散血丹; 云南: 花叶天、

草见血(曲靖), [金不换](思茅), 狗酸特(临沧), 黄泽兰(楚雄), 土血竭, 土竭力, 血当归, 蛇头蓼。

功效 根、全草: 清热解毒, 活血消肿。用于急性胃肠炎, 吐血咯血, 痔疮出血, 月经不调, 跌打损伤。外用于乳腺炎, 痈疖肿毒。

## 7057083

*Polygonum sagittatum* L. var. *paludosum* Kom. --- *P. paludosum* (Kom.) Kom. --- *Persicaria sieboldii* (Meisn.) Ohki var. *paludosa* (Kom.) Nakai ex Kitag.

植物名 沼地箭叶蓼《东北药用植物》

功效 果实或全草: 益气, 明目, 祛风, 除湿, 清热解毒, 消肿, 止痛, 止痒。用于风湿关节痛, 肠炎, 痢疾, 蛇、狗咬伤, 疮疖肿毒, 瘰癧, 带状疱疹, 湿疹, 皮炎, 皮肤瘙痒症, 痔疮。

## 7057084

*Polygonum sagittifolium* Levl. et Vant.

植物名 箭叶蓼《秦岭植志》

文献名 火箭叶蓼《湖北植志》, 戟叶扛板归《广西药录》

地方名 陕西: 蛇倒退(陕南); 湖北: 蛇见退(神农架); 广西: 蛇子草(富川); 贵州: 廊茵; 云南: 雀翅。

功效 全草: 清热解毒, 驱风除湿。用于蛇咬伤, 无名肿毒, 风湿关节炎。

## 7057085

*Polygonum senticosum* (Meisn.) Franch. et Sav.

植物名 刺蓼《高植图鉴》

药材名 刺蓼《汇编》

文献名 野荞麦、小青草藤《李氏草秘》, 廊茵《广西药录》

地方名 红火老鸦酸草、蛇不钻(江西、湖南); 吉林: 猫舌草; 甘肃: 南蛇草; 江西: 猫儿刺; 湖北: 红急解索, 急解索, 蛇倒退; 湖南: 石宗草(凤凰); 广西: 红花蛇不过。

功效 全草: 解毒消肿, 利湿止痒。外用于湿疹, 黄水疮, 疔疮, 痈疖, 蛇咬伤。

## 7057086

*Polygonum sibiricum* Laxm.

植物名 西伯利亚蓼《高植图鉴》

文献名 雀翅《拉汉种称补编》

地方名 剪刀股(河北、云南); 黑龙江: 驴耳朵; 河北: 牛鼻子; 内蒙古: “哈拉布达”(蒙名); 青海: “曲玛子”(藏名), 鸭子嘴。

功效 根茎: 清热, 泻腹水。用于恶性腹积水。

## 7057087 见 7057088a

## 7057088

*Polygonum sieboldii* Meisn.

植物名 雀翅《别录》、《秦岭植志》

药材名 箭叶蓼《汇编》

文献名 去母、更生《别录》, 秋雀翅《台湾药植志》, 小箭叶蓼《湖北植志》

地方名 台湾: 水红骨蛇; 湖北: 降龙草(神农架); 湖南: 大叶野荞草, 长野荞麦草, 荞麦刺; 四川: 走游草、钩

钩草(峨眉山); 贵州: 尖叶蓼。

功效 全草或果实: 祛风除湿, 清热解毒。用于风湿关节痛, 毒蛇咬伤, 湿疹, 黄水疮, 疔疮, 痈疖。

## 7057088a

*Polygonum sieboldii* (Meisn.) Ohki var. *brevifolia* --

*Persicaria sieboldii* (Meisn.) Ohki var. *brevifolia* Kitag.

植物名 短叶箭叶蓼《东北药用植物》

功效 果实或全草: 益气, 明目, 祛风, 除湿, 清热解毒, 消肿, 止痛, 止痒。用于风湿关节痛, 肠炎, 痢疾, 蛇、狗咬伤, 疮疖肿毒, 瘰癧, 带状疱疹, 湿疹, 皮炎, 皮肤瘙痒症, 痔疮。

## 7057089

*Polygonum statice* Levl.

植物名 矾松蓼《贵州植志》

药材名 矾松蓼《贵州药录》

地方名 贵州: 匙叶蓼。

功效 块状根茎: 清热解毒, 健脾, 理气, 消积, 止痛。用于消化不良, 胃脘胀满。

## 7057090

*Polygonum strigosum* R. Br. var. *muncatum* Meisn.

植物名 水湿蓼《贵州植志》

药材名 水湿蓼《贵州药录》

地方名 贵州: 细辣蓼草。

功效 全草: 用于胃痛。

## 7057091

*Polygonum suffultum* Maxim.

植物名 支柱蓼《高植图鉴》

药材名 支柱蓼《汇编》

文献名 紫参《本草图谱》

地方名 九牛港(湖北、四川), 红三七(陕西、甘肃、湖北), 算盘七(陕西、湖北、湖南、贵州), 蜈蚣七(陕西、湖南), 螺丝三七(浙江、安徽、湖北、贵州); 山西: 刀剪药(太行); 陕西: 小红粉、小蝎子七(太白), 九节犁(太白、柞水、山阳), 九节雷, 伞墩七, [桃耳七](凤县), 蓼子七、赶山鞭(太白、安康), 劳伤药; 甘肃: [朱砂七](文县); 浙江: 血三七(天目山), 螺蛳三七; 安徽: 荞麦三七; 湖北: 九节鞭(恩施), 鸡心七(巴东), 荞麦七(竹溪), 散血丹, 鸡血莲(神农架); 湖南: 钻山狗, 荞莲, 蜈蚣草, 野荞, 盘龙节, 盘龙七; 四川: 扭子七(重庆); 贵州: 九龙盘, 鸡血七, 紫参七。

功效 根茎: 散瘀止血, 理气止痛。用于跌打损伤, 腰痛, 胃痛, 崩漏, 外伤出血。

## 7057092

*Polygonum taipaisanense* Kung

植物名 太白蓼《秦岭植志》

地方名 陕西: 大红粉(太白山)。

功效 根茎: 清热解毒, 散瘀止血。用于痢疾, 血崩, 白带, 吐血, 外伤出血。

## 7057093

*Polygonum thunbergii* Sieb. et Zucc.

植物名 戟叶蓼《东北草本植志》

药材名 水麻芳《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 小青草藤、野荞麦(李氏草秘),小青草(高植图鉴),藏氏蓼(中国北部植图),苦荞(陕甘宁青中草药选)

地方名 鹿蹄草(江苏、台湾);台湾:水犁壁草;湖北:红拉拉草、红降龙草(神农架);湖南:凹叶蓼;广西:[苦荞麦]。

功效 全草:理气止痛,活血除湿,祛风。用于胃痛,风湿痹痛,虚劳腰痛。

#### 7057094

*Polygonum tinctorium* Ait.

植物名 蓼蓝(唐本草)、《高植图鉴》

药材名 蓼大青叶(药典),青黛(药性论)、(药典)

文献名 蓝、蓝实(本经),蓝子(本草经集注),染青草(唐韵),蓝淀(本草拾遗),靛青(普济方),蓝靛、靛花、青蛤粉(纲目),靛青(邓子禹家抄方),大青子、青黛实、花青、蓝青、淀花、螺子黛、螺儿青、螺青、罗青、青缸粉、蓝露(新纲),蓝叶(和汉药理学),靛草、蓝草(满鲜植汇),靛叶(汇编),[板蓝根](药植简编)

地方名 大青叶(东北、河北、广西、四川),小蓝、靛、蓼蓝叶(东北),蓝靛叶(北京、河北),靛青叶(河北、四川);河北:水红花子;山西:山蓝根叶,水红花叶;浙江:青板水辣蓼(临安);湖南:红脚辣蓼,红辣蓼,粗辣蓼,辣蓼,辣叶蓼。

功效 叶(蓼大青叶):清热解毒,凉血消斑。用于温病发热,发斑发疹,肺热喘咳,喉痹,疔腮,丹毒,痈肿;果实:清热,解毒。用于温病发斑,咽痛,疳蚀,肿毒,疮疖;青黛(叶的加工品):清热解毒,凉血,定惊。用于温毒发斑,血热吐衄,胸痛咳血,口疮,疔腮,喉痹,小儿惊风;蓝靛(叶加工制青黛时沉淀物):清热,解毒。用于时行热毒,疔疮痈肿,丹毒,疳蚀,天疱疮。

#### 7057095

*Polygonum tortuosum* D. Don --- *P. peregrinatoris* Pauls.

植物名 叉枝蓼(西藏植志)

地方名 西藏:“逆阿落”(藏名)。

功效 根:涩肠止痢。用于急慢性痢疾,肠炎。

#### 7057096

*Polygonum urophyllum* Bur. et Franch.

植物名 硬枝万年荞(云南种录)

地方名 云南:[土茯苓](峨山)。

功效 块根:用于痢疾,腹泻。

#### 7057097

*Polygonum viscosum* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 粘毛蓼(高植图鉴)

药材名 香蓼(广西药录)

地方名 江苏:粘液蓼(南京、吴县);广西:水毛蓼(南宁);贵州:毛苦蓼;云南:红杆蓼(大理)。

功效 茎、叶:用于风湿骨痛,肠胃炎。

#### 7057098

*Polygonum viviparum* L. --- *Bistorta vivipara* S. F. Gray

植物名 珠芽蓼(高植图鉴)

药材名 珠芽蓼(汇编)

文献名 石风丹(名实图考),一口血草(中国北部植

图),紫参(和汉药理学),零余子蓼(拉汉种称),珠芽拳蓼(吉野)

地方名 拳参(甘肃、青海、新疆),草河车(吉林、内蒙古、青海),山高梁(内蒙古、云南),猴子七(陕西、湖北);陕西:红粉(旬阳),白粉(太白、佛坪、洋县、周至),蝎子七(太白、佛坪),红蝎子七、大红粉(太白),猴耳七(凤县),劳伤药;甘肃:[朱砂七](文县),野高粱;青海:“然布”、“然普”(藏名),染布子;湖北:转珠莲(巴东),蜂子七、地龙珠、单兵救主(神农架);四川:铁马鞭、一口血(峨边);云南:蛇枪塔、地黑蜂(峨山);其他:猴娃七、剪刀七。

功效 根茎:清热解毒,散瘀止血。用于扁桃腺炎,咽喉炎,肠炎,痢疾,白带,崩漏,便血。外用于跌打损伤,痈疽肿毒,外伤出血。

#### 7057099

*Pteroxygonum giraldii* Drumm. et Diels

植物名 翼蓼(高植图鉴)

药材名 红药子(西北)(汇编)

文献名 赤药、红腰子(简明中医辞典)

地方名 [何首乌](甘肃、宁夏),红腰子(陕西、河南),黑驴蛋(山西、河南),[白药子](西北);陕西:红药(汉中),荞麦头(佛坪),荞麦蔓(旬阳),石天养,荞麦七,金荞仁(华山);湖北:朱砂莲(神农架)。

功效 块根:清热,解毒,止血,止痛。用于肠炎,痢疾,腰腿痛,便血,崩漏。外用于烧、烫伤,疮疖,狂犬咬伤。

备考 本品块根断面鲜时色白,干时变红,白药子、红药子之名即由而来,但本品与古本草中之“秦州红药”有别。

#### 7057100

*Rheum acuminatum* Hook. f. et Thoms.

植物名 心叶大黄(云南种录)

文献名 亚大黄、中大黄(中草药)

地方名 云南:渐尖大黄,大黄;西藏:“曲只”、“曲什扎”(藏名)。

功效 根:泻下,消炎,健胃,通经,利尿消肿,祛瘀血。用于便秘,黄疸,肿毒。

#### 7057101

*Rheum alexandrae* Batal.

植物名 水黄(植分学报)

文献名 苞叶大黄(云南种录)

地方名 云南:葛叶大黄,大黄。

功效 根:消炎,止痢,外用止血,并稍有泻下作用。

#### 7057102

*Rheum altaicum* A. Los.

植物名 阿尔太大黄(品种论述)

地方名 新疆:大黄。

功效 根茎及根:消炎,止血。用于疮疖痈肿。

#### 7057103

*Rheum delavayi* Franch.

植物名 滇边大黄(植分学报)

药材名 白小黄(云南丽江)、《汇编》

地方名 云南:“打瞎呈拍”(纳西族语),沙七(中甸),小大黄,牛尾七。

功效 根:清热消炎,止血生肌。用于肺热咳嗽,咽喉疼痛,大便下血,外伤出血,骨折,跌打扭伤,风湿痹痛。

#### 7057104

*Rheum emodin* Wall.

植物名 藏边大黄《西藏植志》

药材名 藏边大黄《中药志》

文献名 印度大黄《形性鉴别》,山大黄《品种论述》

地方名 云南:大黄,大岩七,牛尾七,白牛尾七;西藏:“曲扎”、“秋扎”(藏名)。

功效 根:清热解毒,止血,生肌。用于肺热咳嗽,咽喉痛,大便下血,痢肿疮毒,外伤出血。

#### 7057105

*Rheum forrestii* Diels

植物名 牛尾七《云南种录》

文献名 红牛尾七《汇编》,山大黄《品种论述》

地方名 四川:马蹄乌,小大黄(木里),红马蹄草、马蹄窝(峨眉山);云南:土大黄(东山),雪三七,小黄(大理、洱沅),大黄。

功效 根:舒筋活血,止血,清热。

#### 7057106

*Rheum franzenbachii* Munt.

植物名 华北大黄《植分学报》

药材名 山大黄(东北、华北)、《汇编》

文献名 野大黄、酸酸草、黄占卵子《沙漠药植》,波叶大黄《中国药植志》,苦大黄《品种论述》

地方名 大黄(河北、山西),籽黄(河北、山西、内蒙古),土大黄(东北、内蒙古);吉林:北大黄;河北:祁黄(安国);山西:台黄(小五台山、雁北);内蒙古:“格西古纳”、“可逊内”、“米木沙匠泽”(蒙名);其他:河北大黄。

功效 根及根茎:泻热通便,行瘀破滞。用于大便秘结,经闭腹痛,湿热黄疸。外用于口疮糜烂,烫火伤。

#### 7057107

*Rheum hotaoense* C. Y. Chen et C. T. Kao

植物名 河套大黄《植分学报》

文献名 波叶大黄《药学报》,山大黄《中药通报》

备考 本品在临床上代大黄配方使用,仅作兽药用。经药理实验,所含的成分 rapontin 对实验性高脂血症家兔和正常家兔,都能显著地降低其血清中总脂、总胆固醇、甘油三酯和 $\beta$ 脂蛋白(LDL),提高实验性高脂血症家兔血清中 $\alpha$ 蛋白(HDL)和磷脂,提高正常家兔血清中 $\alpha$ 脂蛋白,对磷脂无显著影响。

#### 7057108

*Rheum inopinatum* Prain

植物名 红脉大黄《西藏植志》

文献名 “曲什札”(藏名)《晶珠本草》,亚大黄、中大黄《中草药》

功效 根:藏医作大黄之中品入药。清热毒,泻疫病。用于热性病,疮疖痢肿。

#### 7057109

*Rheum likiangense* G. Sam.

植物名 丽江大黄《植分学报》

文献名 山大黄《品种论述》,墨七《云南种录》

地方名 云南:雪三七。

功效 根:舒筋活血,止血,清热。用于咽喉痛,腮腺炎,大便秘结,跌打损伤,外伤出血。

备考 有人主张将 *Rheum forrestii* Diels 与 *R. ovatum* C. Y. Cheng et C. T. Kao 同作 *R. likiangense* G. Sam. 的异名处理,是否合适,尚待进一步研究。

#### 7057110

*Rheum moorecroftianum* Royle

植物名 卵果大黄《西藏植志》

文献名 藏北大黄《品种论述》,长穗大黄、亚大黄、中大黄《中草药》,“曲什札”(藏名)《晶珠本草》

地方名 西藏:大黄。

功效 根茎及根:消炎,止血。用于疮疖痢肿。

#### 7057111

*Rheum nobile* Hook. f. et Thoms.

植物名 塔黄《西藏植志》

药材名 塔黄《汇编》

文献名 高山大黄《药植简编》

地方名 西藏:“曲玛子”(藏名)。

功效 根茎:泻实热,破积滞,行瘀血。用于实热便秘,谵语发狂,食积痞满,痢疾,腹痛后重,湿热发黄,水肿,目赤头痛,闭经。外用于痈肿疔毒,烫火伤等。

#### 7057112

*Rheum officinale* Baill.

植物名 药用大黄《植分学报》

药材名 大黄《本经》、《药典》

文献名 黄良、火参、肤如《吴普本草》,将军《别录》,蜀大黄《药性论》,锦纹大黄《千金方》,大黄茎《唐本草》,牛舌大黄、锦文《纲目》,无声虎、锦庄黄、破门《新纲》,马蹄大黄《华北药志》,川军、锦纹《和汉药植》,上海大黄、广东大黄、云南大黄(徐《生药》),南大黄、大大黄《中国药植志》,马蹄黄《形性鉴别》,药大黄《药材学》,四川大黄《中药志》,雅黄《品种论述》,生军、西大黄、熟大黄、制军《常用中药名辨》,酒大黄、熟大黄、大黄炭《药典》

地方名 湖北:土大黄(巴东、利川);湖南:川大黄;四川:紫茎大黄,马绵黄。

功效 根、根茎:泻热通便,凉血解毒,逐瘀通经。用于实热便秘,积滞腹痛,泻痢不爽,湿热黄疸,血热吐衄,目赤,咽肿,肠痈腹痛,痢肿疔疮,瘀血经闭,跌打损伤。外用于水火烫伤,上消化道出血;酒大黄:善清上焦血分热毒。用于目赤咽肿,齿龈肿痛;熟大黄:泻下力缓,泻火解毒。用于火毒疮疡;大黄炭:凉血化瘀止血。用于血热有瘀血症。

#### 7057113

*Rheum ovatum* C. Y. Cheng et C. T. Kao

植物名 卵叶大黄《中草药》

文献名 “曲什札”(藏名)《晶珠本草》,亚大黄、中大

黄《中草药》。

功效 根：清热毒，泻疫痢。

#### 7057114

*Rheum palmatum* L.

植物名 掌叶大黄《高僧图鉴》

药材名 大黄《本经》、《药典》

文献名 火参、肤如、黄良《吴普本草》，将军《别录》，锦纹大黄《千金方》，上蕃大黄《图经》，“君母扎”、“君扎”、“竣章”、“拉竣”（藏名）《晶珠本草》，川军、酒军、锦纹、雅黄《药材学》，枫叶大黄、天水大黄、西宁大黄《中药志》，葵叶大黄《中草药学》，北大黄、凉州大黄、凉黄、狗头大黄、河州大黄、岷县大黄、铨水大黄、清水大黄、庄浪大黄《中药大辞典》，蛋吉、中吉、西宁蛋吉、西宁中吉、西宁箱片、苏吉、开片大黄、文县中吉、文县片、文片大黄《中药材》，酒大黄、熟大黄、大黄炭《药典》，生军、西大黄、西锦纹、纹、熟军、制军《常用中药名辨》

地方名 青海：“君本扎”（藏名）；湖北：金大黄（利川）；四川：“金木扎”（藏名）；西藏：“峻”、“金木”、“君只”（藏名）；其他：香大黄。

功效 根、根茎：泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痛腹痛，痢肿疔疮，瘀血经闭，跌打损伤。外用于水火烫伤，上消化道出血；酒大黄：善清上焦血分热毒。用于目赤咽肿，齿龈肿痛；熟大黄：泻下力缓，泻火解毒。用于火毒疮疡；大黄炭：凉血化瘀止血。用于血热有瘀出血症。

#### 7057115

*Rheum pumilum* Maxim.

植物名 小大黄《西藏植志》

文献名 “曲玛孜”（藏名）《晶珠本草》，次大黄、白大黄《中草药》

地方名 矮大黄（西北）。

功效 根：清热，泻腹水。用于恶性腹积水。

#### 7057116

*Rheum reticulatum* A. Los.

植物名 网脉大黄《品种论述》

文献名 “曲什扎”（藏名）《晶珠本草》，亚大黄、中大黄《中草药》

地方名 大黄（甘肃、青海、新疆、四川、西藏）。

功效 根茎及根：消炎，止血。用于疮疖痈肿。

#### 7057117

*Rheum scaberrimum* Lingelsh.

植物名 歧穗大黄《植分学报》

文献名 “曲只”、“曲什扎”（藏名）、亚大黄、中大黄《中草药》

功效 根：泻下，消炎，健胃，通经，利尿消肿，祛瘀。外用于止血，疮痈。

#### 7057118

*Rheum spiciforme* Royle

植物名 穗序大黄《植分学报》

文献名 “曲什扎”（藏名）《晶珠本草》，“曲只”（藏名）《中药通报》，亚大黄、中大黄《中草药》

功效 根：泻下，消炎，健胃，通经，利尿消肿，祛瘀。

#### 7057119

*Rheum tanguticum* Maxim. ex Balf. --- *R. palmatum* L. var. *tanguticum* Maxim. ex Regel

植物名 唐古特大黄《药典》

药材名 大黄《本经》、《药典》

文献名 锦纹大黄、香大黄《华北药察》，土番大黄、西藏大黄（徐《生药》），瓜叶天黄、野黄、唐固大黄（楼《生药》），甘肃大黄《药材学》，铨水大黄《中药志》，西宁大黄《药植简编》，鸡爪大黄《汇编》，北大黄《中药大辞典》，马蹄大黄《中草药学》，西大黄、西锦纹、熟军、制军、制大黄《常用中药名辨》，酒大黄、熟大黄、大黄炭《药典》

地方名 蛋吉、中吉、苏吉（西北）；青海：代黄，“金木”（藏名），青海大黄；其他：突厥掌叶大黄。

功效 根、根茎：泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痛腹痛，痢肿疔疮，瘀血经闭，跌打损伤。外用于水火烫伤，上消化道出血；酒大黄：善清上焦血分热毒。用于目赤咽肿，齿龈肿痛；熟大黄：泻下力缓，泻火解毒。用于火毒疮疡；大黄炭：凉血化瘀止血。用于血热有瘀出血症。

#### 7057120

*Rheum tibeticum* Maxim.

植物名 西藏大黄《西藏植志》

文献名 “君母扎”（藏名）《晶珠本草》

功效 根：泻实热，下积滞，行瘀，解毒。

#### 7057121

*Rheum undulatum* L.

植物名 波叶大黄《植分学报》

药材名 山大黄（东北）

文献名 峪黄、土大黄、芋大黄《药材学》

功效 根及根茎：泻热通便，行瘀破滞。

#### 7057122

*Rheum uninerve* Maxim.

植物名 单脉大黄《植分学报》

功效 根：泻热通便，行瘀破滞。

#### 7057123

*Rheum webbianum* Royle

植物名 喜马拉雅大黄《西藏植志》

文献名 “君母扎”、“君扎”、“竣章”、“竣”、“拉峻”（藏名）《晶珠本草》

地方名 西藏：“扎”、“君扎当吾”〔茎〕、“君扎洛玛”〔叶〕（藏名）。

功效 根：泻实热，下积滞，行瘀，解毒。

#### 7057124

*Rheum wittrochii* Lundstr.

植物名 天山大黄《植分学报》

药材名 新疆大黄《汇编》

文献名 山大黄《中药通报》

地方名 新疆：“热万”（维名），大黄。

功效 根、茎：泻实热，下积滞，行瘀，解毒。

## 7057125

*Rumex acetosa* L.

植物名 酸模(高植图鉴)

药材名 酸模(本草经集注)、《汇编》

文献名 莫《诗经》、须、蓬莠《尔雅》、山大黄、当药、酸模叶(本草拾遗)、山羊蹄、酸母(纲目)、莫菜(食物本草)、酸迷、乾绎(诗毛氏传疏)、醋醋流(尔雅义疏)、酸羊蹄(食用植物图说)、莠、牛舌实、杜鸡脚黄连(新纲)

地方名 土大黄(山西、山东、浙江、安徽、湖北、贵州)、牛耳大黄(湖北、贵州)、牛舌头棵(安徽、河南)、水芥菜、酸不溜、酸鸡溜(东北)、酸姜、酸溜溜(东北、山西、山东)、羊蹄叶(黑龙江、吉林、河北)、黑龙江：酸巴浆；吉林：“少捞基”(朝名)；北京：牛虱子棵(京郊)；天津：车后子；山西：牛舌头；陕西：小红根(太白山)；醋缸；山东：山菠菜(烟台)、山酸溜(牙山)；浙江：[土黄连]、鸡爪黄连、[鸡脚黄连](海门)、[鸡爪连]、野菠菜、酸黄、酸津津、酸株草；安徽：水黄连、牛舌头母子、酸木通、酸气杆、酸梗；江西：活血连；福建：山菠菜(龙海)；河南：打锣锤、猪耳根棵；湖北：九牛子、红酸模、[金不换](巴东)、酸味子、黄叶(神农架)；湖南：[大黄](大庸)、大山七、山牛舌菜、野羊蹄(衡山)、水牛舌头、田鸡脚(凤凰)；广西：瓣草；四川：“切马子”(藏名)、早熟土大黄；贵州：枣儿红、黄根根、酸汤菜、大黄药菜。

功效 根、全草：凉血，解毒，通便，杀虫。用于内出血、痢疾、便秘、内痔出血。外用于疥癣、疔疮、神经性皮炎、湿疹。

## 7057126

*Rumex acetosella* L.

植物名 小酸模(东北草木植志)

药材名 小酸模(台湾药植志)

文献名 封《江苏植录》

地方名 山东：小酸溜(牙山)、土大黄(崂山)、酸溜溜(昆嵛山、莒南)。

功效 叶、根：行血；全草：利尿。

## 7057127

*Rumex aquaticus* L.

植物名 水生酸模(湖北植志)

文献名 土大黄(纲目)、羊蹄(新纲)

地方名 湖北：牛耳大黄(恩施)、[金不换](巴东)。

功效 根：用于消化不良、急性肝炎、血崩。

## 7057128

*Rumex chalepensis* Mill.

植物名 红丝酸模(中药志)

文献名 乳突叶酸模、牛西西(汇编)、中亚酸模(湖北植志)

地方名 血当归(江西、中南)、血三七、止血草(江西、广东)、红筋大黄(浙江、江西)、金不换(华东、中南)、土大黄(中南)；江西：化血莲；广西：散血七、血丝大黄；四川：大晕药。

功效 根：清热解毒，止血，祛瘀，通便，杀虫。用于功能性子宫出血、吐血、咯血、鼻衄、牙龈出血、胃、

十二指肠出血、使血、紫癜、便秘、水肿、外用于疥癣、疮疖、脂溢性皮炎。

## 7057129

*Rumex collosus* Rech.

植物名 硬质酸模(品种论述)

地方名 土大黄(东北)；吉林：野川军(通化)；辽宁：野军(营口)。

功效 根和根茎：消炎，止痢。外用于止血。

## 7057130

*Rumex crispus* L.

植物名 皱叶酸模(高植图鉴)

药材名 羊蹄(本经)、《汇编》

文献名 蓬(诗经)、牛薺(陆玑《诗疏》)、鬼目、东方宿、连虫陆(本经)、薺(别录)、秃菜(本草经集注)、羊蹄大黄(庚辛玉册)、败毒菜、牛舌菜、水黄芹、金荞麦(纲目)、草薺(尔雅义疏)、牛耳大黄(草木便方)、羊蹄草(天宝本草)、薺、非根(新纲)、[土黄连](和汉药理学)、蓬子(满鲜植汇)、皱叶羊蹄(种分)、牛舌薺(中草药学)、杜大黄(中国药学杂志)

地方名 土大黄(北京、内蒙古、西北、湖北、四川、贵州)、牛舌头(东北、四川)、羊蹄叶(东北、甘肃)、山大黄、山羊蹄(东北)、野大黄(湖北、四川)；辽宁：野军(营口)；吉林：羊蹄根、野川军(通化)；北京：牛舌秧根、牛舌；河北：牛舌棵、牛舌头棵；山西：[鲜大黄](天台)；内蒙古：山荞麦、“胡日根-齐合”、“达干奇赫”(蒙名)、“曲诺扎”(阿左旗蒙名)；陕西：[金不换](陕南)、酸桶、醋桶；甘肃：驴耳朵、苛踏叶；青海：“甲肖”(藏名)；新疆：“哈尔锡孔”、“耶日力克热万”(维名)；江苏：土大黄根；江西：牛舌头菜；福建：水飞龙、牛嘴舌、犬嘴舌(闽东)；台湾：壳菜；湖北：牛舌条大黄(均县)、水大黄；湖南：牛舌大王；广东：雀麦花；广西：野当归(全州)、土当归、黑当归；四川：火风堂(重庆)、四季菜根、掉堂根；贵州：牛舌片、牛屎片；其他：羊舌头、野菠菜。

功效 根、叶、全草：有小毒。清热解毒，止血，通便，杀虫。用于鼻出血、功能性子宫出血、血小板减少性紫癜、慢性肝炎、肛门周围炎、大便秘结。外用于外痔、急性乳腺炎、黄水疮、疖肿、皮炎。

## 7057131

*Rumex dentatus* L.

植物名 齿果酸模(高植图鉴)

药材名 牛舌草(江苏药材志)

文献名 羊蹄大黄(图经)、羊蹄、齿果羊蹄(种分学)

地方名 土大黄(江苏、云南)；江苏：牛舌棵子(铜山)、野甜菜(如东)、土王根、牛舌头棵；湖北：[大黄](宣恩)；四川：牛耳大黄。

功效 根、叶、全草：有小毒。清热解毒，止血，通便，杀虫。

## 7057132

*Rumex gmelinei* Turcz.

植物名 毛脉酸模(东北草木植志)

地方名 黑龙江：洋铁叶、羊蹄叶。

功效 根：清热，解毒，消肿。外用于疥癣、痈肿疮

毒。

7057133

*Rumex hastatus* D. Don

植物名 戟叶酸模《云南种录》

药材名 川滇土大黄《云南种录》

文献名 线叶酸模《西昌中草药》, 土大黄《汇编》, 川滇酸模《品种论述》, 细叶酸模《贵州植志》

地方名 四川: 大酸浆草、大酸酸(会理), 草麻黄(西昌), 大酸酸草; 云南: “娃梯格来母”(楚雄彝名), 酸浆草(禄劝), 土麻黄, 老车武草, 豹子离, 野麻黄。

功效 全草: 发汗解表, 润肺止咳。用于感冒, 咳嗽, 水肿, 痰喘。

7057134

*Rumex japonicus* Houtt.

植物名 羊蹄《高植图鉴》

药材名 羊蹄《本经》、《汇编》

文献名 蓬《诗经》, 恶菜蕪《行诗传》, 东方宿、连虫陆、鬼目《本经》, 蕪《别录》, 牛蕪(陆玑《诗疏》), 秃菜《本草经集注》, 羊蹄实《唐本草》, 羊蹄叶《日华子本草》, 羊蹄根《图经》, 猪耳朵《救荒本草》, 败毒菜根《永类铃方》, 羊蹄大黄《庚辛玉册》, 牛舌根《镇江府志》, 败毒菜、牛舌菜、水黄芹、金荞麦《纲目》, 牛舌大黄《名实图考》, 蕪、金荞、菲根、羊蹄菜《新纲》, 鸡脚大黄《中药大辞典》, 羊蹄酸模《中药材》, 牛西西《汇编》

地方名 山东: 安大(安徽、福建), 野大黄(陕西、浙江), 野菠菜(陕西、山东、江苏、上海、安徽), [金不换](江西、福建、湖南), 牛舌条(江西、安徽、湖南), 土大黄、牛舌头(华东、中南), 牛大黄(湖南、广东), 野当归(江西、广东), 癣药(福建、广西), 牛舌头草(上海、江西); 陕西: 苛踏叶; 山东: 羊皮叶(烟台); 上海: 羊耳朵, 大头黄, 秃头菜, 羊舌头根; 浙江: 羊舌头(淳安、宁波), 老鸦酸、酸梗(嵊县), 秋棠(温州、泰顺), 秃菜(洞头), 烧黄头(文成), 雪糖菜、猪母叶(平阳、泰顺), 癣大黄(泰顺), 癣黄(永嘉); 安徽: 狭叶土大黄, 牛舌头棵; 江西: 盐癣草(赣州), 盐癣麻子(泰和), 鲜大青叶(德兴); 福建: 山萝卜, 山菠菜(厦门), 野萝卜(福州、闽侯、厦门、永安、南平), 野蒺藜(漳州、厦门), 癣草(安溪、南安、晋江、德化); 广西: [大黄](玉林), 水大黄(南宁); 其他: 牛舌片, 野蒼达。

功效 根、叶、全草: 有小毒。清热解毒, 止血, 通便, 杀虫。用于鼻出血, 功能性子宫出血, 血小板减少性紫癜, 慢性肝炎, 肛门周围炎, 大便秘结。外用于外痔, 急性乳腺炎, 黄水疮, 疖肿, 皮炎。

7057135

*Rumex japonicus* Houtt. var. *hydrocarpus* (Rich. f.) A. J. Li

植物名 河北酸模《中药通报》

药材名 牛西西《药学报》

功效 根: 清热, 凉血, 止血。

7057136

*Rumex maritimus* L. --- *Rumex chinensis* Champ.

植物名 长刺酸模《东北草本植志》

文献名 酸模《名实图考》, 海羊蹄叶《兴安植群》, 海滨酸模《江苏植志》, 海滨羊蹄《云南种录》, 皱叶羊蹄《广西中草药》, 华酸模《品种论述》

地方名 连明子(东北、台湾), 羊蹄根(广西、四川), 土大黄(广西、云南); 广东: 假菠菜, 牛大黄、癣药(惠阳); 广西: 牛舌菜, 山角菜, 千年不烂心, 野萝卜, 野菠菜, 野当归, 标马醉, 假大黄, 癣药草; 四川: 牛耳大黄, [地黄](成都)。

功效 全草: 清热凉血, 解毒杀虫。用于肺结核咯血, 痔疮出血, 痢疮疖肿, 皮肤瘙痒, 跌打肿痛; 根: 外用于疥癣。

7057137

*Rumex nepalensis* Spreng.

植物名 尼泊尔酸模《高植图鉴》

药材名 牛耳大黄《四川中药志》

文献名 羊蹄《本经》, 羊蹄实《唐本草》, 羊蹄叶《日华子本草》, 羊蹄根、土大黄、秃叶、天王叶《滇南本草》, 牛耳酸模《汇编》, 尼泊尔羊蹄《中药大辞典》

地方名 牛舌头(西北、西南); 青海: “肖芒”(藏名); 贵州: 牛舌片; 云南: 山大黄、牛大黄、牛舌头叶(红河), 金不换; 西藏: “畜买恩”(藏名)。

功效 根、叶、果实: 清热解毒, 凉血止血, 通便, 杀虫。用于肺结核咳血, 急性肝炎痢疾, 便秘, 功能性子宫出血, 痔疮出血, 痢疮疮疡。外用于腮腺炎, 神经性皮炎, 疥癣, 烧伤, 外伤出血。

7057138

*Rumex obtusifolius* L. --- *R. madaio* Makino --- *R. daiwoo* Makino

植物名 钝叶酸模《中药志》

药材名 土大黄《图经》、《汇编》

文献名 吐血草、箭头草(汪连仕《采药书》), [金不换]、救命王、金不换叶、死里逃生《纲目拾遗》, 土大黄叶《名实图考》, 野蒿菜《中医药实验研究》, 大黄酸模《江苏植志》

地方名 火晕药、铁蒲扇(西南), 牛舌头棵(安徽、河南), 血三七(湖南、四川), 血当归(湖南、广东), 红筋大黄(湖北、贵州), [土当归](江西、湖南), 化血莲(江西、四川); 山东: [肺形草](济南); 江苏: [鲜大青](苏州); 浙江: 鲜大黄(乐清); 安徽: [土黄连], 白七; 江西: 野当归(泰和), 绿当归; 福建: [广角], 包金莲, 野菠菜, 野蒼达, 野萝卜; 河南: 酸菠菜; 湖北: 红筋土大黄; 湖南: [田三七](新邵), 活血丹(衡山), [土三七], 止血草, 牛大黄(长沙), 萝卜奇, 癣药; 四川: 血筋大黄。

功效 根、叶: 清热解毒, 止血, 祛瘀, 通便, 杀虫。用于肺脓疡, 肺结核咯血, 衄血, 流行性乙型脑炎, 急性慢性肝炎, 便秘。外用于跌打损伤, 烧烫伤, 痢疾肿毒, 流行性腮腺炎, 疥疮, 湿疹, 皮炎。

7057139

*Rumex patientia* L.

植物名 巴天酸模《高植图鉴》

药材名 牛西西(天津、江西)、《汇编》

文献名 牛耳酸模《秦岭植志》, 针刺酸模《陕西中草

药), 菠菜酸模《经济植物学》, 牛舌棵《中草药学》

地方名 羊蹄、羊铁叶(东北), 土大黄(北京、河北、陕西、青海); 河北: 山大黄, 牛虱子棵, 羊蹄菜, 癯大黄; 陕西: 水大黄、牛耳大黄(平利), 金不换; 野大救驾(镇坪); 青海: “曲什扎”(藏名); 湖北: 牛大黄(巴东); 西藏: “畜买恩”(藏名)。

功效 根: 凉血止血, 清热解毒, 杀虫。用于功能性子宫出血, 吐血, 咯血, 鼻衄, 牙龈出血, 胃、十二指肠出血, 便血, 紫癜, 便秘, 水肿。外用于疥癣, 疮疖, 脂溢性皮炎。

#### 7057140

*Rumex patientia* L. ssp. *tibeticus* (Rech. f.) Rech. f

植物名 西藏巴天酸模《西藏植志》

药材名 西藏酸模《中药志》

功效 根: 有小毒。清热解毒, 止血, 通便, 杀虫

#### 7057141

*Rumex patientia* var. *callosus* F. Schm. ex Maxim. ---

*R. callosus* (F. Schm.) Rech.

植物名 洋铁酸模《东北草本植志》

药材名 洋铁酸模《长白山植药志》

地方名 洋铁叶、羊蹄(东北); 吉林: 巴天酸模。

功效 根、全草: 用于吐血, 咯血, 鼻衄, 牙龈出血, 胃、十二指肠出血, 功能性子宫出血, 便血, 紫癜, 便秘, 水肿。外用于疥癣, 疮疖, 脂溢性皮炎, 银屑病。

#### 7057142

*Rumex remotiflorus* Sam.

植物名 疏花酸模《云南种录》

文献名 牛耳大黄《西昌中草药》

功效 根: 清热解毒, 活血消肿, 通便, 除湿热。用于湿热下痢, 烧烫伤, 牙痛, 疥癣, 痢疮肿毒。

#### 7057143

*Rumex stenophyllus* Ledeb.

植物名 窄叶酸模《汇编》

文献名 牛西西《汇编》, 狭叶酸模《药学报》。

功效 根: 凉血止血, 清热解毒, 杀虫。

### 7059 商陆科 *Phytolaccaceae*

#### 7059001

*Phytolacca acinosa* Roxb. --- *P. esculenta* Maxim. var. *Hortte*

植物名 商陆《高植图鉴》

药材名 商陆《本经》、《药典》

文献名 菟陆《易经》, 蓬蒺、马尾《尔雅》, 常蓼《广雅》, 蓼《尔雅》郭璞注, 荆、章蒺、陆柳《玉篇》, 荔根、夜呼《本经》, 当陆、荔花《本草经集注》, 白昌《开宝本草》, 章柳根、商陆花、并州商陆《图经》, 章柳子《救荒本草》, 大药《滇南本草》, 昌陆、鹿神、文章柳、牛舌根、(土大黄)《新纲》

地方名 见肿消(云南、贵州、西藏、湖北), 大菟菜(四川、贵州), 水萝卜(东北、西北、山东、四川), 牛萝卜(四川、湖北), 湿萝卜(贵州、山东), 胖婆娘(贵州、云南、湖北), 野萝卜(西北、云南), 山萝卜(四川、福建、湖

北、广西、陕西), 牛大黄(湖南、陕西), 白母鸡(江苏、安徽), 抱母鸡、长不老(江苏、云南), 张果老(江苏、安徽), 红花倒水莲(广西、江西); 河北: 上陆; 陕西: 红商陆, 樟柳; 山东: 王母牛(崂山、海阳), [狼毒](泰山); 江苏: 下奶棵子, 狗头二七, 下奶果子, 当路归; 浙江: 胭脂(临安、余姚), 野胭脂、胭脂花; 安徽: 艳红子; 江西: 姪娃头(丰城), 白抱鸡婆, 倒水莲; 福建: 金七娘(仙游、福州), 猪母耳(宁德、罗源、仙游、福州), 金鸡母(宁德、霞浦、福安、福鼎), 白苋菜(古田); 湖北: 地萝卜, 土母鸡(恩施、建始), 土人參、土冬瓜(神农架); 湖南: 下山虎; 广东: 到酱莲; 广西: 假烟(桂平), 花商陆; 四川: 抓消肿, 吞牛头, 白花商陆, 白商陆, 商陆根, 红苋菜, (蛇莲); 贵州: 湿苋菜, 山包谷; 云南: 大萝卜, 萝卜参(保山、梁河), 何汉节、栽羊菜(曲靖), 大苦菜(嵩旺、禄劝), 天萝卜; 其他: 苋菜蓝, 肥猪菜, 大叶, 张南神, 山鹿脯

功效 根: 有毒。逐水消肿, 通利二便, 解毒散结。用于水肿胀满, 二便不能。外用于痈肿疮毒。

备考 市场调查, 发现常以本品之根加工后伪充红参或天麻, 均应注意鉴别。

#### 7059002

*Phytolacca americana* L. --- *P. decandra* L.

植物名 垂序商陆《药典》

药材名 商陆《药典》

文献名 洋胭脂《植物名汇拾遗》, 十蕊商陆《种称》, 洋商陆(徐《生药》), 美商陆《杭州药植志》, 美洲商陆《中药大辞典》

地方名 浙江: 花商陆, 野胭脂; 江西: 白嫩鸡婆, 白鸡腿; 湖北: 土鸡母(神农架); 广西: 山萝卜木; 云南: 大麻菜。

功效 根: 有毒。逐水消肿, 通利二便, 解毒散结。用于水肿胀满, 二便不通。外用于痈肿疮毒。

备考 市场调查, 发现常以本品之根加工后伪充红参或天麻, 均应注意鉴别。

#### 7059003

*Phytolacca japonica* Mak.

植物名 圆果商陆《台湾药植志》

功效 根: 有毒。逐水消肿, 通利二便, 解毒散结。

### 7061 藜科 *Chenopodiaceae*

#### 7061001

*Agriophyllum lateriflorum* (Lam.) Moq. --- *Eryngium lateriflorum* Lam.

植物名 侧花沙蓬《沙漠植志》

功效 种子: 发表解毒。

#### 7061002

*Agriophyllum minus* Fisch. et Mey.

植物名 小沙蓬《沙漠植志》

功效 种子: 发表解热。

#### 7061003

*Agriophyllum squarrosum* (L.) Moq. --- *Agriophyllum arenarium* Bieb.



植物名 沙蓬《中国植志》

药材名 东唐《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 沙蓬米《康熙几暇格物编》, 登相子《保德州志》, 东墙《齐民要术》, 登粟、登陌草《辽史》, 黍喇棘《延绥镇志》, 鸡爪菜《救荒本草》

地方名 沙米(华北); 辽宁: 蒺藜菜, 蒺藜梗; 内蒙古: “楚尔希”、“吉刺儿”、“曲利梗”、“苏利希尔”(蒙名); 宁夏: 瓮索。

功效 种子: 用于饮食积滞, 噎膈反胃。

#### 7061004

*Anabasis aphylla* L.

植物名 无叶假木贼《中国植志》

药材名 毒藜《中国药植图鉴》

文献名 阿那培斯、木烟《中国药植图鉴》, 无叶毒藜《中国经植志》

功效 嫩枝: 用于疥癣, 杀虫。

#### 7061005

*Atriplex centralasiatica* Iljin -- *Obione centralasiatica* (Iljin) Kitag.

植物名 中亚滨藜《中国植志》

药材名 软蒺藜《山东中草》

文献名 中亚粉藜《东北草本植志》, 大灰条、灰菜《沙漠药植》, 旱滨藜《药植简编》

地方名 内蒙古: 碱灰菜, 麻落粒; 山东: {白蒺藜}。

功效 果实: 祛风, 活血, 清肝, 明目。用于结合膜炎, 风疹瘙痒。

#### 7061006

*Atriplex fera* (L.) Bunge --- *Obione fera* Moq. --- *Spinacia fera* L.

植物名 野滨藜《中国植志》

文献名 三齿粉藜《东北草本植志》, 粉藜、咸卜子菜《沙漠药植》

功效 全草: 利水涩肠。用于腹泻。

#### 7061007

*Atriplex repens* Roth

植物名 匍匐滨藜《中国植志》

文献名 伏地滨藜《药植简编》

地方名 福建: 海芙蓉、海归母(闽南), 沙马藤(霞浦)。

功效 全草: 祛风行湿, 固肾, 消肿解毒。用于耳源性眩晕, 下消, 白带, 月经不调; 根: 用于关节炎; 叶: 用于对口疮, 涌泉疽, 皮炎。

#### 7061008

*Atriplex sibirica* L. --- *Obione sibirica* Fisch.

植物名 西伯利亚滨藜《中国植志》

药材名 软蒺藜《山东中草》

文献名 麻落粒《指示植物》, 东蒺藜《药学报》, 大灰条《沙漠药植》, 滨藜《药植简编》, 刺果粉藜《东北草本植志》

地方名 内蒙古: “西伯日-嘎古岱”、“卢伊尔”、“加格戴”(蒙名), 碱灰菜; 山东: 扇面蒺藜、{白蒺藜}、灰菜(无糠、沾化)。

功效 果实: 祛风, 活血, 清肝, 明目。用于结合膜炎, 头痛, 皮肤瘙痒, 肿毒, 乳汁不通。

#### 7061009

*Bassia dasphylla* (Fisch. et Mey.) O. Kuntze -- *Echinopsilon divaricatum* Kar. et Kir. --- *Chenolea divaricata* Hook. f.

植物名 雾冰藜《中国植志》

药材名 五星蒿《沙漠药植》

文献名 星状刺果藜《中药大辞典》, 肯诺藜《中国北部植志》, 雾冰草《东北草本植志》, 毛脊梁、巴锡藜《沙漠药植》

地方名 内蒙古: “布敦-哈姆哈格”、“马楠-哈姆哈格”、“乌斯特-哈姆哈格”(蒙名)。

功效 全草: 清热祛湿。用于脂溢性皮炎(头皮屑)。

#### 7061010

*Beta vulgaris* L.

植物名 甜菜《名实图考》、《中国植志》

药材名 蒺藜《别录》、《汇编》

文献名 蓍达菜《嘉祐本草》, 蓍达儿、蓍达根《饮膳正要》, 茄菜菜、火焰菜、红头菜、红白菜《植物名汇》, 根蒺藜《济南植志》

地方名 北京: 根刀菜; 浙江: 和尚菜; 台湾: 茭莲菜, 茄菜菜; 福建: 不断草; 湖北: 糖萝卜(巴东); 四川: 红牛皮菜(峨眉山), 红甜菜。

功效 根: 通经脉, 下气, 开胸膈; 叶: 用于赤痢, 灼伤及挫伤; 种子: 强壮剂; 全草: 用于麻疹初起见点未透和颜色不红, 妇女经闭停瘀, 血肿和肛门肿痛。

#### 7061011

*Beta vulgaris* L. var. *cicla* L.

植物名 厚皮菜《中国植志》

药材名 红牛皮菜(四川)、《汇编》

文献名 蒺藜子《食疗本草》, 石菜《本草求原》, 光菜《中国蔬裁》, 火焰菜、不断草《牧野日图》

地方名 猪鬃菜(广东、广西), 牛皮菜(湖北、广西、云南), 蒺藜(广东、广西、云南); 陕西: 海白菜; 广东: 杓菜。

功效 全草: 清热凉血, 透疹。用于吐血, 麻疹不透; 种子: 用于小儿热, 痔疮下血。

#### 7061012

*Ceratoides latens* (J. F. Gmel.) Reveal et Holmgren --- *Eurotia ceratoides* (L.) C. A. Mey.

植物名 驼绒藜《中国植志》

文献名 驼绒蒿《东北木本图志》, 优若藜《兰州植物通志》

地方名 河北: 老虎獠子; 青海: “起象”(藏名)。

功效 花序: 用于气管炎, 肺结核。

#### 7061013

*Chenopodium album* L.

植物名 藜《礼记》、《中国植志》

药材名 藜《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 莱《诗经》, 厘、蔓华《尔雅》, 蒙华《尔雅》郭

璞注),灰藜《嘉祐本草》,鹤顶草《土宿本草》,红落藜、舜芒谷、灰藜、灰菜《救荒本草》,红心灰藜《庚辛玉册》,灰挑银粉菜、灰挑叶、灰汞草《滇南本草》,落藜、胭脂菜、灰涤菜《纲目》,灰藜苋、灰天苋《植物名汇》,落帚、土蚕药、藜叶《和汉药物学》,灰草《满洲植录》

地方名 灰苋菜(上海、浙江、湖北、湖南、四川),灰条菜(东北、江苏、湖北、云南),灰帚菜、银粉菜、回回菜(东北),灰烟草(华中),灰灰菜(山东、河南、湖北、四川、云南),野灰菜(上海、云南),[地肤子](辽宁、江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建、贵州),白藜(甘肃、青海、浙江);吉林:血箭,[血见愁](通化);山西:灰藜吊(太行),[青稍子],太菜子,灰吊子;内蒙古:“淖伊勒”、“劳里”、“格气太”(蒙名);陕西:灰灰条;甘肃:灰料草;山东:野灰草;江苏:血下红(武进),灰菜子,灰藜子,灰条头(常熟),灰条(南京、宝应);上海:灰条头草,猪灰头草,灰堆头,灰干,野脱灰草,咸蒿子草,灰滩头草;湖北:灰斗苋菜(巴东);湖南:碎米草,鸡爪草;广东:粉仔菜(惠阳);广西:沙苋菜,粉菜(金秀);云南:灰甜菜;其他:天星米。

功效 幼嫩全草:清热,利湿,杀虫。用于痢疾,腹泻,湿疮痒疹,毒虫咬伤。

#### 7061014

*Chenopodium ambrosioides* L.

植物名 土荆芥《中国植志》

药材名 土荆芥《生草药性备要》、《汇编》

文献名 土荆《土农药志》,洋蚂蚁草《中国药植图鉴》,鹅脚草《和汉药考》,臭藜藿《岭南草药志》

地方名 臭草(福建、江西、广东、贵州、云南),臭蒿(福建、广东、广西),香藜草(福建、广西),钩虫草(湖南、广东、广西、四川),杀虫芥(广东、四川);台湾:臭川芎,臭杏;福建:[红泽兰],天仙草,狗咬痕(厦门、同安),杀虫草(邵武),臭荆芥(莆田);湖南:虎骨香、虱子草(溆浦、麻阳),碎米臭草(衡山),[土茵陈](长沙),蒿子草(东安);广东:藜荆芥,臭火油草,山蛤藤(普宁),山柴胡(罗定、高州),臭艾,臭芦,马了丁(惠阳),蟒草(潮安);广西:火油根,土京芥,姜荆,苦荆芥(北海),沙糖香菜,沙塘香草,火油草(田东)。

功效 全草:有小毒。祛风,杀虫,通经,止痛。用于皮肤风湿痹痛,钩虫病,蛔虫病,痛经,经闭,皮肤湿疹,蛇虫咬伤。

#### 7061015

*Chenopodium aristatum* L. --- *Teloxys aristata* Moq.

植物名 刺藜《中国植志》

药材名 刺藜《汇编》

文献名 刺藜《中国北部植图》,鸡冠冠草《沙漠药植》

地方名 内蒙古:“塔黑亚-音-希勒布-淖嘎”、“查加阿尔迈”、“鸟儿古斯”、“特-卢依尔”(蒙名),野鸡冠子草;河南:红小扫帚苗、铁扫帚苗(新乡)。

功效 全草:祛风止痒。外用于过敏性皮炎,荨麻疹。

#### 7061016

*Chenopodium botrys* L.

植物名 香藜《中国植志》

文献名 总状花藜《秦岭植志》,花叶臭灵丹《中草药学》

功效 全草:清热,解毒,消炎。

#### 7061017

*Chenopodium foetidum* Schrad. --- *Teloxys foetida* Kitag.

植物名 菊叶香藜《中国植志》

文献名 菊叶刺藜《东北草本植志》,总状花藜《中国北部植图》

地方名 云南:[土荆芥],蒿子草。

功效 全草:用于喘息,炎症,痉挛,偏头痛,驱钩虫和蛔虫。

#### 7061018

*Chenopodium glaucum* L.

植物名 灰绿藜《中国植志》

文献名 碱灰菜《指示植物》,灰菜《中国经植志》,粉叶灰藜菜《科学通报》,光藜、小灰灰菜、小灰菜《陕甘宁植志》

地方名 河北:鸡爪落藜;甘肃:灰条,灰灰菜;江苏:小藜。

功效 幼嫩全草:清热利湿,止痒透疹。

#### 7061019

*Chenopodium hybridum* L.

植物名 杂配藜《中国植志》

药材名 大叶藜《汇编》

文献名 大叶菜《东北药植志》,灰菜、黄鹌花、野角犬草《植物名汇》,大叶灰菜《中国药植图鉴》

地方名 血见愁、八角灰菜(东北);黑龙江:杂灰菜,杂灰藜;吉林:“该道儿”(朝名);内蒙古:“依合-淖力”(蒙名);其他:大叶灰条。

功效 地上部分:调经,止血。用于月经不调,功能性子宫出血,吐血,衄血,咯血,尿血。

#### 7061020

*Chenopodium serotinum* L. --- *C. ficifolium* Smith

植物名 小藜《中国植志》

药材名 灰藜《雷公炮炙论》、《中药大辞典》

文献名 金锁天《雷公炮炙论》,灰藜、水落藜《救荒本草》,灰条《野菜谱》,灰条菜《纲目》,灰蒴、灰苋《医林纂要》,灰苋菜《草木便方》,野灰苋《土农药志》,藜《广西植录》

地方名 江西:土蚕药;湖北:灰田苋(神农架);海南:粉菜草(儋县);广西:沙苋菜;四川:灰灰菜,灰刀菜。

功效 全草:清热利湿,止痒透疹。

备考 其胞果在辽宁及南方有些地区误作地肤子用,应予纠正。

#### 7061021

*Kochia scoparia* (L.) Schrad. --- *Chenopodium scoparia* L.

植物名 地肤《中国植志》

药材名 地肤子《本经》、《药典》

文献名 箭、王萆、王帚(《尔雅》郭璞注)、地麦、地华、地脉(《本经》)、地肤苗(《别录》)、扫帚(《本草经集注》)、益明(《药性论》)、涎衣草(《唐本草》)、落帚子(《日华子本草》)、独帚、鸭舌草(《图经》)、独扫苗(《救荒本草》)、扫帚菜(《救荒野谱》)、竹帚子、竹帚草(《滇南本草》)、千头子(《万病回春》)、鸭舌草、千心妓女、地白草(《纲目》)、(黄蒿)(《本经逢原》)、地麦草、鸡儿本(《植物名汇》)、白地芎、千心子、妓女子、白地草子、唐槎、铁扫帚子、略芩草子、落帚梅(《新纲》)、秃索菜(《指示植物》)

地方名 扫帚草(浙江、福建、台湾、四川)、扫帚苗(黑龙江、吉林、河北、甘肃、青海、江苏、安徽、河南、云南)、扫帚子(河北、陕西、浙江、安徽、河南)、苗扫把、野扫帚、野扫竹、落帚(东北)、铁扫帚(湖北、湖南)、铁扫把(湖北、湖南、四川)、辽宁:苔帚菜、家扫帚;河北:地帚子;内蒙古:“东寨布如”、“舒古日-乌布斯”(蒙名)、秃扫儿;新疆:帚菜子;山东:扫帚条;江苏:灰灰条(泰州)、扫帚样子(海门)、灰条子(镇江)、灰料头子(苏州)、扫帚种子(徐州)、蒿蒿头(云台山)、苗扫帚(邳县)、锦扫帚(睢宁)、扫帚秧(启东);安徽:灰线条、棉扫帚、独头扫;福建:地扫子(同安)、狗尿菜(晋江)、地葵子;台湾:扫平草、铁落帚子;河南:地伏子、白地草;湖南:白篾子;广西:(西河柳)(贵县);四川:地肤菜(成都)、铁扫把子;云南:老扫帚、竹扫子;其他:帚子。

功效 果实:清热利湿,祛风止痒。用于小便涩痛、阴痒带下、风疹、湿疹、皮肤瘙痒;嫩茎叶:清热解毒,利尿通淋。

#### 7061022

*Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *culta* Farw.

植物名 扫帚苗(拉汉英种称)

文献名 火球花(《广西药园药录》)

功效 全草:外用于麻疹不透。

#### 7061023

*Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *sieversiana* (Pall.) Ulbr. ex Aschers. et Graebn. --- *K. sieversiana* (Pall.) C. A. Mey.

植物名 碱地肤(《中国植志》)

地方名 地肤子(东北、陕西)。

功效 果实:清利湿热,祛风止痒。

#### 7061024

*Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *trichophylla* (Hort.) Schinz et Thell.

植物名 扫帚菜(《中国植志》)

药材名 地肤子(《中药大辞典》)

文献名 扫帚草(《华北经济植物志要》)

地方名 扫帚(东北)、紫地肤、秋紫地肤(华北);山东:地肤、观音草;江苏:灰灰条(泰州)、帚扫样子(海门)、灰条(镇江)、灰料头子(苏州)、扫帚种子(徐州);四川:铁扫把。

功效 果实:清利湿热,祛风止痒。

#### 7061025

*Nanophyton erinaceum* (Pall.) Bunge

植物名 小蓬(《中国植志》)

药材名 小蓬(《新疆中草药》)

功效 全草:清热杀虫。用于淋病、梅毒、淋巴结核。

#### 7061026

*Salicornia europaea* L. --- *S. herbacea* L.

植物名 盐角草(《中国植志》)

药材名 海蓬子(《药植简编》)

文献名 草盐角(《中国北部植图》)、草块角(《药植简编》)

地方名 河北:野胡萝卜;山西:毒须;山东:海胖子、海甲菜(崂山);江苏:抽筋菜、盐葫芦、胖蒿子草(如东)、蜡烛蒿子(射阳);其它:野蜡烛。

功效 全株:用于高血压病、头痛、坏血病、利尿。

#### 7061027

*Salsola arbuscula* Pall.

植物名 木本猪毛菜(《中国植志》)

文献名 白木本猪毛菜(《沙漠药植》)

地方名 内蒙古:“察干-莫德”(蒙名);新疆:“博雅雷契”(哈隆克名)。

备考 本植物在甘肃阿拉善右旗蒙医以之代寄生入药。

#### 7061028

*Salsola collina* Pall.

植物名 猪毛菜(《中国植志》)

药材名 猪毛菜(《汇编》)

文献名 (猪棕草)(《指示植物》)

地方名 乍蓬棵、叉蓬棵(东北);河北:扎蓬棵;内蒙古:“哈木呼勒”、“哈姆哈支”(蒙名)、叉明棵;甘肃:刺蓬;青海:“达才尔”(藏名);山东:猴子毛(平邑)、蓬子菜(泰山);安徽:乍蓬棵子;河南:三叉明棵、猪毛缨;其它:扎蓬蒿、猪毛蒿、蓬蓬菜。

功效 地上部分:降血压,润肠通便。用于高血压病,习惯性便秘。

#### 7061029

*Salsola komarovii* Iljin

植物名 无翅猪毛菜(《中国植志》)

地方名 乍蓬棵(东北)。

功效 地上部分:降血压,润肠通便。

#### 7061030

*Salsola ruthenica* Iljin --- *S. dichracantha* Kitag. ---

*Salsola pestifer* auct. non A. Nelson

植物名 刺沙蓬(《中国植志》)

药材名 大翅猪毛菜(《东北植药图志》)

地方名 猪毛菜(东北、青海、四川)、叉蓬棵、刺蓬(东北);吉林:风滚草、扎蓬棵;甘肃:苏联猪毛菜。

功效 全草:平肝降压。用于高血压病。

备考 有的文献学名误订为 *Salsola pestifer* A. Nelson

#### 7061031

*Spinacia oleracea* L.

植物名 菠菜(《中国植志》)

药材名 菠菜(《履巉岩本草》)、《汇编》

文献名 波稷《嘉祐本草》,波稷《嘉话录》,波稷菜《唐会要》,赤根菜《品汇精要》,红根菜《滇南本草》,波斯草《纲目》,波稷菜《名实图考》,齿根菜《和汉药物学》,鸚鵡菜,鼠根菜《现代实用中药》

地方名 角菜(广东、广西);福建:敏菜(莆田),波斯菜;台湾:飞稷菜,飞龙菜;湖南:甜菜(古文、麻阳、溆浦、凤凰、新宁),拉筋菜(新邵)。

功效 带根全草:滋阴平肝,止渴润肠。用于高血压,头痛,目眩,风火赤眼,糖尿病,便秘。

#### 7061032

*Suaeda glauca* (Bunge) Bunge

植物名 碱蓬《中国植志》

药材名 碱蓬《救荒本草》、《中药大辞典》

文献名 盐蓬《救荒本草》,灰绿碱蓬《高植图鉴》

地方名 碱蒿子(山东、江苏),盐蒿子(江苏、河南);黑龙江:老虎尾;辽宁:和尚头;河北:毒吸;内蒙古:猪尾巴;甘肃:盐蒿;山东:[蓬子菜](平邑、沂水),卤蓬(广饶、无棣、沾化);河南:[猪毛菜]。

功效 全草:清热,消积。

### 7063 苋科 *Amaranthaceae*

#### 7063001

*Achyranthes aspera* L.

植物名 土牛膝《中国植志》

药材名 倒扣草《汇编》

文献名 杜牛膝、红牛膝、相牛膝、鸡豚草、鸡豚膝《滇南本草》,牛舌大黄、牛舌头、鱼鳞芽《岭南采药录》,倒吞吞、倒挂草《野生药植图志》,撮鼻草《实用中草药》,粗毛牛膝《中药大辞典》,小白牛膝《四川中药志》

地方名 倒扣草(广东、福建、广西、云南),倒勒草、倒刺草(广东、广西),白牛膝(福建、湖南、广西),白基牛膝(福建、广西),马鞭草(海南、广西),鸡骨痠(台湾、福建);福建:牛鞭鼻(泉州),破布粘,虎鞭草,〔鸡骨草〕,粘身草(福安),倒拳草(莆田、福清),鸭脚节(大田、龙溪、将乐),节节枫(光泽),紧身子(三明),圭骨红(永安),野苋菜(清流),竹节菜(明溪),大铁鞭、串鼻草(厦门),红交节、牛脚烧(龙岩);台湾:毛蟹目,到继草,红骨蛇,撮鼻草;湖北:牛膝膝(神农架);湖南:臙节风(溆浦),牛盖膝头;广东:牛膝头(河源),大膝头(增城),痲倒草,痲络草,倒梗草(广州),白花鸡撮鼻,鸡撮鼻,土牛七、白花土牛膝(潮汕),方骨相思(潮安、潮州、南澳),马鞭陈(泉州),〔土常山〕(兴宁),白地三娘,倒拉草(翁源),牛七头(兴宁);海南:倒插草,〔龙牙草〕,南蛇牙草;广西:牛七风,鹤膝,红倒律(藤县),倒捋草(南宁),白马鞭草(平南),小刀律(岑溪),天青地红根(桂林),倒律根,红刀律,牛咳七(乐业),倒律,红马鞭草(梧州);四川:铁牛膝;云南:“怀哦聋”(傣语),圆边牛膝(思茅);其他:倒扣筋,白饭草,红内消,牛脚节,铁马鞭,大本铁马鞭。

功效 全草:解表清热,利湿。用于外感发热,咽喉肿痛,烦渴,风湿性关节炎。

#### 7063002

*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L. --- *A. obtusifolia* Lam.

植物名 钝叶土牛膝《中国植志》

药材名 钝头牛膝《汇编》

文献名 土牛膝《台湾药植志》

地方名 台湾:撮鼻草,牛膝,毛蟹目,鸡骨草,鸡骨黄,到继草,红骨蛇,螃蟹目;广西:倒刺草(田阳);其他:擦鼻草。

功效 根:活血去瘀,利水,通经;茎、叶:解热,止咳。用于肝、肾疾患,毒蛇咬伤。

#### 7063003

*Achyranthes aspera* L. var. *rubro-fusca* (Wight) Hook. f. --- *A. rubro-fusca* Wight

植物名 褐叶土牛膝《中国植志》

药材名 云牛膝《中药大辞典》

文献名 昆明土牛膝《药材学》,红褐粗毛牛膝《汇编》,紫茎牛膝《台湾药植志》

地方名 台湾:牛膝;云南:土牛膝,白牛膝,鸡豚草,拐牛膝。

功效 根:舒筋活血。用于疔疮,痈疽,打胎,明目,强精,腰膝痛。

#### 7063004

*Achyranthes bidentata* Blume

植物名 牛膝《中国植志》

药材名 牛膝《本经》、《药典》

文献名 百倍《本经》,四季花《救荒本草》,山牛膝、脚斯蹬《救荒野谱》,铁牛膝《滇南本草》,对节菜、山苋菜、牛蒸《纲目》,杜牛膝《本草备要》,怀牛膝《本草便读》,马麦草《植物名汇》,怀夕、真夕《汉药写真集成》,苦杖根、鼓槌草、鼓槌风根、牛夕、接骨草、牛无楼巴、通天柱《新纲》,生牛膝、怀膝《常用中药名辨》

地方名 土牛膝(江西、江苏、浙江、安徽、四川、广西),白土牛膝(浙江、四川),白牛膝(浙江、江西、湖南、四川、贵州),淮牛膝(北京、广西),红牛膝(江西、四川),鸡骨草(浙江、福建),牛克膝(陕西、四川),喉痹草(江苏、安徽),野牛膝(江苏、四川),牛盖膝、粘草子根根(贵州、云南);陕西:牛膝膝盖(陕南),野牛克膝(平利);甘肃:土牛夕;山东:牛波落盖(烟台);江苏:牛鞭郎草(泰县),喉吧裸子、喉白草(盱眙),吧草(睢宁),〔透骨草〕(云台山),喉咙草(南通),蛾子草(南京),臭花娘子根,虎杖草,牛舌头根;上海:木鱼草根,水杨草根,对节草根,红梗草根,鸡脚药草根;浙江:鼓槌风(乐清),牛膝草,对节草,鼓种头;安徽:牛膝膝草,红牛夕;福建:疔疮草,鸡胶骨(闽东);河南:接骨丹;湖南:牛盖膝头;四川:牛膝膝;贵州:牛膝台(黔阳);云南:山苋菜根(文山),孔虫草,倒麦渣。

功效 根:补肝肾,强筋骨,逐瘀通经,引血下行。用于腰膝酸痛,筋骨无力,经闭瘕瘕,肝阳眩晕。

#### 7063005

*Achyranthes bidentata* Blume var. *japonica* Miq. --- *A. japonica* (Miq.) Nakai

植物名 少毛牛膝《中国植志》

药材名 尖叶牛膝《汇编》  
文献名 牛膝《中草药通讯》，日本牛膝《品种论述》  
地方名 土牛膝(浙江、江苏)。  
功效 全草：解表清热，利湿。

**7063006**

*Achyranthes fauriei* Levl.

植物名 和牛膝(拟)  
药材名 和牛膝(拟)  
文献名 九江牛膝、土牛膝《品种论述》  
功效 根：散瘀血，补肝肾。  
备考 日本商品牛膝主要为此种。

**7063007**

*Achyranthes longifolia* (Makino) Makino --- *A. bidentata* Blume var. *longifolia* Makino

植物名 柳叶牛膝《中国植志》  
药材名 狭叶红牛膝《品种论述》  
文献名 土牛膝《图经》，山牛膝、苏木红、荔枝红、透血红《纲目拾遗》，长叶牛膝《种分》，柳牛膝《牧野日图》  
地方名 牛膝(陕西、湖南、四川、贵州)，红牛膝(江西、福建、湖北、湖南、贵州、云南)；浙江：鸡骨草，红药；福建：细牛膝(闽清)，鸡胶节(古田)；湖南：婣连子，白牛膝，野苋菜，野牛膝，小牛膝，血牛膝，山苋菜，牛克膝，对节草，桂东牛膝；广西：红马鞭(博白)，红马鞭草(北流)；四川：红牛夕(峨眉山)；其他：剪刀牛膝，狭叶牛膝。

功效 根：补肝肾，强筋骨，逐瘀通经，引血下行。

**7063008**

*Achyranthes longifolia* (Makino) Makino f. *rubra* Ho

植物名 红柳叶牛膝《中国植志》  
药材名 红牛膝(四川)  
地方名 四川：红牛克膝，牛克膝，牛膝，红狭叶牛膝。

功效 根：补肝肾，强筋骨，逐瘀通经，引血下行。

**7063009**

*Achyranthes ogatai* Yamamoto

植物名 南天牛膝《台湾药植志》  
功效 根：健胃。

**7063010**

*Aerva glabrata* Hook. f.

植物名 少毛白花苋《中国植志》  
地方名 贵州：白牛膝。  
功效 根：散瘀止痛，消肿除湿，调经，止咳，止痢。用于痢疾，跌打损伤，风湿关节痛，月经不调，血崩。

**7063011**

*Aerva sanguinolenta* (L.) Blume --- *Aerva scandens* (Roxb.) Wall.

植物名 白花苋《中国植志》  
药材名 白花苋《汇编》  
文献名 绢毛苋、广牛膝《高植图鉴》  
地方名 广西：水清火(都安)，韦苗甫(龙州)；贵州：白牛膝；云南：白牛夕，烂脚苋，土牛膝，[怀牛夕]。  
功效 根、花：散瘀止痛，除湿，调经，止咳，止痢。

用于痢疾，跌打损伤，风湿关节痛，肌肉痛，月经不调，血崩，老年咳嗽。

**7063012**

*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nichols. --- *A. versicolor* (Lem.) Hort. ex Regel

植物名 锦绣苋《中国植志》  
药材名 红莲子草(福建)，《中药大辞典》  
文献名 红绿草《汇编》  
地方名 红草(福建、广东、广西)；北京：五色草；福建：红田乌草(泉州、南安、晋江、厦门、龙海、同安)，红节节草(南安、莆田)，红棕草(龙溪)；广东：红鸡肠菜(湛江)；广西：红丝线，织锦苋，模样苋。

功效 全草：清热解毒，凉血，止血，消积逐瘀。用于吐血，咯血，下血，内伤出血，跌打损伤。

**7063013**

*Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.

植物名 喜旱莲子草《中国植志》  
药材名 空心莲子草《汇编》  
地方名 水花生(北京、江苏、浙江)，革命草(江苏、上海、浙江、湖北、湖南)，空心苋(福建、广东、广西)，水蓬菜(江苏、福建)，螃蟹菊(浙江、湖北、四川)；浙江：野莲草；福建：过江龙(福州、厦门、同安)，空心蓬蓬菜(永安)，山蓬菜；湖北：过塘蛇；湖南：水马苋苣；四川：革命菜(峨眉山)。

功效 全草：清热利尿，凉血解毒。用于乙脑、流感初期，肺结核咯血，流行性出血热初期，麻疹。外用：于湿疹，带状疱疹，疔疮，毒蛇咬伤。

**7063014**

*Alternanthera sessilis* (L.) DC. --- *A. nodiflora* R. Br.

植物名 莲子草《中国植志》  
药材名 莲子草《救荒本草》、《汇编》  
文献名 耐惊菜《救荒本草》，[满天星]《名实图考》，虾蟇菜《生草药性备要》，虾钳菜《广州植志》

地方名 水牛膝(江西、四川)，节节花(台湾、福建、广东、广西)，白花仔(福建、广东)，[旱莲草](台湾、广西)；浙江：止血草(温州)，白花草儿(温州、永嘉)，水旱莲；江西：耐惊花；福建：曲节草，蛇病，猪屎草，白花节节草(福州、泉州、同安、龙海、厦门、武平)，白疔草(闽清)，蛇蓝、蛇草、白田乌草、吊吊花、银剪刀、目目花(泉州)；台湾：田边草，田乌草；湖南：水河柳；广东：虾钳草、蟹钳草(广州)，白花螃蟹草(新兴、广宁、四会、德庆、封开、怀集)，珍珠菜(清远、从化)，叶虾莲(乐昌)，白米仔草(罗定、阳江、阳春、乐昌、增城、电白)，白鸡肠菜(湛江)，蜆脚菜(潮阳、潮安)，蜆脚苏、山节花(揭阳)，白花总草、白花总草菇(饶平)，担杆草；海南：四季花(临高)，鱼鲜菜(澄迈、琼海)；广西：硬骨草(梧州)，小白花草(昭平)，牛毒药草(平南)，鸡脚菜(玉林)，麦梗草(临桂)，米子草，血丝草，红丝线(北海)；四川：水金铃，一包针、虾子草(成都)，[螃蟹菊]；云南：“怕嫩”(傣语)，路花。

功效 全草：清热凉血，利水消肿。用于痢疾，鼻衄，咯血，便血，尿道炎，咽炎，乳腺炎，小便不利。外用

于拔毒止痒,疮节肿毒,湿疹,皮炎,体癣,毒蛇咬伤。

#### 7063015

*Amaranthus caudatus* L.

植物名 尾穗苋《中国植志》

药材名 老枪谷《龙洲纪略》、《汇编》

文献名 稷冠花《名实图考》,红苋米草、鸦谷《植物名汇》,野苋《本草新注》,千岁谷《四川通志》,老仓谷《种分》,千穗谷《经济植物学》,红苋菜《中国植物图鉴》,仙人谷《科裁》

地方名 九莲灯花(东北);黑龙江:老枪谷;辽宁:西米谷、高丽谷(辽西);北京:老来少;湖北:鲜谷、西鲜谷(神农架);广西:红米菜;贵州:天仙米;云南:红米苋;其他:龙须苋。

功效 根:滋补强壮。用于头昏,四肢无力,小儿疳积。

#### 7063016

*Amaranthus hypochondriacus* L. --- *A. hybridus* L. var. *hypochondriacus* (L.) Robinson

植物名 千穗谷《中国植志》

药材名 仙米菜《西昌中草药》

地方名 内蒙古:御谷;四川:天仙米,红仙米菜;云南:老枪谷,小米菜。

功效 全草:消食健胃,止痒。用于风疹,皮肤疮,食积腹胀。

#### 7063017

*Amaranthus lividus* L. --- *A. ascendens* Loisel.

植物名 凹头苋《中国植志》

药材名 野苋菜《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 野苋《名实图考》,光苋菜《汇编》

功效 全草及种子:清热解毒。用于痢疾,目赤,乳痈,痔疮。

#### 7063018

*Amaranthus paniculatus* L.

植物名 繁穗苋《中国植志》

药材名 老粘谷《药植简编》

文献名 人苋《名实图考》,红粘谷《汇编》

地方名 西方谷(东北),白苋菜(陕西、云南),银苋菜(陕西、甘肃),〔青箱子〕(湖北、山西);陕西:田苋菜(佛坪),白银苋(蓝田),红苋菜(卢氏、略阳),田粟;甘肃:田粟谷菜(文县);四川:雅谷,天雪米;贵州:灰吊米;云南:小米菜。

功效 种子:消肿,止痛。用于跌打损伤,骨折肿痛,恶疮肿毒。

#### 7063019

*Amaranthus retroflexus* L.

植物名 反枝苋《中国植志》

药材名 野苋菜《沙漠药植》

文献名 西风古《江苏植录》,青苋《中药通报》

地方名 西风谷、野苋、苋菜(东北、内蒙古),〔青箱子〕(华北、西北);辽宁:苋菜子;北京:人青,人青菜,家人青;内蒙古:“阿日白·淖嘎”(蒙名);台湾:青鸡冠。

功效 全草:清热利湿,解毒消肿,凉血止血。用

于腹泻,痢疾,表热,身痛,头痛,目赤,尿黄不利。

#### 7063020

*Amaranthus spinosus* L.

植物名 刺苋《中国植志》

药材名 刺苋菜《汇编》

文献名 笏苋菜《岭南采药录》

地方名 笏苋菜(广东、广西),野苋菜(江西、福建、广东、云南),野苋(江西、广东、广西),假苋菜(福建、广东、广西),野刺苋、白刺苋(福建、广东);浙江:野刺苋菜(临安),酸酸苋(嵊县);福建:土苋菜,乌苋刺(泉州),刺刺草(福州、南平),猪姆刺(福清、霞浦、同安),猪母菜(闽东),〔地肤子〕,乌仔苋;广东:野笏苋,马屎苋,马屎根、白骨刺苋(南澳),猪食菜(五华),假苋(潮阳);广西:野勒苋,勒苋菜(龙州、苍梧),红勒菜、勒红菜(北海)。

功效 全草或根、茎、叶:清热利湿,解毒消肿,凉血止血。用于痢疾,肠炎,胃、十二指肠溃疡出血,痔疮便血。外用于毒蛇咬伤,皮肤湿疹,疖肿脓疡。

#### 7063021

*Amaranthus tricolor* L. --- *A. mangostanus* L. --- *A. gangeticus* L.

植物名 苋《中国植志》

药材名 苋菜《滇南本草》、《汇编》

文献名 苋实、马苋《本经》,莫实《别录》,地筋《石药尔雅》,糠苋、胡苋《图经》,红人苋《本草衍义》,苋子《饮膳正要》,雁来红、后庭花《救荒本草》,赤苋、花苋、黄《纲目》,老少年《盛京通志》,十样锦、锦西风《花镜》,苋菜子《得配本草》,三色苋、老来少《华北经济植志要》,苋菜、苋菜茎《中国蔬裁》

地方名 老来变、秋红(东北),青香苋(江西、湖南),红苋菜(云南、四川);台湾:老来娇;四川:老来红(峨眉山),老苋菜,红苋苋子;云南:小米菜;其他:老更娇。

功效 全草或根、茎、叶:清热利湿,解毒消肿,凉血止血。用于细菌性痢疾,肠炎,红崩白带,痔疮,阴囊肿痛。

#### 7063022

*Amaranthus viridis* L.

植物名 皱果苋《中国植志》

药材名 野苋菜《汇编》

文献名 细苋、糠苋、白苋《别录》,猪苋《图经》

地方名 野苋(江苏、浙江、江西、福建),绿苋(江苏、湖北、贵州),假苋菜(广东、广西);山东:人青菜(历城、莱芜、聊城、长清、沂水、崂山),苋菜(平邑);福建:猪母草;台湾:山苋菜。

功效 全草及根:清热利湿。用于细菌性痢疾,肠炎,乳腺炎,痔疮肿痛。

#### 7063023

*Celosia argentea* L.

植物名 青葙《纲目》、《中国植志》

药材名 青葙子《本经》、《药典》

文献名 〔草决明〕、〔草蒿〕、藎蒿《本经》,昆仑草《唐

本草》，青箱子《滇南本草》，野鸡冠、鸡冠苋《纲目》，野鸡头、新蓼子、天灵草、还瞳子《新纲》，〔夏枯草〕、鸡公花、鸡公花草、官上加官、小鸡冠花《植物名汇》，鸡冠菜《和汉药理学》，狼尾花、牛尾巴花子《中草药学》，牛尾巴花子《中药材手册》

地方名 野鸡冠花(陕西、山东、江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建、湖南、四川、云南)，野鸡冠花子(湖北、四川)，〔鸡冠花〕(江苏、安徽、福建、台湾、云南)，狼尾巴(江苏、广东、云南)，狼尾草(广东、云南)，狐狸尾(广东、广西)，狗尾巴棵(山东、江苏)，牛母窝(福建、广东)；河北：银顶棵，野千穗谷；内蒙古：“嘎达木巴拉”(蒙名)；山东：狗尾巴花(烟台)，牛尾巴花；江苏：土鸡冠，野鸡冠子、狼尾巴棵种子(徐州)；安徽：狗尾巴菜；江西：青箱花；福建：犬尾鸡冠花(福安、宁德)，野鸡髻花(福州、闽侯、泉州)，牛尾苋(长乐)，牛尾苋(晋江、东山、同安)，十一鸡草(建宁)，青射草(大田)，充鸡冠、冲鸡冠(厦门)，无羽蝎子(泉州)，鸡鸣草，狗尾鸡冠花(南平)；台湾：白桂菊花，白鸡冠，白鸡冠花；湖北：狗尾巴子；湖南：白毛蜡烛(凤凰、黔阳)；广东：鸡公苋、白冠花(惠阳)，土鸡冠花(潮阳)，白花莲(新兴、新会)，狗尾花(化州)；海南：百日红，土狗尾；广西：指天笔、鸡公草(苍梧)，〔白头翁〕(桂平)，火锤木，饮光，尾凤，狗尾苋(北海)；四川：笔鸡冠、笔鸡冠子、狗尾巴子(彭县、金堂)；云南：“糯赖夸吗”(傣语)。

功效 种子：清肝，明目，退翳。用于肝热目赤，眼生翳膜，视物昏花，肝火眩晕；茎叶及根：燥湿清热，杀虫，止血。

备考 孙星衍等辑《本经》，引《魏略》云：“初平山有青牛先生，常服青箱子。箱，当作箱字”。今《滇南本草》正作箱字。

#### 7063024

*Celosia cristata* L. --- *C. argentea* L. var. *cristata* (L.) O. Ktze.

植物名 鸡冠花《中国植志》

药材名 鸡冠花《滇南本草》、《药典》，鸡冠子《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 鸡冠《嘉祐本草》，波罗奢《花镜》，高足鸡冠、矮足鸡冠、百鸟朝王《云南通志》，鸡冠实《新纲》，〔鸡头〕、鸡冠头《中国药植志》

地方名 红鸡冠花、白鸡冠花(江苏、江西、湖南)，老来红(安徽、四川)；吉林：“嫩得米米”(朝名)；内蒙古：“甲色枚刀格”(蒙名)；青海：似田姑；江苏：鸡冠头花(无锡)，〔青箱子〕(苏州、镇江)；浙江：白鸡冠，红鸡冠；福建：鸡脚枪(光泽)，鸡髻花、白冠花(泉州)，鸡公花(闽东)；湖南：红冠(常德)；广东：鸡谷子花(始兴)；四川：鸡冠花子；贵州：鸡冠苋；云南：“糯来”(傣语)；其他：黄鸡冠，白凤冠，矮鸡冠。

功效 花序：收涩止血，止带，止痢。用于吐血，崩漏，便血，痔血，赤白带下，久痢不止；茎叶：用于痔疮，痢疾，吐血，衄血，血崩；种子：凉血，止血。用于肠风便血，赤白痢疾，崩带，淋浊。

#### 7063025

*Cladostachys frutescens* D. Don - *Deeringia amaranthoides* (Lam.) Merr.

植物名 浆果苋《中国植志》

药材名 浆果苋《汇编》

文献名 地灵苋《海南植志》，苋状乌鱼花、纽藤《台湾药植志》，地苋苋《科属词典》

地方名 广西：九层风(上林)；贵州：鼠尾苋；云南：野苋菜藤，苋菜藤。

功效 全株：祛风利湿。用于风湿性关节炎，肠炎腹泻，痢疾；种子：用于夜盲症。

#### 7063026

*Cyathula capitata* Moq.

植物名 头花杯苋《中国植志》

药材名 麻牛膝《品种论述》

文献名 头花苋草《中药大辞典》，头序杯苋、拐膝《中草药学》，苦麻牛膝《品种论述》

地方名 四川：金河牛膝(西昌、盐源、盐边、会理、会东)；云南：千把钩(昆明)，〔红牛膝〕(保山)，拐牛膝，白牛膝，太极草，狗夺子，大粘连连，〔川牛膝〕。

功效 根：祛风除湿。

备考 川牛膝学名过去常误定为本学名，现已予以订正。本品的性味与川牛膝不同，不宜作川牛膝入药。

#### 7063027

*Cyathula officinalis* Kuan --- *Cyathula capitata* auct. non Moq. --- *Cyathula tomentosa* auct. non (Roth) Moq.

植物名 川牛膝《中国植志》

药材名 川牛膝《药典》

文献名 川膝《常用中药名辨》

地方名 牛膝(四川、贵州、云南)；河北：小川牛膝；江西：龙牛膝(遂川)；四川：天全牛膝，肉牛膝(西昌)，都牛膝，米心牛膝，家牛膝，特拐，赛拐，拐膝；贵州：大牛膝，小牛膝，毛药，红毛药；云南：甜牛膝(维西)，拐牛膝，千把钩，云牛膝；其他：甜川牛膝，白牛膝。

功效 根：逐瘀通经，通利关节，利尿通淋。用于经闭瘀痕，胞衣不下，关节痹痛，足痿筋挛，尿血血淋，跌扑损伤。

备考 过去有些文献曾将本品学名误订为 *Cyathula capitata* Moq. 或 *C. tomentosa* (Roth) Moq.

#### 7063028

*Cyathula prostrata* (L.) Blume --- *Achyranthes prostrata* L.

植物名 杯苋《中国植志》

药材名 蛇见怕(海南)、《汇编》

文献名 假牛膝《台湾药植志》

地方名 广东：细叶倒扣草、银丝倒扣草(惠阳)，细叶蛇总管，蛇草；海南：镜面草，蛇惊慌，拔子弹草；广西：小马鞭草、地丹(博白)，小刀律(岑溪)；云南：牛奶藤；其他：平卧杯苋。

功效 根：清热解毒。用于细菌性痢疾；全草：消积除痰，消肿止痛。用于小儿疳积，肝脾肿大，肺结核，蛇咬伤，跌打损伤，疮疡肿毒。

## 7063029

*Gomphrena celosioides* Mart.

植物名 银花苋《中国植志》

药材名 地锦苋《汇编》

文献名 鸡冠千日红《中国植志》

地方名 广东：地锦草(惠阳)。

功效 全草：清热利湿，凉血止血。用于痢疾。

## 7063030

*Gomphrena globosa* L.

植物名 千日红《花镜》、《中国植志》

药材名 千日红《名实图考》、《汇编》

文献名 吕宋菊《陆川本草》，千金红、百日白《中国药植志》，万年红《中草药学》

地方名 千年红(江苏、安徽)，百日红(浙江、福建、广东、广西、四川)，滚水花(广西、四川)，千日白(江苏、广西)，火球花(北京、山东、广西)；上海：长生花，杨梅花；浙江：千精白花、烫烫红(温州)；福建：蜻蜓红(莆田)，球形鸡冠花(晋江、泉州)，园子花(宁化)，粗糠花(厦门)；广东：绒枣花，红菊，滚水菊(郁南)；广西：沸水菊(玉林)，沸水花(全州)，八月红(博白)，滚水红(北海)；云南：“糯罕菜”(西双版纳傣语)。

功效 花序：止咳平喘，平肝明目。用于支气管哮喘，急、慢性支气管炎，百日咳，肺结核咯血，头晕，视物模糊，痢疾。

## 7063031

*Gomphrena globosa* L. cv. Alba

植物名 千日白《浙南本草新编》

地方名 江苏：千年白(苏州)；其他：百日白，千日粉，千日粉红。

功效 花序：祛痰，平喘，退热，明目。

## 7063032

*Iresine herbstii* Hook. f. ex Lindl.

植物名 血苋《中国植志》

药材名 血苋《汇编》

文献名 红洋苋《上海植录》，红叶苋《经植手册》，红槐《药植简编》

地方名 福建：红木耳(南靖、厦门、同安、泉州、漳州)，德国苋；广西：一品红(龙州)，红教杯(北流)，红苋；云南：“皇娘”(西双版纳傣名)，一口红(文山)，红苋菜、叶叶红、红薄荷、红娃娃、红牛夕、红到底、一支红、一口血(红河)，汉宫秋。

功效 全草：清热解毒，调经止血。用于细菌性痢疾，肠炎，痛经，月经不调，血崩，吐血，衄血，便血。

## 7064 落葵科 Basellaceae

## 7064001

*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis --- *Boussingaultia gracilis* Miers var. *baselloides* L. H. Bailey --- *B. gracilis* Miers f. *pseudo-baselloides* Hauman

植物名 落葵薯《云南种录》

药材名 藤三七(四川、云南)、《汇编》

文献名 马德拉藤《经植手册》

地方名 藤七(四川、云南)；四川：藤山七(峨眉山)，土三七(合江、高县)，软浆七(兴文)；云南：藤子三七，小粘药、小年药(昆明)，金钱珠(玉溪)，串枝莲(丽江)，白虎下须，莽菜七，粘藤，寸金丹，猴子七，十年不十，土洋参。

功效 藤上块茎：滋补，壮腰膝，消肿散瘀。用于腰膝痹痛，病后体虚，跌打损伤，骨折。

## 7064002

*Basella rubra* L. --- *B. alba* L.

植物名 落葵《高植图鉴》

药材名 落葵《别录》、《汇编》

文献名 葵菜、紫露、承露《尔雅》，天葵《别录》，藤葵、胡燕脂《开宝本草》，藤儿菜《日用本草》，滑藤、西洋菜《品汇精要》，藤菜、御菜、燕脂菜《纲目》，〔紫草〕《救荒野谱补遗》，燕脂豆、木耳菜《名实图考》，红灯菜、浮藤菜、蚌菜《植物名汇》，榧放《本草新注》，染绛子《中国药植志》，蔓紫《中国植物图鉴》，藤露《中国药植志》

地方名 蕹菜(广东、福建)，红鸡屎藤(福建、广西)，胭脂菜(江苏、浙江、安徽)，豆腐菜(广西、四川、云南)；江苏：紫豆藤，红果儿(泰县)，紫荷叶；上海：胭脂花；福建：紫葵，篱笆菜(古田)；台湾：蚌管菜；广西：软藤菜，滑腹菜，胭脂(平南、陆川)，藤菜子(苍梧)，软筋藤，红软藤，红藤菜(陆川、藤县)，藤罗菜、塘罗菜(北海)，紫背藤菜；四川：软筋菜，软浆菜，软浆叶，染浆芽(峨眉山)，染浆叶(成都)，染浆子(高县)；云南：白虎下须、十年不干(临沧)，寸金丹(曲靖)，“帕蒂”(西双版纳傣语)。

功效 全草：清热解毒，接骨止痛。用于阑尾炎，痢疾，大便秘结，膀胱炎。外用于骨折，跌打损伤，外伤出血，烧、烫伤。

## 7065 亚麻科 Linaceae

## 7065001

*Linum nutans* Maxim.

植物名 垂果亚麻《青藏药图》

地方名 青海：“日吉洒尔玛”(藏名)。

功效 花、果：通经活血。用于子宫瘀血，经闭，身体虚弱。

## 7065002

*Linum perenne* L.

植物名 多年生亚麻《西藏植志》

文献名 壁虱亚麻《植物名汇》，豆麻《云南种录》

地方名 内蒙古：“塔拉音-麻嘎领吉”(蒙名)；云南：亚麻，野芝麻，野亚麻。

功效 果实：用于皮肤病。

## 7065003

*Linum perenne* L. var. *sibiricum* Planch.

植物名 宿根亚麻《兰州植物通志》

文献名 野亚麻《沙漠药植》

地方名 青海：“日吉洒尔玛”(藏名)。

功效 花、果：通经活络。用于子宫瘀血，闭经，身体虚弱。



## 7065004

*Linum stelleroides* Planch

植物名 野亚麻《高植图鉴》

药材名 野亚麻《汇编》

文献名 松叶亚麻《种分》, 松叶人参《中国植物图鉴》, 亚麻《沙漠药植》

地方名 疗毒草、珍珠蒿、繁缕亚麻(东北), [胡麻](陕西、甘肃、宁夏); 辽宁: 丁竹草、山胡麻; 内蒙古: 野胡麻, “哲日格、麻嘎凌古”(蒙名); 湖北: 胡芝麻(神农架)。

功效 地上部分及种子: 养血润燥, 祛风解毒。用于血虚便秘, 皮肤瘙痒, 荨麻疹, 疮痈肿毒。

## 7065005

*Linum usitatissimum* L.

植物名 亚麻《高植图鉴》

药材名 亚麻子《药典》

文献名 壁虱胡麻、鸡麻《纲目》, 胡麻饭《滇南本草》, 山西胡麻《名实图考》, 滑胡麻《叶生药》, 胡脂麻《中国药植志》

地方名 大胡麻(内蒙古、陕西、甘肃、新疆、山东、湖北), 大麻、山脂麻(内蒙古、陕西、甘肃、新疆), [胡麻](辽宁、华北、青海、广西、云南), [胡麻仁](山西、江西、台湾、湖北、广西、四川), 亚麻仁(青海、四川); 河北: 鸦麻子; 青海: “沙玛”(藏名); 四川: “沙米哲布”(阿坝藏名); 贵州: 胡子仁; 西藏: “桑蒂渣唯加蒂噶尔布”(藏语)。

功效 种子: 润燥, 祛风。用于肠燥便秘, 皮肤干燥瘙痒, 毛发枯萎脱落; 根: 平肝, 补虚, 活血。用于慢性肝炎, 睾丸炎, 跌打扭伤; 茎叶: 用于肝风头痛, 刀伤出血。

备考 “亚麻”之名虽出自《图经》, 但非今之亚麻。据考证, 《图经》之“亚麻”, 《证类本草》之“威胜军亚麻子”及《纲目》之“亚麻子”系唇形科植物大花益母草(*Leonurus macranthus* Maxim.)。《名实图考》之“山西胡麻”及《纲目》所称“壁虱胡麻”显系今之亚麻。而“胡麻”之名出《别录》, 所指为胡麻科植物胡麻(即黑芝麻、脂麻), 非今之亚麻, 亦宜辨之。

## 7065006

*Reinwardtia trigyna* (Roxb.) Planch. --- *R. indica* Dumort

植物名 石海椒《高植图鉴》

药材名 过山青《四川中药志》

地方名 四川: 米汤菜; 云南: 迎春柳, 黄花香草, 小王不留行; 其他: 黄亚麻。

功效 嫩枝和叶: 清热利尿。用于黄疸型肝炎, 肾炎, 小便不利, 鼻蛆。

## 7065007

*Tirpitzia ovoidea* Chun et How ex W. L. Sha

植物名 米念芭《广西植录》

药材名 白花柴《广西本草选编》

地方名 广西: 白花木、甲升叶(龙州), 粹米(凤山), 石良花(上林), 白花树, 翠容叶。

功效 枝、茎、叶: 活血散瘀, 舒筋活络。用于跌打损伤, 骨折, 外伤出血, 风湿性关节炎, 小儿麻痹后遗症, 疮疖。

## 7065008

*Tirpitzia sinensis* (Hemsl.) Hall. --- *Reinwardtia sinensis* Hemsl.

植物名 青篙柴《高植图鉴》

药材名 青皮柴(广西、云南)

文献名 柄瓣木《药植简编》

地方名 广西: [白花藤](南丹), 鸡骨赶(凌云), 梯茛木; 贵州: 白豆瓣草; 云南: [石海椒]。

功效 根、叶: 活血, 止血, 止痛。外用于跌打, 刀伤, 肿痛。

## 7066 蒺藜科 Zygophyllaceae

## 7066001

*Nitraria roborowskii* Kom.

植物名 大白刺《华北树木志》

功效 果实: 调经活血, 消食健脾。

## 7066002

*Nitraria schoberi* L.

植物名 白棘《本经》

药材名 白棘《本经》

文献名 白茨《种分》, [枸杞]《植物名汇》, [东唐]《东北木本植志》

地方名 泡泡刺(东北), 白刺(东北、西北); 黑龙江: 拉条榆; 辽宁: [海枣]; 内蒙古: 白哈蟆(包头), 连针; 河北: 狗奶子, 野葡萄壳; 山东: 地枣。

功效 种子: 益气, 益脾胃, 助消化。

## 7066003

*Nitraria sibirica* Pall.

植物名 白刺《高植图鉴》

药材名 小果白刺《汇编》

文献名 西伯利亚白刺《中国经植志》

地方名 酸胖(内蒙古、甘肃); 内蒙古: “哈莫儿”、“哈日木格”、“卡蜜”、“哈尔马格”、“托普佐格”(蒙名), “旁白日布”(阿拉善左旗蒙名)。

功效 果实: 调经活血, 消食健脾。用于身体虚弱, 气血两亏, 脾胃不和, 消化不良, 月经不调, 腰酸腿痛。

## 7066004

*Nitraria sibirica* Pall. var. *globicarpa* (Kitag.) Kitag. --- *N. schoberi* L. var. *globicarpa* Kitag. --- *N. schoberi* L. subsp. *sibirica* (Pall.) Kitag.

植物名 球果白刺(拟)

文献名 球果东唐《东北药用植物》

功效 果实: 调经活血, 消食健脾, 滋补强壮。用于身体虚弱, 气血两亏, 脾胃不和, 消化不良, 月经不调, 腰腹疼痛。

## 7066005

*Nitraria tangutorum* Bor.

植物名 唐古特白刺《华北树木志》

药材名 白刺《内蒙古中草药》

文献名 甘青白刺《汇编》

地方名 内蒙古:酸胖,“哈尔马格”、“唐古特-哈日莫格”(蒙名)。

功效 果实:健脾胃,助消化,安神,解表,下乳。用于脾胃虚弱,消化不良,神经衰弱,感冒,乳汁不下。

7066006

*Peganum harmala* L.

植物名 骆驼蓬《高植图鉴》

药材名 骆驼蓬《新疆中草药》

文献名 老哇瓜、臭古都《沙漠药植》

地方名 内蒙古:“阿德木西”、“乌姆希-乌布斯”、“阿尔格林依德”(蒙名);陕西:苦苦菜,骆驼蒿,臭草,臭牡丹,沙蓬豆豆;甘肃:臭蒿子;新疆:“阿地热斯忙”(维名)。

功效 全草:有毒。宣肺气,祛风湿,消肿毒。用于咳嗽气短,风湿痹痛,皮肤瘙痒,无名肿毒。

7066007

*Peganum harmala* L. var. *multisecta* Maxim.

植物名 多裂骆驼蓬《内蒙古植志》

药材名 骆驼蓬《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古:“阿日嘎里-音-依德”、“奥尼图-乌没黑-额布苏”(蒙名)。

功效 地上部分及种子:有毒。宣肺止咳,祛风湿,解毒。用于咳嗽气喘,无名肿毒,风湿性关节炎。

7066008

*Peganum nigellastrum* Bge.

植物名 骆驼蒿《高植图鉴》

文献名 骆驼蓬、细叶骆驼蓬《沙漠药植》,葡根骆驼蓬《内蒙古植志》

地方名 内蒙古:“哈日-乌没黑-额布苏”(蒙名)。

功效 全草:有毒。祛湿解毒,活血止痛,宣肺止咳。用于急性风湿性关节炎,月经不调,支气管炎,咳嗽哮喘,头痛,无名肿毒,心慌气短;种子:强筋骨,祛风湿。用于咳嗽气喘,小便不利,瘫痪,瘰病,心慌烦躁,筋骨酸痛无力等。

7066009

*Tribulus cistoides* L.

植物名 大花蒺藜《海南植志》

药材名 硬蒺藜《鉴别手册》

地方名 云南:半日花状蒺藜,蒺藜。

功效 果实:通经,催乳,明目。用于风痒肿痛。

7066010

*Tribulus terrestris* L.

植物名 蒺藜《高植图鉴》

药材名 蒺藜《本经》、《药典》

文献名 茨《诗经》,蒺藜子、旁通、屈人、止行、豺羽、升推《本经》,刺蒺藜《吴普本草》,蒺藜子、即蒺《别录》,白蒺藜《药性论》,蒺藜蔓《千金翼方》,杜蒺藜《圣惠方》,休羽《纲目》,旱草《本草经解》,三角蒺藜《本草求真》,三角刺《中国药植志》,黄果刺《植物名汇》,吉立《和汉药标本目录》

地方名 硬蒺藜(东北、内蒙古、山东、江苏),蒺藜狗子(吉林、辽宁、河北、山西、安徽),鬼见愁、鬼头针(江苏、安徽);北京:蒺藜勾子;内蒙古:“依曼-章古”、“巴列蕊玛”(蒙名),刺蒺疙疸;甘肃:陀罗刺;青海:“八角刺”、“随玛拉高”(藏名);山东:蒺藜骨朵,拦路虎(烟台),古堆;江苏:蒺藜子(新海连),蒺藜骨子、白吉利(徐州),野菱角(泰州),地菱儿(泰县),地菱(镇江),草黄子、虎郎子(苏州),血见愁,蒺藜角,蒺藜草,吉力;安徽:狗娃刺,痒痒草,旱菱角,牛头刺;台湾:三脚丫,三脚马仔,三脚虎;湖南:七里丹(攸县);四川:菱角刺(西昌),棱角,八角钉,吉利草,蒺藜力,羊角刺;云南:棱角刺(永胜);其他:吉利花。

功效 果实:有小毒。平肝解郁,活血祛风,明目,止痒。用于头痛眩晕,胸肋胀痛,乳闭乳痈,目赤翳障,风疹瘙痒。

7066011

*Zygophyllum fabago* L.

植物名 骆驼蹄瓣《高植图鉴》

药材名 骆驼蹄瓣《沙漠药植》

文献名 豆叶霸王、蹄瓣根《沙漠药植》

功效 根:止咳祛痰,止痛消炎。用于支气管炎,感冒,牙痛,顽固性头痛。

7066012

*Zygophyllum oxianum* Boriss.

植物名 骆驼蹄草《新疆中草药》

功效 全草:解痉镇痛。用于顽固性头痛。

7066013

*Zygophyllum xanthoxylum* Maxim.

植物名 霸王《高植图鉴》

药材名 霸王根《沙漠药植》

功效 根:行气散满。用于腹胀。

## 7067 牻牛儿苗科 Geraniaceae

7067001

*Biebersteinia heterostemon* Maxim.

植物名 熏倒牛《高植图鉴》

药材名 熏倒牛《青海中草药》

地方名 青海:臭蒿,狼尾巴蒿,臭花椒,芭苕草。

功效 果实:清热镇惊。用于小儿惊风高热,手足抽搐痉挛,预防感冒,腹胀腹痛。

7067002

*Erodium stephanianum* Willd.

植物名 牻牛儿苗《救荒本草》、《高植图鉴》

药材名 老鹳草《纲目拾遗》、《药典》

文献名 斗牛儿苗《救荒本草》,牵巴巴《名实图考》,天罡草《分类草药性》,太阳花《植物名汇》,山牛儿苗、锈针草《华北药志》,长嘴老鹳草《中国经植志》

地方名 老乌嘴、老鹳筋(东北),老牛筋(辽宁、河北),老鹳嘴(东北、陕西、山东),老鹳嘴(吉林、辽宁、河北),老鸦嘴(河北、内蒙古、河南),贯筋(东北、新疆),老鸦爪(山东、河南);河北:五齿耙;山西:鬼圪针;内蒙古:“包哈-乌布斯”、“曼久亥”(蒙名),狼怕苗,狼怕怕;

陕西:狼把巴草, 绵绵牛; 甘肃:木藜藜, 芦花苗子; 青海:车牛路, 勾链链; 山东:小抓钩(烟台), 鹌子嘴(沂水、昌乐), 老观草, 老管草, 老鸱草, 老鸱嘴草; 浙江:将军帽、都督草(嵊县); 河南:〔血见愁〕, 抓钩草; 贵州:五叶联, 生扯拢, 破铜钱; 西藏:〔狼把草〕; 其他:土列列, 啄木鸟。

功效 地上部分:祛风湿, 通经络, 止泻痢。用于风湿痹痛, 麻木拘挛, 筋骨酸痛, 泄泻痢疾。

#### 7067003

*Erodium stephanianum* Willd. f. *atranthum* (Nakai & Kitag.) Kitag. --- *E. stephanianum* Willd. var. *atranthum* Nakai & Kitag.

植物名 紫牻牛儿苗《东北药用植物》

药材名 老鸱草(东北)

地方名 老观草(东北)。

功效 全草地上部分:祛风湿, 通经活络, 健筋骨, 清热解毒, 止泻。用于风湿性关节炎, 肢体麻木, 腰膝不利, 肢体关节疼痛, 腰腿疼痛, 坐骨神经痛, 跌打损伤, 痢疾, 急性胃肠炎, 痢疾, 月经不调, 疱疹性角膜炎。

#### 7067004

*Geranium baishanense* Y. L. Chang

植物名 长白老观草《东北草本植志》

功效 地上部分:祛风湿, 通经络, 止泻痢。

#### 7067005

*Geranium carolinianum* L.

植物名 野老鸱草《高植图鉴》

药材名 野老鸱草《中草药学》

地方名 老鸱草(江苏、浙江), 鸱嘴草(上海、浙江); 上海:鬼蜡烛, 野番茄草, 福雀草; 浙江:高山破铜钱; 安徽:老鸱嘴; 湖南:头牛儿苗, 一颗针, 牵巴巴, 鬼针子, 烫烫青。

功效 全草:祛风通络, 活血通经, 清热止泻。

#### 7067006

*Geranium dahuricum* DC.

植物名 粗根老鸱草《高植图鉴》

药材名 块根老鸱草《汇编》

文献名 块根牻牛苗《吉野》, 红根草《沙漠药植》

地方名 辽宁:老鸱筋, 老鸱草, 老鸱嘴, 贯筋; 内蒙古:“达古日音·西木德格来”(蒙语); 河北:竹沙七; 宁夏:〔红麦冬〕(泾源); 四川:“呷呷陆蹄”(藏名)。

功效 地上部分:祛风湿, 活络, 清热止泻。

#### 7067007

*Geranium delavayi* Franch.

植物名 五角叶老鸱草《高植图鉴》

药材名 赤地榆《云南药录》

地方名 云南:紫地榆, 〔隔山消〕, 德氏老鸱草(红河)。

功效 根:清热利湿, 活血止血。

#### 7067008

*Geranium erianthum* DC.

植物名 北方老鸱草(拟)

文献名 北方老观草《东北草本植志》

功效 地上部分:祛风湿, 活络, 清热止泻。

#### 7067009

*Geranium eriostemon* Fisch.

植物名 毛蕊老鸱草《高植图鉴》

文献名 毛雄蕊牻牛儿苗《中国经植志》, 毛蕊牻牛苗《吉野》, 一颗针《药植简编》

功效 地上部分:祛风湿, 活络, 清热止泻。

#### 7067010

*Geranium eriostemon* Fisch. var. *hypoleucum* Nakai

植物名 毛叶毛蕊老鸱草(拟)

文献名 毛叶毛蕊牻牛苗《吉野》

功效 地上部分:祛风湿, 活络, 清热止泻。

#### 7067011

*Geranium franchetii* R. Kunth

植物名 灰岩紫地榆《云南种录》

文献名 华中老鸱草《广西植录》, 圆齿老鸱草《神农架药录》

地方名 湖北:破血子(神农架); 云南:五叶草。

功效 地上部分:祛风湿, 活络, 清热止泻, 调经。

#### 7067012

*Geranium henryi* R. Kunth

植物名 血见愁老鸱草《高植图鉴》

药材名 破血七《湖北植志》

地方名 湖北:破血子(巴东)。

功效 全草:祛风湿, 止泻痢, 解疮毒; 根茎:破瘀积。用于关节炎。

#### 7067013

*Geranium hupehanum* R. Kunth

植物名 湖北老鸱草《湖北植志》

药材名 湖北老鸱草《神农架药录》

地方名 湖北:破血七(神农架)。

功效 根茎:活血通经, 祛风湿。

#### 7067014

*Geranium japonicum* Franch. et Sav. --- *Geranium sieboldii* Maxim.

植物名 突节老鸱草《高植图鉴》

文献名 突节牻牛苗《吉野》, 直立老鸱草《药植简编》

地方名 辽宁:直立贯筋。

功效 地上部分:祛风湿, 活络, 清热止泻。

#### 7067015

*Geranium kariense* R. Kunth

植物名 滇川老鸱草《高植图鉴补编》

地方名 贵州:五瓣草。

功效 全草:祛风除湿, 止咳化痰。用于风湿关节炎, 烂疮久不收口, 风热咳嗽, 痢疾。

#### 7067016

*Geranium koreanum* Kom.

植物名 朝鲜老鸱草《高植图鉴》

地方名 辽宁:老鸱嘴, 山鸡花。

功效 全草:祛风通络, 活血通经, 清热止泻。

#### 7067017

*Geranium maximowiczii* Regel et Maack

植物名 兴安老鹳草《高植图鉴》

文献名 桃色老鹳草《东北植药图志》, 马氏牻牛苗《吉野》

功效 地上部分: 祛风湿, 活络, 清热止泻。

7067018

*Geranium napuligerum* Franch.

植物名 萝卜根老鹳草《高植图鉴》

地方名 四川: 老鹳草、老贯草(峨眉山); 云南: 圆果隔山消(丽江)

功效 根、全草: 祛风湿, 活血镇痛。用于胃痛, 疝气, 劳伤, 痢疾。

7067019

*Geranium nepalense* Sweet --- *G. nepalense* Sweet var. *thunbergii* (Sieb. et Zucc.) Kudo

植物名 尼泊尔老鹳草《高植图鉴》

药材名 老鹳草《滇南本草》、《汇编》

文献名 牻牛儿苗《救荒本草》, 五叶草、老官草、六阳草、南方老鹳草《滇南本草》, 紫地榆《名实图考》, 油沙七《植物名汇》, 风露草、神与草《和汉药理学》, 天罡草《分类草药性》, 牻牛儿、贯金、公藤《和汉药标本目录》, 短嘴老鹳草《中国经植志》, 老观草《东北草本植志》, 东亚老鹳草《湖北植志》, 南老鹳草《广西植志》

地方名 牻牛儿苗(江西、台湾、河南、四川), 鹤形草(西南); 青海: 鸦鸦嘴, 狼把草; 湖北: 老岩孔; 广西: 野棉花; 四川: 白花老鹳草, 老花乌草, 老贯草, 抓地草, 铁灯碗, 鹭嘴草(冕宁); 贵州: 五叶联, 五叶莲, 破铜钱; 云南: 五瓣草(昆明、红河、保山、丽江、曲靖), 五皮风(文山), 五朵云, 水药(东川), 生扯拢、老鸦爪、草狐狸、狗足迹草、猫爪草、猫脚迹草、野麻(红河), (白花地丁)(临沧), 猫脚印(保山), 猫脚迹, 狗脚血竭(玉溪), 糯隔山消。

功效 地上部分: 祛风湿, 活络, 清热止泻。用于风湿痹痛, 麻木拘挛, 筋骨酸痛, 泄泻痢疾。

7067020

*Geranium paishanense* Y. L. Ching --- *G. dahuricum* DC. var. *alpinum* Bar. et Skv.

植物名 长白老鹳草《东北草本植志》

文献名 高山块根老鹳草《吉野》, 草地老鹳草《高原中草》

功效 地上部分: 祛风湿, 活络, 清热止泻。

7067021

*Geranium pratense* L.

植物名 草原老鹳草《高植图鉴》

文献名 草甸老观草《东北草本植志》, 草地老鹳草《中草药》

地方名 甘肃: 红根草。

功效 全草: 消炎止血, 祛风湿, 通经活络。用于咯血, 胃痛, 血崩, 风湿性关节炎, 肾结核尿血, 痢疾, 肠炎等; 根、根茎: 清热, 消肿。用于肺炎, 传染病发烧, 感冒, 水肿。

7067022

*Geranium pylzowianum* Maxim.

植物名 甘青老鹳草《高植图鉴》

文献名 珠根老鹳草《秦岭植志》, 青藏牻牛儿苗《青藏药图》

地方名 青海: “贾贝”(藏名)。

功效 地上部分: 祛风湿, 活血通经, 清热止泻。

7067023

*Geranium refractoides* Pax et Hoffm.

植物名 反瓣老鹳草《云南种录》

药材名 副品榜玛《迪庆藏药》

文献名 紫萼老鹳草《迪庆藏药》

功效 根: 清热解毒。用于劳损发烧, 食物中毒。

7067024

*Geranium robertianum* L.

植物名 纤细老鹳草《高植图鉴》

药材名 红老鹳草(四川宜宾)

文献名 汉荭鱼腥草《名实图考》, 汉荭鱼腥草《中国经植志》, 细裂老鹳草《西昌中草药》

地方名 [满山红](四川、云南); 四川: 石草(西昌), 老精官草(万县), 臭草(会东); 云南: 水药(东川), [白花地丁]、鹿纸(临沧), 老鹳草(丽江), 狗脚血竭(玉溪), 野麻(红河), 石炭酸校草, 猫脚印, 凤尾小贯筋。

功效 地上部分: 祛风湿, 活血通经, 清热止泻。

7067025

*Geranium sibiricum* L.

植物名 鼠掌老鹳草《高植图鉴》

药材名 老鹳草《纲目拾遗》、《药材学》

文献名 块根牻牛儿苗《东北药植志》, 块根老鹳草《中草药》, 块根牻牛儿苗《青海中草》, 牻牛儿苗《药植简编》, 短嘴老鹳草《中药大辞典》, 西伯利亚老鹳草《沙漠药植》, 鲜卑老鹳草《湖北植志》

地方名 公藤(吉林、辽宁), 鼠掌草(吉林、辽宁、内蒙古、四川), 老鸦筋(东北、河北), 贯筋(东北、山西), 白毫花(山西、陕西); 辽宁: 老鸦嘴, 白毫菜; 内蒙古: “西比日-西木德格来”(蒙语); 山西: 风雾草; 陕西: 五爪龙(凤县), 老鸦嘴(渭南), 地泡草, 红草, 鲜红草(镇坪); 山东: 拉狗丹(青岛); 其他: 痢疾草, 痢疾普儿, 狗尾吊, 云雾散, 现草(朝鲜名), 贯金。

功效 地上部分: 祛风湿, 活血通经, 清热止泻。

7067026

*Geranium sinense* R. Kunth --- *G. platypetalum* Franch.

植物名 中华老鹳草《高植图鉴》

地方名 云南: 观音倒座草(大理)。

功效 根: 止痢。用于痢疾。

7067027

*Geranium soboliferum* Komar.

植物名 线裂老鹳草《高植图鉴》

文献名 匍枝老鹳草《中药志》, 匍枝牻牛苗《吉野》, 线叶老鹳草《东检》

功效 地上部分: 祛风湿, 活血通经, 清热止泻。

7067028

*Geranium strictipes* R. Kunth

植物名 条棱老鹳草《中药志》

药材名 紫地榆《名实图考》、《形性鉴别》

文献名 赤地榆、万两金《滇南本草》，高山老鹳草《西昌中草药》

地方名 四川：红寒药（德昌、会东），隔山撬（冕宁）；云南：〔地榆〕、〔隔山消〕（昆明），红地榆。

功效 根：清热利湿，活血止血。用于肠炎，痢疾，消化不良，慢性胃炎，月经不调，鼻衄。外用于跌打损伤。

#### 7067029

*Geranium tsingtauense* Yabe

植物名 青岛老鹳草《高植图鉴》

功效 地上部分：祛风湿，活血通经，清热止泻。

#### 7067030

*Geranium wallichianum* D. Don ex Sweet

植物名 宽托叶老鹳草《西藏植志》

文献名 白隔山消《云南药录》，瓦氏老鹳草《云南种录》

功效 根：健脾消食，祛风除湿，止血生肌。用于食积腹痛，痞积，消化不良，腹泻，胃寒痛，风湿痛，外伤出血。

#### 7067031

*Geranium wilfordii* Maxim. --- *G. chinense* Migo

植物名 老鹳草《高植图鉴》

药材名 老鹳草《纲目拾遗》、《药典》

文献名 威氏老鹳草《中国经植志》，三裂叶牻牛苗《吉野》，鸭脚老鹳草《汇编》，短嘴老鹳草《湖南药物志》  
地方名 浙江：鸭脚草；广西：子午天葵（全州）；四川：大老鹳草（峨眉山）；其他：五叶草，老鹳筋，破铜钱，鸭子嘴。

功效 地上部分：祛风湿，通经络，止泻痢。用于风湿痹痛，麻木拘挛，筋骨酸痛，泄泻痢疾。

#### 7067032

*Geranium wilsonii* Kunth

植物名 无毛老鹳草《湖北植志》

药材名 无毛老鹳草《神农架药录》

地方名 湖北：破血子（神农架）。

功效 带根全草：祛风湿，通经络，活血脉。

#### 7067033

*Geranium vlassovianum* Fisch. ex Link

植物名 灰背老鹳草《高植图鉴》

文献名 绒背老鹳草《东检》，毛老鹳草《中药志》，绒背牻牛苗《吉野》

地方名 老鹳草（黑龙江、吉林）；吉林：老管草，贯筋。

功效 地上部分：祛风湿，通经络，止泻痢。

#### 7067034

*Geranium yezoense* Franch. et Sav.

植物名 沙头老鹳草《汇编》

地方名 四川：风露草，老鹳七（南川），老鹳草（峨眉山），红花老鹳草，金山老鹳草。

功效 地上部分：祛风湿，通经络，止泻痢。

#### 7067035

*Pelargonium capitatum* Ait.

植物名 洋香菊《台湾药植志》

功效 茎、叶蒸馏之挥发油：用于咳嗽，肋膜炎，呼吸器官疾患

#### 7067036

*Pelargonium graveolens* L. Her.

植物名 香叶天竺葵《高植图鉴》

药材名 香叶草（广西）

文献名 香叶天竺葵《汇编》

地方名 香叶（台湾、广东、广西、四川），香草（江苏、四川）；浙江：香水花；上海：香叶入腊红；广西：香艾。

功效 全草：用于风湿，阴囊湿疹，疥癣；叶：用于疝气；叶挥发油（香茅油）：用于宫颈癌。

#### 7067037

*Pelargonium hortorum* Bailey

植物名 天竺葵《高植图鉴》

药材名 入腊红（上海）

文献名 石腊红《云南中草药》

地方名 月月红（四川、云南）；甘肃：洋绣球；上海：日烂红；湖北：绣球花（神农架）；广东：木海棠，洋葵；广西：香叶（南宁）；四川：老来红。

功效 花：清热消炎。用于中耳炎。

#### 7067038

*Pelargonium odoratissimum* Willd.

植物名 香天竺葵《台湾药植志》

功效 叶、茎蒸馏之挥发油：用于呼吸器官疾患，肺结核。

#### 7067039

*Pelargonium radula* L. Herit.

植物名 菊叶天竺葵《药植简编》

地方名 上海：菊叶入腊红。

功效 全草：用于风湿，阴囊湿疹，疥癣；叶：用于疝气；叶挥发油：用于宫颈癌。

### 7069 酢浆草科 Oxalidaceae

#### 7069001

*Averrhoa bilimbi* L.

植物名 木胡瓜《台湾药植志》

药材名 三敛子《纲目拾遗》

文献名 三帘（杨孚《异物志》），三廉子《纲目》，羊桃、洋桃、山敛、鼠矢、羊肠、御弋《纲目拾遗》，三茎《生草药性备要》，三捻《台湾药植志》

地方名 广东：三敛，酸三稔，新阳桃；广西：三棱子，三脸木特。

功效 果实：收敛，健胃，清凉剂；果汁：用于眼病；叶：用于梅毒，肤痒，耳下腺炎，关节炎，小丘疹；花：用于咳嗽，鹅口疮。

#### 7069002

*Averrhoa carambola* L.

植物名 阳桃《高植图鉴》

药材名 阳桃《纲目》、《汇编》

文献名 五敛子《南方草木状》,羊桃《桂海虞衡志》,五棱子《纲目》,杨摇子《花镜》,杨桃《生草药性备要》,山敛《纲目拾遗》,洋桃《植物名汇》,阳桃叶、阳桃花、阳桃根《岭南采药录》

地方名 五棱果(云南、广西);北京:五角梨;福建:凤鼓、鬼桃、凤果(泉州),撬轴瓜(武平);台湾:杨梅桃,绿磷;广东:新杨桃(从化);广西:酸五棱,木踏子,酸阳桃(邕宁),牛巴木、木轴子(北海),五楞果。

功效 根:涩精,止血,止痛。用于遗精、鼻衄、慢性头痛,关节疼痛;枝、叶:祛风利湿,消肿止痛。用于风热感冒,急性胃肠炎,小便不利,产后浮肿,跌打肿痛,痈疽肿毒;花:清热。用于寒热往来;果:生津止咳。用于风热咳嗽,咽喉痛。

#### 7069003

*Biophytum esquirolii* Levl.

植物名 分枝感应草《高植图鉴》

地方名 云南:骨筋草(玉溪),大还魂草。

功效 全草:有小毒。安神镇静,散瘀止痛,收敛止血。用于神经衰弱,失眠,跌打损伤,咯血,外伤出血,带状疱疹。

#### 7069004

*Biophytum nanum* H. Chuang --- *B. sensitivum* auct. non (L.) DC.

植物名 感应草《高植图鉴》

药材名 感应草《汇编》

文献名 还魂草、生命草《种分》,迷魂草《广西药录》,小礼花《台湾药植志》

地方名 广西:降落伞(田东),含羞草(南宁),落伞草(岑溪);云南:〔荷包草〕、大含羞草、喝呼草(河口),安胎药,〔筋骨草〕,吓唬羊,罗伞草。

功效 全草:消积,利水。用于小儿疳积,水肿。

#### 7069005

*Biophytum sessile* (Ham.) Kunth

植物名 无柄感应草《云南种录》

药材名 感应草《云南中草药》

地方名 云南:安胎药(思茅),骨筋草(玉溪),吓唬草(红河),还魂草。

功效 全草:有小毒。温健脾阳,安胎固脱。用于胎动不安,脾脏肿大,内出血,脱肛,子宫脱出。

#### 7069006

*Oxalis acetosella* L.

植物名 山酢浆草《东北草本植志》

药材名 深山酢浆草《汇编》

文献名 白花酢浆草《东检》,白鳞酢浆草《云南种录》

地方名 三块瓦、酸溜溜(东北);吉林:酢浆草;辽宁:小山锄板。

功效 全草:活血化瘀,清热解毒。用于劳伤疼痛,麻疯,无名肿毒,癩子,疥癣,小儿鹅口疮,烫火伤,蛇咬伤,脱肛,跌打扭伤。

#### 7069007

*Oxalis acetosella* L. var. *japonica* (Franch. et Savat.) Makino --- *O. japonica* Franch. et Savat.

植物名 深山酢浆草《汇编》

药材名 深山酢浆草《汇编》

地方名 陕西:大酸溜溜;四川:三块瓦,地海椒(南充);贵州:山酢浆草,三叶铜钱草(惠水),飞蛾草,飞蛾七(铜仁)。

功效 全草:活血化瘀,清热解毒。用于劳伤疼痛,麻疯,无名肿毒,癩子,疥癣,小儿鹅口疮,烫火伤,蛇咬伤,脱肛,跌打扭伤。

#### 7069008

*Oxalis corniculata* L. --- *O. repens* Thunb.

植物名 酢浆草《高植图鉴》

药材名 酢浆草《唐本草》、《汇编》

文献名 酸箕(李当之《药录》),三叶酸草(千金方),醋母草、鸠酸草、小酸茅(唐本草),雀林草《外台秘要》,酸浆、赤孙施《图经》,醋啾啾、田字草《百一选方》,酸浆草《履巇岩本草》,雀儿草、酸母草《永类铃方》,酸饺草《滇南本草》,小酸苗《品汇精要》,酸草《摘元方》,三叶酸、三角酸、雀儿酸《纲目》,酸迷迷草《纲目拾遗》,斑鸠草、酸味草《生草药性备要》,三叶酸浆《名实图考》,酸酸草《分类草药性》,酸斑斑《岭南采药录》,洛神珠《和汉药理学》,匍匐酢浆草《种分》,婆姑酸、酢母草《民间药与验方》,老鸭嘴《高植图鉴》,黄花酢浆草《广西植录》

地方名 咸酸草(福建、浙江),酸梅草(江西、安徽、陕西、湖南、江苏),三叶破铜钱、黄花草(江西、陕西),黄花草(湖南、江西),酸梅子草(上海、浙江),盐酸草(浙江、台湾、福建),酸咪咪(贵州、江苏、广西),老鸦酸(湖南、广东、广西),斑鸠酸(福建、广西、广东),鸪鹑酸(浙江、广东),三叶草(陕西、湖北),黄花草(湖南、福建),酸酢草(福建、广西);河北:六叶酸;陕西:瑟瑟草(山阳),小三梅草、小叶酸草(柞水),酸醋浆;山东:痲汉腿(五莲),醋溜溜(威海),酸溜草(烟台);江苏:酸得溜,疔草,雨箭草;上海:东阳花草,水晶花,劈碰草,酸梅菜,酸酸梅,野草头,酸咪咪草;浙江:蒲瓜酸,小鸡草,红叶老鸡饭,酸滋草(泰顺),浆儿莓酸(温州、永嘉、乐清);安徽:酸溜子;江西:九九酸(吉水),酸米草(婺源),野早瓜、酸酒草(泰和),酸老九(德兴);福建:酸芝草(宁德),酸批子,菇菇酸(宁化),甜细花(龙岩),沙节波(三明),隔夜合(福清),酸披草(政和、松溪),夜牵藤,没头露草,啊啊草,白来露,酸芝,勃菰酸,酸兰草,茅酸草,武露草,〔梅花草〕,色瓜草,三角盐酸草,酸露草,珠仔草,咸酸仔草,盐酸甜草,咸酸甜草,老鸦饭,霜露草,何丕草(闽东),没头路草,干地葡萄酸(明溪),沙斋泡(三明),酸斋;台湾:盐酸仔草,山盐酸,胡蝇翼;河南:酸不浆,酸不溜,酸婆婆鸡,酸瓜草,酸酒缸,酸黄公秧,酸葡萄秧;湖北:酸米子草,酸儿子草(神农架);湖南:六叶莲,野王瓜草,王瓜酸,冲天泡,长血草,老鸦草,雷公剪,雀灵草,四叶草,老鸦酸草,寅时消,酸王小草,扭金草,红山眯草,红马子害,三梅草,恨天雷(常德);广东:白鸡酸(阳江、阳春、化州、高州、连筠鸡盐酸

(五华), 盐鸡酸(连平), 鹧鸪酸(河源), 盐酸鸡(普宁、陆丰、潮安), 卜鸡酸(兴宁、紫金、东莞、博罗、增城), 黄鹧酸草(从化), 果(台山、新会), 架黄瓜、蛇拍仔(广宁、四会、德庆、封开、怀集), 仆鸡酸(惠阳), 亚公蕉, 咸酸仔、咸酸藤(潮汕), 咸酸甜(潮安、潮州), 咸酸鸡(潮阳), 盐酸鸡仔(普宁), 小号盐酸鸡(惠来), 味酸草、味酸仔(海丰), 咕咕酸、酸冬仔、小斑鸡酸(紫金), 卜鸡酸(饶平), 鸪鸡盐酸(五华), 鸡酸, 水流菜, 甜酸果(台山); 海南: 探花(临高), {金钱草}(琼山), 酸甜草, 地酸菜, 水盐酸, 鹧鸪酸; 广西: 铺地莲, 满天星, 阴阳草(龙州), 天边吊(北流), 罗亚草(苍梧), 仆鸡酸(博白、陆川), 崩沟酸(罗城), 阿婆酸(昭平), 坡鸡酸(合浦、钦县), 酸黄爪菜(兴安), 酸林草(那坡), 酸江江(柳江), 斑鸡窝(田东), 炮肚草, 酸了草, 酸甲菜, 三叶菜, 酸菜草, [接骨仙桃], 出阵兵, 鸪鸡蒜, 粘酢浆草, 酸米米; 四川: 爆肚子, 捺铜草, 三合心草, 孩儿酸(成都), 酸夫儿草(峨眉山); 贵州: 急性草、黄爪香(黔阳); 云南: 酸角草, 酸爪草(楚雄), 老鸦腌菜。

**功效** 全草: 清热利湿, 解毒消肿。用于感冒发热, 肠炎, 肝炎, 尿路感染, 尿路结石, 神经衰弱。外用用于跌打损伤, 毒蛇咬伤, 痈肿疮疖, 脚癣, 湿疹, 烧烫伤。

## 7069009

*Oxalis corymbosa* DC. --- *O. martiana* Zucc.

**植物名** 红花酢浆草《高植图鉴》

**药材名** 红花酢浆草《汇编》

**地方名** 大酸味草(云南、广东、湖北), 铜锤草(浙江、广西、四川); 福建: 大咸酸甜草, 水酸芝(宁德、福安), 一粒雪, 隔夜合(福清、福州), 大号酸甜草(泉州), 大号荷包(福鼎), 四味仔草(同安), 钩草(福州); 湖北: 紫花酢浆草, 红酸米子草, 南天七(鹤峰、神农架), 百合还阳(巴东), 土三七(神农架); 广东: 大种老鸦酸; 广西: 酢浆草(全州), 老鸡酸(阳朔), 大酸味(忻城), 大叶酢浆草, 地人参, 三夹莲, 天鹅孵蛋, 六角莲, 地虾孙, 四英草; 四川: 紫酢浆草, 红酢浆草; 贵州: 大老鸦酸(铜仁), 地麦子草, 地麦子(独山)。

**功效** 全草: 清热解毒, 散瘀消肿, 调经。用于肾盂肾炎, 痢疾, 咽炎, 牙痛, 月经不调, 白带。外用用于毒蛇咬伤, 烧、烫伤。

## 7069010

*Oxalis griffithii* Edgew. et Hook. f.

**植物名** 麦穗酢浆草《汇编》

**药材名** 麦穗七(陕西、湖北)、《汇编》

**文献名** 西南酢浆草《广西药录》, 白花酢浆草《药植简编》, 山酢浆草《高植图鉴》, 三角叶酢浆草《广西植录》

**地方名** 麦吊七(四川、湖北、湖南); 陕西: 钻地蜈蚣, 断脚蜈蚣, 大酸梅草; 湖北: 大酸米子草, 上天梯, 麦子七、麦刁七、麦王七、一条龙(巴东); 湖南: 老鸦酸, 青龙草(衡山); 广西: 蝴蝶草(龙胜), 大蚂拐草(灌阳); 四川: 地海椒, 三瓣草, 飞蛾七, 三块瓦、三皮瓦(峨眉山), 白寒石, 八股绳, 麦须黄(万县); 贵州: 三叶铜钱草; 云南: 红雀草, 飞天鹅(昭通), 四瓣叶(丽江)。

**功效** 根或全草: 止血止痛, 舒筋活络, 清热解毒, 消肿止痛。用于泄泻, 痢疾, 目赤肿痛, 小儿口疮。外用用于乳腺炎, 带状疱疹。

## 7069011

*Oxalis hupehensis* R. Kunth

**植物名** 湖北酢浆草《汇编》

**文献名** 三叶铜钱草、九重隔、飞蛾草《汇编》

**功效** 根或全草: 止血止痛, 舒筋活络, 清热解毒, 消肿止痛。

## 7069012

*Oxalis obtusangulata* Maxim.

**植物名** 三角酢浆草《东北草本植志》

**文献名** 大山酢浆草《植物学大辞典》

**地方名** 辽宁: 山锄板。

**功效** 全草: 清热利湿, 解毒消肿。

## 7069013

*Oxalis stricta* L.

**植物名** 劲直酢浆草《汇编》

**药材名** 扭筋草《湖南药物志》

**文献名** 紧密酢浆草《中药大辞典》, 酸黄爪、三六九、酸溜溜、直酢浆草《东北草本植志》

**地方名** 辽宁: 酸溜溜; 湖南: 老鸦酸, 酢浆草。

**功效** 全草: 有小毒。杀虫, 止痛, 散瘀, 消肿, 祛瘀。用于丝虫病初期, 淋病, 跌打损伤。外用用于肿毒, 烫火伤, 疥癣。

## 7069014

*Oxalis violacea* L.

**植物名** 紫酢浆草《台湾药植志》

**文献名** 紫花酢浆草《台湾药植志》

**地方名** 北京: 三叶兰, 夜合兰。

**功效** 叶: 消肿, 疗疮。

## 7070 旱金莲科 Tropaeolaceae

## 7070001

*Tropaeolum majus* L.

**植物名** 旱金莲《高植图鉴》

**药材名** 旱金莲《汇编》

**文献名** 金丝莲、金狮铃《滇南本草》, 金莲花、大红鸟《名实图考》, 旱莲花《广西本草选编》

**地方名** 上海: 旱荷花; 广西: 吐血丹; 云南: 荷叶莲, 荷叶七(保山)。

**功效** 全草: 清热解毒, 凉血止血。外用用于目赤肿痛, 痈疽肿毒。

## 7071 凤仙花科 Balsaminaceae

## 7071001

*Impatiens apalophylla* Hook. f.

**植物名** 大叶凤仙花《高植图鉴》

**地方名** 广西: 山泽兰(苍梧)。

**功效** 全草: 散瘀, 通经。用于疮毒。

## 7071002

*Impatiens arguta* Hook. f. et Thoms.

植物名 锐齿凤仙花《高植图鉴》

文献名 西藏凤仙花《汇编》

地方名 西藏:凤仙花。

功效 花:通经活血,利尿。用于经闭腹痛,产后瘀血不尽,下死胎,小便不利,疔毒痈疽。

#### 7071003

*Impatiens balsamina* L.

植物名 凤仙花《救荒本草》、《高植图鉴》

药材名 凤仙透骨草《品种论述》,急性子《救荒本草》、《汇编》

文献名 金凤花《世医得效方》,金凤花子《摘元方》,透骨草《灵秘丹药笺》,小桃红、[夹竹桃]、海药、染指甲草、凤仙《救荒本草》,早珍珠、菊婢、好女儿花、凤仙子《纲目》,凤仙草《珍异药品》,透骨白、透骨红《采药书》,指甲花《草木便方》,染指甲、小桃花、爪红《新纲》,媚容《满州情录》,巨性子《和汉药名汇》,鲜凤仙透骨草《药典》

地方名 机机草花、季季草、此帽草、手盖花、家桃花、指甲草(东北),染指头花、指甲桃、顶儿凤、顶头凤、凤儿花、龙爪凤仙花(华东),凤仙花子(江苏、四川),凤仙骨(天津、江苏、上海、台湾),手指甲花(江西、福建);吉林:郎郎蜜豆角;河北:海莲花;甘肃:海拉;青海:海拿;山东:指甲桃花;江苏:凤仙花杆(无锡),凤仙草桔(清江);上海:凤仙花梗;浙江:满堂红;江西:金童花;福建:芋子花、手指花(清流),棕南花(龙岩),手甲花(三明),白金凤,染指甲花;河南:小桃草;广东:紫背茛(宝安);广西:水指甲(南宁),白凤仙;四川:指甲花子,催生子;贵州:透骨丹;云南:金凤子,山金凤;其他:凤仙透。

功效 种子:有小毒。活血通经,软坚消积。用于闭经,难产,骨鲠咽喉,肿块积聚;花:有小毒。活血通经,祛风止痛,外用解毒。用于闭经,跌打损伤,瘀血肿痛,风湿性关节炎,痈疔疮,蛇咬伤,手癣;茎或全草(开白花者):有小毒。祛风湿,活血,止痛。用于风湿关节痛,屈伸不利。

#### 7071004

*Impatiens chinensis* L.

植物名 华凤仙花《高植图鉴补编》

药材名 水凤仙(广东、广西)

文献名 华凤仙《湖南药物志》,水边指甲花《汇编》

地方名 [水仙花](湖南、广西);广东:入冬雪,耳环草;广西:指甲花(贵县),假指甲花(陆川),水甲花(南宁、博白、岑溪、昭平),小红象(玉林),倒吊耳环(北流),水指甲(昭平),水指甲花。

功效 全草:清热解毒,活血散瘀,消肿拔脓。用于肺结核,颜面及喉头肿痛,热痢。外用于蛇头指疔,痈疮肿毒。

#### 7071005

*Impatiens claviger* Hook. f.

植物名 棒凤仙花《高植图鉴补编》

文献名 棒凤仙《广西植录》

地方名 广西:棒状凤仙,[金耳环](博白)。

功效 全草:清凉,消肿。用于痈疮肿毒。

#### 7071006

*Impatiens commelinoides* Hand. -Mazz.

植物名 鸭跖草状凤仙花《高植图鉴补编》

文献名 类鸭跖草凤仙花《江西药录》

功效 全草、种子:祛风,活血,消肿,止痛。

#### 7071007

*Impatiens cyanantha* Hook. f.

植物名 蓝花凤仙花《高植图鉴补编》

药材名 蓝花凤仙花《贵州药录》

功效 全草:用于舒筋活络,跌打肿痛,蛇咬伤。

#### 7071008

*Impatiens davidii* Franch.

植物名 桔岭凤仙花《高植图鉴补编》

药材名 黄凤仙花《中药大辞典》

文献名 野凤仙《药植简编》

地方名 贵州:肥婆娘(兴义),岩指甲花。

功效 全草或根:消积,止痛。用于小儿疳积,无名肿毒;老茎去髓:外用于牙龈溃烂。

#### 7071009

*Impatiens lasiophyton* Hook. f.

植物名 毛凤仙花《高植图鉴补编》

药材名 毛凤仙花《贵州药录》

地方名 贵州:白花野指甲。

功效 全草:用于舒筋活络,跌打肿痛,蛇咬伤。

#### 7071010

*Impatiens leptocaulon* Hook. f.

植物名 细柄凤仙花《高植图鉴》

药材名 冷水丹《湖北中草药志》

地方名 湖北:白冷草,红苋,花儿草,冷草,冷水七,冷水芪,瞿芝麻(神农架);湖南:红冷草;贵州:劳伤药。

功效 全草:理气和血,舒筋活络。用于疟疾,跌打损伤,劳伤腰痛,外伤出血,胃痛,产后血气痛,湿气水肿,淋症下血;根、根茎:散瘀活血。用于风湿性关节炎,跌打青肿。

#### 7071011

*Impatiens loulanensis* Hook. f.

植物名 路南凤仙花《高植图鉴补编》

药材名 亮光菜《贵州药录》

功效 全草:用于舒筋活络,跌打肿痛,蛇咬伤。

#### 7071012

*Impatiens microcentra* Hand. -Mazz.

植物名 小距凤仙《云南种录》

文献名 短距凤仙花《中药大辞典》

地方名 贵州:水指甲(绥阳),肉爬皂。

功效 全草或根:解热,止痛。用于筋骨疼痛,喉痛。

#### 7071013

*Impatiens monticola* Hook. f.

植物名 山凤仙《广西药录》

地方名 广西:[金耳环](博白)。

功效 茎、叶:清凉,消肿。用于热疮。



## 7071014

*Impatiens noli-tangere* L.

植物名 水金凤《高植图鉴》

药材名 水金凤《名实图考》、《汇编》

文献名 辉花菜《植物名汇》, 辉菜花《高植图鉴》, 匙毛萼凤仙花《中药通报》

地方名 野凤仙花(河南、湖南); 内蒙古: “扎恩·哈木口·其其格”(蒙名), 野凤仙; 湖北: 野芝麻、跳芝麻(神农架); 湖南: 水凤仙, 白辣草, 竹节菜(瑶名); 四川: 花儿草(峨眉山); 贵州: 小泽药, 劳伤药, 毒气药。

功效 根及全草: 活血调经, 舒筋活络。用于月经不调, 痛经, 跌打损伤, 风湿疼痛, 阴囊湿疹, 肾病, 膀胱结石。

## 7071015

*Impatiens obesa* Hook. f.

植物名 丰满凤仙花《高植图鉴》

地方名 广西: 山泽兰(苍梧), {金耳环}(博白)。

功效 全草: 拔毒, 消肿。用于痈疮肿毒, 跌打损伤。

## 7071016

*Impatiens omeiana* Hook. f.

植物名 峨眉凤仙花《高植图鉴补编》

文献名 峨山凤仙花《高植图鉴》

地方名 四川: 霸王七(峨眉山)。

功效 根: 解毒, 利湿, 消肿。

## 7071017

*Impatiens pinfanensis* Hook. f.

植物名 块节凤仙花《高植图鉴补编》

药材名 块节凤仙花《贵州药录》

地方名 贵州: 万年把, 串铃, 小洋芋。

功效 块茎: 祛瘀止痛, 祛风除湿。用于风寒感冒, 风湿骨痛, 经闭, 喉蛾, 骨折。

## 7071018

*Impatiens sicutifer* Hook. f.

植物名 黄金凤《高植图鉴补编》

文献名 短刀凤仙花《福建植志》

功效 全草、种子: 祛风, 活血, 消肿, 止痛。

## 7071019

*Impatiens textori* Miq.

植物名 野凤仙花《名实图考》、《东北草本植志》

药材名 霸王七《四川中药志》

地方名 广西: 假凤仙花、假指甲花(陆川); 四川: 万年把(南川), 花儿草、鸡儿花、惊风侧(西昌)。

功效 全草: 清凉, 解毒, 去腐。用于恶疮溃疡; 块根: 祛瘀, 消肿, 解毒。用于跌打损伤及痈疮。

## 7071020

*Impatiens uliginosa* Franch.

植物名 滇水金凤《高植图鉴》

药材名 水金凤《滇南本草》、《汇编》

文献名 昆明水金凤《汇编》, 湿凤仙《药植简编》

地方名 云南: 凤仙花、黄凤仙(红河), 水凤仙, 金凤花。

功效 根及全草: 活血调经, 舒筋活络。用于月经不调, 痛经, 跌打损伤, 风湿疼痛, 阴囊湿疹, 肾病, 膀胱结石; 种子或根: 用于鸡骨, 鱼刺哽喉。

7072 千屈菜科 *Lythraceae*

## 7072001

*Ammannia arenaria* H. B. K. --- *A. auriculata* Willd.

植物名 耳基水苋《中国植志》

药材名 耳水苋《汇编》

文献名 水旱莲《汇编》

功效 全草: 用于急性慢性膀胱炎, 白带过多。

## 7072002

*Ammannia baccifera* L.

植物名 水苋菜《中国植志》

药材名 水苋菜《湖南药物志》

文献名 浆果水苋《种分》

地方名 [仙桃草](湖南、广西), 细叶水苋(广东、广西); 江苏: [半枝莲]; 湖南: 结筋草; 广西: 水灵丹(钟山), 节节花(天峨)。

功效 全草: 消瘀, 止血, 接骨。用于风湿骨痛, 腱鞘炎, 水肿, 肝炎, 痈疮肿毒。

## 7072003

*Lagerstroemia indica* L.

植物名 紫薇《中国植志》

药材名 紫薇《名实图考》、《汇编》

文献名 猴郎达树《酉阳杂俎》, 紫薇花《滇南本草》, 鹭鸶花、五里香、红薇花、百日红、不耐痒树《曲洧旧闻》, 佛相花《八闽通志》, 满堂红《涌幢小品》, 怕痒花、猴刺脱《群芳谱》, 怕痒树《花镜》, 无皮树《灌园草木识》, 拘那花、苞饭花、宝碗花《名实图考》, 紫梢《民药汇编》

地方名 [紫荆皮](四川、贵州), 紫金花(西南、广西), 痒痒树(河南、陕西), 抓痒花(四川、云南); 安徽: 百日花; 江西: 紫金标, 狗骨头(上饶); 湖南: 五爪金龙, 禾花(淑浦), 羊屎树(郴县、永兴), 穷花(桑植), 鹿角叶(永兴), 宝幡花; 广东: 西洋水杨梅, 蚊子花; 广西: 阿米茶(梧州), 紫兰花(凌云), 紫蓝花; 四川: [紫荆](西昌), 山紫薇花, 痒痒树(峨眉山); 云南: 搔痒树。

功效 根、树皮: 活血, 止血, 解毒, 消肿。用于各种出血, 骨折, 乳腺炎, 湿疹, 肝炎, 肝硬化腹水; 花: 用于产后血崩, 带下淋漓, 疥癬癣疮; 叶: 用于痢疾, 湿疹, 创伤出血。

## 7072003a

*Lagerstroemia indica* L. f. *latifolia* Koehne

植物名 阔叶紫薇《云南种录》

功效 树皮: 清热解毒。用于喉痹, 闭经, 皮肤痒疹。

## 7072004

*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.

植物名 大花紫薇《中国植志》

文献名 大叶紫薇《海南植志》

地方名 广东: 百日红。

功 效 叶：外用于疟疾，脚骨折；树皮：用于腹泻；果实：用于鹅口疮；种子：用于麻醉。

## 7072005

*Lagerstroemia subcostata* Koehne

植物名 南紫薇《中国植志》

药材名 拘那花《桂海虞衡志》、《中药大辞典》

文献名 苞饭花《名实图考》，九荆《植物名汇》，小果紫薇《台湾药植志》

地方名 台湾：九号；湖北：马铃花，痒树、紫荆树（神农架）；广东：蚊仔花；广西：假山背（龙州）。

功 效 花、根：败毒，散瘀。用于痢疮肿毒。

## 7072006

*Lagerstroemia tomentosa* Presl

植物名 绒毛紫薇《中国植志》

文献名 毛叶紫薇《西双版纳傣药志》

地方名 云南：“埋摩”（西双版纳傣语）。

功 效 叶：用于疮疖肿痛，顽癣，疥疮。

## 7072007 见 7072003a

## 7072008

*Lawsonia inermis* L.

植物名 散沫花《南方草木状》、《中国植志》

药材名 散沫花《广西药录》

文献名 水木樨、指甲花《花镜》，香桂《树分》，香桂、柴指甲《中药大辞典》

地方名 台湾：染指甲；广东：手甲木，指甲木，指甲叶；海南：干甲树；云南：指甲柴。

功 效 叶：收敛，清热，止血。用于外伤出血。

## 7072009

*Lythrum anceps* (Koehne) Makino

植物名 光千屈菜《中国植志》

文献名 日本千屈菜《药植简编》

地方名 千屈菜（华南、东北）。

功 效 全草：清热解毒，凉血止血。

## 7072010

*Lythrum intermedium* Ledeb. ex Colla --- *L. salicaria* L.  
var. *glabrum* Ledeb.

植物名 中型千屈菜《中国植志》

文献名 无毛千屈菜《东北草本植志》

功 效 全草：清热解毒，凉血止血。

## 7072011

*Lythrum salicaria* L.

植物名 千屈菜《中国植志》

药材名 千屈菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 河西柳《满蒙野卉》，水柳、狼尾巴花、紫蒿子《满洲植录》，毛千屈菜《李《药植》》，水枝锦《科裁》，短瓣千屈菜《中国植物图鉴》

地方名 对叶莲（贵州、山东）；内蒙古：“希润-其其格”（蒙语）；山东：[马鞭草]，蜈蚣草（平度），败毒草；上海：水芝锦；湖南：对牙草；广西：水槟榔（富川）；四川：棉包根（会理），[鸡骨草]；贵州：大关门草；其他：败毒莲，地蜈蚣草。

功 效 全草：清热解毒，凉血止血。用于肠炎，痢

疾，便血。外用于外伤出血

## 7072012

*Lythrum salicaria* L. var. *tomentosa* (DC.) DC. --- *L. tomentosum* DC.

植物名 绒毛千屈菜《云南植志》

药材名 哮喘灵（湖南）

文献名 毛千屈菜、水滨柳《汇编》

地方名 湖南：铁菱角（衡阳），留名芳，红花留名药，铁牛角，冒风药；四川：哮喘药（会理）。

功 效 根茎、全草：清热解毒，凉血。用于痢疾，血崩，高热，哮喘。外用于宫颈炎，烧烫伤。

## 7072013

*Rotala diversifolia* Koehne

植物名 异叶节节菜《中国植志》

药材名 异叶节节菜《广西药录》

功 效 全草：用于痢疮肿毒。

## 7072014

*Rotala indica* (Willd.) Koehne

植物名 节节菜《中国植志》

药材名 节节菜《救荒本草》、《湖南药物志》

地方名 江苏：节节草；安徽：水马兰；湖南：水马齿；广西：水泉（博白），碌耳草。

功 效 全草：清热解毒。用于疮疖肿毒，指头炎。

## 7072015

*Rotala pentandra* (Roxb.) Blatt. et Hallb.

植物名 薄瓣节节菜《中国植志》

药材名 薄瓣节节菜《广西药录》

文献名 薄瓣节节菜《中国植志》

功 效 全草：用于痢疮肿毒，湿疹。

## 7072016

*Rotala rotundifolia* (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne ---  
*Ammania rotundifolia* Buch.-Ham. ex Roxb.

植物名 圆叶节节菜《中国植志》

药材名 水豆瓣（四川、云南）

文献名 水菹菜《草木便方》，水松叶（种称），圆叶水松草《西昌中草药》

地方名 圆叶节节菜（四川、广东、广西），水马桑（四川、贵州）；江西：狗牙齿；福建：小本过江龙、小本过饥草、水鸳鸯、急惊风草（泉州），田乳、齿漏草（厦门）；台湾：水猪母乳，水底金；广东：禾虾菜，假桑子；海南：水酸草，猪肥菜；广西：水泉（陆川），水毒（北流），上天梯（罗城），指甲叶（上林），水瓜子，过塘蛇，指甲草，水瓜子菜，红眼猫；四川：水指甲，水串（会东），水船草，豆瓣菜；贵州：肉矮陀陀，冰水花；云南：“牙罗喷”、“蜜蜂花”（傣语），红格草，圆节菜。

功 效 全草：清热解毒，利湿。用于肺热咳嗽，痢疾，黄疸型肝炎，尿路感染。外用于痢疮肿毒。

## 7072017

*Woodfordia fruticosa* (L.) Kurz --- *Lythrum fruticosum* L.

植物名 虾子花《中国植志》

药材名 虾子花《思茅本草》

文献名 沙花、虾花《汇编》

地方名 吴槁花(广东、广西);云南:虾子木(河口),虾米草(云县),“洞荒”(西双版纳傣语),红蜂蜜花(思茅),野红花、破血药、红虾花(玉溪)。

功效 根:调经活血,凉血,止血,通经活络。用于妇女血崩,月经不调,风湿关节炎,腰肌劳损,鼻衄,咳血。

## 7074 海桑科 Sonneratiaceae

### 7074001

*Sonneratia alba* J. Smith

植物名 杯萼海桑《中国植志》

药材名 枷果(海南)、《海洋药物》

地方名 海南:剪刀树。

功效 果汁(发酵):止溢血。

### 7074002

*Sonneratia caseolaris* (L.) Engl.

植物名 海桑《中国植志》

药材名 海桑《海洋药物》

功效 果:外用于扭伤。

## 7075 石榴科 Puniceae

### 7075001

*Punica granatum* L.

植物名 石榴《广雅》、《中国植志》

药材名 石榴皮《雷公炮炙论》、《药典》

文献名 安石榴《别录》,酸石榴皮《肘后方》,石榴根《本草经集注》,石榴壳《雷公炮炙论》,若榴、金杏《广雅》,榴花、醋石榴《海上集验方》,石榴花、石榴叶《本草拾遗》,丹若、天浆《酉阳杂俎》,石榴根皮《摘元方》,酸石榴花《圣济总录》,甜石榴《滇南本草》,酸石榴、酸榴皮、酸榴东行根、甘石榴、金碧《纲目》,金庞《群芳谱》,石榴树皮、石榴果皮、石榴树《药材学》,若榴木《中国植志》,石榴皮炭、石榴子《药典》,海石榴、安息榴、西安榴、钟石榴《中药大辞典》

地方名 山力叶(东北);福建:西榴皮,西榴,社榴花,树榴花;台湾:白石榴,红石榴,谢石榴,榭石榴;湖北:[月月红](神农架);广西:珍珠石榴(凌云);云南:水晶榴。

功效 果皮:涩肠止泻,止血,驱虫。用于久泻,久痢,便血,脱肛,崩漏,白带,虫积腹痛;种子:温中健胃。用于食欲不振,胃寒痛,胀满,消化不良,泄泻;花:用于吐血,衄血。外用于中耳炎;叶:用于急性肠炎;根:有毒。杀虫,涩肠,止带。用于蛔虫,绦虫,久泻,久痢,赤白带下。

### 7075002

*Punica granatum* L. cv. *Albescens*

植物名 白石榴《中国植志》

药材名 白石榴花《四川中药志》

文献名 白花白榴《江苏植志》

功效 花瓣:止血,涩肠。用于咳血,吐血,衄血,便血,久痢;根:祛风湿,杀虫。用于风湿痹痛,蛔虫,寸

白虫,姜片虫病。

### 7075003

*Punica granatum* L. cv. *Autilplex*

植物名 重瓣白花石榴《中国植志》

药材名 白石榴花《四川中药志》

文献名 重瓣白石榴《四川中药志》,千瓣白石榴《广西植志》,复瓣白石榴《浙江药植志》,千瓣白《秦岭植志》,复瓣白花石榴《江苏植志》

地方名 台湾:白石榴心(小枝);湖北:花石榴(神农架)。

功效 花瓣:止血,涩肠。用于咳血,吐血,衄血,便血,久痢;根:祛风湿,杀虫。用于风湿痹痛,蛔虫,寸白虫,姜片虫病。

### 7075004

*Punica granatum* L. cv. *Nana*

植物名 月季石榴《中国植志》

文献名 四季石榴(广西《园林药录》)

地方名 上海:小石榴。

功效 果皮:收敛,杀虫。用于久泻久痢,蛔虫,内出血,遗精,带下,脱肛。

### 7075005

*Punica granatum* L. cv. *Pleniflorum*

植物名 重瓣红花石榴《江苏植志》

文献名 千瓣红《台湾药植志》,千瓣红石榴《广西植志》,重瓣红石榴《华北树木志》

功效 皮、根:驱除绦虫。

## 7077 柳叶菜科 Onagraceae

### 7077001

*Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.

植物名 柳兰《高植图鉴》

药材名 柳兰《汇编》

文献名 柳草《牧野日图》,〔紫参〕《满州植志》,狭叶柳兰《药植简编》,红筷子《四川中药志》,铁筷子《云南种录》

地方名 内蒙古:“呼绷-散费图”(蒙名);湖北:鸛鸡尾(神农架);四川:山麻条(峨眉山),遍山红;云南:火烧兰(泸水),糯芋(丽江)。

功效 根茎:有小毒。调经活血,消肿止痛。用于月经不调,骨折,关节扭伤;种子冠毛:外用于刀伤,止血。

### 7077002

*Chamaenerion angustifolium* Scop. f. *pubescens* (Hau-skn.) Kitag. --- *Epilobium angustifolium* L. var. *pubescens* Hausskn.

植物名 毛柳兰《东北药用植物》

功效 根茎或全草:消肿利尿,下乳,润肠;叶:提取物有抗炎作用。用于乳汁不足,气虚浮肿,肠滑泄水,食积胀满,阴囊肿大。外用有止血作用。

### 7077003

*Circaea alpina* L. ssp. *imaicola* (Aschers. et Magn.) Kitamura --- *C. imaicola* (Aschers. et Magn.) Hand.-

Mazz.

植物名 高原露珠草《云南种录》

文献名 高山露珠草《高植图鉴》

地方名 四川:红纱草、蛆儿草、就就草、露珠草(西昌);云南:“阿划喝索”(元江哈尼语),水养麦。

功效 全草:消食、止咳,养心安神,湿肠止泻。用于跌打损伤,咳嗽,小儿疳积。

## 7077004

*Circaea cordata* Royle

植物名 牛泔草《高植图鉴》

药材名 牛泔草《贵州草药》

文献名 露珠草《种称》,心叶露珠草《吉野》,心叶谷蓼《浙江药植志》

地方名 湖北:奶花草(神农架);贵州:“都格巴”、“都格里拉”(苗名),三角叶,夜抹光,野麻光。

功效 全草:有小毒。清热解毒,生肌。外用于疮疡肿毒,外伤出血。

## 7077005

*Circaea crubescens* Franch. et Savat.

植物名 谷蓼《高植图鉴》

药材名 谷蓼《贵州药录》

功效 全株:清热解毒,化瘀止血。用于无名毒症,刀伤出血,疥疮。

## 7077006

*Circaea mollis* Sieb. et Zucc.

植物名 南方露珠草《高植图鉴》

药材名 南方露珠草《湖南药物志》

地方名 湖南:拐子菜;广西:辣椒七(全州),白辣蓼草(灌阳),水珠草,虱子草;四川:粉条根(峨眉山);云南:假蛇床子,“药思那雌”(元江哈尼语)。

功效 全草:祛瘀生新。用于跌打损伤。

## 7077007

*Circaea quadrisulcata* (Maxim.) Franch. et Savat. --- *C. lutetiana* L. ssp. *quadrisulcata* (Maxim.) Asch. et Mag.

植物名 露珠草《高植图鉴》

文献名 四沟露珠草《吉野》,水珠草《植物学大辞典》,谷蓼《江苏植志》

地方名 广西:虱子草;四川:散节血。

功效 全草:和胃气,止脘腹疼痛,利小便,通月经。

## 7077008

*Circaea quadrisulcata* (Maxim.) Franch. et Savat. f. *viridicalyx* (Hara) Kitag. --- *C. maximowiczii* (Leveille)Hara var. *viridicalyx* Hara

植物名 绿萼水珠草《东北草本植志》

药材名 绿萼水珠草《东北药用植物》

文献名 绿萼露珠草《高植图鉴》

功效 全草:和胃气,止脘腹疼痛,利小便,通月经。

## 7077009

*Epilobium amurense* Hausskn.

植物名 毛脉柳叶菜《高植图鉴》

文献名 兴安柳叶菜《吉野》,柳叶菜《药植简编》

功效 全草:收敛止血,止痢。用于肠炎痢疾,月经过多,白带。

## 7077010

*Epilobium cephalostigma* Hausskn.

植物名 岩生柳叶菜《药植简编》

药材名 虾筏草(四川),《汇编》

文献名 光华柳叶菜《秦岭植志》

地方名 内蒙古:“给鲁格日-呼崩朝日”(蒙语);青海:“恰本曲则”(藏名);四川:水串草。

功效 全草:清热,疏风,除湿,消肿。用于咽喉肿痛,伤风声哑,月经过多,水肿。

## 7077011

*Epilobium himalayense* Hausskn. --- *E. brevifolium* D.Don ssp. *trichoneurum* (Hausskn.) Raven

植物名 喜马拉雅柳叶菜《汇编》

药材名 山柳叶菜《药植简编》

文献名 西域柳叶菜《药植简编》,〔无风自动草〕《汇编》

地方名 湖北:铁心胆(神农架);四川:刷把草;云南:〔泽兰〕(玉龙山),〔怀胎草〕。

功效 全草和根:有小毒。祛风除湿,止血。用于风湿性关节炎,筋骨疼痛,咽炎。外用于创伤出血。

## 7077012

*Epilobium hirsutum* L.

植物名 柳叶菜《高植图鉴》

药材名 柳叶菜《汇编》

文献名 水朝阳花《名实图考》

地方名 水窝窝(陕西、甘肃);内蒙古:“呼崩朝日”(蒙语);陕西:〔九牛造〕,〔接骨丹〕,水接骨丹(柞水),黄接骨丹;湖南:大样干鱼菜,长角草,〔光明草〕,鱼鳞草;广西:锁匙筒(南丹);四川:水接骨、继母怀胎(木里),呼红花(峨眉山);贵州:小杨柳;云南:水葫芦,〔通经草〕(红河),地母怀胎草、菜子灵(曲靖),〔水丁香〕(昆明),白带草(新平),〔怀胎草〕(红河、新平),鸡脚参(丽江),血留参(兰坪),一把参(宁蒗),水红花、柳叶莲,〔益母草〕(永平),水兰花,红花草,希可羊;其他:大婆针。

功效 花:清热消炎,调经止带,止痛。用于牙痛,急性结膜炎,咽喉炎,月经不调,白带过多;根:理气活血,止血。用于闭经,胃痛,食滞饱胀;带根全草:有毒。用于骨折,跌打损伤,疔疮痈肿,外伤出血。

## 7077013

*Epilobium palustre* L.

植物名 沼生柳叶菜《高植图鉴》

药材名 沼生柳叶菜《汇编》

地方名 水湿柳叶菜(东北、四川、云南、西藏);内蒙古:“那木嘎音-呼崩朝日”(蒙语);青海:“奥豆毛娘”(藏名);四川:独木牛(藏名)。

功效 全草:清热,疏风,镇咳,止泻。用于风热咳嗽,声嘶,咽喉肿痛,支气管炎,高热下泻。

## 7077014

*Epilobium parviflorum* Schreb.

植物名 小花柳叶菜《高植图鉴》

药材名 地母怀胎草《元江哈尼族药》

地方名 内蒙古：“其其格·呼崩朝日”（蒙语）；湖北：扣心胆（神农架）；云南：“背当嘛杂那雌”（元江哈尼语）。

功效 根：祛风除湿，舒筋活血。用于风湿痹痛，外伤骨折，妇女带下。

**7077015**

*Epilobium pyrricholophum* Franch. et Savat. --- *E. japonicum* Hausskn.

植物名 长籽柳叶菜《高植图鉴》

药材名 针筒线《汇编》

文献名 柳叶菜《中国植物图鉴》，日本柳叶菜《江苏植志》

地方名 浙江：麻子草（丽水），枪钻棉、银棉麻（临安）；湖北：毛茛籽七（神农架）；贵州：水朝阳花，心胆草。

功效 全草：活血，调经，止痢。用于月经不调，月经过多，便血，痢疾，安胎；种毛：止血。外用于刀伤出血。

**7077016**

*Epilobium tetragonum* L.

植物名 四棱柳叶菜《神农架药录》

地方名 湖北：〔见肿消〕（神农架）。

功效 全草：消肿散结。

**7077017**

*Ludwigia adscendens* (L.) Hara --- *Jussiaea repens* L.

植物名 水龙《高植图鉴》

药材名 水龙《汇编》

文献名 过塘蛇、水盖菜、崩草《生草药性备要》，玉钗草、草里银钗《纲目拾遗》，水瓮菜《本草求原》，过江龙《天宝本草》，水芥菜《岭南采药录》

地方名 过沟龙（台湾、湖南），鱼鳃草（广东、广西）；福建：水菜岳，水浮藤（龙岩），水薹菜（福州、霞浦、厦门、泉州、同安）；台湾：〔水丁香〕；湖南：水马兜（衡阳），过塘龙；广东：枇杷菜（广州），沿塘蛇（连南），过池蛇（潮阳），过江蛇（陆丰），过塘标、蚕茧草（高州），水手泡（定安），水金枝、水胶播（潮安），水箭（潮州），鱼卜草（新会），穿半石（惠来），大号白花老鼠耳、拖水蜈蚣（揭阳）；广西：水鱼鳞菜（北海），鱼泡菜，水益菜，仰塘蛇，野薹菜，假薹菜；四川：乌龙毛、两头草（成都），过江藤（峨眉山市），鱼鳞草；其他：水金梅，狗肠草，野花生。

功效 全草：清热利湿，解毒消肿。用于感冒发热，麻疹不透，肠炎，痢疾，小便不利。外用于疖疮脓肿，腮腺炎，带状疱疹，黄水疮，湿疹，皮炎，蛇狗咬伤。

**7077017a**

*Ludwigia epilobioides* Maxim. --- *L. prostrata* auct. non Roxb.

植物名 黄花丁香蓼《云南植志》

药材名 黄花丁香蓼《新华本草纲要》

地方名 丁香蓼（湖南、广西），水丁香（福建、安徽、

广西、四川）、红豇豆（陕西、台湾、四川），水油麻（福建、广西）；河北：丁香菜；陕西：草龙（西安）；江苏：水菱草（吴县）；浙江：水灯草（临安）；安徽：针筒草；福建：山金石榴（政和），〔水冬瓜〕（南安、厦门），水黄麻、水芹仔（闽南），白根草（宁化），山鼠瓜，水沉香，水直草，田油麻；台湾：丁子蓼，喇叭草；河南：〔见肿消〕；湖北：田基黄（恩施）；湖南：水苋菜（衡山），田蓼草，红麻草；广西：水石榴，田蓼草（昭平）；四川：水杨柳，水香蓼；贵州：银仙草，水蓬砂，水硼砂；云南：小石榴树、小石榴叶（永平），小疔药（思茅）；其他：田牛莠。

功效 全草：清热解毒，利湿消肿。用于肠炎，痢疾，传染性肝炎，肾炎水肿，膀胱炎，白带，痔疮。外用于痈疖疔疮，蛇虫咬伤。

**7077018**

*Ludwigia hyssopifolia* (G. Don) Exell - *Jussiaea linifolia* Poir.

植物名 草龙《云南种录》

药材名 草龙《汇编》

文献名 细叶水丁香《台湾植志》，线叶丁香蓼《云南种录》

地方名 广东：〔土茵陈〕，化骨溶，调羹草，假焦子（阳山）；广西：小锁匙筒（博白），木败（北流），水仙桃（南宁），水晶（昭平），田浮草（苍梧），白须公（平南），香须公（蒙山），金筒伞（玉林、贵县）。

功效 全草：清热解毒，去腐生肌。用于感冒发热，咽喉肿痛，口腔炎，口腔溃疡，疮疖疔肿。

**7077019**

*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven --- *Jussiaea suffruticosa* L. - *Jussiaea octovalvis* (Jacq.) Sw.

植物名 毛草龙《云南种录》

药材名 毛草龙《汇编》

文献名 草里金钗《纲目拾遗》，水仙桃《广西中药志》

地方名 水丁香（福建、台湾、四川）；福建：水黄麻（长泰），水苋菜（永春），毛柯（诏安），〔一枝香〕；台湾：水登香，水灯香，金龙鬃头，水丁香心，水丁香叶，水丁香头，水香蕉，〔刘寄奴〕，针铜鬃头；广东：水柘榴（普宁），水蜜桃、田柯、假河仔（饶平），水加水（汀迈），水蕉仔（海康），田柘榴（潮阳），鸡仔草（东莞），白辣椒（罗定），获南子（阳江），野荷树（河源）；海南：假黄车、假蕉、水辣椒（琼中），水映草（乐东）；广西：水龙（北流），水木败（玉林），水芙蓉（桂平），毛啦喇（贵县），〔鸡眼草〕（龙州），沙草（宁明），尖叶箭（博白），有毛锁匙筒、〔草茛子〕（南宁），鱼鳃草，络子草，锁匙筒（岑溪、陆川、博白），田浮草，香须公，扣铜草，针筒草（桂平、贺县）；四川：毛水龙；云南：水秧草（玉溪）；其他：水石榴，望邀娘。

功效 全草：清热解毒，去腐生肌。

**7077020**

*Ludwigia peploides* (Kunth) Raven subsp. *stipulacea* (Ohwi) Raven - *Jussiaea stipulacea* Ohwl.

植物名 水江龙《台湾药植志》

文献名 水灯香《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾:过沟龙,过江龙,水丁香,野花生。

功效 根:用于眼病;茎:用于喉痛;茎、叶:外用于肿毒。

#### 7077021

*Ludwigia prostrata* Roxb. --- *L. diffusa* Buch. -Ham. ---  
*Jussiaea prostrata* (Roxb.) Levl.

植物名 丁香蓼《新华本草纲要》

药材名 丁香蓼《汇编》

功效 全草:清热解毒,利湿消肿。用于肠炎,痢疾,病毒性肝炎,肾炎水肿,膀胱炎,白带,痔疮。外用于疔疮疖,蛇虫咬伤。

#### 7077022

*Oenothera biennis* L. --- *Oenothera odorata* auct. non Jacq.

植物名 月见草《东北草本植志》

药材名 月见草《长白山植药志》

地方名 山芝麻(华北、东北);吉林:夜来香。

功效 根:强筋骨,清热解毒,祛风湿;种子油:有降低胆固醇、降血脂、防治动脉粥样硬化、减肥、抗炎、抗癌等药理作用。

备考 1. 同属植物小花月见草 *O. parviflora* L. 与拉马克月见草 *O. lamarkiana* L. 化学成分与月见草相近,可研究作为同类药物新资源。2. 过去有些文献曾将本种学名误订为 *O. odorata* Jacq.

#### 7077023

*Oenothera erythrosepala* Borb.

植物名 红萼月见草《中药大辞典》

药材名 月见草《贵州草药》

地方名 贵州:〔夜来香〕。

功效 根:强筋壮骨,驱风除湿。用于风湿病,筋骨疼痛。

#### 7077024

*Oenothera stricta* Ledeb. ex Link --- *O. odorata* auct. non Jacq.

植物名 待霄草《高植图鉴》

药材名 待霄草《湖南药物志》

文献名 香月见草《药植简编》,香待霄草《中国经植志》,线叶月见草《云南种录》

地方名 山芝麻(东北、山东、湖南)、〔夜来香〕(东北、山东、湖北、云南),月下香(东北、山东);浙江:地蜈蚣(嵊县);广东:拖地莲,青藤仔;广西:白头走马仔、〔仙人对坐草〕、细种节节花(北海);四川:夜来开;云南:水芝麻、月见草(昆明);其他:〔香草〕。

功效 根:清热解毒,祛风除湿。用于感冒,喉炎。

#### 7077025 见 7077024

### 7077a 菱科 Trapaceae

#### 7077a01

*Trapa bicornis* Osbeck

植物名 乌菱《纲目》、《高植图鉴》

药材名 菱《别录》、《汇编》

文献名 折腰菱《酉阳杂俎》,菱角《滇南本草》,乌菱壳《纲目》,风菱角《医宗汇编》,红菱《广西药录》,格菱《沙漠药植》

地方名 江苏:风菱;浙江:环腰菱(吴兴);广西:水红菱;云南:青水菱(昆明)。

功效 果壳、果柄、果、茎及叶柄:健胃止痢,抗癌。用于胃溃疡,痢疾,食道癌,子宫癌。

备考 按伍安贫“武陵记”,以三角四角者为菱,两角者为菱,则本品二角,当为菱而非菱,但《纲目》将菱与菱统列于“菱实”条下。现代各地则不分四角或二角,统称菱角。

#### 7077a02

*Trapa bispinosa* Roxb.

植物名 菱《高植图鉴》

药材名 菱《别录》、《中药大辞典》

文献名 水栗《风俗通》,菱《尔雅》郭璞注),菱实《别录》,菱角《周礼义疏》,水菱《品汇精要》,菱花、沙角《纲目》,家菱《中国植物图鉴》,菱茎《本草推陈》,三角菱《广西药录》。

地方名 台湾:老菱。

功效 果肉生食:消暑解热,除烦止渴;果肉熟食:益气,健脾;叶:用于小儿头疮及增强视力;果壳:用于泄泻,脱肛,痔疮,疔肿,黄水疮,天泡疮;茎:用于胃溃疡及多发性疣赘;淀粉:补脾胃,强脚膝,健力益气,行水,去暑,解毒。

#### 7077a03

*Trapa incisa* Sieb. et Zucc.

植物名 野菱《云南种录》

文献名 刺菱《纲目拾遗》

功效 全草:解酒毒;果实:用于痹痛,遗精,白浊。

#### 7077a04

*Trapa incisa* Sieb. et Zucc. var. *quadricaudata* Gluck

植物名 刺菱《纲目拾遗》、《中药大辞典》

药材名 野菱《纲目》、《安徽中草药》

文献名 菱《华东水植》

地方名 安徽:菱角,刺菱角,草水虫,鬼菱角。

功效 果实(生食):补脾健胃,止渴生津,平肝气,通肾水,益血消食;老菱(煮食):健脾,止泄痢;茎叶:用于小儿头疮,消化道溃疡,肿瘤;果壳:用于慢性痢疾,便血。

#### 7077a05

*Trapa japonica* Fler. --- *T. korshinskyi* V. Vassil.

植物名 丘角菱《东北草本植志》

药材名 菱角(台湾、吉林)

文献名 菱实、菱《别录》,水栗《风俗通》,沙角《纲目》,无冠菱《长白山植药志》

地方名 台湾:龙角;其他:家菱。

功效 果:补脾,止泻,止渴。用于脾虚腹泻,消渴;菱壳:止泻,止血。

#### 7077a06

*Trapa manshurica* Flerov --- *T. tranzschelii* V. Vassiljev

--- *T. manshurica* Flerov var. *tranzschelii* (V. Vassiljev)

Kitag.

植物名 东北菱《东检》

药材名 东北菱《东北药用植物》

地方名 菱角、菱角秧子(东北)。

功效 果实、果壳(菱壳)、果柄(菱蒂);清暑解热,除烦止渴。用于胃溃疡,痢疾,脾虚腹泻,消渴,食道癌,乳腺癌,子宫颈癌,皮肤多发性疣赘,止血,止泻。

#### 7077a07

*Trapa manshurica* Flerov f. *komarovi* (Skv.) S. H. Li et Y. L. Chang --- *T. amurensis* Flerov var. *komarovi* Skv.

植物名 短颈东北菱《东北药用植物》

药材名 东北菱(东北)

功效 果肉、果壳、果柄、茎、叶;清暑解热,除烦止渴,益气,健脾止痢。用于胃溃疡,痢疾,脾虚腹泻,消渴,食道癌,乳腺癌,子宫颈癌;果柄:外用于皮肤多发性疣赘;果壳:收敛,止泻,止血。

#### 7077a08

*Trapa maximowiczii* Korsh.

植物名 细果野菱《高植图鉴》

药材名 菱角(浙江)、《药典》附录)

文献名 马氏菱《东检》

地方名 浙江:野菱,刺菱(临安)。

功效 果实、果壳、果梗;解毒消肿,止血。用于胃溃疡,乳房结块,月经过多,痢疾,便血,痔毒。外用于皮肤多发性疣赘。

#### 7077a09

*Trapa natans* L. var. *komarovi* V. Vassil.

植物名 格菱《占野》

地方名 吉林:菱角。

功效 果壳、果柄、果、茎及叶柄;健胃止痢,抗癌。用于胃溃疡,痢疾,肿瘤,食道癌,子宫癌。

#### 7077a10

*Trapa potanini* V. Vassil.

植物名 耳菱《东北草本植志》

功效 果壳、果柄、果、茎及叶柄;健胃止痢,抗癌。用于胃溃疡,痢疾,肿瘤,食道癌,子宫癌。

#### 7077a11

*Trapa quadrispinosa* Roxb. --- *Trapa natans* L.

植物名 四角菱《高植图鉴》

药材名 菱角《药植简编》

文献名 菱《酉阳杂俎》,野菱《汇编》,欧菱《药植简编》。

地方名 野菱角、四角野菱(河南、湖南);浙江:水红菱。

功效 果壳、果柄、果、茎及叶柄;健胃止痢,抗癌。用于胃溃疡,痢疾,肿瘤,食道癌,子宫癌。

### 7078 小二仙草科 Haloragidaceae

#### 7078001

*Haloragis chinensis* (Lour.) Merr.

植物名 黄花小二仙草《高植图鉴》

地方名 广西:石崩(陆川),黄花船板草;其他:蛇牙

草。

功效 全草;用于哮喘,咳嗽。

#### 7078002

*Haloragis micrantha* (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc.

植物名 小二仙草《高植图鉴》

药材名 小二仙草《名实图考》、《汇编》

文献名 蚁塔《中国植物图鉴》,水豆瓣草《药植简编》

地方名 女儿红、沙生草、砂生草(湖南、四川),豆瓣草(安徽、湖南、广西、四川、贵州);浙江:子阴草(丽水),瓜子草(云和);广西:白粘草(陆川),地茜(平南、武宣),同丹药(三江),船板草;四川:女儿草(重庆);贵州:水豆瓣,豆瓣菜,斑鸠窝。

功效 全草;止咳平喘,清热利湿,调经活血。用于咳嗽哮喘,痢疾,小便不利,月经不调,跌打损伤。

#### 7078003

*Myriophyllum spicatum* L.

植物名 蕺菜《高植图鉴》

药材名 蕺菜《纲目》

文献名 马藻《本草拾遗》,水藻《纲目》,穗状狐尾藻《东检》

地方名 内蒙古:“图门德苏-额布苏”(蒙语);江苏:狐尾藻、榨草(射阳);台湾:草纱;广东:泥茜(梅县);广西:金鱼藻,金鱼草;云南:大杂草、狗尾巴草(永胜)。

功效 全草;清热解毒。用于痢疾,烧烫伤。

### 7078a 杉叶藻科 Hippuridaceae

#### 7078a01

*Hippuris vulgaris* L.

植物名 杉叶藻《高植图鉴》

药材名 杉叶藻《汇编》

文献名 藻《诗经》,蘼藻《左传》,蕝、牛藻《尔雅》,水藻《纲目》

地方名 结骨草(东北);青海:“冬布嘎拉”(藏名);西藏:“当布噶日”、“秦扯”(藏名)。

功效 全草;镇咳,舒肝,凉血,止血,养阴生津,透骨蒸。用于高热烦渴,结核咳嗽,劳热骨蒸,两肋疼痛,肠胃炎。

### 7079 水马齿科 Callitrichaceae

#### 7079001

*Callitriche palustris* L.

植物名 沼生水马齿《中国植志》

文献名 春水马齿《云南种录》

功效 全草;用于眼部炎症,利尿,烧伤。

#### 7079002

*Callitriche stagnalis* Scop.

植物名 水马齿《中国植志》

药材名 水马齿《台湾药植志》

功 效 全草:通经

## 7081 瑞香科 Thymelaeaceae

## 7081001

*Aquilaria agallocha* Roxb

植物名 沉香《中药大辞典》

药材名 沉香《别录》、《中药大辞典》

文献名 蜜香、鸡骨香、黄熟香、棧香、青桂香、马蹄香、〔鸡舌香〕《南方草木状》、角沉、黄沉、黄腊沉《本草衍义》、沉水香、舶沉香、钦香《桂海虞衡志》、蜜香树《南越志》、番沉、舶沉、药沉(叶廷桂《香录》)、熟结、生结、脱落、虫漏、婆木香、弄水香、刺刺香、叶子香、蓬苇香、光香、迷香、生速、熟速、“阿迦咄香”(梵语)《纲目》、奇南棧、香棧、木速香、奇南、奇南结、金丝《乘雅半偈》、伽楠、糖结《宦游笔记》、虎斑金丝结、绿结、油结、洋伽楠《粤海新语》、鸞歌绿、铁结(陈让《海外逸》)、蜜结、金丝虎斑《物理小识》、伽南香、奇楠《纲目拾遗》、沉香树、恶揭鲁《新纲》、印度沉香《种分讲义》、进口沉香《中药大辞典》、沉水香树、落水沉香树、伽罗树《品种论述》、上沉香、盍沉《常用中药名辨》

地方名 台湾:奇南香木;其他:伽罗,奇蓝,棋楠,伽南。

功 效 含有树脂的木材:行气止痛、温中止呕,纳气平喘。用于胸腹胀闷疼痛,胃寒呕吐呃逆,肾虚气逆喘急。

## 7081002

*Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg

植物名 土沉香《桂海虞衡志》、《高植图鉴》

药材名 沉香《药典》

文献名 海南沉(蔡绛《丛谈》)、崖香《桂海虞衡志》、土伽楠《粤海新语》、白木香《南越笔记》、女儿香柑、飞沉香《纲目拾遗》、海南沉香、香麻《经济植物学》、国产沉香《中药大辞典》、白木香树《药学报》

地方名 莞香、莞香(广东、广西);广东:女儿香(东莞);海南:六麻树,香材,香柴,牙香树;广西:沉香木(陆川),芽香树;云南:“外弦顺”(傣语)、“埋娃瓷娃”(楚雄彝名);其他:香木(羊令山)。

功 效 含有树脂的木材:行气止痛,温中止呕,纳气平喘。用于胸腹胀闷疼痛,胃寒呕吐呃逆,肾虚气逆喘急。

## 7081003

*Daphne acutiloba* Rehd.

植物名 尖瓣瑞香《高植图鉴》

药材名 金腰带《南充中草药》

文献名 尖裂瑞香《云南种录》

地方名 湖北:大果金腰带(神农架);四川:铁牛皮(南充),祖师麻(峨眉山)。

功 效 叶、花:杀虫活血,祛瘀止痛;全草:有小毒。驱风除湿,活络止痛。用于风湿关节痛,跌打损伤,眼痛。

## 7081004

*Daphne altaica* Pall.

植物名 阿尔泰瑞香《新疆中草药》

功 效 皮、叶:有毒。发汗解表,止咳祛痰,止痛。用于风寒感冒,咳嗽,气管炎,胃疼。

## 7081005

*Daphne arisanensis* Hayata

植物名 白瑞香《台湾药植志》

地方名 台湾:阿里山白瑞香

功 效 根:祛风除湿,活血止痛

## 7081006

*Daphne aurantiaca* Diels

植物名 橙花瑞香《云南种录》

文献名 橙黄瑞香《迪庆藏药》

功 效 根:止痛。

## 7081007

*Daphne championii* Benth.

植物名 长柱瑞香《高植图鉴》

药材名 小叶瑞香《湖南药物志》

地方名 湖南:小二钱,小黄皮,惊药;广西:一叶一枝花(恭城),占地菊(昭平);其他:野黄皮。

功 效 全株:有小毒。消痞散积,消炎。用于小儿疳积,咽喉炎;根皮、茎:用于腰痛,疳疮肿毒,跌打损伤。

## 7081008

*Daphne feddei* Levl.

植物名 短瓣瑞香《云南种录》

药材名 滇瑞香《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 野瑞香《云南经植》,西南瑞香《汇编》,费氏瑞香《峨眉药植研究》

地方名 四川:铁牛皮(峨眉山);云南:〔万年青〕、小鼠皮、月月绿、金腰带、〔鸡蛋花〕、矮陀陀(曲靖),矮陀,开花矮陀陀、冷水跌打、银丝矮陀、细叶寡鸡蛋树枝、黄皮杜仲、黄根栲红(红河),银丝岩陀,桂花矮陀陀(昆明、曲靖、红河),构皮岩陀、雪花栲(大理),黄山皮条(新平),小构皮(富民),山皮条(玉溪、曲靖),桂花岩陀(玉溪、漾濞),“阿罗把罗基”(楚雄彝名),千年不落叶,岩陀,岩托,万年青矮陀陀。

功 效 根:有小毒。祛风除湿,活血止痛。用于风湿关节痛,跌打损伤,胃痛;根皮、茎皮、叶:外用接骨;全株:妊娠二个月内引产。

## 7081009

*Daphne gemmata* Pritz. --- *Wikstroemia gemmata* (Pritz.) Domke

植物名 川西瑞香《高植图鉴》

药材名 铜牛皮(四川峨眉)

地方名 四川:川西尧花。

功 效 树皮:活血祛瘀,祛风除湿。

## 7081010

*Daphne genkwa* Sieb. et Zucc. --- *D. fortunei* Lindl.

植物名 芫花《高植图鉴》

药材名 芫花《本经》、《药典》

文献名 芫《山海经》,去水《本经》,黄大戟、败花、儿草根《吴普本草》,毒鱼、杜芫、蜀桑根《别录》,滁州芫



花、绵州芫花《大观本草》，头痛花《纲目》，闷头花、群芳谱，金腰带《名实图考》，铁牛皮《分类草药性》，鱼莓、备身芫《新纲》，丁子樱《牧野图》，县牛艾、赶山边《土农药志》，瑞香芫花《华北树木志》，紫芫花、陈芫花《常用中药名辨》。

地方名 老鼠花(陕西、江苏、江西、安徽)、闹鱼花(安徽、河南、湖北)，药鱼草(河北、山东、江苏)，南芫花(华东)，豹皮鞭、消化草(浙江、安徽)，浮胀草(浙江、安徽、湖南)；山东：芫条(昆崙山)，芫条花，芫花条，蓝花条，野丁香花；江苏：大米花(云台山)，羊奶棵子，伤力草花，药鱼棵，野丁香(苏州)，棉花条(睢宁、邳县)，紫荆花(常熟)，老虎花；浙江：山麻皮(衢县、武义)，芫花根皮，紫金花(嵊县)，绵纸草，闹头花，芫花根；安徽：老鸦花，冻米花，雀皮，毒老鼠花、毒老鼠花条了(滁县)；江西：银腰带(吉安)，打不死、好雀子饭(泰和)，流氓草，小叶金腰带，头痛皮，石棉皮，泡米花，蚂蚁蛋，野火麻花；河南：小鸡蛋棵，土冬花，棉花棵；湖南：尽江子(长沙)，半泡树、洋画眉(新化)，真天保、大救驾(长沙、岳阳、临湘)，阴米泡树(常德)，九龙花，地棉花，地棉皮，净光树，泥楸树，紫金树，翻藤树；四川：芫花，闷头树，紫荆树，蒲棉，杜芫，杜芫，赤芫。

功效 花蕾：泻水逐饮，解毒杀虫。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利。外用于疥癣疮，冻疮。

#### 7081011

*Daphne genkwa* Nitsche

植物名 黄瑞香《高植图鉴》

药材名 祖师麻《陕西中草药》

文献名 纪氏瑞香《华北经济植物志要》，祖司麻《汇编》

地方名 走司马、走丝麻(陕西、甘肃)；陕西：大救驾(洛南)；湖北：黄杨皮、爬岩香(神农架)；四川：金腰带(重庆)；其他：黄狗皮。

功效 根皮、茎皮：有小毒。祛风通络，祛瘀止痛。用于头痛，牙痛，风湿关节痛，跌打损伤，胃痛，肝区痛。

#### 7081012

*Daphne koreana* Nakai

植物名 长白瑞香《长白山植物志》

地方名 吉林：辣根草(长白山区)。

功效 全株及根：温中散寒，行瘀止痛。用于冠心病，心绞痛，慢性冠状动脉供血不全，血栓闭塞性脉管炎，良性关节痛及心腹冷痛，冻伤。

#### 7081013

*Daphne genkwa* Thunb.

植物名 瑞香《高植图鉴》

药材名 瑞香《纲目》、《汇编》

文献名 瑞香根《纲目》，麝囊、蓬菜紫、风流树、露甲《群芳谱》，蓬菜花《花镜》，睡香《清异录》，世英、佳客、花贼、珠友、七里香、沈丁花、锦被堆、紫风流、紫丁香、夺皮香《新纲》

地方名 雪里开花(浙江、江西、湖南)，野梦花(湖南、湖北、贵州)；浙江：贼裤带(嵊县)；安徽：棠芸，腊黄梅花；江西：红总管，斗雪开，雪冻花；湖南：上狗皮(保

靖)，山麻皮、软筋求、蔓花草(古丈)，“盖月续”(侗语)，阿舌草(凤凰、麻阳)，暖骨风(衡阳)，雪花皮(耒阳、汝桂、永兴、新宁)，梦花皮；广东：白瑞香，夺香花，雪花；贵州：山梦花；其他：千里香，瑞香。

功效 根、树皮、叶、花：祛风除湿，活血止痛。用于风湿性关节炎，坐骨神经痛，咽炎，牙痛，乳腺癌初起，跌打损伤。

#### 7081014

*Daphne genkwa* Thunb. var. *atrocaulis* Rehd.

植物名 毛瑞香《高植图鉴》

药材名 铁牛皮《汇编》

文献名 夺香花《纲目拾遗》，山花瑞香《台湾药植志》，瑞香、野梦花《中国经济植物志》，山瑞香《广西药志》，黑枝瑞香《汇编》，紫茎瑞香《中药大辞典》

地方名 金腰带(浙江、湖北)；浙江：贼裤带，蒙花皮(金华)，豹皮香(杭州)，野水芭花(龙泉)；江西：大金腰带；四川：大黄枸。

功效 根、花：有小毒。除湿，通经；根：用于风湿骨痛，劳伤腰腿痛，跌打损伤；花：用于牙痛，遗精；茎及根皮：祛风除湿，活血止痛。用于跌打损伤，风湿性关节炎，坐骨神经痛；叶：外用于肿毒，梅毒，麻风病。

#### 7081015

*Daphne genkwa* Thunb. var. *kiusiana* Keissler

植物名 棕枝瑞香《汇编》

药材名 铜牛皮《四川中药志》

地方名 四川：金腰带

功效 根：祛风活血，清热解毒。用于跌打损伤，瘀血凝聚，癰疽，腰痛，腿痛等。

#### 7081016

*Daphne genkwa* Wall. ex Steud. --- *D. cannalina* Lour. ex Wall.

植物名 雪花枸《高植图鉴补编》

药材名 软皮树《云南药志》

文献名 白瑞香《广西药志》，造纸瑞香《西药本草》，纸用瑞香《红河中草药》

地方名 小枸皮(四川、云南)；广西：雪花皮(富川)，一身保暖；四川：臭皮(西昌)，蒙花枝(冕宁)；云南：[一朵云](红河)，空花枸，[白芍](临沧、镇雄)，细叶密、鸡蛋树皮(石屏)，麻皮树(景东)，小黑枸(禄劝)，大八爪金龙(镇雄)，山辣子皮(昭通)，开花矮陀陀。

功效 根及茎皮：有小毒。祛风除湿，调经止痛。用于风湿麻木，筋骨疼痛，跌打损伤，癰疽，月经不调，痛经，经期手脚冷痛；根皮：用于接骨，跌打，内脏下血。

#### 7081016a

*Daphne genkwa* Hemsl.

植物名 凹叶瑞香《高植图鉴》

药材名 祖师麻(西北)

地方名 浙江：杂兰；云南：桂花矮陀陀，白花矮陀陀，冷水跌打，黄眼枸皮；其他：祖司麻。

功效 根皮、茎皮：有小毒。祛风通络，祛瘀止痛。用于慢惊风，头痛，牙痛，风湿关节痛，跌打损伤，胃痛，肝区痛。

## 7081017

*Daphne tangutica* Maxim. --- *D. szechuanica* Winkl. --- *D. wilsonii* Rehd.

植物名 陕甘瑞香《西藏植志》

药材名 祖师麻《汇编》

文献名 唐古特瑞香《华北经济志要》，甘肃瑞香《高植图鉴》，祖司麻《药典》，陕西瑞香《新华本草纲要》，大非架《中草药通讯》

地方名 甘肃：走司马，大救驾；青海：“省象那玛”（藏名），冬夏青，瑞香，“斯朵麦平”（藏名）；云南：矮陀陀。

功效 根皮、茎皮：有小毒。祛风通络，祛瘀止痛。用于头痛，牙痛，风湿关节痛，跌打损伤，胃痛，肝区痛；果、叶、皮：用于梅毒性鼻炎及下疳；花：用于肿胀。

## 7081018

*Edgeworthia chrysantha* Lindl.

植物名 结香《高植图鉴》

药材名 结香花《群芳谱》、《广西中药志》

文献名 白蚁树《花镜》，打结花、梦冬花《树分》

地方名 明花珠（河北、四川），金腰带（湖北、湖南），雪花皮（湖北、广西），雪花树（四川、湖南），蒙花（河北、湖南、广西、四川），蒙花珠（河北、江西、湖北、湖南、广西、四川），〔蜜蒙花〕（安徽、云南、湖南、天津、河北、江苏、浙江、山东），新蒙花（山东、江苏、浙江、安徽、江西、广西、湖南），梦花（四川、云南）；陕西：沉香花；江苏：打结树（上海）；浙江：雪里开（天台、云和、乐清、温州），水萼花（云和、龙泉、泰顺），百结树，宝皮鞍；福建：雪球花；河南：山结香，山蒙花；湖北：软骨树、枯枝梅（神农架）；湖南：软丝筋、解蒙花（黔阳），盘龙草（蓝嘉），野蒙花（新晃）；广西：〔六月雪〕（贺县），一身保暖（金秀），蒙雪花被（富川），三叉树；四川：喜花、迎春花（重庆），盘龙叶，檬花树；贵州：春花；其他：雪蒙花，探春，三桠（日本名）。

功效 根：舒筋活络，消肿止痛。用于风湿关节痛，腰痛。外用于跌打损伤，骨折；花：祛风明目。用于目赤疼痛，夜盲，肺虚久咳；叶：外用于疔疮。

备考 正品密蒙花为马钱科之 *Buddleja officinalis* Maxim.，习称“老蒙花”。本品在某些地区称“新蒙花”，实际上为蜜蒙花的混制品。

## 7081019

*Edgeworthia longipes* Lace --- *Edgeworthia gardneri* (Wall.) Meissn

植物名 长梗结香《汇编》

地方名 云南：滇结香。

功效 根：舒筋活络，消肿止痛；叶：外用于疔疮。

## 7081020

*Eriosolena composita* (L. f.) van Tieghem --- *Eriosolena involucrata* (Wall.) van Tieghem --- *Daphne involucrata* Wall. --- *Eriosolena wallichii* Meissn.

植物名 毛花瑞香《高植图鉴》

药材名 桂花跌打《云南药录》

地方名 云南：山皮条，毛管花，桂花叶子兰。

功效 全株：有毒。舒筋活络，散瘀镇痛，祛风湿。用于胃痛，骨折筋伤，跌打损伤，风湿骨痛，各种疼痛。

## 7081021

*Stellera chamaejasme* L.

植物名 瑞香狼毒《汇编》

药材名 狼毒《本经》、《汇编》

文献名 续毒《本经》，石川狼毒《大观本草》，绵大戟、山萝卜《滇南本草》，〔甘遂〕《名实图考》，川狼毒《集效方》，紫皮狼毒《品种论述》，西北狼毒《药材学》

地方名 一把香（四川、贵州、云南），火柴头花（东北、内蒙古），洋火头花（东北），珍珠花（河北、山西、云南），断肠草（东北、河北、内蒙古、云南），红狼毒（河南、四川）；吉林：软条（镇赉），“塔尔怒”（蒙名），草瑞香；河北：拔萝卜，燕子花；山西：山大戟，山大青；内蒙古：“达伦一图茹”（蒙名），头痛花，红火柴头花，棉大戟；甘肃：山丹花，打碗花，花木根，狗娃娃，粉团花，狼青草，野狼子根；青海：馒头花，馒头花根；四川：闷头花（阿坝），狼毒根；贵州：〔倒提壶〕（安龙），猴子草（威宁）；云南：一扫光、大将军、搜山虎（保山），一束香、一棵松、药萝卜（楚雄），生扯拢（昭通），大萝卜（红河），独萝卜（禄劝），千里马（丽江），〔万丈深〕，过山芦，地萝卜，细叶子香，烧山火，星花；西藏：“热吉巴”。

功效 根：有毒。散结，逐水，止痛，杀虫。用于水气肿胀，淋巴结核。外用于疥癣，杀蝇蛆。

备考 《名实图考》误以本品为甘遂。

## 7081022

*Stellera chamaejasme* L. var. *angustiflora* Diels --- *S. chamaejasme* L. f. *chrysantha* S. C. Huang

植物名 狭叶狼毒（拟）

文献名 瑞香狼毒《云南药录》，狭叶甘遂《云南种录》，黄甘遂《西藏植志》

地方名 云南：大将军，山萝卜，棉大戟；其他：尖叶土瓜狼毒。

功效 根：利尿，止泻。用于水肿，痢疾。

备考 《名实图考》因误以狼毒为甘遂，故《云南种录》以本品为狭叶甘遂，《西藏植志》以本品为黄甘遂，均属欠妥。

## 7081023

*Wikstroemia canescens* (Wall.) Meissn.

植物名 羌花《高植图鉴》

药材名 羌花《本经》、《汇编》

文献名 山皮条、〔黄羌花〕《高植图鉴》

地方名 老龙树、老虎麻（陕西、湖北）；江西：山樨皮，山雁皮，山麻皮，雁皮菜；湖南：老龙皮；云南：小鹰皮，灰白羌花、黄根构皮（红河），小构皮（富民），白花矮陀陀、半边梅、铁扇子、矮陀陀（昆明）；西藏：雁皮（昌都）；其他：黄羌花，白色矮陀陀。

功效 根：有毒。通经活络，祛风除湿，收敛。用于跌打损伤，筋骨疼痛，腮腺炎，乳腺炎，淋巴腺炎；花朵：有毒。泻水饮，破积聚。用于留饮，咳逆上气，水肿，癰疽疔瘰。

## 7081024

*Wikstroemia chamaedaphne* Meissn.

植物名 河朔莨花《高植图鉴》

药材名 黄茛花《图经》、《品种论述》

文献名 绛州茛花《证类本草》, 草甘遂《根》《名实图考》, 茛蒿《汇编》

地方名 醉鱼草(东北), 北茛花(华北), [茛花](华北、西北、东北), 黄映映、黄雁雁、雁皮(陕西、甘肃、宁夏); 北京: 药鱼梢; 河北: 小叶蓝荆, 蓝荆, 红条羊眼子, 红条杨眼子, 苍蝇草, 痒眼花; 陕西: 老虎麻, 羊灰灰(陕北), 矮雁皮(秦岭), 杨燕叶花, 洋燕燕, 黄杨叶花, 黄杨燕花; 山西: 叩皮花(平定), 不芽草(曲沃), 羊尾子朴(灵石), 羊冤冤, 野雁皮, 野瑞香, 茛花, 痒眼子, 黄阿头花。

功效 花蕾、叶: 有小毒。泻下, 逐水, 通便。用于水肿胀满、痰饮积聚、咳逆喘满, 急、慢性传染性肝炎, 精神分裂症, 癫痫。

7081025

*Wikstroemia chinensis* Meissn.

植物名 中国茛花《华北树木志》

功效 叶、花蕾: 有小毒。泻下逐水, 通便。

7081026

*Wikstroemia dolichantha* Diels

植物名 长花茛花《云南种录》

药材名 一把香《汇编》

文献名 山皮条、矮它它、矮陀陀《滇南本草》

地方名 四川: 一柱香(宁南), 土箭芪, 香构; 云南: 竹腊皮(玉溪), [狼毒](元谋), 铁扇子, 铁扁担; 其他: 黄狗头, 藤构, 构枸麻, 橘叶叶, 老虎麻。

功效 根: 健脾, 补虚。用于脾胃虚弱, 便溏, 气虚肿经久不消, 牙痛, 胸病; 根皮: 有小毒。宽中理气。用于妇人气胀, 肚腹疼痛。

7081027

*Wikstroemia indica* C. A. Mey.

植物名 南岭茛花《中国药植志》

药材名 了哥王《岭南采药录》、《汇编》

文献名 九信菜《生草药性备要》, 鸡子麻、鸡忙头、毒除根《岭南采药录》, 蒲仑《树分》, 大黄头树、地棉麻树、桐皮子、九信草《中国药植志》, 狗颈树、鸡断肠、狗信强《南方毒植》, 石棉皮《汇编》, 毒除《中药大辞典》

地方名 金腰带(福建、湖南), 地棉根(台湾、湖南、广东), 山豆了(福建、广东), 山棉皮(浙江、广西); 浙江: 山芝一, 白棉儿, 山络麻, 野麻朴, 山麻皮(金华、衢县), 红山芝一(温州); 江西: 小叶金腰带, 千下锤, 石谷皮, 海底龙, 黄皮子, 黄皮树, 镰刀子树; 福建: 山埔仑、浦银(厦门), 山铺银(福州、闽侯、福清、仙游、莆田), 臭楠根(武平), 棉藤子(宁化), 地菊子根、鸭子串(清流), 山蒲红、金包银、贼子裤带、雷公草垫(大田), 贼裤头带(永安), 山砒霜, 大叶瓜子金(明溪), 七麻根、红赤七、赤麻根、泥罗带(闽东), 金成草、千里马、佬仔药、猪耳根(龙岩), 山六麻、山膏药、白梨头花、赤失、赤七根、赤迹、赤茛、鬼仔根、埔仁草、贼裤带、棉付(福安), 铺银草, 布英, 赤坡, 红灯笼, 别南根; 台湾: 山埔仑仔, 小偷

裤带, 山埔仑木, 九信叶, 鸡儿麻, 埔仑, 埔仑仔, 埔银片, 埔银头, 埔仑头, 埔仑根, 埔银皮, 埔银叶, 埔银心; 湖南: 老鼠皮柴(衡山), 打不烂、“呆了”、“每现南”(侗语), 大救驾, 对口箭, 白纸皮, 泻叶, 软木材, [透骨草], [铁箍散], 蚊子, 野草纸皮; 广东: 消山药、消山虎、[土木香]、海山虎、熟珠、出口叶、死鸡仔头(广州), 哈仔草、刁仔麻、鬼仔麻、坡银麻(阳春), 地棉笠、地棉根皮、独薯根、狗信草、雀仔麻、铺仁草(五华), 岗甩麻(高要), 狗信药(五华、阳春), 哈仔草(阳江), 山黄皮(惠阳), 坡雪麻(化县), 九信药、九虎药(番禺、南海), 鸡仔麻(罗定、阳春), 狗屎麻(湛江), 狗屎藤, 了哥王子, 了哥麻; 广西: 料歌黄(大埔), 鱼胆根(南宁), 地谷根(贵县、平南), 雀儿麻(桂平、岑溪), 雀麻木(北流), 铁骨散(兴安), 地巴麻(南宁、百色), 鬼辣椒(百色), 指皮麻(北海), 鸡儿苦晚, 鸡儿苦麻, 鸡儿苦蔓, 铁乌散, 乌子麻, 火索木, 毒鱼藤, 铁骨伞, 定元根, 土杨柳, 豆九麻, 地麻, 山雁皮。

功效 根、根二层皮: 有大毒。清热解毒, 化痰散结, 通经利水。用于扁桃体炎, 腮腺炎, 淋巴结炎, 支气管炎, 哮喘, 肺炎, 风湿性关节炎, 跌打损伤, 麻风, 闭经, 水肿; 叶: 外用于急性乳腺炎, 蜂窝织炎; 果实: 外用于瘰癧, 疳疽。

7081028

*Wikstroemia micrantha* Hemsl.

植物名 小黄构《高植图鉴》

药材名 小黄构《汇编》

文献名 短锥序茛花《云南种录》

地方名 陕西: [冬青](秦岭); 湖北: 黄构, 小构, 黄狗子皮(神农架); 四川: 建漆(米易), 滑药、黄构皮(南充), 野棉皮, 香构, 娃娃皮, 藤构。

功效 茎皮、根: 止咳化痰, 止痛。用于风火牙痛, 哮喘, 百日咳, 久痢不止。

7081029

*Wikstroemia monnula* Hance

植物名 北江茛花《高植图鉴》

地方名 山棉皮(浙江、广西)。

功效 根、根二层皮、叶: 有毒。清热解毒, 化痰散结, 通经利水; 果实: 外用于瘰癧, 疳疽。

7081030

*Wikstroemia nutans* Champ.

植物名 细轴茛花《高植图鉴》

文献名 垂穗茛花《中药大辞典》, 金腰带《湖南药物志》

地方名 山棉皮(福建、湖南、广东、广西), 著衣麻(华南), 野棉花(广东、广西); 福建: 野发麻; 广东: 雀子麻; 广西: 了哥王(博白), 定谷(柳州), 鸡断肠(平南), 雀儿麻(苍梧), 地棉麻。

功效 花、根、茎皮: 消坚破瘀, 止血, 镇痛。用于瘰癧初起, 跌打损伤。

7081031

*Wikstroemia paniculata* Li

植物名 圆锥茛花《广西药录》

地方名 广西:黄了哥(武鸣);四川:堇花(米易)。

功效 全株;外用子疝气。

### 7081032

*Wikstroemia pilosa* Cheng

植物名 毛花堇花《高植图鉴》

文献名 浙雁皮《浙江药植志》,多毛堇花《云南植物研究》,柔毛堇花《种补补编》

地方名 浙江:白山芝一;广西:地棉皮;其他:山棉皮。

功效 根、根二层皮、叶:有毒。清热解毒,化痰散结,通经利水;果实:外用子瘰癧,疳疔。

## 7083 紫茉莉科 Nyctaginaceae

### 7083001

*Boerhavia crispa* Heyne

植物名 皱波黄细心《品种论述》

地方名 台湾:牛膝。

功效 根:解热、止咳、健胃、消化、利尿。

### 7083002

*Boerhavia diffusa* L.

植物名 黄细心《高植图鉴》

药材名 黄寿丹《云南中草药》

文献名 黄心细、野苋菜《台湾药植志》

地方名 海南:沙参;云南:老来青、披散黄细心、还少丹(红河)。

功效 根:活血散瘀,强筋骨,调经,消痞。用于筋骨疼痛,腰腿疼,月经不调,白带,胃纳不佳,脾肾虚,浮肿,虚咳,小儿疳积,小儿麻痹后遗症。

### 7083003

*Bougainvillea glabra* Choisy

植物名 光叶子花《高植图鉴》

药材名 叶子花《云南中草药》

文献名 宝巾《海南植志》

地方名 簕杜鹃、九重葛(广东、广西),三角花(江苏、广西);云南:紫三角(昆明),紫亚兰。

功效 花:调和气血,收涩止带。用于妇女赤白带下,月经不调;全株:用于跌打损伤,痢疮。

### 7083004

*Mirabilis himalaica* (Edgew.) Heim.

植物名 喜马拉雅紫茉莉《西藏植志》

药材名 喜马拉雅紫茉莉《西藏中草》

文献名 东亚紫茉莉《秦岭植志》,华野茉莉《云南种录》

地方名 甘肃:猪婆蔓(武都);青海:“帕竹”(藏语);西藏:“八朱”(藏语)。

功效 根:补益脾胃,利水。用于肾炎水肿,淋病。

### 7083005

*Mirabilis jalapa* L.

植物名 紫茉莉《草花谱》、《高植图鉴》

药材名 紫茉莉《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 苦丁香、野丁香《滇南本草》,土山奈、紫茉莉根《纲目拾遗》,胭脂花《草花谱》,粉团花、山胭脂花、

菜尼花《盛京通志》,野茉莉、粉豆花《名实图考》,入地老鼠、花粉头《岭南采药录》,水粉头《天宝本草》,奈花、白粉花《和汉药物学》,宫粉花《华北观赏植物》,〔白鼓〕《贵阳民间药草》,紫茉莉叶《峨眉药植》。

地方名 姑娘花(东北),洗澡花(安徽、江西),夜娇娇(浙江、福建),夜晚花(浙江、上海、江苏),〔夜来香〕(上海、安徽、江西),晚饭花(江苏、安徽),胭脂草(安徽、江西),粉孩儿(广东、福建),粉豆子(陕西、湖南),胭脂花头(广东、四川);内蒙古:“包日一米丽卡”(蒙语),胭脂豆,粉子豆;陕西:粉豆子根,状元花(眉县);江苏:磨花(连云港);上海:夜饭花,夜繁花;浙江:白胭脂(温州);安徽:官粉豆子;江西:红花倒水莲、水粉树(于都);福建:白胭脂花,月美人,红孩儿,煮百花、孩儿粉(闽东);台湾:素香花;湖南:上天麻、长春花(常德),白牛膝(衡山、益阳),水粉子花(芷江、永兴),活血余(酃县),假洋参(永顺);广东:白鼓首花根、白蜘蛛花、粉花头(潮阳),蜘蛛花头、古首花头(潮安),小啦叭花头,南京渠,水粉花头,水粉花,水粉子,红花老鼠莲,花粉灰;广西:老来娇(梧州),胭脂薯(苍梧),早晚花(龙州、德保),山枝红(乐业),粉衣裳,夜了娇,胭脂红,出窿老鼠,鸭脚菜;四川:粉子头,粉果花,粉糖花(南充),粉籽花(重庆);贵州:假白鼓,土白鼓;云南:白花参、白丁香花(昆明),丁香花、紫丁香、粉果根(红河),白粉果(曲靖),“糯外娘”(西双版纳傣语),胭脂粉、粉豆、粉果(文山),〔丁香〕(昆明);其他:烟粉豆花,胭脂粉花,烫烫红,夜饭红,草茉莉,鬼子茉莉,胭脂花根,胭脂水粉,未时花。

功效 根、全草:清热利湿,活血调经,解毒消肿;根:用于扁桃体炎,月经不调,白带,子宫糜烂,前列腺炎,泌尿系感染,水肿,大便燥结,风湿关节酸痛;根、叶:外用于乳腺炎,跌打损伤,痈疖疔疮,湿疹;种子的胚乳:用于去面土瘰瘡粉刺。

备考 市场调查,常发现以本品之根加工后伪充人参、天麻、白鼓等,应注意鉴别。

### 7083006

*Pisonia aculeata* L.

植物名 腺果藤《高植图鉴》

文献名 避霜花《海南植志》,腺果水冬瓜《台湾药植志》

地方名 台湾:齿托。

功效 树皮、叶:用于肿毒风湿疼痛。

## 7084 山龙眼科 Proteaceae

### 7084001

*Grevillea robusta* A. Cunn.

植物名 银桦《中国植志》

药材名 艾松胶〔树脂〕《药植简编》

地方名 海南:银橡树,丝树;广西:凤尾七(桂林)。

功效 树脂(艾松胶):用于胃痛,疮溃久不收口;叶:用于跌打损伤。

### 7084002

*Helicia cochinchinensis* Lour.

植物名 小果山龙眼《中国植志》  
 药材名 红叶树(湖北、湖南、广西)、《汇编》  
 文献名 山茂桤《云南植志》,越南山龙眼《广州植志》

地方名 羊仔屎(广东、云南),羊屎果(广东、广西);江西:[橄榄树];广东:羊屎树,羊屎乌,羊咪屎,万打棍,瓮竹树,倒拉锯;海南:黑灰树(澄迈)。

功效 根、叶:行气活血,祛瘀止痛。用于跌打损伤,肿痛,外伤出血;种子:有毒。外用干烧、烫伤。

## 7084003

*Helicia nilagnica* Bedd. *H. erratica* Hook. f. --- *H. erratica* var. *sinica* W. T. Wang

植物名 深绿山龙眼《中国植志》  
 药材名 豆腐渣果《云南中草药》  
 文献名 萝卜树《中药大辞典》,山龙眼《药植简编》,常绿山龙眼《高植图鉴补编》

地方名 云南:“堆雪水女”(元江哈尼语),母猪果(元江、龙陵),母猪烈果(潞西),山葫芦(思茅),苦梨梨(景东),罗罗果(瑞丽),“木札”(景颇语),“米太勒”(楚雄彝名),面果子树,浆果树。

功效 根、叶:收敛,解毒。用于肠炎,腹泻,食物中毒,草中毒,农药六六六中毒;叶:外用于跌打肿痛;树皮:有小毒。散瘀止痛,祛腐生新。用于跌打损伤,水火烫伤。

## 7084004

*Helicia obovatifolia* Merr. et Chun

植物名 倒卵叶山龙眼《中国植志》  
 地方名 海南:红心割;广西:山枇杷(金秀)。  
 功效 叶:止咳化痰。

## 7084005

*Helicia reticulata* W. T. Wang

植物名 网脉山龙眼《中国植志》  
 地方名 萝卜树(广东、广西);湖南:牛乃果(瑶名);广西:亮光子(容县、临桂),苦锯子(贺县),仇木(龙胜);贵州:瞎麻筋。

功效 枝、叶:收敛止血。外用于刀伤跌打;果:收敛,解毒,化痔。用于痔疮,小儿疳积。

## 7084006

*Heliciopsis henryi* (Diels) W. T. Wang

植物名 假山龙眼《中国植志》  
 地方名 云南:人字树(勐腊)，“埋棍”(勐腊傣语)。  
 功效 茎皮:抑菌,避孕。

## 7084007

*Heliciopsis lobata* (Merr.) Sleum.

植物名 调羹树《中国植志》  
 药材名 调羹树《广西本草选编》  
 地方名 广东:大裂叶萝卜树;海南:“定郎”(保亭黎语)，“那托”(琼中黎语);广西:痒腮树,(半枫荷)。

功效 根皮、叶:有小毒。清热解毒。用于腮腺炎;叶:用于痛风,皮炎。

## 7084008

*Heliciopsis terminalis* (Kurz) Sleum. --- *Heliciopsis henryi*

auct. non (Diels) W. T. Wang

植物名 痒腮树(广西)、《中国植志》  
 文献名 小果调羹树《云南植志》  
 地方名 海南:硬壳果;广西:鹅掌枫(防城、东兴);云南:人字树(勐腊)，“埋棍”(勐腊傣语),老鼠核桃(沧源)。

功效 根皮、叶:有小毒。用于腮腺炎;叶:外用皮炎;茎皮:有避孕作用。

备考 《海南植志》(1964)、《高植图鉴》(1972)等文献学名误订为 *H. henryi* (Diels) W. T. Wang

## 7084009

*Macadamia ternifolia* F. Muell.

植物名 澳洲坚果《中国植志》  
 文献名 昆士兰山龙眼、澳洲胡桃《台湾药植志》  
 功效 种子油:用于制造药皂的原料。

## 7085 五桠果科 Dilleniaceae

## 7085001

*Dillenia indica* L.

植物名 五桠果《中国植志》  
 药材名 五桠果《汇编》  
 文献名 拟枇杷、第伦桃《台湾药植志》  
 地方名 云南:“西湿阿地”(哈尼语),大泡果,弥心果。

功效 根、树皮:收敛,解毒。用于疟疾。外用于大疮。

## 7085002

*Dillenia pentagyna* Roxb. --- *D. hainanensis* Merr.

植物名 小花五桠果《中国植志》  
 文献名 五室第伦桃《海南植志》  
 地方名 海南:大叶山枇杷、牛彭(琼中、吊罗、加积)。  
 功效 果:止咳。

## 7085003

*Dillenia turbinata* Finet et Gagnep.

植物名 大花五桠果《中国植志》  
 药材名 大花五桠果《广西药录》  
 文献名 大花第伦桃《海南植志》,毛五桠果《中国树木志》  
 地方名 海南:枇杷树,各班肉,山牛彭;广东:[枇杷叶];广西:山枇杷(上思、博白、防城、陆川、北流、桂平、凤山、鹿寨),大板黄(北流)。  
 功效 叶:润肺,止咳,利尿。

## 7085004

*Tetracera asiatica* (Lour.) Hoogland

植物名 锡叶藤《中国植志》  
 药材名 锡叶藤《汇编》  
 文献名 锡叶《岭南采药录》,狗舌藤《中国树木志》  
 地方名 广东:糙米藤(惠阳),粗米藤(乐昌),红藤头(电白),虎舌藤(普宁);海南:雪藤,涩皮藤,锡叶根,涩叶藤;广西:涩藤(平南、博白、岑溪、苍梧、龙州),涩沙藤(陆川、容县、北流、玉林、博白),涩谷藤(贵县),大

涩沙(岑溪),擦锡藤(邕宁),水车藤。

功效 全株:收涩固脱,消肿止痛。用于腹泻,便血,肝脾肿大,子宫脱垂,白带,风湿关节痛,脱肛,遗精;叶:外用于跌打瘀肿。

#### 7085005

*Tetracera scandens* (L.) Merr.

植物名 毛果锡叶藤《中国植志》

药材名 锡叶藤《汇编》

文献名 涩叶藤《云南种录》

地方名 广西:水车藤,涩沙藤。

功效 藤茎:收涩固脱,消肿止痛。用于腹泻,便血,肝脾肿大,子宫脱垂,白带,风湿关节痛,脱肛,遗精。

### 7087 马桑科 Coriariaceae

#### 7087001

*Coriaria intermedia* Matsumura

植物名 台湾马桑《中国植志》

药材名 台湾马桑《台湾药植志》

功效 鲜叶:有毒。用于腹痛;茎、叶,果实:可毒鼠。

#### 7087002

*Coriaria japonica* A. Gray

植物名 毒空木《台湾药植志》

药材名 毒空木《台湾药植志》

文献名 毒洩疏《树分》,木本黄精叶钩吻《中国植物图鉴》

功效 根、叶:有剧毒。祛风除湿,镇痛,杀虫。

#### 7087003

*Coriaria nepalensis* Wall. --- *C. sinica* Maxim.

植物名 马桑《中国植志》

药材名 马桑《草木便方》、《汇编》

文献名 乌龙须《根》《草木便方》

地方名 野马桑(四川、云南),红马桑、醉鱼儿(四川、湖北),马桑果(云南、陕西、甘肃),千年红(河南、湖北、云南),马桑泡(湖北、广西),马鞍子(广西、云南);陕西:红娘子(柞水),红眼毛(商县),铺地蜈蚣(镇巴);湖北:坐山王(巴东),胖婆娘;湖南:上天梯(常德、永顺),蛤蟆树(古丈),阿斯木(凤凰、芷江、武冈),连花南文(新化);广西:四联树,黑果果(隆林);四川:毒空木,闹鱼儿(南川、成都),马桑树(峨眉山);贵州:马桑柴;云南:水马桑(昆明、红河、文山、曲靖),紫桑(文山),黑虎大王(曲靖),黑龙须(根);其他:〔醉鱼草〕,鱼尾草,〔扶桑〕,蓝蛇风,胖官

功效 根、叶:有剧毒。祛风除湿,镇痛,杀虫。用于淋巴结核,牙痛,跌打损伤,狂犬咬伤,风湿关节痛;叶:外用于烧烫伤,头癣,湿疹,疮疡肿毒。

### 7088 海桐花科 Pittosporaceae

#### 7088001

*Pittosporum balansae* DC.

植物名 聚花海桐《中国植志》

药材名 聚花海桐《广西药录》

地方名 广西:山辣椒(上思、防城),山霸王(钦州、邕宁)。

功效 根、叶:用于淋巴结核,跌打肿痛,蛇咬伤,肿瘤。

#### 7088002

*Pittosporum balansae* DC. var. *angustifolium* Gagnep.

植物名 窄叶聚花海桐《中国植志》

地方名 广西:舞辽类(上思)。

功效 根:用于骨折。

#### 7088003

*Pittosporum brevicalyx* (Oliv.) Gagnep.

植物名 短萼海桐《中国植志》

文献名 山桂花《名实图考》

地方名 广西:大辣椒(大新);四川:臭皮(盐边);贵州:调经草;云南:万里香,〔万年香〕(昆明),〔山栀子〕(禄劝),鸡骨头(玉溪),小朵林,大朵林(红河)。

功效 茎、皮、叶、果:消炎消肿,祛痰,镇咳,平喘。用于慢性气管炎,睾丸炎;根皮:活血调经,化瘀生新。用于经闭,跌打伤肿,失眠,遗精,骨折,风湿肿痛。

#### 7088004

*Pittosporum crispulum* Gagnep.

植物名 皱叶海桐《中国植志》

药材名 臭皮《云南中草药》

地方名 云南:鸡旦白树、羊脆果(红河),羊脆木(思茅),黄木(昭通)。

功效 皮、叶:收敛止血,消肿止痛,解毒。用于胃及十二指肠溃疡出血,鼻衄,产后流血不止,月经过多,黄疸,心悸,失眠,小儿麻痹后遗症,瘫痪,风湿疼痛,坐骨神经痛,跌打损伤,外伤出血,毒蛇咬伤,无名肿毒,骨折;根:用于消食,止吐,肾炎。

#### 7088005

*Pittosporum daphniphyllodes* Hayata

植物名 牛耳枫叶海桐《中国植志》

文献名 “丕妹”《彝药志》

地方名 云南:山青皮,桂花叶兰。

功效 树皮、果实:清热解毒,祛风除湿。用于跌打损伤,痢疾,崩漏,气管炎,白口疮(口腔溃疡),风湿瘫痪,半身不遂,高血压病。

#### 7088006

*Pittosporum elevaticostatum* Chang et Yan

植物名 突肋海桐《中国植志》

地方名 贵州:山枝茶。

功效 根、果:化痰止咳,清热除烦。用于烦躁不安,哮喘,盗汗,遗精,风湿关节炎。

#### 7088007

*Pittosporum floribundum* Wils. et Arn.

植物名 多花海桐《中国植志》

药材名 小年药《中药大辞典》

文献名 云南海桐、多花海桐花《中药大辞典》

功效 叶:用于疮毒肿痛。

## 7088008

*Pittosporum glabratum* Lindl.

植物名 光叶海桐《中国植志》

药材名 广枝仁《常用中草药配方》

文献名 山矾《遵生八笺》, 芭豆、崖花子《树分》, 光海桐《种分》, 山枝仁、山枝根《四川中药志》, 土连翘《常用中草药配方》, 海桐树《汇编》, 山梔茶《民族药志》

地方名 一朵云(广东、广西); 陕西: 七里香; 上海: 山饭树; 浙江: 山金樱、蕲蛇树(天台); 江西: 七叶黄经(萍乡); 福建: 山石榴(清流), 花叶红籽树(宁化), 岩退风; 湖南: 七星胆(新宁), 钻山虎(江华), 皮子药(湘西), 见血飞(古丈); 广东: 七姐妹, 五牛子, 四骨猴王, 四叶齐, 山熊胆(阳春); 广西: 天打槌(藤县), 五托鸡(苍梧), 牛散托(陆川), 牙包树(龙胜), 长果满犬香, 赶山边(富川), 满山香(平南、蒙山), 为龙子(玉林); 四川: 山梔仁、牛台口(蓬溪), 山枝子, 山枝灵(会理), 山柿子, 山支仁, 火泡树, 枝仁, 柞木, 柞木仁, 楂树, 鸡心子, 鸡骨皮, 雀儿子, 矮沱沱; 贵州: 山枝(湄潭), 山梔, 瘦鱼蓼, 鸡骨头, 公梔子; 云南: 羊脆果, 羊脆木, 黄木, 鸡蛋树皮, 臭皮; 其他: 山海桐。

功效 根: 祛风活络, 散瘀止痛。用于风湿性关节炎, 坐骨神经痛, 骨折, 胃痛, 牙痛, 高血压病, 神经衰弱, 梦遗滑精; 叶: 解毒, 止血。外用于毒蛇咬伤, 疮疖, 外伤出血; 种子: 涩肠固精, 生津止渴。用于咽痛, 肠炎, 白带, 滑精。

## 7088009

*Pittosporum glabratum* Lindl. var. *neriifolium* Rehd. et Wils.

植物名 狭叶海桐《中国植志》

文献名 狭叶崖花子、夹竹桃叶崖花子《广西植志》

地方名 湖北: 竹叶金腰带(神农架); 广东: 斩蛇剑; 贵州: [黄梔子], 金刚口摆。

功效 果实或全株: 清热除湿。用于黄疸, 子宫脱出。

## 7088010

*Pittosporum heterophyllum* Franch.

植物名 异叶海桐《中国植志》

药材名 野桂花《汇编》

文献名 异叶海桐花《中国经植志》, [苦丁茶]《药植简编》。

地方名 四川: 山枝仁(万源), 鸡骨头; 云南: 细杉树、红杉树、臭皮(丽江), [臭椿皮](宁蒗), [榕根白皮](兰坪、宁蒗)。

功效 根皮、茎皮: 解毒消炎, 祛风除湿, 止血。用于肺热咳嗽, 痢疾, 风湿疼痛, 跌打损伤, 崩漏, 肠风下血, 蛔虫病; 种子: 清热, 生津止渴。

## 7088011

*Pittosporum illicioides* Makino --- *P. oligocarpum* Hayata

--- *P. kobuskianum* Gowda --- *P. sahnianum* Gowda

植物名 海金子《中国植志》

药材名 山梔茶(四川、贵州)、《民族药志》

文献名 崖花子《浙江天目药志》, 柯布海桐《广西中

药志》, 少果海桐、柯氏海桐《广西药录》, 崖花海桐《高植图鉴》, 台湾圆果海桐、两广海桐《中药大辞典》, 八角海桐《江西药录》, 菲草海桐《药典》, 海桐树《汇编》

地方名 浙江: 野柏子(建德), 野桂花(衢县), 野黄梔、山枝木、粘子柴、接骨丹(金华), 山海桐; 福建: 山石榴(清流), 花叶红籽树(宁化); 湖南: 一朵云, 一锤锣; 广西: 上山虎(大瑶山), 柞木仁, 满山香(蒙山、昭平、贺县、钟山、富川), 五月上树风(金秀), 白背风, 吊灯笼; 四川: 山枝条, 山枝仁(峨眉山)。

功效 根: 祛风活络, 散瘀止痛。用于风湿性关节炎, 坐骨神经痛, 骨折, 胃痛, 牙痛, 高血压病, 神经衰弱, 梦遗滑精; 叶: 解毒, 止血。外用于毒蛇咬伤, 疮疖, 外伤出血; 种子: 涩肠固精。用于咽痛, 肠炎, 白带, 滑精。

## 7088012

*Pittosporum kerrii* Craib

植物名 羊脆木《中国植志》

药材名 羊脆木《疟疾防治中草药选》

文献名 杨翠木《云南中草药》, 假海桐、假多花海桐、滇南海桐《云南植志》

地方名 云南: 羊脆骨, 羊耳朵树, 白浆房树, 白簪檀木(思茅), 芒果(勐仑)。

功效 树皮、根皮: 清热解毒, 祛风解表, 截疟。用于感冒, 流感发热, 百日咳, 疟疾; 全株: 活血止痛。用于跌打, 风湿骨痛。

## 7088013

*Pittosporum leptosepalum* Gowda

植物名 薄萼海桐《中国植志》

文献名 细萼海桐《广西药录》

地方名 广西: [满山香](贺县)。

功效 根皮: 祛风湿。用于风湿骨痛; 叶: 用于刀伤止血。

## 7088014

*Pittosporum omeiense* Chang et Yan

植物名 峨眉海桐《中国植志》

地方名 四川: 山梔仁(峨眉)。

功效 种子: 安神镇静, 生津止渴。

## 7088015

*Pittosporum ovoideum* Gowda

植物名 卵果海桐《中国植志》

药材名 卵果海桐《广西药录》

功效 叶: 止血。

## 7088016

*Pittosporum pauciflorum* Hook. et Arn.

植物名 少花海桐《中国植志》

药材名 少花海桐《广西药录》

文献名 疏花海桐《广西植志》

地方名 崖花子(华南); 广西: 酸味草(桂林), 满山香(金秀、平南), 满山香, 上山虎, 山桔。

功效 根茎: 用于跌打损伤。

## 7088017

*Pittosporum pentandrum* Merr. var. *hainanense*

(Gagnep.) H. L. Li --- *P. formosanum* Hayata --- *P. formosanum* var. *hainanense* Gagnep.

植物名 台琼海桐《中国植志》

文献名 台湾海桐《药植简编》, 台湾海桐花《海南植志》

地方名 台湾: 七里香; 广西: 大梅花树(凌乐); 其他: 鸡柔。

功效 根: 用于跌打损伤, 解渴; 叶: 止痢。

#### 7088018

*Pittosporum perryanum* Gowda

植物名 缝线海桐《中国植志》

地方名 广西: 珠木、黄珠子(大苗山), 吊灯笼(融水)。

功效 果: 用于黄疸病; 全株: 用于泄泻, 胃脘痛。

#### 7088019

*Pittosporum podocarpum* Gagnep.

植物名 柄果海桐《中国植志》

药材名 寡鸡蛋树《云南中草药》

文献名 大果海桐《湖北植志》

地方名 广东: 色斑木, 一朵云, 万里香, 火炮树; 四川: 广梔仁, 云南: 羊脆果树、羊翠果树、鸡蛋白树、臭蚂蚁树(红河)。

功效 根皮、叶: 收敛止血, 消肿止痛, 解毒。用于胃及十二指肠溃疡出血, 鼻衄, 产后流血不止, 月经过多, 黄疸, 心悸失眠, 小儿麻痹后遗症, 瘫痪, 风湿疼痛, 坐骨神经痛, 跌打损伤, 骨折外伤出血, 毒蛇咬伤, 无名肿毒。

#### 7088020

*Pittosporum rehderianum* Gowda

植物名 厚圆果海桐《中国植志》

文献名 秦岭海桐《秦岭植志》, 小籽海桐《湖北植志》

地方名 湖北: 岩花子树(神农架)。

功效 根皮、种子: 清热收敛, 止渴止喘。用于口渴, 哮喘, 腹泻等。

#### 7088021

*Pittosporum tobira* (Thunb.) Ait.

植物名 海桐《花镜》、《中国植志》

药材名 海桐花《花镜》、《汇编》

文献名 七里香、山矾花《群芳谱》, 金边海桐花《广州植志》

地方名 江苏: 山矾树、垂青树; 福建: 海桐(厦门), 臭榕仔; 台湾: 七里香枝。

功效 枝、叶: 杀虫; 叶: 用于疝气, 疼痛, 肿毒, 皮肤病; 树皮: 用于赤痢, 风湿骨痛, 预防龋齿。

#### 7088022

*Pittosporum trigonocarpum* Levl.

植物名 棱果海桐《中国植志》

文献名 三角果海桐《广西植志》

地方名 四川: 山枝仁(峨眉山); 贵州: 公梔子, 鸡骨头, 瘦鱼蓼。

功效 茎皮: 清热补虚, 生津止渴, 安神收敛; 种

子: 清热, 生津止渴; 根皮: 用于多年哮喘。

#### 7088023

*Pittosporum truncatum* Pritz.

植物名 菱叶海桐《高植图鉴》

文献名 崖花子《中国植志》, 七里香《陕西通志》, 平头海桐花《广西植志》, 崖花海桐《秦岭植志》, 崖花树《云南植志》, 崖子花《高植图鉴补编》, 山枝仁《汇编》

地方名 湖北: 无耳木(神农架); 广西: 山茶辣(隆安); 贵州: 茶叶山枝茶, 岩山枝。

功效 根皮及种子: 清热除湿, 补虚安神。用于心悸, 风湿, 遗精, 失眠。

#### 7088024

*Pittosporum tubiflorum* Chang et Yan

植物名 管花海桐《中国植志》

地方名 贵州: 山枝茶。

功效 根皮及种子: 清热除湿, 补虚安神。用于心悸, 风湿, 遗精, 失眠。

#### 7088025

*Pittosporum xylocarpum* Hu et Wang

植物名 木果海桐《中国植志》

药材名 广梔仁《云南植志》

地方名 山枝茶、山枝仁(四川、贵州); 四川: 山支仁、枝仁(重庆), 柞木仁; 贵州: 山枝菜、山梔茶(遵义), 山枝(湄潭)。

功效 种子: 清热, 生津止渴; 根皮: 补肺肾, 祛风湿, 通筋活络。

### 7091 红木科 Bixaceae

#### 7091001

*Bixa orellana* L.

植物名 红木《高植图鉴》

药材名 红木《名实图考》、《云南药录》

文献名 甘蜜《柔佛略记》, 胭脂树《中国植物图鉴》, 红毛果树《云南的造林树》

地方名 云南: 胭脂木(金平)。

功效 全草: 用于肾炎, 黄疸型肝炎, 蛇咬伤, 淋病。

### 7093 大风子科 Flacourtiaceae

#### 7093001

*Bennettiodendron brevipes* Merr.

植物名 山桂花《广西药录》

文献名 木乃铁树《拉汉种称补编》

功效 全株: 用于消化不良。

#### 7093002

*Carrierea calycina* Franch.

植物名 山羊角树《高植图鉴》

药材名 红木子《四川中药志》

文献名 嘉利树《广西药录》

地方名 湖北: 山桐子、水冬瓜(利川); 四川: 嘉丽树、山丁木(峨眉)。



功 效 种子:除风补脑。用于头昏目眩。

## 7093003

*Flacourtia indica* (Burm. f.) Merr.

植物名 刺篱木《高植图鉴》

药材名 刺篱木《广西药录》

功 效 果实:用于消化不良。

## 7093004

*Flacourtia inermis* Roxb.

植物名 罗比梅《台湾药植志》

功 效 根、叶:解毒。用于毒蛇咬伤;树皮:用于风湿痛。

## 7093005

*Flacourtia jangomas* Raeusch.

植物名 罗旦梅《台湾药植志》

功 效 叶:收敛,健胃。用于腹泻,虚弱;果实:用于胆汁病,恶心,止泻;根:外用于创伤,皮肤溃瘍,喉痛。

## 7093006

*Flacourtia ramontchii* L. Herit.

植物名 挪挪果《高植图鉴》

药材名 挪挪果《广西药录》

地方名 云南:“诺红”(瑶语),木关果(马关),山李子、野李子(思茅),棠梨(景洪)。

功 效 树皮、种子:祛风除湿。用于风湿痛,霍乱,间歇热。

## 7093007

*Flacourtia rukam* Zoll. et Moritz.

植物名 大叶刺篱木《高植图鉴》

药材名 牛牙果(广西)

文献名 罗夷梅《台湾药植志》

地方名 广西:角刺(北流),山桩;云南:炉甘果。

功 效 根、果实:用于痢疾;枝叶:外用于皮肤瘙痒。

## 7093008

*Gynocardia odorata* R. Br.

植物名 马蛋果《中药志》

药材名 马蛋果《云南药录》

文献名 云南大风子《中药志》

地方名 云南:沙梨果,树木瓜,大风子。

功 效 种子:用于麻风病,象皮病。

## 7093009

*Hydnocarpus alpina* Wright

植物名 高山大风子《中药通报》

文献名 印度大风子《云南植物研究》

地方名 云南:“码菠萝”(西双版纳傣语)。

功 效 种子:攻毒,杀虫。

## 7093010

*Hydnocarpus anthelminticus* Pierre ex Laness.

植物名 泰国大风子《中药志》

药材名 大风子《本草衍义补遗》、《中药志》\*

文献名 大枫子《品汇精要》,大枫子油《普济方》,大风子油《纲目》,大风子树《药材学》,暹罗大风子树(李

《药植》)大风子仁《药典》

地方名 云南:“吗补罗”(傣语);台湾:驱虫大风子;其他:麻风子。

功 效 种子及其脂肪油:有毒。祛风,攻毒,杀虫。用于麻风。外用于疥,癣,梅毒,水田皮炎,酒齄鼻,疮疡肿毒。

## 7093011

*Hydnocarpus hainanensis* (Merr.) Sleum. ---

*Taraktogenos hainanensis* Merr.

植物名 海南大风子《高植图鉴》

药材名 大风子《中药志》

地方名 海南:龙角,龙角木,海南麻疯树,高根,乌壳子;广西:米康茄、尾加木、青蓝木(龙州),麻风子。

功 效 种子:有毒。祛风,攻毒,杀虫。用于麻风。外用于疥癣,梅毒,水田皮炎,酒齄鼻,疮疡肿毒。

## 7093012

*Hydnocarpus heterophyllus* Kurz --- *Taraktogenos kurzii* King

植物名 缅甸大风子《中药志》

药材名 大风子《台湾药植志》

文献名 库氏大风子《台湾药植志》,印度大风子树《拉汉种称》

地方名 台湾:大风子油,库氏大风子油。

功 效 种子油:有毒。祛风,燥湿,杀虫。用于麻风,风湿,疥癣。

## 7093013

*Hydnocarpus merrillianus* L.

植物名 广西大风子《广西植录》

药材名 大风子《中药通报》

文献名 “麻菠萝”《西双版纳傣药志》,梅氏大风子《植分学报》

地方名 云南:“麻菠萝”(西双版纳傣语)。

功 效 种子:有小毒。祛风,燥湿,杀虫。用于麻风病,皮癣,过敏性皮炎。

## 7093014

*Hydnocarpus wightiana* Blume

植物名 印度大风子《中药志》

药材名 大风子《台湾药植志》

文献名 卫氏大风子《台湾药植志》,东印度大风子(李《生药学》)

地方名 台湾:卫氏大风子油,大风子油。

功 效 种子、种子油:有毒。祛风,燥湿,杀虫。用于麻风病,顽性皮肤疾患,眼炎。外用于创伤及溃瘍。

## 7093015

*Idesia polycarpa* Maxim.

植物名 山桐子《高植图鉴》

药材名 山桐子《广西药录》

文献名 椅《诗经》

地方名 水冬瓜(陕西、湖北);湖北:豆渣包(神农架);湖南:水冬桐,乒乓子,椅树,椅桐;四川:山榧桐;云南:水冬瓜子。

功 效 种子油:杀虫。用于疥癣;叶:清热凉血、散

瘀消肿。用于骨折, 烫火伤, 外伤出血, 吐血。

#### 7093016

*Idesia polycarpa* Maxim. var. *vestita* Diels

植物名 毛叶山桐子《高植图鉴》

地方名 (水冬瓜)《陕西、湖北》; 四川: 山梧桐; 云南: 野桐子(镇雄)。

功效 果实: 解毒, 杀虫。

#### 7093017

*Itoa orientalis* Hemsl.

植物名 伊桐《广西植录》

药材名 梔子皮《高植图鉴》

文献名 野厚朴《高植图鉴》

地方名 广西: 大黄树(天等), 牛眼果, 白走马胎, 白身树, 米稔怀, 弄七, 墨当鸣; 云南: 盐巴菜(西畴), 长叶子老重、木桃果(屏边)。

功效 根: 用于风湿骨痛, 跌打损伤, 贫血, 白血病; 枝、叶: 用于肝硬化。

#### 7093018

*Itoa orientalis* Hemsl. var. *glabrescens* C. Y. Wu

植物名 光梔子皮《广西药录》

地方名 广西: 美安(德保)。

功效 根: 用于风湿骨痛, 跌打损伤。

#### 7093019

*Scolopia chinensis* (Lour.) Clos

植物名 蒴桐《高植图鉴》

文献名 刺桐《广西本草选编》, 蒴冬《新华本草纲要》

地方名 广东: 红蕊蒴(粤北); 广西: 土乌药、红狗牙、楼红(上林), 红猪桑刺(南宁), 红头猪桑勒(平南), 天打壁(玉林), 有勒鸡刺(北流)。

功效 全株: 活血散瘀, 消肿止痛。用于骨痛, 跌打; 叶: 外用子跌打肿痛, 骨折, 痢疮肿毒; 刺: 用于乳汁不通; 根: 用于黄疸。

#### 7093020

*Xylosma controversum* Clos

植物名 南岭柞木《高植图鉴》

地方名 广西: 簕齿树叶, 米多鸡, 猛公刺(那坡), 红穿破石(平南); 贵州: 紫柄冬青。

功效 叶: 凉血散瘀, 消肿止痛, 止血。用于扭伤, 骨折, 脱臼。

#### 7093021

*Xylosma japonicum* (Walp.) A. Gray --- *X. congestum* (Lour.) Merr. --- *X. racemosum* (Sieb. et Zucc.) Miq.

植物名 柞木《高植图鉴》

药材名 柞木《本草拾遗》、《汇编》

文献名 孤奴、纳葛寇《霉疔新书》, 凿子木、柞木叶《纲目》, 柞木皮《纲目拾遗》, 凿头木《本草求原》, 红榉、柞树《草木便方》, 榉子树《分类草药性》, 冻青树、《冬青》《植物名汇》

地方名 羊子木(湖南、四川), 刺凿(湖南、广西), 葫芦刺(浙江、湖南), 蒙子树(安徽、四川); 浙江: [乌不踏]; 江西: 凿树; 湖南: 凿子树, 柞木

籽; 四川: 榉子刺(南川), 刺柞, 榉榕, 蒙子树根, 榉子刺根, 鼠木; 其他: 红蒙子根, 石蜜刺, 羊志木, [野棉花]。

功效 叶、根皮、茎皮: 清热利湿, 散瘀止血, 消肿止痛; 根皮、茎皮: 用于黄疸, 水肿, 瘰疬, 死胎不下; 根、叶: 用于跌打肿痛, 骨折, 脱臼, 外伤出血。

#### 7093022

*Xylosma japonicum* (Walp.) A. Gray var. *pubescens* (Rehd. et Wils.) C. Y. Chang --- *X. racemosum* (Sieb. et Zucc.) Miq. var. *pubescens* Rehd. et Wils.

植物名 毛枝柞木《云南种录》

药材名 柞木《陕西中药名录》

地方名 陕西: 榉子树(陕南); 四川: 榉子刺根

功效 叶、根皮、茎皮: 清热利湿, 散瘀止血, 消肿止痛。

#### 7093023

*Xylosma longifolium* Clos

植物名 长叶柞木《高植图鉴》

药材名 柞木《汇编》

地方名 广东: 跌破筋, 鸡达筋, 朗钉树、铁梨木、凿子树、簕齿树(惠阳), 跌破筋叶; 广西: 小角刺(陆川), 长叶凿树, 铁凌木, 假枫木; 云南: 簕柞树。

功效 叶、根皮、茎皮: 清热利湿, 散瘀止血, 消肿止痛; 根皮、茎皮: 用于黄疸水肿, 死胎不下; 根、叶: 用于跌打肿痛, 骨折, 脱臼, 外伤出血。

### 7094 天料木科 Samydaceae

#### 7094001

*Casearia glomerata* Roxb.

植物名 嘉赐树《海南植志》

药材名 嘉赐树《广西药录》

文献名 球花脚骨脆《高植图鉴》

地方名 广西: 熊胆树皮(忻城), [大力 E](平南), 鳊鱼脯(苍梧)。

功效 根、叶: 退热。用于跌打损伤, 驳骨; 树皮: 用于腹痛, 痢疾。

#### 7094002

*Casearia glomerata* Roxb. f. *pubinervis* How et Ko

植物名 毛脉嘉赐树《广西植录》

文献名 毛嘉赐树《广西药录》

功效 根、叶: 用于跌打损伤。

#### 7094003

*Casearia villilimba* Merr.

植物名 毛叶嘉赐树《海南植志》

文献名 毛嘉赐树《药植简编》, 脚脆骨《高植图鉴》

功效 全株: 用于肝炎。

#### 7094004

*Homalium cochinchinensis* (Lour.) Druce

植物名 天料木《高植图鉴》

药材名 天料木《台湾药植志》

功效 根: 收敛。用于肝炎。

## 7094005

*Homalium hainanense* Gagnep.

植物名 红花天料木《高植图鉴》  
地方名 广东:高根(湛江);海南:山红罗,母生(琼东、澄迈)。  
功效 叶:清热消肿。外用于洗疮毒。

## 7094006

*Homalium sabiaefolium* How et Ko

植物名 柳叶天料木《广西药录》  
功效 全株:用于疮疡肿毒,风疹。

## 7098 怪柳科 Tamaricaceae

## 7098001

*Myricaria bracteata* Royle --- *M. alopecuroides* Schrenk

植物名 宽苞水柏枝《高植图鉴补编》  
药材名 大苞水柏枝《品种论述》  
文献名 [西河柳]、[怪柳]《药植简编》,河柏、水怪柳《高植图鉴》,水柏枝《秦岭植志》  
地方名 陕西:红柳(佛坪);新疆:臭红柳;四川:“翁波”(若尔盖藏语);西藏:[山川柳]。

功效 幼嫩枝条:升阳发散,解毒透疹。用于麻疹不透,高热,风湿性关节炎,皮肤搔痒,血热酒毒。外用于风疹。

## 7098002

*Myricaria dahurica* Ehbrenb.

植物名 达乌里水柏枝《华北经植志要》  
文献名 水柏枝《树分》,“文布”(藏语)《青藏药图》  
地方名 甘肃:红柳(岷县)。  
功效 幼嫩枝条:助消化,解乌头毒。用于中毒性发烧,感冒,肿病。

## 7098003

*Myricaria paniculata* P. Y. Zhang et Y. J. Zhang ---

*Myricaria germanica* auct. non Desv.

植物名 三春水柏枝《中国植志》  
药材名 水柏枝《汇编》  
地方名 青海:砂柳;陕西:红柳;云南:观音柳、[西河柳](玉龙山);其他:臭红柳。  
功效 幼枝:发表透疹。用于麻疹不透。

备考 据《中国植志》第五十卷载“*M. germanica* (L.) Desv. 是典型的欧洲种,……在中国无分布”,并认为本品是欧洲水柏枝的替代种。

## 7098004

*Myricaria platyphylla* Maxim.

植物名 宽叶水柏枝《中国植志》  
药材名 沙红柳《沙漠药植》  
文献名 心叶水柏枝、《高植图鉴》,红虱、杉柳、琵琶柴、海葫芦根《汇编》,阔叶水柏枝《华北树木志》,阔叶怪柳《陕西中药名录》,喇嘛杆《高植图鉴补编》  
地方名 陕西:胖柳,喇嘛棍。  
功效 干燥幼枝:发表透疹。用于麻疹不透,湿疹,皮炎。

## 7098005

*Myricaria prostrata* Hook. f. et Thoms. ex Benth. et Hook. f. --- *M. hedini* Paulsen

植物名 匍匐水柏枝《中国植志》  
文献名 藏水柏枝《药植简编》  
功效 枝、叶:用于感冒。

## 7098006

*Reaumuria soongorica* (Pall.) Maxim.

植物名 红砂《中国植志》  
药材名 红沙《汇编》  
文献名 枇杷柴、红虱、海葫芦根《高植图鉴》,杉柳、琵琶柴《汇编》  
地方名 内蒙古:“乌兰-布杜尔加纳”(蒙语);新疆:[怪柳]、[西河柳]。

功效 枝、叶:用于湿疹,皮炎。

备考 本植物为肉苁蓉寄主之一。

## 7098007

*Reaumuria trigyna* Maxim.

植物名 黄花草《中国植志》  
文献名 黄花草枇杷柴《高植图鉴》,长叶红砂《华北树木志》  
功效 枝、叶:解热透疹,祛风湿,利尿。

## 7098008

*Tamarix austromongolica* Nakai

植物名 甘蒙怪柳《中国植志》  
功效 枝、叶:解热透疹,祛风湿,利尿。

## 7098009

*Tamarix chinensis* Lour. --- *T. juniperina* Bunge

植物名 怪柳《开宝本草》、《中国植志》  
药材名 西河柳《本草汇言》、《药典》  
文献名 怪《诗经》, [河柳]《毛诗传》, 殷怪《尔雅》郑玄注, 雨师《陆机《诗疏》》, [赤杨]《崔豹《古今注》》, 人柳《三辅旧事》, 赤怪《日华子本草》, 怪乳、柳桠、三春柳《开宝本草》, 春柳《图经》, 三眠柳《本草衍义》, 榑落《通志》, 长寿仙人柳《履巉岩本草》, 观音柳《卫生易简方》, 蜀柳、垂丝柳、雨丝《纲目》, 赤柳《东医宝鉴》, 赤怪柳《本草备要》, 怪柳花《岭南采药录》, 御柳《植物名汇》, 西湖柳、华北怪柳《树分》, 雨师师《牧野日图》, 华怪柳《中国植物图鉴》, 桧状怪柳《河北习见树木图说》, 桧怪柳《中药志》, 山川柳《中国经植志》, 红柳《陕甘宁植志》, 桧叶怪柳《内蒙古中草药》

地方名 红荆条(河北、山东、河南), 丝柳(广东、福建), 钻天柳、溪河柳(东北); 河北: 山怪柳, 红荆条棵, 红荆子, 野柏树; 山东: 阴柳(长清、聊城、崂山), [荆条] (沾化、广饶), 红荆; 江苏: 菩萨柳(苏北); 浙江: 麻柏(淳安); 福建: 玉柳(龙海、福州); 台湾: 柳枝痲; 河南: 香椿柳, 扶香柳, 阴阳柳, 红筋条, 河西柳; 湖南: 光叶柳。

功效 细嫩枝叶: 散风, 解表, 透疹。用于麻疹不透, 风湿痹痛。

## 7098010

*Tamarix elongata* Ledeb.

植物名 长穗怪柳《中国植志》

功效 枝、叶：解热透疹，祛风湿，利尿

7098011

*Tamarix laxa* Willd.

植物名 短穗柽柳《中国植志》

功效 枝、叶：解热透疹，祛风湿，利尿。

7098012

*Tamarix leptostachys* Bunge

植物名 细穗柽柳《中国植志》

功效 枝、叶：解热透疹，祛风湿，利尿。

7098013

*Tamarix ramosissima* Ledeb. --- *Tamarix pentandra* (Desv.) Pall.

植物名 多枝柽柳《中国植志》

药材名 山川柳《内蒙古中草药》

文献名 柽柳《开宝本草》，柽柳《图经》，柽柳花《岭南采药录》，观音柳《江苏南部种册》，红柳《高植图鉴》，西河柳、三春柳《沙漠药植》，五蕊柽柳《中草药学》

地方名 内蒙古：“苏亥”、“苏海”、“乌兰-苏海”（蒙名），“马拉沙勒”（乌审旗蒙名）；甘肃：新疆柽柳；新疆：“买及浓塔勒”（维语）。

功效 嫩枝叶：发表，透疹，利尿，祛风湿；树脂（柽乳）：用于金疮；花：清热毒，透疹。

## 7101 西番莲科 Passifloraceae

7101001

*Adenia cardiophylla* (Mast.) Engl. --- *Adenia parviflora* (Blanco) Cusset

植物名 心叶蒴莲《中药志》

文献名 三开瓢《云南植志》

地方名 云南：肉杜仲（永平），红牛白皮（大理），三瓢果，假瓜萎。

功效 藤茎及根：药用。

备考 兽医用果皮混充瓜蒌皮。

7101002

*Adenia chevalieri* Gagnep.

植物名 蒴莲《高植图鉴》

药材名 蒴莲《汇编》

文献名 猪笼藤、双眼灵《植分学报》

地方名 广东：白蛇薯（淇江），软骨青藤（防城），蛇王藤；广西：〔木防己〕（贵县），防杞（平南），〔过江龙〕、田螺掩、软骨风（博白）。

功效 根：健脾胃，补肝肾，祛风湿，通经络。用于肝炎，喉痛，肺热咳嗽，胃炎，子宫脱垂；全株：用于胃脘痛。

7101003

*Adenia volkensii* Harms

植物名 伏氏蒴莲《中药通报》

功效 球茎：有毒。用于胃痛，堕胎。

7101004

*Passiflora altheilobata* Hemsl.

植物名 月叶西番莲《高植图鉴补编》

药材名 羊蹄暗消《云南中草药》

地方名 云南：蝴蝶暗消、藤子暗消（红河），苦胆七（保山），燕子尾。

功效 根、茎、叶：健胃，理气，除湿。用于腹痛，腹胀，腹泻，跌打损伤，风湿关节病，肝炎。外用于毒蛇咬伤。

7101005

*Passiflora couratella* L.

植物名 西番莲《高植图鉴》

药材名 西番莲《名实图考》、《汇编》

文献名 玉蕊花《花镜》，西洋鞠、转心莲《名实图考》

地方名 转枝莲（广西、四川、贵州）；广西：时计草；四川：〔子午莲〕、电光花、转盘花（西昌）；云南：洋酸茄花。

功效 根、藤、果：祛风除湿，活血止痛。用于风湿骨痛、疝痛，蛇经。外用于骨折；全草：除风清热，止咳化痰。用于风热头昏，鼻血流涕。

7101006

*Passiflora cupiformis* Mast. --- *P. franchetiana* Hemsl.

植物名 杯叶西番莲《高植图鉴补编》

药材名 燕尾草（四川、云南）、《云南中草药》

地方名 飞蛾草（四川、贵州），半截叶（广西、云南）；广西：叉痒草（乐业），四方台，羊蹄草、杯叶转心莲；四川：对叉疔疮药；贵州：半边风，对叉疔药；云南：马蹄暗消、五楞藤、羊蹄暗消、锅铲叶、锅铲藤、铁锅铲、藤子暗消（红河），猪腰子花、蝴蝶暗消。

功效 根：消食健胃，行气止痛。用于消化不良，腹胀，腹泻，胃痛，风湿骨痛，肝炎，跌打，小儿脱肛，毒蛇咬伤；全株：利湿祛风，宁心安神。用于精神失常，失眠，痛经，风湿麻木。

7101007

*Passiflora edulis* Sims

植物名 鸡蛋果《高植图鉴》

药材名 鸡蛋果《汇编》

文献名 玉蕊花、西番莲、紫西番莲、西番莲果、侯骚子、时计果（《花镜》伊钦恒江），转心莲《名实图考》，紫果西番莲《经济植物学》，食用时表草（叶《生药》），西番果《台湾药植志》

地方名 福建：土罗汉果；台湾：过山泡根，时计果根；广东：日本瓜；云南：洋石榴（腾冲）。

功效 果实：清热解毒，镇痛安神。用于痢疾，痛经，失眠；根：用于关节炎，骨膜炎

7101008

*Passiflora foetida* L.

植物名 龙珠果《高植图鉴补编》

药材名 龙珠果《南宁药志》

文献名 西番菊、玉蕊花《花镜》

地方名 龙须果（广东、广西）；广东：大种毛葫芦，龙珠草，假苦瓜，鸡片仔；广西：龙吞珠、风雨花（南宁），毛铃儿（北流），山木鳖（贵县），香瓜子（龙州），〔猪仔笠〕（岑溪），龙眼果（龙津），龙爪珠；云南：〔天仙果〕、肉果、香花果、野仙果、野仙桃（河口）。

功效 全草:清热凉血,润燥化痰。用于外伤性眼角膜(或眼结膜)炎,淋巴结炎,肺热咳嗽,小便混浊。

## 7101009

*Passiflora gracilis* Jacq. ex Link

植物名 细柱西番莲《高植图鉴补编》

地方名 云南:戒烟药(西双版纳)。

功效 全草:用于戒烟。

## 7101010

*Passiflora henryi* Hemsl.

植物名 圆叶西番莲《高植图鉴补编》

药材名 燕子尾(云南)、《汇编》

地方名 云南:老鼠铃(元江),闹蛆叶(红河),“爬期”、“八则”(红河哈尼语),燕子草(临沧),锅铲叶,龙球果。

功效 全草:补肺益气,消炎,杀菌。用于痢疾,肺结核,支气管炎,杀蛆,灭子孓;根:用于疮疖、痢疾。

## 7101011

*Passiflora jugorum* W. W. Smith

植物名 山峰西番莲《高植图鉴补编》

地方名 云南:石山南星(保山),燕子尾(临沧)。

功效 根:健胃,消食,止痛,消炎。

## 7101012

*Passiflora kwangtungensis* Merr.

植物名 广东西番莲《高植图鉴补编》

药材名 广东西番莲《广西药录》

地方名 广西:散痛薯(昭平)。

功效 全草:清热消肿。用于疮疡肿毒。

## 7101013

*Passiflora laurifolia* L.

植物名 樟叶西番莲《高植图鉴》

文献名 黄西番莲《花镜》,樟叶西番果《台湾药植志》

功效 叶:有毒。止痒。

## 7101014

*Passiflora moluccana* Reinw. ex Blume var. *teysmanniana* (Miq.) De Wilde --- *P. cochinchinensis* Spreng.

植物名 蛇王藤《高植图鉴补编》

药材名 蛇王藤《广西本草选编》

文献名 两眼蛇、蛇眼藤、山水瓜、黄豆树、海南西番莲《植物分学报》

地方名 双目灵(广东、广西);广东:治蛇灵(广州)。

功效 全株:清热解毒,消肿止痛。用于毒蛇咬伤,胃、十二指肠溃疡。外用于瘰疬,疮痈。

## 7101015

*Passiflora papilio* Li

植物名 蝴蝶藤《高植图鉴补编》

药材名 蝴蝶藤《汇编》

文献名 金粟藤《广西本草选编》

地方名 广西:双飞蝴蝶(上林、凌云),半边叶(都安),仙德藤(德保),花叶蝴蝶藤(大新)。

功效 全草:止血调经,散瘀止痛,清热解毒。用于吐血,便血,产后流血不止,功能性子宫出血,胃痛,

风湿关节痛,小儿惊风,毒蛇咬伤。

## 7101016

*Passiflora quadrangularis* L.

植物名 大果西番莲《高植图鉴》

药材名 大西番果《台湾药植志》

文献名 大转心莲《广西植录》

地方名 大西番莲(华南),日本瓜(广东、广西)。

功效 果实:清热解毒,镇痛安神。

## 7101017

*Passiflora wilsonii* Hemsl.

植物名 镰叶西番莲《高植图鉴补编》

药材名 锅铲叶《汇编》

文献名 铲叶西番莲《汇编》

地方名 云南:半节观音(思茅、临沧),“才嘴坝”、“牙郎办”(西双版纳傣语),金边莲,半截叶,半苏叶。

功效 全草:舒筋活络,散瘀活血。用于风湿骨痛,跌打损伤,疟疾,瘀阻,蛔虫病。外用于骨折。

## 7103 葫芦科 Cucurbitaceae

## 7103001

*Actinostemma tenerum* Griff. --- *A. lobatum* (Maxim.) Maxim. ex Franch. et Sav. --- *A. racemosum* Maxim. ex Cogn.

植物名 盒子草《中国植志》

药材名 盒子草《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 合子草《本草拾遗》,预知子《物理小识》,圣先知、圣知子、盍合子、仙沼子《日华子本草》,鸳鸯木鳖、水荔枝、盒儿藤《百草镜》,天球草、龟儿草《纲目拾遗》,小叶盒子草《云南种录》

地方名 无白草(江苏、上海),天球草(山东、浙江),汤罐头草(黑龙江、上海);山东:龟儿草;江苏:马爬儿(苏州),黄丝藤(宝应),葫荽棵子(盱眙),打破碗子藤;浙江:匍丝网草(吴兴);江西:野瓜藤,预知子藤;广东:五瓜藤、盒仔瓜(潮阳);广西:山苦瓜(上林)。

功效 全草、种子和叶:利尿消肿,清热解毒。用于肾炎水肿,湿疹,疮疡肿毒。

## 7103002

*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn. --- *B. cerifera* Savi

植物名 冬瓜《本经》、《中国植志》

药材名 冬瓜皮《开宝本草》、《药典》,冬瓜子《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 水芝、白瓜子《本经》,瓜子、瓜瓣《金匱要略》,白冬瓜、冬瓜仁《别录》,菰《广雅》,地芝《神仙本草》,濮瓜(孟詵),冬瓜叶、冬瓜藤《日华子本草》,冬瓜瓢《图经》,瓜犀《荆楚岁时记》,蔬瓠《群芳谱》,东瓜《瀛涯胜览》,猪子冬瓜《嘉应州志》,瓜犀子、瓜练子、东瓜子、结瓜子《新纲》,节瓜《满洲植录》,苦冬瓜《药典》,枕瓜《中国药植志》,白东瓜子《药材学》,单边冬瓜子、双边冬瓜子《中药志》,冬瓜练《中药大辞典》,白冬瓜皮《中草药学》,白瓜皮《简明中医辞典》

地方名 上海:洋冬瓜,酸冬瓜;四川:冬瓜米;云南:“麻巴阿烘”(傣名)。

**功效** 外果皮(冬瓜皮):利尿消肿。用于水肿胀满,小便不利,暑热口渴,小便短赤;种子(冬瓜子):润肺,化痰,消痈,利水。用于痰热咳嗽,肺痈,肠痈,淋病,水肿,脚气,痔疮,鼻面酒皴;果实:利水,消炎,清热,解毒。用于水肿,胀满,脚气,淋病,痰吼,咳嗽,暑热烦闷,消渴,泻痢,痈肿,解鱼毒,解酒毒;叶:用于消渴,疟疾,泻痢,蜂螫,肿毒;藤:用于肺热痰火,脱肛;果瓢:消热,止渴,利水,消肿。

## 7103003

*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn. var. *chiehqua* How. --- *Benincasa cerifera* Savi var. *chiehqua* (How.) C. Y. Wu et S. K. Chen

植物名 节瓜《中国植志》

药材名 节瓜《纲目拾遗》、《中药大辞典》

功效 果实:止渴生津,驱暑,健脾,利大小肠。

## 7103004

*Bolbostemma biglandulosum* (Hemsl.) Franquet

植物名 刺儿瓜《中国植志》

药材名 刺儿瓜《广西药录》

地方名 广西:拉拉藤(天等)。

功效 叶:外用于瘰癧,外伤。

## 7103005

*Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet

植物名 土贝母《药典》

药材名 土贝母《本草从新》、《汇编》

文献名 苕、贝母《证类本草》,土贝《百草镜》,大贝母《纲目拾遗》,假贝母《中国植志》,华北盒子草《中草药学》,小叶合子草《云南种录》,野西瓜《高植图鉴》,〔马兜铃〕《中药通报》,藤贝《四川中药志》

地方名 陕西:〔地苦胆〕,草贝,〔白附子〕(太白);甘肃:〔白药子〕,白乌药;山东:土大贝(蒙山),土七厘散(烟台);浙江:猪矢贝,猪屎贝;湖北:藤贝母。

功效 鳞茎:散结,消肿,解毒。用于乳痈瘰癧,乳腺炎,颈淋巴结结核,慢性淋巴结炎,肥厚性鼻炎。

## 7103006

*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai --- *Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. et Zeyh.

植物名 西瓜《日用本草》、《中国植志》

药材名 西瓜皮《纲目》、《中药大辞典》

文献名 寒瓜《本草经集注》,西瓜根叶《滇南本草》,天生白虎汤(汪颖《食物本草》),西瓜青《摄生众妙方》,西瓜翠衣《临证指南医案》,西瓜子仁《纲目》,西瓜子壳《本草撮要》,西瓜霜《疡医大全》,西瓜硝《本草再新》,倭瓜《满洲植录》,时瓜《满蒙植汇》,夏瓜、水瓜、青登瓜《新纲》,翠瓜、打瓜、瓜子儿《满鲜植汇》,西瓜翠《药材资料汇编》

功效 果皮:清解暑热,利尿。用于暑热烦渴,尿少色黄;西瓜霜(西瓜白霜):用于咽喉肿痛;西瓜黑霜:用于慢性肾炎,浮肿,肝病腹水;果瓢:清热解暑,除烦止咳,利小便。用于暑热烦渴,热盛伤津,小便不利,喉痹,口疮;种仁:清肺润肠,和中止渴;种皮:用于吐血,肠风下血;根、叶:用于水泻,痢疾。

## 7103007

*Cucumis melo* L.

植物名 甜瓜《郭橐驼种树书》、《中国植志》

药材名 甜瓜蒂《本草经集注》、《药典》,甜瓜子《开宝本草》、《药典》

文献名 瓜《诗经》,瓜蒂《本经》,甘瓜子《别录》,瓜丁《千金翼方》,甜瓜叶《嘉祐本草》,甜瓜茎、甜瓜花《图经》,苦丁香《本草衍义补遗》,香瓜《滇南本草》,果瓜、甜瓜蔓《纲目》,熟瓜《本草从新》,甜瓜仁、甜瓜瓣《本经逢原》,穿肠瓜、粪甜瓜《纲目拾遗》,瓜萼《新纲》,黄金瓜蒂《药材学》,哈密瓜、白兰瓜、华莱士瓜《中国植志》

地方名 小瓜(陕西、甘肃、宁夏);北京:穿肠草,川肠草,甜瓜秧;山东:甜瓜蒂把(烟台),甜瓜把;江苏:香瓜子(苏州、泰州、靖江),香瓜藤;浙江:黄金瓜,梨瓜(金华),蜜糖瓜(临安);河南:甜瓜疙瘩;广东:蜜糖埕(广州);其他:茶钢,美女瓜,香瓜把,香瓜蒂,黄方花,尿瓜秧,傻瓜,燕瓜,真瓜。

功效 种子(甜瓜子):清热,排脓。用于肺热咳嗽,肺脓疡,阑尾炎;果柄(甜瓜蒂):有毒。催吐。用于食物中毒,痰涎不化,癰瘤;全草:祛火败毒。用于痔疮肿毒,漏疮生管,脏毒滞热,流血刺痒;果实:清暑热,解烦渴,利小便;叶:去瘀血,用于小儿疳积。外用于生发,洗风癞;果皮:清热,去烦渴,泡水止牙疼;花:用于心痛咳逆。外用于敷疮散毒;藤茎:用于鼻中息肉、鼻痈等;根:外用于洗风癞。

## 7103008

*Cucumis melo* L. var. *conomon* (Thunb.) Makino

植物名 菜瓜《饮膳正要》、《中国植志》

药材名 越瓜《本草经集注》、《中药大辞典》

文献名 梢瓜《饮膳正要》,羊角瓜《纲目》,生瓜《本经逢原》,白瓜《本草求真》

功效 果实:利小便,解热毒。用于烦热口渴,小便不利。

## 7103009

*Cucumis sativus* L.

植物名 黄瓜《中国植志》

药材名 黄瓜《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 胡瓜《千金·食治》,黄瓜藤《滇南本草》,刺瓜《名实图考》,青瓜、茶辣、蒴瓜《植物名汇》,黄瓜皮《和汉药标本目录》

地方名 湖南:勒瓜;广东:瓜子(梅县);四川:胡瓜藤,葫瓜藤;云南:小黄瓜叶。

功效 果实:除热,利水,解毒。用于烦渴,咽喉肿痛,火眼,烫火伤;黄瓜藤:消炎,祛痰,镇痉。用于腹泻,痢疾,癰瘤;黄瓜秧:用于高血压;黄瓜霜:清热消肿。用于扁桃腺炎;黄瓜叶:小毒。用于腹泻,痢疾;黄瓜根:用于腹泻痢疾。

## 7103010

*Cucurbita maxima* Duch. ex Lam.

植物名 笋瓜《中国植志》

药材名 笋瓜《中草药学》

文献名 南瓜、番南瓜、蜜南瓜《新纲》,北瓜、饭瓜

《中国植志》，印度南瓜《广西中药志》，洋瓜《云南种录》  
功 效 种子：水、乙醇或乙醚提取物均有很强驱虫作用。

## 7103011

*Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poirer

植物名 南瓜《中国植志》

药材名 南瓜《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 麦瓜《滇南本草》，番南瓜《群芳谱》，番瓜藤、南瓜藤《本草再新》，南瓜蒂、南瓜瓢《纲目拾遗》，番瓜《本草求原》，南瓜根、南瓜花《分类草药性》，阴瓜《植物名汇》，南瓜子、江南瓜（叶《生药》），南瓜仁《科学的民间药草》，伏瓜《民药汇编》，老瓠瓜、窝瓜《中国药植图鉴》，瓜蒂、蜜南瓜子、唐茄子、西壶芦子《药材学》，南瓜阴芽（瓜内幼芽）《四川中药志》，南瓜须《江西中医药》

地方名 北瓜（山西、江苏、江西、广东、云南），金瓜（浙江、福建、湖南、广东、广西），〔冬瓜〕（山西、广东），倭瓜（广西、云南），金冬瓜（山西、广东、广西、云南），盘肠草（上海、四川），饭瓜（上海、江苏、浙江），白瓜子（东北）；北京：倭瓜子；山东：方瓜；江西：番莆；福建：黄金瓜（上杭），红袍（三明、永安），东瓜（晋江、泉州），统瓜（莆田）；广东：番瓜核、盒瓜核（新会）；广西：金瓜米（陆川）；云南：小麦瓜、瓠瓜，“麻帮罕”（西双版纳傣语）；其他：中国南瓜，红南瓜。

功 效 种子：驱虫。用于绦虫病，血吸虫病；南瓜蒂：清热安胎。用于先兆流产，乳头破裂或糜烂；南瓜根：清热，渗湿，解毒。用于黄疸，牙痛；南瓜藤：清热。用于结核低烧；果实：补中益气，消炎止痛，解毒杀虫；南瓜叶：用于痢疾，疳积，创伤；南瓜花：清湿热，消肿毒。用于黄疸，痢疾，咳嗽，痈疽肿毒；茎卷须（南瓜须）：用于妇人乳缩，剧烈疼痛；南瓜瓢：用于烫伤，创伤；阴芽（果实内萌出的幼苗）：用于小儿盘肠气痛及惊风，感冒，风湿热。

## 7103012

*Cucurbita moschata* Duch. var. *melonaeformis* (Carr.) Makino

植物名 倭瓜《东北药植志》

药材名 毛壳南瓜子《中草药学》

地方名 南瓜、南瓜仁（东北）。

功 效 种仁：用于驱绦虫。

## 7103013

*Cucurbita moschata* Duch. var. *toonae* Makino

植物名 牛腿南瓜《广西中药志》

药材名 光亮南瓜子《中草药学》

功 效 种子：用于驱绦虫。

## 7103014

*Cucurbita pepo* L.

植物名 西葫芦《中国植志》

药材名 西葫芦（通称）

文献名 番瓜《南宁府志》，水葫芦《名实图考》，南瓜仁（叶《生药》），美国南瓜《华北经植志要》，西葫芦《药植简编》

地方名 气豆、白瓜子、倭瓜（东北）；江苏：一窝鸡笋瓜（南京）。

功 效 果：用于哮喘，咳嗽。外用：对口疮。

## 7103015

*Cucurbita pepo* L. var. *akoda* Makino

植物名 桃南瓜《汇编》

药材名 桃南瓜《汇编》

文献名 金瓜、鼎足瓜《中国蔬裁》，看瓜、吊瓜《中药大辞典》

地方名 桃儿南瓜（华北）；上海：红南瓜；其他：金冬瓜（日本）。

功 效 果实：平喘，宁嗽。用于哮喘咳嗽。

## 7103016

*Cucurbita pepo* L. var. *kintoga* Makino

植物名 北瓜《广西药录》

地方名 广西：金瓜（南宁）。

功 效 果实：定喘，解毒。用于哮喘，咳嗽。外用：对口疮。

## 7103017

*Diplocyclos palmatus* (L.) C. Jeffrey

植物名 毒瓜《中国植志》

药材名 毒瓜《广西药录》

功 效 全株：外用于淋病。

备 考 果实与根有毒。

## 7103018

*Ecballium elaterium* (L.) A. Rich.

植物名 喷瓜《中国植志》

药材名 喷瓜《药植简编》

功 效 果、根：通经，驱虫，抗癌。用于水臌，蛋白质性肾炎等；果：峻泻。

## 7103019

*Gymnopetalum chinense* (Lour.) Merr. --- *G. cochinchinense* (Lour.) Kurz

植物名 金瓜《中国植志》

药材名 金瓜（广东、广西、云南）

地方名 广西：越南裸瓣瓜，野苦瓜（隆安），老鼠瓜（平南）；云南：〔天花粉〕。

功 效 全草：用于妇科病，全身痛，手脚痿缩，瘰癧。

## 7103020

*Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino

植物名 绞股蓝《中国植志》

药材名 绞股蓝《救荒本草》、《汇编》

地方名 浙江：小叶五爪龙（临安），猪血台（龙泉），软梗五爪金龙（泰顺）；湖北：八爪龙（神农架）；广西：蛇王（柳江）；四川：七叶胆（峨眉山）；云南：小苦药，公罗锅底，遍地生根。

功 效 根茎或全草：清热解毒，止咳祛痰。用于慢性支气管炎，传染性肝炎，肾盂炎，胃肠炎，梦遗滑精。

## 7103021

*Hemsleya amabilis* Diels

植物名 曲莲《中国植志》

药材名 金龟莲《天宝本草》

文献名 金盆《草木便方》，金银盆《分类草药性》，雪胆《汇编》，可爱雪胆《中药大辞典》，小蛇莲《高植图鉴》，圆果雪胆《中草药学》

地方名 蛇莲、苦金盆（贵州、云南）；四川：避蛇雷，土马兜铃；云南：锣锅底、罗锅底；其他：赛金刚，白味莲，金腰莲。

功效 块茎：清热解毒，抗菌消炎。用于菌痢，肠炎，又气管炎，急性扁桃体炎。

#### 7103022

*Hemsleya carnosiflora* C. Y. Wu et C. L. Chen

植物名 肉花雪胆《云南植物研究》

功效 块茎：清热解毒，抗菌消炎，消肿止痛。块茎可为生产雪胆素之原料。

#### 7103023

*Hemsleya changningensis* C. Y. Wu et C. L. Chen

植物名 赛金刚《中国植志》

药材名 赛金刚雪胆《云南植物研究》

地方名 云南：曲莲，细叶锣锅底。

功效 块根：清热解毒，消炎杀菌，收敛止痛。用于菌痢，急性肠胃炎，胃及十二指肠溃疡，脘腹痛，腹泻，尿路感染，高热，咽喉炎，扁桃体炎，便血，神经衰弱。

#### 7103024

*Hemsleya chinensis* Cogn. ex Forbes et Hemsl.

植物名 雪胆《中国植志》

药材名 雪胆《中草药学》

文献名 大五月五《种称》，血胆《药植简编》，中华雪胆《汇编》，华中蛇莲《高植图鉴》，蛇莲《中药通报》，华中雪胆《神农架药录》

地方名 湖北：乌龟七、癩肚七（神农架）；四川：土马兜铃（灌县），山乌龟、块头、蛇衔草（峨眉），金盆（重庆），金龟莲，锣锅七（巫山、巫溪）。

功效 块茎：有小毒。清热解毒，健胃止痛。用于冠心病，宫颈炎。

#### 7103025

*Hemsleya chinensis* Cogn. ex Forbes et Hemsl. var.

*ningnanensis* L. T. Shen et W. J. Chang

植物名 宁南雪胆《中国植志》

地方名 四川：苦金盆、锣锅底（宁南）。

功效 块茎：清热解毒，抗菌消炎。

备考 金龟莲（四川）。

#### 7103026

*Hemsleya delavayi* (Gagnep.) C. Jeffrey ex C. Y. Wu et

G. L. Chen--H. breviperfolata Hand.-Mazz.

植物名 短柄雪胆《中国植志》

药材名 短柄血胆《中国药植志》

文献名 短柄血胆《云南种录》

功效 块茎：清热解毒，抗菌消炎，消肿止痛。

#### 7103027

*Hemsleya delavayi* (Gagnep.) C. Jeffrey var. *yalungensis*

(Hand.-Mazz.) C. Y. Wu et Z. L. Chen--H.

*breviperfolata* Hand.-Mazz. var. *yalungensis* Hand.-

Mazz.

植物名 雅砻雪胆《中国植志》

药材名 雅砻雪胆《植分学报》

功效 块茎：清热解毒，抗菌消炎，消肿止痛。

#### 7103028

*Hemsleya dipterygia* Kuang et A. M. Lu

植物名 翼蛇莲《中国植志》

药材名 翼蛇莲《广西药录》

地方名 广西：石黄连（三江）。

功效 块茎：用于牙痛，牙周炎。

#### 7103029

*Hemsleya dolichocarpa* W. J. Chang

植物名 长果雪胆《中国植志》

地方名 四川：地乌龟（平武），苦龟（彭县），黄龟（绵竹）。

功效 块茎：含雪胆苦味素，雪胆皂甙较多，可作生产雪胆素之原料。

#### 7103030

*Hemsleya ellipsoidea* L. T. Shen et W. J. Chang

植物名 椭圆果雪胆《中国植志》

药材名 椭圆果雪胆《植分学报》

地方名 四川：块头、山乌龟（峨眉）。

功效 块茎：清热解毒，抗菌消炎，消肿止痛。

#### 7103031

*Hemsleya gigantha* W. J. Chang

植物名 巨花雪胆《中国植志》

药材名 蛇莲《中药通报》

地方名 四川：块头（石棉），“阿尼来比”（石棉彝语），金龟莲，甜金盆，苦金盆，雪胆，罗锅底，金腰苦，赛金刚，百味莲。

功效 块茎：清热解毒，健胃止痛。用于冠心病，子宫颈炎。

#### 7103032

*Hemsleya graciliflora* (Harms) Cogn.

植物名 小花雪胆《植分学报》

药材名 马铜铃《中国植志》

文献名 纤花雪胆《汇编》，细花雪胆《中国药植志》，马铜铃雪胆《云南植物研究》，纤花金盆《广西药录》

地方名 四川：土兜铃（彭县、什邡、灌县），响铃铃、羊铃铃、兜铃（绵竹）。

功效 块茎：清热解毒，抗菌消炎，消肿止痛。可作生产雪胆素之原料。

#### 7103033

*Hemsleya macrosperma* C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen

植物名 罗锅底《中国植志》

药材名 罗锅底《云南中草药选》

文献名 金盆《草木便方》，金龟莲《天宝本草》，金银盆《分类草药性》，雪胆、大籽雪胆《汇编》，金腰莲《全展选编·外科》

地方名 四川：土马兜铃；云南：大籽血胆，苦金盆。

功效 块茎：有小毒。清热解毒，健胃止痛。用于胃痛，溃疡病，上呼吸道感染，支气管炎，肺炎，细菌性



痢疾, 肠炎, 泌尿系感染, 败血病及其他多种感染。

#### 7103034

*Hemsleya macrosperma* C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen var. *oblongicarpa* C. Y. Wu et C. L. Chen

植物名 长果罗锅底《中国植志》

文献名 蛇莲《中药通报》

功效 块茎: 清热解毒, 健胃止痛。块茎可作生产雪胆素的原料。

#### 7103035

*Hemsleya megathyrsa* C. Y. Wu

植物名 大序雪胆《云南植物研究》

功效 块茎: 清热解毒, 抗菌消炎, 消肿止痛。用于肠炎, 痢疾, 支气管炎, 急性扁桃体炎, 肺部、胆道、泌尿系感染, 麻疯。块茎可作生产雪胆素之原料。

#### 7103036

*Hemsleya megathyrsa* C. Y. Wu var. *major* C. Y. Wu et C. L. Chen

植物名 大序大花雪胆《云南植物研究》

功效 块茎: 清热解毒, 抗菌消炎, 消肿止痛。块茎可作生产雪胆素之原料。

#### 7103037

*Hemsleya mitrata* C. Y. Wu et C. L. Chen

植物名 帽果雪胆《中国植志》

药材名 帽果雪胆《云南植物研究》

功效 块茎: 可用作提取齐墩果酸和齐墩果酸甙类之原料。

#### 7103038

*Hemsleya omeiensis* L. T. Shen et W. J. Chang

植物名 峨眉雪胆《中国植志》

药材名 峨眉雪胆《植分学报》

地方名 四川: 块头、地乌龟(峨眉)。

功效 块茎: 清热解毒, 抗菌消炎, 消肿止痛。

#### 7103039

*Hemsleya panacis-scandens* C. Y. Wu et C. L. Chen

植物名 藤三七雪胆《中国植志》

药材名 藤三七雪胆《云南植物研究》

功效 块茎: 清热解毒, 抗菌消炎, 消肿止痛。块茎可作提取雪胆素之原料。

#### 7103040

*Hemsleya panlongqi* A. M. Lu et W. J. Chang

植物名 盘龙七《中国植志》

药材名 盘龙七《植分学报》

功效 块茎: 清热解毒, 抗菌消炎, 消肿止痛。

#### 7103041

*Hemsleya pengxianensis* W. J. Chang

植物名 彭县雪胆《中国植志》

药材名 甜雪胆(拟)

地方名 四川: 甜龟(彭县), 菜龟(彭县、绵竹), 白龟(绵竹)。

功效 块茎: 清热解毒, 抗菌消炎, 消肿止痛。

#### 7103042

*Hemsleya pengxianensis* W. J. Chang var. *gulinensis* L.

T. Shen et W. J. Chang

植物名 古蔺雪胆《中国植志》

药材名 古蔺雪胆《植分学报》

功效 块茎: 清热解毒, 抗菌消炎, 消肿止痛。

#### 7103043

*Hemsleya pengxianensis* W. J. Chang var. *jinfushanensis*

L. T. Shen et W. J. Chang

植物名 金佛山雪胆《中国植志》

药材名 金佛山雪胆《云南植物研究》

地方名 四川: 金盆、牛屎金盆、银盆(南川)。

功效 块茎: 清热解毒, 抗菌消炎, 消肿止痛。块茎可作生产雪胆素之原料。

#### 7103044

*Hemsleya pengxianensis* W. J. Chang var. *junliancensis* L.

T. Shen et W. J. Chang

植物名 筠连雪胆《中国植志》

药材名 筠连雪胆《植分学报》

地方名 四川: 地乌龟(筠连)。

功效 块茎: 清热解毒, 抗菌消炎, 消肿止痛。

#### 7103045

*Hemsleya pengxianensis* W. J. Chang var. *polycarpa* L.

T. Shen et W. J. Chang

植物名 多果雪胆《中国植志》

地方名 四川: 金盆、牛屎金盆、银盆(南川)。

功效 块茎: 清热解毒, 抗菌消炎, 消肿止痛。块茎可作生产雪胆素之原料。

#### 7103046

*Hemsleya sphaerocarpa* Kuang et A. M. Lu

植物名 蛇莲《中国植志》

药材名 蛇莲《中药通报》

功效 块茎: 清热解毒, 健胃止痛。用于冠心病及宫颈炎。

#### 7103047

*Hemsleya villosipetala* C. Y. Wu et C. L. Chen

植物名 母猪雪胆《中国植志》

文献名 蛇莲《中药通报》

功效 块茎: 清热解毒, 健胃止痛。用于冠心病, 宫颈炎。

#### 7103048

*Herpetospermum pedunculorum* (Ser.) C. B. Clarke ---

*H. caudigerum* Wall.

植物名 波棱瓜《中国植志》

药材名 波棱瓜子《药典》

文献名 “色吉美多”(藏名)《药典》

地方名 西藏: “色尔格美多”、“赛吉麦朵”(藏名)。

功效 种子、果实: 泻肝火, 解毒。用于黄疸型传染性肝炎, 胆囊炎, 消化不良。

#### 7103049

*Hodgsonia macrocarpa* (Blume) Cogn.

植物名 油渣果《中国植志》

药材名 油渣果《汇编》

文献名 有棱油瓜《中国植志》

地方名 油瓜、猪油果(广西、云南);广西:唆豆荚(宁明),油果;云南:牛蹄果(金屏),野面瓜,猴子面瓜果,“吗井”、“渣尼咕噜”(爱尼语)。

功效 种仁:凉血止血,解毒消肿。用于胃、十二指肠溃疡出血,外伤出血,疮疡肿痛,湿疹;根:有小毒。杀菌,催吐。用于疟疾。

## 7103050

*Hodgsonia macrocarpa* (Blume) Cogn. var. *capniocarpa* (Ridl.) Tsai

植物名 腺点油瓜《中国植志》

药材名 无棱油瓜《云南种录》

文献名 油瓜《西双版纳傣药志》

地方名 云南:“麻景”(西双版纳傣语)。

功效 根:用于眼黄,全身皮肤发黄,尿血,截疟。

## 7103051

*Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. --- *L. leucantha* Rusby --- *L. siceraria* (Molina) Standl. var. *gourda* (Ser.) Hara

植物名 葫芦《中国植志》

药材名 葫芦《日华子本草》、《汇编》

文献名 壶《诗经》,蒲卢《礼记》,壶卢《日华子本草》,蒲芦、药壶卢、苦壶卢《纲目》,长柄茶壶卢《濒湖集简方》,细颈葫芦、长柄葫芦《本经逢原》,神仙葫芦《药材学》

地方名 要瓜(陕西、甘肃、宁夏),葫芦子(东北、山西);甘肃:夜开花,蒲瓜;江苏:陈葫芦;浙江:大葫芦,白蒲(衢县),秋蒲子(余姚),葫芦壳;江西:大葫芦;福建:壶芦;台湾:葫芦匏;广东:扁蒲、蒲子(梅县);湖南:大瓜,白瓜,凹劲瓜,葫芦瓜,瓢瓜;云南:“麻倒空”(西双版纳傣语)。

功效 果皮及种子:利尿,消肿,散结。用于水肿,腹水,颈淋巴结核;叶:解毒;花:用于一切鼠瘻;茎:用于麻疮;果实:用于水肿,黄疸,消渴,癰闭,痈肿,恶疮,疥癬。

## 7103052

*Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *depressa* (Ser.) Hara --- *L. leucantha* var. *depressa* (Ser.) Makino

植物名 匏瓜《说文》、《高植图鉴》

药材名 瓢瓜《汇编》

文献名 匏《诗经》,悬匏《古今注》,匏瓟、匏瓢《广韵》,旧壶卢瓢《海上方》,破瓢《孙天仁集效方》,甜瓠瓢《唐本草》,腰舟《鹖冠子》陆佃注,瓠匏《滇南本草》,瓠姑《群芳谱》,陈壶卢瓢、败瓢、壶卢子《纲目》,败瓠《食物本草会纂》,瓢《药材学》,瓠瓜《中国植志》,瓢葫芦《药典》,平压状葫芦《药植简编》

地方名 山东:圆扁蒲;江苏:瓢荚;湖南:提水瓜;其他:螭蛸葫芦。

功效 果实:利水通淋。用于水肿,腹胀,黄疸,淋病;种子:用于齿齦肿露,齿摇疼痛。

## 7103053

*Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *hispida* (Thunb.) Hara --- *L. leucantha* var. *hispida* (Thunb.)

Nakai --- *L. leucantha* var. *clavata* Makino

植物名 瓠子《中国植志》

药材名 瓠子《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 瓠、甘瓠《诗经》,瓠瓜《说文》,甜瓠《千金·食治》,净街瓠《清异录》,龙蜜瓜、天瓜《滇南本草》,长瓠《纲目》,扁蒲《群芳谱》,蒲种壳《药材资料汇编》

地方名 江苏:地蒲壳(苏州),夜开花;浙江:蒲瓜;广西:葫瓜;云南:龙蛋。

功效 果实:利尿,消肿,散结。用于腹胀,面目四肢浮肿,小便不通;果实:利水,清热,止渴,除烦。用于水肿腹胀,烦热口渴,疮毒;种子:用于哑瘰,跌打,咽喉肿痛。

## 7103054

*Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *microcarpa* (Naud.) Hara --- *L. leucantha* var. *microcarpa* (Naud.) Nakai

植物名 小葫芦《中国植志》

药材名 亚腰葫芦《简便单方》

地方名 四川:壶芦(峨眉山),葫芦,葫芦壳;河南:凹腰葫芦。

功效 果皮:用于水肿腹胀,淋闭,黄疸,口舌生疮,心热烦躁。

## 7103055

*Luffa acutangula* (L.) Roxb.

植物名 广东丝瓜《中国植志》

药材名 八棱丝瓜《汇编》

文献名 蜜瓜《纲目》,棱丝瓜《科裁》,棱角丝瓜、罗嗦《高植图鉴》,十棱瓜《云南种录》,粤丝瓜《广西药录》

地方名 八棱瓜(广西、浙江、四川),丝瓜络、丝瓜布(广东、广西),丝瓜(陕西、甘肃、宁夏、广东、广西);山东:短丝瓜;浙江:八角瓜;广西:丝瓜壳,丝瓜渣。

功效 果实的维管束(丝瓜络):通络,活血;叶:清热解毒,化痰止咳,止血;子:清热化痰,润燥,驱虫;藤:通经活络,止咳化痰;根:清热解毒;茎中汁(丝瓜水):用于双单蛾,消痰火,解毒,清内热;果实:清热,化痰,凉血,解毒;果皮:用于金疮,疔疮,坐板疮;花:清热解毒;瓜蒂:用于小儿痘,一切咽喉肿痛。

## 7103056

*Luffa cylindrica* (L.) Roem.

植物名 丝瓜《滇南本草》、《中国植志》

药材名 丝瓜络《本草再新》、《药典》

文献名 天丝瓜、天罗、蜜瓜《本事方》,绵瓜《续本事方》,布瓜《古今合璧事类备要》,天罗瓜《普济方》,鱼鳃《奇效良方》,丝瓜苗《救荒本草》,天吊瓜、纯阳瓜、倒阳菜《滇南本草》,天络丝《医学正传》,天罗布瓜《妇人良方补遗》,丝瓜子(姚可成《食物本草》),虞刺、洗锅罗瓜《纲目》,天罗絮《群芳谱》,天罗水、乌牛子《纲目拾遗》,纺线、丝瓜网《医林纂要》,丝瓜蒂《本草求真》,水瓜《岭南采药录》,丝瓜壳《分类草药性》,天罗勒《新纲》,天罗线《药材资料汇编》,叶瓜、天罗恕、天络、缣瓜《中国药植志》,天骷髅《中药大辞典》

地方名 丝瓜瓢(河北、江苏、四川), 砌瓜(东北、广东), 蒾瓜(华南), 丝瓜布(广西、四川), 菜瓜(福建、台湾); 江苏: 丝瓜筋; 福建: 蒾(福州), 黄瓜楼(邵武), 蒾瓜(诏安), 鼠瓜(泉州), 闽瓜(三明); 湖南: 干层楼; 广东: 紫瓜, 瓜络, 紫瓜瓢; 广西: 坭瓜, 丝瓜渣; 其他: 老丝瓜。

功效 果实的维管束(丝瓜络): 通络, 活血, 祛风。用于痹痛拘挛, 胸胁胀痛, 乳汁不通; 丝瓜叶: 止血, 清热解毒, 化痰止咳。用于百日咳, 咳嗽, 暑热口渴。外用于创伤出血, 疥癣, 天疱疮; 丝瓜子: 清热化痰, 润燥, 驱虫。用于咳嗽痰多, 蛔虫病, 便秘; 丝瓜藤: 通经活络, 止咳化痰。用于腰痛, 咳嗽, 鼻炎, 支气管炎; 丝瓜根: 清热解毒。用于鼻炎, 副鼻窦炎; 茎中汁(丝瓜水): 消炎火, 清内热。用于双单蛾, 肺痈, 肺痿; 果实(丝瓜): 清热, 化痰, 凉血, 解毒。用于热病身热烦渴, 痰喘咳嗽, 肠风痔漏, 崩带, 血淋, 疔疮, 乳汁不通, 痈肿; 果皮(丝瓜皮): 用于金疮, 疔疮, 坐板疮; 丝瓜花: 清热解毒。用于肺热咳嗽, 咽痛, 鼻窦炎, 疔疮, 痔疮; 丝瓜蒂: 用于小儿痘, 咽喉肿痛。

## 7103057

*Momordica charantia* L.

植物名 苦瓜《中国植志》

药材名 苦瓜《救荒本草》、《汇编》

文献名 锦荔枝、癞葡萄《救荒本草》, 红姑娘《群芳谱》

地方名 癞瓜(北京、四川); 河北: 穿肠草、尿瓜秧(天津); 浙江: 金荔枝(临安、平湖、余姚), 荔枝瓜(台州、黄岩), 红娘(临海); 福建: 红羊(泉州); 台湾: 防羊; 广东: 菩达、凉瓜, 筋瓜(广州); 广西: 苦瓜子; 四川: 癞瓜叶; 云南: 野苦瓜, “麻坏”(西双版纳傣语)。

功效 瓜、根、叶: 清热解毒。用于中暑发热, 牙痛, 肠炎, 痢疾, 便血。外用于瘰疬, 疔疮疖肿; 种子: 益气壮阳; 藤: 清肺止咳。用于肺热咳嗽。

## 7103058

*Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng. --- *M. macrophylla* Gage

植物名 木鳖子《中国植志》

药材名 木鳖子《开宝本草》、《药典》

文献名 木鳖《开宝本草》, 土木鳖《医宗金鉴》, 木别子、正木鳖《新纲》, 大叶木鳖子《云南种录》

地方名 方八、大方八(华东), [天花粉](湖北、广西、四川、贵州), 漏苓子(广西、四川), [瓜蒌皮](广西、贵州); 北京: 金丝木鳖; 浙江: 壳木鳖(杭州); 台湾: 天草, 林投菰, 狗屎瓜, 臭屎瓜; 广东: 水茄(南雄), 木别藤(高要、高鹤), 木鳖瓜; 海南: 乌鸡瓜(海口、乐东、定安、屯昌); 广西: 土木必(平南、陆川), 小瓜蒌(德保、靖西), 木必子(三江、贵县、岑溪), 木必藤(北流、博白), 鸭屎瓜, 鸭屎瓜子, 鸭鳖子, 漏兰子(南宁); 四川: 木别、藤桐(南充), 藤桐子; 贵州: 藤桐米; 云南: 糯饭果(河口), “麻锡嘎”(西双版纳傣语); 其他: 老鼠拉冬瓜。

功效 种子: 有毒。消肿散结, 攻毒疗疮。用于疮疡肿毒, 乳痈, 瘰疬, 痔漏, 干癣, 秃疮。

备考 有些植物学文献称本种为“番木鳖”, 实误。“番木鳖”即“马钱子”, 为马钱科植物 *Strychnos nux-vomica* L. 的种子, 两者切不可混淆。

## 7103059

*Momordica dioica* Roxb. ex Willd.

植物名 云南木鳖《中国植志》

药材名 云南木鳖根(拟)

文献名 雌雄异株苦瓜、山苦瓜、王瓜根《中草药》, 异株木鳖子《云南种录》

功效 干燥块根: 滋补强壮。用于抗阿米巴原虫, 毒蛇咬伤。

## 7103060

*Momordica subangulata* Blume --- *M. eberhardtii* Gagnep.

植物名 凹萼木鳖《中国植志》

药材名 凹萼木鳖根(拟)

文献名 埃贝苦瓜《广西药录》

地方名 广西: 野苦瓜(武鸣、凌云、南丹), 山苦瓜(上林), 山水瓜(邕宁)。

功效 根: 用于腮腺炎, 咽喉肿痛, 瘰疬, 结膜炎, 痢疮肿毒, 肿瘤。

## 7103061

*Mukia maderaspatana* (L.) M. J. Roern. --- *Melothria maderaspatana* (L.) Cogn.

植物名 帽儿瓜《中国植志》

药材名 吊金钟《台湾中药材图鉴》

文献名 毛花马腿儿《海南植志》, 野苦瓜《高植图鉴》

地方名 台湾: 金钟, 丝线吊铜钟; 广西: 野毛瓜(平果), 山苦瓜(藤县)。

功效 花: 解毒; 根: 镇痛。用于腹痛, 胃肠炎, 毒蛇咬伤。

## 7103062

*Schizopepon dioicus* Cogn. ex Oliv.

植物名 湖北裂瓜《中国植志》

药材名 湖北裂瓜《峨眉药植资源》

地方名 甘肃: 毛水瓜蔓(文县); 湖北: 毛瓜(神农架); 四川: 裂瓜(峨眉山)。

功效 根、茎: 清热解毒, 祛风除湿。

## 7103063

*Sechium edule* (Jacq.) Swartz

植物名 佛手瓜《中国植志》

药材名 佛手瓜《广西药录》

地方名 广西: 手瓜, 准人瓜; 云南: 洋丝瓜, 洋茄子。

功效 叶: 清热消肿。外用于疮疡肿毒; 果实: 健脾消食, 行气止痛。用于胃脘痛, 消化不良。

## 7103064

*Siraitia grosvenorii* (Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang --- *Thladiantha grosvenorii* (Swingle) C. Jeffrey

--- *Momordica grosvenorii* Swingle

植物名 罗汉果《中国植志》

药材名 罗汉果《岭南采药录》、《药典》

文献名 罗汗果《药材学》, 光果木鳖《高植图鉴》

地方名 广西: 拉汗果(南宁、苍梧), 假苦瓜(北流), [花粉](博白), [天花粉], [石蟾蜍](贺县、苍梧、贵县、博白), 宽筋藤(平南), 石金蟾, 毛罗汉, 响果, 汉果, [金不换](融水苗族), 野括楼(全州)。

功效 果实: 清热润肺, 滑肠通便。用于肺火燥咳、咽痛失音, 肠燥便秘; 块根: 用于腹泻, 脑膜炎后遗症; 叶: 用于慢性咽炎, 慢性支气管炎。

#### 7103065

*Siraitia siamensis* (Craib) C. Jeffrey ex Zhong et D. Fang

植物名 翅子罗汉果《中国植志》

地方名 广西: “凡力”(壮语), 红汞藤(那坡), 山鹤(天峨)。

功效 块根: 用于胃痛, 咽喉炎; 叶: 外用于神经性皮炎和皮癣。

#### 7103066

*Solena amplexicaulis* (Lam.) Gandhi --- *Solena heterophylla* Lour. --- *Zehneria umbellata* (Klein ex Willd.) Thw. --- *Melothria heterophylla* (Lour.) Cogn.

植物名 茅瓜《中国植志》

药材名 茅瓜《汇编》

文献名 土白藟《生草药性备要》, 异叶马瓟儿《中药志》

地方名 老鼠拉冬瓜(广西、云南), (天花粉)(福建、云南), (白藟)(福建、广西、广东), 老鼠瓜(江西、福建、广西), 杜瓜(福建、广西), 狗黄瓜(四川、云南); 福建: 上花粉(福清), 山瓜、山瓜仔(厦门); 海南: 山上老鼠拉冬瓜, 波瓜公; 广西: 老鼠偷冬瓜(南宁、梧州), 地苦胆(乐业), 一胎三子、猪笼茄(田东), 山天瓜; 四川: 牛奶子; 贵州: 小苦瓜、金丝瓜、耗子瓜(兴义); 云南: 天瓜(红河), [小木通](昆明), 小鸡黄瓜, 老鼠黄, 老鼠黄瓜, 老鼠黄瓜根, 老鼠香瓜, 解毒草, 野黄瓜, 狗屎瓜。

功效 块根、叶: 清热解毒, 消肿散结。用于咽喉肿痛, 结膜炎。外用于疮疡肿毒, 淋巴结结核, 睾丸炎, 皮肤湿疹。

#### 7103067

*Solena delavayi* (Cogn.) C. Y. Wu --- *Melothria delavayi* Cogn.

植物名 滇藏茅瓜《中国植志》

文献名 康滇马瓟儿《西昌中草药》

地方名 四川: 狗黄瓜(西昌)。

功效 块根、叶: 清热解毒, 消肿散结。

7103068 见 7103080a

7103069 见 7103081a

#### 7103070

*Thladiantha dentata* Cogn.

植物名 齿叶赤腿《中国植志》

地方名 四川: 猪儿瓜、龙须菜(南川)。

功效 果实: 滇东北混作瓜萎用。

#### 7103071

*Thladiantha dubia* Bunge

植物名 赤腿《中国植志》

药材名 赤腿《汇编》

文献名 莢《诗经》, 菟瓜《尔雅》, 王瓜、土瓜《本经》, 兔瓜《说文解字》, 老鸦瓜《图经》, 赤茄子《本草衍义》, 师姑草《上宿本草》, 马腿瓜、野甜瓜、公公须《纲目》, 钩藪《本草新注》, 菊苣妹《朝植乡名》, 气包子、屎包子《和汉药名汇》, 黄化乌瓜《诗草木今释》

地方名 气包、山屎瓜(东北), 赤包(东北、河北), 野小瓜(陕西、甘肃、宁夏); 河北: 赤包子, 赤雹儿; 内蒙古: 茄苞子; 陕西: 野丝瓜(凤县); 甘肃: 碎瓜, 酱瓜子。

功效 果: 理气, 活血, 祛痰, 利湿。用于跌打损伤, 暖气吐酸, 黄疸, 肠炎, 痢疾, 肺结核咯血; 块根: 通乳。用于乳汁不下, 乳房胀痛。

#### 7103072

*Thladiantha globicarpa* A. M. Lu et Z. Y. Zhang

植物名 球果赤腿《中国植志》

药材名 球果赤腿《广西药录》

功效 全草: 清热解毒。用于深部脓肿, 各种化脓性感染。

#### 7103073

*Thladiantha henryi* Hemsl.

植物名 皱果赤腿《中国植志》

药材名 皱果赤腿根(拟)

文献名 米来瓜《汇编》

地方名 湖北: [天花粉](五峰、巴东、利川、宜恩、罗田), [苦瓜], 苦瓜葵, 南葛, 癩瓜(神农架); 广西: 野西瓜。

功效 块根: 败火, 温补, 调气。

#### 7103074

*Thladiantha henryi* Hemsl. var. *verrucosa* (Cogn.) A.

M. Lu et Z. Y. Zhang --- *T. verrucosa* Cogn. ex Oliv.

植物名 喙赤腿《中国植志》

药材名 老蛇头《贵州药物》

功效 全草: 散热。用于头痛发热。

#### 7103075

*Thladiantha hookeri* C. B. Clarke

植物名 异叶赤腿《中国植志》

药材名 赤腿罗锅底(拟)

文献名 裂叶赤腿《中药志》, 土瓜赤腿《云南种录》, 曲莲《药植简编》, 粗茎罗锅底《汇编》

地方名 云南: [蛇莲], 罗锅底。

功效 块根: 有小毒。清热解毒, 健胃止痛。用于慢性支气管炎, 急性胃炎, 胆道、泌尿系感染, 颌下淋巴结炎, 扁桃体炎, 肺结核。

#### 7103076

*Thladiantha hookeri* C. B. Clarke var. *pentadactyla* (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang --- *T. hookeri* C. B.

Clarke var. *palmatifolia* Chakr. f. *quinquefoliata* Chakr.

植物名 五叶赤腿《中国植志》

药材名 五叶赤腿根(拟)

文献名 七叶赤腿《高植图鉴》

地方名 云南: 山土瓜, [天花粉], “查乌色”(峨山彝名)。

功效 块根:清热解毒,镇痛,消肿。用于胃炎,胃溃疡,痢疾,疔疮痈肿。

## 7103077

*Thladiantha longifolia* Cogn. ex Oliv.

植物名 长叶赤瓟《中国植志》

药材名 长叶赤瓟根(拟)

地方名 云南:小苦瓜(元江),“哈巴思和”(元江哈尼语)。

功效 块根、果实:宣痹通阳,温中定痛。用于胸痹心痛,胃寒腹痛。

## 7103078

*Thladiantha nigrapunctata* Kuang. aff.

植物名 盘石龟《江西药植名录》

药材名 盘石龟《汇编》

文献名 黑腺点赤瓟《江西药植名录》

地方名 江西:土山龟,石下龟,钻石龟。

功效 块根:用于急性肠胃炎,急性肠炎,急性细菌性痢疾。

## 7103079

*Thladiantha nudiflora* Hemsl. ex Forbes et Hemsl. --- *T. harmsii* Cogn.

植物名 南赤瓟《中国植志》

药材名 南赤瓟《湖南药物志》

文献名 秦岭赤瓟《广西药录》,裸花赤瓟《广西植录》

地方名 陕西:水瓜(文县);江苏:赤瓟儿;浙江:〔天花粉〕,乌瓜(云和),苦瓜萎(龙泉),麻皮栝楼(临安),野瓜萎(建德);湖南:地黄瓜,球子莲,野冬瓜;湖北:野丝瓜,老鸦枕、野黄瓜(神农架);广东:押树乱架;广西:〔栝楼〕(南宁);四川:丝瓜南,〔花粉〕(峨眉),瓜粉;贵州:老蛇头(遵义);西藏:王瓜;其他:毛苦瓜。

功效 叶:用于肠炎,菌痢;果实或鲜根:用于毒蛇咬伤。

## 7103080

*Thladiantha oliveri* Cogn. ex Mottet

植物名 鄂赤瓟《中国植志》

药材名 光赤瓟《高植图鉴》

地方名 陕西:苦瓜蔓(佛坪),野黄瓜(蓝田);甘肃:水葡萄;湖南:“里囡归”(蓝山县瑶名);湖北:野瓜(恩施),清由胆(神农架);四川:野苦瓜藤,王瓜根(峨眉山)。

功效 根:清热解毒,消肿止痛。用于深部脓肿。

## 7103080a

*Thladiantha sessilifolia* Hand. -Mazz.

植物名 短柄赤瓟《中国植志》

药材名 短柄赤瓟根(拟)

文献名 无柄赤瓟《西昌中草药》

地方名 四川:土瓜萎,猫儿瓜(西昌),野黄瓜。

功效 块根:清热解表,生津止渴,祛痰散结。用于疔痢,肿毒,头目昏眩,热病伤津,小便热痛。

## 7103081

*Thladiantha setispina* A. M. Lu et Z. Y. Zhang

植物名 西藏赤瓟《西藏植志》

地方名 西藏:波棱瓜,王瓜。

功效 果:清热解毒,柔肝。用于黄疽性传染性肝炎。

## 7103081a

*Thladiantha villosula* Cogn.

植物名 长毛赤瓟《中国植志》

药材名 长毛赤瓟根(拟)

文献名 七余瓜、倒挂土余瓜《滇南本草》,柔毛赤瓟《云南种录》,山墩《云南药录》

地方名 湖北:〔瓜楼根〕、灯瓜芦果、甜苦瓜(鹤峰),苦瓜萎,毛瓟瓜(神农架);四川:〔蛇莲〕;云南:“火楠南”(傣语),罗锅底(思茅);其他:〔青牛胆〕。

功效 块根:有小毒。清热解毒,健胃止痛。用于菌痢,肠炎,胃及十二指肠溃疡,上呼吸道感染。

## 7103082

*Trichosanthes anguina* L.

植物名 蛇瓜《中国植志》

文献名 蛇豆《中国植志》

地方名 云南:豆角黄瓜。

功效 果实:用于消渴,黄疸;根、种子:止泻,杀虫;果瓢:泻下驱虫。

## 7103083

*Trichosanthes baviensis* Gagnep.

植物名 短序栝楼《中国植志》

药材名 短序瓜萎(拟)

地方名 云南:瓜萎子。

功效 种子:云南曾做瓜萎子入药。

## 7103084

*Trichosanthes cucumerina* L.

植物名 瓜叶栝楼《中国植志》

功效 印度药用。根:用于头痛,气管炎;果:用于胃病,消渴,气喘;种子:解热,杀虫。

## 7103085

*Trichosanthes cucumeroides* (Ser.) Maxim. --- *T. cavaleriei* Levl. - *T. cucumeroides* (Ser.) Maxim. var. *formosana* (Hayata) Kitamura

植物名 王瓜《中国植志》

药材名 王瓜《本经》、《中药大辞典》

文献名 钩藤姑、钩藟、黄菟瓜(《尔雅》郭璞注),蒹、王蒹(《说文》),土瓜《本经》,土瓜根《金匱要略》,王瓜子《药性论》,老鸦瓜《图经》,野甜瓜、马雹儿《丹溪心法纂要》,马剥儿《医学入门》,马瓟瓜、公公须《纲目》,马雹儿子《濒湖集简方》,土瓜仁《本草汇言》,王章、钩藟、马瓟子、新罗葛、黄、师古草《新纲》,王瓜根《和汉药植》,长猫瓜《中药志》,预知子《中国中药杂志》

地方名 山苦瓜(湖南、广东),杜瓜(江苏、福建),〔天花粉〕(浙江、四川),假栝楼(浙江、广西),苦瓜莲(江西、湖南),〔栝楼仁〕(江苏、浙江),〔栝萎〕(上海、江苏、浙江等);浙江:吊瓜,王瓜皮,王瓜仁,乌瓜,苦瓜;江西:小苦兜,毛冬瓜(吉安),黄乌瓜(婺源),七丝瓜;福建:鸽蛋瓜,山冬瓜,水瓜,七花粉;湖南:木瓜楼,老

鼠瓜,大瓜楼菜,羊果,瓜楼,节瓜,山木迪,江瓜,牛皮菜;广东:野苦瓜,假苦瓜,马溜瓜;广西:山黄瓜,土木瓜(贺县),山丝瓜藤,鸭屎瓜(上林),野黄瓜(全州);四川:上瓜子,王瓜壳;贵州:堵拉,耗子枕头。

**功效** 根:有小毒。清热解毒,利尿消肿,散瘀止痛。用于毒蛇咬伤,急性扁桃体炎,咽喉炎,痈疮肿毒,跌打损伤,小便不利,胃痛;种子:清热凉血。用于肺痿吐血,黄疸,痢疾,肠风下血;果实:清热,生津,消痰,通乳。用于消渴,黄疸,噎膈反胃,经闭,乳汁滞少,痈肿,慢性咽喉炎。

## 7103086

*Trichosanthes cucumeroides* (Ser.) Maxim. var. *dicoelosperma* (C. B. Clarke) S. K. Chen --- *T. ascendens* C. Y. Cheng et Yueh

植物名 波叶栝楼《中国植志》

文献名 翅子栝楼《植分学报》

**功效** 果实:在广西入药。根在广西为天花粉之混淆品。

## 7103087

*Trichosanthes dunniana* Levl. --- *T. rubriflos* f. *macrospema* C. Y. Cheng et Yueh --- *T. tridentata* C. Y. Cheng et Yueh

植物名 糙子栝楼《中国植志》

文献名 绿子栝楼、大子红花栝楼《植分学报》,红花栝楼《广西药录》

**功效** 种子:产地(云南)做瓜蒌子入药。

**备考** 瓜蒌子(云南)。

## 7103088

*Trichosanthes fissibracteata* C. Y. Wu ex C. Y. Cheng et Yueh

植物名 裂苞栝楼《中国植志》

文献名 长方子栝楼《植分学报》

**功效** 种子:云南部分地区做瓜蒌子入药。

## 7103089

*Trichosanthes homophylla* Hayata --- *T. mushaensis* Hayata

植物名 芋叶栝楼《中国植志》

药材名 毛果瓜蒌(拟)

文献名 全叶栝楼、毛果栝楼《植分学报》

地方名 天花粉(广东、广西、台湾)。

**功效** 根:产地作天花粉入药。

## 7103090

*Trichosanthes hylonoma* Hand. -Mazz. --- *T. leishanensis* C. Y. Cheng et Yueh

植物名 湘桂栝楼《中国植志》

文献名 雷山栝楼、圆子栝楼、《植分学报》

地方名 天花粉、瓜蒌(湖北、广西)。

**功效** 块根、果实:作天花粉及瓜蒌入药。

## 7103091

*Trichosanthes jinggangshanica* Yueh

植物名 井冈栝楼《中国植志》

文献名 井冈山栝楼《植分学报》

**功效** 根、果实:做天花粉和瓜蒌入药。

## 7103092

*Trichosanthes kerrii* Craib

植物名 长果栝楼《中国植志》

**功效** 种子:云南部分地区曾作栝楼子入药;果实:广西部分地区用作止咳和治癣。

## 7103093

*Trichosanthes kirilowii* Maxim. --- *T. obtusiloba* C. Y. Wu ex C. Y. Cheng et Yueh

植物名 栝楼《吴普本草》、《中国植志》

药材名 天花粉《雷公炮炙论》、《药典》,瓜蒌《针灸甲乙经》、《药典》,瓜蒌皮、瓜蒌子《药典》

文献名 果臝《诗经》,栝楼根、地楼《本经》,泽巨、泽姑《吴普本草》,王白《广雅》,天瓜《尔雅》郭璞注,黄瓜《别录》,栝楼皮、蒌根《雷公炮炙论》,栝楼子《本草经集注》,白药《根》《图经》,瓜蒌仁《丹溪心法》,瑞雪《根》《纲目》,天圆子《果》《东医宝鉴》,栝楼仁《药性类明》,柿瓜《医林纂要》,花粉《根》《增订伪药条辨》,天棘《新纲》,蒌仁《满州植录》,半仁《和汉药标本目录》,天瓜粉《根》《重庆堂随笔》,栝楼壳《形色鉴别》,栝楼粉、蒌粉《药材学》,钝裂栝楼《植分学报》,全瓜蒌、瓜蒌根、瓜蒌实、蒌实、黄熟瓜蒌、黄肥瓜蒌、蒌皮、瓜蒌壳、瓜蒌霜、瓜蒌仁霜、蒌仁霜、栝楼瓢《常用中药名辨》

地方名 野西瓜(浙江、安徽、江西、湖南),野苦瓜(湖南、四川、贵州),野西瓜皮、狗屎瓜(华东),野屎瓜(福建、广东),大瓜(上海、湖南),大肚瓜(浙江、四川),杜瓜(上海、江苏、浙江、四川),药瓜(江苏、上海、浙江、安徽、四川),金瓜蒌、酱瓜子、死瓜子(西北),瓜蒌根(江西、四川),瓜楼(河北、山西、山东、江苏、浙江、河南);辽宁:生牛蛋子(旅顺、大连);山西:油瓜蒌,天仙;山东:大圆瓜,悬铃(滕县),天花粉蔓(荣成),臭瓜蒌,山瓜蒌根,生牛蛋,臭瓜蛋(烟台),子瓜蒌、仁瓜蒌(肥城、长清、淄博);江苏:瓜蒌藤(南云台山),土瓜(泰县),药瓜皮(苏州),苦瓜蒌;浙江:黄栝楼(龙泉),老鸦瓜(温州),大吊瓜,野吊瓜,狗粪瓜,野弥瓜;安徽:秤锤;江西:药葫芦(彭泽),吊瓜络(婺源),野麻瓜(景德镇),尿冬瓜(莲花);福建:山金匏(闽东),鸭蛋瓜,山乱籽(清流),黄瓜蒌(宁化);河南:栝楼蛋根,安阳花粉;湖南:木瓜楼,牛皮菜,半边红,老鼠瓜,屎瓜楼,黄葫芦,野瓜蒌菜,温把陀,苦菜,冬股子,东股子;广东:苗瓜;广西:小栝楼(德保、龙胜);四川:屎瓜根,瓜米,瓜壳,甜瓜壳,二花粉(广元);贵州:瓜老壳;云南:老鼠拉冬瓜(文山),金丝莲(昆明);其他:吕瓜根,花苦瓜,糖瓜蒌,锦地罗。

**功效** 根(天花粉):清热生津,消肿排脓。用于热病烦渴,肺热燥咳,内热消渴,疮疡肿毒;果实(瓜蒌):清热涤痰,宽胸散结,润燥滑肠。用于肺热咳嗽,痰浊黄稠,胸痹心痛,结胸痞满,乳痈,肠痈肿痛,大便秘结;种子(瓜蒌子):润肺化痰,滑肠通便;果皮(瓜蒌皮):清化热痰,利气宽胸。用于痰热咳嗽,胸闷胁痛;茎叶:用于中热伤暑。外用于疮痍脓肿。

**备考** 1. “天花粉”一名,据《重庆堂随笔》记载:

“栝楼实一名天瓜,故其根名天瓜粉,后世讹瓜为花,相传已久,不可改矣。”2. 在江、浙药店处方写瓜蒌子给正品瓜蒌子,写栝楼子或栝蒌子则给王瓜子。

## 7103094

*Trichosanthes lacerbractea* Hayata --- *T. schizostroma* Hayata --- *T. sinopunctata* C. Y. Cheng et Yueh --- *T. hupehensis* C. Y. Cheng et Yueh

植物名 长萼栝楼《中国植志》

文献名 花叶栝楼《药学报》,湖北栝楼《植分学报》,苦花粉《中药志》,裂苞栝楼《广西药录》

地方名 广西:瓜蒌(全州)。

功效 印度入药。果实:用于气喘,耳痛;根:用于疮痈,头痛。

备考 在我国,根为天花粉之混淆品。在广东、广西、湖北、湖南、江西等部分地区误用本品的种子及果皮混作瓜蒌子、瓜蒌皮入药。

## 7103095

*Trichosanthes lepiniana* (Naud.) Cogn.

植物名 马干铃栝楼《中国植志》

地方名 云南:马干铃;广西:野屎瓜(平南)。

备考 根为天花粉之混淆品;种子在广西、云南被误用作瓜蒌子入药。

## 7103096

*Trichosanthes ovata* Cogn.

植物名 卵叶栝楼《中国植志》

功效 种子:在云南作瓜蒌子入药。

## 7103097

*Trichosanthes ovigera* Blume --- *T. himalensis* C. B. Clarke --- *T. rostrata* Kitamura --- *T. chingiana* Hand.-Mazz.

植物名 全缘栝楼《中国植志》

药材名 实葫芦(云南)、《汇编》

文献名 喜马拉雅瓜蒌《汇编》,喜马拉雅栝楼、喙果栝楼、广西栝楼《植分学报》,野王瓜《拉汉种称补编》

地方名 广西:“意敬”(瑶语),野金瓜、天花公、野黄瓜(天等、全州),野屎瓜(容县、贺县、岑溪);云南:实栝楼,佛顶珠。

功效 根:祛瘀,解毒。用于跌打损伤,疮疖肿毒,睾丸炎;种子、果实:广西部分地区作瓜蒌子及瓜蒌皮入药。

备考 根在广西偶有混作天花粉用。

## 7103098

*Trichosanthes pedata* Merr. et Chun --- *T. pedata* Merr. et Chun var. *yunnanensis* C. Y. Cheng et Yueh

植物名 趾叶栝楼《中国植志》

文献名 天花粉、栝楼《植物名汇》,云南趾叶栝楼《植分学报》,叉指叶栝楼《海南植志》

地方名 广西:石铃蟾(平南),土花粉,山苦瓜,石蟾蜍,野屎瓜(岑溪);四川:假瓜蒌(南川);云南:乌足栝楼。

功效 块根:清凉败毒。用于咽喉肿痛,疮疖。偶有混作天花粉用;果实:产地做瓜蒌皮入药。

## 7103099

*Trichosanthes quinquangulata* A. Gray

植物名 五角栝楼《中国植志》

文献名 五角叶栝楼《植分学报》

功效 种子:在产地(云南)曾做栝楼子入药。

## 7103100

*Trichosanthes rosthornii* Harms --- *T. uniflora* Hao --- *T. crenulata* C. Y. Cheng et Yueh --- *T. guizhouensis* C. Y. Cheng et Yueh --- *T. stylopodifera* C. Y. Cheng et Yueh

植物名 中华栝楼《中国植志》

药材名 瓜蒌、瓜蒌皮《药典》,双边瓜蒌子(拟),天花粉《中药志》

文献名 白药子《和汉药标本目录》,华中栝楼《高植图鉴》,双边栝楼、川贵瓜蒌、贵州栝楼、尖果栝楼《植分学报》,瓜蒌子《药典》

地方名 栝楼(四川、云南);湖北:屎瓜六、苦瓜蒌(神农架);广西:栝楼根;四川:天瓜、双边子(峨眉山),川花粉;云南:栝楼仁;其他:花苦瓜。

功效 根及粉(天花粉):清热生津,消肿排脓。用于热病烦渴,肺热燥咳。内热消渴,疮疡肿毒;果实(瓜蒌):清热涤痰,宽胸散结,润燥滑肠。用于肺热咳嗽,痰浊黄稠,胸痹心痛,结胸痞满,乳痈,肠痈肿痛,大便秘结;种子(瓜蒌子):润肺化痰,滑肠通便;果皮(瓜蒌皮):清化热痰,利气宽胸。用于痰热咳嗽,胸闷肋痛。

## 7103101

*Trichosanthes rosthornii* Harms var. *multicirrata* (C. Y. Cheng et Yueh) S. K. Chen --- *T. multicirrata* C. Y. Cheng et Yueh --- *T. damiaoshanensis* C. Y. Cheng et Yueh

植物名 多卷须栝楼《中国植志》

文献名 南方栝楼、南方栝楼根《药学报》

地方名 天花粉(福建、广东、广西)。

功效 根(天花粉):生津止渴,排脓消肿,引产;果实(瓜蒌):宽胸散结,清化热痰,润肺,滑肠。

## 7103102

*Trichosanthes rosthornii* Harms var. *scabrella* (Yueh et D. F. Gao) S. K. Chen --- *T. scabrella* Yueh et D. F. Gao

植物名 糙籽栝楼《中国植志》

功效 果实:产地做瓜蒌皮入药。

## 7103103

*Trichosanthes rubriflos* Thorel ex Cayla

植物名 红花栝楼《中国植志》

文献名 老鸦干林果《疟疾防治中草药选》

功效 根:有毒。清热,解毒,催吐,截疟。

备考 根:为天花粉的混淆品。果皮:贵州、云南等省误作瓜蒌皮入药。种子:在广西、贵州、云南的部分产地曾误作瓜蒌子用。

## 7103104

*Trichosanthes rugatisemina* C. Y. Cheng et Yueh

植物名 皱子栝楼《中国植志》

功效 种子:产地(云南潞西)做瓜蒌子入药。

备考 根为天花粉之混淆品。

## 7103105

*Trichosanthes sericeifolia* C. Y. Cheng et Yueh

植物名 丝毛栝楼《中国植志》

地方名 贵州:天花粉。

功效 根:在产地(贵州)曾做天花粉入药。

#### 7103106

*Trichosanthes smilacifolia* C. Y. Wu ex C. H. Yueh et C. Y. Cheng

植物名 菝葜叶栝楼《中国植志》

地方名 云南:瓜蒌子。

功效 种子:产地(云南)曾做瓜蒌子入药。

#### 7103107

*Trichosanthes subrosea* C. Y. Cheng et Yueh

植物名 粉花栝楼《中国植志》

地方名 广西:天花粉;云南:瓜蒌。

功效 根:在广西作天花粉用;果实:产地做瓜蒌入药。

#### 7103108

*Trichosanthes tricuspidata* Lour. --- *T. palmata* Roxb. --- *T. bracteata* (Lam.) Voigt

植物名 三尖栝楼《中国植志》

文献名 兴元府白药《大观本草》,白药脂、掌叶瓜蒌《药材学》,大苞栝楼《海南植志》

地方名 [瓜蒌子](云南、贵州、广东、广西);云南:老鸦干林果,栝楼,具苞栝楼。

功效 根:用于肿毒,喉痹,咳嗽,吐血。

备考 其根偶有混作天花粉用。其种子在云南、贵州等,曾混作瓜蒌子调拨至华东及东北等地。

#### 7103109

*Trichosanthes truncata* C. B. Clarke

植物名 截叶栝楼《中国植志》

药材名 大子瓜蒌子(拟)

文献名 广西大菱仁《鉴别手册》,大菱仁《药植简编》,大子栝楼《植分学报》

地方名 广西:大瓜蒌,大瓜蒌子。

功效 根作天花粉入药;果皮在广西少量用作瓜蒌入药;种子:在广西作瓜蒌子入药。

#### 7103110

*Trichosanthes villosa* Blume

植物名 密毛栝楼《中国植志》

备考 根为天花粉之混淆品,种子在广西、云南曾混做瓜蒌子用。

#### 7103111

*Trichosanthes wallichiana* (Ser.) Wight

植物名 薄叶栝楼《中国植志》

文献名 全缘萼瓜蒌《云南种录》

功效 果实:云南曾做瓜蒌入药。

#### 7103112

*Zehneria indica* (Lour.) Keraudren --- *Melothria leucocarpa* (Blume) Cong. --- *M. indica* Lour.

植物名 马蔺儿《中国植志》

药材名 马蔺儿《救荒本草》、《中药大辞典》

文献名 老鼠胆冬瓜、土白蔹《生草药性备要》,野苦

瓜、扣子草《名实图考》,马交儿《汇编》

地方名 老鼠拉冬瓜(浙江、广东、海南、四川), (天花粉)(浙江、福建);浙江:野西瓜(云和),野梢瓜;福建:山鸡仔、七星坠地(泉州),土花粉,白蔹,杜瓜(福安);广东:毛瓜蔴(湛江),老鼠拉金瓜,拉屎冬瓜(广州),蛇苦瓜(潮安);海南:菠瓜茨;广西:小老鼠瓜(阳朔),山熊胆、金丝瓜(南宁),老鼠瓜(钟山、陆川、昭平、阳朔),山冬瓜(藤县);四川:小丝瓜;云南:天瓜,老鼠黄瓜,狗黄瓜,银丝莲,野黄瓜。

功效 根、叶或全草:清热解毒,消肿散结。用于咽喉肿痛,结膜炎。外用:于疮疡肿毒,淋巴结核,睾丸炎,皮肤湿疹。

备考 福建个别地区有以块根充天花粉和白蔹使用。

#### 7103113

*Zehneria maysorensis* (Wight et Arn.) Arn. --- *Melothria maysorensis* (Wight et Arn.) Chang

植物名 钮子瓜《中国植志》

药材名 钮子瓜《湖南药物志》

地方名 湖南:土瓜,老鼠拉冬瓜,野黄瓜;广西:野杜瓜,野苦瓜(富川),三角枫(融安)。

功效 根、全草:清热,镇痉。用于小儿高烧,小儿高烧抽筋;全草:消肿散瘀。用于痢疮肿毒。

### 7104 秋海棠科 Begoniaceae

#### 7104001

*Begonia acetosella* Craib

植物名 无翅秋海棠《高植图鉴补编》

文献名 红小姐《名实图考》,酸味秋海棠、黄垣草《云南种录》

地方名 云南:野海棠、红叶子、(紫背天葵)、散血子、红双通、红酸杆、夜变红、丹叶(红河),无翅果秋海棠。

功效 根:清热止咳,散瘀消肿。用于慢性支气管炎,肺热咳嗽,外感高热,扁桃腺炎,百日咳,痢疮红肿,无名肿毒,跌打损伤。

#### 7104002

*Begonia aptera* Blume

植物名 圆果秋海棠《台湾药植志》

地方名 台湾:洋桃草;广东:黄垣草、石上半边莲(新丰),大叶半边莲(清远)。

功效 叶:外用于毒蛇咬伤。

#### 7104003

*Begonia augustinei* Hemsl.

植物名 歪叶秋海棠《高植图鉴》

文献名 思茅秋海棠《云南种录》

功效 全草:用于蛇伤。

#### 7104004

*Begonia bretschnideriana* Hemsl.

植物名 石上秋海棠(拟)

药材名 石上莲(广西来宾)、《汇编》

文献名 伯乐秋海棠《广西药志》



地方名 广西:小一口血,石上海棠。

功效 全草:清热除湿,利水软坚,消肿止痛。用于肝硬化,腹水,暑热口渴,跌打肿痛,疔疮肿毒。

#### 7104005

*Begonia calophylla* Trmsch.

植物名 美丽秋海棠《高植图鉴》

药材名 美丽秋海棠《四川中药志》

文献名 裂叶秋海棠、虎爪龙《高植图鉴》

地方名 江西:水八角,水蜈蚣。

功效 根茎、全草:用于跌打损伤,浮肿,蛇伤。

#### 7104006

*Begonia cathayana* Hemsl.

植物名 花叶秋海棠《高植图鉴》

药材名 花叶秋海棠《汇编》

文献名 中华秋海棠《云南种录》,野海棠《云南中草药》

地方名 广西:花叶一口血;云南:红叶子、紫背天葵、散血子、红双通、红酸杆、夜变红、丹叶(红河),花酸苔、苦酸苔、公鸡酸苔(思茅);其他:山海棠。

功效 全草:清热解毒,活血祛瘀。用于火烫伤,痈疮疔肿,跌打瘀痛。

#### 7104007

*Begonia cavaleriei* Levl.

植物名 盾叶秋海棠《高植图鉴》

药材名 爬山猴《贵州民间药物》

文献名 昌感秋海棠《海南植志》

地方名 贵州:红孩儿,爬地龙,爬岩龙,岩蜈蚣,野海棠。

功效 全草、根茎:通经,舒筋活血。用于跌打损伤,消伤肿,逐瘀血。

#### 7104008

*Begonia circumlobata* Hance

植物名 周裂秋海棠《高植图鉴补编》

文献名 野海棠《广西药园药录》

地方名 广西:水天葵(陆川);贵州:水八角莲,蜈蚣七,红八角莲;云南:石酸苔、酸汤杆(屏边),大麻酸汤杆,一口血。

功效 根:用于月经不调,痛经,跌打损伤。外用用于跌打红肿,痈疮,水、火烫伤。

#### 7104009

*Begonia crassirostris* Irmsch.

植物名 粗喙秋海棠《高植图鉴》

药材名 红半边莲《广西药录》

文献名 黄道草《药植简编》

地方名 大半边莲(广东、广西);广东:鬼边榜;广西:半边风(龙州),〔半边莲〕(贺县、苍梧、藤县、梧州),大叶半边莲(龙州、平果),山蚂蝗(柳江),红莲(贵县),肉半边莲。

功效 根茎、全草:清热解毒,消肿止痛。用于咽喉炎,牙痛,淋巴结结核,毒蛇咬伤。外用用于烧、烫伤。

#### 7104010

*Begonia digyna* Irmsch.

植物名 瓣叶秋海棠《高植图鉴》

药材名 红八角莲(贵州惠水)、《药植简编》

地方名 贵州:血丝金盘(绥阳),猫爪莲(榕江),鸭脚莲(剑河),满沟红(德江)。

功效 根茎:小毒。用于劳伤咳嗽,周身疼痛,腹泻吐血,胃气痛,饱胀,蛇咬伤

#### 7104011

*Begonia edulis* Levl.

植物名 葡萄叶秋海棠《高植图鉴》

功效 全草:用于蛇咬伤,疮疖,便血。

#### 7104012

*Begonia evansiana* Andr.

植物名 秋海棠《群芳谱》、《高植图鉴》

药材名 秋海棠《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 八月春、断肠花、春海棠《群芳谱》,相思草《漳州府志》,断肠草《大观录》,无名断肠花、无名断肠草《纲目拾遗》,八月喜《花镜》,一口血《分类草药性》

地方名 岩丸子(陕西、湖南);甘肃:女儿红;陕西:红白二丸,大红袍;浙江:绿叶红背(鄞县),红岩芋(文成),山海棠(临安);安徽:海棠花;江西:红节草、耙萝草;湖北:红白二元、鸳鸯七(神农架);湖南:乔子莲、阴阳子;广西:大叶半边莲(上林),大破血子(全州);贵州:金线吊葫芦。

功效 块茎、果:凉血止血,散瘀,调经。用于吐血,衄血,咳血,崩漏,白带,月经不调,痢疾,跌打损伤。

#### 7104013

*Begonia fimbriatipulata* Hance---*Begonia cyclophylla* Hook. f.

植物名 天葵秋海棠《汇编》

药材名 红天葵(广西)、《品种论述》

文献名 圆叶秋海棠《药植简编》

地方名 〔紫背天葵〕(湖南、广东、海南、广西、云南);湖南:散血丹,一点血;广东:(虎耳草)(惠阳);广西:红叶,红水葵(上思、龙胜),散血子(临桂),龙虎叶(德保),小英雄(桂平),天葵。

功效 块茎和全草:清热凉血,止咳化痰,散瘀消肿。用于中暑发烧,肺热咳嗽,咯血,淋巴结结核,血瘀腹痛。外用用于扭挫伤,骨折,烧、烫伤。

#### 7104014

*Begonia handelii* Irmsch.

植物名 短茎秋海棠《高植图鉴补编》

文献名 异株秋海棠《云南种录》

地方名 广西:铁米(那坡),倒角莲。

功效 全草:清热解毒,散瘀消肿,消滞健胃,散瘀消肿。用于咽喉肿痛,食滞,跌打肿痛。

#### 7104015

*Begonia henryi* Hemsl.

植物名 柔毛秋海棠《高植图鉴》

药材名 岩丸子(湖北)、《汇编》

文献名 独牛《名实图考》

地方名 湖北:一点血,阴阳七,红黑二丸;贵州:石鼓子;云南:红白二丸、活血(红河),酸杆杆,岩酸(维

西),“谷查那雌”(元江哈尼语)。

功效 块茎:解毒,散瘀,止血。用于跌打损伤,狂犬咬伤,红崩白带。外用于骨折。

#### 7104016

*Begonia labordei* Levl.

植物名 心叶秋海棠《高植图鉴》

文献名 丽江秋海棠《云南种录》

地方名 贵州:一口血;云南:红盘(龙陵、瑞丽),大岩酸(保山区)。

功效 根:用于支气管炎,哮喘,肺心病引起的浮肿。

#### 7104017

*Begonia leprosa* Hance

植物名 团扇叶秋海棠《高植图鉴》

地方名 广西:老虎耳(罗城)。

功效 全草:用于疮疖,蛇咬伤。

#### 7104018

*Begonia limprichtii* Irmisch.

植物名 蕺叶秋海棠《高植图鉴》

药材名 血染草(四川峨眉)

地方名 四川:血染叶(峨眉山),一点血,大散血草,小散血草;贵州:七星花。

功效 根茎:活血生血,清热解毒。

#### 7104019

*Begonia maculata* Raddi

植物名 竹节秋海棠《高植图鉴》

地方名 广西:斑叶竹节秋海棠,马面海棠,〔半边莲〕(金秀),银星海棠。

功效 全草:消肿止血。用于跌打肿痛,痈肿烂疮,咽喉肿痛,半身麻痹,小便不利,水肿,毒蛇咬伤。

#### 7104020

*Begonia membranifera* Chun et F. Chun

植物名 天葵海棠《广西药录》

药材名 红水葵《中药大辞典》

地方名 广西:〔紫背天葵〕。

功效 全草:清热润肺,活血调经。

#### 7104021

*Begonia nymphaeaeifolia* Yu

植物名 莲叶秋海棠《云南种录》

文献名 睡莲叶秋海棠《广西药录》

地方名 广西:过江龙、地蜈蚣(南丹),酸叶(那坡),接骨消(罗城)。

功效 全株:消炎,消肿,活血,止血,接骨。

#### 7104022

*Begonia palmata* D. Don --- *B. laciniata* Roxb.

植物名 裂叶秋海棠《高植图鉴》

药材名 裂叶秋海棠《汇编》

文献名 红孩儿、红海儿《名实图考》

地方名 湖南:血蜈蚣(永顺),水蜈蚣(古丈),蜈蚣七(麻阳、凤凰),乌七(溆浦);广西:半边风、石莲(容县),〔半边莲〕(平南、贺县、钟山、大瑶山、南丹),红天葵(平南、陆川),红莲(博白),石红莲(贵县),虎斑海棠

(那坡),九齿莲(天等),六角莲,红半边莲,八多酸(隆林);四川:一口血(峨眉山);贵州:红八角莲;云南:岩红。

功效 全草:清热解毒,化瘀消肿。用于感冒,急性支气管炎,风湿性关节炎,跌打内伤瘀血,闭经,肝脾肿大。外用于毒蛇咬伤,跌打肿痛。

#### 7104023

*Begonia pedatifida* Levl.

植物名 掌裂叶秋海棠《高植图鉴》

药材名 水八角《分类草药性》、《中药大辞典》

文献名 掌裂秋海棠《汇编》,裂叶秋海棠《江西草药》

地方名 〔水蜈蚣〕(江西、四川),蜈蚣七(湖北、贵州);江西:虎爪龙(吉水),〔水黄连〕(婺源),风吹不动(景德镇);湖北:红骨参(神农架);四川:花公鸡,一口血,枫香细辛,酸猴儿(巫溪),〔红毛七〕,红白二九(万县);贵州:爬岩龙,自来红,水八角莲,红八角莲。

功效 根茎:散瘀,止血,消肿,止痛。用于吐血,子宫出血,胃痛,风湿性关节炎,跌打损伤肿痛,毒蛇咬伤。

#### 7104024

*Begonia rex* Putz.

植物名 毛叶秋海棠《高植图鉴补编》

文献名 紫叶秋海棠《广西药园药录》

功效 全草:拔毒消肿,清肺热。

#### 7104025

*Begonia semperflorens* Link et Otto

植物名 四季海棠《高植图鉴》

文献名 蜆肉秋海棠《海南植志》。

功效 花、叶:清凉散毒。外用于疮疖。

#### 7104026

*Begonia sikkimensis* A. DC.

植物名 锡金秋海棠《高植图鉴补编》

药材名 水天葵《广西陆川》

地方名 广西:〔八角莲〕(平南),一口血(南丹)。

功效 全株:消肿,拔毒。用于五劳七伤,产后流血不止,蛇咬伤。

#### 7104027

*Begonia sinensis* A. DC.

植物名 中华秋海棠《高植图鉴》

药材名 红白二九(湖北)、《汇编》

文献名 珠芽秋海棠《云南种录》

地方名 岩丸子(陕西、湖北);陕西:一口血;湖北:老背少,鸳鸯子,鸳鸯七,红黑二九、阴阳七、一点血(神农架)。

功效 根茎、全草:活血调经,止血止痢。用于月经不调,赤白带下,痢疾,吐血,衄血,跌打损伤出血。

#### 7104028

*Begonia smithiana* Yu

植物名 长柄秋海棠《高植图鉴补编》

药材名 长柄秋海棠《贵州药录》

地方名 贵州:红八角莲。

功效 根茎:清热,止痛,止血。用于跌打损伤,筋骨疼痛,血崩,毒蛇咬伤。

## 7104029

*Begonia taiwaniana* Hayata

植物名 台湾秋海棠《高植图鉴》

文献名 青叶秋海棠《广西《园林药录》》

地方名 广西:青叶半边莲。

功效 全草:清热解毒。用于麻疯,肝硬化。

## 7104030

*Begonia wangii* Yu

植物名 少瓣秋海棠《高植图鉴补编》

药材名 爬山猴《贵州》、《药植简编》

文献名 富宁秋海棠《云南种录》

地方名 贵州:野海棠(都匀),岩蜈蚣(惠水),爬岩龙(剑河、贵阳)。

功效 根茎:用于跌打损伤,虚肿,肺结核。

## 7104031

*Begonia wilsonii* Gagnep.

植物名 一点血秋海棠《中草药学》

药材名 一点血《四川中药志》

文献名 网脉秋海棠《汇编》,威氏秋海棠《四川中药志》,红砖草《全展选编·妇产科》

地方名 四川:石鼓子(西昌),一口血(峨眉山)。

功效 根茎:补气健脾,养血,止血。用于病后虚弱,咳嗽咯血,功能性子宫出血,白带。

## 7104032

*Begonia yunnanensis* Levl.

植物名 云南秋海棠《高植图鉴》

地方名 四川:酸猴儿,酸汤果,疝气草,一面锣;云南:水八角、金蝉脱壳、红耗儿(昭通),酸草果(丽江),酸苹果,腰包花、化血丹(曲靖),一口血、滇秋海棠(文山),小桃红,血当归,老母猪菜,山海棠,大麻酸汤杆,野海棠,白棉胡,老鸡枕头。

功效 全草、果实:行气止痛,活血祛瘀。用于胃痛,月经不调,痛经,小儿吐泻,疝气,跌打损伤。

## 7106 番木瓜科 Caricaceae

## 7106001

*Carica papaya* L.

植物名 番木瓜《高植图鉴》

药材名 番木瓜《汇编》

文献名 石瓜《纲目》,万寿果《肇庆府志》,蓬生果、乳瓜《岭南杂记》,番瓜《名实图考》,冬瓜树《罗江县志》,番木瓜叶《树分》,番瓜树《台湾药植志》,缅甸瓜《云南种录》

地方名 〔木瓜〕(台湾、广东、广西、云南);福建:土木瓜(福州),万寿鲍、奶鲍(龙溪、晋江);台湾:番仔木瓜;广西:木冬瓜(陆川),木瓜公(北流);云南:缅甸瓜,树瓜(文山),角旗,麻山坡,“麻贵沙宝”、“马昌坡”(傣语),大树木瓜。

功效 果实:消食健胃,滋补催乳,舒筋通络。用于脾胃虚弱,食欲不振,乳汁缺少,风湿关节疼痛,肢体

麻木,胃、十二指肠溃疡疼痛;叶:外用于溃疡,消肿;根汁:用于尿少及其他泌尿系疾患,驱虫。外用于关节及筋肉无力。

备考 《本草汇精要》目录卷41有石瓜之名,但正文却无石瓜的记载,《本草纲目》卷35,有文字记载,应为本种。

## 7107 仙人掌科 Cactaceae

## 7107001

*Ariocarpus kotschoubeyanus* Berg.

植物名 黑牡丹《新华本草纲要》

功效 茎:麻醉致幻。

备考 从国外引进栽培。原产地民间药用。

7107002 见 7107011

## 7107003

*Echinopsis multiplex* (Pfeiff.) Zucc.

植物名 仙人球《汇编》

文献名 薄荷包掌《拉汉种称》

地方名 仙人掌(广西、福建);福建:仙拳,刺球,刺刺球,翅翅球,刺挑掌,雪球,霸王头;台湾:八卦癩,八角癩;四川:天鹅蛋(峨眉山、西昌);其他:千子百孙。

功效 茎:清热解毒,消肿止痛。用于肺热,咳嗽,痰中带血。外用于痈肿,烫火伤,蛇虫咬伤。

## 7107004

*Epiphyllum crenatum* (Lindl.) G. Don

植物名 昙花《药植简编》

功效 花:止咳。

## 7107005

*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) How

植物名 昙花《高植图鉴》

药材名 昙花《中药大辞典》

地方名 〔琼花〕(福建、台湾);福建:叶下莲、金钩莲(福州),风花;台湾:月来美人。

功效 花:清肺,止咳,化痰。用于心胃气痛,吐血,肺结核;叶:用于跌打损伤;茎:清热解毒。外用于疔疮。

备考 江苏省扬州市琼花观,有名的观赏植物琼花为虎耳草科植物木绣球,与此迥别。

## 7107006

*Hylocereus undatus* (Haw.) Britt. et Rose

植物名 量天尺《海南植志》

药材名 量天尺《岭南采药录》、《汇编》

文献名 霸王花《岭南采药录》,剑花《广东中药》

地方名 霸王鞭(广西、海南),七星剑花(广东、广西);广东:〔昙花〕(广州),番鬼剑(新会),量天尺花,龙骨花;广西:过三龙(桂平),番鬼莲(南宁),三棱羊古埃(陆川),三棱龙骨(百色),三角火旺,天尺花,韦陀花。

功效 花:清热,润肺,止咳。用于肺结核,支气管炎,颈部淋巴结结核;茎:舒筋活络,解毒。外用于骨折,腮腺炎,疮肿。

## 7107007

*Lophophroa williamsii* Coult

植物名 乌羽玉《新华本草纲要》  
文献名 老头掌《新华本草纲要》  
功效 茎;有毒。麻醉。  
备考 从国外引进栽培。原产地民间药用。

## 7107008

*Mammillaria longimamma* DC.

植物名 长突仙人掌《新华本草纲要》  
文献名 乳突仙人掌《广西植录》  
地方名 广西:长突仙人球(平南)。  
功效 全株;用于内伤出血,肚痛。

## 7107009

*Mammillaria longimamma* DC. var. *sphaerica* (A. Dietr.) K. Brand.

植物名 光刺长突球《广西药录》  
地方名 广西:八角仙人掌(临桂)。  
功效 茎;清热;果实;用于咳嗽。

## 7107010

*Mammillaria rhodantha* Link

植物名 绒仙人球《广西药园药录》  
功效 茎;清肺热,消肿毒。用于腮腺炎,肺肿瘤。

## 7107011

*Nyctocereus serpentinus* (Lag. et Rodr.) Britt. et Rose  
- *Cereus serpentinus* Lag.

植物名 仙人鞭《广西药录》  
地方名 贵州:万年刺。  
功效 茎;泻水。

## 7107012

*Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw.

植物名 猪耳掌《新华本草纲要》  
药材名 猪耳掌《广西民族药简编》  
地方名 广西:“裸林歪”(河池壮语)。  
功效 茎;用于腹内硬块。

## 7107013

*Opuntia dillenii* (Ker-Gawl.) Haw. --- *O. ficus-indica* Mill.

植物名 仙人掌《高植图鉴》  
药材名 仙人掌《纲目拾遗》、《汇编》  
文献名 凤尾笏、千岁子、凤栗《广东新语》,龙舌《桂平县志》,平虑草、老鸦舌《南安府志》,玉芙蓉〔茎浆汁〕《名实图考》,仙人掌《纲目拾遗》,神仙掌、霸王《本草求真》,玉英《云南通志》

地方名 观音掌(广西、贵州),霸王树(台湾、湖南);福建:大型宝剑、仙巴索(厦门),仙人掌(霞浦),火焰;广东:山巴掌(兴宁、潮阳),壮元魁(潮安),老虎古(阳江),神仙手(南海);海南:半天仙(澄迈);广西:仙人掌果(邕宁),观音刺,“麻闷”(环江毛难语),“别奖”(罗城瑶语),“麻独”、“妈身”(侗语),“分门上”(金秀瑶语),“醒排”(都安瑶语);其他:火掌,仙巴掌。

功效 全草;清热解毒,散瘀消肿,健胃止痛,镇咳。用于胃、十二指肠溃疡,急性痢疾,咳嗽。外用于流行性腮腺炎,乳腺炎,痈疽疔毒,蛇咬伤,烧、烫伤;茎浆汁(玉芙蓉):用于怔忡,便血,痔血,喉痛,疔肿;花:

止吐血;果实:健脾胃,益脚力,除久泻。

## 7107014

*Opuntia monacantha* Haw.

植物名 扁金剛《云南种录》  
药材名 云南仙人掌《汇编》  
文献名 神仙掌花《本草求真》,玉英《云南通志》,玉芙蓉、仙巴掌《新华本草纲要》  
地方名 仙人掌(四川、云南);云南:仙桃仙巴掌。  
功效 肉质茎:清热解毒,消肿散结。用于腮腺炎,乳腺炎,疮疖痈肿,毒蛇咬伤;茎、叶溢汁凝块(玉芙蓉):用于便血,疔肿。

## 7107015

*Opuntia vulgaris* Mill.

植物名 扁仙人掌《新华本草纲要》  
文献名 仙人掌《岭南杂记》,仙人掌子《纲目拾遗》  
地方名 福建:凤尾笏、凤栗(福安);其他:观音掌,草鞋掌,霸王树。

功效 果实:补脾健胃,益脚力,除久泻;茎浆汁凝结物(玉芙蓉):用于怔忡,便血,痔血,喉痛,疔肿。

## 7107016

*Zygocactus truncatus* (Haw.) Schum. --- *Epiphyllum truncatum* Haw.

植物名 蟹爪兰《高植图鉴》  
药材名 蟹爪兰《广西药录》  
文献名 蟹足霸王鞭《植物学大辞典》  
地方名 锦上添花(广东、广西);广西:半边旗(平南),脱节蜈蚣(南宁),蟹爪花。  
功效 全株;外用于疮疖肿毒。

## 7108 山茶科 Theaceae

## 7108001

*Adinandra bockiana* Pritz. ex Diels var. *acutifolia* (Hand.-Mazz.) Kobuski

植物名 尖叶川黄瑞木《高植图鉴补编》  
地方名 贵州:四川红淡,湖南杨桐。  
功效 全草;祛风解表,散寒理气。用于风寒感冒,头痛,胃痛。

## 7108002

*Adinandra bockiana* Pritz. ex Diels

植物名 川黄瑞木《高植图鉴补编》  
文献名 四川杨桐《广西植录》,四川红淡《江西药录》  
地方名 江西:瑶人茶,尖叶杨桐。  
功效 叶;止血,消炎。用于各种外伤出血,水火烫伤,炎症。

## 7108003

*Adinandra glischroloma* var. *macrosepala* (Metc.) Kobuski --- *A. macrosepala* Metc.

植物名 大萼黄瑞木《高植图鉴补编》  
文献名 大萼红淡《高植图鉴》  
地方名 湖南:节短莲(蓝山县瑶语)。  
功效 根;活血祛瘀,祛风止痛。

## 7108004

*Adinandra hainanensis* Hayata

植物名 海南黄瑞木《高植图鉴补编》  
 药材名 海南黄瑞木《广西药录》  
 文献名 赤点红淡、油楠、山念子《高植图鉴》  
 功效 茎、叶：止咳，通窍。用于口腔炎，鼻咽癌。

## 7108005

*Adinandra mulletii* (Hook. et Arn.) Benth. et Hook. f.

植物名 黄瑞木《高植图鉴补编》  
 药材名 黄瑞木《汇编》  
 文献名 鸡仔茶、黄板叉木《广西植录》，毛药红淡《药植简编》  
 地方名 福建：乌珠子（宁化），狗骨子（永安），瓜子金钗（明溪），樟耳钗、茄老、乌倍子、乌珠子樵（三明），老鼠籽（大田）。

功效 根：凉血止血，消肿解毒。用于鼻衄，睾丸炎，腮腺炎；鲜叶：外用子疔肿，毒蛇咬伤，毒蜂螫伤。

## 7108006

*Adinandra nitida* Merr. ex Li

植物名 亮叶黄瑞木《高植图鉴补编》  
 文献名 亮叶红淡《高植图鉴》，亮叶杨桐《广西植录》  
 地方名 广西：石芽茶（平乐）。  
 功效 叶：民间当茶饮。用于消炎，退热，止血，降压。

## 7108007

*Anneslea fragrans* Wall.

植物名 红椴《高植图鉴补编》  
 药材名 红香树《云南中草药》  
 文献名 茶梨、猪头果《高植图鉴》，安纳士树《云南药录》  
 地方名 广西：胖婆茶，“米勿友”（壮语）；云南：香叶树、野石榴（龙陵），胖婆娘（思茅）。  
 功效 根皮、叶：消食健胃，舒肝退热。用于消化不良，肠炎。

## 7108008

*Anneslea fragrans* Wall. var. *lanceolata* Hayata

植物名 披针叶红椴《高植图鉴补编》  
 药材名 红香树《药植简编》  
 文献名 细叶安纳士树、台湾安纳氏树《台湾药植志》  
 地方名 广东：红椴，茶梨，猪头果。  
 功效 茎、叶、树皮：消食健胃，舒肝退热。用于消化不良，肠炎，肝炎。

## 7108009

*Camellia caudata* Wall. --- *Theopsis caudata* (Wall.) Hu

植物名 长尾毛蕊茶《高植图鉴补编》  
 文献名 尾叶连蕊茶《广西药录》，尾叶山茶《广西植录》  
 地方名 广西：山茶花（那坡），银花茶（武鸣、邕宁），野山茶子。  
 功效 茎、花：去腐生新

## 7108010

*Camellia chekiang-oleosa* Hu

植物名 浙江红山茶《高植图鉴补编》  
 文献名 红花油茶《江西药录》  
 功效 根、花：收敛，止血，凉血。

## 7108011

*Camellia chrysantha* (Hu) Tuyama

植物名 金花茶《高植图鉴补编》  
 药材名 金花茶《广西药录》  
 功效 叶：清热，生津。用于痢疾。

## 7108012

*Camellia cordifolia* (Metz.) Nakai

植物名 野山茶《高植图鉴》  
 文献名 心叶茶《广西植录》  
 功效 根、花：收敛，止血，凉血。

## 7108013

*Camellia cuspidata* Wight

植物名 尖连蕊花《高植图鉴补编》  
 文献名 尖叶山茶《江西药录》  
 地方名 广东：[火烟子]（台山）；四川：油茶树；贵州：阿根衣  
 功效 根、花：收敛，止血，凉血。

## 7108014

*Camellia edithea* Hance

植物名 尖萼红山茶《高植图鉴补编》  
 文献名 东南山茶《江西药录》  
 功效 根、花：收敛，止血，凉血。

## 7108015

*Camellia eurydides* Lindl.

植物名 铃叶连蕊茶《高植图鉴》  
 文献名 铃叶油茶《广西植录》  
 功效 根、花：收敛，止血，凉血。

## 7108016

*Camellia fraterna* Hance

植物名 毛花连蕊茶《高植图鉴补编》  
 文献名 连蕊茶《浙江药植志》  
 功效 根、叶、花：用于痢肿溃烂，风火喉痛，跌打损伤。

## 7108017

*Camellia gymnogyna* H. T. Chang

植物名 秃房茶《高植图鉴补编》  
 药材名 秃房花《广西药录》  
 地方名 广西：那梅些（融水）。  
 功效 种子：用于腮腺炎。

## 7108018

*Camellia japonica* L.

植物名 红山茶《名实图考》、《高植图鉴补编》  
 药材名 山茶花《纲目》、《汇编》  
 文献名 茶花、捻红、千叶红、石榴茶、千叶白、宝珠茶、海榴茶、蹲踞茶《纲目》，曼陀罗树《广群芳谱》，晚山茶《花镜》，白映茶、宝珠山茶《纲目拾遗》，椿（小泉《药考》），山茶、小茶花《观赏树木学》  
 地方名 红茶花（四川、浙江），白茶花（四川、福建）；

山东:耐冬花,耐冬(青岛);江苏:山茶,包珠花(苏州),包珠花;浙江:山茶子(临安),宝珠茶花(余姚);福建:红花茶(浦城),红茶梨(政和、松溪),茶莉茶(南平、宁化);台湾:椿油(种子仁油);广东:宫粉茶;四川:寿星花;云南:白洋茶;其他:宫粉花,宝珠花,杨妃美人茶。

功效 根、花:收敛止血,凉血。用于吐血,衄血,便血,血崩。外用于烧烫伤,创伤出血。

#### 7108019

*Camellia kissi* Wall.

植物名 落瓣短柱茶《高植图鉴补编》

文献名 落瓣油茶《广西植录》,南皮山茶《云南药录》

功效 果实:用于妇科病。

#### 7108020 见 7108022a

#### 7108021

*Camellia longipedicellata* (Hu) H. T. Chang et D. Fang  
--- *Theopsis longipedicellata* Hu

植物名 长柄山茶《高植图鉴补编》

文献名 长梗连蕊茶《广西药录》,长梗山茶《植分学报》

地方名 广西:山茶花(忻城)。

功效 叶、花:止血,止痢。

#### 7108022

*Camellia meiocarpa* Hu, mss.

植物名 小叶油茶《药典》

药材名 茶油《药典》

地方名 广西:小果油茶。

功效 种子脂肪油(茶油):清热化湿,杀虫解毒。并作为注射用茶油的原料及软膏基质。

#### 7108022a

*Camellia oleifera* Abel --- *Thea oleosa* auct. non Lour.

植物名 油茶《高植图鉴》

药材名 油茶《汇编》,茶油《纲目拾遗》、《药典》

文献名 楂、楂油《农政全书》,榨树子油、[榨树]《纲目拾遗》,桔饼《药性考》,茶枯、茶子树、建茶、白花茶《中国药植志》,油茶籽《中国经植志》,茶子麸、茶油麸《岭南草药志》

地方名 茶梅(台湾、广西);浙江:茶籽树;台湾:苦茶,油茶树;湖北:野油茶,油茶树子,茶子壳;广东:花麸,茶油巴,茶子饼;广西:油茶木(玉林),茶树(贺县),茶油树,黄茶,中果油茶,茶子心(种子)、茶子木花(陆川);云南:油茶果树,野茶籽(砚山);其他:茶子木。

功效 种子脂肪油(茶油):清热化湿,杀虫解毒。用于痧气腹痛,急性蛔虫阻塞性肠梗阻,疥癣,烫火伤;种子(茶子心):有小毒。并作为注射用茶油的原料及软膏基质。

#### 7108023

*Camellia parvilimba* Merr. et Metc.

植物名 细叶连蕊茶《高植图鉴补编》

文献名 小叶山茶《江西药录》

功效 根、花:收敛止血,凉血。

#### 7108024

*Camellia parvisepala* H. T. Chang

植物名 细萼茶《高植图鉴》

地方名 广西:白毛茶(凤山)。

功效 叶:利尿。

#### 7108025

*Camellia pitardii* Coh. Stuart

植物名 西南红山茶《高植图鉴补编》

药材名 山茶花(云南)

文献名 西南山茶《高植图鉴》,平伐山茶《广西植录》,野山茶《云南种录》

地方名 云南:茶花、红山茶花(玉溪),四棱标(昭通)。

功效 花、叶、根:消炎,止痢,调经,活血止血,收敛止泻。用于痢疾,月经不调,鼻衄,吐血,肠风下血,关节炎,脱肛。

#### 7108026

*Camellia pitardii* (Rehd.) Coh. Stuart var. *yunnanensis* Sealy

植物名 窄叶西南红山茶《高植图鉴补编》

药材名 山茶花《滇南本草》、《云南中草药》

文献名 云南野山茶(《滇南本草》整理本)

地方名 云南:野山茶(红河),茶花、红山茶花(玉溪),四棱标(昭通)。

功效 叶、花:用于大肠下血,肺中瘀血,吐血;根:用于急性胃肠炎,痢疾,烧伤,烫伤。

#### 7108027

*Camellia polyodonta* How

植物名 多齿红山茶《高植图鉴补编》

文献名 宛田红花油茶《中国经植志》

功效 根、花:收敛止血,凉血。

#### 7108028

*Camellia reticulata* Lindl.

植物名 滇山茶《高植图鉴补编》

药材名 云南茶花(《滇南本草》整理本)

地方名 云南:山茶、南山茶(昆明),野茶花(会泽),红花油茶(腾冲)。

功效 花、叶:收敛止血。

#### 7108029

*Camellia rosthorniana* Hand.-Mazz.

植物名 川鄂连蕊茶《高植图鉴》

地方名 湖南:“黑渣”(蓝山县瑶名)。

功效 根:理气止痛,活血祛瘀。

#### 7108030

*Camellia salicifolia* Champ.

植物名 柳叶毛蕊茶《高植图鉴补编》

文献名 毛叶山茶、柳叶山茶《高植图鉴》

地方名 广西:柳叶茶。

功效 根、花:收敛止血,凉血。

#### 7108031

*Camellia sasanqua* Thunb.

植物名 茶梅《广群芳谱》、《台湾药植志》

文献名 茶梅花、玉茗《花镜》

地方名 台湾:山茶花。

功效 种子脂肪油(茶梅油)代猪油用;茶油:用于癣疥。

#### 7108032

*Camellia senserrata* Chi

植物名 南山茶《桂海虞衡志》、《高植图鉴》

文献名 广宁油茶《中国经植志》

地方名 广东:红花大油茶;广西:红花油茶。

功效 花、叶:收敛、止血。

#### 7108033

*Camellia sinensis* O. Kuntze --- *Thea sinensis* L.

植物名 茶《高植图鉴》

药材名 茶《唐本草》、《汇编》

文献名 苦茶、檟《尔雅》,茶、茗、薺《尔雅》郭璞注),苦茶《唐本草》,皋芦、瓜芦《本草拾遗》,蔎《茶经》,腊茶《圣济总录》,茶叶《图经》,茶芽《本草别录》,茶树《救荒本草》,滇中茶叶《滇南本草》,酪奴、茶子《纲目》,茶实《续名方家选》,泓泓茶《遵生八笺》,芽茶《简便单方》,细茶《万氏家抄方》,茶树根《纲目拾遗》

地方名 山茶(台湾、广西);河北:木茶、薺茶、松罗茶(张家口);山东:茶叶树;江苏:雨花茶;浙江:龙井茶,绿茶,仙茗,剡溪茶,大方茶,大茗,日铸茶,卧龙茶,抹茶,宝云茶,香林茶,白云茶,旗枪茶,雀舌,花坞茶,五龙茶,青顶茶,经山茶,惠明茶,白毛尖,云雾茶,佛茶;安徽:条花,毛峰茶,尖茶,歪尖;江西:婺源茶,婺绿,茗眉茶,庐山云雾茶,闽林茶,东白茶;福建:茶心(泉州、厦门);台湾:山茶仔;湖南:吃树、家茶(会同),碧螺春;广东:龙头山茶;广西:六洞茶(兴安),西茶叶(平南),后山茶(龙州),白毛茶(凤山);四川:蒙顶甘露茶,雷鸣,雾钟,石花,甘露,白毫,米芽,黄芽,芽白,贡茶,峨蕊茶,龙门茶,竹叶青,玉露茶。

功效 根:强心利尿,抗菌消炎,收敛止泻。用于肝炎,心脏病水肿;叶:用于肠炎,痢疾,小便不利,水肿,嗜睡症。外用于烧,烫伤;果实:有毒。用于喘急咳嗽,去痰垢。

#### 7108034

*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze var. *assamica* (Masters) Kitamura --- *Thea assamica* Mast. --- *Thea sinensis* L. var. *assamica* Pierre

植物名 普洱茶《高植图鉴》

药材名 普洱茶《本经逢原》、《汇编》

文献名 人头茶、普而茶《物理小识》,大叶茶《中国树木学》

地方名 山东:茶,茶叶树;台湾:红茶,乌龙茶,阿萨姆茶;云南:“腊”(西双版纳傣语),滇红,滇青茶,春尖,春中,春尾,二水,谷花,散茶,散尖,沱茶,紧茶,饼茶,七子饼茶,小方砖茶。

功效 嫩叶加工品:清热利水,消食醒神。用于神疲多眠,头痛,目昏,小便不利,解酒毒。

#### 7108035

*Camellia sinensis* (L.) O. Ktze. f. *macrophylla* (Sieb.) Kitamura --- *Thea sinensis* L. var. *macrophylla* Sieb.

植物名 大叶茶《云南种录》

药材名 皋芦《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 过罗、拘罗、物罗《南越志》,瓜芦《本草经集注》,苦荬《纲目》,苦苧《南越笔记》,苦茶、唐茶《台湾药植志》

功效 叶:用于头痛烦热,喉痛,淋病。

#### 7108036

*Camellia tenuifolia* (Hay.) Coh. Stuart

植物名 细叶山茶《台湾中药材图鉴》

药材名 苦茶叶《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾:油茶。

功效 叶:清头目,除烦渴。

#### 7108037

*Camellia triantha* H. T. Chang

植物名 三花连蕊茶《高植图鉴补编》

功效 叶:去腐生新。

#### 7108038

*Eurya aurea* (Levl.) Hu et L. K. Ling

植物名 金叶铃《高植图鉴补编》

药材名 金叶铃《贵州药录》

功效 根、叶:清热解毒,消肿止痛。用于无名肿毒,脓疱疮。

#### 7108039

*Eurya auriformis* H. T. Chang

植物名 耳叶铃《高植图鉴补编》

地方名 广西:三早木(贺县)。

功效 叶:生肌。

#### 7108040

*Eurya chinensis* R. Brown

植物名 米碎花《高植图鉴》

药材名 米碎花《汇编》

文献名 华铃、岗茶《药植简编》

地方名 广东:虾辣眼、大岗茶(惠阳);广西:矮茶(南宁);其他:“梅养东”(侗语)。

功效 根、全株:清热解毒,除湿敛疮;茎、叶:用于黄疸肝炎。

#### 7108041

*Eurya disticha* Chun

植物名 秃小耳铃《高植图鉴》

药材名 秃小耳铃《药植简编》

功效 全株、叶:用于肺热咳嗽。外用于敷跌打,疮疡肿毒。

#### 7108042

*Eurya distichophylla* Hemsl.

植物名 二列叶铃《高植图鉴》

药材名 山禾串《汇编》

地方名 江西:山木香;广东:茅山茶、野茶里(惠阳)。

功效 全株:清热,解毒,消炎止痛。用于急性扁桃腺炎,喉炎,口腔炎,支气管炎,水火烫伤。

#### 7108043

*Eurya groffii* Merr.

植物名 岗铃《高植图鉴》

药材名 岗铃《汇编》

地方名 广西:米碎木(博白、藤县),蚂蚁木(凌云);  
贵州:细叶茶

功效 叶:豁痰镇咳,消肿止痛。用于肺结核,咳嗽,跌打肿痛。

#### 7108044

*Eurya bebedados* Y. Ling

植物名 微毛铃《高植图鉴》

地方名 广西:山茶(北流)。

功效 根、茎、叶:用于肝炎,烫伤,蛇咬伤,跌打损伤;果:祛风,消肿,止血。用于风湿关节炎,外伤出血,无名肿毒。

#### 7108045

*Eurya impressinervis* Kobuski

植物名 凹脉铃《高植图鉴补编》

地方名 贵州:苦白蜡。

功效 叶、果:祛风,消肿,止血。用于风湿关节炎,外伤出血,无名肿毒。

#### 7108046

*Eurya japonica* Thunb.

植物名 铃木《高植图鉴》

药材名 铃木《汇编》

文献名 铃《玉篇》,粗齿铃《植分学报》,海岸铃《高植图鉴》

地方名 鱼骨(华南),细叶菜(江西、湖南);江西:钩茄子树;福建:漆虎;台湾:油茶,油叶茶,油木;湖南:吹木叶,钩茄子树(长沙);广东:黄牛柴,板仔树;四川:白茶树,野茶树。

功效 茎、叶、果:祛风除湿,消肿,止血。用于风湿关节疼痛,腹水,外伤出血。

#### 7108047

*Eurya loquaiana* Dunn

植物名 细枝铃《高植图鉴》

文献名 松木《高植图鉴》

地方名 广西:黑水果木(鹿寨)。

功效 茎、叶:消肿,止痛。用于风湿,跌打损伤。

#### 7108048

*Eurya macartneyi* Champ.

植物名 黑铃《高植图鉴》

药材名 黑铃《广西药录》

功效 茎、叶:清热解毒。

#### 7108049

*Eurya nitida* Korthak

植物名 细齿叶铃木《高植图鉴补编》

文献名 铃《植分学报》,细齿叶铃《湖南药物志》,细齿铃《江西药录》

地方名 湖南:野茶树;四川:饭风子。

功效 茎、叶、花:杀虫解毒,用于疮口溃烂,泄泻,上唇疮烂;叶、果:祛风,消肿,止血。用于风湿关节炎,外伤出血,无名肿毒。

#### 7108050

*Eurya obtusifolia* H. T. Chang

植物名 钝叶铃《高植图鉴》

药材名 野茶子《四川中药志》

文献名 钝头铃《峨眉药植研究》

地方名 四川:犍角筋(峨眉山)。

功效 果实:止渴,醒脑。用于暑热口渴,小便不利,肠炎泻痢及头昏目眩。

#### 7108051

*Eurya patentipilla* Chun

植物名 长毛铃《高植图鉴》

药材名 长毛铃《广西药录》

地方名 广西:乌婆树(金秀),鱼骨刺(岑山)。

功效 叶:用于烧烫伤,疮疡肿毒,跌打损伤。

#### 7108052

*Eurya stenophylla* Merr.

植物名 窄叶铃《高植图鉴补编》

药材名 窄叶铃《广西药录》

功效 根:用于风湿症。

#### 7108053

*Eurya tetragonoclada* Merr. et Chun

植物名 四角铃《高植图鉴》

药材名 四角铃《广西药录》

地方名 广西:驳骨柴(鹿寨),野桂花(贺县)。

功效 根:消肿,止痛。用于跌打损伤。

#### 7108054

*Gordonia axillaris* (Ker) Dietr. --- *Polyspora axillaris* (Roxb.) Sweet

植物名 大头茶《高植图鉴补编》

药材名 铁核桃树《云南中草药》

地方名 广西:[楠木](上思);四川:大山皮,水红树,花东青,[楠木树];云南:羊咪树(红河),拟山药。

功效 茎皮、果实:活络止痛,温中止泻。用于风湿腰痛,跌打损伤;树皮:清热止痒。

#### 7108055

*Schima argentea* Pritz.

植物名 银木荷《高植图鉴》

药材名 山红木《西昌中草药》

文献名 毛荷木《指示植物》,银桐木《广西植录》,银红木《西昌中草药》

地方名 四川:禾木树、山禾木(会理);云南:红木树,红木,李仙,[闹羊花],闹马尖,闹一匹,西撒叶,麻木树,银叶荷树。

功效 根皮、树皮:有毒。驱蛔、杀虫;茎皮:用于痢疾;皮、叶:有毒。用于灭钉螺,蛆虫。

#### 7108056

*Schima superba* Gardn. et Champ. --- *Schima crenata* Korthals

植物名 木荷《高植图鉴》

药材名 木荷《中药大辞典》

文献名 桤木《广西植录》

地方名 桤树(江西、广西);浙江:木艾树,同树,木荷柴(建德),横柴(龙泉);福建:柯树;台湾:荷树 荷



高杯、樟仔；海南：果搞，果树，果材，红果，纳搞，纳松，上身肩，药鱼眉；广西：荷木（临群）；其他：伟梅树。

功效 根皮、叶：有大毒。外用干敷疔疮，无名肿毒。

#### 7108057

*Schima superba* Gardn. et Champ. var. *kankacensis* (Hayata) Keng

植物名 港口木荷《台湾药植志》

地方名 台湾：杆仔皮，恒春木荷。

功效 根皮：毒鱼，代肥皂用。

#### 7108058

*Schima wallichii* Choisy

植物名 西南木荷《高植图鉴补编》

药材名 红木荷《名实图考》、《云南种录》

文献名 红木《名实图考》，峨眉何树《广西药录》，乌叶桐木《广西植录》，峨眉桐树《药植简编》，峨眉木荷《云南中草药》

地方名 云南：麻木树（红河），毛木叶，毛木树（西畴），木荷树，木荷，红毛皮，红毛树，红木对，红毛木树（景东），乌叶子，乌叶荷树，闹一匹，“埋吐罗”（西双版纳傣语）。

功效 叶、皮：有小毒。收敛止泻，杀虫。用于肠炎，痢疾，鼻出血，消化不良，蛔虫症。

#### 7108059

*Stewartia pseudocamellia* Maxim.

植物名 娑罗花《花镜》伊钦恒注）

功效 果实：用于心痛病。

#### 7108060

*Stewartia rostrata* Spongberg

植物名 长柱紫茎《高植图鉴》

文献名 尖嘴紫茎《浙江药植志》

地方名 湖北：紫茎、马溜光（神农架）。

功效 根、果：舒筋活血。用于暑热腹痛，跌打损伤。

#### 7108061

*Stewartia sinensis* Rehd. et Wils.

植物名 紫茎《高植图鉴》

药材名 帽兰《四川中药志》

文献名 旃、檀《植分学报》，紫檀《药植简编》，天目紫茎《浙江药植志》

地方名 湖南：野茶子。

功效 树皮、根皮、果：舒筋活血。用于暑热腹痛，跌打损伤。

#### 7108062

*Ternstroemia gymnanthera* (Wight et Arn.) Sprague

植物名 厚皮香《高植图鉴》

药材名 厚皮香《名实图考》、《汇编》

文献名 秤杆红、红果树《汇编》

地方名 珠木树（广东、湖南）；浙江：猪血柴（遂昌、龙泉），气血藤（平阳），红淀；安徽：红粗；台湾：红柴，[红淡]；广西：[映山红]；四川：水红树，秤杆木；云南：白花果（昆明），[桂枝]（曲靖），莫红砍（思茅），山茶树

（大理），包皮。

功效 果实、叶、花：果有小毒。清热解毒，消脓肿。用于疮疡痈肿，乳腺炎。

#### 7108063

*Ternstroemia kwangtungensis* Merr.

植物名 厚叶厚皮香《高植图鉴补编》

文献名 广东厚皮香《广西植录》，华南厚皮树《高植图鉴》，小红木头树《元江哈尼族药》

地方名 云南：“削削包”（元江哈尼语）。

功效 根：凉血止血。用于尿血。

#### 7108064

*Ternstroemia luteoflora* Hu ex L. K. Ling

植物名 尖萼厚皮香《高植图鉴补编》

地方名 广西：木铁老虎（钟山）。

功效 根、叶：清热解毒，舒筋活络。用于跌打损伤，刀伤，疮毒肿痛。

#### 7108065

*Tutecheria spectabilis* Dunn --- *T. championi* Nakai

植物名 石笔木《云南种录》

药材名 石笔《广西药园药录》

地方名 云南：山茶花（屏边）。

功效 叶、根：散积消滞。

### 7112 猕猴桃科 Actinidiaceae

#### 7112001

*Actinidia arguta* (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.

植物名 软枣猕猴桃《中国植志》

药材名 软枣子（东北）

文献名 猕猴桃《开宝本草》

地方名 猕猴桃（东北），圆枣子（东北、河南）；吉林：软枣藤木；河北：藤瓜；河南：藤梨；湖北：芝麻果子（神农架）；贵州：洋桃藤。

功效 根、叶：健胃，清热，利湿。用于消化不良，呕吐，腹泻，黄疸，风湿关节痛；果实：止渴，解烦热，下石淋。

#### 7112002

*Actinidia arguta* (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. var. *purpurea* (Rehd.) C. F. Liang --- *A. purpurea* Rehd.

植物名 紫果猕猴桃《中国植志》

药材名 小羊桃《贵州草药》

地方名 贵州：羊奶奶（罗甸）；云南：牛奶果（昭通），牛奶子（镇雄、昭通）。

功效 根、果实：清热利湿，补虚益损。用于吐血，慢性肝炎，月经不调，风湿关节痛。

#### 7112003

*Actinidia callosa* Lindl.

植物名 硬齿猕猴桃《中国植志》

药材名 山羊桃（云南）

文献名 京梨《中国经植志》，木梨藤《药植简编》

地方名 广西：马奶奶，羊奶奶；四川：[母猪藤]（盐边）；云南：牛奶果藤（龙陵），[牛奶果]（凤庆、腾冲、临沧）。

功效 根:清热解毒,活血散瘀,祛风利湿,接骨。用于风湿性关节炎,淋巴结核,跌扑损伤,痈疖。

## 7112004

*Actinidia callosa* Lindl. var. *henryi* Maxim. --- *A. curvidens* Dunn

植物名 京梨猕猴桃《中国植志》

地方名 湖北:羊奶奶、小洋桃(神农架);广西:鸡考果(鹿寨);四川:水梨儿(峨眉山);贵州:洋桃血藤。

功效 茎、叶:祛风止痛;根皮、果:清热凉血,消肿止痛。

## 7112005

*Actinidia chinensis* Planch.

植物名 中华猕猴桃《中国植志》

药材名 猕猴桃《开宝本草》、《汇编》

文献名 羊桃、鬼桃、羊肠《本经》,蓂楚、御弋、桃弋《别录》,藤梨、猕猴桃《开宝本草》,阳桃《日用本草》,木子《纲目》,梨藤《东阳县志》,鼠矢《广群芳谱》,毛叶猕猴桃《经植手册》,红藤梨《高植图鉴》,猕猴桃根《药典》,软毛猕猴桃《广西植物》

地方名 毛桃子(四川、云南、福建),毛梨子、毛梨树(四川、云南),山羊桃(陕西、贵州),绳梨(浙江、湖南),杨桃(江西、湖北、云南),狐狸桃(江西、广西);浙江:藤梨根,金梨,野梨;安徽:洋桃;江西:杨桃根(婺源),杨桃藤(瑞昌),马屎果;福建:大零核,猴子梨,毛桃藤(清流),毛藤梨(宁化),山冬瓜(宁德),白毛桃(福鼎),犬蛋袋(福鼎、福安),胡毛猪子(福安);河南:毛羊桃;湖南:野洋桃(湘西、常德),公洋桃,藤拉公(新宁、麻阳),藤拉果(怀化),丝葛藤,钻地风(长沙);广西:野狸桃(贵县),〔天仙藤〕〔桂平〕,〔铁包金〕〔平南〕,甜梨(资源、全州);四川:毛梨根、毛梨儿(叙永),岩风藤(广安),山毛梨(松潘),大洋桃(万县);贵州:大红袍,山洋桃;其他:羊桃藤。

功效 根、根皮:清热解毒,活血消肿,祛风利湿。用于风湿性关节炎,跌打损伤,丝虫病,肝炎,痢疾,瘰疬,痈疽肿毒,癌症;果实:解热,止渴,通淋。用于烦热,消渴,黄疸,石淋,痔疮。

## 7112006

*Actinidia chinensis* Planch. var. *hispida* C. F. Liang --- *A. deliciosa* (A. Chev.) C. F. Liang et A. R. Ferguson

植物名 硬毛猕猴桃《中国植志》

文献名 美味猕猴桃《广西植物》

地方名 湖北:洋桃(神农架);贵州:洋桃血藤。

功效 根、茎、果:清热化湿,解毒消肿,化痰。用于乳痈,消化不良,骨折,颈淋巴结核;果、叶:用于尿石症。

## 7112007

*Actinidia chrysantha* C. F. Liang

植物名 金花猕猴桃《中国植志》

功效 果:滋补强壮。用于维生素丙缺乏症(含维生素丙 58-71%)。

## 7112008

*Actinidia cylindrica* C. F. Liang

植物名 柱果猕猴桃《中国植志》

地方名 广西:牛奶藤(融水)。

功效 根皮、叶:用于子弹入肉。

## 7112009

*Actinidia deliciosa* var. *chlorocarpa* (C. F. Liang) C. F. Liang et A. R. Ferguson

植物名 绿果猕猴桃《广西植物》

功效 果实:滋补强壮。用于维生素丙缺乏症(含维生素丙 88.44%)。

## 7112010

*Actinidia ciantha* Benth.

植物名 毛花猕猴桃《中国植志》

药材名 毛冬瓜《浙江民药》

文献名 毛花杨桃《高植图鉴》,白藤梨、毛卵、毛狗卵《汇编》

地方名 白毛桃(浙江、福建);浙江:白洋桃,白葡萄,生毛藤梨;福建:山蒲桃(古田),接骨仙桃(南平);湖南:羊桃,白毛藤桃;广西:毛桃,毛藤里公(资源)。

功效 根、叶:清热利湿,活血消肿,解毒。用于肺热失音,淋浊,带下,颜面丹毒,淋巴结炎,皮炎,痈疮肿毒,肿瘤。

## 7112011

*Actinidia farinosa* C. F. Liang

植物名 粉毛猕猴桃《中国植志》

功效 果实:滋补强壮。用于维生素丙缺乏症。

## 7112012

*Actinidia fortunatii* Fin. et Gagn.

植物名 条叶猕猴桃《中国植志》

文献名 粉绿猕猴桃《广西植志》。

地方名 广西:羊奶奶(龙胜)。

功效 根:用于跌打。

## 7112013

*Actinidia fulvicoma* Hance

植物名 黄毛猕猴桃《中国植志》

文献名 棕毛猕猴桃《江西药志》

功效 果、根、叶:清热止渴,除烦下气,和中利尿。

## 7112014

*Actinidia fulvicoma* Hance var. *lanata* (Hemsl.) C. F. Liang

植物名 绵毛猕猴桃《中国植志》

药材名 绵毛猕猴桃《贵州药志》

功效 根、茎:清热解毒,化湿祛瘀。用于乳痈,消化不良,骨折,颈淋巴结核;果:用于尿结石。

## 7112015

*Actinidia fulvicoma* var. *lanata* f. *hirsuta* (Fin. & Gagn.) C. F. Liang

植物名 糙毛猕猴桃《中国植志》

功效 果实:滋补强壮。用于维生素丙缺乏症。

## 7112016

*Actinidia glaucophylla* F. Chun

植物名 华南猕猴桃《中国植志》

药材名 华南猕猴桃《广西药志》

地方名 广西:羊奶奶(全州)。  
功效 全株:用于糖尿病,胃脘痛;根:用于骨折;  
果实:用于痢疾。

## 7112017

*Actinidia glaucophylla* F. Chun var. *asymmetrica* (F. Chun) C. F. Liang --- *A. asymmetrica* F. Chun

植物名 耳叶猕猴桃《中国植志》  
药材名 耳叶猕猴桃《广西药录》  
地方名 广西:土羊角(上林)。  
功效 茎:用于跌打损伤,骨折。

## 7112018

*Actinidia hemsleyana* Dunn

植物名 长叶猕猴桃《中国植志》  
功效 果、根、叶:清热止渴,除烦下气,和中利尿。

## 7112019

*Actinidia indochinensis* Merr.

植物名 中越猕猴桃《中国植志》  
功效 果实:滋补强壮。用于维生素丙缺乏症。

## 7112020

*Actinidia kolomikta* (Maxim. et Rupr.) Maxim.

植物名 狗枣猕猴桃《中国植志》  
药材名 狗枣子(东北)、《汇编》  
文献名 深山木天蓼《江苏植录》  
地方名 陕西:猫人参(汉中);山东:伦敦果(崂山);  
湖北:小羊桃(鹤峰);四川:母猪藤。  
功效 果实:滋补强壮。用于维生素丙缺乏症。

## 7112021

*Actinidia lanceolata* Dunn

植物名 小叶猕猴桃《中国植志》  
药材名 小叶猕猴桃《江西药录》  
功效 果、根、叶:清热止渴,除烦下气,和中利尿。

## 7112022

*Actinidia latifolia* (Gardn. et Champ.) Merr.

植物名 阔叶猕猴桃《中国植志》  
药材名 红蒂蛇(广东)、《汇编》  
文献名 多果猕猴桃《海南植志》,多花猕猴桃《高植图鉴》

地方名 湖南:羊奶树;广东:量藤(连山);广西:白  
竭藤(全州),狐狸桃(防城),羊奶子(全州、资源);贵  
州:羊奶奶;云南:跳皮羊桃(屏边)。

功效 根、茎叶:清热除湿,解毒,消肿止痛。用于  
咽喉肿痛,泄泻,痈疮肿痛;果:用于尿结石。

## 7112023

*Actinidia liangguangensis* C. F. Liang

植物名 两广猕猴桃《中国植志》  
地方名 广西:鱼网藤(金秀)。  
功效 根:用于跌打损伤。

## 7112024

*Actinidia macrosperma* C. F. Liang --- *Actinidia valvata*  
auct. non Dunn

植物名 大籽猕猴桃《中国植志》  
药材名 猫人参(浙江)

文献名 钹合猕猴桃《浙江药植志》

地方名 浙江:猫气藤,痢草,沙梨藤。

功效 根:活血,消肿,镇痛,安眠,抗癌。

备考 浙江杭州富阳之猫人参的原植物为本种,  
而非过去文献报道的 *Actinidia valvata* Dunn。

## 7112025

*Actinidia maloides* Li -- *A. tetramera* Maxim. var.  
*maloides* (Li) C. Y. Wu --- *Actinidia callosa* Lindl. var.  
*henryi* auct. non Maxim.

植物名 海棠猕猴桃《中国植志》

药材名 水梨藤《四川中药志》

文献名 四川猕猴桃《拉汉种称》

地方名 四川:水梨儿藤,秤花藤(松潘),野羊桃(奉  
节),[血藤](筠连),小羊角陀(酉阳);贵州:[五味子]、  
羊奶果(梵净山)。

功效 根皮:清热,消肿。用于周身肿亮,背痈红  
肿,肠痈绞痛。

备考 《四川中药志》(1960)将本种误订为 *A.*  
*callosa* Lindl. var. *henryi* Maxim.

## 7112026

*Actinidia melanandra* Franch.

植物名 黑蕊猕猴桃《中国植志》

文献名 黑蕊羊桃《树分》

功效 根:清热解毒,活血散瘀,祛风利湿。

## 7112027

*Actinidia melliana* Hand.-Mazz.

植物名 美丽猕猴桃《中国植志》

文献名 两广猕猴桃《广西植录》

地方名 广西:塔拖藤(藤县),大斑痧藤,小保暖,红  
网藤(金秀),红毛藤(昭平)。

功效 根:用于脉管炎,崩漏,泄泻,老鼠咬伤。

## 7112028

*Actinidia polygama* (Sieb. et Zucc.) Maxim.

植物名 葛枣猕猴桃《中国植志》

药材名 木天蓼《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 天蓼《药性论》,木蓼、小天蓼、藤天蓼《本草  
拾遗》,天蓼木《圣惠方》,蓬菜获留、南扶留、含水藤、金  
莲枝《新纲》,大瓠藤《本草新注》,葛枣《东北木本图  
志》,马枣子《东北药植志》

地方名 葛枣子(吉林、辽宁);吉林:丸枣子;山东:  
软枣(昆崙山),羊枣(青岛);湖北:牛奶子(神农架);湖  
南:牛奶奶,钻地风,羊桃,羊奶奶树;四川:小羊桃(万  
县)。

功效 带虫瘿的果实:理气止痛。用于中风口面  
喎斜,疝气,痲痹;枝叶:有小毒。用于大风痲疾,瘰疬,  
气痢风劳;根:用于牙痛,腰痛。

## 7112029

*Actinidia rubricaulis* Dunn

植物名 红茎猕猴桃《中国植志》

地方名 广西:五月花(乐业)。

功效 根:消肿,止痛。

## 7112030

*Actinidia rubricaulis* Dunn var. *coriacea* (Fin. et Gagn.) C. F. Liang -- *A. coriacea* (Fin. et Gagn.) Dunn

植物名 单叶猕猴桃《中国植志》

药材名 秤砣梨《四川中草》

地方名 湖北:马奶子,小羊桃,猫奶儿,胶果藤,(鸡血藤)(鄂西),羊奶子;四川:马奶藤,铁甲藤,秤砣藤(峨眉山);贵州:[红藤]。

功效 根:行气活血。用于跌打损伤,腰背疼痛,内伤吐血;果:抗肿瘤。

#### 7112031

*Actinidia rufotricha* C. Y. Wu var. *glomerata* C. F. Liang

植物名 密花猕猴桃《中国植志》

功效 果实:滋补强壮。用于维生素丙缺乏症。

#### 7112032

*Actinidia tetramera* Maxim.

植物名 四萼猕猴桃《中国植志》

地方名 湖北:小阳桃、药五味(神农架)。

功效 果实:止渴生津,解热。

#### 7112033

*Actinidia venosa* Rehd.

植物名 显脉猕猴桃《中国植志》

药材名 酸枣子藤《云南植志》

文献名 酸刺子藤《云南植志》,脉叶猕猴桃《西昌中草药》

功效 根皮:祛风除湿,活血去瘀。

#### 7112034

*Actinidia venosa* Rehd. f. *pubescens* Li

植物名 柔毛猕猴桃《中国植志》

文献名 毛背酸枣子藤《云南植志》

地方名 四川:羊奶果(会东),火草条(冕宁),“困母年年”(会东彝语);云南:羊桃(镇雄)。

功效 根皮:用于狗咬伤,刀枪伤。

#### 7112035

*Clematoclethra populifolia* C. F. Liang

植物名 杨叶藤山柳《贵州药录》

功效 根:清热解毒,活血化瘀,消肿止痛。用于吐血,白带,经闭,慢性肝炎,风湿关节炎,疝气。

### 7113 水东哥科 Saurauaceae

#### 7113001

*Saurauia napaulensis* DC.

植物名 尼泊尔水东哥《中国植志》

药材名 鼻涕果《汇编》

文献名 锥序水东哥《高植图鉴》,澜沧水东哥《中药大辞典》,大米花树《广西植志》

地方名 四川:山枇杷;云南:粘心果,密心果,[大叶杜仲](红河),牛嗓管树(曲靖),大接骨、铜皮(保山),明星果,粉心果,马耳子果,撒罗夷。

功效 树皮、果:散瘀活血,接骨,拔脓。用于骨折,跌打损伤,慢性骨髓炎,创伤出血,疮疖。

#### 7113002

*Saurauia thyrsoflora* C. F. Liang et Y. S. Wang

植物名 聚雄水东哥《中国植志》

地方名 广西:水枇杷(马山),碧利木(乐业),勒苗,下毛;贵州:羊桃山枇杷

功效 根:用于小儿麻疹;叶:用于烧、烫伤。

#### 7113003

*Saurauia tristyla* DC.

植物名 水东哥《中国植志》

药材名 水枇杷《广西中草药》

文献名 水管心、大有树、水冬瓜《植物名汇》,伞罗夷、种称

地方名 台湾:倒吊风,马厚朴;广西:水浓根(苍梧),水牛奶(昭平),红毛树(忻城),白饭果,白饭木(平南、博白、大瑶山),白饭树(桂平),野枇杷(柳江),山枇杷(那坡),鼻涕子(梧州),鼻涕果(隆林),米花树,棒筒花,水白环(平南)。

功效 根、叶:清热解毒,止咳,止痛。用于风热咳嗽,风火牙痛,小儿麻疹,高热;叶:用于外伤,刀伤,烫火伤

#### 7113004

*Saurauia tristyla* DC. var. *oldhami* Fin. & Gagn. S. *oldhami* Hemsl.

植物名 台湾水东哥《中国植志》

药材名 台湾水冬瓜(台湾)

文献名 东南水东哥《云南种录》,刚毛米花树《广西植志》

地方名 台湾:水冬瓜,水管心,水广心,大有树,倒吊风,大有树心,山烟头

功效 根:用于腹痛,感冒发烧;嫩芽:外用于刀伤,火伤,跌打损伤。

### 7114 金莲木科 Ochnaceae

#### 7114001

*Sinia rhodoleuca* Diels

植物名 合柱金莲木《中国植志》

药材名 辛木《广西药录》

文献名 线齿木《广西植志》

功效 全株:外用于疥疮。

### 7116 龙脑香科 Dipterocarpaceae

#### 7116001

*Dipterocarpus turbinatus* Gaertn. f.

植物名 油树《中国植志》

药材名 羯波萝香《西双版纳傣药志》

文献名 羯布罗香《中国经植志》

地方名 云南:“埋狼满痒”(傣名)。

功效 叶:用于过敏性皮炎,疥疮,刀伤出血。

#### 7116002

*Dryobalanops aromatica* Gaertn. f.

植物名 龙脑香树《台湾药植志》

药材名 梅花冰片《药材学》

文献名 龙脑香、膏香、龙脑《别录》,固不婆律《酉阳杂俎》,龙脑香子、龙脑膏香、婆律膏、龙脑树《唐本草》。

羯布罗香《本草衍义》，脑子《海上方》，梅花脑子《小儿药证直诀》，瑞龙脑《图经》，龙脑油《南海药谱》，梅花片脑《夷坚志》，婆律香膏、梅花脑、冰片脑、冰片、片脑、米脑、速脑、金脚脑、苍龙脑《纲目》，洗吉片《和汉药名汇》，梅花龙脑《李《药植》》，樟香、虚饭、元慈勒《新纲》，老梅片《药材学》，梅片、梅冰《中药大辞典》

功效 树脂加工品(冰片)：通诸窍，散郁火，去翳明目，消肿止痛。用于中风口噤，热病神昏，惊痫痰迷，气闭耳聋，喉痹，口疮，中耳炎，痈肿，痔疮，目赤翳膜，蛲虫病；种子：下恶气，消食，散胀，香口；树脂(龙脑香膏)：用于耳聋。

## 7118 桃金娘科 Myrtaceae

### 7118001

*Baeckea frutescens* L. --- *B. frutescens* L. var. *brachyphylla* Merr. et Perry

植物名 岗松《中国植志》

药材名 岗松《汇编》

文献名 松帚《指示植物》，扫把枝《广西中药志》，扫把草《药植简编》，扫把树《鉴别手册》，短叶岗松《广西药录》

地方名 扫把根(华南)，石松草(广东、广西)；江西：香柴，扫帚子；广东：[石松]、布松、地松(惠阳)；海南：羊树木(澄迈)，山松，白花松，[石松子]，扫帚草，铁扫把；广西：扫卡木(陆川)，鸡爪松(金秀)，观音扫(蒙山)，长松(贵县)，沙松(苍梧)，[地肤子](武鸣)，松毛枝，蛇虫草，鸡儿松，山松柏。

功效 全草或根：去瘀，止痛，利尿，杀虫。用于跌打损伤，风湿痛，淋病，疥疮，脚癣。

### 7118002

*Cleistocalyx operculatus* (Roxb.) Merr. & Perry

植物名 水翁《中国植志》

药材名 水翁《岭南采药录》、《汇编》

文献名 水翁皮《生草药性备要》，水榕《高植图鉴补编》

地方名 水榕木、水翁花(广东、广西)；广东：水雍花，水翁叶(南海、番禺、顺德)，水榕树(增城、东莞、五华)，水翁枝，水翁树、水龙树(惠阳)，黑叶水翁树(阳春)，水瓮(高要)，水映(电白、徐闻、海康、廉江、遂溪)，大叶榕(高要、高鹤)，广东土槿皮；海南：水映木(乐东、儋县)，酒翁；广西：大蛇药(桂平)，水容木；其他：水香。

功效 花蕾、叶、根、树皮：清暑解表，去湿消滞，消炎止痒；花蕾：用于感冒发热，细菌性痢疾，急性胃肠炎，消化不良；根：用于黄疸型肝炎；树皮：外用于烧伤，麻风，皮肤搔痒，脚癣；叶：外用于急性乳腺炎。

### 7118003

*Decaspermum esquirolii* (Levl.) Chang et Miao

植物名 华夏子楝树《中国植志》

地方名 广西：山稔木(天等)，山岗稔(大新)。

功效 根：用于痢疾，胃痛，肝炎。

### 7118004

*Decaspermum fruticosum* J. R. et G. Forst.

植物名 五瓣子楝树《中国植志》

药材名 米碎叶《广西药录》

文献名 碎米树《云南种录》

地方名 广西：山小稔(天等)，扫鱼木(桂平)，紫凌木；云南：细红草果(景东)，密油果(思茅)，碎米叶、碎米果、水密树(滇南)。

功效 叶：生肌。

### 7118005

*Decaspermum gracilentum* (Hance) Merr. et Perry

植物名 子楝树《中国植志》

药材名 米碎木(海南)

文献名 桑枝米碎木《广西药录》

地方名 广西：桑枝米碎叶，甜茶木(横县)。

功效 根：止血，止痢。用于痢疾，崩漏；叶：外用于止痛。

### 7118006

*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.

植物名 赤桉《中国植志》

药材名 赤桉油《新华本草纲要》

地方名 云南：小叶桉，洋草果。

功效 果：用于小儿疳疾。

### 7118007

*Eucalyptus citriodora* Hook. f. --- *E. maculata* Hook. var. *citriodora* (Hook. f.) Bailey

植物名 柠檬桉《中国植志》

药材名 柠檬桉《广西中药志》

文献名 油玉树《观赏树木学》，油桉树《树分》，香桉《汇编》

地方名 柠檬桉树(华南)；福建：香水桉，蚊子树；广东：柠檬香桉，留香久。

功效 叶：散肿散毒。用于腹泄肚痛，皮肤病，风湿骨痛；叶及精油：消炎杀菌，驱风止痛。

### 7118008

*Eucalyptus dealbata* A. Cunn.

植物名 白皮桉树《广西《园林药录》》

功效 叶：清热杀菌。用于预防流感，痢疾，肠炎。外用于湿疹，熏烟灭蚊。

### 7118009

*Eucalyptus exserta* F. Muell.

植物名 窿缘桉《中国植志》

药材名 窿缘桉《广西中药志》

文献名 美丽桉树《树分》，窿缘小叶桉《汇编》，窿缘桉叶《中药大辞典》

地方名 广西：小叶桉，加利树，细叶桉(南宁)，有加利(博白)，风吹柳，露缘桉；四川：柳叶桉(峨眉山)。

功效 叶：外用于风湿，皮肤病。

### 7118010

*Eucalyptus globulus* Labill.

植物名 蓝桉《中国植志》

药材名 蓝桉《汇编》，桉油《药典》

文献名 蓝玉树《主要经济树木》，有加利、油加利、安加利(山医《生药》)，蓝油木《中国植物图鉴》，蓝桉叶

《广西中药志》,楠桉《西昌中草药》,蓝桉树《药材学》,桉树叶《现代实用中药》

地方名 灰杨柳(四川、云南);河北:[石楠叶];广东:白树,油树,玉树,小球桉树;广西:大种托盘木(博白);四川:桉叶,灰杨柳叶;云南:洋草果树(昆明),蓝木树,金鸡纳树,桉树;其他:灰叶桉,杨草果树,玉树油树。

功效 叶:疏风解热,抑菌消炎,防腐止痒。用于预防流行性感胃,流行性脑脊髓膜炎,上呼吸道感染,咽喉炎,支气管炎,肺炎,急、慢性肾盂肾炎,肠炎,痢疾,丝虫病。外用于烧烫伤,蜂窝组织炎,乳腺炎,疔疮,丹毒,水田皮炎,皮肤湿疹,脚癣,皮肤消毒;挥发油(桉油):皮肤刺激药。用于神经痛。

#### 7118011

*Eucalyptus robusta* Smith

植物名 桉《中国植志》

药材名 大叶桉《汇编》

文献名 大叶桉叶《中药大辞典》,桉叶《药材资料汇编》

地方名 大叶有加利(湖南、广东、广西),桉树(浙江、福建、湖南、广西),油加利(福建、广西、云南),玉树(福建、云南);浙江:三年青(温州);福建:蚊仔树(厦门、漳州),蓝油木,郁加里;台湾:有加利;广西:有加利叶(北流),加利木(平南),加里树;云南:洋草果树,加利树。

功效 叶:疏风解热,抑菌消炎,防腐止痒。用于预防流行性感胃,流行性脑脊髓膜炎,上呼吸道感染,咽喉炎,支气管炎,肺炎,急、慢性肾盂肾炎,肠炎,痢疾,丝虫病。外用于烧烫伤,蜂窝组织炎,乳腺炎,疔疮,丹毒,水田皮炎,皮肤湿疹,脚癣,皮肤消毒。

#### 7118012

*Eucalyptus tereticornis* Smith

植物名 细叶桉《中国植志》

药材名 细叶桉《汇编》

文献名 细叶桉树《经济植物学》。

地方名 桉叶(四川、云南),小叶桉(广西、云南);广西:细叶桉叶(陆川),柳叶桉(南宁);云南:褐桉树,加利树,玉树、油加利、羊草果树(红河)。

功效 叶、果:消炎杀菌,祛痰止咳,收敛杀虫。用于预防流行性感胃,流行性乙型脑炎,疟疾,肠炎,腹泻,痢疾,皮肤溃烂,疮疮红肿,丹毒,乳腺炎,外伤感染,皮癣,神经性皮炎。

#### 7118013

*Eugenia aquea* Burm. f.

植物名 水莲雾《台湾药植志》

功效 树皮:收敛。用于鹅口疮。

#### 7118014

*Eugenia caryophyllum* L. --- *E. aromatica* (L.) Baill. --- *Syzygium aromatica* (L.) Merr. et Perry

植物名 丁香《云南种录》

药材名 丁香《开宝本草》、《药典》

文献名 母丁香《雷公炮炙论》,鸡舌香《抱朴子》,丁

子香《齐民要术》,丁香树皮《海药本草》,丁香根《开宝本草》,亭吴独生《酉阳杂俎》,雌丁香、雄丁香、支解香《本草蒙筌》,丁皮《纲目》,公丁香《本草原始》,百结、洋丁香《秘传花镜》,丁香油《药性考》,丁香露《纲目拾遗》,百里馨、瘦香娇、索馨香、如字香《新纲》,丁子、母丁子《台湾药植志》,丁香树《药材学》

地方名 天津:丁字香;广西:小叶丁香;其他:山丁香、花丁香、大花丁香,玫瑰子。

功效 花蕾:温中降逆,补肾助阳。用于脾胃虚寒,呃逆呕吐,食少吐泻,心腹冷痛,肾虚阳痿;枝:用于一切冷气、心腹胀满,恶心,泄泻虚滑,水谷不消;根:用于风热毒肿;树皮:用于中寒脘腹胀痛,泄泻,齿痛。

#### 7118015

*Eugenia uniflora* L.

植物名 红果仔《中国植志》

文献名 扁樱桃、棱果蒲桃《台湾药植志》

地方名 广西:毕当茄,番樱桃。

功效 叶、果实:用于胃病。

#### 7118016

*Melaleuca leucadendron* L.

植物名 白千层《中国植志》

药材名 白千层《中国药植图鉴》

文献名 加耶布的《中国植物图鉴》,玉树《中国药植图鉴》,药白木(叶《生药》),药白树(李《药植》),药白柴《药学通报》,白树、油树《主要经济树木》,白千层叶《中药大辞典》

地方名 海南:千层皮。

功效 叶:芳香解表,祛风止痛。用于感冒发热,风湿关节痛,神经痛,肠炎腹泻。外用于过敏性皮炎,湿疹;树皮:安神。用于神经衰弱,失眠。

#### 7118017

*Melaleuca viridiflora* Brogn.

植物名 绿花白千层《广西药园药录》

药材名 白树油《广西药园药录》

功效 种子油:用于烧烫伤。

#### 7118018

*Psidium guajava* L.

植物名 番石榴《南越笔记》、《中国植志》

药材名 番石榴《广西中药志》

文献名 秋果《南越笔记》,鸡矢果、(黄肚子)《名实图考》

地方名 擢拔、木八仔(台湾、广西),那拔(福建、台湾),鸡屎果、番稔、花稔(广东、云南),罗拔(安徽、福建),交桃(台湾、贵州、云南),林拔(福建、广西);福建:那勃(晋江),那佛、奈仔拔(厦门),罗仔拔、番李仔(诏安),蓝拔(厦门、漳州);台湾:那拔心[叶],那拔根,拔仔,那拔扒仔,莉仔菱,梨仔菱;广东:拔子(惠阳、梅县、兴宁),拔叶(龙川、连平、河源),扒仔(普宁、陆丰),石榴(南海、顺德、清远、番禺),拔子树(五华),秋果叶(阳春),花稔果、鸡屎稔、枝子(梅县),番桃木(湛江),番稔叶(高要);广西:番桃(南宁、博白、忻城、马山),甲屎果,鸡矢茶,百子树,柏拉叶,柏拉菜,郊桃,喇叭,番石

榴干;四川:广东石榴,红心果,拿把果;云南:冬桃、广石榴、米石榴、瘴气果(红河),胶子果(思茅),椒桃树(西畴),番头果、番桃果(滇东南),“麻贵香啦”(西双版纳傣语),香石榴(龙陵),麻里杆,椒桃,缅甸桃,番桃叶。

功效 叶、果:收敛止泻,消炎止血。用于急、慢性肠炎,痢疾,小儿消化不良;鲜叶:外用于跌打损伤,外伤出血,瘰疬久不愈合;树皮(煨灰):外用于湿毒疥疮。

## 7118019

*Rhodomyrtus tomentosa* (Ait.) Hassk.

植物名 桃金娘《中国植志》

药材名 桃金娘《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 山荃《本草求真》,倒捻子、都捻子、海漆、黏子、倒黏子《纲目拾遗》,岗粘子《名实图考》,姑娘木《指示植物》,山捻子《生草药性备要》,白花红捻、岗捻、岗捻子、都念子、倒念子《岭南采药录》

地方名 水刀莲(台湾、湖南、广东),稔子木、稔子树(广东、广西),桃娘(福建、湖南),捻子、豆捻、山旦仔、多莲(福建、广东、广西),岗捻(浙江、福建、湖南、广东、广西),当梨(福建、湖南、广东、广西),哆年(台湾、广东);福建:多奶,山多奶,山哆年,山中年,苏园子(宁化),石榴子(武平),白当奶,中年,中莲,刀莲,丁莲,多能,唐莲;台湾:刀年,水哆年,哆年仔;广东:岗捻花,多年(潮安),山多捻、乌肚子、当梨子、石捻、马捻、马奶怪、塔炼里、山拈、山吊灯(新会),山捻根(广州),当梨根(梅县),稔子根;海南:江捻;广西:豆捻子,豆捻干,捻子叶(柳江、苍梧),捻果子(龙州),捻果(南宁、龙州),山粘子,桃荃,逃军粮,麦捻;云南:白碾子;其他:捻,倒水拈。

功效 根:祛风活络,收敛止泻。用于急、慢性胃肠炎,胃痛,消化不良,肝炎,痢疾,风湿性关节炎,腰肌劳损,功能性子宫出血,脱肛。外用于烧烫伤;叶:收敛止泻,止血。用于急性胃肠炎,消化不良,痢疾。外用于外伤出血;果:补血,滋养,安胎。用于贫血,病后体虚,神经衰弱,耳鸣,遗精。

## 7118020

*Syzygium araoeladum* Merr. et Perry

植物名 线枝蒲桃《中国植志》

文献名 纤枝蒲桃《拉汉英种称》

地方名 广西:米碎木(上思)。

功效 根:用于泄泻;叶:止痛。

## 7118021

*Syzygium austrosinense* (Merr. et Perry) Chang et Miao  
--- *S. buxifolium* Hook. et Arn. var. *austrosinense* Merr. et Perry

植物名 华南蒲桃《中国植志》

文献名 华南赤楠《广西药录》,南赤楠蒲桃《海南植志》

地方名 广西:小山捻(岑溪)。

功效 全株:收敛。

## 7118022

*Syzygium brachyantherum* Merr. et Perry

植物名 短药蒲桃《中国植志》

药材名 野冬青果《新华本草纲要》

地方名 广西:“梅牢”(壮语);云南:沙糖树果(屏边)。

功效 果、茎叶:用于急性哮喘,过敏性哮喘,肺结核。

## 7118023

*Syzygium brachythyrsum* Merr. et Perry

植物名 短序蒲桃《中国植志》

药材名 野冬青果《云南中草药》

地方名 云南:麻里果(玉溪),沙糖树果(屏边),野冬青皮。

功效 果实、茎皮、叶:润肺定喘。用于肺结核,哮喘。

## 7118024

*Syzygium bullockii* (Hance) Merr. & Perry

植物名 黑嘴蒲桃《中国植志》

文献名 蒲氏蒲桃《广西药录》

地方名 海南:碎叶子,黑嘴树;广西:小托盘木(博白),水榕木(北流),鹅肾木(灵山)。

功效 果、叶:补虚寒。叶:外用于接骨,消肿,止痛;根:用于烧伤,烫伤,跌打损伤。

## 7118025

*Syzygium buxifolium* Hook. et Arn.

植物名 赤楠《中国植志》

药材名 牛金子《名实图考》、《汇编》

文献名 赤楠蒲桃《海南植志》

地方名 瓜子柴(江西、湖南、海南),山乌珠(江西、海南);浙江:山石榴(丽水、云和),石柃、石铃、麒麟柴(温州、东清、瑞安、永嘉、仙居);江西:千年矮;福建:千年树,鱼鳞木;湖南:瓜子草,米仔树,碎米子,碎米子树,碎米树,碎米花根;海南:细子莲,细叶紫藤树;广西:三叉鸡全头(北流),火粘蚁(平南),山捻(金秀),罗雷树(罗城),小叶蒲桃,瓜子木,假黄杨,螺屎米。

功效 根或根皮:清热解暑,利尿平喘。用于浮肿,哮喘。外用于烧烫伤;叶:用于瘰疬,疔疮,漆疮,烧烫伤。

## 7118026

*Syzygium cumini* (L.) Skeels

植物名 乌墨(海南)、《中国植志》

药材名 野冬青果《云南中草药》

文献名 野冬青皮《思茅中草》,海南蒲桃《海南植志》

地方名 子楝树、毒狗树(华南),羊屎果(广西、云南),乌木、乌口树(云南、海南);台湾:蜜宝莲;海南:乌桕,黑墨树;广西:楠木(武鸣),厚皮木(邕宁),“枚拉”(壮语);云南:十年果、蒲桃(思茅),叶叶红、西洋果、洋草果(屏边),小麻柄果(新平),麻里果,麻栗果,〔百合〕,〔野百合〕,山蒲桃;西藏:“沙木哲”(藏名)。

功效 果实、茎皮、叶:润肺定喘。用于肺结核,哮喘。

## 7118027

*Syzygium fruticosum* (Roxb.) DC.

植物名 簇花蒲桃《中国植志》

文献名 黑叶蒲桃《云南种录》

地方名 云南:灌木蒲桃,水榕树(河口),黑果树、冲果(思茅),鼻虫窝树、鼻虫窝(建水)。

功效 树皮:驱蛔虫。

备考 《中国植志》(1984)黑叶蒲桃学名为 *S. thumra* (Roxb.) Merr. et Perry, 产云南西双版纳。

#### 7118028

*Syzygium grijsii* (Hance) Merr. et Perry

植物名 轮叶蒲桃《中国植志》

药材名 山乌珠(福建)、《汇编》

文献名 狭叶赤楠《福建药物志》,三叶赤楠《高植图鉴》

地方名 福建:构铃子、米筛子樵、紫藤子、赤楠(清流、宁化),香雪子(永安),洋柴金芽(三明),赤林(平潭);广西:火粘蚊(平南),锦鸡木(藤县)。

功效 根、叶:祛风散寒,活血破瘀。用于跌打损伤,风寒感冒,风湿头痛。

#### 7118029

*Syzygium jambos* (L.) Alston

植物名 蒲桃《中国植志》

药材名 蒲桃《汇编》

文献名 菩提子、无患子《花镜》,蒲桃树《罗浮志》,蒲桃壳《纲目拾遗》,撵布、南无、香果、檐木、攘波《植物名汇》,蒲桃子(李《药植》),蒲桃种子《中药大辞典》

地方名 凤鼓(台湾、广东);台湾:南蕉,香娇心;海南:水葡萄,水蒲桃,水石榴,水桃树;广西:鸡屎木(凤山),[番石榴](融安),水蒲桃(那坡);云南:水蜜桃木(河口)。

功效 根皮、果:凉血,收敛。用于腹泻,痢疾,刀伤出血;果壳:用于呕逆;种子:用于糖尿病。

#### 7118030

*Syzygium malaccense* (L.) Merr. et Perry

植物名 马六甲蒲桃《中国植志》

文献名 红花蒲桃《云南种录》,马来蒲桃《台湾植志》

地方名 云南:洋蒲桃(景洪),马窝果(河口),果马根(橄榄坝)。

功效 树皮:用于鹅口疮;叶:用于舌头疾患;根:用于皮肤痒,灭虱。

#### 7118031

*Syzygium samarangense* (Blume) Merr. & Perry

植物名 洋蒲桃《中国植志》

药材名 莲雾《台湾药植志》

地方名 金山蒲桃(广东、广西);台湾:莲雾,鞞雾;广西:南洋蒲桃。

功效 树皮:用于鹅口疮;叶:用于舌头疾患;根:用于皮肤痒,灭虱。

#### 7118032

*Syzygium tetragonum* Wall. --- *S. nienkui* Merr. et Perry

植物名 四角蒲桃《中国植志》

文献名 棱翅蒲桃《海南植志》

地方名 广西:念劬蒲桃,山石榴(平南),小蓉木;云南:大树果、时令树果(屏边)。

功效 根:用于风湿,跌打损伤。

### 7119 玉蕊科 *Lecythidaceae*

#### 7119001

*Barringtonia asiatica* (L.) Kurz

植物名 滨玉蕊《中国植志》

文献名 棋盘脚树《台湾药植志》

功效 果实:可毒鱼。

#### 7119002

*Barringtonia racemosa* (L.) Spreng.

植物名 玉蕊《中国植志》

文献名 细叶棋盘脚树《台湾药植志》

地方名 台湾:水茄苳,水贡仔。

功效 叶、根、树皮:外用于肤痒及水痘;果汁:外用于鼻溃疡;果实:用于咳嗽,哮喘,腹泻。外用于皮肤病;种子:用于腹痛,疝痛,眼病。

### 7120 野牡丹科 *Melastomataceae*

#### 7120001

*Allomorpha balansae* Cogn.

植物名 异形木《中国植志》

药材名 异形木《广西药录》

地方名 广西:黄金梢(博白),山暗赤(藤县),山陀螺(防城),肖风木。

功效 根、茎:用于风湿骨痛,子宫脱垂,跌打。

#### 7120002

*Astronia ferruginea* Elmer

植物名 褐鳞木《中国植志》

文献名 锈叶野牡丹《台湾药植志》

地方名 台湾:大叶金石榴。

功效 叶:用于下痢。

#### 7120003

*Barthea barthei* (Hance) Krass.

植物名 棱果花《中国植志》

药材名 棱果木《广西药录》

文献名 刚毛药花《拉汉英种称》

地方名 芭茜(湖南、广西);台湾:大野牡丹。

功效 根、叶:止痛。

#### 7120004

*Blastus apricus* (Hand. -Mazz.) H. L. Li

植物名 线萼金花树《中国植志》

地方名 湖南:叶下红;广西:细黄金梢(博白),白骨丹(田林)。

功效 全株:用于水肿,月经不调,跌打损伤,疮疖。

#### 7120005

*Blastus apricus* (Hand. -Mazz.) H. L. Li var. *longiflorus* (Hand. -Mazz.) C. Chen

植物名 长瓣金花树《中国植志》

地方名 广西:沙崩(苍梧)。



功 效 全株:用于疮疖。

## 7120006

*Blastus cavaleriei* Levl. et Van.

植物名 匙萼柏拉木《中国植志》

药材名 丁锅树《广西药录》

文献名 黔贵野锦香、黔贵柏拉木《广西植录》

地方名 广西:毛秀才。

功 效 叶:止血。用于白带多。

## 7120007

*Blastus cochinchinensis* Lour.

植物名 柏拉木《中国植志》

药材名 山崩砂《广西》、《汇编》

文献名 崩沙木、山暗丹《药植简编》

地方名 黄金梢《广东、广西》;海南:山甜娘;广西:河崩木、细叶沙崩、山阴木(苍梧)、白泡(大瑶山)、白筋(陆川)、白暗赤(藤县、平南)、四大天王(博白)、野锦香、崩疮药、红姑娘、黄金木(武鸣);其他:黄京木。

功 效 根:收敛止血,消肿解毒。用于产后流血不止,月经过多,肠炎腹泻;叶:用于跌打损伤,外伤出血,疮疡溃烂。

## 7120008

*Blastus dunnianus* Levl.

植物名 金花树《中国植志》

药材名 金花树《广西药录》

文献名 巨萼柏拉木《高植图鉴》

地方名 广西:六便狼、谷皱草(全州)、山暗赤(钟山)。

功 效 全株:用于风湿,止血;叶:外用于疮疖。

## 7120009

*Blastus pauciflorus* (Benth.) Guillam.

植物名 少花柏拉木《中国植志》

地方名 广西:黄京生(北流)。

功 效 全株:生肌。用于疥疮。

## 7120010

*Bredia amoena* Diels

植物名 秀丽野海棠《中国植志》

药材名 野海棠《汇编》

地方名 浙江:大叶活血、[活血丹]、山糖浆(临安)、白矮茶(云和)、大号狗卵、老鼠柴(平阳)、和血丹(泰顺)、高脚山茄(仙居、温州、青田、乐清)、高脚山落茄。

功 效 根、全草:祛风利湿,活血调经。用于风湿性关节炎,月经不调,白带,跌打损伤,毒蛇咬伤。

## 7120011

*Bredia esquirolii* (Levl.) Lauener var. *cordata* (H. L. Li) C. Chen

植物名 心叶野海棠《中国植志》

地方名 广西:血麻(全州)、凤凰草(灌阳);四川:红水麻叶、向天葫芦、鸡窝红麻、罐罐草、山红活麻(重庆)。

功 效 全株:用于胃出血,鼻衄,月经不调,崩漏,白带多,痢疾,手脚麻木。

## 7120012

*Bredia longiloba* (Hand. -Mazz.) Diels --- *Fordiophyton gracile* Hand. -Mazz. var. *longilobum* Hand. -Mazz.

植物名 长萼野海棠《中国植志》

地方名 湖南:血经草、天青地红、女儿红、叶下红、紫背红;贵州:露水葛(荔波)。

功 效 全株:祛风利湿,活血通络。用于风湿关节炎,痢疾,咳嗽,月经不调,白带,跌扑伤肿。

## 7120013

*Bredia oldhamii* Hook. f.

植物名 金石榴《中国植志》

药材名 金石榴《台湾药植志》

地方名 台湾:金榭榴、[地丁]。

功 效 花:用于肠炎。

## 7120014

*Bredia quadrangularis* Cogn.

植物名 过路惊《江西》、《中国植志》

功 效 全株:用于小儿夜间惊哭。

## 7120015

*Bredia sessilifolia* H. L. Li

植物名 短柄野海棠《中国植志》

地方名 广西:水牡丹。

功 效 根:止咳。

## 7120016

*Bredia sinensis* (Diels) H. L. Li --- *Tashiroea sinensis* Diels

植物名 鸭脚茶(福建)、《中国植志》

文献名 中华野海棠《高植图鉴》

地方名 浙江:山落茄、高脚山落箕(温州);福建:九节兰、雨伞子。

功 效 根:用于小儿腹泻;叶(煎水洗身):用于感冒。

## 7120017

*Bredia tuberculata* (Guillam.) Diels --- *B. omeiensis* H. L. Li

植物名 红毛野海棠《中国植志》

文献名 西南野海棠《广西植录》、峨眉野海棠《峨眉药植资源》、瘤药野海棠《峨眉药植研究》

地方名 四川:山红活麻、紫背金牛(峨眉山)。

功 效 全草:祛风除湿,活血祛瘀。

## 7120018

*Fordiophyton faberi* Stapf --- *Bredia cavaleriei* Levl. et Van.

植物名 异药花《中国植志》

文献名 伏毛肥肉草《高植图鉴》、峨眉异药花《云南植志》、卡氏野海棠《贵州药录》

地方名 四川:凤顶红(峨眉山)、臭骨草、酸猴儿(宜宾);贵州:血螃蟹(镇远)。

功 效 全株:清热凉血,润肺止咳。用于吐血,咽喉肿痛,肺热咳嗽;叶:用于漆疮。

## 7120019

*Fordiophyton fordii* (Oliv.) Krass. --- *Sonerila fordii*

Oliv.

植物名 肥肉草《中国植志》

文献名 异药花《贵州药录》

地方名 贵州:家构(雷公山)。

功效 全株:清热利湿,祛瘀消肿。用于痢疾,吐血,腹泻,痔疮。

## 7120020

Medinilla assamica (C. B. Clarke) C. Chen --- M. spirei Guillam.

植物名 顶花酸脚杆《中国植志》

药材名 牛皮草《云南药录》

地方名 海南:美丁花;云南:酸藤子(河口)。

功效 叶:退烧。用于小儿发热。

## 7120021

Medinilla septentrionalis (W. W. Smith) H. L. Li

植物名 北酸脚杆《中国植志》

文献名 北裂脬肚丹《广西植录》,美丁花《药植简编》,北美蒂花《广西药录》

地方名 广西:木夕(桂平),北美丁花,黄稔根(上林)。

功效 根:用于小儿惊风。

## 7120022

Melastoma affine D. Don --- M. polyanthum Blume

植物名 多花野牡丹《中国植志》

药材名 多花野牡丹《汇编》

文献名 兰屿野牡丹《台湾药植志》

地方名 福建:老鼠丁根;台湾:基尖叶野牡丹;广东:山甜娘,水石榴(阳春),乌提子,瓮登木;四川:朝天罐(峨眉山);云南:〔打破碗花花〕,炸腰果,酒瓶果,破碗掌角树,催生药(景东),野广石榴,爆肚叶。

功效 根、叶、全株:清热利湿,化瘀止血。用于消化不良,痢疾,肠炎,肝炎,衄血。外用跌打损伤,外伤出血。

## 7120023

Melastoma candidum D. Don --- M. septemnerium Lour.

植物名 野牡丹《中山传信录》、《中国植志》

药材名 野牡丹《福建民间草药》

文献名 猪姆草、山石榴、哑口吧《植物名汇》,假稔子《指示植物》

地方名 毛稔(广东、海南、云南),金石榴(福建、台湾),爆牙郎、大金香炉(广东、广西);浙江:高脚山落苏、〔活血丹〕(遂昌);福建:野石榴,金鸡腿,水多年(厦门、漳州、同安),大号地茄(霞浦),大杜桥(福州),大渡桥、大本狗梳、大号狗兜、大号金石榴、白通光、西林金、高地茄、鹿头草(福安),水丁莲、水多莲(厦门),大号天香炉(邵武),高脚埔梨(龙岩),满山红,地桥头,野柿,野多年,山栗子,鸡姆草;台湾:不留行,〔王不留〕,〔王不留行〕,九螺仔花,金榭榴,埔笔仔;广东:山样埔苕(普宁),山麻客、杜苕、厚酒瓮、假多年(饶平),水流稔、扣口稔(高州),牛西册,白哨牙郎,赤矛郎(阳江),猪枯稔,哨牙郎(罗定),企枝杜必(潮安),彪牙郎(乐昌),硬

枝埔苕、高脚埔苕(潮阳),高脚地稔(河源),高脚乌稔(五华),开口枣、高脚稔、猪麻稔、爆牙稔(惠阳),牛麒稔,猪麒稔;海南:鸡头草,鸡头果,细种鸡头(乐东),细种地狗丹(琼中),细黑口子,九重(定安),猪膏稔,稔花;广西:水亚策(贵县),豹牙郎木(陆川),擗牙郎(合浦),三面筋,羊开口;四川:谷口吧,毡子杆,老虎杆,毛脚杆,小毛香,毛张口,〔商陆〕,罐罐草,倒罐草,朝天罐,毛足杆;云南:小马福、小艳山红、小遍山红、红爆牙郎、炸腰泡、豹狗吉(文山),“豹牙兰”(河口瑶语);其他:母猪稔,赤牙郎,炸腰果,痢疾罐。

功效 根、叶:清热利湿,消肿止痛,散瘀止血;根:用于消化不良,肠炎,痢疾,肝炎,衄血,便血,血栓闭塞性脉管炎;叶:外用跌打损伤,外伤出血。

## 7120024

Melastoma dodecandrum Lour.

植物名 地苕《中国植志》

药材名 地苕《岭南采药录》、《汇编》

文献名 山地苕《生草药性备要》,地茄《名实图考》,〔铺地锦〕《岭南采药录》,野牡丹《种称》

地方名 地樱子、百日红(华南),地苕、铺地苕、地苕藤(广东、广西),〔地瓜〕(江西、湖南),地石榴(湖南、广东、广西),地茄子(江西、福建、湖南),小号地茄(福建、广西);浙江:山辣茄,地茄根,红地茄,野落苏(金华、衢县),紫茄子;江西:〔九头狮子草〕,山地茄、地螺丝、地落苏(婺源),爪荇草(余干),白骨草(吉水),地蓝子(吉安),地稔子,库卢子,盘地蜈蚣,婆罗草;福建:古柑,苦含,金头石榴(泉州),小号埔淡(龙海、华安、同安、福州、厦门),土地榆(龙海、周宁、罗源、福鼎),杜茄(罗源、闽清、福州),牛奶子、土伦子(清流),牛奶根(永安),土地乌(大田),直桥锦、细狗狗穗(福鼎),玉鼓、路茄(罗源),菠萝罂子,矮脚扑翁(上杭、南平、武平、建瓯),覃犁仔(三明);湖南:水汤泡,毛冬瓜,土茄子,地蒲根,猫儿眼睛草,掉茄,提脚龙;广东:小多年、乌稔、牛奶佬、地脚稔、鸡莺子、铺砧(潮阳),地脚苕,地甲草(乐昌),山地苕、矮脚埔苕、当梨子(潮安),红廷仔(揭阳),撻地苕,撻地苕,坡地杜必,落地苕,铺芦草,铺地藤(东莞),连地苕(英德),短地苕(五华),矮脚地苕(河源),埔苕(普宁),磨地苕(从化、花县、高州、增城、东莞);广西:卜地疳(罗城),火炭苞,地吉桃,地葡萄(资源),地红花,地稔叶(岑溪),地稔草(平南),地稔根(梧州),地桥,地枇杷,铺地杨梅(富川),铺地莲、铺地野牡丹,铺轮子,埔雷子草,埔淡草,狗卵子,狗螺仔,杜槿藤,赤边莲子,鸟罗仔,矮脚金香炉,被罗罂子,葡萄罂子;四川:红水麻、地砧(重庆)。

功效 全株或根:清热解毒,祛风利湿,补血止血。用于预防流行性脑脊髓膜炎,肠炎,痢疾,脓疮,盆腔炎,子宫出血,贫血,白带,腰腿痛,风湿骨痛,外伤出血,蛇咬伤。

## 7120025

Melastoma intermedium Dunn

植物名 细叶野牡丹《中国植志》

地方名 台湾:水社野牡丹;海南:山公榴;广西:敷

地莲, 铺地莲, 铺地捻(武鸣、上林、横县、靖西、桂平)。

功效 全草; 用于痢疾, 口腔炎。外用下毒蛇咬伤。

#### 7120026

*Melastoma normale* D. Don

植物名 展毛野牡丹《中国植志》

药材名 大金香炉《南宁药志》

文献名 肖野牡丹《广西植志》

地方名 炸腰果、茶罐叶、野广石榴、爆牙郎(广西、云南); 野牡丹(江西、云南); 福建: 风不动(厦门); 海南: 鸡头肉, 毛捻, 猪姑捻, 猪鬃捻; 广西: 天红地白(融安), 开口枣(罗城), 白爆牙郎, 石老虎(来宾), 羊开口, 假豆捻(南宁), 假桃蕊, 豹牙郎、金香炉(梧州), 黑口莲; 四川: [商陆], 毛张口、秋牡丹、老虎杆、渣口巴(重庆), 张口叭, 猫儿杆, 喳叭叶, 朝天罐(峨眉山), 倒罐草, 蓬蓬黄; 云南: 打破碗花树, 打碗花树(红河), 水烟屎果(玉溪), 马缨花, 炸腰花, 洋松子(河口), 蚂蚁花, 窄腰泡, 毡帽泡花(西畴), 麻叶花(屏边)。

功效 根、叶: 收敛, 止血, 解毒。用于泄痢, 崩漏带下, 内外伤出血。

#### 7120027

*Melastoma sanguineum* Sims

植物名 毛蕊《中国植志》

药材名 红毛蕊《汇编》

文献名 毛蕊《海南植志》, 毛蕊《高植图鉴补编》

地方名 豺狗舌、红爆牙郎(广东、广西); 广东: 大叶猪鬃捻(高要、高鹤), 大牙郎、红心牙郎(湛江), 大海口朵(广宁、四会、德庆、封开、怀集), 大叶猪古捻、哨牙(阳春), 梢牙郎(电白、徐闻、海康、遂溪、廉江), 开口枣, 牛鬃捻(番禺), 山勃贼、崩砂药(罗定、新兴), 红暗擦(化县), 红芯、豺狗捻、黄廉利、猪姑捻、铲牙郎(惠阳), 有毛板牙郎(清远), 赤矛郎(高州、化州、阳江、阳春、茂名), 茶狗舌(台山、新会), 野牡丹(新会), 猪鬃捻(新会、从化、花县、增城); 海南: 鸡头(乐东、儋县), 毛密(澄迈、琼海), 南洋茶(海口、定安、屯昌), 山狗丹(琼中), 木子(琼山), 射牙郎, 亭娘, 甜娘(澄迈), 鸡头木, 鸡头叶(白沙); 广西: 大红英, 大暗影(藤县), 山特勒(博白), 山啄咯(陆川), 山豹牙郎(桂平), 长叶金锦香, 长叶金香炉(南宁), 红花野牡丹, 豹牙郎(博白、北流), 红狗杆木, 豹牙根(平南), 黄狸胆, 猛虎下山。

功效 根、叶: 止血, 止痢。用于便血, 月经过多, 腹泻。外子创伤出血。

#### 7120028

*Memecylon ligustrifolium* Champ.

植物名 谷木《中国植志》

药材名 谷木《广西药录》

文献名 壳木《高植图鉴》

地方名 广东: 山稳仔; 海南: 角木, 鱼木, 子楝树, 山梨子; 广西: 爬石榕(天等), 子陵木。

功效 枝、叶: 用于腰背疼痛, 跌打损伤。

#### 7120029

*Memecylon scutellatum* (Lour.) Hook. et Arn.

植物名 细叶谷木《中国植志》

文献名 小叶谷木《拉汉英种称》

地方名 海南: 羊角, 羊角扭; 广西: 直木梢(北海), 螺丝木, 铁树。

功效 叶: 外用干痢疮溃疡。

#### 7120030

*Osbeckia capitata* Benth.

植物名 头序金锦香《中国植志》

文献名 头花金锦香《西昌中草药》

地方名 四川: 朝天贵, 金锦香(西昌)。

功效 全草: 消炎, 止血, 祛风湿。用于咳嗽, 蜂窝疮, 痢疾, 红崩, 风湿骨痛, 牙痛, 脱肛, 产后寒。

#### 7120031

*Osbeckia chinensis* L.

植物名 金锦香《中国植志》

药材名 金锦香《汇编》

文献名 天香炉《生草药性备要》, 天吊香《岭南采药录》, 芦柳叶花《植物名汇》, 紫金钟《民间药与验方》

地方名 金香炉(浙江、福建、广东、广西), 铁香炉、仰天钟(广东、广西), 朝天罐(安徽、江西、云南), 七孔莲(浙江、江西), 金钟草(安徽、广东、广西), 柳叶花(湖南、广东), 金石榴(浙江、福建、台湾), [王不留行](上海、浙江); 浙江: 仰天金钟, 朝天石榴(临安), 紫花蛇舌草; 安徽: 红花果; 江西: 张天杯(婺源), 它不合(吉水), 张天缸, 昂天巷子, 小叶装天罐、田螺草(泰和), 小张天罐, 白天葫芦, 金鸡腿(贵溪); 福建: 山牡丹、七星坠地(泉州), 葫芦草(罗源), 细架金石榴(东宁), 小号王不留行(同安), 小银台(福州), 石榴草(福安), [竹叶地丁], 埂西榴(松政), 金树榴(厦门), [金牛草](宁德); 台湾: 小留行, [紫地丁], 张天刚; 湖南: 九盏灯, 小背笼, 化痰草, 向天石榴(郴县), 金杯草, 铃铃草、天虎草、金钟炉(常德), 罐子草(长沙、衡山), 张天罐(长沙), 杯子草(衡山), 细花包; 广东: 小叶装天器(南雄), 天炉(阳春), 响天钟(广宁), 昂天器祇(兴宁), 朝天杯(韶关), 细仰口盅(曲江), 铁牙草(茂名); 海南: 狗丹仔(琼中), 毛金英(海口), 五子菜(乐东), 装天瓮, 马松子; 广西: 仰天盅(陆川、蒙山、百色), 细金香炉、小金钟(南宁), 昂天钟(桂平), 昂天英(玉林), 木寻九、仰天罐(贵县), 独脚地粘(北流), 海天海螺(柳江、岑溪), 跳舞花(昭平), 小金香炉(百色), 四方金香炉(那坡), 细叶金香炉, 细九尺; 四川: 蜂窝草, 朝天贵, 罐罐草(重庆); 云南: 小朝天罐, 小倒罐果、莫达海良(保山), 小红参(临沧), 九里堂根, 火把草; 其他: 朝天瓮。

功效 全草: 清热利湿, 消肿解毒, 止咳化痰。用于急性细菌性痢疾, 阿米巴痢疾, 阿米巴肝脓肿, 肠炎, 感冒咳嗽, 咽喉肿痛, 小儿支气管哮喘, 肺结核咯血, 阑尾炎, 毒蛇咬伤, 疔疮疖肿。外用鲜全草捣烂敷患处。

#### 7120032

*Osbeckia chinensis* L. var. *angustifolia* (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen --- *O. angustifolia* D. Don

植物名 宽叶金锦香《中国植志》

地方名 四川: 不王留, 莞不留; 云南: 小酒瓶花, 马

儿杆、山石榴、茶罐花、蚂蚁花、蚂蚁棵、朝天罐(红河)。

**功效** 根或全株：清热利湿，收敛止血。用于肠炎、痢疾、胃痛、膀胱炎、咯血、便血、血崩、贫血、胎动不安、肺结核、外伤出血、癌肿，小儿疳积，小儿夏季热，疟疾等。

#### 7120033

*Osbeckia crinita* Benth.

植物名 假朝天罐《中国植志》

药材名 倒罐子(四川)

文献名 朝天罐《高植图鉴》

地方名 广西：毛金炉(乐业)，仰天钟(藤县)；四川：倒罐草、罐罐草(成都)，小倒果(西昌)，小朝天罐(峨眉山)，水萝卜，怪儿花(叙永)，[商陆]，救苦草；贵州：盅盅花，痢疾罐；云南：小倒贯果、火炼金丹、莫达海良、九果根(保山)，[小红参](临沧)，九里罐(思茅)，大坛花(昭通)，“阿不答石”(河口瑶语)，小尾光叶，冲天罐，张天缸，酒里坛，酒瓶罐，茶罐花，罐罐花。

**功效** 根：润肺止咳，收敛，止泻。用于咳嗽，咯血，痢疾，痔疮出血，小儿疳积。

#### 7120034

*Osbeckia mairei* Craib

植物名 三叶金锦香《中国植志》

**功效** 根：用于腹泻。

#### 7120035

*Osbeckia nepalensis* Hook. f.

植物名 蚂蚁花《中国植志》

药材名 大叶金锦香《汇编》

文献名 野牡丹、尼泊尔金锦香《汇编》

地方名 云南：响铃果，窄腰泡，“板楷”(屏边瑶语)。

**功效** 根：清肝热，消炎，止泻。用于黄疸型肝炎，肠炎，痢疾。外用于外伤瘀血。

#### 7120036

*Osbeckia opipara* C. Y. Wu et C. Chen

植物名 朝天罐《中国植志》

药材名 朝天罐《汇编》

文献名 张天刚《名实图考》，罗浮金锦香《中国药植图鉴》，花筒梗《植分学报》

地方名 大金钟(广东、广西)，向天罐(广西、贵州)，张天缸(江西、湖南)，罐子草(江西、湖南)；陕西：猫耳朵；浙江：山鸡腿(温州、瑞安)，金虾蟆、金钟石榴(平阳)；安徽：大叶装天罐，当天罐，野附片；江西：七孔莲，赤红莲，张天罐，朝天瓮子，紫金钟，痢症草，痢疾草，高脚红缸；福建：[地丁草](厦门、同安)，大叶张天碗子，金石榴，倒水莲，[紫花地丁]；台湾：阔锦香；湖南：“上江鹅”(侗语)，甜草(衡阳)，九坛花，九盏灯，九罐花，竹叶青，血板藤，水杨梅，背龙花，背笼草，线鸡腿；广西：仰天罐(柳州)，水菜蕨(苍梧)，仰天英(藤县)，金香炉(梧州)，天葡萄，公车木，公石榴，太公黄，向天葫芦，狗头拆，猪牯奶；贵州：天罐草，倒提壶，痢疾罐；其他：瓶子草。

**功效** 根、果：清热利湿，止咳，调经。用于急性胃炎，细菌性痢疾，消化不良，慢性支气管炎，吐血，月

经不调，白带。

**备考** 本种曾被大多数植物学和药学工作者误为 *O. crinita* Benth. ex C. B. Clarke(假朝天罐)，两者产地不同，形态区别大，应注意区别。

#### 7120037

*Oxyopora paniculata* (D. Don) DC.

植物名 尖子木《中国植志》

药材名 遍山红《贵州民间药物》

文献名 圆锥花尖子木《西昌中草药》，圆序尖子木《红河中草药》

地方名 广西：三叶藤(龙州)，[满山红](乐业)，丁锅树(武鸣)，朝天罐(天等、那坡)；四川：野枇杷；贵州：秤杆菜，暴牙郎；云南：刀口药、酒饼果(马关)，小爆罐(临沧)，大叶朝天罐，[映山红]、山红参、酒瓶花、酒瓶果、朝天林、(野牡丹)(红河)，“牙娥拔翠”(河口瑶语)，麦斗叶。

**功效** 全株：清热解毒，利湿。用于痢疾，疮疮，腹泻，月经过多，产后流血不止，吐血。

#### 7120038

*Phyllagathis cavaleriei* (Levl. et Van.) Guillaum.

植物名 锦香草《中国植志》

药材名 锦香草《广西药录》

文献名 熊巴掌《高植图鉴补编》

地方名 广西：山霸王(桂平)，猫耳朵草，铺地毯，熊巴耳，白毛虎舌毡(鹿寨)，老虎耳(金秀)。

**功效** 全株：外用于疮疡，刀伤。

#### 7120039

*Phyllagathis cavaleriei* (Levl. et Van.) Guillaum. var. *tankahkeei* (Merr.) C. Y. Wu ex C. Chen

植物名 短毛熊巴掌《中国植志》

地方名 江西：豆角消，猪婆耳；福建：叶下红，虎耳；广西：猫耳朵，熊巴耳，野虎耳草(全州)。

**功效** 叶：用于中耳炎。

#### 7120040

*Phyllagathis elattandra* Diels --- *Stapfiophyton elattandra* (Diels) H. L. Li

植物名 红敷地发《中国植志》

文献名 异药花《药植简编》，史他菲草《广西药录》

地方名 广西：石发，石莲(岑溪)，石单边救主(平南)，铺地毯(苍梧)。

**功效** 全株：清肺热，止咳，消肿。用于肺炎，肺结核，咳嗽，疮疖。

#### 7120041

*Phyllagathis fordii* (Hance) C. Chen --- *Bredia fordii* (Hance) Diels --- *B. Sepalosa* Diels

植物名 叶底红(福建)、《中国植志》

药材名 叶底红《湖南药物志》

文献名 野海棠《浙江药植志》，红背野海棠《江西药录》，江南野海棠《广西植录》，瑶山野海棠《广西药录》

地方名 浙江：叶下红、调经草(温州)；湖南：女儿红，血经草，紫背红；广东：假紫苏；广西：大毛蛇，血还

魂,还魂红,沙崩草(苍梧),四大天王(博白);其他:沙崩仔。

功效 全株:止痛,止血,祛瘀,调经。用于月经不调,吐血,跌打。外用于烫火伤,疥疮。

## 7120042

*Phyllagathis longiradiosa* (C. Chen) C. Chen

植物名 大叶熊巴掌《中国植志》

文献名 大叶野海棠《云南植志》

功效 全草:用于胃出血,咳血。

## 7120043

*Plagiopetalum esquirolii* (Levl.) Rehd. --- *P. blinii* (Levl.) C. Y. Wu ex C. Chen

植物名 偏瓣花《中国植志》

药材名 偏瓣花《贵州药录》

文献名 刺柄偏瓣花《云南植志》

功效 根:清热降火,解毒消肿。用于高烧,感冒,无名肿毒。

## 7120044

*Sarcopyramis bodinieri* Levl. et Van. --- *S. delicata* auct. non C. B. Robins.

植物名 肉穗草《中国植志》

药材名 肉穗草《贵州药录》

文献名 小肉穗草《云南植志》

功效 全株:清热利湿,凉血止血。用于赤痢,腹泻,吐血,咳嗽。

备考 《高植图鉴》(1972)将本种学名误订为 *S. delicata* C. B. Robins.

## 7120045

*Sarcopyramis nepalensis* Wall.

植物名 楮头红《中国植志》

药材名 楮头红《四川中药志》

文献名 尼泊尔肉穗草《四川中药志》

地方名 福建:风柜斗草(闽南);广西:耳环草(全州);四川:酸筒杆(峨眉山)。

功效 全草:清肺热,去肝火。用于风湿痹痛,耳鸣,耳聋,目雾羞明。

## 7120046

*Sonerila alata* Chun et How var. *triangula* C. Chen

植物名 短萼蜂斗草《中国植志》

地方名 广西:田螺掩(博白),山风穿筋藤。

功效 全草:通经活络。用于肿痛,跌打损伤。

## 7120047

*Sonerila cantonensis* Stapf

植物名 蜂斗草《中国植志》

药材名 桑勒草《广西植录》

文献名 广东桑勒草《广西药录》,桑叶草《海南植志》

地方名 广东:尖尾痧,喉痧药;广西:田螺掩、红春根藤(博白),四大天王,小金香炉(贺县),天青地红(德保)。

功效 全株:通经,活络,行血,解毒。用于跌打,肿痛,翳膜,痢疾,产后流血不止,蛇咬伤。

## 7120048

*Sonerila laeta* Stapf --- *Sonerila picta* auct. non Korth.

植物名 小蜂斗草《中国植志》

药材名 地胆《名实图考》,《云南植志》

文献名 彩斑桑勒草《红河中草药》

地方名 云南:小花草、花叶叶、花花草(红河)。

功效 全草:清热解毒。用于结膜炎,肺结核,胃痛,骨折,麻疯症,带状疱疹。

备考 《云南植志》(1979)将本种学名误订为 *S. picta* Korth.

## 7120049

*Sonerila rivularis* Cogn.

植物名 溪边桑勒草《中国植志》

文献名 湿生三蕊草《高植图鉴》

地方名 广西:〔映山红〕。

功效 全株:用于枪弹伤。

## 7120050

*Stapfiophyton degeneratum* C. Chen

植物名 败蕊无距花《中国植志》

地方名 广西:蛇迷草。

功效 全草:用于蛇咬伤。

## 7120051

*Styrophyton caudatum* (Diels) S. Y. Hu --- *Allomo-rphia caudata* H. L. Li --- *Oxyspora spicata* Maxw.

植物名 长穗花《中国植志》

地方名 云南:“假砍八竹”(哈尼族语)。

功效 根:用于子宫脱垂,脱肛。

## 7121 使君子科 Combretaceae

## 7121001

*Calycopteris floribunda* (Roxb.) Lam.

植物名 萼翅藤《中国植志》

功效 叶:强壮剂;果:兴奋剂。

## 7121002

*Combretum alfredii* Hance

植物名 风车子《名实图考》,《中国植志》

药材名 华风车子《广西中草药》

文献名 四角风《名实图考》

地方名 广东:使君子藤;广西:水蜜桃,可绿叶,驱蛔叶,肝炎木,清凉木,清凉树,糖藤(来宾)。

功效 根:清热,利胆。用于黄疸型肝炎;叶:驱虫。用于蛔虫病,鞭虫病;鲜叶:外用于烧烫伤。

## 7121003

*Combretum latifolium* Blume

植物名 阔叶风车子《中国植志》

地方名 云南:大叶地耳(元江),“吗哈查尼”(元江哈尼语)。

功效 根:舒筋活络,止泻止痛。用于跌打损伤,腹痛泄泻。

## 7121004

*Combretum wallichii* DC.

植物名 石风车子《中国植志》

药材名 石风车子《广西药录》  
文献名 紫风车子、凌云风车子、瓦氏风车子《植分学报》  
地方名 广西：黄丝藤（田林）；四川：牛板金。  
功效 全株：用于风湿骨痛。

## 7121005

*Lumnitzera racemosa* Willd.

植物名 榄李《中国植志》  
药材名 榄李《台湾药植志》  
地方名 广东：白榄；海南：滩疤树，滩疤梨。  
功效 果实：用于皮肤病；树液：用于鹅口疮，雪口病。

## 7121006

*Quisqualis indica* L.

植物名 使君子《中国植志》  
药材名 使君子《开宝本草》、《药典》  
文献名 留求子《南方草本状》，史君子（侯宁极《药谱》），水君叶《生草药性备要》，史君根《分类草药性》，杜蒺藜子、风棱御史、四君子《新纲》，五棱子《药材资料汇编》，冬均子《中药材手册》，川君子、建君子《药材学》，使君子叶、使君子根《中药大辞典》。  
地方名 君子（湖南、四川）；福建：色干子（厦门、同安），病痞子；台湾：山羊屎；广东：均子（广州），冬君子、锡痞子（潮安）；广西：水君本叶（平南），使君藤（博白），索子果（南宁）；云南：栽秧老，“木郎牛”（傣族语）；其他：君米，君子仁，印度使君子。

功效 果实：杀虫消积。用于蛔虫，蛲虫病，虫积腹痛，小儿疳积；根、叶：杀虫，开胃，健脾。

7121007

## 7121007

*Quisqualis indica* L. var. *villosa* C. B. Clarke

植物名 毛使君子《中国植志》  
药材名 使君子（四川）。  
文献名 蜀使君子、西蜀使君子《树分》，使君子、留求子《和汉药标本目录》，毛叶使君子《台湾中药材图鉴》  
地方名 四川：中国使君子，君米，君子仁。

功效 果实：驱虫，消积。

## 7121008

*Terminalia argyrophylla* Pott. et Prain

植物名 银叶诃子《中国植志》  
药材名 银叶诃子《广西药录》  
地方名 广西：大河子；云南：小河子（耿马、孟定），“曼纳”（傣语）。

功效 果：用于慢性咽喉炎，哮喘，慢性气管炎，慢性肠炎，便血。

## 7121009

*Terminalia arjuna* (Roxb.) Bedd.

植物名 三果木《台湾药植志》  
功效 树皮：用于胆汁病，心脏病，挫伤，骨折，溃疡病。

## 7121010

*Terminalia bellirica* (Gaertn.) Roxb.

植物名 毗黎勒《唐本草》、《中国植志》

药材名 毛诃子《药典》

文献名 三果《本草新注》，“帕如拉”（藏名）《药典》，毛诃树《中药材》

地方名 其他：（川棟）。

功效 果实：清热解毒，收敛养血，调和诸药。用于各种热症，泻痢，黄水病，肝胆病，病后虚弱。

## 7121011

*Terminalia catappa* L.

植物名 榄仁树《中国植志》  
药材名 榄仁《台湾药植志》  
文献名 戊土、古巴梯斯《中山传信录》  
地方名 广东：法国枇杷（湛江）；海南：山枇杷树，枇杷树。

功效 树皮：用于痢疾，肿毒；嫩叶：用于头痛，疔痛，赤痢。外用于皮肤病。

## 7121012

*Terminalia chebula* Retz.

植物名 诃子《中国植志》  
药材名 诃子《唐本草》、《药典》  
文献名 诃黎勒《金匱要略》，诃黎《千金方》，随风子（刘禹锡《传信方》），诃子核《图经》，毗黎勒、三果、婆罗得、婆罗勒《纲目》，苛子、阿子、柯子、涩翁《新纲》，西藏青果《饮片新参》，藏青果、西青果《中药材手册》，西藏橄榄《简明中医辞典》，诃子叶《中药大辞典》  
地方名 广西：青果，小诃子；四川：“阿儿纳穹”（若尔盖藏名）；西藏：“阿肉拉”（藏名）；其他：西橄榄，榄。

功效 果实：涩肠敛肺，降火利咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑。

7121013

## 7121013

*Terminalia chebula* Retz. var. *gangetica* Roxb.

植物名 恒河诃子《中药大辞典》  
功效 果实、叶、果核：涩肠敛肺，降火利咽。

## 7121014

*Terminalia chebula* Retz. var. *tomentella* (Kurz) C. B. Clarke

植物名 微毛诃子《中国植志》  
药材名 诃子《药典》  
文献名 绒毛诃子《药典》  
功效 果实：涩肠敛肺，降火利咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑。

## 7122 红树科 Rhizophoraceae

## 7122001

*Bruguiera cylindrica* (L.) Blume

植物名 柱果木榄《中国植志》  
药材名 柱果木榄《海洋药物》  
功效 果和胚轴：收敛。用于腹泻；叶：用于疟疾。

## 7122002

*Bruguiera gymnorrhiza* (L.) Poir.

植物名 木榄《中国植志》  
药材名 红树皮《台湾药植志》

文献名 红树《树分》

地方名 台湾：五跤梨，五脚里，红茄苳；广东：包萝剪定（徐闻），鸡爪浪（台山）；海南：剪定，枷定，鸡笼答、五足驴、长鼓（文昌）；广西：大头榄、鸡爪榄（合浦）。

功效 树皮：收敛。用于腹泻，偶治疟疾；根皮：止血。用于咽喉炎。

#### 7122003

*Bruguiera sexangula* (Lour.) Poir.

植物名 海莲《中国植志》

药材名 海莲《海南文昌》

地方名 海南：剪定树，小叶格拿梢，罗古。

功效 果和胚轴：收敛。用于腹泻；叶：用于疟疾。

#### 7122004

*Carallia brachiata* (Lour.) Merr.

植物名 竹节树《中国植志》

药材名 竹节树《广西药录》

地方名 广东：鹅管木，鹅唇木，鹅山木；海南：竹球、气管木、山竹公、山竹犁（澄迈、文昌），鹅件树（黎母岭、加积）；云南：弯心果（遮放），胭脂果，“麻杆李贺”（傣语）。

功效 果实：用于溃疡；树皮：用于疟疾。

#### 7122005

*Carallia diphyetala* Hand.-Mazz. --- *C. lanceaefolia* Roxb.

植物名 锯叶竹节树《中国植志》

药材名 锯齿王《汇编》

地方名 广西：大痧水（博白），大苦灯茶（平南），天云锯（昭平），飞天锯（藤县），铁锯齿（苍梧），百二齿（平南、藤县），鼻子王（桂平），蛇通关（罗城），假山桃（龙州），百六齿（南宁），鱼骨木，铁巴掌，广西鹅山木，“八哥”（壮语）。

功效 根、叶：清热凉血，利尿消肿，接筋骨。用于感冒发热，暑热口渴，妇女血崩，跌打肿痛，骨折，刀伤出血。

#### 7122006

*Ceriops tagal* (Perr.) C. B. Rob.

植物名 角果木《中国植志》

药材名 海加仔《药植简编》

文献名 细蕊红树《台湾药植志》

地方名 海南：剪子树、海枷子、海淀子（文昌）。

功效 全株：用于止血，收敛，代奎宁截疟；种子油：止痒。用于疥癣，冻疮。

#### 7122007

*Kandelia candel* (L.) Druce

植物名 秋茄树《中国植志》

药材名 水笔仔《台湾药植志》

文献名 水笔树《台湾药植志》

地方名 台湾：水笔，茄行树，茄藤树；广东：红榄，硬柴，红浪，浪柴（沿海岛屿）。

功效 树皮：含鞣质，可作染料并药用。

#### 7122008

*Rhizophora mucronata* Poir.

植物名 红茄苳《中国植志》

地方名 台湾：红树皮，栲皮，丹柄，茄藤，五梨跤；海南：厚皮。

功效 树皮、根：收敛，止泻，止血。用于咽喉炎，血尿。

### 7123 金丝桃科 Hypericaceae

#### 7123001

*Cratoxylum cochinchinense* (Lour.) Blume --- *Cratoxylum ligustrinum* (Spach) Blume

植物名 黄牛木《中国植志》

药材名 黄牛茶《药植简编》

文献名 越南黄牛木《海南植志》

地方名 广东：黄鸡丝烂（中山），狗牙茶（肇庆），土苏木（惠阳）；海南：雀笼木，黄尝；广西：山狗芽、九芽木、鸬鹚木、水杜果（平南），节节花（藤县），满天红、河线藤（北流），黄芽木（博白、北流、桂平、陆川、昭平），山狗牙（龙州），狗牙木（梧州），“茶咯桌”、“茶秧”、“美启烈”（壮语）；云南：“梅低优”、“埋丢炯”（傣语）。

功效 根、树皮、嫩叶：解暑清热，利湿消滞。用于感冒，中暑发热，急性胃肠炎，黄疸。

#### 7123002

*Cratoxylum formosum* (Jack) Dyer. ssp. *pruniflorum* (Kurz) Gogelein --- *Cratoxylum prunifolium* Dyer. --- *C. dasyphyllum* Hand.-Mazz.

植物名 红芽木《中国植志》

文献名 苦沉茶、红眼树《高植图鉴》，毛叶黄牛木《广西植志》，樱桃叶黄牛木《云南药录》

地方名 广西：茶盖（上思壮语），毛黄牛木、土茶（宁明、崇左）；云南：牛丁角（盈江），黄浆果（屏边），秧借没，酸浆树，[苦丁茶]。

功效 树皮、嫩叶：解暑清热，利湿消滞。用于感冒，中暑发热，急性胃肠炎，黄疸。

#### 7123003

*Hypericum acrocephalum* N. Robson

植物名 狭叶金丝桃《高植图鉴补编》

功效 根：清热利尿，散瘀解毒。

备考 芒种花

#### 7123004

*Hypericum ascyron* L.

植物名 黄海棠《中国植志》

药材名 红旱莲《汇编》

文献名 连翘、大翘《唐本草》，湖南连翘、云南连翘、[黄花刘寄奴]、芒种花《名实图考》，莲子草《中药志》，长柱金丝桃《东北草本植志》

地方名 伞旦花（东北），大金雀（山东、江苏、安徽），大叶连翘（浙江、湖北），牛心茶（辽宁、山东），[王不留行]（湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州），大叶牛心茶（湖北、广东），红旱莲草（江苏、上海、浙江），旱莲草（辽宁、江苏、上海、浙江、台湾），金丝蝴蝶（河北、山西、内蒙古、广西、四川），鸬鹚草（广东、广西），[刘寄奴]（江

西、湖北、湖南);辽宁:鸡心茶、鸡心菜、山辣椒;吉林:大金丝桃;河北:水黄花;山西:八宝茶;内蒙古:“阿拉坦-其克楚给”(蒙名);陕西:对月草、对经草(太白)、大对经草、大接骨丹(柞水),柳叶草(洛南),救急草;山东:大叶牛心菜(牙山、烟台),大金鹊(莒县、沂水),金丝海棠(崂山);江苏:大汗淋草、大旱莲草(南京),大茶叶,大精血(新海连),六安茶;安徽:对节树,降龙草,阳凤草;湖北:六月雪(神农架);湖南:一口青,九道梯,大样一支草,上天梯,土连翘(衡山),山连翘,双刀草,对叶草,叫子草,养子风(溆浦),养子香,青筒草,野翅草;广西:一枝箭、箭花茶、假连翘(南宁),大头草(大新),大箭草(柳江),上黄芩(乐业),小黄心草(邕宁),大黄心草,小连翘,四方草,房心草;四川:水甘草(西昌);云南:鸡蛋花。

**功效** 全草:凉血止血,清热解毒。用于吐血,咯血,衄血,子宫出血,黄疸,肝炎。外用于创伤出血,烧、烫伤,湿疹,黄水疮。

## 7123005

*Hypericum ascyron* L. var. *brevistylum* Maxim.

**植物名** 短柱金丝桃《东北药用植物》

**地方名** 牛心菜(东北)。

**功效** 全草:凉血,止血,平肝,消肿,散结,排脓,清热解毒。用于头痛,吐血,咯血,衄血,子宫出血,黄疸,肝炎。外用于创伤出血,烧烫伤,湿疹,疮疖,黄水疮;叶及花(牛心茶):清热解毒。

## 7123006

*Hypericum ascyron* L. var. *longistylum* Maxim. --- *H. ascyron* L. var. *vilmorinii* Rehder

**植物名** 东北长柱金丝桃《东北药用植物》

**文献名** 朝鲜长柱金丝桃《东检》

**地方名** 牛心茶(东北)。

**功效** 全草:凉血,止血,平肝,消肿,散结,排脓,清热解毒。用于头痛,吐血,咯血,衄血,子宫出血,黄疸,肝炎。外用于创伤出血,烧烫伤,湿疹,疮疖,黄水疮;叶及花(牛心茶):清热解毒。

## 7123007

*Hypericum attenuatum* Choisy

**植物名** 赶山鞭《中国植志》

**药材名** 赶山鞭《江苏药材志》

**文献名** 小金丝桃《种分》、乌腺金丝桃《东检》

**地方名** 小便草(东北),红旱莲、旱莲草(华东),野金丝桃(江西、广西),〔刘寄奴〕(陕西、四川);陕西:〔过路黄〕(凤县);山东:小金钟,小叶牛心茶,胭脂草;江苏:小儿茶(东海),小茶叶、小金雀(连云港),小旱莲(江宁),小连翘,小叶连翘,女儿茶,大小汗淋草;浙江:二十四节草;安徽:打字草,香龙草;湖北:对月草(神农架),小对叶草,黄花对月,地耳草;广西:“咯讯喊”(罗城仫佬语)。

**功效** 全草:止血,镇痛,通乳。用于咯血,吐血,子宫出血,风湿关节痛,神经痛,跌打损伤,乳汁缺乏,乳腺炎。外用于创伤出血,疮疖肿毒。

## 7123008

*Hypericum beanii* N. Robson *H. patulum* Thunb. var. *henryi* Vetch. ex Bean

**植物名** 黄花香《高植图鉴补编》

**药材名** 黄花香《红河中草药》

**地方名** 大花金丝梅(广西、云南);云南:小黄花、打烂碗花、〔过路黄〕、黄香棵、芒种花、栽秧花(红河)。

**功效** 根、叶:清肝利湿,解毒散瘀。用于急慢性黄疸型肝炎,泌尿道感染,结石,跌打损伤,毒蛇咬伤。

## 7123009

*Hypericum bellum* L.

**植物名** 美丽金丝桃《中国植志》

**药材名** 西藏土连翘《汇编》

**文献名** 土连翘《西藏中草药》

**地方名** 西藏:“甲擦旺秋”(藏名)。

**功效** 果实:清热解毒,祛风除湿,凉血止血,杀虫止痒。用于慢性肝炎,感冒,痢疾,口腔炎,蛔虫,皮炎等症。

## 7123010

*Hypericum elodeoides* Choisy --- *H. napaulense* Choisy

**植物名** 挺茎遍地金《中国植志》

**药材名** 对对草(云南)

**文献名** 挺茎金丝桃《高植图鉴补编》

**地方名** 四川:地耳草(合川);云南:对叶草(贡山),雀舌草,肝炎草,痧子草,腥鱼草。

**功效** 全株:活血,调经。用于月经不调。

## 7123011

*Hypericum erectum* Thunb. ex Murray

**植物名** 小连翘《中国植志》

**药材名** 小连翘《纲目》、《汇编》

**文献名** 小翘《唐本草》,七层兰、瑞香草《质问本草》,音切草、乙切草《新纲》,水木屋《食用植物图说》

**地方名** 对叶草(江西、湖南、四川、贵州),排香草(江西、湖南),小叶连翘(浙江、安徽);甘肃:火丹草(文县);江苏:小金雀(吴县);浙江:小元宝草,黄草(舟山),金石榴(临安),旱莲草(宁波、温州),麝香草(天台),〔红旱莲〕,〔千金子〕,旱莲草,千层塔;安徽:千层楼梯,对叶香,伤力草,野连翘,鞭杆草;江西:排草;广西:大田基、小罂麦(南宁);四川:奶浆草(峨眉),小对月草(重庆),小对叶草,苍蝇草(峨眉山)。

**功效** 全草:调经止血,解毒消肿。用于月经不调,消化道出血,吐血,衄血,外用于外伤出血,疮疖肿毒,毒蛇咬伤。

## 7123012

*Hypericum faberi* R. Keller ex Hand. - Mazz.

**植物名** 扬子小连翘《中国植志》

**药材名** 扬子小连翘《贵州药录》

**地方名** 四川:肝红(眉山);贵州:〔过路黄〕(盘县),鼻鼈药。

**功效** 全株:凉血止血,消肿止痛。用于风热感冒,风湿疼痛,跌打劳伤,鼻鼈,内出血。

## 7123013

*Hypericum geminiflorum* Hemsl. var. *simplicistylum*



(Hayata) N. Robson- *H. simplicistylum* Hayata

植物名 小双花金丝桃《中国植志》

药材名 翻魂草《台湾药植志》

功效 全草:用于吐血。

#### 7123014

*Hypericum hengshanense* W. T. Wang

植物名 衡山金丝桃《中国植志》

地方名 湖南:(王不留行)(蓝山县瑶名)。

功效 全草:舒筋活血,利尿消肿。

#### 7123015

*Hypericum hookerianum* Wight et Arn.

植物名 短柱金丝桃《中国植志》

药材名 苦连翘《云南大理》

文献名 金丝海棠《树分》,多蕊金丝桃《高植图鉴补编》,“加向汪秀”(藏名)《西藏药图》,华西金丝桃《广西植录》

地方名 云南:土连翘,〔过路黄〕(中甸),金丝桃(丽江)。

功效 果:清热解毒,祛风除湿,止血杀虫 用于肝炎,感冒,痢疾,口腔炎,皮炎,蛔虫病等;枝、叶:用于膀胱炎;叶:用于倒经,鼻衄。

#### 7123016

*Hypericum japonicum* Thunb. ex Murray

植物名 地耳草《中国植志》

药材名 地耳草《名实图考》、《汇编》

文献名 田基黄《岭南采药录》,水榴子、香草《质问本草》,斑鸠窝、雀舌草《名实图考》,蛇啞口《草木便方》,跌水草《分类草药性》,对口草、地鼻椒《植物名汇》,日本金丝桃《西昌中草药》

地方名 一枝香(福建、台湾),七寸金(江西、福建、台湾、广东、四川),小元宝草(江苏、浙江),七层塔(江苏、浙江、福建),田基王(江西、广西),合掌草(湖北、广东、四川),肝炎草(广东、云南),金锁匙(江西、福建、湖南),防蚊草(广东、广西),珍珠塔(浙江、福建),降龙草(河南、广东),黄花仔(福建、广东),黄花草(福建、广东、广西),女儿红(湖南、贵州),小田基黄(广西、四川),红孩儿(江西、贵州);江苏:对月草,对草(苏州);浙江:四方草(文成),田基草(永嘉),廿四节(乐清),土防风、枫草儿(龙泉),小叶金石榴(临安),细叶金石榴(天目山),大号千层塔(泰顺),千重楼;江西:寸金草,田边菊,小叶对口莲(吉安),飞机草(宜黄),对叶基(德兴),当日开花当日谢(泰和),〔犁头草〕,乌蝇草,救命王;福建:一条香,小叶隔食草(宁化),小叶七层塔、七对莲、户神翼、龙吐珠、四时春、四季春、田埂仔、蛇豹仔(泉州),小还魂草、〔黄花蒿〕(大田),黄花草(清流);台湾:小号一枝香,小翻魂,小返魂,出生老,〔向天蕪〕,献天盏,蛤仔草,铁钩竿,黄花仔草,黄花母;河南:蛇草,长虫草;湖北:五星草,小降龙草;湖南:小王不留行(衡山),光明草(通道),田叶黄、观音莲(永兴),痧子草(安东),雀香草(长沙),碎砂草(新宁),田基苋,莽壳草;广东:千下捶、千打捶(普宁、海丰),和虾草、禾虾气、细样田基黄(阳春),禾震气(兴宁),禾下尿、耳盘

草、黄花气、黄花草(五华),四稔捶(普宁),百花草(饶平),花香草(广州),〔鸡骨香〕(惠阳),散血丹(始兴),刺蕊草(新丰),〔白花蛇舌草〕,禾下丝,禾震气;广西:天花草(兴安),夜关门、金锁、银锁(全州),青蛙香(河池),金不换(柳江),黄花雾(陆川),黄药儿(苍梧),上天梯,七宫,〔王不留行〕,耳挖草,“思星”、“娘奴曼”(侗语),“奥罗能”、“桐根夜”(苗语);四川:〔刘寄奴〕(成都),蛇台口(重庆),小蚊药,小对叶草;贵州:雷公箭,对叶草,细瓜米叶;云南:小黄药(红河),小鞭打、细跌打(临沧),牙黄草(腾冲),胡椒草(思茅),蛇细草(文山),小兵打,小黄花,小黄花香,小疳药,青鱼胆,金星草,八金剛草,细黄条。

功效 全草:清热利湿,解毒消肿,散瘀止痛。用于肝炎,早期肝硬化,阑尾炎,眼结膜炎,扁桃腺炎。外用于痈疖肿毒,带状疱疹,毒蛇咬伤,跌打损伤。

#### 7123017

*Hypericum kouytchense* Levl.

植物名 贵州金丝桃《中国植志》

药材名 水香柴《汇编》

文献名 洱海连翘《滇黔纪游》

地方名 贵州:大过路黄(贵阳),上天梯,过路黄,〔刘寄奴〕,金丝梅;云南:金丝桃(昆明),土连翘,苦连翘。

功效 根、种子:解热利湿,消积活血,镇痛。用于妇女瘀瘕,月经不调,黄疸,痢疾。

#### 7123018

*Hypericum longistylum* Oliv.

植物名 长柱金丝桃《中国植志》

地方名 湖北:小连翘、小连召(神农架);四川:〔王不留行〕(青川)。

功效 果实:清热解毒,利湿。

#### 7123019

*Hypericum monanthemum* Hook. f. et Thoms. ex Dyet  
--- *H. trigonum* Hand. Mazz.

植物名 单花遍地金《中国植志》

文献名 长瓣金丝桃《高植图鉴补编》,单花金丝桃《新华本草纲要》

地方名 四川:花生草,观音草,双筋草,〔刘寄奴〕。

功效 全株:破瘀活血。用于痛经,月经不调。

#### 7123020

*Hypericum monogynum* L. --- *H. chinense* L.

植物名 金丝桃《中国植志》

药材名 金丝桃《三才图会》、《汇编》

文献名 金丝草、贵重花《植物名汇》,华金丝桃《药植简编》

地方名 土连翘(安徽、湖南),金丝海棠(浙江、安徽、河南),水面油(浙江、江苏);陕西:金丝莲、金线莲(石泉);浙江:木本黄开口(长兴、吴兴),金丝蝴蝶(乐清);安徽:狗胡花(霍山);湖北:〔刘寄奴〕(神农架),大过路黄;湖南:五心花,照月莲;广西:山狗木(柳州),小狗木,黄心草,“妈机手”(罗城佬佬语);四川:〔过路黄〕(奉节),地马桑、夜来花树,金线蝴蝶,坝上黄。

**功效** 根、全草：清热解表，祛风消肿。用于急性咽喉炎，眼结膜炎，肝炎，腰痛，蛇咬伤；果实：用于肺病。

百日咳；叶：用于恶疽，胃痉挛，肿毒；花：外用于热疮肿毒。

#### 7123021

*Hypericum ocmoecephalum* Stapf

**植物名** 栽秧花《云南种录》

**功效** 根：止痢；果：用于黄水疮；全株：用于肾炎。

#### 7123022

*Hypericum perforatum* L.

**植物名** 贯叶连翘《中国植志》

**药材名** 千层楼《汇编》

**文献名** 小贯叶金丝桃《陕西中草药》，对叶莲《药植简编》，二棱金丝桃《吉野》，贵州连翘《中国药植志》

**地方名** 小对月草（陕西、贵州），小汗淋草（江苏、湖北）；陕西：小金丝桃（佛坪），〔刘寄奴〕（柞水），〔小叶刘寄奴〕（商县），〔小刘寄奴〕（安康地区），子叶草，米儿茶，女儿茶；江苏：小旱莲草（南京）；河南：小叶金丝桃（卢氏）；湖北：千层塔，黄胆草，对口草、山连翘（神农架），大对叶草，大对取；四川：夜关门（城口），铁扫把（泸定），赶山鞭，上天梯；贵州：小过路黄，小对叶草，小种黄，小黄药，翳子药。

**功效** 带根全草：清热解毒，调经止血。用于吐血，咯血，月经不调。外用于创伤出血，痈疽肿毒，烧、烫伤，鼻衄。

#### 7123023

*Hypericum przewalskii* Maxim.

**植物名** 突脉金丝桃《中国植志》

**药材名** 大对经草《陕西中草药》

**文献名** 骑马桑《药植简编》，大花金丝桃《陕西中草药》

**地方名** 陕西：〔大叶刘寄奴〕（平利），老君茶；四川：〔王不留行〕（松潘）。

**功效** 全草：活血调经，止血止痛，利水消肿，除风湿。用于月经不调，跌打损伤，骨折，出血，小便不利，蛇咬伤。

#### 7123024

*Hypericum sampsonii* Hance

**植物名** 元宝草《中国植志》

**药材名** 元宝草《本草从新》、《汇编》

**文献名** 茅草香子《简易草药》，灯台、双合合、相思《名实图考》，对叶草《草木便方》，对月草《分类草药性》，对经坐《植物名汇》，合掌草、对叶莲《中国药植图鉴》。

**地方名** 〔王不留行〕（湖南、广西、四川、湖北），对坐草（内蒙古、台湾），对经草（陕西、江西），帆船草（湖南、广西、云南），小连翘（福建、湖南、广西），叶抱枝（福建、广西、云南），〔刘寄奴〕（湖北、湖南），穿心草（江苏、福建、安徽、广西），穿心箭（浙江、安徽、江西）；陕西：〔大刘寄奴〕，对口红（安康），癞子草；江苏：空心草；浙江：蜻蜓草（杭州），蜡烛灯台（寿昌），大叶野烟子（遂昌），

马蹄草，飞鹤草，白象狮子草，红元宝，红旱莲，大还魂，宝塔草；安徽：蛇草；江西：大叶防风草、六月开花六月死、浸油香（德兴），大叶对口莲（占水），西风草（泰和），排草，〔排香草〕，〔神仙对坐草〕；福建：当归草、对莲（泉州），对莲草（莆田），大还魂草（永春、安溪），包骨痠（厦门、漳州），香草、鸭雄香（南平），黄花对莲（宁化）；台湾：大翻魂；湖南：上天梯（永顺），哨子草、叫子草（衡山），叫叶草、养子风（长沙），对叶消（古丈），焦滑风（麻阳），养子草，叫珠草，烂肠草，蛇开口，野旱烟，翳子草；广西：大甲母猪香、小黄心草、对口草、尖金花（黄山），土柴胡（天等），对耳草（凤山），红叶草（贵县），红血散（那坡），穿心连（梧州），莲台（乐业），瓦心草，宝心草，“仰星埃”（苗语），“马误”（仫佬语），上莲下柳（壮名）；四川：大金花、叫叫草（成都、灌县），护心草（合江），急奶草，吹吹草，佛心草，对对草（峨眉山）；贵州：大对叶草（贵阳），对月莲，蛇喳口，蛇喳草，香排草；云南：大叶对经草、大对月莲（宝鸡），对口茶（文山）。

**功效** 全草：清热解毒，通经活络，凉血止血。用于小儿高热，痢疾，肠炎，吐血，衄血，月经不调，白带。外用于外伤出血，跌打损伤，乳腺炎，烧烫伤，毒蛇咬伤。

#### 7123025

*Hypericum seniavini* Maxim.

**植物名** 密腺小连翘《中国植志》

**文献名** 类小连翘、〔红旱莲〕《浙江药植志》

**功效** 全草：调经止血，解毒消肿。

#### 7123026

*Hypericum uralum* Buch.-Ham. ex D. Don --- *H. patulum* var. *uralum* (Buch.-Ham. ex D. Don) Koehne --- *H. parulum* auct. non Thunb.

**植物名** 匙萼金丝桃《中国植志》

**药材名** 苦连翘《滇南本草》

**文献名** 大翘《图经》，洱海连翘《滇黔纪游》，金丝桃、土连翘《滇南本草》，猪母柳《质问本草》，芒种花、云南连翘《名实图考》，金丝梅《高植图鉴》

**地方名** 过路黄（广西、贵州、云南）；湖南：细连翘，蜂子王；广西：大叶黄（乐业）；云南：小黄花（思茅），山黄花，山枝子（玉溪），栽秧花（昆明），黄花香（红河、昆明），黄香果（曲靖），“衣枝塔基”（楚雄彝名）。

**功效** 根：清热利尿，散瘀解毒。用于肝炎，感冒，痢疾，淋病，疝气，筋骨疼痛，牙痛，鼻衄，黄水疮，跌打损伤。

**备考** 《云南种录》（1984）称：有的文献曾将本种学名误订为 *Hypericum patulum* Thunb.

#### 7123027

*Hypericum wightianum* Wall. ex Wight et Arn.

**植物名** 遍地金《中国植志》

**药材名** 遍地金《滇南本草》、《新华本草纲要》

**文献名** 尼泊尔金丝桃《西昌中草药》

**地方名** 大田基黄（广西、四川）；广西：千层散（那坡）；四川：蜚药（会理、德昌），蚁药，苍蝇草，对叶草，对对草，田基黄；云南：小过路黄，鹅掌菜，小黄花香、金星

草(曲靖), 蚂蚁草(临沧), 蛇毒草, 小破血, 小疳药, 青鱼胆, 锅巴草。

· 功效 全株: 收敛止泻, 清热解毒。用于小儿炎症, 消化不良, 久泻, 毒蛇咬伤等。

## 7123028

*Triadenum japonicum* (Bl.) Makino -- *T. asiaticum* (Maxim.) Kom.

植物名 红花金丝桃《高植图鉴》

功效 全草: 清热解毒, 渗湿利水, 消肿止痛。

## 7126 藤黄科 Guttiferae

## 7126001

*Calophyllum chapelieri* Drake

植物名 马达加斯加胡桐《汇编》

功效 根、叶: 祛风湿, 壮筋骨, 活血止痛。

## 7126002

*Calophyllum inoplyllum* L.

植物名 红厚壳《中国植志》

药材名 红厚壳《台湾药植志》

文献名 [胡桐]《高植图鉴》, 琼崖海棠《台湾药植志》

地方名 广东: 海棠木, 海棠树; 海南: 君子树, 琼崖海棠树, [海棠果]; 台湾: 呀拉菩。

功效 种子: 用于大毒热, 心腹烦满, 牙痛, 咽喉热痛, 瘰癧; 树皮: 利尿, 并敷治皮炎; 根、叶: 祛瘀止痛。用于风湿疼痛, 跌打损伤, 痛经; 叶: 用于外伤出血。

## 7126003

*Calophyllum membranaceum* Gardn. et Champ.

植物名 薄叶红厚壳《中国植志》

药材名 横经席《汇编》

文献名 薄叶红厚壳《广西药录》, 薄叶胡桐《高植图鉴》

地方名 皮子黄(广东、广西); 广东: 独筋猪尾, 跌打将军, 碎骨莲, 横经席叶; 广西: 梳篦木(上思), 独角风(藤县、桂林、贺县), 独柱风, 托经带(苍梧), 大山箭(博白、陆川), 皮梳木、通经红(平南、容县), 篦子王, 小果海棠, 兵主齿(陆川), 万年梢(上思壮语), 小果海棠木, 横经叶。

功效 根、叶: 祛风湿, 壮筋骨, 活血止痛。用于风湿关节痛, 腰腿痛, 跌打损伤, 黄疸型肝炎, 月经不调, 痛经; 叶: 外用于外伤出血。

## 7126004

*Garcinia cowa* Roxb.

植物名 云树《中国植志》

药材名 黄心果《汇编》

文献名 云南山竹子《高植图鉴》

地方名 云南: 歪脖子果, 黄牙果, 化皮果, 酸果, 大叶藤黄, 云南莽吉柿, “给哈蒿”、“果木榜”(傣语), 倒接果(屏边)。

功效 茎、叶汁: 有小毒。清热, 消炎, 驱虫。用于蚂蝗入鼻, 湿疹, 口腔炎, 牙周炎, 痢疮溃烂, 烫火伤。

## 7126005

*Garcinia hanburgi* Hook. f.

植物名 藤黄树《汇编》

药材名 藤黄《海药本草》、《汇编》

文献名 海藤、玉黄、月黄《汇编》, 桑藤黄树《中草药学》

功效 胶树脂: 有大毒。峻泻, 止血消肿, 杀虫解毒。用于痈疽疔毒, 跌打损伤, 金疮肿痛, 瘀血凝结。只供配成药用。

备考 《台湾药植志》等以 *Garcinia morella* Desv. 为“藤黄”, 也有称之为“印度藤黄”、“海藤”者。

## 7126006

*Garcinia hombroniana* Pierre

植物名 山凤果《台湾药植志》

功效 根: 用于产妇科; 根与叶: 止肤痒。

## 7126007

*Garcinia mangostana* L.

植物名 莽吉柿《中国植志》

药材名 都念子《本草拾遗》、《台湾药植志》

文献名 倒捻子《岭表录异》, 海漆、粘子《纲目拾遗》, [罗汉果]、山竹子《植物名汇》, 凤果《台湾果树志》

功效 果实: 用于痰咳喘气, 暖腹益肌, 活血补血; 果汁: 止肠滑; 叶: 止下痢; 果皮: 用于大肠炎及痢疾, 小儿慢性腹泻; 树皮、嫩叶: 用于腹泻, 痢疾, 泌尿系疾患。外用于鹅口疮; 根: 用于月经不调。

## 7126008

*Garcinia multiflora* Champ.

植物名 多花山竹子《高植图鉴》

药材名 山竹子《汇编》

文献名 木竹子、木轴子《纲目拾遗》, 木竹果《中药大辞典》

地方名 白树仔(台湾、广西), 山橘子、木熟子、竹果、竹橘子(华南); 广东: 山桔子, 不碌果, 查牙桔, 大核果, 大肚脐, 竹仔, 竹节果, 竹节子, 竹橘树, 金苹果, 木熟果, 粘牙仔, 酸味果, 酸桐子; 海南: 铁色, 楠榔桔; 广西: “蜜柜”(大新、龙州壮语), 醋木竹(平南), “味柜”(壮语), 山节果, 山核果, “旦罗旦”(金秀瑶语), 山枇杷; 云南: “阿必旱”(河口), 花皮果、花瓶果(西畴、屏边), 酸木果、酸白果(马关), 酸果。

功效 根、树内皮或果实: 有小毒。消炎止痛, 收敛生肌。用于肠炎, 小儿消化不良, 胃、十二指肠溃疡, 溃疡病轻度出血, 口腔炎, 牙周炎。外用于烧、烫伤, 下肢溃疡, 湿疹。

## 7126009

*Garcinia oblongifolia* Champ.

植物名 岭南山竹子《中国植志》

药材名 山竹子《汇编》

文献名 木竹子《纲目》, 黄牙橘《中草药学》, 海南山竹子《广西药录》, 岭南倒捻子《树分》

地方名 黄牙果(海南、广西); 广东: 金赏, 罗蒙树, 酸桐木, 黄牙桔, 黄牙树, 严芽桔, 竹节果; 海南: 蜡蒙, 水竹果, 赤过, 麦芽仔, 山竹, 鸡酸, 粘牙仔; 广西: 山木竹(博白), 竹橘、木竹子油(陆川), 檬拢根、竹节根(平

南), 金丝李(宁明、龙州), 麻风果、猴果(龙州), 木竹果, 冬竹子, 龙檬果, 罗荣子, 染牙果, 蒙龙果; 其他: 红山竹梨。

功效 果实、果核、树皮: 消炎止痛, 收敛生肌。

## 7126010

*Garcinia oligantha* Merr.

植物名 单花山竹子《中国植志》

药材名 山竹子(海南)

文献名 角果山竹子《高植图鉴》

功效 树内皮或果实: 有小毒。消炎止痛, 收敛生肌; 根、叶: 用于大毒疮。

## 7126011

*Garcinia paucinervis* Chun et How

植物名 金丝李《高植图鉴》

药材名 金丝李《广西药录》

地方名 广西: 海南山竹子, 猴果, “类卢敦”(上思壮语), “碎锦”(金秀瑶语), “埋贵”(龙州壮语), “米友波”(那坡壮语), “哥非力郎”(都安壮语)。

功效 树皮、枝叶: 外用于烧烫伤。

## 7126012

*Garcinia schefferi* Pien

植物名 越南藤黄《中国植志》

文献名 广西长叶山竹子《广西药园药录》, 长叶山竹子《新华本草纲要》

功效 树皮: 消肿, 散热毒。用于烧伤。

## 7126013

*Garcinia spicata* Hook. f.

植物名 穗花山竹子《中草药学》

文献名 福木《台湾药植志》

地方名 台湾: 福树。

功效 树皮: 用于烧烫伤。

## 7126014

*Garcinia xanthochymus* Hook. f. ex J. Anders. --- *G. tinctoria* (DC.) W. F. Wight

植物名 大叶藤黄《中国植志》

药材名 人面果《西双版纳傣药志》

文献名 蛋树、香港倒捻子《台湾药植志》, 岭南倒捻子《树分》

地方名 广西: “勿茂”(壮语); 云南: “哥麻啦”、“戈吗拉”(傣名), 歪屁股果、歪歪果、胶树(河口), 大叶山竹子、歪脖子果(耿马), 藤黄果(景洪), 歪嘴果。

功效 茎、叶的浆汁: 驱虫。用于蚂蟥入鼻; 果汁: 用于胆病。

备考 本品与藤黄(*G. hanburgi* Hook. f.)的成分基本相同, 药理作用、毒性相似, 可考虑作藤黄的新资源, 作进一步研究。

## 7126015

*Mammea americana* L.

植物名 马米杏《台湾药植志》

功效 树脂: 除虱。

## 7126016

*Mesua ferrea* L.

植物名 铁力木《中国植志》

药材名 铁力木《西双版纳傣药志》

文献名 铁栗木、铁棱《广西通志》

地方名 云南: “埋摸朗”、“梅播朗”、“喃木波朗”、“莫拉”(西双版纳傣语), 三角子。

功效 种子: 滋补强壮。用于疮疡肿疔。

## 7128 椴树科 Tiliaceae

## 7128001

*Colona floribunda* (Wall.) Craib

植物名 一担柴(云南)、《中国植志》

药材名 柯榔木《中国经植志》

文献名 大叶子树《汇编》, 大泡火绳《高植图鉴》

地方名 云南: 大毛叶子火绳(屏边), “即剥蒲”(景颇族语), 野火绳(红河)。

功效 根: 消炎拔脓。

备考 本品为生产紫草茸寄主植物之一。

## 7128002

*Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Makino

植物名 田麻《中国植志》

药材名 田麻《图经》、《汇编》

文献名 毛果田麻《中国经植志》

地方名 浙江: 野络麻(临安), 野花生; 福建: 黄花喉草、白喉草(宁化); 广西: 野皂角(桂林); 湖北: 椴麻草(神农架); 四川: 绿豆青。

功效 全草、叶: 平肝利湿, 解毒, 止血。用于小儿疳积, 白带过多, 风湿疼痛, 痈疖肿毒, 外伤出血。

## 7128003

*Corchorus aestuans* L. --- *Corchorus acutangulus* Lam.

植物名 甜麻《中国植志》

药材名 野黄麻《汇编》

文献名 假麻区《生草药性备要》, 假黄麻、麻瓠《植物名汇》

地方名 广东: 麻勾枝, 假樵仔(英德), 野麻英(始兴); 海南: 针筒草; 广西: 假络、水丁香(桂平), 络麻(苍梧); 贵州: 铁茵陈, 藤连皂; 云南: 土巨胜, 土巨肾; 其他: 奶疳火药, 假麻豆。

功效 全草: 清热利湿, 消肿拔毒。用于中暑发热, 痢疾, 咽喉疼痛。用于疮疖肿毒。

## 7128004

*Corchorus capsularis* L.

植物名 黄麻《中国植志》

药材名 黄麻《图经》、《汇编》

文献名 大麻子(汪连仕《采药书》), 络麻《便民图纂》, 绿麻《植物名汇》, 圆果黄麻《药学报》

地方名 湖南: 水麻; 广东: 麻骨头(广州), 麻叶、老麻叶、麻秧(潮汕), 苦麻叶(潮安), 麻仔叶(海丰)。

功效 叶、根及种子: 清热解暑, 拔毒消肿。用于预防中暑, 中暑发热, 痢疾。外用于疮疖肿毒。

## 7128005

*Corchorus olitorius* L.

植物名 长蒴黄麻《中国植志》

药材名 山麻《台湾药植志》

文献名 长果黄麻《高植图鉴补编》, 斗鹿《植物名汇》, 黄麻《中国经植志》

地方名 云南: [巨甍子], 巨肾子, 菜园黄麻, [野芝麻] (根), “谷主努痕” (元江哈尼语); 其他: 陆麻, 陆轮麻。

功效 种子: 泻剂; 全草: 疏风止咳, 利湿。

#### 7128006

*Excentrodendron hsienmu* (Chun et How) H. T. Chang et R. H. Miao --- *Burretiodendron hsienmu* Chun et How

植物名 蚬木《中国植志》

药材名 蚬木《广西药园药录》

地方名 广西: 咪蚬, 铁树; 其他: 砧板木, 切菜板木。

功效 蚬木寄生: 用于劳伤咳嗽。

#### 7128007

*Grewia abutilifolia* Vent. ex Juss. --- *G. kainantensis* Masumune

植物名 苘麻叶扁担杆《中国植志》

药材名 胶木根(拟)

文献名 苘麻叶解宝树《中国经植志》, 葵叶扁担杆《广西药录》

地方名 海南: 白油胶, 胶木, 散麻树, 苘叶担杆木; 广西: 娘娘粉(崇左), 大狗卵(博白), 米暖麻。

功效 根: 用于肝炎; 叶: 止泻痢。

#### 7128008

*Grewia asiatica* L.

植物名 亚洲捕鱼草《台湾药植志》

功效 果实: 收敛; 根皮: 用于风湿。

#### 7128009

*Grewia biloba* G. Don

植物名 扁担杆《中国植志》

药材名 娃娃拳《四川中药志》

文献名 扁担杆子《种分》, 光叶扁担杆《浙江药植志》

地方名 山络麻(浙江、江西), 棉筋条(江苏、浙江、江西); 陕西: 圪柏麻, 葛荆麻, 岩麻; 山东: 扁担木, 核桃拳(临沂), 小孩拳, 小孩拳头(苍山、沂源、蓬莱、海阳), 孩子拳头(烟台), 哨儿菜, 孩儿拳头; 江西: 狗麋子; 福建: 版筒柴; 河南: 二裂解宝叶, 月亮皮, 葛妃麻; 湖北: 岩筋条(神农架); 湖南: 串果崽子, 狗肾子, 夹板子; 四川: 麻糖果, 背娃娃(蓬溪), 沙糖果, 麻汤果; 贵州: 拗山皮。

功效 根、全株: 健脾益气, 固精止带, 祛风除湿。用于小儿疳积, 脾虚久泻, 遗精, 红崩, 白带, 子宫脱垂, 脱肛, 风湿关节痛。

#### 7128010

*Grewia biloba* G. Don var. *parviflora* (Bunge) Hand. Mazz.

植物名 小花扁担杆《中国植志》

药材名 娃娃拳(山东、四川)

文献名 吉利子树《名实图考》, 扁担格子《植物名汇》, 朴叶田麻《中国植物图鉴》, 头半头、狗柠檬《树

分》, 葛妃麻《高植图鉴》, 扁担木《汇编》, 扁担杆《中药大辞典》

地方名 棉筋条(江苏、江西); 河北: 孩儿拳头, 娘娘拳, 娘娘拳头; 山西: 小窝拳(太行); 陕西: 岩麻; 山东: 狗桑, 山桑, 核桃拳(临沂), 小孩拳, 小孩拳头(苍山、沂源、蓬莱、海阳、掖县); 江苏: 扁担杆子(苏北); 江西: 山络麻, 狗麋子; 河南: 牯卵子; 湖北: 女儿构, 短荆子, 岩金子(神农架); 湖南: 山甲麻; 四川: 麻糖果; 贵州: 拗山皮。

功效 根、枝叶: 健脾益气, 固精止带, 祛风除湿。

#### 7128011

*Grewia eriocarpa* Juss. --- *G. lantsangensis* Hu

植物名 毛果扁担杆《中国植志》

药材名 野火绳《云南中草药》

文献名 毛果解宝树、毛叶扁担杆、澜沧扁担杆、细火绳树《云南种录》

地方名 海南: 红木, 山麻树, 假玉桂; 云南: 马尾巴火绳(屏边), 野麻根、鼠皮树、黑神果(思茅), 细火绳(思茅、普洱), 沙糖果, 子金根、小白药、小火绳、[接骨丹](红河)。

功效 根内皮: 收敛止血, 生肌, 接骨。用于外伤出血, 骨折, 刀枪伤, 疮疖红肿; 花、叶: 用于胃病; 根: 止血、止牙痛。

#### 7128012

*Grewia falcata* C. Y. Wu

植物名 镰叶扁担杆《中国植志》

药材名 炸腰果《云南药录》

文献名 镰叶解宝叶、镰叶解宝树《中国经植志》

地方名 云南: 黄龙粉、猴子饭团(保山、腾冲), 狗卵果子果(梁河)。

功效 全株: 止血。外用于外伤出血。

#### 7128013

*Grewia henryi* Burret

植物名 黄麻叶扁担杆《中国植志》

文献名 南扁担杆《云南种录》, 西南扁担杆《广西药园药录》

地方名 广西: 米排, 米英, 小芒木。

功效 根皮: 止痢。

#### 7128014

*Grewia oligandra* Pierre

植物名 寡蕊扁担杆《中国植志》

药材名 狗核树(广西)、《汇编》

文献名 少蕊扁担杆《中国经植志》, 扁担杆《广西本草选编》

地方名 广西: 狗容木、狗卵木(平南), 狗卵子(南宁), 狗杏藤(玉林), 四眼果(百色), 山芝麻(邕宁)。

功效 根、根皮: 祛湿解毒。用于痢疾, 脚气浮肿, 疮疖红肿, 膀胱湿热, 尿浊, 尿血。

#### 7128015

*Grewia tiliaefolia* Vahl

植物名 椴叶扁担杆《中国植志》

药材名 椴叶扁担杆《红河中草药》

功效 根皮;收敛止血,生肌接骨。外用于外伤出血,骨折,刀、枪伤,疮疖红肿。

## 7128016

*Microcos paniculata* L.

植物名 破布叶《生草药性备要》、《中国植志》

药材名 布渣叶《岭南采药录》、《汇编》

文献名 珠棋《种分》,瓜刺木、剥果木《中国经植志》,破布树《汇编》

地方名 广东:蓑衣叶,布豆叶(高州、茂名),布渣木(湛江),崩补叶(广宁、四会、德庆、封开),布包仔(惠阳),麻布叶(五华),蓑衣子;海南:牛筋子,山茶叶;广西:布包木(平南),狗具布(北流),羊屎草(龙州),夜关门,火布木,布泉根,布渣茶;云南:“哥麻管”(西双版纳傣语)。

功效 叶:清热消食。利湿,健胃。用于感冒食滞,食欲不振。

## 7128017

*Tilia amurensis* Rupr.

植物名 紫椴《中国植志》

药材名 紫椴《药植简编》

文献名 阿穆尔椴树《树分》

地方名 籽椴、菩提树(东北);辽宁:椴树籽;山东:椴树(昆崙山、威海),锦椴(蛟南),椴麻树(泰山)。

功效 花:发汗,镇痉,解热。

## 7128018

*Tilia amurensis* Rupr. var. *taquetii* (Schneid.) Liou et Li

植物名 小叶紫椴《中国植志》

药材名 小叶紫椴《长白山植志》

功效 花序:发汗镇痉;花:发汗,镇痉,解热。

## 7128019

*Tilia amurensis* Rupr. f. *koreana* (Nakai) Y. C. Chu ---  
*T. amurensis* Rupr. var. *koreana* Nakai

植物名 朝鲜紫椴《东北药用植物》

药材名 椴树花(拟)

功效 花:发汗,解热,抑菌。用于感冒,肾盂肾炎,口腔炎,喉炎。

## 7128020

*Tilia amurensis* Rupr. var. *sibirica* (Fisch. ex Bayer) Y. C. Zhu --- *Tilia sibirica* Fisch. ex Bayer

植物名 西伯利亚紫椴《东北药用植物》

药材名 椴树花(拟)

功效 花(浸剂):发汗,解热,抑菌。用于感冒,肾盂肾炎,口腔炎,喉炎等。

## 7128021

*Tilia chinensis* Maxim.

植物名 华椴《中国植志》

药材名 华椴《神农架药录》

地方名 湖北:椴树(神农架)。

功效 树皮:用于跌打损伤,骨折。

## 7128022

*Tilia japonica* Simonk. --- *T. eurosinica* Croizat

植物名 华东椴《中国植志》

文献名 日本椴《浙江药植志》

功效 根皮、根:用于劳伤失力初起,久咳;花序:镇静,发汗。

## 7128023

*Tilia mandshurica* Rupr. et Maxim.

植物名 辽椴《中国植志》

药材名 糠椴《药植简编》

文献名 柎《诗经》,櫟《尔雅》,柎子、上榘《尔雅注》,万岁、櫟材、牛筋《尔雅义疏》,櫟、念珠子、椴木《满州植录》

地方名 椴树(辽宁、山东),大叶椴(吉林、河北);黑龙江:椴兵子;北京:椴;江苏:菩提树(南京)。

功效 花:发汗镇静,解热。

## 7128024

*Tilia miqueliana* Maxim.

植物名 南京椴《中国植志》

药材名 白椴(山东、河南)、《汇编》

文献名 菩提树《南越笔记》,星月菩提《名实图考》,简果椴树《树分》,椴皮《中国经植志》

地方名 椴树(山东、江苏);江苏:菠萝树(连云港),弥格椴,菩提椴,菠萝椴;浙江:小叶韧皮树(临安)。

功效 树皮、根:用于劳伤失力初起,久咳;花序:镇静,发汗。

## 7128025

*Tilia mongolica* Maxim.

植物名 蒙椴《中国植志》

药材名 蒙椴《药植简编》

文献名 小叶椴《树分》,椴皮《中国经植志》,米椴《中国植志》

地方名 白皮椴(山西、河南),椴树(西北);内蒙古:“刀茂特”(蒙名),椴冠冠;江苏:菠萝树,菩提树。

功效 花序:发汗,镇痉,解热。

## 7128026

*Tilia oliveri* Szyszyl. var. *cinerascens* Rehd. et Wils.

植物名 灰背椴《中国植志》

文献名 灰鄂椴《神农架药录》

地方名 湖北:光皮椴(神农架)。

功效 树皮:用于跌打损伤,骨折。

## 7128027

*Tilia omeiensis* Fang

植物名 峨眉椴《中国植志》

文献名 峨眉椴树、白郎花《四川中药志》

功效 根皮:通经理气。用于跌打损伤。

## 7128028

*Tilia paucicostata* Maxim.

植物名 少脉椴《中国植志》

药材名 简果椴《神农架药录》

文献名 少肋椴《云南种录》

地方名 陕西:杏鬼椴。

功效 花提取芳香油:发汗,镇痉,解热;树皮:接骨疗损。用于跌打损伤。

## 7128029

*Tilia tuan* Szyszyl.

植物名 椴树《中国植志》

药材名 椴树《汇编》

文献名 椴《汇编》, 叶上果根《贵州民间药物》, 大叶切皮树《江西药录》

地方名 青科柳、青棵柳(湖南、广西、云南), 叶上果(四川、贵州), 家鹤儿(四川、广西、湖南), 椴麻(陕西、湖北); 江西: 毛枝椴; 湖北: 大叶椴(神农架); 湖南: 金桐力树; 四川: 滚筒树根; 云南: 千层皮, “补鲁威”(楚雄彝名), 叶蝶花, 滚筒树。

功效 根: 祛风, 活血, 止痛。用于跌打损伤, 风湿疼痛, 四肢麻木。

备考 湖北、陕西之椴麻即由本品制成。

## 7128030

*Tilia tuan* Szyszyl. var. *chinensis* Rehd. et Wils.

植物名 毛芽椴《中国植志》

药材名 毛芽椴《汇编》

文献名 叶上果《药植简编》, 毛枝椴《汇编》, 椴树《云南种录》

地方名 云南: 千层皮。

功效 根: 用于跌打, 风湿麻木。

## 7128031

*Triumfetta annua* L.

植物名 单毛刺蒴麻《中国植志》

药材名 小刺蒴麻《海南植志》

文献名 光藕头波《云南种录》

地方名 云南: “啊车拉卡”(元江哈尼语), 粘粘草, 粘人草(元江)。

功效 叶: 解毒, 止血。用于痈疖红肿, 刀伤出血。

## 7128032

*Triumfetta cana* Blume --- *Triumfetta tomentosa* Bojer

植物名 毛刺蒴麻《中国植志》

药材名 毛刺蒴麻《药植简编》

文献名 毛藕头婆《云南种录》, 小铧叶《汇编》, 黄花藕头婆《药植简编》

地方名 广西: 黄花痴头婆(龙州), 痴头婆(凌云、柳州、岑溪), 匹蓬, 下匹, 蓬绒木, 黄花古药(藤县), 双耳子(玉林); 云南: 粘巴头(屏边), 细黄花。

功效 全株: 消风散毒, 用于毒疮, 风湿脚气痛, 浮肿, 痢疾, 肾结石。

## 7128033

*Triumfetta pilosa* Roth

植物名 长钩刺蒴麻《中国植志》

药材名 金纳香(四川)、《汇编》

文献名 刺蒴麻《云南中草药》

地方名 广西: 狗屁藤(天等); 贵州: 小桦叶; 云南: 梗麻, 毛葱根、毛葱叶、羊膻臭果、细心麻栗(红河), (苍耳子)、小狗核桃(东川), 细山马栗(石屏), 密马专; 其他: 牛虱子。

功效 叶及根: 行气, 活血调经。用于月经不调, 腹有包块作痛, 跌打损伤; 全株: 祛风除湿, 利水消肿。

用于风湿疼痛, 小便不利, 水肿。

## 7128034

*Triumfetta rhomboides* Jacq. --- *Triumfetta bartramia* L.

植物名 刺蒴麻《中国植志》

药材名 黄花虱麻头《汇编》

文献名 小藕头婆《云南药录》, 细叶藕头婆《药植简编》, 黄花地桃花《中医方药学》, 黄花虱母子《台湾药植志》

地方名 藕头婆(广东、广西); 广东: 细种苍耳子(惠阳); 广西: 下打捶(南宁), (地桃花)(博白), 粘头婆; 云南: 密麻椿, 密马专。

功效 全株: 解表清热, 利尿散结。用于风热感冒, 毒疮, 肾结石。

7128a 杜英科 *Elaeocarpaceae*

## 7128a01

*Elaeocarpus chinensis* (Gardn. et Champ.) Hook. f. ex Benth.

植物名 中华杜英《中国植志》

药材名 小冬桃《广西药园药录》

文献名 华杜英《高植图鉴》

地方名 浙江: 桃榭; 福建: 羊子屎; 广东: 托盘椅, 羊屎乌; 广西: 高山望, 老来红, 羊屎木, 野朴英。

功效 根皮: 散瘀, 消肿。用于跌打瘀肿。

## 7128a02

*Elaeocarpus decipiens* Hemsl.

植物名 杜英《中国植志》

药材名 杜英《广西药录》

功效 根: 用于风湿, 跌打损伤。

## 7128a03

*Elaeocarpus sylvestris* (Lour.) Poir.

植物名 山杜英《中国植志》

药材名 山杜英《广西药园药录》

地方名 福建: 羊屎乌, 羊仔屎, 山橄榄; 海南: 羊屎树; 广西: 杜英, 胆八树。

功效 根皮: 散瘀, 消肿。用于跌打瘀肿。

## 7128a04

*Sloanea hemsleyana* (Ito) Rehd. et Wils.

植物名 仿栗《中国植志》

药材名 仿栗《广西药录》

功效 根: 用于痢疾。

## 7128a05

*Sloanea leptocarpa* Diels --- *S. tsinyunensis* Chien---

*S. elegans* Chun

植物名 薄果猴欢喜《中国植志》

药材名 薄果猴欢喜《贵州药录》

文献名 北碚猴欢喜《高植图鉴》

功效 根皮: 祛风除湿, 消肿止痛。用于骨折, 跌打, 风寒感冒。

## 7128a06

*Sloanea sinensis* (Hance) Hemsl. --- *S. parvifolia* Chun et How

植物名 猴欢喜《中国植志》  
 药材名 猴欢喜《广西药录》  
 地方名 广西:山板栗(融安)。  
 功效 根:健脾和胃,祛风壮腰。

## 7128b 斜翼科 Plagiopteraceae

### 7128b01

*Plagiopteron chinensis* X. X. Chen

植物名 华斜翼《中国植志》  
 药材名 斜翼《广西药录》  
 地方名 广西:扣丝(龙州)。  
 功效 根、枝、叶:用于腰腿痛,骨折。

## 7130 梧桐科 Sterculiaceae

### 7130001

*Ambroma augusta* (L.) L. f.

植物名 昂天莲《中国植志》  
 药材名 昂天莲《汇编》  
 地方名 海南:水麻;广西:仰天虫(藤县),假芙蓉;  
 云南:鬼棉花,“国味”(傣名),野棉花。  
 功效 根、叶:行血散瘀,消肿。用于疮疖红肿,跌打肿痛,通经。

### 7130002

*Byttneria aspera* Colebu. --- *Buettneria grandifolia* DC.

植物名 刺果藤《中国植志》  
 药材名 刺果藤《汇编》  
 地方名 广东:牛蹄麻,鸡冠麻;广西:大胶藤(北流),  
 (勾红藤)(忻城),独行千里、多仔藤(梧州),大滑藤。  
 功效 根:祛风湿,壮筋骨。用于产后筋骨痛,风湿骨痛,腰肌劳损,跌打骨折。

### 7130003

*Byttneria pilosa* Roxb.

植物名 粗毛刺果藤《中国植志》  
 药材名 毛刺果藤《云南药录》  
 功效 叶、茎:用于麻木性风湿病。

### 7130004

*Eriolaena kwangsiensis* Hand. -Mazz.

植物名 桂火绳《中国植志》  
 药材名 桂火绳《广西药录》  
 地方名 广西:假芙蓉(龙州)。  
 功效 根、茎:用于肝炎,骨折。

### 7130005

*Eriolaena spectabilis* (DC.) Planchon ex Maxt. --- *E. malvacea* (Levl.) Hand. -Mazz.

植物名 火绳树《中国植志》  
 药材名 火绳树(云南)  
 文献名 泡火绳、紫草茸《汇编》,芒木《广西植录》  
 地方名 云南:引火绳、赤火绳、[接骨丹]、火索树(红河)。  
 功效 根皮(内皮):收敛止血,续筋骨。用于外伤出血,骨折,烧烫伤,慢性胃炎,胃溃疡。  
 备考 本品为生产紫草茸的主要寄生植物。

### 7130006

*Firmiana platanifolia* (L. f.) Marsili --- *F. simplex* (L.) F. W. Wight

植物名 梧桐《诗经》、《中国植志》  
 药材名 梧桐子《履巇岩本草》,梧桐白皮《图经》,梧桐叶《纲目》,梧桐花《纲目拾遗》  
 文献名 栳《尔雅》,青梧《品汇精要》,桐麻、瓢窠树《草木便方》,梧桐皮《履巇岩本草》,青桐《花镜》,梧桐蕈《岭南采药录》,桐毛耳、井桐、孤桐《植物名汇》,梧桐片〔叶浸膏片〕《药典》。

地方名 翠果子、瓢儿树(四川、湖北),耳桐(福建、湖南),桐麻树(华中),青皮梧桐(浙江、江苏),九层皮(广西、湖南),国桐叶(通称);江苏:大梧桐;江西:调羹树;福建:白梧桐(福安),山池根(松溪、政和),风眼果、红花果(福州);湖南:梧桐麻(衡山),青桐皮子,春麻(会同);广西:桐油木(北流、南宁),苍桐,苍梧桐,青皮树,地坡皮;四川:瓢儿果,桐麻碗,青桐果(蓬溪),白桐根(成都)。

功效 种子:顺气,和胃,补肾。用于胃痛,伤食腹泻,小儿口疮,须发早白;叶:镇静,降压,祛风,解毒。用于冠心病,高血压,风湿关节痛,阳痿,遗精,神经衰弱,银屑病,痈疮肿毒;花:用于烧、烫伤,水肿,秃疮;根:祛风湿,和血脉,通经络。用于风湿关节痛,肠风下血,月经不调,跌打损伤,血丝虫病,蛔虫病;茎皮:祛风,除湿,活血,止痛。用于痔疮,脱肛,风湿痹痛,跌打损伤,丹毒,月经不调。

### 7130007

*Helicteres angustifolia* L.

植物名 山芝麻《中国植志》  
 药材名 山芝麻《生草药性备要》、《中药志》  
 文献名 岗油麻《生草药性备要》,岗芝麻、山脂麻《岭南采药录》,肖婆林《指示植物》,野山麻《中药志》,石秤陀《汇编》  
 地方名 [山豆根](广东、广西),山油麻(广东、广西、福建),油麻甲(广东、广西、江西),假芝麻(广东、广西、云南),山原胡麻(华南),田油麻(福建、广西),牛釜尾(广西、云南);江西:白头公,野麻杆,八仙桃(泰和);福建:仙桃草,山麻(闽南),山野麻,山野麻子(福州、永定、武平),山黄麻(福州、龙海、诏安),山桃叶、大山麻(晋江),山姜母,野油麻(永安、平潭),野油麻草,油麻草,地黄根(南平),土连召(泉州);台湾:苦麻,苦草,苦麻头,李山豆根;广东:假麻甲,假油麻(阳春、阳江),芝麻头,野麻甲(五华),山芝麻根(潮汕),山油麻甲(陆丰),山麻甲(兴宁),山麻毛(高明),白鹤屎(英德),土豆根;海南:坡片公,坡麻;广西:野芝麻(来宾、钟山、梧州),狗屎树,坡芝麻(苍梧、平南、陆川),坡爪芝、坡芝爪(北海),坡油麻(博白、陆川),博油菜,猴子尾(桂林),壶酿草(全州)

功效 根、全草:有毒。清热解毒。用于感冒高热,扁桃体炎,咽喉炎,腮腺炎,皮肤湿疹。

### 7130008

*Helicteres elongata* Wall.



植物名 长序山芝麻《中国植志》  
 药材名 长角山芝麻《汇编》  
 文献名 长叶山芝麻《云南中草药》, 野山芝麻《汇编》

地方名 云南: 野芝麻、山油麻、假芝麻(红河), 野芝麻棵(思茅), 山芝麻(红河、思茅), “牙呼领”(傣名)。

功效 根: 消炎解表, 截疟, 止泻。用于感冒, 扁桃体炎, 喉炎, 肠炎, 疟疾, 腹泻; 叶: 外用于疮毒。

## 7130009

*Helicteres glabriuscula* Wall.

植物名 细齿山芝麻《中国植志》  
 文献名 光叶山芝麻《广西植志》, 坡油麻《广西本草选编》, 野芝麻根《汇编》

地方名 广西: 地磨薯(宁明); 云南: 野芝麻, 野芝麻棵, 小芝麻, 小黑药。

功效 根或全株: 清热解毒, 截疟, 杀虫。用于疟疾, 感冒, 麻疹, 毒蛇咬伤。

## 7130010

*Helicteres hirsuta* Lour.

植物名 雁婆麻《中国植志》  
 药材名 大果山芝麻(广东)  
 文献名 肖婆麻《海南植志》, 硬毛山芝麻《广西植志》

地方名 坡油麻、坡片麻公、坡麻、油麻甲、鞭谷(广西、海南); 广西: 野芝麻, 假芝麻。

功效 根: 用于慢性胃痛, 消化不良, 胃溃疡。

## 7130011

*Helicteres isora* L.

植物名 火索麻《中国植志》  
 药材名 火索麻(海南)、《汇编》  
 文献名 扭蒴山芝麻《中国经植志》, 大麻树、黎仔麻木《中国药植纲要》

地方名 广东: 癩皮树(广州); 海南: 白麻, 坡片麻, 火绳麻, 鞭龙; 云南: 扭索麻(西双版纳), “买买刘才”、“麻纽赛”(西双版纳傣语), 野芝麻。

功效 根: 解表, 理气止痛。用于感冒发热, 慢性胃炎, 胃溃疡, 肠梗阻。

## 7130012

*Helicteres lanceolata* DC.

植物名 剑叶山芝麻《中国植志》  
 药材名 大山芝麻《广西本草选编》  
 文献名 大叶山芝麻《海南植志》

地方名 广东: 万头果; 广西: 山芝麻(那坡、凤山、隆林), 芝麻茶(隆林), 地麻薯(宁明), 坡芝麻, 米新, 山油麻、假芝麻(邕宁、龙州)。

功效 全草: 解表, 清热, 止痛。用于流感, 痢疾; 叶: 外用于疮疮肿毒, 腮腺炎; 根: 用于蛇咬伤。

## 7130013

*Helicteres viscida* Blume

植物名 粘毛山芝麻《中国植志》  
 文献名 粘毛火索麻《西双版纳傣药志》  
 地方名 云南: “牙新渊”(西双版纳傣语)。

功效 根: 清热解毒, 消炎利尿; 茎、叶: 用于腹痛, 腹泻, 便血, 脱肛。

## 7130014

*Heritiera littoralis* Dryand.

植物名 银叶树《中国植志》  
 地方名 台湾: 大叶白仔。  
 功效 种子: 用于腹泻, 痢疾; 树皮: 用于血尿症。

## 7130015

*Kleinhovia hospita* L.

植物名 鹧鸪麻《中国植志》  
 药材名 馒头果(海南)  
 文献名 克兰树《台湾药植志》  
 地方名 台湾: 面头棵, 栖头恒; 海南: 各钩, 号麻。  
 功效 叶: 外用于疥癣, 头虱等。

## 7130016

*Melochia corchorifolia* L.

植物名 马松子(海南)、《中国植志》  
 药材名 挹地黄(广东)  
 地方名 江苏: 野棉花粘(江浦); 广东: (过路黄)(惠阳); 广西: 假络麻; 云南: 野路葵。  
 功效 茎、叶: 清热利湿。用于急性黄疸型肝炎。

## 7130017

*Pentapetes phoenicea* L.

植物名 午时花《中国植志》  
 药材名 夜落金钱《秘传花镜》, 《广西《园林药录》》  
 文献名 子午花《群芳谱》, 金钱花《名实图考》, 日中金钱、日比尸沙《植物名汇》  
 功效 全草: 散结消肿。外用于脓肿, 乳腺炎, 腮腺炎。

## 7130018

*Pterospermum acerifolium* Willd.

植物名 翅子树《中国植志》  
 文献名 翅子木《台湾药植志》  
 地方名 台湾: 白桐。  
 功效 叶: 止血; 花: 强壮, 杀虫。

## 7130019

*Pterospermum heterophyllum* Hance

植物名 翻白叶树《中国植志》  
 药材名 白半枫荷(广东)  
 文献名 异叶翅子木《中国经植志》, 翻白树《种分》, 异叶翼子木《中国木材学》, 大叶半枫荷、白叶半枫荷《中草药通讯》

地方名 鹅掌枫、半枫荷(湖南、广东、广西); 湖南: 八宝枫; 广东: 姚婆枫(阳江、阳春), 红半枫荷, 红白背(电白), 红荷, 白荷, 白背枫(高州、茂名、阳江、阳春), 番弓长麻, 少女着红裙; 海南: 白布麻, 大种白甫, 支繁, 常汀白布树, 对浩, 十弘, 县晒; 广西: 枫荷桂(平南、陆川、融安), 半边枫荷(融安), 阴阳叶(藤县), 三不怕(昭平), 铁巴掌(南宁), 米新, 米纸, 仙黄麻。

功效 根或茎枝: 祛风除湿, 舒筋活血。用于风湿性关节炎, 类风湿性关节炎, 腰肌劳损, 慢性腰腿痛, 半身不遂, 跌打损伤, 扭挫伤。外用于刀伤出血。

## 7130020

*Pterospermum lanceaefolium* Roxb.

植物名 窄叶半枫荷《中国植志》

药材名 窄叶半枫荷《广东》

文献名 翅子树《海南植志》

地方名 广东:假棉木(信宜)。

备考 根和枝叶,在广西个别地区与桑科桂木属植物半枫荷(*Artocarpus styracifolius*)混用。

## 7130021

*Pterospermum truncatolobatum* Gagnep.

植物名 截裂翅子树《中国植志》

药材名 截裂翅子树《广西药录》

功效 根:用于坐骨神经痛。

## 7130022

*Reevesia pubescens* Mast.

植物名 梭罗树(四川)、《中国植志》

药材名 梭罗树《贵州药录》

文献名 毛叶梭罗《海南植志》

地方名 贵州:野梦花。

功效 树皮:祛风除湿,消肿止痛。用于风湿疼痛,跌打损伤。

## 7130023

*Sterculia brevissima* Hsue

植物名 短柄苹婆《中国植志》

药材名 短柄苹婆《西双版纳傣药志》

地方名 云南:“骂良王”(西双版纳傣名)。

功效 根:用于肝炎,腹泻,腹痛。

## 7130024

*Sterculia euosma* W. W. Smith

植物名 粉苹婆《中国植志》

药材名 粉苹婆《广西药园药录》

功效 叶:用于外伤出血,伤口溃疡;树皮:止咳平喘。

## 7130025

*Sterculia foetida* L.

植物名 香苹婆《中国植志》

文献名 掌叶苹婆、裂叶苹婆《台湾药植志》

功效 叶:解热;根:外用于黄疸病;种子、木材:泻下,堕胎。

## 7130026

*Sterculia hainanensis* Merr. et Chun

植物名 海南苹婆《中国植志》

药材名 小苹婆《广西药园药录》

地方名 广西:红郎伞,个则王(百色)。

功效 叶、根:用于风湿骨痛,跌打损伤。

## 7130027

*Sterculia lanceolata* Cav.

植物名 赛苹婆《树分》

文献名 假苹婆《中国植志》

地方名 广东:鸡冠木(茂名),鸡冠麻,鸡冠皮;海南:亚娘鞋,狗麻,山木棉,山羊角(罗浮山),磨龙角;广西:红郎伞(昭平),米档籽,米当,鸡肝,鸡关木,火索,

九层皮(上林、隆林),鸡皮树(柳江)。

功效 叶:用于除痰火,劳伤;树皮:用于白带,淋浊。

## 7130028

*Sterculia lychnophora* Hance -- *Scaphium lychnophorum* Pierre

植物名 胖大海《中药志》

药材名 胖大海《纲目拾遗》、《药典》

文献名 安南子、大洞果《纲目拾遗》,新州子《药材学》,大海、大海子、大发《中药志》,红胖大海《广西植物》

地方名 通大海、蓬大海、海南子、胡大海(俗称)。

功效 果实:清热润肺,利咽解毒,润肠通便。用于肺热声哑,干咳无痰,咽喉干痛,热结便秘,头痛目赤。

备考 据冯明开在“赴印度考察情况简报”中称:我国引种的胖大海与印度加尔各答植物园栽培的 *Sterculia guttata* Roxb. 为同种,意即我国引种栽培的胖大海学名当为此种,志此供参考(参见《中药材》(4):53,1986)

## 7130029

*Sterculia nobilis* Smith

植物名 苹婆《中国植志》

药材名 罗晃子《桂海虞衡志》

文献名 频婆果《岭外代答》,苹婆《南海志》,九层皮《君子堂日询手镜》,凤眼果、潘安果《生草药性备要》,凤眼果荚《岭南采药录》

地方名 广东:凤眼果壳,苹婆壳,七姐果、富贵子(广州),九层皮果;广西:鸡冠子(上林、凌云),鸡冠树,假九层皮(龙州),九层皮丛,黄皮(容县),六黄子,红皮果(山峨)。

功效 果壳:止痢;种子:温胃,杀虫。用于虫积腹痛,翻胃吐食,疝痛;叶:用于风湿痛,水肿。

## 7130030

*Sterculia nobilis* Smith var. *subspontanea* Hsue

植物名 野生苹婆《广西植物》

药材名 罗晃子《桂海虞衡志》

功效 果壳:止血痢。

## 7130031

*Sterculia pexa* Pierre

植物名 家麻树(广西)、《中国植志》

文献名 棉毛苹婆《中国经植志》,家麻桐《广西药录》,复叶苹婆、绒毛苹婆《广西植录》

地方名 九层皮(广西、云南);广西:“哥波”(壮语),千层皮;云南:果包拗。

功效 树皮:接骨。

## 7130032

*Sterculia scaphigera* Wall. --- *Scaphium wallichii* Schott et Endl.

植物名 圆粒苹婆《植分学报》

地方名 北京:圆粒胖大海,假胖大海[商品名]

功效 种子:清肺热,利咽喉,清肠通便,但作用较

胖大海为差。

备考 过去文献多误以本种为胖大海。

#### 7130033

*Sterculia villosa* Roxb.

植物名 绒毛苧婆《中国植志》

文献名 长毛苧婆《中国经植志》

地方名 云南:白榔皮(耿马、孟定),榔皮树、色白告(思茅),红榔皮。

功效 树胶(梧桐胶):用于医药。

#### 7130034

*Theobroma cacao* L.

植物名 可可《中国植志》

药材名 可可(台湾)

文献名 可可树《中国经植志》,卡卡阿、可加树《树分》

地方名 台湾:哥哥亚;广东:谷谷树;其他:可可豆,柯柯豆,可可子,真可可。

功效 叶、果实、种子:强壮滋养,解痉镇痛。用于糖尿病,水肿病。

#### 7130035

*Waltheria indica* L. --- *W. americana* L.

植物名 蛇婆子《中国植志》

药材名 蛇婆子(海南)、《汇编》

文献名 和他草《中国经植志》,草梧桐《台湾药植志》,〔土苗陈〕《药植简编》

地方名 福建:满地毡、仙人撒网(厦门),仙人抛网(惠安、泉州、厦门、南安),倒枝梅(龙海);广西:大古姆。

功效 根和茎:祛湿,驱风,消炎,解毒。用于下消,白带,痈疖,乳腺炎;根、叶:用于子宫脱垂。

### 7131 木棉科 Bombacaceae

#### 7131001

*Bombax malabaricum* DC. --- *Gossampinus malabarica* (DC.) Merr.

植物名 木棉《纲目》、《中国植志》

药材名 木棉花《生草药性备要》、《(药典)附录》

文献名 古贝《南方异物志》,旆婆、迦罗婆劫《梵书》,斑枝花《汪右丞集》,攀枝花《纲目》,琼枝《梧谿杂佩》,木棉皮《生草药性备要》,木棉根《岭南采药录》,斑枝树《种分》,木棉树《台湾药植志》

地方名 〔海桐皮〕、丁桐皮、红棉(广东、广西),英雄树(广东、广西、云南、福建);福建:斑枝花,攀枝;台湾:斑芝树,斑芝棉,棉树,加薄棉;广东:英雄树根,红茉莉(汕头);广西:生丁木(北流),担花木(桂平),采花木(那坡、桂平、贵县),探花木;云南:“哥牛”(傣语);西藏:“那嘎格刺”〔花丝〕、“白玛格刺”〔花萼〕、“斑玛格刺”〔花瓣〕、“锐赛”〔种子〕〔藏名〕;其他:板枝花,烽火树,红棉树,〔厚朴皮〕

功效 根、根皮:清热利湿,收敛止血。用于慢性胃炎,胃溃疡,产后浮肿,痢疾,瘰癧,跌打扭伤;花:清热利湿,止血。用于泄泻,崩漏,疮疖;树皮:清热利湿,

活血,消肿。用于慢性胃炎,胃溃疡,泄泻,痢疾,腰脚不遂,腿膝疼痛,疮疖,跌打损伤。

#### 7131002

*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.

植物名 美洲木棉《中国植志》

文献名 吉贝《李延寿南史》,爪哇木棉《中国经植志》

功效 树胶:收敛。用于肠疾;幼树根:利尿。用于腹水,皮下水肿;叶:用于淋病;根皮:催吐。

备考 (1)本种原产美洲热带,现广泛引种于亚洲、非洲热带地区;(2)《中国植志》以“吉贝”为正名。《云南植志》认为:“吉贝一名虽见于《南史》,但并不是 *Ceiba* 属,而是 *Gossypium* (棉属)”。按《纲目》云“吉贝者,乃古贝之讹也”,李时珍认为古贝是木棉的异名。

#### 7131003

*Durio zibethinus* Murr.

植物名 榴莲《中国植志》

药材名 韶子《本草拾遗》

文献名 山韶子《桂海虞衡志》,流连《台湾药植志》

地方名 广东:毛荔支。

功效 根、叶:解热;果壳:外用于皮肤病。

### 7132 锦葵科 Malvaceae

#### 7132001

*Abelmoschus crinitus* Wall. --- *Hibiscus cancellatus* Roxb.

植物名 长毛黄葵《中国植志》

药材名 黄茄花《四川中草》

文献名 格纹叶木槿《中药大辞典》

地方名 山芙蓉(海南、广西),〔野棉花〕(四川、云南);海南:黄花马宁;广西:白背木(玉林),假芙蓉(武鸣、凤山),山尖茶;贵州:黄葵;云南:“查拉啊麻云哈”(元江哈尼族语)。

功效 根、花:补脾,化痞,通经,消食。用于胸腹胀满,消化不良;花:用于烫火伤,皮肤红热灼痛等症;籽:用于血淋。

#### 7132002

*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench --- *Hibiscus esculentus* L.

植物名 咖啡黄葵《中国植志》

药材名 秋葵《华北经植志要》

文献名 黄苏葵、黄秋葵《江苏南部种册》

地方名 〔羊角豆〕(广东、广西);上海:糊麻;台湾:毛茄,〔黄蜀葵〕;湖南:越南芝麻;广西:咖啡葵,木丝瓜。

功效 果实:用于喉痛,淋病等;根:用于梅毒。

#### 7132003

*Abelmoschus manihot* (L.) Medicus --- *Hibiscus manihot* L.

植物名 黄蜀葵《中国植志》

药材名 黄蜀葵《嘉祐本草》、《汇编》

文献名 黄葵《说文》,〔侧金盏〕、秋葵《群芳谱》,棉

花葵《名实图考》，黄色葵《阳春县志》，〔草漏芦〕《天宝本草》，霸天伞《汇编》

地方名 假阳桃(福建、广东、广西)，黄秋葵(四川、山东、贵州)，〔野棉花〕(云南、浙江、广西)，〔木芙蓉〕(福建、云南)，野芙蓉(福建、广西)；陕西：羊桃子(白河)；浙江：秋茄花(温州)，山棉花(平阳、丽水)；江西：黄花莲，鸡爪莲，痘疮药，追风药；福建：金花捷报(福州、南平、龙海、永安)，山加剖(福鼎、霞浦)，土黄芪、三胶破(福鼎)，野甲花(福安、宁德)，溪麻、夜合、胡毛核(霞浦)；湖北：麻杆花(神农架)；湖南：棉花七、棉花蒿(溆浦、凤凰)，水棉花(古丈)，小棉花；海南：吸脓膏，假三稔，糖羔花，金花草，毛夹；广西：水芙蓉(钟山、上林、那坡)，水葵，假芙蓉(凌云)，野油麻，鬼布，芙蓉麻；四川：漏芦花，〔漏芦根〕、滑药、夹蒿(成都)，藏郎花(西昌)，雷龙花；云南：大号花、月亮麻、拔毒散(红河)，大苏子，大野棉花，大粘蓟，火灼灼，黄芙蓉，黄共麻，辛麻，玄麻，豹子眼睛花、荞面花(昆明)，卡生花，竹芙蓉；其他：花药草。

功效 根：利水散瘀，消肿，解毒。用于淋病，水肿，乳汁不通，腮腺炎，痈肿；花：通淋，消肿，解毒。用于淋病，痈疽肿毒，烫火烧伤；种子：利水，消肿，通乳。用于淋病，水肿，乳汁不通，痈肿，跌打损伤，骨折；叶：托疮解毒，排脓生肌；茎、茎皮：和血，除邪热。用于产褥热，烫火伤。

#### 7132004

*Abelmoschus manihot* (L.) Medicus var. *pungens* (Roxb.) Hochr.

植物名 刚毛黄蜀葵《中国植志》

药材名 刚毛黄蜀葵《中国植志》

文献名 刚毛秋葵《中国经植志》，黄秋葵叶、黄秋葵根、刚毛黄秋葵《中药大辞典》

地方名 四川：漏芦花、秋葵(峨眉山)；贵州：桐麻；云南：〔野棉花〕，火炮药，黄芙蓉，玄麻，辛麻，辣脚、豹子眼睛(景颇)，豹子眼睛花。

功效 叶：消肿止痛。用于疮疽，骨折，跌打损伤；根：清热利湿。用于水肿，尿路感染。

#### 7132005

*Abelmoschus moschatus* Medicus - - *Hibiscus abelmoschus* L.

植物名 黄葵《中国植志》

药材名 黄葵《广西本草选编》

文献名 假三蕊《生草药性备要》，赶风沙、罗裙博《岭南采药录》，黄秋葵《中药材》

地方名 芙蓉麻、野油麻、野棉花(云南、广西)，假棉花(广东、广西)；福建：山油麻；台湾：药虎，碌碡草，三脚蟹，三脚破；湖北：狭叶麻杆花(神农架)；广东：鸟笼胶，野名桃、大样吸脓羔、打破碗、〔黄蜀葵〕(阳春)，假棉桃，野杨桃，黄少其，吸脓羔(阳山)，六角英(惠阳)；海南：假山捻，毛夹，山芙蓉，假杨桃；广西：野芙蓉，野棉桃，野棉，鬼布，水芙蓉(桂平、贵县、平南、灵山、昭平)；云南：麝香秋葵；西藏：“索玛拉札”(藏名)；其他：〔冬葵〕。

功效 根：清热解毒，润肠通乳。用于高热不退，肺热咳嗽，产后乳汁不通，大便秘结，阿米巴痢疾，尿路结石；叶：消肿排脓。外用于痈疮肿毒，痈疽，骨折；花：外用于烧烫伤。

#### 7132006

*Abelmoschus muliensis* Feng

植物名 木里秋葵《中国植志》

地方名 云南：〔野棉花〕〔根〕。

功效 根：通经。

#### 7132007

*Abelmoschus sagittifolius* (Kurz) Merr. - - *A. moschatus* Medicus ssp. *tuberosus* (Span.) Borss. - - *A. esquirolii* (Levl.) S. Y. Hu

植物名 箭叶秋葵《中国植志》

药材名 五指参《汇编》

文献名 秋葵、黄蜀葵、毛茄、山茄、潺茄《植物名汇》，箭叶黄葵《广西植录》

地方名 广东：五指山参；海南：红花马宁；广西：山芙蓉(博白)，野芙蓉、水芙蓉(柳州、贵县)，鬼花(隆林)，红花参，假芙蓉(南宁)；贵州：梓桐花，野棉花；云南：香铃草、灯笼花(昆明)，黑芝麻(曲靖)，红兰花(玉溪)，铜皮、小红芙蓉(红河)，岩酸(思茅)，火炮草；其他：黄葵，假杨桃。

功效 根、叶：滋阴清热，排脓拔毒。用于肺结核，肺燥咳嗽，产后便秘，痈疮肿毒。

#### 7132008

*Abutilon hirtum* (Lamk.) Sweet

植物名 恶味尚麻《中国植志》

文献名 黄花磨盘草《元江哈尼族药》

地方名 云南：“扒额药坡”(元江哈尼语)。

功效 根、籽：健脾消食，利水消肿。用于饮食积滞，脾虚水肿。

#### 7132009

*Abutilon indicum* (L.) Sweet

植物名 磨盘草《中国植志》

药材名 磨盘草《岭南采药录》、《汇编》

文献名 金花草、磨挡草《生草药性备要》，耳响草《岭南采药录》

地方名 石磨子、磨盆草(广西、福建)，磨盘根、白麻(广东、广西)，磨谷子、磨笼子(河南、广东、广西)，磨盘花(云南、广西)，磨仔草(福建、广东)，中估仔麻(河南、广东)，〔冬葵子〕(华南、台湾)，磨仔树(广东、海南)；福建：磨仔盾，磨盾草、雨伞杆(厦门)，文头草，土蓑草；台湾：米蓝草、紫薇草、帽仔盾、帽仔顿草、帽仔盾头(根、茎)、磨仔盾草、研仔盾草、朴仔草(南极)，四米草，四马草，倒拂风，倒吊风；广东：假茶仔、蚊仔(佛山)，下龙被哺(陆丰、惠来、普宁)，天槌草、磨谷蕨(化县)，磨牙草，耳聩草，淋磨乙(新会)，麻蓉草(五华、潮安)，磨磨砣，挨砣白礁(潮安)，挨砣蜘蛛、王不留行、刘行草、留行草(潮阳)；海南：牛响草，短龙糠(儋县)；广西：帽笼子(陆川、博白)，半截磨、水磨蕨、尚麻、磨盆木、木广根(桂林)；云南：磨鲛果，复盆子，累子草(红河)。

功效 全草或根:疏风清热,益气通窍,祛痰利尿。用于感冒,久热不退,流行性腮腺炎,耳鸣,耳聋,肺结核,小便不利。

## 7132010

*Abutilon indicum* (L.) Sweet var. *guineense* (Schumacher) Feng --- *A. taiwanensis* S. Y. Hu

植物名 几内亚磨盘草《中国植志》

药材名 台湾磨盘草《台湾药植志》

文献名 台湾苘麻《台湾药植志》

功效 全株:用于耳聋,耳鸣,重听。

## 7132011

*Abutilon paniculatum* Hand. - Mazz.

植物名 圆锥苘麻《中国植志》

地方名 云南:〔土黄茛〕,巴巴花,巴巴叶,磨盘草。

功效 全株:清热消炎,补肾。用于感冒发热,腮腺炎,耳鸣,甲状腺肿大,神经衰弱。

## 7132012

*Abutilon sinense* Oliv.

植物名 华苘麻《中国植志》

药材名 豹子眼睛花《汇编》

地方名 云南:老熊花,芙蓉花,豹子眼睛果。

功效 根皮:消炎,接骨。用于肝炎,淋巴腺炎,乳头炎,疮疖,骨折,脚癣。

## 7132013

*Abutilon striatum* Dickson.

植物名 金铃花《中国植志》

药材名 金铃花《广西药录》

文献名 风铃花《台湾药植志》

地方名 灯笼花(福建、广西);台湾:猩猩花;广西:金棒花(融水)。

功效 叶:用于跌打损伤;花:清热解毒,活血。

## 7132014

*Abutilon theophrasti* Medicus --- *A. avicennae* Gaertn.

植物名 苘麻《唐本草》、《中国植志》

药材名 苘麻子《圣济总录》、《药典》

文献名 籒《说文》,𦉰《礼记》,苘实《唐本草》,苘麻根《蜀本草》,𦉰麻子《产乳集验方》,籒实《圣济总录》,籒馒头《救荒本草》,籒麻、白麻《纲目》,青麻《名实图考》,籒子、手巾花《植物名汇》,〔冬葵子〕《药典》,𦉰、桐麻《中药志》

地方名 火麻(甘肃、湖北),青麻子(东北、河北),破古纸(东北);北京:大夫叶;河北:𦉰麻;山西:葵子;陕西:桐麻杆;甘肃:故纸(文县);山东:苘;江苏:空麻子(泰县、镇江),野青,野麻,野苘,野绿麻,野芝麻,野苎麻子,紫菁,绿菁,活剥皮,家孔麻,鬼馒头草;上海:野麻子,白麻子,点圆子草,馒头姆,孔麻;浙江:桐麻皮(天目山);安徽:塘麻;江西:磨盘草,磨盘子树,车轮草;湖北:椿麻,椿麻子;湖南:〔野棉花〕,叶生毛(凤凰);四川:〔胡麻〕(西昌),桐麻子(蓬溪);其他:八角乌,野棉花子。

功效 种子:清热利湿,解毒,退翳。用于赤白痢疾,淋病涩痛,痈肿目翳;全草:解毒,祛风。用于痢疾,

中耳炎,耳鸣,耳聋,关节酸痛;叶:用于痈疽肿毒。

## 7132015

*Althaea officinalis* L.

植物名 药蜀葵《中国植志》

药材名 药蜀葵《汇编》

文献名 欧蜀葵《中药志》,药用蜀葵(叶《生药》)

地方名 新疆:〔黄菁〕。

功效 根:祛痰,镇咳,消炎。

## 7132016

*Althaea rosea* (L.) Cavan. --- *Alcea rosea* L.

植物名 蜀葵《中国植志》

药材名 蜀葵《千金·食治》、《汇编》

文献名 苒、戎葵《尔雅》,侧金盏《尔雅翼》,吴葵华《别录》,蜀葵花《千金·食治》,胡葵《千金方》,蜀葵根、蜀葵子《本草拾遗》,白淑气花、〔土黄茛〕、白蜀葵、小蜀葵《滇南本草》,蜀葵苗《纲目》,阳草、卫足葵《花镜》,葵花《名实图考》,棋盘花《分类草药性》,大熟季、红大熟季、紫大熟季、白大熟季、黄大熟季、黑大熟季、藕合《植物名汇》,获葵、杖石、杖红、杖葵《新纲》,黍菊花、大收花《满洲植录》,舌其花《中国植物图鉴》,蜀其花《本草推陈》,淑气、蜀季、蜀芪、舌其、暑气、树茄《云南植志》,大蜀季《民族药志》,大熟钱《东北草本植志》

地方名 大蜀季花(东北、内蒙古),大收旧花(东北),端午花(东北、安徽、江苏),端午锦(华北),秋桔花(河北、安徽),麻杆花(河南、湖北),一丈红(陕西、贵州);河北:蜀菊花,熟曲花(保定),大季花(张家口);内蒙古:“哈楼一其其格”(蒙名);陕西:鐮钹花、擗杖花(延安),斗蓬花;甘肃:紫花;青海:“泡锦”(藏名),胡及;新疆:“阿克来依里”(维语);山东:悖悖花、光光花(烟台);安徽:大秋花,饼子花;河南:麻析花,钗婆花,牛柿饼花,黍桔花,蜀季花;湖北:果木花,木槿花;湖南:水芙蓉;四川:“降巴”(藏名),树旗花(峨眉山);云南:公鸡花;其他:蜀再,红牡丹,〔黄茛〕。

功效 根:清热凉血,利尿排脓。用于淋病,白带,尿血,吐血,血崩,肠痈,疮肿;种子:利水通淋,滑肠。用于水肿,淋病,便秘,疮疥;花:和血润燥,通利二便。用于痢疾,吐血,血崩,带下,二便不通,疟疾,小儿风疹;茎叶:用于热毒,下痢,淋病,金疮。

## 7132017

*Gossypium arboreum* L.

植物名 树棉《中国植志》

药材名 棉花根、棉籽《汇编》

文献名 中棉、木棉《种分》,印度棉《广州植志》,木本棉《台湾药植志》,木本鸡脚棉《海南植志》

地方名 台湾:鸡脚棉,棉花,棉花子;广西:假棉花(上林);其他:土黄茛,长绒棉花。

功效 根:补气,止咳,平喘。用于慢性支气管炎,体虚浮肿,子宫脱垂;种子:有毒。补肝肾,强腰膝,暖胃止痛,止血,催乳。用于月经过多,功能性子宫出血,乳汁缺乏,胃痛,腰膝无力。

## 7132018

*Gossypium arboreum* L. var. *obtusifolium* (Roxb.)

Roberty --- G. nanking Meyen

植物名 钝叶树棉《中国植志》

文献名 中棉《台湾药植志》

地方名 云南:鸡脚棉。

功效 根皮:通经,催产;籽油:催乳。

#### 7132019

*Gossypium barbadense* L.

植物名 海岛棉《中国植志》

文献名 光籽棉《华北经植志要》

地方名 云南:木棉、离核木棉(开远)。

功效 种毛:止血。用于吐血,下血,血崩,金疮出血。

#### 7132020

*Gossypium barbadense* L. var. *acuminatum* (Roxb.)

Mast. --- G. basiliense Macf.

植物名 巴西海岛棉《中国植志》

文献名 巴西棉《广西植录》

功效 种子:催乳。用于乳汁缺少。

#### 7132021

*Gossypium herbaceum* L.

植物名 草棉《中国植志》

药材名 棉花根(上海)、《汇编》

文献名 棉花、棉子油、古终《纲目》,棉花子、棉花壳《百草镜》,木棉子《本草经疏》,棉花核《兰台轨范》,古终葵《南越志》,亚拉伯棉《高植图鉴》,非洲棉、小棉《广西植录》

地方名 上海:蜜根;浙江:本地棉;云南:“发糯”(西双版纳傣语);其他:〔土黄芪〕。

功效 种毛:止血。用于吐血,下血,血崩,金疮出血;脂肪油:外用于恶疮,疥癣;种子:补肝肾,强腰膝,暖胃止痛,止血,催乳。用于月经过多,功能性子宫出血,乳汁缺乏,胃暖,腰膝无力;根:补气,止咳,平喘。用于慢性支气管炎,体虚浮肿,子宫脱垂;根、种子:可抑制妊娠及精子发育。

#### 7132022

*Gossypium hirsutum* L.

植物名 陆地棉《中国植志》

药材名 棉花根《汇编》

文献名 大陆棉《树分》,墨西哥棉《华北经植志要》,美洲棉《经植手册》,高地棉《广州经植》

地方名 棉花、棉籽(浙江、福建、广西、山东、湖北);上海:蜜根;其他:〔土黄芪〕,大籽棉花。

功效 根:补气,止咳,平喘。用于慢性支气管炎,体虚浮肿,子宫脱垂;种子:有毒。补肝肾,强腰膝,暖胃止痛,止血,催乳。用于月经过多,功能性子宫出血,乳汁缺乏,胃痛,腰膝无力。

#### 7132023

*Hibiscus cannabinus* L.

植物名 大麻槿《中国植志》

药材名 槿麻(广西)

文献名 洋麻《经植手册》,葵麻《济南植录》,芙蓉麻《华北经植志要》

地方名 〔冬葵子〕(东北);台湾:野麻,钟麻。

功效 叶:轻泻;花:用于胆道疾患。

#### 7132024

*Hibiscus indicus* (Burm. f.) Hochr.

植物名 美丽芙蓉《中国植志》

药材名 野槿麻《元江哈尼族药》

文献名 芙蓉木槿《海南植志》

地方名 海南:大棣山芙蓉;广西:芙蓉(博白、平南),早芙蓉(贵县);云南:野芙蓉,野棉花,“查拉阿妈帮呵”(元江哈尼语)。

功效 根:消食散结,通淋止血。用于腹胀,血尿,便秘。

#### 7132025

*Hibiscus mutabilis* L.

植物名 木芙蓉《中国植志》

药材名 木芙蓉《纲目》、《汇编》

文献名 芙蓉花《清异录》,地芙蓉花《图经》,拒霜叶《世医得效方》,芙蓉花叶《普济方》,木芙蓉叶《多能鄙事》,拒霜花《益部方物略记》,白槿树《救荒本草》,木莲《江醴陵集》,醉酒芙蓉《生草药性备要》,四面花、转观花《群芳谱》,文官花《花史》

地方名 水芙蓉、秋芙蓉(广东、福建),三变花(广东、广西);江苏:〔木棉〕;安徽:九头花,犬胡麻;江西:胡李花,胡索花(铜鼓);福建:霜降花(泉州、漳州),得封花,富常花,刺瓜香、熊一飞(南平),大鼎花、桃木(泉州),野甲花(福安);台湾:山芙蓉,狗头芙蓉;河南:织女麻;湖北:紫参麻(神农架);湖南:铁箍散(长沙、黔阳),芙蓉林,山苳麻(常德、黔阳);广东:单瓣芙蓉花、大叶芙蓉(广州),大芙蓉,大芙蓉叶(南澳、海丰);广西:早芙蓉(贵县),大红花,芙蓉(博白、北流);四川:七星花(西昌),七心花(峨眉山);云南:片掌花,月亮花、瓣皮根、〔野棉花〕(红河)。

功效 叶、花、根:清肺凉血,散热解毒,消肿挑脓。用于肺热咳嗽,肥厚性鼻炎,淋巴结炎,阑尾炎。外用于痈疽脓肿,急性中耳炎,烧烫伤。

#### 7132026

*Hibiscus mutabilis* L. form. *plenus* (Andrews) S. Y. Hu

--- *H. mutabilis* L. var. *flore-pleno* Andrews

植物名 重瓣木芙蓉《中国植志》

药材名 木芙蓉《中草药通讯》

功效 花、叶:清肺凉血,散热解毒,消肿排脓。

#### 7132027

*Hibiscus radiatus* Cav.

植物名 辐射刺芙蓉《中国植志》

地方名 福建:金线吊芙蓉(厦门)。

功效 花:用于咳嗽,肺结核。

#### 7132028

*Hibiscus rosa-sinensis* L.

植物名 朱槿《南方草木状》、《中国植志》

药材名 扶桑《纲目》、《汇编》

文献名 花上花《南越笔记》,大红花《汉音韵府》,赤槿、日及《南方草木状》,桑槿《酉阳杂俎》,佛桑《岭表录

异),扶桑叶、扶桑花(纲目),福桑(广东新语),舜英、小牡丹(两粤琐语),扶桑菊(花镜),琉球槿(叶(生药)),红木槿(中药大辞典)

地方名 吊钟花(广东、广西);北京:朱槿牡丹,竹锦牡丹,泡红花;福建:佛桑花(福州);广东:月月红(广宁、四会),白肉花(始兴);海南:小桑叶(定安),猪头尾(琼中);广西:大红牡丹花(南宁),土红花(陆川、苍梧),〔红花〕(合浦),紫花兰(龙州),竹槿花(玉林),桑白(平南);云南:“糯米娘”(西双版纳傣名),公鸡花、木花(红河),状元红;其他:照殿红。

功效 根、叶、花:解毒,利尿,通经;根:用于腮腺炎,支气管炎,尿路感染,子宫颈炎,白带,月经不调,闭经;叶、花:外用于疔疮脓肿,乳腺炎,淋巴腺炎;花:用于月经不调。

#### 7132029

*Hibiscus rosa-sinensis* L. var. *rubro-plenus* Sweet

植物名 重瓣朱槿(中国植志)

药材名 佛桑花(纲目拾遗)、《新华本草纲要》

文献名 朱锦、佛桑(名实图考),扶桑(台湾药植志)

地方名 北京:朱槿牡丹;广东:酸醋花;四川:月月开。

功效 根、叶、花:解毒,利尿,调经;根:用于腮腺炎,支气管炎,尿路感染,子宫颈炎,白带,月经不调,闭经;叶、花:外用于疔疮脓肿,乳腺炎,淋巴腺炎;花:用于月经不调。

#### 7132030

*Hibiscus sabdariffa* L.

植物名 玫瑰茄(中国植志)

药材名 玫瑰茄(福建药物志)

文献名 洛神葵、洛济葵、山茄(台湾药植志)

地方名 福建:红金梅(漳州),红梅果(漳浦);广东:山茄子(广州)。

功效 花萼:清热解渴,敛肺止咳。用于高血压,咳嗽,中暑,酒醉;种子:强壮,轻泻,利尿;叶:外用于疥疮。

备考 本品原产印度,现我国广东、广西、台湾、福建有引种。

#### 7132031

*Hibiscus schizopetalus* (Masters) Hook. f.

植物名 吊灯扶桑(中国植志)

文献名 吊灯花(海南植志),裂瓣朱槿、裂瓣槿(台湾药植志)

地方名 假西藏红花(广东、广西);广东:五凤花,绣球花,吐丝红,灯笼花;广西:红花(北流),南洋红花(玉林)。

功效 叶:拔毒生肌。外用于腋下生疮;茎皮:用于癣疮。

#### 7132032

*Hibiscus sinosyrriacus* Bailey

植物名 华木槿(中国植志)

药材名 大花木槿(江西药录)

功效 花:清湿热,凉血。

#### 7132033

*Hibiscus surattensis* L.

植物名 刺芙蓉(中国植志)

文献名 刺木槿(海南植志),万金葵(台湾药植志)

地方名 广东:五爪藤。

功效 根、叶:用于皮肤病。

#### 7132034

*Hibiscus syriacus* L.

植物名 木槿(中国植志)

药材名 木槿(本草拾遗)、《汇编》

文献名 舜(诗经),朝生(诗毛氏传疏),朝菌(庄子),椶(尔雅),日及(尔雅)郭璞注,藩篱草(仁斋直指方),赤槿(南方草木状),木槿花(日华子本草),里梅花(岭外代客),朝开暮落花、花奴、木槿皮、木槿子(纲目),疳子花(群芳谱),篱障花(荆州府志),槿皮(救急方),川槿皮(养生经验合集),爱老、重台、花上花(花镜),川木槿(纲目拾遗),朝天子(饮片新参),木锦、喇叭花(树分),茶金条(诗草木今释),川槿子、槿树子、白槿皮(药材学),白槿花、桐树(中国药植志),白牡丹、清明蒿、木桂花树、菜花树(中药大辞典)

地方名 槿树(江苏、上海),白水锦花(台湾、广东),白篱笆花(福建、广东),水锦花(福建、台湾),鸡肉花(广东、广西);山东:芭壁花(烟台);江苏:桐树皮、桐树花(常州),平条树(泰县),大碗花(云台山、新海连);上海:金漆树,槿柳条;浙江:槿漆,白捣碗破花(嵊县),白木槿,千年蒿,菜园蒿;安徽:平条,木槿条,猪油花,栏杆蒿,芦树皮;江西:打碗花,篱沿树(德兴),藩篱树(吉水);福建:白玉花,白饭花(松溪、政和、罗源、南平、建瓯),白面花(宁化),白布篱(福州、闽侯、罗源、松溪、古田等),白水锦(龙溪地区),白木锦花(华安、福鼎、霞浦),白棉花(大田),白篱笆桑,白公牛花(闽东),白佛花,白关门花,白锦葵花,白和尚花,白奔篱花、白花根、红佛仔花(松政),白木桑、和尚花、公牛花(南平),饭汤花(南平、三明),肉花(龙溪、龙岩、武平),扁状花,苦松花,姑婆花,红肿花,芙蓉(龙溪),水绵花;台湾:土槿皮;河南:木槿条子;湖北:插金条;湖南:木蓼花(衡山),碗杂花树、芭壁树、碗盏花、插刺树、插柳树(常德),木荆花(长沙);广东:鸡肉树、佛桑花、白佛桑花、白朵花、白花栏果篱、白鸡肉花、园篱花、水槿花(潮安);广西:红牡丹、(牡丹)(平南、桂平),〔牡丹皮〕(昭平、贵县),枝槿(苍梧),木红花(北流),碗盏花,盖碗花,芙蓉树;云南:本葵花,〔木芙蓉〕;其他:杈木,甘花树,无穷花,红木槿花,〔茶花〕。

功效 花:清湿热,凉血。用于痢疾,腹泻,痔疮出血,白带。外用于疳肿;根皮、茎皮:清热利湿,杀虫止痒。用于痢疾,白带,阴囊湿疹,体癣,脚癣;果实:清肺化痰,解毒止痛。用于痰喘咳嗽,神经性头痛。外用于黄水疮。

#### 7132035

*Hibiscus syriacus* L. f. *albus-plenus* Loudon

植物名 白花重瓣木槿(中国植志)

功效 花:用于白带,痢疾。

### 7132036

*Hibiscus taiwanensis* S. Y. Hu

植物名 台湾芙蓉《中国植志》

文献名 狗头芙蓉、山芙蓉《台湾药植志》

功效 根:消炎、解毒、解热。用于关节炎,痢症恶疮肿毒。

### 7132037

*Hibiscus tiliaceus* L.

植物名 黄槿《李文饶文集》、《中国植志》

药材名 黄槿《汇编》

文献名 黄芙蓉《花镜》,右纳《中山传信录》,黄木槿《海南植志》

地方名 木麻、海麻(广东、广西),朴仔、果叶(华南);台湾:盐水面头果;广东:万年春,九重皮;海南:没麻,陆麻,叶网麻,丹枚,脉麻,坡麻,披麻,铜麻,苦皮麻,山加半,港麻;广西:海麻桐,公背麻,弓背麻,海罗麻,海南木(合浦)。

功效 叶、树皮、花:清热解毒,散瘀消肿。用于木薯中毒,疮疖肿毒。

### 7132038

*Hibiscus trionum* L.

植物名 野西瓜苗《中国植志》

药材名 野西瓜苗《救荒本草》、《汇编》

文献名 秃汉头《救荒本草》,芙蓉花《满州植录》,草芙蓉《满鲜植志》,银钱花《牧野日图》,打瓜花、山西瓜秧《东北中草》

地方名 富贵花、毛球花(东北),和尚头(陕西、甘肃、宁夏、内蒙古);内蒙古:“浩柄-乌布斯”(蒙名),灯笼草;山西:银盏花,朝露花;陕西:和尚脑白;山东:莠西瓜(济南);江苏:灯笼泡(盐城),葛菜(邳县),灯泡果(射阳),野菱秧子(连云港);四川:山芝麻,地莲花(会东),野西瓜、灯花(西昌);贵州:小秋葵、冬葵(贵阳),天泡草;云南:香铃草、灯笼花(昆明),野芝麻、黑芝麻(曲靖),火炮草(红河),小聋耳朵草。

功效 全草:清热解毒,祛风除湿,止咳,利尿。用于急性关节炎,感冒咳嗽,肠炎,痢疾。外用于烧、烫伤,疮毒;种子:润肺止咳,补肾。用于肺结核咳嗽,肾虚头晕,耳鸣耳聋。

### 7132039

*Kydia calycina* Roxb.

植物名 翅果麻《中国植志》

药材名 翅果木《云南中草药》

文献名 枹的木《中国经植志》,枹的槿《中国植志》

地方名 云南:火绳树

功效 皮、叶:收敛止血,续筋接骨。用于刀枪伤,外伤出血,烧烫伤,骨折,慢性胃炎,胃溃疡。

备考 本品为生产紫草茸的寄主植物之一。

### 7132040

*Malva crispa* L.

植物名 皱叶锦葵《华北经植志要》

药材名 冬葵子(南方部分地区)

文献名 冬葵《本经》,冬寒菜《名实图考》

地方名 葵菜、冬苋菜(湖南、贵州、四川);江西:蕺菜。

功效 果实:清热利尿,消肿。用于尿路感染,尿闭,水肿,口渴。

备考 《云南植志》(1979)、《中国植志》(1984)称本种植物为“冬葵”,其根据主要按《名实图考》之图考证而得。然而陶弘景说:“以秋种葵,覆养经冬,至春作子者,谓之冬葵。”本种植物为一年生草本,似与陶说不符。故本书仍以二年生或三年生之 *M. verticillata* L. 为冬葵正品,在入药方面,二者通用。

### 7132041

*Malva mohileviensis* Downar

植物名 北锦葵《东北草本植志》

地方名 内蒙古:冬葵,“扎木巴-其其格”(蒙名)。

功效 种子:利尿,止痢,补气,止汗,生肌,利尿。

### 7132042

*Malva rotundifolia* L. --- *Malva neglecta* Wallr.

植物名 圆叶锦葵《中国植志》

药材名 圆叶锦葵《汇编》

文献名 野锦葵《秦岭植志》

地方名 土黄芪(安徽、陕西、河南),烧饼花(甘肃、河南),烧饼果、烧饼棵(安徽、河南),[黄芪](江苏、陕西);陕西:献干粮、狗干粮(眉县),[磨盘草](柞水);山东:冬葵子(济宁);江苏[苏黄芪](盱眙);安徽:小秧桔花,白马棵,土芳苗;河南:地黄芪,碾盘叶,磨盘棵,牛尿甸塌。

功效 根:益气止汗,利尿通乳,托毒排脓。用于贫血,乳汁缺少,自汗,盗汗,肺结核咳嗽,肾炎水肿,血尿,崩漏,脱肛,子宫脱垂,疮疡溃后脓稀不易愈合。

### 7132043

*Malva sinensis* Cavan. --- *Malva sylvestris* auct. non L.

植物名 锦葵《群芳谱》、《中国植志》

药材名 锦葵《汇编》

文献名 苳《诗经》,荆葵(陆玑《诗疏》),钱葵《草花谱》,金钱紫花葵《研经堂葵考》,小白淑气花《滇南本草》,小黍菊花《盛京通志》,小叔敬花《植物名汇》

地方名 抽筋草(陕西、甘肃、宁夏);河北:小季花、小季子(张家口);天津:小麦熟;内蒙古:小蜀葵花,小熟季花;江苏:麦桔花(射阳),小钱花;河南:冬苋菜,冬葵子(郑州、禹州);四川:棋盘花;贵州:茄花;云南:淑气花,俗气花。

功效 花、叶、茎:清热利湿,理气通便。用于大小便不畅,淋巴结核,带下,脐腹痛。

备考 有些文献将本种学名误订为 *M. sylvestris* L.

7132044 见 7132046a

### 7132045

*Malva verticillata* L. --- *Malva pulchella* Bernh.

植物名 冬葵《药典》

药材名 冬葵子《本经》、《中药大辞典》

文献名 葵《诗经》,葵菜《说文》,苳《广雅》,露葵《尔



雅翼》，葵根《别录》，葵子《金匱要略》，菟葵《唐本草》，葵菜子《妇人良方》，冬葵苗叶《图经》，冬葵菜《救荒本草》，土黄芪、芪菜叶《滇南本草》，滑菜《纲目》，卫足《群芳谱》，马蹄菜、蕲菜《医林纂要》，滑肠菜《宁都州志》，金钱葵、金钱紫花葵《研经室集》，小季〔种子〕、野苋菜、荷叶花、小蜀、奇菜子、滑葵子《植物名汇》，藤菜子、露葵子、阿郁子、〔向日葵子〕《新纲》，野葵、旅葵《中国植志》，冬葵果《药典》

地方名 冬寒叶、冬寒菜（云南、四川），冬旱菜、棋盘菜（云南、湖北），滑滑菜（青海、贵州）；吉林：粘滑菜；内蒙古：“萨嘎日木克-扎木巴”、“俄布勒吉占日-其其格”（蒙名）；陕西：〔白香〕（淳化）；青海：“玛能锦巴”（藏名），滑滑子；四川：冬苋菜子、小棋盘花（汶川），七叶菜，枇杷叶，“捆拉”（藏名）；贵州：冬苋菜（贵阳）；云南：芪菜巴巴叶，粘枇杷叶、杷杷叶、把把叶、巴巴叶（红河），糯杷叶（文山），团巴巴叶，红树茄花（昭通），野冬苋菜，棋盘叶，轮叶锦葵。

功效 果实：清热利尿，消肿。用于尿路感染，尿闭，水肿，口渴；根：补中益气。用于气虚乏力，腰膝酸软，体虚自汗，脱肛，子宫脱垂，慢性肾炎，糖尿病；茎叶：清热利湿，用于黄疸型肝炎。

备考 历代本草所载冬葵子之附图均为本种，但今市场上的冬葵子商品几乎全部为苘麻的种子，两者能否代用，值得再从疗效等深入研究。

## 7132046

*Malva verticillata* L. var. *chinensis* (Miller) S. Y. Hu

植物名 中华野葵《中国植志》

药材名 中华野葵《广西药录》

文献名 菟葵《唐本草》，天葵《图经》

地方名 广西：乳痈药（隆林）。

功效 全草：外用于乳痈，痈疮肿毒。

## 7132046a

*Malvastrum coromandelianum* (L.) Gurcke

植物名 赛葵《中国植志》

药材名 赛葵《广西中草药》

地方名 黄花如意、大号黄葵子（华南）；福建：山索血（龙海），山茶心（晋江），四美草（厦门）；台湾：苦麻；广东：大叶黄花猛、摊地黄（惠阳），黄花猛（新会）；广西：黄花棉（南宁），黄花草（百色）。

功效 全草：清热利湿，解毒散瘀。用于感冒，肠炎，痢疾，黄疸型肝炎，风湿关节痛。外用于跌打损伤，疔疮，痈肿。

## 7132047

*Malvaviscus arboreus* Cav. var. *penduliflorus* (DC.) Schery

植物名 垂花悬铃花《中国植志》

药材名 悬铃花《广西药园药录》

功效 根皮、叶：拔毒消肿。用于恶疮。

## 7132048

*Sida acuta* Burm. f.

植物名 黄花稔《中国植志》

药材名 黄花稔（云南）、《中药大辞典》

文献名 蛇总管《台湾药植志》

地方名 福建：〔土黄芪〕（福州、闽侯），黄花麻，山黄麻；台湾：柑仔蜜，四米草，四米仔草，嗽血仔草；广东：假黄麻，灶江；海南：细叶金午时花，扫把麻；广西：嗽见消（百色），山麻（合浦）；云南：拔毒散（思茅），“亚罕阿”、“牙罕满因”（西双版纳傣语）。

功效 根、叶：清热解毒，消肿止痛，收敛生肌。用于感冒，乳腺炎，痢疾，肠炎，跌打伤，骨折，痈疮疖肿，外伤出血。

## 7132049

*Sida alnifolia* L. --- *Sida retusa* L.

植物名 枹叶黄花稔《中国植志》

药材名 黄花母（广西）、《汇编》

文献名 小柴胡《海南植志》，小叶黄花稔《广西植志》

地方名 广东：英仔草、软枝胶播（潮安），生毛英仔草、梅肉草、软枝虱母头、狗脚迹（潮阳），蔓藤虱母头仔、胎仔草（饶平），生毛虱母头、小号山胶胖、虱母头仔（普宁），细种黄花母，细叶黄花母，嗽脓羔，白背黄花稔，麻笔；广西：砂宁根（平南），拔脓草（平南、宁明），地膏草（柳江），地膏药、地马桩（田林），牛筋麻（乐业），治疮根、母鸡丁、黄花草（北海），黄花婆粥，脓见愁，脓见愁根；贵州：牛肋筋（望谟），糯米药。

功效 全株：清热利湿，拔脓消肿。用于黄疸，痢疾，胃脘痛，哮喘，疔疮肿毒。

## 7132050

*Sida alnifolia* L. var. *microphylla* (Cavan.) S. Y. Hu

植物名 小叶黄花稔《中国植志》

药材名 小叶黄花母（拟）

文献名 小叶小柴胡《海南植志》，小叶拔毒散《云南药录》

地方名 广西：黄花草（乐业、富川）；云南：黄秋葵，芙蓉花，草芙蓉。

功效 叶、根：用于疔疮，感冒，咽喉肿痛，子宫脱垂。

## 7132051

*Sida cordata* (Burm. f.) Borss. --- *Sida humilis* Cavan. --- *Sida veronicaefolia* Lam.

植物名 长梗黄花稔《中国植志》

功效 全草：清热解毒，利尿。用于肾炎。

## 7132052

*Sida cordifolia* L.

植物名 心叶黄花稔《中国植志》

药材名 黄花仔《闽南民间草药》

文献名 圆叶金午时花、圆叶嗽血草、细号嗽血仔草《台湾药植志》

地方名 福建：四美草（闽南）；台湾：倒地麻，黄花少四味，嗽血草，小号嗽血草；广东：心叶洋麻；广西：白虱麻头（陆川），白痴头婆（苍梧），小白骨株（北流），大花黄花稔，大黄花母（百色），假黄草；云南：心叶拔毒散。

功效 全草：清热解毒，散瘀消肿，通经堕胎。用于支气管炎，乳腺炎，痈疮肿毒，阑尾炎。

## 7132053

*Sida insularis* Hatusima

植物名 赐米草《台湾药植志》  
 地方名 台湾:大号嗽血仔草,鬼柳根,竖子嗽血仔,四米草,四美草,树仔草。  
 功效 叶、茎:用于胎毒,创伤。

## 7132054

*Sida mysorensis* Wight & Arn.

植物名 粘毛黄花稔《中国植志》  
 药材名 黄花仔《闽南》  
 文献名 索仔草《实用中草药》  
 地方名 福建:吸血草《闽南》;广西:磨盘公。  
 功效 全草:清热解暑,散瘀消肿。用于支气管炎、乳腺炎、痈疮肿毒、阑尾炎。

## 7132055

*Sida rhombifolia* L.

植物名 白背黄花稔《中国植志》  
 药材名 白背黄花稔《汇编》  
 文献名 金午时花《种分》,白花黄花稔《广州植志》,素花草《中草药学》,细叶黄花稔《广西本草选编》,菱叶黄花稔《西昌中草药》

地方名 黄花雾、黄花草(广东、广西),黄花仔(福建、广东),黄花母、地膏药(广东、广西、四川、云南),黄花猛(广东、广西、云南),黄花地桃花(贵州、云南);福建:〔金盏花〕、单枝落地(泉州),〔土黄茛〕(厦门、同安、闽侯、福州),黄金树(三明),吸血草(泉州、漳州),黄茛仔、乏力草(闽侯、福州),黄葵;台湾:鬼柳根,赐米草,竖仔嗽血草,嗽血草,大号嗽血草;广东:黄花棉子(五华),黄花虱母头(揭阳),黄花肉草、野生肉药、细叶虱麻头(兴宁),黄花萌(从化、花县、广州),黄花母雾,梅皮草(潮安、潮阳),梅肉草、硬枝梅肉草(汕头),枚母草(潮汕),皮肉草(潮安、潮州),生肌草(潮安、揭阳),虱母头、生毛英仔草、山鸡绸(潮阳),小号虱母头仔(普宁),英仔草、铁树仔、薄壳米仁草(澄海),倒地金网(惠来),吸血仔(海丰),疔仔草(饶平),千斤坠,陶牛特(阳春),麻笔;海南:金花仔(儋县、琼中),加必仔(澄迈、琼海);广西:大地丁草(玉林),拔脓消(苍梧),胶粘根(横县、南宁),拔脓丸,黄花古弼(岑溪、平南),砂宁根(平南),塘罗达,坡麻,裂叶雪麻头,“亚母头”(壮语);贵州:生扯脱,糯米药,牛肋筋,疔疮药;四川:寄马桩(米易),野桑叶(乐山),小膏药、迷马桩(西昌),黄花蛋不老(峨眉山);云南:脓见愁、细迷马桩棵(文山),尼马庄柯,拔毒散,菱叶拔毒散,小拔毒,小尼马庄柯,巴掌叶,王不留行(昆明),黄葵子;其他:枚叶草,白背黄花猛。

功效 全草:清热利湿,排脓止痛。用于感冒发热,扁桃腺炎,细菌性痢疾,泌尿结石,黄痘,疟疾,腹中疼痛,疳疔疔疮。

## 7132056

*Sida subcordata* Span.

植物名 榛叶黄花稔《中国植志》  
 地方名 云南:“亚拉满”(西双版纳傣语)。  
 功效 根、叶:抗菌消炎,拔脓。

## 7132057

*Sida szechuensis* Matsuda

植物名 拔毒散《中国植志》  
 药材名 拔毒散《滇南本草》、《汇编》  
 文献名 王不留行、小伞药、扒毒散《滇南本草》,四川黄花稔《汇编》,巴掌叶《高植图鉴》  
 地方名 贵州:小路边站;云南:小黄药(玉溪),小克麻(保山),小粘药(昆明),“迷吃是”(楚雄彝名),小拔毒,小迷马桩,小尼马庄柯,迷马庄棵,尼马庄棵;其他:肯麻尖。

功效 全株:调经通乳,解毒消肿。用于闭经,乳汁不通,乳腺炎,肠炎,痢疾。外用于跌打损伤,脓肿。

## 7132058

*Thespesia lampas* (Cavan.) Dalz. & Gilb. -- *Hibiscus lampas* Cavan.

植物名 白脚桐棉《中国植志》  
 文献名 肖槿《海南植志》  
 地方名 海南:山棉花,白脚桐;广西:麻桐,棉桐;云南:桐棉。  
 功效 根、果实:用于淋病,梅毒。

## 7132059

*Thespesia populnea* (L.) Soland. ex Corr.

植物名 桐棉《中国植志》  
 文献名 杨叶肖槿《海南植志》,伞杨、截萼黄槿、恒春黄槿《台湾药植志》  
 功效 木材:用于霍乱,胸膜炎,疝痛;树皮:收敛。用于痢疾;根、叶、果:用于疥癣;果实:用于肤痒,偏头痛;花梗胶质:用于皮肤病,跌打损伤。

## 7132060

*Urena lobata* L. --- *Urena lobata* L. var. *tomentosa* (Blume) Walp.

植物名 地桃花《中国植志》  
 药材名 地桃花《广西药植图志》  
 文献名 天下捶《生草药性备要》,〔野棉花〕《树分》,肖梵天花《广州植志》,短毛梵天花《广西中药志》,毛肖梵天花《药植简编》,虱母子《台湾药植志》,刺头婆《高植图鉴》

地方名 梵天花(广西、贵州、四川),迷马桩、尼马桩、迷马棵(四川、贵州、云南),痴头婆、鸬头婆(广东、海南、广西),红花地桃花、大梅花树(广西、云南),虱麻头(福建、广西),粘油子(广西、四川);安徽:狗脚迹;江西:千下捶,野棉花根;福建:八卦草《闽南》,八卦拦路虎(同安、泉州、福清、闽侯、福州等),八卦疔、山桃花(厦门),山桃树,山加簸(龙溪地区、厦门、同安、南安、永春),山棋桑(将乐),山箕菜、大号野棉花(清流),油玲花(宁化、清流),包馒头、马头子、野桐乔(龙溪、上杭),野加簸,野假挂,野荠菜、紧身仔(三明),大号五龙会、大号犬脚迹(福安),土棉花(霞浦),铁棋盘,七姐妹,叶瓣花,小加簸、草棉花(泉州),破布韧,玉如意,十三大功劳,假肉花,交拔早,粘粘儿,土杜仲;台湾:虱母子草,虱母子头,三脚破;湖南:三角风,桃子草;广东:大叶狗脚迹,大蛇药,挪身子,圆叶痴头婆,密麻根;海

南:大叶马松子;广西:野茄子、野梅花、假桃花(南宁),小朝阳(北流),羊带归、铁包金、黄花猛(北流),厚皮菜(桂林),山坡麻、雪麻头、匹密、半边月、拔脓膏、红痴头婆;四川:红孩儿、红梅仔、角刈草、野绛桃、谈谈亲家母、两亲家不说话、蛋不老、大叶蛋不老(成都),大膏药麻、大膏药、大拔毒散(西昌),石松毛(长寿),毛桐子、牛毛七、刀伤药、小毛桐子(重庆),厚皮草、汤巴叶(峨眉眉山),骑马桑;贵州:野桃花(荔波),田芙蓉、尼玛椿、地马椿;云南:大迷马桩棵(文山、红河),“项满糯说”(傣语),土黄芪、巴巴叶(玉溪),“窝吼”(红河),野鸡花、三角枫。

功效 根、全株:祛风活血,清热利湿,解毒消肿。用于风湿关节痛,感冒,疟疾,肠炎,痢疾,小儿消化不良,白带。外用于跌打损伤,骨折,毒蛇咬伤,乳腺炎。

#### 7132061

*Urena lobata* L. var. *scabriuscula* (DC.) Walp.

植物名 粗叶地桃花《中国植志》

药材名 消风草《名实图考》

文献名 粗叶梵天花《汇编》,粗叶肖梵天花《药植简编》,粗糙野棉花《云南药录》,绵毛肖梵天花《贵州药录》

地方名 福建:野棉花、山加拔(厦门),水洋麻;广西:[铁包金](南宁),乌云盖雪、地桃花(来宾、南丹、南宁),扣青(龙州),痴头婆(柳江、藤县);贵州:野桃花,田芙蓉,千锤草,千锤打,狗扯尾(荔波);云南:[王不留行](河口、屏边)。

功效 种子:止血,镇痛,催乳。用于妇女缺奶;根:用于痧症,疮疖。

#### 7132062

*Urena procumbens* L. --- *Urena sinuata* L. --- *U. lobata* L. ssp. *sinuata* (L.) Borss.

植物名 梵天花《中国植志》

药材名 狗脚迹(福建、广西、浙江)、《汇编》

文献名 三角枫、三合枫《名实图考》

地方名 野棉花(江西、浙江、福建、广西),红野棉花、山棉花(江西、浙江、福建),虱麻头(广西、广东、福建),痴头婆、[铁包金](广东、广西),七姐妹(广西、江西);浙江:棉花肾、野木棉(江山、义乌、永康);江西:野棉桃、地棉花(南昌),八大锤(景德镇),千下锤;福建:野茄、破布勒、假肉花、假棉花、犬脚迹(福州、将乐、闽清、南平、三明等),五龙会(宁德、福安、霞浦、寿宁),粘花衣(福安),拦路虎(永春、福清、闽侯、福州),锥爪草(福安),山楂花(大田),沙棉仔,生棉根,裂叶田芙蓉,土芪,小叶田芙蓉,叶瓣花;广东:圆痴头婆,细叶虱麻头,细叶痴头蛭,细谷皮,黄花虱麻头,十月红、花蝴蝶(粤北),山古田花、裳带衣(广州),提云草,小桃花;广西:乌云盖雪(北海),六月雪(龙州);其他:背草。

功效 根、叶:祛风利湿,清热解暑。用于感冒,风湿性关节炎,肠炎,痢疾,肺热咳嗽。外用于跌打损伤,疮疡肿毒,毒蛇咬伤。

### 7133 金虎尾科 Malpighiaceae

#### 7133001

*Aspidopterys cavaleriei* Levl.

植物名 贵州盾翅藤《广西药录》

功效 叶:用于小儿疳积。

#### 7133002

*Aspidopterys obcordata* Hemsl.

植物名 倒心盾翅藤《云南种录》

药材名 盾翅藤《汇编》

文献名 倒心叶盾翅藤《海南植志》

地方名 云南:“吼盖贯”(傣语),“嘿街广”(西双版纳傣语)。

功效 藤:消炎利尿,清热排石。用于尿路感染,泌尿系结石,风湿骨痛。

#### 7133003

*Hiptage benghalensis* (L.) Kurz

植物名 风车藤《高植图鉴》

药材名 红龙《汇编》

文献名 猿尾藤《台湾药植志》,风车果《云南种录》

地方名 台湾:虎尾藤,牛牵藤;海南:黄牛叶;广西:狗角藤。

功效 藤、茎:敛汗涩精,固肾助阳。用于遗精,小儿盗汗早泄阳痿,尿频,风寒痹痛。

### 7135 古柯科 Erythroxylaceae

7135001 见 7135003a

#### 7135002

*Erythroxylum coca* Lam.

植物名 古柯《台湾药植志》

药材名 古柯叶《药材学》

文献名 秘鲁烟草(叶《生药》),高卡(种分),柯卡叶、化奴古柯卡(楼《生药》),古加《中国植物图鉴》,玻利维亚古柯树、可卡叶、古柯树《药材学》

地方名 广西:高根。

功效 叶:兴奋,强壮,局部麻醉。并作为提取古柯碱的原料。

#### 7135003

*Erythroxylum kunthianum* (Wall.) Kurz

植物名 东方古柯《高植图鉴》

文献名 滇缅古柯《汇编》,假古柯《广西药录》

地方名 湖南:冬卷莲(瑶名);广西:钓丝红(上恩、那坡),麦果;云南:木豇豆(屏边),古柯,细叶接骨丹。

功效 叶:兴奋,强壮,局部麻醉。用于疲劳,支气管哮喘,骨折,疟疾;根:镇痛。用于跌打损伤。

#### 7135003a

*Erythroxylum novogranatense* (Morris) Hieron.

植物名 爪哇古柯《台湾药植志》

药材名 古柯叶《药材学》

文献名 新格拉那大古柯(叶《生药》),秘鲁古柯《药植简编》,长叶古柯(李《生药》),爪哇木柯树《药材学》,大洋洲高卡、爪哇高卡《台湾药植志》

地方名 海南:高柯,古加。  
功效 叶:兴奋,强壮,局部麻醉。

## 7135004

*Erythroxylum sinense* Wu

植物名 华古柯《药植简编》  
地方名 海南:谷子树。  
功效 叶:兴奋,强壮,局部麻醉。

## 7135005

*Erythroxylum truxillense* Rusby

植物名 秘鲁古柯树《药材学》  
药材名 古柯叶《药材学》  
文献名 特鲁克西罗古柯《药植简编》,特卢希罗柯卡树(楼《生药》),爪哇古柯(叶《生药》),第纳克斯勒古柯(李《生药》)  
功效 叶:兴奋,强壮,局部麻醉。并作为提取古柯碱的原料。

## 7135006

*Sinopimelodendron kwangsiense* Tsiang

植物名 广西油木《广西药园药录》  
地方名 广西:蝴蝶果。  
功效 果:健胃消滞,去积。

## 7136 大戟科 Euphorbiaceae

## 7136001

*Acalypha australis* L. --- *A. gemina* Spreng.

植物名 铁苋菜《高植图鉴》  
药材名 铁苋菜《汇编》  
文献名 黄麻叶、牛泥茨、三珠草、天紫苏《纲目拾遗》,〔人苋〕、海蚌含珠、撮斗撮金珠、铁苋《名实图考》,六合草、半边珠《草木便方》,野黄麻《天宝本草》,朴草《植物学大辞典》,血布袋、布口袋《中国药植图鉴》,榎草《广西中药志》

地方名 〔血见愁〕(东北、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建、广东、河南、湖北),海蚌抱珠、编笠草(陕西、甘肃、宁夏),银丁菜、花间草(北京、河南),红眼斑、铁苋头、铁头草、铁杆草、铁杆愁(东北),蚌壳草(广东、四川),野麻仔(福建、广东),叶里藏珠(江西、广东、广西),鬼见愁(北京、山东);陕西:马黄双、风壳草;山东:老牛苋(黄县),鸡蛋壳菜(曹县),歇线筹(青岛);江苏:大青草(南通),水芥(新海连),烂蓬菜(云台山、连云港),水耳朵草(苏州),血旱头杆子、血旱头棵子(新沂),蝎头棵(邳县);上海:萤火虫草,野棉花,寒热草;浙江:叶下双桃(天台),老鼠耳朵草(丽水),猫耳朵(杭州),叶里仙桃,金半斗,金畚斗,金盘野苋菜,野络麻;江西:痢疾草,撮斗珍珠、钵斗装珍珠(彭泽),金簸斗、簸斗装珍珠(德兴),风眼草(南昌),畚斗装珍珠、畚斗将军柱(铅山县),撮钵装金珠,撮筐装珍珠,珍珠装北斗,天狗;福建:一盏龙、一盏灯、山洋麻、玉碗珠、拉痢草、鸡子草、金榭榴、逢真珠、麻草、破碗包珍珠、路通珠、鹭蚌珠草(福安),金步索、金蒲黄(松政),叶里存珠(永定),山黄麻草(漳州、诏安、龙海、南靖、东山),山麻黄,玉碗捧真珠(福州、福清、平潭、南平、武平、元田、宁

德),野麻草,野六麻、野苦麻(闽东),杓斗子草,撮斗子草,粪斗草,粪斗角;台湾:金石榴(北部),茶丝黄(宜县);河南:血布袋棵,老母鸡窝,糖鸡屎棵,红叶菜,鞋不带花;湖北:疳积草;湖南:珍珠草(长沙),田螺草(新宁、叙浦),瓢里珍珠(湘阴),海底藏珍珠(永兴),海藏珠(衡南),皮撮珍珠;广东:叶上珠(惠阳),扑草(广州),乌麻(汕头),凹肚真珠(惠来),乌踏麻、假麻、痔仔草、痢子草(潮阳),麻仔草(潮汕),假麻子(潮安),野芝麻、满盘珠(南澳),蜆壳草(韶关阳山),藏珠草,猫眼菜;广西:假黄麻(百色),肉草、海马含珠(桂林),掌上明珠(梧州),麻勾草(苍梧),〔猫眼草〕(南宁),蜆草(桂林、南宁),含珠草(乐业、桂林),喷水草,喷水菜,叶里含珠;四川:七盏灯(重庆、峨眉),小黄麻、瓦片草、风子草、沙锅草、沙罐草、螺丝草(峨眉),地枒桑(蓬溪),铁灯碗,筒筒草;贵州:海花珠(黔阳),灯盏窝,止血草;其他:铁芥(南方),高脚林。

功效 地上部分:清热解毒,化痰止咳,利湿,收敛止血。用于肠炎,痢疾,咳嗽,吐血,衄血,便血,尿血,崩漏。外用于痈疖疮疡,皮炎湿疹。

## 7136002

*Acalypha australis* L. var. *lanceolata* Hayata

植物名 光茎铁苋菜《东北草本志》  
文献名 细叶人苋《台湾药植志》  
地方名 台湾:田卧仔草,细叶榎草。  
功效 茎、叶:用于肺结核吐血。

## 7136003

*Acalypha brachystachys* Hornem

植物名 短穗铁苋菜《浙江药植志》  
文献名 短序铁苋菜《湖北植志》,短穗铁苋《云南种录》  
地方名 广西:水蛇麻(马山),〔鸡眼草〕。  
功效 地上部分:清热解毒,利湿,收敛止血。

## 7136004

*Acalypha hispida* Burm. f.

植物名 长穗铁苋《台湾药植志》  
文献名 软毛洋榎草《台湾药植志》,狗尾红《广西植志》  
功效 花:用于腹泻;叶:收敛。外用于顽固性溃疡;根:用于吐血;树皮:祛痰。用于哮喘。

## 7136005

*Acalypha indica* L.

植物名 印度人苋《台湾药植志》  
功效 全草:祛痰,利尿,缓泻。用于支气管炎,喘息症,肺炎;根:缓泻,祛痰;叶及嫩梢:驱虫。用于疥癣,痛风,耳痛,蛇、蜈蚣咬伤。

## 7136006

*Acalypha wikesiana* Muell. -Arg.

植物名 红桑《广西《园林药录》》  
功效 叶:清热消肿。外用于痢疮,跌打。

## 7136007

*Acalypha wikesiana* Muell. -Arg. var. *marginata* W. Miller

植物名 金边桑《福建药物志》

地方名 福建:木本金线莲(厦门),金边莲(龙海)。

功效 叶:清热,凉血,止血。用于紫癜,牙龈出血,再生障碍性贫血,咳嗽。

#### 7136008

*Agyneia bacciformis* (L.) A. Juss.

植物名 艾堇《高植图鉴》

文献名 红果草《高植图鉴》

地方名 广东:[仙桃草](湛江)。

功效 全株:用于跌打瘀肿,骨折,乳痈。

#### 7136009

*Alchornea davidii* Franch.

植物名 山麻杆《高植图鉴》

药材名 山麻杆《汇编》

地方名 [桂圆树](江苏、浙江、湖南);陕西:大叶泡(略阳、阳平关),桐花杆,野火麻;湖北:牛南树(来凤),渣把叶(神农架),红荷叶(恩施、建始、宜昌),巴巴叶树(鹤峰、卫东),狗尾巴树,饼子叶树;广东:三稔药;广西:红白木(贺县);四川:红桐。

功效 茎皮、叶:解表,杀虫,止痛。用于疯狗咬伤,蛇咬伤,蛔虫病,腰痛。

#### 7136010

*Alchornea rugosa* (Lour.) Muell.-Arg.

植物名 三稔药《海南植志》

文献名 山麻杆《广西药录》

地方名 海南:苦茶,多济花,二两八树。

功效 种子:泻下;嫩枝:接骨生肌。

#### 7136011

*Alchornea trewioides* (Benth.) Muell.-Arg.

植物名 红背山麻杆《高植图鉴》

药材名 红背叶《广西本草选编》

文献名 红帽顶树《高植图鉴》,山麻杆《药植简编》

地方名 红背娘、红帽顶(广东、广西);广东:红罗裙,红白背木,红白膜,红小娘,红灵丹、红丹树、红骨白鹤树(惠阳),心铺红(英德);广西:红面将军(梧州、南宁、凤山),红帐棚(北流),红皮草(富川),鸡行木(桂平),新妇木(苍梧、平南),太阳木(德保),月亮木(柳城),园满(龙州),红谷粟。

功效 根、叶:清热利湿,散瘀止血。用于痢疾,小便不利,血尿,尿路结石,红崩,白带,腰腿痛,跌打肿痛。外用于外伤出血,荨麻疹,湿疹。

#### 7136012

*Aleurites cordata* Muell.-Arg.

植物名 日本油桐《台湾药植志》

文献名 罌子桐《药植简编》

地方名 台湾:桐子树,油桐,桐油。

功效 果实脂肪油(桐油):用于疥癣,疮毒;根、花:有小毒。用于齿龈肿痛,痢疾;叶:用于烫火伤。

#### 7136013

*Aleurites moluccana* (L.) Willd.

植物名 石栗《南方草木状》、《高植图鉴》

药材名 石栗叶《岭南采药录》、《中药大辞典》

文献名 海胡桃《桂海虞衡志》,海梧子《纲目拾遗》,烛果树《树分》,黑桐油树《汇编》

地方名 海南:油桃,桐油公;广西:黑桐油(龙州),桐油木,木花生,石枒,检果,油果(桂平),铁栗;云南:铁果(文山),水火树。

功效 叶:有小毒。止血,能下胎。用于刀伤出血;种子:通经,清瘀热;树皮液汁:用于口炎性腹泻;根:用于咳嗽,癆伤,瘰癧。

#### 7136014

*Aleurites trisperma* Blanco --- *A. saponaria* Blanco

植物名 菲律宾油桐《台湾药植志》

功效 种子油:优良的杀虫剂;树皮液汁:用于头皮屑。

#### 7136015

*Antidesma acidum* Retz. --- *A. diandrum* (Roxb.) Roth

植物名 二药五月茶《云南种录》

药材名 酸汤叶《云南药录》

地方名 云南:“宋阿”(傣语),酸叶树(河口)。

功效 叶:解毒。用于疮毒。

#### 7136016

*Antidesma bunius* (L.) Spreng.

植物名 五月茶《高植图鉴》

药材名 五月茶《广西药录》

文献名 五味叶《生草药性备要》,五味菜《岭南采药录》,污槽树《树分》,酸味树《汇编》

地方名 广东:[五味子]。

功效 根、叶:收敛,止泻,止渴,生津,行气活血,解毒。用于津液缺乏,食欲不振,消化不良,跌打损伤,疮毒。

#### 7136017

*Antidesma fordii* Hemsley

植物名 黄毛五月茶《海南植志》

药材名 黄毛五月茶《广西药录》

地方名 广西:禾线风(防城)。

功效 叶:用于痈疮肿毒。

#### 7136018

*Antidesma ghaesembilla* Gaertn.

植物名 方叶五月茶《海南植志》

药材名 方叶五月茶《广西药录》

文献名 田边木《云南种录》

功效 茎:通经;根、叶、果:生津止渴,活血解毒。

#### 7136019

*Antidesma japonicus* Sieb. et Zucc.

植物名 细五月茶《云南种录》

药材名 酸味子《广西药录》

文献名 日本五月茶《江西药录》

地方名 广西:禾串果(金秀)。

功效 根、叶:止泻,生津。用于食欲不振,跌打损伤,痈疮肿毒。

#### 7136020

*Antidesma microphyllum* Hemsl.

植物名 小叶五月茶《云南种录》

药材名 小叶五月茶《广西药录》

地方名 四川:刮经板;云南:小叶柳、小杨柳(河口)。

功效 全株:祛风寒,止吐血。

#### 7136021

*Antidesma venosum* E. Mey. ex Tul.

植物名 沙漆木《广西药录》

文献名 沙疗木《药植简编》

地方名 广西:[水杨梅](乐业)。

功效 根:用于小儿麻疹,水痘。

#### 7136022

*Aporosa chinensis* (Champ.) Merr. --- *A. dioica* (Roxb.) Muell.-Arg.

植物名 银柴《高植图鉴》

药材名 大沙叶(海南、广西)、《药植简编》

文献名 砂石木《指示植物》,山咖啡《广州植志》

地方名 海南:粘米赤,硬盐树;广西:假大沙叶,厚皮稔。

功效 叶:拔毒生肌。用于疮疖肿毒。

#### 7136023

*Aporosa villosa* (Lindl.) Baill.

植物名 毛银柴《云南种录》

地方名 云南:“南罗米”(孟定傣语)。

功效 全株:用于麻疯病。

#### 7136024

*Baccaurea ramiflora* Lour.

植物名 木奶果《高植图鉴》

药材名 木奶果《西双版纳纳药志》

文献名 枝花木奶果《海南植志》,火果《广西植录》

地方名 海南:木奶果(澄迈),白皮(保亭),山葡萄(东方);广西:麦穗(龙州),木赖(那坡、防城),铁东木,嘎吹;云南:“哥麻飞”(西双版纳傣语),蒜瓣果、算盘果(屏边),打朴果,三义果,“木符埃”(傣语),黄果树(景洪),树葡萄(金平)。

功效 皮木:用于止咳,止喘,解菌毒,产后消瘦,恶露淋漓,不思饮食;果实:生津止渴,消积。

#### 7136025

*Baliospermum effusum* Pax et Hoffm. --- *Baliospermum micranthum* Muell.-Arg.

植物名 散微籽《云南种录》

药材名 微籽《思茅本草》

文献名 小花微籽《新华本草纲要》

地方名 云南:薇籽,“抱冬虫”(思茅傣语)。

功效 根皮、叶:解毒驱虫,散瘀消肿。用于跌打损伤,骨折,蛔虫病,黄疸型肝炎。

#### 7136026

*Baliospermum montanum* (Willd.) Muell.-Arg.

植物名 斑仔《高植图鉴》

药材名 山微子《中草药》

地方名 云南:“括帮”(傣语)。

功效 种子:泻下祛积,逐水消肿。含抗肿瘤二萜成分,对淋巴白血病、鼻咽癌有抑制作用。

#### 7136027

*Bischofia javanica* Blume

植物名 秋枫《树分》

药材名 秋枫木(广西)、《陆川本草》

文献名 秋枫《桂海虞衡志》,秋枫子《名实图考》,乌杨《植物名汇》,茄冬树《树分》

地方名 加冬、过冬梨(福建、广东),茄冬(福建、台湾、湖南),胡杨(福建、四川);山东:赤木;福建:樟脑树、香棕(泉州);台湾:茄冬根;海南:水加,碰风(澄迈、琼中),红桐木,柴桐树;广西:水梁木(苍梧),大秋枫、三叶红(博白),鸭脚枫(平南),千金不倒(大瑶山),[丢了棒](凌云),红鸭脚木(藤县),米棒(靖西),鸭脚罗伞(桂平),水榿木,大果重阳木,常绿重阳木;四川:红桐。

功效 根、树皮、枝叶:行气活血,消肿解毒;根及树皮:用于风湿骨痛;叶:用于食道癌,胃癌,传染性肝炎,小儿疳积,肺炎,咽喉炎。外用于疳疽,疮疡。

#### 7136028

*Bischofia polycarpa* (Levl.) Airy-Shaw --- *Bischofia racemosa* Cheng et Chu

植物名 重阳木《湖北植志》

药材名 重阳木《汇编》

地方名 山东:赤木;台湾:茄冬;贵州:红桐,过冬梨。

功效 根、树皮及叶:行气活血,消肿解毒;根及树皮:用于风湿骨痛;叶:用于食道癌,胃癌,传染性肝炎,小儿疳积,肺炎,咽喉炎。外用于疳疽,疮疡。

#### 7136029

*Breynia fruticosa* (L.) Hook. f.

植物名 黑面树《汇编》

药材名 黑面叶《汇编》

文献名 黑面神、狗脚利《生草药性备要》,蚊惊树《岭南杂记》,钟馗草、山夜兰《本草求原》,田中途《岭南采药录》,鬼画符、夜兰茶《岭南草药志》,青凡木《广西本草选编》

地方名 暗鬼木、铁甲将军、铁乌柏(广东、广西);福建:山桂花(漳州、龙海、南靖),打打树(平潭),漆生草(泉州),猴写字(漳浦),猢猻写字、山树兰、小青、漆仔青(厦门);广东:乌漆白(潮阳),本地柴胡(化州),田螺戾(阳江),黑面贼(番禺),光漆大伯(曲江),板拷抵树(兴宁),狗脚刺,祖兰、野兰(东莞),青漆(惠阳),漆白(普宁),漆男(潮安),老鸦写字,克面神,庙公仔,鸡肾叶;海南:田螺皮,锅盖叶,借父叶(临高);广西:大叶鬼画符、四眼叶、夜兰(南宁),黑白神(武鸣),夜貌妹(苍梧),[四季青](平南),累庵木叶(容县),柏盈(宁明),红锦(忻城),红黑(河池),“米宾宁”(壮语),四眼草,红尾凤,鍾馗草,田鍾馗,螺掩叶,细青七树;云南:“帕弯顿”(傣名);其他:锅盖仔,黑面辰。

功效 根:有小毒。清热解毒,散瘀,止痛。用于急性胃肠炎,扁桃体炎,支气管炎,尿路结石,产后子宫收缩疼痛,风湿性关节炎;叶:有小毒。外用于烧、烫伤,湿疹,过敏性皮炎,皮肤搔痒,阴道炎。

#### 7136030

*Breynia hyposauiropus* Croizet.

植物名 小叶黑面神《药植简编》

药材名 小黑面叶《汇编》

文献名 红子仔《广西本草选编》, 节节红花《汇编》, 小叶黑面叶《广西植录》, 小叶青凡木《广西药园药录》

地方名 广西: 小叶鬼画符(南宁), 细山鬼画符(桂平), 细鬼画符、红嘴英母、叶叶红花(贵县), 叶叶一支花(来宾), 一叶一支花(藤县、平南、忻城), 叶上一支花(大瑶山), 节节花、黑白神、细四季青(平南), 四眼根(上林), 鹧鸪茶(武鸣), 黑痧药(隆林)。

功效 根: 清热解毒, 消肿止痛。用于感冒发热, 气管炎, 肠炎腹泻, 蛇咬伤, 跌打肿痛。

备考 《广西药录》(1986)小叶黑面神的学名为 *Breynia vitis-idaea* (Burm. f.) C. E. C. Fischer

#### 7136031

*Breynia officinalis* Hemsl.

植物名 药用黑面神《中草药》

文献名 红子仔《植物名汇》, 山漆茎《台湾药植志》

地方名 台湾: 七日晕, 红珠, 红珠仔, 红珠仔头, 红心仔, 红蕙仔。

功效 叶或根: 用于梅毒, 肿毒, 跌打损伤, 劳伤出血。

#### 7136032

*Breynia retusa* (Dunst.) Alston --- *B. patens* (Roxb.) Benth.

植物名 展枝黑面神《西藏植志》

药材名 小叶黑面叶《汇编》

文献名 小叶山漆茎《中草药学》

地方名 云南: 小柿子、小柿子叶、小叶黑面神、小面瓜、地石榴(思茅), 跳八丈(临沧), “牙万卖”(傣名)。

功效 根、叶: 清热解毒, 止血止痛。用于感冒发热, 扁桃体炎, 咽喉炎, 急性胃肠炎, 痢疾, 月经过多, 崩漏, 白带, 痛经。外用于外伤出血, 疮疖, 湿疹, 皮肤, 瘙痒, 烧伤。

#### 7136033

*Breynia rostrata* Merr.

植物名 喙果黑面神《海南植志》

药材名 小面瓜(云南)

文献名 尾叶黑面神、尾叶黑面叶《广西植录》, 黑面神《红河中草药》

地方名 云南: 小柿子、绿子树(红河), “牙万卖”(傣名)。

功效 全草: 用于急性肠胃炎, 产后食欲不振, 痢疾, 感冒, 疟疾, 风湿骨痛, 湿疹。

#### 7136034

*Bridelia fordii* Hemsl.

植物名 虾公木《广西药录》

功效 全株: 用于骨折。

#### 7136035

*Bridelia insulana* Hance

植物名 禾串树《广西药录》

地方名 广西: 猪牙木。

功效 根: 用于骨折, 跌打损伤。

#### 7136036

*Bridelia monoica* (Lour.) Merr.

植物名 土蜜树《高植图鉴》

药材名 土蜜树《广西本草选编》

文献名 土蜜树《广西药录》

地方名 广东: 补锅树(广州), 闭背树, 打扑叶, 扑仔树, 耗子叶; 海南: 逼迫子; 广西: 土知母(陆川), 补脑根(博白), 鸡脚木(北流、平南), 千里马(平南), 石拢强, 雷公根, 炮仗木。

功效 根皮: 安神调经。用于神经衰弱, 月经不调; 茎叶: 清热泻火, 解毒。用于狂犬咬伤, 疔疮肿毒。

#### 7136037

*Bridelia stipularis* (L.) Blume

植物名 土密藤《高植图鉴》

药材名 大串连果《云南药录》

文献名 托叶土密树《广西植录》

地方名 广西: 狗舌果; 云南: “哈母包沙”(傣语)。

功效 根: 消炎, 止泻。用于腹泻, 脱肛; 果: 催吐, 解毒。可解草乌、五楞金刚、曼陀罗、雪上一枝蒿等中毒。

#### 7136038

*Cicca acida* Merr.

植物名 西印度醋栗《台湾药植志》

功效 树皮: 用于气管炎; 根: 用于咳嗽, 哮喘, 头痛, 脚底牛皮癣; 叶: 外用于腰风湿痛, 坐骨神经痛。

#### 7136039

*Cladogynos orientalis* Zipp. var. *tonkinensis* Gagn.

植物名 越南枝实《广西药园药录》

功效 根、叶: 用于风湿性关节炎, 跌打损伤; 叶: 用于外伤出血。

#### 7136040

*Claoxylon polot* (Burm. f.) Merr. --- *Claoxylon indicum* (Reinw. ex Bl.) Hassk.

植物名 白桐树《高植图鉴》

药材名 丢了棒《生草药性备要》、《汇编》

文献名 追风棍、赶风债《生草药性备要》, 赶风柴《本草求原》

地方名 广东: 臭平桐(惠阳), 刁了棒, 掉了棒; 海南: 咸鱼头, 消了树, 消了膨。

功效 全株: 有小毒。祛风除湿, 散瘀止痛。用于风湿痹痛, 外伤瘀痛。

#### 7136041

*Cleidion brevipedunculatum* Pax et Hoffm.

植物名 棒柄花《海南植志》

药材名 三台树《汇编》

地方名 云南: 大树三台(新平), 三台花。

功效 树皮: 消炎解表, 利湿解毒, 通便。用于感冒, 急、慢性肝炎, 疟疾, 膀胱炎, 脱肛, 子宫脱垂, 月经过多, 产后流血, 疝气, 便秘。外用于疮疖。

#### 7136042

*Cleistanthus sumatranus* (Miq.) Muell.-Arg.

植物名 闭花木《广西药录》  
文献名 闭花《广西植录》  
功效 叶：用于矽肺，苯中毒。

## 7136043

*Cleistanthus tonkinensis* Sabl.

植物名 越南闭花木(拟)  
文献名 河内闭花木《广西药录》  
功效 叶：用于矽肺，苯中毒。

## 7136044

*Codiaeum variegatum* (L.) Blume

植物名 变叶木《高植图鉴》  
地方名 洒金榕(广东、广西)。  
功效 根：外用于梅毒溃疡；叶：用于肺热咳嗽。外用于小儿泌尿器疾患(敷小儿腹上)。

## 7136045

*Codiaeum variegatum* (L.) Blume f. *taeniosum* Muell. Arg.

植物名 细叶变叶木《广西药园药录》  
文献名 细叶洒金榕《广西植录》  
功效 叶：有毒。散瘀消肿，清热理肺。

## 7136046

*Croton cascarilloides* Raeusch. --- *C. cumingii* Muell. Arg.

植物名 银叶巴豆《海南植志》  
药材名 银叶巴豆《广西药录》  
文献名 土茛香《广西植录》  
地方名 叶下白(台湾、广东)；台湾：柿糊，〔植梧〕。  
功效 根：祛风，壮筋骨。用于瘰癧，咽喉肿痛，疟疾。外用于风湿骨痛。

## 7136047

*Croton caudatus* Geisel var. *tomentosus* Hook. f.

植物名 毛尾叶巴豆《云南种录》  
药材名 毛叶巴豆《思茅中草》  
文献名 毛巴豆根《药典》  
地方名 云南：大树跌打(墨江)，“剥埂”(傣名)，“哈其根”(孟定傣名)。

功效 全株：镇静祛风，退热止痛，舒筋活络。用于疟疾，高热，惊痫抽搐，风湿性关节炎，麻木不仁。

## 7136048

*Croton cavaleriei* Gagnep.

植物名 石山巴豆《广西药录》  
功效 根：外用于风湿骨痛，跌打损伤。

## 7136049

*Croton crassifolius* Geisel

植物名 鸡骨香《高植图鉴》  
药材名 鸡骨香《生草药性备要》、《汇编》  
文献名 〔山豆根〕、木沉香《生草药性备要》，土沉香、驳骨消《岭南采药录》  
地方名 福建：过山香；广东：土地龙(电白)，七霜根(化州)，棍地龙(阳春)，矮脚猪(潮阳)，黄牛香(东莞)，千人打，坡香，透地龙，滚地龙(广州)；海南：金绵枫，〔青鱼胆〕；广西：鸡脚香。

功效 根：理气止痛，祛风除湿，舒筋活络。用于风湿关节痛，腰腿痛，胃痛，腹痛，疝痛，痛经，跌打肿痛。

## 7136050

*Croton kongensis* Gagnep.

植物名 越南巴豆《云南种录》  
文献名 银叶巴豆《云南药录》  
地方名 云南：“牙杂乱”(傣名)。  
功效 根：用于腹水，急性肠胃炎，头皮疹，口角疮。

## 7136051

*Croton lachnocarpus* Benth.

植物名 毛果巴豆《高植图鉴》  
药材名 小叶双眼皮龙《广东中药》  
文献名 长叶巴豆《药植简编》  
地方名 湖南：白羊木，鸡骨香；广东：下山虎(从化)，山辣蓼、山辣蓼叶、桃叶双眼皮龙(广州)，蛇仔仁、蚊仔仁(陆丰)，双眼皮龙(清远、从化、新会、台山、广宁等)，细叶双眼皮龙，巡山虎(佛冈)，狗屎藤(五华)；广西：山猪撬(蒙山、昭平)，山猪咆(平南)，粗糠柴(梧州)，穿珠林(恭城)。

功效 根、叶：有小毒。祛风除湿，散瘀消肿。用于风湿关节痛，跌打肿痛，毒蛇咬伤；种子：泻寒积，通关窍，逐痰，行水，杀虫。用于冷积凝滞，胸腹胀痛，泻痢，水肿。

## 7136052

*Croton laevigatus* Vahl

植物名 光叶巴豆《海南植志》  
药材名 光叶巴豆树《汇编》  
地方名 云南：“抱龙”(傣语)，大树叶，龙眼叶，羊奶浆叶。

功效 根、叶：活血散瘀，退热止痛。用于跌打损伤，骨折，疟疾，胃痛。

## 7136053

*Croton tiglium* L.

植物名 巴豆《高植图鉴》  
药材名 巴豆《本经》、《药典》，巴豆霜《药典》  
文献名 巴叔《本经》，巴菽(吴普本草)，刚子《雷公炮炙论》，巴豆皮《宣明方》，江子《瑞竹堂经验方》，老阳子、巴豆树根、巴豆壳、巴豆油《纲目》，双眼皮龙《岭南采药录》，肥江子《华北药寮》，巴米《药材资料汇编》，挡蛇剑、独行千里《岭南草药志》，巴豆树《中国药植志》，老鸦子《上农药志》，川江子《药材学》

地方名 巴果(四川、云南)，巴仁、大叶双眼皮龙(广东、广西)，猛子仁(湖北、湖南、广东、广西)，毒鱼子(福建、湖南、广东)，猛子(广东、四川)；江苏：川巴；福建：江子仁(福州、闽南)，药子仁(平和、南靖)，芦麻子(莆田)，腊盘子(同安)，山油子、锣鼓子(安溪)；台湾：蜜豆，广仔，猛树，贡仔，广仔子，猛树根；湖南：金钱巴豆；广东：药仔根(潮安)，虫虫草(肇庆)，巴豆叶，枚子叶，猛子叶，猛子树；海南：芒子(澄迈)；广西：大巴豆(邕宁)，大将军(昭平)，天下无敌手(大瑶山)，五马巡城



(玉林), 把守天门(梧州), 双眼皮(南宁), 八百力(桂平、大瑶山), 打不死、跌打桂(平南), 一摸消(北流), 双龙眼(梧州、南宁), 九龙釜(那坡), 九龙川, 九盘川, 巴豆木, 莽子木(陆川)。

**功效** 果实(巴豆): 有大毒。外用于蚀疮, 恶疮疥癣, 疣痣; 巴豆霜(巴豆仁加工品): 有大毒。峻下积滞, 逐水消肿, 豁痰利咽。用于寒积便秘, 乳食停滞, 下腹水肿, 二便不通, 喉风, 喉痹; 巴豆叶: 用于疟疾, 疮癣, 跌打损伤, 蛇伤; 种皮(巴豆壳): 消积滞, 止泻痢, 杀虫, 败毒。用于瘰癧痰核, 泻痢; 种仁脂肪油(巴豆油): 有毒。用于中风痰厥, 气厥, 中恶, 喉痹, 泻下。

## 7136054

*Croton urticifolius* Y. T. Chang et Q. H. Chen

植物名 荨麻叶巴豆《贵州药录》

**功效** 种子: 有毒。泻寒积, 通关窍, 逐痰, 行水, 杀虫。用于冷积凝滞, 胸腹胀满, 泻痢, 水肿, 血瘕。外用于喉风, 喉痹, 恶疮, 疥癣。

## 7136055

*Deutzianthus tonkinensis* Gagnep.

植物名 东京桐《广西药园药录》

**功效** 根: 用于风湿; 叶: 凉肝散血。

## 7136056

*Disocleidon rufescens* (Franch.) Pax et Hoffm.

植物名 假麦包叶《高植图鉴》

地方名 贵州: 火麻苣。

**功效** 根皮: 有小毒。清热解毒, 泻水消积。用于水肿, 食积, 毒疮。

## 7136057

*Endospermum chinense* Benth.

植物名 黄桐《高植图鉴》

药材名 黄桐《广西药录》

文献名 黄桐树《种分》

地方名 广东: 黄虫树(阳春); 云南: 大树跌打(思茅)。

**功效** 树皮、叶: 有毒。祛瘀生新, 消肿镇痛, 舒筋活络。用于骨折, 跌打劳伤, 风寒湿痹, 关节疼痛, 腰腿痛, 四肢麻木, 疟疾; 根: 用于黄疸肝炎, 蛇咬伤。

## 7136058

*Euphorbia antiquorum* L.

植物名 金剛纂《纲目拾遗》、《高植图鉴》

药材名 火殃筋《生草药性备要》、《汇编》

文献名 金剛杵、冷水金丹《滇南本草》, 纯阳草《丹房本草》, 《霸王鞭》《名实图考》, 杨丫《岭南草药志》, 金剛树、纯阳草、千年剑《南方毒植》, 火虹、美降大戟《中药大辞典》

地方名 火巷(福建、台湾), 金剛钻(四川、云南), 霸王树(广东、云南); 福建: 火焰(莆田、福州), 癩哥刺(晋江), 臭松, 苔哥刺; 广东: 山大羊(四会), 火旺(潮阳), 羊乌鸦(阳江、阳春、电白), 韦陀花、洋木亚、天尺花、羊丫、羊丫叶、羊丫笏、笋大黄(新会), 火殃头(五华), 大力王、筋骨大王(英德), 筋羊(广州), 筋霸王(粤北), 羊槿; 广西: 三菱灯劲(贵县), 龙骨树(河池、乐业), 龙骨

龙髓(北海), 羊不挨(梧州), 肉麒麟(南宁), 龙骨刺, 羊不搭, 阿黎树; 云南: 小青龙、紫木通(思茅), 四棱金刚(红河), 五楞金刚(通海、玉溪), 绿烟锅, 百步回阳(临沧), 圆金刚(通海、玉溪、楚雄), 铁篱笆(丽江), “摆衣奇弱”(楚雄彝名)。

**功效** 茎、叶: 有毒。消肿, 拔毒, 止泻。用于急性胃肠炎, 疟疾, 跌打肿痛; 液汁: 泻下, 逐水, 止痒。用于肝硬化腹水 外用于皮癣。

## 7136059

*Euphorbia adenochlora* Merr. et Decne.

植物名 苘茹《药性简编》

药材名 苘茹《本经》

文献名 苘茹、离楼、屈居《吴普本草》, 离娄、屈据《别录》, 漆头、草苘茹《本草经集注》, 蕙茹《范子计然》, 掘据、蕙蕞《纲目》

地方名 四川: 奶浆草、红筷子(峨眉山); 贵州: 水黄花(贵阳), 括金板(威宁)。

**功效** 根: 有小毒。攻毒, 利尿。外用于痈疽肿毒, 皮肤疥疮。

## 7136060

*Euphorbia atoto* Forst. f.

植物名 海滨大戟《海南植志》

文献名 滨大戟《台湾药植志》

**功效** 全草: 乳汁有毒。用于泻下, 通经。

## 7136061

*Euphorbia chrysocoma* Levl. et Vant.

植物名 黄苞大戟《湖北植志》

药材名 水黄花《广西药录》

文献名 草苘茹《贵州药录》

地方名 下奶藤、拓金盘、拓金榜(贵州、云南); 湖北: 红济公、见气消(利川); 贵州: [水杨柳], 括金板; 云南: [狼毒](文山), 大狼毒、矮黄(红河), 小狼毒。

**功效** 根皮、叶: 有毒。泻水, 清热解毒。用于水臌, 无名肿毒。

## 7136062

*Euphorbia cyanophylla* Levl.

植物名 蓝叶大戟《云南种录》

地方名 云南: 大狼毒(富民)。

**功效** 根: 有毒。舒筋活络, 催乳。

## 7136063

*Euphorbia ebracteolata* Hayata --- *E. sieboldiana* auct. non Morr. et Decne.

植物名 月腺大戟《汇编》

药材名 狼毒《中草药学》

文献名 白狼毒、黄皮狼毒《品种论述》, 续毒《新纲》, 猫眼根《简明中医辞典》

地方名 山东: 胖子棵(淄博)。

**功效** 根: 有毒。利尿, 泻下, 散结, 杀虫。外用于淋巴结核, 皮癣, 灭蛆, 酒龋鼻。

**备考** 有些文献将本种学名误订为 *Euphorbia sieboldiana* Morr. et Decne.

## 7136064

*Euphorbia erythraea* Hemsl.

植物名 三朵云(汇编)

药材名 铁筷子(湖北)、《汇编》

文献名 [千层塔]、[红大戟]《药植简编》

地方名 湖北:通大海。

功效 根:活血,通便。用于便秘,跌打损伤。外用于疮毒。

#### 7136065

*Euphorbia esula* L.

植物名 乳浆大戟(高植图鉴)

药材名 乳浆草(汇编)

文献名 烂疮眼(东检),猫儿眼、砸碗砸碟草(中国土农药志),窄叶大戟(沙漠植志)

地方名 猫眼草(北京、广西);北京:打盆打碗,打碗棵;山东:肿手棵(长清),马虎眼,猫儿眼草;内蒙古:"查干-塔日努"(蒙名);江苏:五灯草,牛眼睛,猫猫眼;湖北:铁筷子(神农架);湖南:咪咪草。

功效 根皮:有毒。解毒,消肿,止痒。用于疮癣,痢疾,肠炎,无名肿毒,蛇咬伤,疟疾,痰饮喘咳,骨髓炎;叶及茎:外用于疮肿。

#### 7136066

*Euphorbia esula* L. var. *cyparissoides* Boiss. --- *E. kaleniczenkii* Czern. ex Trautv.

植物名 松叶乳浆大戟(东北草本植志)

药材名 乳浆草(内蒙古中草药)

文献名 细叶大戟、打碗科、猫眼草(中国药植图鉴),卡氏大戟(东检),乳浆大戟(湖北植志),窄叶大戟(汇编)

地方名 陕西:疏叶猫儿眼。

功效 全草:有毒。拔毒消肿。用于疮疖痈肿,淋巴结核,腮腺炎。

#### 7136067

*Euphorbia fischeriana* Steud. --- *E. pallasii* Turcz.

植物名 狼毒大戟(高植图鉴)

药材名 狼毒(东北药植志)

文献名 茵茹(本经),白狼毒、黄皮狼毒(品种论述),鲁狼毒(药植简编),东北狼毒(中药大辞典)

地方名 猫眼草(华北),猫眼根(东北);黑龙江:猫眼花,狼毒疙瘩;吉林:"狼道科"(朝名);辽宁:山红萝卜根,猫眼睛;河北:狼青草(热河),大猫儿眼草,大猫眼睛,猫眼花根;内蒙古:"塔尔努"(蒙名)。

功效 根:有大毒。破积,杀虫,除湿,止痒。用于淋巴结核,骨结核,皮肤结核,顽固性溃疡,酒糟鼻,牛皮癣,神经性皮炎,疥癣,慢性气管炎,咳嗽,气喘,阴

#### 7136068

*Euphorbia fischeriana* Steud. var. *komaroviana* (Prokh.) Chu

植物名 短柱狼毒大戟(东北草本植志)

药材名 狼毒(东北)

文献名 短柱狼毒(长白山植志)

功效 根:有大毒。破积,杀虫,除湿,止痒。用于淋巴结核,骨结核,皮肤结核,顽固性溃疡,酒糟鼻,牛皮癣,神经性皮炎,疥癣,慢性气管炎,咳嗽,气喘,阴

道滴虫。

#### 7136069

*Euphorbia fischeriana* Steud. var. *pilosa* (Regel) Kitag.

植物名 毛狼毒大戟(东北草本植志)

药材名 狼毒(东北)

文献名 毛叶狼毒(东北药植志)

功效 根:用于恶疮,鼠瘻,蛊毒。

#### 7136070

*Euphorbia formosana* Hayata

植物名 大甲草(台湾药植志)

地方名 台湾:八卦草,八卦癩,下山虎,五虎下山,药虎草,满天草,〔满天星〕。

功效 叶:用于毒蛇咬伤;根:用于风湿,风痰,利膈,解噎。外用于疔,癰,毒蛇和狂犬咬伤。

#### 7136071

*Euphorbia helioscopia* L.

植物名 泽漆(高植图鉴)

药材名 泽漆(本经)、《汇编》

文献名 漆茎(别录),猫儿眼睛草、五凤灵枝(履巉岩本草),五凤草、绿叶绿花草(纲目),凉伞草(质问本草),灯台草(小泉《药植》),芦丁草(药植简编),宽叶猫儿眼(沙漠药植)

地方名 五朵云(浙江、湖北、四川、贵州),毛耳草、羊奶奶(东北),猫儿眼草(山东、上海),猫眼草(安徽、湖北、云南),猫儿眼(江苏、河南、湖北),断肠草(安徽、湖南),五台头(江苏、上海),九头狮子草(湖北、湖南);陕西:奶奶草;山东:肿手棵(长清),马虎眼,瞎眼花(烟台);江苏:五灯头草(无锡),五点草(镇江),乳浆草(泰县),〔土大黄〕(武进),乳青草、苦丁花、苦丁草(苏北),五朵草,大牛眼,五顶草,点浆草,紫金龙,胀歪歪草;上海:奶奶头草,羊奶奶,妈妈浆水草,灯灯头,灯台头,羊奶奶草;浙江:牛奶浆,牛狂草;江西:铁骨草;福建:白种乳草,乳草,古董草(泉州),奶汁草(福州),铁虎伞(仙游),雨伞草;湖南:奶浆草、铁骨伞(沅江);河南:猫儿眼棵,猫猫眼,点点泡,狮子头;四川:一把伞,倒毒伞,“塔尔陆”、“塔旁洼”(若尔盖藏名),小大戟,烂肠草(南川);贵州:五盏灯;云南:灯盏草,水大戟;其他:羊喂喂,铃振花。

功效 全草:有毒。逐水消肿,散结,杀虫。用于水肿,肝硬化腹水,细菌性痢疾。外用于淋巴结核,结核性瘰管,神经性皮炎。

#### 7136072

*Euphorbia henryi* Hemsl.

植物名 长圆叶大戟(湖北植志)

地方名 湖北:刮金板(利川)。

功效 全草:用于跌打损伤。

#### 7136073

*Euphorbia heterophylla* L.

植物名 猩猩草(高植图鉴)

药材名 一品红(汇编)

文献名 草一品红(云南种录),墨西哥火草(台湾药植志),草一品红(海南植志)

地方名 江西:老来娇;广西:[山茶](百色),[叶上花](南宁、柳江),红半叶(贵县);云南:叶象花、红叶叶上花、箭叶叶上花(文山、玉溪),细叶叶上花。

功效 全草:有毒。调经止血,止咳,接骨消肿。用于月经过多,风寒咳嗽,跌打损伤,外伤出血,骨折。

#### 7136074

*Euphorbia hippocrepica* Hemsl.

植物名 马蹄叶大戟(江西药录)

药材名 牛奶浆草(汇编)

文献名 马蹄大戟(云南种录)

地方名 湖南:见气消、柳州七、生死还阳、鬼打伞、[搜山虎]、铁凉伞(湘阴);四川:红筷子(成都、峨眉)。

功效 根:逐水消肿。用于血吸虫病腹水,全身水肿,胸腔积液。

#### 7136075

*Euphorbia hirta* L. --- *E. hirta* L. var. *typica* L. C. Wheeler

植物名 飞扬草(高植图鉴)

药材名 飞扬草(汇编)

文献名 乳门草、乳汁草、土奶奶(汪连仕草药方),大飞羊(生草药性备要),大飞扬草(岭南采药录),奶母草(中药大辞典)

地方名 飞扬(江西、福建、四川),乳仔草(台湾、广东),节节花(江西、福建、广东、广西),大飞扬(浙江、福建、广西、云南),奶汁草(云南、广西),奶浆草(四川、云南),白乳草、蜻蜓草(福建、广东),奶草(福建、广西),乳草(广东、广西),九歪草、大乳汁草、奶子草(广东、云南);浙江:飞天蜈蚣、催乳草;江西:大地锦(新建),白奶汁草(临川);福建:大号乳仔草(福州、闽南、宁德、福安、霞浦、福鼎),[神仙对坐草],大乳草,木本奶草,过路蜈蚣,蚂蚁草,猫仔癩,金花草(同安、泉州、晋江、南安、厦门等),宝钱草,退筋草,狗蚁丁草,蟪蛄草;台湾:大本乳仔草,红骨大本乳仔草;湖南:狮子草(衡阳),高地锦草(衡山),小夜关门,对牙草,打不死,夜关门,铺地花;广东:天泡草,大地锦叶,大呢草,大样乳汁草,胶走订,大号乳汁草(潮阳),蛭割草、乳花草(南澳),蛭镜草(惠来),乳汁藤(普宁),细号节节花(湛江),乳子草(乐昌),蟪乳(英德);海南:钱贼草(琼海);广西:飞羊儿(苍梧),飞羊药(桂平),飞羊草、假奶子草(南宁),壶亮草(全州),个扫廉(凌云),猫屎草(富川),蛇花草(岑溪),癩药草(龙州),癩根,点珠草,大奶汁草,毛飞扬;云南:"牙狼妹"(西双版纳傣语),节节草(易门、玉溪),“牙那勐”(傣语)。

功效 全草:有小毒。清热,解毒,通乳,渗湿,止痒。用于急性肠炎,菌痢,淋病,尿血,肺痈,乳痈,疔疮,肿毒,湿疹,脚癣,皮肤瘙痒。

#### 7136076

*Euphorbia humifusa* Willd.

植物名 地锦(高植图鉴)

药材名 地锦草(嘉祐本草)、《药典》

文献名 地肤、夜光、承夜(吴普本草),地曠(本草拾遗),酱瓣草(庚辛玉册),小虫儿卧单(救荒本草),[草

血竭]、血见愁、血风草、马蚊草、雀儿卧单、獭獭头草《纲目》,扑地锦《本草原始》,奶花草《名实图考》,红实茎草、铁线草《植物名汇》,盖地红《指示植物》,家雀川蛋、奶浆草《中草药学》,毛地锦(汇编),毛地锦草《药植简编》

地方名 奶汁草(浙江、福建、湖北),铺地锦(东北、河北、江苏、福建、湖北),花被单(江苏、上海),铺地红(东北、陕西、福建、湖南),雀儿卧蛋(河北、山西),红茎草(江苏、浙江、福建),不食草(东北、内蒙古),[鹅不食草](辽宁、内蒙古),[地丁]、多叶果、[鱼腥草]、星星草、斑雀草(东北),铁线马齿苋(陕西、江西);河北:花手绢,雀窝蛋,鹊卧蛋草;山西:生络草(太行);内蒙古:“麻拉根-扎拉-乌布斯”、“雀扑拉”、“阿沙增”、“别别也达”、“马拉盖音-扎拉-额布苏”(蒙名),雀儿卧蛋草,红头绳;陕西:[九头狮子草]、斑鸠窝(镇坪),凤凰窝(平利),被单草(旬阳);甘肃:雀盖头;新疆:“夏塔日欧提”(维名);山东:小虫盖体(曹县),铁皮血(崂山),麻雀蓑衣(淄博、沾化、昌乐、广饶),家雀蓑,天棚草,雀传草,麻雀蓑;江苏:[鸡眼草],房子草(南通),抓地锦(铜山);上海:血经基,粪独脚,粪脚草;浙江:小红筋草、红丝草(杭州),血线草(临安),奶疳草、红莲子草(温州、平阳、乐清),红锦,乳浆草;江西:小马苋(南昌),血剑草(吉水),地蓬草(临川),乳汁草(婺源),野马苋(吉安),蜈蚣草,散血草(景德镇),奶子草,珍珠草;福建:奶草,小号奶子草,奶汁子草(宁化),红乳汁子草,细叶奶汁草(清流),免奶奶草(永安),红莲草,莲子草,软骨莲子草,九龙吐珠草,地锦红,铺地草,红乳仔草,小本猪母乳,纲仔草,红龙草,猪母乳草;河南:小虫卧单,雀卧单,红蛋棵;湖北:铁马齿苋;湖南:一点浆(常德),奶奶草(黔阳),千叶草,[仙桃草];广东:小飞扬(广州),小号乳汁草(潮阳),小样乳汁草、[扁蓄草](海丰),飞痒子(四会),牛乳草、蜻蜓翅(澄海),红珠草、披翅凤(潮安),米仔草(增城),细叶节节花(兴宁),细叶扑鸠酸(五华),练汁草(电白),浮草(连平),茅婆草(高鹤),铺地毡(罗定);四川:红斑鸠窝,地马桑,红沙草,凉帽草,小苍蝇翅草,铺地金,三月黄花、天瓜叶(成都);贵州:小马齿苋(湄潭),红砂草(黔东南),倒欠草(铜仁),地瓣草,麻雀卧单,破网方巾;其他:土地绵,鬍子草,卧蛋草。

功效 全草:清热解毒,凉血止血,用于痢疾,肠炎,咳血,尿血,便血,崩漏,疮疖肿毒。

#### 7136076a

*Euphorbia hylonoma* Hand. -Mazz.

植物名 九牛造(中药大辞典)

药材名 九牛造(陕西中草药)

文献名 震天雷(汇编),西南大戟(湖北植志),湖北大戟(秦岭植志)

地方名 五朵云(陕西、湖北);陕西:九牛七(陕南),[翻天印](安康);湖北:九牛糙(恩施),冷水七、三朵云(神农架),[搜山虎](利川),铁筷子(巴东、兴山、神农架),通大海(巴东)。

功效 根:有毒。通便,利水,消积,破瘀,止痛。

用于二便不通,积聚腹胀,胸膈不利,肝硬化腹水,急性肠炎,消化不良,劳伤,跌打损伤,瘀血作痛,无名肿毒;茎、叶:止血,止痛,生肌。用于外伤;全草:外用于无名肿毒。

## 7136077

*Euphorbia hypericifolia* L. --- *E. indica* Lam.

植物名 通奶草《高植图鉴》

药材名 大地锦《台湾药植志》

文献名 光叶飞扬《广西本草选编》

地方名 江西:奶汁草;台湾:大地锦草,大地戟;广东:观音草,〔羊蹄草〕;广西:飞羊草(凌云),光叶飞扬草,光叶小飞扬,奶仔草,大乳仔草,铺地蜈蚣,敷地蜈蚣;四川:地锦葵、苍蝇翅(成都);贵州:小飞扬。

功效 茎叶:解热。用于痢疾,腹泻,月经过多,白带;全草:清热利尿,通乳健脾。用于水肿,乳汁不通,肠炎,腹泻,痢疾。

## 7136078

*Euphorbia jolkiki* Boiss.

植物名 南大戟《广西植录》

药材名 山大戟《桂林药志》

文献名 约大戟《广西药录》

地方名 广西:奶草、奶浆草、蓬头莲、将军箭(桂林),上莲下柳(大新、天等、靖西、南丹、南宁),九层楼、狮子钱(临桂),合骨风、合骨草(全州),蜻蜓草(融安),伤寒草(博白),宝三堂、铁挂扒(柳州、桂林),铁挂牌;其他:土大戟。

功效 全草:清热,凉血,润肺,止咳,杀菌,接骨。用于风湿,跌打损伤,感冒,咳嗽,水肿,消化不良。

## 7136079

*Euphorbia kansui* Liou

植物名 甘遂《高植图鉴》

药材名 甘遂《本经》、《药典》

文献名 主田《本经》,日泽、重泽、陵藁、甘藁、苦泽、鬼丑、《吴普本草》,陵泽《别录》,肿手花根、黄甘遂《药材学》,头痛花《中草药学》,萱根子《沙漠药植》

地方名 猫儿眼、肿手指花、五朵云(西北);陕西:肿手花;湖北:化骨丹,猫儿眼根。

功效 块根:有毒。泻水逐饮。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆喘咳,二便不利。

## 7136080

*Euphorbia kozlovii* Prok.

植物名 青海大戟《青藏药图》

地方名 青海:“塔日庆”(藏名)。

功效 根:用于黄水疮,癣。

## 7136081

*Euphorbia lamprocarpa* Prokh. --- *E. soongarica* Boiss. ssp. *lamprocarpa* (Prokh.) Prokh.

植物名 光果大戟《新疆中草药》

地方名 新疆:大戟。

功效 根:有毒。泻水逐饮,利二便。

## 7136082

*Euphorbia lathyris* L.

植物名 续随子《开宝本草》、《高植图鉴》

药材名 千金子《开宝本草》、《药典》

文献名 千两金、菩萨豆《中华本草》,联步《斗门方》,拒冬《开宝本草》,蜀随子、白随子、〔百两金〕、反时生《新纲》,千层楼、铁蜈蚣《中药大辞典》,神仙对座草《云南种录》,〔仙人对坐草〕《西藏植志》,千金子霜《药典》

地方名 打鼓子(四川、云南),小巴豆(湖北、四川、云南),上巴豆(甘肃、湖北、云南);陕西:蛇形草(山阳),降龙草(丹凤);甘肃:鹦哥抱蛋;湖南:摊板救;广西:〔小连翘〕(凌云),〔搜山虎〕(乐业),上莲下柳,铁挂耙;四川:续随(峨眉山);贵州:看园老;云南:一把伞(文山),〔大狼毒〕、狗打子(昆明),神仙对座,大狗子,大鼓子,百解,百药解、百祥解(大理)。

功效 种子:逐水消肿,破血消癥。用于水肿,痰饮,积滞胀满,二便不通,血瘀经闭。外用于顽癣,疣赘;叶:用于白癜风,面疔,蝎螫;茎中白汁:去肝黯,白癜风,面疔,蛇咬伤。

## 7136083

*Euphorbia lucorum* Rupr. --- *Galarhoeus lucorum* Kitag.

植物名 林大戟《东北草本植志》

药材名 林大戟《长白山植志》

地方名 辽宁:猫眼草(丹东)。

功效 根:清热解毒。用于牛皮癣。

## 7136084

*Euphorbia lunulata* Bunge

植物名 猫眼草《高植图鉴》

药材名 猫眼草《汇编》

文献名 猫儿眼睛草《华北药志》,乳浆草、耳叶大戟《东检》,华北大戟《秦岭植志》,猫眼草大戟《药植简编》,肿手棵《汇编》,细叶猫眼草《中药大辞典》,细叶猫儿眼《陕甘宁植志》

地方名 扎盆扎碗、打碗草(华北),猫儿眼(东北、华北、西北、山东);北京:扎锅扎碗棵;河北:打碗花,打碗棵,打盆打碗;内蒙古:“其黑图-塔日努”(蒙名);山东:猫儿眼草,〔狼毒〕(滕县、昆崙山),大猫儿眼(五莲);广西:上莲下柳、千里马穿莲草、双起草(桂林)。

功效 地上部分:有毒。祛痰,散结,消肿。用于慢性支气管炎,咳嗽,痰多。外用于淋巴结核。

## 7136085

*Euphorbia luticola* Hand. -Mazz.

植物名 黄土大戟《云南种录》

文献名 土大戟《湖北植志》

地方名 陕西:九牛造、太白九牛造(太白);广西:圆地人參(武鸣);云南:“哦尾”(玉溪彝名),狼毒(文山、元江),〔大狼毒〕(玉溪),奶汁草。

功效 全株:有大毒。消炎,清热,利尿,止血,催吐,泻下。用于痢疾,肠炎,小便不利,血淋,小儿疳积,肠脓疡。外用于痢症,湿疹,外伤出血。

## 7136086

*Euphorbia maculata* L.

植物名 斑地锦《湖北植志》

药材名 地锦草《药典》

文献名 美洲地锦草《中国植物图鉴》，小锦草《牧野日图》，斑叶地锦《江西草药》，奶母草、奶浆草、奶汁草、飞扬草《药植简编》

地方名 江苏：血见愁（镇江）；上海：红痣草；山东：斑脚草（烟台）。

功效 全草：清热解毒，凉血止血。用于痢疾，肠炎，咳血，尿血，便血，崩漏，疮疖肿痛。

7136087

*Euphorbia makinoi* Hayata

植物名 小叶红乳草《台湾药植志》

功效 茎、叶：用于痢疾。

7136088

*Euphorbia marginata* Pursh.

植物名 银边翠《高植图鉴》

药材名 银边翠《贵州药录》

地方名 广西：高山积雪。

功效 全草：拔毒消肿。用于月经不调，无名肿毒，跌打损伤。

7136089

*Euphorbia mili* Ch. des Moulins --- *E. splendens* Bojer.

植物名 铁海棠《高植图鉴》

药材名 铁海棠《汇编》

文献名 花麒麟《种分》，筋海棠《药植简编》，铁海棠花《中药大辞典》

地方名 狮子笏（广东、广西），麒麟花（福建、广西）；北京：麒麟刺，虎刺梅，虎刺；福建：有刺日日有、刺花（莆田），刺仔花（南安）；广东：老虎笏；广西：玉麒麟、番鬼刺（玉林），[海棠]（容县），[龙骨]（贵县），[大黄草]（凌云），小龙骨（百色），细龙骨；贵州：万年刺，千脚刺，刺蓬花，爬壁刺；云南：独节枝（玉溪）。

功效 花：止血。用于功能性子宫出血；茎、叶：拔毒消肿。外用于疔疮肿毒；全草：解毒，逐水。用于痢疮，横痃，肝炎，腹水。

7136090

*Euphorbia nematocypha* Hand. -Mazz.

植物名 大狼毒《云南种录》

药材名 大狼毒《滇南本草》、《汇编》

文献名 狼毒、泽七《玉龙山药植》，丝状大戟《西昌中草药》

地方名 四川：老来红（会东、会理）；云南：小狼毒（文山），“格枝糯”、“乌吐”（大理白族语），大搜山虎（大理），五虎下西山（昭通），五朵云、矮红、隔山推、刮金板（红河），土瓜狼毒，金丝矮陀陀，搜山虎。

功效 根：有毒。泻下逐水。用于水肿，肝硬化腹水。外用于创伤出血，淋巴结结核，跌打瘀血肿痛，皮肤搔痒，癣疥。

7136091

*Euphorbia nematocypha* var. *induta* Hand. -Mazz.

植物名 毛大狼毒《云南种录》

文献名 被盖大狼毒《云南药录》

功效 根：有大毒。外用于外伤出血，疥癬疮。

7136092

*Euphorbia nerifolia* L.

植物名 夹竹桃叶大戟《药植简编》

文献名 霸王鞭《台湾药植志》

地方名 甘肃：虎刺；台湾：火卷心；其他：金刚杵，金刚钻，霸王茨。

功效 叶及液汁：有毒。用于痉挛性哮喘，溃疡，皮肤病，肠阻塞。外用于耳痛；根：泻腹水。用于毒蛇咬伤，皮下水肿，气鼓；叶：外用于敷肿毒。

7136093

*Euphorbia pekinensis* Rupr.

植物名 大戟《本经》、《高植图鉴》

药材名 京大戟《药典》

文献名 莽《尔雅》，邛钅《本经》，下马仙《纲目》，破军杀、勒马宣、泽基《新纲》，乳浆草《名实图考》，大吉《和汉药标本目录》，黄花草、大浆草、狼虎草、膨病草、飞龙草《中药通报》，一盘棋《中药大辞典》

地方名 北京大戟、将军草（山西、江苏、四川），龙虎草（东北、山西、江苏、浙江、安徽、湖北、四川），猫儿眼（吉林、辽宁、山东、江苏），九头狮子草（江苏、湖南），小狼毒（江苏、安徽），大猫儿眼（山东、江苏），灯台草（江苏、吉林），[千层塔]（安徽、江西、湖北），猫眼草（辽宁、甘肃、山东、江苏）；吉林：猫眼，打碟子打碗，“代歌克”（朝名）；内蒙古：“巴嘎·塔日努”（蒙名），铁罩篱，点球球花；甘肃：二郎箭；山东：猫儿眼草，[狼毒]（滕县、昆崙山），眼眼草，猫眼棵子（烟台）；江苏：天平一枝香、一枝香（苏州），追水龙（宜兴），黄芽大戟（常熟），鼓胀草（南京），黄花大戟（苏州），大苦了草，归山虎，假苦参，猫猴子眼，通气草，红芽大戟（盱眙）；浙江：泻药（东阳），穿山虎（温州、平阳、乐清），追水龙（嘉兴），搜山虎（乐清、天台），堰水龙草；安徽：小猫眼草，臃胀棵子；江西：千层楼（丰城），震天雷（南丰），天铜尺（吉安），翻毛鸡（南昌）；湖北：下马杆（浠水），大猫儿头（宜昌），山猫儿眼草，翻天印（神农架）；广东：一枝箭；广西：上莲下柳（南宁），空心塔（全州），山塘草，将军箭，残虫草；贵州：小搜山虎；其他：愚毒草（朝鲜）。

功效 根：有毒。泻水逐饮。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利。

7136094

*Euphorbia peplus* L.

植物名 癖草《汇编》

地方名 福建：水芫，豌豆仙草，治癖草、珠子草（厦门）。

功效 全草：有毒。杀虫，解毒。用于癖疮。

7136095

*Euphorbia pilulifera* L.

植物名 台湾地锦草《药植简编》

文献名 治喘莠（叶《生药》），毛果大戟《中药大辞典》

地方名 台湾：大本乳仔草，红骨大本乳仔草，过路蜈蚣，缠绵草；其他：飞扬草，乳仔草。

功效 全草：清热解毒，凉血止血，利湿，通乳。用

于菌痢,肠炎,咳血,吐血,便血,崩漏,外伤出血,湿热黄疸,乳汁不通,痈肿疮疮,跌打肿痛。

## 7136096

*Euphorbia pinus* Levl.

植物名 土瓜狼毒《汇编》

药材名 土瓜狼毒《滇南本草》

文献名 茵茹《滇南本草》

地方名 四川:五朵云(西昌);云南:大萝卜(红河、昆明),羊奶浆(通海),大狼毒,闹狗草,顺水龙,隔山消。

功效 根:有大毒。利水消肿,泻下通便,湿阻中满。用于胃气疼痛,食积结滞,水肿,血积,虫积,痰毒。

## 7136097

*Euphorbia prolifera* Buch.-Ham.

植物名 小狼毒《汇编》

药材名 小狼毒《汇编》

文献名 鸡肠狼毒、隔山消、顺水龙《滇南本草》,丰茂大戟(西昌中草药),土瓜狼毒《中药大辞典》,一把香《中草药》

地方名 四川:万丈深(会东、会理);云南:闹狗草,小龙蛇狼(蒙自),细狗闹花(红河)。

功效 根:有大毒。利水消肿,泻下通便,湿阻中满。用于各种水肿,便秘,外伤出血,疮及无名肿毒,骨折。

## 7136098

*Euphorbia prostrata* Ait.

植物名 铺地草《海南植志》

药材名 红乳草《福建药物志》

文献名 奶汁草、奶疳草《药植简编》

地方名 福建:小飞扬(安溪),小号乳仔草(长汀、仙游、闽清、闽南、莆田),地锦草;广西:小奶汁草(梧州)。

功效 全草:清热凉血,解毒消肿。用于痢疾,肠炎,白喉,咽喉炎,乳糜尿,乳汁稀少,子宫出血,小儿疳积,便血,尿血,牙龈出血,带状疱疹,皮炎,湿疹,痈疖。

## 7136099

*Euphorbia pulcherrima* Willd.

植物名 一品红《高植图鉴》

地方名 猩猩木(江苏、台湾、广西、云南);台湾:圣诞树,圣诞红;广西:状元红(平南),一片红;云南:叶上花、叶象花(红河);其他:老来娇。

功效 全株:有小毒。调经止血,接骨消肿。用于月经过多,跌打损伤,外伤出血,骨折。

## 7136100

*Euphorbia rapulum* Kar. et Kir.

植物名 块茎大戟《新疆药植志》

文献名 小萝卜大戟《沙漠植志》

功效 块茎:利水消肿,泻下通便。

备考 块茎在新疆有误作元胡者,应注意区别。本品有毒。

## 7136101

*Euphorbia resinifera* Berg.

植物名 大戟乳脂树《台湾药植志》

文献名 仙人掌大戟、大戟乳脂、龙骨木《台湾药植志》

功效 全株:剧毒。催吐,重泻。

## 7136102

*Euphorbia rothiana* Spreng.

植物名 长角大戟《云南种录》

文献名 黔大戟《药植简编》,贵州落地金钱《汇编》

地方名 贵州:落地金钱(梵净山);云南:大狼毒(昆明),闹狗浆草(双柏)。

功效 根:有小毒。泻下祛瘀。用于腹部胀痛,气窜胁痛,跌打损伤。

## 7136103

*Euphorbia royleana* Boiss.

植物名 霸王鞭《云南种录》

药材名 霸王鞭《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 金刚纂《丹房本草》

地方名 云南:刺金刚(昆明),圆金刚(楚雄)。

功效 全草及乳汁:有毒。祛风消炎。外用于疮疡肿毒,皮癣。

## 7136104

*Euphorbia sessiliflora* Roxb.

植物名 百步回阳《云南种录》

地方名 云南:蚕豆七、蚕头七、金刚跌打(思茅)。

功效 全草:用于软组织扭伤,骨折,风湿,疮疖。

## 7136105

*Euphorbia sieboldiana* Morr. et Decne.

植物名 钩腺大戟《高植图鉴》

药材名 草茵茹《纲目》

文献名 席氏狼毒《中国药植图鉴》,狼毒《安徽中草药》,〔甘遂〕《中国药植志》

地方名 青海:灯笼儿草(湟中、乐都);山东:胖子棵,狼毒胖子棵;安徽:〔山大黄〕,九头草,红苏毛草;湖北:狼毒药(神农架);四川:奶浆草(重庆)。

功效 块根:有大毒。破积,镇痛,杀虫,灭鼠。用于肺、皮肤、腺、骨等结核,干湿疥疮,顽癣,灭鼠。

## 7136106

*Euphorbia soongarica* Boiss.

植物名 准噶尔大戟《沙漠药植》

药材名 新疆大戟(拟)

文献名 胖胖秧《沙漠药植》

地方名 新疆:大戟。

功效 根:有毒。逐水,通二便,消腹水。

## 7136107

*Euphorbia stracheyi* Boiss. --- *E. megistopoda* Diels

植物名 藏西大戟《云南种录》

文献名 土瓜狼毒《药植简编》,高山大戟《西藏植志》

地方名 云南:一把香、棉大戟、搜山虎(丽江)。

功效 根:有毒。止血,止痛,生肌。

## 7136108

*Euphorbia supina* Rafin.

植物名 血筋草《浙江天目药志》

药材名 地锦草(华东)

文献名 乳门草、[遍地金]、鸡盲草《纲目拾遗》,斑地锦《浙江天目药志》

地方名 浙江:红筋草(杭州),奶疳草(乐清、龙泉);安徽:小飞扬,羊奶草,小虫盖,血见愁,奶浆草,花盖棵,花被单,铺地锦。

功效 全草:止血,清湿热,通乳。用于黄疸,泄泻,疳积,血痢,尿血,血崩,外伤出血,乳汁不多,痈肿疮毒。

#### 7136109

*Euphorbia thymifolia* L.

植物名 千根草《高植图鉴》

药材名 小飞扬草《生草药性备要》、《汇编》

文献名 飞扬草《岭南采药录》,细叶地锦草《云南种录》

地方名 小飞扬(湖南、广东、广西、云南),乳仔草、蒿蓄草(台湾、广东),乳草(福建、广西),乳汁草、地锦(广东、广西),小乳汁草(湖南、广东、云南),细叶飞扬草(广东、云南),铺地锦(湖南、广东),[蒿蓄](福建、广东、台湾);台湾:小本乳仔草,小乳仔草,细本乳仔草,红尾仔草,红乳草,红骨细本乳仔草,乌仔目草,帖乌仔目草,过路蜈蚣,扁草,翻红草;湖南:[血见愁](衡阳);广东:千斤草,痢疾草,细飞扬,红珠草(潮安、潮州),小号乳汁(惠安、普宁),小样乳汁草(海丰),披翅凤(潮安、潮州、澄海),牛乳草、蜻蜓翅(澄海),小叶乳汁草、小奶草、虱越草(粤北),牛奶草,痢子草;广西:红地茜(岑溪),[紫花地丁](玉林),猪屎残(平南),苍蝇翅(北海、凌云),挞地沙,铺地草,蛇花草儿,乳头草(北海);云南:小奶浆草(红河),小奶浆藤。

功效 全草:有小毒。清热利湿,收敛止痒。用于细菌性痢疾,肠炎腹泻,痔疮出血,疟疾。外用于湿疹,过敏性皮炎,皮肤搔痒。

#### 7136110

*Euphorbia tirucalli* L.

植物名 绿玉树《海南植志》

药材名 绿玉树《汇编》

文献名 淡乳《植物名汇》,乳葱树《汇编》

地方名 青珊瑚、神仙棒(台湾、广东、广西);福建:铁罗;台湾:绿珊瑚,宜呼端,铁树;广东:光棍树(广州),白蚁树,珊瑚枝;广西:红雀珊瑚,洋珊瑚,光棍槌。

功效 全草:有小毒。催乳,杀虫。用于缺乳,癣。

#### 7136111

*Euphorbia vachellii* Hook. et Arn.

植物名 细锯叶地锦《台湾药植志》

功效 全草:有毒。解热。

#### 7136112 见 7136076a

#### 7136113

*Excoecaria acerifolia* F. Didrich. --- *Excoecaria acerifolia*

F. Didr. var. *genuina* Muell. - Arg.

植物名 草沉香《高植图鉴》

药材名 刮筋板《四川中药志》

文献名 [鸦蛋子]《名实图考》,刮金槭、[走马胎]《天宝本草》,云南鸦胆子《北华药讯》

地方名 甘肃:奶奶子(文县);湖北:铁乌梢(利川);广西:肥皂草;四川:刮金板(峨眉山),云南土沉香;云南:土沉香(通海、江川),小霸王(红河),红人太岁、山桃根、野桃根、岩石榴(通海),岩槐(易门),“金妮”(楚雄彝名),小桃树,水银菜,沉香。

功效 全株:祛风散寒,健脾利湿,解毒。用于风寒咳嗽,疟疾,黄疸型肝炎,消化不良,小儿疳积,风湿骨痛,闭经,狂犬病,草乌、毒草、食物中毒。

#### 7136114

*Excoecaria agallocha* L.

植物名 海漆《海南植志》

药材名 土沉香(台湾、广西)

文献名 印度瞎眼树《台湾药植志》

地方名 台湾:水贼,水贼仔。

功效 叶:用于癰疽,溃疡,麻疯;茎、根栓皮:壮阳;树汁及木材:泻下。

备考 树汁有毒,不可误入眼睛。

#### 7136115

*Excoecaria cochinchinensis* Lour.

植物名 红背桂花《高植图鉴》

药材名 红背桂《汇编》

文献名 青紫木《种分》,箭毒木《云南药录》

地方名 上海:红叶桂花,东洋桂花;广西:天黑地红(龙州);云南:金锁玉(通海),叶背红。

功效 全株:有毒。通经活络,止痛。用于麻疹,腮腺炎,扁桃体炎,心绞痛,肾绞痛,腰肌劳损。外用子疥癣。

#### 7136116

*Excoecaria cochinchinensis* Lour. var. *viridis* (Pax et Hoffm.) Merr.

植物名 绿背桂花《高植图鉴》

药材名 绿背桂叶(拟)

文献名 绿背桂《广西植录》,鸡尾木《汇编》

地方名 云南:小霸王(思茅),毒箭木(玉溪)。

功效 叶:有大毒。杀虫止痒。外用于牛皮癣,慢性湿疹,神经性皮炎。

#### 7136117

*Excoecaria venenata* S. Lee et F. N. Wei

植物名 鸡尾木《广西药录》

药材名 鸡尾木叶(拟)

地方名 广西:东方绿白,“唧奴”(崇左壮语)。

功效 叶:有毒。外用于牛皮癣,湿疹。

#### 7136118

*Fluggea virosa* (Roxb. ex Will.) Baill. --- *Securinega virosa* (Roxb.) Pax et Hoffm.

植物名 白饭树《中药大辞典》

药材名 白饭树《生草药性备要》、《汇编》

文献名 白饭枝、白饭树叶《生草药性备要》,蕙米蕈《岭南采药录》,金柑藤《树分》,红刺葱《台湾药植志》

地方名 台湾:狗力仔刺,白珠仔树,雷公饭,白鸡母珠,市葱头,[七日晕头],刺葱根,密花市葱;广东:鹊饭树、紫荆花、塘虱花(惠阳);广西:鱼眼根(南宁),鱼骨草(南宁、阳朔),奶子果(隆安),曾仔根、白倍子(贵县),鸡眼藤(北流),白饭珠(白色),白鱼眼,鱼眼木;云南:盐桑树;其他:白火炭,白泡果,牛京当。

功效 全株:有小毒。清热解毒,消肿止痛,止痒止血。外用于湿疹,脓疱疮,过敏性皮炎,疮疖,烧、烫伤。

## 7136119

*Glochidion assamicum* (Muell.-Arg.) Hook. f.

植物名 阿撒姆算盘子《广西药录》

功效 叶:有毒。外用于牛皮癣,湿疹。

## 7136120

*Glochidion daltoni* (Muell.-Arg.) Kurz

植物名 革叶算盘子《云南种录》

地方名 云南:蚂蚁上树《云南药录》。

功效 果实:止咳。用于咳嗽。

## 7136121

*Glochidion dasyphyllum* K. Koch --- *G. hirsutum* (Roxb.) Voigt

植物名 厚叶算盘子《高植图鉴》

文献名 毛叶算盘子《云南药录》

地方名 广西:出山虎(桂平),牛口沙(北流),水冬瓜、大洋算盘(平南),大云药(天等),大叶水榕(贵县),水泡木;云南:“单亮”(西双版纳傣语),“丹药良”(傣语)。

功效 根、叶:收敛固脱,祛风消肿。用于风湿骨痛,跌打肿痛,脱肛,子宫下垂,白带,泄泻,肝炎,牙痛。

## 7136122

*Glochidion eriocarpum* Champ. --- *G. sphaerogynum* Kurz

植物名 毛果算盘子《高植图鉴》

药材名 漆大姑《岭南采药录》、《中药大辞典》

地方名 算盘子、野南瓜(广西、云南),漆大伯(广东、广西),毛漆(广东、广西、云南);福建:山桔子(厦门),八面桔、八楞桔(福州、闽侯、福安),八瓣桔(福州、闽侯、同安、闽东),山金瓜(龙溪),毛漆姑、毛算盘树、七姐妹、七大姑(厦门);广东:杨漆姑婆(新会),生毛漆(阳春);广西:毛七公(北流、南宁、马山、上林),大毛七(博白),毛七木(玉林),毛三七(贵县),毛算盘(蒙山),七保木(柳州),入山虎、果独木(桂平),有毛算盘,扁十生干(凌云),毛七哥(陆川),算盘木(平南、藤县),野算盘,金瓜子,漆泡木,毛七,毛蚊木,大戟毛漆,纸钱木,漆姑木,算盘珠;云南:痒树棵,算盘果,藤篮根。

功效 枝叶:驱风利湿,散瘀,止血,消肿。用于急性胃肠炎,痢疾,风湿关节痛,跌打损伤,创伤出血,漆疮,湿疹,皮炎;根:用于肠炎,痢疾。

## 7136123

*Glochidion fagifolium* Miq.

植物名 山柑算盘子《海南植志》

药材名 圆果算盘子《中国经植志》

文献名 栗叶算盘子《广西药录》

地方名 山柑树(海南、广西);广西:小甘淫,细甘淫,糊木(宁明)。

功效 枝、叶:清热解毒。用于感冒发热,暑热口渴,口腔炎,湿疹,疮疡溃烂。

## 7136124

*Glochidion hongkongense* Muell.-Arg.

植物名 香港算盘子《海南植志》

文献名 毛叶算盘子《广西药录》

地方名 大红心、大叶馒头果(台湾、广西);台湾:金龟树。

功效 根皮:止咳;树皮、叶:用于腹痛,鼻衄。

7136125 见 7136126

## 7136126

*Glochidion lanceolarium* (Roxb.) Voigt --- *G. macrophyllum* Benth.

植物名 艾胶算盘子《海南植志》

文献名 艾胶树《广西药录》,大叶算盘子《广西植录》

地方名 海南:果盒仔;广西:大算盘木(北流),山疳黄、大鸿锦(贵县)。

功效 根:退黄;茎、叶:散瘀消炎。用于跌打,齿龈炎,口腔炎。

## 7136127

*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.

植物名 甜叶算盘子《广西药录》

功效 叶:清热。用于咽喉肿痛,可代茶饮。

## 7136128

*Glochidion puberum* (L.) Hutch.

植物名 算盘子《高植图鉴》

药材名 算盘子《名实图考》、《汇编》

文献名 野南瓜、[柿子椒]《名实图考》,血木瓜《民药汇编》,橘子草、蝉子树、西瓜树《中药大辞典》

地方名 山馒头(浙江、福建、广东),山金瓜(福建、广西),狮子滚球(湖北、广东),算盘珠(福建、湖北、广西、四川),地南瓜(安徽、江西),金骨风(安徽、湖北、广东、广西),馒头果(江苏、安徽、福建、广西),血巴木(湖南、贵州),红娘子棵(江苏、安徽),土山楂、假茶叶、八瓣橘(浙江、福建),野蕃蒲(江西、广东),狮子球(安徽、广东);陕西:大开根;山东:葫芦头(莒南);江苏:小孩拳(连云港、邳县、铜山),红娘子果(盱眙),矮树树;浙江:百莢橘(云和、遂昌),金瓜柴(温州),山水楂,水南瓜,水毛车,百家橘,百橘柴,山柿楂,亚皮草,老北瓜柴,红桶盘,红馒头,鸡木池,鸡木椒,鸡眼睛柴,哑馒头,鬼馒头,炉梨,野麻楂,野盘桃;安徽:千年矮,牛屎饼,灯笼果,鬼木楂子,矮志,腊栗树,磨盘子;江西:水毛楂树(德兴),馒头子柴(南昌),鸡婆柴(吉水),斋珠兰(莲花),算盘子树(萍乡),山金橘,野北瓜,磨盘树子,馒头树子;福建:刀豆子、八楞橘、牛蒡、寿牌子(闽东),山油柑(闽南),酒饼子糖、麻蜂潘车子、葡萄子糖(三明专区),馒头草、桃蜜(厦门),赤松、臭山橘(泉州),山橘子(泉州、南安、永春、莆田、仙游),水金瓜,红



橘子,八楞楂、老妈橘、百梗橘(南平);湖北:雷打火烧子(五峰、建始),矮子郎(黄梅);湖南:红南瓜树、斋巴果(常德),鸡眼树(溆浦),北瓜柴、野南瓜柴(衡山),木把,门子柱,血泡木,斋把树,铁门栅,铁牛皂栏,铁暂板,帽子陀陀,督统大元帅;广东:算盘树(博罗、东莞),果合树(清远、英德),果合仔(从化、东莞),糖瓜树(增城),炉边麻(潮安),红心柿舅(普宁),番瓜仔(新会),古形树(东莞),涩仔叶(高要),曼头树(兴宁),曼头罗(五华),由甲树叶(花县),细沙、山番瓜、假番瓜、周身松(广州),果合落、打油柑、炸一木叶、蛮头树、细叶果盒子(惠阳),小叶蔓头树(梅县),果盒草,盒子草,狮尾草;广西:地金瓜,小毛七,鸡头箭,红算盘珠(富川),算盘木(梧州、昭平、桂平、平南),小算盘木、百足木(玉林),算盘木根(柳江),算盘七草(大瑶山),细算盘、西洋算盘(平南),小南瓜(梧州),小帐棚(北流),光七、细毛七(博白),山大黄(龙州);四川:血瓜木,面头果,算盘子根;贵州:火烧斑,蚂蚁木,算盘果;云南:牛七公,火烧尖子。

功效 根、叶:清热利湿,祛风少络。用于感冒发热,咽喉痛,疟疾,急性胃肠炎,消化不良,痢疾,风湿性关节炎,跌打损伤,白带,痛经;果实:有小毒。用于疟疾,疝气,淋浊,腰痛。

## 7136129

*Glochidion rubrum* Blume

植物名 细叶算盘子(拉汉英种称)

药材名 馒头果(台湾药植志)

文献名 面头果(植物名汇),算盘子(种称),小儿拳(指示植物)

地方名 江苏:山渣,算盘珠;浙江:鸡目椒(兰溪),山桶盘(天台);福建:八片橘、八面橘、八楞橘、寿牌子(福安),山金瓜,山金橘;台湾:细叶赤血仔。

功效 叶:用于风湿,神经痛,祛痰;树皮:用于腹痛。

## 7136130

*Glochidion wilsonii* Hutch.

植物名 湖北算盘子(高植图鉴)

药材名 馒头果(浙江药植志)

文献名 白背算盘子(中国经植志),庐山算盘子、庐山馒头果(广西植录)

地方名 算盘珠(江西、贵州),野南瓜(江苏、江西);江苏:乔木馒头果;江西:鬼馒头(庐山)。

功效 根、叶:清热利湿,祛风活络。

## 7136131

*Glochidion wrightii* Benth.

植物名 白背算盘子(高植图鉴)

药材名 白背算盘子(广西药录)

功效 根:用于痢疾,湿疹,小儿麻疹。

## 7136132

*Glochidion zeylanicum* (Gaertn.) A. Juss.

植物名 槌柱算盘子(拉汉英种称)

文献名 香港算盘子(广西药录)

功效 根:用于咳嗽,肝炎;茎、叶:用于腹痛,蛆

血,跌打损伤。

## 7136133

*Hevea brasiliensis* (H. B. K.) Muell.-Arg.

植物名 橡胶树(高植图鉴)

药材名 弹性树胶(台湾药植志)

文献名 橡皮树、胶皮树、橡胶、树胶(树分),巴西橡胶树(徐(生药)),三叶胶(种称),胶树、三叶橡胶树(中国经植志),巴西橡皮树(台湾药植志)

地方名 海南:三叶胶树。

功效 树胶:用于制橡皮绊创膏及片状芥子泥膏。

## 7136134

*Homonoia riparia* Lour.

植物名 水柳仔(高植图鉴)

药材名 水椎木(汇编)

文献名 水柳(海南植志)

地方名 [水杨梅](台湾、四川);海南:水麻、虾公岔树(儋县);广西:(穿破石);云南:[水杨柳],细杨柳,“哥孩”(西双版纳傣语),柳叶。

功效 根:清热利胆,消炎解毒。用于急、慢性肝炎,膀胱结石。

## 7136135

*Hura crepitans* L.

植物名 沙盒树(台湾药植志)

功效 种子:缓泻;树皮、乳汁:用于麻风;果壳:外用于慢性溃疡。

## 7136136

*Jatropha curcas* L.

植物名 麻疯树(高植图鉴)

药材名 麻风树(广西药录)

文献名 麻风子(植物名汇),南洋油桐(树分),木花生(广西植录),膏桐(云南种录)

地方名 羔桐、臭油桐、黄肿树、假白榄、[芙蓉树](广东、广西),亮桐、油芦子(广西、云南),水漆(台湾、广西、四川),桐油树(台湾、广西、云南),小桐子(广西、四川、云南);福建:鬼斑子、麻斑子;台湾:[巴豆](恒春),[油桐树];广西:青桐木,无筋清风木(博白),滑桃树,假花生,白油果,假桐子,假桐油,黄肿木;四川:野巴豆,小巴豆;云南:小油桐(红河),膏风,洋桐,桐子树,宾麻,[臭梧桐](元江),“麻烘罕”(西双版纳傣名);其他:露蒙子。

功效 树皮和叶:有毒。散瘀消肿,止血止痒,排脓生肌。外用子跌打肿痛,创伤出血,皮肤瘙痒,麻风,癰痢头,慢性溃疡,关节挫伤,阴道滴虫,湿疹,脚癣。

## 7136137

*Jatropha gossypifolia* L. var. *elegans* Muell.-Arg.

植物名 棉叶木花生(广西药园药录)

文献名 棉叶麻风树(广西药园药录)

地方名 广西:三叉风。

功效 叶:用于疔疮,疥癣,湿疹;种子:用于催吐,癰症;叶和种子:泻下;树皮:用于调经。

## 7136138

*Jatropha podagrica* Hook.

植物名 佛肚树(广西植录)

文献名 惠阳独脚莲《药植简编》, 菩肚《广西药园药录》

地方名 广东: [独脚莲](惠阳); 云南: “麻烘娘”(西双版纳傣名)。

功效 全株; 清热解毒, 消肿止痛。用于毒蛇咬伤。

#### 7136139

*Leptopus chinensis* (Bunge) Pojark. --- *Andrachne chinensis* Bunge

植物名 雀儿舌头《高植图鉴》

药材名 雀儿舌头《北京中草》

文献名 黑钩叶《华北树木志》

地方名 湖北: 黄杨皮、一叶秋(神农架)。

功效 嫩苗、叶; 有毒。用于腹痛, 杀虫; 枝: 用于全身瘫痪。

#### 7136140

*Leptopus esquirolii* (Levl.) P. T. Li

植物名 尾叶黑钩叶《广西药录》

功效 叶; 止血, 固脱。用于子宫脱垂。

#### 7136141

*Macaranga adenantha* Gagnep.

植物名 盾叶木《广西药录》

功效 叶; 有毒。用于跌打损伤。

#### 7136142

*Macaranga denticulata* (Blume) Muell. - Arg.

植物名 中平树《高植图鉴》

文献名 血桐、糠皮树《贵州药录》

地方名 海南: 灯笼树(澄迈); 云南: 赖麻、牢麻; 西藏: “沙拉克兴”(藏名)。

功效 根: 用于黄疸型肝炎; 茎皮: 泻下。用于腹水, 便秘。

#### 7136143

*Macaranga henryi* (Pax et Hoffm.) Rehd.

植物名 草鞋木《广西药录》

地方名 广西: 入骨风(上林)。

功效 根: 有毒。用于风湿骨痛, 跌打损伤。

#### 7136144

*Macaranga kurzii* (O. Ktze.) Pax et Hoffm.

植物名 滇桂血桐《云南药录》

文献名 细毛叶树《云南药录》, 团叶于《云南种录》

功效 叶、茎: 用于麻风。

#### 7136145

*Macaranga tanarius* (L.) Muell. - Arg.

植物名 血桐《高植图鉴》

药材名 血桐《台湾药植志》

文献名 红合儿树《中国经植志》

地方名 台湾: 大有树, 橙栏, 橙桐, 面头果; 四川: 毛桐, 山桐子。

功效 根: 用于催吐, 咳血; 树皮: 用于痢疾; 叶: 外用于敷创伤。

#### 7136146

*Mallotus apelta* (Lour.) Muell. - Arg.

植物名 白背叶《高植图鉴》

药材名 白背叶《岭南草药志》

文献名 酒药子树《名实图考》, 白帽顶《岭南草药志》, 叶下白《汇编》, 天青地白柴《中草药学》, 白枫、白林树、白桃叶、谷皮柴、野芙蓉《中药大辞典》

地方名 白面虎(福建、广西), 野桐(安徽、广东、广西), 白鹤顶、白朴树(江西、广东、广西), 白鹤树(江西、广东), 白面风(安徽、江西), 白叶野桐(江苏、福建、湖南、云南), 白膜树(广东、广西); 浙江: 母子树, 白桐子; 安徽: 野梧桐, 席筋皮; 江西: 鬼点火(遂川), 橡皮柴, 谷米柴, [天青地白], 山桐; 福建: 野桐根、白匏仔(闽南), 木梗天青地白(福州、三明), 狗屎团(邵武、沙县), 八面白、山粟(厦门), 萱叶飞扬(宁化), 天虹, 白匏叶, 毡头, 白匏仔叶, 帽呢柴叶, 萱叶白, 山麻; 河南: 野桐麻, 野洋麻; 湖北: 狗尾巴树(鄂西), 野胡油麻(崇阳), 巴巴树, 毛芙蓉树, 灰泡树, 狗骨头子, 野树麻叶; 湖南: 毛桐(长沙), 三角木(麻阳), 泡泡桐、野小米、野桐子桐(衡山), 虎豹叶、豹子虎(衡阳), 哈劳皮(永兴), 耙耙树(新宁); 广东: 山白芋、山芋、白小娘(潮安), 白汁叶、亚娘叶、亚娘根、屎棍条(五华), 白面仔(陆丰), 白膜叶(惠阳), 白毛树、白面戟、白朴叶、白粉叶、白鹤叶(广州), 白背朱砂、假黄粟(阳春), 白叶仔(普宁), 木粟, 白心小娘, 白意根, 白燕根, 白菊粟, 白鹤仔, 老虎尾, 狗屎筒, 野花粟, 假狗尾粟(潮阳、普宁), 假萱叶(饶平), 白玉麻, 白泡树, 白底莲, 白木凳, 白膜根, 白朴根; 海南: 白面杆; 广西: 白背木(北流、博白、平南、南宁、大瑞山), 白背娘(北流、南宁), 白背霜(贺县), 白吊粟(富川、北流), 白吊粟木(蒙山), 白鹤木(平南), 白面筒(北海), 吊粟木(藤县), 树黄粟(富川), 白背桐, 白背树, 白桐, 达达两, 狗尾粟, 荡浪风, 野蜀木; 贵州: 山桐子。

功效 根: 柔肝活血, 健脾化湿, 收敛固脱。用于慢性肝炎, 肝脾肿大, 子宫脱垂, 脱肛, 白带, 妊娠水肿; 叶: 消炎止血。外用于中耳炎, 疖肿, 跌打损伤, 外伤出血; 茎皮: 清热利湿, 逐水消肿, 解毒。用于水肿, 痢疾, 胃痛, 跌打损伤, 蛇咬伤, 外伤出血。

#### 7136147

*Mallotus barbatus* (Wall.) Muell. - Arg. --- *Rottlera barbata* Wall.

植物名 毛桐《高植图鉴》

药材名 红帽顶(广西)、《陆川本草》

文献名 野枇把《植物名汇》, 毛野桐《药植简编》, 毛果桐《云南种录》, 野桐皮《中国经植志》, 盾叶野桐《植分学报》

地方名 湖北: 黄花叶(利川), 糠壳树(来凤); 广东: 谷粟麻(封川); 广西: [大风艾](隆林), 老糠木(浦北), 沉沙木(容县), 红吊福(苍梧), 圆鞋(龙州), 侧枝(大新), 猪肚木(南宁), 猪糠木(钦县), 米糠木, 红妇娘木, 具朋木, 粗糠根(宾阳), 紫糠木、白糠木(玉林); 四川: 大毛桐子, 红毛桐子、毛桐子(峨眉山), 红桐子; 贵州: 糠皮树; 云南: 毛叶子, 白叶树, 饭包木。

功效 根: 清热利尿。用于肠炎腹泻, 消化不良,

尿道炎, 白带。

#### 7136148

*Mallotus japonicus* Muell. -Arg.

植物名 野梧桐(南京)、《高植图鉴》

药材名 野梧桐《本草推陈》

文献名 楸树《救荒本草》, 赤芽楸、赤芽榭《本草推陈》, 日本野桐《种分》, 楸、白肉白匏仔《树分》

地方名 野桐(江苏、台湾); 江苏: 竹桐、黄条子(江浦); 广西: 止血木(玉林), 鸡距藤(北流), 黄果叶(乐业), 山麻杆。

功效 树皮: 调整消化功能。用于胃溃疡, 十二指肠溃疡; 全株: 消肿驳骨, 止血。

备考 根、枝或树干之皮在日本民间用于各种癌症。

#### 7136149

*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg. var. *floccosus* (Muell. -Arg.) S. M. Hwang --- *M. nepalensis* Muell. -Arg. --- *M. tenuifolius* Pax

植物名 野桐《植分学报》

药材名 山桐子(四川、贵州)、《贵州民间药物》

文献名 薄叶野桐《浙江药植志》, 尼泊尔野桐《中药大辞典》, 毛桐子《中国经植志》

地方名 野桐皮(福建、湖北); 山东: 野梧桐; 浙江: 毛虫柴, 野毛桐; 安徽: 皮树; 福建: 犬尾招; 湖北: 巴巴树, 灰炮桐, 狗尾巴, 狗尾巴树, 狗骨头子, 野树麻叶, 饼子叶、粗糠柴(神农架); 湖南: 黄栗树, 小米树, 灰甫树, 泡泡树, 糠树; 广西: 大叶桐, 螳螂风; 四川: 毛梧桐, 红火儿, 岩桐, 矮桐子, 白毛桐子(峨眉山); 贵州: 大马桑叶, 毛桐, 臭樟木。

功效 根皮: 生新解毒。用于骨折, 狂犬咬伤, 骨结核。

#### 7136150

*Mallotus millietii* Levl.

植物名 崖豆藤野桐《植分学报》

文献名 梅列野桐《广西药录》, 滇黔野桐《广西植录》

地方名 广西: 拘钩(武鸣), 称钩, 称钩风, 假钩藤。

功效 全株: 祛风散寒, 消肿; 叶: 用于刀伤。

#### 7136151

*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg. --- *M. cochinchinensis* Lour.

植物名 白楸《高植图鉴》

药材名 白叶子《广西药录》

文献名 白背桐《云南种录》, 白匏子《台湾药植志》

地方名 白背树(中南), 匏子、帽顶(台湾、广西); 台湾: 白匏, 白叶仔; 海南: 力树; 广西: 白背木(博白、北流), 白浊木(北流), 白帽顶(桂平)。

功效 叶: 外用于肿毒, 创伤; 根: 用于头痛; 根与果实: 外用于跌打损伤。

#### 7136152

*Mallotus philippinensis* (Lam.) Muell. -Arg. --- *Croton philippinensis* Lam.

植物名 粗糠柴《高植图鉴》

药材名 粗糠柴《汇编》

文献名 黄藤树《植物名汇》, 加麻刺、樟叶柏《中国植物图鉴》, 吕宋楸木、吕宋楸荚粉(李《生药》), 假桂树《广西中药志》

地方名 六检子、六稔子、茅山树、剪刀树(中南), 菲岛桐(台湾、云南); 江西: 香楸藤(遂川), [楸树](全南); 台湾: 柿糊木, 嘞哩仔, 嘞哩木, 檀栢木(台北); 海南: [檀梧], 吕宋楸荚; 广西: 大风脑、铁面将军(龙州), 将军树(鹿寨), 新妇木, 假桂, 野桂子; 四川: 香檀, 香桂树, 红果果, 鹅果树; 云南: “锅麦解”(傣语), 野荔枝, (玉溪), 菲律宾桐, 鸡尾树; 其他: 六年仔。

功效 根: 清热利湿。用于急性性痢疾, 咽喉肿痛; 果皮上腺体粉末: 驱虫。用于驱绦虫, 兼能驱蛲虫, 线虫; 叶: 有小毒。止血, 生肌。用于外伤出血, 疮疡溃烂。

#### 7136153

*Mallotus repandus* (Willd.) Muell. -Arg. var. *chrysocarpus* (Pamp.) S. M. Hwang --- *M. chrysocarpus* Pamp. --- *M. repandus* auct. non Muell. -Arg.

植物名 杠香藤《植分学报》

药材名 山龙眼(广西)、《汇编》

文献名 倒挂金钩、倒挂藤《名实图考》

地方名 毒鱼药(广西、云南), [钩藤茶](中南); 浙江: 六角枫藤(鄞县), 木贼枫藤(天目山), 万刺藤、犁头枫(金华), 石岩枫, 犁头柴(东阳); 安徽: 舒力起; 江西: 岩枫藤; 福建: 木本薤菜瘡(漳浦), 加吊藤(晋江), 木梗犁头尖(福州), 钓钩草(厦门), 马面草、狂狗藤(仙游); 台湾: 粪箕藤, [钩藤], 桶交藤; 湖北: 千香藤, 岩桐麻, 倒金钩; 湖南: 倒钩木, 假新妇木; 广东: 大力王、大角藤(阳春), 白檀香(乐昌), 鸡骨树(五华), 雌雄草(万山); 海南: 黄杓子(儋县), 糠大麻(保亭); 广西: 全筋藤(那坡), 青勾藤(龙州), 雨钩; 四川: 石岩桐, 青倒钩, 黄豆树, 野桐籽; 贵州: 倒钩藤, 防痧药。

功效 根、茎、叶: 祛风活络, 舒筋止痛。用于风湿性关节炎, 腰腿痛, 产后风瘫。外用于跌打损伤。

备考 《植分学报》(1985, 23(4): 297): 原变种“石岩枫”, 主要分布在亚洲东南至澳大利亚, 而分布在我国长江流域以南的当为本变种。

#### 7136154

*Mallotus stewardii* Merr. ex Metcalf --- *M. apelta* auct. non (Lour.) Muell. -Arg.

植物名 庐山野桐《浙江药植志》

地方名 白背娘(浙江、广西); 浙江: 山桐子(浙南、淳安), 白桐子(龙泉); 广东: 白朴树, 白泡树, 白面筒, 白膜树, 白帽顶, 白鹤树; 广西: 白吊粟, 野小米。

功效 根: 清热平肝, 收涩, 止血。用于慢性肝炎, 脾肿大, 白带, 化脓性中耳炎。外用于刀伤出血。

备考 有些文献将学名误订为 *Mallotus apelta* (Lour.) Muell. -Arg.

#### 7136155

*Mallotus tiliaefolius* (Blume) Muell. -Arg.

植物名 台湾野桐《台湾药植志》

地方名 台湾:台湾楸树。

功效 叶:用于头痛;新芽:外用于创伤。

#### 7136156

*Manihot esculenta* Crantz. --- *M. utilisissima* Pohl.

植物名 木薯《中国经植志》

文献名 参茨《种分》,树薯《台湾药植志》

地方名 台湾:薯树,树番薯;广东:苦木薯;海南:葛薯;广西:[山药];云南:“树薯改伞”、“商”、“蜜六”(傣语)。

功效 树皮:用于风湿;块根:清热解毒,杀虫。

#### 7136157

*Melanolepis multiglandulosa* (Reinw.) Reichb. f. et Zoll.

--- *Mallotus moluccanus* Muell. -Arg.

植物名 白冇树《台湾药植志》

药材名 白树仔《台湾药植志》

文献名 巴豆南《植物名汇》,虫屎《台湾药植志》

功效 根:祛风,利水消炎。用于下消,打伤。

#### 7136158

*Microdesmis casearifolia* Planch. --- *M. casearifolia*

Planch. f. *sinensis* Pax

植物名 小盘木《高植图鉴》

药材名 小盘木《广西药录》

文献名 枸骨《高植图鉴》,海南柑《云南药录》

地方名 海南:枸骨树。

功效 树汁:用于齿痛。

#### 7136159

*Pedilanthus tithymaloides* Poit.

植物名 红雀珊瑚《汇编》

文献名 珊瑚枝《生草药性备要》,扭曲草《广西本草选编》

地方名 拖鞋花(广东、广西);福建:刺钉草(诏安),狗咬痲(长泰),绿珊瑚(泉州);广东:洋珊瑚(广州);广西:百足草、百脚草、玉带根(南宁),止血草;云南:青竹标,“广好修”(傣语)。

功效 全草:有小毒。清热解毒,散瘀消肿,止血生肌。外用于跌打损伤,骨折,外伤出血,疖肿疮疡,眼结膜炎。

#### 7136160

*Phyllanthodendron anthopotamicus* (Hand.-Mazz.) Croiz.

植物名 叶珠木《广西药录》

文献名 珠子木(拉汉英种称)

地方名 广西:叶下花(马山)。

功效 全株:止痛。用于跌打损伤。

#### 7136161

*Phyllanthodendron hypoglaucum* Levl.

植物名 粉背叶珠木《广西药录》

功效 根:用于牙龈出血,痢疾,咽喉肿痛。

#### 7136162

*Phyllanthus cochinchinensis* (Lour.) Spreng.

植物名 越南叶下珠《海南植志》

地方名 乌蝇翼(广东、广西);广东:牙脓草,乌蝇串,石力,树乌蝇翼,紫力,紫灵树;广西:[狗脚迹](梧州);其他:乌蝇叶,苍蝇草。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于牙龈脓肿,哮喘。

#### 7136163

*Phyllanthus emblica* L.

植物名 余甘子《临海异物志》、《高植图鉴》

药材名 余甘子《唐本草》、《药典》

文献名 庵摩勒、余甘《唐本草》,〔橄榄〕《滇南本草》,庵摩落迦果、菴罗果《纲目》,油柑、丝叶《岭南采药录》,庵罗迦果《阳春县志》,望果《树分》,〔紫荆皮〕《品种论述》

地方名 油甘子(广东、广西),油甘(福建、云南);辽宁:〔土荆皮〕,〔土槿皮〕;福建:柚柑(莆田),粉甘(晋江),木本叶下珠;广东:山油柑、土油树(潮阳),油柑子,油柑子虫瘿,余甘子叶,余甘子根;广西:牛甘子、牛甘木(南宁),牛甘果(博白、南宁、乐业),牛甘嘴(北流),油甘木叶(梧州),喉甘子(苍梧),喉甘叶(柳江),鱼木果(岑溪),油柑木皮(陆川),后甘子,昂荆旦,麻甘腮;四川:橄榄子;云南:滇橄榄(文山),“麻项帮”(西双版纳傣名);西藏:“久如拉”、“觉肉拉”(藏名)。

功效 果实:清热凉血,消食健胃,生津止咳。用于血热血瘀,肝胆病,消化不良,腹痛,咳嗽,喉痛,咽干;根:清热解毒。用于高血压病;叶:利尿消肿,清热解毒,止痒。用于小便不利,水肿,皮肤痒,湿疹。

#### 7136164

*Phyllanthus flexuosus* (Sieb. et Zucc.) Muell. -Arg.

植物名 落萼叶下珠《植分学报》

文献名 曲枝叶下珠《西双版纳傣药志》,弯曲叶下珠《湖北植志》

地方名 广西:红鱼眼(上林),四眼根;云南:“河杆巴”(西双版纳傣名)。

功效 全株:用于过敏性皮疹,小儿夜啼;茎、叶:用于风湿。

#### 7136165

*Phyllanthus glaucus* Wall.

植物名 青灰叶下珠《高植图鉴》

功效 根:用于风湿性关节炎,小儿疳积。

#### 7136166

*Phyllanthus hainanensis* Merr.

植物名 海南叶下珠《海南植志》

文献名 海南余甘子《广西植录》,海南油柑《广西药录》

功效 全株:用于目赤肿痛,肝肿大。

#### 7136167

*Phyllanthus hookeri* Muell. -Arg. --- *P. tsarongensis* W. W. Smith

植物名 鳢下子《云南种录》

文献名 察瓦龙叶下珠《西藏植志》

功效 全草:用于尿道结石。

#### 7136168

*Phyllanthus matsumurae* Hayata --- *P. ussuriensis* Rupr. et Maxim.

植物名 蜜柑草《高植图鉴》

药材名 蜜柑草《汇编》

文献名 小蜜柑草、姬蜜柑草《牧野日图》, 东北油柑《东北草本植志》

地方名 珍珠菜(东北); 辽宁: 山丁草、铁蛋草; 陕西: 小夜关门、泻胆草(平利), 松树叶下珠、鱼眼草; 江苏: 苗子草(邳县), 菹棵棵; 广西: 夜关门(罗城), 密甘草。

功效 全草: 有小毒。清热利尿, 明目, 消积, 止泻, 利胆。用于小便失禁, 淋病, 黄疸型肝炎, 吐血, 痢疾。外用于外痔。

7136169

*Phyllanthus niruri* L.

植物名 珠子草《海南植志》

文献名 光叶下珠《种分》, 小返魂《台湾药植志》

地方名 [叶下珠](台湾、云南), 霸贝菜(海南、广西); 台湾: 小翻魂、鸭士珠、梗士珠, 小本乳仔草, 细本乳仔草, 白骨珠仔草; 海南: 霸贝叶; 广西: 杨间; 云南: 日开夜闭、月下红、珍珠花(红河)。

功效 全草: 清肝明目, 渗湿利水。用于小儿疳积, 角膜云翳, 结膜炎, 肾炎水肿, 尿路感染, 尿路结石, 肠炎腹泻, 菌痢, 肝炎, 感冒发热。外用于毒蛇咬伤。

7136170

*Phyllanthus reticulatus* Poir.

植物名 小果叶下珠《云南种录》

药材名 山兵豆(云南玉溪)、《汇编》

文献名 白仔《台湾药植志》, 龙眼睛《海南植志》

地方名 烂头钵(广东、广西); 广西: 红鱼眼, (通城虎)(北流)。

功效 根: 收敛, 消炎, 止泻。用于痢疾, 肠炎, 肠结核, 肝炎, 肾炎, 小儿疳积。

7136171

*Phyllanthus reticulatus* Poir. var. *glaber* Muell.-Arg.

植物名 无毛龙眼睛《广西药录》

地方名 广西: 红鱼眼(上林)。

功效 全株: 祛风活血, 散瘀消肿。用于风湿骨痛, 跌打损伤。

7136172

*Phyllanthus roeperianus* Wall. var. *parvifolius* Muell.

植物名 小叶叶下珠《西昌中草药》

地方名 四川: 地格蚤、一串珠(西昌)。

功效 全草: 清热散结, 消炎止痢。用于膀胱结石, 腹泻。

7136173

*Phyllanthus urinaria* L.

植物名 叶下珠《高植图鉴》

药材名 叶下珠《名实图考》、《汇编》

文献名 地槐菜、小虫儿麦《救荒本草》, 日开夜闭、十字珍珠草、珍珠草《生草药性备要》, 阴阳草、假油柑《临证指南》, 真珠草《纲目拾遗》

地方名 夜合草(江西、福建、广东), 叶下珍珠(江西、广西), 叶后珠(江西、湖南、广东、广西、四川), 日开夜合(江西、广东), 老鸦珠(安徽、湖南、福建), 鱼鳞草(江苏、安徽), 龙珠草(湖南、福建), 珠子草(台湾、广东), 油柑草(福建、广东); 陕西: 关门草(紫阳); 浙江: 粟杨梅、杨梅珠草(临安), 疳积草, 鲜血草(天目山); 安徽: 叶后球; 江西: 叶底珠(婺源), 小叶松, [鬼见愁], 珍珠菜; 福建: 小礼草、乌鸦草(泉州), 大叶苍蝇翅(清流), 乳瘤草(邵武), 柑子草(龙岩), 夜合、地槐花、故芷、夜盲草、矮脚珠、暇油草(罗源), 野麻株(三明); 台湾: 红背崎层珠子草; 湖北: 红荻树, 萆其草(松滋); 湖南: 细叶珍珠; 广东: 下仔柑、应合树(广宁、四会、德庆、封开、怀集), 小里草(揭阳、普宁), 午时合、[含羞草](揭阳), 田青仔、田油柑(南澳), 多仔金(东莞、博罗、增城), 卑贝蛇、婆婆窠、鲫鱼草(广州), 胡羞羞(梅县), 姆仔金(电白、阳江、阳春), 铺地金(罗定、乐昌), 企枝叶下珠(潮安、潮州), 仔背仔(阳春), 痹背甘, 夜合树; 海南: 红珍珠草(海口、定安、屯昌、澄迈、文昌); 广西: 小利柑、落地油柑、佩背柑(陆川), 小喉柑(南宁、梧州), 了背柑, [仙桃草]、鱼蛋草、咪背柑(平南), 水牛柑(玉林), 地牛柑(贵县), 仔背金(北海), 了带柑, 咪使忌, 头耙珠(合浦); 四川: 三节剑(成都), 地麻桑(重庆), 夜合珍珠, 夜关门(峨眉山); 贵州: 塔地沙(荔波), 山皂角; 云南: “牙海巴”(西双版纳傣语)。

功效 全草: 清热利尿, 明目, 消积。用于肾炎水肿, 泌尿系感染, 尿路结石, 肠炎, 痢疾, 小儿疳积, 眼结膜炎, 黄疸型肝炎。外用于青竹蛇咬伤。

7136174

*Phyllanthus virgatus* Forst. f. --- *P. simplex* Retz.

植物名 黄珠子草《海南植志》

药材名 黄珠子草《广西中药志》

文献名 单生叶下珠《湖北植志》, 单叶下珠《台湾药植志》

地方名 珍珠草(广东、广西); 广东: 小里草(普宁), 午时合、[含羞草](揭阳), 叶后珠、田油柑、田青仔(南澳), 龙珠草、企枝叶下珠(潮安), 假油柑(潮汕), 老鸦珠(广州); 广西: 天打落(博白), 日开夜闭、鱼骨草(南宁), 地珍珠(玉林), 假芋(龙州), 田基疳, 乳痈根, 蚊蝇叶, 真珠草; 云南: 叶下珠。

功效 全草: 清热散结, 健胃消积。用于小儿疳积, 乳腺炎。

7136175

*Ricinus communis* L.

植物名 蓖麻《唐本草》、《高植图鉴》

药材名 蓖麻子《唐本草》、《药典》, 蓖麻油《药典》

文献名 蓖麻子《雷公炮炙论》, 明州蓖麻《大观本草》, 蓖麻仁《圣济总录》, 远近子、脾麻子《新纲》, 蜀芥、胡芥《和汉药植》, 红麻《中草药学》, 草麻《中药志》, 红大麻子《药材学》

地方名 大麻子(东北、安徽、河南、广西), 老麻子(陕西、甘肃、宁夏), 红蓖(湖南、广西), 红蓖麻(福建、台湾、广西、云南), 金豆(上海、安徽、湖北); 辽宁: 毕麻

子(营口),黑麻子(辽阳);北京:大麻子;山西:滨麻子;内蒙古:“丹日哈”(蒙名);山东:八门子、扁扁子(烟台),八麻子;江苏:洋黄豆;安徽:麻子;江西:草麻(奉新),千斤吊(景德镇),千斤拔(德兴);福建:牛蒡,牛蒡子(南平、福州),杜麻(厦门),杜蒡(厦门、同安、晋江),牛蒡子草,红骨丁度;台湾:红土蒡,红都蒡;湖南:润肠(虎陵);海南:草麻树;广西:山蒡麻(玉林),红蒡麻子(来宾),红蒡麻叶(凤山、柳江),蒡麻木(平南),蒡麻风(苍梧),蒡麻树(贵县、南丹);云南:天麻子果(临沧),红天麻子(红河),“麻烘娘”(西双版纳傣名);西藏:“探恩察”(藏名);其他:黄麻子,唐胡麻。

**功效** 种子:有毒。消肿拔毒,泻下通滞。用于痈疽肿毒,喉痹,瘰癧,大便燥结;叶:有小毒。消肿拔毒,止痒。外用于疮痈肿毒,湿疹瘙痒,灭蛆,杀子丁;根:祛风活血,止痛镇静。用于风湿关节痛,破伤风,癰疽,精神分裂症;种子脂肪油(蒡麻油):刺激性泻药。用于导泻。

## 7136176

*Sapium baccatum* Roxb.

**植物名** 浆果乌柏《云南种录》

**地方名** 云南:“埋西哩藤”(西双版纳傣名)。

**功效** 根:用于消化不良,食积腹泻,月经不调,体弱消瘦,畏寒怕冷。

## 7136177

*Sapium chihsinianum* S. Lee

**植物名** 济新乌柏《广西药录》

**功效** 根:解毒,止痒。用于毒蛇咬伤,湿疹,皮炎。

## 7136178

*Sapium discolor* (Champ.) Muell.-Arg.

**植物名** 山乌柏《高植图鉴》

**药材名** 山乌柏《汇编》

**文献名** 山榔《树分》,山柳乌柏《海南植志》,红叶乌柏《高植图鉴》

**地方名** 浙江:山柏子,野乌柏;台湾:山柏,有拱,白柏,柏仔;广东:红心虹、红心郎(潮阳),红莲红柏(广州);海南:红莲乌柏,红叶乌柏,红心乌柏,强树(文昌、琼海);广西:木通儿(平南),千里马、红丝线(苍梧),公乌柏(桂平),红乌柏(玉林、北流、博白、陆川),红乌柏木(龙州),木木独脚红乌柏,虹树,腊树;云南:柏子。

**功效** 根皮、树皮:有小毒。泻下逐水,散瘀消肿。用于肾炎水肿,肝硬化腹水,大小便不通;叶:外用子跌打肿痛,毒蛇咬伤,过敏性皮炎,湿疹,带状疱疹。

## 7136179

*Sapium eugeniaefolium* Bach.-Ham.

**植物名** 云南乌柏《云南种录》

**文献名** 云南柏木《药植简编》

**功效** 根皮:有毒。泻下逐水,利尿消肿;种子:杀虫,利水,通便;叶:用于痈肿,疔疮,脚癣,湿疹,蛇伤,阴道炎;种皮外白蜡:用于手足皲裂。

## 7136180

*Sapium japonicum* (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm. ---

*Excoecaria japonica* (Sieb. et Zucc.) Muell.-Arg.

**植物名** 白木乌柏《高植图鉴》

**药材名** 白乳木《浙江药植志》

**文献名** 山乌柏《科种》

**地方名** 三角子(江西、湖北),猛树(陕西、广东);陕西:野蒡麻(商洛);浙江:山柳,白木,银栗子(临安);江西:〔猛子〕;湖南:〔山茶叶〕,猴子打鼓。

**功效** 根皮、叶:散瘀,消肿,利尿。用于腰部劳伤酸痛;果:用于小儿消化不良;鲜叶:外用干漆疮。

## 7136181

*Sapium rotundifolium* Hemsl.

**植物名** 圆叶乌柏《高植图鉴》

**文献名** 圆山乌柏《树分》

**地方名** 广西:圆乌柏木(凌云),妹姑(那坡),山乌柏;云南:红叶树,〔雁来红〕。

**功效** 根皮:解毒,利便。用于头风痛,毒蛇咬伤;叶、果:外用于痈疮肿毒,湿疹,毒蛇咬伤。

## 7136182

*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.

**植物名** 乌柏《高植图鉴》

**药材名** 乌柏《唐本草》、《汇编》

**文献名** 柏、乌白木《唐本草》,乌柏子《本草拾遗》,鸡白、鸦白、乌白、乌柏木《纲目》,卷根白皮《草木便方》,木子树《名实图考》,柜柳《花镜》,卷子叶、卷子根《分类草药性》,乌茶子《天宝本草》,乌白树、了血、榔、柏安树《植物名汇》,白白树《土农药志》

**地方名** 木梓(安徽、江西、福建、湖北),柏子树(陕西、浙江、广西、四川),木油树(湖南、贵州),蜡子树(浙江、福建、湖南、广东、广西、云南),乌柏树(江苏、安徽、广东),木腊树(陕西、河南、湖南、贵州),卷子(湖北、四川),虹树(福建、广东),琼仔(福建、台湾),白乌柏、虹叶、乌乔(广东、广西),卷子树(四川、云南),油子树(河南、湖南),木梓树(江西、湖北),红心郎(广东、云南),乌果树(江苏、云南),柏树(陕西、上海);陕西:白乳木,野蒡麻(商洛),模子树;甘肃:圈子(文县);江苏:极树(如东),乌油(高淳),白蜡树、桐油树(连云港);上海:按丫子树;浙江:皂子树(兰溪),琼树;安徽:柏白蜡,油梓树,乌金树,乌杞子树,皮油树,构油树;江西:棋子树(婺源);福建:蜡烛树(永安),柏柴(福鼎、宁德、福安、南平、沙县);台湾:柏仔,柏仔树,拱仔;河南:构腊树,血血木,柏柏木,黑叶子树;湖北:明卷(利川),明枪,乌柏根皮;湖南:乌油木(长沙),乌油子树(衡山),乌树果,枯焦木(溆浦),枯皮木、枯柏树(黔阳),姑球树、〔赶山鞭〕(新宁);广东:百芷乌柏(广宁、四会、德庆、封开),乌柏蕈(顺德),栝白树(阳春),红心扶勾烟、扶勾树心(五华),虹仔树(普宁、陆丰),矮菱(东莞),乌柏根(广州),白心虹、虹根(潮阳),白莲乌柏(惠阳),虹逃(普宁),油仔叶,红苑布球;广西:红乌柏(富川、贵县),红苗乌柏叶(来宾),红姑画(昭平),苦柏木(乐业),鸭脚木(苍梧),鸭脚儿、柏木树(桂林),捉山虎(北海),棺材树;四川:乌白根,卷子树根,犍子树;贵州:卷子油树,柏子油树,枳子树,钻子树;云南:白蜡果树(红河),

槭白树(文山), 棕树; 其他: 花子。

功效 种子: 杀虫, 利水, 通便。用于疥疮, 湿疹, 皮肤皲裂, 水肿, 便秘; 叶: 用于痈肿疔疮, 疮疥, 脚癣, 湿疹, 蛇伤, 阴道炎; 根皮: 有毒。利水, 消积, 杀虫, 解毒。用于水肿, 腹胀, 瘰癧, 二便不利, 湿疹, 疔毒。

#### 7136183

*Sauropus changianus* S. Y. Hu

植物名 龙俐叶《中草药学》

药材名 龙俐叶《药典》

文献名 龙俐叶《岭南采药录》

地方名 广东: 龙俐叶(清远、广州), 龙舌叶(湛江), 牛耳叶(惠阳); 广西: 龙俐叶花(南宁)。

功效 叶: 润肺止咳; 花: 用于咯血。

备考 龙俐叶的学名,《汇编》用 *S. rostrata* Miq.《广西药录》(1986)用 *S. spatulifolium* Beille.

#### 7136184

*Sauropus quadrangularis* (Willd.) Muell. -Arg.

植物名 细叶守宫木《广西药录》

功效 全草: 用于毒蛇咬伤。

#### 7136185

*Sebastiania chamaelea* (L.) Muell. -Arg. --- *S. chamaelea* (L.) Muell. -Arg. var. *aspenscocca* Pax et Hoffm.

植物名 地杨桃《高植图鉴》

文献名 荔枝草《药植简编》, 色柏草《高植图鉴》, 色巴木《广西药录》

地方名 海南: 坡荔枝(崖县)。

功效 全株: 用于美尼尔氏综合征; 树汁: 收敛, 强壮。

#### 7136186

*Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd. --- *S. ramiflora* Muell. -Arg.

植物名 叶底珠《高植图鉴》

药材名 叶底珠《汇编》

文献名 一叶萩《浙江天目药志》, 山扫条《简明中医辞典》

地方名 花扫条(辽宁、甘肃), 狗舌条(东北、内蒙古、甘肃), 狗舌条(东北、湖南); 黑龙江: 花帚条、花楔子(哈尔滨); 吉林: 山帚条条, 山帚条; 辽宁: 小粒高, 横子, 粉条; 内蒙古: “淖海-音-察义日麻”、“诺亥音-色古日”(蒙名); 山东: 山花(滕县), 老鼠芽、马扫帚芽(崂山), 红根扫帚(昆崙山), 脆条子棵、毒羊(长清); 浙江: 八颗叶下珠(天目山), 大鲤鱼馊子(临安), 叶下珠(余姚); 安徽: 小孩拳(琅琊山); 台湾: 市葱、刺葱; 广西: 老米饭(桂林); 其他: 假金柑藤, 白苕条。

功效 叶、花、根: 有毒。祛风活血, 补肾强筋。用于面神经麻痹, 小儿麻痹后遗症, 眩晕, 耳聋, 神经衰弱, 嗜睡症, 阳痿等。

#### 7136187

*Securinega virosa* (Roxb. ex Willd.) Baill.

植物名 白饭树《广西药录》

地方名 广西: 白鱼眼(上林)。

功效 全株: 杀虫止痒。用于湿疹, 脓疱疮。

#### 7136188

*Speranskia cantoniensis* (Hance) Pax et Hoffm.

植物名 瘤果地构叶《汇编》

药材名 蛋不老(四川)、《汇编》

文献名 地构菜《植物名汇》, 广东地构叶《广西植录》, 地构叶《云南种录》, 华南地构叶《湖北植志》, 黄鸡蛋《药植简编》

地方名 湖南: 四季风(衡阳), 黄鸡蛋(郴县), 矮五甲; 四川: 白花蛋不老, 地胡椒; 广西: 六月雪(临桂), 仁砂草(全州)。

功效 全草: 祛风去湿, 活血调经, 止痛。用于感冒, 虚劳咳嗽, 淋巴结结核, 风湿性关节炎, 坐骨神经痛, 跌打损伤, 月经不调, 白带。

#### 7136189

*Speranskia tuberculata* (Bunge) Baill. --- *S. pekinensis* Pax. et Hoffm.

植物名 地构叶《高植图鉴》

药材名 透骨草《本草原始》、《品种论述》

文献名 疣果地构叶《秦岭植志》, 地构菜、瘤果地构菜、地海透骨草《中国经植志》, 疣果地构菜《甘肃中草》, 北京地构叶《陕甘宁植志》, 珍珠透骨草《中药志》

地方名 内蒙古: “布特黑图-乌布斯”、“铁梅达兰图鲁”、“琴娃音-好日”(蒙名), 竹圪叉, 断肠草, 追风草, 气死丈夫追风草; 甘肃: 铁线草; 新疆: 台格来; 山东: 硬苗透骨草; 河南: 来马回。

功效 全株: 散风祛湿, 解毒止痛。用于风湿关节痛。外用于疮疡肿毒。

#### 7136190

*Strophoblachia fimbriatylx* Boerl.

植物名 宿萼木《高植图鉴》

文献名 腺萼木《植分学报》, 缝萼木《广西植录》, 施巴蜡《海南植志》

地方名 广西: 兀达(龙州)。

功效 叶: 用于疥疮。

#### 7136191

*Trewia nudiflora* L.

植物名 滑桃树《高植图鉴》

文献名 马屎子《高植图鉴》

地方名 海南: 苦皮树(澄迈); 广西: 红背叶。

功效 叶: 用于疥癣; 种子: 美登素类抗癌成分含量较高。

#### 7136192

*Trigonostemon lutescens* Y. T. Chang et J. K. Liang

植物名 红花三宝木《广西药录》

功效 根: 用于风湿骨痛。

#### 7136193

*Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy-Shaw --- *Aleurites fordii* Hemsl. --- *Dryandra oleifera* Wall.

植物名 油桐《高植图鉴》

药材名 油桐《品汇精要》、《四川中药志》

文献名 罌子桐、虎子桐《本草拾遗》, 桐油《日华子本草》, 荏桐《本草衍义》, 油桐子、桐子《纲目》, 桐子树

叶、桐子树根《草木便方》，桐油树茎、桐油树子《岭南采药录》，气桐子《分类草药性》，小桐树《植物名汇》，木油树《中国植物图鉴》

地方名 三年桐(浙江、广东、云南)，光桐(福建、广西)，桐树(陕西、广西)，桐子树(陕西、浙江、安徽、江西、福建、台湾、河南、湖南、四川、云南)；陕西：木油桐(南郑)；江苏：油桐树；浙江：百年桐，五年桐；福建：洋桐(龙海)，油桐果；湖南：糍粑桐；四川：高桐子(成都)，气死桐子、桐子花(重庆)；贵州：油桐树根；云南：桐油树、木海桐(红河)；其他：千年桐，光面桐。

功效 根：清积，驱虫，祛风湿。用于蛔虫病，食积腹胀，风湿筋骨疼，湿气水肿；叶：解毒，杀虫。外用于疮疡，癣疥；花：清热解毒，生肌。外用于烧、烫伤。

#### 7136194

*Vernicia montana* Lour. --- *Aleurites montana* (Lour.) Wils.

植物名 皱桐《广西植录》

药材名 木油桐《高植图鉴》

文献名 千年桐《药植简编》，广东油桐《台湾药植志》

地方名 木油树、桐油树(广东、广西)，山桐(江西、广东)；浙江：五爪桐，高桐；江西：鸡麻桐；福建：花桐；台湾：桐油；广东：桐油根；广西：桐油水浆(北流)，皱面桐，桐树，皱果桐；四川：桐子树。

功效 桐油：用于风痰喉痹，疥癣，肿毒，烫火伤；根：用于瘰癧，哮喘，癫狂，白浊，疮疖；种子：有毒。用于瘰癧，解鸦片烟毒。

### 7136a 虎皮楠科 *Daphniphyllaceae*

#### 7136a01

*Daphniphyllum calycinum* Benth.

植物名 牛耳枫《中国植志》

药材名 牛耳枫《汇编》

文献名 南岭虎皮楠《树分》，牛耳铃《广西中药志》，羊屎子《中药材手册》，假楠木、猪颌木《中药大辞典》

地方名 福建：老鼠莓(同安)；湖南：大卵泡；广东：大脚板、大耳梳、千打锤、牛虱麻、牛俐廉、尿桶板、细叶冬青、糖瓜叶(粤北)，老虎耳；广西：〔土鸦胆子〕，红牛耳枫(玉林)，中耳木叶(富川)，假鸦胆子(北流、武鸣、邕宁)，〔鸦胆子〕(邕宁)，土鸦胆、鸦胆木(忻城)，沙塘木(陆川)，猪龙木(北流)，猪肚木(梧州、贵县)，猪儿木、山猪肚(平南)，猪肚根(宾林)，猪落树(贺县)，白猪介(苍梧)，大东风(贵县)，收水叶、浪公(临桂)，大罗伞(桂林)，牛耳风，猪耳风，猪络木，土鸦胆子，猪肚子。

功效 根、叶：有毒。清热解毒，活血舒筋。用于感冒发热，扁桃体炎，风湿关节痛，跌打肿痛，骨折，毒蛇咬伤，疮疡肿毒；果实：用于慢性痢疾。

#### 7136a02

*Daphniphyllum longistylum* S. S. Chien

植物名 长柱虎皮楠《中国植志》

文献名 广西虎皮楠《神农架药录》

地方名 湖北：大艳山红(神农架)。

功效 根皮：理气止痛。用于胃肠病。

#### 7136a03

*Daphniphyllum macropodum* Miq. --- *D. membranaceum* Hayata

植物名 交让木《中国植志》

药材名 交让木《汇编》

文献名 膜叶交让木、膜叶虎皮楠《高植图鉴》

地方名 浙江：画眉珠(临安)；湖北：女儿红、青叶子树(鹤峰)，山黄树、碱叶树子、水红树(建始)；广东：豆腐头；四川：枸血子，枸色子，水红朴。

功效 种子及叶：消肿拔毒，杀虫。用于疮疖肿毒。

#### 7136a04

*Daphniphyllum oldhami* (Hemsl.) Rosenth. --- *D. pentandrum* Hayata var. *oldhami* (Hemsl.) Hurusawa --- *D. glaucescens* auct. non Blume --- *D. glaucescens* var. *oldhamii* Hemsley

植物名 虎皮楠《中国植志》

药材名 虎皮楠《汇编》

文献名 南宁虎皮楠、四川虎皮楠《树分》，奥氏虎皮楠《台湾药植志》

地方名 广西：猪络木。

功效 根、叶：清热解毒，活血散瘀。用于感冒发热，扁桃体炎，脾脏肿大，毒蛇咬伤，骨折；种子：用于疮疖肿毒。

#### 7136a05

*Daphniphyllum paxianum* Rosenth.

植物名 脉叶虎皮楠《中国植志》

药材名 土杠果(海南)

文献名 峨眉虎皮楠《树分》，海南虎皮楠《海南植志》，显脉虎皮楠《植分学报》

功效 根、叶：清热解毒，活血散瘀。用于感冒发热，扁桃体炎，脾脏肿大，毒蛇咬伤，骨折。

### 7143 蔷薇科 *Rosaceae*

7143001 见 7143005a

7143002 见 7143005b

#### 7143003

*Agrimonia coreana* Nakai --- *A. pilosa* Ledeb. var. *coreana* (Nakai) Liou et Cheng

植物名 托叶龙芽草《中国植志》

药材名 朝鲜仙鹤草(拟)

文献名 大托叶龙芽草《东检》，朝鲜龙芽草《长白山植药志》

功效 全草或根茎：收敛止血，补血。

#### 7143004

*Agrimonia eupatoria* L. subsp. *asiatica* (Juzep.) Skalicky --- *A. asiatica* Juzep.

植物名 大花龙芽草《中国植志》

药材名 新疆仙鹤草(拟)

文献名 亚洲龙芽草《中药大辞典》

地方名 新疆：新疆龙芽草。



功效 全草;收敛止血。

#### 7143005

*Agrimonia nipponica* Koidz. var. *occidentalis* Skalicky

植物名 小花龙芽草《中国植志》

药材名 小花仙鹤草(拟)

地方名 贵州:仙鹤草。

功效 全草;收敛止血,补血。用于咯血,吐血,尿血,血痢。

#### 7143005a

*Agrimonia pilosa* Ledeb. --- *Agrimonia viscidula* Bunge  
--- *A. pilosa* Ledeb. var. *viscidula* Kom. --- *A. pilosa*  
Ledeb. var. *japonica* (Miq.) Nakai --- *A. pilosa* Ledeb.  
f. *davurica* (Willd.) Nakai

植物名 龙芽草《救荒本草》、《中国植志》

药材名 仙鹤草《伪药条辨》、《药典》,鹤草芽《药典》

文献名 狼牙、牙子《本经》,狼齿、支兰、犬牙、抱牙《吴普本草》,施州龙芽草《图经》,瓜香草《救荒本草》,黄尾龙《滇南本草》,石打穿、金顶龙芽《纲目拾遗》,铁胡蜂《百草镜》,老鹤嘴、毛脚茵、子母草《名实图考》,龙头草、寸八节《分类草药性》,黄龙芽、杰里花、《地椒》、《黄花草》,蛇花、线麻子花、癩茨草《植物名汇》,牛牛儿、风露草、神舆草《新纲》,《过路黄》、毛脚鸡《天宝本草》,脱力草《滇南本草图谱》,腺枝龙芽草、多齿龙芽草、金线龙芽草《东北药植志》

地方名 蛇倒退(湖南、云南),蛇疙瘩、龙眼草(湖南、四川),金顶龙芽草(浙江、福建、云南),子不离母(安徽、江西),黄牛尾(东北地区、江苏、山东),牛尾草(东北地区、台湾),狼牙草(辽宁、黑龙江);吉林:地烟烟;黑龙江:地仙草(哈尔滨);内蒙古:“陶古菇·乌布斯”、“冬布察决”(蒙名);陕西:路连黄;山东:鹿鹤草、粘牛尾巴草(烟台),小苍子,念骨朵子(蓬莱、牙山),括头篦子(蒙山),群兰败毒草;江苏:草郎子(连云港、云台山),万肿消、产后草(盱眙),黄牛尾巴(邳县),白牙蒿(连云港),野麦草(句容);浙江:金鸡咀壳,龙牙肾,地洞风,九龙牙,金仙公,土川连,毛仙鹤草,地黄蜂,肾草,金花公;安徽:劳力草,毛公鸡腿,拦路虎,黄花疳积草,龙头凤尾草;江西:土牛七、土牛膝、土柴胡(大余),父子草,毛鸡草,金鸡抱蛋(吉水),《血见愁》、大叶夹食草(泰和);福建:泻痢草,异风颈草,黄花子草(永春、大田、周宁、泉州),毒碧状草(周宁、松溪、政和),大叶隔食草(宁化),黄金鞭(泉州),龙牙头、杜碧湊、《七叶莲》(南平),龙根,龙头叶,山禾瑞,屎屁草,金部叶,《龙舌兰》,黄金边,隔食草,龙眼珠,矮脚台,日头黄,龙眼草,龙岩草,《五爪龙》,葫芦泡,蛆草,山昆菜,寒沙草,《飞扬草》,《五爪金龙》;河南:猴头草;湖北:散寒珠(神农架);湖南:路边枝(嘉禾),路边鸡、雀儿脑、毛鸡腿、毛脚英(衡阳),毛将军、瓜黄草(永顺),呆鹰翅(衡山),毛鸡根、九乐营(郴县),五蹄风、虎耳草、苦牙草(绥宁),牛头草(花垣),龙书草(东安),鸡爪沙、铁马鞭(新邵),土芦风(浏阳);广西:草屈头鸡(北流),毛龙须连(鹿寨),《龙须草》、大鹰爪(梧州),《益母草》(陆川),《马连鞍》(那坡),《黄胆草》(贵县),雾水草,沙扭儿(苍梧),

老鹰爪,大痧(西昌),蛇结包、《鬼见愁》、箭头草、地罗盘、瘦狗还阳、地草、黄龙草、鬼剑头(峨眉);云南:毛龙芽草,马灵安。

功效 地上部分:收敛止血,截疟,止痢,解毒。用于咳血,吐血,崩漏下血,疟疾,血痢,脱力劳伤,痈肿疮毒,阴痒带下;地下冬芽(鹤草芽):驱虫。

#### 7143005b

*Agrimonia pilosa* Ledeb. var. *nepalensis* (D. Don) Nakai  
--- *A. nepalensis* D. Don

植物名 黄龙尾《中国植志》

药材名 黄龙尾《滇南本草》、《品种论述》

文献名 绒毛龙牙草《汇编》,尼泊尔龙牙草《药植简编》,粘龙芽草、龙芽草《云南种录》

地方名 仙鹤草(湖北、云南);云南:石打穿,子母草,刀砍药、马连鞍(文山),水消食(保山),毛足鸡(昆明),斗私草(大理)。

功效 全草:收敛止血。

#### 7143006

*Alchemilla japonica* Nakai et Hara

植物名 羽衣草《中国植志》

文献名 斗蓬草《种称》

功效 全草:收敛,消炎。用于月经过多,外伤。

#### 7143007

*Amelanchier asiatica* (Sieb. et Zucc.) Endl. ex Walp.

植物名 东亚唐棣《中国植志》

功效 树皮:有小毒。益肾,散瘀,止痛。用于肾虚白带,跌打瘀痛。

#### 7143008

*Amelanchier sinica* (Schneid.) Chun

植物名 唐棣《尔雅》、《中国植志》

地方名 红栒子(陕西、河南);陕西:栒子木(略阳)。

功效 树皮:有小毒。去瘀止痛。

备考 李时珍认为《尔雅》之唐棣即《本草拾遗》之扶移,《古今注》之移扬。按崔豹曰:“移扬江东呼为夫移,圆叶弱蒂”。陈藏器曰“扶移木…花反而后合”,按唐棣叶非圆形,花并无反而后合的特征,《纲目》合为一条,恐欠妥当。

#### 7143009

*Amygdalus communis* L. --- *Prunus amygdalus* Batsch ---

*P. communis* Fritsch

植物名 扁桃《中国植志》

药材名 巴旦杏仁《纲目》、《中药大辞典》

文献名 扁桃、婆娑树《酉阳杂俎》,八担仁《饮膳正要》,巴旦杏、八担杏《授时通考》,偏核桃、匾桃、忽鹿麻《纲目》,巴达杏仁《本草通玄》,叭达杏仁《要药分剂》,苦扁桃、苦巴旦杏、《苦杏仁》(叶《生药》),京杏《中药大辞典》

功效 种子:润肺,止咳,化痰,下气。用于虚劳咳嗽,心腹逆闷。

#### 7143010

*Amygdalus communis* L. var. *amara* Ludwig ex DC. ---

*Prunus amygdalus* Batsch var. *amara* (DC.) Focke

植物名 苦味扁桃《中国植志》  
 药材名 苦巴旦杏仁(拟)  
 文献名 巴旦杏仁《纲目》, 苦巴旦杏《中药大辞典》, 巴达杏仁、叭哒杏仁《简明中医辞典》  
 功效 种子: 润肺, 止咳, 化痰, 下气。

## 7143011

*Amygdalus communis* L. var. *dulcis* Borkh.

植物名 甜味扁桃《中国植志》  
 药材名 甜巴旦杏仁(拟)  
 文献名 巴旦杏仁《纲目》, 甜扁桃、甘扁桃、〔甜杏仁〕(叶《生药》), 甜巴旦杏《中药大辞典》, 巴达杏仁、叭哒杏仁《简明中医辞典》  
 功效 种子: 润肺, 止咳, 化痰, 下气。

## 7143012

*Amygdalus davidiana* (Carr.) C. de Vos ex Henry --- *Prunus davidiana* (Carr.) Franch.

植物名 山桃《尔雅》、《中国植志》  
 药材名 桃仁《药典》  
 文献名 胡桃《尔雅》, 山毛桃《内蒙古中草药》, 辽桃《中国植物图鉴》, 毛桃树《树分》, 瘪桃干、桃奴、阴桃子《简明中医辞典》, 桃核仁《常用中药名辨》, 山桃仁《药典》

地方名 野桃(山西、河南、湖南、四川), 花桃(山西、山东、贵州); 内蒙古: “桃日-音-楚莫”、“哲日勒格-陶古日”(蒙名), 普通桃。

功效 种子: 有小毒。破血行瘀, 润燥滑肠; 种子: 活血祛瘀, 润肠通便。用于经闭, 癥瘕痞块, 跌扑损伤, 肠燥便秘。

## 7143013

*Amygdalus kansuensis* (Rehd.) Skeels --- *Prunus kansuensis* Rehd.

植物名 甘肃桃《中国植志》  
 地方名 陕西: 野桃、毛桃(太白山)。  
 功效 种子: 有小毒。破血行瘀, 润燥滑肠。

## 7143014

*Amygdalus mira* (Koehne) Yu et Lu --- *Prunus mira* Koehne

植物名 光核桃《中国植志》  
 药材名 藏桃仁(拟)  
 文献名 藏桃《汇编》  
 地方名 西藏: 西藏桃  
 功效 西藏地区亦以其种子作桃仁入药。种子: 活血, 祛瘀, 润肠。

## 7143015

*Amygdalus mongolica* (Maxim.) Ricker --- *Prunus mongolica* Maxim.

植物名 蒙古扁桃《中国植志》  
 文献名 山桃《汇编》, 布依里斯《沙漠药植》  
 地方名 内蒙古: 蒙古山樱桃, 山豆子, (郁李仁), 大李仁, 山樱桃, 土豆子, “乌兰-布衣勒斯”(蒙名)。  
 功效 种子: 润肠通便, 止咳化痰。用于咽喉干燥, 干咳及气管炎, 阴虚便秘。

## 7143016

*Amygdalus nana* L. --- *Prunus nana* (L.) Stokes

植物名 矮扁桃《中国植志》  
 功效 种子: 含苦扁桃油。润肠通便, 止咳化痰。

## 7143017

*Amygdalus pedunculata* Pail. --- *Prunus pedunculata* (Pail.) Maxim.

植物名 长梗扁桃《中国植志》  
 药材名 大李仁《鉴别手册》  
 文献名 柄扁桃《汇编》, 长柄扁桃《中国果树分类学》, 郁李仁《药典》  
 地方名 内蒙古: “贝拉荣”、“布衣勒斯”(蒙名), 山樱桃, 山豆子, 山樱桃仁。

功效 核仁: 润燥滑肠, 下气, 利水。用于津枯肠燥, 食积气滞, 腹胀便秘, 水肿, 脚气, 小便不利。

## 7143018

*Amygdalus persica* L. --- *Prunus persica* (L.) Batsch --- *Persica vulgaris* Mill. --- *Prunus persica* var. *vulgaris* Maxim.

植物名 桃《诗经》、《中国植志》  
 药材名 桃仁《本草经集注》、《药典》  
 文献名 旄《尔雅》, 桃核人、桃朵、桃花、桃毛、桃囊《本经》, 桃奴、泉景《别录》, 桃皮《本草经集注》, 鬼髑髅《雷公炮炙论》, 干桃、桃树皮《圣惠方》, 气桃《草木便方》, 桃白皮《图经》, 桃子《日用本草》, 大黄桃、小金利核桃、尖嘴桃、〔金弹子〕、毛桃《滇南本草》, 桃枝《纲目》, 阴桃子《分类草药性》, 碧桃干《饮片新参》, 脱核仁《和汉药物》, 瘪桃干《中药志》, 秋蜜桃《科裁》, 桃树《岭南草药志》, 大桃仁《中草药学》, 桃干《现代实用中药》

地方名 花桃(山西、江西), 白桃(青海、浙江); 内蒙古: “陶古日”(蒙名); 青海: “康布热下”(藏名); 江苏: 碧桃奴(苏州); 浙江: 野桃; 台湾: 桃仔, 苦桃, 苦桃叶; 广西: 桃子木(玉林、博白), 红桃, 桃子树; 四川: 毛桃仁, 气桃子; 云南: “麻晃”(西双版纳傣语), 毛矢桃; 其他: 小桃奴, 光桃仁, 单桃仁。

功效 种子: 活血祛瘀, 润肠通便。用于经闭, 痛经, 癥瘕痞块, 跌扑损伤, 肠燥便秘。

## 7143019

*Amygdalus triloba* (Lindl.) Ricker --- *Prunus triloba* Lindl.

植物名 榆叶梅《几辅旧志》、《中国植志》  
 药材名 大李仁(东北)  
 文献名 兰枝、鸾枝梅《山东树木志》  
 地方名 内蒙古: “额勒伯特-其其格”(蒙名); 江苏: 榆梅(南京)。  
 功效 种子: 缓泻, 利尿。

## 7143020

*Amygdalus triloba* (Lindl.) Ricker var. *truncata* --- *Prunus triloba* var. *truncata* Kom. --- *Cerasus triloba* (Lindl.) Bar. et Liou var. *truncata* (Kom.) Bar. et Lour.

植物名 截叶榆叶梅《中国树木志》

药材名 大杏仁《鉴别手册》  
地方名 辽宁:大郁李仁、李仁(海城)。  
功效 种仁:缓泻,利尿。

## 7143021

*Armeniaca mandshurica* (Maxim.) Skv. --- *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne

植物名 东北杏《中国植志》  
药材名 苦杏仁《药典》  
文献名 辽杏、狗杏《植分学报》,华北杏《药植简编》  
地方名 杏仁(东北);内蒙古:“哈木布塞古”(蒙名);辽宁:山杏。

功效 种子:有小毒。降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,血虚津枯,肠燥便秘。

## 7143022

*Armeniaca mume* Sieb. --- *Prunus mume* Sieb. et Zucc.

植物名 梅《诗经》、《中国植志》  
药材名 乌梅《本草经集注》、《汇编》,梅花《药典》  
文献名 盐梅《尚书》,梅实《本经》,枳《说文》,梅根《别录》,梅叶《本草拾遗》,酸梅、梅杏树《救荒本草》,红梅《滇南本草》,白梅花、霜梅、梅核仁《纲目》,梅梗、梅露、绿萼梅花、绿萼梅《纲目拾遗》,糖、蔗《花镜》,梅《玉篇》,春梅《本草再新》,白霜梅《本草便读》,合汉梅《中草药学》

地方名 绿梅花(江苏、浙江),乌梅干(浙江、四川),梅子(安徽、云南),红梅花(江苏、四川);北京:木叶梅,干枝梅;福建:黄仔;台湾:梅仔,白梅;湖北:酸乌梅,谷李子(神农架);湖南:桐梅,青梅;四川:酸梅子,黄梅(成都);云南:山梅,杏梅。

功效 花蕾:开郁和中,化痰,解毒。用于郁闷心烦,肝胃气痛,梅核气,瘰癧疮毒;果实:敛肺,涩肠,生津,安蛔。用于肺虚久咳,久痢滑肠,虚热消渴,蛔厥呕吐腹痛,胆道蛔虫症。

## 7143023

*Armeniaca mume* Sieb. f. *alphandii* (Carr.) Rehd. --- *Prunus mume* Sieb. et Zucc. f. *alphandii* (Carr.) Rehd.

植物名 红梅《江苏植志》  
药材名 红梅花(江苏、浙江)  
地方名 香梅(江苏、浙江);江苏:宫粉;上海:双台红梅。

功效 花:平肝和胃;果:敛肺,涩肠,生津,安蛔。

## 7143024

*Armeniaca mume* Sieb. f. *viridicalyx* (Makino) T. Y. Chen --- *Prunus mume* Sieb. et Zucc. var. *viridicalyx* Makino

植物名 绿萼梅《汇编》  
药材名 绿梅花(江苏、浙江)  
文献名 梅花、梅梗《百草镜》,梅《四川中药志》  
地方名 绿萼、花梅(华东);四川:酸梅子。  
功效 花:平肝和胃。用于胸胁胀痛,胃痛,消化不良,神经衰弱。

## 7143025

*Armeniaca sibirica* (L.) Lam. --- *Prunus sibirica* L.

植物名 山杏《中国植志》

药材名 苦杏仁《药典》

文献名 蒙古杏仁《药学报》,蒙古杏《东北药植志》,西伯利亚杏《药典》

地方名 杏仁(东北);内蒙古:“桂勒森-楚莫”、“西伯日-归勒斯”、“占里斯”、“保力保赫”(蒙名)。

功效 种子:有小毒。降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,血虚津枯,肠燥便秘。

## 7143026

*Armeniaca sibirica* (L.) Lam. var. *daurica* (Carriere) Y. C. Chu --- *A. daurica* Carriere --- *Prunus sibirica* L. f. *daurica* (Carriere) Kitag.

植物名 垂枝杏《东北木本图志》

药材名 垂枝杏《东北药用植物》

功效 核仁:有小毒。止咳,平喘,宣肺,润肠。用于支气管炎,伤风咳嗽,咳嗽喘息,呼吸困难,大便秘结,喉痹,身体浮肿。

## 7143027

*Armeniaca sibirica* (L.) Lam. f. *pubescens* (Kostina) Y. C. Chu --- *A. sibirica* (L.) Pers. var. *pubescens* Kostina --- *Prunus sibirica* L. var. *pubescens* (Kostina) Nakai --- *P. sibirica* L. f. *pubescens* (Kostina) Kitag.

植物名 毛枝西伯利亚杏《东北药用植物》

药材名 杏仁(东北)

文献名 西伯利亚杏《树分》,山杏《东北木本图志》

地方名 内蒙古:“西伯日-归勒斯”(蒙名)。

功效 核仁:有小毒。止咳,平喘,宣肺,润肠。用于支气管炎,伤风咳嗽,咳嗽,呼吸困难,大便秘结,喉痹,身体浮肿。

## 7143028

*Armeniaca vulgaris* Lam. --- *Prunus armeniaca* L.

植物名 杏《山海经》、《中国植志》

药材名 苦杏仁《临证指南》、《药典》

文献名 杏核仁《本经》,杏核、杏子《别录》,杏仁《本草经集注》,木落子《石药尔雅》,杏枝《图经》,杏树《救荒本草》,杏叶《滇南本草》,杏树根《纲目》,甜梅《江南录》,德儿、甜梅仁、草金丹《新纲》,甜杏《济南植录》,红杏《科种》,杏树皮《全展选编》,北杏仁、北杏、圆囡杏仁《常用中药名辨》

地方名 河北:龙王帽,大扁,大刺扁,大扁杏仁,扁杏仁;内蒙古:“归勒斯”(蒙名);青海:杏儿;浙江:杏梅仁;湖南:叭杏;四川:杏子仁;云南:山杏;其他:海棠红杏,红嘴大白杏,小红杏树,大黄杏树。

功效 种子:有小毒。降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,血虚津枯,肠燥便秘。

## 7143029

*Armeniaca vulgaris* Lam. var. *ansu* (Maxim.) Yu et Lu --- *Prunus armeniaca* L. var. *ansu* Maxim. --- *Armeniaca ansu* (Maxim.) Kost.

植物名 野杏《中国植志》

药材名 苦杏仁《药典》

文献名 杏核仁《本经》,杏核、杏子《别录》,杏枝《图

经》,杏叶《滇南本草》,甜梅、杏树根《纲目》,德儿、草金丹《新纲》,苦杏、土杏《科裁》,杏树皮《全展选编·内科》,北杏仁、北杏、原杏仁、圆囡杏仁《常用中药名辨》,野杏树《山东树木志》,山杏《药典》

地方名 北京:杏,杏仁;内蒙古:“合格仁·归勒斯”(蒙名);青海:“康布”(藏名);山东:府杏仁,大府杏;四川:甜杏仁,甘杏

功效 种子:有小毒。降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,血虚津枯,肠燥便秘。

#### 7143030

*Aruncus dioicus* (Walter) Fernald --- *Aruncus sylvester* Kostel. --- *A. asiaticus* Pojark.

植物名 假升麻《云南种录》

文献名 棣棠升麻《中国植志》,羊须草《上海植录》,升麻草《浙江天目药志》

地方名 甘肃:火把杆(武都);湖北:狗尾升麻(巴东),红升麻(神农架);湖南:花升麻,〔千年健〕,毛七;其他:金毛三七。

功效 根:用于跌打损伤,劳伤,筋骨疼痛。

#### 7143031

*Aruncus sylvester* Kostel. var. *tenuifolius* Nakai ex Hara --- *A. kysianus* Koidz. --- *A. sylvester* Kostel. var. *tenerus* Kitag. --- *A. sylvester* Kostel. f. *incisus* Liou et C. Y. Li

植物名 深裂假升麻《东北药用植物》

功效 根或全草:补虚,收敛,解热。用于跌打损伤,劳伤筋骨疼痛。

#### 7143032

*Cerasus cerasoides* (D. Don) Sok. --- *Prunus cerasoides* D. Don

植物名 高盆樱桃《中国植志》

文献名 云南欧李《高植图鉴》,高盆樱《拉汉英种称》

地方名 云南:簪樱桃。

功效 种子:云南个别地区作郁李仁代用品。

#### 7143033

*Cerasus clarifolia* (Schneid.) Yu et Li --- *Prunus pilosiuscula* (Schneid.) Koehne

植物名 微毛樱桃《中国植志》

文献名 西南樱桃《湖北植志》,微毛野樱桃《经植手册》

地方名 湖北:苦樱桃(神农架)。

功效 叶、树皮:杀虫,解毒。

#### 7143034

*Cerasus dictyoneura* (Diels) Yu --- *Prunus dictyoneura* Diels

植物名 毛叶欧李《中国植志》

药材名 毛叶欧李《汇编》

文献名 显脉欧李《华北经植志要》,脉欧李《拉汉种称》,网脉欧李《中药志》

地方名 郁李仁(河北、宁夏)。

功效 根皮:宣结气,破积聚,去白虫。

#### 7143035

*Cerasus glandulosa* (Thunb.) Lois. --- *Prunus glandulosa* Thunb.

植物名 麦李《中国植志》

文献名 山樱桃、山樱桃木、山梅子、花梅子《满鲜植汇》,秧李《树分》,郁李《种分讲义》,钝齿赤李《山东树木志》

功效 种子:润燥滑肠,下气行水。用于慢性便秘,水肿,妇女浮肿。

#### 7143036

*Cerasus glandulosa* (Thunb.) Lois. var. *trichostyla* --- *Prunus glandulosa* Thunb. var. *trichostyla* Koehne

植物名 毛柱麦李《秦岭植志》

地方名 陕西:海李子(宁陕)。

功效 种子:润燥滑肠,下气行水。用于慢性便秘,水肿,妇女浮肿等症。

#### 7143037

*Cerasus humilis* (Bunge) Sok. --- *Prunus humilis* Bunge --- *Cerasus humilis* (Bunge) Bar. et Liou

植物名 欧李《中国植志》

药材名 郁李仁《药典》

文献名 酸丁《热河志》,棣仁、爵李、棠棣仁、车下李、隐上座、崔梅子、雀梅仁、国大李仁、白棣树仁《新纲》,山梅子《中草药学》,磨盘李子《山东树木志》,小李仁《药典》

地方名 河北:郁李,欧李果,欧李仁;内蒙古:“乌兰那”、“乌拉嘎呐”、“乌拉奈”(蒙名),欧梨;山东:赤李子(乳山、泰山、沂水),侧李、吃李种子(烟台);江苏:山李子(铜山);云南:棠梨、样梨(昆明),唐梨,棣梨。

功效 种子:润燥滑肠,下气,利水。用于津枯肠燥,食积气滞,腹胀便秘,水肿,脚气,小便不利。

#### 7143038

*Cerasus japonica* (Thunb.) Lois. --- *Prunus japonica* Thunb.

植物名 郁李《中国植志》

药材名 郁李仁《本经》、《药典》

文献名 常棣、郁《诗经》,楸木《山海经》,英梅《尔雅》,郁李人、爵李《本经》,白棣《说文》,郁核、雀李、棣、车下李《吴普本草》,山李、爵梅《广雅》,马鞭花《嘉兴府志》,郁子《医心方》,〔千金藤〕《医学正传》,郁里仁《珍珠囊》,奥李、多叶郁李《纲目》,雀梅《群芳谱》,策李、赤棣《尔雅义疏》,秋李《名实图考》,穿心梅《名实图考长编》,喜梅、寿李《花镜》,棣仁、山梅子、隐上座、白棣树仁《新纲》,车李子《山东树木志》,小李仁《药典》

地方名 山东李仁、川李仁(四川、甘肃);山东:赤李(昆嵛山、泰山、平邑、益都、荣成),赤李子(费县、沂源、海阳),山赤李子(文登),侧李,吃李种子(烟台);江苏:野樱桃,山里黄,野李子;浙江:麦李(临安),小麦李;安徽:野苦李,秧李子,麦李子;河南:秧李,日本郁李;广东:野梅;四川:柳李(成都)。

功效 种子:润燥滑肠,下气,利水。用于津枯肠燥,食积气滞,腹胀便秘,水肿,脚气,小便不利。

## 7143039

*Cerasus japonica* (Thunb.) Lois. var. *engleri* --- *Prunus japonica* Thunb. var. *engleri* Koehne

植物名 东北郁李《东北木本图志》

药材名 东北郁李仁(拟)

文献名 北郁李《药植简编》, 东北李仁《中药名汇》

功效 种子: 润燥滑肠, 下气利水。

## 7143040

*Cerasus japonica* (Thunb.) Lois. var. *nakaii* (Levl.) Yu et Li --- *Prunus japonica* var. *nakaii* (Levl.) Rehd. --- *P. nakaii* Levl. --- *Cerasus nakaii* (Levl.) Bar. et Liou

植物名 长梗郁李《中国植志》

药材名 郁李仁《中药大辞典》

地方名 小李仁、李仁、欧李、大李仁(东北); 其他: 中井郁李。

功效 种子: 润燥滑肠, 下气利水。

## 7143041

*Cerasus maximowiczii* (Rupr.) Kom. --- *Prunus maximowiczii* Rupr.

植物名 黑樱桃《中国植志》

文献名 深山樱《植物学大辞典》

地方名 吉林: 深山樱桃。

功效 果实: 收敛, 发汗。

## 7143042

*Cerasus pleiocerasus* (Koehne) Yu et Li --- *Prunus pleiocerasus* Koehne

植物名 雕核樱桃《中国植志》

文献名 雕核樱《汇编》

地方名 四川: 土枣皮(德昌、会理)。

备考 果皮称土枣皮, 注意与山茱萸区别。

## 7143043

*Cerasus pseudocerasus* (Lindl.) G. Don --- *Prunus pseudocerasus* Lindl.

植物名 樱桃《中国植志》

药材名 樱桃核《滇南本草图谱》、《中草药学》

文献名 含桃《礼记》, 荆桃《尔雅》, 朱樱《蜀都赋》, 楔桃《广雅》, 英桃、牛桃《博物志》, 朱果《品汇精要》, 莺桃《纲目》, 樱桃水《纲目拾遗》, 楔、崖蜜、蜡樱、朱英、麦英《花镜》, 家樱桃《树分》, 山樱桃核、英桃核《药材学》, 会桃、半桃《福建经植志》

地方名 陕西: 中国樱桃; 山东: 樱桃骨(烟台); 江苏: 樱珠; 湖北: 恩桃树(神农架); 四川: 樱桃米。

功效 核: 清热透疹; 果实: 益气, 祛风湿; 根: 用于蛔虫病。

## 7143044

*Cerasus serrula* (Franch.) Yu et Li --- *Prunus serrula* Franch. --- *P. serrula* Franch. var. *tibetica* Koehne

植物名 细齿樱桃《中国植志》

文献名 云南樱花《经植手册》, 锯齿樱《云南种录》, 西藏野樱桃《汇编》

功效 种子、根、叶: 清肺热, 透托斑疹。用于麻疹不易透发, 寸白虫, 蛇咬伤。

## 7143045

*Cerasus serrulata* (Lindl.) G. Don ex London --- *Prunus serrulata* Lindl. --- *Prunus serrulata* Lindl. var. *spontanea* Wils.

植物名 山樱花《中国植志》

药材名 山樱花《药植简编》

文献名 福島樱《药植简编》, 樱花《高植图鉴》, 野生福島樱《经植手册》, 野樱花《汇编》

功效 种子: 透发麻疹。

## 7143046

*Cerasus serrulata* G. Don var. *pubescens* (Makino) Yu et Li --- *Prunus serrulata* Lindl. var. *pubescens* Wils.

植物名 毛叶山樱花《中国植志》

药材名 毛山樱《药植简编》

文献名 毛叶福島樱《经植手册》, 赞桃《广西植录》, 毛樱花《山东经植》, 毛叶樱花《华北树木志》

地方名 山东: 山樱桃(昆崙山)。

功效 种子: 透发麻疹。

## 7143047

*Cerasus szechuanica* (Batal.) Yu et Li --- *Prunus szechuanica* Batal. --- *P. discadenia* Koehne

植物名 四川樱桃《中国植志》

药材名 野樱桃《宁夏中草》

文献名 四川樱《拉汉种称》, 盘腺樱桃《秦岭植志》, 野樱桃根《宁夏中草》, 盘腺野樱桃《中药大辞典》, 盘腺樱《云南种录》

功效 果实: 清血热, 益肾。用于咽喉肿痛, 声哑; 种子: 透疹。用于麻疹初起, 疹出不透; 根: 调气活血。用于月经不调。

## 7143048

*Cerasus tatsienensis* (Batal.) --- *Prunus tatsienensis* Batal.

植物名 康定樱桃《中国植志》

文献名 打箭樱桃《神农架药录》

地方名 湖北: 野恩桃树(神农架)。

功效 叶: 杀虫。用于阴道炎。

## 7143049

*Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. --- *Prunus tomentosa* Thunb.

植物名 毛樱桃《名实图考》、《中国植志》

药材名 山樱桃《纲目》、《中药大辞典》

文献名 樱桃、朱菜、麦英《吴普本草》, 牛桃、婴桃、英豆《别录》, 李桃、奈桃《食疗本草》, 山婴桃《纲目》, 梅桃《八闽通志》, 野樱桃《树分》, 山樱桃仁、梅花仁、李仁《中国经植志》, 郁李仁《药典》, 大李仁《鉴别手册》

地方名 小李仁、狗樱桃、梅李(东北); 内蒙古: “哲日勒格·应陶日”(蒙名); 青海: 绒毛樱桃, 樱桃核。

功效 果实: 益气固精。用于泻痢, 遗精。

## 7143050

*Cerasus verecunda* --- *Prunus verecunda* (Koidz.) Koehne

植物名 华东山樱《浙江药植志》

地方名 浙江:山樱桃(临安)。

功效 种子:透发麻疹。

#### 7143051

*Cerasus yedoensis* (Matsum.) Yu et Li --- *Prunus yedoensis* Matsum.

植物名 东京樱花《中国植志》

文献名 樱花《经植手册》,日本樱花《高植图鉴》,吉野樱《山东树木志》

功效 树皮:镇咳。

#### 7143052

*Chaenomeles cathayensis* (Hemsl.) Schneid. --- *Chaenomeles lagenaria* (Loisel.) Koidz. var. *cathayensis* (Hemsl.) Rehd.

植物名 狭叶木瓜《秦岭植志》

药材名 西南木瓜《中药志》

文献名 木桃《诗经》,和圆子《雷公炮炙论》,楮子《食疗本草》,木瓜海棠《群芳谱》,毛叶木瓜《广西药录》

地方名 青海:“赛亚”(藏名);江苏:海棠花(连云港);湖北:皱皮木瓜,药木瓜、木瓜(神农架)。

功效 果实:舒筋活络。用于风湿骨痛。

#### 7143053

*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach

植物名 日本木瓜《中国植志》

药材名 日本木瓜《中国植志》

文献名 日本贴梗海棠《湖北植志》,倭海棠《树分》,和木瓜《台湾药植志》

地方名 上海:木瓜(上海)。

功效 果实:镇痉,镇咳,利尿。用于霍乱,中暑及风湿病。

#### 7143054

*Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne

植物名 榧楂《图经》、《中国植志》

药材名 光皮木瓜《汇编》

文献名 木李《诗经》,蜜楂、瘡楂《本草拾遗》,木梨《埤雅》,铁脚梨《花镜》,木瓜《中国植志》

地方名 山东:木梨瓜(崂山);江苏:土木瓜(清江),木瓜片(徐州);河南:(香瓜);湖南:香木瓜;广东:海棠(广州);广西:沙木瓜;云南:“宋麻瓦”(西双版纳傣语)。

功效 果实:消炎,祛风湿。

#### 7143055

*Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai --- *Chaenomeles lagenaria* (Loisel.) Koidz.

植物名 贴梗木瓜《中国植志》

药材名 木瓜《吴普本草》、《药典》

文献名 楸《尔雅》,木瓜实《别录》,铁脚梨《清异录》,木瓜根《日华子本草》,木瓜子《普济方》,秋木瓜《滇南本草》,木瓜核《纲目》,木瓜花《花镜》,杜木瓜、淳安小木瓜《中国药植图鉴》,贴梗海棠《药典》

地方名 皱皮木瓜(浙江、湖北、四川),酸木瓜(四川、云南);山东:红绣鞋;安徽:宣木瓜;四川:大红木瓜,干木瓜,木瓜干,陈木瓜,花木瓜。

功效 果实:平肝舒筋,和胃化湿。用于湿痹拘挛,腰膝关节酸重疼痛,吐泻转筋,脚气水肿。

#### 7143056

*Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai var. *wilsonii* ---

*Chaenomeles lagenaria* (Loisel.) Koidz. var. *wilsonii* Rehd.

植物名 毛叶木瓜《秦岭植志》

药材名 毛叶木瓜《秦岭植志》

文献名 木瓜海棠《群芳谱》

地方名 威氏木瓜(陕西、四川),木瓜(甘肃、陕西、浙江、西藏);浙江:杜木瓜、小木瓜(淳安)。

功效 果实:消炎,祛风湿。

#### 7143057

*Chaenomeles tibetica* Yu

植物名 西藏木瓜《中国植志》

功效 果实:消炎,祛风湿。

#### 7143058

*Chamaerhodos erecta* (L.) Bunge

植物名 地蔷薇《中国植志》

文献名 直立地蔷薇《汇编》

地方名 茵陈狼牙(内蒙古、甘肃);内蒙古:“亚干-宝图勒”、“图门-塔那”(蒙名)。

功效 全草:祛风湿。用于风湿性关节炎。

#### 7143059

*Chrysobalanus icaco* L.

植物名 一口可梅《台湾药植志》

功效 果实:用于腹泻及其他肠部疾患。

#### 7143060

*Coluria longifolia* Maxim.

植物名 无尾果《中国植志》

药材名 无尾果《汇编》

文献名 长叶无尾果《青海中草》

地方名 青海:“热衣巴”(藏名)。

功效 全草:平肝熄风,清热解毒。用于高血压病,肝炎。

#### 7143061

*Comarum palustre* L. --- *Potentilla palustris* Scop.

植物名 沼委陵菜《中国植志》

地方名 吉林:东北沼委陵菜。

功效 全草:用于肺结核,血栓性静脉炎,黄疸,神经痛等。

#### 7143062

*Cotoneaster acutifolius* Turcz.

植物名 灰栒子《中国植志》

地方名 青海:“察尔正”(藏名)。

功效 枝、叶及果实:凉血,止血。用于鼻衄,牙龈出血,月经过多。

#### 7143063

*Cotoneaster acutifolius* Turcz. var. *villosulus* Rehd.

植物名 密毛灰栒子《神农架药录》

文献名 毛灰栒子《树分》

地方名 湖北:〔石楠叶〕(神农架)。

功 效 枝叶;止血。用于外伤出血。

#### 7143064

*Cotoneaster amoenus* Wils.

植物名 马蝗果《云南种录》

文献名 美丽栒子《中药大辞典》, 栒子木《西昌中草药》

地方名 四川: 棉木耳, 牛屎果; 云南: 马蛇果。

功 效 根: 清热解毒, 消肿止痛。用于腮腺炎, 淋巴结核, 麻疹。

#### 7143065

*Cotoneaster coriaceus* Franch.

植物名 厚叶栒子《中国植志》

药材名 野苦梨根《贵州民间药物》

地方名 贵州: 野苦梨。

功 效 根: 消肿解毒。用于风湿, 脚气, 红肿恶疮。

#### 7143066

*Cotoneaster dammerii* Schneid.

植物名 矮生栒子《中国植志》

地方名 贵州: 爬地雨淋巴子。

功 效 根皮: 清热解毒, 消肿除湿。用于妇女月经不调, 风湿, 恶疮。

#### 7143067

*Cotoneaster divaricatus* Rehd. et Wils.

植物名 散生栒子《中国植志》

文献名 张枝栒子《经植手册》, 散枝栒子《秦岭植志》

地方名 江西: 栒子。

功 效 根: 清热除湿, 止血。用于湿热痢, 赤痢, 吐血。

#### 7143068

*Cotoneaster frigidus* Wall. ex Lindl.

植物名 耐寒栒子《中国植志》

文献名 “察巴兴”(藏名)《青藏药图》

功 效 果: 用于关节炎。

#### 7143069

*Cotoneaster glaucophyllus* Franch.

植物名 粉叶栒子《中国植志》

文献名 粉绿叶栒子《广西药录》, 粉绿栒子《广西植录》

地方名 广西: (野山楂)(隆林)。

功 效 根、茎: 用于消化不良。

#### 7143070

*Cotoneaster harrovianus* Wils.

植物名 蒙自栒子《中国植志》

药材名 野苦梨《汇编》

地方名 贵州: 华西栒子。

功 效 根皮: 消肿解毒。用于痈肿疮毒。

#### 7143071

*Cotoneaster horizontalis* Decne.

植物名 平枝栒子《中国植志》

药材名 水莲沙《峨眉药植》

地方名 (铺地蜈蚣)(陕西、湖北); 陕西: (铁扫帚)

(平利); 甘肃: 翘皮子(武都), 牛肋巴(文县); 浙江: 高山带子、(白马骨)(天目山); 湖北: (爬山虎)(巴东), 牛排骨、地蜈蚣、(千年矮)、鹰翅膀(神农架); 四川: 山头姑娘, 栒刺木, 岩楞子; 贵州: 地红子, 矮红子, 被告惹。

功 效 枝叶、根: 用于止咳, 妇女痛经, 白带。

#### 7143072

*Cotoneaster horizontalis* Decne. var. *perpusillus* Schneid.

植物名 小叶平枝栒子《中国植志》

药材名 地红子根《贵州民间药物》

文献名 小叶栒刺木《树分》

地方名 贵州: 小叶平枝灰栒子, 矮红子, 地红子(眉潭)。

功 效 根: 清热除湿, 止血。用于痢疾, 吐血。

#### 7143073

*Cotoneaster microphyllus* Wall. ex Lindl.

植物名 小叶栒子《中国植志》

药材名 耐冬果《汇编》

文献名 黑牛筋《名实图考》, (铺地蜈蚣)《高植图鉴》

地方名 青海: “察尔列”(藏名); 云南: (刀口药)(昆明), 地锅巴(禄劝), 小黑牛筋(富民)。

功 效 叶: 有毒。止血生肌。用于刀伤。

#### 7143074

*Cotoneaster microphyllus* Wall. ex Lindl. f. *melanotrichus* (Franch.) Hand.-Mazz.

植物名 黑毛小叶栒子《云南种录》

药材名 耐冬果《云南药录》

地方名 云南: 黑牛筋, (刀口药)。

功 效 叶: 止血, 生肌。用于刀伤。

#### 7143075

*Cotoneaster salicifolius* Franch.

植物名 柳叶栒子《中国植志》

药材名 翻白柴《四川中药志》

文献名 山米木《高植图鉴》

地方名 四川: 把把柴, 山米麻, 木帚子。

功 效 全株: 除风热。用于干咳失音, 脾湿发黄。

#### 7143076

*Cotoneaster zabelii* Schneid.

植物名 西北栒子《中国植志》

文献名 札氏栒子《经植手册》, 杂氏灰栒子《华北经植志要》

地方名 湖北: 矮木棵(神农架)。

功 效 根或枝: 涩肠止泻。用于疗毒, 止血, 止崩。

#### 7143077

*Crataegus altaica* (Loud.) Lange

植物名 阿勒泰山楂《沙漠植志》

药材名 新疆山楂(拟)

文献名 阿尔泰山楂《高植图鉴》

功 效 果实: 用于消化不良。

#### 7143078

*Crataegus chlorosarca* Maxim.

植物名 绿肉山楂《中国植志》

功 效 果、叶：消食化积，散瘀。

#### 7143079

*Crataegus cuneata* Sieb. et Zucc.

植物名 野山楂《中国植志》

药材名 山楂《本草衍义》、《中药大辞典》

文献名 山楂子、赤爪子、赤爪木、赤楂《唐本草》，棠棣子《图经》，山里果儿、映山红果《救荒本草》，山楂核《滇南本草》，茅楂《日用本草》，山楂木、山楂叶、山楂根、棠杞子、鼻涕团《纲目》，猴抓子《植物名汇》，山里果《食鉴》，杞子、棠梅、药山楂《中国药植志》，黄山楂、药楂《山东树木志》，小叶山楂《中药大辞典》，南山楂《药典》

地方名 毛楂子(安徽、福建)；陕西：红楂子(丹凤)；江苏：野山红(睢宁)，山红、紫金龙(新海连)；浙江：柿扎(嵊县)，山果子；安徽：山楂红，山粒红，(山石榴)，牛疔子(太和)；江西：猴楂(奉新、贵溪)，毛枣子(莲花)，布罗子树(定南)；福建：南楂(邵武)，土山查(霞浦、邵武)，毛楂根；河南：牧虎梨；湖北：红果，山林果(襄阳)，毛利果(罗田)；湖南：野涩梨(邵阳)，山梨；广东：棠梨果、蝉梨子(粤北)；广西：小山楂(全州、平乐)；四川：渣肉；贵州：红果子，浮萍果，大红籽。

功 效 果实：消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，胃脘胀满，泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，疝气疼痛，高血脂症；木材：主水利，头风，身痒；叶和花(泡茶饮)；用于高血压；茎叶(煮汁)：外用用于洗漆疮；种子：用于食积，疝气；根：消积，祛风，止血。用于食积，痢疾，关节痛，咯血。

#### 7143080

*Crataegus dahurica* Koehne ex. Schneid.

植物名 光叶山楂《中国植志》

功 效 果、叶：消食化积，散瘀。

#### 7143081

*Crataegus hupehensis* Sarg.

植物名 湖北山楂《中国植志》

地方名 陕西：模糊梨(秦岭)；江苏：甜梨(连云港)；江西：[酸枣]，大山枣；湖北：南山楂，个山楂，红果，猴楂子，野山楂(神农架)。

功 效 果实：消食化积，散瘀。

#### 7143082

*Crataegus kansuensis* Wils.

植物名 甘肃山楂《中国植志》

地方名 甘肃：面丹子，面旦子。

功 效 果实：消食化积，散瘀。

#### 7143083

*Crataegus maximowiczii* Schneid.

植物名 毛山楂《中国植志》

功 效 果实：消食化积，散瘀。

#### 7143084

*Crataegus pinnatifida* Bunge

植物名 山楂《中国植志》

药材名 山楂《药典》

文献名 杞、棠梅《尔雅》，杞子《尔雅》郭璞注，棠

棣子《本经》，鼠楂《本草经集注》，赤爪子、赤爪木《唐本草》，赤枣子《桂海虞衡志》，山里红果、酸枣、鼻涕团、柿楂子《百一选方》，山里果子《履巉岩本草》，猴楂《世医得效方》，海红《品汇精要》，羊棣、山里果、棠梅《群芳谱》，酸梅子、山梨《树分》，茅楂、猴梨、山棠子、山囊子、山果子、山查子、山栗红果、地乙梨、糖球子、系梅《新纲》，北山楂《药典》

地方名 山里红(山东、云南)；河北：红果；内蒙古：“道老纳”(蒙名)，裂叶山楂；山东：山楂扣，酸楂石榴(长清)，酸楂(崂山)；江苏：绿梨。

功 效 果实：消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，胃脘胀满，泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，疝气疼痛，高血脂症；焦山楂：消食导滞作用增强。用于肉食积滞，泻痢不爽。

#### 7143085

*Crataegus pinnatifida* Bunge. var. *major* N. E. Br.

植物名 山里红《中国植志》

药材名 山楂《本草衍义补遗》、《药典》

文献名 赤爪子、赤爪木《唐本草》，棠棣子《图经》，大山楂、酸梅子《树分》，红果子《简明中医辞典》，北山楂《药典》，山楂石榴《山东树木志》

地方名 河北：棠球，山梨红，红果，棠棣；内蒙古：“各仁-道老纳”(蒙名)；山东：酸楂(烟台)，酸石榴，东山楂；江苏：山楂红子(徐州)。

功 效 果实：消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，胃脘胀满，泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，疝气疼痛，高血脂症；焦山楂：消食导滞作用增强。用于肉食积滞，泻痢不爽。

#### 7143086

*Crataegus pinnatifida* Bunge. var. *psilosa* Schneid.

植物名 狭裂叶山楂《吉野》

药材名 山楂(山东)

文献名 秃山楂《山东经植》

功 效 果实：消食化积，散瘀。用于肉积停乳，脘腹胀满，痛经，产后瘀血腹痛，高血脂症。

#### 7143087

*Crataegus sanguinea* Pall.

植物名 辽宁山楂《中国植志》

药材名 辽山楂《中药大辞典》

文献名 辽东山楂、牧狐梨《树分》

地方名 内蒙古：“花-道老纳”(蒙名)，红果山楂，面果果，白槎子；河南：白海棠；西藏：山楂。

功 效 果实：消食化积，散瘀。

#### 7143088

*Crataegus scabrifolia* (Franch.) Rehd.

植物名 山林果《汇编》

药材名 云南山楂《中国植志》

文献名 山查、山查核《滇南本草》

地方名 大果山楂、酸冷果(广西、云南)；广西：古樟；贵州：野山楂；云南：山楂，山茶果，山里红，沙椋果。

功 效 果实：消食化积，散瘀。

#### 7143089



*Crataegus wilsonii* Sarg.

植物名 华中山楂《中国植志》

地方名 湖北:猴爪子、木猴梨(神农架);贵州:山楸

功效 果实:消食化积,散瘀。

#### 7143090

*Cydonia oblonga* Mill.

植物名 榲桲《中国植志》

药材名 榲桲《本草拾遗》、《汇编》

文献名 木梨《树分》

功效 果实:祛湿解暑,舒筋活络,下气消食。用于伤暑,呕吐酸水,食积胸闷,腹泻,消化不良,关节疼痛,腓肠肌痉挛。

#### 7143091

*Dichotomanthus tristaniaecarpa* Kurz

植物名 牛筋条《中国树木志》

地方名 四川:红眼睛;云南:“阿卡麻思坡”(元江哈尼语),白牛筋。

功效 根皮:清热解暑,止咳,止血。用于感冒咳嗽,咽喉肿痛,鼻衄。

#### 7143092

*Docynia delavayi* (Franch.) Schneid.

植物名 移柃《中国植志》

药材名 移柃《汇编》

文献名 酸楂《中药志》,云南移柃《云南种录》,西南移柃《经植手册》

地方名 [山楂]、酸木瓜[果实](四川、云南),小木瓜(浙江、云南);四川:多柃,台氏移柃;云南:发多衣,多衣,酸多李皮(丽江),渣子果,桃桃榧(思茅),酸移柃(曲靖),渣子树(玉溪),桃桃,多依树,移柃树。

功效 树皮:清热解暑,收敛,接骨。用于肠炎,痢疾。外用于烧、烫伤,骨折,黄水疮,湿疹,子宫脱垂;果:祛风活络,消食健胃。用于风湿性关节炎。

#### 7143093

*Docynia indica* (Wall.) Decne. --- *Docynia rufifolia* (Levl.) Rehd.

植物名 印度移柃《云南种录》

文献名 红叶移柃《中国植志》

地方名 小木瓜、酸木瓜(四川、云南);云南:移柃。

功效 果实:消积食。用于痢疾,消化不良。

#### 7143094

*Duchesnea chrysantha* (Zoll. et Mor.) Miq.

植物名 皱果蛇莓《中国植志》

文献名 黄花蛇莓《药植简编》

地方名 广东:[地锦]。

功效 茎叶:用于疔疮,烫火伤,蛇咬伤;全草:止血。用于崩漏。

#### 7143095

*Duchesnea indica* (Andr.) Focke

植物名 蛇莓《中国植志》

药材名 蛇莓《别录》、《汇编》

文献名 蛇莓汁《别录》,鸡冠果、野杨梅《救荒本草》,蛇蕪、地莓《本草会编》,蚕莓《纲目》,三点红、龙吐

珠、狮子尾《生草药性备要》,九龙草《纲目拾遗》,疔疮药、蛇蛋果、[地锦]《名实图考》,三匹风《草木便方》,蛇泡草、三皮风、三爪龙《分类草药性》,龙衔珠《民药汇编》,蛇抛子《植物名汇》

地方名 落地杨梅(浙江、广西),蛇泡(陕西、江西、湖南、广东、四川、云南),地杨梅(福建、广西),和尚头草、三脚虎(福建、广东),蛇果果(江苏、上海),蛇波(福建、台湾、四川);陕西:地胖子、疔药(宝鸡);山东:蛤蟆眼(蒙山),鸡蛋黄草(历城);江苏:红果果;上海:蛇葡萄,蛇果藤,蛇枕头,蛇卵子草;浙江:三叶蛇扭(临安);安徽:蛇果子,蛇泡子,蛇八瓣,三叶红线草(太和);江西:蛇不见;福建:蛇波藤,老蛇婆,老蛇刺占,老蛇蕪;台湾:蛇婆,蛇衔,威蛇,小龙芽;河南:老鼠屎,歪角莲,活血钱,破风草;湖北:蛇泡果子;湖南:三仙草,倒春藤(长沙),蛇乌苞(衡山),三加皮(大庸),三爪风(古丈),凤凰草(桂新),三股风(辰溪),赛龙珠、过江龙(东安),三爪草,三叶蛇莓草(永顺),五指虎(涟源),五皮风(岳阳),蛇莓儿(常德);广东:龙球草,伤寒头、三姐妹(粤北),飞蛇里,蛇泡祇,倒地梅(兴宁),宝珠草(仙头),飞蛇子(惠阳、五华),龙珠草,蛇波(汕头),蛇姆(南澳),病仔草(揭阳),蛇波仔(普宁),[白毛藤](潮安),九龙吐珠(澄海);广西:红口药(隆林),含珠草,小草莓(陆川),平地莓(金秀);四川:三叶蕪,三匹草,老蛇果、老蛇繆(南平),三披草、三轮草(成都),地快泡,大蛇蕪;贵州:老蛇泡,金草,三皮风根,老蛇蛭;云南:蛇盘草、红顶果(楚雄),蛇蒿(丽江),蛇咬草,蛇麻果(江川),蛇果,长虫泡(文山),黄泡(昆明),雪丁草(昭通),豹子眼睛,米汤果(华宁、通海),“舍利坎”(楚雄彝名),哈哈果草,哈哈泡。

功效 全草:有小毒。清热解暑,散瘀消肿。用于感冒发热,咳嗽,小儿高热惊风,咽喉肿痛,白喉,黄疸型肝炎,细菌性痢疾,阿米巴痢疾,月经过多。外用于腮腺炎,毒蛇咬伤,眼结膜炎,疔疮肿毒,带状疱疹,湿疹,癌症。

#### 7143096

*Eriobotrya bengalensis* (Roxb.) Hook. f.

植物名 云南枇杷《中国植志》

文献名 南亚枇杷《云南种录》

功效 叶:清肺止咳。

#### 7143097

*Eriobotrya cavaleriei* (Levl.) Rehd. --- *E. cavaleriei* var. *brackloi* (Hand.-Mazz.) Rehd.

植物名 大花枇杷《中国植志》

文献名 广东野枇杷《药植简编》

地方名 山枇杷(江西、湖南、广西);江西:庐桔;广西:野枇杷。

功效 叶:清肺止咳。

#### 7143098

*Eriobotrya deflexa* (Hemsl.) Nakai

植物名 台广枇杷《中国植志》

文献名 台湾山枇杷《台湾药植志》,台湾枇杷《树分》

地方名 台湾:山枇杷,夏粥;海南:野枇杷。

功效 果实:清热解毒;叶:镇咳。

#### 7143099

*Eriobotrya fragrans* Champ. ex Benth.

植物名 香花枇杷《中国植志》

文献名 山枇杷《药植简编》

功效 叶(去毛):清肺止咳。

#### 7143100

*Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

植物名 枇杷《中国植志》

药材名 枇杷叶《别录》、《药典》

文献名 卢桔《花镜》,枇杷露《生草药性备要》,卢桔叶、无忧扇《中国药学大辞典》,巴叶《中药材手册》,土冬花《民药汇编》,枇杷果《山东树木志》

地方名 江苏:苏杷叶;台湾:枇杷仁;广东:广杷叶,焦子(广州);广西:杷菜(蒙山),杷叶,白花木(桂平);四川:如意扇。

功效 叶:清肺止咳,降逆止呕。用于肺热咳嗽,气逆急,胃热呕逆,烦热口渴。

#### 7143101

*Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehd.

植物名 白鹃梅《中国植志》

文献名 总花白鹃梅《经植手册》,白山花《药植简编》

地方名 茧子花、金瓜果(浙江、河南);江苏:白花(江宁);安徽:九活头。

功效 根皮、树皮:用于腰骨酸痛。

7143102 见 7143105a

#### 7143103

*Filipendula intermedia* (Glehn) Juzep.

植物名 翻白蚊子草《中国植志》

功效 根、叶、全草:止血,止痢,驱蚊。

#### 7143104

*Filipendula palmata* (Pall.) Maxim.

植物名 蚊子草《中国植志》

文献名 合叶子《中国经植志》,合子草、里白合子草《药植简编》

地方名 内蒙古:“塔布拉嘎-额布斯”(蒙名)。

功效 花:止血,止痢,驱蚊。

#### 7143105

*Filipendula palmata* (Pall.) Maxim. var. *glabra* Ledeb.

ex Kom. et Alis. --- *F. nuda* Grub.

植物名 光叶蚊子草《中国植志》

文献名 绿叶蚊子草《高植图鉴补编》

地方名 内蒙古:“诺干-塔布拉嘎-额布斯”(蒙名)。

功效 花:止血,止痢,驱蚊。

#### 7143105a

*Filipendula purpurea* Maxim. --- *F. glabra* Nakai ex Kom. et Alis.

植物名 瓣叶蚊子草《中国植志》

文献名 光叶蚊子草《吉野》

功效 花挥发油:用于驱蚊。

#### 7143106

*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.

植物名 旋果蚊子草《中国植志》

文献名 合叶子《新疆中草药》

功效 根、花:收敛,降压。用于高血压症,疮疡脓血。

#### 7143107

*Fragaria ananassa* Duch. --- *F. chiloensis* Duch. var. *ananassa* (Duch.) L. H. Bailey

植物名 草莓《东北草本植志》

药材名 草莓《药植简编》

文献名 荷兰草莓《台湾药植志》,凤梨草莓《东北草本植志》

功效 果实:清凉止渴,滋养。

#### 7143108

*Fragaria moupinensis* (Franch.) Gard.

植物名 西南草莓《中国植志》

药材名 白泡《云南药录》

文献名 宝兴草莓《云南种录》

功效 根:消炎止泻。用于痢疾。

#### 7143109

*Fragaria nilegrrensis* Schlecht. ex Gay

植物名 黄毛草莓《中国植志》

药材名 白草莓《云南中草药》

文献名 锈毛草莓《秦岭植志》

地方名 广西:龙芽草(平南),水杨梅(鹿寨),乌地龙(凤山),疳积草(忻城),落地杨梅(藤县),蛇泡(凌云),三叶草(柳江),地白泡(乐业);四川:白糯米泡(西昌);云南:白泡儿、白藤、白蒲草、白酒泡(大理),跑钱草、路边草(丽江),白酒果(玉溪);西藏:三匹风,野杨梅,草莓,“只大萨曾”(藏名)。

功效 全草:清热解毒,续筋接骨;根:用于肝炎,痢疾。

#### 7143110

*Fragaria nilgerrensis* Schlecht. ex Gay var. *mairei* (Levl.) Hand.-Mazz.

植物名 粉叶黄毛草莓《中国植志》

药材名 白桃子《滇南本草》

文献名 白胖、白琐梅(《滇南本草》整理本),宁波白藤《云南种录》

地方名 云南:白泡,白划莓,白藤。

功效 全草:用于肺病咳嗽,清痰解热,筋骨疼痛。

#### 7143111

*Fragaria orientalis* Lozinsk.

植物名 东方草莓《中国植志》

药材名 野草莓《东北草本植志》

文献名 草莓《中国经植志》

地方名 甘肃:瓢儿;湖北:白地泡、土泡(神农架)。

功效 全草:祛痰。用于腹泻,眼病,子宫出血。

#### 7143112

*Fragaria vesca* L. --- *F. concolor* Kitagawa

植物名 野草莓《中国植志》

药材名 野草莓《中国植志》

文献名 白花蛇莓、野杨梅、野莓、山莓《叶《生药》》，欧洲草莓《经植手册》

地方名 青海：“直打洒曾”（藏名）；贵州：白蛇莓，白地泡。

功效 全草：用于肺结核，胸腔脓血。

#### 7143113

*Geum aleppicum* Jacq. --- *G. strictum* Ait. var. *bipinnata* Batal. --- *G. aleppicum* Jacq. var. *bipinnata* (Batal.) Hand.-Mazz.

植物名 路边青《中国植志》

药材名 北水杨梅《药植简编》

文献名 水杨梅《纲目》，草本水杨梅《中药志》，地椒《科裁》，羽裂水杨梅《秦岭植志》

地方名 黑龙江：紫苑，山烟花；河北：[杨梅]；陕西：追风七，追风草、见肿消（太白山），乌金丹（柞水）；内蒙古：“高哈图·图茹”（蒙名）；湖北：草蛇莓、五气朝阳草（神农架）；贵州：兰布政，头晕药；其他：老五叶，海棠菜，萝卜叶。

功效 全草：益气补血，养阴，健脾胃，润肺化痰。用于虚损癆伤，虚弱咳嗽，白带。

#### 7143114

*Geum aleppicum* Jacquin f. *glaberrimum* (Juzepczuk) Kitag. --- *Geum glaberrimum* Juzepczuk

植物名 光茎水杨梅《东北药用植物》

药材名 水杨梅（东北）

功效 全草及根：清热解毒，消肿止痛，祛风除湿，利尿，止血。用于肠炎，痢疾，小儿惊风，腰腿疼痛，跌打损伤，咽痛，月经不调，白带，神经衰弱，头痛，失眠。外用于疔疮，痈肿，瘰癧。

#### 7143115

*Geum japonicum* Thunb. var. *chinense* F. Bolle

植物名 柔毛路边青《中国植志》

药材名 蓝布正《汇编》

文献名 地椒《庚辛玉册》，水杨梅《纲目》，日本水杨梅、南水杨梅《汇编》，东南水杨梅《湖北植志》，华水杨梅《药植简编》，华东水杨梅《浙江药植志》，蛇节大草《植物名汇》，绿水草《玉龙山药植》，柔毛兰布政《广西药录》

地方名 瘦狗还阳（四川、云南），大仙鹤草（湖北、四川），凤凰窝、头晕药（贵州、云南）；陕西：追风七（太白）；甘肃：[黄花地丁]；浙江：黄梅球（临安）；安徽：小儿惊风草；福建：[石打穿]；湖南：穿鱼柳、假杨梅（常德），水益母；广西：地波斯（百色），大马连鞍（隆林）；四川：[石见穿]（盐源），“色尔玛”（藏名），虎掌叶，[满山香]（雷波），鸡仙草，毛通茎、[虎掌草]（綦江），大过路黄、蓝布枕（成都），大毛脚鸡，毛脚鸡；贵州：头晕药根，路连香，卜地香，老蛇骚，换骨丹，香鸡归，路连黄，乌骨鸡；云南：五气朝阳草（昆明），龙须草（丽江），南不正（昭通），萝卜叶，萝卜解（保山），大疮药，大叶子（东川），蝴蝶菜、水白菜、冬昌花、红心草（曲靖），“阿努其它彪”（楚雄彝名），回阳草，山川芎，白头须，团叶子（丽

江）。

功效 全草及根：补脾肾，祛风湿，消痈肿。用于腹泻，痢疾，白带，崩漏，风湿腰腿痛，跌打损伤，痈疽疮疡。

#### 7143116

*Kerria japonica* (L.) DC.

植物名 棣棠花《中国植志》

药材名 棣棠花《花镜》、《汇编》

文献名 棣棠《群芳谱》，金碗《花谱》，黄蔷薇《淮安府志》，黄棣棠《药圃问答》，地棠、黄榆叶梅《树分》，地园花《民药汇编》

地方名 [通草]（陕西、甘肃）；陕西：鸡蛋黄花（石泉、宁陕、西乡）；甘肃：通花杆、青通花（武都），土黄条（文县）；江苏：黄度梅（高淳）；浙江：金棣棠（金华）；江西：地藏王花（吉安）；湖南：兑棠花（凤凰）；广东：麻叶棣棠（肇庆）；四川：蜂棠花、小通花、清明花（南川），地团花、蜂糖花（西昌），蛋黄花（万县）；贵州：鸡蛋花，三月花；云南：金弹子花（楚雄），金弹子。

功效 花：化痰止咳，用于肺结核咳嗽。

#### 7143117

*Kerria japonica* (L.) DC. f. *pleniflora* (Witte) Rehd.

植物名 重瓣棣棠花《中国植志》

文献名 棣棠《花镜》，棣棠花《名实图考》，木通草《玉龙山药植》

地方名 湖北：小通草花《神农架》；贵州：鸡蛋花；云南：蜂棠花（昆明）。

功效 花、根：化痰止咳。用于肺结核咳嗽。

#### 7143118

*Laurocerasus phaeosticta* (Hance) Schneid. --- *Prunus phaeosticta* (Hance) Maxim.

植物名 腺叶桂樱《中国植志》

文献名 腺叶野樱《海南植志》，腺叶稠李《拉汉种称》，黑星樱《台湾木本植志》

功效 全株：活血行瘀，镇咳，利尿，润燥滑肠。用于经闭，痈疽，大便燥结。

#### 7143119

*Laurocerasus spinulosa* (Sieb. et Zucc.) Schneid. --- *Prunus spinulosa* Sieb. et Zucc.

植物名 刺叶桂樱《中国植志》

文献名 檮木《纲目拾遗》，檮木《本草新注》，乌荆子树、乌荆子花、乌梅花、酸梅花、野梅花《叶《生药》》，异刺李《药植简编》，刺叶稠李《拉汉种称》，常绿樱《江西药录》，檐萼稠李《云南种录》

地方名 浙江：乌子、甜珠（临安）。

功效 种子：用于痢疾。

#### 7143120

*Laurocerasus zippeliana* (Miq.) Yu et Lu --- *Prunus sippenliana* Miq. --- *P. macrophylla* Sieb. et Zucc.

植物名 大叶桂樱《中国植志》

文献名 大叶野樱《广州植志》，大叶樱、大叶樱叶《台湾药植志》，大叶樟樱《云南种录》，大叶稠李《拉汉种称》

地方名 台湾:黄土树;湖南:[鬼见愁];广西:古影树(大瑶山),[大驳骨],驳骨木;云南:黑茶树。

功效 叶:祛痰,镇咳。用于咳嗽,喘息,子宫痉挛。

## 7143121

*Malus asiatica* Nakai --- *M. prunifolia* Borkh. var. *rinki* Koidz.

植物名 花红《中国植志》

药材名 林擒《千金·食治》、《中药大辞典》

文献名 林擒根《食疗本草》,来禽《王右军帖》,文林果、朱柰、五色林擒、联珠果《洽闻记》,花红果《滇南本草》,沙果《品汇精要》,林禽《宁原《食鉴本草》》,文林郎果《纲目》,蜜果《群芳谱》,五色柰《医林纂要》,冷金丹《花镜》,秋槟子《中国经植志》

地方名 河北:冷沙果,热沙果,花脸沙果,净面沙果;山西:夏果;内蒙古:“敖拉纳”(蒙名);陕西:红果,白果子;甘肃:红擒,紫擒;山东:冬果,秋果;湖北:宁青(神农架);四川:[山楂],楂肉。

功效 果实:止渴,化滞,涩精。-用于消渴,泻痢,遗精;根:用于白虫,蛔虫,消渴,好睡。

## 7143122

*Malus baccata* (L.) Borkh. --- *M. pallasiana* Juz.

植物名 山荆子《中国植志》

药材名 山荆子《长白山植药志》

地方名 山丁子、糖李子(黑龙江、吉林);吉林:林荆子;河北:山定子;甘肃:石枣。

功效 果实:用于肠疾,肺结核,各种感染。

## 7143123

*Malus doumeri* (Bois.) Chev. --- *Malus formosana* (Kawak. & Koidz.) Kawak. & Koidz.

植物名 台湾林擒《中国树木志》

文献名 台湾海棠《广州植志》,台湾苹果《台湾药植志》

地方名 台湾:[山查],涩梨,山仙查;广西:[山楂](容县、靖西),[木瓜](陆川)。

功效 果实:健胃消食,用于消化不良。

## 7143124

*Malus halliana* Koehne

植物名 垂丝海棠《中国植志》

药材名 垂丝海棠《纲目》、《中药大辞典》

功效 花:调经和血。用于崩漏。

## 7143125

*Malus hupehensis* (Pamp.) Rehd.

植物名 湖北海棠《中国植志》

药材名 野海棠《浙江药植志》

文献名 泰山海棠、甜茶果《山东树木志》,山海棠《药植简编》

地方名 茶海棠(江苏、广西),花红茶(湖北、广西);甘肃:小石枣;江苏:甜梨(连云港);浙江:野花红(建德),山糖梨(龙泉);湖北:海棠茶,棠梨子(神农架);广西:[野山楂];四川:秋子;贵州:山荆子。

功效 根及果:活血,健胃。用于胃呆,筋骨扭伤。

## 7143126

*Malus hupehensis* (Pamp.) Rehd. var. *rosea* (Rehd.) Rehd.

植物名 樱桃海棠《浙江药植志》

文献名 红花野海棠《药植简编》

功效 根及果:活血,健胃。

## 7143127

*Malus kansuensis* (Batal.) Schneid. f. *calva* Rehd.

植物名 光叶陇东海棠《湖北植志》

文献名 无毛甘肃海棠《秦岭植志》

地方名 大石枣(陕西、甘肃);陕西:野海棠果;甘肃:甘肃海棠;湖北:鸡鸽子、野山楂(神农架)。

功效 果:助消化;叶:解毒。

## 7143128

*Malus manshurica* (Maxim.) Kom.

植物名 毛山荆子《中国植志》

药材名 毛山荆子《长白山植药志》

文献名 东北山荆子《华北树木志》,毛山定子《山东树木志》

地方名 吉林:棠梨木,辽山荆子。

功效 叶、花蕾:用于痉挛性疼痛,急性腹泻。

## 7143129

*Malus melliana* (Hand.-Mazz.) Rehd.

植物名 尖嘴林擒《中国植志》

文献名 尖嘴海棠《鉴别手册》,锐齿亚州海棠《植分学报》

地方名 广西:[山楂](梧州、龙胜、大瑶山、北流、玉林),[野山楂], [山楂果](昭平)。

功效 果实:消积,化食。

## 7143130

*Malus micromalus* Makino

植物名 西府海棠《群芳谱》、《中国植志》

药材名 海红《饮膳正要》、《中药大辞典》

文献名 海棠《通志》,海棠梨《纲目》,棠蒸梨(姚可成《食物本草》),小果海棠《华北经植志要》,红林擒、黄林擒、七厘子《内蒙古植志》

地方名 八楞海棠(河北、云南);河北:子母海棠;陕西:果红,果黄;云南:清刺海棠;其他:热花红,冷花红,铁花红,紫海棠,老海红。

功效 果实:用于泄痢。

## 7143131

*Malus prunifolia* (Willd.) Borkh.

植物名 楸子《中国植志》

药材名 楸子《食性本草》、《汇编》

文献名 海棠《药植简编》,海红《经济植物学》,海棠果《树分》,海红果、柰子《山东树木志》

地方名 秋子(陕西、四川),[山楂](四川、云南、甘肃);河北:秋果;内蒙古:“海棠-吉秘斯”(蒙名);甘肃:酸果子;山东:红海棠、茶果(莱芜);四川:楂肉;云南:天然子。

功效 果实:健胃消积,行瘀定痛。用于食积停滞,胸腹胀痛,痢疾泄泻,疝气等。

## 7143132

*Malus pumila* Mill.

植物名 苹果《中国植志》

药材名 苹果《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 奈《别录》, 频婆《广志》, 奈子《千金·食治》, 平波《饮膳正要》, 超凡子、天然子、玉容丹《滇南本草》, 西洋苹果《树分》。

地方名 国光(辽宁、山东、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏), 青香蕉(辽宁、河北、山东), 玉霞、麻皮(四川、贵州、云南), 红星(辽宁、河北、陕西、河南), 黄魁、伏花皮(河北、山东、四川), 祝、伏香蕉、黄元帅、元帅、红元帅、红香蕉、红玉(辽宁、河北、山东); 内蒙古: “阿拉木日都”(蒙名)。

功效 果实: 生津润肺, 除烦, 解暑, 开胃, 醒酒; 果皮: 用于反胃吐酸; 叶: 用于产后血迷, 经水不调, 蒸热发烧。敷脐上治阴症。

## 7143133

*Malus rockii* Rehd.

植物名 丽江山荆子《中国植志》

文献名 喜马拉雅山荆子《树分》, “察巴兴”(藏名)《青藏药图》

功效 果: 健胃, 降压。用于肝病, 腹泻, 眼疾, 月经不调。

## 7143134

*Malus yunnanensis* (Franch.) Schneid.

植物名 滇池海棠《中国植志》

文献名 云南山楂、[山楂]、楂肉《四川中药志》, 云南海棠《经植手册》

功效 果: 消积化食。

## 7143135

*Neillia ribesoides* Rehd.

植物名 毛叶绣线梅《中国植志》

药材名 钓竿柴《汇编》

文献名 川西南梨《药植简编》

地方名 贵州: 钓鱼杆。

功效 根: 利水除湿, 清热止血。用于水肿, 咳血。

## 7143136

*Neillia sinensis* Oliv.

植物名 中华绣线梅《中国植志》

药材名 钓竿柴《贵州草药》

文献名 绣线梅《秦岭植志》, 华南梨《经植手册》

地方名 陕西: 黑楂子; 甘肃: 秤杆梢(武都); 贵州: 钓鱼杆, 白忙衣。

功效 根: 利水除湿, 清热止血。用于水肿, 咳血。

## 7143137

*Neillia thyrsoflora* D. Don

植物名 绣线梅《中国植志》

文献名 复序南梨《经植手册》

地方名 云南: 地棠花(红河)。

功效 花: 用于肺结核。

## 7143138

*Osteomeles schwerinae* Schneid.

植物名 华西小石积《中国植志》

药材名 黑果《汇编》

地方名 云南: 糊炒豆、梭花果树、马屎果、蒿叶叶、地石榴、黑果根(玉溪), 沙糖果; 其他: 小石积木, 老鸦果, 小黑果。

功效 叶、根: 清热解毒, 收敛止泻, 祛风湿。用于咽喉炎, 腮腺炎, 痢疾, 肠炎, 腹泻, 风湿麻木, 关节疼痛, 水肿, 子宫脱垂。外用于痢疮, 无名肿毒, 外伤出血。

## 7143139

*Osteomeles subrotunda* K. Koch

植物名 圆叶小石积《中国植志》

药材名 不凋木《本草拾遗》、《台湾药植志》

文献名 小石积《经植手册》, 矾山椒《牧野日图》。

功效 茎: 调中补衰。

## 7143140

*Padus asiatica* Kom. f. *glauca* --- *Prunus padus* L. f. *glauca* (Nakai) Kitag. --- *P. padus* L. var. *glauca* Nakai

植物名 粉叶稠李《东北木本图志》

药材名 粉叶稠李《东北药用植物》

功效 成熟果实及叶: 补脾, 涩肠止泻。用于腹泻, 痢疾; 叶: 镇咳。

## 7143141

*Padus asiatica* Kom. var. *pendula* Baranov & Skv. --- *Prunus padus* L. f. *pendula* Baranov & Skv.

植物名 垂枝稠李《东北药用植物》

功效 成熟果实及叶: 补脾, 涩肠止泻。用于腹泻, 痢疾; 叶: 镇咳。

## 7143142

*Padus brachypoda* (Batal.) Schneid. --- *Prunus brachypoda* Batal. var. *pseudossiori* Koehne

植物名 短梗稠李《中国植志》

文献名 短柄榉木《药植简编》, 短柄樱桃《广西植录》, 长序稠李、短柄稠李《秦岭植志》

地方名 湖北: 野苦桃树(神农架)。

功效 根、叶: 筋骨扭伤; 树皮: 杀虫止痒。

## 7143143

*Padus buergeriana* (Miq.) Yu et Ku --- *Prunus buergeriana* Miq. --- *Prunus buergeriana* Miq. var. *nudiusecula* Koehne

植物名 榉木《中国植志》

文献名 稍秃樱桃《广西植录》, 白氏榉木《药植简编》, 犬樱《湖北植志》, 华东稠李《浙江药植志》, 榉木樱《江苏植志》, 榉木稠李《高植图鉴补编》

功效 种子: 缓泻, 利尿。

## 7143144

*Padus maackii* (Rupr.) Kom. --- *Prunus maackii* Rupr.

植物名 斑叶稠李《中国植志》

文献名 山桃稠李《华北树木志》, 斑叶稠梨《东北木本图志》

地方名 山桃(东北)。

功 效 果、叶、止痛。

#### 7143145

*Padus racemosa* (Lam.) Gilib.

植物名 稠李《中国植志》

文献名 稠梨《树分》, 樸木《中国树木志》

地方名 夜合、臭山荆子(西北); 甘肃: 臭耳子; 山东: 灰枣(崑崙山); 四川: 蕤仁、芮仁、蕤核仁、姜蕤仁。

功 效 果实: 止泻痢。用于腹泻。

#### 7143146

*Padus racemosa* (Lam.) Gilib. var. *asiatica* (Kom.) Yu et Ku --- *Padus asiatica* Kom.

植物名 北亚稠李《中国植志》

文献名 臭李《华北树木志》

地方名 臭李子、臭山定子(东北); 内蒙古: “矛以勒”、“玛嘎”(蒙名)。

功 效 果实: 止泻痢。

#### 7143147

*Padus racemosa* (Lam.) Gilib. var. *pubescens* (Regel & Tiling) Schneid. --- *Prunus padus* L. var. *pubescens* Regel & Tiling

植物名 毛叶稠李《中国植志》

药材名 樱额《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 樱额梨、稠梨子《盛京通志》, 多毛稠李《中药大辞典》

地方名 臭李子、稠李(东北); 北京: 稠梨; 内蒙古: “玛嘎”(蒙名)。

功 效 果实: 补脾, 止泻。

#### 7143148

*Photinia beauverdiana* Schneid.

植物名 中华石楠《中国植志》

文献名 波氏石楠《经植手册》

地方名 假思桃(广东、广西); 广西: 牛筋木, 琴忌郎, 野思桃。

功 效 叶: 有小毒。祛风, 通络, 益肾。

#### 7143149

*Photinia benthamiana* Hance

植物名 闽粤石楠《中国植志》

文献名 边沁石斑木《广州植志》

功 效 叶: 补肾, 强腰膝, 除风湿。用于肾虚腰膝软弱, 风湿痹痛。

#### 7143150

*Photinia davidsoniae* Rehd. & Wils.

植物名 楞木石楠《中国植志》

文献名 刺蕾《广西植志》

地方名 楞木(浙江、广西); 河北: 石楠叶; 广东: 蕾树; 广西: 石楠, 山官木; 四川: 水红树花; 贵州: 梅子树。

功 效 根: 祛风镇痛。

#### 7143151

*Photinia glabra* (Thunb.) Maxim.

植物名 光叶石楠《中国植志》

药材名 醋林子《图经》、《台湾药植志》

文献名 山降木《中国经植志》, 山杠木《广西植志》

地方名 崩骨木(湖南、江苏); 湖南: 木球花, 串穿木, 凿树, 千年红, 石眼树, 柞树, 矮子错树, 光凿, 光凿树, 光凿木; 广东: 石斑木; 广西: 山官木; 四川: 红檬子。

功 效 果实: 用于久痢不瘥, 痔漏下血; 叶: 清热, 利尿, 止痛。

#### 7143152

*Photinia hirsuta* Hand.-Mazz.

植物名 褐毛石楠《中国植志》

功 效 叶: 补肾, 强腰膝, 除风湿。用于肾虚腰膝软弱, 风湿痹痛。

#### 7143153

*Photinia kwangsiensis* Li

植物名 广西石楠《中国植志》

文献名 广西山杠木《广西药录》

地方名 广西: 三桂木(金秀)。

功 效 叶: 用于风湿骨痛。

#### 7143154

*Photinia lasiogyna* (Franch.) Schneid.

植物名 倒卵叶石楠《中国植志》

功 效 叶: 补肾, 强腰膝, 除风湿。用于肾虚腰膝软弱, 风湿痹痛。

#### 7143155

*Photinia parvifolia* (Pritz.) Schneid. P. *villosa* (Thunb.) DC. var. *parvifolia* (Pritz.) P. S. Hsu et L. C. Li

植物名 小叶石楠《中国植志》

药材名 小叶石楠《中药大辞典》

文献名 伞花石楠《江西药录》, 小叶石楠《江苏植志》

地方名 湖南: {牛奶子}, 牛奶树, 牛李子, 和尚崽, 棒头果, 加泡树, 棒梨子; 广西: 牛伴木(柳江), 木槌子(钟山), 小牛筋(三江); 四川: 牛筋木; 贵州: 山红子, 秤锤子, 兜干; 云南: “娘格尼帕”(楚雄彝名), 小石南藤。

功 效 根: 行血活血, 止痛。用于牙痛, 黄疸, 乳痛。

#### 7143156

*Photinia prunifolia* (Hook. & Arn.) Lindl.

植物名 桃叶石楠《中国植志》

文献名 樱叶石楠《广西植志》, 李叶石楠《药植简编》

地方名 广东: 石斑木; 广西: 山杠木, 石笔木。

功 效 叶: 有小毒。祛风, 通络, 益肾。

#### 7143157

*Photinia schneideriana* Rehd. & Wils.

植物名 绒毛石楠《中国植志》

文献名 鄂西石楠《广西植志》

功 效 叶: 补肾, 强腰膝, 除风湿。用于肾虚腰膝软弱和风湿痹痛。

#### 7143158

*Photinia serrulata* Lindl.

植物名 石楠《广群芳谱》、《中国植志》

药材名 石楠叶《本草从新》、《药典》

文献名 石南、鬼目《本经》,石南草《别录》,风药《纲目》,端正木《花镜》,栾茶《纲目拾遗》,猪林子《名实图考》,水红树、油蜡树《中国药植志》,石崖树、石楠藤《药材学》,石南实《中药大辞典》。

地方名 崩骨木(江苏、江西),石楠树(江苏、浙江);山东:铁树;江苏:石眼树(无锡、常熟),石岩树(常熟),千年红(南京),笔树(高淳),老少年叶;上海:铁搭树;浙江:石楠柴,将军梨,石冠;安徽:避火珠,红叶树,野枇杷,铁栗树,石塔;江西:凿树;福建:石纲;湖南:石椒树,桃仁香,死马回阳;广东:〔石斑木〕,石斑生,石斑僧,石湾木,凿角;广西:独行千里,凿木,山官木。

功效 叶:有小毒。祛风,通络,益肾。用于风湿痹痛,腰背酸痛,足膝无力,偏头痛。

#### 7143159

*Photinia tushanensis* Yu

植物名 独山石楠《中国植志》

地方名 贵州:岩枇杷。

功效 根:活血化瘀。用于跌打青肿。

#### 7143160

*Photinia villosa* (Thunb.) DC.

植物名 毛叶石楠《中国植志》

文献名 细毛崩骨木《江苏植志》,毛叶石南《江苏植志》,芒垂子《药植简编》

地方名 山东:鸡丁子,鸡零子,活鸡丁,吉铃子;广西:禾熟;贵州:秤锤果,邓向观、邓向观根(榕江);其他:糯米珠。

功效 根、果:除湿热,止吐泻,消肿止痛。用于上吐下泻,赤白痢疾,恢复疲劳。

#### 7143161

*Photinia villosa* (Thunb.) DC. var. *sinica* Rehd. & Wils.

植物名 庐山石楠《树分》

文献名 华毛叶石楠《经植手册》,疏毛石楠《秦岭植志》,中华毛叶石楠《湖北植志》

功效 叶:有小毒。祛风,通络,益肾。

#### 7143162

*Potentilla ancistrifolia* Bunge

植物名 皱叶委陵菜《中国植志》

文献名 钩叶委陵菜《神农架药录》

地方名 湖北:翻白草(神农架)。

功效 带根全草:清热解毒,止痢。

#### 7143163

*Potentilla anserina* L.

植物名 蕨麻《中国植志》

药材名 蕨麻《汇编》

文献名 延寿果、鹿跑草《纲目拾遗》,绢毛委陵菜《吉野》,蕨麻委陵菜《秦岭植志》,莲花菜、藩白花《满洲植志》,曲尖委陵菜《黄河中游植物名录》,老鸦爪《种分》,蔓委陵菜《兴安植群》,延寿草《中国植志》,鹅绒毛委陵菜《中草药》

地方名 角麻(陕西、甘肃),大翻白草(陕西、甘肃、宁夏),仙人果(甘肃、青海),鸭子巴掌菜(黑龙江、吉

林),蛤蟆草、老鸦膀子(吉林、辽宁),人参果(北京、西藏);河北:蓬菜花;内蒙古:“哲勒图-陶来音-汤乃”(蒙名),阿篦梳,“吉奇格奈”(蒙名);青海:“卓老沙曾”(藏名);云南:洋沙果;西藏:“戳玛”(藏名),长寿果(昌都)。

功效 块根:补气益血,健脾利湿,生津止渴。用于病后贫血,营养不良,脾虚腹泻,风湿痹痛。

#### 7143164

*Potentilla betonicifolia* Poir. --- *P. leucophylla* Pail.

植物名 白萼委陵菜《中国植志》

文献名 三出叶委陵菜《内蒙古中草药》,三出委陵菜《东检》,白叶委陵菜《东北草本植志》

地方名 内蒙古:“陶格斯音-呼日”(蒙名),草杜仲,“沙嘎吉钙音-萨布日”(蒙名)。

功效 地上部分:消肿利水。用于各种水肿。

#### 7143165

*Potentilla bifurca* L.

植物名 二裂委陵菜《中国植志》

药材名 鸡冠草《沙漠药植》

文献名 叉裂委陵菜《东检》,叉叶委陵菜《中药大辞典》,二裂叶翻白草《陕甘宁植志》,二裂翻白叶《药植简编》,二裂叶委陵菜《汇编》

地方名 内蒙古:“阿查-陶来音-汤乃”(蒙名),地红花,黄瓜瓜苗,土地榆;陕西:痔疮草(陕北),黄瓜绿草,老虎蹄(太白);甘肃:鸡多脑。

功效 全草:止血,止痢。用于功能性子宫出血,产后出血过多,痢疾。外用于疮疡。

#### 7143166

*Potentilla bifurca* L. var. *humilior* Rupr. et Osten.

植物名 矮二裂委陵菜《中国植志》

药材名 鸡冠草《沙漠植志》

功效 簇生幼芽:用于止血;全草:杀虫,消炎。

#### 7143167

*Potentilla centigrana* Maxim.

植物名 蛇莓委陵菜《中国植志》

文献名 蛇莓委陵菜《东检》

地方名 湖北:三皮风(神农架)。

功效 全草:清热解毒,祛风。

#### 7143168

*Potentilla chinensis* Ser. --- *P. chinensis* Ser. subsp. *trigonodonta* Hand.-Mazz.

植物名 委陵菜《中国植志》

药材名 委陵菜《救荒本草》、《药典》

文献名 翻白菜《救荒本草》,根头菜、野鸡旁花《植物名汇》,蛤蟆草《东北药植志》,河原柴胡《和汉药物学》,〔红柴胡〕、〔柴胡〕《台湾药植志》,三角齿委陵菜《云南种录》

地方名 〔翻白草〕(青海、江苏、山东、安徽),〔白头翁〕(安徽、湖北、四川、云南),〔天青地白〕(陕西、青海、贵州、云南),黄州白头翁(湖北、云南),下路鸡(湖南、广东);吉林:野鸡膀子,野鸡子;北京:破鞋底(京郊);天津:南白头翁;内蒙古:“陶来音-汤乃”、“希林-陶来

音-汤乃”(蒙名),地区草(呼和浩特);陕西:一白草、生血丹(汉中),扑地虎、五虎擒血(柞水);青海:鸡腿儿;山东:老鸦翎,老鸦爪,老鸦鳞(五莲),老鸦爪,老鸦翎(烟台),翻白蒿(海阳),鸡爪蒿(昆崙山、文登、海阳);江苏:〔龙牙草〕,鸡爪草,翻白眼(徐州);安徽:鸡骨爪,天青地白草;福建:土防风、小七厘(晋江),山萝卜(莆田),血参(厦门),青叶地白(泉州);河南:毛鸡腿子;广东:北紫草(广州);四川:白玉草(西昌),翻白叶,广白头翁;贵州:小毛药,虎爪菜,鸡爪七;云南:铁称托、山梅子,细翻白叶(曲靖),黑牛七、黑七(丽江);其他:〔紫草〕,白紫草。

**功效** 全草:清热解毒,凉血止痢。用于赤痢腹痛,久痢不止,痔疮出血,痢疮疮毒。

## 7143169

*Potentilla chrysantha* Trev. --- *P. asiatica* (Wolf) Juzep.

**植物名** 黄花委陵菜《中国植志》

**文献名** 亚洲委陵菜《汇编》

**功效** 全草:清热解毒,止血。

**备考** 在新疆地区亦作翻白草用。

## 7143170

*Potentilla conferta* Bunge

**植物名** 大萼委陵菜《中国植志》

**文献名** 大头委陵菜《东北草本植志》

**地方名** 内蒙古:“热干巴”、“都如特-陶来音-汤乃”(藏名)。

**功效** 根:清热,凉血,止血。用于功能性子宫出血,鼻衄。

## 7143171

*Potentilla cryptotaeniae* Maxim.

**植物名** 狼牙委陵菜《中国植志》

**地方名** 湖北:长叶鸡腿草(神农架);四川:铁秤砣。

**功效** 全草:散瘀血,消痼疾。用于跌打损伤。

## 7143172

*Potentilla discolor* Bunge

**植物名** 翻白草《中国植志》

**药材名** 翻白草《救荒本草》、《汇编》

**文献名** 鸡腿根《救荒本草》,天藕儿《野菜谱》,湖鸡腿《纲目》,鸡脚草、鸡距草《草木便方》,乌皮浮儿、犄角草《植物名汇》,鸡眼儿、土菜《中国药植志》,土栗《牧野日记》,翻白委陵菜《中国植志》

**地方名** 天青地白(江苏、浙江、江西、福建、广西、四川、贵州),鸡爪莲(江西、广东、广西),鸡脚爪(江西、广东、四川),鸡爪儿(湖南、四川),鸡爪爪(陕西、四川),〔白头翁〕(江苏、浙江、江西、福建、广西),山萝卜(山东、浙江),〔地丁〕(江西、湖南),鸡大腿(安徽、广西),野鸡腿(陕西、湖南);内蒙古:“沙札盖-莎布口”(蒙名);陕西:鸡爪腿(镇坪),天藕;山东:老鸦爪(昆崙山、文登、荣成),鸡根(平邑、莒县),小地榆(费县),小鸡头(琅琊山);江苏:山樨棍(镇江),山胡萝卜(宜兴),结梨,结梨根,野芽,麦后头,大叶侧草,结连根(连云港),鸡腿苗、白鸡腿(邳县);浙江:反白草、上青下白(嵊县),地栗,白五叶蛇莓(温州),土西洋参,白龙茅肾、三

脚皮(洞头);安徽:鸡腿菜,牛鸡斗,鸡头,鸡拐,大鸡骨,野党参;江西:叶下白(吉安),野鸡尾(南丰),〔紫花地丁〕(南昌);福建:郁苏参、长乐参(福州),〔土人参〕,鸡脚仔、地人参、龙根、飞天蜈蚣(泉州),香老、香茹栳(宁化),粒金(古田),白毛鸡脚莲;河南:翻白叶,补鸡腿;湖南:野鸡坝,兰溪白头翁,黄花地丁,千锤打,上洋参(长沙),鸡爪仙(宁远),鸡脚板(黔阳),鸡公脑、鸡脚(衡阳);湖北:鸡腿子,鸡脚莲,天青地白草;广东:白漂莲(惠阳),鸡脚叶,砂柳草(广州);广西:〔金线吊葫芦〕(昭平),鸭脚参,细沙扭,白背艾、粉白草、老鼠婆(贵县),〔甘遂〕(来宾),鸡爪风,石藕(柳江),红松树(桂平),痧扭药,沙扭草,鸡爪根;四川:鸡爪参,毛鸡腿,红地榆;贵州:鸡脚七,山慈菇,翻白菜。

**功效** 全草:止血,止痢,解毒。用于吐血,便血,崩漏,痢疾,疟疾,痢病。

## 7143173

*Potentilla fragarioides* L.

**植物名** 莓叶委陵菜《中国植志》

**药材名** 雄子莲《陕西草药》

**文献名** 软梗蛇扭《中草药通讯》

**地方名** 毛猴子(江苏、江西);内蒙古:“奥衣音-陶来音-汤乃”(蒙名);陕西:瓢子,〔满山红〕;江西:经如草;广西:落地蜘蛛。

**功效** 根、根茎:止血。用于月经过多,功能性子宫出血。

## 7143174

*Potentilla freyniana* Bornm.

**植物名** 三叶委陵菜《中国植志》

**药材名** 地蜂子《湖北中草药志》

**地方名** 地蜘蛛(四川、贵州),三张叶(陕西、浙江);浙江:三片风,软梗蛇扭,白里金梅,烂苦春,独立金蛋,三叶蛇子草(杭州),三叶蛇莓(温州),三叶蒲庚(仙居),〔一枝蒿〕;江西:三叶翻白草,三叶梅花,土经丸;湖北:蜂子七,土蜂子,大救驾,地骨造(巴东),〔散血丹〕;湖南:地丸子;四川:铁秤砣,五披草(成都),山蜂子,三步跳(峨眉山);贵州:三爪金,山峰子根。

**功效** 根或全草:清热解毒,止痛止血。用于肠炎,痢疾,牙痛,胃痛,腰痛,胃炎,跌打损伤。外用于创伤出血,骨结核,烧烫伤,毒蛇咬伤。

## 7143175

*Potentilla freyniana* Bornm. var. *sinica* Migo

**植物名** 中华三叶委陵菜《中国植志》

**药材名** 地蜂子《湖北中草药志》

**文献名** 三叶委陵菜《江苏植志》,白地梅《药植简编》

**地方名** 湖北:独脚伞,独角委陵菜,大救驾(神农架)。

**功效** 全草或根:清热解毒,止痛止血。用于肠炎,痢疾,牙痛,胃痛,腰痛,胃炎,跌打损伤。外用于创伤出血,骨结核,烧烫伤,毒蛇咬伤。

## 7143176

*Potentilla fruticosa* L.



植物名 金露梅《中国植志》  
 药材名 药王茶《沙漠药植》  
 文献名 金老梅《中药大辞典》，木本委陵菜《中国经植志》  
 地方名 金蜡梅(西北、内蒙古)，棍儿茶(东北、内蒙古、河北)；内蒙古：“哈日·喀比拉”、“乌日阿拉格”、“舒乌尔”、“波罗兹干·舒乌尔”、“布利亚古尔”、“达兰·哈利斯”(蒙名)；青海：“班那”(藏名)，扁麻；云南：委陵菜。  
 功效 叶：清暑热，益脑清心，调经，健胃。用于暑热眩晕，两目不清，胃气不和，滞食，月经不调。

## 7143177

*Potentilla fruticosa* L. var. *albicans* Rehd. et Wils.

植物名 白毛金露梅《中国植志》  
 文献名 白叶金露梅《神农架药录》  
 地方名 湖北：小花茶(神农架)。  
 功效 叶、花：清热，健胃，调经。用于暑热眩晕，胃气不和，滞食，月经不调。

## 7143178

*Potentilla fruticosa* L. var. *arbuscula* (D. Don) Maxim.

--- *P. arbuscula* D. Don

植物名 伏毛金露梅《中国植志》  
 文献名 金露梅《云南种录》  
 功效 叶：清暑热，益脑清心，调经，健胃。

## 7143179

*Potentilla fulgens* Wall. ex Hook. -- *P. siemersiana* Lehm.

植物名 西南委陵菜《中国植志》  
 药材名 翻白叶《滇南本草》  
 文献名 管仲、番白叶《滇南本草》，银色委陵菜《汇编》，亮叶委陵菜《中药大辞典》，光委陵《西昌中草药》  
 地方名 红地榆(四川、云南)，翻白草(四川、西藏、云南)；广西：天青地白(百色)；四川：翻白(西昌)；贵州：翻背白草，(白头翁)，涩地痞，爬地茶，翻白菜，银叶委陵菜；云南：白地榆，地管子，地槟榔，黄地榆，马屎根、赤地榆(丽江)，翻白地榆，槟榔仁，白蒲划，紫地榆(富民)；西藏：鸡腿草。  
 功效 根：凉血止血，收敛止泻。用于鼻衄，肺结核咯血，上呼吸道及消化道出血，痢疾，肠炎，消化不良，红崩，白带。外用于创伤出血，烧烫伤。

功效 根：凉血止血，收敛止泻。用于鼻衄，肺结核咯血，上呼吸道及消化道出血，痢疾，肠炎，消化不良，红崩，白带。外用于创伤出血，烧烫伤。

## 7143180

*Potentilla glabra* Lodd. --- *Dasiphora davurica* (Nestl.) Kom. et Klob. - Alis.

植物名 银露梅《中国植志》  
 文献名 光叶银露梅《云南种录》  
 地方名 银老梅、白花棍儿茶(东北)；内蒙古：“萌根·乌日阿拉格”(蒙名)；四川：“匪夹给”(藏名)。  
 功效 茎、叶、花：理气散寒，镇痛固齿，利水消肿。

## 7143181

*Potentilla glabra* Lodd. var. *mandshurica* (Maxim.) Hand.-Mazz. --- *P. arbuscula* D. Don var. *veitchii* (Wils.) T. N. Liou --- *P. glabra* var. *veitchii* (Wils.)

Hand.-Mazz.

植物名 白毛银露梅《中国植志》  
 药材名 观音茶(陕西太白山)  
 文献名 华西银腊梅《内蒙古植志》  
 地方名 陕西：药王茶。  
 功效 花、叶：健脾化湿，清暑，调经。用于消化不良，中暑，月经不调。

## 7143182

*Potentilla granulosa* Yu et Li

植物名 腺粒委陵菜《中国植志》  
 功效 全草：用于血管硬化症。

## 7143183

*Potentilla griffithii* Hook. f.

植物名 柔毛委陵菜《中国植志》  
 药材名 红地榆《汇编》  
 文献名 云南翻白草《云南种录》  
 地方名 云南：(草莓)(昆明)，(翻白草)，地皮风、白地榆(华宁)，三叶翻白叶(澄江)。  
 功效 根：收敛，止泻。用于红白痢疾，白带。

## 7143184

*Potentilla griffithii* Hook. f. var. *velutina* Card.

植物名 长柔毛委陵菜《中国植志》  
 药材名 地皮风《汇编》  
 文献名 黄毛翻白草《云南种录》，格氏委陵菜《药植简编》，粘毛委陵菜《西昌中草药》  
 地方名 小天青(四川、云南)；四川：翻白叶，小管仲；云南：小翻白叶。  
 功效 根：清热活血，行气止痛。用于痢疾，食积胃痛，小儿惊风，产后流血不止，胃和十二指肠溃疡。

## 7143185

*Potentilla imbricata* Kar. et Kir. --- *P. bifurca* L. var. *canescens* Bong. et Mey.

植物名 覆瓦委陵菜《中国植志》  
 文献名 毛二裂委陵菜《内蒙古植志》，毛叉叶委陵菜《东北草本植志》  
 地方名 内蒙古：“乌斯图-阿叉-陶末音-汤乃”(蒙名)。  
 功效 全草：止血。用于功能性子宫出血，产后出血过多。

## 7143186

*Potentilla kleiniana* Wight et Arn.

植物名 蛇含委陵菜《中国植志》  
 药材名 蛇含《本经》、《汇编》  
 文献名 蛇衔《本经》，威蛇《日华子本草》，小龙牙《斗门方》，紫背龙牙《图经》，紫背草《仁斋直指方》，蛇包五披风《名实图考》，五匹风《草木便方》，五皮风、地五甲、五爪龙《分类草药性》，五叶委陵菜《西昌中草药》  
 地方名 五叶莓(安徽、贵州)，五虎下山(陕西、江西)，小叶五爪龙、蛇泡(江西、广西)，五爪金龙(浙江、江西)，地五爪(江西、湖南)；浙江：五叶蛇莓，五叶蛇扭(临安)，蛇眼草；江西：红线草、一盘珠(泰和)；福建：五叶仔(永春、大田、仙游、莆田、德化)，五叶莲，金线陈

(闽东);安徽:红头绳,对口草;湖南:五爪风,五旱草,五虎草,五爪莲(通道),五叶藤(东安),小五爪(花垣),小五爪龙;广西:地爪龙、狗脚药(隆林),黄铃草(柳江),正链(罗城);贵州:地五加,五爪虎;云南:狗脚迹(红河),五皮枫,五儿,头苗,五皮草。

**功效** 全草:清热解毒,止咳化痰。用于外感咳嗽,百日咳,咽喉肿痛,小儿高热,惊风,疟疾,痢疾,腮腺炎,乳腺炎,毒蛇咬伤,带状疱疹,疔疮,痔疮,外伤出血。

## 7143187

*Potentilla leuconota* D. Don

植物名 银叶委陵菜《中国植志》

药材名 锦线标《汇编》

文献名 白斑人参果《云南种录》

地方名 湖北:天青地白、地白菜(神农架);四川:锦标草、金钱标、金线镖(峨眉),锦线镖,红地榆(盐源);贵州:[白头翁](都匀);云南:湿草。

**功效** 全草:清热解毒。用于肺痈,风热声哑,痢疾。

## 7143188

*Potentilla limprichtii* J. Krause --- *Potentilla sericea* auct. non L. --- *Potentilla poteroides* auct. non Franch.

植物名 下江委陵菜《中国植志》

药材名 浮尸草(四川)

文献名 多茎委陵菜《四川中药志》

**功效** 全草:用于男子弱症,女子干病及崩带。

**备考** 有的文献曾将“浮尸草”学名误订为 *P. sericea* L. 及 *P. poteroides* Franch. 应予纠正。

## 7143189

*Potentilla longifolia* Willd. ex Schlecht. --- *P. viscosa* Donn ex Lehm.

植物名 腺毛委陵菜《中国植志》

文献名 粘委陵菜《汇编》,委陵菜《科裁》

**功效** 全草:清热解毒,止血止痢。

## 7143190

*Potentilla morrisonensis* Hayata

植物名 玉山金梅《台湾药植志》

**功效** 茎叶:解毒。

## 7143191

*Potentilla multifida* L.

植物名 多裂委陵菜《中国植志》

药材名 湖鸡腿(本草原始)

文献名 长虫把子《兴安植群》,〔银柴胡〕《北华药讯》,细叶委陵菜《东北草本植志》

地方名 内蒙古:“奥尼图·陶来音·汤乃”(蒙名);陕西:猫爪子;甘肃:白马肉;其他:毛鸡腿。

**功效** 带根全草:清热利湿,止血,杀虫。用于肝炎,蛲虫病,功能性子宫出血,外伤出血。

## 7143192

*Potentilla nivea* L. --- *P. nivea* L. var. *camtschatica* Cham. & Schlecht.

植物名 雪白委陵菜《中国植志》

药材名 白里金梅《中国植物图鉴》

文献名 雪委陵菜《药植简编》,白委陵菜、假雪委陵菜《东北草本植志》

地方名 贵州:地蜂子,山峰子(梵净山),三爪金(榕江、麻江),播丝草(剑河),地蜘蛛(都匀),铁枕头(绥阳);其他:白里金瓶。

**功效** 全草:用于肝炎,月经不调,疝痛,关节炎等。

## 7143193

*Potentilla parvifolia* Fisch. --- *Dasiphora parvifolia* (Fisch.) Juzep.

植物名 小叶金露梅《中国植志》

药材名 小叶金老梅《汇编》

地方名 “柏拉”(四川、西藏藏名);内蒙古:“吉吉格乌口阿拉格”(蒙名)。

**功效** 花、叶:利尿消肿。用于寒湿脚气,痒疹。

## 7143194

*Potentilla peduncularis* D. Don

植物名 总梗委陵菜《中国植志》

文献名 长梗委陵菜《汇编》,大理人参果《云南种录》

地方名 云南:[白地榆](大理)。

**备考** 云南大理混称白地榆。

## 7143195

*Potentilla reptans* L.

植物名 匍匐委陵菜《中国植志》

药材名 金棒锤《汇编》

文献名 绢毛细蔓委陵菜《内蒙古植志》,金金棒《陕西中草药》

地方名 老爪柑子花(东北);陕西:小五爪龙(平利),五爪龙(华山)。

**功效** 块根、全草:生津止渴,补阴,除虚热。

## 7143196

*Potentilla reptans* L. var. *sericophylla* Franch. --- *Fragaria filipendula* Hemsl.

植物名 绢毛匍匐委陵菜《中国植志》

文献名 绢毛细蔓委陵菜《秦岭植志》

地方名 陕西:金金棒,金棒锤,五爪龙;青海:“子子酒曾”(藏名)。

**功效** 全草:止血排脓。用于肺瘀血,子宫出血等。

## 7143197

*Potentilla sericea* L. --- *P. dadyphylla* Bunge

植物名 绢毛委陵菜《中国植志》

文献名 白毛小委陵草《东北草本植志》,毛叶委陵菜《中国植志》

地方名 内蒙古:“给拉嘎日·陶来音·汤乃”(蒙名)。

**功效** 全草:止血,止痢,解毒。

## 7143198

*Potentilla stenophylla* (Franch.) Diels

植物名 狭叶委陵菜《中国植志》

药材名 狭叶委陵菜《迪庆藏药》

功 效 全草：用于骨折，食物中毒。

#### 7143199

*Potentilla supina* L. --- *P. paradoxa* Nutt. ex Torr. et Gray

植物名 朝天委陵菜《中国植志》

文献名 卧地委陵菜《种分》，仰卧委陵菜《中药志》，铺地委陵菜《秦岭植志》，伏地委陵菜、背铺委陵菜《内蒙古植志》，野金梅草《东北草本植志》，绿早莲《品种论述》

地方名 [旱莲草]（河北、青海）；黑龙江：野香芳（哈尔滨），鸡毛菜（阿城）；天津：伏地委陵菜；内蒙古：“诺古音-陶来音-汤乃”（蒙名）；江苏：地榆子（徐州）。

备 考 北京等地区有误作旱莲草用者，应注意鉴别。

#### 7143200

*Potentilla supina* L. var. *ternata* Peterm. --- *P. amurensis* Maxim.

植物名 三叶朝天委陵菜《中国植志》

文献名 小花委陵菜《鉴别手册》，东北委陵菜《东北草本植志》

备 考 未开花全草：辽宁曾误作老鹳草入药。

#### 7143201

*Potentilla tanacetifolia* Willd. ex Schlecht. --- *P. filipendula* Willd. ex Schlecht. --- *P. nudicaulis* Willd. ex Schlecht.

植物名 菊叶委陵菜《中国植志》

文献名 艾菊叶委陵菜《内蒙古中草药》，叉菊委陵菜《东检》，蒿叶委陵菜《东北草本植志》，沙地委陵菜《内蒙古植志》

地方名 内蒙古：“希日勒金-陶来音-汤乃”（蒙名），地榆草。

功 效 全草：清热解毒，消炎止血。

#### 7143202

*Potentilla turfosa* Hand.-Mazz.

植物名 簇生委陵菜《中国植志》

药材名 翻背白草《汇编》

文献名 泥沼人参果《云南种录》

地方名 贵州：[白头翁]、涩疙瘩（都匀）。

功 效 全草：利湿，解毒，镇痛。用于痢疾，风湿痛。外用于痔疮。

#### 7143203

*Potentilla yokusaiana* Makino

植物名 曲枝委陵菜《中国植志》

文献名 匍枝委陵菜《东北草本植志》

功 效 全草：用于痢疾腹泻。

#### 7143204

*Prinsepia sinensis* (Oliv.) Oliv. ex Bean

植物名 东北扁核木《中国植志》

药材名 东北蕤核《药植简编》

文献名 辽宁扁核木《中国植志》

地方名 黑龙江：扁胡子；吉林：扁枣胡子，金钢木。

功 效 种子：清热明目。

#### 7143205

*Prinsepia uniflora* Batal.

植物名 蕤核《中国植志》

药材名 蕤仁《雷公炮炙论》、《药典》

文献名 榘、白榘《尔雅》，榘《说文》，是《吴普本草》，蕤子《本草拾遗》，蕤李子《救荒本草》，榘《药性论》，白榘仁、榘仁、美仁子《药材资料汇编》，扁核子《简明中医辞典》，单花扁核木《中国植志》

地方名 马茹（内蒙古、陕西），扁核木（陕西、甘肃），马鹿榘、马力子（西北）；山西：茹茹，茹茹棵；内蒙古：“哈布塔盖-楚莫图-毛都”（蒙名）；陕西：小马茹子；甘肃：[郁仁]，[郁李仁]，马茹子；上海：生仁，逐仁；河南：[山桃]；广东：美人子；贵州：打枪子，狗奶子；其他：芮仁，内人。

功 效 果实：养肝明目，疏风散热。用于目赤肿痛，睑弦赤烂，目暗羞明。

#### 7143206

*Prinsepia uniflora* Batal. var. *serrata* Rehd.

植物名 齿叶扁核木《中国植志》

药材名 蕤仁《药典》

功 效 果实：养肝明目，疏风散热。用于目赤肿痛，睑弦赤烂，目暗羞明。

#### 7143207

*Prinsepia utilis* Royle

植物名 扁核木《中国植志》

药材名 青刺尖《滇南本草》、《汇编》

文献名 总花扁核木《高植图鉴》，蕤核《华北树木志》，梅花刺果《贵州草药》，梅花刺根《贵阳民间药草》

地方名 青刺（四川、云南），打油果（贵州、云南）；贵州：打枪果，打枪子，狗奶子，梅花刺；云南：枪子果、鸡子果、鸡蛋羔（思茅），“阿那斯”（纳西语），枪刺果（曲靖），黑黑果。

功 效 叶：清热解毒，活血消肿。用于淋巴腺炎，腮腺炎，乳腺炎，风湿性关节炎，痔疮，跌打损伤，月经不调，贫血，牙龈出血；果：消食健胃。用于消化不良。

#### 7143208

*Prunus conradinae* Koenhne

植物名 华中樱桃《中国植志》

文献名 单齿樱桃《湖北植志》，康拉樱《经植手册》

地方名 湖北：红若桃（神农架）。

功 效 树皮、叶：杀虫止痒。用于阴道滴虫，疥癣。

#### 7143209

*Prunus consociiflora* Schneid.

植物名 鄂李《汇编》

地方名 宁夏：[郁李仁]；其他：萼李。

功 效 种仁：缓泻，利尿。

#### 7143210

*Prunus hongpiensis* C. L. Li, ined.

植物名 红坪杏《神农架药录》

地方名 湖北：杏子树（神农架）。

功 效 种仁：润肺止咳，平喘，滑肠。

#### 7143211

*Prunus majestica* Koehne

植物名 冬花樱《高植图鉴》

药材名 滇樱桃《汇编》

文献名 大樱《云南种录》，山樱桃《云南药录》

地方名 云南：〔郁李仁〕（临沧），高贵樱。

功效 叶、树皮：用于鼻衄，胃出血；叶：外用于疔疮肿毒；果核：用于麻疹；花：用于百日咳。

#### 7143212

*Prunus salicina* Lindl.

植物名 李《诗经》、《中国植志》

药材名 李仁《鉴别手册》

文献名 甘李根白皮《金匱要略》，李核《吴普本草》，李核人《别录》，李根《本草经集注》，居庆李、居陵嘉《梵书》，嘉庆子《两京记》，李子树《救荒本草》，李子、李子树根《滇南本草》，李根皮《和汉药名汇》

地方名 玉皇李（北京、山西、甘肃、河南），〔郁李仁〕（甘肃、台湾），李仔（福建、台湾），山李子（河南、湖北）；吉林：糖李子树；北京：小核李；河北：香紫李，大红李，青皮红；内蒙古：“乌兰-归勒斯”（蒙名）；甘肃：山李；福建：籽李、血李（泉州）；台湾：李仔叶，郁李人；湖北：苦李子，〔乌梅〕；广东：红李根，红心李根；四川：李子仁；贵州：苏李，黄蜡李；云南：“麻曼勒”（西双版纳傣语），鸡血李，均亭李，麦李，脆李，金沙李。

功效 种仁：活血祛瘀，滑肠，利水。用于跌打损伤，瘀血作痛，大便燥结，浮肿；根：清热解毒，利湿，止痛。用于牙痛，消渴，痢疾，白带。

#### 7143213

*Prunus simonii* Carr.

植物名 杏李《中国植志》

药材名 杏李仁（拟）

文献名 鸡血李《分类草药性》，李仁《鉴别手册》，苦李《中国经植志》，玉皇李《云南种录》

地方名 秋根子（河北、云南）；河北：秋根李（昌黎），红李；四川：大李仁，李子仁，鸡血李根，嘉庆子。

功效 种仁、根、叶：活血，调经，止血。用于吐血，经闭，跌打损伤。

#### 7143214

*Pyracantha atalantioides* (Hance) Stapf

植物名 全缘火棘《中国植志》

药材名 救军粮（湖北、湖南）

地方名 湖北：火棘（利川），木瓜了（恩施、巴东）；湖南：黑胡崽莲（蓝山县瑶名）。

功效 叶、根：解毒拔脓，消肿止痛。用于骨髓炎。

#### 7143215

*Pyracantha crenulata* (D. Don) Roem.

植物名 细圆齿火棘《中国植志》

药材名 红子根《四川中药志》

文献名 薜若《中国植志》，火把果《山东树木志》

地方名 江苏：火棘；四川：红枝子、木瓜子、救荒粮、子儿木（万县），火棘根（蓬溪），水沙子，救兵粮；贵州：救军粮，红子。

功效 根、叶：用于劳伤腰痛，肠风下血，疔疮，盗

汗，火眼。

#### 7143216

*Pyracantha fortuneana* (Maxim.) H. L. Li

植物名 火棘《中国植志》

药材名 火棘《汇编》

文献名 赤果、赤阳子、纯阳子、救军粮、火把果《滇南本草》，红子根、红子《分类草药性》

地方名 救兵粮（湖南、广西、四川、云南）；陕西：救命粮，红果子（陕南）；湖北：木渣果、红果子树（神农架）；湖南：禹余粮，救急粮，饱饭花；四川：水沙子，红米子（会理），救军粮根，火棘根，水渣子；广西：救荒粮；贵州：小红子；云南：豆金娘（昆明），满山红，小花红树，刺果。

功效 果：消积止痢，活血止血。用于消化不良，肠炎，痢疾，小儿疳积，崩漏，白带，产后腹痛；根：清热凉血。用于虚劳骨蒸，潮热，肝炎，跌打损伤，筋骨疼痛，腰痛，崩漏，白带，月经不调，吐血，便血；叶：清热解毒。外用于敷疮疡肿毒。

#### 7143217

*Pyrus betulaefolia* Bunge

植物名 杜梨《诗疏》、《中国植志》

药材名 杜梨《纲目》、《汇编》

文献名 杜、甘棠《诗经》，白棠《诗疏》，杜棠（《尔雅》郭璞注），棠梨、野梨、海棠梨《纲目》，梨丁子《华北树木志》

地方名 内蒙古：“哲日力格-阿力梨-哈达”（蒙名）；山东：杜梨子（莒县），面梨（费县、平邑），大杜梨（平邑），毛杜梨（莱阳），豆梨；河南：土梨；湖南：野梨子。

功效 果实：消食止痢。

#### 7143218

*Pyrus bretschneideri* Rehd.

植物名 白梨《中国植志》

药材名 梨《吴普本草》、《中药大辞典》

文献名 快果《本草经集注》，果宗、玉乳、蜜父《纲目》，糖果根《民药汇编》，梨树、猪嘴梨《山东树木志》

地方名 罐梨（河北、内蒙古），秋白梨（河北、山东）；河北：白挂木，鸭梨，蜜梨，雪花梨；山西：黄梨，油梨，夏梨；内蒙古：白罐梨，白挂梨，热梨，红消梨，“查干-阿力玛”（蒙名）；甘肃：冬果梨（兰州）；山东：莱阳梨，慈梨，窝梨，荏梨，荏平；四川：糖梨根，梨子树（峨眉山）。

功效 果实：生津，润燥，清热，化痰。用于热病津伤烦渴，消渴，热咳，痰热，惊狂，噎膈，便秘；叶：用于食菌中毒，小儿疳气；果皮：清心润肺，降火生津。用于暑热烦渴，咳嗽，吐血，发背，疔疮。

备考 本种在园艺上栽培品种甚多，河北的鸭梨、蜜梨、雪花梨、象牙梨和秋白梨等，山西的黄梨、油梨、夏梨和红梨等均属之。

#### 7143219

*Pyrus calleryana* Decne.

植物名 豆梨《中国植志》

药材名 豆梨《汇编》

文献名 榧《诗经》，山梨、杨榧、鼠梨（陆玕《诗疏》），

罗、阳桃、赤梨(尔雅),鹿梨(图经),树梨、阳桃罗(纲目),梨果(尔雅义疏),酸梨(名实图考)

地方名 野梨(江苏、浙江、江西、湖南、广西),糖梨(陕西、河南);陕西:杜梨;山东:车头梨,绵杜梨,明杜梨;江苏:棠梨针(连云港);湖北:棠梨、托梨(神农架);湖南:“野赖”、“野谢”、“野盖”(侗语);广东:棠梨树、铁梨树(惠阳),鸡公梨;广西:糖梨子(贵县),白蜻蜓(平南),山沙梨(龙州)。

功效 果实:健胃,止痢;根、叶:润肺止咳,清热解毒。用于肺燥咳嗽,急性眼结膜炎。

#### 7143220

*Pyrus calleryana* Decne. var. *koehnei* (Schneid.) Yu

植物名 楔叶豆梨(拟)

药材名 乌梨(广西)

地方名 广西:乌梨树(阳朔)。

功效 根、果实:止泻,止痢。

#### 7143221

*Pyrus hopeiensis* Yu

植物名 河北梨(中国植志)

药材名 红杜梨(华北树木志)

地方名 河北:黑丁子,红丁子;山东:褐梨,明杜梨(莱阳)。

功效 果实:消食止痢。

#### 7143222

*Pyrus lindleyi* Rehd.

植物名 岭南梨(台湾药植志)

地方名 台湾:乌梨。

功效 干果皮:用于痢疾。

#### 7143223

*Pyrus pashia* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 川梨(中国植志)

药材名 川梨(汇编)

文献名 [郁李仁]、梓葵、唐葵、橡梨、唐梨(滇南本草)

地方名 湖北:山麻梨、麻梨子树(神农架);云南:棠梨花,棠梨刺,棠梨,刺梨;西藏:野山查,〔山里红〕。

功效 果实:消食积,化瘀滞。用于肉食积滞,消化不良,泄泻,痛经,产后瘀血作痛。

#### 7143224

*Pyrus pyrifolia* (Burm. f.) Nakai --- *Ficus pyrifolia* Burm. f. --- *Pyrus serotina* Rehd.

植物名 沙梨(中国植志)

药材名 沙梨(汇编)

文献名 梨(别录),梨树(救荒本草),乳梨、消梨、花梨、桑梨、棠梨、御儿梨、茅梨、蜜梨、赤梨、雪梨、青梨、麻梨、雀梨、清水梨、面梨、玉儿梨、老梨(滇南本草),快果、果宗、玉乳、蜜父(纲目),酥梨(山东树木志)

地方名 淡水梨(江苏、广东),紫苏梨(安徽、广东),砀山酥梨(江苏、安徽);浙江:石梨树,乌梨,簪色梨(台州),鹅蛋梨(湖州),黄章梨(诸暨);台湾:水梨,梨子;广西:柳州雪梨,梨子干;四川:糖梨根,昌溪梨、施家梨(苍溪);贵州:金盖梨,木瓜梨(湄潭),麻安梨;云南:宝

珠梨(呈贡)。

功效 果皮:清暑解渴,生津收敛。用于干咳,热病烦渴,汗多等症;根:止咳嗽。

备考 我国长江流域和珠江流域各地栽培的梨的品种,多属于本种。例如安徽宣城的乌梨,砀山的砀酥梨,浙江台州的簪色梨,湖州的鹅蛋梨,诸暨的黄章梨等。

#### 7143225

*Pyrus serrulata* Rehd.

植物名 麻梨(中国植志)

药材名 麻梨(广西药录)

文献名 酸梨(中国经植志)

地方名 四川:黄皮梨,麻梨子;广西:棠梨。

功效 果:健胃,助消化,止渴。

#### 7143226

*Pyrus sinkiangensis* Yu

植物名 新疆梨(中国植志)

功效 果:健胃,止渴,助消化。

#### 7143227

*Pyrus ussuriensis* Maxim.

植物名 秋子梨(中国植志)

药材名 山梨(东北、内蒙古)

文献名 青梨(中国植志),香水梨(科裁)

地方名 酸梨、野梨(河北、内蒙古),花盖梨(东北);辽宁:南果梨(鞍山、海城、辽阳);河北:少果梨(定县),京白梨;内蒙古:“阿古拉·音·阿雨木”(蒙名);甘肃:软儿梨(兰州)。

功效 果实:解热祛痰。用于肺热,咳嗽,痰多。

备考 我国东北、华北和西北各地均有栽培,品种很多,市场上常见的香水梨、安梨、酸梨、沙果梨、京白梨、鸭广梨等均属于本种。

#### 7143228

*Rhaphiolepis indica* (L.) Lindl.

植物名 石斑木(中国植志)

药材名 春花木(陆川本草)

地方名 车轮梅(广东、广西);浙江:铁里木、石柱(临安),细叶萝卜木(云和、龙泉);福建:和尚子樵、狗秆子樵(宁化),灯塔子(顺昌),雷公子(龙溪),狗屎油麻茶(安溪),哥子凿凿(武平);雷公树;台湾:白杏花;广东:子京公(吊罗),凿角;海南:春花;广西:山花木,石棠木,鸟巢树(武鸣),黑口树(藤县)。

功效 根及叶:活血止痛,消肿解毒。用于跌打损伤,骨髓炎。

#### 7143229

*Rhaphiolepis lanceolata* Hu

植物名 细叶石斑木(中国植志)

药材名 细叶春花根(拟)

文献名 细叶春花(药植简编),海南车轮梅(海南植志)

地方名 广西:天花竹(昭平)。

功效 根:用于风湿骨痛。

#### 7143230

*Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino

植物名 鸡麻《中国植志》

药材名 鸡麻《赵氏医贯》、《中药大辞典》

地方名 江苏:水葫芦杆(苏北);浙江:双珠母(临安);河南:水葫芦,山葫芦子。

功效 果实及根:用于血虚肾亏。

#### 7143231

*Rosa acicularis* Lindl. --- *R. acicularis* Lindl. var. *gmelini* C. A. Mey. --- *R. acicularis* var. *taquetii* Nakai --- *R. acicularis* Lindl. var. *setacea* Liou --- *R. acicularis* Lindl. var. *pubescens* Liou

植物名 刺蔷薇《中国植志》

文献名 野蔷薇《药植简编》,多刺大叶蔷薇、柔毛大叶蔷薇、刺果大叶蔷薇、少刺大叶蔷薇《东北木本图志》,小刺大叶蔷薇《中国经植志》,大叶蔷薇《华北树木志》

地方名 吉林:刺玫果。

功效 果:用于坏血病,消化不良;花:收敛。用于急性慢性赤痢,口腔糜烂等。

#### 7143232

*Rosa banksiae* Ait.

植物名 木香花《花镜》、《中国植志》

药材名 木香《名实图考》、《汇编》

文献名 锦绷儿《名实图考》,重瓣白木香《秦岭植志》

地方名 倒钩刺(云南、贵州);江苏:木香藤(崇明),黄木香(南通),锦棚儿;浙江:[白木香];湖南:七姐妹,红根,刺根;广东:四季春,黄丽春;四川:[七里香](成都);云南:双白刺花、白刺花、松刺花(玉溪)。

功效 根、叶:收敛止痛,止血。用于肠炎,痢疾,月经过多,肠出血,小儿腹胀,消化不良,腹泻。外用于外伤出血,疮疖。

#### 7143233

*Rosa banksiae* Ait. var. *normalis* Regel

植物名 单瓣白木香《中国植志》

药材名 香花刺《陕西中草药》

文献名 七里香蔷薇《中药大辞典》,白木香(树分),单瓣木香《云南种录》

地方名 陕西:香水花,〔红花〕,〔七里香〕(陕南),红根〔根皮〕;湖北:木香花、红刺皮、鲜花刺(神农架)。

功效 根皮:活血调经,消肿散瘀。用于月经不调,外伤红肿。

#### 7143234

*Rosa banksiopsis* Bak.

植物名 小尾萼蔷薇《神农架药录》

文献名 拟木香《中国植志》,假木香蔷薇《秦岭植志》

地方名 湖北:小花香刺(神农架)。

功效 根皮:活血祛瘀,调经。

#### 7143235

*Rosa bella* Rehd. et Wils.

植物名 美蔷薇《中国植志》

药材名 山刺玫《内蒙古中草药》

文献名 美丽蔷薇《中国植物图鉴》

地方名 油瓶子(河北、山西、陕西);河北:[金樱子];内蒙古:"哲日利格·札木日"、"高要·蔷薇"(蒙名),油瓶瓶。

功效 叶:解毒消肿;花:理气,活血,调经,消肿,健脾。用于消化不良,气滞腹痛,乳痈,肿毒,月经不调,跌打损伤;果实:益肾,涩精,止泻。用于滑精,尿频,遗尿久泻。

#### 7143236

*Rosa bracteata* Wendl.

植物名 硕苞蔷薇《中国植志》

药材名 硕苞蔷薇《汇编》

文献名 苞蔷薇根《福建民间草药》,大苞蔷薇《中国经植志》

地方名 糖钵(江苏、浙江);浙江:大红袍(杭州),糖杏刺,野毛栗;福建:猴局根,金柿根、七姐妹、模似长春老(福安),猴柿刺(福清、莆田、周宁、霞浦),鸡母屎屈刺(闽北),长毛针(福州、平潭、闽北),猫踏刺,野猴柿,铁门门,刺柿,酒瓮刺,山丁柿,山柿仔,猴绿先坐,白地春,坤嫩;其他:苞蔷薇,猴柿,山麻栗子,糖球子,圆刺菱,毛刺头。

功效 根:益气,健脾,固涩。用于盗汗,久泻,脱肛,遗精,白带;花:润肺止咳。用于肺结核咳嗽;果:健脾利湿。用于痢疾,脚气病。

#### 7143237

*Rosa centifolia* L.

植物名 百叶蔷薇《中国植志》

药材名 洋蔷薇《台湾药植志》

文献名 西洋蔷薇《种分》

功效 花:润肠缓下。

#### 7143238

*Rosa chinensis* Jacq.

植物名 月季花《群芳谱》、《中国植志》

药材名 月季花《纲目》、《药典》

文献名 四季花《益部方物略记》,月月红、胜春、瘦客、斗雪红《纲目》,月贵花、月记《南越笔记》,月月开、月月开根《分类草药性》,长春花《群芳谱》,月季根、月季叶《安徽中草药》

地方名 月月花(四川、贵州、云南),绸春花(福建、台湾);内蒙古:"萨日乃·其格" (蒙名);陕西:月季红,刺玫花(商南、宁陕);上海:小月季,本月季;安徽:刺牡丹;福建:艳雪红,月光花,铜锤子,四季春,〔长春花〕;湖南:勒泡,红刺根(黔阳);广西:四季红(岑溪),〔玫瑰〕(那坡);贵州:月月红根;云南:〔红玫瑰〕(红河)。

功效 花:活血调经。用于月经不调,痛经。

#### 7143239

*Rosa corymbulosa* Rolfe

植物名 伞房蔷薇《中国植志》

地方名 湖北:假金樱子(神农架)。

功效 根:活血调经,止痛;果实:收敛固涩。

## 7143240

*Rosa cymosa* Tratt.

植物名 小果蔷薇《中国植志》

药材名 小果蔷薇《汇编》

文献名 小金樱《生草药性备要》，雀梅、爵梅《纲目拾遗》，红茨藤《分类草药性》，明目茶《树分》，小金英《中药志》，野蔷薇花、白残花《中草药学》

地方名 山木香(江苏、河南)，七姐妹(浙江、江西、福建)；浙江：鱼杆子、青刺(天目山)；安徽：月季红，刺芒苔，蔷薇，刺刺柱，牧羊花，刺叶，绵刺紫；江西：野蔷薇(南昌)，打不死的李远(婺源)，梅拱筋，牛筋，毛毛洪，青丝勒、七皮勒(萍乡)；福建：牛郎爱、七叶钩竿刺(福安)，明目茶；河南：红根；湖南：结茧，狗屎刺，小刺花，刺刺叶，鸡公子，五甲莲，(月月红)；广东：倒钩竿；广西：箭血飞(凤山)，白花刺(乐业)，藤勾椒(玉林)，纽扣子，小刺叶(资源)；四川：小和尚藤，红荆藤。

功效 根：祛风除湿，收敛固脱。用于风湿关节痛，跌打损伤，腹泻，脱肛，子宫脱垂；叶：解毒消肿。外用于痈疽疮疡，烧烫伤。

## 7143241

*Rosa davidii* Crep.

植物名 西北蔷薇《中国植志》

药材名 山刺玫果(拟)

文献名 山刺玫《秦岭植志》，大卫蔷薇《中国经植志》

地方名 甘肃：万朵刺(武都)，花别刺(文县)，牛奶头；宁夏：(金樱子)(宁南)。

功效 果实：益肾，涩精，止泻。用于滑精，尿频，遗尿，久泻。

## 7143242

*Rosa davurica* Pall.

植物名 山刺玫《中国植志》

药材名 刺玫果(东北)

文献名 白刺玫《科种》，达乌里蔷薇《中国经植志》，刺莓果《黑龙江中药》，刺玫花《东北本草》，山刺梅、刺木果《中草药学》，刺玫蔷薇《高植图鉴补编》

地方名 蔷薇果、红根(东北)；黑龙江：野玫瑰(哈尔滨)；吉林：野玫瑰根；内蒙古：“扎木日”(蒙名)；甘肃：万朵刺(武都)，花别刺(文县)。

功效 花：止血，和血，解郁调经。用于吐血，血崩，肋间神经痛，痛经，月经不调；果：健脾胃，助消化。用于消化不良，食欲不振，胃腹胀满，小儿食积；根：止咳祛痰，止痢，止血。用于慢性支气管炎，肠炎，细菌性痢疾，功能性子宫出血，跌打损伤。

## 7143243

*Rosa davurica* Pall. var. *glabra* Liou

植物名 光叶山刺玫《中国植志》

文献名 光叶刺玫蔷薇《东北木本图志》

功效 花：止血，和血，解郁调经。用于吐血，血崩，肋间神经痛，痛经，月经不调。

## 7143244

*Rosa graciliflora* Rehd. et Wils.

植物名 细梗蔷薇《中国植志》

药材名 刺栗子《陕西草药》，野人头《中药大辞典》

功效 果实：止痢、消肿。用于痢疾，痔疮。

## 7143245

*Rosa helenae* Rehd. et Wils.

植物名 卵果蔷薇《中国植志》

文献名 巴东蔷薇《秦岭植志》

地方名 陕西：野牯牛刺；湖北：白香花刺、牛王刺(神农架)，牛黄树刺。

功效 根：活血调经；嫩叶：用于气胀。

## 7143246

*Rosa henryi* Bouleng.

植物名 软条七蔷薇《中国植志》

药材名 软条七蔷薇《湖南药物志》

文献名 秀蔷薇《浙江药植志》，湖北蔷薇《秦岭植志》，华中蔷薇《广西植志》，软条七《湖北植志》

地方名 浙江：山木香；湖北：酒壶芦、香花刺(神农架)；湖南：饭罗泡。

功效 根：祛风除湿，收敛固脱。用于风湿关节痛，跌打损伤，腹泻，脱肛，子宫脱垂。

## 7143247

*Rosa hwangata* Michx.

植物名 黄山蔷薇《中药材科技》

功效 花：理气，活血。

## 7143248

*Rosa koreana* Kom.

植物名 长白蔷薇《中国植志》

地方名 四川：“色娃呷波”(若尔盖藏名)。

功效 花：活血调经；果：健胃消食；根：涩精止带。用于痢疾。

## 7143249

*Rosa kwangtungensis* Yu et Tsai var. *mollis* Metc.

植物名 柔毛广东蔷薇《广西药录》

功效 根：收敛，止泻。用于遗尿，久泻。

## 7143250

*Rosa kweichowensis* Yu et Ku

植物名 贵州缙丝花《中国植志》

地方名 贵州：刺梨(道真)。

功效 根、果：消食健脾，收敛止泻。用于消化不良，肠炎，痢疾，胃痛，胃溃疡。

## 7143251

*Rosa laevigata* Michx.

植物名 金樱子《中国植志》

药材名 金樱子《开宝本草》、《药典》

文献名 刺榆子《蜀本草》，刺梨子、白玉带《开宝本草》，金罌子《梦溪笔谈》，金樱花《日华子本草》，山石榴、山鸡头子《纲目》，糖莺子、塘莺蓬、金樱蕰、脱骨丹《生草药性备要》，糖果《分类草药性》，棠球子《名实图考》，棠球、糖罐《名实图考长编》，金刺角树、刺兰棵子《植物名汇》，灯笼果《药材学》，黄刺果《形性鉴别》

地方名 金英、大营花(福建、台湾)，大金英(广东、福建、台湾)，糖罐子(江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖

南), 糖果子(湖北、广东), 糖罌箬(广东、广西), 糖刺果(湖北、湖南、广西), 刺糖果(广西、四川), 美人脱衣(安徽、贵州), 黄茶瓶(湖北、广东、广西), 小石榴(四川、云南), 野石榴(江苏、云南), 金樱果(湖北、广西); 河北: 酒瓶儿; 山西: 油瓶瓶, 葫瓶瓶; 青海: 马奶头, 山鸡子; 江苏: 野糖罐头(常熟), 糖橘子(苏州、镇江); 浙江: 金壶瓶, 糖罐头(嘉兴、海宁、临安), 糖糖髻(嵊县), 糖糖瓶, 糖钵, 刺糖瓶, 刺瓶果, 刺棚果, 棉花锤, 鸡头刺、长糖钵、大红袍、刺钵(永嘉); 安徽: 蜜糖罐子、油瓶果、油皮花、油饼果子, 药樱; 江西: 罗英(婺源), 硬硬子(吉安), 糖罐子箬, 糖梨子箬, 倒挂金钩; 福建: 大棘子(武平、永定), 刺橄欖(莆田、泉州、晋江), 刺猪, 刺梨, 草鞋刺(闽北、福州、闽侯、闽东), 蜜罐子(罗源、福安、闽北), 鸡母卵(明溪), 鸡堆瓮(政和、松溪), 鸡棚奶(三明), 鸡虱辣(清流), 鸡糖卵、鸡蹄卵、辣安子(宁化), 瓦瓮子、瓦晏子刺(大田), 山鸡囊(永安), 糖菠萝(黔阳), 山橄欖; 湖北: 毛梨果子, 大刺果子, 倒挂刺, 糖罐罐, 红根; 湖南: Y根子(淑浦), 鸭板子, 糖罐刺、鸡桃子(衡山), 鸡粮刺、鸡坝腿、鸡陀牙、刺藤棘(郴县), 刺果果(永顺), 螳螂子树(醴陵), 钉榔(石门), 糖梨桠, 糖鸡桠(常德), 山鸡头; 广东: 金樱箬、糖樱子、雄鸡头、刺髻(广州), 塘莺莺、大金樱、糖罌果、倒贴刺、刺罐、刺仔(潮阳), 糖瓮树(饶平), 刺重仔根(潮安), 糖罌子(五华), 金英藤(阳江), 藤安刺, 塘莺; 广西: 藤钩(玉林), 藤勾子, 螳螂果, 梭梭子(苍梧), 红金樱(百色), 拦路虎(北海), 酸藤根(柳州), 梭梭子, 糖莺果, 冷勒子, 钉铛果, 下山虎; 四川: 和尚头, 糖罐子果, 糖梨, 糖果藤, 糖果树, 刺角, 白刺花, 茨梨; 贵州: 蜂糖罐, 槟榔果; 云南: 刺栗子(文山)。

**功效** 果实: 固精缩尿, 涩肠止泻。用于遗精滑精, 遗尿尿频, 崩漏带下, 久泻久痢; 叶: 解毒消肿。外用于疮疖, 烧烫伤, 外伤出血; 根: 活血散瘀, 祛风除湿, 解毒收敛, 杀虫。用于肠炎, 痢疾, 肾盂肾炎, 乳糜尿, 象皮肿, 跌打损伤, 腰肌劳损, 风湿关节痛, 遗精, 月经不调, 白带, 子宫脱垂, 脱肛。外用于烧、烫伤。

## 7143252

*Rosa longicuspis* Bertol.

**植物名** 长尖叶蔷薇《中国植志》

**药材名** 土金樱子(四川会东)

**文献名** 粉棠果《云南中草药》、长尖蔷薇《西昌中草药》

**地方名** 四川: 倒钩刺, 阎王刺(会东); 云南: 卡卡果(富民、昆明), 哈哈果、金樱子(红河), 倒挂刺、乌龙须、叶上果(曲靖), 刺糖果、粉糖果、刺泡、小鸡花果、香柿花果、常绿蔷薇(红河)。

**功效** 叶上虫瘿果: 收敛止泻, 舒筋活络; 根: 用于肠炎, 痢疾, 跌打; 果: 用于小便频数, 小儿夜尿; 虫瘿: 用于子宫脱垂, 小儿疝气, 风湿, 喘咳。

## 7143253

*Rosa macrophylla* Lindl.

**植物名** 大叶蔷薇《中国植志》

**功效** 果实: 益肾, 涩精, 止泻。用于滑精, 尿频,

遗尿, 久泻。西藏以之代金樱子入药。

## 7143254

*Rosa mairei* Levl.

**植物名** 毛叶蔷薇《中国植志》

**药材名** 栽秧果(西昌中草药)

**功效** 果、根: 清热止泻, 祛瘀止痛。用于痢疾, 胃痛, 骨折。

## 7143255

*Rosa maximowicziana* Regel

**植物名** 伞花蔷薇《中国植志》

**药材名** 伞花刺玫果(拟)

**文献名** 伞花蔷薇《东北木本图志》

**地方名** 刺玫果、牙门太、牙门杠(东北); 辽宁: 钩脚藤, 酸溜溜。

**功效** 果实: 益肾, 涩精, 止泻。

## 7143256

*Rosa multiflora* Thunb.

**植物名** 野蔷薇《群芳谱》、《中国植志》

**药材名** 营实《本经》、《汇编》

**文献名** 墙麻、墙薇、牛棘《本经》, 牛勒、山枣、蔷薇《吴普本草》, 蔷薇、山棘、《别录》, 蔷薇子《本草经集注》, 刺花、刺藜《救荒本草》, 野蔷薇子《东医宝鉴》, 玉鸡苗《清异录》, 阿刺吉[露]、刺红《群芳谱》, 雪客《花镜》, 石珊瑚《纲目拾遗》, 营实墙麻《名实图考》, 蔷薇花露《新本草备要》, 英实、狗蔷薇实《新纲》, 佛见笑(和汉药物学), 叶三子《满洲植录》, 白玉棠《华北树木志》, 白残花《药材资料汇编》, 荷花蔷薇《中国经植志》, 多花蔷薇《汇编》。

**地方名** 七姊妹(广东、云南); 山东: 野棘蓬、刺玫花(平邑), 刺梅花、刺玫塔(苍山), 衙门蓬、山棘子(昆嵛子), 蔷薇果(泰山), 棘子花(烟台); 江苏: 柴米米花(无锡、宜兴), 野蔷薇花; 上海: 蔷薇尖, 白玫瑰; 安徽: 刺麦苔, 刺木苔, 小麦苔, 野月季, 四月梅, 刺果; 江西: 梅蕨箬, 毛毛蕨; 台湾: 小金英; 河南: 狮子玫, 月季莓, 白蕨玫, 章章台, 红根, 香花柞, 展刺台, 刺母台; 湖北: 降龙草, 香花刺, 山玫瑰(神农架); 广东: 细箬仔、细果仔、细叶金樱、赤箬仔(粤北), 七星梅、小金樱、赤箬、钩嘴勒(惠阳); 云南: 倒钩刺(曲靖), 和尚头。

**功效** 根: 祛风活血, 调经固涩。用于风湿关节痛, 跌打损伤, 月经不调, 白带, 遗尿。外用于烧烫伤, 外伤出血; 叶: 清热解毒。外用于痢疾疮疡; 花: 消暑解渴, 止血。用于暑热胸闷, 口渴, 吐血, 截疟; 果: 祛风湿, 利关节。用于风湿关节痛, 肾炎水肿。

## 7143257

*Rosa multiflora* var. *brachacantha* (Focke) Rehd. et Wils.

**植物名** 短刺野蔷薇《云南种录》

**药材名** 红刺藤(四川)、《汇编》

**地方名** 四川: 小和尚头, 细叶红根。

**功效** 根: 行气, 活血, 调经。用于闭经, 痔疮, 跌打损伤, 风湿疼痛。

## 7143258



*Rosa multiflora* Thunb. var. *carnea* Thory R.  
*multiflora* Thunb. var. *platyphylla* Thory

植物名 七姊妹《群芳谱》、《中国植志》

药材名 十姊妹《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 佛见笑《纲目拾遗》, 荷花蔷薇《山东网本志》, 阔叶十姐妹《云南种录》

地方名 福建: 姊妹花。

功效 根及叶: 用于黄疸, 痞块。

#### 7143259

*Rosa multiflora* Thunb. var. *cathayensis* Rehd. et Wils.  
--- *R. cathayensis* (Rehd.) Bailey

植物名 粉团蔷薇《中国植志》

药材名 红刺玫(陕西)

文献名 营实、墙薇、墙麻、牛棘《本经》, 蔷薇、牛勒、山枣《吴普本草》, 蔷薇、山棘《别录》, 刺花《纲目》, 野蔷薇《百草镜》, 荷花蔷薇《中国经植志》, 多花蔷薇《中药大辞典》

地方名 陕西: 红刺梅; 浙江: 白残花, 野蔷薇花; 福建: 七姊妹; 湖北: 红香花刺根(神农架); 广东: 佛见笑; 广西: [金英子](隆林), 蔷薇花(南宁), 华蔷薇, 野玫瑰。

功效 花: 消暑热, 化湿浊, 顺气和胃。用于暑热胸闷, 口渴, 呕吐, 不思饮食, 口疮口糜; 根: 活血通络。用于关节炎, 面神经瘫痪。

#### 7143260

*Rosa multiflora* Thunb. var. *villosula* Metc.

植物名 毛野蔷薇《广西植志》

文献名 毛蔷薇《药植简编》

功效 花、果: 利尿, 泻下, 调经。

#### 7143261

*Rosa odorata* (Andr.) Sweet

植物名 香水月季《中国植志》

文献名 酴醾、黄酴醾《名实图考》, 芳香月季《高植图鉴》, 香蔷薇《华北树木志》

地方名 广西: 玫瑰花(南宁), 小猫爪草(乐业); 云南: 生胎果(峨山), 大卡卡果(澄江), 固公果(华宁、通海)。

功效 根、叶: 调和气血, 止痢, 止咳, 定喘, 消炎, 杀菌。用于小儿疝气, 哮喘, 腹泻, 白带, 痢疾; 果实: 用于月经不调。

#### 7143262

*Rosa odorata* (Andr.) Sweet var. *gigantea* (Crep.) Rehd. et Wils.

植物名 大花香水月季《中国植志》

文献名 白蔷薇《名实图考》, 大花芳香月季《江苏植志》, 打碗花《滇南本草》整理本, 打破碗《云南种录》

地方名 生胎果、大卡卡果、固公花、固公果(西南); 云南: 金樱子(昆明), 黄刺梨, 卡卡果(澄江)。

功效 根、叶、虫瘿: 调气和血, 止痢, 止咳, 定喘, 消炎, 杀菌。用于痢疾, 小儿疝气, 哮喘, 腹泻, 白带。外用于疮、痢疾。

#### 7143263

*Rosa odorata* (Andr.) Sweet var. *erubescens* (Focke) Yu et Ku --- *R. odorata* f. *erubescens* (Focke) Rehd. et Wils.

植物名 粉红香水月季《中国植志》

文献名 红花香水月季《中国树木志》, 玫瑰红蔷薇《云南种录》, 紫花香水月季《树分》

功效 云南作金樱子用。果实: 益肾, 涩精, 止泻。用于滑精, 尿频, 遗尿, 久泻。

#### 7143264

*Rosa odorata* (Andr.) Sweet var. *pseudindica* (Lindl.) Rehd.

植物名 橘黄香水月季《中国植志》

文献名 佛见笑《名实图考》, 橙黄香水月季《树分》, 黄蔷薇《云南种录》

功效 果实: 云南作金樱子用。

#### 7143265

*Rosa omeiensis* Rolfe

植物名 峨眉蔷薇《中国植志》

药材名 刺石榴《陕西中草药》

文献名 长白蔷薇《高原中草》, 蔷薇花《民族药志》, 蔷薇果《青海中草》

地方名 山石榴(陕西、四川、云南); 湖北: 山金樱子(神农架); 四川: “色薇美多”、“色娃呼波”(藏名); 云南: 酒瓶果。

功效 果: 止血, 止痢。用于吐血, 衄血, 崩漏, 白带, 痢疾

#### 7143266

*Rosa omeiensis* Rolfe f. *pteracantha* Rehd. et Wils.

植物名 扁刺峨眉蔷薇《中国植志》

文献名 翅刺峨眉蔷薇《四川中药志》

地方名 四川: 山石榴。

功效 根、果实: 收敛止血, 止泻。用于便血, 崩漏, 久痢, 久泻。

#### 7143267

*Rosa roxburghii* Tratt. --- *R. forrestii* Focke

植物名 缙丝花《名实图考》、《中国植志》

药材名 刺梨子《汇编》

文献名 送春归《宦游笔记》, 刺梨《纲目拾遗》, 刺藤《名实图考》, 茨梨子根《天宝本草》, 黄梨《科种》, 野蔷薇实(徐《生药》)

地方名 湖北: 做丝碗, 山刺梨子(利川), 月月红(恩施); 湖南: 油刺果; 广西: 金樱果(南丹); 四川: 文先果(南川), 文仙果、刺榔榔根(西昌), 刺棒锤, 茨李, 旁草, 木梨子; 贵州: 茨梨根; 云南: 野蔷薇。

功效 果: 解暑, 消食。用于维生素C缺乏症; 根: 消食健脾, 收敛止泻。用于食积腹胀, 痢疾, 肠炎, 白汗盗汗, 遗精, 白带, 月经过多, 痔疮出血。

#### 7143268

*Rosa roxburghii* Tratt. f. *normalis* Rehd. et Wils.

植物名 单瓣缙丝花《中国植志》

药材名 刺梨子(四川)

文献名 茨梨《宦游笔记》, 野刺梨、金樱果《广西植

录)

地方名 陕西:野石榴(汉中、宁强、勉县),刺石榴(勉县),刺梨(南郑)。

功效 果:解暑,消食。用于维生素C缺乏症。

7143269

*Rosa rubus* Levl. et Vant.

植物名 悬钩子蔷薇《中国植志》

文献名 茶藨花《湖北植志》,和尚头刺藤《云南种录》

地方名 倒挂刺、小果蔷薇(广西、四川);陕西:茶藨花;四川:和尚头。

功效 根:收敛涩阻,用于泻痢。

7143270

*Rosa rugosa* Thunb.

植物名 玫瑰《群芳谱》、《中国植志》

药材名 玫瑰花(姚可成《食物本草》)、《药典》

文献名 徘徊花《群芳谱》,离娘草《花镜》,玫瑰露《纲目拾遗》,赤蔷薇《新纲》

地方名 红玫瑰花(山东、江苏、浙江、安徽),红玫瑰(浙江、江苏、安徽);河北:刺玫花;内蒙古:“札木日-其其格”、“萨日钙-其其格”(蒙名);青海:“赛永”(藏名),刺玫;浙江:笔头花,潮花;安徽:红花刺木苔。

功效 花蕾:行气解郁,和血,止痛。用于肝胃气痛,食少呕恶,月经不调,跌扑伤痛。

7143271

*Rosa saturata* Baker

植物名 大红蔷薇《中国植志》

地方名 湖北:山刺莓花(神农架)。

功效 根皮:活血祛瘀,调经止痛。

7143272

*Rosa sericea* Lindl.

植物名 绢毛蔷薇《中国植志》

药材名 山刺梨《西藏中草》

地方名 青海:“赛哇”(藏名),刺梨根;西藏:“色瓦”(藏名)。

功效 根、果实:消食健脾,止痢。用于积食腹胀,肠鸣腹泻;花:用于胆囊炎,头痛恶心,沙眼。

7143273

*Rosa sertata* Rolfe

植物名 钝叶蔷薇《中国植志》

地方名 湖北:小酒壶芦(神农架);云南:〔金樱子〕(玉龙山)。

功效 根:用于月经不调,痛风,无名肿毒;果实:用于遗精。

7143274

*Rosa setipoda* Hemsl. et Wils.

植物名 刺梗蔷薇《中国植志》

文献名 黄花蔷薇《高原中草》,刺毛蔷薇《秦岭植志》,齿萼蔷薇《湖北植志》,刺柄蔷薇《拉汉种称》

地方名 湖北:糖罐子(神农架);四川:“色清”(若尔盖藏语)。

功效 果实:消食健脾;根:清热发乳,止泻。用于

红崩白带。

7143275

*Rosa sikangensis* Yu et Ku

植物名 川西蔷薇《中国植志》

药材名 蔷薇花《迪庆藏药》

文献名 西康蔷薇《迪庆藏药》

功效 花瓣:降气,清胆,活血,调经,收敛血管。用于“龙”病,“赤巴”病,肺热咳嗽,头晕,吐血,脉管瘀痛,月经不调,赤白带下,风湿,痢疾;果:清肝热,消食积。

7143276

*Rosa sweginzowii* Koehne

植物名 扁刺蔷薇《中国植志》

文献名 裂萼蔷薇《青藏药图》,强壮蔷薇《云南种录》

地方名 陕西:油瓶子(秦岭),野刺玫(佛坪);宁夏:〔金樱子〕;青海:“赛果”(藏名)。

功效 果实:消食,健脾,止泻。

7143277

*Rosa taiwanensis* Nakai

植物名 小金樱《中国植志》

药材名 台湾小金樱(拟)

文献名 台湾蔷薇《中草药》

地方名 台湾:小金英,金英头。

功效 果、根:用于淋病,月经不调,打伤,遗精。

7143278

*Rosa taronensis* Yu et Ku

植物名 求江蔷薇《中国植志》

药材名 蔷薇花《迪庆藏药》

功效 花瓣:降气,清胆,活血,调经,收敛血管。用于“龙”病,“赤巴”病,肺热咳嗽,头晕,吐血,脉管瘀痛,月经不调,赤白带下,风湿,痢疾;果:清肝热,消食积。

7143279

*Rosa xanthina* Lindl.

植物名 黄刺玫《中国植志》

文献名 黄刺莓《高植图鉴》,黄刺梅《东北木本图志》,山刺玫《内蒙古中草药》

地方名 山西:大马茄子,野蔷薇;内蒙古:马茄子,重瓣黄刺玫,“格日音·希日·札木尔”(蒙名)。

功效 花、果:理气,活血,调经,消肿。

7143280

*Rosa xanthina* Lindl. f. *normalis* Rehd. et Wils. --- *R. xanthina* Lindl. f. *spontanea* Rehd.

植物名 单瓣黄刺梅《中国植志》

功效 果实:含维生素C,医药工业用。

7143281

*Rubus adenophorus* Rolfe

植物名 腺毛莓《中国植志》

药材名 红牛毛刺《汇编》

文献名 雀不站、红毛草《汇编》

功效 根、叶:和血理气,止痛,止痢。用于瘀伤疼

痛,吐血,痢疾,疟疾;叶:用于黄水疮。

#### 7143282

*Rubus alceaefolius* Poir. --- *R. fimbriifolius* Focke --- *R. hamnanensis* Focke

植物名 粗叶悬钩子《中国植志》

药材名 大叶蛇泡藤《汇编》

文献名 流苏莓《云南种录》,大敷根、十月泡《广西兽药》,破布刺《广西药录》,海南悬钩子《海南植志》,大猛虎、黄牛泡藤《药植简编》

地方名 八月泡(湖南、广东、广西),狗头泡、八月坡(湖南、广东),大破布刺、老虎泡(广东、广西);湖南:大米泡;广东:大禾泡,虎掌笏,九月泡,白面老虎;广西:大勒潭(桂林),大力牛、鹅鞋风(北流),大暗潭(容县),牛尾泡(乐业),牛大泵,鸡朴莲(博白),牛暗桐(岑溪)。

功效 根及叶:清热利湿,活血祛瘀。用于肝炎,肝脾肿大,口腔炎,乳腺炎,痢疾,肠炎,跌打损伤,风湿骨痛,外伤出血。

#### 7143283

*Rubus alexeterius* Focke

植物名 刺萼悬钩子《中国植志》

文献名 粉茎覆盆子《云南种录》

地方名 云南:小红袍。

功效 根:固涩,止泻,调经。用于肠风下血,红血痢,筋骨痛,月经不调,盗汗,倒经,小儿百日咳,黄水疮,肾炎水肿,挫伤,黄疸。

#### 7143284

*Rubus amabilis* Focke

植物名 秀丽莓《中国植志》

文献名 美丽悬钩子《华北经植志要》

地方名 青海:“甘打嘎日”(藏名);湖北:倒扎龙(神农架);其他:倒毒散。

功效 根:活血止痛,清热解毒;茎、枝:用于感冒,肺热咳嗽。

#### 7143285

*Rubus amphidasys* Focke ex Diels

植物名 周毛悬钩子《中国植志》

文献名 全毛悬钩子《浙江天目药志》

地方名 浙江:珍珠莓(泰顺);广西:出山虎(大瑶山),顿牛;其他:红毛猫耳扭。

功效 全株:用于妇女产后受风,月经不调,四肢麻木。

#### 7143286

*Rubus aurantiacus* Focke

植物名 橘红悬钩子《中国植志》

文献名 藏悬钩子《药植简编》

功效 全株:用于感冒。

#### 7143287

*Rubus bambusarum* Focke

植物名 竹叶鸡爪菜《中国植志》

文献名 短柄鸡爪菜《树分》

地方名 湖北:鹰爪菜(神农架),老林茶。

功效 叶:用于肺病。

#### 7143288

*Rubus biflorus* Buch.-Ham. ex Smith

植物名 粉枝莓《中国植志》

文献名 二花悬钩子《秦岭植志》,二花莓《经济手册》,“甘打嘎日”(藏名)《青藏药图》

功效 茎、枝:用于感冒,肺热咳嗽。

#### 7143289

*Rubus blinii* Levl.

植物名 五爪风《高植图鉴》

药材名 五爪风《四川中药志》

文献名 培氏悬钩子《四川中药志》

地方名 四川:五爪藤。

功效 全株:舒筋活络,行血止痛。用于跌打损伤,风湿疼痛,腓肠肌痉挛。

#### 7143290

*Rubus buergeri* Miq.

植物名 寒莓《中国植志》

药材名 寒莓《本草会编》、《汇编》

文献名 蓬蘽《本经》,陵藎、阴藎《别录》,割田藎《纲目》,大叶寒莓《台湾木本植志》,岗粘子《广西药录》

地方名 猫儿扭(浙江、湖北);浙江:冬扎公(乐清、宁波),猫儿丑,山纸朋(温州),铁高杯(平阳),虎脚丑,聋朵公,咯咯红;江西:皱草藤,水漂沙,寒刺泡;福建:〔肺形草〕(永泰、福州),肺痢草(闽清),大叶漂(清流),大号刺波,大号山刺波,大号寒莓(安溪、永春),毛底冬菠(松溪、政和),倒地冬菠(福鼎),倒陈冬莓(福安),鸡公草(建瓯),冬菠藤(南平、周宁),老虎菠(大田),老虎刺,乔果、毛桃根(三明),冬波;湖北:〔过江龙〕,虎角扭,地王泡(神农架);其他:地莓。

功效 根、叶:清热解毒,活血止血;根:用于黄疸型肝炎,胃痛,月经不调,产后发热,小儿高热,痔疮;叶:用于肺结核咯血。外用创伤出血,黄水疮。

#### 7143291

*Rubus chingii* Hu --- *R. palmatus* auct. non Thunb.

植物名 掌叶复盆子《中国植志》

药材名 覆盆子《别录》、《药典》

文献名 覆盆子《别录》,乌藟子《纲目》,西国草《海上集验方》,插田藟、乌藟子、毕楞伽、缺盆、大麦莓《新纲》,秦氏悬钩子《中国植物图鉴》,小托盘《中药材手册》,藟子《简明中医辞典》,华东覆盆子《汇编》

地方名 牛奶莓(浙江、安徽);浙江:种田泡,翁扭,牛奶母,牛奶糖(天台),牛奶果,牛奶格公(乐清),牛奶蒙,大号角公,细叶角公,百公丑,细叶角公丑(遂昌),木藟,槭叶莓;安徽:大头莓,头莲果子,耘田草;江西:笏藟子;福建:馒头菠(福安),金腰带,刺葫芦;湖北:大麦泡;其他:枸朴子,本莓。

功效 果实:益肾,固经,缩尿。用于肾虚遗尿,小便频数,阳痿早泄,遗精滑精。

#### 7143292

*Rubus chroosepalus* Focke

植物名 毛萼莓《中国植志》

文献名 毛萼悬钩子、~~紫萼~~悬钩子《秦岭植志》，毛萼刺《峨眉药植资源》，紫萼 西植录》  
地方名 湖北：菟麦 是。  
功效 根：活血行 失打损伤。

## 7143293

*Rubus cochinchinensis*

植物名 越南悬钩子 《志》  
药材名 蛇泡藤《海阳》  
文献名 越南山泡《汇编》 蛇泡藤《高植图鉴》  
地方名 广东：小猛虎；海南：鸡足刺，猫枚藤；广西：[五加皮]（容县），五爪龙（贵县），假五加皮（南宁），红藤钩（博白），五爪风（武鸣）。  
功效 根、叶：驱风，除湿，行气。用于腰腿痛，四肢痹痛，风湿骨痛；叶：用于打打肿痛。

## 7143294

*Rubus cockburnianus* Hemsl.

植物名 华中悬钩子《中国植志》  
文献名 琐梅、钻地风、疏风草《滇南本草》，覆盆子、黑枝黑锁梅《名实图考》，卞氏悬钩子《中国植志》，高山覆盆子《云南种录》  
功效 果：益肾补肝，明目，兴阳；根：洗疥癬疮。

## 7143295

*Rubus columellaris* Tutchet

植物名 小柱悬钩子《中国植志》  
地方名 三叶吊杆泡（广东、广西）。  
功效 根：外用于跌打损伤。

## 7143296

*Rubus corchorifolius* L. --- *R. althaeoides* Hance

植物名 山莓《尔雅》，中国植志》  
药材名 山莓《汇编》  
文献名 箭《尔雅》，木莓《尔雅》郭璞注），悬钩子《本草拾遗》，树莓《日华子本草》，沿钩子《日用本草》，蕨子《纲目》，木莓根《乾坤生意》，三月蕨根《草木便方》，山莓悬钩子《华北树木志》  
地方名 山抛子（江苏、广西、贵州），三月泡（福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州），吊杆泡（广东、广西），对嘴泡（四川、贵州），树泼泼（江苏、湖南），栽秧泡（湖北、贵州）；河北：山芦子；陕西：大麦泡（丹凤），泡儿刺（平利）；江苏：树泡泡；江西：高脚蒟田泡；福建：三尖蒟、布田蒟（古田），刺葫芦（莆田、仙游），大含蒟（安溪），大本火梅刺（南安、惠安），桑树漂（宁化、清流），[覆盆子]（大田、清流），猪母苞（三明），山泡刺（南平），馒头蒟，高脚波；湖北：山泡，山扬泡，老鸦泡，插秧泡，麦泡、荞麦泡子（神农架）；湖南：三叶泡，九蕊泡，四月泡，伏盆子，掉泡，山泡子，阿泡刺，三月乌泡，插田泡、树乌泡（衡山），龙船泡；广东：五月泡、出罗蒟（粤北）；广西：三角刺（临桂），吊尿泡（兴安），鸡心暗聚（藤县）；四川：三月蕨，蕨秧蒟，对嘴蒟，黄莓，蕨秧泡；贵州：猫爪刺（惠水），牛奶泡（都匀），小封喉（瓮安），撒秧泡。  
功效 根、根皮、茎叶：消食积，止泻痢，解毒，活血，调经，止血。用于食积泡胀，肚痛，腹泻，红、白痢疾，红崩带下，跌打损伤，黄水疮。

## 7143297

*Rubus coreanus* Miq.

植物名 插田泡《中国植志》  
药材名 覆盆子《别录》，《中药大辞典》  
文献名 西国草《别录》，毕楞伽《图经》，大麦莓《摘元方》，插田蕨《纲目》，高丽悬钩子《华北经植志要》  
地方名 [过江龙]（陕西、湖北、湖南），乌沙莓（浙江、湖北）；陕西：菜子泡，回头泡、两头忙（柞水），荞麦泡、刺桑椹（平利），白龙须，朝鲜悬钩子，刺泡（勉县、宁陕、石泉），黑帽子；浙江：胡须苗；福建：猪母苞（三明）；湖北：猛子刺（神农架）；湖南：棟乌泡，爬船莓，爬船泡，乌泡，龙船泡刺，白灰刺，大样酸鸡蕨，红刺台，天呈棘，和尚子，白疫子；四川：乌泡倒触伞，两头草，乌龙毛，倒生根（重庆）；其他：端阳莓，荞麦抛子。  
功效 果：补肾固精。用于阳痿，遗精，遗尿，白带；根、不定根：调经活血。

## 7143298

*Rubus coreanus* Miq. var. *tomentosus* Card.

植物名 毛叶插田泡《中国植志》  
文献名 毛插田蕨《药植简编》，白绒覆盆子《秦岭植志》  
地方名 陕西：刺泡花（宁陕、石泉）；甘肃：乔莓子、倒牵牛（武都），莓儿刺（文县）；湖北：荞麦泡，天搭桥，龙船泡（鄂西南），小麦泡、过江龙（神农架）；广西：灰金营（德保）。  
功效 果：补肾固精，兼治脑神经衰弱。

## 7143299

*Rubus crataegifolius* Bunge

植物名 牛叠肚《中国植志》  
药材名 托盘（东北、山东）、《汇编》  
文献名 蓬蘽《名实图考》，沙窝《树分》，蓬蘽悬钩子《东北本本图志》，山楂叶悬钩子《汇编》  
地方名 马林果（东北、山东）；河北：牛迭肚；山东：山坡门头（昆崙山、文登、荣成），红眼儿（崂山），菠萝盘（五莲），安门头，红眼耳，拉牛珠；其他：树莓，寒梅，割田蕨。  
功效 果：补肝肾，缩小便。用于阳痿，遗精，尿频，遗尿。

## 7143300

*Rubus delavayi* Franch.

植物名 三叶悬钩子《中国植志》  
药材名 小倒钩刺《汇编》  
文献名 狭叶悬钩子《西昌中草药》，三叶蕨《云南种录》，德氏悬钩子《中国经植志》，倒钩刺《云南中草药》，小倒挂刺《药植简编》  
地方名 四川：拌脚刺，小黄泡刺（会理）；云南：小鸟泡（昆明），小姐药、[钻地风]、黄金锁梅、小黑锁梅、小黄药、老虎刺（富民），小野花椒、小倒挂龙刺、小飞龙斩血、鸡脚琐莓、[刺三加]（红河），小鸡脚锁梅（曲靖），[刺黄连]（楚雄），刺茶（丽江），散花草（昭通）。  
功效 叶、根、全株：清热解毒，除湿止痢，驱蛔。用于扁桃腺炎，急性结合膜炎，痢疾，疮疡，风湿性关节

炎,驱蛔虫。外用丁腮腺炎,乳腺炎,疮疡肿毒。

#### 7143301

*Rubus doyonensis* Hand. -Mazz.

植物名 白薹《中国植志》

药材名 白薹《云南中草药》

文献名 贡山莓《云南种录》

功效 全株:解毒。用于雪上一枝蒿、草乌、附片等中毒。

#### 7143302

*Rubus ellipticus* Smith

植物名 椭圆悬钩子《中国植志》

药材名 黄蘗根《四川中药志》

文献名 黄泡、老虎泡《分类草药性》,黄龙须《名实图考》,切头悬钩子《中药大辞典》,红毛悬钩子《云南种录》

地方名 四川:老虎蘗;其他:黄喜马莓,黄泡叶。

功效 根:祛风除湿,清热解毒。用于吐血,瘰癧;叶:杀虫止痒。

#### 7143303

*Rubus eucalyptus* Focke

植物名 桉叶悬钩子《中国植志》

地方名 贵州:六月泡。

功效 叶:消炎生肌。

#### 7143304

*Rubus eustephanus* Focke ex Diels

植物名 大红泡《中国植志》

药材名 大红泡《湖南药物志》

文献名 大红蘗《中国经植志》

地方名 湖南:帽子泡;四川:大红袍。

功效 根:用于百日咳。

#### 7143305

*Rubus feddei* Levl. et Vant.

植物名 黔桂悬钩子《中国植志》

文献名 费狄悬钩子《广西药录》

地方名 广西:乌血龟(凌云),毛果藤(德保)。

功效 根、叶:清热利胆。用于急性黄疸型肝炎。

#### 7143306

*Rubus flosculosus* Focke

植物名 弓茎悬钩子《中国植志》

文献名 弓茎莓《经植手册》,小花梅《神农架药录》

地方名 河南:山挂牌条;湖北:刺泡《神农架》。

功效 果实:补肾固精;根:调经,活血,止痛;幼枝:祛风胜湿。

#### 7143307

*Rubus fockeanus* Kurz --- *R. loropetalus* Franch.

植物名 凉山悬钩子《中国植志》

文献名 倒牵牛《峨眉药植资源》

功效 根、叶:清热解毒。

#### 7143308

*Rubus formosensis* Ktze. --- *R. nantoensis* Hayata

植物名 台湾悬钩子《中国植志》

文献名 南投悬钩子《台湾药植志》

功效 根:用于牙痛。

#### 7143309

*Rubus hanceanus* Ktze. --- *R. fordii* Hance

植物名 华南悬钩子《中国植志》

文献名 西江悬钩子《广西植录》,白面水鸭《药植简编》

功效 根、叶:用于跌打肿痛,刀伤出血,月经不调,产后恶露不尽。

#### 7143310

*Rubus hastifolius* Levl. et Vant. --- *Rubus rufo-lanatus* Chang

植物名 戟叶悬钩子《中国植志》

药材名 红绵藤《汇编》

文献名 止血灵《药植简编》

功效 叶、枝:收敛止血。用于内外伤出血。

#### 7143311

*Rubus henryi* Hemsl. et Ktze.

植物名 鸡爪茶(湖北)、《中国植志》

文献名 亨利莓《经植手册》

地方名 湖北:老林茶(兴山);贵州:“走牛修勒”(雷公山苗语);云南:“哈期郎火”(元江哈尼语)。

功效 根:除风湿,舒筋络。用于风湿骨痛,跌打损伤。

#### 7143312

*Rubus hirsutus* Thunb.

植物名 蓬蘽《中国植志》。

药材名 蓬蘽《本经》、《汇编》

文献名 陵藁、阴藁《别录》,菠盘、托盘《救荒本草》,割田藁《纲目》,三月泡《汇编》,刺菠《闽东本草》

地方名 浙江:饭消扭(临安、丽水),地苗,田角公(临安),郭公,麦条草;福建:空腹莲,空腹妙,饭包菠,雅旱(罗源);其他:企晃刺,野杜利,竖藤火梅刺。

功效 叶:消炎,接骨。用于断指;根:祛风活络,清热镇凉。用于小儿惊风,风湿筋骨痛。

#### 7143313

*Rubus hirsutus* Thunb. var. *glabellus* (Focke) Wuzhi

植物名 空心泡《神农架药录》

地方名 湖北:端阳泡、大麦泡(神农架)。

功效 根、叶:清热解毒。

#### 7143314

*Rubus ichangensis* Hemsl. et Ktze.

植物名 宜昌悬钩子《中国植志》

药材名 黄泡子《汇编》

文献名 黄蘗子《树分》,宜昌莓《药植简编》

地方名 湖南:小米泡;广西:独叶龙(乐业);四川:山泡刺藤,黄泡叶,牛尾泡,狗屎泡,红五泡。

功效 根:通经散瘀。用于吐血,痔疮出血;叶:用于黄水疮,温热,疮毒等症。

#### 7143315

*Rubus idaeopsis* Focke

植物名 拟覆盆子《中国植志》

药材名 西藏覆盆子《汇编》

文献名 椰田蕨《云南种录》

功效 果实:西藏地区以其果实作覆盆子入药。

#### 7143316

*Rubus idaeus* L.

植物名 覆盆子《中国植志》

药材名 覆盆子《内蒙古中草药》

文献名 绒毛悬钩子《华北经济志要》,红覆盆子《药学名词合编》,盆子《和汉药标本目录》,红覆盆子实、欧覆盆子、悬钩子(徐《生药》),树莓《山东树木志》,毛悬钩子、珍珠杆《药典》

地方名 内蒙古:“干达嘎力”(蒙名)。

功效 果实:补肝肾,明目,缩小便。用于视物不清,多尿遗尿,阳痿遗精等症。

#### 7143317

*Rubus innominatus* S. Moore

植物名 白叶莓《中国植志》

药材名 白叶莓《浙江药植志》

文献名 白叶悬钩子《秦岭植志》,无名黄龙须《云南种录》

地方名 陕西:刺泡。

功效 根:用于小儿风寒咳嗽。

#### 7143318

*Rubus innominatus* S. Moore var. *kuntzeanus* (Hemsl.)

Bailey

植物名 无腺白叶莓《中国植志》

药材名 早谷蕨《浙江天目药志》

文献名 早谷莓《广西植志》,白叶莓《药植简编》

地方名 湖北:包谷泡(神农架);广西:早谷泡。

功效 根:止咳,平喘。用于小儿风寒咳逆,气喘。

#### 7143319

*Rubus inopertus* (Diels) Focke

植物名 红花悬钩子《中国植志》

文献名 脉翅悬钩子《神农架药志》

地方名 湖北:刺泡子、菜子泡(神农架)。

功效 根:活血散瘀;果实:生津止渴。

#### 7143320

*Rubus irenaeus* Focke

植物名 灰毛泡《中国植志》

药材名 地五泡藤《贵州草药》

地方名 湖南:蒲团叶,路路泡,白叶子泡,藤覆盆;贵州:“家正牛”(苗名)。

功效 根、叶:理气止痛,散毒生肌。用于气痞腹痛,口角疮。

#### 7143321

*Rubus komarovi* Nakai

植物名 绿叶悬钩子《中国植志》

地方名 四川:“干楂杂拉”(若尔盖藏名)。

功效 全株:收敛止血。用于感冒发烧,肝炎,肺炎,吐血,鼻血,月经不调;果:用于风湿疼痛,补肝肾益肾,涩精缩尿。

#### 7143322

*Rubus kwangsiensis* L.

植物名 广西悬钩子《中国植志》

地方名 广西:鸡心勒、出山虎(平南),鸡仔力(昭平),旁培勒(博白),吊边葱(藤县),上吊边(北流);贵州:三月泡,牛奶猛(安顺),牛奶泡(都匀),对嘴泡(罗甸),撒秧泡(独山)。

功效 根、叶:用于牙痛,哮喘,疮肿,跌打肿痛,骨折,筋骨痛。

#### 7143323

*Rubus lambertianus* Ser.

植物名 高粱泡《中国植志》

药材名 高粱泡《汇编》

文献名 蓬莖《本经》,陵藁、阴藁、寒莓《本经》,细烟筒子《广西植志》,山泡刺藤《台湾药植志》

地方名 酸泡(湖南、广西);江苏:上棚莓(宜兴),倒龙盘(句容);浙江:十月红(临安),寒扭(泰顺、丽水、云和、武义),寒苗(温州、泰顺),山枝蓬(永嘉),冬牛;江西:倒水莲,寒泡刺(婺源、德兴),乌泡勒(莲花),乌泡泡(吉安),乌壳子(吉水),小漂沙(景德镇),刺泡根、温扭(德兴);福建:冬菠;台湾:刺五泡藤;湖南:刺泡;广西:黄水泡,狗屎泡(资源);四川:药黄泡;其他:十月苗,倒盘尤。

功效 根、叶:活血调经,消肿解毒。用于产后腹痛,血崩,产褥热,痛经,坐骨神经痛,风湿关节痛,偏瘫;叶:用于创伤出血。

#### 7143324

*Rubus lambertianus* Ser. var. *glaber* Hemsl. --- *R. hakonensis* Franch. et Sav. --- *R. lambertianus* Ser. var. *hakonensis* (Franch. et Sav.) Rehd.

植物名 光滑高粱泡《中国植志》

药材名 黄水蕨《贵州民间药物》

文献名 光叶高粱泡《秦岭植志》,山泡刺藤《中药大辞典》,高粱泡《高植图鉴》,黄泡刺悬钩子《陕西中草药》

地方名 陕西:红娘藤、三月锦(陕南),黄泡刺(略阳);贵州:黄泡根,黄莓刺(遵义),小米蕨,小米泡,小黄泡,光蓬蕨(遵义),酸泡,酸蕨,乌泡,倒钩伞;其他:黄花蕨,倒盘龙。

功效 叶:清热,除湿,解毒。用于黄水疮。

#### 7143325

*Rubus lasiostylus* Focke

植物名 绵果悬钩子《中国植志》

药材名 毛柱莓《湖北中草药志》

文献名 毛柱悬钩子《华北经济志要》

地方名 陕西:刺泡花(宁陕);湖北:毡毛泡。

功效 湖北恩施地区以果实作覆盆子用。果实:补肝肾,明目,缩小便。

#### 7143326

*Rubus leucanthus* Hance

植物名 白花悬钩子《中国植志》

地方名 广东:吊杆泡、大叶三月泡、吊鞭筋(惠阳);海南:白钩筋藤,〔南蛇筋〕。

功效 根:用于腹泻,赤痢。

## 7143327

*Rubus malifolius* Focke

植物名 棠叶悬钩子《中国植志》

文献名 羊尿泡《拉汉英种称》，海棠叶莓《经植手册》

地方名 湖北：老林茶（兴山）；湖南：羊乌泡；广西：狗屎泡（资源）。

功效 茎：用于小儿疳积。外用于疮疡肿毒。

## 7143328

*Rubus mesogaeus* Focke

植物名 喜阴悬钩子《中国植志》

文献名 短样刺泡藤《经植手册》，深山悬钩子《台湾木本植志》

地方名 甘肃：莓子；湖北：过江龙、刺泡儿（神农架）。

功效 根：祛风湿，通经络；果实：固肾涩精。

## 7143329

*Rubus multibracteatus* Levl. et Vant. --- *R. clinoccephalus* Focke --- *R. mallodes* Focke

植物名 大乌泡《中国植志》

药材名 大乌泡《贵州草药》

文献名 多苞片悬钩子《广西植录》，多苞莓《云南种录》，红铁泡刺《中药大辞典》

地方名 广西：牛毛泡刺（凌云、天峨），六月泡（罗城），石泡果（东兰）；贵州：倒生根，黄水泡，无刺多泡，糖泡叶，马莓叶（安顺），乌泡（望漠）；云南：老牛黄泡（思茅），马泡（玉溪），大红黄泡；其他：乌龙须，大红黄袍。

功效 根、全株：清热利湿，止血接骨。用于感冒发热，肠炎，痢疾，咯血，衄血，风湿骨痛，骨折。

## 7143330

*Rubus niveus* Thunb. --- *R. foliolosus* D. Don --- *R. micranthus* D. Don

植物名 红泡刺藤《中国植志》

药材名 毛果覆盆子《云南种录》

文献名 硬枝黑琐梅、琐梅、钻地风、疏风草、覆盆子《滇南本草》，黑琐梅《名实图考》，灰毛果莓《高植图鉴》，多叶悬钩子《西昌中草药》，紫泡《汇编》，小花悬钩子《广西药录》

地方名 多叶蕨（广西、云南）；甘肃：钩刺（武都）；广西：乌泡刺（百色、乐业）；四川：黑泡、黑泡刺、倒毒伞（西昌），倒生根，倒竹伞，倒把龙（南充），白刺泡、白刺蕨（峨眉山），白刺根；贵州：蕨秧泡，白枝泡；云南：红刺泡、黑托盘、栽秧泡（红河），黑蕨，刺泡，倒回龙，倒侧生，锁梅，“郎恶恶那那麻”（元江哈尼语），黑黄袍，大黑黄袍（曲靖），黑锁梅，刺泡刺。

功效 果：补肾涩精。用于痢疾，腹泻，风湿关节痛，痛风，急性肝炎，月经不调，小儿疳积，挫伤疼痛，湿疹，皮肤化脓感染，口腔炎，咽炎，牙龈炎，泌尿道结石，神经衰弱，遗精，早泄；根、枝叶：清热利湿，祛风止痛，凉血止血，调经止带。

## 7143331

*Rubus obcordatus* (Franch.) Nguyen van Thuan --- *R. ellipticus* Smith var. *obcordatus* (Franch.) Focke

植物名 黄蕨《云南种录》

药材名 黄蕨《名实图考》

文献名 黄琐梅根、琐梅根、（钻地风）《滇南本草》，[栽秧蕨]《中国经植志》，红毛圆叶山泡《广西药录》，侧心叶悬钩子《西昌中草药》，[栽秧泡]《高植图鉴》

地方名 黄泡（广西、四川、云南），黄泡刺（四川、云南）；广西：老虎泡（忻城），厚拉（田林）；云南：黄泡刺根，黄泡，乌泡（玉溪），倒竹伞，三月泡，雀不站，黄茨果，“麻胡冷英”（西双版纳傣语），黄邻皮果（西双版纳），锁莓，钻地锋，锁地风，黄刺泡，黄莓，黄猫菜，黄刺果，黄猛角根，红锁梅、大红黄泡叶（思茅），涩疙瘩；贵州：蕨秧泡。

功效 根、叶：消肿止痛，收敛止泻。用于扁桃腺炎，牙痛，筋骨酸痛，急、慢性痢疾，黄疸型肝炎，月经不调；叶：外用于创伤出血，黄水疮；果实：补肾涩精。用于神经衰弱，多尿，遗精，早泄。

## 7143332

*Rubus pacificus* Hance

植物名 太平莓《中国植志》

药材名 太平莓《浙江天目药志》

地方名 浙江：老虎扭（临安），尖叶扭（龙泉），大叶莓。

功效 全株：用于妇女产后腹痛，发热。

## 7143333

*Rubus parkeri* Hance

植物名 乌泡子《中国植志》

药材名 小乌泡《汇编》

文献名 乌泡根《分类草药性》，乌蕨子《树分》，乌泡《秦岭植志》，小乌泡根《重庆草药》，覆盆子《汉药写真集成》

地方名 福建：草杨梅子；四川：狗尿泡根，狗洞子根，狗屎泡（南充）。

功效 根：行血，调经。用于月经不调，闭经，血崩，衄齿。

## 7143334

*Rubus parvialifolius* Hayata

植物名 穗叶悬钩子《中国植志》

药材名 穗叶悬钩子《台湾药植志》

功效 叶：外用于眼患，肿疡。

## 7143335

*Rubus parvifolius* L.

植物名 茅莓《中国植志》

药材名 茅莓《本草拾遗》、《汇编》

文献名 蕨《尔雅》，蕨田蕨《纲目》，红梅消、红琐梅、过江龙、倒筑伞《名实图考》，蛇泡劳、黑龙骨《生草药性备要》，三月泡《辰溪县志》，蕨秧泡《分类草药性》，茅莓悬钩子《东北木本图志》，小叶悬钩子《华北经植志要》，毛莓根《中药志》

地方名 天青地白草（江苏、上海、浙江），四月泡（湖南、广西），拦路虎（上海、江西、安徽、广西），虎梅刺（福

建、台湾),大薯莓(浙江、湖南),婆婆头、蛤蟆草(东北),乌泡(四川、云南),两头粘(浙江、福建);河北:拨盘;陕西:田蔗、红花脬、龙船脬、蒟田脬、四月脬子、修母脬、耘田脬(宝鸡);山东:山坡门头(昆崙山),坡门头(蓬莱),托盘(莒南、昌乐),托盘根、托盘子、山托盘(崂山),山婆门头、山爬蔓头根(烟台),小叶山拨盘(青岛);江苏:山泡么(新海连),仙人搭桥(南京),栽秧果,山泡泡;浙江:甲公莓,插田莓(文成),虎莓(洞头);安徽:天青地白,百肿消,猴子莓,小麦泡,磨盘,蛄攀,八瓣果,秧果,蒲篱笆秧,耘田果子(太和);江西:蒟田泡(吉安),五月藤刺,龙船藤,红花脬,早禾泡(宁都),小泡泡(丰城),秧脚泡(定南);福建:虎波草,虎姆波(厦门),虎莓刺,布田波草,布田刺占,布田赤艳(福安),布田繇,播田花,播田菠(周宁、闽侯、福安),火梅刺(泉州、晋江、南安、厦门),插秧泡草(闽北),耘田波(龙岩、清流、宁化),五月红(霞浦、邵武),地杨梅,叶杨梅;台湾:刺波,盐婆,虎刺梅;河南:花米托盘;湖北:草杨梅子;湖南:草杨梅,天青地白扭,种田满,田坎泡(常德),五月泡、两头扎、端阳泡、龙船乌泡、田泡筋(衡山),田藤泡(淑浦);广东:牙鹰筋,中叶蛇泡筋(从化、花县),小号水泡筋(阳春、茂名、高州、化州),小筋蓬(广宁、四会、德庆、怀集),小黄泡筋(清远),筋皮(普宁、陆丰),虎爬刺,虎唔刺(潮阳),虎姆(汕头),虎姆筋(南澳),虎姆根,筋菠(潮汕),蛇菠、筋杨梅(潮州),细种甘泡筋、细叶蛇泡筋、拔眼仔、婆牙根、谷帽筋、三月蛇泡筋(新会),三月菠(陆丰),三月泡勒(河源),红冬筋(从化);海南:黄牛泡(儋县),上山虎(定安、屯昌);广西:乳泡泡,鹰爪勒,白花暗洞(平南),落地金鸡(博白),蛇坡勒(苍梧),[细红藤](北流),野鸡泡(凤山),拦路蛇(百色),托盆子,小三月泡、红梅(北海),三月蛇泡果,蛇泡子,蛇泡果,蛇泡辣,猫泡刺(隆林);四川:倒触散,倒触伞,薜秧藤,乌泡根、薜秧泡根(蓬溪),蒿秧泡,黄豆泡,端午泡(南充);贵州:倒生根,毛叶仙桥,倒足伞,倒竹伞;云南:黑泡(昆明),黑锁梅,两头蛇(保山),紫泡。

**功效** 全株:活血消肿,清热解毒,祛风除湿。用于跌打损伤,风湿痹痛,疮痍肿毒。

#### 7143336

*Rubus parvifolius* L. var. *adenochlamys* (Focke) Migo  
--- *R. adenochlamys* (Focke) Focke

**植物名** 腺花茅莓《中国植志》

**地方名** 甘肃:莓子蔓,倒莓子,红莓梢;四川:雀不站(南川);贵州:腺毛莓,红牛毛刺,红毛草。

**功效** 枝、叶、根:调气和血,解毒。用于跌打损伤,月经不调,心胸气胀,吐血,痢肿疮毒。

#### 7143337

*Rubus pectinellus* Maxim.

**植物名** 黄泡(贵州)、《中国植志》

**药材名** 小黄泡《汇编》

**地方名** 湖北:地虎耳(神农架)。

**功效** 根、叶:清热利湿,解毒。用于水泻。外用干黄水疮。

#### 7143338

*Rubus peltatus* Maxim.

**植物名** 盾叶莓《中国植志》

**地方名** 浙江:天青地白扭,大叶覆盆子

**功效** 果实:用于腰腿酸痛。

#### 7143339

*Rubus phoenicolasius* Maxim.

**植物名** 多腺悬钩子《中国植志》

**药材名** 空筒泡《汇编》

**文献名** 雀不站、红毛巾、钻地风《汇编》

**地方名** 陕西:树莓(太白山);山东:白里叶莓,大红眼儿(崂山)。

**功效** 根、叶:祛风除湿,活血止痛。用于风湿骨痛,跌打损伤。

#### 7143340

*Rubus pileatus* Focke

**植物名** 蕨帽悬钩子《中国植志》

**地方名** 湖北:刺麦泡,端午泡(神农架)。

**功效** 果实:解热,生津,止渴。

#### 7143341

*Rubus pinfaensis* Levl. et Vant.

**植物名** 红毛悬钩子《中国植志》

**药材名** 老虎泡《四川中药志》

**文献名** 鬼悬钩子《台湾木本植志》,川黔悬钩子《广西植录》

**地方名** 湖北:乌不踏(巴东),小乌泡(利川);四川:老熊泡,黄泡叶,暴风(南充);贵州:牛毛大王,空洞泡,红毛巾,黄刺泡。

**功效** 根、叶:祛风湿,散瘀癆。用于风湿关节痛,刀伤,吐血,颈淋巴结核。

#### 7143342

*Rubus pinnatiseptalus* Hemsl.

**植物名** 羽萼悬钩子《中国植志》

**文献名** 新店悬钩子《台湾木本植志》

**地方名** 广西:寒莓(全州);四川:爬地泡。

**功效** 根:用于痢疾,疟疾。

#### 7143343

*Rubus piptopetalus* Hayata ex Koidz. --- *R. euphleobophyllus* Hayata

**植物名** 薄瓣悬钩子《中国植志》

**文献名** 早脱瓣悬钩子《台湾药植志》

**地方名** 台湾:虎婆刺,虎梅刺,虎不刺。

**功效** 叶:解热。外用于肿疡。

#### 7143344

*Rubus pirifolius* Smith

**植物名** 梨叶悬钩子《中国植志》

**药材名** 红筋钩《汇编》

**文献名** 太平悬钩子《台湾木本植志》

**地方名** 红筋菜(广东、广西);广东:蛇泡;海南:蛇泡藤藤;广西:铁牛入石(桂平),铜皮包铁骨(平南),九层皮(贵县),过山标(苍梧),红勒勾(博白),黄皮穿破石(蒙山)。



功 效 根:清肺凉血,解郁。用于肺热咳血,胸闷咳嗽。

## 7143345

*Rubus pungens* Camb.

植物名 针刺悬钩子《中国植志》

药材名 倒扎龙《陕西中草药》

文献名 刺悬钩子《华北经植志要》,刺莓莓《湖北植志》,刺蕨《云南种录》,香莓《药植简编》

地方名 陕西:倒毒散(太白山)。

功 效 根:清热解毒,活血止痛,止带,止汗。用于腰痛,白带,瘰癧,黄水疮,盗汗。

## 7143346

*Rubus pungens* Camb. var. *oldhamii* (Miq.) Maxim. ---

*R. pungens* Camb. var. *indefensus* Focke

植物名 香莓《中国植志》

药材名 香莓《浙南本草新编》

文献名 疏刺悬钩子《秦岭植志》,九头饭消扭、(九里香)、落地角公《高植图鉴》

地方名 陕西:刺泡儿(宁陕),倒毒散(太白山),倒扎龙(陕南)。

功 效 根:活血止痛,清热解毒。用于盗汗;带叶茎、枝:消食、利水、发表。

## 7143347

*Rubus reflexus* Ker

植物名 锈毛莓《中国植志》

文献名 七指枫《药植简编》

地方名 山烟筒子(广西、云南);广东:蛇泡笏,大叶蛇泡笏;广西:大眼潭(容县),{马连鞍}(北流),七指风(藤县),悬钩子,黄背毛莓(靖西);云南:细锁梅,“啊雌坡爬”(元江哈尼语)。

功 效 根:祛风湿,强筋骨。用于风湿痹痛,跌打损伤,骨折;叶:止血,消炎。用于刀伤出血。

## 7143348

*Rubus reflexus* Ker var. *hui* (Diels apud Hu) Metc. --

*R. gilvus* Focke

植物名 浅裂锈毛莓《中国植志》

文献名 淡黄悬钩子《海南植志》,红铁刺泡《药植简编》,毛莓《湖南药志》

功 效 根:清热止痢,祛风止痛。用于菌痢,风湿关节痛。

## 7143349

*Rubus reflexus* Ker var. *lanceolobus* Metc.

植物名 深裂锈毛莓《中国植志》

药材名 七爪风《汇编》

文献名 狭叶七指枫《药植简编》,红泡刺《广西药志》

地方名 海南:蛇泡笏;广西:七指风,山烟筒子(桂平)。

功 效 根:祛风湿,强筋骨。用于风湿关节疼痛,四肢麻痹瘫痪,痢疾。

## 7143350

*Rubus rosaefolius* Smith

植物名 空心泡《中国植志》

药材名 空心泡《汇编》

文献名 蔷薇莓《中国植物图鉴》,秦氏莓《种分》,空心蕨、洋金银藤《树分》,龙船泡、白花蕨、麦泡《药植简编》,划船泡《中国植志》

地方名 三月泡(湖南、广西),覆盆子(广东、广西);浙江:牛卵子郭公;江西:七叶饭消扭;湖北:小麦泡;湖南:“登利”、“登三月”(侗语);广东:三月坡(阳春),白花三月泡、青麻泡(惠阳),蛇泡笏;广西:白花暗洞(梧州),吊边坡(柳江),小暗岗(平南),小蔷薇(凌云),五月泡、红帽顶(南丹),黄牛泡,四月泡,刀伤泡,三月莓,白烟筒,托盘子(忻城);贵州:倒触伞(贵阳)。

功 效 根、嫩枝及叶:清热,止咳,止血,祛风湿。用于肺热咳嗽,百日咳,咯血,盗汗,牙痛,筋骨痹痛,跌打损伤。外用于烧、烫伤。

## 7143351

*Rubus sachalinensis* Levl.

植物名 库页悬钩子《中国植志》

文献名 川莓《经济植物学》,野悬钩子《药植简编》,悬钩子《兴安植群》

地方名 辽宁:托盘(长海);内蒙古:沙窝窝,“矛日音-布格日勒哲”(蒙名);四川:“更楂朵热”(若尔盖藏名)。

功 效 茎、叶:解毒,祛痰,消炎。用于吐血,鼻血,痢疾;根:止血止带。用于久痢滑泻不收。

## 7143352

*Rubus saxatilis* L.

植物名 石生悬钩子《中国植志》

文献名 北悬钩子《药植简编》,天山悬钩子《东检》,覆盆子《青海中草》,小悬钩子《汇编》

地方名 河北:托盘;内蒙古:地豆子,“哈达音-布格日勒哲”(蒙名);青海:悬钩子,莓子。

功 效 全株:补肝健胃,祛风止痛。用于急、慢性肝炎,食欲不振,风湿性关节炎;果:补肾固精。用于遗精。

## 7143353

*Rubus setchuenensis* Bureau et Franch.

植物名 川莓《中国植志》

药材名 川莓《汇编》

文献名 大乌泡根《分类草药性》,四川莓《云南种录》,乌泡刺《药植简编》

地方名 四川:乌泡,乌泡根;贵州:糖泡刺,黄水泡,无刺乌泡,马莓叶,倒生根。

功 效 根或叶:祛风除湿,止呕,活血。用于癆伤吐血,月经不调,口有腥气,瘰癧,痘后目翳,狂犬咬伤等;叶:用于黄水疮。

## 7143354

*Rubus simplex* Focke

植物名 单茎悬钩子《中国植志》

文献名 单生莓《湖北植志》

地方名 湖北:大麦泡子[叶](神农架)。

功 效 根:散血止痛,通经;叶:止血。

## 7143355

*Rubus suavisissimus* S. Lee

植物名 甜叶莓(拟)

药材名 甜茶莓(拟)

文献名 甜茶(广西植物)

功效 叶:补肾,降压,清热生津。用于糖尿病,高血压病。

## 7143356

*Rubus sumatranus* Miq.

植物名 红腺悬钩子《中国植志》

药材名 牛奶莓《汇编》

文献名 腺毛悬钩子《海南植志》,花楸叶茶藨《云南种录》,虎泡《广西药录》

地方名 湖南:七月泡;广西:白鸡啼(博白),南蛇榕(陆川),灯笼泡(乐业);贵州:马泡,红刺苔。

功效 匍匐枝的细根或块根:用于妇女产后寒热,腹痛,食欲不振。

## 7143357

*Rubus swinhoi* Hance

植物名 木莓《中国植志》

药材名 木莓《浙江药植志》

文献名 湖北悬钩子《广西植志》,高脚老虎扭《高植图鉴》,斯氏悬钩子《台湾植志》

功效 根、叶:消食积,止泻痢,活血,调经。

## 7143358

*Rubus taiwanianus* Matsum.

植物名 刺莓《中国植志》

文献名 台湾悬钩子《台湾药植志》

地方名 台湾:虎婆刺,虎蕾刺,虎梅刺,虎莓刺。

功效 全株:止痒,消毒。用于痢疾;叶:外用洗痔。

## 7143359

*Rubus tephrodes* Hance

植物名 灰白毛莓《中国植志》

药材名 乌泡刺《汇编》

文献名 蓬蘽《本经》,陵藨,阴藨《别录》,割田藨《纲目》,寒藨《医林纂要》,灰绿悬钩子《拉汉种称》,白毛悬钩子《药植简编》

地方名 乌龙摆尾(江西、湖南),乌泡(湖南、贵州);江西:乌云盖雪、乌泡子筋、天青地白(泰和),乌泡子(萍乡),葵叶莓;湖南:倒水莲,倒生根,蛇乌泡、黑乌泡(长沙);广西:灰山泡,红泡勒、大勒潭(桂林),八角泡,八月泡,蛇泡,鸡儿暗洞,覆盆子(全县),狗屎泡(资源);贵州:大乌泡(贵民)。

功效 根:祛风除湿,活血调经。用于风湿疼痛,慢性肝炎,腹泻,痢疾,跌打损伤,月经不调;叶:止血,解毒。外用于外伤出血,痈疖疮疡;子:补气益精。用于病后体虚,神经衰弱。

## 7143360

*Rubus trianthus* Focke

植物名 三花悬钩子《中国植志》

文献名 三花莓《经植手册》,苦悬钩《台湾木本植

志》,牛奶莓《药植简编》

功效 全株:活血散瘀。

## 7143361

*Rubus wangii* Metc.

植物名 大苞悬钩子《中国植志》

文献名 两广悬钩子《广西植志》

功效 根:收敛止血,止痢。

## 7143362

*Rubus xanthocarpus* Bureau et Franch.

植物名 黄果悬钩子《中国植志》

药材名 地莓子《陕西中草药》

文献名 地梅子《汇编》

地方名 黄帽子(陕西、甘肃);陕西:黄刺儿根(凤县),黄莓子(陇南),泡儿刺(佛坪);甘肃:猛子刺,黄莓,莓子刺(文县);云南:“处徐”(楚雄彝名),刺茶,小黄莲。

功效 根:清湿热,杀虫,止血。用于湿热痢疾,鼻血不止,黄水疮,疥癣。

## 7143363

*Rubus xanthoneurus* Focke

植物名 黄脉莓《中国植志》

地方名 贵州:地黄泡(梵净山)。

功效 根:止血消肿。用于跌打损伤,外伤出血。

## 7143364

*Rubus yunnanicus* Ktze.

植物名 云南悬钩子《中国植志》

文献名 云南莓《云南种录》,滇悬钩子《云南药录》

功效 全草:用于血淋。

## 7143365

*Sanguisorba alpina* Bunge

植物名 高山地榆《中国植志》

地方名 宁夏:阿拉善地榆,地榆。

功效 根:凉血止血,解毒敛疮。

## 7143366

*Sanguisorba applanata* Yu et Li

植物名 宽蕊地榆《中国植志》

地方名 山东:地榆(烟台)。

功效 根:凉血止血,解毒敛疮。

## 7143367

*Sanguisorba applanata* Yu et Li var. *villosa* Yu et Li

植物名 柔毛宽蕊地榆《中国植志》

地方名 山东:野西瓜头(蒙山),山花地榆(胶东),地榆(烟台)。

功效 根:凉血止血,解毒敛疮。

## 7143368

*Sanguisorba filiformis* (Hook. f.) Hand.-Mazz.

植物名 矮地榆《中国植志》

药材名 虫莲《云南中草药》

文献名 线叶地榆《药植简编》,小白花地榆《玉龙山药植》

地方名 云南:[海参]、“五母那包”(纳西语),地海参(丽江),金钱回(兰坪)。

功 效 根: 补血调经。用于月经不调, 痛经。

#### 7143369

*Sanguisorba officinalis* L. --- *S. officinalis* L. var. *longa* Kitagawa

植物名 地榆《中国植志》

药材名 地榆《本经》、《药典》

文献名 酸赭《别录》, 豚榆系《石药尔雅》, 玉札、玉鼓《神仙服食经》, 白地榆、鼠尾地榆、鼠地榆《滇南本草》, 酢枣《纲目》, 苽菜、无名印《新纲》, 野升麻《中国药植志》, 江州地榆《本草图谱》, 猪人参《中草药学》, 长穗地榆《长白山植药志》

地方名 红地榆(湖南、四川), 血箭草(湖南、广西), 枣儿红(贵州、云南), 马连鞍(福建、广东、广西), 山红枣(浙江、安徽、福建), 小土参(浙江、江西), 马猴枣、鞭枣胡子(黑龙江、山西), 黄瓜香(黑龙江、内蒙古、山东), 野生麻(广西、四川), 山枣子(山西、云南); 黑龙江: 山地瓜(哈尔滨); 河北: 山红枣根(张家口), 黄瓜香根; 内蒙古: 蒙古枣, “苏德”、“苏都·额布斯”、“出虫巴”(蒙名); 甘肃: 山丹花(岷县), 塞塞草, 红朵脑, 地地根; 青海: 枣儿草, 鼻拉塌, 野沙枣, 鼻拉塌根; 山东: 小棵子(文登、荣成、昆崙山), 老虎枣(五莲、胶南、胶县、即墨), 地榆子(章丘), 山参子(益都), 西瓜香(昆崙山), 小科子、枣香(烟台), 马虎枣根, 马胡枣; 江苏: 一枝箭(邳县), 紫朵苗子(睢宁、邳县), 小紫草(云台山); 安徽: 砚台蒿, 大刀杆, 西瓜草, 牛鸡拐, 火把草, 老牛筋(滁县); 福建: 真珠斗(松溪); 湖北: 红头草, 十大川, 金线小风, 地马牛(神农架); 湖南: 岩地茂, 地皮扒, 搜山狗(衡阳); 广东: 假红枣(曲江), 鸡鹤头, 三脚猫(阳山); 广西: 马连鞍薯; 四川: 西地榆, “然补”(若尔盖藏名), 地芽; 云南: 水橄欖根、小松圈、小黑地榆、黑防风、无风自动草、土荜菝(昆明), 水檳榔(红河), 小地榆(昆明、临沧), 山橄欖, 枣子红, 暖骨草(文山), 赤地榆, 紫地榆, 山枣参(东川), 黄根子(丽江), 蕨苗根、大黑补(保山)。

功 效 根: 凉血止血, 解毒敛疮。用于便血, 痔血, 血痢, 崩漏, 水火烫伤, 痈肿疮毒。

#### 7143370

*Sanguisorba officinalis* L. var. *carnea* (Fisch.) Regel ex Maxim.

植物名 粉花地榆《中国植志》

功 效 根: 凉血止血, 解毒敛疮。

#### 7143371

*Sanguisorba officinalis* L. var. *glandulosa* (Kom.) Worosch. --- *Sanguisorba glandulosa* Kom.

植物名 腺地榆《中国植志》

地方名 地榆(黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古)。

功 效 根: 凉血止血, 解毒敛疮。

#### 7143372 见 7143373a

#### 7143373

*Sanguisorba officinalis* L. var. *longifolia* (Kitagawa) Yu et Li --- *S. grandifolia* (Maxim.) Makino

植物名 长蕊地榆《中国植志》

文献名 直穗粉花地榆《东北草本植志》, 直穗地榆《湖北植志》, 大花地榆《中药大辞典》

功 效 根及根茎: 凉血止血, 解毒敛疮。

#### 7143373a

*Sanguisorba officinalis* L. var. *longifolia* (Bertol.) Yu et Li --- *S. longifolia* Bert. --- *S. rectispicata* Kitagawa --- *S. formosana* Hayata --- *S. officinalis* L. var. *meridionalis* Liou et Li

植物名 长叶地榆《中国植志》

药材名 地榆《纲目》、《药典》

文献名 直穗地榆《湖北植志》, 台湾地榆《台湾药植志》, 南地榆《药植简编》

地方名 湖北: 绵地榆(蒲圻)。

功 效 根: 凉血止血, 解毒敛疮。用于便血, 痔血, 血痢, 崩漏, 水火烫伤, 痈肿疮毒。

#### 7143374

*Sanguisorba officinalis* L. f. *latifoliata* (Liou et C. Y. Li) Y. C. Chu --- *S. officinalis* L. var. *latifoliata* Liou et C. Y. Li

植物名 宽叶地榆《东北药用植物》

功 效 根: 凉血, 止血, 收敛止泻, 清热解毒, 生肌敛疮。用于咯血, 吐血, 衄血, 尿血, 胃肠出血, 痔疮出血, 功能性子宫出血, 白带, 血痢, 慢性胃肠炎。外用丁烧烫伤, 湿疹, 金疮, 痈肿疮毒。

#### 7143375

*Sanguisorba sitchensis* C. A. Mey.

植物名 大白花地榆《中国植志》

药材名 白花地榆《汇编》

地方名 山东: 羊霍涝(昆崙山、文登)。

功 效 根: 凉血止血, 解毒敛疮。

#### 7143376

*Sanguisorba tenuifolia* Fisch. ex Link

植物名 细叶地榆《中国植志》

文献名 垂穗粉花地榆《东北草本植志》

地方名 吉林: 地榆。

功 效 根: 凉血止血, 解毒敛疮。

#### 7143377

*Sanguisorba tenuifolia* Fisch. var. *alba* Trautv. et Mey. --- *S. parviflora* (Maxim.) Takeda

植物名 小白花地榆《中国植志》

文献名 水地榆《兴安植群》, 狭叶地榆《种分》, 棉地榆《鉴别手册》

地方名 野鸡冠花、黄攸香、地榆、地榆根(东北); 黑龙江: 绵地榆, 黄瓜香, 山萝卜, 白花地榆; 吉林: 细叶地榆, 多穗地榆, 野宫花。

功 效 根: 凉血止血, 解毒敛疮。

#### 7143378

*Sibbaldia adpressa* Bunge

植物名 伏毛山莓草《中国植志》

药材名 西巴草《中草药通讯》

文献名 “交毛罗登”(藏名)《中草药通讯》

功 效 全草: 用于肺结核, 肺脓肿。

**7143379***Sibbaldia procumbens* L.

植物名 山莓草《中国植志》

文献名 五蕊梅、匍茎五蕊梅《汇编》, 木茎山金梅《东北草本植志》

地方名 四川: “足木罗尔登”(若尔盖藏名)。

功效 全草: 止咳, 调经, 祛瘀消肿。用于咳嗽, 月经不调。外用于骨折。

**7143380***Sibbaldia procumbens* L. var. *aphanopetala* (Hand.

-Mazz.) Yu et Li

植物名 隐瓣山莓草《中国植志》

文献名 隐瓣山金梅《秦岭植志》

功效 全草: 止咳, 调经, 祛瘀消肿。

**7143381***Sibiraea angustata* (Rehd.) Hand. -Mazz.

植物名 窄叶鲜卑花《中国植志》

功效 花序: 用于食积, 胃痛。

**7143382***Sibiraea laevigata* (L.) Maxim.

植物名 鲜卑花《中国植志》

文献名 平滑鲜卑花《中草药》

功效 花序: 用于食积, 胃痛。

**7143383***Sorbaria arborea* Schneid.

植物名 高丛珍珠梅《中国植志》

药材名 珍珠梅《东北中草》

文献名 野生珍珠梅《经植手册》

地方名 山高粱、八木条(东北); 宁夏: 珍珠杆, 花儿杆; 湖北: 龟柳树(神农架)。

功效 茎皮: 有毒。活血祛瘀, 消肿止痛。用于骨折, 跌打损伤, 关节扭伤, 红肿疼痛, 风湿性关节炎。

**7143384***Sorbaria arborea* Schneid. var. *glabrata* Rehd.

植物名 光叶高丛珍珠梅《湖北植志》

文献名 光叶珍珠梅《秦岭植志》

地方名 陕西: 捣黍杈(太白山), 狼尾巴(蓝田)。

功效 茎皮: 活血去瘀, 消肿止痛。用于骨折, 跌打损伤。

**7143385***Sorbaria kirilowii* (Regel) Maxim.

植物名 华北珍珠梅《中国植志》

药材名 珍珠梅《内蒙古中草药》

文献名 吉氏珍珠梅《经植手册》

地方名 内蒙古: “曹布德力格-其其格”、“奥木日图音-苏布得力格-其其格”(蒙名); 山东: 珍珠树(泰山)。

功效 茎皮: 有毒。活血祛瘀, 消肿止痛。用于骨折, 跌打损伤。

**7143386***Sorbaria sorbifolia* (L.) A.Br.

植物名 珍珠梅《中国植志》

药材名 珍珠梅《东北中草》

文献名 东北珍珠梅《高植图鉴》, 华楸珍珠梅《东北木本图志》, 八木条《汇编》

地方名 山高粱、走马葵、珍珠花、毛漆、通花杆、山高粱条子、高楷子(东北); 北京: 花秸子; 内蒙古: “苏布得力格-其其格”(蒙名); 四川: “哦色洼哈”(藏名)。

功效 茎皮、枝条、果穗: 有毒。活血散瘀, 消肿止痛。用于骨折, 跌打损伤, 关节扭伤, 红肿疼痛, 风湿性关节炎。

**7143387***Sorbaria sorbifolia* (L.) A.Br. var. *stellipila* Maxim.

植物名 星毛珍珠梅《汇编》

文献名 星毛花楸珍珠梅《东北木本图志》, 穗形七度灶《植物学大辞典》

功效 茎皮、枝条、果穗: 有毒。活血散瘀, 消肿止痛。

**7143388***Sorbaria sorbifolia* (L.) Al. Braun f. *incerta* (Scheid.) Kitag. --- *S. stellipila* (Maxim.) Schneid. var. *incerta* Schneid.

植物名 密星毛珍珠梅《东北药用植物》

功效 茎皮、枝条及果穗: 有毒。活血散瘀, 消肿止痛。用于骨折, 跌打损伤, 关节扭伤, 红肿疼痛, 风湿性关节炎。

**7143389***Sorbus alnifolia* (Sieb. et Zucc.) K. Koch --- *Micromeles alnifolia* (Sieb. et Zucc.) Koehne

植物名 水榆花楸《中国植志》

药材名 水榆《汇编》

文献名 花楸《经植手册》, 女儿经《东北木本图志》

地方名 河北: 粘枣子; 山东: 山樱桃(昆嵛山), 山榆(沂源、沂水、蒙山), 大叶子榆(蒙山), 水桃, 枫榆(青岛); 浙江: 糯米珠(临安); 河南: 黄山榆; 湖北: 山樱桃树(神农架); 湖南: 千筋树。

功效 果实: 用于血虚劳倦、支气管炎。

**7143390***Sorbus amabilis* Cheng ex Yu

植物名 黄山花楸《中国植志》

文献名 水榆花楸、水榆《山东树木志》

功效 果实: 用于虚劳, 支气管炎。

**7143391***Sorbus amurensis* Koehne

植物名 黑水花楸《东北药用植物》

功效 树枝、树皮及果实: 健脾, 利水, 补虚。用于胃炎, 胃痛, 水肿, 咳嗽, 维生素 A、C 缺乏症, 清肺, 止咳, 祛痰, 慢性气管炎, 肺结核, 哮喘, 咳嗽。

**7143392** 见 7143394a**7143393***Sorbus caloneura* (Stapf) Rehd.

植物名 美脉花楸《中国植志》

文献名 川花楸《中国森林植志》

地方名 湖北: 小麻梨(神农架); 湖南: (野山楂)(蓝山县瑶名); 广西: 小棠梨; 贵州: 山黄果。

功 效 果根;消积健胃,收敛止泻。用于小儿疳积。

## 7143394

*Sorbus folgneri* (Schneid.) Rehd.

植物名 石灰花楸《中国植志》

药材名 石灰树《浙江药植志》

文献名 傅氏花楸《经植手册》,华盖木《中国树木志略》

地方名 江西:白绵子树;河南:毛栒子;湖北:石灰条(鄂西),关山白、欢山白(鹤峰),石灰条子;湖南:粉背叶;广西:牛筋木;四川:反白树。

功 效 果实:凉血,止血,解毒;枝条:用于风湿麻木。

## 7143394a

*Sorbus hupehensis* Schneid.

植物名 湖北花楸《中国植志》

文献名 雪压花《树分》

地方名 陕西:臭栒子(太白山);山东:水罐子(昆嵛山)。

功 效 树皮:用于气管炎。

## 7143395

*Sorbus keissleri* (Schneid.) Rehd.

植物名 毛序花楸《中国植志》

文献名 凯旋花《树分》

地方名 湖北:野麻梨子(神农架)。

功 效 果实:助消化,健胃;花、叶:恢复体力,肢体疲乏无力。

## 7143396

*Sorbus megalocarpa* Rehd.

植物名 大果花楸《中国植志》

功 效 全株:清热解毒,化瘀消肿。用于无名肿毒,刀伤出血,乳腺炎。

## 7143397

*Sorbus pohuashanensis* (Hance) Hedl.

植物名 花楸树《救荒本草》、《中国植志》

药材名 花楸《吉林中草药》

地方名 百花花楸(河北、内蒙古、山东),山槐子、红果臭山槐(河北、内蒙古);河北:绒花树;吉林:马加木,马加木;内蒙古:“浩日图-包日”、“好日图-保日-特斯”(蒙名)。

功 效 果实:健脾补虚。用于胃炎,肺结核,哮喘,咳嗽。

## 7143398

*Sorbus pohuashanensis* (Hance) Hedl. var. *manshuriensis* (Kitag.) Y. C. Chu --- *Sorbus manshuriensis* Kitag. --- *S. amurensis* Koehne var. *lanata* Nakai

植物名 东北花楸《东北药用植物》

文献名 百花花楸《河北习见树木图说》

地方名 花楸(东北、河北);辽宁:蛇皮楸、山冬瓜、臭漆(本溪);吉林:马加木(延边朝名);河北:臭山槐(赤城),红果臭山槐,绒花树,山槐子。

功 效 树枝、树皮及果实:健脾,利水,补血。用于

胃炎,水肿,咳嗽,维生素 A、C 缺乏症,慢性气管炎,肺结核,哮喘,咳嗽。

## 7143399

*Sorbus tianschanica* Rupr.

植物名 天山花楸《中国植志》

药材名 天山花楸《新疆中草药手册》

地方名 新疆:花楸。

功 效 果实:健脾补虚。用于胃炎,肺结核,哮喘,咳嗽。

## 7143400

*Spenceria ramalana* Trimen

植物名 马蹄黄《中国植志》

药材名 黄总花草《汇编》

地方名 云南:管仲、小地榆、黄地榆(中甸),白地榆(丽江)。

功 效 根:解毒消炎,收敛止血。用于久痢,水泻。

## 7143401

*Spiraea blumei* G. Don

植物名 绣球绣线菊《中国植志》

药材名 珍珠绣球(江苏、贵州)、《汇编》

文献名 珍珠梅《名实图考》,补氏绣线菊《经植手册》

地方名 绣球(江苏、河南);江苏:翠兰茶(句容宝华山);湖南:瘦狗婆;贵州:碎米丫(印江),山茴香(绥阳),碎米桠,麻叶绣球。

功 效 根、果实:调气,止痛,散瘀利湿。用于跌打损伤,瘀血,疼痛,腹胀痛,白带。

## 7143402

*Spiraea cantoniensis* Lour.

植物名 麻叶绣线菊《中国植志》

药材名 麻叶绣球《汝南圃史》,《广西药录》

文献名 麻球、麻毡《花镜》,粤绣线菊《经植手册》,麻叶绣球绣线菊《东检》

地方名 河南:石棒子;广西:石糖梨(富川),土常山(桂林),毛球。

功 效 全株:用于疟疾,疥癬。

## 7143403

*Spiraea cantoniensis* Lour. var. *lanceata* Zab.

植物名 重瓣麻叶绣线菊《中国植志》

功 效 枝叶:用于疥癬。

## 7143404

*Spiraea chinensis* Maxim.

植物名 中华绣线菊《中国植志》

文献名 华绣线菊《经植手册》,铁黑汉条《树分》

地方名 广西:仙人佛(全州)。

功 效 根:驱风止痛。用于白带,疟疾。外用于外伤出血。

## 7143405

*Spiraea henryi* Hemsl.

植物名 翠蓝绣线菊《中国植志》

文献名 翠蓝茶《亨利氏植录》,亨利绣线菊《经植手册》

地方名 湖北:秃子花(神农架)。

功效 花、叶:清热解毒,散瘀。用于咽喉肿痛,跌打损伤。

#### 7143406

*Spiraea hirsuta* (Hemsl.) Schneid.

植物名 疏毛绣线菊《中国植志》

地方名 湖北:吊干柴(神农架)。

功效 花、叶:活血散瘀,止痛。用于跌打损伤,腹胀痛。

#### 7143407

*Spiraea japonica* L. f.

植物名 粉花绣线菊《中国植志》

药材名 绣线菊《汇编》

文献名 绣线菊叶《浙江民药》,日本绣线菊《树分》,细叶米筛花《汇编》

地方名 红簇子(四川、贵州);陕西:蚂蟥梢;贵州:火烧尖,土黄连,强盗九杆子。

功效 叶:消肿解毒,去腐生肌。用于慢性骨髓炎;根:止咳,明目,镇痛。

#### 7143408

*Spiraea japonica* L. f. var. *acuminata* Franch.

植物名 狭叶绣线菊《中国树木志》

药材名 吹火筒《陕西中草药》

文献名 尖叶绣线菊《秦岭植志》,渐尖绣线菊《药植简编》

地方名 甘肃:火箭花(文县),火箭杆(武都);浙江:大绣线菊、细叶米筛花(临安);云南:黄花草(红河),白升麻(昆明),筛子花(临沧),一把伞(保山),千颗米。

功效 全株:通经,通便,利尿。用于闭经,月经不调,便结腹胀,小便不利。

#### 7143409

*Spiraea japonica* L. f. var. *fortunei* (Planchon) Rehd.

植物名 光叶粉花绣线菊《华北树木志》

药材名 绣线菊《贵州草药》

文献名 大绣线菊《树分》,光叶绣线菊《汇编》,红花绣线菊《秦岭植志》

地方名 陕西:雪风箭、蚂蝗梢(镇坪);江苏:天灯把、红禾茅(连云港);湖北:万年红(恩施),癞子花(神农架);贵州:火烧尖(麻江、安顺),土黄连,强盗九杆子(毕节、清镇)。

功效 根及嫩叶:清热解毒。用于目赤肿痛,头痛,牙痛,肺热咳嗽。外用子创伤出血;果实:用于痢疾。

#### 7143410

*Spiraea japonica* L. f. var. *glabra* (Regel) Koidz.

植物名 无毛粉花绣线菊《湖北植志》

文献名 无毛绣线菊《浙江药植志》,红绣线菊《树分》

地方名 湖北:人心药[叶](神农架)。

功效 全草:通经,通便,利尿;叶:用于创伤出血。

#### 7143411

*Spiraea japonica* L. f. var. *stellaris* Rehd.

植物名 星花绣线菊《云南种录》

药材名 白升麻(昆明)、《汇编》

文献名 星芒绣线菊《药植简编》

地方名 云南:一把伞(保山),千颗米,黄花草,筛子花。

功效 根:清热解表。用于感冒,头痛发烧。

#### 7143412

*Spiraea media* Schmidt

植物名 欧亚绣线菊《中国植志》

文献名 石棒绣线菊《长白山植药志》

地方名 河南:石棒子。

功效 种子、叶、根:用于胃肠疾病和妇科疾病。

#### 7143413

*Spiraea miyabei* Koidz. var. *pilosula* Rehd.

植物名 毛叶长蕊绣线菊《云南种录》

地方名 云南:碎米花(富源)。

功效 根:用于感冒;花:用于胃痛;全草:用于闭经,便结,腹胀,小便不利。

#### 7143414

*Spiraea mongolica* Maxim.

植物名 蒙古绣线菊《中国植志》

文献名 “麻息”(藏名)《青藏药图》

地方名 内蒙古:“蒙古勒-塔比勒干纳”(蒙名)。

功效 花:生津止渴。用于腹水。

#### 7143415

*Spiraea myrtilloides* Rehd.

植物名 细枝绣线菊《中国植志》

文献名 脆沙草《峨眉药植》

功效 果:用于刀伤。

#### 7143416

*Spiraea prunifolia* Sieb. et Zucc.

植物名 李叶绣线菊《中国植志》

药材名 笑靥花《花镜》、《浙江天目药志》

文献名 笑靥、御马鞭《花镜》,李叶笑靥花《经植手册》

地方名 其他:小叶米筛草。

功效 根:用于咽喉肿痛。

#### 7143417

*Spiraea prunifolia* Sieb. et Zucc. var. *pseudoprunifolia* (Hayata) Li --- *S. pseudoprunifolia* Hayata ex Nakai

植物名 多毛李叶绣线菊(拟)

文献名 假笑靥花、台湾笑靥花《台湾药植志》

功效 根:用于发烧。

#### 7143418

*Spiraea prunifolia* Sieb. et Zucc. var. *simpliciflora* Nakai

植物名 单瓣李叶绣线菊(拟)

文献名 单瓣笑靥花《浙江药植志》

地方名 浙江:小叶米筛花(临安)。

功效 根:用于咽喉肿痛。

#### 7143419

*Spiraea pubescens* Turcz.

植物名 上庄绣线菊《中国植志》  
 药材名 上庄花(吉林、河南)  
 文献名 蚂蚱腿《东北木本图志》, 柔毛绣线菊《经植手册》

地方名 河南: 石茛子, 小叶石棒子。

功效 茎髓: 用于利尿, 水肿。

#### 7143420

*Spiraea salicifolia* L.

植物名 绣线菊《群芳谱》、《中国植志》

文献名 珍珠梅《名实图考》, 柳叶绣线菊《东北木本图志》, 王八脆、水火筒《汇编》

地方名 空心柳、马尿洩(东北); 内蒙古: “塔比勒干纳”(蒙名)。

功效 全株: 通经, 活血, 通便, 利水。

#### 7143421

*Spiraea salicifolia* L. var. *oligodonta* Yu

植物名 疏齿绣线菊《东北药用植物》

文献名 贫齿柳叶绣线菊《黑龙江树木志》

功效 全草及根: 活血通经, 行瘀止痛, 化痰止咳, 利水通便。用于闭经, 便结腹胀, 小便不利, 跌打损伤, 关节疼痛, 周身酸痛, 咳嗽痰多, 刀伤等症。

#### 7143422

*Spiraea salicifolia* L. var. *grosseserrata* Liou

植物名 巨齿绣线菊《东北药用植物》

文献名 巨齿柳叶绣线菊《东北木本图志》

功效 全草及根: 活血通经, 行瘀止痛, 化痰止咳, 利水通便。用于闭经, 便结腹胀, 小便不利, 跌打损伤, 关节疼痛, 周身酸痛, 咳嗽痰多, 刀伤等症。

#### 7143423

*Spiraea sericea* Turcz.

植物名 绢毛绣线菊《中国植志》

功效 茎、叶: 外用于湿疹。

#### 7143424

*Spiraea thunbergii* Sieb. ex Blume

植物名 珍珠绣线菊《中国植志》

文献名 珍珠花、玉屑《花镜》, 笑靥花《华北树木志》

地方名 天津: 兰花子; 山东: 雪柳; 浙江: 喷雪花; 湖南: 小叶瓦茶、米饭花(衡山)。

功效 根: 用于咽喉肿痛。

#### 7143425

*Stephanandra chinensis* Hance

植物名 野珠蓝《中国树木志》

文献名 华空木《经植手册》, 中华野珠兰《广西植录》, 中国小米空木《江苏植录》

地方名 野珠兰(浙江、湖南); 浙江: 凤尾米筛花(临安), 滴滴金(嵊县); 湖南: 鲤鱼红。

功效 根: 用于血崩, 月经不调, 咽喉肿痛。

#### 7143426

*Stranvaesia davidiana* Decne.

植物名 红果树《中国植志》

文献名 斯脱兰威木《经植手册》

地方名 贵州: 野梦花(雷公山)。

功效 果实: 清热除湿, 化痰止痛, 用于风湿, 跌打损伤, 痢疾, 消化不良。

#### 7143427

*Stranvaesia tomentosa* Yu et Ku

植物名 绒毛红果树《植分学报》

地方名 四川: 水红花(北碚)。

功效 根、果: 益气活血。

### 7144 毒鼠子科 Dichapetalaceae

#### 7144001

*Dichapetalum gelonioides* (Roxb.) Engl.

植物名 毒鼠子《海南植志》

药材名 毒鼠子《新华本草纲要》

功效 果实: 有剧毒。用于毒鼠。

#### 7144002

*Dichapetalum longipetalum* (Turcz.) Engl. --- *Dichalum hainanense* (Hance) Engl.

植物名 海南毒鼠子《高植图鉴》

功效 茎叶: 用于血吸虫病。

### 7145 蜡梅科 Calycanthaceae

#### 7145001

*Calycanthus chinensis* Cheng et S. Y. Chang --- *Sinocalycanthus chinensis* (Cheng et S. Y. Chang) Cheng et S. Y. Chang

植物名 夏蜡梅《中国植志》

药材名 夏蜡梅《浙江天目药志》

文献名 夏梅《林业科学》, 夏腊梅《汇编》

地方名 浙江: 大叶柴, 牡丹木, 蜡木, 黄梅花。

功效 花、根: 健胃止痛。用于胃气痛。

#### 7145002

*Chimonanthus nitens* Oliv. --- *Meratia nitens* (Oliv.) Rehd. et Wils.

植物名 山蜡梅《中国植志》

药材名 山蜡梅《药典》

文献名 亮叶蜡梅《经植手册》, 山蜡梅叶、山蜡梅茶《药典》, 山腊梅《汇编》

地方名 浙江: 石凉茶(浙南); 安徽: 香风茶; 江西: 秋蜡梅, 毛山茶(婺源); 湖南: 肾囊草; 广西: 牛柳铃, 鸡卵果; 贵州: 小坝王(遵义), 岩马桑(兴义), 臭蜡梅(罗甸), 铁筷子(贵阳); 云南: 野蜡梅, 雪里花。

功效 叶: 解表祛风, 清热解毒。用于防治感冒, 流行性感胃。

#### 7145003

*Chimonanthus praecox* (L.) Link --- *C. praecox* (L.) Link var. *concolor* Makino --- *C. praecox* (L.) Link var. *grandiflorus* (Lindl.) Makino --- *Meratia praecox* (L.) Rehd. et Wils.

植物名 蜡梅《中国植志》

药材名 蜡梅《纲目》、《中药大辞典》

文献名 腊梅花《救荒本草》,黄梅花《纲目》,黄梅、狗蝇梅《花镜》,磬口蜡梅《广群芳谱》,狗矢蜡梅《经植手册》,九英蜡梅《种分》,铁钢叉《贵州方药》,蜡木《中国药植志》,狗爪蜡梅、檀香蜡梅、素心蜡梅、腊梅《四川中药志》

地方名 蜡梅花(浙江、江苏);山东:[巴豆],国花;江苏:巴豆花,梅花;浙江:石凉茶(丽水、龙泉),蜡花(武义),芳备茶(开化),黄金茶;江西:荷花蜡梅;福建:黄仔(仙游),岩马桑,臭腊梅;广西:大叶蜡梅(桂林);四川:黄腊梅(南川);贵州:瓦乌柴(罗甸),铁簇子花,雪里花;云南:暗梅花。

功效 花蕾:解暑生津,开胃散郁,止咳。用于暑热头晕,呕吐,气郁胃闷,麻疹,百日咳。外用于烫火伤,中耳炎;根、根皮:祛风,解毒,止血。用于风寒感冒,腰肌劳损,风湿关节炎。外用于刀伤出血。

## 7145004

*Chimonanthus salicifolius* S. Y. Hu

植物名 柳叶腊梅《江西药录》

功效 叶:解表祛风,清热解毒。用于风寒感冒,头痛,咳嗽,胃寒腹痛。

## 7148 豆科 Leguminosae

## 7148001

*Abrus cantoniensis* Hance --- *A. fruticulosus* Wall. ex Wight et Arm.

植物名 广东相思子《豆科图说》

药材名 鸡骨草《岭南采药录》、《药典》

文献名 黄头草、黄仔强、大黄草《岭南采药录》,土甘草《中药志》,广州相思子《广西药录》

地方名 地香根(广东、广西);广东:黄食草,小叶龙鳞草,细叶龙鳞草,猪腰草,黄蚀草;广西:红母鸡草、假牛甘子(南宁),锁草(平南),铁丝草(百色),石门砍。

功效 全株:清热解毒,舒肝止痛。用于黄疸,肋肋不舒,胃脘胀痛,急、慢性肝炎,乳腺炎。

备考 本品种子有毒,用时必须把豆类全部摘除。

## 7148002

*Abrus mollis* Hance

植物名 毛相思子《豆科图说》

药材名 毛鸡骨草《中药志》

地方名 海南:油甘草,油甘藤,蜻蜓藤;广西:土甘草、子带藤、[甘草](苍梧),牛甘藤(博白),相思豆(平南),鸡骨草(藤县、贵县、北流),芒尾蛇(北流),乳疮根(横县)。

功效 全株:消炎,解毒。用于乳疮,传染性肝炎,小儿疳积。外用于烧、烫伤,疮疖。

备考 荚果有大毒,采用时应注意将荚果除去。

## 7148003

*Abrus precatorius* L. --- *A. pauciflorus* Lesv. --- *A. squamulosus* E. Mey. --- *Glycine abrus* L.

植物名 相思子《高植图鉴》

药材名 相思子《唐本草》、《汇编》

文献名 云南豆于《增订伪药条辨》,红公卵、小人

草、畏羞草、八重山珊瑚《植物名汇》,美人豆、唐小豆、相思树、郎君子《新纲》,南丹真珠、雄丹真珠《豆科图说》,毒红豆(叶《生药》),相思子树《药名汇考》,翼眼豆《药名大辞典》,云南豆子《增订伪药条辨》

地方名 相思豆(福建、广东、广西),赤小豆(北京、广西、云南),红豆、红漆豆、相思藤、鸳鸯豆(广东、广西);福建:鸡母珠;台湾:红厨木,红珠木,红珠子,鸡母子,鸡母真珠,鸡骨草(幼苗),鬼豆,珊瑚豆;广东:相思红豆(广州),吗料豆,郎君豆;广西:山甘草(桂平),土甘草(百色),土甘草豆,文钱红(陆川),阴阳豆(田东),鬼眼子、观音子、相思子根(南宁),观音珠,甘藤,亚公眼,鸡眼子,猫狸根,猴子眼;云南:黑头小鸡(玉溪),小红豆。

功效 种子:有大毒。涌吐,杀虫。外用于癣疥,痈疮,湿疹;根、藤、叶:清热解毒,利尿;根、藤:用于咽喉肿痛,肝炎;叶:用于支气管炎。

## 7148004

*Abrus pulchellus* Wall.

植物名 美丽相思子《豆科图说》

地方名 广东:子金黑。

功效 根:用于黄疸型肝炎,外感风热。

## 7148005

*Acacia arabica* (Lam.) Willd. --- *Acacia nilotica* (L.) Willd. ex De

植物名 阿拉伯金合欢《拉汉英种称》

文献名 阿拉伯胶树《云南种录》,阿伯树胶《中国经植志》,假阿拉伯胶树《台湾药植志》

地方名 台湾:胶树。

功效 嫩叶:用于腹泻;树皮:收敛。用于脱肛,白带,溃疡;树胶:用于糖尿病,并为阿拉伯胶之代用品。

## 7148006

*Acacia catechu* (L.) Willd. --- *Mimosa catechu* L.

植物名 儿茶树《汇编》

药材名 儿茶《饮膳正要》、《药典》

文献名 孩儿茶《饮膳正要》,乌爹泥、乌垒泥、马丁泥《纲目》,百药煎、乌丁《植物名汇》,阿仙药、培克阿仙药、孟买阿仙药、榜葛刺阿仙药《新纲》,亚克沙阿仙药《中国植物图鉴》,粉口儿茶、亚沙阿仙药《豆科图说》,黑色儿茶、培克儿茶(叶《生药》),儿茶膏、西谢《形性鉴别》

地方名 浙江:黑儿茶;云南:“哥西泻”(西双版纳傣语);西藏:“多甲”(藏名)。

功效 去皮枝、干的煎膏:收湿生肌敛疮。用于溃疡不敛,湿疹,口疮,跌扑伤痛,外伤出血。

## 7148007

*Acacia confusa* Merr. --- *A. richii* A. Gray

植物名 台湾相思《高植图鉴》

药材名 台湾相思《广西药录》

文献名 假叶豆《中国植物图鉴》,相思树《台湾药植志》,台湾相思树《福建植志》

地方名 香丝树(福建、台湾);福建:番子树;台湾:相思仔;云南:洋桂花(昆明)。



功 效 嫩芽:用于跌打损伤;鲜枝叶:去腐生肌。外用用于疮疡。

## 7148008

*Acacia decurrens* Willd. --- *A. molissima* Willd.

植物名 线叶金合欢《中国植志》

药材名 线叶金合欢《广西药录》

文献名 栲皮树《台湾药植志》,阿卡锡《药学报》,绿荆树、澳洲细叶金合欢、鱼骨松《中国树木志》

地方名 广东;绿荆;广西:圣诞树(柳州、桂林)。

功 效 树皮:为收敛剂;树胶:代阿拉伯胶用。

## 7148009

*Acacia decurrens* Willd. var. *mollis* Lindl.

植物名 澳洲金合欢《广西药录》

文献名 毛果阿卡锡《药学报》

地方名 阿克锡(福建、海南);广西:圣诞树(南宁)。

功 效 树胶:代阿拉伯胶用。

## 7148010

*Acacia delavayi* Franch. --- *A. cavaleriei* Levl.

植物名 光叶金合欢《中国植志》

文献名 阔叶相思树、老虎刺《豆科图说》,丽江金合欢《云南种录》,阔叶金合欢《中国树木志》

地方名 云南:酸格(玉溪),老虎刺,酸格刺;假臭菜。

功 效 叶、嫩枝、根、果实:消炎健胃,止呕,解毒;叶、嫩枝:用于妊娠呕吐;根:用于腮腺炎,乳腺炎,扁桃腺炎。

## 7148011

*Acacia farnesiana* (L.) Willd. --- *A. indica* Desv.

植物名 金合欢《台湾府志》、《中国植志》

药材名 金合欢《汇编》

文献名 鸭皂树《高植图鉴》,荆球花《中国植物图鉴》,鸭皂树皮、鸭皂树根《中药大辞典》

地方名 消息花、番苏木、牛角花(台湾、云南),〔猪牙皂〕(四川、云南),檀树(广东、云南),牙皂树(福建、云南);福建:绒祖刺(晋江);台湾:羊刚刺,羊港市,蕃仔刺,荆球花;广西:银枝枪(北流);云南:天黄豆、牙皂(玉溪),金钱梅、杨梅花刺、鸭皂角树(红河),洋梅花刺根,山皂荚(蒙自)。

功 效 全株:消肿排脓,收敛止血。用于肺结核,冷性脓肿,风湿性关节炎,疟疾;嫩荚果汁:用于眼痛;下枝:作儿茶膏或代阿拉伯胶用。

## 7148012

*Acacia intsia* (L.) Willd. --- *Mimosa intsia* L.

植物名 臭菜藤《云南种录》

文献名 印度相思树《豆科图说》,藤相思树《台湾药植志》,印度金合欢《中国树木志》

地方名 台湾:相思树;云南:臭香椿(文山),“帕那”(傣语),“拖波季扭”(哈尼语),“普切”(瑶族语)。

功 效 花:用于月经不调;荚果(烧灰):外用治痒;茎、叶:避孕,截疟。

## 7148013

*Acacia pennata* (L.) Willd. --- *Mimosa pennata* L. --

*Acacia hainanensis* Hayata

植物名 羽叶金合欢《中国植志》

药材名 蛇藤《广西药录》

文献名 南蛇筋藤《拉汉英种称》,蛇藤合欢《福建植志》

地方名 浙江:龙骨刺(温州、乐清、瑞安、平阳);海南:加烈酸藤,加力酸藤,南蛇筋藤,南蛇刺;广西:南蛇容(博白),细南蛇(梧州),蚌蛇笏;云南:“宋拜”(西双版纳)

纳 俚语),倒钩藤、红皮毒鱼藤(西双版纳),〔红藤〕(勐腊)。

功 效 根及老茎:祛风湿,强筋骨,活血止痛。用于脊椎骨损伤,腰脊肌劳损,风湿痹痛;叶:用于难产;茎藤:有毒。外用用于急性过敏性渗出性皮炎。

## 7148014

*Acacia senegal* (L.) Willd. --- *Mimosa senegal* L.

植物名 阿拉伯胶树《中国植志》

药材名 阿拉伯胶《药材学》

文献名 胶树《台湾药植志》,亚拉毗亚护漠树、亚拉伯树胶、橡胶脂树(树分),刺合欢《中国树木志》

功 效 树胶:用于腹泻,痢疾,呼吸器官疾患,发烧,子痛,肾脏变性病,水蛭咬伤出血不止,衄血。外用用于保护发炎之创面,如火烧、乳头疾患等。

备 考 我国台湾有栽培。

## 7148015

*Acacia sinuata* (Lour.) Merr. --- *A. rugata* (Lam.) Buch. ex Voigt

植物名 藤金合欢《中国植志》

药材名 藤金合欢《汇编》

文献名 小金合欢《广西植录》

地方名 广东:金合欢;广西:小叶南蛇筋(贺县),细叶南蛇筋(梧州),细青蛇筋(贵县),细南蛇(容县、北流、陆川),〔南蛇藤〕(平南);其他:南蛇公。

功 效 叶:解毒消肿。用于急剧腹痛,牙痛。

## 7148016

*Acacia yunnanensis* Franch.

植物名 滇金合欢《云南种录》

文献名 老虎刺《名实图考》,云南金合欢《中国树木志》,云南相思树《中国植志》

功 效 藤:用于疮毒;果实:通窍。外用治鼻炎。

## 7148017

*Adenanthera pavonina* L.

植物名 海红豆《高植图鉴》

药材名 海红豆《海药本草》、《中药大辞典》

文献名 相思子、孔雀豆《花镜》,西施格树《豆科图说》,红木(树分)

地方名 红豆(台湾、广东);广东:大眼星木,相思树;海南:红球田螺意,银珠;广西:双栖树,红金豆。

功 效 种子:有小毒。用于人黑皮肝瘤,花瓣,头面游风。外用治加速疮疖化脓;叶:用于痛风,肠及尿道出血。

## 7148018

*Aeschynomene indica* L.

植物名 田皂角《名实图考》、《高植图鉴》

药材名 梗通草《饮片新参》、《汇编》

文献名 水茸角、合萌《中藏经》，合明草《本草拾遗》，白梗通《本草正义》，大样夜合草《中国药植志》，夜闭草《民间药与验方》，合蒴《中国药植志》，梗通《药材学》

地方名 水皂角(陕西、广西、四川)，禾镰草、野兰(江西、广西)，夜关门(江苏、湖南)，梳子树(陕西、江西)，[沙苑子](内蒙古、湖北、湖南)；陕西：禾镰树、锯子草、瞎眼蛇药(宝鸡)；山东：光楝子(平邑)，野楝子(费县)，赖楝子(莒南)；江苏：独木根、野皂角(兴化)，锯没子(东海)，烂莲子(新沂)，菖麦、水固麦子(连云港)，水通草，气通草，野通草；上海：野豆莢，野寒豆，野鸭树草；浙江：田马葛(杭州)，野绿豆；安徽：水皂荚，水槐，白胖腿，夹麻，野黄豆；江西：禾镰树子，合萌叶，合萌根；福建：叶顶珠、向天蜈蚣(同安、泉州、武平)，拉田草(宁化)，肥猪草(邵武)，马鞭水芹菜(南平)，海柳；台湾：虱簕草；河南：夜合，水柏枝；湖南：田边夜关门(常德)，连根拔(郴县)，野槐树，野含羞草，蜈蚣杨柳；广东：田皂角；广西：水飞杨、水杨葵(武鸣)，磨地牛甘(玉林)，木排豆，木樨，钩龙草，绿稗子；四川：水通(南川)；其他：皂荚草，豎拔草，黏木树，野皂荚，野荚草。

功效 全草(合萌)：清热解毒，平肝明目，利尿。用于尿路感染，小便不利，黄疸型肝炎，腹水，肠炎，痢疾，小儿疳积，夜盲症，结膜炎，荨麻疹。外用于外伤出血，疖肿；剥去外皮的茎部(梗通草)：利尿，通乳。用于小便不利，乳汁不通；种子：用于眼疾。

#### 7148019

*Afzelia xylocarpa* (Kurz) Craib --- *Pahudia xylocarpa* Kurz --- *P. cochinchinensis* Pierre

植物名 缅茄《中国植志》

药材名 缅茄《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 沔茄《灵秘丹药笺》，细茄《豆科图说》，木果缅茄(拉汉英种称)

地方名 广东：木茄(高州)。

功效 种子：消肿解毒。用于牙痛和眼病。

#### 7148020

*Albizia chinensis* (Osbeck) Merr. --- *Mimosa chinensis* Osbeck

植物名 楹树《中国植志》

药材名 楹树《汇编》

文献名 盈树《植物名汇》，蒙自合欢《豆科图说》

地方名 海南：华楹，母引，水相思；广西：牛尾木(平南)；云南：“谷菜喷”(景颇语)。

功效 树皮：固涩止泻，收敛生肌。用于肠炎，腹泻，痢疾。外用于外伤出血，疮疡溃烂久不收口。

备考 树皮中含合欢催产素，在东非用于引产或催产。

#### 7148021

*Albizia corniculata* (Lour.) Druce --- *A. millettii* Benth. --- *Mimosa corniculata* Lour.

植物名 天香藤《中国植志》

药材名 天香藤《广西药录》

文献名 刺藤《豆科图说》

地方名 海南：白格，黄豆树，藤山丝；广西：香藤(博白)。

功效 木部：行气止痛。

#### 7148022

*Albizia falcata* (L.) Fosberg --- *Albizzia falcata* (L.) Baker ex Merr. --- *Adenanthura falcata* L.

植物名 南洋楹《中国植志》

药材名 南洋楹《广西药录》

地方名 台湾：仁仁树，仁人木，麻六甲合欢。

功效 树皮：固涩止泻，收敛生肌。用于肠炎，疮疡溃烂久不收口，外伤出血。

#### 7148023

*Albizia julibrissin* Durazz.

植物名 合欢《本经》、《中国植志》

药材名 合欢皮《本草拾遗》、《药典》，合欢花《本草衍义》、《药典》

文献名 青堂(崔豹《古今注》)，合昏皮、黄昏《千金方》，合昏《唐本草》，青裳、夜合《图经》，夜合花《本草衍义》，夜合树《救荒本草》，乌绒《雷公炮制药性解》，合欢木堂、乌刺树《纲目》，马缨、马缨花《畿辅通志》，夜合皮《独行方》，明葛、乌赖树《百一选方》，宜男《群芳谱》，尸利洒树《金光明经》，夜合槐、青囊《花镜》，绒树《名实图考》，乌树《本草便读》，茸花枝《分类草药性》，萌葛皮、青裳皮、合昏树皮、乌赖树皮、合欢树、有情树皮、茶花树皮、晴梅条《新纲》，夜合米《药材学》。

地方名 绒花树(河北、陕西、山东、江苏、安徽、河南)，[夜关门](浙江、安徽、湖南)，乌绒树(江苏、上海)；北京：首树；山东：蓉花树(莱芜、历城、平邑)，芙蓉花(长清)，蓉棒头(沂水)，[芙蓉树](济南、莱阳、青岛、荣成)，羊毛花，毛毛花，大毛毛花；江苏：夜花老(溧阳)，乌云树(南汇)，绒花(常熟)，窝绒树，黑心树；浙江：喜绒花(杭州)，合欢米，盲荚；安徽：山麻粘，夹鸡尾；江西：白皮黑心、黑面雷神(泰和)；福建：火柴树(南安)，洗手粉；湖北：扁花树(罗田)，红夜蒿子树；湖南：夜合木、大夜关木(凤凰)，夜合欢；广西：野花木，白合欢；四川：夜合树皮，夜树花；贵州：夜蒿树；云南：独脚金鸡(思茅)，细黑心(陇川)，“敲塞米鹿”(楚雄彝名)，夜蒿花，山合欢，明目花；其他：芙蓉花树。

功效 花序(合欢花)：解郁安神。用于心神不安，忧郁失眠；树皮(合欢皮)：解郁安神，活血消肿。用于心神不安，忧郁失眠，肺病疮肿，跌扑伤痛。

#### 7148024

*Albizia kalkora* (Roxb.) Prain --- *Mimosa kalkora* Rorb.

植物名 山合欢《高植图鉴》

药材名 合欢皮《汇编》

文献名 夜合欢《植物名汇》，山槐(树分)，白花合欢、钩龙树《中国树木志》，白合欢《高植图鉴》

地方名 夜合树(陕西、湖北、湖南、四川、云南)，花旦子(河北、湖南)，夜合(江苏、福建)；河北：花旦；陕西：野胡老(丹凤)；山东：蓉木树(章丘)，芙蓉树(海

阳), 蓉仙花、蓉提、黄蒲纓(青岛), 白樱(崂山), 马缨花; 江西: 白夜合; 福建: 火柴树、蛇形柴(泉州); 湖北: [山桃](咸宁); 湖南: 野合(岳麓山); 广东: 刀头黄; 四川: 夜合花, 夜合树花, 夜合树皮, 合昏, 茸花枝; 云南: “蔽塞米鹿”(楚雄彝名), 夜蒿花, 明目花, 黑心树。

功效 树皮: 解郁安神, 活血消肿。用于心神不安, 忧郁失眠, 肺癰疮肿, 跌扑伤痛。

## 7148025

*Albizia lebbbeck* (L.) Benth.

植物名 阔荚合欢《中国植志》

药材名 阔荚合欢《汇编》

文献名 尸利洒树《金光明经》, 夜合、白夜合树《植物名汇》, 印度合欢、缅甸合欢《树分》, 大叶合欢《豆科图说》, 紫草茸《汇编》

地方名 福建: 夜合树, 火七树; 云南: “麻沙沙坡”(元江哈尼语), 铁夜蒿。

功效 根皮: 固齿, 镇惊, 安神, 驱虫。用于牙床溃瘍, 心悸失眠, 驱蛔虫; 树皮: 收敛, 消肿, 镇痛。用于痔疾, 腹泻。外用于跌打肿痛。

备考 本植物为生产紫草茸的寄主植物。豆荚和种子有溶血作用, 不可内服。

## 7148026

*Albizia mollis* (Wall.) Boiv. --- *A. julibrissin* Durazz. var. *mollis* (Wall.) Benth.

植物名 毛叶合欢《中国植志》

药材名 毛合欢《西昌中草药》

文献名 大毛毛花、夜合树《名实图考》, 毛夜合欢《中国经植志》

地方名 四川: 夜合欢、夜蒿树(西昌); 云南: “嘎邦”(傣语), 羊毛毛, 夜合, 滇合欢。

功效 花、树皮: 理气安神, 解郁, 活血, 消肿止痛。用于心烦失眠, 跌打骨折, 肺癰, 胸悶不舒。

## 7148027

*Albizia odoratissima* (L.f.) Benth.

植物名 香合欢《中国植志》

文献名 黄豆树《豆科图说》

地方名 香须树(广东、贵州、云南); 海南: 乌格, 白丝绒, 香茜藤; 贵州: 山合欢; 云南: 细黑心, 独脚金鸡, 黑心木。

功效 根: 用于风湿性关节炎, 跌打损伤, 创伤出血, 疮癤。

## 7148028

*Albizia procera* (Roxb.) Benth. --- *Acacia procera* Willd. --- *Mimosa elata* Roxb.

植物名 红荚合欢《中国树木志》

文献名 菲律宾合欢《海南植志》

地方名 黄豆树(台湾、海南); 台湾: 白其春, 蕃婆树; 海南: 白格, 白相思, 蕃婆树; 广西: 高合欢。

功效 树皮: 供药用, 亦可毒鱼。

## 7148029

*Alhagi sparsifolia* Shap. ex Kell. et Shap. --- *A. pseudalhagi* auct. non Desr.

植物名 骆驼刺《沙漠植志》

药材名 刺糖《汇编》

文献名 羊刺蜜《北史》, 刺蜜、草蜜、给敦罗《本草拾遗》

地方名 新疆: 骆驼刺糖, “阳塔克西克尔”, “台兰儿别勒”(维名), “延塔克”(维吾尔、乌兹别克、塔吉克名)。

功效 种子: 用于胃痛。外用于牙痛; 刺糖(叶片伤口流出的糖液): 涩肠, 止痛。用于腹痛, 腹泻, 痢疾, 骨蒸烦渴, 头痛。

备考 过去许多文献曾将骆驼刺学名订为 *Alhagi pseudalhagi* Desr.

## 7148030

*Alysicarpus bupleurifolius* (L.) DC.

植物名 柴胡叶链荚豆《广西植录》

文献名 长叶练荚豆、柴胡叶练荚豆《云南种录》

功效 全草: 驳骨消肿, 去腐生肌。用于刀伤, 骨折, 外伤出血, 疮疡溃烂久不收口。

## 7148031

*Alysicarpus rugosus* (Willd.) DC.

植物名 皱缩链荚豆《豆科图说》

药材名 链荚豆《西双版纳傣药志》

## 7148032

*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.

植物名 链荚豆《高植图鉴》

药材名 狗蚁草(福建)、《汇编》

文献名 练荚豆《云南种录》

地方名 福建: 大叶青(东山), 小号野花生; 台湾: 山土豆, 山地豆, 土豆舅, 细本油虫翼, 蝇翼草; 广西: 红豆藤、(韩信草)(玉林), 假花生、假地豆(贵县、富川、钟山)。

功效 全草、根、叶: 活血通络, 清热化湿, 驳骨消肿, 去腐生肌; 全草: 用于慢性肝炎, 蛇咬伤。外用于跌打损伤, 骨折, 外伤出血, 疮疡溃烂久不收口; 根: 用于半身不遂, 股骨酸痛。

## 7148033

*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC. var. *diversifolius* Chun

植物名 异叶链荚豆《广西植录》

文献名 异叶练荚豆《广西药录》

地方名 广西: 利通草(玉林), 投牛转(南宁)。

功效 全草: 用于刀伤, 疮疥。

## 7148034

*Ammopiptanthus mongolicus* (Maxim.) Cheng f. --- *Piptanthus mongolicus* Maxim.

植物名 沙冬青《高植图鉴》

药材名 沙冬青《宁夏中草》

文献名 [冬青]《沙漠植志》, 蒙古沙冬青《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古: “孟和-哈日嘎纳”(蒙名), 蒙古黄花木。

功效 鲜茎、叶: 有毒, 祛风除湿, 活血散瘀。用于冻伤, 慢性风湿性关节痛。

## 7148035

*Ammopiptanthus nanus* (M. Pop.) Cheng f.

植物名 小沙冬青《高植图鉴》

药材名 小沙冬青《汇编》

文献名 新疆沙冬青《中国树木志》

功效 枝、叶：祛风除湿。

## 7148036

*Amorpha fruticosa* L.

植物名 紫穗槐《高植图鉴》

药材名 紫穗槐《北京中草药》

地方名 苕条（东北），椒条（吉林、辽宁、山西、内蒙古、陕西、福建），紫翠槐（山西、内蒙古、陕西），〔槐树〕（江苏、四川），棉槐（东北、山东、江苏），槐花槐（山西、内蒙古、陕西、福建）；辽宁：油条；内蒙古：“宝日·特如图·槐子”（蒙名）；江苏：紫槐（连云港）；河南：紫花槐。

功效 种子：杀虫。

## 7148037

*Amphicarpea bracteata* (L.) Fernald ssp. *edgeworthii* (Benth.) Ohashi --- *A. edgeworthii* Benth.

植物名 具苞两型豆《云南种录》

文献名 两型豆《拉汉英种称》

地方名 云南：大麻药（腾冲）。

功效 块根：止痛。

## 7148038

*Amphicarpea trisperma* Baker

植物名 三籽两型豆《高植图鉴》

药材名 阴阳豆（吉林、浙江）

文献名 阴阳豆《拉汉种称》，两型豆、银豆（东北草本植志）

地方名 野毛扁豆（吉林、陕西、福建）；吉林：山巴豆；陕西：〔山豆根〕（太白山），野毛豆（丹凤）；浙江：鸟豆（丽水），野扁豆（临安），野豇豆（江山）；湖南：小山豆根，野黄豆。

功效 根、全草：消食，解毒；根：用于消化不良；全草：用于体虚自汗，盗汗，夏季预防疮疖，孕妇生疮疖。

## 7148039

*Apios carnea* (Wall.) Benth. ex Baker --- *Cyrtotrophia carnea* Wall.

植物名 肉色土圞儿《高植图鉴》

药材名 肉色土圞儿《广西药录》

文献名 山红豆花《名实图考》，鸭咀花《中国经植志》

地方名 湖南：“奎拉丁”（蓝山县瑶名）；广西：野豆子（全州）。

功效 根：强筋补肾，用于肾虚腰痛；种子：用于目赤肿痛。

## 7148040

*Apios fortunei* Maxim.

植物名 土圞儿《高植图鉴》

药材名 土圞儿《救荒本草》、《汇编》

文献名 地栗子《救荒本草》，九子羊《名实图考》，山

红豆花《牧野日图》，食用土圞儿《豆科图说》

地方名 九牛子（安徽、江西），三叶青（浙江、安徽、江西），土子（河南、贵州），土蛋（安徽、河南、贵州），金丝吊葫芦（浙江、安徽），金线吊葫芦（浙江、江西、湖南），野凉薯（湖南、四川），野绿豆（安徽、江西）；陕西：山洋芋；浙江：黄皮三叶青（瑞安），黄皮狗卵（临安、绍兴），佛鸡子；江西：子鸡生蛋（吉安），〔山茨菇〕（婺源）；福建：定风珠（闽清）；湖北：老君丹；湖南：九连珠，土鸡蛋，土凉薯，罗汉参，琴母草（衡山）；广西：乳薯（三江），痲子薯；四川：九子藤，豆芋；贵州：野豆子，野豆根。

功效 块根、叶、种子：清热解毒，化痰止咳。用于百日咳，感冒咳嗽，咽喉肿痛。外用于毒蛇咬伤，疮疡肿毒。

## 7148041

*Apios taiwanianus* Hosokawa

植物名 台湾土圞儿《台湾药植志》

功效 全草：用于喉痛，亦为强壮剂。

## 7148042

*Arachis hypogaea* L.

植物名 落花生《高植图鉴》

药材名 落花生《滇南本草》，花生油《纲目拾遗》，花生衣、花生壳《汇编》

文献名 花生《酉阳杂俎》，落花参《滇南本草》，番豆、土露子《物理小识》，长生果《本经逢原》，落地松、地豆《滇海虞衡志》，落地生《刘启堂经验秘方》，〔土豆〕、落花生油《纲目拾遗》，及地果《南城志》，千岁子《花镜》，地果《名实图考》，香芋《新纲》，万岁果《和汉药物学》，花生番豆《豆科图说》，番果《现代实用中药》

地方名 内蒙古：落哈生（蒙名）；山东：长果（鲁西、鲁南），果子（临沂）；江苏：南京豆（南京）；福建：涂豆（晋江）；云南：及第果。

功效 种皮（花生衣）：止血，散瘀，消肿。用于血友病，类血友病，原发性及继发性血小板减少性紫癜，肝病出血症，术后出血，癌肿出血，胃、肠、肺、子宫等出血；种子（花生米）：润肺，和胃。用于燥咳，反胃，脚气，乳妇奶少；种子油（花生油）：润肠通便。用于蛔虫性肠梗阻。外用于穴位注射治肠炎，地图舌；果荚壳：敛肺止咳。用于久咳气喘，咳痰带血；枝、叶：用于跌打损伤，疮毒，高血压。

## 7148043

*Astragalus acaulis* Baker

植物名 无茎黄芪《迪庆藏药》

药材名 塞嘎《迪庆藏药》

功效 花、果：利水，清热。用于“培根”病，腹水，虚性水肿，脾热，肺热，腹痛。

## 7148044

*Astragalus adsurgens* Pall.

植物名 直立黄芪《高植图鉴》

文献名 直茎黄芪《汇编》，斜茎黄芪《东北草本植志》，野鸡颈子草《指示植物》，青扫条、紫木黄芪《豆科图说》

地方名 〔地丁〕（西北），〔沙苑子〕（宁夏、江苏），马

绎肠(内蒙古、甘肃);辽宁:二人抬(本溪);内蒙古:“矛日音-好恩其日”(蒙名);甘肃:沙打旺;江苏:苦草(淮阴),沙大王(射阳),沙灶、闹草(睢宁)。

备考 江苏与宁夏部分地区以其种子混作沙苑子用,此物甚毒,宜注意使用。

## 7148045

*Astragalus aksuensis* Bunge

植物名 阿克苏黄芪《中药大辞典》

地方名 新疆:黄芪。

功效 根:补气固表,托疮生肌。

## 7148046

*Astragalus balfourianus* Simpon --- *A. tribulifolius* Benth. ex Bunge

植物名 雪山芪《云南种录》

药材名 雪山芪《云南中草药》

文献名 滇西北黄芪《豆科图说》,拟蒺藜黄芪《西藏植志》

功效 根:补中益气,壮阳益肾。用于体虚,贫血,产后虚弱,子宫脱垂,脱肛,自汗。

## 7148047

*Astragalus bhotanensis* Baker

植物名 地八角《高植图鉴》

药材名 地八角《滇南本草》、《云南中草药》

文献名 球花紫云英《汇编》,不丹黄芪《豆科图说》

地方名 陕西:〔土牛膝〕(延安);宁夏:地八椒(六盘山);四川:“色拉”(藏名);云南:旱皂角、地皂角、八角花(昆明),野落地松(景谷),黄鳝草(普洱)

功效 全草:清热,镇咳,止痢,解毒,利尿。用于扁桃体炎,浮肿,牙痛,口鼻出血,麻疹。

备考 本品不可作黄芪入药。

## 7148048

*Astragalus camptodentus* Franch.

植物名 弯齿黄芪《豆科图说》

药材名 滇楠芪《云南药录》

地方名 云南:黄芪,滇黄芪。

功效 根:固表止汗,益气补虚,排脓生肌。用于体虚盗汗,疮疖。

## 7148049

*Astragalus chinensis* L.

植物名 华黄芪《高植图鉴》

文献名 木黄芪《满蒙植物志》,地黄芪《东检》

地方名 沙苑子(天津、内蒙古、江苏、浙江);河北:芒牛旦;内蒙古:“道木大图音-好恩其日”(蒙名);其他:牯牛花。

功效 种子:补肾,固精,养肝,明目。

备考 根在东北一带为黄芪之下品,实难入药《药材学》。

## 7148050

*Astragalus chrysopterus* Bunge

植物名 金翼黄芪《豆科图说》

药材名 金翼黄芪《汇编》

地方名 小黄芪(河北、山西、甘肃、青海),小白芪

(河北、甘肃、青海);陕西:黄芪(太白山);青海:“塞赛尔”(藏名),白芪;其他:茂县白芪。

功效 根:补气固表,托疮生肌;全草:用于利尿,外用于创伤。

## 7148051

*Astragalus complanatus* R. Br. ex Bunge

植物名 扁茎黄芪《高植图鉴》

药材名 沙苑子《临证指南医案》、《药典》

文献名 沙苑蒺藜、同州白蒺藜、沙苑白蒺藜《图经》,沙苑蒺藜子《本草求真》,潼蒺藜《本草便读》,沙蒺藜《增订伪药条辨》,白蒺藜《本草原始》,大沙苑子《华北药志》,扁茎紫云英《黄河中游植物名录》,蔓黄芪《豆科图说》,夏黄芪《东检》,潼沙苑《药学学报》,关沙苑《常用中药名辨》

地方名 黑皮芪、铁皮芪、铁芪、生芪(辽宁、内蒙古);吉林:夏黄草;河北:铁杆黄芪,蛇牛胆;内蒙古:“哈布他盖-好恩其日”(蒙名),复黄芪;陕西:大沙苑,同蒺藜;其他:潼关蒺藜,绿蒺藜,腰蒺藜。

功效 种子:温补肝肾,固精,缩尿,明目。用于肾虚腰痛,遗精早泄,白浊带下,小便余沥,眩晕目昏。

备考 宋·元·明时期的文献资料中所出现的白蒺藜的名,多指沙苑蒺藜,非现今的白蒺藜(刺蒺藜)。

## 7148052

*Astragalus degensis* Ulbr. var. *rockianus* Peter-Stibai

植物名 丽江窄翼黄芪《迪庆藏药》

药材名 毫木《迪庆藏药》

文献名 窄翼黄芪《云南种录》

功效 花:利水,清热,开郁。用于热病,水肿,烦闷,疮热。

## 7148053

*Astragalus englerianus* Ulbr.

植物名 蒙自黄芪《云南种录》

文献名 恩氏黄芪《豆科图说》,野黄芪《云南药录》

功效 根:补中升阳,固表,止汗,排脓生肌,利尿退肿。用于久病体弱,四肢无力,阳虚自汗,久泻脱肛,子宫脱垂,乳汁不足,痈疽肿毒,慢性皮肤溃疡,水肿。

## 7148054

*Astragalus ernestii* Comb.

植物名 梭果黄芪《豆科图说》

药材名 梭果黄芪《汇编》

地方名 四川:黄芪(理塘)。

功效 根:补气固表,利尿托毒,排脓敛疮生肌。

## 7148055

*Astragalus floridus* Benth. ex Bunge

植物名 多花黄芪《豆科图说》

药材名 多花黄芪《汇编》

地方名 黄芪(青海、四川);青海:小叶黄芪,“塞赛尔”(藏名);四川:“纳洼色”(藏名),川芪,川黄芪,白绵芪,花生黄芪,棉芪,棉黄芪。

功效 根:补气固表,托疮生肌。

## 7148056

*Astragalus henryi* Oliv.

植物名 秦岭黄芪《秦岭植志》

地方名 黄芪(陕西、湖北);陕西:鄂西黄芪,湖北黄芪。

功效 根:补气固表,托疮生肌。用于糖尿病。

#### 7148057

*Astragalus hoantchy* Franch.

植物名 乌拉特黄芪《中国植志》

文献名 贺兰山黄芪、黄芪《内蒙古中草药》,库伦芪《药材学》,粗壮黄耆《植物研究》

功效 根:补气固表,托疮生肌。

备考 本品库伦不产,称库伦芪或库伦黄芪均误。

#### 7148058

*Astragalus josephii* Peter-Stibál

植物名 沙基黄芪《迪庆藏药》

药材名 塞那《迪庆藏药》

文献名 川西南黄芪《云南种录》

功效 花或全草:利水,托毒。用于腹水,体虚浮肿,疮疖。

#### 7148059

*Astragalus kialensis* Simpson

植物名 西康黄芪《云南种录》

药材名 塞那《迪庆藏药》

功效 花或全草:利水,托毒。用于腹水,体虚浮肿,疮疖。

#### 7148060

*Astragalus lepsensis* Bunge

植物名 伊宁黄芪《新疆中草药》

地方名 新疆:黄芪。

功效 根:补气固表,止汗,托疮,生肌,利尿,消肿。

#### 7148061

*Astragalus licentianus* Hand. -Mazz.

植物名 甘肃黄芪《迪庆藏药》

药材名 塞盎《迪庆藏药》

功效 全草:利尿,愈疮。用于水肿,诸疮;煎膏:用于创伤。

#### 7148062

*Astragalus mahoschanicus* Hand. -Mazz.

植物名 马河山黄芪《高植图鉴》

地方名 青海:“塞赛尔”(藏名)。

功效 根:补气固表,托疮生肌;全草:用于利尿。外用用于创伤。

#### 7148063

*Astragalus maowenensis* Hsiao

植物名 茂汶黄芪《汇编》

地方名 四川:黄芪,川绵芪,白绵芪。

功效 根:补气固表,托疮生肌。

#### 7148064

*Astragalus melilotoides* Pall.

植物名 草木樨状紫云英《豆科图说》

文献名 草木樨状黄芪、紫云英、山胡麻《豆科图说》,苦豆根《沙漠药植》,草木犀黄芪《东北草本植志》

地方名 内蒙古:“哲格仁-希勒比”、“舒乌儿”、“泽连-希利比”(蒙名),小马层子,层头,秦头;陕西:扫帚苗(陇东);青海:“苏巴达息”(藏名)。

功效 全草:祛风湿,止咳,化痰。用于风湿性关节痛,四肢麻木,咳嗽,耳聋。

#### 7148065

*Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge

植物名 膜荚黄芪《高植图鉴》

药材名 黄芪《本经》、《药典》

文献名 黄耆、戴椹《本经》,戴椹、独椹、蜀脂、百本、芰草《别录》,王孙《药性论》,百药绵(侯宁极《药谱》),木耆《唐本草》,绵黄芪、宪州黄芪《图经》,箭芪(刘仕廉《医学集成》),东三省黄芪《豆科图说》,绵上黄芪、山西绵黄芪、山西白皮芪、正芪、冲正芪、东北山黄芪(赵《黄芪生药学研究》),东山黄芪《高植图鉴》,木黄芪《哈农学报》,条芪《中草药学》,箭杆花《陕甘宁植志》

地方名 茨松(河北、山西),卜黄芪(东北),卜奎芪(黑龙江、内蒙古),口芪(东北、河北、内蒙古),东北黄芪(河北、内蒙古、浙江),绵芪(山西、四川),大黄芪(黑龙江、甘肃),西芪(黑龙江、内蒙古、青海),北黄芪(黑龙江、内蒙古),土山爆张根(新疆、山东),宁古塔芪(黑龙江、吉林),黑石滩芪(内蒙古、河北);黑龙江:鸡爪芪、鞭杆芪(黑河);辽宁:二人抬;山西:白黄芪,生黄芪(绵山),西绵芪、西黄芪(浑源);内蒙古:“扫色色尔卜”、“好恩其日”(蒙名),北芪;甘肃:鸡肚花(岷县),马鞭根,独根;青海:大有芪;山东:山爆仗(烟台)。

功效 根:补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,痈疽难溃,久溃不敛,血虚痿黄,内热消渴,慢性肾炎蛋白尿,糖尿病;蜜制黄芪:益气补中。用于气虚乏力,食少便溏;蒸叶:用于疗渴,筋挛,痈肿,疽疮。

#### 7148066

*Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge var. *mongholicus* (Bunge) Hsiao --- *A. mongholicus* Bunge

植物名 蒙古黄芪《中药志》

药材名 黄芪《本经》、《药典》

文献名 黄耆、戴椹《本经》,戴椹、独椹、蜀脂、百本、芰草《别录》,王孙《药性论》,百药绵(侯宁极《药谱》),木耆《唐本草》,棉黄芪、宪州黄芪《图经》,箭芪(刘仕廉《医学集成》),内蒙黄芪《药材学》,内蒙古黄芪《汇编》

地方名 黑石滩芪(河北、内蒙古),红蓝芪(山西、内蒙古);黑龙江:卜黄芪;河北:大黄芪;山西:浑源芪(浑源产),大岚芪(大岚产),绵芪(交城产);内蒙古:武川芪(武川产),“混其日”、“蒙古勒-好恩其日”(蒙名),绵花芪,生黄芪,北黄芪,北芪,口黄芪,北口芪,口芪;陕西:壮芪(绥德产);上海:西黄芪;四川:“色卡”(若尔盖藏名);其他:冲正芪,正炮台芪,副炮台芪,正小皮,副小皮,白皮芪,东北正口芪,二号红蓝芪,北箭芪。

功效 根:补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,痈疽难溃,久溃不敛,血虚痿

黄,内热消渴,慢性肾炎蛋白尿,糖尿病;蜜制黄芪:益气补中。用于气虚乏力,食力便溏;茎叶:用于疗渴,筋挛,痲肿,疽疮。

7148067 见 7148066

7148068

*Astragalus monadelphus* Bunge

植物名 单体蕊黄芪《豆科图说》

文献名 鳌山黄芪《中药通报》,单蕊黄芪《西藏植志》

地方名 四川:“色卡”(若尔盖藏名)。

功效 根:补气固表,托疮生肌。用于体虚自汗,久泻,脱肛,子宫脱垂,慢性肾炎,体虚浮肿,慢性溃疡,疮口久不愈合。

7148069

*Astragalus polycladus* Bur. et Franch.

植物名 多枝黄芪《豆科图说》

地方名 青海:“塞莫”(藏名)。

功效 花:外用于消炎。

7148070

*Astragalus prattii* Sims.

植物名 短苞黄芪《云南种录》

药材名 塞色《迪庆藏药》

功效 花:止血痢,愈合血管,止痛,清疮。用于“木保”病疼痛,血痢,创伤;全草鲜汁:外用于敷疮。

7148071

*Astragalus przewalskii* Bunge

植物名 黑紫花黄芪《豆科图说》

地方名 青海:〔黄芪〕(民和、互助)。

备考 根:青海个别县将根少量混入黄芪使用。

7148072

*Astragalus scaberrimus* Bunge

植物名 粗糙紫云英《豆科图说》

文献名 春黄芪、掐不齐《豆科图说》,糙叶黄芪《东北草本植志》

功效 根:国外文献报导曾作抗肿瘤药。

7148073

*Astragalus sievesianar* Pall.

植物名 绵果黄芪《沙漠植志》

药材名 绵毛黄芪《中药志》

地方名 新疆:塔城黄芪。

功效 根:补气固表,托疮生肌。

7148074

*Astragalus sinicus* L.

植物名 紫云英《高植图鉴》

药材名 紫云英《汇编》

文献名 苕《诗经》,柱天、摇车《尔雅》,翹摇《本草拾遗》,铁马豆、黄花马豆《滇南本草》,翹翹花、野蚕豆、红花菜、翹摇草《名实图考》,荷花紫草《芥子园画谱》,荷花黄《耕心农话》,苕、莲花草、荷花郎《豆科图说》,草沙苑《中国药植图鉴》,红花草子《药学报》,〔腰葵藜〕《中药志》

地方名 〔沙苑子〕(江苏、福建、四川),红花草(江

苏、江西、广西),草葵藜(江苏、浙江、江西),草籽(上海、浙江);陕西:滚龙珠,斑鸠窝;江苏:红花郎(苏州);浙江:花草(浙北);江西:米筛花草,花菜,紫云英子;湖北:羊儿花(鹤峰);广西:石吐风(梧州);四川:马苕子(江油),江西苕子(成都),〔沙葵藜〕,〔沙苑葵藜〕;贵州:米伞花,灯笼花,野鸭草,野豌豆,斑鸠花,螃蟹花,〔葵藜子〕;其他:货郎子。

功效 根、全草和种子:祛风明目,健脾益气,解毒止痛;根:用于肝炎,营养性浮肿,白带,月经不调;草:用于急性结膜炎,神经痛,带状疱疹,疮疖痲肿,痔疮;种子:用于眼部疾患。

7148075

*Astragalus skythropos* Bunge

植物名 威黄芪《迪庆藏药》

药材名 塞盎《迪庆藏药》

功效 全草:利尿,愈疮。用于水肿,诸疮;煎膏:用于创伤。

7148076

*Astragalus sungpanensis* Peter-Stibai

植物名 松潘黄芪《迪庆藏药》

药材名 塞木《迪庆藏药》

功效 花:利水,清热,开郁。用于热病,水肿,烦闷,疮热。

7148077

*Astragalus tanguticus* Bat.

植物名 青海黄芪《西藏植志》

地方名 青海:“塞完”(藏名)。

功效 全草:退热,镇痛,催吐,利尿。用于溃疡病,胃痉挛,水肿。外用于创伤。

7148078

*Astragalus tatsinensis* Bur. et Franch. --- *Astragalus yunnanensis* Franch. var. *tatsinensis* (B. et Fr.) Cheng f.

植物名 康定黄芪《迪庆藏药》

药材名 塞嘎《迪庆藏药》

文献名 打箭炉黄芪《豆科图说》

功效 花、果:利水,清脾,肺热。用于“培根”病,腹水,虚性水肿,脾热,肺热,腹痛。

7148079

*Astragalus tibetanus* Benth. ex Bunge

植物名 西藏黄芪《西藏植志》

文献名 藏黄芪《豆科图说》,藏棉芪、滇绵芪《汇编》,春黄芪《中药大辞典》

地方名 黄芪(云南、西藏)。

功效 根:强壮补气,排脓生肌,利尿止汗。用于久病衰弱,慢性肾炎浮肿,消化不良,贫血,自汗,盗汗,糖尿病,痲肿疮疖,痢疾,月经不调,带下。

7148080

*Astragalus tongolensis* Ulbr.

植物名 塘谷耳黄芪《豆科图说》

药材名 黑毛果黄芪《汇编》

文献名 晋芪《中国药植图鉴》,黄芪《中药大辞典》,

## 白毛果黄芪《中草药通讯》

地方名 甘肃:马芪,白芪(岷县),白大芪;青海:土黄芪,大叶黄芪,“豆赛”、“大牙甘”(藏名);四川:“善舍儿”(若尔盖藏名),胡豆棉芪(理县),连七(宝兴),川绵芪,白绵芪,棉芪,棉黄芪,川芪;云南:东俄洛黄芪。

功效 根:补气固表,托疮生肌;花、全草:消炎接骨。用于关节痛。外用于消肿。

## 7148081

*Astragalus yunnanensis* Franch.

植物名 云南黄芪《高植图鉴》

文献名 黄花绵芪《云南药录》

地方名 黄芪(西藏、云南)。

功效 根:补中益气,壮阳益肾。

## 7148082

*Atylosia mollis* (Willd.) Benth. --- *Cantharospermum volubile* (Blanco) Merr.

植物名 虫豆《高植图鉴》

药材名 虫豆《广西药录》

文献名 蝙蝠豆《名实图考》

功效 全株:解毒。用于疮疥。

## 7148083

*Atylosia scarabaeoides* (L.) Benth. --- *Cantharospermum scarabaeoides* (L.) Baill.

植物名 蔓草虫豆《高植图鉴》

药材名 蔓草虫豆《汇编》

文献名 止血草、水风草、假地豆草《汇编》

地方名 福建:三叶金(漳浦),倒地一条根(泉州);台湾:[山豆根];广东:山地豆草、地豆草、软枝地豆草(潮州),假地豆(揭阳、海丰、陆丰);海南:假黄麻(澄迈);广西:小葛根(柳江),山栏豆(玉林),细叶金钱草(防城),乳痂草(贵县);四川:虫豆,山黄豆(西昌)。

功效 叶:解暑利尿,止血生肌。用于伤风感冒,风湿水肿。外用于外伤出血;根:解热。用于牙痛,咽喉痛,淋病。

## 7148084

*Bauhinia acuminata* L.

植物名 白花羊蹄甲《中国植志》

文献名 马蹄豆《植物名汇》,木碗树《台湾药植志》,渐尖羊蹄甲《云南种录》

地方名 广东:泽紫荆。

功效 根:用于咳嗽;叶:作泥罨剂。外用于鼻部溃疡。

## 7148085

*Bauhinia aurea* Levl.

植物名 火索藤《中国植志》

药材名 牛蹄藤《云南中草药》

文献名 红绒毛羊蹄甲《高植图鉴》,红茸毛羊蹄甲《广西植录》,金毛羊蹄甲《云南种录》,金叶羊蹄甲《中国树木志》

地方名 广西:合掌风(平南),古花(马山);四川:黄麻藤;云南:九龙藤、红毛藤(红河)。

功效 根、茎:祛风除湿,活络止痛。用于风湿性

关节炎,鹤膝风,跌打损伤,胃痛,肾炎,黄疸型肝炎,疟疾。

## 7148086

*Bauhinia brachycarpa* Wall. ex Benth. --- *B. faberi* Oliv. --- *B. enigmatica* Prain --- *B. bonatina* Pam-pan.

植物名 鞍叶羊蹄甲《中国植志》

药材名 马鞍叶《汇编》

文献名 马鞍叶羊蹄甲《豆科图说》,马鞍羊蹄甲《四川中药志》

地方名 夜关门(四川、云南),夜合叶(贵州、云南);甘肃:桑角子;湖北:猪腰子藤(巴东、建始);广西:[大飞扬](乐业),[小飞扬]、羊蹄藤(隆林),蝴蝶风,木夜关门(罗城);四川:双肾藤(盐边),大金刀,羊蹄甲,破破藤,柴米子根;云南:[夜合花](红河),“丕米里”(楚雄彝名),夜合欢,马鞍花,马蹄叶。

功效 根:止泻,安神,止痛,散结。用于腹泻,神经官能症,筋骨疼痛。外用于颈淋巴结结核;叶、幼枝:解湿毒,祛腐生肌。用于天泡疮,顽癣,皮肤湿疹,痢疾溃烂,烧烫伤。

## 7148087

*Bauhinia championii* (Benth.) Benth. --- *B. championii* Benth. var. *acutifolia* L. Chen

植物名 龙须藤《中国植志》

药材名 龙须藤《汇编》

文献名 过岗龙《生草药性备要》,木腰子《生草药手册》,田螺虎树《名实图考》,过江龙子《岭南采药录》,羊蹄甲《中草药通讯》,尖叶龙须藤《广西药录》

地方名 羊蹄叉(湖南、广西),[钩藤](湖南、台湾),百代藤(海南、广西),羊蹄藤(福建、广东、广西),菊花木(台湾、广东),五花血藤(湖南、广东),圆龙(广东),燕子尾(福建、湖南、广西);浙江:子燕藤,三益藤(乐清),双木蟹(平阳),五里藤,黄开口;江西:田螺虎树;福建:梅花入骨丹(宁化),入骨丹(厦门),白蛇藤(龙岩),羊角草(仙游),鱼尾叉(南安),穿龙木(莆田),绞剪草(南靖),蝴蝶藤(云霄),蝶藤;台湾:花藤;湖南:夜合草,千打捶,九牛燥,马脚藤,羊甲木,五花过山龙,牛蹄风,红过山龙,箭头树,川心菊,五花活血;广东:过江龙(广州、佛山、从化、罗定、德庆),过岗圆龙,扭骨风(徐闻、海康、廉江、遂溪、电白),左扭风(广宁、四会),左脑风(高州),血龙、五花血龙(广州),乌酸极、白蝶藤、尾蝶藤(潮阳),九龙灯(徐闻),羊蹄脚(增城),鱼尾枫,双勾藤、牛脚甲、羊衣树、罗亚多藤、马迹藤(南雄),猪迹藤(曲江、南雄),钻骨丹、穿心菊(兴宁),合掌藤,乌郎藤,蛤叶;海南:陈刻婆(儋县),利洛藤、猪鬃麻(琼中、乐东);广西:乌藤、钓鱼勾、乌藤柴(桂林),飞扬藤(桂林、北流),九龙根(陆川、博白、贵县),[淫羊霍](藤县),九龙藤(贺县、南宁、河池),九龙藤叶(南宁),羊蹄风、燕子藤(河池),黑梅花藤(田阳),串鼻藤,猪蹄叉,黑皮藤,勾燕(上林、贵县),山道藤(桂平),乌皮藤,搭袋藤;贵州:夜关门,夜关叶,黔羊蹄甲。

功效 藤:祛风除湿,活血止痛,健脾理气。用于风湿性关节炎,腰腿痛,跌打损伤,胃痛,小儿疳积;种



子;理气止痛,活血散瘀。

#### 7148088

*Bauhinia corymbosa* Roxb. ex DC. --- *Phanera corymbosa* Benth.

植物名 苜蓿藤(海南)、《中国植志》

文献名 深裂叶羊蹄甲《广西药录》

地方名 海南:总管藤;广西:[小飞扬]。

功效 叶:去毒,洗疮。

#### 7148089

*Bauhinia delavayi* Franch.

植物名 薄甲羊蹄甲《中国植志》

文献名 德氏羊蹄甲《豆科图说》,羊蹄甲《云南药录》,川滇羊蹄甲《中国树木志》,宾川羊蹄甲《云南种录》

地方名 云南:夜关门。

功效 根:止血。用于咳嗽,遗尿,咯血,吐血,大肠下血,白带。

#### 7148090

*Bauhinia didyma* L. Chen

植物名 李叶羊蹄甲《中国植志》

文献名 二叶片羊蹄甲、二裂片羊蹄甲《广西药录》

地方名 广东:牛耳麻,飞机藤(信宜);广西:飞扬藤(北流),燕子尾(岑流、梧州)。

功效 枝、叶:用于葡萄球菌性脓疱疹;叶:外用于疮疖。

#### 7148091

*Bauhinia glauca* (Wall. ex Benth.) Benth. --- *Bauhinia paraglauca* Tang et Wang

植物名 粉叶羊蹄甲《中国植志》

文献名 拟粉叶羊蹄甲《豆科图说》

地方名 夜关门(湖南、贵州);湖南:五花血藤,牛蹄风,早关门,羊爪风,羊蹄风,羊脚藤;广西:燕尾藤(龙胜);贵州:菌串子根、蝴蝶草(贵阳),蝴蝶草根。

功效 根:收敛止血。用于咳嗽,咯血,遗尿;茎:用于风湿骨痛;叶:外用于疮疖。

#### 7148092

*Bauhinia glauca* Benth. ssp. *hupehana* (Craib) T. Chen --- *B. hupehana* Craib --- *B. hupehana* Craib var. *grandis* Craib

植物名 鄂羊蹄甲《中国植志》

药材名 鄂羊蹄甲《中药大辞典》

文献名 湖北羊蹄甲《汇编》,双肾藤《四川中药志》

地方名 马蹄(陕西、四川),羊蹄甲(湖北、四川);湖北:肾子叶(鹤峰),猪腰子藤,白公堂,云霄藤;湖南:过岗藤,田螺虎树,缺月藤,鹰爪风;四川:马鞍藤,过山龙,猪腰藤,腰子藤;贵州:缺叶藤,[夜关门];其他:羊蹄藤。

功效 根:行气,止痛,收敛,止血。用于防治痢疾,睾丸肿痛,阴囊湿疹,吐血,遗尿,子宫脱垂;藤:祛风,活血,解毒。用于风湿疼痛,风疹搔痒,阴囊湿疹。

#### 7148093

*Bauhinia glauca* (Wall. ex Benth.) Benth. subsp.

*pernervosa* (L. Chen) T. Chen --- *B. pernervosa* L. Chen

植物名 显脉羊蹄甲《中国植志》

药材名 大夜关门《汇编》

文献名 多脉叶羊蹄甲《豆科图说》,多脉羊蹄甲《高植图鉴》,羊蹄风、猪腰藤《汇编》,关门草《中药大辞典》

地方名 贵州:夜关门,大夜关门根。

功效 根叶:补肾固精,止咳,止血;根:用于遗精,遗尿,咳嗽,血崩;叶:用于脱肛,子宫脱垂。

#### 7148094

*Bauhinia glauca* (Wall. ex Benth.) Benth. subsp. *tenuiflora* (Watt ex Clarke) K. et S. S. Larsen --- *B. tenuiflora* Watt ex Clarke --- *Phanera tenuiflora* (Watt ex Clarke) de Wit

植物名 薄叶羊蹄甲《中国植志》

药材名 薄叶羊蹄甲《云南药录》

文献名 蜜花羊蹄甲、深裂叶羊蹄甲《豆科图说》

功效 叶:外用于腹痛。

#### 7148095

*Bauhinia lecomtel* Gagnep.

植物名 黔羊蹄甲《汇编》

文献名 尖叶龙须藤《云南种录》

地方名 贵州:马蹄叶。

功效 叶、根:理气止痛,利尿化痰。用于小便不利,劳伤腰痛,胞衣不下,跌打损伤。

#### 7148096

*Bauhinia ornata* Kurz var. *austrosinensis* (Tang et Wang) T. Chen --- *B. austrosinensis* Tang et Wang --- *B. kerrii* auct. non Gagnep.

植物名 琼岛羊蹄甲《中国植志》

文献名 羊蹄藤《海南植志》,绸缎木《广西植志》,木飞扬《广西药录》

功效 枝、叶:外用于洗飞扬疮。

备考 《海南植志》(2),1965 学名 *Bauhinia kerrii* Gagnep. 系误订。

#### 7148097

*Bauhinia purpurea* L.

植物名 羊蹄甲(广州)、《中国植志》

药材名 紫羊蹄甲《台湾药植志》

文献名 玲甲花《名实图考》,白紫荆《豆科图说》

地方名 台湾:洋紫荆。

功效 根:驱风。外用于烫伤,脓疮;叶:用于跌打损伤,骨折,咳嗽。外用于溃疡疮疖。

#### 7148098

*Bauhinia pyrrhoclada* Drake --- *Phanera pyrrhoclada* (Drake) de Wit

植物名 红毛羊蹄甲《中国植志》

文献名 红毛枝羊蹄甲《广西药录》

地方名 海南:羊蹄藤;广西:九龙根(龙州、苍梧),马脚风(桂平),双合掌(隆林),合掌风(北流、平南、博白),猪腰藤(凤山)。

功效 茎、叶:祛风。用于小儿惊风。

#### 7148099

*Bauhinia racemosa* Lam. --- *B. parviflora* Vahl

植物名 总状花羊蹄甲《中国植志》

药材名 总状花羊蹄甲《台湾药植志》

文献名 硬叶羊蹄甲《中国树木志》, 总序羊蹄甲《云南种录》

功效 树胶及叶: 用于疟疾发烧, 头痛。

#### 7148100

*Bauhinia tomentosa* L.

植物名 黄花羊蹄甲《中国植志》

药材名 黄花羊蹄甲《台湾药植志》

功效 树皮、根: 收敛, 驱虫。用于肝炎; 树皮: 外用治肿瘤, 创伤; 叶、花: 用于痢疾; 果实: 利尿。

#### 7148101

*Bauhinia touranensis* Gagnep. --- *Bauhinia genuflexa* Craib --- *Bauhinia rocheri* Levl. --- *Bauhinia henryi* Craib

植物名 囊托羊蹄甲《中国植志》

文献名 囊萼管羊蹄甲、越南羊蹄甲《豆科图说》, 囊萼羊蹄甲《广西药录》

地方名 广西: 羊蹄(贺县), 夜关门藤(环江)。

功效 茎: 驱风活络。外用于疮疖。

#### 7148102

*Bauhinia variegata* L. --- *Phanera variegata* (L.) Benth.

植物名 洋紫荆《中国植志》

药材名 羊蹄甲《汇编》

文献名 玲甲花《名实图考》, 弯叶树《树分》, 紫荆《岭南学报》, 红花紫荆、红紫荆《豆科图说》

地方名 福建: 红蝴蝶; 广东: 双飞蝴蝶(清远、佛冈), 马蹄豆, 紫荆树(阳山、连县), 猪迹树; 广西: 飞扬藤(北流), 红花羊蹄甲。

功效 根: 止血, 健脾。用于咯血, 消化不良; 树皮: 健脾燥湿。用于消化不良, 急性胃肠炎; 叶: 润肺止咳, 缓泻。用于咳嗽, 便秘; 花: 消炎解毒。用于肝炎, 肺炎, 支气管炎。

#### 7148103

*Bauhinia variegata* L. var. *candida* (Roxb.) Voigt --- *B. candida* Roxb. --- *B. variegata* L. var. *candida* (Roxb.) Corner --- *B. variegata* L. var. *alboflava* de Wit

植物名 白花洋紫荆《广西药录》

药材名 白花洋紫荆《广西药录》

文献名 白花树《西双版纳傣药志》

地方名 云南: 大白花, 白花羊蹄甲、老白花(思茅), “埋修”(傣语)。

功效 根: 强壮, 驱肠虫。用于消化不良; 根、树皮、叶、花: 用于湿疹溃烂, 麻风溃烂, 刀伤等。

#### 7148104

*Bowringia callicarpa* Champ.

植物名 藤槐《高植图鉴》

药材名 藤槐《广西药录》

地方名 广东: 赤竹子; 海南: 放屁藤, 鸡公合藤; 广西: 石崖风(平南), 两头槌(岑溪), 包含豆。

功效 根、叶: 清热解毒。用于跌打损伤。

#### 7148105

*Butea monosperma* (Lam.) Kuntze - *Butea frondosa* Koen. ex Roxb.

植物名 紫柳树《云南种录》

药材名 紫柳树《民族药志》

文献名 紫柳《纲目》, 紫柳、紫矿《豆科图说》, 胶虫树《台湾药植志》

地方名 云南: “迈掀”(耿马傣语), “玛茹子”(藏名); 其他: 假乌楠。

功效 种子: 用于驱蛔虫, 绦虫, 水疱疹, 皮肤搔痒; 树胶: 收敛。用于翼状胬肉, 角膜浑浊, 止痢; 鲜树胶汁: 用于肺结核, 出血, 溃瘍, 喉痛, 腹泻, 消化不良, 发烧; 花: 消肿, 利尿, 通经。用于睾丸炎; 叶: 用于疖, 小丘疹, 疔痛, 蛔虫, 痔疾; 树皮: 用于蛇咬伤。

#### 7148106

*Butea suberecta* (Dunn) Blatter

植物名 马鹿花《云南药录》

文献名 紫柳树《云南药录》

地方名 云南: 小豆花、紫梗藤(思茅)。

功效 根: 驱虫。用于蛔虫, 寸白虫, 小儿疳积。

#### 7148107

*Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb. --- *Guilandina bonduc* L.

--- *G. bonducella* L. --- *Caesalpinia crista* auct. non L.

植物名 刺果苏木《中国植志》

药材名 刺果苏木《汇编》

文献名 老虎心《台湾药植志》, 台湾云实《中国树木志》

地方名 台湾: 猪肉刺, 答肉刺, 鹰叶刺, 蚊蝇, 蚊蝇子, 蛇药; 广东: 芒果钉(广州); 海南: (南蛇筋), 南蛇笏。

功效 叶: 祛瘀止痛, 清热解毒。用于急、慢性胃炎, 胃溃疡, 痈疮疖肿; 种子: 温肾暖胃。用于胃寒、肾寒; 根: 用于风湿痹痛, 跌打, 淋病。外用于睾丸炎。

备考 《豆科图说》(1955)、《海南植志》(1965)、《高植图鉴》(1972)及许多药学著作, 曾将本种学名误订为 *Caesalpinia crista* L. (华南云实)。

#### 7148108

*Caesalpinia coriaria* Willd. ex Kunth

植物名 狄薇豆《中国树木志》

药材名 狄薇豆《台湾药植志》

功效 荚果: 外用于溃瘍。

#### 7148109

*Caesalpinia crista* L. --- *Guilandina nuga* L. --- *Caesalpinia nuga* Ait. --- *C. szechuenensis* Craib --- *C. kwangiungensis* Merr.

植物名 华南云实《中国植志》

药材名 华南云实《湖南药物志》

文献名 球树子(叶《生药》), 假老虎筋《海南植志》, 南天川云实《中国树木志》

地方名 见血飞(湖北、云南); 台湾: 猪肉刺, 南天藤; 广西: 双角龙(玉林), 耀英根(容县), 虎耳藤(乐业)。

功效 根: 祛瘀活血, 利尿。用于风湿痹痛, 毒蛇

咬伤,膀胱尿砂,结石;根、叶;用于疮疖肿毒。

#### 7148110

*Caesalpinia cucullata* Roxb. --- *Mezoneuron cucullatum* (Roxb.) Wight et Arnold.

植物名 大见血飞《云南种录》

文献名 见血飞《中国植志》

地方名 云南;麻药(屏边)。

功效 茎藤:活血止痛。

#### 7148111

*Caesalpinia decapetala* (Roth) Alston --- *C. sepiaria* Roxb.

植物名 云实《中国植志》

药材名 云实《本经》、《汇编》

文献名 员实、天豆《吴普本草》,云英《别录》,草云母《唐本草》,臭草、羊石子、羊石子草、马豆《图经》,老虎刺尖《滇南本草》,云实根、粘刺、杉刺、桤占刺《纲目》,水皂角、水皂荚、野皂角、野皂荚《植物名汇》,四时青《分类草药性》,枯刺、蛇结苋《豆科图说》,云实皮《药典》

地方名 牛王刺(安徽、湖北、四川、贵州),乌水踏、红总管(安徽、江西),百鸟不宿、蛇不过(安徽、湖南),药王子(安徽、湖北、湖南),铁场豆(福建、云南),倒挂牛(陕西、浙江),倒挂刺、阎王刺(安徽、四川、贵州、云南),黄牛刺(浙江、四川),猫爪刺(安徽、四川、贵州),霸王刺(四川、云南);江苏:多赖罗,野发柴;浙江:山油皂(天目山、遂昌、龙泉),黄粟刺(天目山),斗米虫树(临安),倒搭刺(金华),倒扎黄狼刺(余姚、普陀),黄牛牵(乐清),黄牛刺虫树,无聊郎树,云实子,百鸟不站树,羊母哭;安徽:牯牛刺,接力刺,倒爪刺,倒拉牛,倒挝镰,倒钩虫树,酱油刺;江西:百鸟不停(婺源),刺皂角(定南),翻天云(宜黄);湖南:牛头刺(溆浦),千年鸟不栖、斗蓬刺、呆鹰刺(衡阳),千年鸟不落、鸟不落刺(零陵),鸟不落(辰溪、衡阳),鸟不栖(永兴、麻阳),鸟不扑筋芽皮刀(衡山),禄雪枫(江华),粗阎王刺(永顺);广东:吓叭刺、哈吧刺(潮阳);四川:土苏木(米易),倒钩刺(蓬溪);贵州:四月清,药王刺,猫抓刺;云南:老虎刺,虎头刺(易门),爬墙刺(华宁);其他:川原藤(日本)。

功效 种子:有毒。止痢,驱虫。用于痢疾,钩虫病,蛔虫病;根:发表散寒,祛风活络。用于风寒感冒,风湿疼痛,跌打损伤,蛇咬伤;茎皮:外用于酒齄鼻;叶:用于小儿口疮,跌打损伤,产后恶露不尽。

备考 树茎中一种昆虫幼体(蛀虫),浙江称“黄粟刺虫”、“朝天子”,安徽称“子午虫”以及江西、湖南等均入药,用于小儿疳积,麻疹透发不快及筋骨痛等。

#### 7148112

*Caesalpinia decapetala* (Roth) Alst. var. *pubescens* Tang et Wang --- *Caesalpinia sepiaria* Roxb. var. *pubescens* (Tang et Wang) P. C. Huang

植物名 毛叶云实《秦岭植志》

药材名 倒挂牛《陕西中草药》

文献名 毛云实《中国树木志》,多毛叶云实《中药大

#### 辞典》

地方名 陕西:大牛昂,〔朝天子〕,牛王刺。

功效 根:有小毒。解表发汗。用于伤风感冒头痛,筋骨疼痛,跌打损伤;茎、皮:有小毒。外用于酒齄鼻。

#### 7148113

*Caesalpinia digyna* Rottler

植物名 肉荚云实《中国植志》

文献名 二蕊苏木《台湾药植志》,肉荚苏木《海南植志》

功效 根:收敛。用于肺病,瘰癧。外用于敷溃瘍。

#### 7148114

*Caesalpinia globulorum* Banh. f. et Van Koyen --- *C. jayabo* Maza

植物名 莲实藤《中国树木志》

药材名 莲实藤《台湾药植志》

功效 种子:催吐;种子油:用于痉挛,麻痹,胃痛,腹泻,间歇热,疟疾,疝痛,腹水,咳嗽,驱虫;叶:通经。用于急性痛风,风湿,头痛,睾丸炎,黄疸,肤痒,驱绦虫;根:收敛。用于赤痢;果实:用于肝病;果核:用于风湿。

#### 7148115

*Caesalpinia magnifoliolata* Metc. --- *C. yaoshanensis* Chun

植物名 大叶云实《中国植志》

药材名 大叶云实《贵州草药》

文献名 铁藤、刺藤《中药大辞典》

地方名 广西:猫爪藤(东兰),鹰爪刺(来宾)。

功效 根、果、枝:舒筋活络,补虚。

#### 7148116

*Caesalpinia millettii* Hook. et Arn. --- *Pterolobium subvestium* Hance

植物名 小叶云实《中国植志》

药材名 小叶云实《广西药录》

文献名 假南蛇簕《中国树木志》

地方名 广西:假楠(龙州)。

功效 根:用于胃病,消化不良。

#### 7148117

*Caesalpinia minax* Hance --- *C. morsei* Dunn

植物名 喙荚云实《中国植志》

药材名 苦石莲《增订伪药条辨》、《中药大辞典》

文献名 南蛇簕、〔石莲子〕《生草药性备要》,莲子笏、蚰蛇笏《岭南采药录》,刺果云实《四川中药志》

地方名 老鸦枕头(广东、云南),土石连子、石连勒、烫耙苗、猫儿核、青蛇子(华南);广东:猫爪簕(翁源),鹧鸪簕(惠阳),鹧鸪子,蚰蛇簕,蛋妇灵牌;广西:〔土甘草〕(德保),飞天龙、南蛇莲(北流、玉林、贵县、博白),南蛇勒子,南蛇笏根(南宁),石莲藤(忻城、邕宁),石花生(上林),石莲勒,石连笏,过江龙,老鸦胆(北海);四川:阎王刺果(仁寿),阎王刺(西昌),雀不站子(简阳);广西:石莲子;云南:“麻嘎哪”(西双版纳傣语),打鬼棒(梁

河),鬼棒头(腾冲),小黑羊(双江),落夕树(峨山),盐棒头果;其他:南蛇草。

**功效** 种子:散瘀止痛,清热去湿。用于哮喘,痢疾,淋浊,尿血,跌打损伤;幼苗:泻热,去瘀解毒。用于风热感冒,湿热痧气,跌打损伤,瘰癧,疮疡肿毒;根:清热解毒,散瘀。用于外感发热,痧症,风湿骨痛,疮肿,跌打损伤。

## 7148118

*Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw. --- *Poinciana pulcherrima* L.

**植物名** 金凤花《台湾府志》、《中国植志》

**药材名** 金凤花《台湾药植志》

**文献名** 番蝴蝶《豆科图说》

**地方名** 洋金凤(广东、海南、广西);福建:蝴蝶花;台湾:黄蝴蝶,蛱蝶花,蛱蝶花;海南:红紫。

**功效** 花:止咳,解热,驱虫。用于支气管炎,哮喘,疟疾,发烧;叶:解热,通经,泻下,可引起坠胎;树皮:止泻,通经;根:用于小儿惊风。

## 7148119

*Caesalpinia sappan* L.

**植物名** 苏木《中国植志》

**药材名** 苏木《医学启源》、《药典》

**文献名** 苏枋《南方草木状》,苏方《肘后方》,苏方木《唐本草》,窠木《诸蕃志》,天成沙《木中菌核》《纲目拾遗》,多邦、巴腊虎《新纲》,赤木《兽医国药及处方》,“左摸兴”(藏名)《民族药志》

**地方名** 河北:苏木花、苏木末(张家口);台湾:棕木;海南:参芬,苏芬;广西:“咪得兰”、“美膜”、“秀雾”(龙州、扶绥、天等壮语)、“俊膜”,“美江单”(三江侗语),山醋木(桂平),红苏木;四川:红柴;云南:“哥方”、“戈梅方”(思茅傣语),落夕树。

**功效** 心材:行血祛瘀,消肿止痛。用于经闭痛经,产后瘀阻,胸腹刺痛,外伤肿痛。

## 7148120

*Caesalpinia sinensis* (Hemsl.) Vidal --- *Caesalpinia tsoongii* Merr.

**植物名** 鸡嘴簕《中国植志》

**药材名** 鸡嘴簕《广西药录》

**地方名** 广西:石南龙(凌云、乐业),南茄(天等)。

**功效** 根:清热解毒,消肿止痛,止痒。用于跌打损伤,疮疡肿毒,湿疹,腹泻,痢疾。

## 7148121

*Caesalpinia vernalis* Champ.

**植物名** 春云实《中国植志》

**药材名** 春云实《浙江药植志》

**地方名** 广东:乌爪簕藤,南蛇笏。

**功效** 种子:有毒。止痢,驱虫;根:发表散寒,祛风活络。

## 7148122

*Cajanus cajan* (L.) Millsp. --- *C. flavus* DC. --- *C. indicus* Spreng.

**植物名** 木豆《高植图鉴》

**药材名** 木豆《汇编》

**文献名** [山豆根]《台湾药植志》,黄豆树《贵州药录》

**地方名** 扭豆(海南、云南),树豆(台湾、广西);福建:观音豆(泉州),赤小豆,赤豆;台湾:花螺树豆;广东:豆蓉(广州);海南:柳豆(澄迈);广西:大木豆(河池),木豆叶(陆川);四川:树黄豆(西昌),药豆;云南:三叶豆(红河),“吐也”(西双版纳傣语)。

**功效** 根:利湿消肿,散瘀止痛。用于黄疸型肝炎,风湿关节痛,跌打损伤,瘀血肿痛,便血,衄血;种子:清热解毒,补中益气,利水消食,排痈肿,止血,止痢。用于心虚,水肿,血淋,痔血,痈疽肿毒,痢疾,脚气;叶:有小毒。解痘毒,消炎肿。用于小儿水痘,痈肿。

## 7148123

*Calophaca polystichoides* (Hand.-Mazz.) Cheng f. ---

*Chesneya polystichoides* (Hand.-Mazz.) Cheng f.

**植物名** 川滇雀儿豆《高植图鉴》

**药材名** 丽豆《西昌中草药》

**文献名** 耳蕨丽豆《西昌中草药》,滇康丽豆《云南药录》,红皮棉芪《玉龙山药植》,滇康雀儿豆《品种论述》

**地方名** 四川:石泽兰(西昌);云南:土甘草(罗平山)。

**功效** 茎:活血祛瘀,止痛。用于接骨,跌打肿痛,红崩;根:补中益气。用于子宫脱垂。

## 7148124

*Campylotropis argentea* Schindl.

**植物名** 银叶杭子梢《云南种录》

**药材名** 白叶花柴《云南药录》

**文献名** 银背叶杭子梢,银色杭子梢《红河中草药》

**地方名** 云南:白叶花(红河)。

**功效** 根:清热利湿,收敛止血。用于肠炎,腹泻,痢疾,浮肿,便血,风湿骨痛,跌打损伤。外用于骨折。

## 7148125

*Campylotropis bonatiana* (Pamp.) Schindl.

**植物名** 毛三棱枝杭子梢《云南种录》

**药材名** 三棱梢《汇编》

**文献名** 马尿藤《名实图考》

**地方名** 云南:爬山豆(大理),大发表(楚雄),野蚕豆根(红河),樟脑苍耳(个旧)。

**功效** 根及全株:发汗解表,清热利湿。用于跌打损伤,皮肤病,肾炎。外用于跌打损伤。

## 7148126

*Campylotropis delavayi* (Franch.) Schindl. --- *Lespedeza atrokermesina* Forrest ex W. W. Smith

**植物名** 西南杭子梢《高植图鉴》

**药材名** 豆角柴《贵州草药》

**功效** 根:清热解毒,止咳化痰。用于风热感冒,高热不退,痢疾。

## 7148127

*Campylotropis harmsii* Schindl.

**植物名** 滇南杭子梢《云南种录》

药材名 三叶豆《汇编》

文献名 干枝柳《中药大辞典》

地方名 广西:米过穴。

功效 根:清热利湿,祛瘀止痛。用于痢疾,跌打损伤,刀伤。

#### 7148128

*Campylotropis hirtella* (Franch.) Schindl. --- *Lespedeza hirtella* Franch.

植物名 毛杭子梢《高植图鉴》

药材名 大红袍《滇南本草》、《汇编》

文献名 野黄豆、锈钉子《滇南本草》,硬毛杭子梢《云南中草药》

地方名 山皮条、铁锈根(四川、云南);四川:毛茶;贵州:土山豆根,岩豆根,[山豆根];云南:大和红、地油根、黄水疮药、紫地油、火烧药、油炸棵(红河),小红袍、牛黄豆(丽江),油豆根、油根、油皂角、扁皂角(曲靖),山黄豆(昆明),白蓝地花(楚雄),牛吐血,锈钉根。

功效 根:活血调经,止痛,收敛。用于闭经,痛经,白带,胃痛。外用于黄水疮,烧烫伤。

#### 7148129

*Campylotropis ichangensis* Schindl.

植物名 宜昌杭子梢《高植图鉴》

文献名 假大红袍《元江哈尼族药》

地方名 浙江:小叶乌梢(临安);湖北:铁人扫(黄梅),懒金树(巴东);云南:“皂女女拍”(元江哈尼语)。

功效 根及全草:祛风散寒,舒筋活血。用于风寒感冒,发热无汗,肢体麻木,皮肤瘙痒。

#### 7148130

*Campylotropis macrocarpa* (Bunge) Rehd. --- *Lespedeza macrocarpa* Bunge

植物名 杭子梢《高植图鉴》

药材名 杭子梢《汇编》

文献名 落豆花《中国树木志》,见肿消《汇编》

地方名 陕西:壮筋草;河北:木枝子(热河);浙江:马料梢;河南:木本见肿消,万年消(新乡);广西:假花生(富川)。

功效 根:发汗解表,舒筋活血。用于感冒,肾炎,肢体麻木,半身不遂。

#### 7148131

*Campylotropis pinetorum* (Kurz) Schindl. ssp. *velutina* (Dunn) Ohashi --- *Campylotropis velutina* (Dunn) Schindl. --- *Campylotropis cavaleriei* (Levl.) C. Y. Wu --- *Lespedeza velutina* Dunn --- *Millettia cavaleriei* Levl.

植物名 绒毛杭子梢《云南种录》

药材名 三匹叶《汇编》

文献名 绒毛叶杭子梢《豆科图说》,豆角柴《汇编》

地方名 广西:米过血(田林)。

功效 根:通经活血,舒筋活络,收敛止痛。用于腹泻,赤白痢疾,慢性肝炎,腹痛,风湿痛,痛经。

#### 7148132

*Campylotropis polyantha* (Franch.) Schindl.

植物名 多花杭子梢《高植图鉴》

药材名 小雀花《名实图考》

文献名 小脚花《西昌中草药》

功效 茎、叶、花:发表散寒,消炎止痛,止咳。用于风寒咳嗽,头痛发烧,痢疾,乳腺,烧烫伤。

#### 7148133

*Campylotropis trigonoclada* (Franch.) Schindl. --- *Lespedeza trigonoclada* Franch.

植物名 三棱枝杭子梢《高植图鉴》

药材名 大发表《汇编》

文献名 黄雀花《科种》,佳不齐《中国树木志》,黄花马尿藤《云南种录》

地方名 三棱草(四川、贵州),爬山豆(贵州、云南);四川:走胆草,山草参;贵州:山落花生(安龙),扒山豆,爬山豆根;云南:三股筋、马豆草(新平),三棱梢(大理),“松漏争”(楚雄彝名),三角西花、三楞草、三楞金刚、见水消、蚕豆兰、野蚕豆、野蚕豆根(红河),三罗松棵、野罗松(峨山),三荆芥,风摆柳,惊风草,马尿藤。

功效 根及全株:发汗解表,清热利湿。用于湿热黄疸,感冒发热,鼻炎,肠炎,痢疾,膀胱炎,肾炎,风湿性关节炎。外用于跌打损伤。

#### 7148134

*Canavalia ensiformis* (L.) DC. --- *C. gladiata* DC. var. *ensiformis* DC. --- *Dolichos ensiformis* L.

植物名 洋刀豆《云南种录》

药材名 大刀豆《中草药学》

文献名 刀豆、挟剑豆《新纲》,白刀豆、刀豆壳《和汉药名汇》,刀鞘豆、刀狭豆《豆科图说》,直生刀豆《海南植志》,直立刀豆《湖北植志》,刀侠豆、皂荚豆、葛豆《中药志》

地方名 台湾:白凤豆,刀板仁豆,刀豆荚;四川:刀巴豆,刀豆子;西藏:“卡玛消夏”(藏名)。

功效 种子:温中下气,益肾补元。

#### 7148135

*Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. --- *Dolichos gladiatus* Jacq. --- *Canavalia ensiformis* DC. var. *gladiata* Makino

植物名 刀豆《高植图鉴》

药材名 刀豆《救荒本草》、《药典》

文献名 挟剑豆《酉阳杂俎》,刀豆子《纲目》,大戈豆《本草求原》,刀豆壳、刀豆根《医林纂要》,大刀豆《分类草药性》,龙爪豆《义乌市志》,葛豆《豆科图说》,野刀板藤《高植图鉴》

地方名 江西:刀培豆(婺源),刀豆角;福建:马刀豆;台湾:刀板仁豆,刀豆荚,白凤豆,关豆,虎爪豆,洋刀豆,菜刀豆;湖南:刀坝豆(长沙);广东:水流豆;广西:关刀豆,刀鞘豆(陆川);四川:刀把豆(西昌),刀巴豆;云南:“拖法”(西双版纳傣语),野刀豆;西藏:“卡玛消夏”(藏名)。

功效 种子:温中,下气,止呃。用于虚寒呃逆,呕吐;果壳:和中下气,散瘀活血。用于反胃,呃逆,久痢,经闭,喉痹,喉癣;根:用于头风,风湿腰痛,疝气,久痢,经闭,跌打损伤。

#### 7148136

*Canavalia maritima* (Aubl.) Thouars --- *Canavalia lineata* (Thunb.) DC. --- *Dolichos lineatus* Thunb.

植物名 海刀豆《海南植志》

药材名 海刀豆《广西《园林药录》》

地方名 广西：鬼刀豆，野刀豆，假刀豆。

功效 全株、果仁：有毒。祛风止痒。外用于皮肤搔痒，湿疹；种子：外用于疥癣。

7148137

*Canavalia microcarpa* (DC.) Piper

植物名 小刀豆《海南植志》

药材名 小刀豆《广西药录》

地方名 海南：野刀板豆；广西：假刀豆（南宁），〔扁豆〕（靖西）。

功效 全草：清热消肿，杀虫，止痒；根：用于牙痛。

7148138

*Caragana arborescens* (Amm.) Lam.

植物名 树锦鸡儿《高植图鉴》

药材名 树锦鸡儿《汇编》

文献名 蒙古锦鸡儿、金鸡儿、骨担草《豆科图说》

地方名 黄槐（东北）；吉林：金雀花，锦鸡儿；山西：映映葛针（太行）；内蒙古：“陶日格-哈日嘎纳”（蒙名），小黄刺条；其他：柠条。

功效 根皮：通乳，利湿。用于乳汁不通，白带，脚气，麻木浮肿。

7148139

*Caragana brevifolia* Kom.

植物名 短叶锦鸡儿《高植图鉴》

药材名 短叶锦鸡儿《汇编》

文献名 锦鸡儿《青海中草》

地方名 青海：“扎马”（藏名），猫儿刺。

功效 根：清热散肿，生肌止痛。用于痈疽，疮疖，肿痛。

7148140

*Caragana changduensis* Liou f.

植物名 藏锦鸡儿《民族药志》

药材名 藏锦鸡儿《民族药志》

文献名 “佐摸兴”（藏名）《民族药志》

功效 木部心材：活血化瘀，降压。用于多血症，高血压及月经不调等。

7148141

*Caragana franchetiana* Kom.

植物名 云南锦鸡儿《高植图鉴》

药材名 云南锦鸡儿《汇编》

文献名 阳雀花、阳雀花根《西藏中草》

地方名 西藏：“佐摸兴”、“渣玛兴”（藏名），锦鸡儿。

功效 根：滋补强壮，活血调经，祛风利湿；花：祛风活血，止咳化痰。

备考 现在藏医所用“佐摸兴”（苏木 *Caesalpinia sappan* L.）的来源植物之一。

7148142

*Caragana frutex* (L.) C. Koch

植物名 黄刺条《沙漠植志》

药材名 黄刺条《民族药志》

文献名 金雀花《群芳谱》，黄雀花《纲目拾遗》，飞来凤《嘉兴府志》，水锦鸡《兴安植群》，飞凤《种分》，金雀锦鸡儿《东北木本图志》，木锦鸡儿《汇编》

地方名 内蒙古：〔翠雀花〕；西藏：“佐摸兴”（藏名）。

功效 花：补血，活血。用于跌打损伤，疮疮

备考 现在藏医所用“佐摸兴”（苏木 *Caesalpinia sappan* L.）的来源植物之一。

7148143

*Caragana intermedia* Kuang et H. C. Fu

植物名 中间锦鸡儿《内蒙古植志》

药材名 柠条《汇编》

文献名 马集柴、老虎刺《沙漠药植》，柠条花、柠条籽、柠条根《中药大辞典》

地方名 内蒙古：“乃力札古尔-哈日根”、宝特 哈日嘎纳”、“乌赫尔-哈尔干”、“乌赫尔布特”（蒙名）。

功效 全草、花：滋阴养血。用于高血压病，头晕，心慌，气短，四肢无力，疲乏，月经不调；种子：止痒，杀虫。用于神经性皮炎，牛皮癣，黄水疮。

7148144

*Caragana jubata* (Pall.) Poir.

植物名 鬼箭锦鸡儿《高植图鉴》

药材名 鬼箭锦鸡儿《中药大辞典》

文献名 鬼见愁《名实图考》，鬼箭头《豆科图说》，刺松《科裁》，冠毛锦鸡儿《华北经植志要》

地方名 “着母香”（四川、西藏藏名）；青海：“腰冒”（藏名），浪麻，狼麻，锦鸡儿；西藏：“佐摸兴”（藏名）。

功效 皮、茎、叶：接筋续骨，祛风除湿，活血通络，消肿止痛。用于跌打损伤，风湿筋骨痛，月经不调，乳房发炎；全草（藏药）：平血压。用于由高血压引起之发烧。外用于疔疮痈疽。

7148145

*Caragana leucophloea* Pojark.

植物名 白皮锦鸡儿《高植图鉴》

药材名 白皮锦鸡儿《汇编》

文献名 锦鸡儿《新疆中草药》

地方名 新疆：金雀花，〔白鲜皮〕。

功效 根：活血，利尿，止痛，强壮。用于体虚无力，浮肿，乳汁不足，风湿关节痛，跌打损伤，体虚白带多；花：祛风平肝，止咳。用于高血压病，头痛，眩晕，肺虚久咳，小儿疳积。

备考 在新疆误以其根皮作白鲜皮入药。

7148146

*Caragana microphylla* Lam. --- *C. altagana* Poir.

植物名 小叶锦鸡儿《高植图鉴》

药材名 小叶锦鸡儿《沙漠药植》

文献名 小叶金雀花《树分》，小叶骨担草《豆科图说》，柠鸡儿《汇编》

地方名 柠条（内蒙古、山东），骨担草（东北），猴猴刺（河北、内蒙古）；内蒙古：雪里洼（翁牛特旗），“阿拉坦-哈日根”，“乌禾日-哈日嘎纳”，“阿拉他嘎纳”（蒙名），柠鸡儿果，黑柠条；宁夏：牛筋条。

**功效** 果实:清热解毒。用于咽喉肿痛;全草、花、根:滋阴养血。用于高血压病,头晕,心慌,气短,四肢无力,疲乏,月经不调。

## 7148147

*Caragana microphylla* Lam. var. *cinerea* Kom. --- *C. cinerea* (Kom.) Nakai

植物名 灰色小叶锦鸡儿《东北药用植物》

药材名 小叶锦鸡儿(拟)

**功效** 花:降血压。用于高血压;根:祛痰止咳。用于慢性支气管炎,心慌气短,四肢无力;全株:滋阴养血,活血调经。用于月经不调;果实(柠鸡儿果):清热解毒。用于咽喉肿痛;种子:祛风止痒,解毒,杀虫。用于神经性皮炎,牛皮癣,黄水疮。

## 7148148

*Caragana microphylla* Lam. var. *viridis* Kom.

植物名 绿色小叶锦鸡儿《东北药用植物》

药材名 小叶锦鸡儿(拟)

**功效** 花:降血压。用于高血压;根:祛痰止咳。用于慢性支气管炎,心慌气短,四肢无力;全草:滋阴养血,活血调经。用于月经不调;果实(柠鸡儿果):清热解毒。用于咽喉肿痛;种子:祛风止痒,解毒,杀虫。用于神经性皮炎,牛皮癣,黄水疮。

## 7148149

*Caragana polourensis* Franch.

植物名 昆仑锦鸡儿《高植图鉴》

药材名 昆仑锦鸡儿《新疆中草药》

地方名 新疆:锦鸡儿。

**功效** 根:活血,利尿,止痛,强壮;花:祛风平肝,止咳。

## 7148150

*Caragana rosea* Turcz.

植物名 红花锦鸡儿《高植图鉴》

药材名 红花锦鸡儿《中药大辞典》

文献名 紫花锦鸡儿《东北木本图志》,金雀儿《豆科图说》,甘肃锦鸡儿《高原中草》

地方名 内蒙古:“乌兰-哈日嘎纳”(蒙名);陕西:黄枝条(秦岭)。

**功效** 根:健脾强胃,活血催乳,利尿通经。用于虚损劳热,阴虚喘咳,淋浊白带。

## 7148151

*Caragana sinica* (Buchoz) Rehd. --- *C. chamlagu* Lam.

植物名 锦鸡儿《高植图鉴》

药材名 锦鸡儿《救荒本草》、《汇编》

文献名 坝齿花、酱瓣子《救荒本草》,金鹊花、大蛇叶《滇南本草》,飞来凤《嘉兴府志》,金雀花《百草镜》,金雀根《纲目拾遗》,地羊鹊《天宝本草》,板参、阳雀花《草木便方》,土霸齿花、白心皮、[白鲜皮]《名实图考》,江南金凤《植物名汇》,群雀、金雀木《豆科图说》

地方名 杨雀花(陕西、湖南),骨担草(东北),[黄芪](江苏、浙江、安徽),阳雀儿(广西、贵州),[土黄芪](华东、湖北、广西),羊雀花(陕西、湖北),阳雀花根(上海、湖北),[白鲜皮](陕西、湖南、广西、四川、贵州、云

南),大绣花针(江苏、浙江、江西),金吊子(浙江、福建),斧头花(浙江、安徽),铁扫帚(山东、河南),娘娘袜子(河北、山西),绣花针(安徽、江西),蜂花(江西、湖南);河北:娘娘袜、娘娘挂(涿源);陕西:洋雀花(平利),阳鹊花,羊角花;江苏:白黄芪(苏州);上海:金雀藤;浙江:毛刀花(嵊县),金瓜子(平阳),金剑儿、金橘梅(温州),甲鱼嘴花,野黄芪;安徽:小叶金蜂,鸡爪棵子,金雀,金柱树,金耙齿,横树根;江西:鸟儿花、单绣花针、雀里子花(泰和),冷骨风(南丰),接儿花根(德兴),黄雀梅(定南);福建:[金不换](福安、霞浦),刺刺花、猪蹄花(福州),张骨英(崇安);河南:花花根,蚂蚱花;湖北:金雀花根;湖南:小石榴,下口针,追风箭(常德);广西:雀儿花根(桂林);四川:阳雀花根皮;云南:大狗牙(红河),金孔雀(丽江);其他:山丽豆,粘粘棒,黄棘,豹皮鞭,鹅根刺,桂枝筋,洋笑花。

**功效** 根:滋补强壮,活血调经,祛风利湿。用于高血压病,头昏头晕,耳鸣眼花,体弱乏力,月经不调,白带,乳汁不足,风湿关节痛,跌打损伤;花:祛风活血,止咳化痰。用于头昏耳鸣,肺虚咳嗽,小儿消化不良。

**备考** 四川、湖南、陕西一带的“白鲜皮”为本种的根皮,安徽、江苏部分地区民间以根误作黄芪代用品,称“土黄芪”,均属误用,应予纠正。

## 7148152

*Caragana spinifera* Kom.

植物名 多刺锦鸡儿《西藏植志》

药材名 多刺锦鸡儿《西藏中草》

文献名 西藏锦鸡儿《豆科图说》

地方名 西藏:“扎玛”(藏名)。

**功效** 茎枝内皮:祛风活血,止痛利尿,补气益肾。

**备考** 《豆科图说》、《沙漠药植》、《青藏药图》的“多刺锦鸡儿”学名为 *Caragana spinosa* (L.) DC.

## 7148153

*Caragana tibetica* Kom.

植物名 西藏锦鸡儿《西藏植志》

药材名 垫状锦鸡儿《沙漠药植》

文献名 康青锦鸡儿《云南种录》,藏锦鸡儿、黑猫头刺、毛刺、毛刺锦鸡儿《中国树木志》,川青锦鸡儿《中药大辞典》

地方名 内蒙古:“特布都-哈日嘎纳”(蒙名);青海:“作毛兴”(藏名);西藏:“佐摸兴”(藏名)。

**功效** 根:滋补强壮,活血调经,祛风利湿;花:祛风活血,止咳化痰。

## 7148154

*Cassia acutifolia* Del. --- *C. senna* L.

植物名 尖叶番泻树《中草药学》

药材名 番泻叶《饮片新参》、《药典》

文献名 埃及番泻、亚历山大番泻叶《中药志》,埃及旗那、旗那叶、尖叶番泻《台湾药植志》,番杏叶、番泻英(山医《生药》)

地方名 天津:泻叶;上海:地薰草,泡竹叶。

**功效** 叶:泻热行滞,通便,利水。用于热结积滞,便秘腹痛,水肿胀满。

**7148155**

*Cassia agnes* (de Wit) Brenen --- *C. javanica* L. var. *agnes* de Wit --- *Cassia javanica* L. var. *indo-chinensis* Gagnep.

植物名 神黄豆《中国植志》

药材名 神黄豆《纲目拾遗》、《中国植志》

文献名 蚕豆、青花豆、回回豆、真宁豆《纲目拾遗》、雄黄豆《中药大辞典》

地方名 云南：腊肠豆、排钱豆（思茅）、树黄鳞、黑明大解（梁河）、树蚂蟥。

功效 果实：清热解毒，理气润肠。用于胃痛、疟疾、感冒、麻疹、水痘、便秘。

**7148156**

*Cassia alata* L.

植物名 翅荚决明《中国植志》

药材名 对叶豆《汇编》

文献名 翼柄旗那《台湾药植志》，有翅决明《豆科图说》

地方名 云南：“牙郎满登”（西双版纳傣语）、翅叶槐（西双版纳）、非洲木通（思茅）。

功效 叶：杀虫，止痒。用于神经性皮炎、牛皮癣、湿疹、皮肤瘙痒、疮疖肿毒；种子：驱蛔虫；花：用于支气管炎、哮喘及水泡疹；根、树皮：缓泻。用于便秘。

**7148157**

*Cassia angustifolia* Vahl

植物名 狭叶番泻树《中草药学》

药材名 番泻叶《饮片新参》、《药典》

文献名 旗那叶、泻叶《药物学大成》，丁内米利番泻（楼《生药》），印度番泻叶（徐《生药》），番杏叶、第勒维里番泻（李《生药》），狭叶番泻叶《广西植录》，狭叶番泻《汇编》

地方名 上海：泡竹叶、地薰草；浙江：弟兄草；台湾：旗那。

功效 叶：泻热行滞，通便，利水。用于热结积滞，便秘腹痛，水肿胀满。

**7148158**

*Cassia auriculata* L. --- *Semia auriculata* Roxb.

植物名 耳叶番泻《中药大辞典》

药材名 耳叶番泻叶《中药大辞典》

文献名 耳叶决明《中国植志》

地方名 台湾：番泻叶。

功效 叶：泻热行滞，通便，利水；种子：用于眼炎；树皮：收敛。用于糖尿病、萎黄病。

**7148159** 见 7148164a**7148160**

*Cassia bicaupularis* L.

植物名 双荚决明《中国植志》

药材名 双荚决明叶《中草药》

文献名 腊肠子树《海南植志》

功效 叶：泻下。用于便秘。

**7148161**

*Cassia didymotrya* Fresen

植物名 长穗决明《海南》、《中国植志》

药材名 长穗决明叶《中草药》

功效 叶：泻下。用于便秘。

**7148162**

*Cassia dimidiata* Roxb.

植物名 西南山扁豆《中草药》

药材名 二半决明《云南药录》

地方名 云南：石莲子、喙夹云实、细叶蒿、盐棒头果。

功效 全株：解毒。用于痘疹、淋病；果实：用于小儿黄疸。

**7148163**

*Cassia fistula* L.

植物名 腊肠树《中国植志》

药材名 阿勒勃《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 婆罗门皂荚《本草拾遗》，波斯皂荚、阿梨去伐、忽野檐《西阳杂俎》，神黄豆《纲目拾遗》，长果子树《树分》，清泻山扁豆（叶《生药》），肃树果《药名汇编》，黄槐花树《豆科图说》

地方名 广东：牛角树（广州）；云南：“哥龙娘”、“哥娘”（傣名），香肠豆、天皇土；西藏：“东嘎”（藏名），腊肠树果，“通下”（藏名）。

功效 果：主心膈间热风，心黄，骨蒸寒热，杀三虫；种子：发疹，发痘，缓泻。

备考 《中国民族药志》（1984）以本种果实为《纲目拾遗》之“神黄豆”（云南）。

**7148164**

*Cassia floribunda* Cav. --- *Cassia laevigata* Willd.

植物名 光叶决明《中国植志》

药材名 光决明《汇编》

地方名 云南：怀花米（临沧）。

功效 根、叶：清热，通便，明目。用于感冒，角膜云翳，慢性结膜炎，胃痛，便秘，牙痛，喉痛；种子：驱蛔虫。

**7148164a**

*Cassia fruticosa* Mill. --- *C. bailliaris* L.

植物名 大叶决明《中国植志》

药材名 大叶决明子《中草药》

功效 种子：解毒。

**7148165**

*Cassia hirsuta* L.

植物名 毛荚决明《中国植志》

药材名 毛荚决明子《中草药》

功效 种子：解毒，解热。

**7148166**

*Cassia leschenaultiana* DC. --- *C. mimosoides* L. var.

*wallichiana* DC. --- *C. mimosoides* L. ssp.

*leschenaultiana* (DC.) Ohashi

植物名 短叶决明《中国植志》

药材名 短叶山扁豆《汇编》

文献名 地甘油、大样地甘油《豆科图说》，大叶山扁豆《海南植志》，大花水皂角《云南种录》



地方名 山扁豆(江西、广西、四川、云南);浙江:小合萌、野葛萌(建德、江山),田萌葛(临安);江西:土柴胡,飞天漆,正西风草,狗麻蛇药,夜合草;海南:牛旧藤;广西:细叶油甘(百色);四川:干水皂角(会理),小水皂角、山皂角(米易),铁皂角,小扁豆(西昌);云南:铁箭矮陀(澄江),蓖子草(通海),野皂角(华宁)。

功效 根:清热平肝,安神。用于痢疾,白内障,角膜混浊,失眠,癩皮痒。

## 7148167

*Cassia mimosoides* L.

植物名 含羞草决明《中国植志》

药材名 山扁豆《救荒本草》、《汇编》

文献名 黄瓜香、茫芒、还瞳子、大叶山扁豆《豆科图说》,山扁豆子《现代实用中药》

地方名 水皂角(贵州、云南);江苏:苦麦草(新海连);江西:〔土柴胡〕,飞天漆;湖南:茫喜,茫决明,夜合草,蛇药;广东:金芽江,芽江草(潮阳),金蜈蚣(五华),百熟草(东莞),鸡毛箭(徐闻),水含羞草、细叶含羞草、硬骨含羞草(惠阳),坡扁柏(化州),梳子剑(湛江),潺蚊子(阳江),地柏草;海南:梦草(澄迈);广西:小扁豆(玉林),下通草、汉族草、细杠木、拈地沙、砂子草(南宁),红霜石(贵县),鱼骨折、细密梳(藤县),瘡草(宁明),蚊蝇草(北流),蛇谷草(平南),假牛柑(龙州),刺草,野皂角;云南:黄扁豆(红河),顺地爬(玉溪)。

功效 全草:清热解毒,利尿,通便。用于肾炎水肿,口渴,咳嗽痰多,习惯性便秘,毒蛇咬伤;种子:利尿,健胃。

## 7148168

*Cassia multijuga* Rich.

植物名 密叶决明《中国植志》

药材名 密叶决明叶《中草药》

功效 叶:泻下便秘。

## 7148169

*Cassia nodosa* Buch.-Ham. ex Roxb.

植物名 节果决明《中国植志》

药材名 神黄豆《本经逢原》、《中药大辞典》

文献名 回回豆《药材学》

功效 果实:稀痘,解毒。用于发疹,发痘。

备考 《纲目拾遗》之“神黄豆”,《中国植志》(第39卷,1988)及《云南种录》(1984)订为 *Cassia agnes* (de Wit) Brenen,《中国民族药志》(1984)订为 *Cassia fistula* L. (腊肠树),《药材学》(1960)及《中药大辞典》订为本种,本书均一一列出,供进一步研究参考。

## 7148170

*Cassia nomame* (Sieb.) Kitag. --- *Sooja nomame* Sieb.

植物名 豆茶决明《中国植志》

药材名 水皂角(贵州民间方药集)

文献名 〔山扁豆〕《救荒本草》,山野扁豆、江芒决明《汇编》

地方名 辽宁:关门草(岫岩、凤城、宽甸),蓖子叶(新民),驴夹板、夹板草(金县),豆茶(新宾),山梅豆(法库、新民),山茶叶(庄河、本溪),帘子草;四川:水皂

角子,水通;贵州:金豆子。

功效 全草:清肝明目,健脾利湿,止咳化痰,润肠通便。用于慢性肾炎,咳嗽痰多,慢性便秘;种子:用于小儿疳积,夜盲,目翳。

## 7148171

*Cassia obtusifolia* L.

植物名 钝叶决明《中药志》

药材名 决明子《本经》、《药典》

文献名 草决明、羊明《吴普本草》,决明子、〔石决明〕《别录》,马蹄决明《本草经集注》,决明、江南豆、江蒿子、决完子、狄水豆、马蹄草、合明草子《新纲》,钝叶山扁豆《中药通报》

地方名 福建:〔羊角豆〕、野鸡子头(武平),野青豆;云南:“咱都尖”(楚雄彝名),果象豇豆;其他:假绿豆,〔假花生〕。

功效 种子:清热明目,润肠通便。用于目赤涩痛,羞明多泪,头痛眩晕,目暗不明,大便秘结;根:助产。

## 7148172

*Cassia occidentalis* L.

植物名 望江南《救荒本草》、《中国植志》

药材名 羊角豆《广西中药志》

文献名 槐豆《救荒本草》,金花豹子《百草镜》,金豆子《纲目拾遗》,饭匙清草、蛇灭门草《新纲》,喉白草《中国经植志》,大更药、假槐花《中国药植志》

地方名 〔草决明〕(东北、广西、云南),望江南决明(安徽、四川);江苏:风寒豆,黄豇豆,凤凰草(无锡),金角子(镇江),金角儿(泰县),金角儿树(东台),喉百草(云台山),金豆角子,凤凰花草;浙江:天江豆(嵊县);安徽:筋骨草,约蜈蚣;江西:飞天蜈蚣(婺源),羊豆角(新建),铁蜈蚣(彭泽);福建:山咖啡,野鸡子豆,扁粗决明;台湾:小羊角豆,〔石决明〕;湖北:圆决明;湖南:土蚕菜,豆荚草,大蜈蚣草,野豆荚,野豇豆,野绿豆,天蚕草、地蚕草(长沙),江南豆(溆浦),江南槐,茶儿茶;广东:狗屎豆、野扁豆(广州),双高藤(潮安、潮阳),生刺叶(乐昌),假绿豆(五华),鸭掌枫(新兴、高鹤、五华),望江南子;海南:黎茶,猪骨棉,猪骨头,山绿豆;云南:“哥拢浪”(傣语),倒挂龙,豆瓣,叶苦参,野花生;其他:黄槐子,杏黄槐子。

功效 种子:清肝明目,健胃润肠,通便解毒。用于高血压头痛,目赤肿痛,口腔糜烂,习惯性便秘,痢疾腹痛,慢性肠炎,疟疾;茎、叶:解毒。外用于蛇虫咬伤;根:利尿;全草:解毒。用于毒瘤,咳嗽。

备考 本植物有小毒,牲畜误食过量可以致死。

## 7148173

*Cassia pumila* Lam.

植物名 柄腺山扁豆(海南)、《中国植志》

功效 种子:用于泻下,利尿,胃肠病。

## 7148174

*Cassia siamea* Lam.

植物名 铁刀木《中国植志》

药材名 铁刀木《台湾药植志》

文献名 孟买蔷薇木、孟买黑檀《豆科图说》

地方名 云南：“埋西列”、“埋黑哩”、“眉席栗爹”、“哈坑懒”(傣语)，挨刀树，黑心树。

功效 心材：缓泻；根：驱除肠寄生虫，用于小儿惊厥；叶、果：有毒。用于痞满腹胀，头晕，脚转筋。

#### 7148175

*Cassia sophora* L.

植物名 槐叶决明《中国植志》

药材名 苳芒决明《纲目》、《汇编》

文献名 茶花儿、江南槐《植物名汇》

地方名 北京：〔望江南〕；云南：〔苦参〕（江川），豆瓣叶，野苦参（华宁）；其他：小羊豆，〔羊角豆〕。

功效 根：消炎，止痛，健胃。用于痢疾，胃痛，肝脓疡，喉炎，淋巴腺炎。外用于阴道滴虫，烧烫伤；种子：除痰止渴，令人不睡，调中，解热。

备考 个别地区以种子作望江南用，效用与望江南不同，应注意鉴别。

#### 7148176

*Cassia surattensis* Burm. f. --- *Cassia glauca* Lam. --- *C. suffruticosa* Koen. et Roth

植物名 黄槐决明《中国植志》

药材名 黄槐决明《广西药录》

文献名 凤凰花《名实图考》，粉叶决明《云南种录》，黄槐《高植图鉴》，旗那《豆科图说》

地方名 福建：金凤；广西：土槐花（岑溪），槐花木（平南）。

功效 叶：泻下，润肺，解毒；树皮及叶：用于痛风，糖尿病，淋病；花、果：用于痔疮出血。

#### 7148177

*Cassia tora* L.

植物名 决明《中国植志》

药材名 决明子《本经》、《药典》

文献名 草决明、羊明《吴普本草》，羊角《广雅》，马蹄决明《本草经集注》，望江南《救荒本草》，还瞳子《医学正传》，狗屎豆《生草药性备要》，夜关门《纲目拾遗》，金豆儿、狭小豆、槐豆、槐藤、江离子、决完子、马蹄草、合明草子、独占红子《新纲》，猪骨明、猪屎蓝豆、细叶猪屎豆《南方毒植》，假咖啡豆、喉白草《中草药学》，羊触足《中药大辞典》

地方名 雷公刀、山科猪（华南），夜合草、野绿豆（广西、云南），野花生（安徽、湖南、云南），假花生（广东、广西、云南），假绿豆（江西、广东、广西、四川、云南），芹决（陕西、湖南）；辽宁：〔咖啡豆〕；山西：〔千里光〕；江苏：马蹄子（南通），地槐根；安徽：丁豆，野咖啡；江西：决明草、野青豆；台湾：大号山上豆；河南：蝎子肚；广东：草结莲（台山、新会），岭豆（乐东），石中明、野地豆、野地豆苗（五华），野合草、大眼南子（翁源），猪屎豆（新兴、番禺、高要、高鹤），猪屎夹（广州）；海南：天上鹤（定安、屯昌），雷公豆（琼中），雷公青（澄迈、琼海），猪屎林（儋县）；广西：羊尾豆（平南），夜拉子（邕宁），夜壶草、夜笠草、决明茶、枕头子、葛明茶、葛猛茶、假羊角菜（桂林），小决明、小决明子，马蹄决明子，江南豆；四川：闹牛黄

（广汉），闹牛黄子（成都）；贵州：路边皂角；云南：“牙榔扣”、“亚拉阿”（西双版纳傣语），“牙拉劲”（思茅傣语），铃铛草（河口），明月子（文山）；西藏：“大伽几笃结”（藏名）。

功效 种子：清热明目，润肠通便。用于目赤涩痛，羞明多泪，头痛眩晕，目暗不明，大便秘结；全草或叶：祛风，清热，明目，润肠。用于流感，感冒。

#### 7148178

*Cassia torosa* Cav.

植物名 小羊角豆《台湾药植志》

文献名 〔石决明〕、蛇灰门草《满洲植录》，饭昆情草《药植事典》，望江南《台湾药植志》

地方名 台湾：小羊豆豆，羊角豆，江南子。

功效 种子：健胃，增视力，强心，利尿。用于下痢，腹痛；根：利尿。用于水肿；茎叶汁：外用于毒蛇、虫咬伤，齿痛，疥癣。

7148179 见 7148222

#### 7148180

*Cercis chinensis* Bunge -- *C. pauciflora* Li --- *C. chinensis* Bunge f. *rosea* Hsu

植物名 紫荆《日华子本草》、《中国植志》

药材名 紫荆皮《日华子本草》、《汇编》

文献名 紫荆木、紫荆花《日华子本草》，肉红、内消《纲目》，满条红《群芳谱》，紫荆木皮《本草经疏》，白林皮《分类草药性》，裸枝树、箩筐树《植物名汇》，罗钱桑、乌桑《树分》，箩筐桑《中国药植志》，紫金盘、紫荆根皮《中药大辞典》

地方名 米花木（东北）；陕西：罗圈树（佛坪），馍叶树（太白山），罗春桑；安徽：烂石根，菜药；湖北：罗椎树（巴东），罗圈桑；湖南：紫花树（衡山），扁头翁；四川：紫荆果（成都）。

功效 树皮：活血通经，消肿止痛，解毒。用于月经不调，痛经，经闭腹痛，风湿性关节炎，跌打损伤，咽喉肿痛。外用于痔疮肿痛，虫蛇咬伤；叶：用于背痈初起；花：通小肠，清热凉血，去风解毒；根皮：破瘀活血，消痈解毒。用于疯狗咬伤，妇人遗尿症；果：用于咳嗽，孕妇心痛。

#### 7148181

*Cercis chingii* Chun

植物名 黄山紫荆《中国植志》

文献名 秦氏紫荆《豆科图说》

地方名 浙江：浙皖紫荆（杭州）。

功效 皮、根：活血，消肿，止痛。

#### 7148182

*Cercis glabra* Pampan. --- *C. yunnanensis* Hu et Cheng

植物名 湖北紫荆《中国植志》

文献名 马藤《名实图考》，云南紫荆《云南种录》，紫荆皮《中药大辞典》

地方名 箩筐树（湖北、四川），乌桑树（湖北、河南）；云南：紫荆，石鲜，石瓣。

功效 树皮：活血通经，消肿止痛，解毒；叶：用于背痈初起；花：通小肠，清热凉血，祛风解毒。

## 7148183

*Cercis racemosa* Oliv.

植物名 垂丝紫荆《中国植志》

药材名 垂丝紫荆《贵州药录》

文献名 石鲜、石癭《滇南本草》，马藤《名实图考》

功效 根、叶：清热解毒，活血行气。用于产后气痛，喉痹，疮不收口。

## 7148184

*Christia constricta* (Schindl.) T. Chen

植物名 长管蝙蝠草《海南植志》

药材名 长管蝙蝠草《汇编》

文献名 蝴蝶草、半边月《汇编》

功效 全株：活血祛瘀，解毒消肿，止痛。用于跌打瘀肿，风湿骨痛，肺结核咳嗽，蛇虫咬伤，疳疮等。

## 7148185

*Christia lunata* Moench

植物名 月见罗瑞草《广西药录》

地方名 广西：蝴蝶草（柳江、武鸣、龙州）。

功效 全株：接骨。用于肺结核，蛇虫咬伤。

## 7148186

*Christia obcordata* (Poir.) Bahn. f. --- *Lourea obcordata* Desv. --- *Hedysarum obcordatum* Poir.

植物名 铺地蝙蝠草《高植图鉴》

药材名 半边钱《汇编》

文献名 罗瑞草《种分》

地方名 钱苗草（福建、广西）；福建：大扁草（龙海），土豆草、纱帽草（泉州），[马蹄香]（漳州），[马蹄金]（闽南、福州、龙岩），螺丕掩（福清），蝴蝶叶，罗藟草，三脚虎；广西：蝴蝶草（柳江）。

功效 全草：清热利湿，利尿止带。用于结膜炎，小便不利，膀胱炎，尿道炎，慢性肾炎，乳腺炎，石淋，白带。外用于疥癣，跌打损伤，毒蛇咬伤；根：凉血。用于吐血，咳血。

## 7148187

*Christia vespertilionis* (L. f.) Bahn. f. --- *Lourea vespertilionis* (L.) Desv.

植物名 蝙蝠草《高植图鉴》

药材名 蝙蝠草《汇编》

文献名 蝴蝶叶《中国经植志》

地方名 月见罗藟草（海南、广西）；海南：雷州蝴蝶树；广西：鹧子草（南宁），蝴蝶草（邕宁、南宁、武鸣、柳州），蝴蝶风，飞锅草，飞锡草，双飞蝴蝶。

功效 全草：清热凉血，接骨。用于肺结核，支气管炎，扁桃体炎。外用于跌打骨折。

## 7148188

*Cicer arietinum* L.

植物名 鹰嘴豆《高植图鉴》

药材名 回回豆《饮膳正要》、《中药大辞典》

文献名 胡豆《本草拾遗》，回鹘豆《契丹国志》，那合豆《救荒本草》，鸡豆、鸡儿豆《豆科图说》，香豆子、鸡头豆《高植图鉴》

功效 种子：用于消渴，解面毒。

## 7148189

*Cladrastis platycarpa* (Maxim.) Makino

植物名 翅荚香槐《高植图鉴》

药材名 翅荚香槐《浙江药植志》

功效 根：用于风湿关节疼痛。

## 7148190

*Cladrastis wilsonii* Takeda

植物名 香槐《高植图鉴》

药材名 香槐《浙江天目药志》

文献名 威氏槐《豆科图说》

地方名 陕西：黄槐（太白山）；浙江：香近豆（临安）；河南：山荆。

功效 根及果实：用于关节疼痛。

## 7148191

*Clitoria hanceana* Hemsl.

植物名 立蝴蝶《广西药录》

药材名 山岗荚《汇编》

文献名 韩氏蝶豆、假沙葛《中药大辞典》

地方名 广东：直立蝴蝶，白花蝶豆；广西：十兄弟（贵县），山葛薯、山萝卜（南宁），山江豆（博白）。

功效 块根：镇咳祛痰，消肿拔毒。用于老年慢性气管炎，疮肿。

## 7148192

*Clitoria mariana* L.

植物名 三叶蝴蝶花豆《高植图鉴》

药材名 大山豆《云南药录》

文献名 三叶蝶豆《云南种录》

地方名 云南：野黄豆（澄江、峨山），顺气药（元江）。

功效 根、叶、花：补肾，止血，舒筋。用于感冒，肾虚头晕，白带，产后腹痛，水肿，肠出血，风湿性关节炎。

## 7148193

*Clitoria ternatea* L.

植物名 蝴蝶花豆《高植图鉴》

药材名 蝴蝶花豆《台湾药植志》

地方名 蝶豆（台湾、海南）；台湾：羊豆，豆碧；广东：蓝蝴蝶（广州）；海南：蓝花豆。

功效 根：缓泻，利尿。用于腹水，发烧；根液汁：用于慢性气管炎，偏头痛；叶液汁：敷耳痛；种子：有毒。泻下，驱虫。外用于关节疼痛；花汁：用于眼炎；根皮：为膀胱及输尿管易受刺激时之镇静剂，亦具利尿、泻下作用。

## 7148194

*Cochlianthus gracilis* (Grah.) Benth.

植物名 细茎旋花豆《高植图鉴》

药材名 野老鼠豆《元江哈尼族药》

文献名 旋花豆《云南种录》

地方名 云南：“尼哈努刚”（元江哈尼语）。

功效 根：止痛止泻。用于腹痛，腹泻。

## 7148195

*Codariocalyx gyroides* (Roxb. ex Link) Hassk. ---*Desmodium gyroides* (Roxb. ex Link) DC. ---*Hedysarum gyroides* Roxb.

植物名 圆叶舞草《云南种录》  
 药材名 圆叶舞草《广西药录》  
 文献名 毛茛舞草《拉汉英种考》  
 地方名 广西：土金钱草（贺县），木豆（那坡）；贵州：接骨药。

功效 全草：清热利水，祛瘀，用于口腔炎，肾炎，肾结石，尿路感染。

## 7148196

*Codariocalyx motorus* (Houtt.) Ohashi --- *C. gyrans* (L.f.) Hassk --- *Desmodium gyrans* (L.f.) DC.

植物名 舞草《高植图鉴》  
 药材名 舞草《酉阳杂俎》、《汇编》  
 文献名 无风独摇草《名实图考》，舞获《豆科图说》，钟萼豆《台湾植志》，电信草《中国植物图鉴》

地方名 无风自动草（广西、云南）；广西：红毛母鸡草、红母鸡药、接骨草（南宁），壮阳草（凌云），红毛鸡草；云南：风流草、自动草、害羞草、唱合草（红河）。

功效 全草：安神，镇静，补肾安胎，去瘀生新，活血消肿。用于神经衰弱，胎动不安，跌打肿痛，骨折，风湿腰痛，神经痛，狂犬咬伤。

## 7148197

*Copaifera officinalis* (L.) Willd.

植物名 柯伯胶树《台湾药植志》  
 药材名 古巴香胶《台湾药植志》  
 文献名 古巴香树（叶《生药》），马那卡波古巴香胶（李《生药》），骨湃波拔乐撒漠树《中国植物图鉴》

功效 香胶：兴奋，利尿，泻下。用于淋病，膀胱炎。

## 7148198

*Coronilla varia* L.

植物名 绣球小冠花《东北草本植志》  
 功效 种子：含强心甙类，国外民间有作强心药和利尿药，并曾经作为抗肿瘤药。

## 7148199

*Craspedolobium schochii* Harms

植物名 巴豆藤《名实图考》、《高植图鉴》  
 药材名 铁藤《汇编》  
 文献名 禄劝鸡血藤《中草药学》，铁藤根《云南中草药》

地方名 云南：黑藤、血藤、三叶藤（红河），铁血藤（玉溪、新平），[大血藤]（新平），[鸡血藤]（禄劝）。

功效 根、藤：行血调经，祛风除湿。用于内出血，月经不调，贫血，红崩白带，跌打损伤，腰腿痛，风湿关节痛。

## 7148200

*Crotalaria acicularis* Buch.-Ham. ex Benth.

植物名 针状叶猪屎豆《广西药录》  
 文献名 针状猪屎豆《豆科图说》  
 功效 全草：拔毒，用于疮疖。

## 7148201

*Crotalaria alata* Buch.-Ham.

植物名 翅茎猪屎豆《云南种录》

药材名 狗响铃《贵州药录》

文献名 翅托叶野百合《海南植志》，翅茎野百合《西昌中草药》，翅托叶猪屎豆、阿字绿肥《豆科图说》

地方名 响铃草（广东、四川、贵州）；四川：土山豆根（西昌），响皮鞋（米易）；贵州：野豌豆；云南：狗铃铛。

功效 全草：清热，解毒，利尿。用于久咳痰喘，尿道炎，膀胱炎，痈疽疔疮。

## 7148202

*Crotalaria albida* Heyne ex Roth --- *C. montana* Roxb. --- *C. tenuis* Willd. --- *C. leiocarpus* Vogel

植物名 响铃豆《高植图鉴》  
 药材名 响铃豆《汇编》  
 文献名 [黄花地丁]《滇南本草》，黄花野百合《种分》

地方名 野豌豆（广西、云南）；福建：山大麻、白天金（泉州）；广西：马口铃（苍梧），猴丝草（柳城），铜拳头（临群），假花生（上林），黄痘草（崇左）；四川：黄花细辛，白野百合，小响铃草；云南：小响铃、响铃根（思茅），响铃草、土蔓荆（红河），狗响铃（红河、楚雄），摆子药（保山）。

功效 根或全草：清热，解毒，利尿，止咳平喘，截疟。用于尿道炎，膀胱炎，肝炎，胃肠炎，痢疾，支气管炎，肺炎，哮喘，疟疾。外用于痈肿疮毒，乳腺炎。

## 7148203

*Crotalaria anagyroides* H.B. et K.

植物名 三尖叶猪屎豆《豆科图说》  
 药材名 黄猪屎豆（广西）  
 文献名 美洲野百合《中国树木志》  
 功效 全草：祛风除湿，消肿止痛。

## 7148204

*Crotalaria assamica* Benth.

植物名 大猪屎豆《高植图鉴》  
 药材名 大猪屎豆《中药大辞典》  
 文献名 自消容、自消容根《生草药性备要》，十字珍珠草《本草求原》，自消融、通心草、大金不换《岭南采药录》，大猪屎青《豆科图说》，凸尖野百合《海南植志》  
 地方名 广东：自消蓉（广州），通心蓉，通心菜，散心蓉，马铃薯；广西：八百力（藤县），大马铃薯（岑溪），水流豆（平南），驱虫豆（忻城），倒水莲（苍梧），猪铃豆（博白），响铃豆（北流）；云南：[山豆根]（景东），野靛叶（思茅）。

功效 根、茎、叶：清热解毒，凉血降压，利尿。用于热咳，吐血，降压；叶：外用于马口疮；种子：补肾。用于肾虚耳鸣。

## 7148205

*Crotalaria bracteata* Roxb.

植物名 大苞叶猪屎豆《云南种录》  
 药材名 毛果猪屎豆《中药材》  
 文献名 小苞叶猪屎豆《中草药学》  
 地方名 云南：大响铃豆。  
 功效 根：清热解毒，理气消积。用于膀胱炎；全草：补中益气。

## 7148206

*Crotalaria calycina* Schrank

植物名 长萼猪屎豆《高植图鉴》

药材名 长萼猪屎豆《广西药录》

文献名 长萼野百合《海南植志》

地方名 海南:狗铃草(琼山);广西:大叶毛铃(宁明),猓猿上树;四川:响铃草(米易)。

功效 根:用于小儿疳积;茎、叶:外用于高热。有抗癌有效成分。

## 7148207

*Crotalaria capitata* Benth.

植物名 头花猪屎豆《高植图鉴》

药材名 头花猪屎豆《汇编》

地方名 贵州:鸡儿头、地草果(兴义);云南:大丁香、蓝花水豌豆(曲靖)。

功效 全草、根:清热解毒,止泻。用于小儿肺炎,小儿腹泻,疔疖,跌打损伤,外伤感染,痞块,饱胀。

## 7148208

*Crotalaria chinensis* L.

植物名 中国猪屎豆《豆科图说》

药材名 中国猪屎豆《广西药录》

文献名 华猪屎豆、华野百合《云南种录》,华百合《福建植志》

地方名 广西:假花生(三江),响铃珠(蒙山)。

功效 全草:外用于跌打损伤,狂犬咬伤;根、叶:用于小儿疳积。外用于毒蛇咬伤。

## 7148209

*Crotalaria ferruginea* Grah.

植物名 假地蓝《高植图鉴》

药材名 狗响铃《云南药录》

文献名 响铃草《滇南本草》,黄花野百合《海南植志》,锈色响铃草《西昌中草药》,毛假地豆《云南中草药》

地方名 假地豆(广西、云南),马铃草(江西、广西),荷猪草(江西、广东),响亮草(江西、湖南),野花生(浙江、江西、湖南、云南);浙江:风铃草(温州),响马铃(泰顺),野蚕豆(嵊县);江西:土霸王、(朝天子)、野百合(婺源),荷承草;广西:马刀铃(博白、苍梧),西瓜木(玉林),假花生(靖西、平南、龙州),响铃豆(那坡、平果),大补药;四川:铃铃草(重庆),肾气草(长寿),沙蒺藜;云南:小狗响铃(思茅、临沧),大响铃豆(昆明),老鼠响连科(曲靖),狗铃铛(文山),大响铃草、大马响铃、大狗响铃、响铃果、猪屎豆(红河),野豌豆(丽江),野毛豆,马小莲,马响铃,地响铃,响铃子。

功效 全草或根:养肝滋肾,止咳平喘,调经。用于肝肾不足所致头晕目眩,耳鸣耳聋,遗精,肾炎,哮喘,月经不调,白带。外用于疔疮。

## 7148210

*Crotalaria incana* L.

植物名 圆叶猪屎豆《中药材》

文献名 光叶猪屎豆《豆科图说》

功效 全草:有抗肿瘤作用。

## 7148211

*Crotalaria juncea* L.

植物名 菽麻《高植图鉴》

药材名 太阳麻《广西药录》

文献名 赫麻、赫麻《豆科图说》,印度麻《中国经植志》

地方名 自消容、自消融(台湾、广东),桫麻(陕西、广西);台湾:大金不换,通心草,自消了。

功效 种子:清热解毒,消肿止痛。用于牙痛。外用于疥癣;叶:用于坠胎。外用于疔疮肿毒;根:解毒,麻醉。用于内伤。

## 7148212

*Crotalaria linifolia* L. f. --- *C. stenophylla* Vog. --- *C. linifolia* L. f. var. *stenophylla* (Vogel.) C. Y. Yang

植物名 条叶猪屎豆《高植图鉴》

药材名 条叶猪屎豆《汇编》

文献名 线叶野百合《海南植志》,线叶猪屎豆《广西药录》,密叶猪屎豆《福建植志》

地方名 广西:假花生(博白),假鸡心头;四川:响铃草(凉山、西昌);贵州:小苦参。

功效 全草和根:清热解毒,理气消积。用于腹痛,毒疮,耳鸣,肾亏,遗精,妇女干血癆等。外用于疮疥,毒蛇咬伤,狂犬咬伤,疮疖。

## 7148213

*Crotalaria micans* Link

植物名 闪光猪屎豆(拟)

文献名 三尖叶猪屎豆《中药材》

功效 全草:有抗肿瘤作用。

## 7148214

*Crotalaria mysorensis* Roth

植物名 褐毛猪屎豆《中药材》

功效 全草:有抗肿瘤作用。

## 7148215

*Crotalaria pallida* Ait. --- *C. mucronata* Desv. --- *C. striata* DC.

植物名 猪屎豆《云南种录》

药材名 猪屎豆《广西药录》

文献名 三圆叶猪屎豆、沙字绿肥《豆科图说》,黄野百合《台湾药植志》

地方名 [潼蒺藜](福建、广西),[土沙苑](广东、广西);江苏:野黄豆;福建:[沙苑子],[本沙苑](连江、永泰、武平),鬼子豆(华安),水蓼竹;台湾:大眼蓝,马屎,憩憩草;广东:野黄豆草,假沙苑;海南:猪屎青;广西:大马铃(岑溪),假兰豆(贵县),[沙苑](北流、蒙山)。

功效 全草或根:解毒散结,消积,用于淋巴结核,乳腺炎,痢疾,小儿疳积;茎、叶:清热祛湿。用于痢疾,湿热腹泻。

备考 猪屎豆种子有毒,破坏肝功,严重的甚至出现腹水和肝昏迷而死亡,此种子切不可作沙苑子用。

## 7148216

*Crotalaria retusa* L.

植物名 凹叶野百合《海南植志》

药材名 吊裙草《台湾药植志》

文献名 裙草《中药材》

地方名 台湾:〔羊角豆〕;广东〔土沙苑〕,响铃子、矮脚假沙苑(湛江、海康)。

功效 根:用于疝痛,胃肠气胀;叶液汁:用于慢性发烧;叶及嫩梗之液汁:用于疥癣及脓疱病。

备考 本品的种子对肝脏有损害,服后可出现头晕、头痛、恶心、呕吐等症状,严重者可能出现腹水,肝昏迷而死亡,因之本品的种子切不可作沙苑子用。

#### 7148217

*Crotalaria sessiliflora* L.

植物名 农吉利《汇编》

药材名 农吉利《汇编》

文献名 野百合《佛指甲》《名实图考》,〔狸豆〕《植物学大辞典》,猪屎豆《中药志》,蓝花野百合《豆科图说》,细叶芝麻响《汇编》

地方名 山油麻(浙江、江西),狗铃草(辽宁、海南);辽宁:猫蛋草(新金);山东:羊屎蛋(蒙山),〔山芝麻〕、〔刘寄奴〕(烟台),老鼠布袋(日照),货郎鼓子草(胶南),鼠卵草,鼠蛋草,奴菱葵;浙江:小号芝麻铃(温州),河猪兰(平阳),疔草、紫花疔草(洞头),倒挂野芝麻(临安),芝麻响铃铃,〔野芝麻〕;安徽:吼子草,老母猪油;福建:四金铃、里乐丹(龙海),含铃草(厦门),高本倒生油麻(福州、闽侯),倒生麻;广东:〔锦地罗〕;广西:马留甲(苍梧),小响铃(兴安),猴子卵,猴子泡(大瑶山),狗铃豆;四川:响铃草,肾气草、野花生(西昌);云南:响铃果。

功效 全草:清热,利湿,解毒。用于疔疮,皮肤鳞状上皮癌,食道癌,宫颈瘤;根茎:用于小儿疳积。

#### 7148218

*Crotalaria spectabilis* Roth --- *C. macrophylla* Willd.

植物名 美丽猪屎豆《汇编》

文献名 美观猪屎豆《云南种录》,大托叶猪屎豆《中药材》

功效 全草:抗肿瘤。

备考 全草含野百合碱。

#### 7148219

*Crotalaria tetragona* Roxb. ex Andr.

植物名 四棱猪屎豆《云南种录》

药材名 化金丹《贵州草药》

地方名 云南:大马响铃、大响铃草、马响铃(红河),大响铃果。

功效 全草:化滞,止痛。用于腹痛;根、种子:清热解毒,利尿通淋。用于尿路感染,膀胱结石,肝炎,麻疹,月经不调,肾盂肾炎。

备考 全草:含野百合碱。

#### 7148220

*Crotalaria verrucosa* L.

植物名 多疣猪屎豆《豆科图说》

文献名 多疣野百合《海南植志》,大叶野百合《台湾药植志》

功效 叶:外用于头痛;叶汁:减少流涎。用于疥

癣,脓疱病。

#### 7148221

*Crotalaria yunnanensis* Franch.

植物名 云南猪屎豆《云南种录》

药材名 瓜子莲《汇编》

文献名 云南野百合《西昌中草药》

地方名 四川:响铃草。

功效 根、叶:解毒,祛风;根:用于跌打损伤;叶:用于枪毒。

#### 7148222

*Crotalaria zanzibarica* Benth. --- *C. usaramoensis* Baker f

植物名 光萼猪屎豆《中国树木志》

药材名 苦罗豆《广西药园药录》

文献名 光萼野百合《海南植志》

地方名 台湾:南美猪屎豆。

功效 全草:清热解毒,散结祛瘀。外用于疮疖,抗肿瘤。

#### 7148223

*Cylindroknelupha turgida* (Merr.) T. L. Wu --- *Albizia turgida* (Merr.) Merr. --- *Paralbizzia turgida* (Merr.) Kosterm.

植物名 大叶合欢《中国植志》

药材名 大叶合欢《广西药录》

文献名 鼎湖合欢《广西植志》,桂合欢《广西药录》,两广合欢、胀荚合欢《中国树木志》

地方名 广西:大山豆根(博白),〔土沙苑〕,假沙苑,鬼子豆。

功效 根:用于肚痛,杀虫。

#### 7148224

*Cytisus scoparius* Link

植物名 金雀儿《西藏植志》

药材名 金雀儿《台湾药植志》

文献名 金雀花《群芳谱》

功效 花:强心,利尿,发痘疹。用于心脏病及其他水肿,跌打损伤;根:暖筋骨,疗痛风,追风,活血,通脉,消结。

#### 7148225

*Dalbergia balansae* Prain

植物名 南岭黄檀《高植图鉴》

文献名 南岭檀《海南植志》,茶丫藤《树分》

地方名 广东:水相思(广州);海南:绳树,黄类树(澄迈)。

备考 本种为紫胶虫寄主植物。紫胶虫寄生树上所产的胶(紫胶),用于外伤出血。

#### 7148226

*Dalbergia benthamii* Prain

植物名 两粤黄檀《高植图鉴》

药材名 蕉藤麻(海南)

文献名 两粤檀《海南植志》,粤黄檀《广西植志》,两广黄檀《拉汉英种称》

地方名 海南:藤春(澄迈)。

功效 茎:活血通经。

#### 7148227

*Dalbergia dyeriana* Prain ex Harms

植物名 大金刚藤黄檀《中国树木志》

药材名 土降香(四川《南充中草》)

文献名 大金刚藤《云南种录》

地方名 四川:降筋湾、大降香(南充);云南:黄檀。

功效 根:理气散寒,活络止痛。用于胸腹气滞疼痛,胃气上逆的嗝气,呃逆,跌打损伤。

#### 7148228

*Dalbergia hainanensis* Merr. et Chun

植物名 海南黄檀《中国树木志》

文献名 海南檀《海南植志》

地方名 海南:花梨公,花梨木,牛筋树。

功效 紫胶:用于外伤出血。

#### 7148229

*Dalbergia hancei* Benth.

植物名 藤黄檀《高植图鉴》

药材名 藤檀《汇编》

文献名 榧树《豆科图说》

地方名 浙江:大金刚黄檀(龙泉),丁香柴、檀树、枰果藤(泰顺),龙毛香藤、草钩藤(平阳),孟葛(临海),香藤刺,黄檀柴,倒挂刺;福建:米糖藤,雪米藤;广西:大香藤(昭平),白鸡刺藤(北流),红香藤(玉林、陆川),鸡爪刺、黄龙脱衣(乐业、凌云),鸡踢香、藤香(陆川),细叶鸡踢勒(平南),降香(玉林、陆川、博白),豆扣藤,油香藤,屈叶藤,痛必灵。

功效 茎、树脂:理气止痛,用于胃脘痛,胸胁痛;根:强筋骨,宽筋,活络。用于腰腿关节痛。

#### 7148230

*Dalbergia hupeana* Hance

植物名 黄檀《高植图鉴》

药材名 檀根《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 檀木《诗经》,水檀《唐本草》,檀《本草拾遗》,檀树芽《救荒本草》,望水檀《群芳谱》,白檀树《植物名汇》

地方名 檀树(山东、江苏、浙江);山东:山檀子(平邑);江苏:等水檀(江宁),山檀(连云港);浙江:不知春(平阳);福建:白檀,担杆树,硬檀柴;河南:山槐;其他:山荆木。

功效 根、叶:有小毒。清热解毒,止血消肿。用于细菌性痢疾,疔疮肿毒,咳血,跌打肿痛;根、皮:有小毒。用于疮疥,杀虫。

#### 7148231

*Dalbergia millettii* Benth.

植物名 香港黄檀《中国树木志》

药材名 香港黄檀《浙江药植志》

地方名 广东:油香藤;贵州:孟葛藤。

功效 叶:清热解毒。用于疔疮,痈疽,蜂窝组织炎,竹叶青蛇咬伤。

#### 7148232

*Dalbergia munosoides* Franch. --- *D. stenophylla* Prain

植物名 含羞草叶黄檀《高植图鉴》

药材名 麦刺藤叶(浙江金华)、《中药大辞典》

文献名 象鼻藤《名实图考》,小黄檀《树分》

地方名 湖北:夜关门(鹤峰);其他:鸡勾札。

功效 叶:消炎解毒。用于疔疮,痈疽,竹叶青蛇咬伤,蜂窝织炎。

#### 7148233

*Dalbergia obtusifolia* Prain

植物名 钝叶黄檀《高植图鉴》

文献名 紫梗《纲目》

地方名 牛肋巴(广西、云南);云南:牛筋木,铁刀木,紫梗树。

功效 木材:行气止痛。

备考 本种为紫胶虫寄主植物。紫胶虫在树枝上分泌的胶质有凉血、解毒、发痘作用。用于痘毒不易透发,湿痒疮疥。

#### 7148234

*Dalbergia odorifera* T. Chen

植物名 降香檀《海南植志》

药材名 降香《药典》

文献名 降香黄檀《中草药学》

地方名 海南:花梨母(崖县、东方),花梨木(崖县),花梨。

功效 树干、根的心材:行气活血,止痛止血。用于脘腹疼痛,肝郁胁痛,胸痹刺痛,跌扑损伤,外伤出血。

#### 7148235

*Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain --- *D. tamarindifolia* Roxb.

植物名 斜叶黄檀《中国树木志》

药材名 羽叶檀《广西药园药录》

文献名 斜叶檀《海南植志》,罗望子叶黄檀《汇编》,羽叶黄檀《云南种录》,酸角叶黄檀《豆科图说》

地方名 云南:“谢汗省”(壮名),黄檀。

功效 根、树皮:消炎,解毒,截疟;全株:消肿止痛。用于风湿,跌打损伤,扭挫伤,沙虫脚。

#### 7148236

*Dalbergia polyadelpha* Prain

植物名 多体蕊黄檀《中国树木志》

文献名 云南黄檀《树分》

地方名 云南:“阿亏亏让”(元江哈尼语),老秧草(元江)。

功效 根或树皮:驱风除湿,止咳平喘。用于风湿腰痛,咳嗽喘息。

#### 7148237

*Dalbergia rimosa* Roxb.

植物名 多裂黄檀《中国树木志》

文献名 多裂黄藤《广西药录》

地方名 广西:老鹰爪(上林),米辣蚕(龙州)。

功效 根:接骨。

#### 7148238

*Dalbergia sisso* Roxb.

植物名 印度黄檀《中国树木志》  
 药材名 降紫香《中草药学》  
 文献名 印度檀《海南植志》, 降真香、降香《中草药学》, 紫藤香《简明中医辞典》  
 地方名 台湾: 茶檀。  
 功效 根部心材: 行气活血, 止痛止血; 叶: 用于急性淋病; 紫胶虫寄生于树枝上所生产的紫胶: 用于外伤出血, 口腔炎。

## 7148239

*Dalbergia szemaoensis* Prain

植物名 思茅黄檀《中国树木志》  
 地方名 秧青(广西、云南); 广西: 紫梗树; 云南: 酸香。  
 备考 本植物为紫胶虫的主要寄主之一, 虫胶和虫蜡为紫胶虫的产物。

## 7148240

*Dalbergia yunnanensis* Franch.

植物名 滇黔黄檀《中国树木志》  
 药材名 秧青(四川)、《汇编》  
 文献名 云南黄檀《西昌中草药》, 虹香藤《中药大辞典》  
 功效 根: 发表理气。用于风寒头痛, 食积胃腹胀痛。

## 7148241

*Delonix regia* (Boj.) Raf.

植物名 凤凰木《中国植志》  
 药材名 凤凰木《台湾药植志》  
 地方名 广东: 火树、红花楹(广州), 金凤村, 凤房树, 洋楹; 广西: 红花楹树; 其他: 凤凰树。  
 功效 树皮: 为解热药; 根: 有水溶性生物碱, 有降低血压作用。

## 7148242

*Dendrolobium triangulare* (Retz.) Schindl. ---  
*Desmodium triangulare* (Retz.) Merr. --- *Hedysarum triangulare* Retz.

植物名 假木豆(海南)、《高植图鉴》  
 文献名 圆锥山蚂蚱《豆科图说》  
 地方名 广西: 早甘草、野蚂蚱(梧州), 木特、假绿豆(龙州), 哥踏(贵县), 白毛千斤拔(隆林); 其他: (千斤拔)。

功效 根、叶: 清热凉血, 强筋壮骨, 健脾利湿。用于瘫痪, 喉痛, 腹泻, 跌打损伤, 骨折, 吐血, 咯血; 全草: 用于角膜白斑。

## 7148243

*Derris elliptica* (Wall.) Benth.

植物名 毛鱼藤《中国树木志》  
 药材名 鱼藤《药材学》  
 文献名 毒鱼藤(李《药植》), 南亚鱼藤《经植手册》  
 地方名 四川: 苗栗藤(成都)。  
 功效 根: 有毒。外用于癣疥湿疹。

## 7148244

*Derris eriocarpa* How

植物名 毛果鱼藤《中国树木志》  
 药材名 毛果鱼藤《广西药录》  
 文献名 毛毒鱼藤《品种论述》  
 地方名 广西: (上甘草)(上林、马山、百色、平果), (鸡血藤)(南宁); 云南: 美丽相思子、藤子甘草(思茅)。  
 功效 根: 补血, 润肠。用于咳嗽, 咽喉肿痛; 藤: 利尿除湿, 镇咳化痰。用于肾炎, 膀胱炎, 尿道炎, 咳嗽, 脚气水肿。

## 7148245

*Derris ferruginea* (Roxb.) Benth.

植物名 锈毛鱼藤《海南植志》  
 药材名 锈毛鱼藤《药材学》  
 文献名 锈毛鱼藤《高植图鉴》  
 地方名 海南: 山茶藤, 老荆藤, 锈叶鱼藤, 荔枝藤; 广西: 毒鱼藤(容县)。  
 功效 根: 外用于癣疥湿疹。

## 7148246

*Derris fordii* Oliv.

植物名 中南鱼藤《高植图鉴》  
 药材名 毒鱼藤《湖南药物志》  
 文献名 霍氏鱼藤《药材学》, 揭阳鱼藤《广西植录》  
 地方名 广西: 毛鱼藤, 坭藤, 鱼藤, 苦楝藤。  
 功效 茎枝、叶: 有毒。外用于湿疹, 风湿关节疼痛, 跌打肿痛(皮肤未破)。  
 备考 浙江以此混称鸡血藤。

## 7148247

*Derris hancei* Hemsl.

植物名 肇庆鱼藤《广西植录》  
 文献名 韩氏鱼藤《广西药录》  
 地方名 广西: 玉郎伞(扶绥)。  
 功效 根: 接骨。用于跌打。

## 7148248

*Derris heptaphylla* (L.) Merr. --- *D. exserta* Craib

植物名 突出鱼藤《云南种录》  
 药材名 七叶鱼藤《台湾药植志》  
 功效 嫩叶: 供药用; 根、茎: 杀虫。外用于疥癣及皮肤病。

## 7148249

*Derris laxiflora* Benth.

植物名 疏花鱼藤《拉汉英种称》  
 药材名 疏花鱼藤《台湾药植志》  
 功效 根: 杀虫。用于疥癣及皮肤病。

## 7148250

*Derris malaccensis* Prain

植物名 麻六甲鱼藤《台湾药植志》  
 文献名 马来鱼藤、鱼藤《药材学》, 异翅鱼藤《海南植志》, 马那卡毒鱼藤(李《生药》)  
 功效 根: 杀虫。外用于疥癣及皮肤病。

## 7148251

*Derris marginata* (Roxb.) Benth. --- *Dalbergia marginata* Roxb.

植物名 边荚鱼藤《高植图鉴》



药材名 边荚鱼藤《药材学》  
文献名 纤毛蓴鱼藤《豆科图说》  
地方名 广东:老荆藤;广西:水硬骨藤,纤毛毒鱼藤。

功效 根:外用于癣疥湿疹。

## 7148252

*Derris microptera* Benth.

植物名 小翅鱼藤《西藏植志》

地方名 西藏:毒鱼藤。

功效 根:外用于癣疥,毒鱼,杀虫。

## 7148253

*Derris oblonga* Benth.

植物名 矩叶鱼藤《台湾药植志》

文献名 肝脉瓣鱼藤《豆科图说》

功效 根:杀虫。外用子疥癣。

## 7148254

*Derris scabricalis* (Franch.) Gagnep.

植物名 毛枝鱼藤《西藏植志》

药材名 毛枝鱼藤《广西药园药录》

文献名 粗茎鱼藤《云南种录》

地方名 西藏:毒鱼藤。

功效 根:外用于跌打肿痛,癣疥。

## 7148255

*Derris scandens* Benth. --- *Dalbergia scandens* Roxb.

植物名 攀登鱼藤《台湾药植志》

文献名 截耳瓣鱼藤《豆科图说》

地方名 毒鱼藤(广东、广西)。

功效 根:杀虫。外用于疥癣及皮肤病。

## 7148256

*Derris trifoliata* Lour. --- *D. uliginosa* Benth.

植物名 鱼藤《高植图鉴》

药材名 鱼藤《汇编》

文献名 菱藤《南方毒植》,沼池鱼藤《杀虫植物》,三叶毒鱼藤《药学通报》,台湾鱼藤《台湾药植志》

地方名 浙江:毒鱼藤;广东:白药、白药根、雷公藤蹄、露藤(潮安);海南:水藤。

功效 全株及根茎:有大毒。散瘀止痛,杀虫。外用于湿疹,风湿关节肿痛,跌打肿痛,疥疮。

## 7148257

*Desmodium caudatum* (Thunb.) DC. --- *Catenaria caudata* (Thunb.) Schindl.

植物名 小槐花《高植图鉴》

药材名 小槐花《名实图考》、《汇编》

文献名 青酒缸、青酒缸根《草木便方》,味草《分类草药性》,草鞋板《天宝本草》,小青金缸《植物名汇》,三把菱、饿蛆疆《岭南采药录》,味噌草、蛆草《植物学大辞典》,锐叶小槐花《台湾药植志》

地方名 山蚂蝗(江西、广东、广西、四川),羊带归(江西、广东、四川),饿蚂蝗(广西、云南),蚂蝗根(四川、贵州),拿身草(浙江、广东、广西、云南),粘身草(江西、广东、广西),胃痛草(广东、广西),金腰带(浙江、福建、台湾),抹草(台湾、广东);浙江:豆荚树柴(建德),

豆荚马料肖(嵊县),山高枝(普陀),狗脚粘,杨介圭;江西:见人打、粘人草(泰和),逢人打(德兴),扁草子(婺源),山槐花;福建:三叶青(长乐、福州、永泰、平潭、罗源),牛贴额(漳浦),豆夹也(松溪、政和),野春被兰(尤溪),鬼豆(福州),夹蝇子,夹夹子草,皮鞋夹草,草鞋掌,扁担夹草抹尾;台湾:大鱼鳞,鲢鱼鳞,磨仔草;湖南:巴人草,尖叶山蚂蝗(衡山),粘粘草(黔阳),粘衣刺,水蛭草,豆子草,路边鸣,路边肖;广东:草鞋底(英德),流水解、粘身子、挪身子、扁挪身、细芸(粤北),三把莲,二把灵,山蚂蝗,没蓝,蝴蝶挪,饿蚂蝗;广西:四眼草(平南),百节草、骨碎木(玉林),羊太龟(岑溪、平南),软麻黄(藤县),蚂蝗木、蝴蝶木(陆川),小饿蚂蝗,米噌草;四川:米草(成都),畏草;贵州:蚂蝗草,化痰精,长叶粘巴草,旱蚂蝗,〔万年青〕;云南:路蚂蝗(文山);其他:野毛豆。

功效 根、叶或全株:清热解毒,祛风利湿。用于感冒发热,胃肠炎,痢疾,小儿疳积,风湿关节痛。外用于毒蛇咬伤,痈疖疔疮,乳腺炎。

## 7148258

*Desmodium duclouxii* Pamp. --- *Desmodium henryi* A. K. Schindl.

植物名 鹤庆山蚂蝗《云南种录》

药材名 水菇里《汇编》

地方名 云南:水菇蓼,红野豆,野黄豆。

功效 根:活血散瘀,止痛,舒筋活络。用于风湿筋骨痛,跌打损伤,闭经,月经不调。

## 7148259

*Desmodium elegans* DC. --- *D. esquirolii* Levl. --- *D. spicatum* Rehd.

植物名 圆锥山蚂蝗《高植图鉴》

药材名 山蚂蝗《西昌中草药》

文献名 灰毛山蚂蝗《云南种录》,雅致山蚂蝗(拉汉英种称),总状花序山蚂蝗(贵州药录)

地方名 四川:饿蚂蝗(西昌);贵州:〔山豆根〕;云南:棉筋,黄皮条,山毛豆。

功效 全草:开胃健脾,清热利湿。用于小儿疳积,肝炎,胸腹胀痛,风湿关节痛;叶:接骨。外用于骨折。

## 7148260

*Desmodium gangeticum* (L.) DC.

植物名 大叶山蚂蝗《高植图鉴》

药材名 大叶山蚂蝗《广西药录》

文献名 钩毛荚山蚂蝗(拉汉英种称),球花山蚂蝗《台湾药植志》,粘波波大叶山蚂蝗《汇编》

地方名 大叶山绿豆(海南、广西),恒河山绿豆(广东、广西、云南);广西:小百解菜(阳朔),红毛鸡草、红母鸡草(南宁),扁米根(百色),籽蚂蝗(凤山),单叶山蚂蝗;云南:粘人草,粘草,粘波波。

功效 根:消炎,杀菌,调经止痛。用于子宫脱垂,脱肛,腹痛,闭经,牛皮癣,神经性皮炎;全草:止血,止痛,散瘀消肿。外用于跌打损伤,骨折,疮疖。

## 7148261

*Desmodium heterocarpum* (L.) DC. ssp. *angustifolium* (Craib) Ohwi -- *D. reticulatum* Champ. ex Benth.

植物名 狭叶假地豆《云南种录》

文献名 显脉山绿豆《广西药录》

地方名 山地豆、假花生(广东、广西); 广东: 山花生; 广西: 三叶青(岑溪), 金钻, 野花生。

功效 全株; 去腐, 生肌。用于痢疾, 外伤出血。

#### 7148262

*Desmodium heterocarpum* (L.) DC. --- *D. buergeri* Miq. -- *Hedysarum heterocarpum* L.

植物名 假地豆(海南)、《高植图鉴》

药材名 山花生《汇编》

文献名 倒卵叶山蚂蝗《江西药录》, 异果山绿豆《广西药录》, 小槐花《台湾药植志》

地方名 野花生(浙江、广西); 福建: 大叶青(闽南), 两神翅(厦门); 台湾: 大本山土豆; 广东: 假花生; 海南: 稗豆; 广西: 狗尾花、细叶假花生(南宁), 通乳草(玉林), 木假地豆(苍梧), 山道根(苍梧、藤县), 九宫菜、假红兰(桂平), 爬地蚂蝗(凌云), 中蝶草(梧州), 麒麟尾(北流), 山地豆, 野花生藤, 铺地假花生, 铜钱射。

功效 全株; 清热解毒, 消肿止痛。用于预防腮腺炎, 流行性乙型脑炎; 喉痛。外用于毒蛇咬伤, 跌打肿痛, 痢疾。

#### 7148263

*Desmodium heterocarpum* (L.) DC. var. *strigosum* van Meeuwen

植物名 糙毛假地豆《广西药录》

文献名 伏毛假地豆《云南种录》, 异果山绿豆《鼎湖山植物手册》

地方名 广西: 假花生(北海、防城、宁明)。

功效 全草; 止痛, 止血生肌。用于毒蛇咬伤; 叶: 用于蛇咬伤; 根: 用于感冒发热, 头痛。

#### 7148264

*Desmodium heterophyllum* (Willd.) DC.

植物名 异叶山蚂蝗《广西药录》

文献名 田吊子、血筋草、拐仔草、铺地藤、乌蝇翼《汇编》, 异叶山绿豆《海南植志》

地方名 江西: 山花生; 福建: 大叶青(闽南); 海南: 田胡蜘蛛(儋县); 广西: 狗尾花、细叶假花生(南宁), 铁线草(大新), 假地豆(武鸣), 山道根, 木假地豆, 中蝶草, 通乳草, 假花生。

功效 全草; 利尿通淋, 散瘀消肿。用于泌尿系结石, 跌打瘀肿, 外伤出血; 根: 健胃, 消痰止咳。用于虚寒性咳嗽, 小儿疳积; 叶: 清热解毒。用于疮疡及埋口生肌。

#### 7148265

*Desmodium laxiflorum* DC.

植物名 疏花山蚂蝗(拉汉英种称)

文献名 疏花山绿豆《广州植志》, 大叶拿身草《云南药录》

地方名 羊带归(广西、云南); 广西: 白花饿蚂蝗; 贵州: 水倒提; 云南: 山蚂蝗, 粘人草, 粘衣草, 野毛豆, 饿

蚂蝗, 路蚂蝗。

功效 全草; 清热解毒, 健脾利湿。用于毒蛇咬伤, 跌打损伤, 淋巴结炎, 神经性皮炎, 过敏性皮炎, 乳腺炎, 烫伤, 胃痛, 肾、膀胱结石, 小儿疳积, 梅毒。

#### 7148266

*Desmodium mandshuricum* (Maxim.) Schindler --- *D. podocarpum* DC. var. *mandshuricum* Maxim. --- *D. racemosum* (Thunb.) DC. var. *mandshuricum* (Maxim.) Ohwi --- *D. oxyphyllum* DC. var. *mandshuricum* (Maxim.) Ohashi

植物名 东北山蚂蝗《豆科图说》

药材名 东北山蚂蝗《东北药用植物》

地方名 辽宁: 山绿豆(沈阳、铁岭)。

功效 全株; 祛风, 活络, 散瘀, 解毒消肿, 止痢。用于跌打损伤, 风湿性关节炎, 腰痛, 哮喘, 乳腺炎, 崩中, 带下, 咳嗽吐血, 毒蛇咬伤。

#### 7148267

*Desmodium microphyllum* (Thunb.) DC. --- *D. parvifolium* (Spr.) DC. --- *Hedysarum microphyllum* Thunb.

植物名 小叶三点金草《高植图鉴》

药材名 小叶三点金《汇编》

文献名 碎米柴《纲目》, 八字草《名实图考》, 小叶山绿豆《海南植志》, 小叶小槐花《种分》, 小叶山蚂蝗《西昌中草药》, 铺地山绿豆《广西药园药录》

地方名 [鸡骨草](广西、贵州), 逍遥草(四川、云南), [漆大伯](安徽、江西); 浙江: 红漆筋(龙泉), 红关门(泰顺), 红盲夹(丽水), 金七枝(乐清), 雄蛇药; 江西: 小叶关门草, 天小豆, 太阳草, 红梗草, 消毒草, 路路星; 福建: 红梗夫人草(宁化、清流), 红杆美人草(宁化), 美人草(清流); 湖南: 大蚊虫药, 红筋草; 广西: 飞扬草(桂平、玉林), 耳挖草(钟山), [红藤草], 红藤, 红夜关门(资源), 扫把艾(三江); 四川: 红绿线, 吼包草, 哮喘草, 女儿茶、红藤藤、匍匐茎(西昌), 雄蛇草; 贵州: 爬地香(兴义); 云南: 地盘茶(保山、红河), 散风散(曲靖), 斑鸠窝(昆明、红河), 细叶兰(临沧), 马尾草(红河), 细鞭打, 消黄散, 马龙通, 斑鸠鼻, 小木通(丽江), 马尾藤, 狮子草, 苍蝇网、小叶琴草、小穿鱼草、碎米草、接筋草、蛇药(红河), 喜鹊窠、逍遥散、辫子草(昆明), “敏的胸”(楚雄彝名), 土丁香。

功效 根及全草; 健脾利湿, 止咳平喘, 解毒消肿。用于小儿疳积, 黄疸, 痢疾, 咳嗽, 哮喘, 支气管炎, 泌尿系结石, 慢性胃炎, 咯血, 崩漏, 白带。外用子水火烫伤, 毒蛇咬伤, 痢疮溃烂, 漆疮, 痔疮, 跌打损伤。

#### 7148268

*Desmodium multiflorum* DC. --- *D. sambuense* (D. Don) DC. --- *D. floribundum* (G. Don) Sweet

植物名 饿蚂蝗《高植图鉴》

药材名 饿蚂蝗《汇编》

文献名 多花山蚂蝗《中国树木志》, 多花三点金《福建植志》, 紫藤小槐花《台湾药植志》

地方名 红掌草(浙江、广西、四川); 浙江: 细风带(丽水), 山角豆(云和、龙泉); 台湾: 野黄豆; 湖南: 走牛

郎,活血皮,洋骚鸡婆婆子;广西:吊马花(全州),山蚂蝗,大山蚂蝗,粘身草;贵州:[山豆根], [大红袍], 烂玉树。

功效 根、全株及种子:清热解毒,消食止痛。用于胃痛,小儿疳积,腮腺炎,淋巴结炎,毒蛇咬伤;花、枝:发汗,发表。

## 7148269

*Desmodium renifolium* (L.) Schindl.

植物名 肾叶山蚂蝗《台湾药植志》

文献名 肾叶山绿豆《海南植志》

地方名 台湾:[马蹄金]。

功效 叶:解热。

## 7148270

*Desmodium rubrum* (Lour.) DC.

植物名 绢毛山蚂蝗《拉汉英种称》

药材名 铜钱草《西昌中草药》

文献名 单叶假地豆《广西药录》,赤山绿豆《海南植志》

地方名 广西:飞扬草(桂平);四川:小山蚂蝗、红山蚂蝗(西昌)。

功效 全株:消食健胃,消炎止泻。用于小儿烂头疮。

## 7148271

*Desmodium sequax* Wall. --- *D. sinuatum* (Miq.) Blume ex Baker

植物名 波叶山蚂蝗《中国树木志》

药材名 牛巴嘴《汇编》

文献名 波状叶山蚂蝗、菱叶山绿豆《广西药录》

地方名 饿蚂蝗(广西、四川、贵州、云南);广西:[千年拔](苍梧),迭钱草(大新);台湾:满鼎湖草,山毛豆花,乌山黄檀草;四川:大山蚂蝗(西昌),野豆子;贵州:粘人花,粘人花根,黄粘巴草;云南:[过路黄](文山),山蚂蝗、粘人草、蚂蝗棵、三叶地玛桩(红河),瓦子草。

功效 根:有小毒。润肺止咳,驱虫。用于肺结核咳嗽,盗汗,喘咳,产后胎盘滞留,蛔虫病;果:止血消炎,用于内伤出血;全草:外用于急性结膜炎,烧伤。

## 7148272

*Desmodium styracifolium* (Osbeck) Merr. --- *Hedysarum styracifolium* Osbeck

植物名 广金钱草《药典》

药材名 广金钱草《药典》

文献名 龙鳞草《岭南采药录》,广东金钱草《岭南草药志》

地方名 金钱草、马蹄草、铜钱草、落地金钱、落地金钱草(广东、广西),午时灵(华南);广东:亚婆钱(五华),金钱落地环(顺德),牛蟻草、围辘岭(东莞),月姑草(陆丰、惠来),奇蒿拐(增城),山地豆(普宁、潮阳),[马蹄香](潮汕),假地豆(潮安、潮州),老虎耳(惠来),铜钱射草;海南:金子草(琼中),铜铲(乐东),铜钱沙(澄迈);广西:文钱甘、古铜钱(贵县),大猪尾(玉林),金钱根(桂平),[六月雪],有毛假花生(北海),假花生、银蹄草(南宁),铜钱疳,[一面锣],铜钱花,金钱肺金

草,白侧耳根,藤侧耳根,地豆公,水侧耳根,铺地金钱。功效 地上部分:清热除湿,利尿通淋。用于热淋,砂淋,石淋,小便涩痛,水肿尿少,黄疸尿赤,尿路结石。

## 7148273

*Desmodium triflorum* (L.) DC.

植物名 三点金草《高植图鉴》

药材名 三点金草《汇编》

文献名 八字草《名实图考》,三点金《广西药录》

地方名 台湾:蝇翼草,蝇翅草,蝴蝶翼,三砚仔草,三耳草,四季春,珠子草,扁豆,[扁蓿];广东:三脚虎、[六月雪]、品字草(潮阳),三叶仔(汕头),三点青(惠来),三点桃、三叶桃、三点星(普宁),大号苍蝇翼(海丰),大样苍蝇翼(陆丰),三点仔、小样马蹄金、铺地锦、三点红(饶平);广西:车拍草(玉林),白鸪酸(博白),苍蝇叶、苍蝇草(平南),葫芦草(桂平),细鸡米、纹零菜(贵县),[还魂草](苍梧),透层网(隆林),小蝴蝶、细叶野花生(南宁),三花山绿豆;云南:河地马桩、马郎果叶、葫芦叶(红河),[葫芦茶],斑鸠窝,遍地撒金钱。

功效 全草:行气止痛,温经散寒,解毒。用于中暑腹痛,疝气痛,月经不调,痛经,产后关节痛,狂犬病;叶:用于创伤,脓肿。

## 7148274

*Desmodium umbellatum* DC.

植物名 胡蝇翼《台湾药植志》

文献名 台湾山蚂蝗《新华本草纲要》

地方名 台湾:白古苏花。

功效 花:用于淋病,月经不调。

## 7148275

*Desmodium velutinum* (Willd.) DC. --- *D. lasiocarpum* (Beauv.) DC. --- *Hedysarum velutinum* Willd.

植物名 绒毛山蚂蝗《高植图鉴》

药材名 绒毛山蚂蝗《广西药录》

文献名 绒毛叶山蚂蝗《豆科图说》,绒毛山绿豆《海南植志》,短钩毛山蚂蝗《拉汉英种称》

地方名 广西:凤凰草(岑溪)。

功效 全草:用于黄疸型肝炎。

## 7148276

*Desmodium zonatum* Miq.

植物名 单叶拿身草《中国树木志》

药材名 单叶饿蚂蝗《广西药园药录》

文献名 长荚山绿豆《广西药园药录》,长荚山蚂蝗《新华本草纲要》

地方名 广西:山槐树(融安)。

功效 根:清热消滞。用于胃脘痛,小儿疳积。

## 7148277

*Dichrostachys cinerea* (L.) Wight et Arn. --- *D. glomerata* (Forsk.) Chiov.

植物名 代儿茶(广东)、《中国植志》

药材名 柏勒儿茶《汇编》

文献名 色穗木《中国树木志》,柏勒树儿茶《中药大辞典》

地方名 广东:柏勒树、白番筋(中山)。

功效 枝的水煎浸膏:止血,止泻,敛疮定痛。用于胃、十二指肠溃疡出血;根:用于肠道寄生虫,蛇、蝎咬伤,梅毒,麻风等。

#### 7148278

*Dolichos cultatus* Thunb.

植物名 鹧豆《汇编》

地方名 广东:鹧仔豆(潮阳),雀仔豆,紫扁豆,黑扁豆。

功效 叶、种子:祛风行气,升清降浊,和中益肾。用于头风,遗尿,四肢酸痛。

#### 7148279

*Dolichos ficifolius* Grah.

植物名 无花果叶扁豆《汇编》

功效 全草:有杀虫作用。

#### 7148280

*Dolichos lablab* L. --- *Lablab vulgaris* Savi

植物名 扁豆《别录》、《高植图鉴》

药材名 白扁豆《纲目》、《药典》

文献名 藊豆、扁豆叶《别录》,扁豆花《图经》,眉儿豆苗《救荒本草》,南扁豆《滇南本草》,扁豆藤、沿篱豆、峨眉豆《纲目》,眉豆《本草原始》,羊眼豆《药品化义》,凉衍豆《本草乘雅半偈》,扁豆根《生草药性备要》,龙爪豆《汝南圃史》,扁豆皮《本草便读》,青扁豆、刀豆藤、沿篱豆《植物名汇》,白峨眉豆、雪梅同气《新纲》,天竺豆、千石豆《豆科图说》,藤豆《中草药学》,老母猪耳朵《东北药植志》

地方名 火镰扁豆(北京、河北、山西),肉豆(江西、台湾),白花豆(广东、云南),茶豆(江苏、云南),扁豆衣(江苏、浙江、安徽),白眉豆(东北、河南);吉林:气豆;河北:小白鞋;山西:活扁豆;内蒙古:“哈布他钙-宝日其格”(蒙名);江苏:白扁豆皮(徐州),爷爷豆,白贡边;台湾:白肉豆,肉仔豆,乌仔豆,白扁豆衣;河南:白豆,白门豆,梅豆,白梅豆;广东:膨皮豆(梅县),南豆花,白扁豆花、白面豆花(广州),面豆;广西:雪豆(龙州、博白),把披豆花(平南、陆川),南豆(陆川);四川:小刀豆,树豆(会理),药豆(西昌);云南:白茶豆。

功效 白色种子:健脾化湿,和中消暑。用于脾胃虚弱,食欲不振,大便溏泻,白带过多,暑湿吐泻,胸闷腹胀;炒扁豆:健脾化湿。用于脾虚泄泻,白带过多;扁豆根:用于便血痔漏,淋浊;扁豆藤:用于风痰迷窍,癫狂乱语;扁豆叶:用于吐泻转筋,疮毒,跌打创伤;扁豆花:消暑,化湿,和中。用于暑湿泄泻,痢疾;扁豆衣(种皮):健脾化湿。用于痢疾、腹泻,脚气浮肿。

备考 苏颂《本草图经》云:“入药用白者,黑者名鹧豆。”

7148281 见 7148291

#### 7148282

*Dolichos tenuicaulis* (Baker) Craib --- *Dolichos falcatus* auct. non Klein ex Willd.

植物名 大麻药《云南种录》

药材名 大麻药《云南中草药》

文献名 人参药《中草药通讯》

地方名 野饭豆(贵州、云南);云南:小豆根、野老鼠豆棵、麻野麻、野扁豆(红河),麻三段(思茅),豆叶百步还阳(保山),大豆荚、大九荚(文山),三极方,野饭豆根,〔山豆根〕。

功效 根:有毒。祛风活血,止血止痛。用于风湿痛,跌打损伤,骨折,外伤出血,吐血,衄血,便血。

备考 有的文献将本种学名误订为 *Dolichos falcatus* Klein ex Willd.

#### 7148283

*Dumasia bicolor* Hay.

植物名 二色叶山黑豆《台湾药植志》

功效 全草:用于脚痛,脚底生鸡眼。

#### 7148284

*Dumasia cordifolia* Benth. et Baker

植物名 心叶山黑豆《高植图鉴》

药材名 心叶山黑豆《西昌中草药》

地方名 四川:三叶山扁豆(西昌)。

功效 全草:清热消炎,止泻。用于腹泻,风痒。

#### 7148285

*Dumasia forrestii* Diels

植物名 雀舌豆《高植图鉴》

药材名 雀舌豆(云南)、《汇编》

文献名 小鸡藤《名实图考》,光叶山黑豆《西藏植志》,大苞山黑豆《广西植物》

功效 荚果:舒筋活络,止痛。用于坐骨神经痛,筋骨疼痛。

#### 7148286

*Dumasia villosa* DC.

植物名 柔毛山黑豆《高植图鉴》

文献名 毛小鸡藤《云南种录》

地方名 甘肃:瘦骨豆(文县);四川:野爬山豆(峨眉山),大叶红藤,〔红藤〕。

功效 全草:清热解毒,通经,健胃。

#### 7148287

*Dunbaria circinalis* (Benth.) Bak.

植物名 卷圈野扁豆《豆科图说》

药材名 云豆根《中药大辞典》

文献名 豆根、〔广豆根〕《常用中药名辨》

地方名 云南:山豆根(昆明),野扁豆。

功效 根茎:清喉热,肝热。用于喉炎,结膜炎。

#### 7148288

*Dunbaria fusca* (Wall.) Kurz --- *Phaseolus fusca* Wall.

植物名 褐野扁豆《云南种录》

药材名 黄毛野扁豆《广西药录》

地方名 广西:山黄豆(苍梧),红草藤(平南),黄藤儿(岑溪),山坡豆。

功效 根、叶:健胃,利尿。用于黄疸型肝炎,小儿疳积,天花。外用于疮疡肿毒。

#### 7148289

*Dunbaria parvifolia* X. X. Chen

植物名 小叶野扁豆《广西药录》

地方名 广西:铁线藤(邕宁)。

功效 全草:用于毒蛇咬伤。

#### 7148290

*Dunbaria podocarpa* Kurz

植物名 长柄野扁豆《高植图鉴》

药材名 长柄野扁豆《广西药录》

地方名 广东:山绿豆;广西:水芽豆(贵县),金钱风(博白),贼老藤(北流),黄汁藤,山保豆。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于乳瘤,牙痛,咽喉炎;根:外用于毒蛇咬伤。

#### 7148291

*Dunbaria rotundifolia* (Lour.) Merr.

植物名 圆叶野扁豆《高植图鉴》

药材名 罗网藤(广东)

地方名 广东:假绿豆(阳春);广西:小黄藤(南宁),家豆薯(昭平)。

功效 全草:清热解毒,止血生肌。用于急性肝炎,肺热,大肠湿热。

#### 7148292

*Dunbaria villosa* (Thunb.) Makino --- *D. subrhombica* (Miq.) Hemsl. --- *Glycine villosa* Thunb.

植物名 毛野扁豆《高植图鉴》

药材名 野扁豆《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 野赤小豆《福建植志》

地方名 河南:〔黄芪〕。

功效 全草或种子:外用于无名肿毒;种子:用于妇女白带。

#### 7148293

*Entada phaseoloides* (L.) Merr. --- *E. scandens* (L.) Benth. --- *Lens phaseoloides* L. --- *Mimosa scandens* L.

植物名 榼藤《南方草木状》、《中国植志》

药材名 榼藤子《本草拾遗》、《中药大辞典》,过岗龙〔藤茎〕《汇编》

文献名 象豆《南方草木状》,合子《本草拾遗》,榼子《日华子本草》,藏腰子《本草新注》,老鸦枕、前合母《拉汉种称补编》,攀援榼藤《民族药志》,榼藤子仁《〈药典〉附录》

地方名 过江龙(广东、广西、云南),牛眼睛(海南、广西),眼镜豆(福建、海南、云南),榼子藤(海南、广西、云南),扁龙(福建、广东),过岗扁龙、扭骨风(广东、广西);内蒙古:木腰子;福建:光饼豆(福州);台湾:鸭腿藤;广东:扭龙(广州),左右扭(湛江),背龙,猪腰子;海南:牛肠麻;广西:过山龙(藤县、龙州、车兰),〔大血藤〕(桂平),镰刀风(金秀瑶族),南蛇风、左右扭藤(忻城),老鸦肾,钩龙藤,过山枫;云南:“麻把”(西双版纳傣名),“不裂把”(思茅傣语),扁藤、老鸦枕头、大歪柄(红河),大扁藤、过江藤(文山),腊盒子,饭盒豆;西藏:“千巴消夏”(藏名)。

功效 藤茎(过岗龙):有毒。祛风除湿,活血通络。用于风湿性关节炎,跌打损伤,四肢麻木;种仁(榼藤子):有毒。利湿消肿。用于黄疸,脚气,水肿。

#### 7148294

*Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Griseb.

植物名 象耳豆《中国植志》

文献名 红皮象耳豆《中国树木志》

功效 树胶:用于支气管炎。

#### 7148295

*Eriosema chinense* Vogel

植物名 猪仔笠《高植图鉴》

药材名 猪仔笠《生草药性备要》、《汇编》

文献名 山葛《生草药性备要》,大力牛《岭南采药录》,鸡头薯、雀脑珠、岗菊《广州植志》

地方名 毛瓣花(福建、湖南);福建:肺草(莆田);湖南:五毒子;广东:山布袋、山猫卵、地龙珠、独角麒麟(潮阳),狗薯(陆丰),猪子粒(广州),牛牲药(潮安),山甘葛(花县),〔山橘子〕(高要),野麻甲(河源),胆茹(高州),猪肝吊胆(湛江),鸡心树、血吉(电白),猫春树(罗定),山番葛,地梧桐,金莲菊,金菊头;海南:坡参(海口),草仔薯(儋县),铁金牛草(临高),坡金、坡并草(澄迈),铁钟草,岗谷,岗葛,金叶菊,山老鼠,石炭菇;广西:鸡心薯(南宁),野凉薯(贺县),猴子薯(忻城),红鸡头(宁明),鸡头子,鸡心头,〔凉薯〕,山良薯,〔山豆根〕,铜拳头;云南:〔地草果〕,草果内消、〔大猪屎豆〕(文山),“区奔精”(楚雄彝名),〔一柱香〕。

功效 全草、块根:清热解毒,生津止渴,健胃消食,消肿止痛,止咳化痰。用于上呼吸道感染,发热烦渴,肺脓疡,痢疾。外用于跌打损伤。

#### 7148296

*Eriosema himalaicum* Ohashi --- *Eriosema chinense* Vogel var. *tuberosum* (Buch.-Ham.) C. Y. Wu

植物名 绵三七《高植图鉴》

药材名 绵三七《汇编》

文献名 草仔薯《中药大辞典》,球块茎毛瓣花《云南种录》,球根毛瓣花《云南中草药选》

地方名 四川:独苗一支立;云南:鸡心矮陀陀(昆明),山鸡头(保山),山草果、山土瓜、草果暗消、地草果(红河),排红草,化食,鸡嗦。

功效 全草、块根:健胃消积,理气止痛。用于小儿疳积,消化不良,胃腹疼痛,腹泻。外用于跌打损伤。

#### 7148297

*Erythrina arborescens* Roxb. --- *E. tienensis* Wang et Tang

植物名 乔木刺桐《高植图鉴》

药材名 海桐皮《云南药录》

文献名 红嘴绿鹦哥、刺果鹦哥花《豆科图说》,刺桐《西昌中草药》,刺木通《高植图鉴》

地方名 四川:鹦哥树;贵州:鹦哥叶;云南:泡龙刺桐(红河),鹦哥花,海桐,刺通,龙尾。

功效 根、叶、果实:清热驱风,健脾利湿。用于头胀痛,痢疾。

#### 7148298

*Erythrina corallodendron* L.

植物名 龙牙花《高植图鉴》

药材名 龙牙花(四川《南充本草》)

文献名 珊瑚木《种分》,珊瑚树《豆科图说》

地方名 象牙红(广东、广西);台湾:珊瑚刺桐;其他:冬叶树。

功效 树皮:麻醉,镇静;全草:有毒。祛风镇静,化湿杀虫;皮、花:用于风湿腰膝疼痛,皮肤湿疹,杀蛆。

#### 7148299

*Erythrina variegata* L. var. *orientalis* (L.) Merr. --- *E. indica* Lam. --- *Erythrina orientalis* (L.) Murr.

植物名 刺桐《南方草木状》、《中国树木志》

药材名 海桐皮《开宝本草》、《汇编》

文献名 刺桐花《图经》,海桐《纲目》,鹦哥花《天中记》,梯沽、梯枯、古枪、大有树、冬叶树《植物名汇》,鼓桐皮、厂皮《药材资料汇编》

地方名 广东象牙红、鸡桐木(广东、广西);台湾:山芙蓉,旋仔药;广东:海柳皮;海南:鸡公树;广西:有勒青桐(博白),黄肿木(北流),青桐木(宁明),刺松树、钉桐皮(北海),空桐树,刺青桐木;贵州:刺通,接骨药;其他:海红豆。

功效 树皮或根皮:祛风湿,舒筋活络,用于风湿麻木,腰腿筋骨疼痛,跌打损伤。外用于各种顽癣;叶:用于小儿疳积,蛔虫症;花:用于金疮,止血;果实:用于解热,胆汁病。

备考 印度以此树皮作退热药用。

#### 7148300

*Erythrophloeum fordii* Oliv.

植物名 格木《中国植志》

药材名 格木《广西药园药录》

文献名 孤坟柴、斗登风、大疔瘡、乌鸡骨、鸡眉、赤叶木《树分》,赤叶柴《中国植志》

地方名 台湾:拾穗豆;广东:围涎树。

功效 种子、树皮:有毒。含强心甙。

#### 7148301

*Euchresta formosana* (Hayata) Ohwi --- *Euchresta horsfieldii* Benn. var. *formosana* Hayata

植物名 台湾山豆根《中国树木志》

药材名 台湾山豆根《台湾药植志》

功效 茎、叶:用于喉痛;根:用于毒蛇咬伤。

#### 7148302

*Euchresta horsfieldii* (Lesch.) Benn. --- *E. strigillosa* C. Y. Wu

植物名 伏毛山豆根《云南种录》

文献名 〔苦参〕《云南药录》

功效 根:清热解毒,止痛。用于肠炎,腹泻,腹胀,胃痛,咽喉痛。

#### 7148303

*Euchresta japonica* Benth.

植物名 日本山豆根(拟)

文献名 山豆根《中国植物图鉴》,黄结、金锁匙《新纲》

地方名 四川:野黄豆。

功效 根:泻心火,保肺气,去肺和大肠之风热,消肿,止痛。用于喉痹,喉风,龈肿,齿痛,喘满,热咳,腹

痛,下痢,五痔,诸疮,解诸药毒,虫蛇咬伤。

#### 7148304

*Euchresta trifoliolata* Merr.

植物名 三小叶山豆根《高植图鉴》

药材名 三小叶山豆根《湖南药物志》

功效 全株:有小毒。清热镇痛。用于胃腹热痛,疮疖肿毒,喉痛,牙痛。

#### 7148305

*Euchresta tubulosa* Dunn

植物名 管萼山豆根《中国树木志》

药材名 鄂豆根《汇编》

文献名 山豆根《湖北植志》

地方名 湖北:豆根,黄结;湖南:鸦片七;四川:胡豆蓬。

功效 根、全株:清火去热,利咽喉;根:用于腹痛,腹胀;全株:用于喉症,牙痛。

#### 7148306

*Flemingia ferruginea* Grah. ex Wall. --- *Moghania ferruginea* (Wall. ex Benth.) Li

植物名 锈毛千斤拔《海南植志》

药材名 锈毛千斤拔《广西药录》

文献名 锈毛千金拔《云南种录》

地方名 海南:铁龙穿石(琼中),黄胆树(万宁),假黑豆(儋县)。

功效 根:用于黄疸病,壮筋骨。

#### 7148307

*Flemingia fluminalis* Clarke ex Prain --- *Moghania fluminalis* (Clarke) Li

植物名 水边千斤拔《中国树木志》

药材名 岩豆《四川本草》

文献名 河边千斤拔《云南种录》

功效 根、茎和叶:祛风湿,行血止痛。用于风湿性关节炎,慢性阑尾炎,白带。

#### 7148308

*Flemingia lineata* (L.) Roxb. ex Ait. --- *Moghania lineata* (L.) O. Ktze. --- *Hedysarum lineata* L. --- *Lespedeza lineata* (L.) Pers.

植物名 细叶千斤拔《云南种录》

药材名 细叶千斤拔《台湾药植志》

地方名 台湾:一条根(彰化),老鼠尾,透地龙,〔牛大力〕,千里马。

功效 根:祛风,解热,除湿。用于产后伤风,肝病,肾病,筋骨痛,骨折,风湿病,关节炎,坐骨神经痛,久年风伤。

#### 7148309

*Flemingia macrophylla* (Willd.) Merr. --- *Moghania macrophylla* (Willd.) O. Ktze

植物名 大叶千斤拔《高植图鉴》

药材名 大叶千斤拔《广西药录》

文献名 大叶千金拔《台湾药植志》,千斤拔《海南植志》

地方名 千斤红(广东、云南),〔山豆根〕、老鼠尾(广

东、广西), 豆叶千斤拔(安徽、广东), 一条根(台湾、广东); 安徽: 钉甲草、野棉芪(太和), 直立千斤拔; 台湾: 红药头、红豆草、白马屎、臭空仔; 广东: 红药根(从化), 三脚马(阳春), 牛板头(潮阳), 千斤秤(潮安), 铁牛钻石壁(五华), 三胎叶(阳江), 入地红, 皱面树; 海南: 假乌豆草(儋县), 牛得巡、千里镜(澄迈), 假乌头草, 皱面叶; 广西: 千斤力(罗城), 大猪尾(容县), 土干葛(博白), 串心黄、桃牛特(苍梧), 钻地风, 追地风, 地风, 棺材丁, 大力黄, 狗马桩; 四川: 山豆(会理); 贵州: 大根不倒, 大叶千金拔根; 云南: 夹眼睛果、千斤杖(红河), “嘎三比拢”(西双版纳傣语), 千金红, 夹眼皮果。

**功效** 根: 舒筋活络, 祛风止痛, 散瘀消肿, 生津止渴。用于胃脘痛, 哮喘, 咽喉肿痛, 风湿骨痛。外用于跌打损伤, 骨折, 狂犬咬伤, 外伤出血, 疮疖。

#### 7148310

*Flemingia philippinensis* Merr. et Rolfe --- *F. prostrata* Roxb. --- *Moghania philippinensis* (Merr. et Rolfe) Li --- *M. prostrata* (Roxb.) Mukerjee

**植物名** 千斤拔(云南种录)

**药材名** 千斤拔(名实图考)、(汇编)

**文献名** 上黄鸡、金鸡落地、山豆(名实图考), 老鼠尾、透地龙、牛大力、千里马、牛鞭头(岭南采药录), 蔓性千斤拔(豆科图说), 矮千斤拔(西昌中草药)

**地方名** 单根守(广东、海南), [钻地风](福建、广西、四川), 穿地龙(福建、广西), [山豆根](江西、福建、广西), 吊马桩(江西、广西), 金牛尾(广东、云南), 一条根(江西、福建), [土黄芪](江西、湖南、广东、广西); 江西: 千斤蹬、健根(大余), 套牛蹬(寻邬), 钉脚根、井甲里(南部), 打地钻(赣州), 箭根(赣南), 钉根犁(吉水), 金钢钻(吉安), 千金吊, 钉根葵; 福建: 千斤称、通地椎(厦门), 竹结豆(永定), 打爆草(永春); 湖南: 吊马墩; 广东: 千斤木(龙川), 千斤吨(英德), 钉地根(五华、普宁、潮安、潮阳), 千斤草(乐昌), 牛石头(惠阳), 猪脚蹄(东莞), 上北芪(新会), 狗马吨、狗马特、狗牛特(粤北), 牛鞭祇树、独脚虎、铁顿摇船(兴宁), 铁牛钻石壁(五华), 千斤夏, 牛夏头, 牛夏树, 大力牛, 独脚龙, 毒蛇不出头, 单守根, 铁夏摇, 狗牛夏; 海南: 千斤葵(乐东、琼中、儋县), 千里镜(澄迈、琼海); 广西: 牛尾蕨(南宁), 割鸡蕨(横县), 口条子(隆林), 千斤立(钟山、富川), 狗马庄、拉马庄(百色), 马石头, 狗马桩; 四川: 地风、野花生(成都); 云南: 三股丝、千金墮(文山), 千斤坠。

**功效** 根: 祛风湿, 强腰膝。用于风湿性关节炎, 腰腿痛, 腰肌劳损, 白带, 跌打损伤; 全草: 清热解毒。用于痢疾。外用于跌打损伤。

#### 7148311

*Flemingia strobilifera* (L.) Ait. --- *F. bracteata* (Roxb.) Wight --- *F. fruticulosa* Wall. --- *Moghania strobilifera* (L.) St.-Hilaire ex O. Ktze. --- *M. bracteata* (Roxb.) Li --- *M. fruticulosa* (Wall. ex Benth.) Mukerjee

**植物名** 球穗千斤拔(云南种录)

**文献名** 球穗花千斤拔(高植图鉴), 大苞叶千斤拔、半灌木千斤拔(中药大辞典), 蚌壳千斤拔(广西植录), 麒麟尾、山萝卜(汇编)

**地方名** 蚌壳草、咳嗽草(广西、云南); 台湾: 佛来明豆; 广西: 千斤拔(苍梧、桂平、宁明), 千斤力(忻城), 老鼠尾(平南), 鸡腊草(藤县), 百咳草, 吊马庄; 云南: 金歪斜(曲靖), 扯病药(保山), 耗子响铃, 贝壳草。

**功效** 根、全草: 止咳祛痰, 清热解毒, 祛风除湿, 补虚劳, 壮筋骨。用于咳嗽, 哮喘, 黄疸, 风湿痹痛, 疳积, 百日咳, 肺炎, 小儿高热惊厥, 精神病; 叶: 用于小儿驱虫及外伤。

#### 7148312

*Flemingia yunnanensis* Franch. --- *Moghania wallichii* (Wight et Arn.) O. Kuntze

**植物名** 滇千斤拔(云南种录)

**文献名** 毛叶千斤拔(豆科图说), 假山皮条(汇编)

**地方名** 云南: 千斤拔, 马尾叶, 豹子眼睛花。

**功效** 根: 调经活血, 舒筋活络, 强筋壮骨。用于痹伤久咳, 咽喉肿痛, 腰痛, 腰肌劳损, 风湿瘫痪, 坐骨神经痛, 月经不调, 宫寒不孕症。

#### 7148313

*Fordia cauliflora* Hemsl. --- *Millettia cauliflora* Gagn

**植物名** 干花豆(高植图鉴)

**药材名** 水罗伞(汇编)

**文献名** 虾须豆、福特木(广西中药志), 福特豆(广西药录)

**地方名** 广西: 老鼠藤(柳江), 土甘草(南宁), 玉郎伞(昭平、苍梧、凌云、乐业), 大郎伞, 水郎伞, 野京豆, 虾须草; 云南: 勒勒叶。

**功效** 根: 散瘀消肿, 润肺化痰。用于风湿骨痛, 跌打骨折, 瘀积疼痛, 肺结核咳嗽, 痢疮肿痛; 全草: 清热, 疏风, 除湿, 消肿。用于喉头肿痛, 伤风声哑, 月经过多, 水肿。

**备考** 本品在广西少数地区民间代甘草用, 称“土甘草”。

#### 7148314

*Galactia ellipticifolia* Merr.

**植物名** 乳豆(高植图鉴)

**药材名** 乳豆(广西药录)

**文献名** 毛豆、老鼠藤(高植图鉴), 椭圆乳豆(云南种录)

**地方名** 广西: 毛鸡药、三娘教子(南宁)。

**功效** 全草: 接骨。用于跌打损伤, 骨折。

#### 7148315

*Gleditsia australis* Hemsl. --- *Gleditsia microcarpa* Metc.

**植物名** 小果皂荚(中国植志)

**药材名** 小果皂荚(广西药录)

**地方名** 甘肃: 山皂角(武都); 广西: 角刺(北流)。

**功效** 果实: 驱蛔虫; 刺: 去毒通关。用于痈疽。

7148316 见 7148318a

#### 7148317

*Gleditsia fera* (Lour.) Merr. --- *G. formosana* Hayata

植物名 华南皂荚《中国植志》

药材名 华南皂荚《广西药录》

文献名 华南皂角荚《广西药录》

地方名 广西:皂角(武鸣)、小叶皂角,小叶皂荚,天丁,牙皂。

功效 果实:有小毒。杀虫,开窍,祛痰。用于中风昏迷,口噤不语,痰涎壅塞。

#### 7148318

*Gleditsia japonica* Miq. --- *G. horrida* (Thunb.) Makino  
--- *G. melanacantha* Tang et Wang

植物名 山皂荚(山东、江苏、安徽、江西)、《中国植志》

药材名 山皂角《汇编》

文献名 皂荚《盛京通志》,扁皮皂荚《树分》,乌犀、悬刀《中国树木志》,皂荚树、皂角树、悬刀树、荚果树、乌犀树、鸡栖子、日本皂荚《豆科图说》

地方名 皂角(辽宁、江苏);辽宁:皂力板子;吉林:山皂刺;山东:皂荚板,皂角刺,小皂荚(青岛);江苏:荚角刺,大角角牙(连云港);安徽:紫皂荚;广西:鹿角筋(陆川);其他:皂角针,瘦皂。

功效 荚果(皂角):有小毒。祛痰开窍。用于中风或癫痫,痰涎涌盛者,痰多咳喘;皂角刺:活血祛瘀,消肿溃脓,下乳。用于淋巴结结核,乳腺炎,恶疮,脓肿不溃。

#### 7148318a

*Gleditsia japonica* Miq. var. *delavayi* (Franch.) L. C. Li  
--- *G. delavayi* Franch.

植物名 滇皂荚《中国植志》

药材名 滇皂角《名实图考》

文献名 皂角树、滇南皂角树《名实图考》,云南皂荚《豆科图说》

地方名 云南:天丁,皂角,猪牙皂,皂角米。

功效 刺:杀虫。外用子疔疮肿毒,恶疮,妇人乳肿;种仁:健胃,祛痰。

#### 7148319

*Gleditsia sinensis* Lam. --- *G. officinalis* Hemsl.

植物名 皂荚《本经》、《中国植志》

药材名 皂角刺《本草衍义补遗》、《药典》,猪牙皂[不育果实]《别录》、《药典》,大皂角[果实]《纲目》、《汇编》

文献名 皂角《肘后方》,皂荚子《雷公炮炙论》,猪牙皂角《海上集验方》,大皂荚、皂角子《千金方》,猪牙皂荚《唐本草》,皂荚刺《圣惠方》,皂子、皂儿《博济方》,皂刺、长皂荚《图经》,悬刀《外丹本草》,长皂角《仁斋直指方》,皂角核《妇人良方》,木乳《普济方》,马鱼儿菜《救荒本草》,乌犀、皂荚叶、皂荚根皮、天丁《纲目》,小皂《本经逢原》,皂角荚《新纲》,皂针《中药材手册》,眉皂《中药志》,药用皂角刺、鸡栖子《豆科图说》,黑煞神《陕甘宁植志》,皂荚树、皂丁《汇编》

地方名 会牙皂、东牙皂(东北),皂角树(江苏、华中、四川),皂脚针(河北、江苏),扁皂角(山西、河南),山皂角(山西、湖南);陕西:小皂荚;山东:小皂角(邹

县),皂角板刺(烟台),皂荚板(莱阳、海阳);江苏:角针(南通),角刺片(泰州),皂角针片(无锡),刺片(镇江),台树(高淳),山皂荚、荚角刺(连云港),肥皂树;上海:大皂;浙江:牙皂树;安徽:刺皂,钩刺;河南:平皂角;湖南:刀皂,人见愁,穿心刺;广东:栖子;广西:角刺(博白、平南、北流),小牙皂(阳朔),肉皂角;四川:天疗(成都),眉毛皂,肥牙皂,皂角树根,艾子,木党子,皂荚藤,胰皂;贵州:鬼刀。

功效 棘刺(皂角刺):消肿托毒,排脓,杀虫。用于痈疽初起或脓成不溃。外用于疥癣麻风;不育果实(猪牙皂):有小毒。祛痰开窍,散结消肿。用于中风口噤,昏迷不醒,癫痫痰盛,关窍不通,喉痹痰阻,顽痰喘咳,咯痰不爽,大便燥结。外用于痈肿;成熟果实(大皂角):有小毒。开窍,祛痰,通便。用于卒然昏迷,口噤不开,喉中痰壅,支气管哮喘,便秘,颈淋巴结结核;根:通利关窍,除风解毒。用于风湿骨痛,痺子,疮毒,无名肿毒;根皮:用于风热痰气,杀虫;叶:外用于洗风疮;种子(皂夹子):润燥通便,祛风消肿。用于大便燥结,肠风下血,下痢里急后重,疝气,瘰癧,肿毒,疮癣。

#### 7148320

*Gleditsia triacanthos* L.

植物名 美国皂荚《中国植志》

药材名 三刺皂荚《中草药学》

文献名 新疆皂荚《汇编》

功效 果实:有小毒;开窍,祛痰,通便;刺:消肿托毒,排脓,杀虫。

#### 7148321

*Glycine max* (L.) Merr. --- *Phaseolus max* L.

植物名 大豆《高植图鉴》

药材名 大豆黄卷《本经》、《汇编》,黑豆衣《汇编》,淡豆豉《本草汇言》、《中药大辞典》

文献名 菽《诗经》,大菽《管子》,戎菽、荏菽《尔雅》,生大豆《本经》,香豉《伤寒论》,大豆卷《本草经集注》,乌豆《肘后方》,大豆蘗、黄卷《崔禹锡《食经》》,大豆黄《千金方》,豆黄、卷蘗《食疗本草》,稽豆衣《本草拾遗》,黑豆《日华子本草》,黄卷皮、豆腐、黑大豆《图经》,毛豆《滇南本草》,豆腐泔《慈航活人书》,黄大豆《宁原《食鉴本草》》,豆油、黑大豆衣、黑大豆叶、黑大豆花、黑大豆皮、豆腐皮、豆腐、淡豉《纲目》,豆黄卷《长沙药解》,菽蘗《本经疏证》,豆浆《秘方集验》,豆腐衣《刘羽仪经验方》,豆腐泔水、雪花菜《随息居饮食谱》,豆腐浆、豆腐渣《纲目拾遗》,豆豉《新纲》,青皮豆《诗草木今释》,算食豆《中国药植图鉴》,稽豆《汇编》,大豆豉《中草药学》,香豆豉、清豆豉、豉汁《常用中药名辨》

地方名 黄豆(东北、山东、江苏、浙江、湖北、湖南、广东、广西、四川),白豆(甘肃、台湾、广东、广西),白黑豆(陕西、甘肃、宁夏),豆子(东北),秣食豆(广东、广西);内蒙古:“希日·宝日其格”(蒙名);江苏:鲁豆衣、黑小豆、黑豆花(镇江);福建:绿心豆;四川:豆卷(西昌),冬豆子;其他:黑料豆,杜豆土。

功效 经发芽晒乾之种子(大豆黄卷):清热,除湿,解表。用于暑湿发热,麻疹不透,胸闷不舒,骨节疼



痛,水肿胀满;种子发酵加工品(淡豆豉):解表,除烦。用于感冒发热,头痛,虚烦,失眠;种皮(黑豆衣):养血祛风。用于阴虚盗汗,虚热,烦躁,头晕目昏,血寒,风痹;稽豆:健脾益胃,养阴除烦。用于阴虚烦热,自汗盗汗,风湿痹症;黑皮种子(黑大豆):活血,利水,祛风,解毒。用于水肿胀满,风毒脚气,黄疸浮肿,风痹筋挛,产后风痉,口噤,痈肿疮毒,解药毒;黄皮种子(黄大豆):健脾宽中,润燥消水。用于疳积泻痢,腹胀羸瘦,妊娠中毒,痈疮肿毒,外伤出血;脂肪油(豆油):驱虫,润肠;豆浆:补虚润燥,清肺化痰。用于虚劳咳嗽,痰水哮喘,便秘,淋浊;豆腐:益气和胃,生津润燥,清热解毒。用于赤眼,消渴,休息痢,解硫黄、烧酒毒;豆腐泔水:通便,下痰,通癰闭;豆腐渣:用于疮疡肿毒,大便下血;黑皮种子蒸菹加工品(豆黄):益气,润肤;叶:用于血淋,蛇咬伤;花:用于目盲翳膜;根:利湿消肿。用于水肿。

## 7148322

*Glycine soja* Sieb. et Zucc. --- *G. ussuriensis* Reg. et Maack

植物名 野大豆(高植图鉴)

药材名 野料豆(饮片新参)、《中药大辞典》

文献名 豇豆《救荒本草》,零乌豆、马料豆《本草汇言》,稽豆、料豆、细黑豆《本经逢原》,马豆《本草经解》,野毛豆《百草镜》,鹿藿、饿马黄、野绿豆、豇豆《名实图考》,野黑豆《陕甘宁植志》,黑大豆、蔓豆、白豆、山黄豆、毛豆、饭豆《豆科图说》

地方名 野黄豆(江苏、湖北、湖南),野豇豆(江苏、上海),野大豆藤(浙江、湖北、湖南);辽宁:小落豆秧(沈阳、开原、铁岭、西丰);内蒙古:“哲日勒格-希日-宝日其格”(蒙名);山东:河豆子(昌乐),山黑豆(孤岛、沾化);江苏:柴豆(镇江);上海:野利豆;其他:大青豆,小青豆,白毛豆,羊眼豆,花豆花,青皮豆,香珠豆,紫皮豆,野毛扁豆。

功效 种子:益肾,止汗。用于头晕,目昏,风痹汗多;茎、叶、根:健脾。用于盗汗,伤筋。

## 7148323

*Glycine soja* Sieb. et Zucc. f. *lanceolata* (Skr.) P. Y. Fu et Y. A. Chen --- *G. soja* Sieb. et Zucc. var. *lanceolata* Skr. --- *G. ussuriensis* Regel et Maack var. *angusta* Kom.

植物名 狭叶野大豆《东北草本植志》、《东北药用植物》

药材名 野大豆(拟)

功效 种子:补益肝肾,祛风解毒,利尿,止汗。用于头晕,阴亏目昏,肾虚腰痛,盗汗,风痹汗多,筋骨疼痛,产后风痉,小儿疳积;茎、叶及根(野大豆藤):平肝,健脾,强壮,敛汗。用于盗汗,痘毒,小儿疳积,黄疸,肝火,目疾。外用于伤筋。

## 7148324

*Glycyrrhiza aspera* Pall.

植物名 粗毛甘草《沙漠药植》

药材名 粗毛甘草《中药志》

文献名 糙毛甘草《品种论述》,念珠甘草《沙漠植

志》

地方名 新疆:甘草。

功效 根及根茎:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。

## 7148325

*Glycyrrhiza eurycarpa* P. C. Li --- *Glycyrrhiza korshiskyi* auct. non G. Hrig. --- *Glycyrrhiza kansuensis* Chang et Peng

植物名 黄甘草《西北植物研究》

药材名 甘草(甘肃)

文献名 腺萼甘草《沙漠植志》,长序甘草《沙漠药植》

地方名 甘肃:西甘草。

功效 根、根茎:补脾益气,清热解毒,止咳润肺,调和诸药;叶:止血。

备考 有些文献学名 *Glycyrrhiza korshiskyi* G. Hrig. 系误订。

## 7148326

*Glycyrrhiza glabra* L.

植物名 光果甘草《药典》

药材名 甘草《药典》

文献名 粉草、西班牙甘草《豆科图说》,光甘草《沙漠药植》,洋甘草、欧甘草《药材学》

地方名 青海:甜草根;新疆:生甘草;其他:大甘草(香港)。

功效 根、根茎:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性与烈性;炙甘草:补脾,益气,复脉。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代。

## 7148327

*Glycyrrhiza inflata* Bat.

植物名 胀果甘草《药典》

药材名 甘草《药典》

功效 根、根茎:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性与烈性;炙甘草:补脾,益气,复脉。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代。

## 7148328

*Glycyrrhiza pallidiflora* Maxim.

植物名 刺果甘草《高植图鉴》

药材名 刺果甘草《汇编》

文献名 头序甘草《东北草本植志》,东北土甘草《品种论述》,胡苍耳《高植图鉴》

地方名 [黄芪](吉林、辽宁);辽宁:山大料,狗甘草,土甘草;山东:臭棵棵子(淄博),野大棵(孤岛、沾化);江苏:马狼粘(如东),马狼柴(连云港),马狼杆子(启东、射阳、南通),油蒿子(启东),湖金强子(睢宁),湖金绳子,马兰杆子,唤娘拳头;河南:奶桂;四川:打油罐。

功效 果序、果实:催乳。用于乳汁缺少;根:杀

虫。用于阴道滴虫病。

#### 7148329

*Glycyrrhiza squamulosa* Franch.

植物名 圆果甘草《高植图鉴》

药材名 圆果甘草《中草药学》

文献名 马兰科《高植图鉴》

功效 根、根茎：补脾益气，清热解毒，止咳润肺，调和诸药；叶：止血。

#### 7148330

*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.

植物名 甘草《高植图鉴》

药材名 甘草《本经》、《药典》

文献名 蜜甘、美草、蜜草、蕤《别录》，国老《本草经集注》，灵通《记事珠》，甘草梢《珍珠囊》，粉草《群芳谱》，甘草头《纲目》，甘头节《本草原始》，粉草节《外科精要》，东北甘草（徐《生药》），内蒙古草、梁外草、王爷地草、西镇草、上河川草、下河川草、西北草、东北草、小白草〔商品名〕《药材学》，条草、毛草《中药通报》

地方名 甜甘草（东北、内蒙古、甘肃、山东、安徽），甜草（东北、山西、内蒙古、甘肃、青海），甜根子（东北、陕西），甜草根（东北、河北、青海、安徽），红甘草（甘肃、安徽），乌拉尔甘草（山西、内蒙古、青海），甜根（山东、云南），甜草苗（东北、河北、内蒙古），西草（内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆），东草（东北、河北、山西）；黑龙江：棒草〔主根〕；内蒙古：“西黑日-乌布斯”、“希禾日-额布斯”、“奇希尔-乌布斯”、“奇希里英-翁季斯”、“兴嘎拉”（蒙名）；甘肃：疙疙草；青海：“象额尔”（藏名）；新疆：“切其克布亚”（维名）；山东：野槐树棵（无棣、沾化、利津）；四川：“汉安”（藏名）；云南：“沙英”（西双版纳傣语）；其他：粉甘草，哈达草，皮草，红粉，白粉，关草，抽草。

功效 根、根茎：补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性；炙甘草：补脾，益气，复脉。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代；根或根茎内充填有棕黑色树脂状物（甘草节）；用于痈疽疮毒，咽喉肿痛；芦头（甘草头）：行瘀血，消肿毒；根梢或细根（甘草梢）：清火，解毒。用于阴茎中疼痛及淋浊；叶：用于外伤出血。

#### 7148331

*Glycyrrhiza yunnanensis* Cheng f. et L. K. Tai

植物名 云南土甘草《玉龙山药植》

药材名 云南土甘草《品种论述》

文献名 云南甘草《中药志》

地方名 云南：土甘草，刺球。

功效 根：解热消炎。用于疮疖肿痛。

备考 《品种论述》称：本品成分与甘肃产甘草成分不同，不但没有甜味而且苦涩，具刺激性，不能充当甘草入药。

#### 7148332

*Gueldenstaedtia brachyptera* Pamp. var. *elongata* (Pamb.) Per. et Schieh.

植物名 短翼米口袋《鉴别手册》

地方名 河南：甜地丁。

功效 带根全草：清热解毒。用于疔疮痈肿，急性阑尾炎，化脓性炎症。

#### 7148333

*Gueldenstaedtia coelestis* (Diels) Simpson --- *Amblytropis coelestis* (Diels) C. Y. Wu et H. P. Tsui

植物名 蓝花米口袋《云南种录》

药材名 蓝花米口袋《滇南本草》整理本

文献名 野花生《云南药录》

地方名 云南：紫花地丁，金苞根，地米菜。

功效 根：清热解毒。用于阑尾炎，胃痛，红、白痢疾。外用于疮疖肿痛。

#### 7148334

*Gueldenstaedtia henryi* Ulbr. --- *Amblytropis henryi* (Ulbr.) C. Y. Wu

植物名 川鄂米口袋《湖北植志》

药材名 川鄂米口袋《云南中草药》

地方名 湖北：紫花地丁〔荆门〕；云南：月叶发。

功效 根：接筋接骨。用于骨折。

#### 7148335

*Gueldenstaedtia himalaica* Baker --- *Amblytropis uniflora* (Strachey) Kung et H. P. Tsui --- *A. diversifolia* (Maxim.) C. Y. Wu --- *Gueldenstaedtia diversifolia* Maxim.

植物名 高山米口袋《西藏植志》

药材名 喜马拉雅米口袋《西藏中草药》

文献名 单花米口袋《豆科图说》，异叶米口袋《高植图鉴》

地方名 青海：“塞木”（藏名），地丁；云南：甜地丁（丽江）；西藏：“杰巴区土”（藏名）。

功效 带根全草：解毒消肿，利尿。用于水肿，痈肿，疔毒，淋巴结结核。

#### 7148336

*Gueldenstaedtia maritima* (Maxim.) Kitag. --- *Amblytropis maritima* (Maxim.) Kitag.

植物名 光滑米口袋《豆科图说》

药材名 光滑米口袋《鉴别手册》

文献名 海滨米口袋《东北草本志》

地方名 山东：甜地丁。

功效 带根全草：清热解毒。用于疔疮痈肿，急性阑尾炎，一切化脓性炎症。

#### 7148337

*Gueldenstaedtia multiflora* Bunge --- *Amblytropis multiflora* (Bunge) Kitag.

植物名 米口袋《高植图鉴》

药材名 甜地丁《汇编》

文献名 米布袋《救荒本草》，地丁《纲目》，紫花地丁《本草原始》，老米口袋、黄米口袋《满洲植录》，毛紫云英《中国植物图鉴》，多花米口袋、独行虎、羊角子、大米口袋《豆科图说》，疔毒草《鉴别手册》，小丁花、米口袋地丁《中药大辞典》

地方名 蛤蟆草(东北), 痒痒草(辽宁、山东), 萝卜地丁(江苏、河南); 吉林: 小丁黄, “哎歌-杂问”、“米恩得烈”(朝名); 辽宁: 地雷(黑山), 大根地丁(建昌、凌源); 内蒙古: “地各大”、“泡草-乌布斯”、“莎勒吉日”、“消布音-他不格”(蒙名); 陕西: 地槐(眉县), 破血丹(商南), 女儿草, 草桔梗; 山东: 老鼠枕头根(烟台), 紫地丁, 老鼠尾根, 槐连, 槐连当; 江苏: 地丁草(徐州、泰州), 地丁花, 猫耳朵草; 河南: 小豆棵, 棒锤草。

功效 带根全草: 清热解毒, 消肿止痛。用于疮痈肿, 急性阑尾炎, 一切化脓性炎症。

#### 7148338

*Gueldenstaedtia pauciflora* (Pall.) Fisch. --- *Amblytropis pauciflora* (Pall.) Kitag.

植物名 少花米口袋《汇编》

药材名 地丁《中药大辞典》

文献名 地丁《纲目》, 小米口袋《沙漠药植》, 甜地丁、米布袋、疗毒草《鉴别手册》, 米口袋地丁、萝卜地丁《中药大辞典》

地方名 甘肃: 紫花地丁。

功效 带根全草: 清热解毒, 消肿止痛。用于疮痈肿, 急性阑尾炎, 一切化脓性炎症。

#### 7148339

*Gueldenstaedtia stenophylla* Bunge --- *Amblytropis stenophylla* (Bunge) Kitag.

植物名 狭叶米口袋《高植图鉴》

药材名 狭叶甜地丁(拟)

文献名 细叶米口袋《东北草木志》

地方名 甜地丁(山东、河南); 内蒙古: “纳日音-莎勒吉日”(蒙名), 地丁。

功效 全草: 清热解毒, 消肿止痛。

#### 7148340

*Gueldenstaedtia verna* (Georgi) A. Boriss. --- *G. multiflora* Bunge var. *longispica* Franch. --- *G. delavayi* Franch. --- *Amblytropis delavayi* (Franch.) C. Y. Wu

植物名 洱源米口袋《云南种录》

药材名 康滇米口袋《西昌中草药》

文献名 米口袋《中药志》

地方名 四川: 紫花地丁(会理), 皮寒药。

功效 全草: 清热解毒, 消痈肿。用于化脓性炎症, 疖疽疮, 高热烦躁, 黄疸, 肠炎, 痢疾, 瘰癧。

#### 7148341

*Gueldenstaedtia yunnanensis* Franch. --- *Amblytropis yunnanensis* (Franch.) C. Y. Wu ex H. P. Tsui --- *Astragalus esquirolii* Levl.

植物名 云南米口袋《高植图鉴》

文献名 滇兔丝子《名实图考》, 米口袋《云南中草药》

地方名 云南: [棉芪]、断血草(丽江)。

功效 根: 强筋壮骨, 活血止血。用于体虚, 脱肛, 肋痛, 痢疾, 鼻衄, 代偿性月经, 刀伤, 骨折。

备考 《植物名实图考》蔓草卷之二十三“滇兔丝子”确为本种而非旋花科菟丝子属(*Cuscuta*)植物。

#### 7148342

*Gymnocladus chinensis* Baill.

植物名 肥皂荚《中国植志》

药材名 肥皂荚《纲目》、《汇编》

文献名 肥皂核《纲目》, 肥皂子、皂荚子、皂角子、肥皂树子《药材学》

地方名 肥皂豆(华中), 肥皂树(浙江、湖南); 河北: 皂子(张家口); 浙江: 肉皂(临安); 湖北: 肉皂角; 湖南: 肉皂荚, 肥猪子, 油皂; 四川: 油皂角(峨眉山)。

功效 果实、种子、树皮及根: 祛风除湿, 活血消肿。用于风湿疼痛, 跌打损伤, 疮痈肿毒, 止咳祛痰。

#### 7148343

*Haematoxylon caesapina* L.

植物名 洋苏木(叶《生药》)

文献名 [苏木]《中草药》

功效 木材: 收敛。用作染料。

备考 云南景洪有引种。

#### 7148344

*Haematoxylon campechianum* L.

植物名 采木《中国植志》

药材名 墨水树《台湾药植志》

文献名 洋苏木《中国植物图鉴》, 洋苏木树《药名同合编》

功效 木材: 收敛。用于腹泻, 痢疾, 肺出血, 子宫出血, 肠出血及小儿腹泻。

#### 7148345

*Hedysarum alpinum* L.

植物名 山岩黄芪《高植图鉴》

文献名 [绵芪]《中药通报》

功效 根: 华北一带作“黄芪”的下品, 实难入药。

#### 7148346

*Hedysarum austrosibiricum* B. Fedtsch.

植物名 紫花岩黄芪《汇编》

地方名 新疆: 红芪; 其他: 新疆红芪。

功效 根: 新疆作红芪入药。

#### 7148347

*Hedysarum citrinum* E. Baker

植物名 黄花岩黄芪《迪庆藏药》

药材名 蒺三嘎波《迪庆藏药》

功效 根: 用于水肿, 水土不服。

#### 7148348

*Hedysarum lignosum* Trautv. --- *Hedysarum fruticosum* Pall. var. *lignosum* (Trautv.) Kitag.

植物名 木岩黄芪《中国树木志》

文献名 山竹子《华北经植志要》, 山竹岩黄芪(拉汉英种称)

地方名 河北: 黄芪(张家口)。

功效 根: 河北张家口等地曾作黄芪入药。

#### 7148349

*Hedysarum limitaneum* Hand. -Mazz.

植物名 滇岩黄芪《云南种录》

药材名 滇岩黄芪《云南药录》

地方名 云南:黄芪。

功效 根:固表止汗,益气补虚,排脓生肌。用于病后体弱。

#### 7148350

*Hedysarum multijugum* Maxim.

植物名 红花岩黄芪《高植图鉴》

药材名 红花岩黄芪《青海中草》

文献名 岩黄芪《中国树木志》

地方名 花柴、牛以消(陕西、甘肃);陕西:豆花牛膝筋(秦岭);甘肃:红黄芪;青海:[黄芪]。

功效 根:强心利尿。

#### 7148351

*Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz.

植物名 多序岩黄芪《高植图鉴》

药材名 红芪《药典》

文献名 黄芪《药典》,晋芪《中药志》,川芪《中药材科技》,岩黄芪、黑芪《汇编》

地方名 内蒙古:“乌兰-混其日”(蒙名);甘肃:独根(宕昌);四川:“纳洼善马”(藏名),小叶黄芪(川北)。

功效 根:补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,痈疮难溃,血虚萎黄,内热消渴,慢性肾炎蛋白尿,糖尿病;蜜红芪:益气补中。用于气虚乏力,食少便溏。

#### 7148352

*Hedysarum pseudoastragalus* Ulbr.

植物名 紫云英岩黄芪《豆科图说》

药材名 塞玛《迪庆藏药》

文献名 假岩黄芪《云南种录》

功效 花或全草:止痛,收敛,续脉。用于“木保”病疼痛,血痢,筋脉伤。

#### 7148353

*Hedysarum scoparium* Fisch. et Mey.

植物名 细枝岩黄芪《高植图鉴》

药材名 细枝岩黄芪《中药通报》

文献名 花帽子、花以稍《沙漠植志》

地方名 内蒙古:桦棒;陕西:花棒;甘肃:桦秧,牛尾梢,红芪(河西一带);宁夏:花柴,花帽。

功效 根:甘肃河西一带以此作红芪入药。

#### 7148354

*Hedysarum sikkimense* Benth. ex Baker --- *H. limprichtii* Ulbr. --- *H. tanguticum* Fedtsch. --- *H. sikkimense* Benth. var. *megalanthum* Ohashi et Tateishi

植物名 锡金岩黄芪《西藏植志》

药材名 雪山芪(云南)

文献名 川西岩黄芪《云南种录》,西康岩黄芪《中药志》,岩黄芪《青藏药图》

地方名 青海:“塞玛尔”(藏名);四川:“申马儿”(藏名),红绵芪(川北);西藏:红芪。

功效 全草:健胃,利尿。用于胃病及各种水肿。

#### 7148355

*Hedysarum sikkimense* (Benth.) Baker var. *rigidum*

Hand.-Mazz.

植物名 坚硬岩黄芪《云南种录》

地方名 云南:黄芪。

功效 根:固表止汗,益气补虚,排脓生肌。

#### 7148356

*Hedysarum smithianum* Hand.-Mazz.

植物名 山西岩黄芪《中药志》

地方名 山西:黑芪(山阴、朔县、应县、霍县)。

功效 根:补气固表,利尿托毒,敛疮生肌。

#### 7148357

*Hedysarum taibeicum* (Hand.-Mazz.) K. T. Fu --- *H. vicioides* Turcz. var. *taibeicum* (Hand.-Mazz.) Liu

植物名 太白岩黄芪《秦岭植志》

药材名 太白岩黄芪《汇编》

地方名 陕西:绵芪、红芪、太白黄芪(太白山)。

功效 根:固表止汗,益气补虚,排脓生肌。

#### 7148358

*Hedysarum thiochroum* Hand.-Mazz.

植物名 疏花岩黄芪《云南种录》

药材名 塞色《迪庆藏药》

功效 花:止血痢,愈合血管,止痛,清疮。用于“木保”病疼痛,血痢,创伤;全草(鲜汁):外用于敷疮。

#### 7148359

*Hedysarum tuberosum* Fedtsch.

植物名 块茎岩黄芪《西藏植志》

地方名 青海:“塞完”(藏名)。

功效 全草:退热,镇痛,催吐,利尿。外用于创伤。

#### 7148360

*Hedysarum ussuriense* I. Schischk. et Kom.

植物名 长白岩黄芪《长白山植志》

地方名 吉林:山岩黄芪(长白山)。

功效 根:强壮,解热,止汗。

#### 7148361

*Hedysarum vicioides* Turcz. --- *H. esculentum* Ledeb.

植物名 巢菜状岩黄芪《云南种录》

文献名 岩黄芪《新纲》,拟蚕豆岩黄芪《豆科图说》

地方名 内蒙古:红芪,“莎格拉嘎日-他日波勒吉”(蒙名);宁夏:黄芪。

功效 根:补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌。

#### 7148362

*Hymenaea courbarii* L.

植物名 李叶豆《中国植志》

药材名 巴西岩树脂《台湾药植志》

文献名 南美叉叶树、西印刺槐《台湾药植志》,巴西柯伯胶[树脂]《中国植志》

功效 树脂:杀虫。并可做油漆原料。

#### 7148363

*Indigofera amblyantha* Craib

植物名 多花木蓝《高植图鉴》

药材名 木蓝山豆根(拟)

文献名 多花槐蓝《中国树木志》

地方名 山豆根(陕西、甘肃、江苏、安徽、河南、湖北)、野蓝枝(江苏、湖北);陕西:野绿豆(丹凤);甘肃:马黄消、色儿条;湖北:野绿豆(汉阳);四川:早栗子(宝兴)、马黄消。

功效 根:清火、解毒、消肿、止痛。用于风、喉痹、牙龈肿痛、喘满热咳、黄疽、下痢、痔疾、热肿、秃疮、疥癣、蛇、虫、犬咬伤。

7148364

*Indigofera tinctoria* Buch. - Ham. ex Roxb.

植物名 深紫木蓝(云南种录)

药材名 深紫木蓝(广西药录)

文献名 线苞木蓝(西藏植志),深紫槐蓝(中国树木志)

地方名 广西:流产草(东兰)。

功效 根:用于人工流产;叶:用于蛇咬伤。

7148365

*Indigofera bungeana* Steud.

植物名 铁扫帚(高植图鉴)

药材名 铁扫帚(广西药录)

文献名 本氏槐蓝(广西药录),野木蓝(广西植志),本氏木蓝(豆科图说),野蓝枝子(云南种录)

地方名 山东:山扫帚(昆崙山、威海、荣成、海阳、莱阳、牙山),山花子(莒县、平邑、沂源、沂水、五莲),山槐(平邑),山胡枝子(莒县);湖北:[苦豆根], [山豆根];广西:山红蓝靛(融安);贵州:[金银花],水蓝乔,鸡骨柴,女儿红,野绿豆,一味药,铁扫竹。

功效 全草或根:生肌收口,止血消肿,清热利湿。用于创伤,肿毒,口疮,痔疮,吐血,水泻。

7148366

*Indigofera carlesii* Craib

植物名 苏木蓝(高植图鉴)

药材名 苏木蓝(汇编)

文献名 苏槐蓝(中国树木志)

地方名 山豆根(陕西、甘肃、江苏、安徽、河南、湖北、贵州);湖北:木蓝叉。

功效 根:清热解暑,补虚弱。用于咳嗽、自汗、外用于外伤出血。

7148367

*Indigofera caudata* Dunn

植物名 尾叶木蓝(广西植录)

药材名 尾叶木蓝(广西药录)

文献名 烟蒸果、知子藤(汇编)

地方名 云南:山豆根,野饭豆。

功效 根:祛风,消炎,止痛,截疟。

7148368

*Indigofera cooperi* Craib

植物名 宁波木蓝(高植图鉴)

药材名 宁波木蓝(浙江药植志)

文献名 宁波槐蓝(中国树木志)

地方名 浙江:地料梢。

功效 根和叶:清火,解毒,消肿,止痛。

7148369

*Indigofera decora* Lindl. --- *I. incarnata* (Willd.) Nakai

*I. tinctoria* L. var. *incarnata* (Willd.) Nakai

植物名 蓝草(豆科图说)

药材名 靛蓝(广西药录)

文献名 靛蓝(豆科图说)

地方名 广西:泡颈亮(金秀),杨桃叶罗伞;四川:青

酒缸,草鞋板(成都)。

功效 根或全草:理跌打,续筋骨,通经络,散瘀血,消肿止痛。用于跌打损伤,瘀血,风湿,骨节疼痛。

7148370

*Indigofera argentea* L. var.

植物名 黔滇木蓝(豆科图说)

药材名 黔滇木蓝(广西药录)

地方名 广西:白口莲(隆林)。

功效 枝、叶:用于肠道寄生虫病所致腹痛,腹胀。

7148371

*Indigofera fortunei* Craib

植物名 华东木蓝(高植图鉴)

药材名 华东木蓝(汇编)

文献名 和琼木蓝(江苏植药志),江苏山豆根(广西中药志),华东槐蓝(中国树木志)

地方名 山豆根、土豆根(山西、陕西、甘肃、江苏、浙江、安徽、河南、湖北);江苏:杜豆根(南通),野蚕豆(六合),小叶绿豆茶。

功效 根和叶:清热解暑,消肿止痛。用于流行性乙型脑炎,咽喉肿痛,肺炎,蛇咬伤。

7148372

*Indigofera hancockii* Craib

植物名 草山木蓝(云南种录)

药材名 苍蝇草(云南药录)

文献名 韩氏木蓝(中药大辞典)

地方名 云南:[马鞭草]。

功效 根:祛风,消炎,止痛。用于牙龈炎,跌打疼痛,麻风。

7148373

*Indigofera hendecaphylla* Jacq.

植物名 十一叶木蓝(云南种录)

药材名 铁箭岩陀(云南中草药)

功效 全草、根:用于避孕,绝育。

7148374

*Indigofera hirsuta* L.

植物名 毛木蓝(海南植志)

药材名 毛木蓝(广西药录)

文献名 刚毛木蓝、毛马棘(台湾药植志)

地方名 台湾:红脚蹄仔;海南:假绿豆草(儋县);广西:毛槐蓝(凌云)。

功效 根:用于毒蛇咬伤;枝、叶:去毒,消肿。用于皮肤瘙痒,疮疥。

7148375

*Indigofera ichangensis* Craib --- *Indigofera decora* Lindl.

var. *ichangensis* (Craib) Y. Y. Fang et C. Z. Zheng

植物名 宜昌木蓝(高植图鉴)

药材名 木蓝山豆根(拟)

文献名 野红花《名实图考》,木蓝《豆科图说》,宜昌庭藤《广西药录》

地方名 〔山豆根〕、土豆根(陕西、甘肃、江苏、河南、湖北);广西:铁饭豆(天峨)。

功效 根:清热解毒,消肿止痛。用于喉炎、咳嗽、牙龈肿痛、肺炎。

7148376

*Indigofera kirilowii* Maxim.

植物名 花木蓝《高植图鉴》

药材名 木蓝山豆根(拟)

文献名 朝鲜庭藤、姓条树、木蓝、山藤《豆科图说》,花槐蓝、胡豆《中国树木志》,吉氏木蓝《山东树木志》

地方名 山豆根、土豆根(陕西、甘肃、江苏、河南、湖北);辽宁:山小豆,山绿豆,山豆花,山胡麻结;河北:樊梨花;内蒙古:“丹青-矛都”(蒙名);山东:山胡枝子(莒县),山扫帚(昆崙山、威海、荣成、海阳、莱阳、牙山),山花子(莒县、平邑、沂源、沂水、五莲),山槐(平邑),苦扫根(平度),山蓝,山花子根,扫帚花。

功效 根:清热解毒,消肿止痛,通便。用于咽喉肿痛,肺热咳嗽,黄疸,热结便秘。外用于痔疮肿痛,蛇虫咬伤。

7148377

*Indigofera linifolia* Retz.

植物名 单叶木蓝《豆科图说》

药材名 地红草《西昌中草药》

文献名 线叶马棘《台湾药植志》,线叶木蓝《西昌中草药》

地方名 四川:瓜子草、甜山豆根(米易)。

功效 全株:用于因热病而起之疹,月经不调,驱虫。

7148378

*Indigofera litoralis* Chun et T. Chen

植物名 滨木蓝《广西药录》

功效 全株:用于咽喉肿痛。

7148379

*Indigofera mengtzeana* Craib

植物名 蒙自木蓝《云南种录》

药材名 蒙自木蓝《汇编》

地方名 云南:大铁扫把(文山)、“格堵嘎多”(楚雄彝名),白豆、红苦刺花、大铁扫帚、大救急、鸡拉木蓝。

功效 根:消炎镇痛,舒筋活络。用于肺炎,脉管炎、骨髓炎,跌打损伤,风湿瘫痪,疮痍;种子:用于胃痛,牙痛,消化不良。

7148380

*Indigofera neopolygaloides* Hu --- *I. polygaloides* Gagnep. --- *I. oenotheroides* (Levl.) Levenr --- *I. squalida* Prain

植物名 块根木蓝《汇编》

文献名 虫豆柴《汇编》,“娘三端”(佤族名)《药典》

地方名 广西:地萝卜(田林),鸡心薯(乐业);贵州:远志木蓝。

功效 块根:止痛,消炎。用于胃痛,胃肠炎,咽喉痛,扁桃腺炎;全草:活血止痛。用于劳伤。

7148381

*Indigofera parksonii* Craib

植物名 浙江木蓝《高植图鉴》

药材名 浙江木蓝《中药大辞典》

文献名 广东木蓝《广西植录》,巴东木蓝《豆科图说》,浙江槐蓝《中国树木志》

功效 根或全株:清热解毒,活血祛瘀,消肿散结。

7148382

*Indigofera potaninii* Craib

植物名 陕甘木蓝《汇编》

药材名 木蓝山豆根(拟)

文献名 波氏木蓝《豆科图说》,甘川木蓝《云南种录》,白毛木蓝《华北树木志》

地方名 山豆根、土豆根(陕西、甘肃、江苏、安徽、河南、湖北);陕西:小蓝柴(紫阳)。

功效 根:清热解毒,消肿止痛,通便。

7148383

*Indigofera pseudotinctoria* Mats

植物名 马棘《高植图鉴》

药材名 马棘《救荒本草》、《汇编》

文献名 野槐树《名实图考》,长穗木蓝《豆科图说》,长穗槐蓝《中国树木志》

地方名 野绿豆(浙江、安徽、贵州),小绿豆(浙江、四川),味药、一味药根(湖北、四川、贵州),马料梢(浙江、安徽、湖北),野蓝枝子(湖北、广西、四川),〔铁扫帚〕(湖南、四川);浙江:野细豆(嵊县),紫花地料梢;安徽:木木屋、夜明草;江西:假木蓝;湖北:木蓝根(阳新),〔苦豆根〕;湖南:玉草;广西:蜀小蓝(南宁),豆瓣木(天峨),野蓝靛,〔狼牙草〕;四川:独战岗(南充),〔山皂角〕;贵州:小豆柴,岩豆柴,铁扫把;云南:“苦处喜”(楚雄彝名),必火丹;其他:马良茶。

功效 根或全株:清热解毒,消肿散结。用于感冒咳嗽,扁桃腺炎,颈淋巴结核,小儿疳积,痔疮。外用于疔疮。

7148384

*Indigofera squalida* Dunn

植物名 溪毛木蓝《豆科图说》

文献名 溪毛槐蓝《福建植志》

地方名 四川:红绣箭条(西昌)。

功效 根:宽中理气,解郁除疮毒。全株:止咳,利尿。

7148385

*Indigofera stachyoides* Lindl. --- *I. bodinieri* Levl.

植物名 茸毛木蓝《高植图鉴》

药材名 茸毛木蓝《汇编》

文献名 茸毛槐蓝《中国树木志》

地方名 血人参(贵州、云南);广西:圆花米菜(隆林);贵州:铁刷子,雪人参;云南:红苦刺(红河),山红花。

功效 根:活血止痛,舒筋活络,滋阴补肾,补

气摄血。用于崩漏，跌打风湿，肝硬化，痞积，痢疾；叶、花：利尿。

## 7148386

*Indigofera suffruticosa* Mill.

植物名 野青树《高植图鉴》

药材名 青黛《药性论》、《中药大辞典》

文献名 西印度木蓝《种分》，假蓝靛《海南植志》

地方名 大青《台湾、海南》；福建：大小青，小青；台湾：蕃菁，板蓝根，大菁，菁子；广西：木蓝《陆川》，蓝靛（北流、马山），小蓝青《岑溪》，野火蓝、青子《龙胜》。

功效 茎或茎叶加工制得的粉末或团块：清热解毒，凉血，定惊。用于温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，疔腮，喉痹，小儿惊风。

## 7148387

*Indigofera szechuanensis* Craib

植物名 四川木蓝《豆科图说》

药材名 山皮条《昆明民药》

地方名 四川：一味药；贵州：[金雀花]。

功效 根：宽中理气，解郁，除疮毒。用于胃痛，腹冷痛，胸膈气胀，肺癆发热，疮毒。

## 7148388

*Indigofera teysmanni* Miq.

植物名 密花木蓝《拉汉英种称》

药材名 大叶狼豆柴《贵州草药》

文献名 梯氏木蓝《豆科图说》，板纳木蓝《云南种录》

功效 全株：清热解毒，软坚消痞。用于扁桃腺炎，乳腺炎，疮块，疔疮。

## 7148389

*Indigofera tinctoria* L.

植物名 木蓝《图经》、《高植图鉴》

药材名 青黛《药性论》、《汇编》

文献名 槐蓝《本草拾遗》，蓝靛、靛花、小青叶《纲目》，大蓝、大蓝青、大靛根《生草药性备要》，水蓝《岭南采药录》，印度蓝、野蓝枝子《树分》，印度蓝马棘、野槐树《豆科图说》。

地方名 靛《华南》，小青《福建、台湾》；福建：青仔草《泉州》，大青根《诏安》，漏血草《南平、闽清》，野青靛；台湾：木菁、菁仔，小菁；广东：青里根、板蓝根《五华》，马棘，蓝草，豆靛。

功效 叶、茎叶加工品：清热解毒，凉血，定惊。用于温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，疔腮，喉痹，小儿惊风。

## 7148390

*Indigofera trifoliata* L. --- *I. prostrata* Willd.

植物名 三叶木蓝《高植图鉴》

药材名 三叶木蓝《汇编》

文献名 三叶槐蓝《广西药录》

地方名 广西：地蓝、地蓝根《玉林》，野蓝《贵县》。

功效 全株：清热消肿。用于急慢性咽喉炎，乳腺炎。

## 7148391

*Indigofera zollingeriana* Miq.

植物名 尖叶木蓝《海南植志》

文献名 兰屿木蓝《台湾药植志》

功效 根、叶：用于头痛，创伤，毒蛇咬伤。

## 7148392

*Intsia bijuga* O. Kuntze

植物名 印茄《拉汉英种称》

文献名 太平洋铁木《台湾药植志》

功效 树皮：用于腹泻。

## 7148393

*Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino --- *Lepedeza syipulacea* Maxim.

植物名 豎毛鸡眼草《汇编》

文献名 斑珠科《名实图考》，长萼鸡眼草《高植图鉴》，短萼鸡眼草《东北草木植志》，直立鸡眼草《浙江药植志》

地方名 掐不齐《东北、内蒙古、山东、江苏、四川》，鸡眼草《内蒙古、江苏、江西、四川》；黑龙江：野苜蓿草《齐齐哈尔》；内蒙古：“塔黑亚-尼都-乌布斯”、“他黑延-尼都-额布斯”《蒙名》；陕西：地苜蓿《太白》；江西：小人字草；福建：[蒿藟]，[扁蓿]《福州》，小蒿蓿；湖北：夜关门《神农架》；四川：斑鸠窝《峨眉山》，红斑鸠窝；其他：高丽胡枝子。

功效 全草：清热解毒，活血，利尿，止泻；茎、叶：用于肿毒。

## 7148394

*Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.

植物名 鸡眼草《高植图鉴》

药材名 鸡眼草《救荒本草》、《汇编》

文献名 掐不齐《救荒本草》，人字草《本草求原》，斑珠科、公母草《名实图考》，炸古基《豆科图说》，妹子草、红花草、地兰花《中医实验研究》

地方名 三叶人字草《湖北、广东、广西、四川》，乌蝇翼、新孩儿草《广东、广西》，米碎草《广东、云南》，小关门《浙江、湖南》，白斑鸠窝《四川、云南》，关门草《浙江、安徽》，夜关门《湖南、广西》，蚂蚁草《上海、浙江、湖北》，[斑鸠窝]《安徽、四川》，铺地锦《湖南、广东》；内蒙古：[地锦]；陕西：牛黄黄；江苏：小菁片《南京》，蚂蚁骨头草；上海：粪蛆草；浙江：小延边草，白蒿蓿，花生草，花花草，夏闭草，莲子草，瞌睡草，雌雄草，细号合萌《文成》；安徽：二合不齐；江西：阴阳草《泰和》，对叉草，雄雌草；福建：夜合草《三明》，小关门草《福安、福鼎》，曲仔草《建阳、松溪、政和、周宁》，[蒿蓿]《永安、沙县、建宁、福安、长汀》，三叶草《永安、永泰》，纱帽草《南安、晋江》，小蒿蓿，小号苍蝇翼，红骨丹，苍蝇翅，老蛇草，蚱蜢翅，夜明草，苍蝇翼，乌鸦目子草，红莲子草，乌蝇草，夫人草；台湾：蝴蝶翼，山土豆；河南：斑鸠炸；湖北：小人字草，扇子草；湖南：老鸦须，铺地龙，鸳鸯草；广东：[鹿含草]《惠阳》，乌鸦羽《五华》，孩儿草；广西：苍蝇蓿《柳城、柳江、玉林、贵县》，[地丁草]《博白、陆川、容县》，乳汁草《南宁》，蛤蚧草《龙州》，[紫花地丁]《北流、

贵县、玉林),红筋草;四川:豆瓣草;贵州:土文花(惠水),满路金鸡(榕江),细花草,爆火叶。

功效 全草:清热解毒,活血,利尿,止泻。用于胃脘痛,痢疾,肝炎,夜盲症,泌尿系感染,跌打损伤,疔疮疔肿。

#### 7148394a

*Lathyrus cicera* L.

植物名 对叶香豌豆(新疆中草药)

药材名 香豌豆(新疆中草药)

功效 种子:活血,祛瘀。用于月经不调,跌打损伤。

#### 7148395

*Lathyrus davidii* Hance

植物名 荏苒香豌豆(高植图鉴)

药材名 荏苒香豌豆(汇编)

文献名 [荏苒决明]、大山薰豆(吉野),荏苒山薰豆(秦岭植志),[金银花](食用植物图说),豌豆叶、山豆、荏苒决明香豌豆(豆科图说)

地方名 吉林:“花儿拉木儿”(朝名);湖北:野豌豆,土黄七。

功效 种子:镇痛。用于子宫内膜炎,痛经。

#### 7148396

*Lathyrus komarovii* Ohwi --- *L. alatus* (Maxim.) Kom.

植物名 具翅香豌豆(豆科图说)

文献名 三脉山薰豆(东检)

功效 全草:用于外伤,黄疸和利尿。

#### 7148397

*Lathyrus palustris* L.

植物名 沼生香豌豆(豆科图说)

药材名 山薰豆(中药志)

文献名 连理草(江苏植志)

功效 全草:祛风湿,活血,止痛。

#### 7148398

*Lathyrus palustris* L. var. *linearifolius* Ser.

植物名 细叶香豌豆(《滇南本草》整理本)

药材名 竹叶马豆(昆明民药)

文献名 山薰豆(牧野日图),连理草(中药大辞典)

地方名 云南:铁马豆(昆明)。

功效 全草:清热解毒。用于疮,癣,癰,小儿麻疹后余毒不尽。

#### 7148399

*Lathyrus palustris* L. var. *pilosus* (Champ.) Ledeb. ---

*L. pilosus* Champ.

植物名 柔毛香豌豆(豆科图说)

文献名 山薰豆(长白山植药志)

功效 全草:散风祛湿,解毒止痛。

#### 7148400

*Lathyrus pratensis* L.

植物名 牧地香豌豆(高植图鉴)

文献名 牧地山薰豆(东北草本植志)

地方名 湖北:小野豌豆(神农架)。

功效 全草:清热解毒,利湿;叶:祛痰止咳,用于

支气管炎,肺炎,肺脓肿,肺结核。

备考 叶及全草有雌激素样作用。

#### 7148401

*Lathyrus quinquenervius* (Miq.) Litv. ex Kom.

植物名 五脉叶香豌豆(高植图鉴)

文献名 五脉山黎豆(沙漠药植)

地方名 河北:山薰豆。

功效 全草:祛风除湿,止痛。用于关节炎;花、种子:用于头痛。

#### 7148402

*Lathyrus sativus* L.

植物名 欧洲香豌豆(拟)

文献名 欧洲山薰豆(沙漠药植),家山薰豆(东北草本植志)

功效 全草:有毒。用于治疣。

7148403 见 7148394a

#### 7148404

*Lespedeza bicolor* Turcz.

植物名 胡枝子(高植图鉴)

药材名 胡枝子(救荒本草)、(汇编)

文献名 随军茶(救荒本草),和血丹(名实图考),山槐(植物名汇),菽、虾夷山萩(豆科图说),胡枝花、鹿鸣花(中药大辞典)

地方名 扫皮、二色胡枝子(内蒙古、山东),扫条(东北、内蒙古),帚条、苕条、杏条(东北);辽宁:横子;内蒙古:“胡吉斯”、“矛仁、呼日布格”(蒙名),脑痕,雪拉,横条,横色子;山东:苦枝子、野扫帚(崂山),扫帚苗(牙山),胡枝子苗(蒙山、莱芜),胡枝条、大芨、大橘(青岛),鹿鸣草,山扫帚;江西:〔过山龙〕,羊角梢,豆叶柴,野山豆根,胡枝子根,〔山豆根〕;福建:夜合草(福安),野花生(罗源、周宁),假花生(秦宁);湖南:紫布荆柴(衡山),风小生;广西:鸡爪枝(北流、陆川),把天门(梧州),腊烛心树(临桂)。

功效 根:解表。用于感冒发热;茎、叶或全草:润肺清热,利尿通淋。用于肺热咳嗽,百日咳,鼻衄,淋病。

#### 7148405

*Lespedeza bicolor* Turcz. var. *japonica* Nakai --- *Lespedeza japonica* Bailey

植物名 日本胡枝子(拉汉英种称)

文献名 鹿鸣草(中草药学)

备考 叶含 N, N 二甲基色胺(N, N-dimethyltryptamine,  $C_{12}H_{16}N_2$ ),其 100 万-200 万倍的稀释液对离体大鼠的子宫即有收缩作用。

#### 7148406

*Lespedeza buergeri* Miq.

植物名 绿叶胡枝子(高植图鉴)

药材名 女金丹(福建)、(汇编)

文献名 木本胡枝子、白氏胡枝子(豆科图说),木本胡枝子叶、木本胡枝子皮、麒麟药、豆荚(中药大辞典),三姐妹、九月豆、金飘带(汇编)

地方名 福建:土附子(福安、罗源),粘衣草(福安),



三叶青, 三叶枝, 三头草, 三叶牌, 三娘仔, 三父子, 三兄弟, 山附子, 山鬼豆, 玉扣带, 牛贴额, 知天文, [金腰带], 鬼豆, 癌草; 湖北: 马福梢、胡枝子(神农架); 四川: 草鞋板(成都); 贵州: 血人参; 其他: 石香花。

功效 根、叶: 解表, 祛湿, 止痛, 止血。用于感冒咳嗽, 头痛, 小儿痰喘, 胃痛, 黄疸, 心绞痛, 腰痛, 子宫出血, 乳癌初起, 风湿性关节炎, 疔疮, 毒蛇咬伤; 茎皮: 用于风湿骨痛。

## 7148407

*Lespedeza chinensis* G. Don

植物名 中华胡枝子《高植图鉴》

药材名 中华胡枝子《汇编》

文献名 细叶马料梢《中药大辞典》, 高脚硬梗太阳草《浙江天目药志》, 小叶马料梢《浙江药植志》, 台湾胡枝子《豆科图说》

地方名 浙江: 马料梢、鸪鹑梢、小号布纱(廿化), 乌天盲(丽水), 细叶落花生(云和), 细叶野花生, 千年勿大树, 白盲英; 湖北: 小叶老虎梢(神农架)。

功效 根或全株: 清热止痢, 祛风截疟。用于急性细菌性痢疾, 关节痛, 疟疾。

## 7148408

*Lespedeza cuneata* (Dum.-Cours.) G. Don --- *L. sericea* (Thunb.) Miq. --- *L. juncea* (L.f.) Pers. var. *sericea* (Thunb.) Maxim.

植物名 截叶铁扫帚《高植图鉴》

药材名 截叶铁扫帚《汇编》

文献名 苳、马帚《尔雅》, 铁扫帚《救荒本草》, 三叶草《滇南本草》, 封草《质问本草》, 菌串子、夜关门《分类草药性》, 截叶胡枝子《浙江药植志》, 铁线八草《植物名汇》, 野鸡草、白马鞭、野辟汗草《中药大辞典》

地方名 老牛筋(陕西、广西), 一枝香、人字草(福建、广西), 三叶公母草(江西、湖北), 小夜关门(贵州、云南), [千里光](福建、台湾), [马鞭草](福建、贵州), 白关门草、马尾草(浙江、福建), 关门草(浙江、安徽、福建、贵州、云南), 鱼串草(广东、广西), 穿鱼草(湖南、云南), 夜合草(江西、福建), 铁扫把(江西、福建、湖南、广西、四川、云南), 铁马鞭(江西、湖北、贵州), 蛇蜕壳(四川、贵州), 蝴蝶翼(福建、台湾), [狗尾草](浙江、广西); 上海: 火鱼草, 石青蓬; 浙江: 鸡虱草(宁波), 鸡盲草(温州), 大关门草、关儿草(乐清、平阳、泰顺), 夜闭草, 雉鸡尾巴; 安徽: 高脚阴阳草(太和), 岗松, 牧地草, 柳蒿条子, 疳积草; 江西: 公母草(景德镇), 白花小叶瓦叉(德兴), 疳积药(莲花), 野鸡尾(丰城), 夜合锁; 福建: 半天雷(南安、同安、周宁、晋江、厦门), 苍蝇翼(古田、大田、龙海、光泽、武平), 白梗夫人草(宁化), 狐狸嘴, 蝗虫串, 闭门草, 暗草, 胡流串, (千里及), 光明竹, [光明草], 白杆夫人草, 苍蝇翅, 生胡叶, 小格蝇翅, 狗尾, 关门竹, 关门楼, 一粒珠, 王母钗, 龙莓草, 雷公草, 蝌蚪草, [还魂草], [凤尾草], 胡蜆舌, [九里明], 白晃草, 田铁仔, 嗜草, 蝗虫草, 甘尾草, 一条香, 绒组草, 扫手截, 千层楼, [野花生], 石桥草, 牛奶草, 国公鞭, 千球草; 台湾: 乌蝇翼(新竹); 湖北: 蛇药草; 湖南: 化食草

(永兴), 豆毛草(黔阳), 家药(衡阳), 凤文尾、赵公鞭(长沙、古文), 凤尾交(常德), 收鳞草(衡山), 夜开花, 叶开花; 广东: 一支烛, 万打棍, 乌蝇婆死蛇, 坭鳅串, 细叶鳅串, 乳头草, 夜腊草, 湖鳅串; 广西: 蛇利草(贵县、南宁), 蚊虫草(梧州), 青天白(忻城), 夜光明(全州), 独柱打杆(大新), 蛇骨草(百色), 细叶串, 鱼仔串, 蚊承草, 绒珠马鞭; 四川: 蛇垮皮, 瓦子草; 贵州: [一支箭], [一柱香], 小种夜关门, 退烧草, 菌子串, 蛇退草, 蛇倒退, 帽顶草; 云南: 老糠菜(文山), 串鱼草(临沧), 穿鱼条、穿鱼串、[鱼鳅串]、[黄鳝草](红河), [黄鳝藤](昆明)。

功效 根和全株: 清热利湿, 消食除积, 祛痰止咳。用于小儿疳积, 消化不良, 胃肠炎, 细菌性痢疾, 胃痛, 黄疸型肝炎, 肾炎水肿, 白带, 口腔炎, 咳嗽, 支气管炎。外用于带状疱疹, 毒蛇咬伤。

## 7148409

*Lespedeza cyrtobotrya* Miq.

植物名 短梗胡枝子《高植图鉴》

药材名 短序胡枝子《长白山植药志》

文献名 圆叶胡枝子《山东树木志》, 荻、深山荻《豆科图说》

地方名 辽宁: 籽条。

功效 茎叶或全株: 润肺清热, 利尿通淋; 根: 解表。

## 7148410

*Lespedeza davidii* Franch.

植物名 大叶胡枝子《高植图鉴》

药材名 大叶胡枝子《汇编》

文献名 胡枝子、和血丹《名实图考》, 粗筋胡枝子《浙江药植志》

地方名 铁扫帚(陕西、甘肃、宁夏); 吉林: 铁苕条; 浙江: 大叶马料梢(临安), 山苜蓿(天台); 江西: 羊古梢; 湖南: [山豆根], 羊罩机; 广西: 夜关门(全州)。

功效 根、叶或全株: 宣开毛窍, 通经活络。用于疹痧不透, 头晕眼花, 汗不出, 手臂酸麻。

## 7148411

*Lespedeza davurica* (Laxm.) Schindl.

植物名 兴安胡枝子《东北木本图志》

药材名 枝儿条《汇编》

文献名 达呼里胡枝子《高植图鉴》, 达呼尔胡枝子、豆苗苗、毛果状铁扫帚《豆科图说》, 毛果胡枝子《云南种录》, 达乌里胡枝子《内蒙古植志》

地方名 吉林: 铁苕条; 河北: 蒙牛茶; 内蒙古: “呼日布格”、“捷尔吉纳”(蒙名); 山东: 青龙草; 江苏: 小茶叶、山豆粘(东海); 其他: 蒙牛查, 牛枝子, 牛筋子。

功效 根、全株: 解表散寒。用于感冒, 发烧, 咳嗽。

## 7148412

*Lespedeza dunii* Schindl.

植物名 春花胡枝子《豆科图说》

药材名 春花胡枝子《中药大辞典》

功效 全株: 用于急性阑尾炎。

## 7148413

*Lespedeza fasciculiflora* Franch.

植物名 束花铁马鞭《豆科图说》

文献名 地筋《云南药录》

功效 根：用于痢疾，腹泻。

备考 《云南种子植物名录》以本品为《植物名实图考》之铁马鞭。

## 7148414

*Lespedeza floribunda* Bunge

植物名 多花胡枝子《高植图鉴》

药材名 多花胡枝子《汇编》

地方名 白毛蒿花(东北)；内蒙古：“莎格拉嘎日-呼日布格”(蒙名)；陕西：米汤草，铁鞭草；山东：山扫帚，扫帚苗；浙江：石告杯。

功效 全株或根：消积散瘀。用于疳积。

## 7148415

*Lespedeza formosa* (Vogel) Koehne --- *L. bicolor* Turcz. subsp. *formosa* (Vogel) Hsu --- *Desmodium formosum* Vog. --- *Lespedeza thunbergii* (DC.) Nakai

植物名 美丽胡枝子《高植图鉴》

药材名 马扫帚《汇编》

文献名 胡枝子《科裁》

地方名 马拂帚(浙江、云南)；陕西：土大戟(陇县)；山东：苦枝子、野扫帚(崂山)，扫帚苗(牙山)，胡枝子苗(蒙山、莱芜)；江苏：草大戟、鸡骨墓(吴县)；上海：〔绵大戟〕；浙江：白花梢，白蔓里梢，红蔓里梢；安徽：马胡须，苗长根；福建：白布纱、红布纱(福州、福清、福鼎、永安、永春、古田)，马须草(浦城)，马乌柴(周宁)，牛姆西、羊牯草(武平、永安)，步索(松溪、政和、周宁)，山埔西(安溪)，白蒲藤(宁化)，羊尾匙(沙县)，苦擦仔(龙岩)，鹿柴兜(光泽)，马蹄柴(福安)，坡柴(福安、霞浦)；湖北：大马福梢，南江树；湖南：“立多”、“拎多”(侗语)；广东：白花羊牯爪，白花羊牯草(惠阳)，红花羊牯爪；广西：假蓝根，霸守天门、夜关门(南宁)，碎蓝木(博白)，沙牛木(苍梧)，泌根(平南)，三桂木(桂平)，鸡丢枝(玉林)，把天门(柳州、平南)。

功效 根、全株：清热凉血，消肿止痛。用于肺热咳嗽，肺脓肿，疮痈疔肿，便血，风湿关节痛，跌打肿痛。外用于扭伤，脱臼，骨折；花：清热凉血。用于肺热咳血，便血。

## 7148416

*Lespedeza hedysaroides* (Pall.) Kitag. --- *L. juncea* Pers.

植物名 尖叶铁扫帚《豆科图说》

药材名 尖叶铁扫帚《汇编》

文献名 铁扫帚《救荒本草》，夜关门、少枝毫《植物名汇》，横子《指示植物》，灯心草状胡枝子、小叶牛子棵、〔黄蒿子〕《豆科图说》，尖叶胡枝子《山东树木志》

地方名 小夜毫、黄毫子(东北)；湖南：化食草，白指甲花，关门草，鱼吊草，扁座，赵公鞭，铁马鞭，野鸡草，野辟汗草；广东：各骆艾，坭锹穿。

功效 全株：止泻利尿，止血。用于痢疾，遗精，吐

血，子宫下垂。

## 7148417

*Lespedeza inschanica* (Maxim.) Schindl. --- *L. hedysaroides* (Pall.) Kitag. var. *inschanica* (Maxim.) Kitag.

植物名 阴山胡枝子《中国树木志》

文献名 野苜蓿《豆科图说》，白指甲花《山东经植》

地方名 山东：胡枝子苗，扫帚苗。

功效 根、叶或全株：宣开毛窍，通经活络。

## 7148418

*Lespedeza penduliflora* (Oudemann) Nakai ssp. *cathayana* Hsu et All.

植物名 垂花胡枝子《汇编》

地方名 浙江：马扫帚，三叶藤。

功效 花、根、根皮：消痰镇咳，活血接骨。用于急、慢性支气管炎，跌打损伤，骨折。

## 7148419

*Lespedeza pilosa* (Thunb.) Sieb. et Zucc. --- *Hedysarum pilosum* Thunb. --- *Desmodium pilosum* (Thunb.) DC.

植物名 铁马鞭《高植图鉴》

药材名 铁马鞭《名实图考》、《汇编》

文献名 九头蛇草《民族药志》

地方名 野花生(上海、浙江、江西)；浙江：金钱藤、野花草(天目山)；江西：三叶藤(吉水)；湖南：收魂草(衡山)，土黄芪，夜牵牛；广西：假山豆(三江)。

功效 根及全株：清热散结，活血止痛，行水消肿。用于颈淋巴结结核，冷脓肿，虚热不退，水肿，腰腿筋骨痛。外用于乳腺炎。

## 7148420

*Lespedeza tomentosa* (Thunb.) Sieb. ex Maxim. --- *Hedysarum tomentosum* Thunb.

植物名 绒毛胡枝子《东北木本图志》

药材名 山豆花《名实图考》、《汇编》

文献名 白花胡枝子《救荒本草》，白苻《中国植物图鉴》，(虎耳草)、禹州虎耳草《华北药志》，茸毛胡枝子《广西植录》

地方名 毛胡枝子(山东、安徽)；山东：大胡枝子(莒县)；江苏：女儿红(赣榆)；安徽：大毛尖，大山豆秸，小毛香，山豆子，山花生，白胡枝子，野紫花生子，山豆花根；湖南：山油麻，公油麻；贵州：小雪人参(贵阳)，白土子。

功效 根、全株：健脾补虚，清热祛湿。用于痢疾，虚劳，虚肿。

## 7148421

*Lespedeza virgata* (Thunb.) DC.

植物名 细梗胡枝子《高植图鉴》

药材名 细梗胡枝子《汇编》

文献名 斑鸠花《中国树木志》，掐不齐《江苏药材志》

功效 根、叶或全株：用于疟疾，肺结核，慢性肾炎。

## 7148422

*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit --- *L. glauca* (L.) Benth. --- *Mimosa glauca* L. --- *Acacia glauca* (L.) Willd.

植物名 银合欢《中国植志》

药材名 银合欢《台湾药植志》

文献名 白合欢《豆科图说》, [合欢花]《云南药录》

地方名 广东: [合欢]; 云南: 倭合树。

功效 未熟种子: 驱虫。

#### 7148423

*Lorus corniculatus* L.

植物名 百脉根《高植图鉴》

药材名 百脉根《唐本草》、《汇编》

文献名 柏脉根《唐书》, 牛角花《名实图考》, 都草、黄金花、鸟距草《中药大辞典》

地方名 黄花草 (四川、云南); 甘肃: 野苜蓿 (武都); 湖北: 铺地黄、蛇口黄 (巴东), 草红花; 四川: 三月黄花、天瓜叶 (成都), 五叶草 (绵阳), 花生藤 (米易), 斑鸠窝 (简阳、成都), 酸米子 (广元), 八角草, 地羊鹊, 蛾子药; 贵州: 金花菜; 其他: 大酸米草, 绿豆秋儿。

功效 全草: 清热解毒, 止咳平喘。用于风热咳嗽, 咽炎, 扁桃体炎, 胃中痞满疼痛。外用于湿疹, 疮疖, 痔疮。

#### 7148424

*Lotus tenuis* Waldst. et Kitag. ex Willd. --- *L. corniculatus* L. var. *tenuifolius* L.

植物名 细叶百脉根《沙漠植志》

药材名 金花菜《贵州草药》

地方名 内蒙古: “纳日音·好希杨朝日” (蒙名)。

功效 全草: 清热, 止血。用于大肠下血, 痢疾。

#### 7148425

*Lupinus luteus* L.

植物名 黄花羽扇豆《台湾药植志》

地方名 台湾: 鲁冰。

功效 种子: 利尿, 驱虫。

#### 7148426

*Lupinus polyphyllus* Lindl.

植物名 多叶羽扇豆《西藏植志》

文献名 羽扇豆《台湾药植志》

功效 种子: 利尿, 驱虫。

#### 7148427

*Lysidice brevicalyx* Wei

植物名 短萼仪花《中国植志》

地方名 广东: 麻轱木; 广西: 麻轱木。

功效 根、茎、叶: 有小毒。活血散瘀, 消肿止痛; 根: 用于风湿痹痛, 跌打损伤; 根、茎、叶: 外用于外伤出血。

#### 7148428

*Lysidice rhodostegia* Hance

植物名 仪花《中国植志》

药材名 铁罗伞《广西本草选编》

文献名 仪花《云南种录》, 红花树《中国树木志》

地方名 广西: 龙眼参 (南宁), 单刀根 (南宁、龙州), “嘎啦” (壮语), 广檀木, 大救驾, 麻轱木, 假格木。

功效 根、叶: 有小毒, 活血散瘀, 消肿止痛。用于风湿痹痛, 跌打损伤。外用于外伤出血。

#### 7148429

*Maackia amurensis* Rupr. et Maxim.

植物名 朝鲜槐《高植图鉴》

药材名 檉槐《纲目》

文献名 浙槐槐《山东经植》, 唐槐槐《豆科图说》, 高丽槐《树分》

地方名 山槐 (东北、山东); 吉林: 黄色木; 山东: 山腊 (海阳)。

功效 茎枝: 祛风除湿。用于风湿关节痛。

#### 7148430

*Maackia tenuifolia* (Hemsl.) Hand.-Mazz.

植物名 光叶马鞍树《高植图鉴》

药材名 光叶马鞍树根《浙江药植志》

地方名 浙江: 乌心柴 (永康), 铜身铁骨 (临安)。

功效 根: 用于跌打损伤。

#### 7148431

*Medicago falcata* L. --- *M. sativa* L. subsp. *falcata* Doll

植物名 野苜蓿《高植图鉴》

药材名 黄花苜蓿《汇编》

文献名 连花生《豆科图说》, 花苜蓿、苜蓿草、黄苜蓿《汇编》

地方名 内蒙古: “格仁·浩西阳古日”、“希日·查日嘎苏” (蒙名), 豆豆苗, 镰荚苜蓿。

功效 全草: 降压利尿, 消炎解毒。用于浮肿, 各种恶疮。

#### 7148432

*Medicago hispida* Gaertn. --- *M. denticulata* Willd.

植物名 南苜蓿《高植图鉴》

药材名 苜蓿《别录》、《中药大辞典》

文献名 牧宿《尔雅》郭璞注, 苜蓿根《唐本草》, 塞鼻边迦《金光明经》, 怀风、光风、连枝草、木粟、光风草《纲目》, 毒旋子《当涂县志》, 野苜蓿《名实图考》, 金花草、刺三叶、唐草、盘歧头、马肥《豆科图说》

地方名 母齐头、金花菜、草头 (江苏、浙江), 黄花草子 (浙江、广西); 陕西: 刺苜蓿; 江苏: 苜蓿头 (南京); 上海: 黄苜蓿 (龙华); 浙江: 磨盘草子; 其他: 斑鸠。

功效 全草: 清热利尿。用于膀胱结石; 根: 清热利尿, 退黄。用于黄疸, 尿路结石。

#### 7148433

*Medicago lupulina* L. --- *M. parviflora* Gilib.

植物名 天蓝苜蓿《高植图鉴》

药材名 三叶草《滇南本草》

文献名 天蓝《苏州府志》, 老蜗生《名实图考》, 黑荚苜蓿、杂花苜蓿、米粒苜蓿、斑珠科《豆科图说》, 野苜蓿、黑籽籽、黄花苜蓿《沙漠药植》

地方名 野花生 (四川、贵州); 内蒙古: “呼和·查日嘎苏” (蒙名); 陕西: [接骨丹] (山阳); 青海: “布苏劣” (藏名); 江西: 三三光, 丫雀扭; 福建: 清钝草 (厦门); 湖

北;竹结巴;湖南;黄瓜草;四川;小黄花草,花生草;贵州;地梭罗,清酒缸;云南:接筋草(昆明),黄花马豆草,金花菜,三叶酸(玉龙山);其他:斑鸠。

**功效** 全草:清热利湿,凉血止血,舒筋活络。用于黄疸型肝炎,便血,痔疮出血,白血病,坐骨神经痛,风湿骨痛,腰肌劳损。

7148434

*Medicago sativa* L.

**植物名** 紫苜蓿(高植图鉴)

**药材名** 苜蓿(别录)、(汇编)

**文献名** [土黄芪](食疗本草),苜蓿根(唐本草),阳草(满洲植录),牧宿、路孙、阿尔佛佛、武功苜蓿、紫花苜蓿、苜蓿(豆科图说)

**地方名** [透骨草]、苜蓿草(东北),[黄芪](东北、华北、安徽);内蒙古:“宝日-查日嘎苏”(蒙名);西藏:羊草。

**功效** 根、全草:健胃,清热利尿。用于肠炎,尿路结石,夜盲。

7148435

*Melilotus albus* Medik.

**植物名** 白香草木樨(高植图鉴)

**药材名** 白香草木樨(汇编)

**文献名** 白零陵香(叶(生药)),白花甘翘摇(台湾药植志),草木樨(经济植物学),白花羌香(上海植录),白草木樨、白甜车轴(豆科图说),白花草草木樨(东北草本植志)

**地方名** [黄芪](东北、华北、湖北),辟汗草(湖北、贵州、陕西);内蒙古:“查干-呼庆黑”(蒙名);陕西:白甜车轴草,金花草;上海:白花辟汗草;湖北:木犀草,臭苜蓿根(神农架)。

**功效** 全草:清热解毒,化湿,杀虫。

7148436

*Melilotus dentatus* (Waldst. et Kitag.) Pers.

**植物名** 细齿草木樨(高植图鉴)

**药材名** 细齿草木樨(内蒙古中草药)

**地方名** 内蒙古:马层,马层子,臭苜蓿,“纳日音-呼庆黑”(蒙名)。

**功效** 全草:清热解毒,化湿,杀虫。

7148437

*Melilotus indicus* (L.) All. --- *M. parviflora* Desf. ---

*M. arvensis* Wall.

**植物名** 小花草草木樨(云南种录)

**药材名** 印度草木樨(广西药录)

**文献名** 野苜蓿、蛇蜕草(汇编)

**地方名** 辟汗草(陕西、贵州);江苏:马兰菜、各答菜(连云港),臭草、野花生(射阳),草木樨(如东),马来菜,天蓝楷;福建:山树兰(厦门);台湾:郎日巴花。

**功效** 全草:清热解毒,敛阴止汗。用于虚汗,皮肤搔痒;种子:用于肠部疾患,小儿腹泻。

7148438

*Melilotus officinalis* (L.) Desr.

**植物名** 黄香草木樨(高植图鉴)

**药材名** 黄零陵香(汇编)

**文献名** 醒头香、辟汗香、香草木樨(花镜),黄花甘翘摇(台湾药植志),欧草木樨、墨里老鸪、金花草、黄甜车轴、黄甜车轴草、香草木樨(豆科图说),黄草木樨(经济植物学)

**功效** 全草:解痉止痛。用于哮喘,支气管炎,肠绞痛。外用于创伤,淋巴结肿痛。

7148439

*Melilotus suaveolens* Ledeb.

**植物名** 草木樨(高植图鉴)

**药材名** 草木樨(汇编)

**文献名** 醒头香(花镜),辟汗草(名实图考),[沙苑子]、小沙苑子、[沙苑蒺藜]、[白蒺藜](华北药寮),宝贝草、黄花苜蓿(沙漠药植),黄花草草木樨(沙漠植志)

**地方名** [地肤子](四川、贵州、云南),省头草(黑龙江、上海、浙江、安徽),[黄芪](东北、华北),臭虫草(西南),臭苜蓿(陕西、内蒙古),铁扫把(上海、四川、贵州),野苜蓿(黑龙江、吉林、陕西、浙江),野木樨(黑龙江、山东),黄花草(江苏、安徽),臭苜蓿根(陕西、湖北);黑龙江:香马料;吉林:“真束刺里”(朝名);内蒙古:“呼青黑”(蒙名),马层子,马秦;陕西:散血草(宁强),臭老汉、品川蕨、蕨蕨(商县),麻前(陕北),败毒草;甘肃:马苜蓿,洋苜蓿;青海:“甲贝”(藏名);山东:扫帚苗(沂源),木樨草(沂山),蓼香棵(沾化);江苏:天蓝杆(启东),马兰菜,各答菜,野花生;上海:野长生果,鸡头花草,羌香;浙江:醒头草,安徽:草苜蓿,[苜蓿];湖北:[铁扫帚],[夜关门];四川:鸡虱子草,[小地肤子](川东、川南)。

**功效** 全草:芳香化浊,截疟。用于暑热胸闷,口臭,头胀,头痛,疟疾,痢疾;根:清热解毒。用于淋巴结核。

7148440

*Mezoneuron sumatranum* Wight et Arn. --- *Caesalpinia sumatrana* Roxb.

**植物名** 苏门答腊见血飞(台湾药植志)

**功效** 叶:驱虫。用于肠部疾病,如腹泻,又为产妇用药。

7148441

*Millertia acsperma* Dunn

**植物名** 大种崖豆藤(豆科图说)

**药材名** 大种崖豆藤(广西药录)

**地方名** 广西:山狗豆(北流),[鸡血藤](靖西),扫布藤(苍梧),假九层皮(龙州)。

**功效** 茎:补血;种子:用于痢疾。

7148442

*Millertia bonatiana* Pamp.

**植物名** 滇桂崖豆藤(云南种录)

**药材名** 白藤(云南中草药选)

**文献名** 大发汗(汇编)

**地方名** 云南:大毛豆(玉溪),断肠叶(昆明),白花藤、大力士、巴豆藤、舒筋大力王、活血大力王(红河),断肠草。

**功效** 根、藤或叶：有毒。发汗解表，祛风除湿。用于感冒无汗，头痛，鼻塞，风湿疼痛，跌打损伤。

## 7148443

*Millettia championi* Benth.

**植物名** 绿花崖豆藤《高植图鉴》  
**药材名** 硬骨藤《广西本草选编》  
**文献名** 羊药头、老京藤《汇编》  
**地方名** 广西：水苦辣，白跌打，羊药豆，早硬骨藤，〔鸡血藤〕。

**功效** 根或根皮：有毒。凉血散瘀，祛风消肿。用于跌打扭伤，风湿关节痛，面神经麻痹。

## 7148444

*Millettia congestiflora* T. C. Chen

**植物名** 密花崖豆藤《豆科图说》  
**地方名** 广西：青叶烂麻藤。  
**功效** 根茎：活血，祛风，通络。  
**备考** 过去有的文献称本种为“丰城鸡血藤”，实误。

## 7148445

*Millettia dielsiana* Harms ex Diels --- *M. champutonensis* Hu --- *M. argyrea* T. Chen

**植物名** 香花崖豆藤《高植图鉴》  
**药材名** 山鸡血藤（海南、广西、四川）  
**文献名** 昆明鸡血藤《名实图考》，岩豆根《分类草药性》，香花鸡血藤《浙江药植志》，〔过江龙〕《中草药学》，银瓣崖豆藤《广西植录》，菖蒲桶崖豆藤《品种论述》  
**地方名** 鸡血藤（江西、广西、四川、云南），岩豆藤（湖北、四川、贵州、云南），血藤（广西、四川），棉胶藤（湖北、湖南），丰城鸡血藤（浙江、江西），（大血藤）（贵州、云南）；浙江：红皮藤（天台），红血藤（温州）；江西：小活血、狐狸藤（德兴），猴子刮屁股（婺源），毛豆结藤，大活血，过山龙，苦藤，猪婆藤，鲜活鸡血藤〔鲜品〕（庐山）；福建：鸡血藤根；湖北：岩豆〔紫藤〕；湖南：牛大力，石鸡血莲；广东：血风根（潮阳），老人根（兴宁、潮阳），老人藤（五华），红牛大力（增城），五叶鸡血藤（广州），血枫根、血枫差、拉牛入石（兴宁），五虎下山、硬壳藤、老公筋、白藤（惠阳），血枫藤；广西：入骨风、火麻藤、〔血见愁〕、五虎将、川山甲（平南），马下消（梧州），马上消、桃牛特（苍梧），毛鸡血藤；四川：〔络石藤〕，岩豆藤根，山胡豆、岩胡豆（南充），贯肠血藤；贵州：小鸡血藤（金沙），老鸦藤（瓮安），血贯肠（贵阳），菖蒲桶岩豆藤（遵义），老菟豆藤；云南：白血藤、大巴豆（昆明）；其他：野奶豆。

**功效** 藤茎、根：补血行血，通经活络。用于贫血，月经不调，闭经，风湿痹痛，腰腿酸痛，四肢麻木，放射治疗引起的白细胞减少症。

## 7148446

*Millettia dielsiana* Harms var. *heterocarpa* (Chun ex T. Chen) Z. Wei --- *M. heterocarpa* Chun ex T. Chen

**植物名** 异果崖豆藤《植分学报》  
**药材名** 山鸡血藤（广州）  
**文献名** 大巴豆《高植图鉴》

**地方名** 广西：牛板筋（天峨）。

**功效** 根、茎：活血祛瘀。用于风湿关节痛。

## 7148447

*Millettia dielsiana* Harms var. *solida* T. Chen

**植物名** 雪峰山崖豆藤《植分学报》  
**药材名** 实心崖豆藤《广西药录》  
**地方名** 广西：〔大血藤〕（乐业）。  
**功效** 根：补血，行血。

## 7148448

*Millettia dorwardi* Coll. et Hemsl. --- *M. shunningensis* Hu

**植物名** 滇缅崖豆藤《云南种录》  
**文献名** 顺宁崖豆藤《广西药录》，中缅崖豆藤《植分学报》  
**地方名** 广西：血藤（乐业）。  
**功效** 茎：补血，活血。

## 7148449

*Millettia eurybotrya* Drake

**植物名** 宽序崖豆藤《中国树木志》  
**药材名** 宽序崖豆藤《广西药录》  
**地方名** 广西：祛风藤（柳江）。  
**功效** 全株、茎：有毒。外用用于湿疹疮毒，皮肤过敏；根：用于风湿骨痛，慢性肝炎，白带，便血；叶：用于跌打损伤，疮疡肿毒。

## 7148450

*Millettia fordii* Dunn

**植物名** 披针叶崖豆藤《中国树木志》  
**文献名** 福特崖豆藤《广西药录》，广东崖豆藤《植分学报》

**地方名** 广东：苦牛大力；广西：〔土甘草〕（平南、北流），〔山甘草〕（北流、平南、岑溪），山莲藕（博白），山豆角（梧州），假甘草藤（蒙山），〔七叶莲〕（藤县），凉心薯（苍梧），细叶山莲藕（陆川），猪子力（大瑶山），猪力子。

**功效** 根：有毒。健胃，泻火，镇静，滋补，壮筋骨，润肺。用于毒疮，瘰癧，肺癆。

## 7148451

*Millettia ichthyochtona* Drake

**植物名** 扁果崖豆藤《中国树木志》  
**药材名** 冲天果《云南中草药》  
**文献名** 闹鱼崖豆《植分学报》，闹鱼岩豆树《云南种录》，乔木鸡血藤《云南药录》  
**地方名** 云南：闹鱼藤、毒鱼藤（红河），冲天子（红河、河口）。

**功效** 根、叶、果：有大毒。消肿拔毒，止痒。外用用于秃顶，疮疖红肿，异物入肉，皮疹，皮肤瘙痒，跌打损伤，骨折，外伤。民间用作毒鱼药，农药。

## 7148452

*Millettia leptobotrya* Dunn

**植物名** 窄序崖豆藤《中国树木志》  
**药材名** 葛根跌打《云南药录》  
**文献名** 长序岩豆树《西双版纳傣药志》，窄序岩豆《云南种录》，思茅崖豆《植分学报》

地方名 云南:“合罕郎”(西双版纳傣语)。

功效 叶、根:麻醉止痛,活血散瘀,舒筋络,祛湿利水。用于骨折筋伤,跌打损伤,风湿性关节炎,腰痛,脚气水肿,腹水。

#### 7148453

*Millettia nitida* Benth. --- *M. kueichouensis* Hu

植物名 亮叶崖豆藤《中国树木志》

药材名 亮叶崖豆藤《广西药录》

文献名 亮叶鸡血藤《海南植志》,光叶崖豆藤《高植图鉴》,岩豆藤根、岩豆藤花《贵州民间药物》,大血藤、血贯藤、老菟豆藤、小鸡血藤、贵州崖豆藤《中药大辞典》

地方名 鸡血藤(湖南、广东、广西);湖南:老鼠豆;广东:毒鱼藤(曲江),老人根,老京藤,硬根藤;广西:血藤、血风藤(靖西),黄狗肾(桂林),血节藤,血筋藤;贵州:老鸡藤,崖豆藤。

功效 根、茎:活血补血,通经活络;花:用于鼻衄;老藤:用于乳癌。

#### 7148454

*Millettia nitida* Benth. var. *hirsutissima* Z. Wei --- *M. hirsutissima* Z. Wei

植物名 丰城崖豆藤《植分学报》

药材名 丰城鸡血藤《广西药录》

地方名 江西:鸡血藤,大活血;广西:老人筋(贺县)。

功效 茎:行血通经;根、茎:用于风湿骨痛,跌打损伤,肝炎,贫血。

#### 7148455

*Millettia nitida* Benth. var. *minor* Z. Wei

植物名 峨眉崖豆藤《植分学报》

功效 茎:活血行经。

#### 7148456

*Millettia oosperma* Dunn

植物名 皱果崖豆藤《中国树木志》

药材名 皱果崖豆藤《广西药录》

文献名 蛋果崖豆藤、大种崖豆藤《豆科图说》

地方名 海南:大叶老京藤,豆藤;广西:山狗豆(北流)。

功效 茎:用于贫血;种子:用于痢疾。

#### 7148457

*Millettia pachycarpa* Benth. --- *M. dunnii* Merr. --- *M. taiwaniana* Hayata

植物名 厚果崖豆藤《豆科图说》

药材名 苦檀子《汇编》

文献名 苦檀叶、土大风子《草木便方》,厚果鸡血藤、少果鸡血藤、台湾崖豆藤《豆科图说》,藤藤《台湾药植志》

地方名 毒鱼藤、[鸡血藤](湖南、广西、四川、贵州),苦蚕子(湖南、贵州),冲天子(广东、广西、云南),鱼藤(台湾、广东);台湾:枰藤,露藤,雷藤,毒藤;湖南:比卡卡(湘西),秤杆子,岩豆藤;广西:[土甘草](乐业),狗学藤(桂平),吕洞宾,茜根,大藤藤;四川:[络石

藤](重庆),树口头鸡(峨眉),口头鸡、[血藤];贵州:牛牯大力,猪腰子;云南:闹鱼藤(思茅),红药(潯江);西藏:“阿哲”(藏名)。

功效 根、叶、种子:有大毒。散瘀消肿。外用于跌打损伤,骨折,皮肤病,毒蛇咬伤;茎汁:用于虫齿,皮肤病,毒蛇咬伤。

#### 7148458

*Millettia pachyloba* Drake --- *M. lasiopetala* (Hayata) Merr.

植物名 海南崖豆藤《豆科图说》

药材名 毒鱼藤(福建、广东、广西)

文献名 海南岩豆藤、海南鸡血藤《豆科图说》,毛蕊鸡血藤《中药大辞典》,毛鸡血藤《海南植志》,毛瓣崖豆藤《广西植录》

地方名 广东:雷公藤蹄(阳春),鱼藤,白药根老藤;海南:岛鱼藤;云南:毛刀豆;其他:「苦木」。

功效 根、茎、叶:有大毒。外用于杀虫止痒,逐湿痹。

#### 7148459

*Millettia pulchra* Kurz --- *M. pulchra* Kurz var. *typica* Dunn

植物名 美花崖豆藤《植分学报》

药材名 美花崖豆藤《湖南药物志》

文献名 印度鸡血藤《广州植志》,疏叶美花崖豆藤《广西中药志》,南亚岩豆树《云南种录》,印度崖豆《植分学报》,疏叶鸡血藤《海南植志》

地方名 栲柳(广东、云南);湖南:推人上天,马蹄造;广西:水流豆(容县),土甘草,小牛力;云南:老秧叶。

功效 根:有小毒。活血止血。用于风湿关节痛,跌打损伤,痔血,风疹发痒;叶:用于水痘。

#### 7148460

*Millettia pulchra* Kurz f. *laxior* (Dunn) Z. Wei --- *M. pulchra* Kurz var. *typica* forma *laxior* Dunn

植物名 疏叶美花崖豆藤《中药大辞典》

文献名 美花崖豆藤《广西药录》,疏叶崖豆藤《广西植录》,疏叶鸡血藤《海南植志》,疏叶鸡血树《云南种录》,疏叶崖豆《植分学报》

地方名 广东:老秧叶;广西:土甘草(南宁、凌云),单刀根(武宣),小牛力。

功效 根:散瘀,消肿,止痛,宁神。用于跌打肿痛;叶:外用于疮疡肿毒,跌打损伤。

#### 7148461

*Millettia reticulata* Benth.

植物名 网络崖豆藤《品种论述》

文献名 酢甲《质问本草》,网络鸡血藤《豆科图说》,〔鸡血藤〕《高植图鉴》,〔昆明鸡血藤〕《中药大辞典》

地方名 红藤(浙江、广东),〔血藤〕(浙江、福建、广东、贵州),白血藤(浙江、福建);浙江:土鸡豆(杭州),光叶朱藤,黄昭藤,松藤,马尿血豆,马屎血豆,水桶荚,崖儿藤;江西:赵藤根(萍乡);安徽:野豆,三月黄,渣子树,纤藤花,杂骨豆;福建:地瓜刮、河边刮(三明),虎舌

丙屎藤(明溪),雷公刮屎怕、鬼豆藤(清流),雷公甲尿(宁化);台湾:过山龙、[葛藤];湖南:行血风、硬壳子藤(衡阳),老鼠豆(黔阳、新晃),岩豆角藤(黔阳),[黄藤](望城、长沙),蓝藤(湘阴、浏阳),青皮活血,血防藤,血灌皮;广东:牛牯大力(徐闻、海康、廉江、遂溪、电白),马上消(罗定),马古力菇(化州、茂名、阳江、阳春),白牵牛(高州),活血藤(广州),山葛藤(高要、高鹤),刷风藤(乐昌),蛤蚧藤(广宁、四会、德庆、封开、怀集),毒鱼藤;海南:老荆藤,螭螭藤;广西:白骨藤(阳朔),马下消(南宁),[青藤](桂平),野豆角木(柳江),大肠草,大肠藤,土毒鱼藤,血筋藤,老凉藤;其他:芦藤,崖豆,紫薇藤。

**功效** 茎:养血祛风,通经活络;根:有小毒。镇静。用于狂躁型精神分裂症。

**备考** 过去很多文献误此为昆明鸡血藤,实际上只有南方个别地区以此为鸡血藤入药。

## 7148462

*Millettia speciosa* Champ.

**植物名** 美丽崖豆藤《中国树木志》

**药材名** 牛大力《岭南采药录》、《汇编》

**文献名** 大力牛、大口唇、扮山虎《生草药性备要》, [扒山虎]《岭南采药录》,牛大力藤《海南植志》

**地方名** 广东:大力薯(阳春),牛牯大力(湛江),入地鸭(广宁、四会、怀集),叶芝麻(乐昌),大口牛、甜牛大力(佛山),金钟根(潮阳),金兰根(潮安),倒吊金钟,牛牯大力土,山藕,大力茨,猪脚笠,牛牯大力藤,老惊藤;海南:毒辣藤(琼中);广西:大力茄(北海),大力鸡、牯大力(博白),大莲藕(陆川),[土黄芪](藤县),山狗豆(北流),坡莲藕(陆川、龙州、平南、桂平、北流、蒙山、藤县),血藤(岑溪、藤县、桂平、陆川、平南),血风藤(桂平),闭风藤(贵县),地藕(南宁),[穿破石](梧州),山莲藕(陆川),痘雍薯。

**功效** 根:补虚润肺,强筋活络。用于腰肌劳损,风湿性关节炎,肺结核,慢性支气管炎,慢性肝炎,遗精,白带。

## 7148463

*Millettia tsui* Metc.

**植物名** 喙果崖豆藤《中国树木志》

**药材名** 喙果崖豆藤《广西药录》

**文献名** 喙果鸡血藤《海南植志》,崔氏崖豆藤《广西药录》,虎崖豆藤《品种论述》

**地方名** 广西:风藤(靖西),血皮藤(瑶山),连珠豆(博白),假猫豆(天等),老虎豆。

**功效** 根、茎:行血,补气,祛风。用于风湿骨痛;叶:外用于疮疖。

## 7148464

*Mimosa pudica* L.

**植物名** 含羞草《中国植志》

**药材名** 含羞草《岭南采药录》、《汇编》

**文献名** 知羞草《南越笔记》,怕羞草《生草药性备要》,喝呼草、惧内草《名实图考》,将喝草《豆科图说》,感应草《简明中医辞典》

**地方名** 怕丑草(安徽、广东、云南),呼喝草(广东、广西);福建:羞耻草(福州),畏尧草(龙溪),无名草(龙岩);台湾:羞消草,消草;广东:怕夫草(岭南);广西:望江南(南宁),赫虎草,害羞草;云南:“牙对约”(西双版纳傣语)。

**功效** 全草:有小毒。清热利尿,化痰止咳,安神止痛。用于感冒,小儿高热,急性结膜炎,支气管炎,胃炎,肠炎,泌尿系结石,疟疾,神经衰弱,全身水肿。外用于跌打肿痛,疮疡肿毒,咯血;鲜叶:外用于带状疱疹;根:止咳化痰,利湿通络,和胃,消积。用于慢性支气管炎,风湿疼痛,慢性胃炎,小儿消化不良。

**备考** 《东北草本志》5:61,1976载称:南美民间曾用叶、枝、根制膏剂作抗肿瘤药物。

## 7148465

*Mucuna birdwoodiana* Thich.

**植物名** 白花油麻藤《高植图鉴》

**药材名** 白花油麻藤《汇编》

**文献名** 勃氏黎豆《中药志》,白花黎豆《福建植志》,血藤《广西植录》

**地方名** [鸡血藤](浙江、广东、广西);广东:血风藤(广州),雀儿花;广西:大兰布麻(大苗山),毡豆(陆川),鹰嘴花(宾阳)。

**功效** 藤茎:补血,通经络,强筋骨。用于贫血,白细胞减少症,月经不调,腰腿痛。

**备考** 种仁含左旋多巴6.25%~6.56%。

## 7148466

*Mucuna castanea* Merr.

**植物名** 褐毛黎豆《高植图鉴》

**药材名** 黑血藤《汇编》

**文献名** 栗茸油麻藤《豆科图说》

**地方名** 黑肉风(广东、广西);广东:牛豆藤,肉麻纛;海南:牛豆;广西:牛藤。

**功效** 老茎:清肺热,止咳,舒筋活血。用于肺燥咳,咳血,腰膝酸痛,月经不调,贫血,萎黄病。

## 7148467

*Mucuna championi* Benth.

**植物名** 绢毛油麻藤《中国树木志》

**药材名** 绢毛油麻藤《湖南药物志》

**文献名** 港油麻藤《豆科图说》,雀蛋豆《南方毒植》

**地方名** 湖南:山峨峨豆,牛腿薯,乌葛,南芪,棉芪。

**功效** 根:有小毒。祛风湿,舒筋络。用于风湿关节痛,腰腿痛,肠炎,腹泻,伤风感冒,无汗恶寒。

## 7148468

*Mucuna gigantea* (Willd.) DC.

**植物名** 巨黎豆《海南植志》

**文献名** 大血藤《台湾药植志》

**功效** 种子:壮阳;树皮:用于风湿性关节炎。

## 7148469

*Mucuna macrocarpa* Wall. --- *M. ferruginea* Matsum.

**植物名** 长荚油麻藤《中国树木志》

**药材名** 长荚油麻藤《中药大辞典》

**文献名** 大果油麻藤《云南种录》,血藤、大果禾雀花

《台湾药植志》，葛叶藤《观赏树木学》，锈毛油麻藤《品种论述》

地方名 台湾：青山笼；四川：老鸦花、老鸦枕头、山胡豆（盐边），岩胡豆（西昌）；云南：大血藤，小老鸦枕头，老鸦花藤，“嘿良龙”（傣语）。

功效 茎：强筋壮骨，调经补血。用于小儿麻痹后遗症，贫血，月经不调，风湿筋骨痛。

备考 马来人谓本属植物具有刺激性毛，故名虎豆、猪豆，其茎叶及荚果之毛穿入人之皮肤，可引起刺激，入肠则引起出血，衰损，死亡。

#### 7148470

*Mucuna nigricans* Steud. --- *M. membranacea* Hayata

植物名 野黎豆《台湾药植志》

功效 茎汁：用于多种发烧。

#### 7148471

*Mucuna nigricans* (Lour.) var. *hongkongensis* Wilmot. -Dear

植物名 香港黎豆《广西药录》

地方名 广西：山峨眉（钟山）。

功效 茎：用于风湿骨痛。

备考 种子及豆荚上的毛有毒。

#### 7148472

*Mucuna paohwashanica* Tang et Wang

植物名 宁油麻藤《中国树木志》

药材名 宁油麻藤《汇编》

地方名 湖南：峨眉豆（瑶名）。

功效 根：活血散瘀，消肿止痛。用于跌打肿痛，骨折。

#### 7148473

*Mucuna sempervirens* Hemsl.

植物名 常春油麻藤《高植图鉴》

药材名 常春油麻藤《中药志》

文献名 过山龙、牛马藤《草木便方》，油麻藤《植物名汇》，常绿油麻藤《汇编》，绵麻藤《云南种录》，藤花、棉麻藤、常绿黎豆《豆科图说》

地方名 牛麻藤（陕西、湖北、四川），老鸦枕头（陕西、四川）；浙江：棉藤（兰溪），祛风藤（建德、吴兴），[海风藤]，大血藤，血藤，大活血，三叶柱；福建：人丹胶藤，牛肠藤，肉藤，鸡血藤；湖南：山刀豆，黑风；四川：老鸦藤（蓬溪），乌通，过山藤，鬼见怕，黎豆，黎豆藤；贵州：油麻血藤，老鸦藤；云南：土巴豆（碧云、洱沅）；西藏：“拉嘎消夏”（藏名）。

功效 根、茎、叶：活血化瘀，祛风除湿，通经活络。用于跌打损伤，风湿疼痛，麻木，痛经，经闭；种子：用于震颤性麻痹。

备考 种子有毒，不宜混作刀豆用。

#### 7148474

*Mucuna subferruginea* Hayata

植物名 近锈毛油麻藤《品种论述》

地方名 台湾：血藤。

功效 根、茎：活血化瘀，祛风除湿，通经活络。

#### 7148475

*Mucuna wangii* Hu

植物名 鹦哥花藤《云南种录》

药材名 鹦哥花藤《汇编》

文献名 王氏油麻藤《豆科图说》，密绒毛油麻藤《中药大辞典》

地方名 云南：大血藤（思茅），“嘿良龙”（傣名），老鸦花藤。

功效 茎：舒筋活络。用于月经不调，小儿麻痹后遗症。

#### 7148476

*Mundulea suberosa* Benth.

植物名 栓皮豆《台湾药植志》

功效 茎、种子、荚果：杀虫。

#### 7148477

*Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzsch

植物名 秘鲁香胶树《台湾药植志》

药材名 秘鲁香胶《中药大辞典》

文献名 拔尔撒摩、百露拔尔撒摩树、秘鲁巴尔树《纲目拾遗》，秘鲁树香、秘鲁树香脂、秘鲁浆、百露香树脂、秘鲁脂（叶《生药》），秘鲁香树（徐《生药》）

功效 树脂（香胶）：用于杀菌，祛痰。外用于疥疮，钱癣。

#### 7148478

*Myroxylon toluiferum* Humb. et Kunth

植物名 吐鲁香胶树《台湾药植志》

药材名 吐鲁香胶《台湾药植志》

功效 香胶：用于慢性气管炎。

#### 7148479

*Nogra simplicifolia* (Dalz.) Raiz.

植物名 广西土黄芩（拟）

文献名 土黄芩《广西药录》

功效 根：用于胸膜炎，胸痛，风湿骨痛，水肿，脚气病，胃脘痛，呕吐，咳嗽。

#### 7148480

*Ormosia fordiana* Oliv. --- *Ruddia fordiana* (Oliv.) Yakovl.

植物名 肥荚红豆《高植图鉴》

药材名 肥荚红豆《汇编》

文献名 福氏红豆《树分》

地方名 广东：小孔雀豆，鸡胆豆，青炒，青皮木，青竹蛇，鸭公青，鸡冠豆、鸡冠果（信宜）；海南：食虫树；广西：大红豆，三榕，林罗木，圆子红豆。

功效 茎皮、根、叶：有小毒。清热解毒，消肿止痛。用于急性肝炎，跌打损伤，肿痛，风火牙痛，烧烫伤。

#### 7148481

*Ormosia glaberrima* Wu --- *O. kwangiensis* L. Chen

植物名 光叶红豆《高植图鉴》

文献名 广西红豆树《中国树木志》

地方名 海南：青同。

功效 种子：用于痢疾。

#### 7148482



*Ormosia henryi* Prain

植物名 花榈木《高植图鉴》

药材名 花榈木《纲目》、《汇编》

文献名 桐木《本草拾遗》, 花梨木《琼州府志》, 亨氏红豆《树分》, 毛叶红豆树《浙江药植志》

地方名 三钱三(江西、福建), 红豆树(江西、云南); 浙江: 烂锅底柴(淳安), 臭桶柴(浙南), 臭桐柴, 臭木, 烂锅柴; 江西: 一股青、铁尺子树、臭桐树(德兴), 臭树(婺源), 青竹蛇(抚州), 嗦罗子树(泰和), 鸭公青, 硬皮黄槿; 福建: 普高牛根(三明), 牛屎夹夹(明溪), 牛屎樵(清流), 胡钩饭、肥猪肉(永安), 牛屎柴; 湖南: 相思树(新邵), [大青叶]、天丝虫(郴县), 青皮树, 青龙捆地, 青豆风柴。

功效 根、根皮、茎及叶: 有毒。活血化瘀, 祛风消肿。用于跌打损伤, 腰肌劳损, 风湿关节痛, 产后血瘀腹痛, 白带, 流行性腮腺炎, 丝虫病; 根皮: 外用于骨折; 叶: 外用于烫伤。

## 7148483

*Ormosia hosiei* Hemsl. et Wils. --- *O. taiana* C. Y. Chiao

植物名 红豆树《高植图鉴》

药材名 红豆树《汇编》

文献名 鄂西红豆、鄂西红豆树《树分》, 江阴红豆、何氏红豆《树分》

地方名 江苏: 江阴红豆树(江阴), 红宝树, 宝树; 浙江: [花梨木]; 福建: 黑樟, 樟丝, 红豆柴, 胶丝; 四川: 红豆木(峨眉山), 红豆树米(南充), 红豆; 贵州: 相思豆; 其他: 南国红豆, 红豆相思。

功效 种子: 有小毒。理气, 通经。用于疝气, 腹痛, 血滞, 闭经; 根: 用于风湿关节痛。

## 7148484

*Ormosia indurata* L. Chen

植物名 初荚红豆《中国树木志》

地方名 广西: 树黄豆(融安)。

功效 种子: 用于跌打损伤。

## 7148485

*Ormosia microphylla* Merr. ex L. Chen

植物名 小叶红豆《中国树木志》

文献名 绒毛小叶红豆《福建植志》

地方名 广东: 红心红豆(广州), 黄姜丝; 广西: 假苏木(上林、武鸣), 苏檀木树, [紫檀], [紫檀木], [苏木]。

备考 近来在广西发现误作苏木(*Caesalpinia sappan* L.)收购。

## 7148486

*Ormosia nuda* (How) R. H. Chang et Q. W. Yao --- *O. henryi* Prain var. *nuda* How

植物名 光叶花榈木《中国树木志》

文献名 秃叶花榈木《豆科图说》, 秃叶红豆《植分学报》, 秃叶红豆树《新华本草纲要》

地方名 贵州: 红豆树。

功效 根皮: 外用于跌打损伤。

## 7148487

*Ormosia semicastrata* Hance

植物名 软荚红豆《高植图鉴》

药材名 红豆《纲目》。

文献名 相思豆、相思子《纲目》, 相思木《述异记》, 红豆树《树分》

地方名 广东: 黄姜树, 山鸭公青; 广西: 红相思。

功效 种子: 有小毒, 理气通经; 根: 解热毒, 镇虚气痛。

## 7148488

*Ormosia xylocarpa* Chun ex Merr. et L. Chen

植物名 木荚红豆《高植图鉴》

药材名 琼州红豆(海南)

地方名 江西: 欢五柴; 广东: 山鸭公青, 姜黄树, 黄姜树; 广西: 白果木, 牛假森, 羊胆木, 野油坛树。

功效 种子: 有小毒, 理气通经; 根: 解热毒, 镇虚气痛。

## 7148489

*Oxytropis aciphylla* Ledeb.

植物名 刺叶柄棘豆《高植图鉴》

文献名 猫头刺《内蒙古植志》

地方名 内蒙古: “奥日图哲”(蒙名), 老虎爪子, [鬼见愁]。

功效 茎叶: 外用于脓疮。

## 7148490

*Oxytropis anertii* Nakai

植物名 长白棘豆《东北草本植志》

功效 全草: 用于痢疾肿毒。

## 7148491 见 7148492a

## 7148492

*Oxytropis chiliophylla* Royle

植物名 轮叶棘豆《西藏植志》

药材名 莨大夏(《药典》附录)

功效 全草: 有毒。清热解毒, 生肌。用于高烧, 喉炎, 痢疾, 创伤出血。

备考 《西藏植志》第二卷载称:《西藏常用中草药》第165页的轮叶棘豆学名系误订, 按描写应为小叶棘豆 *O. microphylla* (Pall.) DC.

## 7148492a

*Oxytropis coerules* (Pall.) DC.

植物名 蓝花棘豆《高植图鉴》

地方名 河北: [山黄芪] (临城、邢台), [黄芪]; 山西: 人头草(晋西)。

备考 河北、山西以其根混作黄芪入药, 应注意鉴别。

## 7148493

*Oxytropis falcata* Bunge

植物名 镰荚棘豆《西藏植志》

药材名 莨大夏(《药典》附录)

文献名 镰形棘豆《高植图鉴》

地方名 青海: “大夏”(藏名); 四川: “达哈”(若尔盖藏名)。

功效 全草: 有毒。清热解毒, 生肌。用于高烧, 喉炎, 痢疾, 创伤出血。

## 7148494

*Oxytropis glabra* DC. --- *O. diffusa* Ledeb. --- *O. dark-eana* Franch.

植物名 小花棘豆《高植图鉴》

药材名 醉马草《沙漠药植》

文献名 断肠草、勺草《汇编》

地方名 马绊肠、醉马豆(西北);内蒙古:“扫格图-奥日图哲”、“扫格图-额布斯”、“霍勒-额布斯”、“乌森赫尔斯”(蒙名);青海:〔黄芩〕。

功效 全草有毒。镇静,麻醉,止痛。用于关节痛,牙痛,神经衰弱,皮肤痒痒症。

## 7148495

*Oxytropis hailarensis* Kitag. --- *O. oxyphylla* DC. --- *O. hulunbailensis* H. C. Fu et Cheng f.

植物名 海拉尔棘豆《沙漠植志》

药材名 泡泡草《沙漠药植》

文献名 山棘豆《汇编》,呼伦贝尔棘豆《东北草本植志》

地方名 内蒙古:“达格沙”(乌审旗蒙名),“恩贡格-乌布斯”(蒙名),尖叶棘豆,山泡泡,羚羊蛋。

功效 全草:清热解毒。用于疮疖肿痛,乳腺炎初期,感冒,癰病结核,急性慢性湿疹。

## 7148496

*Oxytropis hirta* Bunge

植物名 硬毛棘豆《高植图鉴》

文献名 毛棘豆《东北草本植志》,棉花紫云英《豆科图说》

地方名 辽宁:蛤蟆草(锦州);内蒙古:“希如文-奥日图哲”(蒙名)。

功效 根:用于感冒。

## 7148497

*Oxytropis kansuensis* Bunge

植物名 甘肃棘豆《高植图鉴》

药材名 甘肃棘豆《高原中草》

地方名 青海:“塞嘎尔”(藏名);四川:“色舍儿”(若尔盖藏名)。

功效 全草:解毒,医疮,止血利尿。用于各种内出血,水肿。

## 7148498

*Oxytropis leptophylla* (Pall.) DC. --- *Astragalus leptophylla* Pall.

植物名 薄叶棘豆《高植图鉴》

药材名 薄叶棘豆《汇编》

文献名 光棘豆《东检》

地方名 吉林:棘豆根;内蒙古:山泡泡。

功效 根:清热解毒。用于秃疮,癰病。

## 7148499

*Oxytropis melanocalyx* Bunge

植物名 黑萼棘豆《高植图鉴》

药材名 黑萼棘豆《高原中草》

地方名 青海:“塞完”(藏名);四川:“色昂”(藏名)。

功效 全草:排毒医疮,利尿消肿,退烧,镇痛,催

吐。用于腹水,风疹,丹毒,溃瘍病,胃痉挛,水肿。外用于创伤。

## 7148500

*Oxytropis microphylla* (Pall.) DC. --- *O. tibetica* Bunge --- *Astragalus microphylla* (Pall.) Pall. --- *Oxytropis chiliophylla* auct. non Royle ex Benth.

植物名 小叶棘豆《西藏植志》

药材名 小叶棘豆《青藏药图》

文献名 藏棘豆《豆科图说》,〔轮叶棘豆〕《西藏中草》

功效 全草:有小毒。止血消炎,止泻镇痛。用于疮疖肿痛,肠炎腹泻,炭疽。外用于疮伤。

备考 《西藏常用中草药》第165页的“轮叶棘豆”*O. chiliophylla* Royle ex Benth. 为本种之误订。

## 7148501

*Oxytropis myriophylla* (Pall.) DC. --- *Phaca myriophylla* Pall.

植物名 狐尾藻棘豆《高植图鉴》

药材名 鸡瓠草《内蒙古中草药》

文献名 多叶棘豆《中药大辞典》

地方名 内蒙古:“敖兰查-敖日都渣”、“达兰-奥日图哲”、“哈勒达格消”(蒙名),长肉芽草;青海:“奥打夏”(藏名)。

功效 全草:清热解毒,消肿,祛风湿,止血。用于流行性感胃,咽喉肿痛,痈疮肿毒,创伤,瘀血肿胀,各种出血。

## 7148502

*Oxytropis ochrocephala* Bunge

植物名 黄花棘豆《高植图鉴》

药材名 黄花棘豆《青藏药图》

地方名 甘肃:“团巴草”(藏名),醉马草,马绊肠,极恶草;青海:“塞嘎尔”(藏名)。

功效 花:用于各种水肿;全草:对实验肿瘤有抑制作用。

## 7148503

*Oxytropis psammocharis* Hance

植物名 砂珍棘豆《高植图鉴》

文献名 砂棘豆、东北棘豆《豆科图说》

地方名 内蒙古:“额勒森-敖日都札”、“额勒苏音-奥日图哲”、“泡静-额布斯”(蒙名),沙棘豆,泡泡草。

功效 全草:消食健脾。用于小儿消化不良。

## 7148504

*Oxytropis yunnanensis* Franch.

植物名 云南棘豆《高植图鉴》

地方名 青海:“塞玛莫保”(藏名)。

功效 花:用于各种水肿。

## 7148505

*Pachyrhizus erosus* (L.) Urban --- *P. angulatus* Rich. --- *Dolichos erosus* L. --- *Cacara erosa* Kuntze

植物名 豆薯《高植图鉴》

药材名 凉薯《汇编》

文献名 白土瓜《滇南本草》,番葛、刈薯《植物名

汇》,葛瓜、土萝卜、地瓜子《中国药植志》

地方名 地瓜(江苏、浙江、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南),土瓜(湖南、四川、贵州、云南),凉瓜(四川、贵州、云南),沙葛(江西、广东、广西),葛薯(台湾、广西),上芋、草瓜茄(广东、广西);江西:地萝卜;台湾:蕃薯;广西:沙葛花(苍梧、博白),贫人果;贵州:地萝卜子,凉薯子。

功效 块根:止渴,解酒毒。用于慢性酒精中毒;种子:有毒。外用于疥癣,痈肿;花:解酒毒。用于酒毒烦渴,肠风下血。

#### 7148506

*Parkia biglobosa* Benth. --- *P. leiophylla* Kurz

植物名 白球花《云南种录》

文献名 黄球花《西双版纳傣药志》,球花豆《高植图鉴》

地方名 云南:“哈柄栽”(西双版纳傣语),派克木;其他:大叶球花豆,大叶巴克豆,埋皇广。

功效 根皮:祛风除湿,用于疮疡疔肿。

#### 7148507

*Parkinsonia aculeata* L.

植物名 扁轴木(海南)、《中国植志》

文献名 扁叶轴木《豆科图说》,巴金生豆《科属词典》

功效 树皮、叶:补虚劳。用于一般衰弱症。

#### 7148508

*Paroetus communis* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 紫雀花《云南种录》

药材名 金雀花《汇编》

文献名 蓝花接骨草《滇南本草》

地方名 生血草(四川、云南);四川:水惊风;贵州:一颗血;云南:一点血,一点红,蓝雀花。

功效 全草:补肾壮阳,接骨止血。用于肾虚阳痿,创伤出血,跌打骨折。

#### 7148509

*Peltophorum pterocarpum* (DC.) Backer ex K. Heyne --- *P. inerme* (Roxb.) Naves --- *P. ferrugineum* Benth.

植物名 盾柱木《中国植志》

药材名 盾柱木《台湾药植志》

文献名 双翼豆《豆科图说》,双翅果《中国树木志》

功效 树皮:用于痢疾。外用于擦伤,筋痛,溃瘍等。

#### 7148510

*Phaseolus angularis* (Willd.) W. F. Wight --- *Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et Ohashi --- *Azuka angularis* (Willd.) Ohwi --- *Dolichos angularis* Willd.

植物名 赤豆《唐本草》、《高植图鉴》

药材名 赤小豆《本经》、《药典》

文献名 赤小豆花《药性论》,藿、赤小豆叶《别录》,荅《广雅》,红豆《滇南本草》,赤小豆芽《纲目》,红饭豆《增订伪药条辨》,朱赤豆《中药志》,麻熟、湍豆、花小豆、黑小豆《满洲植录》,微小豆、金红小豆、杜世豆、野世豆、猪肝豆、米赤、朱小豆、茅紫赤《药材学》,野赤豆、

芳紫豆《中草药学》,朱赤豆《中药志》

地方名 小豆(北京、陕西、湖北),红小豆(东北、北京、台湾);江苏:四叶赤豆(昆山),红赤豆(常熟、宜兴);台湾:米豆;湖北:蚕豆;湖南:血豆(永兴),菜豆(新邵),饭豆子,全红豆;广西:小红录豆、虱姆豆(陆川);四川:红豆根(成都);云南:饭豆。

功效 种子:利水消肿,解毒排脓。用于水肿胀满,脚气浮肿,黄疸尿赤,风湿热痹,痈肿疮毒,肠痈腹痛;叶:用于小便频数,遗尿;豆芽:用于便血,妊娠胎漏;花:清热,止渴,醒酒,解毒。用于疟疾,痢疾,消渴,伤酒头痛,痔瘡下血,丹毒,疔疮。

#### 7148511

*Phaseolus calcaratus* Roxb. --- *Vigna umbellata* (Thunb.) Ohwi et Ohashi --- *Azukia umbellata* (Thunb.) Ohwi --- *Dolichos umbellatus* Thunb.

植物名 赤小豆《高植图鉴》

药材名 赤小豆《本经》、《药典》

文献名 藿、赤小豆叶《别录》,赤小豆花《药性论》,赤豆《日华子本草》,红豆、赤小豆芽《纲目》,红小豆《本草原始》,猪肝赤《本经逢原》,杜赤豆《本草便读》,小豆《经植手册》,米赤、米赤豆、茅柴赤《中药大辞典》

地方名 广西:小红绿豆、朱小豆(陆川);云南:饭豆。

功效 种子:利水消肿,解毒排脓。用于水肿胀满,脚气浮肿,黄疸尿赤,风湿热痹,痈肿疮毒,肠痈腹痛;豆芽:用于便血,妊娠胎漏;叶:用于小便频数,遗尿;花:清热,止渴,醒酒,解毒。用于疟疾,痢疾,消渴,伤酒头痛,痔瘡下血,丹毒,疔疮。

#### 7148512

*Phaseolus lunatus* L.

植物名 金甲豆《高植图鉴》

药材名 金甲豆《台湾药植志》

文献名 菜豆《豆科图说》,棉豆《海南植志》

地方名 台湾:观音藤,黄帝豆,五色豆;广西:荷包豆,雪豆,香豆。

功效 种子:补血,消肿。用于胃痛;根:用于印度痘。

#### 7148513

*Phaseolus minimus* Roxb.

植物名 山绿豆《高植图鉴》

药材名 山绿豆《广西药录》

文献名 贼小豆《豆科图说》

地方名 湖北:野小豆(神农架);广西:禾花豆(贺县)。

功效 种子:行气止痛。

#### 7148514

*Phaseolus radiatus* L. --- *vigna radiata* (L.) R. Wilczak --- *Phaseolus mungo* auct. non L. --- *P. aureus* auct. non Roxb.

植物名 绿豆《高植图鉴》

药材名 绿豆《开宝本草》、《汇编》

文献名 青小豆《圣惠方》,真粉《日用本草》,绿豆

皮、绿豆叶、绿豆芽、绿豆花、绿豆粉〔纲目〕, 绿豆壳〔本经逢原〕, 豆芽菜〔本草汇言〕, 文豆、拔绿、摘绿、植豆、八重生〔新纲〕

地方名 绿豆衣(山西、浙江、贵州); 内蒙古: “诺古干·宝日其格”(蒙名); 福建: 小豆、细豆(闽南)。

功效 种子、种皮(绿豆皮): 清热祛暑, 解毒。用于预防中暑, 暑热烦渴, 疮疖肿毒, 药物、食物中毒; 叶: 用于吐泻, 斑疹, 疔疮, 疹癍; 花: 解酒毒; 豆芽: 解酒毒, 热毒, 利三焦; 淀粉: 清热解暑。用于痈疽疮肿初起, 烫伤, 跌扑伤, 解热药及酒食诸毒。

备考 有些文献曾将学名误订为 *Phaseolus mungo* L. 及 *P. aureus* Roxb.

#### 7148515

*Phaseolus vulgaris* L.

植物名 菜豆〔高植图鉴〕

药材名 菜豆〔纲目〕、《中药大辞典》

文献名 刀豆〔滇南本草〕, 云扁豆、四季豆、龙爪豆〔名实图考〕, 花云豆、白云豆、家雀豆〔植物名汇〕, 唐虹、隐元豆〔植物学大辞典〕, 芸豆、六月鲜、龙骨豆、二生豆、唐豆〔豆科图说〕, 二度豇豆、五月豇豆、不老〔清蒙植汇〕, 龙牙豆〔种分〕

地方名 豆角(东北、内蒙古、湖北); 北京: 扁豆; 内蒙古: “宝日其格”(蒙名), 蓬豆; 湖北: 芸扁豆, 花梅豆; 广东: 高脚龙牙豆(广州); 广西: 白豆, 白饭豆、粉豆(陆川); 云南: 泥鳅豆。

功效 种子: 滋养, 解热, 利尿, 消肿。用于水肿, 脚气病; 荚果(烧灰): 用于风寒湿气。

备考 《内蒙古植志》(1977)及《东北草本植志》(5, 1976)等注称: “国外报导, 其豆荚的煎剂和煎剂可治糖尿病, 并用植株、种子、豆荚作抗癌、肿瘤、乳等药”

#### 7148516

*Phaseolus yunnanensis* Wang et Tang

植物名 滇绿豆〔豆科图说〕

药材名 滇绿豆〔广西药园药录〕

功效 种子: 利尿, 消肿。

#### 7148517

*Phyllodium elegans* (Lour.) Desv. --- *Desmodium blandum* Van Meeuwen

植物名 毛排钱树〔中国树木志〕

药材名 毛排钱草〔广西中药志〕

文献名 梭狸鳞、蛟鲤鳞〔豆科图说〕, 绒毛排钱草〔江西药录〕, 鳞狸鳞〔中药大辞典〕

地方名 排钱草(福建、广东、广西), 钱剑草(广东、广西); 福建: 毛钱排, 拉里莲; 广东: 山纸钱、水大人、阿婆钱、钱串草(新会), 准管准带(中山), 亚婆钱(花县), 子钱花(遂溪), 钱排草(德庆), 大株排钱草(新兴), 黄桂叶(乐东), 看牛郎(清远), 钱玲树(新兴), 午时合、日开夜合、掌牛奴(潮阳); 海南: 山甲叶(琼中), 灵利甲(儋县), 箩李、拉利草(澄迈), 连里尾树; 广西: 叠钱草(南宁), 串钱草、船排木(贵县), 串钱木(陆川), 头边草(苍梧), 千斤拔(三江), 花落地(马山), 大罗伞、山甲尾(北流), 文钱木、钱寸树(河池), 大叠钱(桂西), 钱串木

(横县), 麒麟尾(北流、岑溪), 麒麟片。

功效 根及地上部分: 散瘀消肿, 去湿滞风热。用于跌打, 乳疮, 咳血, 血淋, 小儿牙疳及锁喉, 牙痛, 头疮, 疳积, 瘰癧, 风湿骨痛。

#### 7148518

*Phyllodium kurzianum* (Kuntze) Ohashi

植物名 云南排钱树〔中国树木志〕

文献名 云南排钱草〔中国树木志〕

功效 全株: 清凉解热。

#### 7148519

*Phyllodium longipes* (Craib) A. K. Schindl. --- *Desmodium longipes* Craib

植物名 长叶排钱树〔云南种录〕

文献名 长叶排钱草〔云南中草药〕

地方名 广西: 串钱草(北流、贵县、梧州), 麒麟尾(岑溪、隆林), 凤尾勒云(博白); 云南: 粘人草、大排钱(红河), 风包草(思茅)。

功效 根: 疏风解表, 温中健脾, 利尿通淋。用于感冒, 胃炎, 黄疸型肝炎, 痢疾, 胆结石, 尿路结石, 尿路感染, 月经过多, 虚癆, 外伤出血; 叶: 用于目赤肿痛, 风湿骨痛。

#### 7148520

*Phyllodium pulchellum* (L.) Desv. --- *Desmodium pulchellum* (L.) Benth. --- *Hedysarum pulchellum* L.

植物名 排钱树〔中国树木志〕

药材名 排钱草〔福建民间草药〕

文献名 龙鳞草、午时合、尖叶阿婆钱〔生草药性备要〕, 金钱草、午时灵〔岭南采药录〕, 牌钱树〔中药大辞典〕, 阿婆钱〔汇编〕, 牌钱草〔福建植志〕

地方名 亚婆钱、叠钱草(福建、广东), 串钱草(广东、广西), 钱串草(江西、广东); 福建: 四季春(泉州), 金钱豹(泉州、南安、晋江、武平), 铁甲龙鳞(长泰), 钱树(上杭、福州), 双金钱(福州、福清、永泰、同安、厦门), 双钱排、火烧柴、金钱树、钱模根、肉夹饼、牛尾草、纸钱草(厦门), 纸钱剑, 双排钱, 腊狸尾草, 双叠钱, 钱甲龙鳞, 劳里连, 木本四季春, 蜈蚣草, 蜈蚣补, 牛尾仔; 广东: 乌骨掌牛郎(惠阳), 虎尾金钱(潮安), 千重塔, 契齿索, 掌牛郎; 海南: 尖阿婆钱, 笠碗子树; 广西: 猪肚木(贵县), 钱串木(百色), 燕子尾(北流), 钱排树(梧州), 钱排草, 人字草, 排刀草, 头瓣草; 云南: 大排钱, 摇钱树(红河), 木排钱, “鲁里”(傣语); 其他: 钱排木。

功效 根和叶: 有小毒, 清热利湿, 活血祛瘀, 软坚散结。用于感冒发热, 疟疾, 肝炎, 肝硬化腹水, 血吸虫病肝脾肿大, 风湿疼痛, 跌打损伤。

#### 7148521

*Piptanthus nepalensis* D. Don --- *P. concolor* Harrow

植物名 黄花木〔西藏植志〕

药材名 黄花木〔西藏中草〕

地方名 山菜豆(陕西、甘肃); 青海: “羌曲兴”(藏名); 陕西: 圆荚树。

功效 种子: 清肝明目, 利水, 润肠。用于风热头

痛,急性结膜炎,高血压,慢性便秘。

#### 7148522

*Pisum sativum* L.

植物名 豌豆《高植图鉴》

药材名 豌豆《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 豌豆《四民月令》, 豌豆《广雅》, 寒豆《品汇精要》, 胡豆, 戎菽, 青小豆, 青斑豆, 麻果《纲目》, 豌豆《唐史》, 回龙豆《辽志》, 白豌豆《扬州府志》, 豌豆, 戎豆, 国豆, 冷豆, 孙豆, 丸豆, 小寒豆, 西胡豆, 小寒, 准豆《豆科图说》

地方名 荷兰豆(福建、广东); 青海:“恰布子子曼巴”(藏名); 江苏:安豆, 安豆头, 安乐豆; 上海:蔬菜豌豆; 浙江:寒豆儿(杭州), 麦豆(遂昌); 福建:公妈豆(晋江), 幼豆(莆田), 金豆(福州), 眉豆(建阳); 湖南:麦豌豆; 广东:雪豆; 广西:兰豆; 四川:白豌豆, 麻豌豆。

功效 种子:和中下气, 利小便, 解疮毒。用于霍乱转筋, 脚气, 痲肿; 花、叶:清热除湿, 消肿, 散结。

#### 7148523

*Pithecellobium clypearia* (Jack.) Benth.

植物名 猴耳环《中国植志》

药材名 蛟龙木《汇编》

文献名 围涎树《高植图鉴》, 尿同公树《豆科图说》

地方名 交龙木、尿桶公(广东、广西); 福建:角冷; 广东:三不正、洗头树(惠阳), 尿桶木, 尿糖松, 亚公劈, 亚婆劈, 老婆树, 婆树, 鹤麻古树, 鸡三树; 海南:鸡心树; 广西:(半边旗)(昭平), 相思格(平南), 林榔木(北流), 假南蛇(柳江), 假格(藤县), 雷婆辟(苍梧); 其他:蛟龙叶。

功效 叶、果实及种子:清热解毒, 凉血消肿。外用于烧、烫伤, 疮痍疔肿。

#### 7148524

*Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth. --- *Mimosa dulcis* Roxb.

植物名 牛蹄豆(海南)、《中国植志》

药材名 牛蹄豆《广西园林药录》

文献名 甜肉围涎树《经植手册》

地方名 广东:金龟树; 广西:勒豆。

功效 树皮:清热收敛。外用于痲疮溃烂久不收口, 湿疹。

#### 7148525

*Pithecellobium lucidum* Benth. --- *P. bigeminum* (L.) Benth.

植物名 亮叶猴耳环《中国植志》

药材名 尿桶弓《陆川本草》

文献名 亮叶围涎树《高植图鉴》, 亮叶牛蹄豆《云南种录》, 鸡三树《豆科图说》, 三角果、黑汉豆、羊角《南方毒植》

地方名 台湾:益穗豆, 乌鸡骨; 海南:雷公凿; 广西:水肿木(平南), 火汤木(藤县), 山木香、青木香(梧州), 尿桶公(北流、陆川、博白), 亚婆树(柳州); 四川:车耳树、金耳环(峨眉山), 环钩树。

功效 果、枝、叶:收敛止血, 消肿散结, 补肾强筋。

用于风湿骨痛, 烧、烫伤, 溃疡。

#### 7148526

*Pocockia ruthenica* (L.) P. Y. Fu et Y. A. Chen ---

*Trigonella ruthenica* L. --- *Medicago ruthenica* Ledeb.

植物名 扁蓿豆《东北草本植志》

药材名 花苜蓿《汇编》

文献名 老牛铧《指示植物》, 扁豆子、野苜蓿、紫苜蓿、黄苜蓿《豆科图说》, 连生花《满洲植录》

地方名 直英苜蓿(陕西、甘肃、宁夏); 黑龙江:(透骨草); 吉林:苜蓿草; 内蒙古:“奇尔克”、“纳林-胡岑格”(蒙名); 青海:“布斯夸”、“布斯项”(藏名)。

功效 全草:清热解毒, 止咳, 止血。用于发烧, 肺热咳嗽, 赤痢。外用于消炎止血。

#### 7148527

*Podocarpium laxum* (DC.) Yang et P. H. Huang var. *laterale* (Schindl.) Yang et P. H. Huang

植物名 侧序长柄山蚂蝗(拟)

文献名 侧序山蚂蝗《广西药录》

地方名 广西:山蚂蝗(灵山)。

功效 全株:用于感冒。

#### 7148528

*Podocarpium leptopus* (A. Gray ex Benth.) Yang et P. H. Huang --- *Desmodium laxum* DC. ssp. *leptopus* (A. Gray ex Benth.) --- *D. leptopus* A. Gray ex Benth. --- *D. gardneri* Benth.

植物名 细长柄山蚂蝗(拉汉英种称)

药材名 长果柄山蚂蝗《广西药园药录》

文献名 细柄山绿豆《海南植志》, 长果梗山蚂蝗《贵州药录》

地方名 广西:小叶鸡血藤(上林); 贵州:野豇豆。

功效 根及全草:清热利湿, 健脾消积。用于肝炎。外用于毒蛇咬伤。

#### 7148529

*Podocarpium oldhami* (Oliv.) Yang et Huang --- *Desmodium oldhami* Oliv.

植物名 羽叶长柄山蚂蝗《中国树木志》

药材名 羽叶山蚂蝗《浙江药植志》

文献名 羽状山蚂蝗、藤甘草《高植图鉴》, 羽叶山绿豆《东北草本植志》

功效 根及全株:祛风活络, 解毒消肿; 根皮:捣烂敷, 用于筋骨折断。

#### 7148530

*Podocarpium podocarpum* (DC.) Yang et P. H. Huang --- *Desmodium podocarpum* (Thunb.) DC. --- *Desmodium fallax* Schindl. var. *mandshuricum* (Maxim.) Nakai

植物名 长柄山蚂蝗《中国树木志》

药材名 长柄山蚂蝗《广西药录》

文献名 东北山蚂蝗《长白山植志》, 圆菱叶山蚂蝗《湖北植志》, 菱叶山蚂蝗《中药大辞典》

地方名 陕西:山菜豆; 浙江:山豆子; 湖北:野黄豆(神农架)。

功效 根、叶:解表祛寒, 止血。用于感冒, 咳嗽。

外用于外伤出血。

#### 7148531

*Podocarpium podocarpum* (DC.) Yang et P. H. Huang  
var. *fallax* (Schindl.) Yang et P. H. Huang --- *Desmodium fallax* Schindl.

植物名 宽卵叶长柄山蚂蝗《拉汉英种称》

药材名 宽卵叶长柄山蚂蝗《广西药录》

文献名 宽卵叶山蚂蝗《高植图鉴》

地方名 假山绿豆(海南、广西);四川:青胡豆(峨眉)。

功效 全草:清热解表;根:用于急性黄疸型肝炎。

#### 7148532

*Podocarpium podocarpum* (DC.) Yang et P. H. Huang  
var. *oxyphyllum* (DC.) Yang et P. H. Huang ---  
*Desmodium racemosum* (Thunb.) DC. --- *D. oxyphyllum* DC.

植物名 尖叶长柄山蚂蝗《中国树木志》

药材名 尖叶山蚂蝗《广西药录》

文献名 山蚂蝗《名实图考》,总序山绿豆、总序山蚂蝗《广西植录》,逢人打、扁草子《汇编》

地方名 浙江:狗粪粘(天台);安徽:小槐花;湖南:小眉角豆、宽叶山蚂蝗(衡山);广西:三叶粘身草;四川:詹草子(峨眉)。

功效 根及全草:祛风活络,解毒消肿。用于跌打损伤,风湿性关节炎,腰痛,乳腺炎,毒蛇咬伤。

#### 7148533

*Podocarpium podocarpum* (DC.) Yang et Huang var.  
*szechuenense* (Craib) Yang et Huang --- *Desmodium szechuenense* (Craib) Schindl.

植物名 四川长柄山蚂蝗《中国树木志》

药材名 四川山蚂蝗《中药大辞典》

地方名 四川:比子草,蚰子草,清酒缸;贵州:红土子,红土子草,红土子皮,红清酒缸,过路清,路边青。

功效 根皮及全草:清热解毒。用于喉痛,疟疾,刀伤及黄水疮。

#### 7148534

*Pongamia pinnata* (L.) Merr.

植物名 水黄皮《高植图鉴》

药材名 水流豆《岭南采药录》、《中药大辞典》

文献名 水流兵《生草药性备要》

地方名 台湾:九重吹;广东:野豆,水罗豆,水刀豆。

功效 种子:用于疥癣,脓疮及风湿症;花:用于糖尿病。

#### 7148535

*Priotropis cytisoides* Wight et Arnott --- *Crotalaria cytisoides* Roxb. ex DC. --- *C. szemoensis* Gagnep.

植物名 黄雀儿《高植图鉴》

药材名 思茅小扁豆根(拟)

文献名 思茅猪屎豆《中药大辞典》

地方名 云南:小扁豆(思茅)。

功效 根:消炎解毒,利咽止痛。用于急性胃肠炎,咽喉炎,扁桃体炎。

#### 7148536

*Psophocarpus tetragonolobus* DC. --- *Psophocarpus palustris* Desv.

植物名 四棱豆《云南种录》

药材名 四棱豆《台湾药植志》

地方名 台湾:豆菜;云南:“吐崩”、“妥崩”(西双版纳傣语)。

功效 种子:用于皮肤病;块根:用于咽痛,齿痛,口腔溃疡,泌尿系炎症,突发皮疹,皮下瘀斑不散,高热等症。

#### 7148537

*Psoralea corylifolia* L.

植物名 补骨脂《高植图鉴》

药材名 补骨脂《雷公炮炙论》、《药典》

文献名 胡韭子(徐表《南州记》),婆固脂、破故纸《药性论》,补骨脂《图经》,补骨脂子《纲目》,马骊姜《重修南宁府志》,天豆、反古纸、破故正、婆固纸《新纲》,胡脂《和汉药名汇》,黑故子《中药志》,和兰菟《豆科图说》,黑故纸《常用中药名辨》

地方名 江西:吉固子;广西:川鼓芷(岑溪),故纸(横县、桂平);河南:怀故子,淮故子;四川:合固子(合川),故子,川故子,胡故子,破骨子,破固脂;云南:黑固脂(文山),兰菟;其他:破故子。

功效 果实:温肾助阳,纳气,止泻。用于阳痿遗精,遗尿尿频,腰膝冷痛,肾虚作喘,五更泄泻。外用于白癜风,斑秃。

#### 7148538

*Pterocarpus indicus* Willd.

植物名 紫檀《高植图鉴》

药材名 紫檀《本草经集注》、《中药大辞典》

文献名 紫檀木(崔豹《古今注》),紫真檀木《别录》,赤檀、胜沉香《纲目》,紫檀香《本草备要》,赤檀木、紫檀《和汉药名汇》,紫檀《和汉药物学》,三叶紫檀《种分》,羽叶檀、蔷薇木《豆科图说》

地方名 红木(江苏、浙江);河北:〔黄柏〕,紫檀木(张家口);广东:青龙木,酸枝树。

功效 心材:消肿,止血,定痛。用于肿毒,金疮出血。

备考 过去文献有将紫檀的学名订为 *Pterocarpus santalinus* L.

#### 7148539

*Pterocarpus marsupium* Roxb.

植物名 吉纳檀《台湾药植志》

文献名 〔花桐本〕《台湾药植志》,奇诺、奇诺树(李《生药》),吉纳《中国植物图鉴》

功效 树胶:用于齿痛,腹泻。外用于疖,疮,皮肤病;树皮、叶:收敛。用于腹泻。

#### 7148540

*Pterolobium punctatum* Hemsl. --- *Caesalpinia aestivalis* Chun et How

植物名 老虎刺《中国植志》

药材名 老虎刺《名实图考》、《广西药录》

地方名 湖北:雀不踏;湖南:撩皮勒(瑶名);广东:倒钩藤,崖婆勒,蚰蛇利;广西:牛阳子(全州),牛尾筋(上林),仁皂刺,蚰蛇利,黄牛筋,倒钩刺,假南蛇筋;云南:老鹰刺,倒爪刺,石龙花。

功效 根:消肿止痛。用于跌打损伤,牙痛;枝、叶:祛风除湿,清热解暑。用于风湿痹痛。外用于疮疖。

## 7148541

*Pueraria chinensis* Ohwi

植物名 华葛(品种论述)

地方名 台湾:葛根。

功效 根:祛风,解肌,发表。

## 7148542

*Pueraria edulis* Pamp.

植物名 食用葛藤(高植图鉴)

药材名 食用葛(品种论述)

文献名 葛根、葛花、甘葛(滇南本草)

地方名 葛藤(贵州、云南),甜葛(四川、云南);四川:粉葛;云南:葛麻。

功效 根:解肌退热,生津,透疹,升阳止泻;花:解酒醒脾。

## 7148543

*Pueraria elegans* Wang et Tang

植物名 丽花葛藤(豆科图说)

地方名 湖北:葛根。

功效 根:解肌退热,生津,透疹,升阳止泻。

备考 《湖北中草药志》(1978)称:有的地区作葛根入药。

## 7148544

*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi --- *P. thunbergiana* (Sieb. et Zucc.) Benth. --- *P. pseudo-hirsuta* Tang et Wang --- *P. hirsuta* (Thunb.) Schneider

植物名 野葛(高植图鉴)

药材名 葛根(本经)、《药典》,葛花(别录)、《汇编》

文献名 葛(诗经),鸡齐根、葛谷[种子](本经),绛绛草(说文),葛叶、白葛、黄斤、鹿藿、葛根汁(别录),葛蔓(唐本草),干葛(阎氏小儿方),黄葛藤(开宝本草),葛藤蔓(卫生易简方),葛条花(中药大辞典),葛茎藤(中国土农药志),日本葛(经植手册),田葛藤(植分学报),过山藤(中国药学杂志),野扁葛(中药大辞典)

地方名 葛条(东北、河北、陕西、山东、福建、河南),葛藤(东北、陕西、山东、江苏、浙江、江西、安徽、福建、湖北、广西、四川),粉葛藤(甘肃、江西、湖北),粉葛根(西北、华中、华东、华南、西南),麻葛藤(广东、海南),葛麻藤(陕西、广西);河北:山戈条子,葛拉条子;陕西:绵葛藤(城固),葛条根;山东:葛子,葛子根,山东葛根;江苏:大葛藤(云台山),葛片(南京);福建:山刘根,刘头茹,刘粉;台湾:山肉豆,刘根,葛藤草;湖北:毛角藤,勾藤,米葛,黄葛麻,葛麻;湖南:大角,黄角;广东:大麻葛(肇庆),小葛薯、小薯莨(清远),山葛(罗定),山葛薯(增城),山葛根、土干葛、毛葛藤(陆丰);广西:葛麻茹(陆川),夹子藤,麻风藤,野葛根;四川:黄葛根,

葛丁,戈葛,野扁豆;云南:土葛、毛豆(红河),毛宣;其他:铁葛。

功效 根:解肌退热,生津,透疹,升阳止泻。用于外感发热头痛,项强,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,高血压颈项强痛;花:解酒止渴。用于酒醉烦渴;种子:下痢;藤茎:用于痢肿,喉痹;叶:金疮止血;生根汁:用于消渴,伤寒壮热。

## 7148545

*Pueraria montana* (Lour.) Merr. - *P. tonkinensis* Gagnep.

植物名 山葛藤(品种论述)

药材名 山葛根(拟)

文献名 越南葛藤(海南植志),北越葛(云南种录)

地方名 台湾:葛根;海南:葛麻姆;广西:葛花(全州)。

功效 根、花:用于感冒发热,烦渴,呕吐。

## 7148546

*Pueraria omeiensis* Wang et Tang

植物名 峨眉葛藤(高植图鉴)

药材名 苦葛根、苦葛花(贵州草药)

文献名 峨眉葛(品种论述)

地方名 广西:葛根(乐业);四川:粉葛、葛藤(峨眉山);贵州:苦葛。

功效 根、花:升阳发表,生津止渴,解酒毒。

## 7148547

*Pueraria peduncularis* (Benth.) Grah. ex Benth. --- *P. yunnanensis* Franch.

植物名 云南葛藤(高植图鉴)

药材名 苦葛(滇南本草)、《云南中草药》

文献名 苦葛根(品种论述)

地方名 [葛根](云南、西藏),苦葛藤(云南、四川);四川:粉葛(峨眉山);云南:红葛、嘎卖(大理),白药(禄丰村),毛宣,土葛,野葛;西藏:“羌区兴”(藏名);其他:苦葛花。

功效 花:解酒毒;块根:有毒。杀虫。用于杀灭血吸虫尾蚴,杀钉螺,灭子,制成毒饵可诱杀苍蝇。块根不应作葛根入药。

## 7148548

*Pueraria phaseoloides* (Roxb.) Benth.

植物名 三裂叶野葛(高植图鉴)

药材名 三裂叶野葛(广西药录)

文献名 三裂叶葛藤(广西植录),三裂叶野葛藤(中药大辞典)

地方名 浙江:粉葛,葛藤,葛根;广西:野葛(武鸣),藤铅(博白),夹仔藤。

功效 块根:解肌退热,生津,透疹,升阳止泻;花:解酒止渴。

## 7148549

*Pueraria thomsonii* Benth.

植物名 甘葛藤(高植图鉴)

药材名 葛根(药典)

文献名 葛、葛根、黄斤、鹿豆、鹿藿、鹿豆忠、葛藤

根、铁葛根、鸡齐根《新纲》,家葛《豆科图说》

地方名 粉葛、甘葛(广东、广西),葛麻藤(广西、云南);湖南:家葛根;广西:干葛(北海),葛麻;贵州:甜葛。

功效 根:解肌退热,生津,透疹,升阳止泻。用于外感发热头痛,项强,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,高血压颈项强痛;花:解酒醒脾。用于酒醉烦渴;种子:用于下痢。

#### 7148550

*Pycnospora lutescens* (Poir.) Schindl.

植物名 密子豆《高植图鉴》

药材名 密子豆《广西药录》

文献名 蜜子豆、假番豆《中药大辞典》

地方名 广东:假番豆草(临高);广西:假地豆(北流、陆川)。

功效 全草:消肿解毒,清热利水。用于小便癃闭,砂淋,白浊,水肿。

#### 7148551

*Rhynchosia dielsii* Harms

植物名 菱叶鹿藿《豆科图说》

药材名 菱叶鹿藿《四川中药志》

文献名 山黄豆藤《四川中药志》

地方名 陕西:野黄豆(镇坪),野茭豆,野莞豆;广西:古眼风(资源),三叶豆(隆林);四川:山黄豆、野豆藤(峨眉山),螃蟹眼睛。

功效 全草或根:祛风,解热。用于小儿风热咳嗽,各种惊风。

#### 7148552

*Rhynchosia volubilis* Lour.

植物名 鹿藿《高植图鉴》

药材名 鹿藿《本经》、《汇编》

文献名 藿《尔雅》,鹿豆(《尔雅》郭璞注),豇豆、野绿豆《纲目》,野毛扁豆、假荷兰豆、拈根《植物名汇》,痰切豆、金雀豆、狐豆《豆科图说》,红荚豆《种分》,饿马营《高植图鉴》

地方名 老鼠眼(广东、海南、广西);浙江:乌眼珠(温州、乐清),光眼铃铃藤(温州),乌眼睛豆、大叶野绿豆(天目山),黑药豆;福建:野鸡肫花(福州),风藤子(龙岩),鸡母眼睛(闽南),豇豆;湖南:老鼠豆(通道),野毛豆(永兴),门瘦(湘西),鬼豆(麻阳),饿马黄,鹿藿根,酒壶藤;广东:野黄豆;海南:野黄豆藤;广西:山黑豆(陆川),假棉花(岑溪),假葛薯(贵县),土葛藤、葛麻藤(临桂),彭藤(玉林),鬼豆根(上林),藤黄豆(来宾),[寻骨风](桂林),筋骨风。

功效 根及全草:消积散结,消肿止痛,舒筋活络。用于小儿疳积,牙痛,神经性头痛,颈淋巴结结核,风湿性关节炎,腰肌劳损。外用于疔疮肿毒,蛇咬伤;种子:用于蛊毒,肠痈瘰癧,痈疮气,头痛,痰满,哮喘,腰痛。

#### 7148553

*Robinia pseudoacacia* L.

植物名 刺槐《中国树木志》

药材名 刺槐花《贵州民间方药集》

文献名 刺藤、刺槐《豆科图说》

地方名 德国槐(河北、山东),洋槐(内蒙古、山东、江苏、台湾、湖北、广西、四川),槐树、刺儿槐(辽宁、山东);内蒙古:“乌茹格素图·槐斯”(蒙名);山东:琴树;四川:洋槐树;贵州:洋槐花。

功效 花:止血。用于大肠下血,咯血,吐血,妇女红崩;树皮、茎皮、根皮:有小毒。清热解暑,祛风止痛;树皮:用于咽喉肿痛,风火牙痛,恶疮,阴痒,睾丸肿痛,痔疮肿痛;叶:与树皮相似,但效力较弱。

#### 7148554

*Saraca asoca* (Roxb.) De Wilde --- *Saraca indica* Baker

植物名 无忧花《中国树木志》

药材名 无忧树《台湾药植志》

地方名 广西:四方木,火焰花。

功效 树皮及根:用于风湿,直肠及子宫下坠;花:用于血痢。

#### 7148555

*Saraca dives* Pierre --- *S. chinensis* Merr. et Chun --- *S. indica* auct. non L.

植物名 中国无忧花《中国植志》

药材名 中国无忧花《汇编》

文献名 黄莺花《云南种录》,无忧花《广西药录》,云南无忧花《中国树木志》,四方木皮《汇编》,火焰花《广西植志》

地方名 广西:火焰木(那坡),四方木(龙州、那坡),“唆梅花”、“唆坚”(壮语);云南:马树(金平),马叶树(河口)。

功效 树皮和叶:祛风除湿,消肿止痛;树皮:用于风湿骨痛,跌打肿痛;叶:外用于跌打肿痛。

备考 本种可放养紫胶虫,且是一优良的紫胶虫寄主。《云南种录》(1984)将本种学名订为 *Saraca thaipingensis* Cautley ex Prain;《中国科属辞典》(1958)、《高植图鉴》2:331,1972 为本种,学名 *Saraca indica* L. 系误订。

#### 7148556

*Sesbania cannabina* (Retz.) Pers.

植物名 田菁《高植图鉴》

药材名 田菁《汇编》

文献名 细叶木兰《云南药录》

地方名 江苏:野豇豆;浙江:咸青;福建:田槐(福州、霞浦),向天蜈蚣、铁青草(泉州),叶顶珠,铁精草,海松柏;云南:“牙喊撒”(傣语),小野蚂蚱豆。

功效 叶、种子:消炎,止痛。用于胸膜炎,高热,关节挫伤,关节痛;根:用于下消,妇人赤白带。

#### 7148557

*Sesbania grandiflora* (L.) Pers. --- *Aeschynomene grandiflora* Desr.

植物名 木田菁《高植图鉴》

文献名 大花田菁《台湾药植志》

功效 树皮:收敛,解热,缓泻,催吐。用于痢疾及其他肠部疾患,鹅口疮,小儿胃部疾患,消化道溃疡;根:外用于肿毒溃瘍;叶或花液汁:用于流鼻涕及头痛;



叶汁：用于眼膜脱，扭伤。

# 7148558

*Sesbania sesban* (L.) Merr. --- *S. aegyptiaca* Pers.

植物名 印度田菁《台湾药植志》

药材名 臭菁仔(台湾)

文献名 山青仔、田菁《植物名汇》，埃及田菁《豆科图说》

地方名 浙江：山靛；云南：阴草树(元江)。

功效 种子：用于脾脏肿大，肤痒；树皮：发疹；叶：外用于风湿，肿毒，疖肿；根：用于蝎螫伤。

# 7148559

*Shuteria ferruginea* Baker

植物名 绣毛宿苞豆《广西药录》

地方名 广西：银花草(临桂)。

功效 叶：用于外伤。

# 7148560

*Shuteria pampaniniana* Hand.-Mazz. --- *S. involucrata* (Wall.) Wight et Arn. var. *villosa* (Pamip.) Ohashi

植物名 毛宿苞豆《高植图鉴》

药材名 草红藤《汇编》

文献名 有毛宿苞豆《药典》，有毛苞豆《广西药录》，疆蛇通《汇编》

地方名 广东：急贝花、急贝叶(番禺)，山麻、单鞭救主、(蛇总管)(潮阳)，黄花帽(增城)；海南：细样木虱(儋县)，扫把麻，灶江，天花麻(琼中)，假黄麻；四川：红藤(成都)，小红藤(峨眉山)，三叶红藤(西昌)；贵州：眼痛药；云南：“亚罕闷”(西双版纳傣名)，黄花马豆、蝴蝶草、铁马豆、黄花苞豆(昆明)；其他：大种黄花母。

功效 全草：消炎，解毒，清肺。用于阑尾炎，乳腺炎，腮腺炎，肺结核咳嗽。

# 7148561

*Shuteria sinensis* Hemsl. --- *Shuteria involucrata* (Wall.) Wight et Arn.

植物名 中国宿苞豆《高植图鉴》

药材名 宿苞豆《汇编》

地方名 云南：野豌豆，铜钱麻黄(思茅)。

功效 根：清热，解毒。用于感冒咳嗽，咽炎，乳腺炎，肺结核，慢性支气管炎。

# 7148562

*Shuteria vestita* (Grah.) Wight et Arn. --- *Shuteria involucrata* (Wall.) Wight et Arn. var. *glabrata* (Wight et Arn.) Ohashi

植物名 西南宿苞豆《高植图鉴》

药材名 西南宿苞豆《广西药录》

文献名 光宿苞豆《云南种录》

地方名 广西：(茜草)(龙州)，钱藤草(那坡)；云南：铜钱麻黄。

功效 根：补血，调经。用于感冒，咳嗽，咽喉炎，扁桃体炎。

# 7148563

*Sizolobium venulosum* Piper

植物名 瘴气藤《汇编》

功效 根：清热，解毒，止痛，截疟。用于疟疾。

# 7148564

*Smithia conferta* Smith

植物名 密节坡油甘《广西药录》

文献名 密节施氏豆《广西药录》

地方名 广西：蛇头草(北流)，[地丁]、水丁贵(岑溪)。

功效 全草：用于肝炎，肺结核，神经衰弱，咳血，衄血，目赤肿痛，乳痈，烧烫伤，跌打损伤。

# 7148565

*Smithia sensitiva* Ait.

植物名 坡油甘《高植图鉴》

药材名 坡油甘《广西药录》

文献名 田基豆《广西植录》，敏感施氏豆《海南植志》，施氏豆《广西药录》，田唇乌蝇翼《中药大辞典》

地方名 广西：水老虎、(田基黄)(平南)，水百足(玉林)，黄花儿。

功效 全草：用于小便困难，尿砂，毒蛇咬伤，咳嗽，肝炎，疮疡肿毒，钩端螺旋体病。

# 7148566

*Sophora albescens* (Rehd.) C. Y. Ma --- *S. glauca* Lesch. ex DC. var. *albescens* Rehd. --- *S. velutina* Lindl. var. *albescens* (Rehd.) Tsoong

植物名 白花槐《植分学报》

药材名 白花槐根(拟)

文献名 白花灰毛槐树《贵州草药》，白花灰毛槐《高植图鉴》，小苦参《汇编》

地方名 贵州：[山豆根](荔波)；云南：千层皮、牛挣药、贼骨头(红河)。

功效 根：清热，除烦。用于喉痛，烦热不眠。

# 7148567

*Sophora alopecuroides* L.

植物名 苦豆子《高植图鉴》

药材名 苦豆根《中药志》

文献名 狐尾槐《中国树木志》，苦豆草《药典》，苦参草《沙漠药植》

地方名 西豆根(内蒙古、甘肃、宁夏、广东)，苦甘草(北京、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆)，粉豆根(内蒙古、甘肃)；内蒙古：“嘎顺-包日其格”、“胡兰-宝雅”、“里捷勒”、“利德尔”，“呼鲁木-布亚”(蒙名)；甘肃：白蒿子，苦参，草本槐，草槐，白头蒿子；宁夏：[山豆根](盐池、灵武)；新疆：“布雅”、“布牙”(维名)。

功效 根、根茎及地上部分：清热解毒，燥湿杀虫。用于急性菌痢，肠炎，腹泻；种子：用于胃痛，滴虫性肠炎，白带过多。外用于疮疖，湿疹，顽癣。

# 7148568

*Sophora davidii* (Franch.) Kom. ex Pavol. --- *S. viciifolia* Hance

植物名 白刺花《名实图考》、《中国树木志》

药材名 苦刺《汇编》

文献名 草藤叶槐《豆科图说》，蚕豆叶槐《中国树木志》

地方名 苦刺花(湖北、四川、云南), 马蹄针(山东、河南), 狼牙刺(陕西、甘肃、宁夏、四川); 陕西: 狼牙槐; 河南: 白刺针, 马皮采, 马鞭采; 湖北: 铁马胡烧; 四川: 苦刺枝; 贵州: 白花刺, 白刺花叶; 云南: 苦豆刺(曲靖)。

功效 根: 清热解毒, 利湿消肿, 凉血止血。用于喉炎, 肺炎, 痢疾, 膀胱炎, 水肿, 衄血, 血尿, 便血; 果: 理气消积。用于消化不良, 胃痛, 腹痛; 花: 用于盗汗, 中暑; 叶: 清热解毒。外用于肿毒。

## 7148569

*Sophora flavescens* Ait. --- *Sophora angustifolia* Sieb. et Zucc.

植物名 苦参(高植图鉴)

药材名 苦参(本经)、《药典》

文献名 苦参、水槐(本经), 地槐、菟槐、骄槐、白茎、虎麻、岑茎、绿白、陵郎(别录), 苦参实(唐本草), 苦骨、苦参子、野槐、独椹(纲目), 鹿白、拔麻、地骨、虎卷、扁府(新纲)

地方名 槐花树(东北、内蒙古、山东、湖南), 地参(江苏、江西、云南), 川参(江苏、江西、贵州), 好汉拔(东北、山东), 槐麻根子、地槐根子(东北), 牛参(安徽、江西、福建、湖南), 牛人参(浙江、江西、云南), 牛苦参(浙江、云南), 野槐树(江苏、云南); 吉林: 山槐子(镇赉), 鄂条、“木布利”(朝名); 北京: 野槐子; 河北: 山槐根, 野槐根; 山西: 马介槐; 内蒙古: “立得力”、“道古勒-额布斯”(蒙名), 苦豆, 苦参麻; 甘肃: 草槐; 山东: 野地槐(莒南), 山花子, 槐力当; 江苏: 小槐树(铜山), 山槐树(盱眙); 浙江: 牛蚤股(永嘉); 安徽: 槐木, 苦槐子; 福建: [山豆根](崇安), 大号蜈蚣草(龙岩、漳平), 黄皮柴(建瓯), 先苦后甜草, 苦人儿草; 台湾: 苦心根; 河南: 臭槐棵, 野槐棵; 广西: [巴豆](柳州), 流产草(东兰), 凤凰爪; 四川: 豆参、槐参(广元), 黄花草(合川), 苦槐; 贵州: 小槐; 云南: 苦刺花(红河), 苦槐子根, 沼水槐。

功效 根: 清热燥湿, 杀虫, 利尿。用于热痢, 便血, 黄疸尿闭, 赤白带下, 阴肿阴痒湿疹, 湿疮, 皮肤瘙痒, 疥癣麻风。外用于滴虫性阴道炎; 种子: 明目。

备考 在河北安国县有人以苦参根充黄芩出售, 应注意鉴别。

## 7148570

*Sophora japonica* L. --- *Stryphnolobium japonicum* Shott

植物名 槐树(高植图鉴)

药材名 槐花(日华子本草)、《药典》, 槐米[花蕾](药典), 槐角[果实](本草备要)、《药典》

文献名 槐、槐(尔雅), 槐实(本经), 槐枝、槐根、槐皮(别录), 槐子(本草经集注), 槐白皮(药性论), 槐嫩蘗(唐本草), 槐叶(食疗本草), 槐胶(嘉祐本草), 槐树头、槐树芽(救荒本草), 槐豆(本草原始), 槐蕊(本草正), 守宫槐(群芳谱), 长生子、槐木皮、鬼木、良木、槐尘米(新纲), 槐角子(高植图鉴), 鬼树花(中药志), 白槐、猪屎槐、槐木、槐花木、槐花木(豆科图说)

地方名 槐花树(河北、江苏、四川), 中国槐(河北、山东、湖南、广西), 金药树(福建、湖南), 细叶槐(江西、湖南), 白槐(山西、青海、湖南、广东), 紫槐(山西、湖

南), 槐花米(江苏、浙江), 国槐(北京、山东); 北京: 槐树条(京郊), 槐树胆; 河北: 本槐树, 槐树花; 内蒙古: “洪呼日朝格图-木德”(蒙名), 槐实子、槐条(包头); 陕西: 中槐; 青海: 豆槐; 山东: 家槐(荣成), 槐豆角(海阳), 本地槐, 圆槐, 黄槐, 黑槐, 槐岭吗; 江苏: 绿槐角(苏州), 槐连豆; 河南: 槐连灯, 九连灯, 天豆, 落地槐; 四川: 槐子皮, 槐花树皮, 槐树根, 槐姜豆; 云南: 槐花果(曲靖)。

功效 花蕾、花: 凉血止血, 清肝泻火。用于便血, 痔血, 血痢, 崩漏, 吐血, 衄血, 肝热目赤, 头痛眩晕; 果实: 清热泻火, 凉血, 止血。用于肠热便血, 痔肿出血, 肝热头痛, 眩晕目赤。用于痔疮, 喉痹, 蛔虫病; 枝、嫩枝: 用于崩漏带下, 心痛, 目赤, 痔疮, 疥疮; 树皮或根皮之韧皮部(槐白皮): 祛风除湿, 消肿止痛。用于风邪外中, 身体强直, 肌肤不仁, 热病口疮, 牙疳, 喉痹, 肠风下血, 疽, 痔, 烂疮, 阴部痒痛, 烫火伤; 叶: 用于惊痫, 壮热, 肠风, 溲血, 痔疮, 疥癣, 湿疹, 疔肿; 树脂(槐胶): 主一切风, 化涎。

## 7148571

*Sophora moercroftiana* (Benth.) Benth. ex Baker

植物名 沙生槐(西藏植志)

药材名 沙生槐(西藏中草)

文献名 砂生槐《中药大辞典》, 砂生槐树《豆科图说》, 西藏狼牙刺《植分学报》

地方名 青海: “解哇”(藏名); 西藏: “鲜瓦”(藏名)。

功效 果实、种子: 消炎解毒。用于湿热黄疸, 白喉。

## 7148572

*Sophora prazeri* Prain

植物名 锈毛槐(贵州药录)

地方名 贵州: 乌头根。

功效 根: 清热除湿, 活血化瘀。用于喉炎, 痔疮, 痢疾, 气管炎。

## 7148573

*Sophora prazeri* Prain ssp. *mairei* (Pamp.) Yakovl. ---

*S. mairei* Pamp. --- *S. wilsonii* Craib

植物名 西南槐(植分学报)

药材名 西南槐(广西药录)

文献名 西南槐树(高植图鉴), 红花苦刺、蛇黄豆(汇编)

地方名 四川: 陀杉树(南充), 矮陀陀, 矮陀陀(峨眉山), 打锣不响; 贵州: [山豆根], 乌豆根; 云南: 野建芪、矮槐、糙皮槐树、野松皮(红河)。

功效 根、茎: 有小毒。清热除湿, 活血化瘀。用于劳伤, 风湿骨痛, 水泻; 茎: 用于疟疾; 种子: 用于骨折, 跌打损伤, 风湿骨痛。

## 7148574

*Sophora tomentosa* L.

植物名 绒毛槐(植分学报)

文献名 [黄芪](植物名汇), 岭南槐树(树分), 海南槐(海南植志), 毛苦参(台湾药植志)

功效 种子、根及根皮: 用于霍乱, 腹泻, 食物中

毒;叶:外用于毒鱼咬伤。

#### 7148575

*Sophora tonkinensis* Gagnep. --- *S. subprostrata* Chun et T. Chen

植物名 越南槐《药典》

药材名 山豆根《宝本草》、《药典》

文献名 山大豆根、黄结《经验方》,广豆根《广西植录》,柔枝槐《高植图鉴》,豆根、山豆根末《常用中药名辨》,越南槐树《贵州药录》

地方名 山西:山豆(靖西、那坡),苦豆根;贵州:小黄连,岩黄连。

功效 根及根茎:有毒。清热解毒,消肿利咽。用于火毒蕴结,咽喉肿痛,齿龈肿痛。

#### 7148576

*Sophora tonkinensis* Gagnep. var. *polyphylla* S. Z. Huang et Z. C. Zhou

植物名 多叶越南槐《植分学报》

药材名 山豆根(广西)

地方名 广西:广豆根(都安、马山、忻城)。

功效 根及根茎:清热解毒,消肿利咽。

#### 7148577

*Sophora velutina* Lindl. --- *S. glauca* Lesch. ex DC. --- *Indigofera mairei* Levl.

植物名 灰毛槐树《高植图鉴》

药材名 灰毛槐《西昌中草药》

文献名 紫花苦参《云南种录》

地方名 苦参(四川、云南);四川:黄药根、黄根药(西昌);云南:苦参根(东川),粉绿色槐。

功效 根:清热除烦,通经活血。用于喉痛,烦热不眠,避孕。

备考 四川以本品作苦参用;全株煎水,用于牛马瘟疫及肠臭病。

#### 7148578

*Spatholobus harmandii* Gagnep.

植物名 光叶密花豆《高植图鉴》

地方名 海南:红血藤,大样荔枝藤。

功效 藤茎:华南民间用作鸡血藤的代用品。

#### 7148579

*Spatholobus sinensis* Chun et T. Chen

植物名 红血藤《海南植志》

药材名 红血藤《品种论述》

文献名 华密花豆《广西植录》

地方名 鸡血藤(华南)。

功效 藤茎:华南民间用作鸡血藤的代用品。

#### 7148580

*Spatholobus suberectus* Dunn

植物名 密花豆《高植图鉴》

药材名 鸡血藤《药典》

地方名 血藤(广东、广西),[大血藤](广西、云南);广东:血风(惠阳);广西:九层风(博白、平南、北流、桂平、梧州),血风藤(藤县、昭平、柳江),血龙藤(贺县、苍梧),猪血藤(梧州、北流、桂平),过岗龙(靖西),三叶鸡

血藤;云南:小豆花、马鹿花、紫梗藤(思茅),大活血,〔红藤〕、活血藤(红河)。

功效 藤茎:补血,活血,通络。用于月经不调,血虚萎黄,麻木瘫痪,风湿痹痛。

#### 7148581

*Stizolobium capitatum* (Sweet) Kuntze --- *Mucuna capitata* Sweet

植物名 头花黎豆《高植图鉴》

药材名 黎豆《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 诸虑、山槲、虎槲、槲《尔雅》,槲槲、虎豆(《尔雅》郭璞注),狸豆《纲目》,巴山虎豆、鼠豆《名实图考》

地方名 台湾:老爪豆,虎爪豆,富贵豆。

功效 种子:有小毒。温中,益气。

#### 7148582

*Stizolobium cochinchinense* (Lour.) Tang et Wang --- *Mucuna cochinchinensis* (Lour.) A. Cheval.

植物名 龙爪豆《云南种录》

药材名 龙爪豆《名实图考》、《汇编》

文献名 黎豆、狸豆《本草拾遗》,龙爪黎豆《中药大辞典》,虎爪豆《汇编》

地方名 狗蹄豆(湖北、湖南);浙江:猫爪豆(临安),白黎豆,狗爪豆(天目山);广西:猫豆(南宁),苗豆(壮名)。

功效 种子:有小毒。用于腰脊酸痛;叶:清热,凉血。

#### 7148583

*Stizolobium pruriens* (L.) Medik. --- *Mucuna utilis* Wall ex Wight --- *Mucuna pruriens* (L.) DC. var. *utilis* (Wall. ex Wight) Bak. ex Burck

植物名 刺毛狸豆《云南种录》

药材名 刺毛黎豆(拟)

文献名 狗爪豆《广西药录》

地方名 广西:猫豆(南宁)。

功效 种子:有毒。用于腰膝酸痛,震颤性麻痹。

#### 7148584

*Stizolobium venulosum* Piper --- *Mucuna venulosa* (Piper) Merr. et Metc.

植物名 细脉狸豆《云南种录》

药材名 细脉黎豆(拟)

文献名 黄毛黎豆《广西植录》,爆气藤《云南药录》

功效 根:清热解毒,止痛,截疟。用于疟疾。

#### 7148585

*Swainsonia salsula* (Pall.) Taubert --- *Sphaerophysa salsula* (Pall.) DC. --- *Phaca salsula* Pall.

植物名 苦马豆《高植图鉴》

药材名 苦马豆《救荒本草》、《汇编》

文献名 红花苦豆子、牙巴尿泡草、羊卵泡、红苦豆子、铃铛草、黄吉布牙《沙漠植志》

地方名 羊尿泡(内蒙古、陕西、甘肃、宁夏),〔黄芪〕(山西、青海),尿泡草(陕西、甘肃、宁夏);内蒙古:“洪呼图-乌布斯”、“霍尔齐格努尔-奇希马斯”(蒙名),羊

卵蛋,〔沙蒺藜〕;陕西:羊奶奶。

功效 全草、根及果实:有小毒。利尿,消肿。用于肾炎水肿,慢性肝炎,肝硬化腹水,血管神经性水肿。

#### 7148586

*Tadehagi triquetrum* (L.) Ohashi --- *Desmodium triquetrum* (L.) DC. --- *Pteroloma triquetrum* (L.) Desv.

植物名 葫芦茶〔中国树木志〕

药材名 葫芦茶〔生草药性备要〕、〔汇编〕

文献名 瓠芦草〔植物名汇〕

地方名 田刀柄(福建、湖南、广东、云南),龙舌癩(福建、台湾),百劳舌、迫颈草(广东、广西),刨板茶(福建、广东),葫芦叶(湖南、广东、云南),蒲芦草(广东、海南、广西);江西:金腰带;福建:鲛鲤舌、麻草(福鼎、宁德、龙岩、霞浦),牛舌麻(武平),山埔姜、螳螂草(泉州),犬嘴舌、不落地(福安),双剑草(厦门),倒藤老抱(福鼎),〔虫草〕,杨梅草,加箭地草,剪犁头,锁剪果,胶剪草,尖刀癩,剑仔草,剑骨草,剪刀瓶,金剑草(闽南、宁德、福州、武平);台湾:三脚虎,虎咬癩;广东:蒲芦茶(东莞、番禺、高州、化州、茂名),蒲虫草(电白、海康、廉江、遂溪),葫芦板(台山),胡刨板、禾刨板(阳春),剃刀柄(从化),三胎叶、千根疔(高州、化州、茂名、阳江、阳春),双葡萄(东莞),长胫娘(化县),锹板茶(高要),禾颈甫(五华),百劳刺(惠阳),别颈草(连山),南颈胡、狗舌草(兴宁),龙舌红、龙舌茶(潮安、潮州、澄海、饶平),金葫芦(澄海),咸鱼菜(连平),咸鱼草,鲑鱼草(海丰),黄超板(高明);海南:咸虾叶,咸虾茶,芦茶(澄迈、琼海),超板茶;广西:小骨碎(昭平),逃马庄(荔浦),雷公锤(玉林、北流、陆川),长颈鹅、狗舌茶(陆川),狗舌奈、必须草(梧州),鳖颈草(贺县),鳖头草(苍梧),扎腰娘(博白),扎腰草,牛虫草;贵州:〔土豆〕,地马庄;云南:河地马桩、马郎果叶(红河),“丹火马”(傣名)。

功效 全株:清热解毒,消积利湿,杀虫防腐。用于预防中暑,感冒发热,咽喉肿痛,肾炎,黄疸型肝炎,肠炎,细菌性痢疾,小儿疳积,妊娠呕吐,菠萝中毒,小儿硬皮病。民间腌制咸鱼、肉类,放人本品,防蝇蛆。

#### 7148587

*Tadehagi triquetrum* subsp. *pseudotriquetrum* (DC.) Ohashi --- *Pteroloma pseudotriquetrum* Schindl. --- *Desmodium pseudotriquetrum* DC. --- *Tadehagi pseudotriquetrum* (DC.) Yang et P. H. Huang

植物名 蔓茎葫芦茶〔中国树木志〕

药材名 蔓茎葫芦茶〔广西药录〕

文献名 假葫芦茶〔拉汉英种称〕

地方名 葫芦茶(福建、台湾、广西、云南);浙江:麻草(乐清),〔金腰带〕(青田、温州);台湾:三脚虎,龙舌癩,龙舌黄;广西:一条根。

功效 根:止咳,化痰,止呕,杀虫。用于百日咳,呕吐,小儿疳积,痢疾,感冒。外用于疮疖。

#### 7148588

*Tamarindus indica* L.

植物名 酸豆〔中国植志〕

药材名 酸豆〔台湾药植志〕

文献名 都橈子〔本草拾遗〕,酸饺〔滇南本草〕,朝鲜槿藤子肉(叶〔生药〕),油楠〔树分〕,答满林度〔中国植物图鉴〕,答满林度树(小泉〔药植〕),〔罗望子〕〔汇编〕

地方名 酸角(四川、云南);台湾:酸果树;海南:〔乌梅〕,酸梅,酸梅树;四川:酸枣;云南:“曼姆”、“木罕”(傣名),酸果,通血香;其他:爪哇的酸。

功效 果实:清热解暑,消食化积。用于中暑,食欲不振,小儿疳积,妊娠呕吐,便秘,蛔虫病;叶:退肿止痛,胆汁性发烧。外用于洗创伤;叶汁:用于眼结膜炎;花:用于眼结膜炎,痔出血;树皮:收敛,强壮,洗溃疡,疖,毛虫皮疹;心材:泻下。用于脾脏疾患。

备考 《植分学报》(1977):“古称‘罗望子’和‘罗晃子’,实为梧桐科的苹婆(*Sterculia nobilis* Smith)由于后人以讹传讹,把‘罗望子’和‘罗晃子’的名称误用在豆科植物 *Tamarindus indica* L. 上。”现《中国植志》等已将本种改称“酸豆”。

#### 7148589

*Tephrosia purpurea* (L.) Pers.

植物名 灰叶〔高植图鉴〕

药材名 灰叶〔汇编〕

文献名 红花灰叶〔纲目〕,野青树、野青子、假靛青、野蓝靛〔豆科图说〕,灰毛豆〔拉汉英种称〕

地方名 野蓝、假蓝靛(广东、广西);广东:山青、灰叶根(广州);海南:乌仔草,紫草藤,假蓝靛;云南:毛青。

功效 全草、根:有毒,解表,健脾燥湿,行气止痛。用于风热感冒,消化不良,腹胀腹痛,慢性胃炎。外用于湿疹,皮炎。

#### 7148590

*Tephrosia villosa* (L.) Pers.

植物名 长毛灰叶〔豆科图说〕

药材名 长毛灰叶〔台湾药植志〕

文献名 毫毛草藤〔台湾药植志〕

功效 叶汁:用于水肿。

#### 7148591

*Teramnus labialis* (L. f.) Spreng. --- *Glycine labialis* L.

植物名 钩豆〔拉汉英种称〕

文献名 广叶南洋豆〔台湾药植志〕,软荚豆〔海南植志〕

功效 种子:清凉,收敛。用于肺病,发烧,胆及血液疾患。

#### 7148592

*Thermopsis alpina* Ledeb.

植物名 高山黄华〔高植图鉴〕

药材名 高山黄华〔汇编〕

地方名 西藏:高山黄华根。

功效 根:截疟,镇静,降压,清热化痰。用于疟疾,高血压;花、果:用于狂犬病。

#### 7148593

*Thermopsis barbata* Royle --- *T. atrata* Czefr.

植物名 紫花黄华〔云南种录〕

药材名 紫花黄华《汇编》

文献名 紫色黄华《青藏药图》

地方名 青海：“沙对嘎保”（藏名）。

功效 根、根茎：有小毒。杀虫，止痛，消炎。用于疟疾，高血压，肺热咳嗽。

#### 7148594

*Thermopsis chinensis* Benth.

植物名 小叶野决明《高植图鉴》

文献名 野决明《浙江药植志》，小叶决明《经济植物学》

地方名 浙江：高脚獐猪豆（临安）。

功效 全株：有毒。祛痰止咳；根及种子：用于目赤肿痛。

#### 7148595

*Thermopsis inflata* Gamble

植物名 胀果黄华《迪庆藏药》

药材名 胀果黄华《迪庆藏药》

功效 带果枝叶：用于脑病。

#### 7148596

*Thermopsis lanceolata* R. Br.

植物名 披针叶黄华《高植图鉴》

药材名 野决明《汇编》

文献名 牧马豆《宁夏中草》，苦豆、枪叶野决明《陕甘宁青中草药选》

地方名 苦豆子（内蒙古、青海）；河北：苦豆根；内蒙古：“塔日布根-西给药”（蒙名），绞蛆爬，面人眼睛；陕西：苦豆角、野黑豆（榆林），黄华；宁夏：黄华苦豆子，蒴豆子；青海：“拉豆”（藏名）；四川：菌串子（成都）；其他：土马豆，木马豆。

功效 全草：有毒。祛痰、镇咳。用于痰喘咳嗽；根：有毒。用于梅毒性鼻疽，虫牙。

备考 《沙漠植志》2:180, 1987“披针叶黄华”学名为 *Thermopsis shischkinii* Czefr., 认为《豆科图说》(1955)学名 *T. lanceolata* R. Br. 系误订。

#### 7148597

*Thermopsis lupinoides* (L.) Link. --- *Sophora lupinoides* L. --- *Thermopsis fabacea* (Pall.) DC.

植物名 羽扇野决明《东北草本植志》

药材名 野决明《中药大辞典》

文献名 霍州油菜《名实图考》，黄华、先代菽、仙台菽、花豆秧《豆科图说》

功效 茎叶及种子：有毒。解毒消肿，祛痰催吐。用于恶疮疥癣。

#### 7148598

*Trifolium lupinaster* L.

植物名 野火球《高植图鉴》

文献名 也火秋、野火菽、野车轴草《豆科图说》

地方名 内蒙古：“禾日音-好希扬古日”（蒙名）。

功效 全草：镇静，止咳，止血。

#### 7148599

*Trifolium pratense* L.

植物名 红车轴草《高植图鉴》

药材名 红车轴草《中国药植志》

文献名 红菽草、红花苜蓿、金花菜《国产牧草植物》，红三叶《种称》，红花三叶草《种分》，三叶草、红花翹搖《豆科图说》，红花草翹搖《汇编》，红荷兰翹搖《台湾药植志》，红三叶草《贵州药录》

地方名 三叶草（江苏、江西）；湖北：红花草子（神农架）；贵州：三消草，山泉草。

功效 花序及带花枝叶：止咳，止喘，镇痉。

备考 国外有将全草、花、种子及根制成软膏、膏药、糊剂、煎剂或泡茶饮，作为抗肿瘤药物。

#### 7148600

*Trifolium repens* L.

植物名 白车轴草《高植图鉴》

药材名 白车轴草《汇编》

文献名 白三叶《种称》，翹搖《种分》，白花三叶草《种分》，白花苜蓿、荷兰翹搖、金花草、菽草翹搖《豆科图说》，白荷兰翹搖《台湾药植志》，白三叶草《贵州药录》

地方名 贵州：三消草（贵阳），山泉草，山花生，翹疊花。

功效 全草：清热，凉血，宁心。用于癫痫，痔疮出血，风热咳嗽，痰喘，失眠。

#### 7148601

*Trigonella archiducis-nicolai* Sirj. --- *Medicago archiducis-nicolai* Sirj.

植物名 青藏胡芦巴《西藏植志》

文献名 矩镰苜蓿《中药大辞典》

地方名 四川：“莫桑河”（藏名）。

功效 全草：清热消炎，强心利尿。用于肺炎咳嗽。外用于创伤。

#### 7148602

*Trigonella coerulea* (Desr.) Ser. --- *Melilotus coeruleus* Desr. ex Lam. --- *Trifolium coeruleum* Willd.

植物名 卢豆《东北草本植志》

地方名 黑龙江：香草。

功效 种子：温肾，祛寒，止痛。用于肾脏虚冷，小腹冷痛，小肠疝气，寒湿脚气。

#### 7148603

*Trigonella foenum-graecum* L.

植物名 胡芦巴《豆科图说》

药材名 胡芦巴《嘉祐本草》、《药典》

文献名 苦豆《饮膳正要》，卢巴《纲目》，芦巴《本草原始》，胡巴《本草求真》，芸香草《盛京通志》，芸香《名实图考》，灵香草、零香草、酒城草《和汉药名汇》，肾曹、都尉、番萝卜子、都护《新纲》，胡芦巴《东北药植志》，苦草、苦菜《中药大辞典》

地方名 香苜蓿（陕西、甘肃、宁夏），香豆（陕西、甘肃、青海），香豆子（甘肃、新疆），卢巴子（甘肃、安徽），香草（东北、北京、陕西），香草儿（河北、河南），季豆（东北），芦巴子（东北、四川）；内蒙古：“扎嘎日图-宝日其格”（蒙名）；甘肃：苦豆子；新疆：小不反 其他：苦豆实，胡芦巴子。

功效 种子:温肾,祛寒,止痛。用于肾脏虚冷,小腹冷痛,小肠疝气,寒湿脚气。

## 7148604

*Trigonella tibetana* (Alef.) Vassilcz. --- *T. foenum-graecum* L. var. *tibetana* Alef.

植物名 西藏胡芦巴(拟)

药材名 西藏胡芦巴(拟)

文献名 胡芦巴《西藏植志》

地方名 西藏:“雪杉”(藏名),香豆。

功效 种子:补肾壮阳,祛痰,去寒湿。

## 7148605

*Uraria crinita* Desv. ex DC.

植物名 猫尾射《豆科图说》

药材名 虎尾轮《闽南民间草药》

文献名 猫尾草《广西药录》,兔儿草《种分》

地方名 狐狸尾(海南、广西);福建:大本山菁、古钱窗草、铁金铜(泉州),狗尾射(上杭、永定),一箭花(平潭),统天草(闽南),防虫草(厦门);海南:布狗尾,兔狗尾,千斤笔;广西:九子莲花(容县),老虎尾(贵县、平南、桂平),狼狗尾(平南、桂平),野狸尾(苍梧),狗尾梗(桂林),[狗尾草],狗鞭蕨。

功效 全草:清热,解毒,止血,消痈。用于咳嗽,肺病,吐血,咯血,尿血,脱肛,子宫脱垂,肿毒;根:理气,化痰,益肾。用于心胃气痛,痰饮咳嗽,肾虚遗精。

## 7148606

*Uraria crinita* Desv. var. *macrostachya* Wall. --- *U. macrostachya* Schindl.

植物名 长穗猫尾射《豆科图说》

药材名 布狗尾《岭南草药志》

文献名 土狗尾《岭南采药录》,长穗猫尾草《海南植志》,狐狸尾《台湾药植志》,长穗狸尾草《岭南草药志》,大穗兔尾草《广西植录》,防虫草、猫上树《汇编》

地方名 福建:托天草,虫草,倘天草,虎尾轮,鼠尾痈;广东:猫公树(广州),石参、猫尾草(惠阳),兔狗尾。

功效 全草:清热化痰,凉血止血,杀虫。用于感冒,咳嗽,疟疾,血丝虫病,小儿疳积,吐血,咯血,尿血;根:行气止痛,逐饮化痰。用于心胃气痛,痰饮咳嗽。

## 7148607

*Uraria lagopodioides* (L.) D. Don --- *Hedysarum lagopodioides* L. --- *Uraria lagopoides* DC.

植物名 狸尾草《海南植志》

药材名 狸尾草《汇编》

文献名 狐狸尾《生草药性备要》,兔尾草《高植图鉴》,狸尾豆《广西药录》,尾萼豆《台湾药植志》

地方名 福建:虎尾轮、猫尾豆(厦门);广西:小野狸尾(岑溪),千斤力(上林),龙狗尾(宁明),狗狸尾(梧州),野合酥(武鸣),猫尾草,白根假花生。

功效 全草:清热解毒,散结消肿。用于颈淋巴结结核,毒蛇咬伤,痈疮肿痛;根:用于痢疾。

## 7148608

*Uraria picta* (Jacq.) Desv. ex DC. --- *U. linearis* Hassk. --- *Doodia picta* Roxb.

植物名 美花兔尾草《高植图鉴》

药材名 美丽兔尾草《汇编》

文献名 美花兔尾木《中国树木志》,美花狸尾豆《广西药录》,彩色兔尾草《西昌中草药》,狐狸尾、退蛆草《汇编》

地方名 广西:牵筋草(宁明),牵根草,猫尾风(南宁);四川:[断肠草]、闹蛆药(西昌);贵州:[蜈蚣草],密马。

功效 枝、叶:除湿,散寒。用于感冒发热,小便刺痛,肌肉酸痛;根:平肝补肾。用于头晕心烦;果实:用于小儿口腔病;叶:用于淋病。

## 7148609

*Uraria sinensis* (Hemsl.) Franch. --- *U. hamosa* Wall. var. *sinensis* Hemsl.

植物名 华兔尾草《云南种录》

药材名 猫尾草《汇编》

文献名 中华兔尾草《云南药录》,华南兔尾木《中国树木志》

地方名 云南:饿蚂蟥(绥江),细长叶。

功效 全草:清热化痰,凉血止血,杀虫。

## 7148610

*Urariopsis brevissima* Yang et P. H. Huang

植物名 短序算珠豆《广西药录》

功效 叶:用于恶毒大疮。

## 7148611

*Urariopsis cordifolia* (Wall.) Schindl. --- *Uraria cordifolia* Wall.

植物名 算珠豆《高植图鉴》

文献名 [大金钱草]《元江哈尼族药》

地方名 云南:“喝皮阿查”(哈尼语)。

功效 根:发汗解表,除湿利尿,散瘀止痛。用于感冒,跌打瘀血,肾炎,膀胱炎。

## 7148612

*Vicia amoena* Fisch.

植物名 山野豌豆《高植图鉴》

药材名 山野豌豆《汇编》

文献名 宿根巢菜《重要牧草栽培》,宿根草藤、涝豆秧《国产牧草植物》,豆豆苗、高蔓豆藤、宿根苕子《豆科图说》,大巢菜、胡不姿《沙漠药植》,东北透骨草《汇编》

地方名 [透骨草]、山黑豆、山草藤、落豆秧、落倒秧(东北),野豌豆(东北、云南);黑龙江:野豆角(哈尔滨);吉林:草藤;河北:山豆苗,山豌豆;山西:小豆豆苗,芦豆苗,豆豌豆;内蒙古:“乌拉音·给希”、“丘杜尔·乌布斯”、“奥依诺姆”(蒙名);甘肃:铁豆角(岷县),[紫花地丁];青海:“尼牙托巴”(藏名);新疆:“亚瓦普尔恰克”(维名)。

功效 全草:散风祛湿,解毒止痛。用于风湿关节痛。外用于疮疡肿毒。

## 7148613

*Vicia amoena* Fisch. var. *oblongifolia* Regel - - *V. amoena* Fisch. var. *angusta* Freyn.

植物名 狭叶山野豌豆《东北草本植志》

药材名 山野豌豆《内蒙古中草药》

文献名 狭山野豌豆《东北药植志》, 芦豆苗《内蒙古中草药》

地方名 [透骨草]、中叶落豆秧(东北); 内蒙古: “占H勒格-豌豆”(蒙名), 山黑豆, 豆苗。

功效 地上部分: 散风祛湿, 解毒, 止痛。用于风湿筋骨疼痛, 阴囊湿疹, 疮毒。

#### 7148614

*Vicia amoena* Fisch. var. *sericea* Kitag.

植物名 绢毛山野豌豆《东北草本植志》

药材名 毛山野豌豆《东北药植志》

地方名 [透骨草](黑龙江、辽宁); 辽宁: 毛野豌豆(旅顺)。

功效 全草: 散风祛湿, 解毒止痛。

#### 7148615

*Vicia amurensis* Oett.

植物名 黑龙江野豌豆《东北草本植志》

药材名 黑龙江野豌豆《长白山植药志》

功效 全草: 祛风湿, 活血, 舒筋, 止痛。

备考 全草作透骨草入药。

#### 7148616

*Vicia angustifolia* L.

植物名 窄叶野豌豆《高植图鉴》

文献名 狭叶野豌豆《种分》, 苕饶、鸟野豌豆、雀野豌豆、鸟豌豆《豆科图说》, 野绿豆《高植图鉴》

地方名 [王不留行](江苏、湖北、贵州); 湖北: 小叶野豌豆(神农架)。

备考 种子: 在局部地区混作王不留行使用, 应注意鉴别。

#### 7148617

*Vicia bungei* Ohwi --- *V. tridentata* Bunge

植物名 三齿萼野豌豆《高植图鉴》

文献名 [透骨草]、骨草《和汉药名汇》, 三齿草藤、山黧豆《豆科图说》, 野豌豆《陕甘宁植志》

功效 全草: 解表, 活血行血, 祛瘀生新。

#### 7148618

*Vicia cracca* L.

植物名 广布野豌豆《高植图鉴》

药材名 广布野豌豆《汇编》

文献名 巢菜《种分》, 细叶野豌豆《沙漠植志》, 野落秧草藤《豆科图说》

地方名 小叶落豆秧、毛草藤、[透骨草](东北), 落豆秧(东北、内蒙古), 草藤(内蒙古、湖北), 野豌豆(江苏、湖北、贵州); 吉林: 细叶落豆秧; 内蒙古: “伊曼-给希”(蒙名), [地丁]; 陕西: 苕子(陕南); 广西: 蓝花草(桂平), 肥田草; 四川: “那乌善玛”(藏名), 野苕子(峨眉山), 野麻豌豆。

功效 全草: 清热止咳, 散瘀止血。用于子宫脱垂, 脱肛, 痞积, 吐血, 咯血, 尿血。

#### 7148619

*Vicia cracca* L. var. *canescens* Maxim.

植物名 灰叶广布野豌豆(拟)

地方名 辽宁: 透骨草(沈阳)。

功效 全草: 解表, 活血行血, 祛瘀生新。

#### 7148620

*Vicia faba* L.

植物名 蚕豆《高植图鉴》

药材名 蚕豆《救荒本草》、《汇编》

文献名 佛豆《益部方物略记》, 胡豆《纲目》, 南豆《蒙化府志》, 蚕豆荚壳(姚可成《食物本草》), 蚕豆壳、蚕豆黑壳《纲目拾遗》, 蚕豆皮[种皮]《本草求真》, 豇豆、仙豆、寒豆、拒豆、湾豆、罗泛豆《中国药植志》, 糊豆、树豆《豆科图说》, 蚕豆叶《现代实用中药》

地方名 蚕豆花(江苏、浙江、四川), 胡豆花(上海、四川); 内蒙古: [大豆]; 上海: 夏豆, 蚕豆梗; 浙江: 罗汉豆(金华、衢县、遂昌), 川豆(台州); 台湾: 马齿豆; 四川: “伸马”(藏名), 虫胡豆, 老胡豆, 葫黑豆, 虫蚕豆, 蚕豆茎(成都); 云南: “吐比”(西双版纳傣语), 豆。

功效 花: 凉血止血, 止带降压。用于咯血, 吐血, 便血, 白带, 高血压病; 种子: 健脾利湿, 用于脚气水肿; 豆荚: 敛疮。用于天疱疮, 脓疱疮, 烧、烫伤; 叶: 解毒。用于蛇咬伤; 梗: 止血止泻。用于各种内出血, 腹泻; 种皮(豆壳): 利尿渗湿。用于水肿脚气, 小便不通, 天疱疮, 黄水疮。

#### 7148621

*Vicia gigantea* Bunge

植物名 大野豌豆《高植图鉴》

药材名 大野豌豆《药学报》

文献名 薇《诗经》, 野豌豆、大巢菜、垂水《豆科图说》

地方名 陕西: [红芪](淳化); 湖北: 野黄芪(神农架)。

功效 根: 消肿排脓。外用于疮毒疔肿。

备考 据记载此草对牲畜有毒。

#### 7148622

*Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray

植物名 小巢菜《高植图鉴》

药材名 小巢菜《纲目》、《中药大辞典》

文献名 苕《诗经》, 薇、雀野豆《本草拾遗》, 瓢摇豆《履巉岩本草》, 野蚕豆、元修菜、漂摇草、漂摇豆《纲目》, 硬毛果野豌豆、雀野豌豆、野豌豆、摇车《豆科图说》

地方名 [王不留行](山东、江苏、江西、湖北、湖南); 四川: 野苕子(峨眉山), 野麻豌豆, 小野麻豌豆, 白翘摇, 苕子、白花苕菜(成都)。

功效 全草: 解表利湿, 活血止血。用于黄病, 疟疾, 鼻衄, 白带; 种子: 活血, 明眼。

#### 7148623

*Vicia japonica* A. Gray

植物名 东方野豌豆《东北草本植志》

药材名 东方野豌豆《长白山植药志》

文献名 日本野豌豆《豆科图说》

地方名 吉林: 透骨草。

功效 全草: 散风祛湿, 活血止痛。

## 7148624

*Vicia kulingiana* Bailey

植物名 枯岭野豌豆《高植图鉴》

药材名 枯岭野豌豆《浙江药植志》

地方名 浙江: 红花豆、四叶豆(鄞县), 山蚕豆(临安)。

功效 全草: 清热解毒, 活血。用于小儿疳积, 风寒咳嗽。

## 7148625

*Vicia multicaulis* Ledeb.

植物名 多茎野豌豆《豆科图说》

药材名 多茎野豌豆《中药大辞典》

文献名 野毛耳《豆科图说》

地方名 内蒙古: “萨格拉嘎日-给希”(蒙名); 四川: “那乌善玛”(藏名)。

功效 全草: 发汗除湿, 活血止痛。用于风湿疼痛, 筋骨拘挛, 黄疸型肝炎, 白带, 鼻血, 热疟, 阴囊湿疹。

## 7148626

*Vicia nummularia* Hand. -Mazz.

植物名 西南野豌豆《豆科图说》

药材名 野马豆《西昌中草药》

文献名 黄花野豌豆《西昌中草药》, 黄花野苕子《云南种录》

功效 全草: 祛痰止咳, 活血调经, 攻毒拔脓。用于咳嗽痰多, 月经不调, 腰痛, 鼻血, 疔疮, 痔疮, 劳伤腰痛, 牙痛, 跌打损伤, 疟疾, 黄疸, 蛔虫性腹痛。

## 7148627

*Vicia pseudo-orobus* Fisch. et Mey. --- *V. tanakae* Franch. et Sav.

植物名 大叶野豌豆《东北草本植志》

药材名 大叶野豌豆(东北)

文献名 假香野豌豆《中药志》, 假香豌豆《湖北植志》, 大叶巢菜《经植手册》, 大叶草藤《中国植物图鉴》, 槐条花、芦豆苗《豆科图说》

地方名 槐条花、透骨草、大落豆秧、大叶落豆秧(东北); 吉林: “沙利拉木儿”(朝名); 内蒙古: “乌日根-纳布其特-给希”(蒙名); 湖北: 野山豆根(神农架); 湖南: 野豌豆。

功效 全草: 祛风湿, 活血, 舒筋, 止痛。

## 7148628

*Vicia ramuliflora* (Maxim.) Ohwi

植物名 北野豌豆《东北草本植志》

药材名 北野豌豆《长白山植志》

地方名 吉林: 透骨草(长白山)。

功效 全草: 解表, 活血行血, 祛瘀生新。

## 7148629

*Vicia ramuliflora* (Maxim.) Ohwi f. *baicalensis* (Turcz.) P. Y. Fu et Y. A. Chen --- *V. baicalensis* (Turcz.) Fedtsch.

植物名 贝加尔野豌豆《长白山植志》

文献名 贝加野豌豆《豆科图说》

地方名 吉林: 透骨草(长白山)。

功效 全草: 解表, 活血行血, 祛瘀生新。

## 7148630

*Vicia sativa* L.

植物名 救荒野豌豆《高植图鉴》

药材名 大巢菜《纲目》、《中药大辞典》

文献名 薇《诗经》, 垂水《尔雅》, 薇菜、巢菜、野豌豆《品汇精要》, 野绿豆《救荒野谱》, 马豆草、翘摇、田蚕豆《滇南本草》, 野麻豌豆《草木便方》, 箭筈豌豆《植物学大辞典》, 春巢菜、普通苕子、栽种草藤、无蔓箭、筈豌豆《豆科图说》, 马豆《云南种录》

地方名 [王不留行](江苏、湖北、湖南、贵州), 苕子(湖南、广东、四川); 内蒙古: “给希-额布斯”(蒙名); 甘肃: 劳灯儿草; 安徽: 拉拉豆子; 湖北: 野小扁豆(神农架); 湖南: 草子, 野苕, 野皂角, 野苕子, 野豌豆草; 广东: 黄藤子(广州); 广西: 麦豆藤(乐业), 野牙三(柳江), 大巢豆; 四川: 马豌豆、弯麻子、野麻豌豆(南充), 瓦布子(峨眉山); 贵州: 肥田草; 云南: 野菜豆; 其他: 苕饶, 野麦豌豆。

功效 全草: 清热利湿, 和血祛瘀。用于黄疸, 浮肿, 疟疾, 鼻衄, 心悸, 梦遗, 月经不调。

## 7148631

*Vicia sepium* L.

植物名 野豌豆《高植图鉴》

药材名 野豌豆《中药志》

文献名 滇野豌豆《云南种录》

功效 叶、花、果: 清热解毒, 消肿。

备考 有的地区以其种子作王不留行使用。

## 7148632

*Vicia tetrasperma* (L.) Moench.

植物名 四籽野豌豆《高植图鉴》

药材名 四籽野豌豆《汇编》

文献名 丝翘翘《野菜博录》, 乌喙豆《高植图鉴》

地方名 [王不留行](江苏、上海、湖北、湖南、贵州), 乌喙豆(江苏、广西); 陕西: 四籽草藤; 山东: 山豌豆、崂豆蔓(崂山); 湖北: 野豌豆(神农架); 广西: 异猪草(桂林)。

功效 全草: 解表利湿, 活血止血。外用于疮疡肿毒。

## 7148633

*Vicia unijuga* A. Br.

植物名 歪头菜《高植图鉴》

药材名 歪头菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 山苦瓜《名实图考》, 双叶巢菜《兴安植群》, 谷渡、水皂荚《满蒙野卉》

地方名 [透骨草](东北), 野豌豆(甘肃、青海、贵州), 两叶豆苗(河北、江西); 吉林: “罗克杜拉木儿”(朝名); 河北: 二叶蚕豆, 二叶菽, 草豆; 内蒙古: “浩日黑纳格-额布斯”(蒙名); 青海: 豌豆花; 山东: 山绿豆(崂山), 山豆苗(泰山), 老驴枷板(莱阳), 绿豆芽(崂山), 野绿豆(费县); 湖北: 土黄苣(神农架); 湖南: 豆叶菜; 贵州: 三铃丁(贵阳), 豆菜, 山铃丁; 云南: 红水豆, 山豆。



豆根。

功效 全草：补虚调肝，理气止痛，清热利尿。用于头晕，体虚浮肿，胃痛。外用于疔疖。

#### 7148634

*Vicia unijuga* A. Br. var. *apoda* Maxim.

植物名 短序歪头菜《东北草本植志》

药材名 短序歪头菜《长白山植药志》

功效 全草：补虚调肝，理气止痛，清热利尿。

#### 7148635

*Vicia unijuga* Al. Braun var. *apoda* Maxim. f. *albiflora* Kitag.

植物名 白花短序歪头菜《东北药用植物》

药材名 白花歪头菜《拟》

功效 全草：补虚调肝，理气止痛，清热利尿。用于劳伤，头晕，体虚浮肿，胃痛。外用于疔疖。

#### 7148636

*Vicia unijuga* Al. Braun var. *ohwiana* (Hosokawa) Nakai --- *V. ohwiana* Hosokawa

植物名 长齿歪头菜《东北草本植志》

药材名 长齿歪头菜《东北药用植物》

功效 全草：补虚调肝，理气止痛，清热利尿。用于劳伤，头晕，体虚浮肿，胃痛。外用于疔疖。

#### 7148637

*Vicia villosa* Roth

植物名 长柔毛野豌豆《高植图鉴》

文献名 毛叶苕子、毛茸苕子《高植图鉴》

地方名 贵州：毛苕菜。

功效 种子：行气通经，消肿止痛，催生下乳。

#### 7148638

*Vigna unguiculata* (L.) Walp. --- *Dolichos sinensis* L.

--- *Vigna sinensis* (L.) Savi ex Hassk.

植物名 豇豆《云南种录》

药材名 豇豆《救荒本草》、《汇编》

文献名 紫豇豆苗《救荒本草》，豇豆叶、豇豆根《滇南本草》，降豆《纲目》，豇豆《食物本草》，羊角、豆角《医林纂要》，八月角豆《植物名汇》，线豆《满蒙植汇》，腰豆、裙带豆、大角豆、红豆、苕豆、降豆、双豆、饲料豇豆、打豇《豆科图说》

地方名 菜豆《陕西、福建》；内蒙古：“乌日图-宝日其格”（蒙名）；江苏：长豇豆；浙江：角豆，饭豆，长豆；台湾：菜豆壳；湖北：江豆；广东：豆角干；四川：姜豆、豇豆壳（成都）；贵州：紫豆；云南：八月豆。

功效 种子、叶、果皮、根：健脾利湿，清热解毒，止血。用于血尿，小便不通，小儿疳积，疔疮，毒蛇咬伤，盗汗；壳：镇痛，消肿。用于腰痛，乳痛。

#### 7148639

*Vigna unguiculata* (L.) Walp. var. *catjang* (Burm. f.) Bertoni --- *Vigna cylindrica* (L.) Skeels --- *Phaseolus cylindricus* L. --- *Vigna unguiculata* (L.) Walp. var. *cylindrica* (L.) Ohashi --- *Dolichos catjang* Burm. f.

植物名 短荚豇豆《云南种录》

药材名 饭豆《日用本草》、《中药大辞典》

文献名 白豆《孙真人食忌》，饭豇豆《豆科图说》，眉豆《江苏植志》

地方名 甘豆《湖南、广东》；广西：白目豆。

功效 种子：调中益气，健脾益肾。

#### 7148640

*Vigna unguiculata* (L.) Walp. var. *sesquipedalis* (L.) Ohashi --- *Dolichos sesquipedalis* L. --- *Vigna sesquipedalis* (L.) W. F. Wight ex Freeman

植物名 豆角《云南种录》

药材名 长豇豆《贵州药录》

文献名 尺八豇、长豆角《豆科图说》

功效 种子：清热凉血，和胃健脾。用于盗汗，疳积，小便不利，牙疳，无名肿毒。

备考 《秦岭植志》1(3):113, 1981 将本种并入豇豆，学名正名为 *Vigna sinensis* (L.) Endl.

#### 7148641

*Vigna vexillata* (L.) Benth. --- *Phaseolus vexillatus* L.

植物名 野豇豆《高植图鉴》

药材名 野豇豆《汇编》

文献名 山土瓜《名实图考》，野豇豆、〔红参〕《中国药植志》

地方名 〔土高丽参〕《浙江、安徽、江西》，绿豆参《安徽、江西、湖北》，〔土人参〕《浙江、安徽、湖南》；江苏：〔朝鲜人参〕《南通军山、镇江》，〔高丽参〕《灌云》；浙江：山豆、山绿豆、红皮豆《临安》；安徽：野绿豆；湖北：三叶参；广西：白洋参《梧州、北流》，〔山豆根〕《陆川》，老鼠豆《全州》，土白参，假人参；其他：〔朝鲜参〕，〔吉林参〕，〔红力参〕，〔土参〕，〔大红参〕，〔西洋参〕，〔豆角参〕，〔南通军山人参〕。

功效 根：清热解毒，消肿止痛，利咽喉。用于风火牙痛，咽喉肿痛，腮腺炎，疮疖，小儿麻疹余毒不尽，胃痛，腹胀，便秘，跌打肿痛，骨折；种子：清热除湿。用于风湿肿痛，无名肿毒。

备考 江苏南通一带有人以其根加工炮炙伪充朝鲜人参或红参出售，应注意鉴别。

#### 7148642

*Vigna vexillata* (L.) Benth. var. *yunnanensis* Franch.

植物名 云南野豇豆《汇编》

文献名 云南山土瓜《云南种录》，山马豆根、野马豆《中药大辞典》

地方名 云南：山马豆，〔山豆根〕《昆明》，野汤豆，野萝卜，细活血。

功效 根：清热解毒，消肿止痛，利咽。

#### 7148643

*Whitfordiodendron filipes* (Dunn) Dunn --- *Adinobotrys filipes* Dunn --- *Podobruggea filipes* (Dunn) Gaib

植物名 大英藤《中国树木志》

药材名 猪腰子《纲目》

文献名 细梗密束花《广西植录》，红梗惠特木、猪腰豆《广西药录》，细梗大英藤《品种论述》，象牙豆《中药材》

地方名 广西：小血藤《凌云》，〔鸡血藤〕《龙州》；云

南：瓦叶藤、冲天子；西藏：“阿哲”（藏名）。

功效 茎：补血。用于贫血，月经不调。

备考 藏医用本品种子代芒果核（*Mangifera indica* L.）用。

7148644

*Wisteria floribunda* (Willd.) DC.

植物名 多花紫藤《高植图鉴》

药材名 多花紫藤《台湾药植志》

文献名 黄环、狼跋子、藤萝花、女萝、藤花菜《豆科图说》，藤、朱藤《高植图鉴》，藤萝、紫藤《山东树木志》

功效 根：用于水臌病，筋骨疼痛；种子：缓泻；茎皮、花：解毒驱虫，止吐泻。

7148645

*Wisteria sinensis* Sweet --- *Kraunhia sinensis* Mak. ---

*Wisteria chinensis* DC. --- *Glycine sinensis* Sims

植物名 紫藤《高植图鉴》

药材名 紫藤《本草拾遗》、《汇编》

文献名 招豆藤、紫藤子《本草拾遗》，朱藤《梦溪笔谈》，藤花菜《救荒本草》，守宫槐《群芳谱》，藤花《青田县志》，小黄藤、黄环、狼跋子《名实图考》，女萝《植物名汇》，微藤《树分》，凌泉、就葛、大就、生白、根韭、葛花藤萝树《豆科图说》

地方名 藤萝（山东、江西）；河北：葛萝树，藤萝树；陕西：硬葛藤（陕南），葛花藤（西乡），铁葛麻藤（南郑），皂葛藤；山东：萝花（济南），藤萝花（昆崙山、泰山）；江苏：紫金藤，紫藤豆，紫金藤子，藤花子，猪花藤（宜兴），猪儿藤，株藤壳；浙江：山夹豆（天目山），紫花藤，黄牵藤，黄绞藤；江西：豆藤，轿藤，黄纤藤；河南：〔葛藤〕；湖北：交藤，绞葛老藤；湖南：棉绞藤，棉藤，棉藤皮；四川：石岩参、矮它它（成都）；其他：度谷，紫藤麻。

功效 茎皮、花及种子：有小毒。止痛，杀虫。用于腹痛，蛲虫病；根：祛风通络。用于风湿痹痛。

7148646

*Wisteria venusta* Rehd. et Wils. --- *W. brachybotrys* Sieb. et Zucc. var. *alba* Mill.

植物名 白花藤萝《中国树木志》

药材名 大发汗《云南文山》、《中药大辞典》

文献名 冬花树《中国树木志》，白花藤《树分》，紫藤《云南药录》

地方名 云南：白仙丹（文山），白龙藤，白藤，断肠叶。

功效 根：有毒，发汗解表，除风祛湿。用于风湿疼痛，跌打损伤，感冒发热，头痛鼻塞。

7148647

*Wisteria villosa* Rehd.

植物名 藤萝《中国树木志》

地方名 山东：紫藤。

功效 茎皮、花：解毒，驱虫。用于吐泻。

7148648

*Zornia gibbosa* Spanoghe --- *Z. diphylla* auct. non (L.) Pers.

植物名 丁癸草《云南药录》

药材名 丁癸草《生草药性备要》、《汇编》

文献名 丁癸草根《生草药性备要》，红骨丁地青《实用中草药》，二叶丁癸草《台湾药植志》

地方名 二叶人字草（广东、四川），人字草（浙江、福建、广东、广西、四川），丁癸草（福建、广东、广西），乌龙草、瓜核草（广东、广西），苍蝇翼（福建、广东），蚊古草、蟋蟀草（广东、海南）；福建：瓜子叶一条根、铁甲将军、粗糠叶一条根（泉州），一条根，草花子草，人竹草；广东：铺地锦（新会、徐闻、海康、廉江、遂溪），乌蝇翼草（梅县），牛心莫沙草（增城），双雀翎草（罗定、新兴），龙川草（乐昌），沙甘葛（紫金），地沙草（南海），乌蝇羽（增城），披地风（潮安、潮州），蚂蚁草（普宁），且蚊草（南澳），乌豆草（惠来），角蚊草、胡蝇翼（潮阳），薄叶瓜仁草、沙甘草（五华），黄花草（阳春），天葵、蟹襪草（兴宁），黄花柑药（南雄），沙柑草（曲江），溜子药（翁源），金鸳鸯，苦地枕；海南：瓜仁草（澄迈、琼海、海口、定安、屯昌）；广西：金线吊虾蟆、斜对叶（贵县），〔地丁〕、敷地草（陆川、博白），王瓜核（玉林），铺地草，双叶草，红骨丹，两叶胡蝇翅；四川：水细辛连。

功效 全草：清热解表，凉血解毒。用于感冒，咽喉炎，急性黄疸型肝炎，急性胃肠炎，急性阑尾炎，小儿疳积，急性乳腺炎，眼结膜炎。外用于跌打损伤，痈疽肿毒，毒蛇咬伤；根：清热，解毒。用于痢疾，疔疮，脚气浮肿，瘰癧。

## 7150 旌节花科 Stachyuraceae

7150001

*Stachyurus chinensis* Franch.

植物名 中国旌节花《高植图鉴》

药材名 小通草（湖北、广西、四川）、《药典》

文献名 旌节花《群芳谱》，通草《植物名汇》，通条花《牧野目图》，通条叶、锦茄儿花《树分》，中华旌节花《云南植志》

地方名 小通花（浙江、四川），水凉子（甘肃、河南），通草树（湖北、湖南）；陕西：称舵（安康、岚皋）；甘肃：通花杆（武都、文县）；浙江：画眉杠（临安），珍珠通（丽水），金珠链、盏盏新（龙泉），坑青（临海）；安徽：山麻皮，白蛇精；河南：萝葡药；湖南：矮脚棍；广西：小通藤（都安），通泡木，山通草（全州）；四川：抱耳环，鱼泡通，通花（峨眉山）。

功效 茎髓：清热，利尿，下乳。用于小便不利，尿路感染，乳汁不下。

7150002

*Stachyurus chinensis* Franch. var. *latus* Li

植物名 宽叶旌节花《高植图鉴》

药材名 小通草（安徽）

地方名 湖北：空心杆子（神农架）。

功效 茎髓：清热，利尿，下乳。

7150003

*Stachyurus himalaicus* Hook. f. et Thoms. ex Benth.

植物名 喜马拉雅旌节花《高植图鉴》

药材名 小通草《药典》

文献名 西域旌节花《四川中药志》, 通草花《生药学》, 通条树《中药志》, 通草树《台湾药植志》, 喜馬拉雅旌节花《简明中医辞典》, 通草, 通草棍《鉴别手册》, 旌节花《药典》

地方名 小通花(广西、四川), 台湾, 四川通草: 湖南; 牛奶奶, 大金刀, 矮脚棍, 通条叶; 广西: 山通草, 西藏旌节花, 通条木, 通草(全州), 小通条(都安), 通心木(那坡); 四川: 空藤杆, 鱼泡通, 条通草, 通花梗, 小花通通草、通花(成都、峨眉山); 贵州: 小通台。

功效 茎髓: 清热, 利尿, 下乳。用于小便不利, 尿路感染, 乳汁不下

7150004

*Stachyurus obovatus* (Rehd.) Li

植物名 倒卵叶旌节花《高植图鉴》

药材名 小通草(四川)

文献名 卵叶旌节花《四川中药志》

地方名 四川: 小通花, 鱼泡通, 通花(峨眉山)。

功效 茎髓: 清热, 利尿, 下乳。

7150005

*Stachyurus rerusus* Yang

植物名 四叶旌节花《四川中药志》

药材名 小通草(四川)

地方名 四川: 小通花, 鱼泡通, 通花(峨眉山)。

功效 茎髓: 清热, 利尿, 下乳。

7150006

*Stachyurus salicifolius* Franch.

植物名 柳叶旌节花《高植图鉴》

药材名 小通草(四川)

文献名 披针叶旌节花《贵州药录》

地方名 四川: 小通花, 鱼泡通, 铁泡桐、通花(峨眉山)。

功效 茎髓: 清热, 利尿, 下乳。

7150007

*Stachyurus szechuanense* Fang

植物名 四川旌节花《四川中药志》

药材名 小通草(四川)

地方名 四川: 小通花, 鱼泡通, 通花(峨眉山)。

功效 茎髓: 清热, 利尿, 下乳。

7150008

*Stachyurus yunnanensis* Franch.

植物名 云南旌节花《高植图鉴》

药材名 小通草《云南药录》

文献名 滇旌节花《云南植物研究》

地方名 通花(四川、贵州); 广西: 酸茜果(乐业); 贵州: [钻地风](绥阳), 小通台(梵净山), [木通](清镇), 小通花, 鱼泡通。

功效 茎髓: 清热, 利尿, 下乳。用于小便不利, 尿路感染, 乳汁不下。

## 7151 金缕梅科 Hamamelidaceae

7151001

*Altingia chinensis* (Champ.) Oliver ex Hance ---

*Liquidambar chinensis* Champ

植物名 蕁树《中国植志》

文献名 阿丁枫《广西药录》, 中华蕁树《贵州植志》

地方名 广西: 半边枫, 枫荷桂(陆川), 老虎斑, 山杨梅(钟山), 假荔枝(贺县)。

功效 根: 用于风湿痛, 跌打, 瘫痪。

7151002

*Altingia gracilipes* Hemsl.

植物名 细柄蕁树《中国植志》

文献名 细柄阿丁枫《江西药录》

地方名 江西: 蕁树。

功效 树脂: 解毒止痛, 止血生肌。

7151003

*Altingia gracilipes* Hemsl. var. *serrulata* Tutch.

植物名 细齿蕁树《中国植志》

功效 树脂: 解毒止痛, 止血生肌。

7151004

*Corylopsis alnifolia* (Levl.) Schneid.

植物名 桤叶蜡瓣花《中国植志》

功效 根皮、叶: 宁心健胃, 清热驱风。用于恶心呕吐, 心悸不安。

7151005

*Corylopsis multiflora* Hance

植物名 瑞木《中国植志》

药材名 瑞木《贵州药录》

文献名 大果蜡瓣花《海南植志》

地方名 贵州: 水茶油。

功效 根皮、叶: 用于恶心呕吐, 心悸不安。

7151006

*Corylopsis sinensis* Hemsl.

植物名 蜡瓣花《中国植志》

药材名 蜡瓣花《浙江天目药志》

文献名 中华蜡瓣花《高植图鉴》

地方名 浙江: 连核梅、连合子(临安); 湖北: 猴栗子树(神农架)。

功效 根皮、叶: 用于恶寒发热, 呕逆心跳, 烦乱昏迷。

7151007

*Corylopsis sinensis* Hemsl. var. *calvescens* Rehd. et Wils.

植物名 秃蜡瓣花《中国植志》

药材名 秃蜡瓣花《贵州药录》

功效 根皮、叶: 宁心健胃, 清热驱风。用于恶心呕吐, 心悸不安。

7151008

*Distylium dunnianum* Levl.

植物名 窄叶蚊母树《中国植志》

地方名 广西: 大叶紫木(三江)。

功效 叶: 收敛止血。用于各种内出血, 刀伤出血。

7151009

*Distylium myricoides* Hemsl.

植物名 杨梅叶蚊母树《中国植志》  
文献名 杨梅蚊母树《中国经植志》  
地方名 浙江：夹心、萍柴、野茶。  
功效 根：用于手足浮肿。

## 7151010

*Distylium myricoides* Hemsl. var. *macrocarpum* C. Y. Wu

植物名 大果萍柴《云南植志》  
功效 根：用于手脚浮肿。

## 7151011

*Exbucklandia populnea* (R. Br.) R. W. Brown    *Syningtonia populnea* (R. Br.) Steenis

植物名 马蹄荷《中国植志》  
药材名 马蹄荷《汇编》

地方名 合掌木(广西、云南)；广西：白克木(靖西)，三角枫(贺县)，马蹄樟(罗城)，马蹄木(那坡)；贵州：马蹄稠；云南：合掌、巴巴叶、鹤掌叶(屏边)，省雀花、盖阳树、解阳树(西畴)，菁合木(龙陵)，拍拍木(新平)，小刀树(景东)。

功效 茎：有小毒。舒筋活血，活络止痛。用于风湿关节炎，坐骨神经痛。

## 7151012

*Exbucklandia tonkinensis* (Lec.) Steenis --- *Syningtonia tonkinensis* (Lec.) Steenis ex W. Vink

植物名 大果马蹄荷《中国植志》

地方名 湖南：“荷罗莲”(蓝山县瑶名)；云南：“宽幅”(屏边苗语)。

功效 树皮、根：祛风湿，活血舒筋，止痛。用于偏瘫。

## 7151013

*Fortunearia sinensis* Rehd. et Wils.

植物名 牛鼻栓《中国植志》

药材名 牛鼻栓《浙江天目药志》

文献名 千斤力《汇编》

地方名 江苏：牛鼻栓(宜兴)；浙江：连盒子，木里仙(临安)。

功效 枝、叶、根：益气，止血。用于气虚，刀伤出血。

## 7151014

*Hamamelis mollis* Oliver

植物名 金缕梅《中国植志》

药材名 金缕梅《汇编》

地方名 浙江：木里仙、牛踏果(临安)。

功效 根：劳伤乏力。

## 7151015

*Liquidambar formosana* Hance

植物名 枫香树《南方草木状》、《中国植志》

药材名 路路通《纲目拾遗》、《药典》，枫香脂《唐本草》、《药典》

文献名 楸楸《尔雅》，枫木《说文》，枫树《尔雅》郭璞注)，枫香《本草经集注》，枫实《南方草木状》，白胶香《唐本草》，枫脂《通典》，白胶《儒门事亲》，枫皮《本草拾

遗》，芸香《本草原始》，枫香木皮、香枫、枫影《纲目》，枫木上球《德胜堂经验方》，枫香果《槐西杂志》，枫、糖、丹枫《花镜》，枫果、楸子《纲目拾遗》，枫子树《植物名汇》，阿子树、子季、枫人、枫树《药对》，路路通《通雅》、《植物名汇》，三角枫、三角尖《岭南采药录》，枫子《本草纲目》、《本草纲目拾遗》，《药材资料汇编》，枫珠子《中药志》，白云香《药典》

地方名 九空子、九孔子(江苏、云南)；陕西：鸭脚板(镇巴)；江苏：六六通(徐州)；浙江：鸡爪槭、鸡枫树(杭州)；安徽：榉树；福建：路通子、白枫(邵武)、古田(福州)，榉柴(宁德)，枫果根、杜秀根、燕叶(闽宁)，三角云香叶(南平)，延树(南平、建阳、长汀)，黄邦(三明)，榉树、榉模(闽东)；台湾：枫仔，枫仔心；河南：狼眼，鬼鼓狼眼；湖北：枫树球，枫球子；湖南：大叶枫、猫儿刺(龙山)；广东：风饭仔、风饭树，风香仔，五角枫，半枫荷；海南：吗草(临高)，百日材；广西：枫荷桂(平南)，枫木叶(容县、梧州、柳江、德保)，枫香蛇(苍梧)，大风木(陆川)，黑饭木(来宾、桂平)，三叉风(博白)，鹅爪风、五爪风(北流)，黑饭叶，味厚；四川：三角兰，枫树果，枫香树果；云南：洋樟木(广南)。

功效 果序(路路通)：祛风活络，利水通经。用于关节痹痛，麻木拘挛，水肿胀满，乳少经闭；树脂(枫香脂)：活血止痛，解毒，生肌，凉血。用于跌扑损伤，痈疽肿痛，吐血，衄血，外伤出血。

## 7151016

*Liquidambar orientalis* Mill.

植物名 苏合香树《药材学》

药材名 苏合香《别录》、《药典》

文献名 帝膏《侯宁极《药谱》)，苏合油《太平寰宇记》，苏合香油《局方》，帝油流《现代实用中药》，合香、苏香、帝香《新纲》，流动苏合香、液状苏合香(叶《生药》)，苏香油、苏合膏《中药名汇》

功效 香树脂：开窍，破秽，止痛。用于中风痰厥，卒然昏倒，胸腹冷痛，惊痫，湿症。

## 7151017

*Loropetalum chinense* (R. Br.) Oliver

植物名 榧木《中国植志》

药材名 榧木《鄱阳县志》、《汇编》

文献名 茧漆《广群芳谱》，榧花、纸末花、鸡寄《名实图考》，榧木《植物名汇》

地方名 鱼骨柴、知微木(广东、广西)，白花树(安徽、广西)，刺木花、桤木柴、榧木柴、榧柴(浙江、江西、湖南)，满山白(安徽、福建)；浙江：坚漆、榧宿(龙泉、云和)，鸟榧柴(衢县、常山、江山)，峴儿(温州)，刺漆，金梨漆，金钱漆，榧漆(乐清)，石榴榧(泰顺)，雪里抽(永嘉)，金漆液(文成)；安徽：力起，地里爬，碎光花，腰子树，石柳榧，结结满；江西：榧家老(临川)，米榧林(德兴)，槐榧柴(婺源)，老柴(萍乡)，鱼骨勒；福建：白清明花，清明花(晋江、福州、闽侯、福鼎、三明、崇安)，铁沙梨(建瓯、南平)，米碎柴(连城)，极夹古，石薰丁花、老婆婆花、雪丁花、公牛柴、极杂古、牛古拉、极夹骨(宁化)，铁柴(松政)，榧黎巴，铁树子，牛根，牛根草，闪月

木, 易柴, 铁屎仔, 铁柴叶, 契曲柴, 七利柴, 白花仔, 染检丁, 棕衣儿根, 岩视丁, 鸡踪巴, 四蕊丁, 四丁花, 树枯, 搓古腰, 柴刺骨, 拉屎孤, 婆奶柴, 极古杂, 继夹古, 米萝灿, 狮机野; 湖北: 土降香(鹤峰), 榧木根, 榧木叶, 榧木花, 土降条; 湖南: 土墙树, 桤木树, 桤木架, 杨雨树, 土墙花, 榧木刺, 桤木树(溆浦), 志木树, 志木柴(衡山); 广东: 杆漆, 狗牙柴, 支钱花, 田螺鄱, 狗牙花, 鱼鳞叉(惠阳); 广西: 罗腮木(苍梧、容县), 子孙满堂(柳州), 鸡油树, 鸡麦树(富川、钟山), 鸡寄木, 罗胭脂, 鸡头木, 知球木, 臭骨柴, 螺犀木, 羊角树, 螺硯木(平南); 四川: 榧木条, 锯木桤(忠县), 锯木条(合川、忠县), 扁担条(重庆), 锯子条; 贵州: 刀烟木(榕江), 锯木花。

功效 叶: 清热解毒, 收敛, 止血。用于烧、烫伤, 外伤出血, 吐血, 崩漏, 腹泻; 花: 清热, 止血。用于鼻出血, 外伤出血; 根: 行血祛瘀。用于血瘀经闭, 跌打损伤, 慢性关节炎, 外伤出血。

## 7151018

*Mytilaria laosensis* Lec.

植物名 米老排《广西植录》

地方名 广西: 壳菜果, 三角枫; 云南: “朔潘”(苗语), 鹤掌叶(屏边)。

功效 全株: 清热祛风。

## 7151019

*Rhodoleia parvipetala* Tong

植物名 小花红花荷《中国植志》

药材名 红苞木《广西药录》

文献名 小花红苞木《高植图鉴》, 红花桐《云南植志》, 红花荷《云南种录》

地方名 广西: 节红子、红花木(金秀); 云南: 红花、红花树(屏边)。

功效 叶: 止血。用于刀伤。

## 7151020

*Semiliquidambar cathayensis* Chang

植物名 半枫荷《中国植志》

药材名 半枫荷(广东、广西)

文献名 金缕半枫荷《汇编》

功效 根、枝、叶: 祛风湿, 舒筋络。用于风湿跌打, 瘀积肿痛, 产后风瘫。

## 7151021

*Semiliquidambar cathayensis* Chang var. *parvifolia* (Chun) Chang

植物名 小叶半枫荷《中国植志》

地方名 广西: 半枫荷(融水、融安、东兴)。

功效 根及叶枝: 祛风湿, 舒筋络。

## 7152 杜仲科 Eucommiaceae

## 7152001

*Eucommia ulmoides* Oliver

植物名 杜仲《中国植志》

药材名 杜仲《本经》、《药典》

文献名 思仙《本经》, 木绵、思仲《吴普本草》, 棉、棉芽《图经》, 石思仙《本草衍义补遗》, 玉丝皮、乱银丝、鬼

仙木《新纲》, 丝连皮、丝楝树皮《中药志》, 厚杜仲、绵杜仲、汉杜仲《常用中药名辨》

地方名 丝棉木(湖南、甘肃、广西), 丝棉树皮(四川、湖北), 丝棉树(陕西、湖北、广西、四川), 棉皮(河南、安徽), 川杜仲(四川、广西); 陕西: 丝棉皮(太白); 甘肃: 丝连木, 明久久; 山东: 杜仲皮; 浙江: 杜仲叶; 安徽: 杜胶树, 丝仲; 江西: 阴叶榆; 河南: 棉树皮; 湖北: 丝楝树, 棉树; 湖南: 年筋藤(通道), 扯丝皮(怀化、麻阳); 四川: 金丝杜仲(峨眉), 神仲, 板仲; 云南: 银丝杜仲、树杜仲(曲靖); 其他: 丝棉花。

功效 树皮: 补肝肾, 强筋骨, 安胎。用于肾虚腰痛, 筋骨无力, 妊娠漏血, 胎动不安, 高血压症; 初生嫩叶(棉芽): 用于风毒脚气, 久积风冷, 肠痔下血; 果皮、叶: 用于疔疮, 刀伤出血。

## 7154 黄杨科 Buxaceae

## 7154001

*Buxus bodinieri* Levl. --- *B. harlandii* Hance

植物名 雀舌黄杨《中国植志》

药材名 雀舌黄杨《广西药录》

文献名 匙叶黄杨《浙江药植志》, 细叶黄杨《汇编》

地方名 千年矮(四川、广西、福建、广东、湖北), [万年青](广西、广东、浙江), 黄杨木(云南、浙江、湖北); 浙江: 石黄杨(临安); 福建: 小叶黄杨(福州); 广东: 清明矮(阳山), 黄头艾(英德), 锦熟黄杨, 大样满天星; 广西: [千年见](融安), [四季青](临桂); 云南: 小万年青, 小黄杨。

功效 茎、叶: 止血, 祛风, 除湿。用于疟疾, 痢疾, 风湿痹痛, 跌打损伤。

## 7154002

*Buxus cephalantha* Levl. et Vant.

植物名 头花黄杨《中国植志》

地方名 贵州: 细叶黄杨, 万年青, 千年矮。

功效 根、叶: 清热利湿, 解毒镇静。用于冠心病, 黄疸, 劳咳, 牙痛, 风热瘙痒, 无名肿毒。

## 7154003

*Buxus henryi* Mayr.

植物名 大花黄杨《中国植志》

文献名 桃叶黄杨《湖北植志》

地方名 湖北: 黄杨木(神农架), 黄杨、水黄杨(鹤峰)。

功效 全株: 止血, 散血; 根: 祛风湿; 叶: 消肿毒。用于无名肿毒。

## 7154004

*Buxus latistyla* Gagnep.

植物名 阔柱黄杨《中国植志》

功效 根: 用于风湿; 树皮: 用于小儿惊风; 叶: 用于骨折。

## 7154005

*Buxus microphylla* Sieb. et Zucc. var. *intermedia* (Kanehira) H. L. Li --- *Buxus sinica* (Rehd. et Wils.) Cheng var. *intermedia* (Kanehira) M. Cheng

植物名 中间黄杨《中国植志》  
 文献名 台湾黄杨《台湾药植志》  
 地方名 台湾：石柳，内地石柳。  
 功效 叶：有毒。外用于肿毒。

## 7154006

*Buxus microphylla* Sieb. et Zucc. var. *sinica* Rehd. et Wils. --- *Buxus sinica* (Rehd. et Wils.) Cheng

植物名 黄杨《中国植志》  
 药材名 黄杨木《纲目》、《中药大辞典》  
 文献名 山黄杨《履巇岩本草》，黄杨脑《丹溪心法》，千年矮、小黄杨《分类草药性》  
 地方名 [万年青]（广西、福建），野黄杨（福建、广西、四川），瓜子黄杨（广西、上海、浙江、湖北），小叶黄杨（江苏、浙江、江西）；江苏：黄杨树（启东）；上海：豆瓣黄杨，豆板黄杨；安徽：野万年矮；广西：假黄杨（凌云）；四川：[百日红]（雅安）。

功效 根、叶：祛风除湿，行气活血。用于风湿关节痛，痢疾，胃痛，疝痛，腹胀，牙痛，跌打损伤，疮痈肿毒。

## 7154007

*Buxus sempervirens* L.

植物名 锦熟黄杨《云南植志》  
 文献名 黄梨树《树分》，黄杨木《台湾药植志》  
 地方名 云南：窄叶黄杨（昆明）。  
 功效 叶：苦补，泻剂，发汗剂。用于产妇难产，胃病，风湿，梅毒；木材：发汗；树皮：解热。

## 7154008

*Pachysandra axillaris* Franch.

植物名 板凳果《中国植志》  
 药材名 金丝矮陀陀《汇编》  
 文献名 腋花三角咪《中草药学》，粉蕊黄杨《汇编》  
 地方名 三角咪（贵州、云南），矮陀陀（广西、云南）；广西：奶近药（隆林）；贵州：腋花富贵草，山板凳；云南：草本叶上花、黄芩矮陀陀、白金三角咪（曲靖），金丝矮陀陀（昆明），小清喉、[万年青]（富民），银丝矮陀陀。

功效 全株：有小毒。祛风除湿，舒筋活络。用于风湿关节痛，肢体麻木，跌打损伤，通乳汁。

## 7154009

*Pachysandra axillaris* Franch. var. *glaberrima* (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu

植物名 光叶板凳果《云南植志》  
 药材名 三叉果（四川）  
 地方名 四川：金丝矮陀陀（会东），香炉脚、靛叶、野靛（西昌）；贵州：三角咪，山板凳；云南：板凳果（禄劝）。

功效 全草：祛风湿，活血祛瘀，止痛。用于风湿疼痛，劳伤腰痛，跌打损伤，腹痛。

## 7154010

*Pachysandra axillaris* Franch. var. *stylosa* (Dunn) M. Cheng --- *Pachysandra stylosa* Dunn

植物名 多毛板凳果《中国植志》  
 药材名 三角咪《贵州草药》

文献名 宿柱三角咪《高植图鉴》，毛叶板凳果《高植图鉴补编》

地方名 四川：香炉脚、[靛叶]、野靛（会东），雪山芩，金丝矮陀陀，铁螃蟹，四季青（峨眉山）；贵州：山板凳。

功效 根茎或全株：有毒。祛风湿，活血，止痛。用于风湿痹痛，劳伤腰痛，跌打损伤。

## 7154011

*Pachysandra terminalis* Sieb. et Zucc.

植物名 顶花板凳果《中国植志》  
 药材名 雪山芩（四川、陕西）  
 文献名 粉蕊黄杨《树分》，雪山林《陕西中草药》，顶嘴三角咪《汇编》，顶蕊三角咪《高植图鉴》

地方名 富贵草、转筋草（湖北、四川）；陕西：捆仙绳（秦岭），孩儿茶（镇坪），水泽兰，雪三苓（太白）；甘肃：长青草；浙江：黄秧连（临安）；四川：上天桥，土桔梗，[四季青]（峨眉山）。

功效 全草：祛风止咳，舒筋活络，调经止带。用于慢性气管炎，风湿性关节炎，小腿转筋，白带，闭经，神经病烦躁不安。

## 7154012

*Sarcococca hookeriana* Baill. --- *S. pruniformis* Lindl. var. *hookeriana* Hook. f.

植物名 羽脉野扇花《中国植志》  
 药材名 厚叶子树《汇编》  
 文献名 野扇花《西昌中草药》  
 地方名 四川：[八爪金龙]，[开喉箭]，[山豆根]（会东），铁角兰（峨眉山）；云南：[苦参]、云南野扇花、虎克野扇花、黑果清香桂（红河）。

功效 全株：散瘀止血，行气止痛，拔毒生肌。用于胃痛，支气管炎，肝炎，蛔虫症。外用于跌打损伤，刀伤出血，无名肿毒。

## 7154013

*Sarcococca hookeriana* Baill. var. *digyna* Franch. --- *S. humilis* Stapf --- *S. hookeriana* Baill. var. *humilis* Rehd. et Wils.

植物名 双蕊野扇花《中国植志》  
 文献名 小野扇花《湖北植志》，矮树八爪龙《云南植志》，叉蕊野扇花《神农架药录》，两蕊野扇花《峨眉药植研究》，小叶野扇花《广西植录》

地方名 湖北：黄八爪（巴东），吊香杆、铁角板（神农架）；四川：岩花子，铁角兰（峨眉山）；云南：[万年青]，清香桂，胃友，树八爪龙（洱源）。

功效 全株：用于跌打损伤，胃痛，急性胃炎，胃溃疡，劳伤疼痛，喉痛。

## 7154014

*Sarcococca longipetiolata* M. Cheng

植物名 长叶柄野扇花《中国植志》  
 文献名 长柄野扇花《广西药录》  
 地方名 湖南：[青鱼胆]，缝骨连（瑶名）；广东：千年青；广西：柑子风（兴安），铁铃胆（全州）。

功效 根：清热退黄。用于急性黄疸型肝炎；全

株：用于风湿痹痛。

## 7154015

*Sarcococca orientalis* C. Y. Wu

植物名 东方野扇花《新华本草纲要》

地方名 江西：三两根，大风消，土丹皮。

功效 根：活血舒筋，祛风消肿。用于跌打损伤，老伤发痛，水肿。

## 7154016

*Sarcococca ruscifolia* Stapf --- *S. ruscifolia* Stapf var. *chinensis* (Franch.) Rehd. et Wils. --- *S. pauciflora* C. Y. Wu ex S. Y. Pao

植物名 野扇花《中国植志》

药材名 清香桂《汇编》

文献名 大叶野扇花《树分》，短叶野扇花《西昌中草药》，狭叶清香桂、少花清香桂《云南植志》，云南野扇花《秦岭植志》

地方名 大风消（江西、湖南），〔土丹皮〕（江西、湖南）；陕西：千年崖（南郑）；江西：单鞭（南丰、吉水），地金桔；湖北：木远志（崇阳）；湖南：三两金、三两银（芷江）；广西：铁铃胆（全州），黑杆草（凤山）；四川：短叶八爪金龙，花子藤，棉草木（峨眉），全青（灌县），八爪金龙（会东），八爪龙，“哥吾斯挠”（凉山彝语），贵州：观音柴，断虫草；云南：叶上花（昆明），〔万年青〕（红河），胃友，龙芋叶，三号黄药，矮陀（富源），野樱桃；其他：桂花矮陀陀。

功效 根：理气止痛，祛风活络。用于急慢性胃炎，胃溃疡，风湿关节痛，跌打损伤；根、叶：止咳化痰。用于肺结核咳嗽；果实：补血养肝。用于头晕，心悸，视力减退。

## 7154017

*Sarcococca vagans* Stapf

植物名 海南野扇花《中国植志》

文献名 大叶清香桂《云南植志》

地方名 广西：水边青（北流），接骨木（大新）。

功效 根、叶：用于肺结核咳嗽，骨折。

## 7155 悬铃木科 Platanaceae

## 7155001

*Platanus occidentalis* L.

植物名 一球悬铃木《中国植志》

药材名 美国梧桐《树分》

功效 树皮：用于腹泻。

## 7155002

*Platanus orientalis* L. --- *P. vulgaris* Spach

植物名 三球悬铃木《中国植志》

药材名 法国梧桐《台湾药植志》

文献名 净土树《广博物志》，悬铃木《树分》，筱悬木《云南种录》

地方名 陕西：祛汗树、鸡摩罗什树（户县）。

功效 树皮：用于腹泻，痢疾，疝气，齿痛。

## 7156 杨柳科 Salicaceae

## 7156001

*Populus adenopoda* Maxim.

植物名 响叶杨《中国植志》

药材名 响叶杨《浙江天目药志》

文献名 白杨《唐本草》，白杨木《纲目》，风响树、团叶白杨《树分》，腺柄杨《云南种录》

地方名 白杨树（湖北、湖南、浙江、四川）；陕西：绵杨（周至）；江苏：山白杨（江宁），圆叶白杨（南京）；安徽：杨树；湖北：青天杨树；云南：毛白杨；其他：响朴叶。

功效 根、叶、茎：散瘀活血，止痛。用于风湿关节痛，四肢不遂，损伤瘀血肿痛。

## 7156002

*Populus alba* L.

植物名 银白杨《中国植志》

药材名 白背杨《中药大辞典》

文献名 白杨叶、白杨树皮《唐本草》

地方名 白杨（河北、安徽）；安徽：杨树；其他：大叶杨。

功效 叶：祛痰，消炎，平喘，止咳。用于慢性气管炎，咳嗽，气喘。

## 7156003

*Populus canadensis* Moench.

植物名 加杨《中国植志》

药材名 杨树花《药典》

文献名 欧美杨、加拿大白杨、美国大白杨、加拿大杨《树分》，大叶钻天杨《湖北植志》

功效 雄花序：化湿止痢。用于细菌性痢疾，急性肠炎。

## 7156004

*Populus cathayana* Rehd.

植物名 青杨《救荒本草》、《中国植志》

药材名 扶移《本草拾遗》

文献名 白杨移杨《古今注》，唐棣《尔雅》，夫移《尔雅注》，移《诗毛氏传疏》，白杨、高飞、独摇、夫移《纲目》

地方名 河北：小叶杨。

功效 树皮：去风血脚气痹痛。

## 7156005

*Populus davidiana* Dode --- *P. tremula* L. var. *davidiana* (Dode) Schneid.

植物名 山杨《中国植志》

药材名 山杨树皮《汇编》

文献名 白杨叶、白杨树皮《唐本草》，大叶杨《名实图考》，白杨皮《梅师集验方》，钻天白杨《中国植物图鉴》，白杨树根皮《四川中药志》

地方名 响杨（东北）；吉林：白杨，山小叶杨；辽宁：山杨树；北京：火杨，鸡爪杨，钻天杨；河北：青杨；青海：“玛尔”（藏名）；河南：明杨；湖北：小叶杨、骚白杨（神农架）。

功效 树皮：凉血，解毒，清热止咳，驱虫。用于高

血压,肺热咳嗽,蛔虫病,小便淋漓。外用于秃疮疥癣;叶:用于龋齿,骨疽久发。

## 7156006

*Populus euphratica* Oliv. --- *P. diversifolia* Schrenk.

植物名 胡杨《中国植志》

药材名 胡桐泪《唐本草》、《药材学》

文献名 胡桐《汉书》,胡桐律《唐本草》,石律《日华子本草》,石泪《岭表录异》,胡桐碱《纲目》

地方名 内蒙古:“托奥罗依”(蒙语);甘肃:[梧桐],异叶杨;上海:梧桐泪。

功效 树脂:清热解毒,制酸止痛。用于咽喉肿痛,牙痛,淋巴结核,胃及十二指肠溃疡,胃痛,胃酸过多。外用于中耳炎,痔疮;根:驱虫;叶:平肝,用于高血压;花序:外用于止血。

## 7156007

*Populus koreana* Rehd.

植物名 香杨《中国植志》

药材名 香杨《长白山植药志》

地方名 朝鲜杨、皱叶杨、黄铁木、大青杨(东北)。

功效 树皮:凉血,解毒,清热止咳,驱虫。

## 7156008

*Populus nigra* L.

植物名 黑杨《中国植志》

药材名 黑杨《台湾药植志》

功效 冬季叶芽:用于慢性气管炎之刺激性祛痰,收敛,火伤,止血;嫩芽:外用于风湿病;嫩叶油:作软膏。

## 7156009

*Populus nigra* L. var. *italica* (Moench.) Koehne --- *P. pyramidalis* Rozier --- *P. pyramidalis* Borkh.

植物名 钻天杨《中国植志》

药材名 杨梅花(北京、天津)

文献名 美国白杨、美国小叶白杨《树分》,黑杨、美国杨《中国植物图鉴》

地方名 洋梅花(天津、北京);江苏:白杨,杨树;广西:箭杆杨;其他:笔杨,白杨树。

功效 树皮:凉血解毒,祛风除湿。用于风湿疼痛,脚气肿,高血压,烧烫伤,肝炎,痢疾,感冒。外用于疥癣秃疮。

## 7156010

*Populus nigra* L. var. *thevestina* (Dode) Bean

植物名 箭杆杨《中国植志》

文献名 钻天杨《沙漠药植》

地方名 甘肃:白杨树;新疆:“阿可提来克库子盖”(维名)。

功效 树皮:凉血解毒,祛风除湿。用于风湿疼痛,高血压,烧伤,痢疾,感冒,疥癣秃疮,骨结核,大骨节病,关节炎。

## 7156011

*Populus pseudo-simonii* Kitag.

植物名 小青杨《中国植志》

药材名 小青杨《吉林中草药》

地方名 朝鲜杨、高丽杨、皱叶杨、黄铁木(东北);吉林:东北杨。

功效 树皮:解毒。用于顽癣疮毒。

## 7156012

*Populus rotundifolia* Griff. var. *bonati* (Levl.) C. Wang et Tung --- *P. bonati* Levl.

植物名 滇南山杨《中国植志》

文献名 团叶杨《中药大辞典》,山枝《西昌中草药》,圆叶白杨树《汇编》

地方名 四川:山白杨,山杨柳(西昌);云南:山白龙、野白杨树(丽江),白杨树,响叶杨(大理)。

功效 皮、叶:清热解毒,消炎利水,杀虫。用于肾炎,感冒,蛔虫病。外用于牙痛。

## 7156013

*Populus rotundifolia* Griff. var. *duclouxiana* (Dode) Gomb.

植物名 清溪杨《中国植志》

功效 树皮:凉血,解毒,清热止咳,驱虫。

## 7156014

*Populus simonii* Carr.

植物名 小叶杨《中国植志》

文献名 菜杨《华北树木志》

地方名 杨树(吉林、辽宁、山东、安徽、山西);江苏:南京白杨(南京),白杨柳(江浦);河南:青杨,明杨,河南杨。

功效 树皮:凉血,解毒,清热止咳,驱虫。

## 7156015

*Populus tomentosa* Carr.

植物名 毛白杨《中国植志》

药材名 杨树花《药典》

地方名 响杨(河北、山西),大叶杨(江苏、河南);天津:杨梅花;陕西:闹羊花(武功);山东:白杨(平邑),笨白杨,独摇。

功效 雄花序:化湿止痢。用于细菌性痢疾,急性肠炎;树皮:祛痰。用于咳嗽痰喘;嫩枝、叶:消肿去毒。外用于无名肿毒。

## 7156016

*Populus tremula* L.

植物名 欧洲山杨《中国植志》

地方名 黑龙江:火烧杨。

功效 树皮:凉血解毒,祛风除湿。

## 7156017

*Salix alba* L.

植物名 白柳《中国植志》

文献名 柳毛《沙漠药植》,白杨《汇编》

地方名 新疆:“苏盖提”(维名)。

功效 叶、芽根:清湿热,祛风湿。用于急性扁桃腺炎,上呼吸道感染,咽喉炎,盆腔炎,肾炎,疮疖;芽:用于黄疸性肝炎,风湿性关节炎初起。

## 7156018

*Salix araeostachya* Schneid.

植物名 纤序柳《中国植志》



文献名 纤穗柳《云南种录》

地方名 云南：“埋海仑”(西双版纳傣语)。

功效 树皮：用于产后消瘦，恶露淋漓不净，湿疹痒，风湿关节痛。

#### 7156019

*Salix babylonica* L.

植物名 垂柳《中国植志》

药材名 垂柳《纲目》、《汇编》

文献名 小柳、小杨《说文》，柳花、柳絮《本经》，水杨《本草经集注》，杨花、杨柳条《摘元方》，杨柳《本草拾遗》，柳椹《岫嵴神方》，柳条《芷园臆草》，杨柳花、顺水柳根、水杨柳《滇南本草》，柳叶眉《圣惠方》，柳蛀粪《圣济总录》，柳屑、柳蕊《纲目拾遗》，青丝柳《本草求真》，柳线、吊柳《草木便方》，杨柳须、红龙须《天宝本草》，清明柳、垂枝柳、水柳《树分》，柳树皮《中国经植志》，水柳须《中医实验研究》，分水翁《民药汇编》，柳枝《中药大辞典》

地方名 柳树(辽宁、山东、江苏、浙江、贵州)，倒栽柳(吉林、山西、山东)，垂杨柳(黑龙江、北京)；黑龙江：倒枝柳；山东：倒垂柳；浙江：杨柳树，倒挂柳，倒挂杨柳；安徽：倒披杨柳；广东：大叶柳；广西：堤柳；四川：青龙须，倒插柳，顺水飘，吊杨柳(蓬溪)，线柳。

功效 枝、叶、树皮、根皮、须根等：清热解毒，祛风利湿；叶：用于慢性气管炎，膀胱炎，膀胱结石，高血压。外用于关节肿痛，疖疽肿痛，皮肤瘙痒，灭蛆杀孑孓；枝、根皮：用于白带，风湿性关节炎。外用烧、烫伤；须根：用于风湿拘挛，筋骨疼痛，湿热带下，牙龈肿痛；树皮：外用于黄水疮。

#### 7156020

*Salix cheilophila* Schneid.

植物名 乌柳《中国植志》

药材名 杞柳《纲目》

文献名 援《尔雅》，杞《诗疏》，柅柳(赵岐孟子注)，水柳、柅柳、蒲柅、蒲根白《新纲》，筐柳《树分》，沙柳《高植图鉴》

地方名 河北：刀柳；内蒙古：“蒿-布勒嘎苏”(蒙名)；四川：“降马”(藏名)。

功效 鲜茎、叶、树皮：解表祛风。用于麻疹初起，斑疹不透，皮肤瘙痒，慢性风湿。

#### 7156021

*Salix chienii* Cheng

植物名 银叶柳《中国植志》

药材名 银叶柳《汇编》

地方名 浙江：小叶杨柳(临安)，白水杨柳(丽水)，水柳(平阳、龙泉)。

功效 根：清热解毒，祛风止痒。用于感冒发热，咽喉肿痛，皮肤瘙痒。

#### 7156022

*Salix gracilior* (Siuz.) Nakai

植物名 细枝柳《中国植志》

文献名 狭叶紫柳《长白山植药志》

功效 根皮：清热解毒，祛风利湿。

#### 7156023

*Salix gracilistyla* Miq.

植物名 细柱柳《中国植志》

文献名 猫柳《东北木本图志》

地方名 黑龙江：红毛柳。

功效 皮和叶：清热解毒，祛风利湿。

#### 7156024

*Salix guebrianthiana* Schneid. --- *S. tetradenis* Hand. -Mazz.

植物名 细序柳《中国植志》

药材名 山黑柳《汇编》

文献名 山杨柳、黑杨柳《中药大辞典》，四腺柳《云南种录》

地方名 云南：四齿柳，云贵柳。

功效 树皮：清热解毒。用于疮疡肿毒。

#### 7156025

*Salix hypoleuca* Seemen

植物名 小叶柳《中国植志》

药材名 小叶柳《汇编》

文献名 翻白柳《秦岭植志》

地方名 贵州：山杨柳(贵阳)，红梅腊(都匀)。

功效 根、叶：驱风除湿，清血化瘀。用于风湿骨痛，劳伤，蛇头疔。

#### 7156026

*Salix inamoena* Hand. -Mazz.

植物名 丑柳《中国植志》

药材名 小白蜡条《汇编》

地方名 云南：山杨柳，白蜡条，山白蜡条(曲靖)，西山柳。

功效 根：祛风除湿，调经。用于月经不调，风湿痛。

#### 7156027

*Salix matsudana* Koidz.

植物名 旱柳《中国植志》

药材名 旱柳《汇编》

文献名 蒲柳《尔雅》，蒲《春秋传》，蒲杨、蒲柅《古今注》，柳、官柳《花镜》，左公柳《济南植录》，北京柳《东北木本图志》，河柳、小叶柳《中国经植志》

地方名 柳树(山东、河南、安徽)；辽宁：青皮柳；山东：窄叶柳、白柳(昆嵛山)，长叶柳(海阳)，杨柳(平邑)；河南：红皮柳(郑州)；其他：山杨柳。

功效 根、根须、皮枝、种子：清热除湿，消肿止痛。用于急性膀胱炎，小便不利，关节炎，黄水疮，疮毒，牙痛。

#### 7156028

*Salix microstachya* Turcz.

植物名 小穗柳《中国植志》

药材名 小红柳《沙漠药植》

文献名 乌柳《汇编》，乌柳根《沙漠药植》

地方名 内蒙古：“乌兰-布勒嘎苏”(蒙名)。

功效 侧根及须根：清热泻火，顺气。用于风火牙痛，急性腰扭伤。

## 7156029

*Salix sinopurpurea* C. Want et Ch. Y. Yang

植物名 红皮柳《中国植志》

药材名 水杨《纲目》、《中药大辞典》

文献名 蒲柳《尔雅》，蒲杨《崔豹《古今注》》，杞柳《图经》，青杨、萑苻《纲目》，水杨皮、水柳皮、水杨叶、杨叶《和汉药理学》

地方名 紫柳、红柳（吉林、山西、河南、内蒙古）；山东：棉柳（沾化、广饶），筐柳（沾化）；江苏：芭斗柳（宝应）；浙江：箕柳；安徽：红心柳。

功效 枝叶：清热解毒。用于久痢，痈肿疮毒；根：外用于乳痈诸肿。

## 7156030

*Salix tetrasperma* Roxb.

植物名 四子柳《中国植志》

文献名 四籽柳《海南植志》

功效 树皮：解热。用于鼻部溃疡。

## 7156031

*Salix variegata* Franch.

植物名 秋华柳《中国植志》

药材名 秋华柳《贵州药录》

功效 枝：祛风除湿，活血消肿。

## 7156032

*Salix wallichiana* Anderss.

植物名 皂柳《中国植志》

药材名 皂柳根《贵州民间药物》

地方名 湖北：红心柳；四川：华丽柳（峨眉山）；贵州：毛狗条（梵净山），山杨柳（贵阳）。

功效 根：驱风解热，除湿。用于风湿关节疼痛，头风疼痛。

## 7156033

*Salix warburgii* Seemen

植物名 水柳《中国植志》

地方名 台湾：水柳子。

功效 根、茎：用于恢复疲劳。

## 7159 杨梅科 Myricaceae

## 7159001

*Myrica adenophora* Hance

植物名 青杨梅《中国植志》

药材名 青杨梅《广西药录》

文献名 青梅《树分》

地方名 海南：杨梅树；广西：火梅；其他：杨梅。

功效 果实：祛痰，解酒，止吐。

## 7159002

*Myrica esculenta* Buch.-Ham.

植物名 毛杨梅《中国植志》

地方名 广西：火杨梅（北流），火梅木（博白），杨梅（天峨、南丹）；云南：大树杨梅，野杨梅，杨梅树。

功效 树皮或根皮：消炎，收敛，止泻，止痛。用于痢疾，肠炎，崩漏，胃痛。

## 7159003

*Myrica nana* Cheval.

植物名 云南杨梅《中国植志》

药材名 矮杨梅《云南中草药》

文献名 滇杨梅《汇编》

地方名 杨梅（四川、云南）；云南：杨梅根，酸杨梅。

功效 根皮、茎皮或果实：用于痢疾、腹泻，消化不良，崩漏，直肠出血，脱肛，风湿疼痛，跌打劳伤。

## 7159004

*Myrica rubra* (Lour.) Sieb. et Zucc.

植物名 杨梅《中国植志》

药材名 杨梅《食疗本草》、《汇编》

文献名 杮子《北户录》，圣生梅、白蒂梅《品汇精要》，杮《花镜》，龙睛《潜确类书》，火实、火齐、金丸、杨果、杨氏子、杨家果、鹤头红、日精曹公、鹤顶红《新纲》，朱红、树梅《树分》，杨梅皮《李《药植》》，炎实、珠蓉《中草药学》

地方名 水晶杨梅、根梅（华南），山杨梅（福建、浙江、广西），火梅木（广西、广东）；江西：杨梅树；福建：珠红；广东：醋梅，五月梅，杨梅公；广西：杨梅木（蒙山），火杨梅（北流），厚皮英（忻城）。

功效 根、树皮：散瘀止血，止痛。用于跌打损伤，骨折，痢疾，胃、十二指肠溃疡，牙痛。外用于创伤出血，烧烫伤；果：生津止渴，用于口干，食欲不振；种仁：用于脚气。

## 7161 桦木科 Betulaceae

## 7161001

*Alnus cremastogyne* Burk.

植物名 桤木《名实图考》、《中国植志》

药材名 桤木《汇编》

地方名 水青冈（陕西、四川）；四川：水青缸、桤蒿树、桤木（成都），桤木尖（峨眉山）；贵州：牛屎树。

功效 嫩枝叶：清热降火，止血，止泻。用于吐血，衄血，水泻，痢疾，黄水疮。

## 7161002

*Alnus ferdinandi-coburgii* Schneid.

植物名 滇桤木《云南种录》

药材名 水冬瓜《云南曲靖》

文献名 川滇桤木《贵州药录》

功效 叶、树皮：接骨。

## 7161003

*Alnus japonica* (Thunb.) Steub.

植物名 日本桤木《中国植志》

药材名 赤杨《汇编》

地方名 水瓜树（河南、湖北），水冬瓜（河南、贵州、吉林、黑龙江、云南）；辽宁：冬果；水冬果；江苏：赏树（南京）；台湾：水柯子；湖北：水拔树；贵州：冬瓜树。

功效 嫩枝、叶、树皮：清热降火。用于鼻血不止，预防水泻，外伤出血。

## 7161004

*Alnus lanata* Duthie ex Bean

植物名 毛桤木《中国植志》

药材名 桤木皮《天宝本草》、《中药大辞典》  
文献名 毛桤《汇编》、牛屎树《贵州民间药物》、桤木《中药大辞典》

地方名 贵州：罗拐木，菜壳蒜。

功效 嫩叶、皮：有小毒。平肝，清火，利气。用于鼻衄，崩症，风火赤目，麻风，腹泻。

#### 7161005

*Alnus mandshurica* (Call.) Hand. - Mazz.

植物名 东北桤木《中国植志》

文献名 东北赤杨《东北木本图志》

功效 果实、树皮：清热解毒，收敛。用于腹泻，外伤出血。

#### 7161006

*Alnus mandshurica* (Call.) Hand. - Mazz. var. *pubescens* A. Baranov

植物名 柔毛东北桤木《长白山植药志》

文献名 柔毛东北赤杨《东北木本图志》

功效 果实、树皮：清热解毒，收敛。用于腹泻，外伤出血。

#### 7161007

*Alnus nepalensis* D. Don

植物名 尼泊尔桤木《中国植志》

药材名 旱冬瓜(云南)、《汇编》

文献名 蒙自桤木《云南种录》，蒙自赤杨《贵州草药》，蒙自桤木《贵州药录》

地方名 水冬瓜(云南、贵州)，水冬瓜树(云南、四川)，桤木树(四川、云南)；广西：萝卜木，粗糠木；贵州：冬瓜树，冬瓜树皮(兴义)；云南：桤木、旱冬瓜树(红河)，冬瓜木，“埋歪”(西双版纳傣语)。

功效 树皮、叶：止泻，消炎，接骨，收敛止血，健胃。用于腹泄，痢疾，鼻衄，骨折，跌打损伤。

#### 7161008

*Alnus sibirica* Fisch. ex Turcz. --- *Alnus tinctoria* Sarg. --- *A. hirsuta* Turcz. --- *A. hirsuta* Turcz. var. *sibirica* (Fisch.) Schneid.

植物名 辽东桤木《中国植志》

文献名 色赤杨、水冬瓜赤杨《东北木本图志》

地方名 水冬瓜(东北)。

功效 树皮：祛痰，消炎，镇咳，平喘。用于老年慢性气管炎。

#### 7161009

*Alnus trabeculosa* Hand. - Mazz.

植物名 江南桤木《中国植志》

药材名 江南桤木《湖南药物志》

地方名 江苏：水冬瓜(江宁)。

功效 茎叶：清热解毒。用于湿疹，荨麻疹。

#### 7161010

*Betula albo-sinensis* Burk.

植物名 红桦《中国植志》

地方名 河北：红皮桦；陕西：纸皮桦(秦岭)。

功效 树皮焦油：用于外伤，各种斑疹，皮肤病；芽：用于胃病。

#### 7161011

*Betula alnoides* Buch. - Ham. ex D. Don

植物名 西桦《中国植志》

药材名 西桦《汇编》

文献名 西南桦木《树分》，蒙自桦《云南种录》

地方名 云南：化桃木(蒙自)。

功效 叶：解毒，敛口。用于疔毒，已出脓久不收口。

#### 7161012

*Betula austro-sinensis* Chun ex P. C. Li

植物名 华南桦《中国植志》

药材名 华南桦《贵州药录》

功效 根：利水通淋，清热解毒。用于水肿，疮毒。

#### 7161013

*Betula dahurica* Pall.

植物名 黑桦《中国植志》

文献名 棘皮桦《华北树木志》

地方名 桦树、臭桦(东北)。

功效 芽：用于胃病；树皮：解热，利尿。用于黄疸。

#### 7161014

*Betula ermanii* Cham. --- *Betula ermanii* Cham. var. *lanata* Regel

植物名 岳桦《中国植志》

文献名 绒毛岳桦《长白山植药志》

功效 树皮：伤口抗菌药。

#### 7161015

*Betula ermanii* Cham. var. *incisa* Koidz.

植物名 缺刻岳桦《东北木本图志》

功效 树皮：伤口抗菌药。

#### 7161016

*Betula luminifera* H. Winkl. --- *Betula alnoides* Buch.

-Ham. var. *pyrifolia* (Franch.) Burk.

植物名 亮叶桦《中国植志》

药材名 亮叶桦《汇编》

文献名 光叶桦《中国经植志》，光皮桦《树分》

地方名 陕西：桦果树(平利)；浙江：大叶桦、桦烛(临安)；河南：红桦树；湖北：花果树，铁桦瓜、油桦瓜、画挂树(神农架)；广西：映桦子，桦角；四川：桦树皮，桦杆树皮，桦树，凤桦，化胶树，香桦；贵州：桦稿，狗啃木。

功效 叶：清热利尿。用于疔毒，水肿；树皮：除湿消食，解毒。用于食积停滞，乳痈红肿，时行热毒疮，风疹，小便短赤，黄疸；根：清热解毒，利水消肿。用于肾炎水肿，狂犬病。

#### 7161017

*Betula pendula* Roth

植物名 垂枝桦《中国植志》

药材名 新疆白桦《汇编》

文献名 疣枝桦、白桦皮《中药大辞典》

地方名 新疆：“刻因托斯”(维名)，疣桦。

功效 树皮：清热解毒，止咳。用于急慢性痢疾，咳嗽气喘，乳痈。

## 7161018

*Betula platyphylla* Suk. --- *Betula platyphylla* Suk. var. *mandshurica* (Regel) Hara --- *B. mandshurica* (Regel) Nakai

植物名 白桦《中国植志》

药材名 桦树皮《汇编》

文献名 桦皮《灵苑方》, 桦、桦木《本草拾遗》, 桦木皮《开宝本草》, 樨《纲目》, 东北白桦《东北木本图志》

地方名 粉桦(东北); 河北: 桦皮树, 臭桦(热河); 内蒙古: “胡斯”、“达可巴”(蒙名); 四川: “启比巴”(若尔盖藏名); 其他: 桦树。

功效 树皮: 清热利湿, 解毒, 止咳。用于急性扁桃体炎, 支气管炎, 肺炎, 肠炎, 痢疾, 肝炎, 尿少色黄, 急性乳腺炎, 外用于烧、烫伤, 痈疽肿毒。

## 7161019

*Betula platyphylla* Suk. var. *japonica* (Sieb.) Hara

植物名 华北白桦《中药大辞典》

药材名 桦木皮《开宝本草》、《中药大辞典》

文献名 白桦《中国经植志》

地方名 桦木(河南、山西), 桦树皮、桦槁树(西南), 粉桦(东北); 河北: 红桦皮; 内蒙古: 桦树; 河南: 红桦。

功效 树皮、树干液汁: 清热利湿, 祛痰止咳, 解毒消肿。

## 7161020

*Betula utilis* D. Don --- *B. albo-sinensis* Burk. var. *septrionalis* Schneid.

植物名 糙皮桦《中国植志》

文献名 牛皮桦《秦岭植志》

功效 树皮: 抗菌, 驱虫; 树皮焦油: 用于外伤, 各种斑疹, 皮肤病。

## 7161021

*Carpinus corodata* Blume

植物名 千金榆《中国植志》

药材名 半拉子(东北)、《汇编》

文献名 鹅耳枥《树分》, 千金鹅耳枥《东北木本图志》

地方名 山东: 千斤榆, 大叶桑、山樱桃(昆崙山); 河南: 穗干榆, 金丝榆, 穗子榆; 湖北: 千筋榆; 其他: 见风干。

功效 果穗: 健胃消食。用于胸腹胀满, 食欲不振, 消化不良。

## 7161022

*Carpinus corodata* Blume var. *chinensis* Franch.

植物名 华千金榆《中国植志》

药材名 小果千金榆《浙江天目药志》

文献名 中华鹅耳枥《湖北植志》, 小果千金榆《中药大辞典》, 华鹅耳枥《汇编》

地方名 大叶马料(浙江、江西); 江西: 野梅树。

功效 根皮: 用于劳倦疲乏, 跌打损伤, 痈肿, 淋病。

## 7161023

*Carpinus polyneura* Franch.

植物名 多脉鹅儿枥《中国植志》

功效 根皮: 用于跌打损伤, 痈肿, 淋病。

## 7161024

*Corylus heterophylla* Fisch. ex Trautv.

植物名 榛《诗经》、《中国植志》

药材名 榛子《开宝本草》、《中药大辞典》

文献名 亲《纲目》, 榧子《本草求真》, 山板栗《树分》

地方名 毛榛子、胡榛子、火榛子(东北); 北京: 平头榛, 平头榛子; 河北: 平榛, 榛栗, 榛棵秧; 甘肃: 木榛子, 毛核桃; 其他: 山白果。

功效 种仁: 调中, 开胃, 明目。

## 7161025

*Corylus heterophylla* Fisch. var. *sutchuenensis* Franch.

植物名 川榛《中国植志》

地方名 浙江: 木里仙; 贵州: 榛子。

功效 种仁: 调中, 开胃, 明目; 根: 清热润肺, 和胃健脾。用于消化不良, 脾虚泄泻, 肺热咳嗽。

## 7161026

*Corylus heterophylla* Fisch. ex Besser f. *brevituba* (Kom.) Kitag.

植物名 短苞毛榛《东北药用植物》

药材名 榛子(东北)

功效 种仁: 调中, 开胃, 明目。

## 7161027

*Corylus mandshurica* Maxim. et Rupr. --- *C. sieboldiana* Blume var. *mandshurica* (Maxim. et Rupr.) Schneid.

植物名 毛榛《中国植志》

文献名 角榛《种称》

地方名 毛榛子、胡榛子、火榛子(东北); 黑龙江: 山榛子; 北京: 角头榛。

功效 种仁: 滋养, 健胃, 止咳。

## 7161028

*Ostryopsis nobilis* Balf. f. et W. W. Smith

植物名 滇虎榛《高植图鉴补编》

地方名 云南: [叶上花](维西)。

功效 茎皮: 接骨止血。

## 7163 壳斗科 Fagaceae

## 7163001

*Castanea crenata* Sieb. et Zucc.

植物名 日本栗《高植图鉴补编》

药材名 日本栗《台湾药植志》

功效 叶: 收敛。用于漆疮。

## 7163002

*Castanea henryi* (Skan) Rehd. et Wils.

植物名 锥栗《高植图鉴》

药材名 珍珠栗(浙江、云南)、《中药大辞典》

地方名 江苏: 小叶栎; 浙江: 毛栗(建德), 甜栎(安吉、孝丰); 湖北: 尖栗(利川); 广西: [板栗树], 甜锥(四川: [榛子](峨眉山); 贵州: 青冈树; 云南: 金丝栗。

功效 种仁: 养胃健脾, 补肾强腰, 活血止血; 果壳: 化痰散结; 叶: 收敛。用于喉疔大毒, 外涂漆疮; 花: 用于泻痢, 便血, 瘰癧, 赤白带下; 栗毛球(总苞): 用于

丹毒, 瘰癧, 痰核, 百日咳; 树皮: 用于丹毒, 瘰癧, 口疮, 漆疮, 创伤; 根: 用于补肾(疝)气, 血痹。

#### 7163003

*Castanea mollissima* Blume--*C. bungeana* Blume

植物名 栗(别录)、《高植图鉴》

药材名 栗子《千金·食治》、《中药大辞典》

文献名 栲栗《诗经》, 亲栗《诗毛氏传疏》, 栗壳、栗树皮《食疗本草》, 板栗、栗毛壳、栗树白皮《唐本草》, 栗刺壳、栗花《日用本草》, 栗子花《滇南本草》, 楔子、掩子《医心方》, 芡迦、栗荻、栗毛球《纲目》, 栗树根《汪颖(食物本草)》, 瑰栗《西京杂记》, 茅栗《名实图考》, 风栗《植物名汇》, 家栗、瓦栗子《中国药植志》, 板栗壳《药典》

地方名 大栗(江苏、浙江、福建), 毛栗子(甘肃、河南), 毛板栗(湖北、云南), 毛栗(甘肃、广西), 魁栗(河北、云南), 栗子树(山东、浙江); 北京: 荔枝花(雄花序); 河北: 山栗, 苹果, 栲栗; 山东: 栗蓬(海阳); 江苏: 桂花栗子; 江西: 板栗壳斗; 福建: 高栗(龙岩、永定), 建栗(福州), 栗里(上杭); 湖北: 尖栗(利川), 瓦栗子树, 猴板栗(鹤峰); 广东: 风栗壳; 广西: 毛栗壳(平乐); 云南: 栗楔, 栗叶; 其他: 咸从栗。

功效 种仁: 养胃健脾, 补肾强筋, 活血止血。用于反胃, 泄泻, 腰脚软弱, 吐衄, 便血, 金疮, 折伤肿痛, 瘰癧; 栗叶: 用于喉疔大毒, 收敛, 外涂漆疮; 栗壳: 用于反胃, 鼻衄, 便血; 花: 用于泻痢, 便血, 瘰癧; 果皮: 用于瘰癧, 骨鲠; 栗毛球(总苞): 用于丹毒, 瘰癧, 痰核, 百日咳; 树皮: 用于丹毒, 瘰癧, 口疮, 漆疮, 打伤。

#### 7163004

*Castanea seguinii* Dode

植物名 茅栗《高植图鉴》

药材名 茅栗《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 栲、栲、栲栗(《尔雅》郭璞注), 栲栗《纲目》, 毛板栗《云南植志》

地方名 毛栗(江苏、江西、湖南), 金栗(浙江、江西), 野栗子(江苏、浙江、河南); 江苏: 锥栗; 江西: 野茅栗; 湖北: 毛凹栗子(兴山), 白花栗(鹤峰), 珍珠栗(崇阳); 广西: 毛栗树(全州); 贵州: 板栗树。

功效 壳斗、树皮或根: 用于肺炎, 肺结核, 丹毒, 疮毒; 种仁: 用于失眠; 叶: 用于消化不良; 幼树根: 用于丝虫病; 花序: 用于口疮。

7163005 见 7163014a

#### 7163006

*Castanopsis carlesii* (Hemsl.) Hayata

植物名 米榧《高植图鉴补编》

文献名 细枝榧《广西植录》, 小叶榧、米子柴、细米圆《高植图鉴》, 小红榧《江西药录》

功效 种仁: 用于痢疾。

#### 7163007

*Castanopsis chinensis* Hance

植物名 榧《高植图鉴补编》

药材名 榧栗《汇编》

文献名 钩栗、椶子、狗栗《植物名汇》, 米榧、桂林榧《高植图鉴》, 榧栗果壳《中药大辞典》, 华榧《贵州药录》

地方名 栲栗(广东、云南), 锥栗栲(广西、云南); 广东: 榧(广州); 云南: 野板栗栲; 其他: 山榧, 米榧栗, 榧子树, 勒翠。

功效 种子: 健胃, 补肾。用于肾虚, 痿弱, 消瘦; 壳斗: 健胃补肾, 除湿热。用于湿热, 腹泻。

#### 7163008

*Castanopsis delavayi* Franch.

植物名 高山榧《高植图鉴补编》

药材名 高山栲《汇编》

文献名 高山栲树《树分》, 毛栗、白猪栗、丝栗《高植图鉴》, 白栗、滇栲《中国树木志》

地方名 云南: 白栲, 滇锥栗, 锥栗树。

功效 根、茎皮、果实: 收敛, 止泻, 解毒, 消炎; 根或茎皮: 用于肠炎, 腹泻; 果实: 用于心悸, 耳鸣, 腰痛。

#### 7163009

*Castanopsis eyrei* (Champ.) Tutch.

植物名 甜槠《高植图鉴补编》

文献名 石栗子、丝栗《高植图鉴》, 栲《中国经植志》, 水榧栲《广西植录》, 甜槠栲《江西药录》

地方名 安徽: 青树栲; 福建: 小叶苦槠, 榧树, 栲树。

功效 种仁: 用于痢疾。

#### 7163010

*Castanopsis fabri* Hance

植物名 罗浮榧《高植图鉴补编》

文献名 酒泡、白椶、三检榧《高植图鉴》, 白椶《中国树木志》

地方名 罗浮栲(江西、广东、广西、云南), 白榧(福建、云南); 广东: 小狗牙榧(大埔), 白坭树(梅县)。

功效 种仁: 用于痢疾。

#### 7163011

*Castanopsis fargesii* Franch.

植物名 栲《高植图鉴补编》

药材名 丝栗子(四川、贵州)、《中国经植志》

文献名 大丝栗树《高植图鉴》, 栲树《中国树木志》, 川鄂栲《广西植录》

地方名 江西: 丝栗栲; 湖北: 大叶栗; 广西: 丝栗; 四川: 水绿树, 毛叶丝, 毛叶绿, 丝栗树。

功效 种仁: 用于痢疾。

#### 7163012

*Castanopsis fissa* (Champ.) Rehd. et Wils.

植物名 裂壳榧《高植图鉴补编》

药材名 裂壳榧《广西药录》

文献名 闽粤栲栗《树分》, 大叶栗《中国经植志》, 裂斗榧栗《广西植录》, 裂壳栲《云南植志》

地方名 大叶栲、裂壳(广西、云南), 厚栗(湖南、广西); 广西: 山苦榧(桂平、贺县), 崩疮药(贺县), 大叶栲, 硬壳斗; 云南: 大叶榧, 大叶栲。

功效 果实: 用于咽喉肿痛; 叶: 外用于跌打损伤, 疮疖。

#### 7163013

*Castanopsis fordii* Hance

植物名 南岭榧《高植图鉴补编》

文献名 水梨《高植图鉴》,南岭栲《江西药录》

地方名 毛栲(福建、广西);浙江:大红栗栲;福建:赤皮栲,梭树,银皮,银耳皮;广东:山栗子,木槲,毛栲,绒毛栗。

功效 种仁:用于痢疾。

#### 7163014

*Castanopsis hickelii* A. Camus

植物名 红椴木《中国经植志》

药材名 红椴杆《陆川本草》

文献名 红椴栲《广西植录》

地方名 广东:赤栲,石头栲;广西:赤黎木,红锥,红椴,椴木。

功效 种仁:滋养强壮,健胃,消食。用于食欲不振,脾虚泄泻。

#### 7163014a

*Castanopsis hystrix* A. DC.

植物名 红锥《高植图鉴补编》

文献名 刺栲《海南植志》

地方名 大施栗、丝栗子树(四川、贵州),红栲、栲树(浙江、云南);浙江:小红栗栲;江西:叶下黄,青栲;福建:山连子树,赤红栲,黄栲;广东:赤椴树,红椴;云南:红锥栗。

功效 种仁:用于痢疾。

#### 7163015

*Castanopsis jucunda* Hance

植物名 秀丽锥《高植图鉴补编》

文献名 乌榧、乌榧栲、牛牯锥、铁榧《高植图鉴》,美秀锥栗、东南栲《广西植录》

功效 种仁:用于痢疾。

#### 7163016

*Castanopsis kawakamii* Hayata

植物名 吊皮锥《高植图鉴补编》

文献名 青钩锥栗、青钩栲《高植图鉴》,吊皮栲《中国树木志》

地方名 台湾:赤栲;广东:蓑衣栲,红椴。

功效 种仁:用于痢疾。

#### 7163017

*Castanopsis lamontii* Hance

植物名 鹿角锥《高植图鉴补编》

文献名 红勾、白勾、红勾栲、石锥树《高植图鉴》,鹿角栲《云南种录》,粗肉栲《中国树木志》

地方名 江西:红钩栲;广西:火锥,铁锥栲。

功效 种仁:用于痢疾。

#### 7163018

*Castanopsis sclerophylla* (Lindl.) Schottky --- *Quercus sclerophylla* Lindl.

植物名 苦槠《高植图鉴补编》

药材名 槠子《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 槠《诗经》,赤栲《尔雅》,槠子皮叶、苦槠子《本草拾遗》,槠子《饮膳正要》,血槠《纲目》,槠栗《植物名汇》,苦槠锥、苦槠栲《高植图鉴》

地方名 浙江:苦栗,槠栲;安徽:泡蓝树,铁栗木;福建:苦锥(南平、沙县、尤溪、浦城、建瓯、德化),苦槠槠

(崇安)。

功效 种仁:止泻痢;树皮及叶:止血。

#### 7163019

*Castanopsis tibetana* Hance

植物名 钩锥《高植图鉴补编》

药材名 钩栗《本草拾遗》、《浙江天目药志》

文献名 钩栲、巢钩子、甜槠子《纲目》,西藏锥栗《中国植物图鉴》,猴栗《高植图鉴》,藏栗、硬叶栲《植分学报》,大叶高山栲《中国经植志》,钩栲、大叶青柴、《汇编》,构栲《贵州药录》

地方名 大叶锥栗(浙江、广东、广西),青叶槠(浙江、江西);浙江:木栗(龙泉);安徽:葫芦树;福建:大叶槠;湖北:厚叶栗子树;湖南:厚栗;广东:红叶板栗;广西:破叶栲,野板栗;贵州:猴板栗;云南:硬叶栗。

功效 种仁:用于痢疾;树皮:用于湿热泄泻。

#### 7163020

*Cyclobalanopsis bambusaefolia* (Hance) Chun --- *Quercus salicina* Seem.

植物名 竹叶青冈《中国树木志》

文献名 竹叶青冈栲《树分》

地方名 福建:竹叶槠(闽南);海南:谷槠,石基槠;广西:竹叶栲,扫把锥。

功效 叶:用于尿石症。

#### 7163021

*Cyclobalanopsis delavayi* (Franch.) Schottky

植物名 黄毛青冈《云南植志》

药材名 黄栲《汇编》

文献名 黄栲《高植图鉴》,黄背叶青冈《高植图鉴补编》,黄青冈、滇黄栲《中国树木志》

地方名 云南:黄栗树(曲靖)。

功效 树皮:平喘。用于哮喘。

#### 7163022

*Cyclobalanopsis glauca* (Thunb.) Oerst. --- *Quercus glauca* Thunb.

植物名 青冈《云南植志》

药材名 橡子《中国经植志》

文献名 槠子《本草拾遗》,青冈栲《名实图考》

地方名 小栗子树、崖青冈树(华中),铁青冈(陕西、华中),铁槠(江苏、云南),九欖(福建、台湾),大叶青冈(陕西、河南);浙江:花梢树,青栲,青栲;安徽:石虎,青柴,铁栗子;福建:加胶(福州、闽侯、闽清、永泰),加曾、槠木(永春、仙游、闽南、莆田),白槠(南平、尤溪、三明、福安),铁槠(沙县、南平),槠仔(南靖、平和、龙溪),石头槠(崇安),铁白杜(长汀),紫心木;台湾:枝欖;湖北:槠树,丝栗子,青刚树,猴欖子,细叶槠,铁栲,铁槠栲;湖南:石槠;广东:鸡槠风,赤槠勾;广西:米槠(临桂),咪中(隆林),青冈麻;其他:宝槠,九槠,九层。

功效 种仁:止渴,止痢,破恶血,健行;树皮:止产妇流血;嫩叶:用于疳疮。

#### 7163023

*Cyclobalanopsis gracilis* (Rehd. et Wils.) Cheng et T. Hong --- *Quercus glauca* Thunb. f. *gracilis* Rehd. et

Wils. --- *Cyclobalanopsis glauca* (Thunb.) Oerst. var. *gracilis* (Rehd. et Wils.) Y. T. Chang

植物名 细叶青冈《中国树木志》

文献名 小叶桐《秦岭植志》, 小叶青冈栎《广西植录》

功效 种仁: 止渴, 止痢, 破恶血, 健行; 树皮: 止产妇流血; 嫩叶: 用于疔疮。

#### 7163024

*Cyclobalanopsis hui* (Chun) Chun --- *Quercus hui* Chun

植物名 雷公青冈《中国树木志》

药材名 橡子《中国经植志》

文献名 雷公果《中国经植志》, 雷公桐《高植图鉴》, 扁斗桐《广西植录》

地方名 广东: 苦槠树, 槟榔桐; 广西: 雷公子。

功效 种仁: 用于头痛和胃病。

#### 7163025

*Cyclobalanopsis kerrii* (Craib) Hu --- *Quercus kerrii* Craib

植物名 毛叶青冈《云南植志》

药材名 埋博树《云南药录》

文献名 平脉桐《高植图鉴》

地方名 广东: 榧柴树; 云南: “埋哥当牧”(傣语)。

功效 树皮、壳斗: 涩肠止泻, 解毒截疟。用于疟疾。

#### 7163026

*Cyclobalanopsis myrsinaefolia* (Blume) Oersted --- *Quercus myrsinaefolia* Bl.

植物名 小叶青冈《云南植志》

药材名 榧子《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 面榧《纲目》, 青栲《树分》, 青桐《高植图鉴》, 细叶青冈《福建植志》

地方名 浙江: 细叶青栎; 江西: 青钩; 福建: 铁榧树(宁化), 竹叶榧(浦城、崇安、建阳), 小叶榧(建阳), 赤皮; 湖北: 红桐; 湖南: 甜珠子(衡山), 苦榧, 甜榧; 广东: 石壁桐子, 石及子, 大叶宜都桐。

功效 种仁: 止泻痢, 食之不饥, 令健行, 能除恶血, 止渴。

#### 7163027

*Lithocarpus areca* (Hick. et A. Camus) A. Camus

植物名 槟榔柯《高植图鉴补编》

药材名 槟榔柯《广西药录》

文献名 槟榔石栎、槟榔桐《中国树木志》

地方名 广西: 麦果(龙州)。

功效 根: 用于痢疾。

#### 7163028

*Lithocarpus brevicaudatus* (Skan) Hayata

植物名 岭南柯《高植图鉴》

文献名 短尾柯《海南植志》, 岭南石栎《贵州药录》

地方名 海南: 香牙刷。

功效 种仁: 清热利湿。用于泻痢。

#### 7163029

*Lithocarpus dealbatus* (DC.) Rehd.

植物名 白皮柯《高植图鉴》

文献名 滇石栎《云南植志》, 白皮栎、白皮石栎《中国树木志》

地方名 云南: 毛石栎、野槟榔(昆明), 猪栎。

功效 花序: 顺气消食, 健胃杀虫。用于食积腹胀, 虫积不化。

#### 7163030

*Lithocarpus glaber* (Thunb.) Nakai

植物名 柯《高植图鉴》

药材名 柯树皮《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 木奴树《临海异物志》, 桐柯《中国树木志》, 桐树、柯树《中药大辞典》

地方名 石栎(江苏、浙江); 江苏: 子栎, 橡子; 浙江: 白桐树, 青锡; 江西: 栲树; 湖北: 石头树(崇阳); 湖南: 箭栎子; 广东: 桐木。

功效 树二层皮: 有小毒。用于腹水病。

#### 7163031

*Lithocarpus henryi* (Seem.) Rehd. et Wils.

植物名 灰柯《高植图鉴补编》

文献名 绵柯、绵桐、刚板栗、羊角栗《高植图鉴》, 棉石栎、灰桐、桐木、桐壳栗《中国树木志》, 长叶石栎、光叶桐《江西药录》

地方名 江西: 棉榧; 四川: 绵榧, 青皮刚, 大青冈。

功效 种仁: 止泻痢。

#### 7163032

*Lithocarpus litseifolius* (Hance) Chun --- *L. polystachyus* auct. non (DC.) Rehd.

植物名 多穗柯《高植图鉴补编》

药材名 多穗柯《广西药录》

文献名 榧叶柯《高植图鉴》, 多穗石柯《中国经植志》, 多穗石栎、鸡山柯《中国树木志》

地方名 甜茶(浙江、广东、广西、四川), 大叶桐子(浙江、广东); 浙江: 麻斗, 槐柴(龙泉); 广东: 车锥, 鸡心肚, 算盘子; 广西: 美丽加奴(百色), 黑石虎(隆林); 四川: 小猪籽(米易)。

功效 茎: 驱风除湿, 止痛。用于风湿痹痛, 骨折。

备考 有些文献将本种学名误订为 *Lithocarpus polystachyus* (DC.) Rehd.

7163033 见 7163032

#### 7163034

*Lithocarpus spicatus* Rehd. et Wils.

植物名 粗穗柯《高植图鉴》

药材名 粗穗柯《江西药录》

文献名 榧栎树《高植图鉴》

功效 种仁: 止泻痢。

#### 7163035

*Quercus acutissima* Carr.

植物名 麻栎《高植图鉴》

药材名 橡实《雷公炮炙论》, 橡实壳《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 栲、栎《诗经》, 橡《庄子》, 栎《尔雅》, 柞树(《尔雅》郑玄注), 柔、样、栲实《说文》, 橡栗、皂斗(《吕氏春秋》高诱注), 栎、栎木皮《本草拾遗》, 柞栎(陆玑

《诗疏》), 赤龙皮(肘后方), 杼斗、橡斗壳、橡斗子、栎树皮(日华子本草), 橡栎(图经), 橡子树(救荒本草), 柞子、橡木皮(纲目), 麻栎果(纲目拾遗), 栎子(医林纂要), 橡豆子壳(余居士选奇方), 橡子壳(玉楸药解), 栲、栲栎(志文义证), 蚕柞木、青岗树、橡碗树(满洲植录), 小叶菠萝(华北树木志)

地方名 柴栎(江苏、浙江), 青冈、碗栎、黄麻栎(东北), 橡树(山东、浙江、安徽), 大橡树(东北、陕西); 河北: 榲桲, 榲桲皮, 橡碗子树; 陕西: 大橡子树; 山东: 大橡子(昆崙山); 安徽: 橡栎树, 刺栎树, 栎树, 耳栎树, 苦珠; 台湾: 土骨皮; 湖北: 白皮花栎(利川), 花栎(鄂西); 海南: 年树; 广西: 米域; 四川: 毛猴儿, 虫波罗, 青刚(内江), 青杠(成都), 青杠转, 青杠树(峨眉山); 贵州: 红麻栗皮; 云南: 麻栗果。

功效 根皮或树皮: 收敛, 止痢。用于久泄痢疾, 瘰癧, 恶疮; 果: 解毒消肿, 涩肠固脱。用于乳腺炎, 泻痢, 脱肛, 痔血; 壳斗: 收敛, 止血。用于泻痢, 脱肛, 肠风下血, 崩中带下。

## 7163036

*Quercus acutissima* Carr. var. *septrionalis* Liou

植物名 北方麻栎(华北树木志)

功效 种子: 止泻, 消乳肿; 叶、树皮: 止痢。

## 7163037

*Quercus aliena* Blume

植物名 榲桲(高植图鉴补编)

药材名 橡子(新乡中草)

文献名 榲桲(名实图考), 大叶栎柴、细皮青冈、小叶波罗(云南植志)

地方名 波罗树、榲桲、橡树(陕西、河北、山西、山东), 青冈(甘肃、山东、河南); 安徽: 白栎树; 河南: 大叶青冈; 湖北: 白皮栎; 湖南: 碗脚栎; 贵州: 青冈树, 青杠果。

功效 种仁: 止泻痢; 果壳: 用于慢性痢疾。

## 7163038

*Quercus aliena* Blume var. *acuteserrata* Maxim.

植物名 锐齿榲桲(高植图鉴)

文献名 尖齿榲桲(东北木本图志), 锐齿栎(秦岭植志)

地方名 湖北: 李李栎(兴山)。

功效 果: 止泻, 止痛; 根: 用于肠炎, 痢疾; 带虫瘰的总苞: 健脾消积, 理气, 清火, 明目。

## 7163039

*Quercus chenii* Nakai

植物名 小叶栎(高植图鉴)

地方名 江西: 苍落; 福建: 杜木, 铁栎柴, 黄栎树。

功效 果: 止泻, 止痛; 根: 用于肠炎, 痢疾; 带虫瘰的总苞: 健脾消积, 理气, 清火, 明目。

## 7163040

*Quercus dentata* Thunb.

植物名 柞栎(高植图鉴)

药材名 榲桲皮(唐本草)、《中药大辞典》

文献名 朴槲(诗经), 赤龙皮、榲桲木皮(肘后方), 榲桲皮(崔氏纂要方), 榲桲实、榲桲若(唐本草), 榲桲叶(图经), 大

叶栎、金鸡树、栎榲子、榲桲树、榲桲实仁(纲目), 枹(本草新注), 榲桲(尔雅义疏), 青冈枫(和汉药物学), 榲桲木(满蒙产药植), 榲桲(中药大辞典), 波罗栎(中国树木志)

地方名 波罗叶、小波拉子(东北), 柞树(黑龙江、吉林), 橡树(东北、山西、陕西、山东、云南), 大叶菠萝(河北、山东、湖北、云南), 青冈(河南、云南); 河北: 波罗树; 山西: 柴树(太行山); 山东: 橡子(昆崙山), 菠萝(莒南、滕县), 榲桲菠萝(莒县); 浙江: 摘朵, 茭; 安徽: 白栎树; 福建: 大叶栎柴; 台湾: 榲; 湖北: 佛利青冈(利川), 大叶柞; 湖南: 软脚珠; 四川: “卫江”(藏名), 麻栗(会理), 大叶青杠, 细皮青冈, 青冈转; 云南: 白栗毡, 矮脚栗; 其他: 青冈树。

功效 树皮: 用于恶疮, 瘰癧, 痢疾, 肠风下血; 叶: 用于吐血, 衄血, 血痢, 血痔, 淋病; 种子: 涩肠止痢。

## 7163041

*Quercus dolicholepis* A. Cam.

植物名 匙叶山栎(高植图鉴补编)

药材名 匙叶山栎(贵州药录)

功效 果壳: 清热利湿。用于腹泻。

## 7163042

*Quercus fabri* Hance

植物名 白栎(高植图鉴)

药材名 白栎(汇编)

文献名 栎(满洲植录), 柞子树、索落果树(中国森林植志), 小白反栎(经植手册), 法氏榲(中国植物图鉴)

地方名 青冈树(贵州、云南); 山东: 青杠树; 江苏: 白反栎, 金冈栎, 栎树, 索落树, 橡树; 浙江: 白柴蒲树(临安), 泽子(衢县、江山), 泽栗(龙泉), 柞子柴(遂昌), 豺狗栗(温州), 榲桲(浙西), 白屑树, 白栎蒲(果实虫瘰), 白栎部(天目山); 江西: 石栎, 栎石树, 橡子; 福建: 山毛栎, 白栎, 阔栎, 皂斗, 栎柴; 湖北: 米橡子树(罗田); 贵州: 麻栗树; 云南: 小白栎。

功效 树皮、壳斗、果壳的虫瘰: 健脾消积, 理气, 清火, 明目。用于疝气, 疳积, 火眼赤痛; 根: 用于肠炎, 痢疾。

## 7163043

*Quercus franchetii* Skan

植物名 川滇山栎(高植图鉴补编)

文献名 椎连栎(植分学报), 椎连栎(汇编)

地方名 云南: 黄栗。

功效 树内皮: 止咳定喘。用于感冒, 支气管哮喘, 风湿; 寄生: 消炎。用于黄疸型肝炎, 喉炎。

## 7163044

*Quercus glandifera* Blume var. *brevipetiolata* (DC.)

Nakai--*Q. serrata* Thunb. var. *brevipetiolata* (DC.)

Nakai

植物名 短柄枹栎(高植图鉴)

药材名 短柄枹栎(湖南药物志)

文献名 短柄枹栎(江苏植志), 白花栎(湖北植志)

地方名 小橡子树(陕西、湖北), 短柄枹(山东、福建); 陕西: 枹树; 山东: 菠萝, 柞树; 河南: 小叶青冈。

功效 虫瘰: 用于淋病。

## 7163045



*Quercus glandilifera* Blume --- *Quercus serrata* Thunb.

植物名 枹栎《高植图鉴》

药材名 橡子(江苏、山东、河南)

文献名 枹(纲目), 榲桲、榲皮、国木皮、栎皮、扣皮、枋皮、赤龙皮、皂斗皮、土骨皮、幽樟皮、榲木皮《新纲》, 榲《中国植物图鉴》, 青冈树《高植图鉴》

地方名 小橡树(陕西、湖北), 枹树(山东、江西); 山东: 柞木, 青岗栎; 江苏: 李落树(江阴), 野皂荚, 叶子团波罗; 河南: 青刚树; 四川: 白花栎。

功效 树皮、壳斗、果实的虫瘿: 健脾消积, 理气, 清火, 明目; 根: 用于肠炎, 痢疾。

#### 7163046

*Quercus hopeiensis* Liou

植物名 河北栎《华北树木志》

功效 种子、壳斗、树皮及根皮: 收敛, 止泻, 止血。

#### 7163047

*Quercus infectoria* Oliv.

植物名 没食子树《药材学》

药材名 没食子〔虫瘿〕《海药本草》、《中药大辞典》

文献名 墨石子《雷公炮炙论》, 无食子《药性论》, 没石子《子母秘录》, 无石子《酉阳杂俎》, 麻葵泽《方輿志》, 没食子榲(小泉《药植》), 没食子榲树《药学术语合编》

功效 虫瘿: 固气, 涩精, 敛肺, 止血。用于大肠虚滑, 泻痢不止, 便血, 遗精, 阴汗, 咳嗽, 咯血, 齿痛, 创伤出血, 疮疡久不收口。

#### 7163048

*Quercus liaotungensis* Koidz.

植物名 辽东栎《高植图鉴》

药材名 橡子(河北、内蒙古)

文献名 蔡木《名实图考》, 辽东柞《树分》

地方名 青冈(陕西、甘肃、青海), 青冈柳(辽宁、吉林), 柞树(黑龙江、辽宁、内蒙古), 柴树(河北、山西), 橡子树(河北、内蒙古); 内蒙古: “柴忽拉”(蒙名); 宁夏: 杠木, 辽东栎皮, 辽东栎壳斗; 河南: 小叶青冈, 小青冈, 青冈栎。

功效 果实、壳斗、树皮及根皮: 收敛, 止泻, 止血。用于脾虚腹泻, 久痢, 痔瘡出血, 脱肛便血, 子宫出血, 白带, 恶疮, 痢肿。

#### 7163049

*Quercus mongolica* Fisch.

植物名 蒙古栎《高植图鉴补编》

药材名 柞树皮《吉林中草药》

文献名 青刚木、真木、小叶柞树《满洲植录》, 青杏子菜《科裁》, 青冈树《经植手册》, 橡子树、青风栎《汇编》, 橡碗、青刚栎《中药大辞典》

地方名 柞树(东北、山西、内蒙古), 小叶榲桲(东北、山东), 柞栎(东北), 蒙栎(河北、山东); 吉林: “岳翰尔巴姆那木”(朝名), 橡树, 青冈柳, 柞树胶, 柞树叶; 山东: 青刚栎、卷毛杠、菠萝(昆崙山), 软菠萝(莱阳)。

功效 树皮、叶: 清热利湿, 解毒。用于细菌性痢疾, 急性胃肠炎, 小儿消化不良, 黄疸, 急、慢性支气管炎, 痔瘡; 壳斗: 收敛止血。

#### 7163050

*Quercus mongolica* Fisch. var. *grosserata* Rehd. et Wils.

植物名 粗齿蒙古栎《中国树木志》

文献名 钝齿蒙栎《华北树木志》, 粗齿蒙栎《山东树木志》

功效 树皮、叶: 清热利湿, 解毒; 壳斗: 收敛止血。

#### 7163051

*Quercus mongolico-dentata* Uyeki

植物名 柞榲栎《东北木本图志》

功效 树皮: 用于恶疮, 瘰癧, 痢疾, 肠风下血; 叶: 用于吐血, 衄血, 血痢, 血痔, 淋病; 种子: 涩肠止痢。

#### 7163052

*Quercus phillyraeoides* A. Gray

植物名 乌岗山栎《高植图鉴补编》

文献名 石楠柴《云南神录》, 乌岗栎《江西药录》

功效 果实的虫瘿: 健脾消积, 理气, 清火, 明目; 根: 用于肠炎, 痢疾。

#### 7163053

*Quercus robur* L.

植物名 欧洲白栎《高植图鉴补编》

药材名 橡子《新疆中草》

文献名 夏栎《山东树木志》

地方名 新疆: 橡子碗, 橡树。

功效 果实和壳斗: 收敛, 涩肠, 止痢, 平喘。用于慢性肠炎, 痢疾, 子宫脱垂, 脱肛, 哮喘。

#### 7163054

*Quercus semicarpifolia* Smith

植物名 高山栎《高植图鉴补编》

药材名 青杠膏《西藏中草》

文献名 藏青杠《汇编》

地方名 青海: “贝折”(藏名)。

功效 叶及叶煎成的膏: 清热解毒。用于寒热夹杂, 泻痢, 肠炎及哮喘。

#### 7163055

*Quercus senescens* Hand. -Mazz.

植物名 灰背山栎《高植图鉴补编》

文献名 灰背高山栎《高植图鉴》, “贝折”(藏名)《青藏药图》

地方名 云南: 灰背栎。

功效 果: 用于腹泻, 流行性感冒。

#### 7163056

*Quercus variabilis* Blume

植物名 栓皮栎《高植图鉴》

药材名 栓皮栎《汇编》

文献名 大叶栎《纲目》, 麻栎《云南经植概论》, 厚皮栎、粗皮青刚《云南的造林树》, 香刚柳《东北木本图志》

地方名 橡树、柞树(河北、山东), 软木栎(山西、山东、江西、福建、云南), 粗皮栎(河南、云南); 河北: 白柞, 白枣子, 软木; 内蒙古: 橡子; 陕西: 耳子树(秦岭), 花栎木(陕南); 山东: 小叶菠萝(泰山), 橡子树(蒙山、荣成、莱芜); 浙江: 大叶橡(浙西); 福建: 厚皮栎(南平); 台湾: 校力, 棉栗; 河南: 老栎, 花栎, 橡谷树; 湖北:

黄划栎;广东:稠树;四川:粗皮青冈,青杠树(峨眉山);贵州:青杠碗;云南:白麻栎;其他:校栎,橡斗,白柞子,大花栎,厚皮花栎,粗皮花栎。

功效 果壳:止咳涩肠。用于咳嗽,水泻。外用于头癣;种仁:健胃,收敛,止血痢。

## 7164 木麻黄科 Casuarinaceae

### 7164001

*Casuarina cunninghamiana* Miq.

植物名 细枝木麻黄《中国植志》

地方名 广东:银线木麻黄(广州)。

功效 枝叶:用于疝气,阿米巴痢疾,慢性支气管炎。

### 7164002

*Casuarina equisetifolia* Forst.

植物名 木麻黄《中国植志》

文献名 针树、常磐桤柳(小泉《药植》),木贼叶木麻黄《台湾药植志》,马尾树《种分》

地方名 驳骨松(广东、广西);广东:短枝木麻黄,驳骨树。

功效 树皮:收敛,强壮;枝叶:用于疝气,阿米巴痢疾,慢性支气管炎。

### 7164003

*Casuarina quadrivalvis* Labil.

植物名 方苞木麻黄《台湾药植志》

功效 木材:可解渴。

## 7165 榆科 Ulmaceae

### 7165001

*Aphananthe aspera* (Thunb.) Planch.

植物名 糙叶树《高植图鉴》

药材名 糙叶树《浙江天目药志》

文献名 朴树《漳州府志》

地方名 牛筋树(浙江、福建),白鸡油(福建、台湾);山东:糙皮树(青岛);上海:沙弹子;浙江:山朴;广东:大牛筋;广西:假枫树;四川:丝棉树。

功效 根皮及树皮:用于腰损伤酸痛;花:用于胃病。

### 7165002

*Celtis biondii* Pamp.

植物名 紫弹朴《高植图鉴补编》

药材名 紫弹树《浙江天目药志》

文献名 黄果朴《浙江药植志》,黄果树《江苏南部种册》

地方名 浙江:牛筋树(临安);湖北:粗壳榔(巴东),青弹树(神农架),朴树;湖南:沙南子树,香丁;四川:糯米树。

功效 全株:清热解毒,祛痰,利小便。用于小儿脑积水及小儿头颅软骨病,腰骨酸痛,乳腺炎。外用于疮毒,溃烂。

### 7165003

*Celtis bungeana* Blume

植物名 黑弹朴《高植图鉴补编》

药材名 棒棒木《汇编》

文献名 小叶朴《汇编》,朴《经植手册》,光皮朴《东北木本图志》,小叶朴皮《药学报》

地方名 黑弹树(内蒙古、陕西、四川),朴树(内蒙古、四川),棒子树(河北、甘肃);河北:[秦皮];内蒙古:"珠茹嘎岱-毛都"(蒙名);河南:白麻子,报马子。

功效 树干:祛痰,止咳,平喘。用于支气管哮喘,慢性气管炎。

### 7165004

*Celtis cinnamomea* Lindl. ex Planch.

植物名 玉桂朴(拟)

文献名 假玉桂《高植图鉴》

地方名 广西:香胶木(钦州)。

功效 叶:止血。外用于外伤出血。

### 7165005

*Celtis tetrandra* Roxb.

植物名 四蕊朴《高植图鉴补编》

地方名 广西:麦筛亮(金秀),裸结(来宾)。

功效 叶:外用于浮肿。

### 7165006

*Celtis tetrandra* Roxb. subsp. *sinensis* (Pers.) Y. C. Tang --- *C. sinensis* Pers. --- *C. nervosa* Hemsl. --- *C. bodinieri* Levl. --- *C. labilis* Schneid. --- *C. cercidifolia* Schneid.

植物名 朴树《高植图鉴》

药材名 朴树《汇编》

文献名 木桃儿树《救荒本草》,朴《种称》,朴榆《经植手册》,青檀、柏仔、木树果子《植物名汇》,榎(小泉《药植》),千粒树、木发树《树分》

地方名 沙朴(山东、江苏、浙江、台湾),朴于树(福建、台湾),青朴(江苏、台湾),桑仔、桑子(台湾、广东、海南);广东:相思树;广西:[千层皮],费范;浙江:小叶牛筋树(临安);山东:紫丹树(费县);福建:朴朴于(福州、南平);湖南:蒸枣花。

功效 根皮、叶、树皮:用于腰痛,漆疮。

### 7165007

*Gironniera subaequalia* Planch.

植物名 白颜树《高植图鉴》

药材名 大板王《广西药录》

文献名 大叶白颜树《中国经植志》

功效 叶:用于祛寒除湿。

### 7165008

*Hemiptelea davidii* (Hance) Planch.

植物名 刺榆《高植图鉴》

药材名 刺榆《本草拾遗》、《汇编》

文献名 榘《诗经》,莛、莛《尔雅》,柘榆、梗榆《广雅》,棘榆《纲目》,钉枝榆《树分》

地方名 辽宁:刺叶子;江苏:刺榆针子;浙江:刺榔(临安);广西:骚夹菜(阳朔)。

功效 树皮、根皮、叶:解毒消肿。用于水肿,痢肿,毒蛇咬伤,痢疮肿毒。

### 7165009

*Trema angustifolia* (Lindl.) Blume --- *T. sampsonii* (Hance) Merr. et Chun --- *T. lanceolata* Merr.

植物名 狭叶山黄麻《高植图鉴》

文献名 狭叶山油麻《中药大辞典》

地方名 广西: 山络木、山郎木(平南), 麻络儿(岑溪), 水麻(隆林); 云南: 野婆树, “啊车”(元江哈尼语), 麻脚树。

功效 嫩叶、根: 清热解毒, 止痛, 止血。用于疔毒, 外伤出血。

#### 7165010

*Trema cannabina* Lour.

植物名 光叶山黄麻《高植图鉴》

药材名 光叶山黄麻《福建药物志》

文献名 硬壳朗、滑朗树《中药大辞典》

地方名 福建: 蛇壳草; 广东: 光尾斧头树; 广西: 山海麻, 麻木(金秀), 双思草(钟山), 茶木(上林), 细叶麻木(东兰)。

功效 根皮: 健脾利水, 祛瘀生新。用于水泻, 接骨; 全株: 清热解毒。用于流感。

#### 7165011

*Trema cannabina* Lour. var. *dielsiana* (Hand. -Mazz.) C. J. Chen --- *T. dielsiana* Hand. -Mazz.

植物名 山油麻《高植图鉴》

药材名 山油麻《浙江天目药志》

地方名 浙江: 榔树(临安), 山脚麻; 江西: 山黄麻, 丸子树; 福建: 山野麻, 山油桐, 野麻芒。

功效 嫩叶、根: 清热解毒, 止痛, 止血。用于疔毒, 外伤出血。

#### 7165012

*Trema orientalis* (L.) Blume

植物名 山黄麻《高植图鉴》

药材名 山黄麻《广西本草选编》

文献名 银毛叶山黄麻《云南种录》, 里白覆《中国植物图鉴》

地方名 蛤蚧树(湖南、广东), 鞭炮麻(湖南、广东), 山麻木(广西、云南); 福建: 羊尾癭、羊尾红(厦门), 山角麻; 台湾: 度布树, 麻布树; 广东: 麻桐树, 小叶磨兰麻; 海南: 山王麻, 马冷麻, 雷温, 抗哥; 广西: 九层麻(南宁), 麻木(平南、玉林), 羊漆烧(隆林), 羊七烧; 云南: “埋呼”(西双版纳傣语), 蚂蚁树, 短命树。

功效 根叶: 散瘀, 消肿, 止血。用于跌打瘀肿, 外伤出血; 全株: 用于癰瘤。

#### 7165013

*Ulmus androssowii* Litw. var. *virgata* (Pl.) Grudz. --- *U. pumila* L. var. *pilosa* Rehd.

植物名 毛枝榆《高植图鉴补编》

药材名 红榔木《汇编》

文献名 红榔树《中药大辞典》

地方名 云南: 毛白榆, 棉榔树、滇榆(文山), 榔榆, 大树皮, 榆树。

功效 树皮: 接骨, 消肿, 止血。用于外伤出血, 骨折, 跌打肿痛。

#### 7165014

*Ulmus bergmanniana* Schneid. var. *lasiophylla* Schneid. --- *U. lasiophylla* (Schneid.) Cheng

植物名 西蜀榆《高植图鉴》

药材名 水墨树《广西药录》

文献名 蜀榆《树分》

功效 叶: 用于烂疮, 火伤。

#### 7165015

*Ulmus changii* Cheng var. *kunmingensis* (Cheng) Cheng et L. K. Fu --- *U. kunmingensis* Cheng

植物名 昆明榆《高植图鉴补编》

地方名 四川: 玄榔木, 玄榔皮(会东、会理)。

功效 根皮、叶: 止血消肿, 接骨。用于骨折, 外伤出血; 鲜叶: 外用于疮痍肿毒。

#### 7165016

*Ulmus davidiana* Planch.

植物名 黑榆《高植图鉴补编》

药材名 黑榆《中药志》

文献名 山毛榆《山东树木志》

功效 嫩枝: 行血通经, 活络止痛。

备考 在北京地区作鬼箭羽药用。

#### 7165017

*Ulmus davidiana* var. *japonica* (Rehd.) Nakai -- *U. propinqua* Koidz.

植物名 春榆《高植图鉴》

药材名 榆白皮《山东经植》

地方名 山榆(辽宁、山东); 吉林: 蜡条榆; 辽宁: 红榆。

功效 根皮: 滑肠利尿, 渗湿热, 行津液, 消痈肿。用于小便涩少, 水湿肿满, 咳嗽不眠, 瘰癧疮毒等; 叶: 利尿, 消肿, 排石, 镇静。用于泌尿道结石, 小便涩痛, 浮肿等症; 子实: 镇静, 止带。用于失眠, 带下等症。

#### 7165018

*Ulmus glaucescens* Franch. var. *lasiocarpa* Rehd.

植物名 毛果旱榆《高植图鉴》

文献名 “摇布合”(藏名)《青藏药图》

功效 树内皮: 退烧, 消炎。用于创伤。

#### 7165019

*Ulmus laciniata* (Trautv.) Mayr

植物名 裂叶榆《高植图鉴》

药材名 青榆《长白山植药志》

文献名 姑榆、山榆、山榆仁、芡萸仁《满鲜植汇》

地方名 大叶榆(东北)。

功效 果实: 消积杀虫。

#### 7165020

*Ulmus lanceaefolia* Roxb. ex Wall. --- *U. tonkinensis* Gagnep. --- *U. hookeriana* Planch.

植物名 越南榆《云南种录》

药材名 滇榆《汇编》

文献名 常绿榆、披针叶榆《汇编》

地方名 云南: 红榔木树, 榔木树, 涩皮树, 青丝榔, 癩皮树, 榔榆, 榆树, 大树皮

功效 树内皮:收敛止血。用于胃肠出血,尿血,各种外伤出血。

## 7165021

*Ulmus macrocarpa* Hance

植物名 大果榆《高植图鉴》

药材名 茺萸《本经》、《汇编》

文献名 茺萸《本经》,茺萸酱《别录》,无夷、无姑、姑榆《尔雅》郭璞注),山粉榆《说文》,山榆《广雅》,茺萸仁《千金方》,山榆子《千金·食治》,山榆仁《本草拾遗》,白茺萸《圣惠方》,姑榆仁、茺姑仁、茺墙仁《新纲》,黄榆《树分》,沙抱榆《种称补编》,蒙古黄榆、翅枝黄榆《东北木本图志》,大果榆榧《药材学》,进榆《中药大辞典》

地方名 [鬼箭羽](东北、华北);内蒙古:“德勒都”(蒙名),山板榆;河南:毛榆,柳榆,扁榆;河北:臭茺萸,山扁榆;湖北:榔树(神农架)。

功效 种子加工后的成品(茺萸):消积杀虫。用于小儿疳积,蛔虫病,蛲虫病。

## 7165022

*Ulmus macrocarpa* Hance var. *mongolica* Liou et Li

植物名 蒙古黄榆《东北木本图志》

药材名 蒙古黄榆《东北药用植物》

地方名 [鬼箭羽](华北)。

功效 果实:祛痰,利尿,杀虫。用于痰多咳嗽,浮肿,小便不利,蛔虫症;茺萸(果实的加工品):杀虫,消积。用于蛔虫病,蛲虫病,虫积腹痛,小儿疳积,冷痢,疥癣,恶疮。

## 7165023

*Ulmus macrocarpa* Hance f. *nana* (Liou et Li) Kitag.---

*U. macrocarpa* Hance var. *nana* Liou et Li

植物名 矮形黄榆《东北木本图志》

药材名 矮形黄榆《东北药用植物》

功效 果实:祛痰,利尿,杀虫。用于痰多咳嗽,浮肿,小便不利,蛔虫症;茺萸(果实的加工品):杀虫,消积。用于蛔虫病,蛲虫病,虫积腹痛,小儿疳积,冷痢,疥癣,恶疮。

## 7165024

*Ulmus parvifolia* Jacq.

植物名 榔榆《高植图鉴》

药材名 榔榆《本草拾遗》、《汇编》

文献名 栲木《左传》,松心木《说文》,榆钱树《植物名汇》,小叶榆《中国植物图鉴》,榆、秋榆《小泉《药植》》,鸡楸《汇编》,细叶榔《中草药学》

地方名 榆树(浙江、福建、云南),榔树(安徽、湖南),脱皮榆(山东、湖南),枸丝榆、桥皮榆(江苏、湖南);山东:山樱桃(昆崙山),豺皮榆;江苏:杨丝榆;浙江:榔皮树(临安),地头树(普陀),田柳树(乐清);福建:鸡筹仔(漳州、龙海、南靖),石柳,〔铁树〕,铁枝子树;安徽:老树皮,油树;江西:麻果树、风气灵、变质树(德兴);台湾:红鸡油;湖南:蚊子树,冷树(衡阳),蚊榔树;河南:掉皮榆;四川:由榔树。

功效 果(榆钱):安神健脾;树皮、叶:安神,利小便;内皮:用于骨折,外伤出血。

## 7165025

*Ulmus propinqua* Koidz. var. *suberosa* Miyabe

植物名 栓皮春榆《东北木本图志》

药材名 翼枝榆《长白山植药志》

地方名 吉林:拉趟榆(长白山),〔鬼箭羽〕,

功效 根皮及树皮:用于骨结核。

## 7165026

*Ulmus pumila* L.

植物名 榆树《高植图鉴》

药材名 榆白皮《药性论》、《中药大辞典》

文献名 粉、榆《诗经》,白粉《尔雅》,粉榆《尔雅》郭璞注),榆皮、榆实、零榆《本经》,榆叶《本草经集注》,榆子、榆仁《食疗本草》,榆荚仁《证类本草》,榆钱树《救荒本草》

地方名 内蒙古:“海力斯”(蒙名);河北:榆钱,榆荚,白皮榆,家榆;北京:臭茺萸;江苏:钻地榆,钱榆(徐州),钻天榆(扬州),白榆(镇江);湖北:春榆(武昌);云南:树粘榔,粘榔树(曲靖)。

功效 果:安神健脾。用于神经衰弱,失眠,食欲不振,白带;树皮、叶:安神,利小便。用于神经衰弱,失眠,体虚浮肿;内皮:骨折,外伤出血。

## 7165027

*Zelkova schneideriana* Hand. -Mazz.

植物名 榉树《纲目》、《高植图鉴》

药材名 榉树皮《别录》、《中药大辞典》,榉树叶《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 甜茶《纲目》,榉柳、鬼义、大叶榉树《树分》

地方名 山东:大叶榉;江苏:榉榆,血榉;浙江:鸡油树,黄榉榆;湖北:硬壳榔(咸丰)。

功效 树皮、叶:清热安胎,用于感冒,头痛,肠胃实热,痢疾,妊娠腹痛,全身水肿,小儿血痢,急性结肠炎;叶:用于疔疮。

## 7165028

*Zelkova serrata* (Thunb.) Makino

植物名 光叶榉《拉汉英种称》

文献名 鸡油《植物名汇》,榉、光光榆《秦岭植志》

地方名 安徽:红珠树,大叶树。

功效 叶:用于疔疮。

## 7167 桑科 Moraceae

## 7167001

*Antiaris toxicaria* (Pers.) Lesch.

植物名 见血封喉《高植图鉴》

药材名 见血封喉《中草药学》

文献名 弩箭子、毒箭木《中草药学》,箭毒木《西双版纳傣药志》

地方名 海南:加布(陵水),剪刀树(文昌、保亭);云南:大药树,“埋广”(西双版纳傣名)。

功效 树乳汁:有大毒。强心,催吐。外用于淋巴结核;种子:解热,用于痢疾。

## 7167002

*Artocarpus chaplasha* Roxb.

植物名 野树菠萝《云南种录》

药材名 恰普拉希面包果《汇编》  
文献名 擅撑木菠萝蜜《植分学报》  
功效 根：祛风利湿。

## 7167003

*Artocarpus communis* Forst. --- *A. incisa* L. f. --- *A. camansi* Blanco --- *A. rima* Blanco

植物名 面包树《台湾药植志》

地方名 台湾：面磅树。

功效 叶：外用于疱疹，脾肿；花：用于牙痛。

## 7167004

*Artocarpus heterophyllus* Lam. --- *A. integra* Merr. --- *A. integrifolius* auct. non L. f.

植物名 木菠萝《高植图鉴》

药材名 木菠萝《汇编》

文献名 婆那婆、阿萨辣《酉阳杂俎》，波罗蜜《滇南本草》，波罗蜜核中仁、囊伽结《纲目》，优珠县、天婆罗《树分》，大树菠萝《红河中草药》，将军木《汇编》，菠萝蜜《中药大辞典》

地方名 树菠萝（广东、广西、云南）；台湾：天罗，婆罗，面包果；广东：树婆罗（广州）；海南：包蜜；云南：蜜冬瓜，蜜菠萝，密多罗，思难果，思漏果，长傍果，牛肚子果（红河）。

功效 树液（树脂）：散结，消肿，止痛。用于疮疖红肿，急性淋巴结炎，湿疹；果仁：滋养益气，生津止渴，通乳。用于产后乳少或乳汁不通，脾胃虚弱。

## 7167005

*Artocarpus hypargyrea* Hance

植物名 白桂木《高植图鉴》

药材名 白桂木《汇编》

文献名 狗卵果《岭南采药录》，红半枫荷《中药大辞典》

地方名 将军树（广东、广西）；广东：将军木，细女着红袍，仙女穿红袍，狗春果；海南：脂胭木（琼海、儋县），红桂木（儋县）；广西：夏暑果。

功效 根：祛风利湿，止痛。用于风湿关节痛，腰膝酸软，胃痛，黄疸；果实：生津止渴，止血，开胃化痰。用于热病烦渴，咳血，吐血，衄血，喉痛，食欲不振。

## 7167006

*Artocarpus lingnanensis* Merr. --- *Artocarpus nitidus* Trec. ssp. *lingnanensis* (Merr.) Jarr.

植物名 桂木《高植图鉴》

药材名 桂木《汇编》

文献名 狗果《岭南采药录》，红桂木《中药大辞典》

地方名 广东：胭脂公（广州），桂木干，狗果干；海南：白桂木，狗果树，大叶胭脂。

功效 果：清肺止咳，活血止血。用于肺结核咳血，支气管炎，鼻衄，吐血，咽喉肿痛；根：健胃行气，活血祛风。用于胃炎，食欲不振，风湿痹痛，跌打损伤。

## 7167007

*Artocarpus rigida* Blume --- *A. muricata* Hunter --- *A. echinata* Roxb.

植物名 猴面果《台湾药植志》

功效 乳汁：外用于创伤。

## 7167008

*Artocarpus styracifolius* Pierre --- *A. bicolor* Merr. et Chun

植物名 二色波罗蜜《海南植志》

药材名 红枫荷《汇编》

文献名 红山梅《中草药通讯》，二色桂木《云南种录》

地方名 广西：红半枫荷，红根木，脱皮半枫荷，白乳半枫荷，半枫荷（昭平），胭脂木。

功效 根：祛风除湿，舒筋活血。用于风湿性关节炎，腰肌劳损，慢性腰腿痛，半身不遂，跌打损伤，扭挫伤。

## 7167009

*Broussonetia kazinoki* Sieb. et Zucc. --- *B. kaempferi* Sieb. et Zucc.

植物名 小构树《高植图鉴》

药材名 谷皮树《汇编》

文献名 楮桃、楮树、谷桑、谷实《新纲》，谷树子、楮实、楮《和汉药理学》，构皮麻《贵州民间药方集》，藤构《中国经植志》

地方名 谷皮藤（浙江、广东），藤葡萄（浙江、江西），葡萄（台湾、湖南、湖北、广西）；陕西：野构树（平利），野构桃（南郑）；浙江：楮皮、纸皮（临安、淳安），细叶构皮柴（江山），皮藤、黄皮藤（温州）；江西：谷皮叶，藤纸皮；福建：剥皮藤、杉皮藤（上杭），乳藤草（顺昌）；河南：女谷；湖北：小构（神农架），女儿构（巴东）；湖南：山树藤，小谷树，沙纸树，鸦鹊树，小麻蒜，冷木树，冷沙木，皮叶树，鸭屎树；广东：丹药、过里丹（惠阳），冷丹藤、丁字黄心羌、黄疸藤、生天麻、飞天龙（粤北）；广西：九得藤、狗额藤（平南），谷沙藤（马山、武鸣），斑沙藤（苍梧），小叶构，皮树花，野桑叶，麻沙藤；云南：棉花藤，楮实子；贵州：构皮树，酱叶树。

功效 根、根皮：散瘀止痛。用于跌打损伤，腰痛；叶、树皮汁：解毒，杀虫。外用于神经性皮炎，顽癣。

## 7167010

*Broussonetia papyrifera* (L.) L. Her. ex Vent. --- *Morus papyrifera* L. --- *Papyrius papyrifera* Ktze.

植物名 构树《高植图鉴》

药材名 楮实子《素问病机保命集》、《药典》

文献名 谷《诗经》，谷木皮、楮《吴普本草》，楮实、谷实、楮叶、楮树皮、楮茎、楮皮间白汁《别录》，谷桑、楮桑（陆玑《诗疏》），谷子、谷白皮《千金方》，构《酉阳杂俎》，谷树汁、五金胶漆《日华子本草》，斑谷《图经》，楮白皮《圣济总录》，谷枝汁《近效方》，楮桃《濒湖集简方》，楮桃树《救荒本草》，构叶《于母秘录》，构胶、楮树汁《纲目》，构皮《草木便方》，谷树子根《本经逢原》，酱黄叶《生草药性备要》，酱黄木《岭南采药录》，谷木蕈《生草药手册》，谷树叶《简便单方》，柯树、壳树《中药大辞典》

地方名 楮实子树（广东、广西），野杨梅（江西、江苏），楮树（山东、河北、陕西、云南、湖南），大构（湖北、贵州），构桑（河北、陕西），纱纸树（广东、广西），谷树

(河北、山西、浙江、江西、福建、湖南), 皮树(安徽、河南); 河北: 构实; 陕西: 构桃子(太白); 山东: [毛桃](章丘), 当当树, 楮桃子, 油匠当当, 沙纸树; 江苏: 角树子(苏州), 构树子、栝树子[南通]; 上海: 谷木子, 谷树子, 谷树卵子; 浙江: 大叶谷皮(丽水), 楮皮柴, 大谷皮绳, 楮皮, 谷皮; 安徽: 纸皮树, 浆巴巴树, 白背叶, 皮桑, 癣树, 老鸦皮, 野毛桑, 纸皮, 山桃子, 土桃子, 野皮桑; 江西: 合浆树; 福建: 棉藤(霞浦、将乐), 纹板草(福州、闽侯、莆田), 柚藤(龙岩), 五缺连(永安), 钩勾草(漳州), 蕃加拔(泉州、南安), 山花麻(福清), 云板草, [六角英]; 台湾: 鹿仔树; 河南: 构桃树, 谷桃; 湖南: 奶浆树, 谷浆树, 大谷树(衡山); 广东: 谷木、猪鼻弯、土升麻(惠阳), 谷皮树; 海南: 鸟子麻, 紫草麻; 广西: 桑白根、谷木叶(平南), 猪母桑(昭平), 谷纱树, 谷米, 谷沙果树, 沙纸木, 地沙皮, 斩穿刀(北海), 木沙树(都安), 沙树木(罗城); 四川: 构泡; 贵州: 土构, 构皮树; 云南: 构子树, 围腰瓜叶, 毛叶边西, 厚皮浆树, 虾子树, “哥沙”(西双版纳傣语)。

**功效** 果实: 健脾益肾。用于水肿胀满, 腰膝无力, 目翳; 叶: 清热, 凉血, 利湿, 杀虫。用于鼻衄, 肠炎, 痢疾; 树皮: 利尿消肿, 祛风湿。用于水肿, 筋骨酸痛; 乳汁(树皮割伤流出); 外用于神经性皮炎及癣症。

**备考** 商品桑白皮, 有以本品之根皮冒充者。

#### 7167011

*Cannabis sativa* L. --- *C. indica* Lamk.

**植物名** 大麻《本草经集注》、《高植图鉴》

**药材名** 火麻仁《日用本草》、《药典》

**文献名** 麻《诗经》, 麻蕒、麻勃、麻子《本经》, 麻华、麻子中人、麻蓝、青羊、青葛《吴普本草》, 麻子仁《伤寒论》, 大麻子、麻根《本草经集注》, 白麻子《千金·食治》, 麻叶、大麻仁、麻青根《药性论》, 冬麻子《食医心镜》, 乌麻花《千金方》, 汉麻《尔雅翼》, 火麻《日用本草》, 火麻头《疮科心要》, 山丝苗《救荒本草》, 麻皮、[黄麻]、泉麻、牡麻、苴麻、苧麻《纲目》, 火麻子《本草新编》

**地方名** 线麻(东北、陕西、甘肃、云南), 野大麻(内蒙古、山东), 麻仁(北京、江苏、广西), 野麻(山东、江苏), 黄麻仁(江苏、湖北); 河北: 花麻子(保定); 内蒙古: “日拉哈”(蒙名); 陕西: 子麻(关中); 青海: 麻子儿, 麻粉儿, “索玛拉扎”(藏名); 山东: 山麻(济南、威海、泰山), 白麻种子、麻种、线麻种子(烟台), 好麻; 江苏: [胡麻], 线麻子, 火麻草, 亮麻子, 麻线, 麻茎子, [黄麻子]; 安徽: 大火麻; 湖北: 糖麻(巴东); 广西: 大麻草, 青麻子(陆川); 四川: “说马纳波”(若尔盖藏名); 云南: 状元红(楚雄)。

**功效** 果实: 润燥滑肠通便。用于血虚, 津亏肠燥便秘; 麻叶: 用于疟疾, 气喘, 蛔虫; 茎皮部的纤维(麻皮): 祛瘀利水。用于跌扑损伤, 热淋胀痛; 麻花: 有毒。祛风活血。用于风病肢体麻木, 遍身苦痒, 妇女经闭; 麻根: 祛瘀止血。用于淋病, 血崩, 带下, 难产, 胞衣不下, 跌打损伤; 幼嫩果穗(麻蕒): 有毒。祛风止痛, 镇痉。用于痛风, 痹证, 癫狂, 失眠, 咳嗽; 种仁: 润燥, 滑肠, 通淋, 活血。用于肠燥便秘, 消渴, 热淋, 风痹, 痢

疾, 月经不调, 疥疮。

#### 7167012

*Cannabis sativa* L. f. *ruderalis* (Janisch.) Chu

**植物名** 野大麻《东北草本植志》

**药材名** 火麻仁(东北)

**地方名** 麻叶、麻皮、麻花、麻蕒、麻根、麻子仁(东北)。

**功效** 果实: 润燥滑肠通便; 麻叶: 用于疟疾, 气喘, 蛔虫; 茎皮部的纤维(麻皮): 祛瘀利水; 麻花: 有毒。祛风活血; 麻根: 祛瘀止血; 幼嫩果穗(麻蕒): 有毒。祛风止痛, 镇痉; 种仁: 润燥, 滑肠, 通淋, 活血。

#### 7167013

*Cecropis peltata* L.

**植物名** 号角树(广西《园林药录》)

**地方名** 广西: 山木瓜。

**功效** 叶: 散结, 消肿。用于肠炎, 肝炎。外用于跌打损伤, 阴疽。

#### 7167014

*Cudrania cochinchinensis* (Lour.) Kudo et Masamune ---

*Maclura cochinchinensis* (Lour.) Corner --- *Vanieria cochinchinensis* Lour.

**植物名** 构棘《高植图鉴》

**药材名** 穿破石《岭南采药录》、《汇编》

**文献名** 奴柘、奴柘刺《本草拾遗》, 限支《益部方物略记》, 蔑芝《云谷杂记》, 川破石《生草药性备要》, 地棉根、拉牛入石《岭南采药录》, 小栝树《中药大辞典》, 黄龙退壳《汇编》

**地方名** 黄桑勒、饭团筋(广东、广西), 猴欢喜、九重皮(浙江、福建), 山荔枝(浙江、福建、广东), 千层皮(浙江、福建、云南), 山荔子(浙江、安徽、湖南), 假荔枝(福建、广东), 黄蛇(广东、广西、云南), 大疔瘡(福建、台湾、广东); 浙江: 野黄芪(兰溪、衢县、龙泉), 石米刺(云和), 刺楮、九层皮(温州、乐清), 冬杨梅(乐清), 黄母鸡; 江西: 山黄箕(南丰), 铁篱根(定南), 黄龙脱皮; 福建: 土巴吉、土巴戟(宁德), 鸟不踏、老鼠刺(霞浦), 千重皮(三明、永安), 黄金刺; 台湾: 黄金桂, 刺格; 湖北: 饭团树(通山), 榨古钉、榨木(神农架); 湖南: 野梅子, 柘藤, 野黄鳝藤; 广东: 金蝉退壳、山枸杞、大力黄(化县), 猪肚筋(新兴), 黄蛇根、黄牛角、黄田鸡(普宁、陆丰、惠来), 黄筋根(翁源), 黄蚩筋, 黄鸡母, 老桑筋, 大黄龙, [大力王](从化), 筋蚩树(五华), 鹅掌刺(潮安), 三斗粉(揭阳), 三斗米温(潮安、惠阳), 牵牛入石、黄霜桐(惠阳); 广西: 房着刺(阳朔), 勒路子(桂平), 金钢藤(临桂), 黄桑木; 贵州: 山荔枝果; 云南: 构棘芝、阿公公孙、牛丁子树(红河), 牛头刺(思茅), [石打穿]。

**功效** 根: 止咳, 退黄, 活血, 通络。用于肺结核, 湿热黄疸, 肋肋疼痛, 跌扑瘀痛, 风湿痹痛; 棘刺: 用于老血瘦, 男子痿痹, 闪痞; 果实: 调气, 利水, 消食。用于膀胱疝气, 食积腹胀, 小便不利。

#### 7167015

*Cudrania cochinchinensis* (Lour.) var. *gerontogea* (Nakai) Kudo et Masamune

植物名 凹头蓼芝《台湾药植志》

地方名 台湾:大丁癩,黄金桂。

功效 根茎:解热,去毒。用于跌打损伤。

#### 7167016

*Cudrania fruticosa* (Roxb.) Wight ex Kurz.

植物名 柘藤《广西植录》

文献名 老虎刺根《云南中草药》

功效 根:舒筋活血,祛风除湿。用于跌打损伤,内外伤出血,慢性胃炎。

#### 7167017

*Cudrania pubescens* Trecul.

植物名 毛柘藤《广西药录》

地方名 广西:穿破石(南宁、邕宁、龙州)。

功效 根:用于肝炎。

#### 7167018

*Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. --- *Maclura tricuspidata* Carr. --- *Vaneria tricuspidata* (Carr.) Hu

植物名 柘树《高植图鉴》

药材名 柘树《救荒本草》、《中药大辞典》

文献名 柘《诗经》,棫、白桺《尔雅》,柘桑《淮南子》高诱注),柘木、柘木白皮《本草拾遗》,文章树《清异录》,灰桑树《湘阴县志》,佳子《纲目》,白柘、白桺《尔雅义疏》,〔穿破石〕、黄蛇退壳、大黄筋《岭南采药录》,葛针《指示植物》,鸡脚刺《中国经植志》,刺钉、黄疽树、炸刺《中药大辞典》

地方名 刺桑(四川、贵州、云南),柘刺(江苏、浙江、安徽),野梅子(江西、湖南);山东:柘柴;江苏:棘针树,柘骨针,制针树(睢宁),角针(连云港);浙江:〔桑白皮〕(兰溪);安徽:柞刺,柘各树,刺针树;福建:山荔枝、水荔枝(福州、福鼎、福安),山枳壳(周宁),金蛇退壳(福州),黄巴吉(宁德),野荔枝,金蛇脱衣,火烧麒麟,大疔黄,肺痈草,钓钩草,黄根瘡,九重皮,黄根蕲,大刺勒;河南:铁刻针,铁结子,铁黑子,铁黑刺;湖北:榨古丁(巴东);湖南:鸭脚皮、翻剥皮(衡阳),鞋底青(凤凰);广东:黄筋根,黄筋藟,黄蛇根,猫爪筋,细仔穿黄衣,藤凿树,牵牛入石(兴宁);广西:尖尾风(苍梧),川破石(邕宁),老虎肝,黄桑,黄了刺,钢钻,土磺胶(百色);四川:青桑(南川),柞树,田柘(成都),刺桑根,奴柘;贵州:奶桑;云南:炸腮树,黄龙蛻壳。

功效 茎叶:消炎止痛,祛风活血。用于流行性腮腺炎,肺结核,慢性腰腿痛,跌打损伤,疖肿,急性关节扭伤;根皮或树皮:补肾固精,凉血舒筋。用于腰痛,遗精,咯血,呕血,跌打损伤;果实:清热凉血,舒筋活络。用于跌打损伤;木材:用于妇人崩中血结,疟疾。

#### 7167019

*Fatoua villosa* (Thunb.) Nakai --- *F. japonica* Blume --- *F. pilosa* Gaud.

植物名 水蛇麻《高植图鉴》

药材名 水蛇麻《贵州药录》

地方名 贵州:桑草。

功效 根皮:清热解毒,凉血止血。用于喉炎,流行性腮腺炎,无名肿毒,刀伤出血。

#### 7167020

*Ficus abelii* Miq.

植物名 石榕树《高植图鉴补编》

药材名 水榕(广西)

文献名 水榕树《高植图鉴》,水潦榕《广西药录》

地方名 广东:高山榕(广州);海南:大叶榕,牛奶仔;广西:水泡木,水牛奶(平南),水羊奶(苍梧),牛奶果(桂平),鸡皮眼(兴安),排拉木(大瑶山),鸡榕,牛奶木(昭平)。

功效 叶:清热解毒,止血。用于崩漏,糖尿病,痢疾;根茎:用于风湿痹痛,乳痈,哮喘。

#### 7167021

*Ficus altissima* Blume

植物名 高山榕《高植图鉴》

地方名 海南:马榕,大叶常,大叶榕;广西:榕(邕宁),鸡榕(上思);云南:大青树。

功效 叶:用于跌打损伤;气生根:清热,解毒,活血,止痛。

备考 本品为生产紫草茸的寄主植物之一。

#### 7167022

*Ficus auriculata* Lour. --- *F. roxburghii* Wall.

植物名 大果榕《高植图鉴》

药材名 大果榕《贵州药录》

文献名 无花果、馒头果《高植图鉴》

地方名 贵州:地瓜。

功效 果:祛风宣肺,补肾益精。用于肺热咳嗽,遗精;吐血。

#### 7167023

*Ficus awkeotsang* Makino

植物名 爱玉子《台湾药植志》

地方名 台湾:玉枳,枳仔,草实仔,草枳子,枳蒲,透仔实。

功效 叶:强壮药。

#### 7167024

*Ficus bengalensis* L. --- *F. indicus* Roxb.

植物名 孟加拉榕《台湾药植志》

功效 树皮:强壮药。用于糖尿病;种子:清凉药,强壮药;叶:用于脓肿,发汗;根:用于淋漓;小枝:用于咳血;气生根嫩梢:用于顽性呕吐;乳汁:外用于疼痛,挫伤,风湿性关节炎,肌炎。

#### 7167025

*Ficus benamina* L.

植物名 垂叶榕《高植图鉴》

文献名 小叶榕《台湾药植志》

地方名 广东:细叶榕,柳叶榕(广州);海南:米碎常(琼中),马尾榕;广西:吊丝榕。

功效 枝、叶:通经活血。用于月经不调,跌打损伤;乳汁:用于衰弱。

备考 本种为生产紫草茸的寄主植物之一。

#### 7167026

*Ficus carica* L.

植物名 无花果《高植图鉴》

药材名 无花果《食物本草》、《汇编》

文献名 阿归、阿驿、底珍《酉阳杂俎》，天生子《滇南本草》，映口果《便民图纂》，优昙钵《广州志》，蜜果《群芳谱》，文仙果《草木便方》，唐柿、映日红、王孙皮枝、仙桃、青桃《新纲》

地方名 奶浆果(安徽、福建、湖南、四川)；浙江：挣桃(温州)；安徽：对嘴果；福建：文光果(福州)；湖南：暗花生(常德)；四川：树地瓜、天瓜、家地瓜(蓬溪)，品仙果(成都)；云南：明目果、(天仙子)(昆明)，古度。

功效 果实：润肺止咳，清热润肠。用于咳嗽，咽喉肿痛，便秘，痔疮；根、叶：散瘀消肿，止泻。用于肠炎，腹泻。外用于痈肿。

#### 7167027

*Ficus chartacea* Wall. ex King var. *torulosa* King

植物名 纸叶榕《高植图鉴补编》

药材名 纸叶榕《广西药录》

地方名 广西：红牛奶(金秀)，山桑皮(上林)。

功效 全株：用于跌打损伤，月经不调，产后缺乳；根：消肿；花托：补血。

#### 7167028

*Ficus concinna* Miq. --- *Ficus parvifolia* (Miq.) Miq.

植物名 小叶榕《高植图鉴补编》

药材名 小叶榕《广西本草选编》

文献名 万年青树《云南种录》

功效 气生根：祛风活络，除湿消肿。用于风湿性关节炎，跌打损伤，白带；叶：化痰止咳，消肿止痛。用于慢性气管炎，痢疾，肠炎。外用于跌打骨折；乳汁：外用于唇疔。

#### 7167029

*Ficus elastica* Roxb.

植物名 印度胶树《高植图鉴》

药材名 橡胶榕《广西《园林药录》》

文献名 缅甸《名实图考》，印度橡树《种称》，印度橡皮树、橡皮树、印度树胶、胶树、护膜树《树分》。

功效 树胶：凝固止血。用于外伤出血。

#### 7167030

*Ficus elastica* Roxb. var. *variegata* Hort.

植物名 花叶橡胶榕《广西药园药录》

文献名 斑叶印度橡胶树《广西药园药录》

功效 树胶：止血。用于外伤出血。

#### 7167031

*Ficus erecta* Thunb. var. *beeheyana* (Hook. et Arn.)

King --- *F. beeheyana* Hook. et Arn.

植物名 天仙果《高植图鉴》

药材名 天仙果《纲目》、《浙南本草新编》

文献名 牛乳甫《质问本草》，天果《植物名汇》，披针叶天仙果《广西药录》，水风藤、牛乳茶、“加星里”(苗语)《汇编》

地方名 布叟、牛奶子(江西、福建)；浙江：野枇杷(镇海、普陀)，山牛奶、牛奶珠、毛天仙果、大叶牛奶子(温州、泰顺、丽水)，毛天仙果根、牛奶浆(天台、仙居)，大号牛奶珠(温州)，大叶牛奶树(泰顺、乐清、洞头)，牛

奶忤；福建：大号铁牛入石(厦门、同安、永春)，大号牛奶仔(福州、南平、宁德)，山无花果(泉州)，牛奶柴(闽东)；广西：鹿饭、水牛奶(上林)，(满山香)(桂平)。

功效 根(天仙果)：祛风化湿，止痛。用于风湿关节疼痛，头风疼痛，跌打损伤，月经不调，腹痛，腰疼带下，小儿发育缓慢；茎、叶(牛奶柴)：补中益气，健脾化湿，强筋壮骨，消肿，活血解毒。用于风湿关节痛，中气虚弱，气血衰微，四肢酸软，筋骨不利，跌打损伤，经闭，乳汁不通；果实(牛奶浆)：缓下，润肠。用于痔疮。

#### 7167032

*Ficus fistulosa* Reinw. ex Blume --- *F. harlandi* Benth.

植物名 空管榕《云南种录》

药材名 水桐木《汇编》

文献名 水桐木、哈氏榕《海南植志》，尖尾榕《中国经植志》，水筒木《广西植录》

地方名 广东：细叶牛奶树；广西：“米呢”(壮名)。

功效 根皮、叶：补气，润肺，活血，渗湿利尿。用于五癆七伤，跌打损伤，小便不利，湿热腹泻。

#### 7167033

*Ficus formosana* Maxim. --- *F. taiwaniana* Hayata

植物名 台湾榕《高植图鉴补编》

药材名 台湾榕《浙南本草新编》

文献名 奶汁树《江西草药》，狭叶台湾榕《高植图鉴》

地方名 江西：大叶牛奶树，牛奶树；广东：细叶牛奶树、石榕、挹地牛奶树(惠阳)；海南：长叶牛奶树，羊奶子；广西：大同木，天星木(桂平)，水椋榔、仙入桃(博白、贺县)，水牛奶(金秀)，羊屎木(融水)，狗奶木(三江)；贵州：牛奶果；其他：牛奶子树，下乳草，翻奶。

功效 全株：柔肝和脾，清热利湿。用于急、慢性肝炎，腰脊扭伤，急性肾炎，泌尿系感染；果：催乳，止咳。

#### 7167034

*Ficus formosana* Maxim. var. *angustifolia* (Cheng) Migo

植物名 窄叶台湾榕《海南植志》

药材名 奶汁树《江西草药》

地方名 江西：牛奶子树(新建)，下乳草；湖南：一种三苗、奶浆树、下乳树(衡山)；广西：山沉香(昭平)，细牛奶(桂平)。

功效 根、叶：祛风利湿，清热解毒。用于腰痛，黄疸，疟疾，百日咳，背痈，乳痈，乳汁不足，齿龈炎，毒蛇咬伤。

备考 《高植图鉴补编》“狭叶台湾榕”学名为

*Ficus formosana* Maxim. f. *shimadai* Hayata

#### 7167035

*Ficus fulva* Reinw. --- *F. esquirolia* Levl.

植物名 黄毛榕《高植图鉴》

药材名 黄毛榕《广西本草选编》

地方名 海南：大救婆树(临高)，毛櫟(澄迈)；广西：土桑白皮(桂平)，[土黄蔑](博白、陆川)，老虎掌(苍梧)，老鸦风、[大黄芪](北流)，麻婆风、大摇风(平南)，[五加皮](博白、桂平)，红后大痲痧，亚婆风，痧纽



木;贵州:无花果。

**功效** 根皮:健脾益气,活血祛风。用于气血虚弱,子宫下垂,脱肛,水肿,风湿痹痛,便溏泄泻;果:通乳。

#### 7167036

*Ficus gasparriniana* Miq. var. *viridescens* (Levl. et Vant.) Corner --- *F. comata* Hand.-Mazz.

**植物名** 小果榕《高植图鉴补编》

**文献名** 丛毛榕、细叶牛奶树、石榕《汇编》,毛枝榕《湖北植志》,冠毛榕、绿叶冠毛榕《广西药录》,冠毛榕、冠叶榕《云南药录》

**地方名** 奶汁草(福建、云南);福建:铁牛入石,竹叶牛奶子,小叶钻石风;广西:奶浆果(全州);贵州:母猪精(榕江)。

**功效** 根:祛风行气,健脾利湿。用于关节风湿疼痛,劳倦乏力,消化不良,胸闷,白带,痈疽,溃瘍不易收口。

#### 7167037

*Ficus henryi* Warb.

**植物名** 尖叶榕《高植图鉴》

**药材名** 奶浆果《神农架药录》

**地方名** 湖北:奶浆树(神农架)。

**功效** 果实:催乳。

#### 7167038

*Ficus heteromorpha* Hemsl.

**植物名** 异叶榕《高植图鉴》

**药材名** 奶浆果《汇编》

**文献名** 异叶天仙果《湖南药物志》

**地方名** 大山枇杷、奶浆树(湖北、四川),野枇杷(陕西、四川、贵州),山枇杷(湖北、湖南),山结香(河南、广东);陕西:斑鸠树(镇巴),肺癆草、[金樱子](柞水);浙江:牛奶浆;福建:红结香;湖北:四面楸,野桐子(鹤峰);湖南:奶浆木,牛舌子树,天枇杷,小木通,一母三样,一种三苗;广东:牛奶头;广西:山榕,羊奶子(三江);四川:牛奶子、树地瓜(峨眉山),大斑鸠食子,树地果(万县);贵州:无花果。

**功效** 果:下乳补血。用于脾虚胃弱,缺乳等。

#### 7167039

*Ficus hirta* Vahl --- *F. simplicissima* Lour. var. *hirta* (Vahl) Migo

**植物名** 粗叶榕《高植图鉴补编》

**文献名** 九龙根《本草求原》,鸡枫、丫枫小树《名实图考》,五爪龙、五龙根《生草药性备要》,火龙叶《岭南采药录》,掌叶榕《汇编》,牛奶子、三爪龙《中药大辞典》

**地方名** 五指毛桃(湖南、广东、广西、云南),五指牛奶(湖南、广东、广西),佛掌榕(福建、海南),牛奶树(福建、广西);福建:山狗肾(漳州、漳平、安溪),山枇杷树(上杭),鸡脚掌牛奶子(宁德),山枇杷,山狗蛋,虎掌丸,虎阴囊,奶汁子,乳汁柴,大叶牛奶子柴,奶汁柴,椿云仔,黄衣加,牛乳树,毛桃树(武平、福州),熊掌草,三叉刀;湖南:五老虎;广东:五爪金龙(高鹤、南海),五叉牛稔(高州),五爪牛乳(廉江、徐闻、海康),五指牛奶桐

(广州),五叉牛乳(湛江),五指香(化州),牛奶树叶,牛奶稔,牛魁头,南芪(英德),五指槟榔(清远),野枇杷(乐昌),猫公果(连县);广西:牛奶木(平南),大药通(钟山、富川),大牛奶(苍梧),猪母奶,二指牛奶,土五加皮,〔土黄芪〕;云南:饿饭果(思茅、红河),小哨叶子果、阿卡拉马(红河),“喝麻亚毫”(西双版纳傣语)。

**功效** 根和花序托:清热解毒,祛风利湿,活血祛瘀。用于风湿骨痛,闭经,产后瘀血腹痛,白带,睾丸炎,跌打损伤。

#### 7167040

*Ficus hirta* Vahl var. *palmatiloba* (Merr.) Chun --- *F. simplicissima* Lour. --- *F. hirta* Vahl var. *hibisci-folia* (Champ.) Chun

**植物名** 五指毛桃《海南植志》

**药材名** 五指毛桃《汇编》

**文献名** 五爪龙《生草药性备要》,五龙根、火龙叶《岭南采药录》,粗叶榕《海南植志》,五指粗叶榕《广西药录》,三爪龙、五爪桃、山狗差《汇编》

**地方名** 五爪金龙、土黄芪、五指牛奶(广东、广西),佛掌榕(福建、广东);福建:牛乳柴,鬼馒头(南平);广东:毛桃,山枇杷根(潮安),五叉牛稔,五爪牛奶,五叉牛乳,五指香,五指榕,粗叶五爪龙,九龙根,指槟榔,粪椅树(梅县),南芪(广州);海南:三龙爪,亚椴木;广西:五人掌、五加皮(忻城、贵县、德保),五平金(柳江),五叉牛奶藤(北流),五叉虎,三叉虎(东兰),米津,大牛奶,大木通,络树,五指槟榔、土五加皮(百色);云南:糙叶子果(红河),三指毛桃,饿饭果,小哨叶子果,阿卡拉马。

**功效** 根:健脾益气,化湿舒筋。用于脾虚浮肿,自汗,慢性支气管炎,风湿痹痛,腰痛,肝炎,白带,产后无乳。

#### 7167041

*Ficus hirta* Vahl var. *roxburghii* (Miq.) Metc.

**植物名** 大果佛掌榕《云南种录》

**药材名** 三指粗叶榕《广西药录》

**文献名** 老翁树《中国经植志》

**地方名** 广西:三加皮(邕宁),三指牛奶(梧州),半枫荷(蒙山),一手三元(鹿寨),〔土黄芪〕、牛奶木(平南)。

**功效** 根:止痛,强筋骨。用于风湿痛,哮喘,跌打损伤。

#### 7167042

*Ficus hispida* L. f.

**植物名** 对叶榕《高植图鉴》

**药材名** 对叶榕《广西药录》

**文献名** 牛奶树、牛奶树子《岭南采药录》

**地方名** 马奶叶(广东、海南),猪奶树、大种牛奶树(广东、海南),络树(广东、广西);广东:牛奶子,牛魁稔,牛奶稔(南海、番禺),大叶乳汁麻,练总草,稔水冬瓜,野枇杷,猫公果,猪奶,多橘树,橘多树,猪母茶、练汁公(惠阳),葫芦草(高州、茂名),无花里(增城);海南:牛奶麻,能麻,乳汁公树,乳汁麻木,千里行(定安、

屯昌);广西:牛乳药(大新),大牛奶(苍梧),胡果(凌云),米津,(大木通);云南:“麻勒蹦”(西双版纳傣名)。

功效 根、叶、皮:清热利湿,消积化痰。用于感冒,气管炎,消化不良,痢疾,风湿性关节炎;果:用于腋疮。

#### 7167043

*Ficus ischnopoda* Miq.

植物名 壶托榕《高植图鉴补编》

文献名 瘦柄榕《广西药录》

地方名 广西:牛奶子(宾阳),水牛奶(昭平)。

功效 全株:清热解毒。用于跌打损伤;根皮:舒筋活络。用于小儿惊风,风湿麻木。

#### 7167044

*Ficus laceratifolia* Levl. et Vant. --- *Ficus gasparriniana* Miq. Var. *laceratifolia* (Levl. et Vant.) Corner

植物名 撕裂榕《云南种录》

药材名 树地瓜《汇编》

文献名 裂叶榕《高植图鉴补编》,破裂叶榕《中药大辞典》

地方名 四川:山枇杷,牛奶根,斑鸠食子,鸡眼睛,牛奶子。

功效 根:清热解毒;果序托;下乳。用于痢疾,尿路感染,乳汁不足,颈淋巴结核,痔疮。

#### 7167045

*Ficus laevis* Blume

植物名 平滑榕《高植图鉴补编》

文献名 光叶榕《广西药录》

地方名 广西:大疳积藤(蒙山),大手药(金秀)。

功效 全株:用于小儿疳积,产后贫血。

#### 7167046

*Ficus lungchowensis* Chun

植物名 长柄藤榕《广西药录》

地方名 广西:红乌扣(大新)。

功效 根:清热解毒。用于慢性肝炎,毒蛇咬伤。外用于牛皮癣。

#### 7167047

*Ficus microcarpa* L.f. --- *F. retusa* auct. non L.

植物名 榕树《南方草木状》、《高植图鉴》

药材名 榕树《汇编》

文献名 半天吊、小榕叶《生草药性备要》,倒生树、倒生木《粤志》,菩萨树《八续译史》,不死树、榕须《纲目拾遗》,榕叶《药性考》,榕《名实图考》,落地金钱《本草求原》,吊风根、榕树须、细叶榕、榕树胶汁《岭南采药录》,官榕木《陆川本草》

地方名 正榕(台湾、广东),榕树根(福建、广东);浙江:绳树(平阳);福建:情树(厦门),赤松(漳州),赤榕根,吊松根,避暑树(宁德);台湾:马松,倒吊松根,葛松,乌松;广东:榕树吊须,细叶榕木(高州),榕木吊(湛江),成树,乘树,黄榕树,倒吊榕根、癩哥松根(潮阳),倒吊神树根(揭阳),细种牛练(惠阳),吊根榕(兴宁),细叶榕树;广西:小榕树(博白),小叶榕(马山),小叶榕树,万年荫;云南:龙树,万年青(红河),大万年青,大

龙树,小果榕,万年青叶。

功效 叶:清热,解表,化湿。用于流行性感冒,疟疾,支气管炎,急性肠炎,细菌性痢疾,百日咳;气根:发汗,清热,透疹。用于感冒高热,扁桃体炎,风湿骨痛,跌打损伤;树皮:用于泄泻,疥疮,痔疮;果:用于疔疮;树脂(胶汁):用于目翳,赤眼,瘰癧,唇疔,牛皮癣。

备考 有些文献将本种学名误订为 *Ficus retusa* L.

#### 7167048

*Ficus nervosa* Heyne ex Roth

植物名 九丁树《高植图鉴补编》

药材名 九丁树《广西药录》

功效 树皮:助消化。

#### 7167049

*Ficus pandurata* Hance

植物名 琴叶榕《高植图鉴》

药材名 琴叶榕《汇编》

文献名 牛奶子树、一种三苗《汇编》,鼠奶子、奶汁树、骨风木《中药大辞典》

地方名 牛奶仔(福建、广东),牛乳树(江西、广东);浙江:牛奶树(温州),小牛奶树(乐清、泰顺),香人乳(泰顺),牛奶绳;江西:下奶草,狗婆子树;福建:牛奶柴(龙岩),水榕(厦门、龙海),铁牛入石、细牛奶树根(厦门),茶叶牛奶子,牛根子;广东:狗麻、乳树(龙川、连平),细叶牛乳树(始兴);海南:猫奶仔(琼中);广西:山甘草(陆川),山沉香(昭平),过山香(梧州),羊奶果(南宁、苍梧),细牛奶(贵县),鸡公木(苍梧),筛箕子木(玉林);贵州:小无花果。

功效 根或叶:行气活血,舒筋活络。用于月经不调,乳汁不通,跌打损伤,腰腿疼痛,乳腺炎。

#### 7167050

*Ficus pandurata* var. *angustifolia* Cheng --- *F. pandurata* var. *linearis* Migo --- *F. stenophylla* Hemsl.

植物名 条叶榕《高植图鉴补编》

药材名 竹叶榕《汇编》

文献名 狭叶榕、水稻清《云南中草药》,竹叶牛奶树《广西药园药录》,水边柳、百了草、假槟榔、细叶水榕树《中药大辞典》

地方名 小叶牛奶(广东、广西);湖南:牛奶泡;广东:落地金牛,长尾牛奶,长叶牛奶,细叶牛奶树,水浪磅;广西:长叶狗奶木(三江);贵州:加星里。

功效 茎及全株:祛痰止咳,行气活血,祛风除湿。用于咳嗽,胸痛,跌打肿痛,肾炎,风湿骨痛,乳少。

#### 7167051

*Ficus pandurata* Hance var. *holophylla* Migo

植物名 全叶榕《高植图鉴补编》

药材名 铁牛入石(福建)

文献名 全缘榕《福建药物志》,全缘琴叶榕《湖南药物志》,奶汁树《浙南本草新编》

地方名 福建:牛乳子,小叶牛奶子,奶汁草(龙岩),水风藤(泉州);湖南:土麻黄;广西:水沉香(昭平)。

功效 根:祛风除湿。用于风寒感冒,止汗,风湿

痛,急性乳腺炎,淋巴结核,血淋,白带,痈疽溃瘍;  
叶:用于蛇伤;花托:清热解毒。用于湿疹,痈疽溃瘍。

#### 7167052

*Ficus pubigera* (Wall. ex Miq.) Miq.

植物名 褐叶榕《广西药录》

地方名 广西:石山榕(横县)。

功效 叶:消肿止痛,止血。外用于跌打损伤。

#### 7167053

*Ficus pumila* L.

植物名 薜荔《高植图鉴》

药材名 薜荔《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 木莲《本草拾遗》,木莲藤《日华子本草》,水馒头《岭外代客》,鬼馒头、木馒头《纲目》,蔓头萝《生草药性备要》,石壁莲《植物名汇》,膨泡树、饼泡树、木壁莲、木铎、桔杷《树分》,鬼球《药材资料汇编》,风不动《中国药植志》,凉粉果《中草药学》

地方名 凉粉藤(浙江、江西、福建、广西),薜荔果(浙江、湖北、湖南、广东、广西),凉粉果(浙江、安徽、湖南),凉粉子(安徽、江西、浙江、湖南、贵州),木莲果(浙江、安徽),木瓜(上海、湖南),爬山虎、田螺掩、糖馒头、[王不留行](广东、广西),石莲子(四川、云南),奶母(湖北、广东、广西),薜荔藤(安徽、台湾),络石藤(江苏、浙江、江西、山东);江苏:石龙藤、络石、木莲蓬、天花台(溧阳);上海:土馒头、爬壁草、木隆冬、帮帮老虎藤;浙江:木果蒲、胖朴、膨莲、岩络、石络、首莲、老鸭馒头藤、[无花果]、乒碰(温州);安徽:气木瓜、秤锤、石瓜菱、[石花]、珍珠凉粉藤;江西:石络藤、爬墙藤(吉水),牛屎藤(丰城),烹孢子(吉安),木瓜藤、凉粉球、乒子、[石南藤](九江);福建:彭蜂藤、班子藤、乒乓抛藤、乒抛藤(莆田、厦门、同安、华安、南平),乒抛(厦门),牛奶子、牛奶柚、金奶柚(闽南、闽东、邵武、武平、建瓯),假秤锤、程邦子、水子、泊壁藤(同安),墙壁藤(闽北),有蜂藤(同安、安平、邵武、福州、闽侯),大号风不动,佬孟,壁系藤,腊孟,红墙络,红墙套,白寺套,仙对坐,墙脚柱,墙落藤,烟筒石,水称陀,萍泡,双合仔,石班子藤;台湾:爱玉子;湖南:石壁藤,补血玉,追骨风,爬岩风,膀膀子,凉粉子藤;湖北:岩风藤(鹤峰),碎骨还阳(巴东),石藤草(罗田);广东:田螺犀,大鼓藤,薜荔络石藤,馒头郎,馒头萝,馒头米壳,上树鸢(湛江),上树龙(兴宁),上树蜈蚣(五华),上壁蜈蚣(惠阳),上树鳖,广东王不留行,搭壁藤(潮阳、潮安、陆丰、惠来),贴壁藤(潮安),秤陀拔,秤陀子树,文头螺,文头仔,石文头,石筋,细叶馒头罗,磨盆草(广州),细叶旁郎迫(花县);海南:文头榔;广西:(常春藤),爬墙草(南丹),盼石风(柳江、那坡、凤山),秤锤藤(平南、河池),狗卵子(苍梧),石小风青(北流),凉粉泡,上木蚂蝗,大薜荔、大巴山虎(南宁),过墙风(北海),爬石风、冰孢子藤(昭平),秤头果(恭城);四川:爬墙果、爬壁果、爬壁虎、爬石虎,冷子树,壁石虎;贵州:[黑骨藤],吊岩榕,抱树莲。

功效 花序托:补肾固精,活血,催乳。用于遗精,

阳痿,乳汁不通,闭经,乳糜尿;茎、叶:祛风,利湿,活血,解毒。用于风湿痹痛,泻痢,淋病,跌打损伤,痈肿疮疖;根:祛风除湿,舒筋通络。用于头痛眩晕,风湿关节痛,产后风。

#### 7167054

*Ficus pyriformis* Hook. et Arn.

植物名 梨果榕《高植图鉴补编》

药材名 梨果榕《汇编》

文献名 舶梨榕《海南植志》,水石榴《云南药录》

地方名 海南:梨状牛奶子;广西:水棉木、梨叶榕;贵州:母猪精(榕江);云南:黎柳树(红河)。

功效 茎:清热利尿,止痛。用于肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾性水肿,心性水肿,胃痛。

#### 7167055

*Ficus racemosa* L. --- *F. glomerata* Roxb.

植物名 聚果榕《高植图鉴补编》

文献名 马榔树《汇编》,优昙花《台湾药植志》

功效 树皮:收敛。用于洗创伤,猫咬伤;根皮:用于月经过多;果实:收敛,健胃,祛风。用于月经过多,咯血;乳汁:用于痔疮,腹泻。

备考 本品为生产紫草茸的寄主植物之一。

#### 7167056

*Ficus religiosa* L.

植物名 菩提树《高植图鉴补编》

药材名 菩提树《酉阳杂俎》、《台湾药植志》

文献名 思维树《酉阳杂俎》,卑钵罗树《大唐西域记》,觉树《梵书》,阿湿曷毗婆力叉、印度波树《树分》,“阿思多罗”、“阿输陀树”、“卑钵罗树”(梵语)《台湾药植志》,印度菩提树《中国药植图鉴》

地方名 云南:大青树。

功效 干皮:用于糖尿病,淋病;果实:缓下,消食。

备考 本种为生产紫草茸的寄主植物之一。

#### 7167057

*Ficus sarmentosa* Buch.-Ham. ex J. E. Smith --- *F. foveolata* Wall. ex Miq.

植物名 匍茎榕《海南植志》

药材名 珍珠莲《汇编》

文献名 薜荔、石墙、茶藤、崖爬藤《植物名汇》,木莲葛《中国植物图鉴》,岩石榴、匍茎珍珠莲《云南种录》,冰粉果《西昌中草药》,爬崖藤《台湾药植志》,小木莲《汇编》

地方名 福建:牛奶蒲;台湾:磨草,风不动,铃壁藤;广西:上石牛奶、藤牛奶(藤县),上壁牛奶(平南),上树风、小王不留行(大瑶山),[爬山虎](那坡),果柑毛、入山虎(龙州),石风藤(全州),大首叶(桂平、靖西),小荔薜,过墙风;四川:冰粉树,巴梨子,崖荔枝,石泡草;云南:崖石榴(昆明),小绿袍(马关)。

功效 藤、根:祛风化湿。用于慢性关节炎,乳腺炎;茎叶:用于感冒发热,痢疾;果实:消肿败毒,止血。用于心痛,阴囊囊肿,久痢肠痔,妇人乳脉不通;茎汁:用于白癜风,疔疮风,恶疮瘰癧。

#### 7167057a

*Ficus sarmentosa* Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. *henryi* (King) Corner --- *F. foveolata* Wall. var. *henryi* King

植物名 珍珠榕《广西药录》

药材名 珍珠莲《名实图考》、《汇编》

文献名 崖石榴《名实图考》，崖荔子、巴梨子《树分》，冰粉树《汇编》，木莲蕊《中药大辞典》

地方名 陕西：爬岩香（镇坪）；浙江：小木莲（临安），风藤（云和），木馒头（龙泉）；福建：大风藤；江西：石彭子，石彭彭，小寸莲，寸葛莲；四川：冰粉子。

功效 藤、根：祛风湿，消肿解毒，杀虫。用于风湿性关节炎，乳腺炎，疮疖，癣；花托：用于睾丸偏坠，内痔，便血。

#### 7167058

*Ficus sarmentosa* Buch. -Ham. ex J. E. Smith var. *impres* (Champ.) Corner --- *F. martini* Levl. et Vant.

植物名 爬藤榕《高植图鉴》

药材名 爬藤榕《汇编》

文献名 冰粉子《植分学报》，组榕《海南植志》，长叶铁牛入石、小号牛奶子《汇编》，狭叶藤荔《中药大辞典》

地方名 浙江：小木莲（天目山），风藤，小叶风藤；安徽：岩石榴，爬墙虎；江西：拉壁志柴（萍乡）；湖南：枇杷藤；湖北：巴山虎（神农架）；广西：抓石榕（天等），山牛奶（钟山）；四川：吊岩风（峨眉山）。

功效 根：祛风湿，舒气血，消肿止痛。用于风湿性关节炎或神经痛，跌打损伤，消化不良，气血亏虚；叶茎（蒸熏）：用于风眼，眼痒发红。

#### 7167059

*Ficus sarmentosa* Buch.-Ham. ex J. E. Smith var. *lacrymans* (Levl.) Corner --- *F. lacrymans* Levl.

植物名 尾尖爬藤榕《高植图鉴补编》

文献名 爬藤榕《浙江药植志》，长尾爬藤榕《湖北植志》，泪滴珍珠莲《云南种录》

地方名 浙江：小木莲（临安），木莲果（建德），石金藤（兰溪），小叶风藤（云和）。

功效 根、茎藤：祛风湿，止痛。用于风湿痹痛，神经性头痛。

#### 7167060 见 7167057a

#### 7167061

*Ficus semicordata* Buch.-Ham. ex J. E. Smith --- *F. cunia* Buch.

植物名 鸡嗉子榕《云南种录》

药材名 鸡嗉果《汇编》

文献名 耳叶榕《广西植录》，山枇杷果《广西药录》，鸡嗉子果《高植图鉴补编》

地方名 贵州：榕树；云南：鸡嗉子。

功效 叶：止咳。

备考 本种为生产紫草茸寄主植物之一。

#### 7167062

*Ficus septica* Burm. --- *F. leucantatoma* Poir. --- *Ficus kaukauensis* Hayata --- *Ficus kotoensis* Hayata

植物名 梭果榕《台湾药植志》

地方名 台湾：大有树，大叶有，蚬仔叶，猪母乳乳。

功效 根：解鱼毒及食物中毒；叶乳汁：泻下；果实：泻下，催吐。

#### 7167063

*Ficus stipulosa* Miq.

植物名 大叶榕《台湾药植志》

功效 树皮：流涎之含漱剂。外用于洗溃瘍及白带。

#### 7167064

*Ficus tikoua* Bur.

植物名 地瓜榕《广西植录》

药材名 地枇杷《汇编》

文献名 地石榴《滇南本草》，地瓜根、过江龙、土瓜《草木便方》，野地瓜《分类草药性》，地蜈蚣《天宝本草》，地饮根《植物名汇》

地方名 野地瓜藤（陕西、四川、贵州），过山龙（湖北、四川、贵州），地瓜藤（陕西、广西、四川），地瓜（广西、四川）；陕西：爬地蜈蚣；湖南：牛托鼻，鸠草，冬枇杷，青风月，风藤，拦路虎，地木耳，穿切风（黔阳），猪屎枇杷（凤凰）；湖北：匍地龙（巴东）；广西：霜坡虎（马山），爬地牛奶（横县），钻地龙（贵县），地胆柴，爬地风，覆坡虎；四川：铺地蜈蚣，土过山龙；贵州：地郎果，地枇杷果，牛马藤，过石龙，地瓜果，络石藤；云南：（遍地金），地板藤（思茅），母猪地瓜、匍地蜈蚣、万年扒（昭通），地石榴花，地棠果。

功效 全株：清热利湿。用于小儿消化不良，急性胃肠炎，痢疾，胃、十二指肠溃疡，尿路感染，白带，感冒，咳嗽，风湿筋骨疼痛；根：用于黄尿，瘰癧，遗精，阳痿，痔疮；花：用于遗精，滑精。

#### 7167065

*Ficus tinctoria* Gorst. f. var. *gibbosa* (Blume) Corner --- *F. gibbosa* Blume

植物名 斜叶榕《高植图鉴》

药材名 斜叶榕《广西药录》

地方名 广东：水榕，石榕；广西：川破石、石皮榕（阳朔），石榕树（罗城），石壁榕，山茶石（贵县），山榕（马山），剑叶榕（凌云），斜叶乳（岑溪），牵丝榕，丰边刀；云南：野水君子，酸叭叭树，马勒。

功效 树皮及寄生：清热，消炎，解痉。用于感冒，高热抽搐，腹泻痢疾，风火眼疼；根皮：接骨，去毒；叶：豁痰镇咳，祛风通络。用于支气管炎，风湿性关节炎。外用于跌打损伤。

#### 7167066

*Ficus tsiangii* Merr. ex Corner

植物名 杂色榕《广西药录》

地方名 广西：大叶五指牛奶（永福）。

功效 根：用于肝炎。

#### 7167067

*Ficus variolosa* Lindl. ex Benth.

植物名 变叶榕《高植图鉴》

药材名 变叶榕《广西药录》

地方名 浙江：斑榕；福建：牛奶仔（诏安），奶汁柴（三明、清流、宁化、闽侯），常绿天仙果，椿云仔（三明）；

广东:水照映,水照影,水蛇榕,水影树,水担埕,水担杆,亚婆奶(新会),细叶牛乳木,牛乳树,山榕,芷葛;海南:击常木(东方);广西:山牛奶(昭平),假岑榕(扶绥),红绸叶(大瑶山),〔金不换〕(苍梧),白半枫荷(梧州)。

功效 枝、叶:清热解毒。用于胃脘痛;鲜茎(火烧取流汁):外用子淋巴结核。

## 7167068

*Ficus vasculosa* Wall. ex Miq. --- *F. championii* Benth.

植物名 白肉榕《高植图鉴补编》

药材名 黄果榕《广西药录》

文献名 突脉榕《云南种录》

地方名 海南:鸡仔常(吊罗)。

功效 根:用于腹痛,腹泻。

## 7167069

*Ficus virens* Ait. --- *F. wightiana* Wall. ex Benth.

植物名 笔管榕《高植图鉴》

药材名 笔管榕《汇编》

文献名 赤榕《台湾药植志》,雀榕《福建药物志》

地方名 鸟榕(福建、台湾);福建:漆娘舅(福州、福清、莆田、泉州、平和),漆舅,白米叶(泉州);台湾:山榕,红肉榕,鸟屎榕;海南:笔管树。

功效 根:用于乳痈;叶:用于漆疮,鹅口疮,乳腺炎。

## 7167070

*Ficus virens* Ait. var. *sublaevis* (Miq.) Corner --- *F. lacor* auct. non Buch. -Ham.

植物名 黄葛树《高植图鉴》

药材名 黄槐根《草木便方》、《中药大辞典》

文献名 大榕叶、婆罗树、万年阴《生草药性备要》,嘉树《峨眉县志》,黄槐浆、黄槐叶、黄槐皮、〔榕树〕《草木便方》,红龙须、黄葛根《分类草药性》,黄槐树《中国药植志》,大叶榕《广州植志》,披针叶黄葛树《广西药录》

地方名 山榕(浙江、广西),黄龙须(四川、贵州);广东:青葛树、牛角树(粤北),猪鬃榕、四季榕(惠阳);海南:猪麻榕、马尾榕;广西:榕木脚(北流),榕树木(隆林),石榕;四川:黄槐树根,黄槐树根疙瘩(重庆);贵州:小无花果;云南:小万年青,大青树。

功效 气生根:行气、祛风、除寒、除湿。用于风湿麻木,筋骨痛,跌打损伤,劳伤,腰背酸痛,湿肿,虚弱,外伤吐血;树皮乳汁:用于疥癣,血风癣,腮腺炎;树皮:用于风湿痹痛,四肢麻木,半身不遂,瘡疮;树疙瘩(虫瘿):用于背脊痛,劳伤腰痛。

备考 过去文献常将本品误订为 *Ficus lacor* Buch. -Ham.

## 7167071

*Humulus lupulus* L.

植物名 啤酒花《高植图鉴》

药材名 啤酒花《汇编》

文献名 蛇麻《闽书南产志》,狗爪藤《植物名汇》,霍布、忽布腺、香蛇麻草、香蛇麻腺(叶《生药》),香蛇麻

《东北药植志》,忽布《药典》,香蛇麻花、酒花、野酒花《中草药学》

地方名 辽宁:菊花引子(沈阳);山东:霍布花;新疆:“啤瓦古丽”(维名);浙江:蛇麻草。

功效 未经授粉的雌花:健胃消食,抗结核,安神利尿。用于食欲不振,腹胀,肺结核,结核性胸膜炎,失眠,瘵病,浮肿,膀胱炎,麻风。

## 7167072

*Humulus lupulus* L. var. *cordifolius* Maxim. --- *H. cordifolius* Makino

植物名 华忽布花《秦岭植志》

药材名 野酒花《陕西中草药》

文献名 蛇麻《中国植物图鉴》,华忽布《华北经济志要》,啤酒花《内蒙古中草药》,蛇麻草《中药大辞典》

地方名 酒花、香蛇麻(甘肃、陕西);内蒙古:忽布;陕西:草忽布,忽布花(秦岭)。

功效 花:健胃,镇静,抗结核。用于消化不良,不思饮食,瘵病,失眠,结核病。

## 7167073

*Humulus scandens* (Lour.) Merr. --- *H. japonicus* Sieb. et Zucc.

植物名 葎草《高植图鉴》

药材名 葎草《唐本草》、《汇编》

文献名 勒草、黑草《别录》,葛藟蔓《唐本草》,葛勒蔓《蜀本草》,来莓草《开宝本草》,葛藟草《圣济总录》,葛勒子、淫萝蔓《救荒本草》,割人藤《本经逢原》,蓝毛藤花、宪麻子、乌仔蔓、槐藤《植物名汇》,蓝藤子《满蒙植汇》

地方名 拉拉秧(东北、华北、内蒙古、山东、安徽、广西、云南),拉拉蔓(河北、内蒙古、甘肃、山东),拉拉藤(辽宁、陕西、甘肃、浙江、安徽、江苏、湖北),拉人藤(上海、浙江、湖北),降龙草(陕西、甘肃、湖北),五爪龙(陕西、浙江、安徽、江西、福建、湖南),锯锯藤(陕西、江西、四川、贵州),穿肠草(东北、华北、甘肃、北京、广西);吉林:拦马藤,韩山登棍儿;辽宁:拉马藤子;河北:过满龙;内蒙古:“珠日给”(蒙名),串肠草;陕西:葛麻麻,苣荬藤(镇坪);甘肃:麻葛蔓;青海:野桑草;山东:拉狗蛋(昆崙山、滕县、莱芜、济南);江苏:路路藤;上海:拉子藤,野丝瓜,葫芦藤;浙江:五叶杂藤(临安),五叶葎、大叶五爪金龙(温州);安徽:大拉拉藤,老虎刺,老虎藤,猪儿刺藤;江西:过沟龙(临川),大叶五爪龙(婺源),野苦瓜,锯子草(泰和);福建:牛蹄迹,牛脚迹,锯叶藤子(上杭),积藤(光泽),刮皮藤(邵武),蜈蚣藤(松溪、政和),五爪金龙(宁化、三明),五叶藤,五花龙,虎爪陈(泉州),虎爪藤,葛勒草、有刺五叶藤、锁扣刺(福州),狗脚迹,小五爪叶;台湾:乌山蔓,山苦瓜,苦瓜草;河南:大淫拉秧,大拉拉秧;湖北:蛇不钻(巴东),马郎雾子、锯拉草(神农架);湖南:旱马藤兜,五爪风,五皮风,过路乌泡;广东:假苦瓜,苦瓜藤;广西:锯藤(忻城);四川:河转草,大锯锯藤,五披风(成都);贵州:葎草花;云南:倒挂藤(文山);其他:筋草。

功效 全草:清热解毒,利尿消肿。用于肺结核潮热,胃肠炎,痢疾,感冒发热,小便不利,肾盂肾炎,急性

肾炎,膀胱炎,泌尿系结石。外用子癰疽肿毒,湿疹,毒蛇咬伤。

## 7167074

*Malaisia scandens* (Lour.) Planch.

植物名 牛筋藤《高植图鉴》

药材名 牛筋藤《广西药录》

地方名 海南:包饭果藤,煲稗子藤(澄迈);广西:黄芪、米脉藤(北流、陆川),蛙皮藤(扶绥),谷沙藤(武鸣),鹊鸂鶒(龙州)。

功效 叶:外用于杀虫;根:祛风湿,止痛。用于风湿痹痛。

## 7167075

*Morus alba* L. --- *Morus alba* L. var. *romana* Loddiges

植物名 桑《诗经》、《高植图鉴》

药材名 桑叶《本经》、《药典》,桑白皮《药性论》、《药典》,桑椹《唐本草》、《药典》,桑枝《图经》、《药典》

文献名 蕤《尔雅》,桑根白皮《本经》,桑实《说文》,桑汁、桑白汁、桑灰《肘后方》,桑柴灰《唐本草》,桑根皮、桑皮《孟诜《食疗本草》》,上清《石药尔雅》,家桑《日华子本草》,桑木汁《圣惠方》,桑白皮中白汁、桑条、神仙叶、〔霜后叶〕《图经》,乌椹《本草衍义》,文武实《素问病机保命集》,荆桑《王桢农书》,桑椹树《救荒本草》,桑椹子《滇南本草》,黑椹《本草蒙筌》,桑籍、桑沥《纲目》,桑油《万氏家抄方》,木鹵《本草经疏》,桑皮汁《玉楸药解》,桑叶露、桑叶滋、桑脂、桑滋干、铁扇子、桑瘦、桑梢榧《纲目拾遗》,桑葚于《本草再新》,伏蛇、婁食蚕、延年卷雪《新纲》,牛耳构树、娘仔树《植物名汇》,山黄桑树《中国药植志》,老桑叶、青桑叶、童桑叶、老桑枝《常用中药名辨》

地方名 桑树(东北、浙江、江西、台湾),岩桑(陕西、湖北、四川),桑粒(东北);河北:洋桑,伏蛇皮,马额皮;山西:白桑皮;内蒙古:“依拉玛”、“色仁兴伸巴格”(蒙名);江苏:桑果,黄桑(扬州),桑树根皮、双白皮(徐州),霜桑叶,桑树枣,桑根(南京);浙江:山桑树,冬桑叶,桑芽(浙南);安徽:桑果子;福建:蚕叶,桑材,桑随;台湾:桑材仔;河南:双叶、双皮(新乡);湖北:连条;湖南:伏桑(零陵);广东:桑祗树(兴宁),山谷皮;广西:双白(贵县),蚕虫叶(柳江),蚕叶树(桂林);四川:桑薰,山黄桑(武隆);贵州:山蚕树(黔阳);云南:蚕桑(文山)。

功效 桑叶:疏散风热,清肺润燥,清肝明目。用于风热感冒,肺热燥咳,头晕头痛,目赤昏花;根皮(桑白皮):泻肺平喘,利水消肿。用于肺热喘咳,水肿胀满尿少,面目肌肤浮肿;桑枝(嫩枝):祛风湿,利关节。用于肩臂关节酸痛麻木;果穗(桑椹):补血滋阴,生津润燥。用于眩晕耳鸣,心悸失眠,须发早白,津伤口渴,内热消渴,血虚便秘;根:用于惊痛,筋骨痛,高血压,目赤,鹅口疮;桑瘦(老桑树上的结节):用于老年鹤膝风,胃痛;桑籍(桑柴灰汁蒸发后的结晶状物):用于噎食积块。外用子癰疽,拔疔;桑叶汁:用于癰疽,瘰癧,外伤出血,蜈蚣咬伤;桑叶露(叶的蒸馏液):用于目疾红筋,祛风清热;桑皮汁

(树皮中白色液汁):用于小口疮,外伤出血;桑柴灰:有小毒。用于水肿,金疮出血,目赤肿痛;桑沥(枝条烧灼后沥出汁液):用于大风疮疥,生眉发。

备考 据《东北药植志》载:过去,一般对家桑学名只笼统地冠以 *Morus alba* L. 其中包括果熟时白色及暗红紫色两者。《朝鲜森林植物编》及《苏联植物志》指出白果者系 *Morus alba* L. var. *vulgaris* Bureau, 果暗红紫色才是 *Morus alba* L. var. *romana* Loddiges --- *Morus alba* L. Var. *tatarica* Seringes

## 7167076

*Morus alba* L. var. *multicaulis* Loud.

植物名 鲁桑《山东树木志》

药材名 桑白皮《四川中药志》

文献名 白桑《山东树木志》,湖桑《江苏植志》

地方名 四川:油桑,扶桑,洋桑,桑根皮,冬桑叶,霜桑叶,桑枝;其他:桑蕨,乌蕨桑果。

功效 根皮(桑白皮):泻肺平喘,利水消肿。用于肺热喘咳,水肿胀满,尿少,面目肌肤浮肿;果穗(桑椹):补血滋阴,生津润燥。用于眩晕耳鸣,心悸失眠,须发早白,伤津口渴,内热消渴,血虚便秘。

## 7167077

*Morus australis* Poir. --- *M. acidosa* Griff. --- *M. japonica* Bailey --- *M. bombycis* Koidz.

植物名 鸡桑《高植图鉴》

药材名 鸡桑《中药大辞典》

文献名 小叶桑《广西药录》,小叶桑根《贵州草药》

地方名 岩桑、岩树(广西、四川),野桑(广西、云南);山东:山桑;安徽:野刺桑,金绒桑;台湾:盐桑仔,盐桑树,桑树,桑材仔,桑白,桑枝,桑白皮,桑树根,桑叶,桑根,桑椹,桑皮,蚕仔叶树,蚕仔树,娘子树,山黄桑,牛耳构树;湖北:小花叶桑(鹤峰),扩叶桑、叉叶桑(神农架);广东:角树、山桑垂(潮阳);广西:小岩桑,皮藤,鸡脚桑;贵州:小虫桑;云南:马桑。

功效 叶:清热解表。用于感冒咳嗽;根或根皮:泻肺火,利小便。用于肺热咳嗽,衄血,水肿,腹泻,黄疸。

## 7167078

*Morus cathayana* Hemsl.

植物名 华桑《中国经植志》

药材名 华桑《汇编》

地方名 葫芦桑(陕西、湖北、江苏);河北:花桑,桑叶;浙江:花山桑,桑白皮;安徽:大叶皮桑,花叶皮桑,板皮桑,桑枝,桑椹;湖北:花叶桑(鹤峰),大叶桑(恩施),毛桑。

功效 桑叶:疏散风热,清肺润燥,清肝明目;桑枝:祛风清热,通络;桑椹:补血滋阴,生津润燥;根皮:泻肺平喘,利水消肿。

## 7167079

*Morus macroura* Miq. --- *Morus laevigata* Wall.

植物名 光叶桑《西藏植志》

文献名 长果桑《汇编》

地方名 西藏:桑叶。

功效 桑叶:疏风清热,清肝明目。

#### 7167080

*Morus mongolica* (Bureau) Schneid. - *M. alba* L. var. *mongolica* Bureau

植物名 蒙桑《高植图鉴》

药材名 蒙桑《汇编》

文献名 崖桑《药材学》,岩桑《秦岭植志》

地方名 桑、桑白皮、桑椹子(东北);安徽:桑叶;山西:山桑(太行);陕西:刺叶桑(广县);湖北:岩桑树(神农架)。

功效 桑叶:疏散风热,清肺润燥,清肝明目;根皮:泻肺平喘,利水消肿。

#### 7167081

*Morus mongolica* Schneid. var. *diabolica* Koidz.

植物名 裂叶蒙桑《西藏植志》

药材名 山桑《内蒙古中草药》

文献名 鬼桑《华北树木志》

地方名 内蒙古:胡芦桑。

功效 桑叶:疏散风热,清肺润燥,清肝明目;桑枝:祛风湿,利关节;桑椹:补血滋阴,生津润燥。

#### 7167082

*Morus nigra* L.

植物名 黑桑《台湾药植志》

功效 果实:用于小儿轻泻;根皮:泻下,驱虫。用于绦虫。

#### 7167083

*Morus serrata* Roxb.

植物名 西藏桑《西藏药图》

文献名 “塔尔兴”(藏名)《西藏药图》

地方名 青海:桑叶,桑枝,桑白皮。

功效 叶、枝条内皮:清热解毒。用于感冒,气管炎,腹泻。

#### 7167084

*Pseudostreblus indica* Bur.

植物名 假鹊肾树《高植图鉴》

药材名 滑叶跌打《云南中草药》

地方名 云南:止血树皮,清水跌打(思茅),“卖央蒿”、“梅戈央”(西双版纳傣语),止血树,青树跌打。

功效 树皮:止血止痛。用于消化道出血,胃痛,外伤出血,跌打损伤,接骨接筋。

#### 7167085

*Streblus asper* Lour.

植物名 鹊肾树《高植图鉴》

药材名 鹊肾树《云南药录》

地方名 海南:鸡仔,鸡啄,加毒,加底,莺哥果,万里果,百日晒;云南:“埋坏”(西双版纳傣语)。

功效 树皮:止痢止泻。用于痢疾,腹泻;根:用于解蛇毒。

#### 7167086

*Taxotrophis ilicidolius* (Kurz) Vidal

植物名 刺桑《海南植志》

药材名 刺桑《广西药园药录》

功效 根皮、叶:消肿拔毒,清热凉肝,消滞。

#### 7167087

*Teonongia tonkinensis* Stapf

植物名 米扬噶《高植图鉴》

文献名 米浓液《广西药园药录》,条降胶树《广西植录》

功效 根皮、叶:拔毒消肿。用于痈疮肿毒。

### 7169 荨麻科 Urticaceae

7169001 见 7169009a

#### 7169002

*Boehmeria clidemioides* Miq. var. *diffusa* (Wedd.) Hand.-Mazz. --- *B. diffusa* Wedd.

植物名 序叶苎麻《高植图鉴》

文献名 叶序苎麻《高植图鉴补编》

地方名 四川:水苎麻,水苏麻,水麻叶,玄麻;贵州:水火麻。

功效 全草或根:用于风湿。

#### 7169003

*Boehmeria densiglomerata* W. T. Wang

植物名 密球苎麻《云南植物研究》

地方名 四川:土麻仁、野紫苏(川南)。

功效 全草:祛风除湿。

#### 7169004

*Boehmeria formosana* Hayata

植物名 海岛苎麻《高植图鉴补编》

地方名 广西:大叶水麻叶(临桂)。

功效 叶:消肿止痛。外用于跌打损伤。

#### 7169005

*Boehmeria gracilis* C. H. Wright --- *B. paraspicata* Nakai --- *B. tricuspidata* var. *unicuspis* Makino ex Ohwi

植物名 细野麻《高植图鉴》

药材名 麦麸草《陕西中草药》

文献名 东北苎麻《东北草本志》,宽叶苎麻《陕西中草药》,野苎麻《秦岭植志》,细茎苎麻《湖北植志》

地方名 陕西:红锦麻(旬阳),野线麻(丹凤),水麻叶(紫阳);江西:小赤麻;河南:红线麻;湖北:水苎麻。

功效 全草:清热解毒,祛风止痒,利湿;根:用于跌打损伤,痔疮。

#### 7169006

*Boehmeria longispica* Steud. --- *B. grandifolia* Wedd.

植物名 大叶苎麻《高植图鉴》

药材名 水苎麻《广西药录》

文献名 山苎《名实图考》,蒙自苎麻《广西植录》

地方名 野水苎麻(广西、云南);山东:山麻;安徽:野苎麻,野线麻;江西:山苎麻;广西:水升麻(全州);四川:大蜜婆叶、火麻风(蓬溪);贵州:大水麻,水苏麻,水禾麻,水活麻。

功效 根或全草:祛风除湿,接骨,清热解毒。用于风湿痹痛,小儿麻疹,疮疖。外用于跌打骨折。

#### 7169007

*Boehmeria macrophylla* D. Don

植物名 长叶芒麻《高植图鉴补编》

地方名 广西：“米顶心”（壮语），折听藤，假密蒙（天等），沟边木（武鸣）；四川：水悬麻；云南：水麻，水细麻。

功效 茎：用于头风，发烧；根：用于骨折，感冒，风湿关节炎；叶：外用于中耳炎，小儿头疮。

#### 7169007a

*Boehmeria macrophylla* var. *loochooensis* (Wedd.) W. T. Wang --- *B. densiflora* Hook. et Arn. --- *B. platyphylla* var. *loochooensis* Wedd.

植物名 密花芒麻《高植图鉴补编》

药材名 红水柳《台湾中药材图鉴》

文献名 木芒麻《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾：水柳仔，水柳黄，山水柳，密花水芒麻，粗糠谷，虾公须。

功效 根、茎：祛风。用于感冒；叶：外用于止痒。

#### 7169008

*Boehmeria nivea* (L.) Gaud.

植物名 芒麻《高植图鉴补编》

药材名 芒麻根《药性论》、《药典》

文献名 纁《诗经》，芒《草木疏》，芒根、芒汁《别录》，家芒《纲目》，天青地白草、川绵葱、野芒麻（王安卿《采药录》），白芒、银芒、（天名精）《纲目拾遗》

地方名 元麻（四川、云南），芒麻头（广西、四川），野麻（福建、云南、湖南、湖北、安徽），线麻（安徽、湖南、湖北），芒仔（台湾、湖南），天青地白（广东、陕西），青麻（云南、湖南、广西），山麻叶（浙江、广东），白麻（上海、广西、湖南、云南），野苦麻、上青下白（浙江、安徽），园麻（四川、贵州、广西）；陕西：糠骨散（柞水）；浙江：真麻（东阳、永康、武义）；安徽：苦麻，野线麻；江西：野麻叶（德兴），土芒麻（赣州），家麻；福建：山坠（龙岩），〔活血丹〕（光泽），般芒、山芒（闽东）；台湾：麻仔；河南：疙妮菜；湖北：绿麻；海南：白芒麻，假棉兜，粗麻，假麻，白麻头；广西：白毛叶（富川、钟山），白背芒麻（北流），白薯麻（藤县），芒麻茹，家芒麻；四川：家麻根、圆麻根（会理）；云南：“办藤”（傣名），钻骨风（昆明），密芒麻，“鸡妈白”（楚雄彝名），竹麻（曲靖）。

功效 根、根茎：止血，安胎。用于胎动不安，先兆流产，尿血。外用于痈肿初起；叶、茎（提取物）：止血。用于节育后期延长或流血量增多，月经过多症，鼻衄，痔疮出血；皮：清烦热，利小便，散瘀止血。用于瘀热，心烦，小便不通，肛门肿痛，创伤出血；花：清心，利肠胃，散瘀。

#### 7169008a

*Boehmeria nivea* (L.) Gaud. var. *nippononivea* (Koidz.) W. T. Wang

植物名 伏毛芒麻《高植图鉴补编》

地方名 广西：芒麻（防城）。

功效 根：用于骨鲠喉。

#### 7169009

*Boehmeria nivea* (L.) Gaud. var. *tenacissima* (Gard.) Miq.

植物名 青叶芒麻《高植图鉴补编》

文献名 青芒麻《广西植录》

地方名 广东：青叶芒；广西：野草麻。

功效 根、叶：止血，散瘀。

#### 7169009a

*Boehmeria platanifolia* Franch. et Sav. --- *B. platyphylla* var. *tricuspis* Hance

植物名 悬铃叶芒麻《高植图鉴补编》

药材名 水芒麻《汇编》

文献名 悬铃木叶芒麻《高植图鉴》，水麻、蕹麻、芙蓉麻《汇编》

地方名 八角麻（浙江、江西），野芒麻（江西、安徽、湖南、甘肃），山麻（江西、山东、甘肃），大水麻（贵州、湖北）；陕西：火麻（佛坪），荨麻（宁强）；浙江：方麻；安徽：龟叶麻；江西：鸡树，马鞭麻，龟尾麻，掌叶麻；湖北：透骨风（巴东），红火麻（利川），大防风根、大防风、荨麻草（神农架）；贵州：水禾麻（贵阳），水蕹麻。

功效 根、全株：解表，生肌。用于头风，发烧。外用于跌打损伤，痔疮，荨麻疹。

#### 7169010

*Boehmeria platyphylla* D. Don --- *B. platyphylla* var. *macrostachya* Wedd.

植物名 水芒麻《高植图鉴》

药材名 水芒麻《广西药录》

地方名 广西：土升麻，草麻，野芒麻；云南：水麻，大糯叶（文山），儿梭马、大接骨（临沧），草莞（曲靖），癞蛤蟆棵。

功效 全株：解毒。用于风湿痛。

#### 7169011

*Boehmeria platyphylla* D. Don var. *canescens* (Wedd.) Wedd.

植物名 灰绿水芒麻《广西药录》

功效 全草：用于骨髓炎。

#### 7169012

*Boehmeria platyphylla* var. *scabrella* (Roxb.) Wedd. --- *Urtica scabrella* D. Don Roxb. --- *Boehmeria scabrella* (Roxb.) Gaud.

植物名 糙叶水芒麻《高植图鉴补编》

文献名 糙叶水芒麻《广西药录》

地方名 广西：蛤蟆草（龙州），假芋麻（平南、岑溪）。

功效 全株：用于风湿痛，霉疮，疟疾；根：用于疟疾，风湿痛，烧、烫伤。

#### 7169013

*Boehmeria siamensis* Craib

植物名 束序芒麻《高植图鉴补编》

文献名 暹罗芒麻《中药大辞典》，野芒麻《云南中草药选》

地方名 云南：八楞麻、大接骨、大糯叶、双合合、老母猪、五爪根、老母猪挂面（思茅），牛鼻子树，“牙呼光”（傣语）。

功效 全草：清热解毒，祛风除湿，止血生肌。用于肠痈，腹痛，泄泻，荨麻疹，皮肤瘙痒，湿疹，痘疮。

#### 7169014



*Boehmeria silvestrii* (Pamp.) W. T. Wang --- *B. tricuspidis* auct. non Makino

植物名 赤麻《高植图鉴补编》

文献名 长白苧麻《长白山植药志》

地方名 陕西:火麻(石泉),野苧麻(丹凤);甘肃:线麻(文县);河南:三裂苧麻;湖北:水柱麻、水柱麻根(神农架)。

功效 根:清热解毒,止血。用于无名肿毒,止血。

备考 有些文献曾将本品学名订为 *B. tricuspidis* Makino

#### 7169015

*Boehmeria spicata* (Thunb.) Thunb.

植物名 小赤麻《高植图鉴补编》

药材名 小红活麻《汇编》

地方名 广西:(升麻)(全州)。

功效 全草:祛痰,利湿。用于小儿麻痹,小儿麻疹。

#### 7169016

*Boehmeria zollingeriana* Wedd. --- *B. heteroidea* Blume

植物名 帚序苧麻《高植图鉴补编》

文献名 长叶苧麻《台湾药植志》

地方名 台湾:金石榴。

功效 叶:用于小儿积食。

7169017 见 7169007a

7169018 见 7169008a

#### 7169019

*Chamabainia cuspidata* Wight --- *Urtica squamigera* Wall.

植物名 微柱麻《云南种录》

文献名 止血草、虫蚁菜《高植图鉴》

功效 全草:止血,生肌。用于刀伤出血;根或全草:用于胃腹疼痛。

#### 7169020

*Debregeasia edulis* (Sieb. et Zucc.) Wedd. --- *Morocarpus edulis* Sieb. et Zucc.

植物名 冬里麻《新华本草纲要》

药材名 冬里麻《峨眉药植》

文献名 [水麻]《名实图考》,水麻子《植物名汇》,柳莓《植物学大辞典》

地方名 陕西:水马桑(西乡、南郑);湖北:水冬瓜(利川),尖麻(鹤峰),沙连泡、砂糖果(神农架);广西:水麻根(柳江),柳梅、红烟(靖西);四川:大水麻(西昌),白杨柳(成都),米麻子(峨眉山);贵州:天青地白,水麻柳,水苏麻,小苏麻;云南:水麻秧。

功效 茎皮、叶:清热利湿,止血解毒。用于小儿急惊风,风湿关节痛,咳血,痢症肿毒。

#### 7169021

*Debregeasia longifolia* (Burm. f.) Wedd.

植物名 长叶水麻《高植图鉴》

药材名 长叶水麻《贵州药录》

地方名 贵州:水麻。

功效 全草:祛风除湿,清热解毒。用于风湿肿

痛,无名肿毒。

#### 7169022

*Elatostema brachyodontum* (Hand.-Mazz.) W. T. Wang --- *E. ficoides* Wedd. var. *brachyodontum* Hand.-Mazz.

植物名 短齿楼梯草《高植图鉴补编》

功效 全草:清热解毒,利湿平肝。用于骨折,风湿红肿,火眼,黄疸。

#### 7169023

*Elatostema brunneinerve* W. T. Wang

植物名 褐脉楼梯草《广西药录》

地方名 广西:薛瓣(那坡)。

功效 全草:用于慢性肝炎。

#### 7169024

*Elatostema cavaieriei* (Levl.) Mand.-Mazz. --- *Pellionia cavaleriei* Levl.

植物名 江南楼梯草《湖北植志》

药材名 冷子草《神农架药录》

地方名 湖北:六月寒(巴东)。

功效 全草:清热泻火,解毒。用于火烫伤。

#### 7169025

*Elatostema edule* C. B. Rob.

植物名 南海楼梯草《高植图鉴补编》

文献名 阔叶赤车使者《台湾药植志》

功效 根:退热;叶:用于毒蛇咬伤。外用于创伤。

#### 7169026

*Elatostema ficoides* Wedd.

植物名 梨序楼梯草《高植图鉴补编》

药材名 仙马杆《峨眉药植研究》

地方名 四川:瓢刀杆(峨眉山)。

功效 茎叶:解暑热。

#### 7169027

*Elatostema involucratum* Franch. et Sav. --- *E. umbellatum* (Sieb. et Zucc.) Blume var. *majus* Maxim.

植物名 楼梯草《名实图考》、《高植图鉴补编》

药材名 赤车使者《雷公炮炙论》、《汇编》

文献名 小锦枝《雷公炮炙论》,蟒蛇草、蛇漏斗《牧野日图》,总苞楼梯草《广西植录》,大楼梯草《秦岭植志》,大叶楼梯草《湖北植志》,大伞花楼梯草《汇编》

地方名 陕西:冷子草、上天梯、水芝麻叶、龙含珠、千锤打(镇坪),麻杆七(旬阳),拐枣七(略阳),鹿角、拐仗七(宁强),海马含珠;浙江:白龙骨(天目山);安徽:惊风草;江西:水乌蛆,石鸡草,石兔俭,阴陈草;福建:坑乌菜(松政);湖南:小白沙(花垣),石边采(郴县),细水麻叶(凤凰);广西:八脸麻、玉麻(桂林);贵州:半边山(罗甸),半边伞(绥阳),到老嫩(铜仁)。

功效 全草:清热利湿,活血,消肿。用于细菌性痢疾,黄疸,水肿,无名肿毒。外用于风湿关节疼痛,骨折,痢症肿毒。

#### 7169028

*Elatostema lineolatum* Wight var. *majus* Thw. ---

*Elatostema umbellatum* (Sieb. et Zucc.) Blume

植物名 狭叶楼梯草《高植图鉴》

药材名 豆瓣七《云南中草药》  
文献名 鱼公草《名实图考》，多齿楼梯草《海南植志》，线条楼梯草《广西植录》  
地方名 台湾：蒋草心草，冷清草；广西：石寒公（平南）；云南：〔万年青〕（保山）。  
功效 全草：消炎接骨。用于痈疽，骨折。

## 7169029

*Elatostema macintyreii* Dunn --- *E. rupestre* auct. non (Buch.-Ham.) Wedd.

植物名 多序楼梯草《高植图鉴补编》  
文献名 石生楼梯草《高植图鉴》  
地方名 广西：节节花〔鹿寨〕。  
功效 全草：消肿止痛。外用于跌打损伤。

## 7169030

*Elatostema microcephalantha* Hayata

植物名 球花楼梯草〔拟〕  
文献名 球花赤车使者《台湾药植志》  
功效 茎叶：通经。

## 7169031

*Elatostema monandrum* (D. Don) Hara --- *E. surculosum* Wight var. *elegans* Hook. f.

植物名 异叶楼梯草《高植图鉴补编》  
药材名 石螃蟹《西昌中草药》  
功效 根茎：清利湿热，消肿解毒。用于风湿疼痛，红白痢疾，无名肿毒，跌打扭伤。

## 7169032

*Elatostema myrtillus* (Levl.) Hand.-Mazz.

植物名 瘤茎楼梯草《贵州药录》  
地方名 贵州：路郎鸡。  
功效 全草：清热解毒，利湿平肝。用于骨折，风湿红肿，火眼，黄疸。

## 7169032a

*Elatostema oblongifolium* Fu ex W. T. Wang

植物名 长圆楼梯草《高植图鉴补编》  
药材名 六月合（湖北）、《新华本草纲要》  
文献名 无梗楼梯草《湖北植志》  
地方名 湖北：冷草；四川：小水药、水惊风（西昌）。  
功效 全草：行血，消肿止痛。用于骨折，扭伤，疮疖肿毒。

## 7169033

*Elatostema parvum* (Blume) Miq. --- *E. minutum* Hayata

植物名 小叶楼梯草《高植图鉴补编》  
功效 全草：清热拔毒。外用于跌打损伤，疥疮。

## 7169034

*Elatostema platyphyllum* Wedd.

植物名 宽叶楼梯草《高植图鉴补编》  
文献名 阔叶楼梯草《广西植录》  
地方名 广西：大归边棒（北流）。  
功效 全株：清热解毒。

## 7169035 见 7169029

## 7169036

*Elatostema schizocephalum* W. T. Wang

植物名 裂序楼梯草《广西药录》  
功效 全草：化痰，止咳。用于感冒咳嗽。

## 7169037

*Elatostema sessile* Forst.

植物名 无梗楼梯草《湖北植志》  
药材名 小水药《西昌中草药》  
文献名 半边纱《植物名汇》  
地方名 湖北：冷草（鹤峰、五峰），冷子草（神农架），六月合（五峰）；四川：水惊风。  
功效 全草：有小毒。行血消肿，止痛。用于骨折，扭伤肿痛，疮肿。

## 7169038

*Elatostema sessile* Forst. var. *pubescens* Hook. f.

植物名 毛叶楼梯草《湖北植志》  
文献名 柔毛楼梯草《广西植录》，毛楼梯草《云南种录》  
地方名 湖北：飞扬草（神农架）；广西：米烧（龙州）。  
功效 全株：祛风湿，拔毒。用于疥疮，关节疼痛。

## 7169039

*Elatostema stewardii* Merr.

植物名 庐山楼梯草《高植图鉴》  
地方名 浙江：白龙骨，冷坑兰，冷坑青（镇海、鄞县、乐清、龙泉），猢猻接竹（嵊县），痒痒草（衢县），血和山，乌骨麻，赤车使者，接骨草（临安）。  
功效 全草：活血祛瘀，消肿解毒，止咳。用于挫伤，扭伤，骨折，流行性腮腺炎，闭经，肺结核发热，咳嗽。

## 7169040

*Elatostema stewardii* Merr. forma *bulbiferum* W. T. Wang

植物名 珠芽楼梯草《高植图鉴补编》  
文献名 鳞茎楼梯草《神农架药录》  
地方名 湖北：冷草（神农架）。  
功效 全草：活血祛瘀，消肿。

## 7169041

*Elatostema sublineare* W. T. Wang

植物名 条叶楼梯草《高植图鉴补编》  
地方名 广西：接骨草（宜山）；贵州：半边山，臭草，岩芹菜。  
功效 全草：清热解毒，利湿平肝。用于骨折，风湿红肿，火眼，黄疸。

## 7169042

*Girardinia chingiana* Chien

植物名 浙江蛇麻《浙江药植志》  
药材名 青火麻（四川）  
地方名 浙江：带刺马鞭（临安）；四川：火麻（成都）。  
功效 根：止血，散瘀。用于小儿麻疹。

## 7169043

*Girardinia condensata* (Hochst.) Wedd. --- *G. cuspidata*

Wedd. ssp. grammala C. J. Chen

植物名 大钱麻《云南种录》

药材名 大钱麻《滇南本草》

文献名 梗麻《滇南本草》

地方名 红蛇麻草(四川、云南);云南:大前麻、大蝎子草、红麻(丽江),苧麻、红活麻、蝎麻(文山)。

功效 全草:祛风,消痰,下气。用于皮肤风痒,风伤肺气咳嗽,胃痰,疮毒,水肿。

备考 《滇南本草》“大钱麻”之学名,《滇南本草》整理本1977年版(第2卷,243页)订为 *Girardinia palmata* (Forsk.) Gaud.,《云南种录》订为本种。

#### 7169044

*Girardinia cuspidata* Wedd.

植物名 蝎子草《高植图鉴》

药材名 蝎子草《湖南药物志》

地方名 辽宁:哈拉海,蟹麻;陕西:险麻,苧麻;湖北:火麻草(巴东);湖南:红藿毛草;其他:蟹麻蒿。

功效 全草:用于风湿关节炎。

#### 7169045

*Girardinia palmata* (Forsk.) Gaud. --- *G. heterophylla* Decne.

植物名 大蝎子草《高植图鉴》

药材名 大蝎子草《汇编》

文献名 蛇麻草《植物名汇》,掌叶蝎子草《湖北植志》

地方名 火麻(陕西、湖北);陕西:嫩麻(陕南);湖北:活麻草、活麻草根、追骨风、老虎麻(神农架);四川:红火麻(成都),红合麻,红活麻(峨眉山);云南:大身麻,钱麻、苧麻(昆明),蝎子草,大前麻,大茎麻,大苧麻。

功效 全草、根:有毒。祛风解表,利气消痰,清热解暑。用于伤风咳嗽,胸闷痰多。外用子肤痒,疮毒;茎、叶:用于小儿惊风,中风不语,咳嗽痰多,咯血。外用子疮毒;根:用于水肿。

#### 7169046

*Gonostegia hirta* (Blume) Miq. --- *Memoralis hirta* (Blume) Wedd.

植物名 糯米团《高植图鉴》

药材名 糯米团《汇编》

文献名 糯米饭草、白米饭草《本草从新》,捆仙绳《天宝本草》

地方名 糯米草(四川、云南、贵州、江西、湖北),猪粥菜、吮脓膏、把齿药、干菜茅、细叶干菜茅(广东、广西),糯米藤(浙江、安徽、湖北、江西、陕西、四川、贵州),糯米菜(四川、陕西),糯米条(湖南、浙江),蔓苎麻(浙江、广西、云南、陕西、江西);陕西:饭藤子(镇坪),乌蛇草、红蔓根(略阳),糯米芽(平利);浙江:红米藤,红饭藤,梗扁草(龙泉);安徽:意心藤;江西:大红袍(南丰),糯米莲(吉安);福建:猪仔菜(寿宁),贯线草,石薯(永泰、福清、南安),康菜藤(宁德),硬骨石薯(泉州),竹叶贯菜(宁化),蚯蚓藤草(浦城),四美草(漳州),双合连珠(仙游),鸡舌草、扞里草、贯钱草、野其菜、贯菜

根、枪刀草、红石薯(南平);台湾:奶叶藤;湖北:糯米头;湖南:糯米饭藤;广东:(甜甜草)(阳江、阳春);海南:大拳头(澄迈),蚌巢草(儋县);广西:水狗克(玉林),角脉糕(北流),雾水葛,大雾水葛,白消散,铁节草,气骨,蛳消菜,祝英台蔓苎麻,吸脓羔(靖西),红姑娘、竹节草(南宁);四川:玄麻根,〔生扯拢〕(德昌),糯米叶、旋麻、〔糯稻草〕(成都),姐妹花(峨眉),筲箕藤(夹江);贵州:米浆藤,铁箍蔓草,铁箍草(贵阳);云南:小铁箍(丽江),小粘药、小藤药(楚雄),红头带、小览(昆明),九股牛(大理),小拔毒散(玉溪),小郎根(曲靖),摸铺铺(红河),水猴子,土茄藤。

功效 根、茎、叶:健脾消食,清热利湿,解毒消肿。用于消化不良,食积胃痛,白带,疟疾。外用子血管神经性水肿,疔疮疖肿,乳腺炎,跌打肿痛,外伤出血。

#### 7169047

*Gonostegia pentandra* (Roxb.) Miq. var. *hypericifolia* (Blume) Masamune --- *Memoralis pentandra* (Roxb.) Wedd. var. *hypericifolia* (Blume) Wedd.

植物名 狭叶糯米团《高植图鉴补编》

地方名 台湾:石薯,石珠子。

功效 茎叶:外用子创伤,拔恶血。

#### 7169048

*Laportea bulbifera* (Sieb. et Zucc.) Wedd. --- *L. terminalis* Wight --- *L. oleracea* Wedd. --- *L. sinensis* C. H. Wright --- *L. bulbifera* var. *sinensis* Chien --- *L. dielsii* Pamp.

植物名 珠芽艾麻《高植图鉴》

药材名 艾麻草(陕西、甘肃、贵州)、《汇编》

文献名 苧麻《植物名汇》,毛蕨《和汉药标本目录》,零余子苧麻《中国植物图鉴》,艾麻《吉野》,华中艾麻《高植图鉴》,珠芽蟹麻、顶花蟹麻《秦岭植志》,华艾麻草《中药大辞典》,华中艾麻草《江西药录》,顶花艾麻《云南种录》,蟹麻《神农架药录》

地方名 火麻(陕西、甘肃),蟹麻子(江西、黑龙江);陕西:铁秤砣;浙江:牡丹三七(临安),野绿麻;湖北:一窝蛆、蛇麻草、蛆儿麻(神农架);湖南:红藿麻,“拿给公”(瑶语);广西:麻风树,麻风草(富川);四川:火麻子,红活麻(峨眉山);贵州:红禾麻,禾麻草;云南:顶花火麻。

功效 全草、根:祛风除湿,活血,利水化石。用于疝积,尿路结石,风湿麻木,跌打损伤,无名肿毒,小儿肺热咳嗽。

#### 7169049

*Laportea interrupta* (L.) W. L. Chew --- *Fleurya interrupta* (L.) Gaud.

植物名 红小麻《云南种录》

文献名 屏东桑草《台湾药植志》

功效 叶:用于痢疾;根:利尿。

#### 7169050

*Laportea kotoensis* Hayata

植物名 兰屿咬人狗《台湾药植志》

功效 叶、根:用于瘰癧。

## 7169051

*Laportea macrostachya* (Maxim.) Ohwi --- *Sceptrocnide macrostachya* Maxim. --- *Laportea grossedentata* C. H. Wright

植物名 艾麻《高植图鉴》

药材名 红线麻《汇编》

文献名 山苎麻《中国经植志》，大序艾麻《汇编》

地方名 陕西：〔千年老鼠屎〕，火麻，红苎麻，红火麻，蝎子草（太白）；湖北：蛇麻草（巴东、恩施），火麻草（神农架）。

功效 根：有小毒。祛风湿，通经络，解毒消肿。用于腰腿疼痛，麻木不仁，风痹水肿，淋巴结核，蛇咬伤。

## 7169052

*Laportea meyeniana* (Walp.) Warb. --- *L. pterostigma* Wedd.

植物名 咬人狗火麻树《高植图鉴补编》

地方名 台湾：咬人狗，咬人猫。

功效 叶、花、根：外用于瘰癧，痈疽，肿毒发背。

## 7169053

*Laportea sinuata* (Blume) Miq. --- *L. crenulata* (Roxb.) Wedd. --- *L. integrifolia* Wu

植物名 全缘叶火麻树《高植图鉴补编》

文献名 全叶树火麻《植分学报》，圆齿艾麻《海南植志》

地方名 广西：天下无敌手，不可摩，把守天门，艾麻草，老虎喇。

功效 叶：有大毒。接骨止痛，消肿祛瘀。外用于跌打骨折，外伤出血。

## 7169054

*Laportea urentissima* (Gagnep.) Chew

植物名 火麻树《高植图鉴补编》

药材名 树火麻《思茅本草》

文献名 麻风树《高植图鉴》

地方名 云南：电树，“憨掌”（傣名）。

功效 树皮：驱蛔虫。

备考 其毛刺、毒汁有大毒，刺触皮肤，烧痛感可持续数天，严重时可致小孩于死地。

## 7169055

*Laportea violacea* Gagnep. --- *L. vitifolia* Hand. -Mazz.

植物名 广西艾麻《高植图鉴补编》

文献名 葡萄叶艾麻《广西《园林药录》》

地方名 广西：麻风草（龙州），豆麻；其他：麻风叶。

功效 根：健胃镇静。用于疳积，癫痫，胃脘痛；全株：用于祛风湿。

## 7169056

*Lecanthes peduncularis* (Royle) Wedd.

植物名 假楼梯草《高植图鉴》

文献名 筋管草《广西药录》，绿山麻柳《元江哈尼族药》

地方名 四川：水菟菜（凉山）；云南：“啊车扒女”（元

江哈尼语）。

功效 根：拔毒，消肿，接骨；全草：用于肺结核。

## 7169057

*Maortia puya* (Wall.) Wedd.

植物名 水丝麻《高植图鉴》

药材名 白山麻柳《元江哈尼族药》

地方名 广西：普爷麻；四川：三元麻；云南：“啊车车补”（元江哈尼语），翻白叶。

功效 根：清热解毒，消肿止痛。外用于疮疖红肿。

## 7169058

*Nanocnide japonica* Blume

植物名 花点草《高植图鉴》

药材名 花点草《汇编》

文献名 荷包草《纲目拾遗》，高墩草《中药大辞典》

地方名 浙江：幼油草（天目山）。

功效 全草：清热，润肺，止咳，化痰，止血。用于咳嗽，咯血，肺结核，痔疮，瘰子。

## 7169059

*Nanocnide pilosa* Migo --- *N. lobata* Wedd.

植物名 毛花点草《高植图鉴》

药材名 雪药《四川中药志》

文献名 花点草《广西植录》，毛叶冷水花《浙江药植志》，裂叶花点草《神农架药录》

地方名 波丝草（湖南、贵州）；浙江：红细草；湖北：小九龙盘（宜昌），灯笼草、蛇草（神农架）；湖南：水麻菜；广西：〔透骨消〕（临桂），狗断肠（柳城、忻城），遍地红（融安）。

功效 全草：清热解毒，通经活血。用于烧烫伤，疮疖，瘰子，麻疹，骨折，跌打损伤，无名肿毒，毒蛇咬伤。

## 7169060

*Oreocnide frutescens* (Thunb.) Miq. --- *O. fruticosa* (Gaud.) Hand. -Mazz. --- *Villebrunea fruticosa* (Gaud.) Nakai

植物名 紫麻《高植图鉴》

药材名 紫麻《汇编》

文献名 小麻叶《分类草药性》，水麻叶、紫苎麻《四川中药志》，火水麻子、天青地白《汇编》

地方名 水苎麻（湖北、四川）；广西：假山麻（胎平），雪果（宾阳）；四川：白水苎麻，火麻条；贵州：野麻；云南：大叶麻，大毛叶。

功效 全草：行气，活血，清热解毒。用于感冒发热，透发麻疹，月痕病；根：用于跌打损伤，牙痛；叶：外用于小儿麻疹发热。

## 7169061

*Oreocnide kwangsiensis* Hand. -Mazz.

植物名 广西紫麻《高植图鉴补编》

文献名 广西花点草《广西药录》

地方名 广西：青橘叶（那坡），甘梅花（忻城）。

功效 根、叶：接骨。外用于接骨，疮毒。

## 7169062

*Oreocnide pedunculata* (Shirai) Masamune

植物名 长梗紫麻《高植图鉴补编》

文献名 长梗紫麻、有梗紫麻《台湾药植志》

地方名 台湾;山水柳。

功效 树皮:外用于肿疡。

#### 7169063

*Parietaria micrantha* Ledeb.

植物名 墙草《高植图鉴》

药材名 墙草《汇编》

文献名 小花墙草《东北草本植志》,墙草根《福建中草药》,石茹菰、白猪子果、袜子草《汇编》

地方名 福建:白石薯(莆田、福州、南平),田薯,红薯(晋江、永春、漳州、厦门、同安),软骨红薯(泉州),细叶贯菜(永定、永春),水萝卜(南平),干菜子(武平),指甲薯(福安),白猪仔菜(福安、霞浦)。

功效 块根、叶:拔脓消肿。用于脚底深部脓肿,痈疽,疔疳,多发性脓肿。

#### 7169064

*Pellionia heteroloba* Wedd.

植物名 异被赤车《广西药录》

功效 全草:用于浮肿,消化不良。外用于烧烫伤。

#### 7169065

*Pellionia minima* Makino

植物名 山椒草《浙江天目药志》

文献名 卜罗草《汇编》

地方名 浙江:塌地草(临安)。

功效 全草:外用于关节扭伤,鸡眼脚。

#### 7169066

*Pellionia radicans* (Sieb. et Zucc.) Wedd. --- *Elatostema radicans* (Sieb. et Zucc.) Wedd.

植物名 赤车《高植图鉴》

药材名 赤车《汇编》

文献名 赤车使者《唐本草》,坑冷《浙南本草新编》,阴蒙藤、小铁木、吊血丹《中药大辞典》

地方名 浙江:岩下青、冷坑青(嵊县),拔血红(仙居),风阳草(衢县),坑兰(丽水、温州、文成、泰顺);福建:毛骨草(闽清、尤溪),天门草(顺昌),猴接骨(武平);贵州:岩苋菜,到老嫩。

功效 全草、根:祛瘀,消肿,解毒,止痛。用于挫伤肿痛,牙痛,疖子,毒蛇咬伤。

#### 7169067

*Pellionia repens* (Lour.) Merr.

植物名 吐烟花《海南植志》

药材名 吐烟花《汇编》

地方名 海南:吐烟草。

功效 全草:清热利湿。用于急慢性肝炎,神经衰弱。外用于过敏性皮炎,下肢溃疡,疖肿。

#### 7169068

*Pellionia scabra* Benth. --- *Elatostem scabrum* (Benth) Hall. f.

植物名 蔓赤车《高植图鉴》

药材名 毛赤车《汇编》

文献名 粗糙楼梯草《广西药录》

地方名 浙江:接骨草(临安),坑兰(温州),水漩青(泰顺),坑冷(文成、瑞安);湖北:水田草(罗田);广东:羊眼草、石解骨(惠阳);广西:细点草(玉林),[茵陈](博白),石寒公(平南),[鸡骨香](田林),楼梯草(灵川),香蕉草,接骨仙子,赤车,破血藤;贵州:石杨梅,豆瓣草。

功效 全草:清热解毒,凉血散瘀。用于急性结膜炎,流行性腮腺炎,扭挫伤,牙痛,带状疱疹,妇女闭经,毒蛇咬伤等。

#### 7169069

*Pellionia subundulata* W. T. Wang var. *angustifolia* W. T. Wang

植物名 狭叶赤车《广西药录》

功效 全草:清热利湿。

#### 7169070

*Pellionia trilobulata* Hayata

植物名 三裂赤车《贵州药录》

功效 全草:清热消肿,活血化瘀。用于急性关节炎,跌打肿痛。

#### 7169071

*Pellionia tsoongii* (Merr.) Merr.

植物名 长柄赤车《高植图鉴》

文献名 钟氏赤车草《广西药录》

功效 全草:清热解毒。用于疔疮。

#### 7169072

*Pilea angulata* (Blume) Blume --- *P. stipulosa* Miq.

植物名 圆瓣冷水花《高植图鉴补编》

药材名 圆瓣冷水花《广西药录》

文献名 棱枝冷水花《高植图鉴》

功效 茎、叶:祛风,活血。

#### 7169073

*Pilea aquarum* Dunn --- *P. velutinipes* Hand. -Mazz. ---

*P. brevicornuta* Hayata

植物名 湿生冷水花《高植图鉴补编》

文献名 短角冷水花《高植图鉴》

地方名 广西:四轮草(东兰)。

功效 全草:用于疮疡肿毒。

#### 7169074

*Pilea basicordata* W. T. Wang

植物名 基心叶冷水花《广西药录》

药材名 接骨风《汇编》

文献名 冷水花《广西本草选编》,心叶冷水花《广西药园药录》

地方名 广西:红瓣草(上林)。

功效 全草:清热解毒,散瘀消肿。用于烧烫伤,跌打肿痛,骨折,疮疖。

#### 7169075

*Pilea cavaleriei* Levl. --- *P. crassifolia* Hance

植物名 波缘冷水花《高植图鉴》

药材名 石油菜《广西中药志》

文献名 厚叶冷水花《高植图鉴》，肉质冷水花《湖北植志》，石茺茜《广西药录》

地方名 石茺菜(湖南、广西)；湖南：冻疮药，见肿消，石芽草，凉心草；广西：滴水人，〔石花菜〕，肥奴奴草，小石芥(陆川)，冷冻草、疳积草(富川、钟山)，肥猪菜(柳江)，打不死、背花疮(贵县)，〔金钱草〕(龙州)，石西洋菜(柳州)；贵州：肥猪草。

功效 全草：清热解毒，润肺止咳，消肿止痛。用于肺热咳嗽，肺结核病，肾炎水肿。外用子跌打损伤，烧、烫伤，疮疖肿毒。

## 7169076

*Pilea japonica* (Maxim.) Hand. -Mazz. --- *Achudernia japonica* Maxim.

植物名 山冷水花《高植图鉴补编》

药材名 苔水花《汇编》

文献名 山美豆《中国植物图鉴》，日本冷水花《广西药园药录》

地方名 四川：红水草。

功效 全草：清热解暑，渗湿利尿。用于扁桃体炎，尿路感染，子宫颈炎，赤白带下。

## 7169077

*Pilea lomagramma* Hand. -Mazz.

植物名 隆脉冷水花《高植图鉴补编》

文献名 急尖冷水花《高植图鉴》

地方名 湖北：肥猪草(利川)；四川：鼠舌草(峨眉)。

功效 全草：用于凉寒腹痛，烫火伤。

## 7169078

*Pilea longicaulis* Hand. -Mazz.

植物名 长茎冷水花《高植图鉴补编》

地方名 广西：接骨风、白淋草(临桂)。

功效 全草：散瘀消肿。外用子跌打损伤，烧、烫伤。

## 7169079

*Pilea microphylla* (L.) Lieb.

植物名 小叶冷水花《高植图鉴补编》

药材名 透明草《广西本草选编》

文献名 小叶冷水麻《台湾植志》

地方名 广西：玻璃草。

功效 全草：清热解暑，安胎。用于痈疮肿痛，无名肿毒，烧、烫伤。

## 7169080

*Pilea mongolica* Wedd. --- *P. hamaoi* Makino --- *P. viridissima* Makino

植物名 透茎冷水花《高植图鉴补编》

药材名 透茎冷水花《汇编》

文献名 荫地冷水花《湖北植志》，钩状冷水花《云南种录》，青美豆、蒙古冷水花《浙江药植志》，美豆《东北草本植志》

地方名 浙江：直苎麻(临安)；江西：野麻；广西：冰糖草；四川：水麻叶；其他：玉接骨。

功效 根、茎：利尿解热，安胎，消肿解毒。用于糖尿病，孕妇胎动，先兆流产；叶：止血。用于创伤出血，

瘀血；根、叶：用于急性肾炎，尿道炎，出血，子宫脱垂，子宫内膜炎，赤白带下。

## 7169081

*Pilea notata* C. H. Wright

植物名 冷水花《高植图鉴》

药材名 冷水花《汇编》

地方名 水麻叶(贵州、四川)；福建：山羊血(福州)，白山羊；湖北：蛆儿麻(神农架)；湖南：甜草；贵州：〔土甘草〕(安龙)。

功效 全草：清热利湿。用于黄疸，肺结核。

## 7169082

*Pilea peltata* Hance

植物名 舌叶冷水花《高植图鉴》

文献名 盾状冷水花《广西药录》

地方名 广西：独色草(柳江)，〔四季青〕(罗城)，大石芥(陆川)，铜钱草(那坡)，石油菜(宁明)。

功效 全草：解毒。用于疳积，肺结核吐血，肺脓疡，疥疮，跌打损伤。外用子疮疡肿毒，跌打损伤。

## 7169082a

*Pilea peperomoides* Diels

植物名 镜面草《新华本草纲要》

药材名 镜面草《名实图考》

地方名 云南：岩金花，紫常绿，跌打散，镜面叶，翠屏草。

功效 全草：消炎，消肿。用于丹毒，接骨。

## 7169083

*Pilea peploides* (Gaud.) Hook. et Arn.

植物名 矮冷水花《高植图鉴》

药材名 矮冷水花《汇编》

文献名 孪茎冷水花《广西植录》，圆叶豆瓣草、坐镇草《汇编》

地方名 浙江：苔水花，透明草(黄岩)；福建：地油仔，膏油仔(松溪、政和)，蚯蚓草(崇安)，蚯蚓藤草；广西：大石油菜(罗城)，虎牙草(全州)。

功效 全草：清热解暑，祛瘀止痛。用于跌打损伤，骨折，痈疖，肿毒，蛇咬伤。

## 7169084

*Pilea plataniflora* C. H. Wright --- *P. taiioensis* Hayata --- *P. kankacensis* Hayata

植物名 石筋草《高植图鉴补编》

药材名 石筋草《滇南本草》、《汇编》

文献名 全缘冷水花《海南植志》，西南冷水花《高植图鉴》

地方名 湖北：六月冷(巴东)，过金桥(神农架)；广西：石稔草、石头花(隆林)；贵州：到老嫩；云南：软三股筋，软枝三股筋，草本三股筋，石芦草、石岩菜，狗骨节(昆明)，石翁草，羊肚参，〔霸王鞭〕，狗岩菜，贼骨果，大苞药。

功效 全草：舒筋活络，消肿利尿，止痛。用于风湿痹痛，筋骨疼痛，手足麻木，肾炎水肿，尿闭，类风湿病，肝炎。

## 7169085

*Pilea rotundinucula* Hayata

植物名 圆果冷水花《高植图鉴补编》

文献名 圆果冷清草《台湾药植志》

功效 叶：外用于敷头痛。

#### 7169086

*Pilea scripta* (Ham.) Wedd. --- *P. symmeria* Wedd.  
var. *salwinensis* Hand. -Mazz.

植物名 细齿冷水花《高植图鉴补编》

药材名 九节风《云南药录》

文献名 怒江蛇毛草《云南种录》

地方名 云南：水麻。

功效 全草：散瘀，止痛，软坚，活血。用于跌打损伤，骨腐，骨折。

#### 7169087

*Pilea sinofasiata* C. J. Chen --- *P. fasiata* Franch.

植物名 粗齿冷水花《高植图鉴》

药材名 紫绿草《贵州草药》

文献名 扇花冷水花《广西药录》

地方名 广西：走马胎（北流），大麻叶（全州），“阿伯秀”（苗语）；贵州：青药，云南：扁花冷水花、水甘草、〔大茴香〕（红河）。

功效 全草：理气止痛，清热解毒，润肺止咳。用于咳嗽，高热，消化不良，咽喉疼痛，喉炎声哑，鹅口疮，扁桃腺炎，胃气痛。

#### 7169088

*Pilea swinglei* Merr. --- *P. crateriformis* Metc. --- *P. henryana* C. H. Wright

植物名 三角形冷水花《高植图鉴》

药材名 三角叶冷水花《汇编》

文献名 中原冷水花《东北草本植物志》，史维冷水花《浙江天目药志》

地方名 浙江：玻璃草；湖北：冷子草（神农架）。

功效 全草：解毒消肿。用于毒蛇（竹叶青）咬伤。

#### 7169089

*Pilea symmeria* Wedd. --- *P. wrightii* Wedd.

植物名 大果冷水花《高植图鉴补编》

药材名 蛇毛草（湖北）、《云南种录》

文献名 水麻《云南种录》，中南冷水花《神农架药录》

地方名 湖北：九节风。

功效 全株：用于跌打损伤，胃癌，骨折。

#### 7169090

*Pilea trinervia* Wight

植物名 三脉冷水花《高植图鉴补编》

药材名 三脉冷水花《广西《园林药录》》

功效 全草：清热利水，消肿止痛。用于尿路感染，喉痛。外用于丹毒，跌打，烫、火伤。

#### 7169091

*Pilea tsiangiana* Metc.

植物名 海南冷水花《高植图鉴补编》

地方名 广西：拿虎（龙州）。

功效 茎、叶：清热解毒。

#### 7169092

*Pilea verrucosa* Hand. -Mazz.

植物名 疣果冷水花《高植图鉴补编》

药材名 疣果冷水花《广西药录》

地方名 四川：土甘草。

功效 全草：清热解毒。用于脾虚，水肿。外用于疮疡肿毒。

#### 7169093

*Pouzolzia elegans* Wedd.

植物名 雅致雾水葛《高植图鉴》

药材名 水鸡油《台湾药植志》

地方名 台湾：济地燕。

功效 干内皮：外用于头痛，肿疡；根、叶、种子：用于肿疡。

#### 7169094

*Pouzolzia sanguinea* (Blume) Merr. --- *P. viminea* (Wall.) Wedd.

植物名 红雾水葛《高植图鉴》

药材名 红雾水葛《云南中草药》

文献名 卵叶雾水葛《广西植录》

地方名 海南：野麻公（白沙）；广西：涩叶树（武鸣），水麻叶（天峨）；四川：〔升麻〕、玄麻（西昌）；云南：土升麻，小粘榔（曲靖），大粘药、大槐（昆明），山毛柳、黄毛芽、〔接骨木〕、粘药根、大粘榔（红河），血升麻（文山），山麻柳，小粘榔药，粘榔药，秋克，接骨灵，毛辣虫棵，青白麻叶，籽藤，水麻，红水麻（麻栗坡），粘巴巴叶，大粘叶，铁箍散。

功效 叶、根：祛风湿，舒筋络。用于风湿筋骨疼痛，乳腺炎，疮疖红肿，骨折；根皮：用于胃肠炎，外伤出血，刀枪伤。

#### 7169095

*Pouzolzia zeylanica* (L.) Benn. --- *P. indica* (L.) Gaud.  
var. *alienata* (L.) Wedd.

植物名 雾水葛《高植图鉴补编》

药材名 雾水葛《生草药性备要》、《汇编》

文献名 脓见消、吸脓膏《生草药性备要》

地方名 浙江：山三茄（乐清）；福建：石茄（福州），田薯（闽南），石薯；台湾：石珠子；广东：贯菜（惠阳），杜藤头（潮安）；广西：拔脓膏（陆川、平南、贵县），生肉药（博白），猪竹菜（乐业、凌云），山参（龙州），地消散（南宁）；云南：粘榔根，水麻秧，粘榔果。

功效 全草：清热利湿，解毒排脓。用于痢疾，肠炎，尿路感染。外用于疖肿，乳腺炎。

#### 7169096

*Pouzolzia zeylanica* (L.) Benn. var. *microphylla* (Wedd.) W. T. Wang

植物名 多枝雾水葛《高植图鉴补编》

地方名 台湾：石珠，石珠子，雾水葛；广西：强盗草（武鸣）。

功效 全草：用于肺结核；叶：外用于肿疡，梅毒；根：外用于骨折，疮疡肿毒。

#### 7169097

*Procris crenata* C. B. Robins. --- *P. wightiana* Wall. ---  
*P. laevigata* auct. non Blume --- *Elatostema laevi-gatum*  
auct. non (Blume) Hassk.

植物名 藤麻《高植图鉴》

药材名 眼睛草《云南中草药》

文献名 石羊菜《广西药录》, 乌来草《台湾药植志》,  
平滑楼梯草《中药大辞典》

地方名 广东: 金玉叶(惠阳), 野公菜(茂名); 海南:  
虾火菜; 广西: 下山连(大瑶山, 金秀), 连甲棒(乐业),  
假榄角(龙州), 石羊草; 贵州: 山七; 云南: 石骨丹(思  
茅), 一支林(文山)。

功效 全草: 清热解毒, 散瘀消肿。外用于骨折,  
跌打损伤, 烫伤, 无名肿毒, 皮肤溃瘍; 茎、叶: 清热解  
毒, 退翳明目。用于角膜云翳, 急性结膜炎。外用于水  
火烫伤。

备考 有些文献将本种学名误订为 *Procris laevi-*  
*gata* Blume 或 *Elatostema laevi-gatum* (Blume) Has-  
sk.

#### 7169098

*Urtica angustifolia* Fisch. ex Hornem. --- *U. dioica* L.  
var. *angustifolia* Ledeb.

植物名 狭叶荨麻《高植图鉴》

药材名 狭叶荨麻《汇编》

文献名 窄叶荨麻《青海中草药》, 荨麻根《贵州民间方  
药集》

地方名 小荨麻(内蒙古、云南), 螫麻子(东北); 内  
蒙古: “哈拉海”(蒙名); 新疆: 猋麻; 云南: 细荨麻。

功效 全草: 有小毒。祛风定惊, 消食通便。用于  
风湿关节痛, 产后抽风, 小儿惊风, 小儿麻疹后遗症, 高  
血压, 消化不良, 大便不通。外用于荨麻疹初起, 蛇咬  
伤。

#### 7169099

*Urtica cannabina* L.

植物名 猋麻《高植图鉴》

药材名 麻叶荨麻《汇编》

地方名 螫麻子(东北), 猋麻(陕西、甘肃、宁夏), 蝎  
子草(内蒙古、黑龙江); 河北: 席麻; 内蒙古: “哈拉盖”、  
“哈拉海”(蒙名); 甘肃: 火麻。

功效 全草: 有小毒。祛风湿, 凉血定痉。用于高  
血压病。外用于荨麻疹初起, 风湿性关节炎, 毒蛇咬  
伤, 小儿惊风。

#### 7169100

*Urtica cyanescens* Kom.

植物名 乌苏里荨麻《东北草本植志》

地方名 内蒙古: “哈拉海”(蒙名)。

功效 全草: 有小毒。用于风寒咳嗽, 风湿疼痛,  
皮肤痒疹, 幼儿惊吐, 糖尿病。

#### 7169101

*Urtica dioica* L.

植物名 异株荨麻《西藏植志》

药材名 钱麻《滇南本草》

文献名 单性荨麻《中国经植志》, 宽叶荨麻《新疆中  
草药》

功效 茎叶: 用于中风不语, 咳嗽吐痰, 小儿惊风,  
一切风症。

#### 7169102

*Urtica fissa* Pritz. --- *U. thunbergiana* auct. non Sieb. et  
Zucc.

植物名 荨麻《云南种录》

药材名 荨麻《图经》、《四川中药志》

文献名 猋麻《益部方物略记》, 蕺麻《墨庄漫录》, 蕺  
草《白香山集》, 毛蕺《纲目》, 痛痛草《牧野日图》, 蝎子  
草《科裁》, 白活麻《汇编》, 裂叶荨麻《高植图鉴》

地方名 火麻草(湖北、贵州), 白火麻(湖南、四川);  
陕西: 火麻; 台湾: 刺草, 咬人猫; 湖北: 透骨风、白老虎  
麻(神农架), 蛇麻草、小蛇麻草(巴东), 蕺麻草根, 小红  
活麻草; 湖南: 活麻, 木槽, 蕺毛草; 四川: 青活麻(西  
昌), 活麻草; 贵州: 禾麻草, 合麻草, 白禾麻; 云南: 猋  
麻、红活麻、蝎麻(文山); 西藏: “山钟”(藏名); 其他: 白  
蛇麻, 蛇麻, 贺麻草, 贺马草。

功效 全草: 有小毒。祛风除湿。用于风湿骨痛,  
小儿吐乳, 皮肤湿疹, 产后抽风, 小儿惊风, 荨麻疹。

备考 有些文献将学名误订为 *Urtica thunbergi-*  
*ana* Sieb. et Zucc.

#### 7169103

*Urtica laetevirens* Maxim. --- *U. dentata* Hand.-Mazz.  
--- *U. pachyrrhachis* Hand.-Mazz. --- *U. silvatica*  
Hand.-Mazz.

植物名 宽叶荨麻《高植图鉴》

药材名 螫麻(东北)

文献名 红活麻、湖北红活麻《汇编》, 螫麻子、虎麻  
草《西藏植志》, 齿叶荨麻《神农架药录》, 荨麻《民族药  
志》, 森林荨麻《贵州药录》

地方名 内蒙古: “哈拉海”(蒙名); 新疆: 猋麻;  
湖北: 蛇麻草(神农架); 贵州: 小禾麻; 西藏: “山  
钟”(藏名)。

功效 全草、根和种子: 有小毒。祛风定惊, 消  
食通便。用于风湿关节痛, 产后抽风, 小儿惊风, 小  
儿麻疹后遗症, 消化不良, 大便不通。外用于荨麻疹  
初起, 蛇咬伤。

#### 7169104

*Urtica macrorrhiza* Hand.-Mazz.

植物名 粗根荨麻《高植图鉴》

药材名 青活麻《汇编》

文献名 巨根荨麻《中国经植志》

地方名 云南: 荨麻, 火麻, 活麻, 老虎麻。

功效 全草: 祛风湿, 解痉, 解毒。用于风湿性关  
节炎, 高血压, 小儿惊风, 产后抽风, 荨麻疹, 毒蛇咬伤。

#### 7169105

*Urtica mairei* Levl.

植物名 云南荨麻《高植图鉴》

药材名 大荨麻(云南红河)、《汇编》

文献名 滇藏荨麻《西藏植志》

地方名 云南: 荨麻(红河), 猋麻、蝎麻(文  
山), 钱麻。



**功效** 全草：祛风除湿，活血，止痛，止痒。用于风湿麻木，关节痛，劳伤疼痛，疝痛，水肿，毒蛇咬伤，皮肤瘙痒，小儿惊风吐乳，妇女产后体虚。

## 7169106

*Urtica triangularis* Hand.-Mazz.

植物名 三角叶荨麻《西藏植志》

药材名 三角叶荨麻《汇编》

地方名 西藏：花叶活麻，火麻。

**功效** 全草：祛风湿，解痉，活血。

**备考** 在西藏与青活麻（*U. macrorrhiza* Hand.-Mazz.）同等入药。

## 7169107

*Urtica triangularis* Hand.-Mazz. f. *pinnatifida* Hand.-Mazz. --- *U. triangularis* Hand.-Mazz. ssp. *pinnatifida* (Hand.-Mazz.) C.J. Chen

植物名 羽裂荨麻《云南种录》

地方名 宁夏：荨麻、蝎子草（六盘山区）。

**功效** 全草：有毒。祛风湿，解痉，止血。

## 7171 冬青科 Aquifoliaceae

## 7171001

*Ilex aculeolata* Nakai

植物名 满树星《高植图鉴补编》

药材名 满树星《汇编》

文献名 鼠李冬青《广西药录》

地方名 湖北：满树星；广西：称星木（博白），天星根、烫膏仔木、满天星（平南），土甘草（岑溪），养牛仔（资源），天星木；其他：点称树，青梅叶。

**功效** 根皮：清热解毒，止咳化痰。用于感冒咳嗽，烧烫伤，牙痛。

## 7171002

*Ilex angulata* Merr. et Chun

植物名 棱枝冬青《高植图鉴补编》

地方名 广西：山绿茶。

**功效** 叶：清热解毒，消炎消肿，通经活血。用于高血压，口腔炎，疖肿，慢性喉炎，妇科附件炎，降胆固醇等。

## 7171003

*Ilex asprella* (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.

植物名 秤星树《名实图考》、《高植图鉴》

药材名 岗梅《汇编》

文献名 岗梅根、槽楼星、檀楼星《生草药性备要》，〔秦皮〕《名实图考》，灯秤根、灯秤子根、灯秤仔头、白甘草、万点金、岗梅叶《岭南采药录》，梅叶冬青《广西药录》

地方名 土甘草（湖南、广东、广西），山梅根（江西、广东），白点称（福建、广西），百解（湖南、广西），百解茶（湖南、广东），百点金（福建、台湾），点称星（江西、广东），秤星子柴（福建、湖南），秤星木（广东、广西）；浙江：土白芍、称花柴（泰顺）；福建：山青梅（诏安），订称仔（龙海），千斤称、红平草（泉州），称星柴（闽南），牛柳尿、称花茶；台湾：订称花，订称根，乌鸡骨，风

梅根；湖南：星子柴（永兴），秤百根（淑浦），麻子树（新宁），犁蜡树（常德）；广东：秤星根（广宁、四会、怀集、封开、德庆），点秤木（湛江），点秤树（阳江、新会、台山、罗定），点秤蕈（茂名），青梅叶（河源、连平、龙川），青梅根（广州、从化、花县），梅根，岗梅树（南海），苦梅树（惠阳），苦梅根（增城），假青梅（东莞、博罗），七星蕈（清远），点星根（英德），点杆树（阳江），点秤根、先苦后甜（花县），青名树（兴宁），合仔蕈（连县），轻骨头（五华），山甘草（潮阳）；广西：秤杆根、金包银（南宁），天星根（梧州、南宁），满天星（容县），天星木，百解树（金秀），假甘草（临桂），假秤星。

**功效** 根、叶：清热解毒，生津止渴。用于感冒，高热烦渴，扁桃体炎，咽喉炎，气管炎，百日咳，肠炎，痢疾，传染性肝炎，野蕈、砒霜中毒。

## 7171004

*Ilex corallina* Franch.

植物名 珊瑚冬青《高植图鉴》

文献名 红果冬青《峨眉植物图志》，红珊瑚冬青《秦岭植志》，野白蜡叶《汇编》

**功效** 根、叶：清热解毒，活血止痛。用于烫火伤，劳伤疼痛，黄癣。

## 7171005

*Ilex corallina* Franch. var. *pubescens* S. Y. Hu

植物名 毛枝冬青《高植图鉴》

药材名 毛枝冬青《汇编》

**功效** 根：清热解毒。用于腹痛，酒精中毒。

## 7171006

*Ilex cornuta* Lindl. et Paxt.

植物名 枸骨《本草拾遗》、《高植图鉴》

药材名 功劳叶（江苏、浙江、湖北），《品种论述》

文献名 木蜜《诗疏》，枸骨叶、枸骨树皮《本草拾遗》，猫儿刺、狗骨《纲目》，枸骨刺《本草汇言》，根木《本草经疏》，十大功劳、枸骨子、苦丁茶《本经逢原》，八角茶《本草从新》，角刺茶、老鼠刺《纲目拾遗》，大虎刺、红果树、猫儿屎《植物名汇》，杠骨树《药学名词合编》，老虎刺叶《中草药学》，红矛、狗筋《品种论述》

地方名 八角刺（浙江、安徽、江西、湖南、广西），功劳子（江苏、浙江），鸟不宿（江苏、上海、安徽、江西）；北京：苦丁叶；江苏：老虎刺（镇江），八角子，六角刺，鸟不宿叶，老虎脚底枝，老鼠树，〔虎刺〕，猫儿香；上海：功劳树；浙江：猫脚爪（杭州），功劳根，枸骨茶；江西：老鼠筋（吉水），枸筋（吉安），狗青芳；安徽：角刺，狗儿刺，狗白骨，刺苦丁茶；福建：扛谷树，枸骨根；湖北：苦茶；湖南：羊角刺（永兴），羊角筋（衡山），狗公刺、猫公刺（长沙），八角莲；广东：鹅掌筋（惠阳）；广西：天鼠红（桂林），龟蓬筋（梧州），山猫象，老鼠怕，散血丹；四川：耗子牙（峨眉山）；其他：闹狗子，老虎刺子，老鼠刺子，六角茶。

**功效** 叶：清热养阴，平肝，益肾。用于肺癆咯血，骨蒸潮热，头晕目眩，高血压症；果：固涩下焦。用于白带过多，慢性腹泻；根：祛风止痛。用于风湿关节酸痛，腰酸劳损，头痛，黄疸型肝炎。

## 7171007

*Ilex crenata* Thunb.

植物名 钝齿冬青《高植图鉴》

文献名 波缘冬青《台湾药植志》

地方名 台湾:假黄杨。

功效 树皮粘液:用于制作捕蝇胶、拌创膏。

#### 7171008

*Ilex elmerilliana* S. Y. Hu

植物名 厚叶冬青《高植图鉴》

药材名 厚叶冬青《江西药录》

功效 根、叶:消炎,解毒。用于水火烫伤。

#### 7171009

*Ilex ficoidea* Hemsl.

植物名 榕叶冬青《高植图鉴》

地方名 广东:仿腊树(龙头山);广西:上山虎(鹿寨)。

功效 根:清热解毒,祛风止痛。用于肝炎,跌打肿痛;叶:消炎,解毒。用于水火烫伤。

#### 7171010

*Ilex formosana* Maxim.

植物名 台湾冬青《云南种录》

药材名 糊桤《台湾药植志》

地方名 台湾:苦株。

功效 树皮粘液:用于作捕蝇胶,拌创膏,皮肤病治疗剂等。

#### 7171011

*Ilex franchetiana* Loes.

植物名 山枇杷《高植图鉴》

药材名 山枇杷《分类草药性》、《汇编》

文献名 康定冬青《云南种录》,川鄂冬青《汇编》,樊氏冬青《四川中药志》

地方名 四川:山枇杷叶,野枇杷;云南:黑皮紫条(镇雄)。

功效 叶:降气平喘,敛肺止咳。用于久咳气喘,咳痰带血;根、叶:用于崩漏;果实:用于瘰癧,风湿麻木。

#### 7171012

*Ilex godajam* (Colebr.) Wall.

植物名 米碎木《高植图鉴》

药材名 米碎木《广西药录》

地方名 广西:救必应(博白)。

功效 树皮:用于腹痛,蛔虫病。

#### 7171013

*Ilex hainanensis* Merr.

植物名 海南冬青《高植图鉴》

药材名 山绿茶《广西上林》、《广西药录》

地方名 广西:胶树(融水),小叶熊胆(灵山)。

功效 叶:清热解毒,消炎消肿,通经活血。用于高血压病,口腔炎,疖肿,慢性喉炎,妇科附件炎,降胆固醇。外用于跌打损伤,疮疖;根:用于咽喉炎。

#### 7171014

*Ilex hylonoma* Hu et Tang var. *glabra* S. Y. Hu

植物名 刺叶冬青《广西药录》

地方名 广西:跌打王(横县)。

功效 根:消肿止痛。用于跌打损伤,风湿痛;叶:用于跌打损伤。

#### 7171015

*Ilex integra* Thunb.

植物名 细叶冬青《台湾药植志》

文献名 藕树(小泉《药植》),藕木《树分》、全缘冬青《种称补编》、本藕《台湾药植志》

地方名 台湾:冈梅根(嘉义),乌藕,糊桤;河南:苦连茶,秦树;湖南:冻青树、青皮树(衡阳);其他:黏胶树。

功效 树皮:用于蜈蚣、蝎及其他毒虫咬伤,疝气,脚气病;根、茎:用于淋病,肺炎咳嗽,肿毒。

#### 7171016

*Ilex kudingcha* C. J. Tseng

植物名 苦丁茶冬青《广西药录》

药材名 大叶苦丁茶(拟)

文献名 苦灯茶《本草求真》

地方名 广西:苦丁茶,苦登茶,大叶茶,茶理菜。

功效 叶:消炎解暑。

#### 7171017

*Ilex kwangtungensis* Merr.

植物名 广东冬青《高植图鉴》

功效 根、叶:消炎,解毒。用于水火烫伤。

#### 7171018

*Ilex latifolia* Thunb.

植物名 大叶冬青《高植图鉴》

文献名 波萝树《通雅》,宽叶冬青《云南种录》

地方名 浙江:将军柴(龙泉),黄菠萝(余姚);安徽:大苦丁;江西:大叶苦丁茶。

功效 叶:凉血平肝,解暑,益肾阴。

#### 7171019

*Ilex lohfaensis* Merr.

植物名 矮冬青《高植图鉴》

文献名 罗浮冬青《广西植录》

功效 根、叶:消炎,解毒。用于水火烫伤。

#### 7171020

*Ilex macrocarpa* Oliv.

植物名 大果冬青《高植图鉴》

地方名 云南:臭樟树(晋宁),青刺香(师宗)。

功效 根、叶:消炎,解毒。用于水火烫伤。

#### 7171021

*Ilex macrocarpa* Oliv. var. *longipedunculata* S. Y. Hu

植物名 长梗冬青《高植图鉴》

文献名 长序大果冬青《广西植录》

功效 根、叶:消炎,解毒。用于水火烫伤。

#### 7171022

*Ilex macropoda* Miq.

植物名 大柄冬青《高植图鉴》

功效 根、叶:消炎,解毒。用于水火烫伤。

#### 7171023

*Ilex microcoeca* Maxim.

植物名 小果冬青《高植图鉴》  
文献名 细果冬青《海南植志》  
功效 根、叶：消炎解毒。用于水火烫伤。

## 7171024

*Ilex micrococca* Maxim. f. pilosa S. Y. Hu  
植物名 毛梗小果冬青(拟)  
文献名 毛小果冬青《广西植录》，毛梗冬青《高植图鉴》，毛梗细果冬青《广西植录》  
地方名 云南：绿姑妮树，绿樱桃(屏边)。  
功效 树皮：止痛。

## 7171025

*Ilex pedunculosa* Miq.  
植物名 具柄冬青《高植图鉴》  
药材名 一口血《湖北中草药志》  
文献名 长柄冬青《广西药录》，长梗冬青《秦岭植志》，冬青、冻青、刻脉冬青《台湾药植志》  
地方名 湖北：一口红(竹溪)。  
功效 叶：清热解毒，止血止痛。用于外伤出血，风湿关节痛，腰疼，跌打损伤，皮肤皲裂、瘢痕；种子：驱风。

## 7171026

*Ilex pernyi* Franch.  
植物名 猫儿刺《高植图鉴》  
药材名 老鼠刺《贵州草药》  
文献名 硬叶冬青《西昌中草药》，枸骨冬青《四川中药志》  
地方名 陕西：狗骨头(平利)；四川：老虎刺、猫刺(西昌)，枸骨，三尖角刺，刺楸子，相枕刺。  
功效 根：清热解毒，润肺止咳。用于肺热咳嗽，咯血，咽喉肿痛，角膜云翳；树皮、枝、叶：代枸骨用。

## 7171027

*Ilex pubescens* Hook. et Arn.  
植物名 毛冬青《高植图鉴》  
药材名 毛冬青《汇编》  
文献名 高山冬青《湖南药物志》  
地方名 毛拔树(浙江、安徽、广东、广西)，细叶冬青(浙江、湖南、广东)，茶叶冬青(浙江、广东)，喉毒药(广东、广西)；浙江：小叶野冬青(衢县、义乌)，山冬青(龙泉)，苦田螺(乐清)，山桐油(永嘉、乐清)，白银柴(乐清、泰顺)，羊饭根、野羚羊(永嘉)，老鼠啃，细叶青，山羚羊(浙南)；安徽：毛叶冬青；江西：毛栋子；福建：[大青]，毛菜(明溪)，毛雌子、雌鸡子樵(清流、宁化)，毛珠子旗、猪骨子樵(清流)，美仔蕉(福州)，猫秋子草(上杭、长汀)，矮梯、耐糊梯(三明)，梯树(永安、三明)；湖南：毛皮树，米碎丹；广东：[六月雪](曲江)，乌尾丹(翁源)，山熊胆、山水银(阳春)，细叶白银香(新丰)，毛梯树，水火丹，水火药；广西：三钱银(桂平)，火焰木，米碎木(苍梧)，贼老鼠、酸味木(平南)，[土甘草]，女维树，乌尾丁，六月霜，古毛根，纸浆木，痛树，贼老鼠，银灰木。  
功效 根、叶：活血通脉，消肿止痛，清热解毒。用于心绞痛，心肌梗死，血栓闭塞性脉管炎，中心性视网

膜炎，扁桃体炎，咽喉炎，小儿肺炎，冻疮

## 7171028

*Ilex pubescens* Hook. et Arn. var. glaber Chang  
植物名 秃毛冬青《汇编》  
文献名 火烧头《中药志》  
功效 根、茎、叶：活血通脉，消肿止痛，清热解毒；根：用于冠心病，心绞痛。

## 7171029

*Ilex pubescens* Hook. et Arn. var. kwangsiensis Hand. Mazz.  
植物名 广西毛冬青《广西植录》  
功效 叶：生肌，去毒，润喉。

## 7171030

*Ilex purpurea* Hassk. --- *Celastrus adenophylla* Miq. ---  
*Ilex chinensis* auct. non Sims  
植物名 冬青《唐本草》、《高植图鉴补编》  
药材名 四季青(江苏)、《汇编》  
文献名 冬青子、冬青叶、冻生、冻青《本草拾遗》，冬青皮《日华子本草》，冬青木、冬青实《图经》，万年枝《群芳谱》，过冬青、铁炉散《植物名汇》，紫花冬青《种分》  
地方名 一口血(湖南、广西)，红冬青(江西、四川)，大冬青(江西、湖南)；江苏：四季青叶；浙江：山冬柴(天台)，不冻柴(遂昌)，冬青树；安徽：疮草；江西：一口红(吉安)，大叶青(丰城)，对叶荷(贵溪)，满口红；湖南：冻江木，冻青树，青皮柴、青架树(衡山)，油叶树(益阳)；广东：鸡眼睛(英德)，顶树子(连县)；广西：水汤药(藤县)，青皮浪；四川：青皮树，观音茶；其他：青硬树。  
功效 叶：清热解毒，消肿祛瘀。用于肺炎，急性咽喉炎，痢疾，胆道感染。外用于烧伤，下肢溃疡，麻风溃瘍；果实：祛风，补虚。用于风湿痹痛，痔疮；树皮：止血，补益肌肤。

备考 过去文献常将本种误订为 *Ilex chinensis* Sims，浙江个别地区曾发现以本种果混作女贞子(木樨科植物)，应予区别。

## 7171031

*Ilex rotunda* Thunb.  
植物名 铁冬青《高植图鉴》  
药材名 救必应《岭南采药录》、《汇编》  
文献名 白沉香《中国经植志》  
地方名 山熊胆(福建、广东)，大叶冬青(广东、广西)，白银香(江苏、福建、广西)，白银树(福建、广西)；浙江：白山叶(云和)，白皮冬青(天台)，冬青柴(建德)，红子儿(龙泉)，胶叶柴，铁钉柴；安徽：山桐青；福建：冬青(仙游)，游民茶；台湾：马口树，白银，糊棒；湖北：高粱树(利川)；广东：白兰香、百日红皮、白银香皮、熊胆树皮(广州)，白银树皮(潮汕)，大叶胶树(仁化)，大叶白银香、白棉树、自然树、熊胆木皮(英德)，白樟树，白熊胆木；广西：九层皮、过山枫(桂平)，小风藤(玉林)，山苦桂(河池)，大古端木、假象皮木(梧州)，土甘草，白凡木(贺县)，白银木(平南)，红熊胆、碎骨木(博白)，猪胆木(那坡、百色、德保)，熊胆木(博白、容县、北流、岑溪)，龙胆子，狗屎木；其他：山冬青，冬青仔。

功效 树皮:清热凉血,消炎,止痛。用于暑湿感冒发热,咽喉肿痛,脘腹胀痛,腹泻,痢疾。外用于烧、烫伤;果实:用于溃疡出血。

## 7171032

*Ilex rotunda* Thunb. var. *microcarpa* (Lindl. ex Pax.) S. Y. Hu

植物名 微果冬青《高植图鉴》

文献名 微果铁冬青《云南种录》,小果铁冬青《浙南本草新编》,毛铁冬青《海南植志》

地方名 广西:熊胆木(博白)。

功效 树皮、根、叶:清热凉血,消炎止痛;果实:用于溃疡出血。

## 7171033

*Ilex serrata* Thunb.

植物名 落霜红《高植图鉴补编》

药材名 落霜红《汇编》

地方名 江西:小叶冬青(德兴),细叶冬青(婺源),细毛全冬(定南);福建:庵草,猫秋子草,落霜红根。

功效 根皮、叶:清热解毒,凉血,止血。用于烧烫伤,创伤出血,疮疖溃疡,肺病。

## 7171034

*Ilex stewardii* S. Y. Hu

植物名 滇桂冬青《云南种录》

药材名 山绿茶《广西》

文献名 黔越冬青《广西植录》

功效 叶:清热解毒,消炎消肿,通经活血。用于高血压,口腔炎,疖肿,慢性喉炎,妇科附件炎,降胆固醇。

## 7171035

*Ilex suaveolens* (Levl.) Loes.

植物名 香冬青《高植图鉴》

文献名 甜冬青《广西植录》

功效 根、叶:消炎,解毒。用于水、火烫伤。

## 7171036

*Ilex triflora* Blume

植物名 三花冬青《高植图鉴》

地方名 广西:小冬青(龙胜)。

功效 根:用于疮疡肿毒。

## 7171037

*Ilex tsoii* Merr. et Chun

植物名 紫果冬青《高植图鉴》

文献名 乐昌冬青《广西植录》

功效 根、叶:消炎,解毒。用于水、火烫伤。

## 7171038

*Ilex viridis* Champ. ex Benth. --- *Ilex triflora* Blume var. *viridis* (Champ.) Loes.

植物名 亮叶冬青《高植图鉴》

药材名 亮叶冬青《汇编》

文献名 细叶冬青《广西植录》,细叶三花冬青《海南植志》

地方名 绿冬青(浙江、福建);福建:大叶帽子(明溪),鸡子樵、鸭子樵、青皮子樵、猪黑樵、薄叶冬青(宁

化、清流)。

功效 叶:凉血解毒,祛腐生新。用于水、火烫伤,外伤出血;根:用于关节痛。

## 7171039

*Ilex wilsonii* Loes.

植物名 尾叶冬青《高植图鉴》

文献名 江南冬青《云南种录》,庐山冬青《广西植录》

功效 根、叶:消炎,解毒。用于水、火烫伤。

## 7172 岩高兰科 Empetraceae

## 7172001

*Empetrum nigrum* L. var. *japonicum* K. Koch --- *E. nigrum* L. var. *asiaticum* Nakai ex H. Ito

植物名 东北岩高兰《中国植志》

文献名 岩高兰《东北木本图志》

功效 果实:可供药用。

## 7173 卫矛科 Celastraceae

## 7173001

*Catha edulis* Forssk.

植物名 巧茶《广西药园药录》

功效 叶:作兴奋剂。

## 7173002

*Celastrus aculeatus* Merr.

植物名 过山枫《高植图鉴补编》

文献名 落霜红、(穿山龙)《高植图鉴》

功效 根:用于类风湿性关节炎,痛风,肾炎,胆囊炎,高血压病。

## 7173003

*Celastrus angulatus* Maxim.

植物名 苦皮藤《高植图鉴》

药材名 苦树皮《汇编》

文献名 棱枝南蛇藤《陕西中草药》,虫草药、玉红架、麻桑皮《土农药志》

地方名 虫药(河南、山东),萝卜药(河南、陕西、四川),酸枣子藤(四川、云南),大钓鱼杆(陕西、四川),马断肠(浙江、江苏、甘肃),莱虫药(江西、陕西),苦树(江西、江苏),老虎麻、老虎麻藤(贵州、四川);河北:马肠;陕西:莱药(眉县),南蛇藤(镇坪),马贯肠;浙江:蝗虫药;江西:牛虱姑,苦通皮,涩包;湖北:莱药根、假黄藤(神农架),南蛇根;四川:钓鱼竿(万县),大钓鱼竿,大马桑;贵州:吊杆麻;云南:南山叶,白沙藤,苦皮树。

功效 根或根皮:有小毒。清热利湿,杀虫。用于秃疮,黄水疮,头癣,骨折肿痛,阴痒。

## 7173004

*Celastrus flagellaris* Rupr.

植物名 刺苞南蛇藤《高植图鉴》

药材名 刺南蛇藤《东北本草》

文献名 刺叶南蛇藤《中国经植志》

地方名 爬山虎(东北)。

功效 根、茎、果实:祛风湿,强筋骨,活血止痛。

用于风湿性关节炎, 跌打损伤。

#### 7173005

*Celastrus gemmatus* Loes.

植物名 哥兰叶《高植图鉴》

药材名 霜红藤(江苏、江西、四川),《汇编》

文献名 大芽南蛇藤《中国经植志》

地方名 米汤叶(陕西、江苏); 陕西: 山货榔; 江苏: 绵条子; 浙江: 苦树皮(杭州); 福建: [穿山龙]; 湖北: 小叶菜药、兰蛇草(神农架); 广西: 三叶泡(资源), [钻地风](恭城); 云南: 调杆麻(鲁甸), 白皮条、钓竿麻, 山货郎(曲靖), 小红藤、白花藤(玉溪)。

功效 根: 舒筋活血, 散瘀。用于风湿关节痛, 月经不调, 带状疱疹, 荨麻疹, 湿疹; 茎、叶: 补肾固脱, 益气。用于饮食不佳, 子宫脱垂, 脱肛。

#### 7173006

*Celastrus glaucophyllus* Rehd. et Wils.

植物名 灰叶南蛇藤《高植图鉴补编》

文献名 过山枫藤、藤木、麻麻藤《高植图鉴补编》, 粉叶南蛇藤《云南种录》

地方名 贵州: 麻妹条, 霜叶南蛇藤。

功效 根: 化瘀消肿, 止血生肌。用于跌打损伤, 刀伤出血, 肠内便血。

#### 7173007

*Celastrus glaucophyllus* Rehd. et Wils. var. *rugosus* (Rehd. et Wils.) C. Y. Cheng et T. C. Kao --- *Celastrus rugosus* Rehd. et Wils.

植物名 皱脉灰叶南蛇藤《高植图鉴补编》

药材名 皱叶南蛇藤《新华本草纲要》

地方名 贵州: 南蛇藤(湄潭)。

功效 根: 有小毒。用于小儿麻疹, 风湿, 劳伤。

#### 7173008

*Celastrus hindsii* Benth.

植物名 青江藤《高植图鉴》

药材名 青江藤《广西药录》

文献名 野茶藤、黄果藤《高植图鉴》

地方名 广西: 麻藤(大新)。

功效 根: 通经, 利尿。

#### 7173009

*Celastrus hookeri* Prain

植物名 滇边南蛇藤《高植图鉴补编》

文献名 藤麻南蛇藤《广西植录》, 蛇藤《汇编》, 毛枝南蛇藤《湖北植志》

地方名 福建: [穿山龙]; 广西: 藤麻。

功效 根: 有小毒。活血行气, 疏风祛湿。

#### 7173010

*Celastrus hypoleucus* (Oliv.) Warb.

植物名 粉背南蛇藤《高植图鉴》

药材名 绵藤《贵州草药》

文献名 白背南蛇藤《植分学报》, 博根藤、落霜红《中药大辞典》

地方名 贵州: 麻妹条叶, “来阿片”(雷公山苗语)。

功效 根、叶: 有小毒。化瘀消肿, 止血生肌。外

用于跌打红肿, 刀伤。

#### 7173011

*Celastrus kusanoi* Hayata

植物名 圆叶南蛇藤《海南植志》

药材名 称星蛇(广东),《汇编》

文献名 草野南蛇藤《植分学报》

地方名 广东: 双虎排牙(阳春); 广西: [铁包金]、过山风(平南), 风药(金秀)。

功效 根: 宣肺除痰, 止咳解毒。用于喉痛, 喉炎, 初期肺结核。

#### 7173012

*Celastrus oblanceifolius* Wang et Tsoong

植物名 窄叶南蛇藤《高植图鉴补编》

文献名 倒披针叶南蛇藤《浙江药植志》

地方名 浙江: 南蛇藤。

功效 根、藤: 祛风活血, 消肿止痛; 叶: 解毒, 散瘀。

#### 7173013

*Celastrus orbiculatus* Thunb. --- *C. articulatus* Thunb.

植物名 南蛇藤《高植图鉴》

药材名 南蛇藤《名实图考》、《汇编》

文献名 金银柳《盛京通志》, 金红树、果山藤、药狗旦子《植物名汇》, 蔓落霜红《树分》, 过山风、挂廊藤《中国药植志》

地方名 明开夜合、[黄藤]、穷挽藤、[合欢](辽宁、山东), [合欢花](华北), 鸦雀食(东北), 南蛇风(陕西、湖南), 地南蛇(江西、陕西), [过山龙](江西、浙江、广东), 过塘蛇(安徽、江西), 老牛筋(辽宁、广西); 辽宁: 老石棵子; 吉林: “闹巴登棍”(朝名); 陕西: [川山龙]、叫咀藤(宝鸡); 山东: 哈哈笑(昆崙山、崂山), 胭脂叶(莱芜、昌潍), 狗葛子(莒县), 老鸦眼(益都), 猴子鞭(蒙山); 江苏: 挂郎芭, 苦树皮, 降龙藤, 香龙草, 挂廊鞭(云台山), 降龙草; 上海: 月藤; 浙江: 泥下蛇(温州), 泥底蛇(丽水); 江西: 钻骨龙(南丰), 金腰带(丰城), [南藤](景德镇), 钻山龙; 福建: [穿山龙]; 河南: 葛菜叶, 麻山条; 湖北: 七寸麻, 齐寸麻; 湖南: 大伦藤, 大南蛇, 白龙, 老龙皮, 臭花椒, 四十八节草(永兴)。

功效 根、藤: 祛风活血, 消肿止痛。用于风湿性关节炎, 跌打损伤, 腰腿痛, 闭经; 果: 安神镇静。用于神经衰弱, 心悸, 失眠, 健忘; 叶: 解毒, 散瘀。用于跌打损伤, 多发性疖, 毒蛇咬伤。

#### 7173014

*Celastrus orbiculatus* Thunb. var. *jeholensis* (Nakai) Kitag. --- *C. jeholensis* Nakai --- *C. articulatus* Thunb. var. *jeholensis* (Nakai) Kitag.

植物名 大果南蛇藤《东北药用植物》

地方名 辽宁: 明开夜合、云柳(绥中), [合欢花]。

功效 根、藤、叶及果实(合欢): 祛风湿, 行气活血, 消肿解毒, 止痛。用于风湿性关节炎, 四肢麻木, 跌打损伤, 腰腿痛, 闭经, 小儿惊风, 痧症, 痢疾, 痈疽肿毒; 果实: 安神镇静, 用于神经衰弱, 心悸, 失眠, 健忘, 筋骨疼痛, 腰腿麻木。

## 7173015

*Celastrus paniculatus* Willd.

植物名 灯油藤《高植图鉴》

药材名 滇南蛇藤《广西植录》

文献名 圆锥南蛇藤《西双版纳傣药志》, 锥序南蛇藤《高植图鉴》, 红果藤《中国经植志》

地方名 云南: 打油果, “嘿麻屯”(傣语)。

功效 根: 用于痢疾, 腹泻, 腹痛; 种子: 缓泻, 催吐, 镇静。

## 7173016

*Celastrus punctatus* Thunb.

植物名 光果南蛇藤《台湾药植志》

药材名 台东南蛇藤《台湾药植志》

文献名 点纹南蛇藤《中国经植志》

地方名 台湾: 穿山龙, 山龙片。

功效 茎、叶: 止痛。外用于敷疮。

## 7173017

*Celastrus rosthornianus* Loes.

植物名 短梗南蛇藤《高植图鉴》

药材名 白花藤《新华本草纲要》

文献名 滇南蛇藤《广西药录》, 褐柄南蛇藤《广西植录》, 少果南蛇藤《云南种录》

地方名 四川: 黄绳儿; 贵州: 南蛇藤; 云南: 大藤菜, 山货榔(曲靖)。

功效 根: 舒筋活血, 镇静, 镇痛, 止血。用于筋骨痛, 扭伤, 胃痛, 闭经, 月经不调, 牙痛, 失眠, 无名肿毒; 根皮: 用于蛇咬伤, 肿毒。

## 7173018

*Celastrus stylosus* Wall. --- *Celastrus stylosus* Wall. ssp. *glaber* Hou

植物名 显柱南蛇藤《高植图鉴补编》

药材名 山货榔《云南中草药》

文献名 无毛南蛇藤《汇编》, 无毛明柱南蛇藤《植分子学报》, 茎花南蛇藤《云南种录》

功效 茎: 有小毒。祛风消肿, 解毒消炎, 舒筋活络。用于脉管炎, 肾盂肾炎, 跌打损伤。

## 7173019

*Euonymus acanthocarpus* Franch.

植物名 刺果卫矛《高植图鉴补编》

文献名 棘果卫矛《广西植录》, 红杜仲、金丝杜仲《中药通报》

地方名 贵州: 小千金, 硬筋藤, 扣子花; 云南: 藤杜仲(中甸), 刺果藤仲(丽江)。

功效 茎皮: 用于妇科出血, 风湿, 外伤出血, 跌打, 骨折; 根: 祛风湿, 散寒。用于风湿关节痛, 月经不调, 跌打损伤。

## 7173020

*Euonymus acanthocarpus* Franch. var. *scandens* (Loes.) R. A. Blak.

植物名 攀生刺果卫矛《云南种录》

文献名 刺果卫矛《鉴别手册》, 刺果藤仲《汇编》

地方名 云南: 藤杜仲(丽江)。

功效 藤: 祛风除湿, 通经活络。用于风湿疼痛, 外伤出血, 跌打损伤。外用于骨折。

## 7173021

*Euonymus aculeatus* Hemsl.

植物名 软刺卫矛《高植图鉴补编》

药材名 小千金《汇编》

文献名 皮刺卫矛《广西植录》, 黄刺卫矛《高植图鉴》, 紫刺卫矛《湖北植志》, 白背紫刺卫矛《云南种录》

地方名 湖南: [千斤拔]; 其他: 硬筋藤。

功效 根: 祛风除湿, 舒筋活络。用于风湿疼痛, 脚转筋。

## 7173022

*Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. --- *E. sacrosancta* Koidz.

植物名 卫矛《高植图鉴》

药材名 卫矛《本经》、《汇编》

文献名 鬼箭《本经》, 神箭《广雅》, 鬼箭羽《日华子本草》, [狗骨]《图经》, 曲节草、六月凌、绿豆青《名实图考》, 四棱棒、芸杨、鬼见愁《树分》, 魂剪羽、卫矛《满洲植志》, 杪楞树《满蒙植汇》, 鬼鼻子《指示植物》, 风枪林《中国药植志》, 小卫矛《陕甘宁植志》

地方名 八树(江苏、江西、湖北、河北、陕西), 鼻子木(山西、陕西), 千层皮(辽宁、江西), 四棱树(安徽、湖北、江苏、广西、江西), 篦子树(湖南、河南); 辽宁: 刀尖茶, 四棱茶, 雁翎茶; 河北: 山扁榆, 四楞榆, 巴棱鸭了; 陕西: 巴木, 篦子木(秦岭); 山东: 刮头篦子(莒县、临沂、海阳), 鬼箭翅(烟台), 割漆刀、漆妹子刀(威海), 斩鬼箭、不禁摸(昆崙山), 脆枝条(莱芜), 斩鬼剑; 江苏: 小八柴、拔树(盱眙), 小鬼篦子, 鬼篦子(连云港、云台山), 四面鼠、韦陀鞭(南京), 见肿消, 四角树, 方梗树; 浙江: 四面箭(嵊县、天台、乐清), 四方柴, 四面戟, 鬼剑令, 天师剑(龙泉), 卫肚边, 篦箕柴(临安、永康、东阳、缙云); 安徽: 山鸡条子, 四边刀; 江西: 四角棒、华陀箭(德兴); 河南: 小叶鬼见愁; 湖北: 扒树(神农架); 湖南: 六月梭, 四面风, 四把刀, 四方风, 剑骨风, 鼻子风, 梳篦风, 篦梳风(常德), 穿裤子树(衡山); 广东: 百日回阳、麻药(连县); 四川: 梭楞树(南川), 干篦子; 贵州: 鬼见羽。

功效 根、带翅的枝及叶: 行血通经, 散瘀止痛。用于月经不调, 产后瘀血腹痛, 跌打损伤肿痛。

## 7173023

*Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. var. *pubescens* Maxim.

植物名 毛脉卫矛《高植图鉴》

药材名 鬼箭羽《华北、东北》

文献名 卫矛《本经》, 毛脉卫矛《汇编》, 东北卫矛《新华本草纲要》

地方名 四棱树、山鸡条子(东北), 鬼箭(吉林、河南), 八树(江苏、江西、河北); 内蒙古: “额莫根-查干”、“莫计东”(蒙名)。

功效 茎枝: 破血, 活血化瘀, 止痛。用于心绞痛, 冠心病。

## 7173024

*Euonymus angustatus* Sprague

植物名 紫刺卫矛《高植图鉴补编》

文献名 狭叶卫矛《广西植录》，棱枝卫矛《广西药录》

地方名 贵州：小千金，硬筋藤。

功效 根：祛风除湿，舒筋活络。用于风湿疼痛，脚转筋。

## 7173025

*Euonymus bockii* Loes.

植物名 南川卫矛《广西药录》

地方名 广西：大叶扶芳藤（那坡）；贵州：土杜仲〔茎皮〕。

功效 根、茎枝：行血止痛。用于高血压病，风湿疼痛。

## 7173026

*Euonymus carnosus* Hemsl.

植物名 肉花卫矛《高植图鉴》

药材名 痰药（湖北）、《汇编》

文献名 野杜仲、土杜仲《高植图鉴》，厚萼卫矛《江苏植志》

地方名 浙江：四棱子（临安）；江西：金丝杜仲。

功效 树皮、根皮、果、叶：祛风湿，舒筋络，补肾，软坚散结。用于痢疾初起，腹痛，肾虚腰痛，风湿疼痛，瘀血闭经，淋巴结核。

## 7173027

*Euonymus centidens* Levl.

植物名 百齿卫矛《高植图鉴》

文献名 地育干《高植图鉴》

地方名 广西：扶芳本（融安），竹叶青（资源），山杜仲（金秀）。

功效 茎皮、根：活血化瘀，强筋壮骨。用于腰膝疼痛，跌打损伤，月经不调。外用于毒蛇咬伤。

## 7173028

*Euonymus chinii* Hand. -Mazz.

植物名 宝兴卫矛《中药通报》

地方名 四川：红杜仲（天全、雅安、宝兴），缘舒筋。

功效 皮：祛风除湿，通经活络。

## 7173029

*Euonymus cornutus* Hemsl.

植物名 角翅卫矛《高植图鉴》

药材名 角翅卫矛《峨眉药植研究》

文献名 小角果卫矛《云南种录》

地方名 湖北：折蛛树（神农架）；四川：木螃蟹（峨眉山）。

功效 果实：散寒止咳，除湿热；树枝：消肿，止痒。外用于痒疮，漆疮，红肿疼痛。

## 7173030

*Euonymus dielsianus* Loes.

植物名 裂果卫矛《高植图鉴》

文献名 宜昌卫矛《云南种录》，平塘卫矛《贵州药录》

地方名 浙江：柴杜仲；广西：土杜仲（金秀）

功效 茎皮、根：活血化瘀，强筋壮骨。用于腰膝疼痛，跌打损伤，月经不调。

## 7173031

*Euonymus euscaphis* Hand. -Mazz.

植物名 鸭椿卫矛《高植图鉴》

地方名 浙江：竹杜仲；江西：土杜仲，四棱。

功效 根、根皮：祛风湿。用于血栓闭塞性脉管炎，风湿关节炎，腰痛，跌打损伤。

## 7173032

*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand. -Mazz. --- *E. radicans* Sieb. --- *E. fortunei* (Turcz.) Hand. -Mazz. var. *radicans* (Miq.) Hand. -Mazz.

植物名 扶芳藤《高植图鉴》

药材名 扶芳藤《本草拾遗》、《汇编》

文献名 游藤《本草拾遗》，爬行卫矛《树分》，爬藤卫矛《华北树木志》，爬墙扶芳藤《云南种录》

地方名 土杜仲（浙江、湖南），〔爬墙虎〕（广西、山东、云南），〔络石藤〕（江苏、陕西、河南、湖北、山东），藤卫矛（浙江、云南）；陕西：换骨箭，清风藤（汉中）；山东：过冬青（五莲）；浙江：羊皮花藤，白对叶肾（温州），对叶肾，白墙络（永康、泰顺），拈络藤；江西：过桥风，攀援丝棉木，藤杜仲；河南：卧山虎；湖北：爬山虎（神农架）；湖南：金线风，爬墙草，小风藤，小松藤，岩风草，千层楼，岩石虎，爬墙风，甜茶叶，〔九牛造〕；广西：石边桃（桂林），卫生草（那坡），〔千斤藤〕（富川），山百足（玉林），〔泽兰〕（乐业、桂平、博白、苍梧），水泽兰（凌云），石兰、石骨兰（平南）；四川：坐转藤；贵州：岩青杠，岩青藤，〔万年青〕，靠窗风，青藤，软筋藤，巴筋藤，惊风草（毕节、剑河）；云南：换骨筋（思茅），小藤仲、铁草鞋（文山），绿皮杜仲、棉花杜仲（红河），接骨筋，大树杜仲，金丝杜仲（会泽），银丝杜仲，铁皮杜仲，南瓜米草，小青叶（玉溪）。

功效 茎、叶：散瘀止血，舒筋活络。用于咯血，月经不调，功能性子宫出血，小儿惊风，风湿性关节炎。外用子跌打损伤，骨折，创伤出血。

## 7173033

*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand. -Mazz. var. *alticollis* (Hand. -Mazz.) Rehd.

植物名 高原扶芳藤《云南种录》

地方名 云南：小杜仲、藤杜仲（曲靖），〔杜仲〕（富源），大叶黄皮杜仲（玉溪），小缘皮杜仲（红河）。

功效 茎、根：舒筋活络，止血生肌，接骨。用于咯血，月经不调，月经过多，小儿麻痹。外用于骨折，跌打损伤，风湿关节疼痛，外伤出血。

## 7173034

*Euonymus frigidus* Wall.

植物名 冷地卫矛《高植图鉴补编》

药材名 冷地卫矛《汇编》

文献名 细棉木卫矛《汇编》

地方名 西藏：丝棉木卫矛，卫矛，丝棉木

功效 枝：破血，止痛，杀虫。用于月经不调，瘰结

腹痛, 血晕, 关节炎等症。

### 7173035

*Euonymus grandiflorus* Wall. ex Roxb.

植物名 大花卫矛《高植图鉴》

药材名 痰药《汇编》

文献名 滇桂《名实图考》, 黑杜仲《中国经植志》, 树杜仲、土杜仲《中药通报》

地方名 四棱子(浙江、陕西), 野杜仲(云南、陕西); 湖南: 过山虎; 贵州: 木本青竹标; 云南: 火鸡果, 公鸡果, 鸡娃娃果, 软皮树, 摆衣耳杜(红河), 金丝杜仲(丽江), 银丝杜仲。

功效 树皮、根皮、果、叶: 祛风湿, 舒筋络, 补肾, 软坚散结。用于痢疾初起, 腹痛, 肾虚腰痛, 风湿疼痛, 瘀血闭经, 淋巴结结核。

### 7173036

*Euonymus hamiltonianus* Wall. f. *lanceifolius* (Loes.) C. Y. Cheng --- *E. lanceifolius* Loes.

植物名 披针桃叶卫矛《新华本草纲要》

文献名 毛脉卫矛《贵州药录》, 野杜仲《中药通报》, 披针叶卫矛《高植图鉴》

地方名 杜仲(四川、贵州、云南、浙江)。

功效 茎皮: 用于劳伤疼痛。

### 7173037

*Euonymus hamiltonianus* Wall. ex Roxb. --- *E. europaeus* L. var. *hamiltonianus* (Wall. ex Roxb.) Maxim.

植物名 西南卫矛《高植图鉴》

文献名 桃叶卫矛《纲目》, 明开夜合《盛京通志》, 卫矛、玉牙木、鬼见愁《陕甘宁植志》, 华北卫矛《广西植录》

地方名 湖北: 八树条子(神农架); 贵州: 白皮。

功效 根皮、茎皮: 祛风湿, 强筋骨。用于风湿腰痛, 跌打损伤; 枝、叶: 外用于漆疮。

### 7173038

*Euonymus hamiltonianus* Wall. f. *koehneanus* (Loesen.) Blak.

植物名 西南桃叶卫矛《云南种录》

地方名 云南: 杜仲藤。

功效 根、果: 止鼻血, 止血, 泻热。

### 7173039

*Euonymus hamiltonianus* Wall. var. *yodoensis* (Koehne) Blak.

植物名 东京桃叶卫矛《新华本草纲要》

功效 根、根皮、果实: 用于鼻衄, 血栓闭塞性脉管炎, 风湿, 跌打损伤, 漆疮。

### 7173040

*Euonymus hederaceus* Champ. ex Benth.

植物名 常春卫矛《高植图鉴》

文献名 常春藤卫矛《海南植志》, 红杜仲《中药通报》

地方名 浙江: 藤杜仲; 广东: 土杜仲。

功效 茎、叶: 散瘀止血, 舒筋活络。

### 7173041

*Euonymus ilicioides* C. Y. Cheng, mss.

植物名 景东卫矛《杜仲代用品原植物研究》

地方名 云南: 藤杜仲(景东、元阳)。

功效 茎皮: 在云南景东、元阳等地称藤杜仲入药。

### 7173041a

*Euonymus japonica* Thunb.

植物名 冬青卫矛《高植图鉴》

文献名 大叶黄杨、正木《树分》, 黄爪龙树、冬青木、〔杜仲〕《满洲植录》, 和杜仲《和汉药物学》, 日本卫矛《种分》, 〔泽兰〕《广西药录》, 假杜仲《台湾药植志》

地方名 河北: 扶芳树; 甘肃: 〔冬青〕; 江苏: 〔四季青〕(南京), 〔黄杨〕, 青叶黄杨; 湖南: 〔七里香〕; 广西: 白辣(龙州), 大叶过墙风(桂林); 四川: 〔万年青〕(成都); 贵州: 调经草(遵义), 八木。

功效 根、叶: 调经, 化痰, 利湿解毒, 利尿, 强壮。用于月经不调, 痛经, 跌打损伤, 骨折, 小便不利。

### 7173042

*Euonymus japonica* Thunb. var. *albo-marginata* T. Moore ex Rehd.

植物名 银边冬青卫矛(拟)

文献名 银边黄杨《山东树木志》, 银边大叶黄杨、银边正木、银边卫矛《广西药录》

功效 全株: 活血, 消肿。用于接骨, 跌打损伤。

### 7173043 见 7173041a

*Euonymus jinfoshanensis* Z. M. Gu

植物名 金山卫矛《杜仲代用品原植物研究》

地方名 四川: 土杜仲。

功效 茎皮: 在四川部分地区称土杜仲入药。

### 7173045

*Euonymus kiautschovicus* Loes.

植物名 胶东卫矛《高植图鉴》

文献名 胶州卫矛《浙江药植志》, 攀援卫矛《华北树木志》, 攀援丝棉木《山东树木志》

地方名 江西: 野杜仲, 土杜仲; 湖北: 爬窗虎(神农架)。

功效 茎、叶: 散瘀止血, 舒筋活络。

### 7173046

*Euonymus lawsonii* Clarke var. *salicifolius* (Lous.) Blakel

植物名 柳叶卫矛《高植图鉴补编》

地方名 广西: 青皮狗骨(钦州)。

功效 叶: 外用于跌打损伤。

### 7173047

*Euonymus laxiflorus* Champ.

植物名 疏花卫矛《高植图鉴补编》

药材名 山杜仲(福建龙岩)、《汇编》

文献名 五稔子、佛手仔《高植图鉴》

地方名 土杜仲(广东、广西、福建); 福建: 丝棉木; 台湾: 大丁黄, 大疔黄; 广东: 飞天驳, 涕乌木(粤北); 广西: 木杜仲(北流、藤县、苍梧、昭平), 土续断、落地金



牛、木半七、〔杜仲〕(平南), 五金花(博白), 〔四季青〕(梧州), 〔万年青〕(桂平), 假木香(梧州、南宁), 五角仙(天等), 鱼骨木(防城), “堵仲木”(上林壮语), “烧炮木”(金秀瑶语); 云南: 树仲, “私崩朋麻”(元江哈尼语)

功效 根皮及树皮、茎、叶: 祛风湿, 强筋骨。用于风湿骨痛, 腰膝酸痛, 跌打疼痛, 外伤出血。

## 7173048

*Euonymus linearifolius* Franch.

植物名 线叶卫矛《高植图鉴补编》

药材名 黄皮杜仲《云南药录》

文献名 线叶金丝杜仲《云南种录》

地方名 云南: 刀口药(元江), 金丝杜仲(峨山、易门), 细叶黄皮杜仲(新平), 红皮杜仲(澄江), 小接骨丹(曲靖)。

功效 全株: 补肾壮阳, 舒筋活络, 调经活血, 止血, 接骨。用于慢性肾炎, 月经不调, 闭经, 风湿骨痛, 骨折; 根皮: 用于外伤出血。

## 7173049

*Euonymus maackii* Rupr. --- *E. bungeanus* Maxim.

植物名 白杜《高植图鉴》

药材名 丝棉木《汇编》

文献名 上杜《满洲植录》, 白皂树《中国树木志略》, 华北卫矛、桃叶卫矛、青条《树分》, 玉牙木《陕甘宁植志》

地方名 明开夜合(河北、江苏、河南、陕西、山西), 〔合欢花〕〔果〕(华北、东北、山东), 野杜仲(浙江、安徽、湖北), 土杜仲(浙江、湖南), 〔杜仲〕(华东、湖北、湖南); 内蒙古: “桃日-那布其图-额木根-查干”(蒙名), 榆芽树; 陕西: 月牙树(陕北); 山东: 老乌胭脂条子; 江苏: 漆树叶, 白树, 野狗骨树, 狗夹子, 白杜树; 上海: 白桃树; 浙江: 白樟树, 南仲根(兰溪); 安徽: 小孩拳, 丝棉树; 河南: 杓子树; 湖南: 绿皮树; 贵州: 日开夜合。

功效 根、树皮、果实或枝叶: 有小毒。祛风湿, 活血止血。用于风湿性关节炎, 腰痛, 血栓闭塞性脉管炎, 衄血, 漆疮, 痔疮。

备考 华北地区误以本品果实作合欢花用。华东、湖北、湖南误以其树皮代杜仲用。

## 7173050

*Euonymus microcarpus* (Oliv.) Sprague

植物名 小果卫矛《湖北植志》

药材名 小果卫矛《神农架药录》

地方名 湖北: 岩花树(神农架)。

功效 根茎: 祛风湿, 健筋骨。

## 7173051

*Euonymus myrianthus* Hemsl.

植物名 大果卫矛《高植图鉴》

文献名 多花卫矛《广西植录》, 黄楮《高植图鉴》, 丝棉木《中药通报》

地方名 黑杜仲(江西、湖南); 浙江: 白鸡槿(泰顺); 江西: 土卫矛; 湖北: 梭果树(神农架); 湖南: “洞迫迷”(瑶名); 广西: 梅风(三江), “青得乃”(资源苗语)。

功效 根、茎: 补肾, 活血, 健脾, 利湿。用于产后

恶露不净, 湿热白带, 肾虚腰痛。

## 7173052

*Euonymus nitidus* Benth. --- *E. chinensis* Lindl.

植物名 华卫矛《中药通报》

文献名 黄杨《植物名汇》, 中华卫矛《高植图鉴》, 杜仲藤《汇编》

地方名 广东: 土杜仲, 假杜仲(惠阳); 广西:

炮仗木

功效 全株: 舒筋活络, 强壮筋骨。用于风湿腿痛, 跌打损伤, 高血压。

## 7173053

*Euonymus oblongifolius* Loes. et Rehd.

植物名 矩圆叶卫矛《高植图鉴》

药材名 鸡血蓝《贵州药录》

地方名 福建: 白鸡肫。

功效 根、果: 有小毒。止血, 泻热。用于鼻衄。

## 7173054

*Euonymus orgyalis* W. W. Smith --- *E. peteloffii* Merr.

植物名 六呖卫矛《中药通报》

药材名 缩筋药《中药通报》

地方名 云南: 针丝杜仲、藤杜仲、毛根杜仲(文山、屏边)。

功效 茎、皮: 用于腰痛, 骨折。

## 7173055

*Euonymus oxyphyllus* Miq. --- *Kalonymus oxyphylla* (Miq.) Wang et Li

植物名 垂丝卫矛《高植图鉴》

药材名 青皮树《汇编》

文献名 豆瓣树《树分》, 球果翅卫矛《东北木本图志》, 球果卫矛《浙江药植志》

地方名 山东: 小米饭, 刮头篦子, 暖木; 浙江: 五棱子(临安), 肿风柴(天目山); 安徽: 金丝吊蝴蝶; 湖北: 青丝莲(神农架); 四川: 青皮。

功效 果、根皮、树皮: 用于痼疾初起, 骨折损伤, 阴囊湿疹, 关节酸痛。

## 7173056

*Euonymus paravagans* Z. M. Gu

植物名 滇西卫矛《杜仲代用品原植物研究》

地方名 云南: 藤杜仲、杜仲(腾冲)。

功效 茎皮: 在云南省腾冲等地作杜仲代用品。

## 7173057

*Euonymus pellucidifolius* Hayata

植物名 大丁癩卫矛(拟)

药材名 大丁癩《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾: 〔杜仲〕, 〔和杜仲〕。

功效 根茎: 用于跌打损伤, 退癩, 消炎。

## 7173058

*Euonymus phellomanus* Loes.

植物名 栓翅卫矛《高植图鉴》

药材名 栓翅卫矛《宁夏中草》

文献名 翅卫矛《高原中草》

地方名 宁夏: 鬼箭羽, 白檀子, 八肋木; 湖北: 卫矛

(神农架);四川:“约哦”(若尔盖藏名);其他:有翅卫矛,〔鬼见愁〕。

功效 枝皮:破血落胎,调经续断。用于月经不调,产后腹痛,崩中下血,风湿疼痛。

## 7173059

*Euonymus przewalskii* Maxim.

植物名 八宝茶《高植图鉴》

文献名 甘青卫矛《青海中草药名录》

功效 枝条:活血,破瘀;叶:可代茶。

## 7173060

*Euonymus radicans* var. *acuta* Rehd.

植物名 尖叶爬行卫矛《峨眉药植研究》

地方名 四川:安胃藤(峨眉山)。

功效 全株:开胃健脾,止痛。用于胃痛。

## 7173061

*Euonymus semenovii* Regel et Hard.

植物名 中亚卫矛《高植图鉴补编》

药材名 新疆卫矛《汇编》

地方名 新疆:鬼箭羽,卫矛,“津洽起利”(维吾尔)。

功效 带翅的嫩枝、根:活血消瘀,止痛。用于产后恶露,小腹痛,关节炎,闭经,痢疮红肿。

## 7173062

*Euonymus subsessilis* Sprague

植物名 无柄卫矛《高植图鉴》

文献名 短柄卫矛《广西植录》,绿舒筋《中药通报》

地方名 广西:接骨树(罗城);四川:安胃藤,红杜仲(宝兴、芦山、天全、大竹);贵州:扣子花,岩风。

功效 全株:健脾开胃,止痛。用于胃痛;根皮、茎皮:祛风湿,强筋骨。用于风湿痛,跌打损伤。

## 7173063

*Euonymus tengyuehensis* W. W. Smith

植物名 腾冲卫矛《云南种录》

药材名 白皮《贵州民间药物》

地方名 贵州:牛千斤(惠水);云南:土杜仲,〔杜仲〕,金丝杜仲、红杜仲、红皮杜仲、棉仲(保山、双柏)。

功效 树皮:止血,用于刀伤。

## 7173064

*Euonymus tingens* Wall. ex Roxb.

植物名 染用卫矛《高植图鉴》

文献名 阿于好《高植图鉴》,脉瓣卫矛《云南经植》,金丝杜仲、杜仲《中药通报》

地方名 云南:银丝杜仲(丽江)。

功效 树皮:在云南、四川盐源以此代杜仲使用。

## 7173065

*Euonymus vagans* Wall.

植物名 游藤卫矛《汇编》

药材名 银丝杜仲《汇编》

文献名 石宝茶藤《云南种录》,金丝杜仲《云南药录》

地方名 贵州:白皮(兴仁),牛千金(惠水);云南:银杜仲(丽江),棉杜仲(曲靖),土杜仲,杜仲。

功效 树皮:祛风除湿,补肾,接骨,止血。用于风

湿性腰痛,肾虚腰痛,筋骨萎软等。

## 7173066

*Euonymus venosus* Hemsl.

植物名 曲脉卫矛《高植图鉴补编》

功效 茎皮:在四川省部分地区称藤杜仲入药。

## 7173067

*Euonymus virens* C. Y. Wu, n. sp.

植物名 常绿卫矛《新华本草纲要》

药材名 棉花杜仲《云南药录》

地方名 云南:山杜仲、岩杜仲(曲靖),黄皮杜仲。

功效 树皮:祛风除湿,壮腰止痛,固精。用于劳伤腰痛,肾虚腰痛等。

## 7173068

*Euonymus wilsonii* Sprague

植物名 长刺卫矛《高植图鉴》

文献名 刺果卫矛《树分》,狭叶刺果卫矛《云南种录》,扣子花、岩风《汇编》

地方名 广西:小梅花树;四川:红杜仲(宝兴)。

功效 根:祛风除湿,止痛。用于风湿疼痛,劳伤,水肿。

## 7173069

*Euonymus xylocarpus* C. Y. Cheng et Z. M. Gu

植物名 木果卫矛《杜仲代用品原植物研究》

地方名 云南:土杜仲(盈江)。

功效 皮:云南盈江以此代杜仲使用。

## 7173070

*Euonymus yangbiensis* C. Y. Cheng

植物名 漾濞卫矛《杜仲代用品原植物研究》

地方名 云南:土杜仲、红杜仲(保山)。

功效 茎皮:在云南保山等地作土杜仲。

## 7173071

*Euonymus yunnanensis* Franch. --- *E. decorus* W. W. Smith

植物名 云南卫矛《高植图鉴补编》

药材名 金丝杜仲《名实图考》,《汇编》

文献名 石小豆《名实图考》,大叶金丝杜仲《新华本草纲要》

地方名 土杜仲、黄皮杜仲(四川、云南);云南:棉杜仲,小青黄(曲靖),野石榴(楚雄),狗铃当(富民)。

功效 根皮及茎皮:有毒。祛风湿,散瘀消肿。用于跌打损伤,腰腿痛,风湿疼痛。

## 7173072

*Glyptopetalum feddei* (Levl.) Hou

植物名 罗甸沟瓣《高植图鉴补编》

药材名 罗甸沟瓣《广西药录》

功效 根:用于肝硬化腹水。

## 7173073

*Maytenus austroyunnanensis* S. J. Pei & Y. H. Li

植物名 滇南美登木《云南植物研究》

备考 树木含美登素类抗癌化学成分。

## 7173074

*Maytenus berberoides* (W. W. Sm.) C. Y. Cheng ---

*Gymnosporia berberoides* W. W. Smith

植物名 小檗美登木《高植图鉴补编》

文献名 槲状美登木《云南植物研究》

备考 树木含美登素类抗癌成分。

#### 7173075

*Maytenus confertiflorus* J. Y. Luo et X. X. Chen

植物名 密花美登木《高植图鉴补编》

地方名 广西：“亚棱侧”(大新壮语)。

功效 茎、叶：活血祛瘀，消肿止痛，抗癌。用于跌打损伤。

#### 7173076

*Maytenus diversifolius* (Maxim.) Hou - *Gymnosporia diversifolia* (Hemsl.) Maxim.

植物名 变叶美登木《新华本草纲要》

药材名 刺仔木(海南)

文献名 变叶裸实《高植图鉴》，细叶裸实《海南植物志》

地方名 海南：咬眼刺。

功效 全株：抗癌。

#### 7173077

*Maytenus esquirolii* (Levl.) C. Y. Cheng --- *Gymnosporia esquirolii* Levl.

植物名 贵州美登木《云南植物研究》

备考 树木含美登素类抗癌化学成分。

#### 7173078

*Maytenus graciliramulus* S. J. Pei et Y. H. Li

植物名 细梗美登木《云南植物研究》

文献名 疏花美登木《云南种录》

备考 树木中含美登素抗癌成分。

#### 7173079

*Maytenus hookeri* Loes.

植物名 美登木《高植图鉴》

文献名 云南美登木《药学报》，梅丹《云南种录》

功效 叶：活血化痰。用于癌症初起。

#### 7173080

*Maytenus kuangsiensis* C. Y. Cheng et W. L. Sha

植物名 广西美登木《高植图鉴补编》

地方名 广西：陀螺钮(扶绥)。

功效 根、茎、叶：祛风，止痛，抗癌。

#### 7173080a

*Maytenus lunglinensis* C. Y. Cheng et W. L. Sha

植物名 隆林美登木《高植图鉴补编》

功效 茎、枝、叶：抗肿瘤。

#### 7173081

*Maytenus oliganthus* C. Y. Cheng et W. L. Sha

植物名 少花美登木《高植图鉴补编》

功效 茎、枝、叶：抗肿瘤。

#### 7173082

*Maytenus orbiculata* C. Y. Wu ex S. J. Pei et Y. H. Li

植物名 厚叶美登木《云南植物研究》

药材名 厚叶美登木《新华本草纲要》

功效 叶：活血化痰。用于癌症初起。

#### 7173083

*Maytenus variabilis* (Loes.) C. Y. Cheng --- *Gymnosporia variabilis* Loes.

植物名 刺茶《高植图鉴补编》

文献名 牛王刺、刺茶裸实《高植图鉴》

功效 根：活血化痰。

#### 7173084

*Maytenus variabilis* (Loes.) C. Y. Cheng f. *incanas* C. Y. Cheng W. K. Sha

植物名 广西刺茶《高植图鉴补编》

文献名 刺茶美登木《广西药录》

地方名 广西：皮胡椒(东兰)

功效 叶：外用于下肢溃疡、牛皮癣、神经性皮炎、头癣。

7173085 见 7173080a

#### 7173086

*Tripterygium hypoglaucum* (Levl.) Hutch.

植物名 昆明山海棠《高植图鉴补编》

药材名 昆明山海棠《名实图考》、《汇编》

文献名 紫金皮《滇南本草》，火把花《纲目》，山海棠《云南经植》，猪尿吓、皱果雷公藤《杀虫植物》，云南紫金皮《新华本草纲要》，粉背雷公藤《品种论述》

地方名 掉毛草(云南、四川)，雷公藤(广西、四川、云南)，黄藤根(广西、湖南)；安徽：[黄药]；福建：大茶叶，山枇杷，菜子草；湖南：大叶黄藤，火莽子，“车油根”(苗语)；广西：大黄藤根，南蛇根；四川：脱毛草，黄经；云南：胖关藤(曲靖)，马掌尼，[紫荆皮]，六方藤(楚雄)，九团花，洋道芭，火把芭，金刚藤(红河)，莫哈扎尼，[紫金藤](思茅)，黄蜡藤(宣威)。

功效 根或全株：有大毒。祛风除湿，活血散瘀，续筋接骨。用于类风湿关节炎，纤维组织炎，红斑狼疮，慢性肾炎，血管炎，麻风反应等多种胶原性疾病及自身免疫性疾病。外用于骨折，外伤出血；根皮(云南紫金皮)：有毒。用于痈疮红肿，跌打损伤。

#### 7173087

*Tripterygium regelii* Sprague et Takeda

植物名 东北雷公藤《高植图鉴》

药材名 东北雷公藤《汇编》

文献名 黑蔓《汇编》

地方名 吉林：“录马嘎毛克”(朝名)。

功效 根：有毒。祛风，杀虫。

#### 7173088

*Tripterygium wilfordii* Hook. f.

植物名 雷公藤《高植图鉴》

药材名 雷公藤《纲目拾遗》、《中国药植志》

文献名 蒸龙草、震龙根《纲目拾遗》，[莽草]、水莽、水莽子、水莽莖、黄藤、大茶叶《名实图考》，[黄皮](李《生药》)，刺蓬、[黄药](种分)，菜虫药、红柴根、蝗虫药、断肠草、黄藤草、红药《中国药植志》，山海棠、水莽藤《土农药志》，钩吻《中国中药杂志》

地方名 黄藤根(湖南、广西、浙江)，南蛇根(广西、湖南)；江苏：黄蜡藤；上海：水莽根，木子根，葬坭鱼秋；

浙江: 菜子龙草; 江西: 山莽芭, 山花色; 福建: 菜仔草, 山砒霜(建瓯); 湖北: 南蛇杆子(神农架); 湖南: 水莽草, 三棱花, 旱禾花(淑浦), 水脑子根, 黄腊藤, “蜡心门”(苗语); 广西: 黄藤木(全州), 小黄藤根; 四川: 红毛山藤(米易); 云南: 火把花。

功效 根、叶、花及果实: 有大毒。祛风, 解毒, 杀虫。外用于风湿性关节炎, 皮肤发痒, 杀蛆虫, 子丁, 灭钉螺, 毒鼠。

## 7178 翅子藤科 Hippocrateaceae

### 7178001

*Loeseneriella concinna* A. C. Smith

植物名 程香仔树《中国植志》

药材名 程香仔树《广西药录》

地方名 广西: 青光藤(防城)。

功效 根、茎: 清热解毒。外用于毒蛇咬伤。

### 7178002

*Salacia prinoides* (Willd.) DC.

植物名 五层龙《中国植志》

药材名 五层龙《中药大辞典》

文献名 桫欏木《海南植志》

功效 根: 通经活络, 祛风除湿。用于风湿性关节炎, 腰肌劳损, 体虚无力。

### 7178003

*Salacia sessiliflora* Hand. -Mazz.

植物名 无柄五层龙《中国植志》

药材名 无柄五层龙《广西药录》

地方名 广西: 梭子藤(贺县), 鸡卵黄(防城), 狗卵石; 云南: 野黄果, 野柑子。

功效 果实: 用于胃脘痛。

## 7179 茶茱萸科 Icacinaceae

### 7179001

*Gomphandra tetrandra* (Wall. in Roxb.) Sleum. --- *G. hainanensis* Merr.

植物名 粗丝木《中国植志》

药材名 黑骨走马《汇编》

文献名 毛蕊木(树分), 海南粗丝木《海南植志》

地方名 广西: 海南须蕊木, 黑骨梢(防城), 山萝卜(上思)。

功效 根: 清热利湿, 解毒。用于骨髓炎, 急性胃肠炎。

### 7179002

*Iodes balansae* Gagn.

植物名 大果微花藤《中国植志》

文献名 大果约的藤《广西药录》

地方名 广西: 防己(武鸣)。

备考 根: 利水。用于肾炎, 风湿痹痛。

### 7179003

*Iodes cirrhosa* Turcz.

植物名 微花藤《中国植志》

地方名 广西: 防己(武鸣), 麻雀筋藤、花心藤、吹风

藤(龙州、那坡)。

功效 根: 用于风湿痛。

### 7179004

*Iodes seguini* (Levl.) Rehd.

植物名 瘤枝微花藤《中国植志》

地方名 广西: 白藤(大新), 蛋黄蛇药(玉林), 蛤蚧藤、[丁公藤](龙州); 云南: 辣子果(西畴)。

功效 根: 润肺, 止咳; 茎: 用于风湿痹痛; 叶: 用于毒蛇咬伤。

### 7179005

*Iodes vitiginea* (Hance) Hemsl. --- *I. ovata* Blume var. *vitiginea* (Hance) Gagnep.

植物名 小果微花藤《中国植志》

文献名 微花藤《云南药录》

地方名 广西: 构芭(马山), 吹风藤(龙州), 双飞蝴蝶(来宾), 鸡屎藤(柳州); 云南: 犁耙树(屏边), 岩嘎拉(富宁)。

功效 根、茎: 用于风湿痹痛, 急性结膜炎; 全草: 外用于痔疮。

### 7179006

*Mappiantnus iodoides* Hand. -Mazz.

植物名 定心藤《中国植志》

药材名 甜果藤《汇编》

文献名 麦撒花藤《广西药录》

地方名 海南: 走马胎, 黄马胎; 广西: 铜钻(贺县), 藤蛇总管, 风药, 冻骨风, 黄九牛, 假丁公藤(武鸣、上林); 云南: 羊不吃(红河), “才期期马”(河口瑶语), “顿哩喊”、“邓嘿罕”(傣语); 其他: 马比花。

功效 根或全株: 祛风除湿, 调经活血, 止痛。用于风湿关节炎, 类风湿性关节炎, 黄疸, 跌打损伤, 月经不调, 痛经, 闭经。外用于外伤出血, 毒蛇咬伤。

### 7179007

*Nothapodytes foetida* (Wight) Sleum.

植物名 臭味假柴龙树《中国植志》

文献名 臭假柴龙树、臭马比木《中草药》

功效 地上部分及根: 用于抗癌。

### 7179008

*Nothapodytes pittosporoides* (Oliv.) Sleum.

植物名 马比木《中国植志》

药材名 贵州追风散《汇编》

文献名 海桐假柴龙树《中药大辞典》, 假柴龙树《中草药》, 茶茱萸《峨眉药植研究》

地方名 贵州: 公黄珠子; 其他: 追风伞, 牛刺兰。

功效 根皮: 祛风除湿, 理气散寒。用于浮肿, 小儿疝气, 关节疼痛。

### 7179009

*Peripterygium platycarpum* (Gagnep.) Sleum.

植物名 大心翼果《中国植志》

药材名 大心翼果《广西药录》

功效 根: 用于经闭。

### 7179010

*Peripterygium quinquelobum* Hassk. --- *Cardiopteris*

lobata Wall. ex R.Br.

植物名 心翼果《中国植志》

药材名 裂叶心翼果《广西药园药录》

功效 全株:用于痢疮肿痛。

#### 7179011

*Pittosporopsis kerni* Craib

植物名 假海桐《中国植志》

功效 种子:可入药。

### 7182 铁青树科 Olacaceae

#### 7182001

*Erythralium scandens* Blume

植物名 赤苍藤《中国植志》

药材名 腥藤《广西本草选编》

地方名 海南:牛耳藤,萎藤;广西:土白芍(陆川、北流、博白),蚂蝗藤(凌云),山筋藤、侧扣(龙州),蛇眼草(陆川),龙须藤(龙州、天等、北流),假黄藤(南宁),〔防己〕(贵县),龙须菜、宽心藤(大新),〔木防己〕、杓木、幌幌木、铁青树(上林),菜藤,十丈藤(防城),勾华,侧莨;云南:细绿藤。

功效 全株:清热利尿。用于肝炎,肠炎,尿道炎,急性肾炎,小便不利。

#### 7182002

*Schoepfia chinensis* Gardn. et Champ.

植物名 华南青皮木《中国植志》

文献名 华青皮木《广西本草选编》,管花青皮木《高清图鉴》,青皮木《中国经植志》

地方名 广东:碎骨仔树;海南:香芙木;广西:退骨王(陆川),红巨木,土绞断(昭平),骨碎木(玉林)。

功效 根、树枝及叶:清热利湿,消肿止痛。用于急性黄疸型肝炎。外用于风湿痹痛,跌打损伤,骨折。

#### 7182003

*Schoepfia fragrans* Wall.

植物名 香芙木《中国植志》

功效 根:用于骨折。

#### 7182004

*Schoepfia jasminodora* Sieb. et Zucc.

植物名 青皮木《中国植志》

药材名 脆骨风《汇编》

文献名 幌幌木、素馨地锦树(树分),羊脆骨(云南种录)

地方名 湖北:铁青树(神农架);广东:碎骨风、吊钟花(惠阳);广西:香青皮木,刀把木(金秀);其他:鸡白柴,茶条树。

功效 全株:散瘀,消肿止痛。用于急性风湿性关节炎,跌打肿痛。

### 7183 山柚子科 Opiliaceae

#### 7183001

*Cansjera rheedii* J. F. Gmel.

植物名 山柑藤《中国植志》

文献名 山柑《海南植志》

地方名 广西:捞绞藤(龙州)。

功效 茎:用于小儿惊风。

#### 7183002

*Champereua manillana* (Blume) Merr.

植物名 台湾山柚《中国植志》

药材名 山柚子《台湾》

文献名 拟常山《台湾药植志》

地方名 台湾:山桔子,〔常山〕,山柑、山柑子。

功效 茎、叶:用于风寒湿热。

### 7185 桑寄生科 Loranthaceae

#### 7185001

*Arceuthobium pini* Hawksworth et Wiens

植物名 高山松寄生《中国植志》

药材名 高山松寄生《迪庆藏药》

功效 全株:止吐,止泻。

#### 7185002

*Dendrophthoe pentandra* (L.) Miq. --- *Loranthus pentandrus* L.

植物名 五蕊寄生《中国植志》

药材名 乌槐寄生(广东、广西)

文献名 五蕊桑寄生《海南植志》

地方名 海南:寄生,家生;广西:木波罗寄生(龙州),茶寄生、油桐寄生(马山),茶树寄生、黑槐寄生(宁明)。

功效 全株:益血,安胎。用于痢疾,腰痛,虚癆,肺结核。

#### 7185003

*Helixanthera guangxiensis* H. S. Kiu

植物名 广西离瓣寄生《中国植志》

地方名 广东:小叶山鸡茶;广西:油茶寄生(博山)。

功效 全株:用于跌打损伤。

#### 7185004

*Helixanthera parasitica* Lour. --- *Loranthus pentapetalus* Roxb.

植物名 离瓣寄生《中国植志》

药材名 五瓣寄生《广西药录》

文献名 五瓣桑寄生《海南植志》

地方名 海南:家生,寄生;广西:玉桂寄生(龙州、容县),木棉寄生、油桐寄生(忻城),杉木寄生(北流),枫油寄生(德保、靖西),桂花寄生(靖西);云南:树上茶(屏边)。

功效 枝、叶:祛痰,止痢,祛风,除湿,消肿,补气血。用于痢疾,肺结核,眼角炎。

#### 7185005

*Helixanthera sampsoni* (Hance) Danser --- *Loranthus sampsoni* Hance --- *L. ligustrinus* Wall.

植物名 油茶离瓣寄生《中国植志》

药材名 油茶寄生《广西药录》

文献名 油茶桑寄生《海南植志》

地方名 广西:茶寄生(贺县),牛筋藤寄生、粗糠柴寄生(罗城)。

功 效 全株:用于肺病,咳嗽,风湿痹痛。

### 7185006

*Korthalsella japonica* (Thunb.) Engl. --- *Pseudixus japonica* (Thunb.) Hayata

植物名 栗寄生《中国植志》

药材名 栗寄生《四川中药志》

文献名 杓寄生《湖南药物志》

地方名 湖北:寄生(神农架);湖南:方叶子(通道),吊兰(道县),螃蟹脚、胡龙须(长沙);广东:枫香寄生,枫树蟹爪,老蟹叉;四川:螃蟹夹,寄生包。

功 效 枝叶:用于气痛,跌打损伤。

### 7185007

*Loranthus delavayi* Van Tiegh. --- *L. owatarii* Matsum. et Hayata --- *Hyphear delavayi* (Van Tiegh.) Danser.

植物名 桐树桑寄生《中国植志》

药材名 桐寄生《云南植志》

文献名 总序桑寄生《神农架药录》,小五瓣寄生《广西植志》,大渡氏枫寄生《台湾药植志》,桑树寄生《新华本草纲要》

地方名 湖北:寄生木(神农架);广西:苦辣树。

功 效 茎叶:祛风除湿,通经活络,止痛。

### 7185008

*Loranthus guizhouensis* H. S. Kiu

植物名 南桑寄生《中国植志》

药材名 贵州桑寄生《植分学报》

地方名 贵州:桑寄生。

功 效 全株:祛风胜湿。

备 考 本种常寄生于壳斗科小叶青冈等栎属植物上。

### 7185009

*Loranthus tanakae* Franch. et Sav. --- *Hyphear tanadas* (Franch. et Sav.) Hosok. --- *Loranthus europaeus* auct. non Jacq. --- *Hyphear europaeum* auct. non (Jacq.) Danser

植物名 北桑寄生《中国植志》

药材名 杂寄生(拟)

文献名 [欧洲桑寄生]《山西中草药》, [欧洲栎寄生]《秦岭植志》, [欧亚桑寄生]《植分学报》

地方名 桑寄生(陕西、甘肃、宁夏);山西:杏寄生;陕西:宜枝,枝子(陕北);西藏:榭寄生(昌都)。

功 效 带叶茎枝:祛风湿,补肝肾,强筋骨。

备 考 1. 有的文献将本种学名曾误订为 *Loranthus europaeus* Jacq. 及 *Hyphear europaeum* (Jacq.) Danser 2. 本品产于四川、甘肃、陕西、山西、内蒙古、河北、山东等省区,常寄生于栎属、榆属、李属、桦属等植物上。其枝、叶民间作桑寄生入药。

### 7185010

*Macrosolen bibracteolatus* (Hance) Danser --- *Elytranthe bibracteolata* (Hance) Lecomte

植物名 双花鞘花《中国植志》

文献名 二苞鞘花、杉木鞘花寄生《广西药录》

地方名 广西:八角寄生(那坡),肥衣桐寄生(上

思),枫树寄生,栗寄生。

功 效 全株:祛风。用于风湿骨痛。

### 7185011

*Macrosolen cochinchinensis* (Lour.) Van Tiegh. --- *Elytranthe fordii* (Hance) Merr. --- *Elytranthe cochinchinensis* (Lour.) G. Don --- *Loranthus cochinchinensis* Lour.

植物名 鞘花《中国植志》

药材名 杉寄生(广东、广西)

文献名 枫木鞘花、狭叶鞘花《海南植志》,越南鞘花《广西药录》,八角鞘花寄生、枫鞘花寄生《广西植志》

地方名 枫木寄生、樟木寄生(广东、广西);海南:水柿寄生,白银寄生(澄迈),“吉弟”(陵水),甜糖树寄生(儋县);广西:枫树寄生(隆林),杉木寄生(宁明、北流),小梨木寄生、梅子寄生、油茶寄生(北流),救必应寄生(桂平),漆木寄生(平南),梨寄生(罗城),柿树寄生(龙州、恭城),茶树寄生(恭城),三稔寄生(苍梧),八角寄生(宁明),龙眼寄生、发冷果寄生、沙梨寄生、菠萝树寄生(龙州),白蜡树寄生(阳朔);云南:寄生果(景东)。

功 效 全株:清热,止咳,补肝肾,祛风湿。用于痧气,痢疾,咳血。

### 7185012

*Scurrula buddleioides* (Desr.) G. Don

植物名 滇藏梨果寄生《中国植志》

文献名 察隅梨果寄生《植分学报》

地方名 四川:马桑寄生(米易)。

功 效 马桑寄生:用于精神分裂症。

### 7185013

*Scurrula chingii* (Cheng) H. S. Kiu --- *Loranthus chingii* Cheng

植物名 卵叶梨果寄生《中国植志》

药材名 杂寄生(拟)

文献名 秦氏寄生《广西药录》,卵叶寄生《高植图鉴补编》

地方名 广西:水菠萝寄生(那坡、博白),枫木寄生(博白),柚子寄生(武鸣),水东哥寄生(马山),寄生;云南:茶树寄生(河口)。

功 效 全株:祛风除湿,化痰止咳。用于风湿痹痛,痢疾。

### 7185014

*Scurrula ferruginea* (Jack) Danser --- *Loranthus ferrugineus* Jack --- *Cichlanthus ferrugineus* (Jack) Van Tiegh.

植物名 锈毛梨果寄生《中国植志》

药材名 滇南寄生《新华本草纲要》

文献名 桑寄生、桑上寄生《中药志》,广寄生《新华本草纲要》

功 效 枝叶:强壮,安胎。用于腰膝痛,神经痛,高血压,血管硬化性四肢麻木。

### 7185015

*Scurrula parasitica* L. --- *Loranthus parasiticus* (L.) Merr. --- *L. scurrula* L. --- *L. chinensis* DC. var. *for-*

mosanus Lecomte --- *Loranthus gracilifolius* auct. non Schult.

植物名 红花寄生《中国植志》

药材名 红花寄生《中草药》

文献名 马桑寄生《汇编》，老式寄生《中草药学》，红花桑寄生《福建药物志》，小叶桑寄生《海南植志》

地方名 福建：寄脏匡（宁化），寄居花童（福州），桑树鸟榕（泉州）；广东：柠檬寄生；广西：小梨木寄生，黄芽木寄生，桐油寄生，荔枝寄生，相思树寄生，沙梨寄生，桃树寄生（北流、崇左），山黄皮寄生（崇左），猪香木寄生（龙州），枫木寄生，杨桃寄生，枇杷寄生（邕宁），龙眼寄生，油茶寄生（陆川），桃木寄生（平南），寄生，小叶寄生，藤菜；四川：金钩藤寄生；云南：桑寄生。

功效 桑寄生：补肝肾，祛风湿，强筋骨，养血，安胎，降血压；马桑寄生：用于精神分裂症，偏头痛，风湿关节痛，跌打损伤等。

备考 《海南植志》（1965）将学名误订为 *Loranthus gracilifolius* Schult.

#### 7185016

*Scurrula parasitica* L. var. *graciliflora* (Wall. ex DC.) H. S. Kiu --- *Loranthus graciliflorus* Wall. ex DC.

植物名 小红花寄生《中国植志》

药材名 杂寄生（拟）

文献名 小叶寄生《广西药录》

功效 全株：用于跌打损伤。

#### 7185017

*Scurrula philippensis* (Cham. et Schlecht.) G. Don --- *Loranthus philippensis* Cham. et Schlecht.

植物名 梨果寄生《中国植志》

文献名 马桑寄生、菲律宾寄生《汇编》

功效 马桑寄生：有毒。用于精神分裂症，偏头痛，风湿关节痛，跌打损伤等。

#### 7185018

*Taxillus balansae* (Lecomte) Danser --- *Loranthus tienyensis* Li

植物名 栗毛钝果寄生《中国植志》

药材名 杂寄生（拟）

文献名 栗毛寄生《云南植志》，天南寄生《广西药录》

地方名 广西：石栗寄生（那坡），枫寄生（上林），什寄生，杂寄生。

功效 全株：用于跌打损伤，骨折。

#### 7185019

*Taxillus caloreas* (Diels) Danser --- *T. matsudai* (Hayata) Danser --- *Loranthus matsudai* Hayata --- *L. caloreas* Diels

植物名 松柏钝果寄生《中国植志》

药材名 松寄生《台湾药植志》

文献名 柏寄生《名实图考》，松钝果寄生《西藏植志》

功效 全株：用于风湿性关节炎，中风，淋病，消渴，疮疡。

#### 7185020

*Taxillus caloreas* (Diels) Danser var. *fargesii* (Lecomte) H. S. Kiu

植物名 显脉钝果寄生《中国植志》

药材名 杂寄生（拟）

文献名 显脉松寄生《云南植志》，显脉柏寄生《云南种录》

功效 全株：用于风湿病。

#### 7185021

*Taxillus chinensis* (DC.) Danser --- *Loranthus chinensis* DC. --- *Loranthus parasiticus* auct. non (L.) Merr.

植物名 广寄生《中国植志》

药材名 广寄生（广东、广西）、《中草药》

文献名 苦楝寄生《本草求真》，华桑寄生《中药大辞典》，中国寄生《广西药录》，松树桑寄生《海南植志》，松寄生《广西植志》，桑寄生《药典》

地方名 寄生茶（广东、广西）；广东：桃树寄生；广西：红花夹竹桃寄生（桂林），茶寄生（凤山），梨寄生（恭城），桔子寄生（苍梧），相思树寄生，酸柚寄生，黄皮寄生，槐花寄生，橙果寄生，枇杷寄生，桃木寄生，猴甘果寄生（邕宁）。

功效 枝叶：补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎元。用于风湿痹痛，腰膝酸软，筋骨酸软，筋骨无力，崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安，高血压症。

备考 1. 两广地区主要作寄生茶，其次才作桑寄生用。2. 过去有些文献常将本品学名误订为 *Loranthus parasiticus* (L.) Merr.。3. 本品以寄生于桑树、桃树、马尾松的疗效较佳，寄生于夹竹桃的有毒，不宜药用。

#### 7185022

*Taxillus delavayi* (Van Tiegh.) Danser --- *Phyllostegmis delavayi* Van Tiegh. --- *Loranthus balfourianus* Diels --- *Taxillus balfourianus* (Diels) Danser

植物名 柳树钝果寄生《中国植志》

药材名 柳树寄生（四川）、《中草药》

文献名 柳钝果寄生《西藏植志》，杂木寄生《广西植志》，花椒寄生《新华本草纲要》

地方名 桑寄生（西南）；四川：柳寄生，马桑寄生；云南：寄生草（禄劝），火把果树寄生（曲靖）。

功效 全株：祛风湿，安胎元；马桑寄生：用于精神分裂症。

#### 7185023

*Taxillus kaempferi* (DC.) Danser --- *Loranthus kaempferi* (DC.) Maxim.

植物名 小叶钝果寄生《中国植志》

药材名 华东松寄生《高植图鉴》

地方名 浙江：松胡颓子；安徽：松寄生（黄山），芎藭松。

功效 全株：祛风胜湿。

#### 7185024

*Taxillus kaempferi* (DC.) Danser var. *grandiflorus* H. S. Kiu --- *Loranthus calareas* Diels var. *oblongifolius* Lecomte

植物名 黄杉钝果寄生《中国植志》

药材名 四川松寄生《中国植志》

功效 全株；祛风湿。

#### 7185025

*Taxillus levinei* (Merr.) H. S. Kiu --- *Loranthus levinei* Merr.

植物名 锈毛钝果寄生《中国植志》

药材名 李寄生《广西药录》

文献名 连江寄生《广西植录》，锈毛寄生《高植图鉴补编》，毛叶桑寄生《湖北植志》

地方名 湖北：寄生（神农架）；广西：茶树寄生（富川、那坡），李万寄生、梨寄生、板栗寄生（那坡）。

功效 全株；消炎，止咳，祛风湿。用于气管炎，肺结核咳嗽。外用于疮疖。

#### 7185026

*Taxillus limprichtii* (Grünig) H. S. Kiu --- *Loranthus kwangtungensis* Merr. --- *L. limprichtii* Grünig

植物名 木兰寄生《中国植志》

药材名 木兰寄生《广西药录》

文献名 粤桑寄生《海南植志》，广东寄生《广西药录》

地方名 台湾：李樟山桑寄生，桑寄生；广西：枫木寄生（贺县），樟树寄生。

功效 全株；祛风除湿。用于风湿痹痛。

#### 7185027

*Taxillus limprichtii* (Grünig) H. S. Kiu var. *liquidambaricolus* (Hayata) H. S. Kiu --- *Loranthus liquidambaricolus* Hayata --- *Scurrula liquidambaricola* (Hayata) Danser --- *Taxillus liquidambaricolus* (Hayata) Hosok.

植物名 显脉木兰寄生《中国植志》

药材名 杂寄生（拟）

文献名 大叶枫寄生《台湾药植志》，显脉寄生、大叶桑寄生《植分学报》

功效 茎叶；活血通络。用于妇女血崩，腰痛，产后疾患及妊娠血漏。

#### 7185028

*Taxillus nigrans* (Hance) Danser --- *Loranthus nigrans* Hance --- *L. lonicerifolius* Hayata --- *Taxillus yadoriki* auct. non Sieb. ex Maxim. --- *Loranthus yadoriki* auct. non Sieb. ex Maxim.

植物名 毛叶钝果寄生《中国植志》

药材名 桑寄生（湖南、四川、江西）、《雷公炮炙论》

文献名 葛《诗经》，桑上寄生、寄屑、寓木、宛童《本经》，寄童、巢屑、巢童、桑生、桑络、混沌、螟蛉、桑上羊儿藤、桑树上羊儿藤《新纲》，柿寄生《中国植物图鉴》，毛叶桑寄生《高植图鉴》，毛叶寄生《高植图鉴补编》，马桑寄生《汇编》，忍冬叶桑寄生《台湾树木志》

地方名 寄生苞（广西、四川），〔寄生草〕（海南、云

南），冰粉树（四川、云南），寄生泡（四川、陕西）；陕西：寄生包（洋县、宁强）；湖北：蠹心宝；湖南：借母怀胎（凤凰），借气生，替生枝，飞菜叶；广西：枫杨寄生（全州），樟寄生；四川：寄生茶（西昌），寄生子（南川），柳寄生，杂寄生。

功效 桑寄生枝叶；补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎元。用于风湿痹痛，腰膝酸软，筋骨无力，崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安，高血压症；马桑寄生全株；有大毒。用于精神分裂症，偏头痛，风湿关节痛，跌打损伤。

备考 1. 寄生因寄主植物之名而异。寄生于桑树上者为桑寄生，寄生于马桑树上的为马桑寄生。寄主不同，寄生之活性成分与疗效各异，不可错用；2. 过去文献常将本种桑寄生的原植物学名误订为 *Taxillus yadoriki* Sieb. ex Maxim. [*Loranthus yadoriki* Sieb. ex Maxim.] (此为日本钝果寄生之学名，该种分布于朝鲜和日本，我国不产)。

#### 7185029

*Taxillus sutchuenensis* (Lecomte) Danser --- *Loranthus sutchuenensis* Lecomte

植物名 桑寄生《中国植志》

药材名 桑寄生（福建、江西、湖北、湖南、四川、贵州），《雷公炮炙论》

文献名 葛《诗经》，桑上寄生、寄屑、寓木、宛童《本经》，四川桑寄生《湖北植志》，毛叶寄生《中草药》，柿寄生《中药大辞典》，毛叶桑寄生《华北树木志》

地方名 四川：马桑寄生，寄生。

功效 桑寄生枝叶；补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎元。用于风湿痹痛，腰膝酸软，筋骨无力，崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安，高血压症；马桑寄生全株；有大毒。用于精神分裂症，偏头痛，风湿关节痛，跌打损伤。

备考 本种应是古本草所记桑寄生之正品。但寄生于马桑上者才是马桑寄生。

#### 7185030

*Taxillus sutchuenensis* var. *duclouxii* (Lecomte) H. S. Kiu --- *Loranthus duclouxii* Lecomte

植物名 灰毛桑寄生《中国植志》

药材名 桑寄生（四川、贵州）

文献名 灰毛寄生《云南植志》，马桑寄生《中草药》

地方名 湖北：湖北桑寄生；四川：马桑寄生泡（大邑）。

功效 桑寄生；补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎元；马桑寄生；用于精神分裂症。

#### 7185031

*Taxillus theifer* (Hayata) H. S. Kiu --- *Loranthus theifer* Hayata --- *Scurrula theifer* (Hayata) Danser

植物名 台湾钝果寄生《中国植志》

文献名 台湾寄生《植分学报》

功效 全株；祛风湿。

#### 7185032

*Taxillus thibetensis* (Lecomte) Danser --- *Loranthus thi-*



betensis Lecomte

植物名 滇藏钝果寄生《中国植志》

药材名 牛筋刺寄生《新华本草纲要》

文献名 寄生草《滇南本草》, 藏寄生《云南中草药》, 金沙江寄生《云南植志》, 星毛钝果寄生《西藏植志》

地方名 云南: 桑上寄生, 梨寄生, 野花椒寄生, 老米酒寄生(罗平)。

功效 全株: 解毒止咳, 消炎。用于小儿中蛊毒, 腹内坚痛, 面目青黄, 淋露骨立, 咳嗽, 尿路感染。

备考 本种常见于牛筋刺(*Rhamnus leptophyllus* Schneid.)、野花椒(*Zanthoxylum simulans* Hance)、老米酒(*Viburnum foetidum* Wall.)及其他壳斗科和山茱萸植物上。

#### 7185033

*Tolypanthus maclurei* (Merr.) Danser --- *Loranthus maclurei* Merr. --- *Tolypanthus esquirodii* (Levl.) Lauener

植物名 大苞寄生《中国植志》

药材名 榔榆寄生《广西药录》

文献名 大苞桑寄生《高植图鉴》

地方名 广西: 柑寄生(武鸣), 油茶寄生、柿树寄生、野梨树寄生(恭城), 桐油寄生(平乐), 猪糠木寄生(平南), 大萼桑寄生。

功效 全株: 清热, 补肝肾, 祛风湿, 止咳。用于内伤, 吐血, 下气, 风湿痹痛。

#### 7185034

*Viscum album* L. var. *meridianum* Danser

植物名 卵叶槲寄生《中国植志》

文献名 阔叶槲寄生《云南植志》, 白果槲寄生《新华本草纲要》

地方名 云南: 寄生草(景东)。

功效 全株: 强壮, 消肿, 催乳。

#### 7185035

*Viscum articulatum* Burm. f.

植物名 扁枝槲寄生《中国植志》

药材名 麻栎寄生(广东、广西)

地方名 蟹爪寄生(广东、广西); 浙江: 鸟泄树、痰云树枝(景宁); 湖北: 扁寄生, 牛肋巴骨寄生(神农架); 广东: 蟠脾寄生、节枝槲寄生(广州), 乌蝇树寄生; 广西: 无叶槲寄生, 粗糠柴寄生(罗城), 黑榄寄生(宁明), 虾脚寄生; 四川: 桐寄生(峨眉山), 桐子寄生(成都); 云南: 柿寄生(曲靖), 扁寄生草, 蚂蚱腿, 螃蟹脚; 西藏: 扁枝寄生。

功效 全株: 祛风利湿, 舒筋活络, 止血。用于风湿性关节炎, 腰肌劳损, 崩漏, 鼻衄, 白带, 尿路感染。

#### 7185036

*Viscum coloratum* (Kom.) Nakai

植物名 槲寄生《中国植志》

药材名 槲寄生《蜀本草》、《药典》

文献名 桑上寄生《唐本草》, 有色槲寄生(叶《生药》), 北桑寄生《药材学》, 北寄生《中药志》

地方名 寄生(东北、河北、内蒙古、陕西、山东), 柳

寄生(东北、湖北), (冬青)(东北、内蒙古、山东), 冻青(东北、河北), 螃蟹夹(西南); 河北: 冬青条, 杂寄生, 呱呱叫, 桑牛, 倒吊草; 内蒙古: “毛敦-苏格苏尔”、“兴德瓦”(蒙名); 山东: 鸦雀食(烟台); 安徽: 飞来草; 台湾: 黄寄生, 台湾槲寄生; 湖南: 借母怀胎(常德), 借气生, 替生枝, 飞菜叶; 四川: 寄生子; 其他: 寄生木(朝鲜), 枫寄生。

功效 带叶茎枝: 祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎。用于风湿痹痛, 腰膝酸软, 胎动不安。

备考 历代本草所载桑寄生, 非止一种, 《唐本草》注云“叶无阴阳, 如细柳叶而厚脆。茎粗短, 江南人相承用为续断”者, 即为本种, 此与《本草经集注》所记之桑寄生不同。

#### 7185037

*Viscum coloratum* (Kom.) Nakai f. *lutescens* Kitag. --- *V. album* L. var. *lutescens* Makino

植物名 黄果槲寄生《东北药植志》

药材名 桑寄生《唐本草》

地方名 寄生、柳寄生(东北); 浙江: 槲寄生。

功效 枝叶: 祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎元。

#### 7185038

*Viscum coloratum* (Kom.) Nakai f. *rubro-aurantiacum* Kitag.

植物名 红果槲寄生《东北药植志》

药材名 桑寄生《唐本草》

地方名 寄生、柳寄生(东北)。

功效 枝叶: 祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎元。

#### 7185039

*Viscum diospyrosicolum* Hayata --- *Viscum angulatum* auct. non Heyne

植物名 柿寄生《新华本草纲要》

药材名 柿寄生(福建、广西、云南)

地方名 福建: 荷树寄生(上杭), 广丁香寄生(寿宁); 海南: 青刚栎寄生; 广西: 桐木寄生(贺县), 万寿木寄生(北流、平南), 樟木寄生、梨寄生(北流), 虾脚寄生, 蚂蚱腿寄生; 西藏: 桑寄生。

功效 枝叶: 祛风, 强壮, 舒筋, 清热, 止咳, 消炎。用于肺病吐血, 乳疮, 腹痛, 风湿痛, 小儿咳嗽。

备考 《海南植志》(1965)等文献, 将其学名误订为 *Viscum angulatum* Heyne ex DC.

#### 7185040

*Viscum liquidambaricolum* Hayata

植物名 枫香槲寄生《中国植志》

药材名 枫香寄生《生草药性备要》、《中药大辞典》

文献名 枫柳《纲目》, 枫上寄生、吊杀稠孙、上树稠孙、铁角孙儿、风木藤《纲目拾遗》, 栗寄生《名实图考》, 虾蚶草《本草求原》, 百子痰梗《岭南采药录》, 狭叶枫寄生《台湾药植志》, 路路通寄生、风饭寄生《中草彩图》

地方名 螃蟹脚(台湾、广东、云南、四川), 枫寄生(台湾、广西); 台湾: 扁寄生, 台湾枫寄生, 赤柯寄生; 广东: 枫树寄生(英德); 广西: 枫木寄生; 四川: 桐树寄生;

云南:寄生草(禄劝)。

功效 全株:用于胃脘痛,神经痛,小儿惊风,咳嗽,高血压病,尿路感染,风湿关节炎。外用于跌打损伤,牛皮癣。

#### 7185041

*Viscum monoicum* Roxb. ex DC.

植物名 五脉槲寄生《中国植志》

药材名 五脉槲寄生《广西药录》

文献名 多脉槲寄生《云南植志》

功效 全株:用于风湿痹痛。

#### 7185042

*Viscum multinerve* (Hayata) Hayata --- *V. stipitatus* Lecomte

植物名 柄果槲寄生《中国植志》

药材名 桂花寄生《广西植录》

文献名 有柄槲寄生《海南植志》

地方名 台湾:刀叶槲寄生;广东:三桠槲树上寄生(增城),油香藤寄生(大埔);广西:油桐寄生(武鸣),寄生茶(大苗山)。

功效 全株:用于跌打损伤,骨折,腰腿痛。

#### 7185043

*Viscum nudum* Danser

植物名 绿茎槲寄生《中国植志》

功效 全株:祛风湿,安胎。

#### 7185044

*Viscum ovalifolium* DC. --- *Viscum orientale* auct. non Willd.

植物名 瘤果槲寄生《中国植志》

药材名 柚寄生《本草求原》、《中药大辞典》

文献名 禄柚寄生《岭南采药录》,柚树寄生《生草药性备要》,东方槲寄生《广西药录》

地方名 寄生(广东、广西);海南:鸡醉树寄生(临高),荔当树寄生(儋县);广西:柚子寄生(苍梧、北流、邕宁),大柚寄生、黄皮寄生、橘子寄生、蛤凹木寄生、柿寄生(苍梧、北流),山橘寄生(天等),羊奶寄生(龙州),克李寄生(崇左),无患子寄生(北流),油香藤寄生(上思),檀香叶寄生。

功效 全株:用于风湿痹痛,小儿疳积,痢疾,跌打损伤,咳嗽,麻疹,产后风疹。

备考 《海南植志》(1965)等文献将其学名误订为 *Viscum orientale* Willd.

### 7186 檀香科 Santalaceae

#### 7186001

*Buckleya lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Miq. --- *B. hen-ryi* Diels

植物名 米面蕨《中国植志》

文献名 米面蕨、擅羽《树分》,都愈子《植物名汇》,羽毛球树《种分》

地方名 陕西:尿尿皮,柴骨皮;浙江:九层皮(永康);安徽:凤凰草;湖北:米面无、米面无果(神农架)。

功效 根:用于痢症,无名肿毒;叶:有毒。外用于

皮肤瘙痒;果实:用于解食物、有机磷中毒。

#### 7186002

*Dendrotrophe frutescens* (Champ. ex Benth.) Danser - *Henslowia frutescens* Champ. ex Benth. --- *Dufrenoyia frutescens* (Benth.) Stauffer

植物名 寄生藤《中国植志》

药材名 寄生藤《汇编》

地方名 广东:上树酸藤、大叶酸藤、[黄藤]、堂仙公、酸藤公(惠阳),列子(海康),藤酸公(东莞);海南:青藤公(澄迈),鸡骨香藤;广西:藤香(北流),入地寄生(苍梧),熊胆藤(陆川),鲫鱼胆(博白),观音藤,左扭香(陆川、北流)。

功效 全株:疏风解热,除湿。用于流行性感冒,跌打损伤。

#### 7186003

*Osyris wightiana* Wall. ex Wight

植物名 沙针《中国植志》

药材名 山苏木《思茅中草》

文献名 香疙瘩树《红河中草药》

地方名 广西:上檀香(大新)、[檀香]、石上鬼画符(龙州);四川:小透骨消(峨眉山);云南:干檀香、小青皮(昆明),小仙人掌,杜档香(玉溪),干香树(思茅),香疙瘩(文山、昆明),疙瘩香、香面叶(红河),清香树,檀香叶,木檀香,香疙瘩果,豆青香,小青香,山芝麻。

功效 根、叶:消炎,解毒,安胎,止血,接骨。用于咳嗽,胃痛,胎动不安,外伤出血,骨折,疟疾,疥癣,疖肿,痢疮。

#### 7186004

*Phacellaria caulescens* Collett et Hemsl.

植物名 粗序重寄生《中国植志》

文献名 健序隐茎木《广西药录》

功效 全株:清热。

#### 7186005

*Pyrularia edulis* (Wall.) A. DC.

植物名 檀梨《中国植志》

地方名 云南:油葫芦,麝子果。

功效 种子油:用于烧伤、烫伤等;茎皮:用于跌打损伤。

#### 7186006

*Santalum album* L.

植物名 檀香《中国植志》

药材名 檀香《别录》、《药典》

文献名 旋檀(竺法真《罗浮山疏》),白檀(本草经集注),黄檀香《图经》,真檀、浴香、旃檀《纲目》,檀香油、檀香泥[树脂]《纲目拾遗》,白元香(和汉药名汇),白银香、黄英香、旃檀娜《新纲》,印度老山檀香、雪梨、西香《药材学》

地方名 广东:檀香树;四川:"占登鲁鲁"(藏名);云南:"尖蒿"(西双版纳傣语)。

功效 心材:行心温中,开胃止痛。用于寒凝气滞,胸痛,腹痛,胃痛食少,冠心病,心绞痛;挥发油(檀香油):用于胃脘疼痛,呕吐,淋浊。

## 7186007

*Thesium chinense* Turcz.

植物名 百蕊草《中国植志》

药材名 百蕊草《图经》、《汇编》

文献名 百乳草《图经》,〔夏枯草〕《满州植录》,中华百蕊草《云南种录》

地方名 青龙草(江西、云南),地石榴(安徽、贵州),金石榴(安徽、福建),细须草(江苏、浙江、安徽),积药草(山东、江西),珍珠草(东北);山西:土夏枯草;内蒙古:“陶格日其格-乌布斯”(蒙名);陕西:〔透骨草〕,凤芽蒿(陕南);甘肃:金针草;江苏:肚蹲草;浙江:化痰草(遂昌),细珠草、虎毯草(温州、洞头),救死还魂草(瑞安);安徽:小草,龙须草;福建:全旨草;河南:打食草;湖北:千年剑(鹤峰),降龙草,独脚鸡;湖南:青天白,疳积草;广西:草檀(临桂),叶叶一枝花(来宾);四川:地刷把;云南:石菜子(文山),九仙草,山柏枝,小儿疳积药;其他:珊瑚草,松毛参,白风草,一棵松。

功效 全草:清热解毒,消肿。用于感冒发热,扁桃腺炎,咽喉炎,支气管炎,肺炎,肺脓疡,乳腺炎,疖肿。

## 7186008

*Thesium chinense* Turcz. var. *longipedunculatum* Y. C. Chu

植物名 长梗百蕊草《中国植志》

药材名 长梗百蕊草《长白山植志》

功效 茎叶:清热毒,消肿。

## 7186009

*Thesium himalense* Royle

植物名 露柱百蕊草《中国植志》

药材名 绿珊瑚《汇编》

文献名 喜马拉雅百蕊草《汇编》,西域百蕊草《中药大辞典》,九仙草《昆明民药》

地方名 云南:一棵松,麻黄细辛,细须草,酒仙草,松毛参,白细辛。

功效 全草:清热解痉,消炎。用于感冒,中暑,支气管炎,小儿肺炎,血吸虫病,小儿惊风,腓肠肌痉挛,血小板减少性紫癜。

## 7186010

*Thesium longiflorum* Hand. -Mazz.

植物名 长花百蕊草《中国植志》

地方名 四川:绿珊瑚,长花绿珊瑚。

功效 全草:清热解表,消炎。用于感冒,中暑,支气管炎,小儿肺炎,血吸虫病。

## 7186011

*Thesium longifolium* Turcz.

植物名 长叶百蕊草《中国植志》

药材名 九仙草《昆明民药》

文献名 真珠草《兴安植群》

地方名 四川:百蕊草、茅草细辛、铁刷把(西昌);云南:山柏枝、绿珊瑚、撒花一棵针、一棵松(曲靖),珊瑚草、松毛草、松毛参、细叶钩虫草、松毛疳药、小松杉、瘴子菜(红河),九龙草、珍珠酒仙草(玉溪),小星宿草,细

须草,酒草,疳积草,疳积药。

功效 全草:祛风清热,解痉。用于感冒中暑,小儿肺炎,咳嗽,惊风。

## 7186012

*Thesium refractum* C. A. Mey.

植物名 急折百蕊草《中国植志》

药材名 绿珊瑚《汇编》

文献名 反折百蕊草《西藏植志》

地方名 云南:九仙草(昆明),松毛参、六夫草(丽江)。

功效 全草:清热解痉,消炎。用于小儿肺炎,支气管炎,肝炎,小儿惊风,腓肠肌痉挛,血小板减少性紫癜。

## 7189 蛇菰科 Balanophoraceae

## 7189001

*Balanophora dioica* R. Br. ex Royle

植物名 粗穗蛇菰《中国植志》

文献名 异株蛇菰《云南植志》

地方名 云南:鹿仙草(大理)。

功效 全草:壮阳补肾,止血生肌。用于神经官能症,阳痿,慢性肝炎,外伤出血,消化道出血,月经过多。

## 7189001a

*Balanophora fargesii* (Van Tiegh.) Harms

植物名 川藏蛇菰《中国植志》

功效 全草:止血,镇痛,消炎。用于痔疮,胃病等。

## 7189002

*Balanophora harlandii* Hood. f. --- *B. esquirolii* Levl.

植物名 红冬蛇菰(广西)、《中国植志》

文献名 葛花菜、葛乳《纲目》,红冬菰《广西药录》,蛇菰《云南植志》

地方名 葛菌(贵州、云南);四川:葛花,山狗球;贵州:葛藤菌,仙人头,地重楼;云南:地红果(屏边)。

功效 全草:清热解毒,凉血止痛。用于痔疮,咳血。外用于淋巴结结核。

## 7189003

*Balanophora henryi* Hemsl.

植物名 宜昌蛇菰《中国植志》

地方名 七菌子(湖北、四川);陕西:母猪花;湖北:红麝菇(均县)。

功效 全草:止血,补血。

## 7189004

*Balanophora indica* (Arn.) Griff.

植物名 印度蛇菰《中国植志》

功效 全草:壮阳补肾,止血生肌。

## 7189005

*Balanophora involucrata* Hook. f.

植物名 筒鞘蛇菰《中国植志》

药材名 鹿仙草《汇编》

文献名 鞘苞蛇(秦岭植志),筒鞘蛇菇《中药大辞典》,蛇菰《种称》,谷花《植分学报》,寄生黄《贵州草药》

地方名 借母怀胎(湖北、云南);湖北:文王一支笔、观音莲(五峰);四川:[葛花]、山狗球(峨眉山);云南:见根生、坡本(保山)、地杨梅、地吕(临沧)、万星菌(丽江)、鹿心草、红菌(丽江、大理)、藤林(红河)、猪油药、蒿枝花(曲靖)、土里开花(东川)、牛奶菌(思茅)、九子不离母(大理)。

功效 全草:壮阳补肾,健脾理气,止血。用于阳痿,神经官能症,慢性肝炎,胃痛,消化道出血,月经过多。

## 7189006

*Balanophora japonica* Makino

植物名 日本蛇菰(中国植志)

药材名 蛇菰(汇编)

文献名 葛乳、葛菜花(纲目),葛覃(纲目拾遗),蛇茹(中药大辞典),小蛇菰(湖北植志)

地方名 浙江:上心肝(温州、平阳);福建:石莲花(漳州);湖北:文王一枝笔;湖南:螺丝起;广西:[锁阳](贵县),铺地开花;四川:葛菌、红血莲、角菌、角花(南川),葛覃药,[葛花]、山狗球(峨眉山)。

功效 全草:有小毒。清热解毒,凉血。用于咳嗽吐血,血崩,痔疮肿痛,指疔。

## 7189007

*Balanophora laxiflora* Hemsl.

植物名 疏花蛇菰(中国植志)

地方名 广东:石上莲。山菠萝;广西:通天蜡烛。

功效 全草:用于痔疮,虚癆出血,腰痛。

## 7189008

*Balanophora mutinoides* Hayata --- *B. valida* Diels

植物名 红烛蛇菰(中国植志)

药材名 深山不出头(汇编)

地方名 广东:[独脚莲]、石上莲(惠阳);广西:仇人不见面;四川:山狗球、天麻公子。

功效 全草:解毒,散瘀,消肿。用于胃痛,骨髓炎,跌打损伤,疮疡肿毒。

## 7189009

*Balanophora polyandra* Griff.

植物名 多蕊蛇菰(中国植志)

药材名 多蕊蛇菰(广西药录)

文献名 蛇菰(峨眉药植资源)

地方名 木菌子(海南、广西);湖北:鸡心七、一支笔(神农架);广西:土苡蓉(贵县、桂平),通天蜡烛(陆川、苍梧),[肉苡蓉](贵县);四川:[葛花]、山狗球。

功效 全草:滋阴补胃。用于血虚,出血,阳痿,淋病。

## 7189010

*Balanophora spicata* Hayata

植物名 穗花蛇菰(中国植志)

地方名 广西:地荔枝;云南:鹿仙草(思茅)。

功效 全株:行气止痛。用于腰痛,痔疮,肝炎。

## 7189011

*Balanophora subcupularis* Tamura

植物名 杯茎蛇菰(中国植志)

功效 全草:用于肺病,补精气。

## 7189012

*Balanophora tobiricola* Makino

植物名 乌鞘蛇菰(中国植志)

文献名 海桐蛇菰(广西药录)

功效 全草:用于咳嗽。

## 7189013 见 7189001

## 7190 鼠李科 Rhamnaceae

## 7190001

*Berberia flavescent* (Wall.) Brongn. --- *B. hypochrysa* Schneid.

植物名 黄背勾儿茶(中国植志)

药材名 石萝藦(四川中草)

文献名 石萝藦(汇编),金背勾儿茶(科属词典),金背黄蜡藤(云南种录)

地方名 四川:[甜茶],把子树,牛儿藤、鸭公藤(峨眉山),大鸭公藤。

功效 根、茎:解表,清热;根:用于胸腹胀痛,红白痢疾,跌打损伤,筋骨疼痛;茎:用于红崩白带,月经不调,跌打损伤。

## 7190002

*Berberia floribunda* (Wall.) Brongn. --- *B. racemosa* Sieb. et Zucc. --- *B. giraldiana* Schneid. --- *B. floribunda* (Wall.) Brongn. var. *megalophylla* Schneid.

植物名 多花勾儿茶(中国植志)

药材名 黄蜡藤(名实图考)、(汇编)

文献名 紫萝花(名实图考),勾儿茶、大叶铁包金(汇编),大叶勾儿茶(中药大辞典),羊母锁(中国药植图鉴)

地方名 牛儿藤(四川、贵州),老鼠藤(福建、江西、湖南),铤子藤(福建、江西),熊柳(湖南、江西),铁包金(陕西、福建、湖北、广西),扁担藤(河南、湖南),皱纱皮(江西、四川);陕西:牛鼻圈,牛鬍子、乌梢蛇(镇坪),乌梢蛇根;江西:消子紫(吉水),土赤药(瑞昌),老鼠屎藤(定安),山黄茛(景德镇);福建:熊柳藤,熊柳根,皱皮草,花眉跳架、鼻朴子、厝箕藤、土黄茛(闽东),勾勾茶(福州),奇氏勾儿茶(福州、三明),羊锁贯,老鼠子柴根(清流),老鼠子尿叶、车拔子钗(明溪),柏籽根(三明);湖北:扁担果,扁担果子(神农架);湖南:知母崽,乌德根,[黄皮树],西风柳,鸡奶奶,有光藤,鱗鱼藤,小龙骨;广东:牛鼻拳、牛鼻角秧(广州);广西:老鼠屎(梧州),大黄蜡藤(桂平),筛箕藤(昭平);四川:鸭公藤(峨眉山),[金刚藤];云南:黑龙串筋、黑观音(思茅);其他:枪子柴。

功效 根:祛风利湿,活血止痛。用于风湿关节痛,痛经,产后腹痛。外用于骨折肿痛;茎、叶:清热,凉血,利尿,解毒。用于衄血,黄疸,风湿腰痛,经前腹痛,风毒流注,伤口红肿。

## 7190003

*Berberia formosana* Schneid.

植物名 台湾勾儿茶(中国植志)

药材名 台湾黄蟾藤《台湾药植志》

文献名 台湾黄藤《台湾植志》

功效 茎:外用于毒蛇咬伤。

#### 7190004

*Berchemia huana* Rehd.

植物名 大叶勾儿茶《中国植志》

文献名 胡氏勾儿茶《黄山植研》,毛勾儿茶《浙江药植志》

功效 茎藤、根:祛风利湿,活血止痛。

#### 7190005

*Berchemia kulingensis* Schneid.

植物名 牯岭勾儿茶《中国植志》

药材名 牯岭勾儿茶《汇编》

文献名 小叶勾儿茶《中国植志》

地方名 铁包金(浙江、安徽),紫青藤(浙江、江西),熊柳(江西、湖南);浙江:画眉跳杠(泰顺),〔青藤〕(淳安、天台、金华、平阳),画眉杠(丽水、景宁),铁骨散,常青藤,山黄茛,小叶青,铁藤(临海),拔儿绳(龙泉),硬哨蛭(余姚),紫藤(诸暨);安徽:铜皮铁骨,勾儿茶,黄牛茶,寸子;江西:赤博条,青皮老鸦菜,铤子树;福建:老鼠藤(永春),蟑螂翅(南安、安溪),放筋藤(泉州),乌鲁莫奇(晋江),镜子藤(莆田);广西:大叶铁包金(百色)。

功效 根:祛风利湿,活血止痛。用于风湿关节痛,产后腹痛,痛经,小儿疳积,骨髓炎。

#### 7190006

*Berchemia lineata* (L.) DC.

植物名 铁包金《中国植志》

药材名 铁包金《岭南采药录》、《汇编》

文献名 狗脚刺、提云草、小桃花《岭南采药录》,勾茶、岗坪《植物名汇》,细叶勾儿茶《汇编》

地方名 老鼠乳(福建、广东),老鼠耳、乌龙根(福建、湖南、广东),勾儿茶(湖南、广东),老鼠屎藤(广东、广西),小叶黄蟾藤(福建、台湾);福建:老鼠乌(福州、闽南),乌金藤、鼠乳头(福州),乌痧头、乌李棟(宁化),乌石米、乌倍、乌染草、乌骨草、布染、青莲米、鼠耳草(莆田),龙须藤(大田),山乌藤、山乌沉、乌纱根、乌沉刺、乌店刺、老鼠米、老鼠奶(厦门),乌纱草(惠安),乌西(仙游),小号铁包金(闽侯),碎米珠(安溪、南安),鼠米(闽侯、福州);台湾:米拉藤;湖南:老鼠屎;广东:小叶铁包金、细纹勾儿花、乌口仔(广州、台山、惠阳、五华、番禺),乌口枣(番禺),乌口甩、染布根(台山),乌鼠乳(潮安),乌嘴狗,老鼠屎仔(奥北),老鼠乳头(饶平),老鼠乳藤根(普宁),老鼠鳞(海丰),老鼠稔、产布仔头(东莞),细叶老鼠屎藤(南雄、阳山),细老鼠屎(翁源),黄蟾藤(新会、台山),雀仔屎(乳源),黑狗仔(云浮),黑口果(清远),铜皮铁骨(广宁、四会、德庆、封开、怀集),假榄仔(广州),鼠乳根(汕头、潮阳),鼠年根(潮汕),狗芽子(阳春);海南:密叶勾儿茶;广西:大鸡米(贵县),牛健子、牛鞭子藤(北海)。

功效 根:化瘀止血,镇咳止痛。用于肺结核咳血,胃、十二指肠溃疡出血,精神分裂症,跌打损伤,风

湿骨痛,疔疮疖肿,睾丸脓肿,痔疮,烫伤。

#### 7190007

*Berchemia polyphylla* Wall. ex Laws.

植物名 多叶勾儿茶《中国植志》

文献名 水车藤《云南种录》,金刚藤《中国植志》,小通花《广西植录》

地方名 广西:老鼠耳(乐业),铁包金(那坡、隆林);四川:鸭公藤(峨眉山);贵州:鸭公头

功效 根:清热祛湿,祛风活络。用于赤白痢疾,风湿骨痛;叶:用于肝炎。

#### 7190008

*Berchemia polyphylla* Wall. ex Laws. var. *leicladia* Hand. -Mazz.

植物名 光枝勾儿茶《中国植志》

药材名 湖南铁包金(拟)

文献名 光枝老鼠耳《广西药录》,光枝水车藤《云南种录》,猫奶奶《民族药志》,光背勾儿茶《汇编》,光枝多叶勾儿茶《广西药园药录》,平枝勾儿茶《神农架药录》

地方名 湖南:铁包金(凤凰),锐谷子,乌饭藤,糯米茶叶;广西:狗耳草(岑溪),锦中藤、老鼠屎藤(龙州),黑口果、黄蟾藤(南宁),〔鸡屎藤〕(大新),米粒藤(防城),老鼠耳(资源)。

功效 地上部分、根:止咳,祛痰,平喘,安神。用于急、慢性支气管炎,精神分裂症。

#### 7190009

*Berchemia sinica* Schneid.

植物名 勾儿茶《中国植志》

药材名 勾儿茶《神农架药录》

地方名 河南:牛鼻足秧;湖北:鸭公藤(神农架)。

功效 根:祛风除湿;叶:用于淋巴结炎。

#### 7190010

*Berchemia yunnanensis* Franch.

植物名 云南勾儿茶《中国植志》

药材名 鸭公青《草木便方》、《汇编》

文献名 青龙草《草木便方》,女儿红茶、女儿红叶、女儿红根《分类草药性》,女儿茶《天宝本草》,勾儿茶《云南中草药》,黄蟾藤《云南种录》

地方名 甘肃:黑果子;四川:鸭公子、熊柳(南川),碎米藤、女儿红、泛银子、鸭公叶、鸭公藤、鸭公藤(峨眉山),鸭公草(巴县),冷饭子(重庆);贵州:鸭公头(湄潭),消黄散(石阡、德江),鸭公园(绥阳),“都格里巴”(雷公山苗语);云南:马凳藤。

功效 根、叶:清热利湿,祛风活络,活血止痛。用于黄疸,肾炎水肿,痢疾,红崩,白带,风湿骨痛,痛经。外用于骨折,跌打损伤,痈肿疮毒。

#### 7190011

*Chaydaia crenulata* Hand. -Mazz. --- *C. rubinervis* (Levl.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen

植物名 苞叶木《高植图鉴》

药材名 苞叶木《汇编》

地方名 广西:十两叶(田林、平果),沙达木(靖西)。

功效 全株:利疸退黄。用于黄疸型肝炎,肝硬化

腹水。

#### 7190012

*Colubrina asiatica* (L.) Brongn.

植物名 蛇藤《中国植志》

文献名 亚州滨枣《台湾药植志》

地方名 台湾:山乌刺。

功效 茎、叶:消肿。

#### 7190013

*Gouania javanica* Miq.

植物名 毛嘴签《中国植志》

文献名 毛叶嘴签《广西植志》, 爪哇下果藤《云南种录》

地方名 广西:烧伤藤, 节节藤。

功效 茎、叶:清热解毒, 收敛止血。用于烧烫伤, 外伤出血, 疮疖红肿, 湿疹, 痢疮溃烂。

#### 7190014

*Gouania leptostachya* DC.

植物名 嘴签《中国植志》

药材名 下果藤《云南中草药选》

文献名 嘴针《广西药录》

地方名 广西:吹风藤(宁明);云南:“亚奔波”、“亚泵磷”(西双版纳傣语)。

功效 茎、叶:清热消炎。用于烧烫伤。

#### 7190015

*Gouania leptostachya* DC. var. *tonkinensis* Pitard

植物名 越南嘴签《中国植志》

药材名 下果藤《汇编》

文献名 大苞嘴签《汇编》, 北越下果藤《云南种录》

地方名 云南:“亚泵磷”(傣语)。

功效 茎、叶:凉血解毒, 舒筋活络。用于肢体麻木。外用于烧烫伤, 疮疡。

#### 7190016

*Hovenia acerba* Lindl. --- *H. parviflora* Nakai et Y. Kimura

植物名 枳椇《中国植志》

药材名 枳椇子《唐本草》、《汇编》

文献名 枸《诗经》, 拐枣《救荒本草》, 鸡爪子《纲目》, 南枳椇《汇编》, 小花拐枣《云南种录》, 南方拐枣《江西药录》

地方名 万字果(福建、广东), 万寿果(福建、广东、广西), 天藤、还阳藤(华南), 鸡爪树(江苏、安徽), 金钩子(浙江、安徽); 浙江:鸡爪梨, 金果梨; 福建:钩子梨(建宁), 万字梨、解酒子(闽西), 拐子枣, 蜜子梨; 广东:橘扭树、九柳(惠阳), 结钩, 橘扭子, 橘扭俚, 结留子; 广西:万寿子, 鸡爪果, 鸡爪连, 鸡爪连子, 鸡距子; 贵州:鸡勾, 鸡枣; 云南:鸡橘子。

功效 种子:止渴除烦, 解酒毒, 利二便。用于醉酒, 烦热, 口渴, 呕吐, 二便不利。

#### 7190017

*Hovenia dulcis* Thunb.

植物名 北枳椇《中国植志》

药材名 枳椇子《唐本草》、《汇编》

文献名 枸《诗经》, 枳椇《庄子》, 棋《礼记》, 木蜜、枸骨(陆玑《诗疏》), 交加枝《雷公炮炙论》, 树蜜、木锡、白石木(崔豹《古今注》), 白石木子《荆楚岁时记》, 枳椇《唐本草》, 蜜屈律《太平广记》, 鸡距子、赖汉指头《苏沈良方》, 白石、金钩梨《尔雅翼》, 背洪子、兼穹《朱子大全》, 拐枣《救荒本草》, 木珊瑚、鸡爪子、鸡橘子、结留子、曹公爪、棘枸、鸡距、梨枣树《纲目》, 金钩木《舆地志》, 白石枣《医林纂要》, 石李、白宝、烂瓜《新纲》, 龙爪树《种分》, 枳枣《中药志》, 蜜子梨、龙爪《中国药植志》

地方名 婆婆子(东北), 鸡爪、鸡爪树(陕西、江苏、安徽), 鸡爪梨(北京、江苏、安徽), 拐枣子(湖北、四川), 甜半夜(陕西、河南), 金钩子(江苏、湖北); 辽宁:具子; 陕西:万字果; 山东:白苏木; 江苏:金钩钩(常熟), 龙爪子(宜兴), 金果树子(泰县), 曲陆米、九曲弯(苏州), [酸枣子](天台山、睢宁), 鸡脚爪, 鸡脚枣, 臭杞子; 浙江:糖果树; 江西:转扭子; 湖北:鸡巨子; 四川:鸡棋子, 含泡树, 拐枣儿(峨眉山); 其他:金钩李。

功效 果实、种子:清热利尿, 止渴除烦, 解酒毒。用于热病烦渴, 呃逆, 呕吐, 小便不利, 酒精中毒; 树皮:活血, 舒筋解毒。用于腓肠肌痉挛, 食积, 铁棒锤中毒; 果梗:健胃, 补血。用于滋养补血; 叶:用于死胎不出; 液汁:用于腋下狐臭。

#### 7190018

*Hovenia trichocarpa* Chun et Tsiang --- *H. tomentosa* Cheng

植物名 毛果枳椇《中国植志》

文献名 黄毛枳椇《中国植志》, 毛拐枣《江西药录》

地方名 枳椇(安徽、浙江); 广西:毛枳椇, 毛果鸡爪连。

功效 种子:止渴除烦, 解酒毒, 利二便。

#### 7190019

*Paliurus hemsleyanus* Rehd.

植物名 铜钱树《思南府志》、《中国植志》

药材名 金钱木根《浙江天目药志》

文献名 马鞍秋《思南府志》

地方名 [鸟不宿](陕西、四川); 陕西:摇钱树, 刺凉子; 浙江:金钱木(临安); 安徽:金钱树; 湖北:柞古丁、刺梁木(神农架); 广西:麻介树(融安); 四川:钱串树。

功效 根:用于劳伤乏力; 全株:用于痢疾, 风湿痹痛。外用于跌打损伤。

#### 7190020

*Paliurus ramosissimus* (Lour.) Poir.

植物名 马甲子《名实图考》、《中国植志》

药材名 铁篱笆《汇编》

文献名 马驹、白棘《本经》, 棘刺、刺针棘原、棘刺花、荏蓂、白棘实、刺仔心《别录》, 白棘枝、白棘叶、白棘刺、赤龙爪《纲目》, 马鞍树《遵义府志》, 马鞍《思南府志》, 棘针、刺原、马胸《本草新注》, 滨枣《牧野H图》

地方名 马甲刺(湖南、四川), 雄虎刺(福建、湖南), 乌刺仔(台湾、湖南); 安徽:马尾刺; 福建:霜药(宁化), 一条龙(莆田), 牛角刺(龙海); 台湾:公牛刺, 牛港刺, 刺仔心头, 刺江壮, 白刺; 湖南:石刺子、簕子、刺针、(铁

菱角)、木架筋、水架筋(衡山);广东:筋仔、仑头筋、饶钹筋、水筋、和尚筋(惠阳),棘盘子;广西:怕托筋(龙州),密里木(容县),伞钉筋、仙姑筋、鸡眼筋(梧州),秤锤筋、狗骨筋(南宁),围园刺(金秀);四川:铜钱树,铁篱芭根,铁篱巴果;贵州:铁理风(贵阳)。

功效 根:祛风止痛,解毒。用于感冒发热,胃痛,跌打损伤;叶:用于疮痈肿毒。

## 7190021

*Rhamnella franguloides* (Maxim.) Weberb. --- *R. obovalis* Schneid.

植物名 猫乳《中国植志》

文献名 卵叶猫乳《江苏南部种册》,长叶绿柴《树分》

地方名 浙江:鼠矢枣;安徽:山黄。

功效 全株:用于劳伤乏力;根:用于疥疮。

## 7190022

*Rhamnella gilgitica* Mansf. et Melch.

植物名 西藏猫乳《中国植志》

药材名 升登《药典》

文献名 森等《品珠本草》

功效 木材:凉血,利湿消肿。用于类风湿性关节炎,黄水病,高原性红细胞增多症。

## 7190023

*Rhamnus arguta* Maxim.

植物名 锐齿鼠李《中国植志》

文献名 火李《中国植志》,老鸱眼《华北树木志》,圆鼠李《山东树木志》,尖齿鼠李《秦岭植志》

地方名 辽宁:老乌眼;北京:牛李子;河南:照家茶。

功效 树皮:有小毒。清热通便;果实:有小毒。止咳,祛痰。

## 7190024

*Rhamnus brachypoda* C. Y. Wu ex Y. L. Chen

植物名 山绿柴《中国植志》

药材名 山绿柴《广西药录》

功效 根皮:用于牙痛。

## 7190025

*Rhamnus cathartica* L.

植物名 药鼠李《中国植志》

药材名 药鼠李实《药材学》

功效 果实:通便。

## 7190026

*Rhamnus crenata* Sieb. et Zucc. --- *Frangula crenata* (Sieb. et Zucc.) Miq.

植物名 长叶冻绿《中国植志》

药材名 黎辣根《名实图考》,《中药大辞典》

文献名 黎罗根《汇编》,钝齿鼠李《台湾植志》,缘齿鼠李、鼠李《云南药录》

地方名 梨罗根(江西、湖南),六厘柴(浙江、福建),铁包金、苦李根(广东、广西),黄药(江西、广东、广西),山黄(浙江、广东);江苏:水冻绿(镇江);浙江:山绿篱、山六厘、山鹿梨、六厘(杭州),癩痢柴(建德);江西:亡药(萍乡),癩痢根,赖芦子,黎罗柴;福建:龙泥根(福州),鹿梨草(清流、宁化),绿柴(周宁),石冻只(永春),

鬼头发(寿宁);湖北:[过路黄](兴山),山黑子(宜昌),长叶绿柴,冻绿,绿篱柴,土黄芩(神农架);湖南:梨头根(新宁、淑浦、凤凰、麻阳、长沙、衡山),琉璃根、两木叶(通道),梨辣根(长沙),土黄柏(新宁),罗梨根,泥罗根,雷路根,犁乃根;广东:拿药、拿柳、奶药、野药(惠阳),掌牛仔,大野牛奶桃,丫弓子,吐利蕈,黄老虎,癩药,刀头根(广州);广西:红点秤(南宁),一扫光(上林、金秀),土黄连(贵县),马灵仙(玉林),狐狸根(北流),假黄连、夜路根、玻璃根、胡连(平南),山辣蓼(博白),咕嘿根,子野根,狗心树,苦李蕈;四川:教尔母子树(达县);云南:修琴树。

功效 根或根皮:清热利湿,杀虫,止痒。外用于疥疮,顽癣,湿疹,脓疱疮。

## 7190027

*Rhamnus davurica* Pall.

植物名 达乌里鼠李《新华本草纲要》

药材名 鼠李《汇编》

文献名 绿子《本经逢原》,乌罌子、牛消子、禾镰子《医林纂要》,羊史子《名实图考》,狗李子《种分》,老攸言叶《满蒙药植》,山黑子《土农药志》,黑格兰、烧烂锅《沙漠药植》,冻绿柴、红皮绿树《中药大辞典》,老乌眼《汇编》

地方名 鼠李实、老鸱眼(东北),叫铃木、叫梨木(西南),老鸱眼(东北、辽宁、河南);吉林:吴李子;陕西:黑老鸦刺(华县);河北:大绿;其他:油葫芦子,狗李,黑狗丹,搭绿皮,乌棒树,大龟头。

功效 树皮:有小毒。清热通便。用于大便秘结;果实:有小毒。止咳,祛痰。用于支气管炎,肺气肿,龋齿痛,痈疖,疔瘡,瘰疬,疥癣。

## 7190028

*Rhamnus diamantiaca* Nakai

植物名 金刚鼠李《中国植志》

文献名 金刚鼠李《药材学》

功效 树皮:清热通便;果实:止咳,祛痰。

## 7190029

*Rhamnus erythroxylon* Pall.

植物名 柳叶鼠李《中国植志》

文献名 茶叶树、窄叶鼠李《沙漠药植》,小叶黑格郎、碎叶刺《陕甘宁植志》,家茶《汇编》

地方名 山西:红木鼠李;内蒙古:黑格铃;陕西:黑格兰,黑疙瘩。

功效 叶:消食健胃,清热去火。用于消化不良,腹泻。

## 7190030

*Rhamnus esquirolii* Levi. --- *Celastrus lvi* Levi. --- *Sageretia bodinieri* Levi.

植物名 贵州鼠李《中国植志》

药材名 贵州鼠李《贵州药录》

文献名 无刺鼠李《高植图鉴》

地方名 贵州:铁滚子,紫棍柴。

功效 根、果、叶:活血消积,理气止痛。用于腹痛,月经不调。

## 7190031

*Rhamnus esquirolii* Levl. var. *glabrata* Y. L. Chen et P. K. Chou

植物名 木子花《中国植志》  
药材名 木子花(四川峨眉山)  
功效 叶、果实:外用于刀伤。

## 7190032

*Rhamnus frangula* L. --- *Frangula alnus* (L.) Mill.

植物名 欧鼠李《中国植志》  
药材名 弗郎鼠李皮(赵《生药》)  
文献名 药炭鼠李《树分》  
地方名 新疆:药绿柴。  
功效 树皮:催吐,缓泻。用于腹痛,便秘,为大黄代用品。

## 7190033

*Rhamnus fulvotincta* Metc.

植物名 黄鼠李《中国植志》  
药材名 黄鼠李《广西药录》  
地方名 广西:紫背药(天峨)。  
功效 全株:清肝明目;根:用于风湿痹痛,扁桃腺炎,腹痛。

## 7190034

*Rhamnus globosa* Bunge

植物名 圆叶鼠李《中国植志》  
药材名 鸭屎树《汇编》  
文献名 冻绿刺《湖南药物志》  
地方名 山绿柴(江苏、浙江);山东:欧李子(崂山),乌李豆子(昆崙山),护山鸡(泰山),偶栗子;浙江:黑鸟枝刺(临安),冻绿;安徽:冻绿树,黑旦子;湖南:野苦楝子,洞皮树,臭李子,老鸪眼;其他:野屎树。  
功效 茎、叶、根:杀虫,下气,祛痰,消食。用于瘰疬,哮喘,蚊虫病。

## 7190035

*Rhamnus henryi* Schneid.

植物名 毛叶鼠李《中国植志》  
药材名 绉棉藤《云南药录》  
地方名 云南:黄柴。  
功效 果实:清肺热。用于肺热咳嗽。

## 7190036

*Rhamnus heterophylla* Oliv.

植物名 异叶鼠李《中国植志》  
药材名 崖枣树《贵州民间药物》  
文献名 岩枣树《汇编》  
地方名 女儿茶(四川、贵州);四川:黄茶根,女儿红;贵州:岩果紫(安顺),紫果叶(都匀)。  
功效 根或枝叶:清热利湿,凉血止血。用于痢疾,吐血,咯血,痔疮出血,血崩,白带,月经不调,暑日烦渴。

## 7190037

*Rhamnus koraiensis* Schneid.

植物名 朝鲜鼠李《中国植志》  
功效 树皮:清热通便;果实:止咳,祛痰。

## 7190038

*Rhamnus leptophylla* Schneid.

植物名 薄叶鼠李《中国植志》  
药材名 绛梨木(四川)、《汇编》  
文献名 铁刺枝、刺枝、刺枝根《滇南本草》,打枪子、嚼连根、孟子根《分类草药性》,白苏木《华北经济植物志要》,细叶鼠李《广西植志》,赤木《华北树木志》,嚼连木《中药大辞典》

地方名 郊李子(广西、四川);河南:白色木,白赤木;湖北:蜡子树(兴山),榨木钉(神农架);广西:木蛇(三江),巴巴木(兴安);四川:叫耳母子,叫铃子,叫梨子,金钱子、绛耳木、叫母耳子、震天雷、黑枣子(成都),黑龙须,绛梨子(峨眉山);贵州:铁包金、鹿角刺根、鹿角刺(贵阳),亮高柴(铜仁),叫梨子木(遵义),“梅纳利”(榕江侗语),黄根,冻绿刺;云南:绿皮刺,牛筋刺(曲靖),刺绿皮,土黄柏(玉溪);其他:绛耳目,乌荏子刺。

功效 根和果实:消食顺气,活血祛瘀。用于食积腹胀,食欲不振,胃痛,暖气,跌打损伤,痛经。

## 7190039

*Rhamnus leptophylla* Schneid. var. *villosissimus* C. Y. Wuined.

植物名 毛薄叶鼠李《神农架药录》  
地方名 湖北:榨木钉(神农架)。  
功效 果实:消食,行水,通便;根:消食,行水,祛瘀;叶:用于食积饱胀。

## 7190040

*Rhamnus nepalensis* (Wall.) Law.

植物名 尼泊尔鼠李《中国植志》  
文献名 纤序鼠李《广西植志》, 锥序鼠李《云南种录》

地方名 染布叶(浙江、福建);湖南:叶青,大风药;广西:皂布叶(天峨)。

功效 根、茎:祛湿,消肿。用于风湿关节痛,慢性肝炎,早期肝硬化腹水;果实、叶:外用于疥疮。

## 7190041

*Rhamnus parvifolia* Bunge

植物名 小叶鼠李《中国植志》  
药材名 小叶鼠李《汇编》  
文献名 麻绿、叫驴刺《植物名汇》,驴子刺《高植图鉴》,大绿《台湾药植志》  
地方名 老乌眼(东北),黑格铃(内蒙古、河北),琉璃枝(山东、河南);河北:黑梨,白花条;内蒙古:“雅西勒”(蒙名),挠胡子,臭李子,鼠李;山东:欧李子(崂山),乌李豆子(昆崙山),护山鸡(泰山);云南:铁刺枝;其他:叫驴子。

功效 果实:有小毒。清热泻下,消瘰疬。用于腹满便秘,疥癣,瘰疬。

## 7190042

*Rhamnus rosthornii* Pritz. --- *R. leveilleana* Fedde

植物名 小冻绿树《中国植志》  
药材名 叫梨木《西昌中草药》



文献名 狭叶鼠李《西昌中草药》

地方名 四川:叫梨子、黑果刺、牛筋刺(会东)。

功效 根、果:利水行气,消积通便。用于食积腹胀,大叶性肺炎,疮痈,便秘,腹痛,月经不调。

#### 7190043

*Rhamnus schneideri* Levl. et Vant. var. *manshurica* Nakai

植物名 东北鼠李《中国植志》

功效 树皮:清热通便;果实:止咳祛痰。

#### 7190044

*Rhamnus ussuriensis* J. Vass.

植物名 乌苏里鼠李《中国植志》

药材名 鼠李《汇编》

地方名 老鸱眼(辽宁、内蒙古);内蒙古:臭李子,大绿。

功效 树皮:清热通便;果实:止咳祛痰。

#### 7190045

*Rhamnus utilis* Decne.

植物名 冻绿《中国植志》

药材名 鼠李《本草》、《浙江药植志》

文献名 牛李《吴普本草》,鼠梓、柰《别录》,皂李、赵李《唐本草》,乌巢子《图经》,山李子(刘禹锡《传信方》),楮李、牛皂子、乌槎子《纲目》

地方名 红冻(陕西、福建、湖北),冻绿柴(浙江、安徽);陕西:黑狗旦;山东:欧李豆子(昆崙山);浙江:大叶乌枝刺(临安),绿柴(丽水),冻绿树,冻木树,绿皮刺;安徽:糙皮树;福建:小黄,绿泥根,鹿蹄根;河南:大脑头,狗李,油葫芦干,砂绿皮,楮绿皮,黑狗丹;湖北:野油漆树,木藜芦(神农架);广西:山桃子(贵县);四川:乌稍子(南充);贵州:鹿梨;其他:过路黄。

功效 根、根皮或树皮:用于疥疮,湿疹,发痧肚痛,跌打损伤;果实:导泻。

#### 7190046

*Rhamnus utilis* Decne. var. *hypochrysus* (Schnied.) Rehd.

植物名 毛冻绿《中国植志》

文献名 黑刺《秦岭植志》,毛叶冻绿《神农架药录》

地方名 湖北:榨骨钉(神农架)。

功效 果实:解热,止泻。用于瘰癧。

#### 7190047

*Rhamnus virgata* Roxb. --- *R. leptophylla* Schneid. var. *milensis* Schneid.

植物名 帚枝鼠李《中国植志》

文献名 弥勒薄叶鼠李《云南种录》,细叶鼠李《云南药录》,分枝鼠李《拉汉英种称》,帚状鼠李《广西《园林药录》)

地方名 贵州:小叶冻绿。

功效 根、茎:清热,散瘀消肿。用于肝炎,扁桃体炎,咽喉炎;果实:除积食。用于消化不良,腹胀。

#### 7190048

*Sageretia hamosa* (Wall.) Brongn.

植物名 钩刺雀梅藤《中国植志》

药材名 钩刺雀梅藤《广西药录》

文献名 钩状雀梅藤《拉汉英种称》

地方名 浙江:猴栗。

功效 根:用于风湿痹痛,跌打损伤。

#### 7190049

*Sageretia henryi* Drumm. et Sprague

植物名 梗花雀梅藤《中国植志》

文献名 亨利雀梅藤《广西药录》

地方名 [红藤](广西、四川);湖北:枸儿茶(神农架);广西:红雀梅藤;四川:约锦藤(峨眉)。

功效 果实:降火,清胃热。

#### 7190050

*Sageretia pycnophylla* Schneid. --- *S. perpusilla* Schneid.

植物名 对节刺(四川)、《中国植志》

药材名 对节刺《贵州药录》

地方名 四川:铁勒鞭棵棵(巫山);贵州:沙糖果。

功效 根、果:清热解暑,理气止痛。用于风寒咳嗽,胃痛,无名肿毒。

#### 7190051

*Sageretia rugosa* Hance

植物名 皱叶雀梅藤《中国植志》

药材名 皱叶雀梅藤《广西药录》

文献名 锈毛雀梅藤《高植图鉴》

地方名 湖南:九把伞;广西:糖背菜(富川)。

功效 根:用于风湿痹痛。

#### 7190052

*Sageretia thea* (Osbeck) Johnston --- *S. theezans* (L.) Brongn

植物名 雀梅藤《中国植志》

药材名 雀梅藤《汇编》

地方名 对节刺(华北、浙江、广西、云南),酸桐子、酸色子(华南);江苏:对节刺;浙江:碎米子、扎梅(临安),摘木(普陀),雀梅酸(乐清),五金龙(丽水),岩溪蓄(龙泉),雀梅,酢酢梅,刺冻绿;福建:大本鼠米,石晚,浮埔;台湾:牛鬃刺,刺晚;广东:酸味(广州),酸梅筋、酸香筋、酸钉筋(惠阳);广西:沙穿勒、米碎木(玉林);云南:刺杨梅,对节巴,杨松毛,癌藤,癌瘤藤。

功效 根:行气化痰。用于咳嗽气喘,胃痛;叶:解毒消肿,止痛。外用于疮疡肿毒,烫火伤。

#### 7190053

*Sageretia thea* (Osbeck) Johnston var. *toментosa* (Schneid.) Y. L. Chen et P. K. Chou

植物名 毛叶雀梅藤《中国植志》

药材名 毛叶雀梅藤《广西药录》

功效 根:用于感冒,肝炎;叶:外用于跌打损伤。

#### 7190054

*Ventilago inaequalateralis* Merr. et Chun

植物名 海南翼核果《中国植志》

药材名 海南翼核果《广西药录》

功效 全株:用于毒蛇咬伤。

#### 7190055

*Ventilago leiocarpa* Benth.

植物名 翼核果《中国植志》

药材名 翼核果《汇编》

文献名 光果翼核木《台湾中药材图鉴》, 光果翼核藤《云南种录》

地方名 青藤、铁牛入石、血风藤(广东、广西), 血风根(广东、海南); 台湾: 青皮猫; 广东: 牛参(阳春), 水边红, 坑边青, 鸡爪黄(湛江), 血宽筋(化州), 红蛇根、青藤仔(潮阳), 黄梅根、青钩(增城), 血贯(徐闻); 海南: 血枫根, 老鼠拉屎藤, 青筋藤, 崩果藤; 广西: 川破石(柳江、昭平、藤县、平南、玉林、桂平), 状元红(贺县、容县、桂平、北流、平南), 血母平、松鳞藤(梧州), 鸡爪王(北流), 拉牛入石, 过山风, 红穿破石, 松鳞藤, 穿破石。

功效 根茎: 养血祛风, 舒筋活络。用于风湿筋骨痛, 跌打损伤, 腰肌劳损, 贫血头晕, 四肢麻木, 月经不调。

#### 7190056

*Venulago leiocarpa* Benth. var. *pubescens* Y. L. Chen et P. K. Chou

植物名 毛叶翼核果《中国植志》

药材名 毛叶翼核果《广西药录》

功效 根、茎: 祛风湿, 消肿止痛。用于风湿痹痛, 跌打损伤; 叶: 止痛。

#### 7190057

*Ziziphus incurva* Roxb.

植物名 印度枣《中国植志》

药材名 印度枣《广西药录》

文献名 滇枣《树分》

地方名 广西: 麦抱。

功效 叶: 外用于跌打损伤。

#### 7190058

*Ziziphus jujuba* Mill.

植物名 枣《诗经》、《中国植志》

药材名 大枣《本经》、《药典》

文献名 良枣《吴普本草》, 干枣、美枣、枣叶《别录》, 枣根《本草经集注》, 红枣《医学入门》, 木蜜、白蒲枣《花镜》, 丹枣、棠枣、桧枣、白枣、紫枣、灌枣、氏枣、桂枣、胶枣、墟枣、枣膏、枣脯、枣油、牛头、羊角、狗牙、蹶泄、鸡心、轳轳、天蒸枣、扑落酥《新纲》, 枣子树《中国植志》

地方名 枣树、枣子(河北、山东、山西), 红枣树(四川、湖南); 内蒙古: “哲日利格察布嘎-音-乌热”(蒙名), 大红枣(包头); 江苏: 牙枣、沙枣(苏北); 上海: 白核枣, 白乌枣; 浙江: 羊官枣(杭州), 南枣; 湖北: 别大枣; 湖南: 山枣子, 红枣子, 野红枣; 广西: 鸡心红枣、鸡心枣子(崇左), 山红枣(桂平); 四川: 刺枣, 枣子根, 川枣皮; 其他: 脆苓枣, 胡瓶枣, 狼枣, 龙爪枣树, 敦骨如枣, 黑枣, 乌枣。

功效 果实: 补中益气, 养血安神。用于脾虚食少, 乏力便溏, 妇人脏躁; 果核: 用于胫疮, 走马牙疳; 叶: 用于时气发热, 疮疖; 树皮: 收敛止泻, 祛痰, 镇咳, 消炎, 止血。用于痢疾, 肠炎, 慢性气管炎, 目昏不明, 烧烫伤, 外伤出血; 树根: 用于关节酸痛, 胃痛, 吐血, 血崩, 月经不调, 风疹, 丹毒。

#### 7190059

*Ziziphus jujuba* Mill. var. *inermis* (Bunge) Rehd. --- *Z. vulgaris* Lam. var. *inermis* Bunge

植物名 无刺枣《中国植志》

药材名 大枣《本经》、《汇编》

文献名 良枣《吴普本草》, 干枣、美枣、枣叶《别录》, 赤小枣、康枣《滇南本草》, 红枣《医学入门》, 丹枣、棠枣、桧枣、白枣、紫枣、灌枣、氏枣、桂枣、胶枣、墟枣、枣膏、枣脯、枣油、蹶泄、鸡心、轳轳、天蒸枣、扑落酥《新纲》, 枣树《中药志》

地方名 河北: 小枣, 大甜枣; 山东: 枣; 江苏: 白蒲枣(启东、常熟); 湖北: 药枣子, 枣子; 广西: 老枣; 云南: 糠毗枣, 滇刺枣; 其他: 枣子树。

功效 果实: 补中益气, 养血安神。用于脾虚食少, 乏力便溏, 妇人脏躁。

#### 7190060

*Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chow --- *Z. sativa* Gaertn. var. *spinosa* (Bunge) Schneid. --- *Z. spinosa* (Bunge) Hu ex Chen

植物名 酸枣《本经》、《中国植志》

药材名 酸枣仁《雷公炮炙论》、《药典》

文献名 棗、酸枣《尔雅》, 棘《诗经》, 山枣《本草经集注》, 棘棘《孟子》, 棘仁、山枣仁、调睡参军《新纲》, 酸枣树《树分》, 酸枣根皮《陕西中草药》

地方名 山枣树(河南、安徽), 角针(安徽、山东), 枣仁(内蒙古、四川); 河北: 山酸枣; 山西: 棘酸枣; 内蒙古: 花红枣; 山东: 黄毛棘, 棘子; 江苏: 酸枣子、小酸枣仁(徐州), 酸枣核(清江); 安徽: 小山枣, 野枣子; 河南: 硬枣; 四川: 刺枣; 其他: 赤棘。

功效 种子: 补肝, 宁心, 敛汗, 生津。用于虚烦不眠, 惊悸多梦, 体虚多汗, 津伤口渴。

#### 7190061

*Ziziphus mauritiana* Lam.

植物名 滇刺枣《中国植志》

药材名 缅甸枣《云南中草药》

文献名 黑食子、嘘嘘果《滇南本草》

地方名 酸枣(广东、云南); 广西: 莱苑; 云南: 西西果(保山、思茅), “马典”、“吗点”(傣名), 滇枣皮, 酸枣皮, 西西果皮, 枣仁。

功效 树皮: 消炎, 生肌。用于肠炎, 痢疾。外用于烧伤, 烫伤。

#### 7190062

*Zizyphus montana* W. W. Smith

植物名 山枣《中国植志》

药材名 山枣《迪庆藏药》

功效 种仁: 用于不育症。

### 7191 胡颓子科 Elaeagnaceae

#### 7191001

*Elaeagnus angustifolia* L.

植物名 沙枣《中国植志》

药材名 沙枣(甘肃)、《汇编》

文献名 四味果《纲目拾遗》,砂枣《华北经植志要》,甘肃胡颓子《树分》,银柳胡颓子《东北木本图志》,胡颓子《中国经植志》,七里香《植物名汇》,沙枣叶《药典》,沙枣胶《新疆中草药手册》

地方名 砂枣子(西北);辽宁:银柳;内蒙古:“则给毛道”、“则给德毛道”、“牙格达”、“吉格达”(蒙名);红豆;新疆:“吉格代”、“给结格代”(维名);河南:香柳,桂香柳,刺柳。

功效 果实:健脾止泻。用于脾虚,消化不良,腹泻;叶:清热解毒。用于痢疾,腹泻,肠炎;树皮:清热凉血,收敛止痛。用于慢性气管炎,胃痛,肠炎,白带。外用:烧烫伤,止血;胶:用于骨折;花:止咳平喘。

## 7191002

*Elaeagnus angustifolia* L. var. *orientalis* (L.) Kuntze

植物名 东方沙枣《中国植志》

药材名 大沙枣(拟)

功效 果、根皮、茎皮:健脾止泻。用于脾虚,消化不良,腹泻;叶:清热解毒。用于痢疾,腹泻,肠炎。

## 7191003

*Elaeagnus argyi* Levl.

植物名 余山羊奶子《中国植志》

文献名 余山胡颓子《江苏南部种册》

地方名 江西:牛奶子。

功效 根:祛痰化湿,利胆。用于黄疸型肝炎,咳嗽,风湿痹痛,疖痢等症。

## 7191004

*Elaeagnus bockii* Diels

植物名 长叶胡颓子《中国植志》

药材名 长叶胡颓子《广西药园药录》

文献名 川西胡颓子《广西植录》

地方名 四川:马鹳树、牛奶子(成都);贵州:牛奶果。

功效 叶:平喘止咳。用于哮喘,慢性气管炎,感冒咳嗽;根:利尿通淋,散瘀消肿,接骨。用于跌打骨折,疥疮,风湿,肝炎,胃病,尿路结石,骨鲠喉;果:收敛止泻。用于肠炎腹泻。

## 7191005

*Elaeagnus difficilis* Serv. --- *E. cuprea* Rehd.

植物名 巴东胡颓子《中国植志》

药材名 咸孢柴《汇编》

文献名 铜色叶胡颓子《高植图鉴》,盐孢藤、沉孢、补阴丹《汇编》

地方名 四川:半圈子(酉阳)。

功效 根:温下焦,祛寒湿。用于小便失禁,外感风寒。

## 7191006

*Elaeagnus glabra* Thunb.

植物名 蔓胡颓子《中国植志》

药材名 蔓胡颓子《汇编》

文献名 阳春子《名实图考》,羊奶子、三月黄子《树分》,光滑胡颓子《拉汉种称》,藤胡颓子《中国经植志》,抱君子、桂香柳《高植图鉴》

地方名 上海:马奶树;浙江:藤木楂(乐清),柿果(平阳),白甜蒲(泰顺);福建:打锅炸(三明),半身子(宁化),吊三子(清流),沙糖罐(明溪),鸡茄根(大田);广东:疑鹤根、叮冬仔(潮阳),狗蚊头(河源),镰鱼勒(增城),列吊树(韶关),银背寿隆树(阳春),棋糊(汕头),倒吊子(翁源),鸡笛树(惠阳、五华),山铁杭,鸡梭子,当吊子,夜行千里,甜棒锤、蒲颓子、蔷薇树、半春子(广州),疑吴(饶平);广西:牙叉草、羊奶奶、羊母奶、半奶果、瓦环果、羊奶子、炒银藤(河池),白面将军(富川);贵州:加豆叶。

功效 叶:平喘止咳,退热。用于支气管哮喘,慢性支气管炎,感冒咳嗽,骨鲠喉;果:收敛止泻。用于肠炎腹泻;根:利尿通淋,散瘀消肿。用于跌打损伤,吐血,尿路结石。

## 7191007

*Elaeagnus gonyanthes* Benth.

植物名 角花胡颓子《中国植志》

药材名 角花胡颓子《汇编》

文献名 多花胡颓子《广西药录》,吊中子藤《高植图鉴》

地方名 海南:假甜酸(澄迈);广西:鸭公藤(大瑶山),红面将军(陆川),土芋肉(北流);云南:羊奶果;其他:羊母奶子。

功效 叶:平喘止咳。用于支气管哮喘,慢性支气管炎;根:祛风通络,行气止痛,消肿解毒。用于风湿性关节炎,腰腿痛,河豚中毒,狂犬咬伤,跌打肿痛;果:收敛止泻。用于泄泻。

## 7191008

*Elaeagnus henryi* Warb.

植物名 宜昌胡颓子《中国植志》

药材名 红鸡蹄香《陆川本草》

文献名 鄂西胡颓子《广西植录》

地方名 湖北:牛奶子、藤胡颓子(鹤峰);广西:白杜仲(苍梧),金背藤、[金耳环](博白),红面将军(陆川),红鸡蹄香(博白、陆川),疳积藤;四川:牛奶子根、牛奶树根(南充);贵州:羊奶奶。

功效 根、叶:清热利湿,平喘止咳,止血。用于痢疾,痔血,血崩,吐血,咳嗽,骨髓炎,消化不良。

## 7191009

*Elaeagnus lanceolata* Warb.

植物名 披针叶胡颓子《中国植志》

药材名 盐孢藤(福建)、《汇编》

文献名 柳叶胡颓子《云南种录》,咸孢柴、沉孢、补阴丹《汇编》

地方名 羊奶子(陕西、湖北);甘肃:麦桑子(文县);湖北:胡颓子,密蒙树,三月黄子、羊母奶子(神农架)。

功效 根皮:滋阴清热,活血生津。用于经闭,失眠,血崩,白带,肺热咳嗽。

## 7191010

*Elaeagnus loureirii* Champ.

植物名 鸡柏紫藤《中国植志》

药材名 吊灯笼《云南药录》

文献名 陆氏胡颓子《广西药录》, 南胡颓子《云南种录》

地方名 广东: 吊中仔藤(惠阳), 灯吊子; 广西: [金锁匙]、角罗风(玉林), [金耳环](博白), 红鸡刺藤(北流), 铺山燕(凤山); 云南: 胡颓子; 其他: 炮仗花。

功效 全草: 止咳平喘, 收敛止泻; 叶: 用于哮喘, 支气管炎; 根: 用于腹泻, 急性睾丸炎, 慢性肝炎, 胃痛, 跌打损伤, 痔疮, 肿痛; 果: 用于疮癣。

#### 7191011

*Elaeagnus macrophylla* Thunb.

植物名 大叶胡颓子《中国植志》

药材名 冬枣(山东)

文献名 圆叶胡颓子《山东树木志》

功效 根、叶、果: 收敛止泻, 平喘止咳。

#### 7191011a

*Elaeagnus magna* Rehd. --- *E. unbellata* Thunb. subsp. *magna* Serv.

植物名 银果牛奶子《中国植志》

药材名 银果牛奶子《贵州药录》

文献名 银果胡颓子《高植图鉴》

功效 根、叶: 清热解毒, 解表透疹; 根: 用于麻疹不透; 叶: 用于无名肿毒。

#### 7191012

*Elaeagnus mollis* Diels

植物名 翅果油树《中国植志》

地方名 山西: 灰棱蛋, 柴禾, 碱绿柴; 陕西: 毛折子。

功效 种仁: 含油量高, 油质好, 可供医药用。

#### 7191013

*Elaeagnus moorcroftii* Wall. ex Schlecht.

植物名 大果沙枣《沙漠植志》

药材名 大果沙枣《新疆药植志》

功效 果实: 止咳祛痰, 消食化滞, 活血散瘀。用于咳嗽痰多, 消化不良, 食积腹痛, 跌扑瘀肿, 瘀血经闭。

#### 7191014

*Elaeagnus multiflora* Thunb.

植物名 多花胡颓子《汇编》

药材名 木半夏《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 四月子、牛脱《高植图鉴》

地方名 牛奶子(山东、四川); 山东: 灰枣(昆崙山), 灰梨(莱阳), 灰糖梨(平邑、蒙山), 白棘子(五莲、泰山); 浙江: 判植(余姚), 洞甩叶(嵊县); 安徽: 小米饭树, 羊不来, 麦粒团, 莓粒团, 明子, 棠台; 江西: 芦都子; 福建: 牛脱; 湖北: 羊奶子; 湖南: 枣皮树; 四川: 牛奶子根, 石滚子, 卢都子(峨眉山); 贵州: 羊奶奶; 其他: 甜枣, 夏菜萸, 喷酢。

功效 根、叶、果: 平喘, 活血, 止痢。用于哮喘, 痢疾, 跌打损伤, 痔疮。

#### 7191015

*Elaeagnus multiflora* Thunb. var. *tenuipes* C. Y. Chang

植物名 细枝木半夏《中国植志》

功效 果、叶、根: 用于痔漏, 白浊, 下阴生疮等症。

#### 7191016

*Elaeagnus oldhami* Maxim.

植物名 福建胡颓子《中国植志》

药材名 檀枳(福建)、《汇编》

地方名 福建: 锅底刺(厦门), 柿模(莆田、仙游), 咸鲍柴(福州、宁德、闽清), 金钢刺, 金公根, 天青地白, 白叶刺, 江芦, 过路菜, 格鲁紫兰, 咸鲍柴根, 尿壶刺, 鹿头叶, 柿糊, 柿糊刺。

功效 根、叶: 祛风除湿, 下气定喘, 固肾。用于风湿性关节炎, 哮喘, 肾虚腰痛。

#### 7191017

*Elaeagnus pungens* Thunb.

植物名 胡颓子《中国植志》

药材名 胡颓子《本草拾遗》、《汇编》

文献名 卢都子、蒲颓叶《中藏经》, 雀儿麻《雷公炮炙论》, 王婆奶《履巉岩本草》, 蒲颓子、半含春《纲目》, 半春子、甜棒槌《名实图考》, 牛奶子、石滚子《草木便方》, 羊母奶子、糖罐头《植物名汇》, 牛奶根《分类草药性》, 胡颓叶、潘桑叶《简明中医辞典》

地方名 羊奶奶(湖南、贵州), 羊奶子(湖北、湖南), 牛奶子根(四川、湖南), 四枣(河南、湖南), 土黄肉(浙江、福建), 鸡卵子树(江西、湖南), 马奶树(江苏、上海); 江苏: 蒲栗子(苏州), 麦婆拉(常熟), 捕除果(宜兴), [接骨木]; 上海: 脚米藤, 潘桑果, 麦果果, 野枣子; 浙江: 大麦奶, 大麦前果, 大叶巴楂子, 干茄, 半楂(天目山), 斑楂, 白葛薯, 浆末草(平湖), 甜果, 野荸荠, 野枇杷, 野水葡萄, 贯梓根, 旗杓(东阳、永康), 麦楂(龙泉); 安徽: 三月枣, 羊不来, 羊奶树, 扁柞, 茶橘, 野樱桃, 糖枣; 江西: 丁吊子(定南), 牛婆奶奶树(吉水), 卢都树(婺源), 含米柴(宜黄), 清明子(丰城), 鸡卵子(吉安); 福建: 天青地白、野芭麻、白叶刺头(泉州), 半身子、吊吊子、芒迟子(宁化), 叶刺头, 咸鲍(闽东), 咸鲍头, 田蒲, 柿蒲, 灯蒲, 柿糊(福鼎), 补阴丹, 瓶鲍; 河南: 剪子股; 湖北: 三月小枣, 柿模, 甜棒子; 湖南: 小青六, 羊头泡, 白叶丹, 半升子(黔阳), 半钱子, 冬至兜, 豆子树, 冷皮消, 秧李子、阳春子(衡阳), 松树窝, 郎郎崽, 张公钓鱼, 姐姐树, 黄羊奶树, 薺密树; 广西: 白背风(柳江), 抓皮、梅花泡(富川), 假灯笼(龙州); 四川: 牛奶、牛瞒(南充); 贵州: 土羊奶; 其他: 黄婆奶, 喷酢。

功效 叶: 敛肺, 平喘, 止咳。用于咳嗽气喘, 咯血; 果实: 用于泻痢, 消渴, 咳嗽; 根: 止咳, 止血, 祛风利湿, 消积滞, 利咽喉。用于咳嗽, 吐血, 咯血, 便血, 月经过多, 风湿关节痛, 黄疸, 泻痢, 小儿疳积, 咽喉肿痛。

#### 7191018

*Elaeagnus sarmentosa* Rehd.

植物名 攀援胡颓子《中国植志》

药材名 羊奶果《汇编》

文献名 蒙自胡颓子《云南种录》, 长匐茎胡颓子《红河中草药》

地方名 云南: 牛虱子果, 羊山咪树。

功效 根、果、叶: 止咳平喘, 收敛止泻。用于哮喘, 虚咳, 慢性支气管炎, 肠炎, 腹泻, 跌打肿痛, 风湿疼

痛,吐血,咯血,咽喉肿痛,感冒,小儿惊风,疮癣等症。

#### 7191019

*Elaeagnus songarica* (Bernh. ex Schlecht.) Schlecht.

植物名 准噶尔沙枣《沙漠植志》

药材名 准噶尔沙枣《新疆药植志》

功效 果实:止咳祛痰,消食化滞,活血散瘀。用于咳嗽痰多,消化不良,食积腹痛,跌扑瘀肿,瘀血经闭。

#### 7191020

*Elaeagnus stellipila* Rehd.

植物名 星毛羊奶子《中国植志》

文献名 星毛胡颓子《高植图鉴》

地方名 四川:马奶子(峨眉山)。

功效 果实:清热利湿,收敛止泻。

#### 7191021

*Elaeagnus umbellata* Thunb.

植物名 牛奶子《中国植志》

药材名 牛奶子《名实图考》、《江苏药材志》

文献名 四月子、野櫻桃《纲目》,羊奶子《植物名汇》,茱萸、食茱萸、茱萸子《满鲜植志》,伞花胡颓子《华北树木志》,剪子《陕甘宁植志》

地方名 羊奶子(湖南、四川);陕西:剪子梢(太白山);山东:灰枣(昆崙山),灰梨(莱阳),灰糖梨(平邑、蒙山),白棘子(五莲、泰山),麦粒子;浙江:天青下白(宁波),红米饭(余姚),梅梅树(普陀),斑楂(丽水);河南:剪子果,剪子股,甜枣;湖北:山羊母奶子、小羊奶子(神农架);湖南:半春子,禾了子,芒珠子,岩麻子,密毛子,铃春子,清明子,迎春子,羊奶树,豆子树,春花胡颓子,娘娘,夏至茱萸;四川:马苳子,马现子;贵州:牛奶奶,秋胡颓子。

功效 根、叶、果实:清热利湿,止血。用于咳嗽,泄泻,痢疾,淋病。

#### 7191022

*Elaeagnus viridis* Serv. var. *delavayi* Lecomte

植物名 白绿叶《中国植志》

药材名 白绿叶《云南中草药》

文献名 丽江绿胡颓子《云南种录》

地方名 云南:小羊奶果,羊奶果,羊奶奶(昭通),羊肋树(大理),天青地白(丽江),胡颓子。

功效 叶:利尿排石,止咳定喘,行气止痛。用于慢性肾炎,胃痛,慢性支气管炎,支气管哮喘,尿路结石。

#### 7191023 见 7191011a

#### 7191024

*Hippophae rhamnoides* L.

植物名 沙棘《中国植志》

药材名 沙棘《药典》

文献名 黄果酸醋柳《科裁》,〔沙枣〕《高原中草》

地方名 海鼠李、酸刺儿(陕西、甘肃、宁夏),醋柳(内蒙古、四川、陕西、山西),酸刺(内蒙古、陕西),黄酸刺(陕西、山西),黑刺(青海、甘肃);河北:白酸醋柳;山西:白酸醋刺、酸刺柳、酸醋柳(太行);内蒙古:酸刺子,

酸柳柳,“其察日嘎纳”、“契察日戈纳”(蒙名);青海:“达日布”(藏名);新疆:“吉汗”(维名);四川:“达尔”(藏名);西藏:“大尔卜兴”(藏名)。

功效 果实:止咳祛痰,消食化滞,活血散瘀。用于咳嗽痰多,消化不良,食积腹痛,跌扑瘀肿,瘀血经闭。

#### 7191025

*Hippophae rhamnoides* L. subsp. *sinensis* Rousi --- *H. rhamnoides* L. var. *procera* Regd.

植物名 中国沙棘《中国植志》

文献名 红酸刺《华北树木志》

地方名 山西:醋柳;内蒙古:酸刺;陕西:黄酸刺,酸刺柳;青海:黑刺。

功效 果:富含维生素C,供药用。

#### 7191026

*Hippophae thibetana* Schlecht.

植物名 西藏沙棘《中国植志》

文献名 “达日布”(藏名)《植分学报》

功效 果实:止咳祛痰,消食化滞,活血散瘀。

### 7193 葡萄科 Vitaceae

#### 7193001

*Ampelocissus artemisiaefolia* Planch.

植物名 酸蕊藤《植分学报》

药材名 大九节铃《云南中草药》

文献名 艾叶酸蕊藤《中药大辞典》

地方名 云南:铜皮铁箍(丽江),牛角天麻。

功效 根:有小毒。接筋骨,止血消炎,止痛。用于骨折,刀枪伤,烧伤,痈肿。

#### 7193002

*Ampelopsis aconitifolia* Bunge

植物名 乌头叶蛇葡萄《高植图鉴》

药材名 草葡萄《安徽中草药》

文献名 野葡萄《植物名汇》,草白藜《东北木本图志》,乌头叶葡萄、蛇葡萄《中药志》,掌裂草葡萄《汇编》,狗葡萄《沙漠药植》

地方名 〔白片〕(西北),〔白藜〕(陕西、甘肃、宁夏、河南),过山龙(陕西、安徽、四川);陕西:羊葡萄蔓;河南:马葡萄;湖北:山葡萄(神农架)。

功效 根皮:散瘀消肿,祛腐生肌,接骨止痛。用于骨折,跌打损伤,痈肿,风湿关节痛。

#### 7193003

*Ampelopsis aconitifolia* Bunge var. *glabra* Diels et Gilg ---

*A. aconitifolia* var. *palmiloba* Rehd.

植物名 掌裂草葡萄《高植图鉴》

药材名 独脚蟾蜍(广东)、《汇编》

文献名 蛇葡萄《救荒本草》,三裂草白藜《东北木本图志》,光叶草葡萄《安徽中草药》,掌裂草白藜《鉴别手册》

地方名 安徽:白珠,一窝狼;广东:石蟾蜍、金钱吊蛤蟆(惠阳);广西:五爪龙(隆林);四川:爬山虎。

功效 块茎:清热解毒,豁痰。用于结核性脑膜

炎,痰多胸闷,禁口痢,疮疖痈肿。

#### 7193004

*Ampelopsis bodinieri* (Levl. et Vant.) Rehd. ---  
*Ampelopsis micans* Rehd.

植物名 蓝果蛇葡萄《高植图鉴补编》

药材名 上山龙《汇编》

文献名 蓝果野葡萄《中国经植志》,蛇葡萄《秦岭植志》,闪光蛇葡萄《陕西中草药》,大叶野葡萄《西昌中草药》,白背酸藤《云南种录》

地方名 陕西:大接骨丹(柞水),过山龙;四川:大红袍(西昌);贵州:扁担藤。

功效 根皮:消肿解毒,止血,止痛,排脓生肌,去翳,祛风湿。用于眼翳,跌打损伤,骨折,风湿腿痛,便血,崩漏,白带。

#### 7193005

*Ampelopsis bodinieri* (Levl. et Vant.) Rehd. var.  
*cinerea* (Gagn.) Rehd.

植物名 灰毛蛇葡萄《高植图鉴补编》

地方名 贵州:野葡萄。

功效 根:清热凉血,去翳生肌。用于眼翳,刀伤出血,疮毒,骨折。

#### 7193006

*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. var.  
*kulingensis* Rehd.

植物名 牯岭蛇葡萄《高植图鉴补编》

文献名 牯岭山葡萄《江西草药》

功效 根、皮:清热解毒,祛风活络;茎、叶:利尿,消炎,止血。

#### 7193007

*Ampelopsis cantoniensis* (Hook. et Arn.) Planch. --- *A. leoides* Planch. --- *Vitis cantoniensis* Seem.

植物名 广东蛇葡萄《高植图鉴补编》

药材名 无刺根《中草药学》

文献名 蛇葡萄《纲目拾遗》,粤蛇葡萄《广西药录》,有刺根《中草药学》,无刺根《全展选编·内科》,赤枝山葡萄、牛牵丝、红血龙《中药大辞典》

地方名 山甜茶(湖南、广东);浙江:过山龙(宁波),红脑藤、骨疼搜(乐清);福建:虾须藤(宁德);湖南:狮子藤;广东:牛劝须、白茹茶、辣梨茶(惠阳);海南:田浦茶、背带藤;广西:田婆茶、白毛茶、铁甲将军(桂平),藤茶(融安);贵州:母猪精藤。

功效 根或全株:消炎解毒。用于骨髓炎,急性淋巴结炎,急性乳腺炎,脓疱疮,湿疹,丹毒,疖肿,嗜盐菌食物中毒。

#### 7193008

*Ampelopsis delavayana* Planch.

植物名 三裂蛇葡萄《高植图鉴补编》

药材名 玉葡萄根《中药志》

文献名 赤木通、野蒲桃根、金刚散《滇南本草》,七角藤《植物名汇》,枫藤、台氏蛇葡萄《种分》,三裂叶蛇葡萄《浙南本草新编》,乌血藤《彝药志》

地方名 山葡萄(陕西、云南),五爪龙(湖南、云南),

见肿消(陕西、江西),蛇葡萄(陕西、云南),绿葡萄(广西、云南);江西:五爪金龙;湖北:三叶葡萄(神农架);广西:三叶藤(乐业),红狗肠(永福),[穿破石](贺县);四川:红赤葛,红内消,赤葛,钻山龙(峨眉山);云南:大接骨丹、耳坠果、野葡萄(昆明),玉葡萄(昆明、大理),“腰女卑”(楚雄彝名),“嘿宗嗨魏”(傣名),五爪金,飞蜈蚣藤,红十字创伤粉,野葡萄根,红母猪藤,破石珠,野葡萄藤,枪花药。

功效 根皮:散瘀止痛,消炎,止血。用于肠炎腹泻,跌扑损伤 外用于烧、烫伤,外伤出血,骨折。

#### 7193009

*Ampelopsis delavayana* Planch. var. *gentiliana* (Levl. et Vant.) Hand. Mazz. --- *Vitis potaninii* Maxim.

植物名 毛三裂蛇葡萄《高植图鉴补编》

药材名 绿葡萄《云南药录》

文献名 五裂叶蛇葡萄《秦岭植志》,毛三叶蛇葡萄、五叶枫藤《云南种录》

地方名 广西:红狗肠(融水);贵州:五爪龙,赤葛。

功效 根皮:散瘀止痛,消炎,止血;鲜茎火烤流汁;用于角膜云翳。

#### 7193010

*Ampelopsis delavayana* Planch. var. *mollissima* C. Y. Wu

植物名 柔毛蛇葡萄《(滇南本草)整理本》

地方名 云南:钻山虎、肥猪藤(禄劝县)。

功效 根皮:外用于痈疮,骨折。

#### 7193011

*Ampelopsis grossedentata* (Hand. -Mazz.) W. T. Wang --- *A. cantoniensis* (Hook. et Arn.) Planch. var. *grossedentata* Hand. -Mazz.

植物名 显齿蛇葡萄《高植图鉴补编》

药材名 甜茶藤(广西)、《汇编》

文献名 大齿蛇葡萄《广西药录》,大齿牛果藤《云南种录》

地方名 广西:田婆茶,苦练蛇(岑溪),藤茶(平南、大瑶山、富川、昭平),龙须茶、金丝苦练(平南)。

功效 全株:清热解毒。用于黄疸型肝炎,感冒风热,咽喉肿痛,急性结膜炎,痢疾。

#### 7193012

*Ampelopsis humulifolia* Bunge

植物名 葎叶蛇葡萄《高植图鉴》

药材名 紫葛《本经》

文献名 蛇葡萄《救荒本草》,酸藤《名实图考》,山葡萄、木果藤、趴山虎、爬山虎、趴墙虎《植物名汇》,葎草叶蛇葡萄《中药大辞典》,葎叶白薇、葎草叶山葡萄《陕西中草药》,七角白薇《汇编》

地方名 七角藤(东北);陕西:小接骨丹(陕南),[活血丹];台湾:大本山葡萄,耳空仔藤,冷饭藤,羹甘藤,野葡萄;湖北:斗轮刚(神农架);广东:牛见思。

功效 根皮:活血散瘀,消炎解毒,生肌长骨,祛风除湿。用于跌打损伤,骨折,疮疖肿痛,风湿性关节炎。

#### 7193013

*Ampelopsis humulifolia* var. *heterophylla* (Thunb.) K. Koch --- *A. brevipedunculata* var. *maximowiczii* (Regel) Rehd. --- *Vitis heterophylla* Thunb.

植物名 异叶蛇葡萄《高植图鉴补编》

药材名 蛇葡萄《云南药录》

文献名 光叶蛇葡萄《浙南本草新编》，光叶蛇白薇《东北木本图志》

地方名 蛇白薇、狗葡萄(东北)；辽宁：山葫芦蔓子，老鸱眼，稠文秧；浙江：山葡萄；福建：山红羊，山苦瓜，猫耳朵，野葡萄；海南：粉藤；贵州：〔大红袍〕，赤葛；云南：肉五甲、绿葡萄(文山)；其他：见毒消，〔爬山虎〕酸藤。

功效 根或根皮：清热解毒，祛风活络；茎、叶：利尿，消炎，止血。

#### 7193014

*Ampelopsis humulifolia* Bunge f. *trisecta* (Nakai) Kitag. --- *A. humulifolia* Bunge var. *trisecta* Nakai

植物名 三叶白薇《东北木本图志》

药材名 三叶白薇根皮(拟)

功效 根皮：活血散瘀，消炎解毒，生肌长骨，除风湿。用于跌打损伤，骨折，疮疖肿痛，风湿性关节炎。

#### 7193015

*Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino --- *A. serjaniaefolia* Bunge --- *Panlunia japonica* Thunb.

植物名 白薇《高植图鉴》

药材名 白薇《本经》、《药典》

文献名 菟核、白草《本经》，白根、昆仑《别录》，白薇子《药性论》，猫儿卵《纲目》，鹅抱蛋《名实图考》，山地瓜、二无舌、五爪叶、山葡萄、白茎、凉水罐、薇《植物名汇》，镜草《新纲》，五福膏《沈阳县志》，五爪藤《高植图鉴》

地方名 白水罐、野葡萄秧(东北、山东)，小老鸱眼根、猪儿卵(东北)，一窝狼(江苏、安徽)，山苦瓜(陕西、福建、广西)，见肿消(江苏、安徽、福建、湖南、广西)，地老鼠(江苏、浙江、安徽)，狗卵子(江苏、河南)；吉林：山葡萄秧，菰草，“嘎里套姆”(朝名)；辽宁：八卦牛，小老瓜蔓，白葡萄秧，山栗子，狗天天，狗浆罐；北京：地白薯(京郊)；河北：白葡萄蔓根，耗子枕头，野葡萄蔓根，钻地老鼠，〔地瓜〕(承德)；内蒙古：“打包尔”(蒙名)；山东：山芋头(临沂)，白穗子秧梨(五莲)，野葡萄(沂水、昌乐)；山萝贝，江西密罐，浆水罐；江苏：黄狗卵子(镇江、无锡、苏州)，猫狗卵子(溧阳)，箭猪腰(南京)，黄狗蛋子；浙江：野番薯(金华、兰溪)，山番苣，活血，穿山老鼠；江西：金线吊，癞痢茶；福建：山薯、鸭妈藤(福州)，山瓜子(南安)，翁仔枫(诏安)；河南：凉水盆，老鼠蛋，狗娃蛋；湖北：猫卵子；湖南：七姊妹(零陵)，九子不离娘(蓝嘉)，丝线吊葫芦、野红薯(永兴)，鸡婆抱蛋(长沙)，肥猪菜(溆浦)；广西：九莲灯(梧州)，公列英(贺县)，母鸡带仔(临桂)，七角莲、老鼠瓜茄(河池)，九牛力(南宁、武鸣、来宾)，乌眼睛(来宾)，铁老鼠，草葡萄，马葡萄，钻石羊，破石珠，上竹龙，旱黄钳，老鼠瓜薯；四川：小母猪芭；贵州：母鸡抱蛋，藤乌，花五加；其他：小

老鸱根，白天天秧。

功效 块根：清热解毒，消痈散结。用于痈疽发背，疔疮，瘰癧，水火烫伤；果实：用于温疟，寒热结壅热肿。

#### 7193016

*Ampelopsis megalophylla* Diels et Gilg

植物名 大叶蛇葡萄《高植图鉴》

药材名 藤茶《湖北中草药志》

文献名 大叶牛果藤《云南种录》

地方名 湖北：大叶山葡萄，野葡萄(神农架)；贵州：藤茶。

功效 枝、叶(泡茶饮)：清热凉血。用于高血压病，头昏目胀等症；根、叶：清热利湿，活血化瘀。用于痢疾，肠炎，跌打损伤，小便不利。

#### 7193017

*Ampelopsis megalophylla* var. *puberula* W. T. Wang

植物名 毛枝蛇葡萄《高植图鉴补编》

药材名 毛枝蛇葡萄《贵州药录》

功效 根、叶：清热利湿，活血化瘀。用于痢疾，肠炎，跌打损伤，小便不利。

#### 7193018

*Ampelopsis sinica* (Miq.) W. T. Wang --- *Vitis sinica* Miq. --- *Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Koehne var. *vestita* (Rehd.) Rehd. --- *A. glandulosa* (Wall.) Momiyama var. *vestita* (Rehd.) Momiyama --- *A. brevipedunculata* auct. non (Maxim.) Trautv.

植物名 蛇葡萄《植分学报》

药材名 蛇葡萄根《浙江天目药志》

文献名 酸藤《名实图考》，山葡萄、爬山虎《植物名汇》，短序柄蛇葡萄《云南药录》

地方名 山胡烂、狗葡萄、蛇白薇(东北)，见肿消(浙江、安徽、江西)，过山龙(浙江、江西)，野葡萄(浙江、江西、福建、河南、湖南、广东、云南)，假葡萄(湖南、广东、广西)；江苏：烟火藤，口烟火藤(盱眙)，野葡萄光藤(吴县)；上海：山葡萄藤；浙江：山刺瓜，大叶岩盖，山天萝、母苦藤(天目山)；安徽：老妈妈爱，望肿消，野南瓜藤；江西：山葡萄根，梦中消(景德镇)，泥沙根(吉水)，内红消(丰城)，见毒消(南昌)，外红消(临川)，禾黄藤，禾稼子藤，酸古藤；福建：山南瓜(明溪)，野葡萄根(泉州)；河南：老鸱眼；湖南：绿葡萄；广东：牛件茜、红番薯(惠阳)，山菩提，野菩提；海南：粉藤(澄迈)；广西：水葡萄(龙州)，妖英枫(大瑶山)，狗肠子；云南：细葡萄。

功效 根皮：清热解毒，祛风活络。用于风湿性关节炎，呕吐，腹泻，溃疡病。外用于跌打损伤肿痛，疮疡肿毒，外伤出血，烧烫伤。

备考 1.《救荒本草》之蛇葡萄非本种；2.有些文献将本种学名误订为 *Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. (东北蛇葡萄)。

#### 7193019

*Ampelopsis sinica* (Miq.) W. T. Wang var. *hancei* (Planch.) W. T. Wang --- *A. brevipedunculata* (Maxim.) Koehne var. *hancei* (Planch.) Rehd. --- *A. bre-*

vipedunculata auct. non (Maxim.) Trautv.

植物名 光叶蛇葡萄《高植图鉴补编》

药材名 虾须藤《台湾中药材图鉴》

文献名 小叶蛇葡萄《中草药学》

地方名 台湾:大山葡萄,大本山葡萄,山葡萄,大葡萄,耳空仔藤,〔冷饭藤〕,蛇葡萄,虾秋藤,酸藤,羹甘藤;海南:粉藤;云南:见毒消。

功效 根:消炎解毒。用于眼疾,耳疾,刀伤,无名肿毒。

备考 有些文献曾将本种学名误订为 *Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. (东北蛇葡萄)。

#### 7193020

*Cayratia corniculata* (Benth.) Gagnep.

植物名 角花乌莓《高植图鉴》

药材名 九牛薯《南宁药志》

文献名 菱茎野葡萄、野葡萄、钻地羊《中药大辞典》

地方名 广西:五指梅(博白),山葡萄,九龙根,九牛子。

功效 块根:润肺,止咳,化痰。用于肺癆,咳嗽,血崩。

#### 7193021

*Cayratia geniculata* (Blume) Gagnep. --- *C. kiukiangensis* C. Y. Wu

植物名 膝曲乌莓《高植图鉴补编》

文献名 依江乌莓《西藏植志》

功效 茎:用于哮喘。

#### 7193022

*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep. --- *Vitis leucocarpa* Hayata --- *V. japonica* Thunb. --- *Cissus japonica* (Thunb.) Willd.

植物名 乌莓《高植图鉴》

药材名 乌莓《唐本草》、《汇编》

文献名 莓《诗经》,拔、茈葛《尔雅》,龙尾、虎葛《尔雅》郭璞注,五叶莓、五爪龙《本草经集注》,笼草、乌莓草《蜀本草》,五叶藤《履巉岩本草》,五爪龙草《医学正传》,五龙草《本草述》,母猪藤《草木便方》,五爪金龙《岭南采药录》,五月五《植物名汇》,五叶茛、五拔藤、藪枯《新纲》,龙草《和汉药物学》,猪婆藤、鸡丝藤《中国土农药志》,乌莓梅《汇编》

地方名 大叶五爪龙(江西、湖南),五爪藤(浙江、四川),五叶陈(江西、福建),木竹藤(中南),过江龙(江苏、江西),〔猪血藤〕(安徽、江西);陕西:猪婆蔓(眉县);江苏:虎藤(如东),老鸡眼;上海:野葡萄藤,老鸡眼睛藤,老鸡藤,老鹰眼睛,五爪龙藤,黄眼藤,鲫鱼藤;安徽:老鸡眼,老母猪藤;江西:四季草(吉水),五将军;福建:金丝五叶藤;台湾:五爪绒,香花动;河南:猪草秧,稀屎桶;湖北:见肿消,五儿秧(神农架);湖南:大五爪龙(衡山),五甲藤,地龙鼠,铁称陀,铁散仙,酸甲藤,猪娘藤(溆浦);广东:气象(阳春),细母猪藤;广西:母猪菜,红母猪藤,钩芽藤,上树蛇、五爪蛇、克节风(梧州),马办儿(平南),五指梅(博白),上木蛇(玉林),双腋龙(北流);四川:小母猪藤;贵州:地五加,血五甲。

功效 全草:解毒消肿,活血散瘀,利尿,止血。用于咽喉肿痛,目翳,咯血,血尿,痢疾。外用于痈肿,丹毒,腮腺炎,跌打损伤,毒蛇咬伤。

备考 葫芦科植物绞股兰 *Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino, 植物形态与本种有不少相似之处,因此,常有人将乌莓混作绞股兰,应注意鉴别。

#### 7193023

*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagn. var. *pubifolia* Merr. et Chun

植物名 车索藤《高植图鉴补编》

药材名 红母猪藤(广西)、《汇编》

文献名 毛叶乌莓梅《广西植录》

功效 全草或根:解毒消肿,活血散瘀,利尿,止血。

#### 7193024

*Cayratia mollis* (Wall. ex Lawson) C. Y. Wu ex Wang

植物名 毛乌莓《高植图鉴补编》

药材名 小麻藤果《云南药录》

地方名 云南:野葡萄。

功效 茎、叶:祛风除湿,止咳。用于跌打损伤,咳嗽,风湿关节炎。

#### 7193025

*Cayratia oligocarpa* (Levl. et Vant.) Gagnep.

植物名 大叶乌莓《高植图鉴》

药材名 大母猪藤(四川)、《汇编》

文献名 少果乌莓《云南种录》,绿叶扁担藤、野葡萄《汇编》,稀果野葡萄《中药大辞典》

地方名 四川:母猪藤(峨眉山);贵州:地五加。

功效 根、叶:除风湿,通经络。用于牙痛,风湿性关节炎,无名肿毒等。

#### 7193026

*Cayratia oligocarpa* var. *glabra* (Gagnep.) Rehd.

植物名 樱叶乌莓《高植图鉴补编》

药材名 樱叶乌莓《贵州药录》

功效 根、叶:清热利湿,活血化瘀。用于痢疾,肠炎,跌打损伤,小便不利。

#### 7193027

*Cayratia pseudotrifolia* W. T. Wang

植物名 尖叶乌莓《高植图鉴补编》

地方名 陕西:母猪藤。

功效 根:有毒。清热解毒。

#### 7193028

*Cayratia tenuifolia* (Wight et Arn.) Gagnep.

植物名 细叶乌莓《云南种录》

药材名 五叶藤《云南药录》

地方名 云南:红母猪藤、母猪菜、五龙草、五爪金龙(文山)。

功效 全株:清热解毒,利尿消肿。用于慢性肾炎水肿,血尿,目赤肿痛。外用于痈疮肿毒,跌打损伤,毒蛇咬伤。

#### 7193029



*Cayratia trifolia* (L.) Domin

植物名 三叶乌敛莓《高植图鉴补编》

药材名 母猪藤《陕西中草药》

地方名 陕西:过路边,蜈蚣藤,小拦蛇(镇坪);云南:三爪龙、(狗脚迹)(思茅)。

功效 根:有毒。清热解毒。用于肺病,疮疖;茎叶:外用于骨折。

#### 7193030

*Cissus assamica* (Laws.) Craib

植物名 苦郎藤《高植图鉴补编》

药材名 风叶藤《广西南宁》、《汇编》

文献名 毛叶白粉藤《高植图鉴》,印度白粉藤《广西药录》

地方名 广东:粗壳藤(惠阳);广西:红背丝绸(平乐),野葡萄(马山、贺县);云南:左边藤、左爬藤、葫芦叶(红河)。

功效 根、全株:拔脓消肿,散瘀止痛。用于跌打损伤,扭伤,风湿关节疼痛,骨折,痈疮肿毒,骨髓炎。

#### 7193031

*Cissus glaberrima* Planch.

植物名 粉藤果《高植图鉴补编》

文献名 尖叶白粉藤《广西药录》,光叶白粉藤《云南中草药选》

地方名 云南:小花叶、白葡萄、野葡萄(临沧),大绿藤,痧症药。

功效 根:接骨。用于骨折,痧症。

#### 7193032

*Cissus hastata* (Miq.) Planch. --- *C. pteroclada* Hayata

植物名 戟叶白粉藤《高植图鉴补编》

药材名 四方藤《广西中药志》

文献名 戟叶粉藤《海南植志》,万丈藤、四方风、四方钻、舒筋藤、四方宽筋藤《汇编》,翼茎葡萄《台湾中药材图鉴》,翼枝白粉藤《广西中药志》

地方名 台湾:牛叫呷;广东:棺材纛(阳春);广西:方茎藤、春根藤、伸筋藤(陆川),方根藤(博白、桂平),宽筋藤(藤县、博白、桂平、容县、陆川),风藤(平南),蚂蝗藤(苍梧),软筋藤(临桂),红宽筋藤(北流、陆川);方藤,红四方藤;云南:山老鸱藤。

功效 藤茎:祛风湿,舒筋络。用于风湿痹痛,关节胀痛,腰肌劳损,筋络拘急。

#### 7193033

*Cissus hexangularis* Planch.

植物名 翅茎白粉藤《高植图鉴》

药材名 六方藤《广西本草选编》

文献名 方茎宽筋藤《汇编》

地方名 广东:宽筋藤(湛江);海南:五俭藤,山坡瓜藤,拦河藤,散血龙,六棱粉藤。

功效 藤、全株:祛风活络,散瘀活血。用于风湿关节痛,腰肌劳损,跌打损伤。

#### 7193034

*Cissus javana* DC. --- *C. discolor* (Blume) Dalz.

植物名 青紫葛《高植图鉴补编》

药材名 花斑叶(云南)、《汇编》。

地方名 云南:下面红(临沧),花脸叶(保山),抽筋散(思茅),蛤蚂藤(西盟),粪虫叶。

功效 全草:疏风解毒,消肿散瘀,续筋接骨。外用于荨麻疹,湿疹,过敏性皮炎,骨折筋伤,跌打扭伤,风湿麻木。

#### 7193035

*Cissus kerrii* Craib --- *C. modeccoides* Planch. var. *subintegra* Gagnep. --- *C. modeccoides* var. *kerrii* Craib

植物名 鸡心藤《高植图鉴补编》

药材名 白粉藤《汇编》

文献名 山鸡蛋、山葫芦、飞龙接骨、白面水鸡、青龙跌打、夜牵牛《汇编》,白薯藤、假葡萄《中药大辞典》

地方名 独脚乌柏、(青藤)(广东、广西);福建:万年薯、接骨藤、粉藤蛋(厦门),粉藤。

功效 根:化痰散结,消肿解毒,祛风活络。用于颈淋巴结结核,扭伤骨折,腰肌劳损,风湿骨疼,坐骨神经痛,疮疡肿毒,毒蛇咬伤;藤、叶:有小毒。拔毒消肿。用于疮疡肿毒,小儿湿疹。

#### 7193036

*Cissus repens* (Wight et Arn.) Lam.

植物名 白粉藤《高植图鉴补编》

药材名 白粉藤《广西本草选编》

文献名 独脚乌柏《生草药性备要》

地方名 粉藤(福建、台湾、广西),独角乌柏(台湾、广东、广西),白薯藤(广西、云南);福建:白花藤、乳藤(泉州),藤蛋(漳浦);广东:牛子头藤(惠来),白粉丹(广宁),白灰藤(番禺),白背冬瓜、假番薯(从化),白牵牛、块根山鸡蛋、粉藤旦(潮汕),粉藤薯(陆丰),白冬瓜(增城),步步青、夜牵牛(晋宁),面粉藤(电白),接骨藤(潮阳),假白番薯(新兴),假香附(高州),鬼城薯(湛江),独角乌扣,粉藤头(广州),假冬瓜藤;海南:走粉藤(海口),山葫芦,降树;广西:山番薯(平南),白假薯藤(玉林),伸筋藤(宁明),〔青藤〕(那坡),藤桑(昭平);云南:爬行白粉藤、大力药、红叶大力药、挣药、灰葡萄(红河),青龙跌打,飞龙接骨。

功效 根:清热解毒,消肿止痛。用于痰火瘰癧,疔疮肿毒,毒蛇咬伤;茎、叶:有小毒。消肿拔毒。用于肾炎、痢疾。

#### 7193037

*Leea bracteata* Clarke --- *L. compactiflora* Kurz

植物名 显苞火筒树《高植图鉴》

药材名 马骨节《云南中草药》

文献名 密花火筒树《云南种录》

地方名 云南:九子不离母、理肺散(思茅),猴背(临沧)。

功效 块根:养阴润肺,活络止痛。用于百日咳,结核病,咳嗽,跌打劳伤,腮腺炎,喉痛。

#### 7193038

*Leea crispa* L. --- *L. herbacea* Buch. -Ham.

植物名 翅序火筒树《高植图鉴补编》

文献名 单羽火筒树《云南种录》

地方名 云南:九子不离母(思茅),山葶芥(梁河),猴背(临沧),理肺散。

功效 根:用于黄疸性肝炎。

#### 7193039

*Leea indica* (Burm. f.) Merr.

植物名 火筒树《高植图鉴补编》

药材名 火筒树《广西药录》

地方名 广西:红吹风(防城)。

功效 根:用于风湿痹痛;叶:外用于疮疡肿毒。

#### 7193040

*Leea macrophylla* Roxb. ex Hornem. --- *L. robusta* Roxb.

植物名 大叶火筒树《云南种录》

药材名 大叶火筒树《中草药》

功效 根:外用于消肿定痛,愈溃生肌。

#### 7193041

*Parthenocissus austro-orientalis* Metcalf

植物名 东南爬山虎《高植图鉴补编》

功效 根、茎:祛风活络,活血止痛;叶:清热解毒,收敛生肌。

#### 7193042

*Parthenocissus henryana* (Hemsl.) Diels et Gilg --- *P. mutiflora* Pamp.

植物名 川鄂爬山虎《云南种录》

药材名 川鄂爬山虎《贵州药录》

文献名 红叶爬山虎《中药志》,大五爪龙《神农架药录》

地方名 河南:〔五加皮〕(商城);湖北:五爪藤(神农架);贵州:顺地红。

功效 根:破血散瘀,消肿解毒。用于经痛,经闭,跌打损伤,风湿,骨折,水肿,毒疮。

#### 7193043

*Parthenocissus heterophyllus* (Blume) Merr. --- *P. landuk* (Hassk.) Gagnep.

植物名 异叶爬山虎《高植图鉴》

药材名 吊岩风(贵州)、《汇编》

文献名 大叶爬山虎《中药大辞典》,异叶地锦《浙江天目药志》

地方名 爬山虎(福建、广东、广西);浙江:小叶红藤(天目山);福建:〔青藤〕(顺昌),捆仙藤(晋江),石葡萄、地锦、壁上藤(泉州),猴仙丹(上杭),莫欲(松溪);湖南:小风藤,三爪虎;广东:五子连环(新会),长春藤、过塘蛇、抱树莲(龙门);海南:白花藤仔(儋县),上树蛇,节叶藤;广西:上木蛇(贵县),上木三叉虎(玉林),三叉虎、上竹龙(梧州),上石橡胶(桂平),上树蜈蚣(钟山),单吊根(横县);贵州:三皮风,三角风。

功效 根、茎:祛风活络,活血止痛。用于风湿筋骨痛,赤白带下,产后腹痛。外用于骨折,跌打肿痛,疮疖;叶:清热解毒,收敛生肌。外用于毒蛇咬伤,疮疡肿毒。

#### 7193044

*Parthenocissus himalayana* (Royle) Planch.

植物名 三叶爬山虎《高植图鉴》

药材名 三爪金龙《汇编》

文献名 地锦、爬墙虎红葛《中国药植图鉴》

地方名 爬山虎(广西、云南),喜马拉雅爬山虎(广西、贵州),〔大血藤〕(贵州、云南);广西:单吊根,苦凉丹,野葡萄藤;假葡萄藤;湖北:假葡萄(神农架);贵州:小红藤(绥阳),绿葡萄藤(水城),三爪风;云南:三姊妹,岩三加、野葡萄(曲靖),三爪龙、三角风(峨山),三窝草,〔爬树龙〕。

功效 根、茎:祛风除湿,活络散瘀。用于风湿骨痛。外用于骨折,跌打损伤;叶:清热解毒。用于毒蛇咬伤。

#### 7193045

*Parthenocissus himalayana* (Royle) Planch. var. *vestitus* Hand. -Mazz.

植物名 黄毛三叶爬山虎《云南种录》

药材名 毛爬山虎《西昌中草药》

地方名 四川:爬山虎,接骨藤、老母猪藤(西昌)。

功效 根:活血消肿,止痛,安神。用于母猪疯,骨折,外伤出血,疮毒瘀肿。

#### 7193046

*Parthenocissus laetivirens* Rehd.

植物名 绿爬山虎《高植图鉴补编》

药材名 大绿藤(云南)、《汇编》

文献名 亮绿爬山虎《云南药录》

地方名 青龙藤(浙江、安徽);浙江:五爪金龙(余姚、天台),五叶壁藤(泰顺),五盘藤(临海);安徽:五爪龙,爬山虎。

功效 藤:舒筋活络,消肿散瘀,接骨。用于跌打损伤,骨折,风湿性关节炎,腰肌劳损,四肢痹痛;根:用于毒蛇咬伤,疔肿;叶:用于下肢慢性溃疡。

#### 7193047

*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

植物名 五叶地锦《高植图鉴补编》

药材名 五叶地锦《湖南药物志》

地方名 湖南:三皮风,三角风,山里七,五爪龙,五花藤,地锦,枫藤,芽藤,爬墙风,爬墙藤,藤五加。

功效 茎:祛风除湿。用于风湿痛。

#### 7193048

*Parthenocissus suberosa* Hand. -Mazz.

植物名 栓翅爬山虎《高植图鉴补编》

药材名 栓翅爬山虎《贵州药录》

功效 根、茎:破瘀血,消肿毒。

#### 7193049

*Parthenocissus thomsonii* (Laws.) Planch. --- *P. henryana* (Hemsl.) Diels et Gilg var. *glaucescens* Diels et Gilg

植物名 粉叶爬山虎《高植图鉴》

文献名 五叶爬山虎《广西药录》,粉叶地锦《浙江天目药志》,亮绿爬山虎《广西植录》

地方名 广西:五爪金龙(天等);四川:小母猪藤,红五加、红翅葛(峨眉山);贵州:细母猪藤,五皮风。

功效 根、茎：清热解毒，祛风除湿。用于风湿痹痛，白带多，疮疡肿毒。

## 7193050

*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch. ---  
*Parthenocissus thunbergii* (S. et Z.) Nakai

植物名 爬山虎《高植图鉴》

药材名 爬山虎《汇编》

文献名 地锦、地锦《本草拾遗》，常春藤、土鼓藤《名实图考》，红葛《树分》，巴山虎《种分》

地方名 山葡萄(东北)，过风藤、大风藤(陕西、江西)，爬壁虎(河南、四川)，爬墙虎(山东、浙江、安徽)，枫藤(浙江、安徽、江西、云南)，红葡萄藤(山东、广西、贵州)，石壁藤(陕西、江苏)，三角枫(广西、云南)；陕西：过节枫、秋红藤(宝鸡)；山东：石蓬串子(昆崙山)，爬石虎(烟台)；江苏：络石、[络石藤](徐州、新海连市)，把山虎、捆石龙(连云港)；浙江：三叶茄(温州)，大叶山天萝(临安)，爬岩虎(天台)，野枫藤(淳安)，野葡萄(乐清)，三角枫藤，日光子，爬龙藤，腹水藤，蝙蝠藤；安徽：[石南藤]，枫树藤，甜水藤；江西：风藤；台湾：红骨蛇；河南：[石楠藤]，卧山虎；湖北：大爬山虎(神农架)；广东：假薯苗(惠阳)；广西：上竹猫(平南)，丹藤(贵县)，红风藤(南丹)，红腰蛇(陆川)，爬牛虎(南宁)，爬树龙(乐业)，单吊根(北海)，上竹龙，五爪风，五爪龙，五爪蜈蚣，五叶爬山虎，假葡萄藤；四川：地锦藤；贵州：小红藤(绥阳、水城)；云南：飞天蜈蚣，多脚草，抓树龙，遍山龙；其他：走游藤。

功效 根、茎藤：祛风通络，活血解毒。用于风湿关节痛。外用于跌打损伤，痈疽肿毒。

## 7193051

*Tetrastigma caudatum* Merr. et Chun

植物名 尾叶崖爬藤《高植图鉴补编》

地方名 广西：红血见愁(柳江)，马攀子，扁钻。

功效 茎：祛风湿，破血，拔毒。

## 7193052

*Tetrastigma delavayi* Gagnep.

植物名 七小叶崖爬藤《高植图鉴补编》

药材名 一把篾《思茅本草》

文献名 大叶崖藤《西昌中草药》，七叶崖爬藤《云南种录》

地方名 四川：血木通、刺节连(西昌)；云南：“嘿吗野”(傣名)。

功效 根或藤：清热利尿，散瘀活血，祛风湿。用于膀胱炎，尿道炎，风湿骨痛，跌打损伤，蛇咬伤，疮疖肿毒。

## 7193053

*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep. --- *Vitis formosana* Hemsl.

植物名 台湾崖爬藤《高植图鉴补编》

文献名 三叶崖爬藤《台湾药植志》

地方名 台湾：毒葡萄。

功效 叶：外用于创伤。

## 7193054

*Tetrastigma hemsleyanum* Diels et Gilg --- *Vitis shifunensis* Hayata --- *Vitis triphylla* Hayata

植物名 三叶崖爬藤《高植图鉴》

药材名 三叶青(浙江、江西、湖南)、《汇编》

文献名 石猴子、蛇附子《名实图考》，亨氏崖爬藤《广西药录》，三叶葡萄《台湾药植志》

地方名 三叶扁藤(湖南、广东、广西、云南)，石老鼠(福建、江西)，丝线吊金钟(湖南、广东、海南)，金线吊葫芦(浙江、江西)，骨碎藤(湖南、广西)，破石珠(湖南、广西、四川)，三叶竹梅(湖南、广东)；浙江：三叶对(普陀)，黑皮三叶青(鄞县)；江西：土经丸(婺源)，石抱子(宜黄)，吊葫芦、金丝吊葫芦(德兴)，锦吊葫芦(丰城)；福建：金线吊虾蟆(周宁)；台湾：三脚蟹草，三脚蟹；湖北：小母猪藤(神农架)；湖南：九斤子、九节子(黔阳)，搜夹风，雷胆子；广西：小扁藤，飞天虎、天水藤(玉林)，三叉蛇(博白)，[血见愁](融安、罗城、忻城)，鸡肠枫(大瑶山)，拦山虎，流尼木(钟山)，钻石红(武鸣、兴安)，猴子丹(梧州)，藤三叉虎(平南)，多仔婆，青皮藤；四川：钻石风，阴灵子，猴食子(峨眉山)；贵州：人参草；云南：大扁藤(红河)，扁担藤，腰带藤。

功效 块根或全草：清热解毒，祛风化痰，活血止痛。用于白喉，小儿高热惊厥，肝炎，痢疾。外用于毒蛇咬伤，扁桃体炎，淋巴结核，子宫颈炎，蜂窝组织炎，跌打损伤。

## 7193055

*Tetrastigma hypoglaucom* Planch.

植物名 狭叶崖爬藤《高植图鉴》

药材名 五爪金龙《滇南本草》、《汇编》

文献名 五爪藤《滇南本草》，白背崖爬藤《云南种录》，粉背崖爬藤《汇编》，下白崖白藤《神农架药录》

地方名 云南：[白薇](大理、剑川)，八面风、小红藤、红葡萄(大理)，小五爪金龙(红河、思茅、玉溪、保山、曲靖)，五爪龙(曲靖)，小五爪龙、马蓼果、爬树藤、岩爬藤、雪里高(红河)，五虎下山(临沧)，灯笼草(玉溪)，“月乌鸡”(楚雄彝名)，乌莓莓，野葡萄根。

功效 全草或根：祛风活络，活血止痛。用于风湿骨痛，跌打损伤。外用于骨折，外伤出血。

## 7193056

*Tetrastigma lenticellatum* C. Y. Wu

植物名 显孔崖爬藤《高植图鉴补编》

药材名 大五爪金龙《云南玉溪》、《汇编》

功效 根、茎：祛风，活血，消肿。用于风湿关节疼痛，口腔炎，鼻炎。外用于跌打损伤，骨折。

## 7193057

*Tetrastigma obovatum* (Laws.) Gagnep.

植物名 毛枝崖爬藤《高植图鉴》

文献名 卵叶崖爬藤《品种论述》，五爪龙《中药大辞典》，五爪龙《汇编》

地方名 广西：扁藤(田东)；贵州：红五加，[大血藤](兴义、绥阳、独山、岩山)。

功效 根：行气活血，强筋壮骨。用于劳伤，接骨，虚咳；茎：祛风湿。用于风湿痹痛。外用于外伤出血。

## 7193058

*Tetrastigma obtectum* (Wall.) Planch.

植物名 崖爬藤《高植图鉴》

药材名 走游草《四川中药志》

文献名 毛叶崖爬藤《湖南药物志》, 钝叶五爪龙、梅花五叶藤《红河中草药》, 五叶崖爬藤《昆明药植调查报告》, 红五加、五爪金龙《汇编》

地方名 湖南: 小五爪瓜, 钻山甲; 广西: 五爪龙(全州), 五爪金(凤山), 包袱丹(富川), 围身草(临桂), 爬山虎(阳朔), 藤五爪龙(武鸣), 软毛藤; 四川: 上树蜈蚣、(五加皮)、痰五加(重庆), 藤五加(成都、峨眉山), 藤五甲, 蛇蜈巴(峨眉); 贵州: 毛五加, 岩五加, 小走游草, 大走游草, 走游藤, 通气藤; 云南: 小五爪金龙、小红药、小红藤、铜丝络(昆明), 小母猪藤、(红藤)(丽江), 小血藤, “乌诺鸡”(楚雄彝名)。

功效 全株或根: 祛风活络, 活血止痛。用于跌打损伤, 风湿麻木, 关节筋骨疼痛。外用于疮疖, 带状疱疹。

## 7193059

*Tetrastigma obtectum* (Wall.) Planch. var. *glabrum* (Levl. et Vant.) Gagnep. --- *T. umbellatum* (Hemsl.) Nakai

植物名 无毛崖爬藤《高植图鉴》

药材名 小九节铃《云南中草药》

文献名 光叶崖爬藤《中药大辞典》, 光叶崖藤《西昌中草药》, 钝叶崖爬藤《广西植录》, 台湾崖爬藤《台湾药植志》, 无毛崖藤《云南种录》

地方名 甘肃: 五角枫; 海南: 藕刺藤; 广西: 飞石莲(阳朔); 四川: 九子不离母, 小红袍、石猴子、跳三步(西昌), 上树蜈蚣, 五爪龙, 五加皮, 毛五加, 走游草, 红五加, 藤五甲; 云南: 小五爪龙、五爪金龙、小红藤、小红药、铜丝络(昆明), 小乌龟、小母猪藤、红藤(丽江), 崖爬藤(曲靖), 九节莲。

功效 根、全草: 有小毒。活血解毒, 祛风湿。用于头痛, 身痛, 风湿麻木及游走痛。外用于洗疮毒, 淋巴结炎, 跌打损伤, 外伤出血。

## 7193060

*Tetrastigma obtectum* (Wall.) Planch. var. *pilosum* Gagnep.

植物名 毛叶崖爬藤《高植图鉴》

地方名 走游草(湖北、贵州); 湖北: 五爪藤(神农架)。

功效 全株: 化痰止咳, 活血通经, 清热解毒。用于高烧惊厥, 肺炎, 哮喘, 肝炎, 风湿, 月经不调, 咽喉痛, 瘰疬, 痈疔疮疖。

## 7193061

*Tetrastigma obtectum* (Wall.) Planch. var. *potentilla* (Levl. et Vant.) Gagnep.

植物名 钝头崖爬藤《高植图鉴补编》

功效 全株: 用于跌打损伤, 红白痢。

## 7193062

*Tetrastigma obtectum* (Wall.) var. *trichocarpum*

Gagnep.

植物名 巧家崖爬藤《高植图鉴补编》

文献名 毛果崖藤《西昌中草药》, 崖爬藤《四川中药志》

地方名 四川: 石蓑衣, 走游草, 五匹兰, 爬岩草, 岩五甲, 藤五甲。

功效 全株: 活血去瘀, 止血止痛, 祛风除湿。用于风湿疼痛, 骨折, 跌打损伤, 烧伤, 风疹。

## 7193063

*Tetrastigma pachyphyllum* (Hemsl.) Chun

植物名 厚叶崖爬藤《高植图鉴补编》

地方名 广西: 勾办(上林)。

功效 茎: 消肿, 祛风; 叶: 外用于跌打损伤。

## 7193064

*Tetrastigma planicaule* (Hook. f.) Gagnep.

植物名 扁担藤《高植图鉴》

药材名 扁担藤《汇编》

文献名 扁茎爬岩藤《品种论述》

地方名 扁藤(福建、广东); 福建: 脚白藤(闽南); 广东: 五爪龙, 过山龙, 过江扁龙, 羊带风, 担杆藤, 扁藤叶, 腰带藤; 广西: 子背藤、扁头风(陆川), 车带藤、背带藤(博白), 白姆草藤(北流), 春根藤(贵县), 扁骨风(大瑶山、临桂), 扁骨枫, 铁带藤(防城); 贵州: 大血藤, 岩五加; 西藏: “角比鲁”(墨脱藏名); 其他: 大芦藤。

功效 全株、藤茎及根: 祛风除湿, 舒筋活络。用于风湿骨痛, 腰肌劳损, 跌打损伤, 半身不遂。

## 7193065

*Tetrastigma pubinerve* Merr. et Chun

植物名 毛脉崖爬藤《高植图鉴》

地方名 广西: 它办(上林), 五爪金龙(来宾), 山大黄(贵县)。

功效 叶: 用于风湿骨痛, 刀伤; 全株: 用于跌打损伤。

## 7193066

*Tetrastigma retinerium* Planch.

植物名 网脉崖爬藤《广西药录》

地方名 广西: 带藤(德保、天等), 野葡萄(那坡)。

功效 根: 安胎。用于习惯性流产。

## 7193067

*Tetrastigma triphyllum* (Gagnep.) W. T. Wang --- *T. yunnanense* Gagnep. var. *triphyllum* Gagnep.

植物名 菱叶崖爬藤《高植图鉴补编》

文献名 滇崖爬藤《云南中草药》

地方名 云南: 三爪龙, 爬树龙, 三角枫, 马龙头叶, 飞蜈蚣, 飞天蜈蚣, 红三角枫、软三角枫(昆明)。

功效 茎、叶: 用于风湿关节炎, 骨折, 烧伤等。

## 7193068

*Tetrastigma yunnanense* Gagnep.

植物名 云南崖爬藤《高植图鉴补编》

文献名 石葡萄《滇南本草》, 滇崖爬藤《红河中草药》, 滇崖藤《云南种录》, 五爪金龙《汇编》

地方名 云南: 过思茅(大理), 小五爪龙(富源) 小

爬树龙、大叶绿葡萄(通海),爬树龙(石屏)。

功效 全草:散瘀消肿,续筋骨。用于骨折,跌打损伤,疮疖红肿。

#### 7193069

*Vitis adstricta* Hance --- *V. thunbergii* Sieb. et Zucc. var. *adstricta* (Hance) Gagnep. --- *V. thunbergii* var. *mairret* (Levl.) Lauener --- *Vitis thunbergii* auct. non Sieb. et Zucc.

植物名 蔓萸《高植图鉴》

药材名 蔓萸《本草经集注》、《汇编》

文献名 萸《诗经》,诸虑、山槲《尔雅》,蔓萸《说文》,燕萸《毛诗》,蔓舌《广雅》,樱萸、车轭藤《齐民要术》,山葡萄《唐本草》,山蒲桃《本草拾遗》,野葡萄藤、木龙《百一选方》,烟黑《救荒本草》,野葡萄《纲目》,木龙藤《周益生家宝方》,甘古藤、禾黄藤《中医药实验研究》

地方名 山东:扑弄蔓(崑崙山);安徽:咽喉子;江西:禾花子藤,酸古藤;福建:小平布藤(南平),山红羊(厦门、泉州),平布藤,扁担酸、野桑叶(宁化),山苦瓜(泉州、厦门、漳州),猫耳藤(泉州),山红娘;台湾:小本山葡萄,细本山葡萄,小山葡萄,小葡萄;广东:山菩提(广州),山浮桃、鸟葡萄(潮汕),鸟嘴葡萄(潮阳),破布藤(潮安),铜窝晒谷(阳春);广西:芋葡萄,藤葡萄;四川:猫眼睛(成都);贵州:接骨藤;其他:水仙藤。

功效 全株或根、茎、叶及果实:清热解毒,祛风除湿。用于肝炎,阑尾炎,乳腺炎,肺脓疡,多发性脓肿,风湿性关节炎。外用于疮痈肿毒,中耳炎,蛇虫咬伤。

备考 过去文献常将本品误订为 *Vitis thunbergii* Sieb. et Zucc. 而后者实为桑叶葡萄 *V. ficifolia* Bunge 的异名。

#### 7193070

*Vitis amurensis* Rupr

植物名 山葡萄《高植图鉴》

药材名 山葡萄《汇编》

文献名 黑龙江葡萄、山藤藤秧《中草药学》,黑水葡萄《汇编》,阿穆尔葡萄《经植手册》。

地方名 辽宁:野葡萄。

功效 根、藤:祛风止痛。用于外伤痛,风湿骨痛,胃痛,腹痛,神经性头痛,术后疼痛;果:清热利尿。用于烦热口渴,尿路感染,小便不利。

#### 7193071

*Vitis balanseana* Planch.

植物名 小果野葡萄《高植图鉴》

药材名 小葡萄(海南)

文献名 酸藤《名实图考》,光叶葡萄《云南种录》,葡萄血藤《汇编》

地方名 假葡萄(广东、广西);广东:山葡萄、山浮桃、鸟葡萄(潮汕),鸟嘴葡萄(潮阳),蚊树(番禺、南海、顺德),破布藤(潮安、潮州、揭阳、澄海),野葡萄(阳江、阳春、乐昌、罗定、潮汕),野菩提子藤(龙门),山菩提;海南:粉藤(澄迈);广西:山葫芦(苍梧),果麻栓(资源),补刀藤(玉林),穿过山(贵县);贵州:[大血藤](贵阳)。

功效 根皮:舒筋活血,清热解毒,生肌利湿。用

于接骨,风湿瘫痪,劳伤,疮疡肿毒,赤痢;茎、叶:解毒,止痛,消肿。

#### 7193072

*Vitis betulifolia* Diels et Gilg --- *V. hexamera* Gagnep.

植物名 桦叶葡萄《高植图鉴补编》

文献名 桦木叶葡萄《广西植录》

地方名 云南:野葡萄(保山)。

功效 根、根皮:接骨。用于风湿瘫痪,劳伤;全株:外用于疮疡肿毒。

#### 7193073

*Vitis bicolor* W. T. Wang

植物名 两色葡萄《迪庆藏药》

药材名 葡萄《迪庆藏药》

功效 果实:用于咳嗽,发烧,肺癆,肺炎,气喘,失音,儿童气喘,虚弱。

#### 7193074

*Vitis chunganensis* Hu

植物名 东南葡萄《高植图鉴》

地方名 浙江:野葡萄。

功效 根、根皮、叶:活血消肿,祛瘀。

#### 7193075

*Vitis chungii* Metcalf

植物名 闽藤葡萄《高植图鉴补编》

药材名 红扁藤《汇编》

地方名 广东:红乌藤、背带藤(惠阳)。

功效 全株:消肿拔毒。用于疮痈疔肿。

#### 7193076

*Vitis coignetiae* Pull.

植物名 紫葛《中国植物图鉴》

药材名 紫葛《唐本草》

地方名 山葡萄(东北),酸葡萄藤(中南)。

功效 根皮:用于痈肿恶疮。

#### 7193077

*Vitis davidii* (Roman.) Foex. -- *V. armata* Diels et Gilg

植物名 刺葡萄《高植图鉴》

药材名 野葡萄根《分类草药性》、《中药大辞典》

文献名 山葡萄《汇编》,千斤藤《中药大辞典》

地方名 江西:野葡萄;湖北:乌鸦子(神农架);贵州:小葡萄。

功效 根:祛风湿,利小便。用于慢性关节炎,跌打损伤;茎:清热利湿,平肝明目。用于痢疾,翳子。

#### 7193078

*Vitis davidii* (Roman.) Foex. var. *cyanocarpa* (Gagnep.) Sargent

植物名 疣枝刺葡萄《神农架药录》

文献名 瘤枝葡萄《高植图鉴补编》

地方名 湖北:野刺葡萄(神农架)。

功效 根:用于骨髓炎。

#### 7193079

*Vitis flexuosa* Thunb.

植物名 葛藟《高植图鉴》

药材名 葛藟《纲目》、《汇编》

文献名 藟《说文》，千岁藟汁、千岁藟、藟羌《别录》，巨菰、推藟《陆机《诗疏》》，巨荒《诗义疏》，苕瓜、葛藟汁《本草拾遗》，藟根《纲目》，〔甜茶〕《倭汉三才图会》，千岁藟《名实图考》，千岁木《植物名汇》，乌娃子《树分》

地方名 山葡萄(山东、湖北、湖南)，野葡萄(浙江、四川、云南)；浙江：乌桕藤(青田)；江西：割谷镰藤；湖南：红五味子；广西：石琴薯(南宁)；云南：葡萄藤；其他：栽秧藤。

功效 根：祛风利湿，消食积。用于风湿痹痛，黄疸型肝炎，食积，多发性脓肿，乳腺炎；叶：凉血止血，消肿解毒。用于咯血，湿疹；藤汁：补五脏，续筋骨，益气，止渴；果实：用于关节酸痛，跌打损伤，咳嗽，吐血，积食。

#### 7193080

*Vitis flexuosa* Thunb. var. *parvifolia* (Roxb.) Gagnep.  
--- *V. parvifolia* Roxb.

植物名 小叶葛藟《高植图鉴补编》

药材名 葛藟《纲目》

文献名 千岁藟汁、千岁藟、藟羌《别录》，葛藟汁、苕瓜《本草拾遗》，小叶千岁藟《云南种录》，短叶葡萄《西昌中草药》

地方名 四川：小叶葡萄，小葡萄，小野葡萄；云南：山葡萄。

功效 根：祛风利湿，消食积；叶：凉血止血，消肿解毒；藤汁：补五脏，续筋骨，益气，止渴；果实：用于关节酸痛，跌打损伤，咳嗽，吐血，积食。

#### 7193081

*Vitis hancockii* Hance --- *V. fagifolia* Hu

植物名 菱叶葡萄《高植图鉴补编》

文献名 山毛榉叶葡萄《浙南本草新编》，菱状葡萄《植分学报》

地方名 浙江：野葡萄(浙南)。

功效 根、根皮、叶：活血消肿，祛瘀。

#### 7193082

*Vitis labrusca* L.

植物名 美洲葡萄《华北树木志》

文献名 酒葡萄《云南种录》，狐葡萄《华北树木志》，美国蔓藟《山东树木志》

地方名 云南：白肚(思茅)。

功效 全株：用于跌打损伤，风湿病。

#### 7193083

*Vitis lanata* Roxb.

植物名 绵毛葡萄《云南种录》

文献名 绒毛葡萄《西藏植志》

地方名 云南：野葡萄，绿葡萄。

功效 根：用于风湿病，跌打损伤。

#### 7193084

*Vitis piasezkii* Maxim. --- *Parthenocissus sinensis* Diels et Gilg

植物名 复叶葡萄《高植图鉴》

药材名 麻羊藤(广西全州)、《汇编》

文献名 黑葡萄液汁《中药大辞典》

地方名 陕西：野葡萄，黑葡萄；湖南：止血灵，〔甜茶叶〕；广西：山蝴蝶(临桂)，狗尿藤(乐业)；其他：五叶葡萄，五指虎

功效 幼茎液汁：消食清热，凉血。用于胃肠实热，头痛发热，骨蒸劳热，急性结膜炎，鼻衄等症。

#### 7193085

*Vitis piasezkii* Maxim. var. *pagnuccii* (Roman.) Rehd.

植物名 少毛复叶葡萄《高植图鉴补编》

文献名 少毛葡萄《高植图鉴》，无毛复叶葡萄《神农架药录》

地方名 湖北：野葡萄(神农架)。

功效 根茎：舒筋活络，祛风胜湿。

#### 7193086

*Vitis quinquangularis* Rehd. --- *V. pentagona* Diels et Gilg

植物名 毛葡萄《高植图鉴补编》

药材名 毛葡萄《汇编》

文献名 五角叶葡萄《陕西中草药》

地方名 大风藤(广东、广西)，山葡萄(山东、湖北、广东)，野葡萄(陕西、山东、广东、广西、云南)；山东：烟藟(泰山)；广东：白鹤藤(英德)，飞天白鹤(佛冈)，山菩提(广州)，牛饭塘、水影子、普地榕(连山)，鸟嘴葡萄(潮阳)，鸟葡萄、山浮桃(潮汕)，木果藤(新兴)，止血藤、血见愁、芳婆驳骨、蝴蝶艾(惠阳)，百部抓(广宁)，狗虱(连平)，贼芙蓉、假葡萄提(增城)，葡萄提叶(罗定)，破布藤(潮安)，粉田子(五华)，橡根藤；广西：野葡萄藤(大瑶山、龙州)；贵州：大血藤。

功效 根皮、茎：调经活血，舒筋活络。用于月经不调，白带。外用于跌打损伤，筋骨疼痛；叶：止血。用于外伤出血。

#### 7193087

*Vitis quinquangularis* Rehd. var. *bullata* (Rehd.) Rehd.

植物名 小叶毛葡萄《江西药录》

地方名 江西：毛葡萄。

功效 叶：止血。

#### 7193088

*Vitis romanetii* Roman. --- *V. rutilans* Carr

植物名 秋葡萄《高植图鉴》

药材名 秋葡萄《汇编》

文献名 野葡萄根《分类草药性》，腺葡萄《中国经植志》

地方名 野葡萄(湖北、四川)；陕西：黑葡萄；江苏：紫葡萄(洞庭山)；广西：大风藤；贵州：扁担藤(黎平)。

功效 茎：祛瘀止血，生肌。用于吐血，眼翳，跌打损伤；根：行血，消积。用于吐血，消肿胀；全株：止血，祛风湿，安胎，解热。用于麻疹；果：用于贫血和肺病。

#### 7193089

*Vitis sinocinerea* W. T. Wang --- *V. thunbergii* Sieb. et Zucc. var. *cinerea* Gagnep.

植物名 小叶葡萄《高植图鉴补编》

文献名 浅裂蔓藟《浙南本草新编》，绿葡萄《中

药通报)

地方名 浙江:野葡萄;湖南:“水泥背”(蓝山县瑶名)。

功效 全株:清热解毒,消肿止痛,活血祛瘀。

7193090

*Vitis vinifera* L.

植物名 葡萄《高植图鉴》

药材名 葡萄《本经》、《汇编》

文献名 葡萄根《食疗本草》,草龙珠、蒲桃、水晶葡萄、马乳葡萄、紫葡萄、琐琐葡萄《纲目》,蒲陶《名实图考》,索索葡萄、菩提子《中草药学》,白葡萄干《药典》附录)

地方名 北京:玫瑰香葡萄;山东:山葫芦;广西:白葡萄、葡萄提子(梧州),火炭藤(南宁);四川:吊乳头。

功效 果:解表透疹,利尿,安胎。用于麻疹不透,小便不利,胎动不安;根、藤:祛风湿,利尿。用于风湿骨痛,水肿。外用于骨折;叶:用于水肿,小便不利,目赤,痈肿。

7193091

*Vitis wilsonae* Veitch --- *V. reticulata* Gagnep.

植物名 网脉葡萄《高植图鉴》

药材名 野葡萄根《中药大辞典》

文献名 大叶山天萝《高植图鉴》

地方名 浙江:水葡萄(临安);湖北:草葡萄(神农架);广西:乌葡萄(三江);贵州:葡萄藤。

功效 根:用于慢性骨髓炎;果:解表透疹,利尿,安胎;根、藤:祛风湿,利尿;叶:用于水肿,小便不利,目赤,痈肿。

## 7194 芸香科 Rutaceae

7194001

*Acronychia pedunculata* (L.) Miq. --- *A. laurifolia* Blume

植物名 山油柑《高植图鉴补编》

药材名 降真香《证类本草》、《台湾中药材图鉴》

文献名 紫藤香、[鸡骨香]、番降《纲目》,山油柑叶、山油柑果(广州部队《中草》),沙塘木《广西药录》,〔山柑〕、石苓舅《台湾药植志》

地方名 台湾:石苓舅;广东:甜糖,水浓叶,山柑,酒饼叶;广西:山塘梨(博白),沙柑木(灵山),山油桂。

功效 心材或根:行气活血,健脾,止咳。用于风湿性腰腿痛,跌打瘀肿,心胃气痛;枝叶:用于疔疮痈肿,感冒咳嗽,跌打损伤;树皮:用于疥癣,溃疡。

备考 《中草药学》注称:中药降香,据《海药本草》“生南海山中及大秦国”,“番降以紫而润者为良”的记载,似指豆科植物印度黄檀 *Dalbergia sisso* Roxb. 的心材,志此供研究参考。

7194002

*Aegle marmelos* Correa --- *Crataeva marmelos* L. --- *C. religiosa* Forst.

植物名 三叶木橘《云南种录》

药材名 硬皮橘《台湾药植志》

文献名 孟加拉苹果《植分学报》,鱼木、虎王《树分》,木橘《中药材》

地方名 台湾:牛角歪,三脚桌,三脚凳;广东:假沙梨,蒙蒙;广西:四方灯笼;云南:树头菜,鸡爪菜,印度枳,“麻比罕”(西双版纳傣语);西藏:“皮哇”(藏名)。

功效 果实:消炎,止泻。用于痢疾,腹泻,咽喉肿痛。

7194003

*Atalantia buxifolia* (Poir.) Oliv. --- *Severinia buxifolia* (Poir.) Oliv. --- *Citrus buxifolia* Poir.

植物名 酒饼筋《高植图鉴》

药材名 东风橘《岭南采药录》、《汇编》

文献名 半天钩、假花椒、猪钩笏公《岭南采药录》,蠔壳刺、狗橘、乌柑仔《台湾药植志》

地方名 狗骨筋(广东、海南、广西);台湾:山柑子,黄根(常山),〔常山根〕,五六山,六五山;广东:东风橙(新兴、罗定),山桔、鬼甘筋(湛江),山柠檬(广州、花县、从化、南海),山桔仔(罗定、乐昌),野柑仔(兴宁),狗桔(广州),鬼桔仔、鬼力登(高州、化州),鬼桔栗(东莞),虾力眼(增城、博罗、东莞),乌柑刺(陆丰),针子筋、牛屎桔、牛屎勒(阳春),假柠檬(广州);海南:山桔筋,山骨筋,狗桔刺,狗橘树;广西:铜将军(陆川),剑锋筋(北海),酒饼药。

功效 根、叶:祛风解表,化痰止咳,理气止痛。用于感冒,头痛,咳嗽,支气管炎,疟疾,胃痛,风湿性关节炎,腰腿痛。

7194004

*Atalantia kerrii* (Swingle) Huang

植物名 大叶酒饼筋《云南种录》

地方名 广东:东风橘。

功效 根、叶:用于流感,咳嗽,疟疾。

7194005

*Atalantia kwangtungensis* Merr.

植物名 广东酒饼筋《高植图鉴补编》

药材名 广东酒饼筋《广西药录》

功效 叶:清热解毒,消肿止痛。用于毒蛇咬伤,跌打损伤。

7194006

*Boenninghausenia albiflora* Reichb. --- *B. japonica* Nakai --- *Bodiniera thalictrifolia* Levl. et Vant.

植物名 臭节草《高植图鉴》

药材名 臭节草《名实图考》、《汇编》

文献名 松风草《植物学大辞典》,石椒《种称》,岩椒草《四川中药志》

地方名 臭沙子、石椒草(四川、云南),猩锈臭草、臭草、苦黄草(四川、广东),蛇皮草(浙江、安徽、广东、四川);浙江:臭花草、葱草花(临安),地通花(丽水、云和),火烫药(临海),烫伤草;安徽:松草;台湾:野椒,〔常山根〕,大退癩;四川:石胡椒,大羊不食草,镇天雷,蛇盘草,〔石胡荽〕,疙蚤草,臭虫草(西昌),〔五孕云〕,小臭草;贵州:草见血飞(兴义),洗疮药(安龙);云南:山羊草,猫脚迹,千里马(丽江),大叶石椒,臭蚤子,小

狼毒、黑胡椒(昆明)，“旧哈”(西双版纳傣语)。

**功效** 全草：解表截疟，活血散瘀，解毒。用于疟疾，感冒发热，支气管炎，跌打损伤。外用于外伤出血，痈疽疮疡，烫伤。

**备考** 《植物学大辞典》以松风草为原植物名，按“松风草”原系日本名称，我国《植物名实图考》早对此植物有记载，故以《植物名实图考》之“晃节草”名为正名。

#### 7194007

*Boenninghausenia sessilicarpa* Levl.

**植物名** 石椒草《高植图鉴补编》

**药材名** 石椒草《滇南本草》、《汇编》

**文献名** 石交《名实图考》，白胡草《中国经植志》

**地方名** 四川：无柄疙蚤草(西昌)，岩椒草，臭沙子；云南：石胡椒、九牛二虎草(昆明、丽江)，千里马，羊不吃(丽江)，一支蒿(楚雄)，铁扫把(昭通)，羊蹄草、羊不食草、二号黄药、罗灶(红河)，壁虱草(思茅)，白虎草(临沧)，小豆根藤(保山)，小狼毒(澄江)，臭草、胡椒、细叶石椒(昆明)，羊山草。

**功效** 全草：抗菌消炎。用于上呼吸道感染，尿路感染。

#### 7194008

*Citrus aurantium* cv. *Chuluan* --- *Citrus aurantium* 'Chuluan' --- *Citrus aurantium* L. var. *decumana* Bonar

**植物名** 朱栾(韩彦直橘录)、《药典》

**药材名** 温枳壳、温枳实(浙江)

**文献名** 酸栾、枳壳《中国药植图鉴》，枳实《药典》

**地方名** 浙江：枳壳树(温州)。

**功效** 未成熟果实(枳壳)：理气宽中，行滞消胀；自落幼果(枳实)：破气消积，化痰散痞。

#### 7194009

*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle --- *Citrus medica* var. *acida* Hook. --- *C. acida* Rottb.

**植物名** 来檬《高植图鉴补编》

**文献名** 酸柠檬《广西植录》，雷姆《台湾药植志》

**地方名** 台湾：〔陈皮〕。

**功效** 果汁：用于头痛，咳嗽，眼病；果实：用于坏血病；根：用于痢疾。

#### 7194010

*Citrus aurantium* L.

**植物名** 酸橙《高植图鉴》

**药材名** 枳壳〔未熟果实〕《图经》、《药典》，枳实〔幼果〕《图经》、《药典》

**文献名** 陈枳壳、商枳壳《药材学》，苦橙树、酸橙树《药名名词汇编》

**地方名** 香柑(台湾、湖北)；陕西：酸橙枳实，鹅眼枳实，枪子枳实；江西：臭橙，江枳壳，江枳实；湖南：酸柑子，臭橙子；广西：橙果树(隆林)；四川：川枳壳，酸黄果(宁南)，酸广柑(西昌)，酸橙枳壳(江津)，药枳壳(酉阳)，橙柑(秀山、酉阳、黔江)；云南：青皮(大理)；其他：万木酸橙。

**功效** 未成熟果实(枳壳)：理气宽中，行滞消胀。

用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停，胃下垂，脱肛，子宫脱垂；幼果(枳实)：破气消积，化痰散痞。用于积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻胸痹，结胸，胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

**备考** 宋代以前的枳为枸橘 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. 宋代以后，药用枳壳、枳实则改变以本品为主，现时国家药典即以本品为正。

#### 7194011

*Citrus aurantium* cv. *Daidai* --- *Citrus aurantium* 'Daidai' --- *C. aurantium* L. var. *amara* Engl. --- *C. aurantium* L. var. *daidai* Makino --- *C. daidai* Sieb.

**植物名** 代代花《药典》

**药材名** 代代花《汇编》，枳壳、枳实《药典》

**文献名** 臭橙《花镜》，枳壳花《草花谱》，耿耿花枳壳、耿耿情、回春橙《中药大辞典》，青皮《中草药学》

**地方名** 代代果、代代圆、代代圆干、代代(江苏、浙江)；江苏：苏枳壳，苏枳实；浙江：中青皮(杭州)；福建：耿耿，酸橙花，回青橙。

**功效** 花蕾(代代花)：理气宽胸，开胃。用于胸胁胀闷，恶心，食欲不振；枳壳：理气宽中，行滞消胀；枳实：破气消积，化痰散痞。

#### 7194012

*Citrus aurantium* L. cv. *Hongpi Suanchen*

**植物名** 红皮酸橙(湖南)

**药材名** 枳壳、枳实(湖南)

**功效** 枳壳：理气宽中，行滞消胀；枳实：破气消积，化痰散痞。

#### 7194013

*Citrus aurantium* L. CV. *Huangpi-Suanchen* --- *Citrus aurantium* L. 'Huangpi Suanchen'

**植物名** 黄皮酸橙《药典》

**药材名** 枳壳、枳实《药典》

**地方名** 湖南：酸柑子、臭蛋柑子(辰溪、泸溪、黔阳、衡山、邵阳)，它它树(沅江)。

**功效** 未成熟果实(枳壳)：理气宽中，行滞消胀；自落幼果(枳实)：破气消积，化痰散痞。

#### 7194014

*Citrus aurantium* L. cv. *Jiangjin-Suanchen* --- *Citrus aurantium* L. 'Jiangjin Suanchen'

**植物名** 江津酸橙(四川)

**药材名** 枳壳、枳实(四川)

**地方名** 江西：江枳壳(新江、澄江、新余)；四川：川枳壳(江津、秦江)。

**功效** 枳壳：理气宽中，行滞消胀；枳实：破气消积，化痰散痞。

#### 7194015

*Citrus aurantium* L. cv. *Tangcheng* --- *Citrus aurantium* L. 'Tangchen'

**植物名** 塘橙《药典》

**药材名** 枳壳、枳实《药典》

**地方名** 浙江：大麦橙(兰溪)。

**功效** 未成熟果实(枳壳)：理气宽中，行滞消胀；



自落幼果(枳实):破气消积,化痰散痞。

#### 7194016

*Citrus grandis* (L.) Osbeck --- *C. maxima* (Burm.) Merr.

植物名 柚《本草经集注》、《高植图鉴》

药材名 化橘红《药典》

文献名 檮《山海经》,山楸《尔雅》,山楸《尔雅注》,雷柚《广志》,柚子、柚子皮《本草经集注》,柚皮、胡柑《唐本草》,臭柚《桂海虞衡志》,香栾、柚花《纲目》,柚核《岭南采药录》,抛《五杂俎》,苞《闽游纪略》,野《闽中纪略》,文旦《闽产录异》,文蛋《采芳随笔》,七爪红《和汉药名汇》,泡子《种分》,文丹《诗草木今释》,桔红《中药志》,黄七爪、绿七爪、大五爪、六爪红、尖化红、柳叶橘红《中药大辞典》,柚皮橘红《简明中医辞典》,光七爪、光五爪《药典》

地方名 〔枳实〕(陕西、江西、广西、四川),〔香缘〕(江西、湖南、湖北);浙江:香抛,五爪红〔外果皮〕,四季抛,大红袍,香泡;福建:程树(大田),皮山柚,土柚(泉州),栾子(龙海);台湾:斗柚;湖北:巴东柚(巴东);湖南:香柚;广东:碌柚;广西:大柑叶(博白),六扑子(北流),柚子树(柳江),柚木(德保),酸柚,均青〔青柚子〕;四川:枳柑根;枳柑皮,气柑(峨眉山)。

功效 未成熟外层果皮(化橘红):散寒,燥湿,利气,消痰。用于风寒咳嗽,喉痒痰多,食积伤酒,呕恶痞闷。

#### 7194017

*Citrus grandis* (L.) Osbeck cv. Pinshanyu --- *Citrus grandis* (L.) Osbeck var. pinshanyu Hort.

植物名 坪山柚《中药大辞典》

功效 外层果皮(化橘红):散寒,燥湿,利气,消痰。

#### 7194018

*Citrus grandis* (L.) Osbeck cv. Shatinyu

植物名 沙田柚《广西植录》

地方名 广西:柚子,元旦,香抛,桔红。

功效 外层果皮:散寒,燥湿,利气,消痰。

#### 7194019

*Citrus grandis* (L.) Osbeck cv. Szechipow

植物名 四季抛《中药大辞典》

功效 外层果皮:散寒,燥湿,利气,消痰。

#### 7194020

*Citrus grandis* (L.) Osbeck cv. Huajuhong --- *Citrus grandis* Osbeck var. tomentosa Hort. --- *C. grandis* 'Tomentosa'

植物名 化州柚《药典》

药材名 化橘红《识药辨微》、《药典》

文献名 化皮、化州仙橘《岭南杂记》,化州橘红《岭南随笔》,化州陈皮《本草从新》,化州桔红《纲目拾遗》,七爪桔红、六爪桔红、五爪桔红、兴化红《药材学》,毛橘红《药典》

地方名 广东:桔红,毛桔红,毛柑,毛化红(化县),赖桔红;广西:毛化,橘花,橘珠,橘胎〔幼果〕;其他:化

桔红,桔红花,桔红球,桔红皮,正毛桔红,副毛桔红,元化红,七爪化红。

功效 未成熟外果皮:散寒,燥湿,利气,消痰。用于风寒咳嗽,喉痒痰多,食积伤酒,呕恶痞闷。

#### 7194021

*Citrus grandis* (L.) Osbeck cv. Wentanyu --- *C. grandis* (L.) Osbeck var. wentanyu Hort.

植物名 文旦柚《中药大辞典》

地方名 福建:六月柚(漳州);其他:文旦。

功效 外层果皮:散寒,燥湿,利气,消痰。

#### 7194022

*Citrus hongheensis* Y. L. D. L.

植物名 红河橙《高植图鉴补编》

文献名 树葫芦《峨山彝族药》

地方名 云南:“阿迫哩葫芦者”、“支路贺”(峨山彝名),“阿雷”(哈尼族名)。

功效 根、叶、果:清热解毒,散瘀消肿。用于流行性感胃,感冒。

备考 云南将果作枳壳入药。

#### 7194023

*Citrus ichangensis* Swing.

植物名 宜昌橙《高植图鉴补编》

文献名 洞庭、粘刺、破胸槌、槌胸露雳、商壳《新纲》,宜昌柑《树分》,宜昌柠檬《种分》,树葫芦《云南中草药》

地方名 枳实、枳壳(湖北、四川);湖北:狗柑子、青皮、青皮子、野柑子(鄂西),〔狗柑子〕(鹤峰);广西:野柚子;四川:川枳壳,川枳实,药柑,公孙桔;贵州:野狗柑;云南:妥葫、三刮木(大理)。

功效 果实:破气消积,化痰除痞。用于胃脘痛,百日咳,中暑烦渴;根:止血消炎,祛瘀止痛。用于外伤出血,跌打损伤,皮肤溃疡,牙出血。

#### 7194024

*Citrus junos* Sieb. ex Tan. --- *Citrus aurantium* L. subsp. *junos* Makino

植物名 香橙《群芳谱》、《高植图鉴补编》

药材名 橙子《食性本草》、《中药大辞典》

文献名 橙《上林赋》,橙子皮《开宝本草》,橙子核《图经》,金球、鸽壳《纲目》,枙、金球《群芳谱》

地方名 蟹橙(江苏、浙江);江苏:土桔皮,柑子;上海:橙子树;湖北:蛆柑(神农架);湖南:枳实、枳壳(麻阳、慈利、大庸);其他:黄橙,金橙。

功效 果实:止呕恶,宽胸膈,消痰,解酒;果皮:化痰,利膈,消食,止呕;种子:用于疝气,淋病,腰痛。

#### 7194025

*Citrus kotokan* Hayata

植物名 虎头柑《台湾药植志》

文献名 枳壳《台湾中药材图鉴》

功效 外层果皮:散寒,燥湿,理气,消痰。

#### 7194026

*Citrus limon* (L.) Burm. f. --- *C. medica* L. subsp. *limonum* Hook. f.

植物名 柠檬《高植图鉴》  
 药材名 柠檬《岭南采药录》、《中药大辞典》  
 文献名 柠檬叶《生草药性备要》, 柠檬根《陆川本草》, 柠檬皮《广西中药志》, 洋柠檬《中药大辞典》  
 地方名 广东: 云皮; 云南: “麻脑”(西双版纳傣语); 其他: 西柠檬。

功效 果: 化痰止咳, 生津健胃; 根: 行气止痛, 止咳平喘; 叶: 化痰止咳, 理气, 开胃。

## 7194027

*Citrus limonia* Osbeck --- *C. limonelloides* Hayata

植物名 黎檬《高植图鉴》  
 药材名 柠檬《岭南采药录》、《汇编》  
 文献名 黎檬子《桂海虞衡志》, 黎檬子《岭外代答》, 宜母子、里木子、黎檬干《事物纪原》, 柠檬叶《生草药性备要》, 檬子、梦子《通雅》, 宜母果、宜蒙子《岭南杂记》, 药果《纲目拾遗》, 柠檬皮《广西中药志》, 柠檬根《陆川本草》

地方名 广东: 果木树, 新会柠檬、红柠檬(新会), 里木; 广西: 柠果, 枳壳树(临桂), 香桔叶(梧州), 土柠檬, 黎檬皮; 贵州: 枳实; 云南: 土陈皮; 其他: 罗蒙子, 香桃。

功效 果: 化痰止咳, 生津健胃。用于支气管炎, 百日咳, 食欲不振, 维生素 C 缺乏症, 中暑烦渴; 根: 行气止痛, 止咳平喘。用于胃痛, 疝气痛, 睾丸炎, 咳嗽, 支气管哮喘; 叶: 化痰止咳, 理气, 开胃。用于咳嗽, 腹胀, 泄泻。

## 7194028

*Citrus madurensis* Lour.

植物名 柑《福建药物志》  
 地方名 福建: 有柑。  
 功效 根: 涩精利尿。用于滑精, 五淋; 果皮: 下气调中, 解毒止渴。用于伤风感冒, 胃热食积。

## 7194029

*Citrus medica* L.

植物名 枸橼《高植图鉴》  
 药材名 香橼《图经》、《药典》  
 文献名 枸橼子《南方草木状》, 香橼叶《滇南本草》, 香橼根《民药汇编》, 川佛手《中草药》, 陈香圆、香橼皮《简明中医辞典》

地方名 香圆(浙江、广西、云南), 蜜罗柑(福建、云南), 香泡树(四川、云南); 江苏: 蜜罗(上海); 浙江: 香圆片(温州); 福建: 香杨, 香圆柑(龙岩); 广东: 香黄, 枸橼皮; 广西: 云香; 四川: 药柑(西昌), 香橼柑, 香橼果, 佛手花; 云南: 黄皮枳壳, 枳壳, 枳实。

功效 果实: 舒肝理气, 宽中, 化痰。用于肝胃气滞, 胸胁胀痛, 脘腹痞满, 呕吐噎气, 痰多咳嗽; 叶: 用于伤寒咳嗽; 根: 理气消胀。用于胃腹胀痛, 风痰咳嗽, 小儿疝气。

## 7194030

*Citrus medica* L. var. *dulcis* Risso et Poiteau

植物名 山柠檬《台湾药植志》  
 功效 根: 用于腹痛, 感冒。

## 7194031

*Citrus medica* var. *sarcodactylis* (Noot.) Swing. ---  
*Citrus sarcodactylus* Nooten

植物名 佛手柑《图经》、《高植图鉴补编》  
 药材名 佛手《药典》  
 文献名 佛手香橼《闽书》, 蜜筒柑《黔书》, 蜜罗柑《古州杂记》, 枸橼《图经》, 佛指柑《零陵县志》, 飞瓠《花镜》, 佛手露《纲目拾遗》, 佛手花《随息居饮食谱》, 拳佛手、开佛手《树分》, 广佛手[广东肇庆产]、建佛手[福建产]、云佛手、兰佛手[浙江兰溪集散]、川手花[四川产]、兰手花[浙江产]、广手花[广东产]《药材学》, 福寿柑《民药汇编》, 手柑《中药志》

地方名 福建: 十指香圆(长汀); 台湾: 香圆, 佛手香柑, 香柚, 佛手片; 广东: 十指柑; 广西: 五指柑, 半掌丸(蒙山), 九抓木(平南), 手橼; 四川: 佛掌, 手片。

功效 果实: 舒肝理气, 和胃止痛。用于肝胃气滞, 胸胁胀痛, 胃脘痞满, 食少呕吐; 花、蕾: 平肝胃气痛; 根: 顺气止痛。

## 7194032

*Citrus microcarpa* Bunge --- *C. mitis* Blanco

植物名 四季橘《台湾药植志》  
 地方名 河北: 金橘叶(张家口); 浙江: 金橘(温州、湖州); 台湾: 蕃柑; 其他: 唐金柑(日本)。  
 功效 果实、液汁: 可清除口腔及咽喉粘液。

## 7194033

*Citrus natsudaoides* Hayata

植物名 夏橙《台湾药植志》  
 地方名 台湾: 夏皮。  
 功效 果实: 用于脚气病。  
 备考 本品原产日本, 台湾有引种。其未熟果实, 在日本为枳壳之代用品。

## 7194034

*Citrus reticulata* Blanco --- *Sinocitrus reticulata* (Blanco) Tseng

植物名 橘《周礼》、《药典》  
 药材名 陈皮(孟诜《食疗本草》)、《药典》, 青皮、橘红《纲目》、《药典》, 橘核《日华子本草》、《药典》, 橘白《本草便读》、《简明中医辞典》, 橘叶《纲目》, 橘络《本草求真》、《汇编》

文献名 橘柚、橘皮《本经》, 黄橘《图经》, 贵老(侯宁极《药谱》), 橘子仁(姚僧坦集验方), 橘子核《本草衍义》, 黄橘皮《鸡峰普济方》, 红皮《汤液本草》, 橘子叶、橘子皮《滇南本草》, 青橘皮《品汇精要》, 绿橘《纲目》, 橘丝、橘饼《纲目拾遗》, 青柑皮《本草求真》, 柑橘《经济植物学》, 橘筋《中药材手册》, 橘仁《药材学》, 芸皮、芸红《药材资料汇编》, 柑《广西药录》, 顺筋、凤尾橘络[完整顺理成束者]、乱络、散丝橘络、金丝橘络[散乱不整者]、铲络[用刀铲下者]《中药大辞典》, 宽皮橘《高植图鉴补编》, 青橘叶、橘米《简明中医辞典》, 网脉蜜柑《云南种录》, 细青皮、均青皮《常用中药名辨》, 广陈皮、个青皮、四花青皮《药典》

地方名 陕西: 大青皮, 扣青皮, 中青皮, 小青皮; 湖北: 川橘; 广西: 青柑子(蒙山); 四川: 橘柑皮, 红橘柑

皮、红橘、川皮、头红、苏红、二红；贵州：大红袍；云南：橘子，“麻庄”（西双版纳傣语）。

**功效** 成熟果皮（陈皮）：理气健脾，燥湿化痰。用于胸膈胀满，食少吐泻，咳嗽痰多；未成熟果皮（青皮）：疏肝破气，消积化滞。用于胸胁胀痛，疝气，乳核，乳痈，食积腹痛；种子（橘核）：理气散结止痛。用于小肠疝气，睾丸肿痛，乳痈肿痛；外果皮（橘红）：散寒，燥湿，利气，消痰。用于风寒咳嗽，喉痒痰多，食积伤酒，呕恶痞满；橘叶：疏肝行气，化痰，消肿毒。用于胁痛，乳痈，肺痈，咳嗽，胸膈痞满，疝气；果皮内层筋络（橘络）：通络，理气，化痰。用于经络气滞，久咳胸痛，痰中带血，伤酒口渴；果皮的白色内层（橘白）：和胃，化浊赋；根：顺气止痛。用于除寒湿，气痛，膀胱疝气。

#### 7194035

*Citrus reticulata* Blanco cv. Chachi --- *Citrus reticulata* Blanco var. chachiensis H. H. Hu --- *C. reticulata* 'Chachi' --- *Sinocitrus chachensis* (Hort.) Tseng --- *Citrus chachiensis* Hort.

植物名 茶枝柑《药典》

药材名 广陈皮、青皮《药典》

文献名 金实《马琬《食经》》，柑、柑皮《本草拾遗》，柑子《开宝本草》，柑核《图经》，柑叶、木奴《纲目》，瑞金奴《群芳谱》，新会皮《药性切用》，陈柑皮《本草求真》，红皮、陈皮、柑尾、早水青皮〔七月初采收〕、花青〔五、六月分采收〕、大意青〔七月中采收〕、厚子青〔四、五月采收〕《药材学》，大红柑《中草药学》，茶子柑《简明中医辞典》，陈皮《药典》，茶枝柑《云南种录》

地方名 广东：新会陈皮，新会柑，江门柑。

**功效** 果实：生津止渴，醒酒利尿；成熟果皮（陈皮）：理气健脾，燥湿化痰；幼果皮（青皮）：疏肝破气，消积化滞；种子：理气散结止痛；叶：理气，消肿散毒。用于胸膈逆气，肝胃滞气，乳痈，乳岩，胁痛，行经。

#### 7194036

*Citrus reticulata* Blanco cv. Dahongpao --- *Citrus reticulata* 'Dahongpao'

植物名 大红袍《药典》

药材名 陈皮、青皮、橘红、橘核《药典》

地方名 四川：川橘，红橘，川陈皮；其他：大红袍红桔。

**功效** 果皮（陈皮）：理气健脾，燥湿化痰；幼果、果皮（青皮）：疏肝破气，消积化滞；外果皮（橘红）：散寒，燥湿，利气，消痰；种子（橘核）：理气散结止痛。

#### 7194037

*Citrus reticulata* Blanco cv. Jiangnan

植物名 建柑（福建、湖南）

药材名 陈皮（福建、湖南）

地方名 湖南：臭皮柑（沅江）。

**功效** 果皮：理气健脾，燥湿化痰；幼果皮（青皮）：疏肝破气，消积化滞。

#### 7194038

*Citrus reticulata* Blanco cv. Jiaogan --- *C. reticulata* 'Jiaogan' --- *Citrus tankan* Hayata --- *C. reticulata* Blan-

co var. tankan (Hayata) H. H. Hu

植物名 蕉柑《中药大辞典》

药材名 陈皮《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾：桶柑，年柑海梨；广东：招柑。

**功效** 果皮（陈皮）：理气健脾，燥湿化痰。

#### 7194039

*Citrus reticulata* Blanco cv. Kinokuni --- *Citrus reticulata* Blanco var. Kinokuni (Tanaka) H. H. Hu --- *C. kinokuni* Tanaka

植物名 南丰蜜橘《种分》

药材名 青皮（江西）

文献名 乳橘《汇编》，金钱蜜橘《浙江药植志》

地方名 浙江：时橘；江西：蜜橘（南丰）。

**功效** 幼果皮（青皮）：疏肝破气，消积化滞。

#### 7194040

*Citrus reticulata* Blanco cv. Manaogan

植物名 玛脑柑《全国柑橘类药材》

药材名 陈皮、青皮（湖南）

地方名 湖南：黄柑、皱皮柑、指头柑（衡山、溆浦、常德、沅江）。

**功效** 成熟果皮（陈皮）：理气健脾，燥湿化痰；幼果皮（青皮）：疏肝破气，消积化滞。

#### 7194041

*Citrus reticulata* Blanco cv. Nienju

植物名 年橘《全国柑橘类药材》

药材名 陈皮、青皮（广东）

地方名 广东：大红桔（四会）。

**功效** 成熟果皮（陈皮）：理气健脾，燥湿化痰；幼果皮（青皮）：疏肝破气，消积化滞。

#### 7194042

*Citrus reticulata* Blanco cv. Poongan --- *C. reticulata* var. poonensis (Hayata) H. H. Hu

植物名 椪柑《台湾药植志》

药材名 陈皮（台湾）

文献名 汕头蜜柑《云南种录》

地方名 福建：土陈皮（龙溪、福州），芦柑；台湾：蜜橘，有柑，有桔，青皮；广东：蜜柑柑，梅柑，白桔，潮州蜜橘，勐版桔。

**功效** 果皮：理气健脾，燥湿化痰。

#### 7194043

*Citrus reticulata* Blanco cv. Shiyueju

植物名 十月橘《全国柑橘类药材》

药材名 陈皮、青皮《全国柑橘类药材》

**功效** 果皮（陈皮）：理气健脾，燥湿化痰；幼果皮（青皮）：疏肝破气，消积化滞。

#### 7194044

*Citrus reticulata* Blanco cv. Sihugan --- *C. reticulata* Blanco var. suhoiensis (Tanaka) H. H. Hu --- *C. suhoiensis* Tanaka

植物名 四会柑《中药大辞典》

地方名 广东：广陈皮，行柑（四会）。

**功效** 果实：生津止渴，醒酒利尿。

## 7194045

*Citrus reticulata* Blanco cv. *Suavissima* --- *Citrus reticulata* Blanco var. *suavissima* (Tanaka) H. H. Hu --- *C. suavissima* Tanaka

植物名 瓯柑《中药大辞典》

药材名 瓯柑《随息居饮食谱》、《汇编》

文献名 乳柑《本草拾遗》, 柑核《图经》, 柑叶《纲目》, 真柑《橘录》, 春橘《随意居饮食谱》, 广陈皮《中药大辞典》

地方名 浙江; 陈皮, 柑(温州)。

功效 果实: 生津止渴, 醒酒利尿; 果皮: 理气健脾, 燥湿化痰。

## 7194046

*Citrus reticulata* Blanco cv. *Subcompressa* --- *Citrus reticulata* Blanco var. *subcompressa* (Tanaka) H. H. Hu --- *C. subcompressa* Tanaka

植物名 黄岩蜜橘《中药大辞典》

药材名 陈皮(浙江)

文献名 早橘《浙江药植志》

功效 果皮: 理气健脾, 燥湿化痰; 幼果: 疏肝破气, 消积化滞。

## 7194047

*Citrus reticulata* Blanco cv. *Succosa* --- *Citrus reticulata* Blanco var. *succosa* (Tanaka) H. H. Hu --- *C. succosa* Tanaka

植物名 天台蜜橘《汇编》

药材名 青皮(浙江)

文献名 本地早《浙江药植志》

地方名 浙江: 天台山蜜橘; 其他: 土佐地蜜柑(日本)。

功效 果实: 舒肝止痛, 破气散结, 消食化滞; 果皮: 理气健脾, 燥湿化痰。

## 7194048

*Citrus reticulata* Blanco cv. *Tangerina* --- *Citrus reticulata* Blanco 'Tangerina' --- *C. reticulata* Blanco var. *deliciosa* H. H. Hu --- *C. tangerina* Hort. --- *C. reticulata* Blanco cv. *Fuju* --- *C. deliciosa* Tenore

植物名 福橘《药典》

药材名 陈皮(孟诜《食疗本草》、《药典》, 青皮、橘红《纲目》、《药典》, 橘核《日华子本草》、《药典》, 橘白《本草便读》, 橘络《本草求原》, 橘叶《纲目》、《中药大辞典》)

文献名 橘柚、橘皮《本经》, 黄橘《图经》, 贵老(侯宁极《药谱》), 橘子仁《姚僧坦集验方》, 橘子核《本草衍义》, 黄橘皮《鸡峰普济方》, 红皮《汤液本草》, 青橘皮《品汇精要》, 绿橘《纲目》, 橘丝、橘饼《纲目拾遗》, 青柑皮《本草求原》, 橘筋《中药材手册》, 橘仁《药材学》, 芸皮、芸红《药材资料汇编》, 顺筋、凤尾橘络[完整顺理成束者]、乱络、散络、金丝橘络[散乱不整者]、铲络[用刀铲下者]《中药大辞典》

地方名 红橘(福建、湖南、四川); 江苏: 浑福桔, 土桔皮; 浙江: 樟橘; 福建: 建陈皮, 年桔; 湖南: 桔子树, 蜜桔, 南桔(沅江、长沙); 四川: 橘米, 桔白, 匀皮, 桔子皮,

桔柑皮, 桔柑, 桔子柑, 桔核, 柑桔米, 桔络。

功效 果皮(陈皮): 理气健脾, 燥湿化痰; 幼果皮(青皮): 疏肝破气, 消积化滞; 种子(橘核): 理气散结止痛; 果皮内层(橘白): 散寒, 燥湿, 利气, 消痰; 橘叶: 疏肝, 行气, 化痰, 消肿毒; 橘络: 通络, 理气, 化痰; 橘白: 和胃, 化浊腻; 根: 顺气止痛。

## 7194049

*Citrus reticulata* Blanco cv. *Tardiferax* --- *Citrus reticulata* Blanco var. *tardiferax* (Tanaka) H. H. Hu

植物名 椪橘《浙江药植志》

药材名 陈皮、青皮(浙江)

功效 果皮: 理气健脾, 燥湿化痰; 幼果皮: 疏肝破气, 消积化滞。

## 7194050

*Citrus reticulata* Blanco cv. *Unshiu* --- *Citrus reticulata* Blanco var. *unshiu* (Marcor.) H. H. Hu --- *C. unshiu* Marcor. --- *C. reticulata* Blanco cv. *Wenzhou Migan*

植物名 温州蜜柑《药典》

药材名 陈皮、青皮《药典》

文献名 长沙无核蜜橘《中草药》, 无核橘《浙江药植志》, 红橘、大红蜜橘、漳橘、红柑、扁柑、玉林柑、大红袍、朱砂柑、潮州柑《中药大辞典》

地方名 浙江: 大青皮(温州), 温州蜜橘。

功效 果皮: 理气健脾, 燥湿化痰。

## 7194051

*Citrus reticulata* Blanco cv. *Zhuju* --- *C. erythrosa* (Tanaka) Tseng --- *C. reticulata* Blanco var. *erythrosa* H. H. Hu

植物名 朱橘《本草拾遗》、《中药大辞典》

药材名 陈皮、青皮、橘红、橘核、橘白、橘络、橘根《中药大辞典》

文献名 赤蜜柑《树分》, 大红橘《科裁》

地方名 朱红橘、朱砂橘(浙江、广西), 迟红(浙江、江西、湖南), 大红袍(江苏、湖南), 衢橘(江苏、浙江); 江苏: 桔子皮(苏州), 早衢橘, 了红(震泽); 浙江: 朱红(黄岩); 湖南: 湘陈皮, 桔子树, 朱红桔(邵阳、溆浦)。

功效 果皮(陈皮): 理气健脾, 燥湿化痰; 幼果皮(青皮): 疏肝破气, 消积化滞; 外果皮(橘红): 散寒, 燥湿, 利气, 消痰; 种子(橘核): 理气散结止痛; 果皮内层(橘白): 和胃, 化浊腻; 橘络: 通络, 理气, 化痰; 橘叶: 疏肝, 行气, 化痰, 消肿毒; 根: 顺气止痛。

## 7194052

*Citrus sinensis* (L.) Osbeck --- *C. aurantium* var. *sinensis* L. --- *Aurantium sinense* (L.) Mill.

植物名 甜橙《高植图鉴补编》

药材名 枳实《药典》, 广柑皮《四川中药志》

文献名 橙《开宝本草》, 黄果《滇海虞衡志》, 枳实理皮、黄果皮《滇南本草》, 新会橙《名实图考》, 橙叶《岭南采药录》, 广橘《树分》, 柑、甘树(徐《生药》), 广皮《药材学》, 溆浦广柑《中草药》

地方名 土陈皮、土橘皮(陕西、四川、江西、广西)

海), 青皮子、个青、四化青皮、四花青皮、四开青皮(福建、广东、广西), 广柑(广东、广西、四川、湖南), 卵子柑(福建、广东); 广东: 雪柑, 广橙, 甘代代; 广西: 广桔; 四川: 广柑枳实(江津), 锦橙; 云南: 理陈皮; 其他: 甜橙皮。

**功效** 幼果(枳实): 破气消积, 化痰散痞。用于积滞内停, 痞满胀痛, 泻痢后重, 大便不通, 痰滞气阻胸痹, 结胸, 胃下垂, 脱肛, 子宫下垂; 果皮(广柑皮): 理气健脾, 燥湿化痰。用于脾胃气滞, 脘腹胀满, 恶心呕吐, 消化不良, 痰湿壅滞, 胸膈满闷, 痰多清稀等; 叶: 止痛散瘀。外用于敷疮; 核: 用于内挫腰痛, 面肝粉刺。

#### 7194053

*Citrus wilsonii* Tanaka --- *C. grandis* (L.) Osbeck var. *shangyuan* Hu

植物名 香圆(苏轼《物类相感志》)、《高植图鉴》

药材名 香橼(《图经》、《药典》)

文献名 香橼露(《纲目拾遗》), 枳壳、枳实、陈枳壳、青皮(《药材学》), 香圆子(《江苏药材志》), 西南香圆(《汇编》), 香橼皮(《简明中医辞典》), 香圆枳壳、香圆枳实(《中药大辞典》)

地方名 均青皮(浙江、福建), 陈香圆(浙江、江苏); 陕西: 鹅眼枳实、枪子枳实(宝鸡); 江苏: 粗皮香圆(苏州), 癭香圆(苏北); 浙江: 大青皮, 黄皮枳壳; 云南: 香泡树、蜜罗柑(文山)。

**功效** 成熟果实(香橼): 舒肝理气, 宽中, 化痰。用于肝胃气滞, 胸胁胀痛, 脘腹痞满, 呕吐噎气, 痰多咳嗽; 果实蒸馏液(香橼露): 消痰逐滞。

#### 7194054

*Clausena dunniana* Levl. --- *Amyris dentata* Willd.

植物名 齿叶黄皮(《高植图鉴补编》)

药材名 野黄皮(《广西药录》)

文献名 山黄皮(《广西本草选编》)

地方名 广西: 接骨木(柳江)、假黄皮、野皮果; 贵州: [山茵香]。

**功效** 根、叶: 疏风散寒, 行气止痛, 除湿消肿。用于感冒发热, 疟疾, 胃痛, 水肿, 风湿性关节炎; 枝、叶: 理气止痛, 降逆止喘。用于慢性支气管炎, 哮喘, 胸膈痞满。

#### 7194055

*Clausena emarginata* Huang

植物名 小黄皮(《高植图鉴补编》)

药材名 小黄皮(《汇编》)

地方名 广西: 假鸡皮果、山鸡皮果(龙州), 山黄皮(隆安、德保); 云南: 九里香, 白花千只眼。

**功效** 根、叶、全株: 宣肺止咳, 行气止痛, 通经活络。用于感冒头痛, 风寒咳嗽, 偏头痛, 胃痛, 神经痛, 牙痛, 风湿性关节炎, 跌打损伤。

#### 7194056

*Clausena excavata* Burm. f. --- *C. lunulata* Hayata

植物名 假黄皮(《高植图鉴补编》)

药材名 臭黄皮(《汇编》)

文献名 假黄皮树(《中药大辞典》), 鸡母黄(南方主要

毒植), 臭假黄皮(《云南种录》), 山黄皮(《陆川本草》), 野黄皮(《广西植录》), 过山香、番仔香草(《台湾药植志》)

地方名 番仔香(华南); 海南: 大果; 广西: 山鸡皮(龙州); 云南: 五薯叶, 小叶臭黄皮, 臭麻木, 小黄皮(思茅), 臭桫罗椿(思茅、临沧), 臭麻藤(普洱)。

**功效** 枝、叶: 疏风解表, 行气利湿, 截疟。用于上呼吸道感染, 流行性感胃, 疟疾, 急性胃肠炎, 痢疾。外用于湿疹。

#### 7194057

*Clausena indica* (Dalz.) Oliv.

植物名 小叶黄皮(《高植图鉴补编》)

文献名 细叶黄皮(《广西药录》), 印度黄皮(《中草药》)

地方名 广西: 山黄皮(凌云、邕宁、横县), 鸡皮果(龙州), 假黄皮(邕宁); 云南: 九黄皮、黄皮口(河口)。

**功效** 枝、叶、果: 疏风散寒, 行气止痛。用于感冒, 胃脘痛, 水肿, 风湿痹痛, 黄疸。

#### 7194058

*Clausena lansium* (L.) Skeels.

植物名 黄皮(《高植图鉴》)

药材名 黄皮叶(《岭南采药录》、《汇编》)

文献名 黄皮子(《桂海虞衡志》), 黄檀子(《八闽通志》), 黄弹子(《广东通志》), 黄皮果(《纲目》), 黄皮皮(《生草药性备要》), 金弹子(《本草求真》), 黄皮核(《岭南采药录》), 黄弹(《岭南杂记》), 黄枇、黄柑(《台湾药植志》)

地方名 福建: 黄段(漳州、诏安、龙岩), 黄冒(莆田); 广东: 酸皮子, 黄懒(南澳), 黄皮枣(陆丰), 黄淡(澄海); 广西: 黄皮木, 黄皮木茎; 云南: 黄皮果树(红河), [龙眼]; 其他: 油皮, 油梅, 果子黄。

**功效** 叶: 解表散寒, 顺气化痰。用于防治流行性感胃, 流行性脑脊髓膜炎, 疟疾, 感冒发热; 根、种子: 行气止痛, 健胃消滞。用于胃痛, 腹痛, 疝痛, 风湿骨痛, 痛经; 果: 化痰消食。用于食积胀满, 痰饮咳嗽; 树皮: 消风肿, 去疳积, 散热积, 通小便。

#### 7194059 见 7194056

#### 7194060

*Dictamnus angustifolius* G. Don

植物名 狭叶白鲜(《汇编》)

药材名 白鲜皮(《新疆》)

**功效** 根皮: 清热燥湿, 祛风止痒。

#### 7194061

*Dictamnus dasycarpus* Turcz. --- *Dictamnus albus* L. var. *dasycarpus* (Turcz.) T. N. Liou et Y. H. Chang

植物名 白鲜(《本经》、《高植图鉴》)

药材名 白鲜皮(《药性论》、《药典》)

文献名 白鲜、白臈、白羊鲜(《本草经集注》), 金雀儿椒(《日华子本草》), 地羊膻(《图经》), 地羊鲜、八圭牛(《中国药植志》), 北鲜皮(《药材资料汇编》)

地方名 八股牛(内蒙古、东北、安徽), 好汉拔(吉林、辽宁、内蒙古), 羊鞭草(吉林、辽宁、安徽); 辽宁: 鲜皮, 山牡丹(彰武); 河北: 白奶秧根, 好汉子拔; 内蒙古: “苏古费”(蒙名); 陕西: 六月寒, 大六月寒(华山、太白); 甘肃: 野大香; 山东: [千斤拔](昆崙山、文登、海

阳), [胡椒] (蓬菜), 臭哄哄; 江苏: 野花椒、大茴香 (肝胎), 臭骨头 (肝胎), 百舌皮 (丹阳), 野花椒皮, 臭根皮; 安徽: 骚公鸡, 山八角, 交棵子、椒棵子 (滁县)。

功效 根皮: 清热燥湿, 祛风解毒。用于湿热疮毒, 黄水淋漓, 湿疹, 风疹, 疥癣疮癩, 风湿热痹, 黄疸尿赤。

#### 7194062

*Evodia austrosinensis* Hand. -Mazz.

植物名 华南吴萸《高植图鉴补编》

文献名 小花吴萸、红花树《名实图考》

地方名 云南: 泡椿 (屏边)。

功效 果实: 用于心痛, 滞气, 腹胀, 中暑。

#### 7194063

*Evodia baberi* Rehd. et Wils.

植物名 川西吴萸《高植图鉴补编》

文献名 异花吴茱萸《汇编》, 巴氏吴茱萸《湖北中草药志》

地方名 广西: 臭椿萸, 假茱萸, 小退七; 四川: 狗屎椒 (成都), 臭辣子、野吴萸 (峨眉山)。

功效 果实: 温中散寒, 止痛。

备考 四川乐山、峨眉, 湖北襄阳及西南部分地区有以此果实混作花椒入药。

#### 7194064

*Evodia calcicola* Chun ex Huang

植物名 石山吴萸《高植图鉴补编》

地方名 广西: 山茶辣 (那坡)。

功效 叶: 清热解毒。外用于疮疡肿毒; 果实: 散寒止痛。用于胃气痛。

#### 7194065

*Evodia daniellii* (Benn.) Hemsl. --- *Zanthoxylum daniellii* Benn.

植物名 臭檀吴萸《高植图鉴补编》

药材名 臭檀子《神农架药录》

文献名 抛辣子《华北树木志》

地方名 臭椿芽、臭檀 (山东、河北); 河南: 黑辣子; 湖北: 野吴萸 (神农架)。

功效 果实: 散寒, 止痛。

#### 7194066

*Evodia daniellii* (Benn.) Hemsl. var. *hupehensis* (Dode) Huang --- *E. hupehensis* Dode

植物名 湖北臭檀《湖北植志》

药材名 湖北臭檀子《神农架药录》

地方名 湖北: 野吴芽、铁鼓杨木 (神农架)。

功效 果实: 散寒止痛。

#### 7194067

*Evodia fargesii* Dode --- *E. glauca* auct. non Miq.

植物名 臭辣吴萸《高植图鉴补编》

药材名 臭辣树《汇编》

文献名 楝叶吴茱萸《广州植志》

地方名 臭桐子树 (江西、湖南), 野吴萸 (湖南、贵州); 浙江: 树油 (临安); 台湾: 贱仔树, 山漆; 江西: 刁近树; 湖北: 吴芋 (罗田); 广东: 獭子树、童子骨、臭獭 (惠

阳); 海南: 寮树; 广西: 野米辣 (凌云), 蛇药, 山苦楝。

功效 果: 散寒, 止咳, 止痛。用于腹痛, 胃痛, 麻疹后咳嗽; 叶: 外用于洗漆疮。

备考 有的文献将本种学名误订为 *Evodia glauca* Miq.

#### 7194068

*Evodia henryi* Dode --- *E. daniellii* (Benn.) Hemsl. var. *henryi* (Dode) Huang

植物名 湖北吴萸《高植图鉴补编》

文献名 山艾子《品种论述》

地方名 四川: 假黄柏。

备考 四川民间有一种假黄柏即为本植物, 应注意鉴别, 勿与黄柏混淆。

#### 7194069

*Evodia lepta* (Spreng.) Merr. --- *E. pteleaefolia* Merr. --- *Xanthoxylum pteleaefolia* Champ.

植物名 三叉苦《高植图鉴补编》

药材名 三叉苦《汇编》

文献名 三丫苦、三丫苦叶《岭南采药录》, 小黄散《云南中草药》

地方名 三枝枪 (广东、广西、云南), 三桠苦、三叉虎 (福建、台湾、广东); 福建: 三叶仔 (安溪), 三叶英 (长泰、厦门), 铁金英、三叶莲、白银树、三丫虎、肺炎草 (漳州); 台湾: 三脚鳖, 细叶山葛菜; 广东: 三叶鸡骨树 (普宁), 跌打王 (乳源、阳春), 鸡骨树, 鸡脚苦 (潮阳), 三部虎 (五华), 斑鸠花 (罗定), 三布荆 (阳春), 三籽苦 (广州), 山鸦兔 (英德), 三石攀, 叉虎根; 海南: 三脚赶, 山芥叶 (定安), 假鹰爪, 三角朵 (琼海), 上山虎 (澄迈); 广西: 三叉叶 (邕宁), 指小风 (北流), 白云香 (贵县), 出山虎 (玉林), 千斤不倒; 云南: “狼碗”、“佛药” (西双版纳傣名), 消黄散, 小黄伞, 九节历 (保山), 鸡肉树 (屏边)。

功效 根及叶: 清热解毒, 散瘀止痛。用于防治流行性感胃, 流行性脑脊髓膜炎, 乙型脑炎, 中暑, 感冒高热, 扁桃腺炎, 咽喉炎, 肺脓疡, 肺炎, 疟疾, 风湿性关节炎, 坐骨神经痛, 腰腿痛, 胃痛, 黄疸型肝炎, 断肠草 (钩吻) 中毒。外用于跌打损伤, 虫蛇咬伤, 痈疽肿毒, 外伤感染, 湿疹, 皮炎。

#### 7194070

*Evodia lepta* (Spreng.) Merr. var. *cambodiana* (Pierre) Huang

植物名 柬埔寨吴萸《高植图鉴补编》

药材名 三枝枪《红河中草药》

地方名 云南: 小白皮树, 小黄伞, 消黄散, 三桠苦 (红河)。

功效 根、枝叶、茎皮: 清热解毒, 消炎止痛。用于防治流脑, 流感, 乙型脑炎, 风湿性关节炎, 跌打损伤, 无名肿毒, 毒蛇咬伤。

#### 7194071

*Evodia melisefolia* (Hance) Benth.

植物名 楝叶吴萸《高植图鉴补编》

药材名 树腰子《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 红花树《名实图考》, 楝叶吴茱萸《中药

大辞典)

地方名 山苦楝(海南、广西), 棕树(海南、云南); 台湾: 山漆; 广东: 獾子树、童子骨(惠阳), 贼子树, 辣树; 海南: 才槁; 广西: 野米辣(乐业); 贵州: 野吴芋, 野莠子, 山辣子, 臭油林, 米辣子, 野辣子, 野蜀芋。

功效 果实: 暖胃, 止痛。用于胃痛吐清水, 头痛; 根、叶: 有小毒。清热化痰, 止咳。用于肺结核, 疮痈疖肿。

#### 7194072

*Evodia roxburghiana* Benth.

植物名 大叶吴茱萸《台湾药植志》

地方名 台湾: 山葛菜, 白马屎, 三脚鳖。

功效 根: 祛风; 叶、花、树皮: 强壮, 通经, 解热。用于间隙热。

#### 7194073

*Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.

植物名 吴茱萸《高植图鉴》

药材名 吴茱萸《本经》、《药典》

文献名 藜《根》《本经》, 吴茱萸根白皮《别录》, 吴茱萸叶《日华子本草》, 吴萸《草木便方》, 茱、桵《植物名汇》, 川姜、搜筵、辟邪翁、九日三官、吴椒、药吴萸《新纲》, 辣子树《科裁》, 茶萸《花镜》伊钦恒注)

地方名 伏辣子(陕西、山东、湖南、贵州), 气辣子(陕西、四川), 纯幽子(四川、云南), 茶辣(安徽、广东、广西), 储油子(福建、湖南), 左力(广东、广西), 臭辣子树(湖北、贵州), 臭辣子(湖北、四川), 吴萸子(山东、湖南、四川), 辣子(福建、广东), 吴椒(安徽、湖北、广西); 陕西: 漆辣子; 江苏: 吴于(南京); 安徽: 苦辣; 福建: 刷子(沙县), 水干子(长汀); 湖北: 吴于子, 麦曲药子, 野茱萸(宣恩), 野吴芋(恩施、巴东), 野储油子, 储油树子, 野木腊子, 大籽吴萸, 椒油子, 乌椒子, 小籽吴萸, 曲药子; 湖南: 野吴萸, 土吴萸, 土吴萸子, 臭辣子棵; 广东: 八瓣香; 广西: 家茶辣(龙胜、天峨), 小花米辣(凌云、田林), 大米辣(凌云), 茶练子; 四川: 树萸子(峨眉山), 吴艾子, 山花椒, 臭泡子, 树辣子; 云南: 泡椿, 如意子, 茶腊。

功效 未熟果实: 有小毒。散寒止痛, 降逆止呕, 助阳止泻。用于厥阴头痛, 寒疝腹痛, 寒湿脚气, 经行腹痛, 脘腹胀痛, 呕吐吞酸, 五更泄泻, 高血压症。外用于口疮; 叶: 用于霍乱, 下气, 止心腹冷气, 内外肾绞痛; 根或根皮: 行气温中, 杀虫。用于脘腹冷痛, 泄泻, 下痢, 风寒头痛, 腰痛, 疝气, 经闭腹痛, 蛲虫病。

备考 云南有一种野吴萸原植物为云南吴萸 *Evodia balansae* Dode.

#### 7194074

*Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *bodinieri* (Dode) Huang --- *E. bodinieri* Dode

植物名 疏毛吴茱萸《药典》

药材名 吴茱萸《本经》、《药典》

文献名 少毛吴茱萸《汇编》, 毛脉吴茱萸《中药大辞典》, 小果吴茱萸《中草药学》, 少毛石虎《湖北植志》, 波氏吴萸《广西药录》, 波氏吴茱萸《中药志》

地方名 吴萸(江西、湖南、广东、广西、贵州), [花椒](湖北、四川); 湖北: 野茱萸子(宣恩); 广西: 茶辣(天等、灵川、贵县、平南), 小茶辣、假茶辣(乐业), 散花茶辣(田林), 野吴萸(贵县), 贵州吴茱萸。

功效 未熟果实: 有小毒。散寒止痛, 降逆止呕, 助阳止泻。用于厥阴头痛, 寒疝腹痛, 寒湿脚气, 经行腹痛, 脘腹胀痛, 呕吐吞酸, 五更泄泻, 高血压症。外用于口疮; 根、叶: 行气温中, 杀虫。

#### 7194075

*Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. f. *meionocarpa* (Hand. -Mazz.) Huang

植物名 少果吴茱萸《浙江药植志》

药材名 吴茱萸(浙江)

文献名 少果吴萸《湖南药物志》

地方名 浙江: 吴萸。

功效 未熟果实: 有小毒。散寒止痛, 降逆止呕, 助阳止泻。

#### 7194076

*Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang --- *E. officinalis* Dode

植物名 石虎《药典》

药材名 吴茱萸《药典》

文献名 望水檀《名实图考》, 吴椒、药茱萸《新纲》, 吴芋《中药志》

地方名 纯幽子(河南、四川); 浙江: 树萸, 杜吴萸, 吴萸; 湖北: 野吴芋(鹤峰); 湖南: 茱萸, 茶奈, 米辣子; 广东: 紫萸(连山), 薯油子(曲江、连县); 广西: 左力(南宁), 鸡臭木(钟山), 野茶辣(河池), 山吴萸(北流、柳城), 茶辣(桂平), 土茶萸(蒙山)。

功效 未熟果实: 有小毒。散寒止痛, 降逆止呕, 助阳止泻。用于厥阴头痛, 寒疝腹痛, 寒湿脚气, 经行腹痛, 脘腹胀痛, 呕吐吞酸, 五更泄泻, 高血压症。外用于口疮; 根: 消肿止痛, 祛风除湿。用于腹痛, 风湿痹痛。

#### 7194077

*Evodia simplicifolia* Ridley

植物名 单叶吴萸《高植图鉴补编》

文献名 单叶吴茱萸《西双版纳傣药志》

地方名 云南: “烘浪碗”(西双版纳傣语)。

功效 叶: 用于风湿关节炎, 关节肿痛, 颈淋巴结, 腮腺炎, 胃溃疡, 跌打损伤, 枪刀伤。

#### 7194078

*Evodia sutchuenensis* Dode

植物名 四川吴萸《高植图鉴补编》

药材名 四川吴萸《贵州药录》

功效 果实: 散寒止痛, 降逆止呕。用于胃脘冷痛, 肋肋胀痛, 虚寒经痛, 呕吐。

#### 7194079

*Evodia trichotoma* (Lour.) Pierre

植物名 牛斜吴萸《高植图鉴补编》

药材名 山吴萸《汇编》

文献名 山吴萸果《中药大辞典》

地方名 茶辣(广西、云南);海南:牛斜树;广西:山茶辣(龙州),假吴茱萸(南丹),大花椒(陆川),吴茱萸(北流),野茶辣(乐业、德保);云南:大漆上叶、五除叶、吴茱萸(思茅),“牙路火”(西双版纳傣语),斗麻(景东)。

功效 未熟果实:散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻;叶:祛风除湿。外用于风湿性关节炎,荨麻疹,湿疹,皮肤疮疡。

## 7194080

*Evodia trichotoma* var. *pubescens* Huang

植物名 毛牛斜吴茱萸《高植图鉴补编》

地方名 广西:山茶辣(防城)。

功效 根:避孕;叶:祛风除湿,用于风湿痹痛。

## 7194081

*Feronia limonia* (L.) Swingle

植物名 木苹果《台湾药植志》

功效 叶:用于消化不良,麻风;树皮:外用于蛇咬伤。

## 7194082

*Fortunella crassifolia* Swingle

植物名 金弹《温州志》、《中药大辞典》

药材名 橘核(浙江)、《汇编》

文献名 金柑《橘录》,金橘《纲目》,金弹橘《遵生八笺》,金橘露、金钱橘饼《纲目拾遗》,金橘核、金橘叶《本草再新》,金蛋《随息居饮食谱》,山橘《广州植志》,金橘根《闽东本草》

地方名 宁波金柑(华东);福建:山桔子(闽东)。

功效 根:醒脾行气;果:宽中化痰下气。用于风寒咳嗽,胃气痛,食积胀满,疝气。

备考 本品在浙江加工金橘饼和蜜饯时,其副产品金橘核充橘核入药。

## 7194083

*Fortunella hindsii* (Champ.) Swingle

植物名 山橘《高植图鉴》

药材名 山橘《本草求真》、《汇编》

文献名 山橘子《岭表录异》,金橘、山金柑《橘录》,山金橘《纲目》,山橘叶《本草求真》

地方名 浙江:金豆(平阳、乐清);福建:猴子柑(浦城);广东:金豆叶;广西:金桔叶。

功效 果:宽中化痰下气。用于风寒咳嗽,胃气痛,食积胀满,疝气;叶:祛风,散瘀,生新。用于跌打损伤,痰饮咳嗽;根:醒脾行气。

## 7194084

*Fortunella japonica* (Thunb.) Swingle --- *Citrus japonica* Thunb.

植物名 金柑(韩彦直《橘录》)、《高植图鉴》

药材名 圆金柑《汇编》

文献名 橘《群芳谱》,金橘《台湾药植志》,柑桔、山桔子、月桔《汇编》

功效 根、果实:健脾,理气。用于水肿,胃气痛,疝气,脱肛,产后气滞,腹痛,子宫脱垂;果皮:用于肺结核,镇咳。

## 7194085

*Fortunella margarita* (Lour.) Swingle --- *Citrus margarita* Lour.

植物名 金橘《归田录》、《高植图鉴》

药材名 金橘《纲目》、《汇编》

文献名 卢橘《汉书》,山橘《北户录》,罗浮《瓠江逸志》,枣橘《宜州府志》,夏橘、给客橙《纲目》,牛奶橘《遵生八笺》,牛奶柑《花镜》,金枣《花历百咏》,金柑《橘谱》,牛奶金柑《汝南圃史》,金橘露、金钱橘饼《纲目拾遗》,金橘叶、金橘核《本草再新》,金橘饼《中国医学大辞典》,长金柑《中药大辞典》

地方名 浙江:橘核;广东:长金橘;广西:长安金橘;四川:寿星柑根,寿星柑。

功效 果:理气,解郁,化痰,醒酒。用于胸闷郁结,伤酒口渴,食滞胃呆;叶:舒肝,开胃气,散肺气。用于膈噎,瘰癧;种子:用于日疾,喉痹,瘰癧;根:行气,散结。用于胃痛吐食,瘰癧,疝气,产后腹痛,子宫下垂;果实蒸馏液(金橘露):舒肝,和中,理肝气,解郁结,和脾胃,进饮食,止呕吐,除痰水;果蜜制品(金橘饼):消食,下气,开膈,酒洩。

备考 本品为浙江商品“橘核”的主要来源之一,是在加工金橘饼和蜜饯时的产品。

## 7194086

*Fortunella sagittifolia* Feng et Mao

植物名 箭叶金橘《云南植物研究》

地方名 云南:金线吊葫芦(大理苍山)。

功效 全株:用于关节疼痛,慢性肾炎,皮下出血等。

## 7194087

*Glycosmis parviflora* (Sims) Little --- *Glycosmis citrifolia* (Willd.) Lindl.

植物名 山小橘《高植图鉴补编》

药材名 山小橘《广西本草选编》

文献名 山油柑《植分学报》

地方名 酒饼木(广东、广西);广东:酒饼山桔叶(广州),山黄皮(罗定、肇庆),山柑(陆丰、普宁),山桔树(广州),山柑桔(曲北),山桔叶,甜糖木、胶碗只(高州),盐糖叶(廉江、遂溪),甜糖,甜糖子(湛江);海南:小果,山桔;广西:野沙柑、山柑子(贵县),假金桔(北流),沙柑木,假酒饼木,山桔子。

功效 根、叶、果实:祛痰止咳,理气消积,散瘀消肿。用于感冒咳嗽,消化不良,食欲不振,食积腹痛,疝痛。外用于跌打瘀血肿痛,稻田皮炎。

## 7194088

*Glycosmis pentaphylla* (Retz.) Correa

植物名 五叶山小橘《云南种录》

文献名 山小橘、酒饼叶《汇编》,山柑子《种分》

地方名 福建:(玛瑙);台湾:石铃舅;海南:山桔;广西:鸡眼桔,沙柑,鸡爪苏,油婆勒,八大王。

功效 根、叶、果实:祛痰止咳,理气消积,散瘀消肿。

## 7194089

*Micromelum falcatum* (Lour.) Tanaka



植物名 大管(海南、广西)、《广西药录》  
文献名 野黄皮、鸡卵黄《本草彩图》,白木(陆川本草)

地方名 山黄皮(广西、云南);海南:大杆(陵水);广西:小柑,小郎伞,捺散,野辣椒,白木南(那坡),白骨走马(北海),野黄皮树,假山黄皮(凭祥),山鸡米(凌云)。

功效 根、叶:散瘀行气,止痛,活血。用于毒蛇咬伤,胸痹,跌打扭伤,喉痛。

## 7194090

*Micromelum integerrimum* (Buch. -Ham.) Roem.

植物名 小芸木《高植图鉴补编》

药材名 小芸木《广西药录》

文献名 全叶小柑《汇编》,虾蟆跌打《云南中草药》

地方名 广东:半边枫(高州);广西:鸡屎木(龙州),山黄皮、野茶辣(凌云),小黄皮(龙州、钟山);云南:野黄皮、癞蛤蟆跌打(思茅)。

功效 根:用于风湿痹痛,跌打损伤;茎:用于疟疾;叶:用于骨髓炎。

## 7194091

*Murraya euchrestifolia* Hayata --- *Clausena euchrestifolia* (Hayata) Kanehira --- *Chalcas euchrestifolia* (Hayata) Tanaka

植物名 豆叶九里香《高植图鉴补编》

药材名 豆叶九里香《广西药录》

文献名 山豆根叶九里香《植分学报》

地方名 广西:满山香(博白、容县),穿花针(龙州)。

功效 枝、叶:祛风活血,消肿止痛。用于头痛,感冒,跌打损伤,风湿骨痛,疟疾。

## 7194092

*Murraya exotica* L. --- *M. paniculata* (L.) var. *exotica* (L.) Huang

植物名 九里香《高植图鉴补编》

药材名 九里香《广西药录》

文献名 小叶九里香《云南种录》

地方名 广西:七里香(北流),五里香(陆川),千里香、万年青(贵县),不怕打(融安),木万年青(北海)。

功效 根、叶:行气,消肿,散瘀。用于跌打损伤,风湿病,蛇咬伤。

备考 《高植图鉴补编》以海南产的 *M. microphylla* (Merr. et Chun) Swingle 为小叶九里香。

## 7194093

*Murraya kwangsiensis* (Huang) Huang --- *Clausena kwangsiensis* Huang

植物名 广西九里香《高植图鉴补编》

文献名 广西黄皮《广西药录》

地方名 广西:假鸡皮(龙州),山柠檬(武鸣)。

功效 全株:消肿止痛。用于风湿痹痛,跌打损伤,角膜炎;根:用于胃脘痛;枝、叶:用于感冒。外用于跌打损伤。

## 7194094

*Murraya paniculata* (L.) Jack.

植物名 千里香《生草药性备要》、《高植图鉴补编》

药材名 九里香《岭南采药录》、《汇编》

文献名 满山香《生草药性备要》,月橘《中山传信录》,〔透骨草〕、青香木《云南中草药选》

地方名 七里香(福建、台湾、广东),木万年青、水万年青、月桔、山黄皮、半天雷(广东、广西);福建:过山香(漳浦、厦门);台湾:十里香,石枰,石枰;广东:九牛入城(广宁、四会、德庆、封开),九树香(普宁),七经通(电白、徐闻、海康、遂溪),石桂树(陆丰),九霄香(潮安),石辣椒、千年青(连县),白鼻仔、过天香(清远),九秋香(潮阳);海南:万里香(海口);广西:五里香,申树木(上林),〔四季青〕〔桂平〕,小万年青;云南:千只眼,千枝叶(红河),千只眼跌打(思茅),臭千只眼(玉溪)。

功效 叶、带叶嫩枝:有小毒。行气止痛,活血散瘀。用于胃痛,风湿痹痛。外用于牙痛,跌打肿痛,蛇虫咬伤;根、树皮:用于风湿痹痛,腰痛,跌打损伤,睾丸肿痛,湿疹,疥癣;花:用于胃痛。

## 7194095

*Murraya tetramera* Huang

植物名 四数花九里香《植分学报》

药材名 千只眼《云南中草药》

文献名 千支眼《云南种录》

地方名 广西:满天香(龙州);云南:臭漆,透光草(红河)。

功效 叶、根:祛风解表,行气止痛,活血散瘀。用于感冒发热,支气管炎,哮喘,风湿麻木,筋骨疼痛,皮肤瘙痒,湿疹,毒蛇咬伤,疟疾,水肿等。

## 7194096

*Orixa japonica* Thunb. --- *Evodia ramiflora* Gray.

植物名 日本常山《高植图鉴》

药材名 臭常山《汇编》

文献名 鸭屎草、鸡屎草《日华子本草》,翻胃木《新纲》,白常山《科裁》,臭苗《中国药植志》,常山《湖北植志》,和常山《中药志》

地方名 湖北:野胡椒(鹤峰),羊山草(神农架);四川:胡椒树(峨眉山);贵州:大山羊,大骚羊,大素药,大暑药,骚牯羊,地梔子,梔子黄,白胡椒,弼马瘟(绥阳),臭山羊,满园臭,臭药。

功效 根、茎、叶:清热利湿,截疟,止痛,安神。用于风热感冒,风湿关节肿痛,胃痛,疟疾,跌打损伤,神经衰弱。外用于痈疮肿毒。

## 7194097

*Papeda kerrii* (Swingle) Tseng --- *Citrus macroptera* var. *kerrii* Swingle

植物名 大翼橙《云南种录》

药材名 树葫芦《云南药录》

地方名 云南:“支路贺”(玉溪彝名),枳实。

功效 全株:消炎,止血,止痛,防腐生肌。用于感冒头痛,咳嗽,风湿骨痛,跌打损伤,外伤出血,慢性溃疡,伤口发炎,湿疹,疮疖。

## 7194098

*Phellodendron amurense* Rupr.

植物名 黄檗《药性论》、《高植图鉴》

药材名 黄柏《纲目》、《药典》

文献名 槩木、檀桓《本经》, 槩皮《伤寒论》, 山屠《新纲》, 关黄柏《中药志》, 关柏、东黄柏《中药大辞典》, 黄勃罗《品种论述》

地方名 黄柏木、黄波罗、黄波罗、黄被罗、元柏、王柏、柏皮(东北); 吉林: 黄柏栗; 内蒙古: “浩布鲁”、“吉乃巴”(蒙名), 黄菠萝树; 其他: 铁麸盐树, 红椿树。

功效 树皮: 清热燥湿, 泻火除蒸。用于湿热泻痢, 黄疸, 带下, 热淋, 脚气, 痿痹, 骨蒸劳热, 盗汗, 遗精, 疮疡肿毒, 湿痒疹痒; 盐黄柏: 滋阴降火。用于阴虚火旺, 盗汗骨蒸。

#### 7194099

*Phellodendron chinense* Schneid.

植物名 黄皮树《高植图鉴》

药材名 黄柏《纲目》、《药典》

文献名 槩木、檀桓《本经》, 川黄柏《得配本草》, 黄槩《蜀本草图经》, 华黄柏、华黄槩《种分》, 川柏、黄槩皮《常用中药名辨》, 黄柏树《云南种录》

地方名 黄柏皮(四川、云南); 甘肃: 黄山刺(武都); 湖北: 黄波罗果(神农架); 其他: 灰皮柏, 灰皮树。

功效 树皮: 清热燥湿, 泻火除蒸。用于湿热泻痢, 黄疸, 带下, 热淋, 脚气, 痿痹, 骨蒸劳热, 盗汗, 遗精, 疮疡肿毒, 湿痒疹痒; 盐黄柏: 滋阴降火。用于阴虚火旺, 盗汗骨蒸。

#### 7194100

*Phellodendron chinense* Schneid. var. *glabriusculum* Schneid.

植物名 秃叶黄皮树《高植图鉴补编》

药材名 黄柏(陕西、安徽、湖北、广西)

文献名 光叶黄皮树《湖北植志》, 广西黄柏《广西本草选编》, 小黄槩《中国经植志》

地方名 江西: 土黄柏; 湖北: 黄槩, 元柏、黄槩皮(神农架); 广西: 黄皮(凌云); 四川: 黄柏树。

功效 树皮: 清热燥湿, 泻火除蒸。

#### 7194101

*Phellodendron chinense* Schneid. var. *yunnanense* Huang

植物名 云南黄皮树《汇编》

药材名 黄柏(云南西畴、文山)

文献名 云南黄柏《云南种录》

功效 树皮: 清热燥湿, 泻火除蒸。

#### 7194102

*Phellodendron fargesii* Dode

植物名 法氏黄柏《品种论述》

地方名 四川: 黄柏。

功效 树皮: 清热燥湿, 泻火除蒸。

#### 7194103

*Phellodendron macrophyllum* Dode

植物名 大叶黄柏《品种论述》

地方名 四川: 黄柏(城口)。

功效 树皮: 清热燥湿, 泻火除蒸。

#### 7194104

*Phellodendron sinii* Y.C. Wu

植物名 辛氏黄柏《品种论述》

地方名 贵州: 黄柏。

功效 树皮: 清热燥湿, 泻火除蒸。

#### 7194105

*Phellodendron wilsonii* Hayata et Kanch.

植物名 台湾黄槩《台湾药植志》

文献名 台湾黄柏《品种论述》, 魏氏黄柏《台湾药植志》

地方名 台湾: 槩木, 槩皮, 黄柏。

功效 树皮: 清热燥湿, 泻火除蒸。

#### 7194106

*Pilocarpus pennatifolius* Lem.

植物名 翼叶毛果芸香《台湾药植志》

功效 叶: 利尿, 发汗, 祛风。用于心脏或肾脏疾患之浮肿, 绿内障之眼内压下降, 急性结膜炎时瞳孔缩小, 癫痫。

#### 7194107

*Poncirus trifoliata* (L.) Raf. --- *Citrus trifoliata* L. --- *Aegle sepiaria* DC.

植物名 枸橼《橘录》、《高植图鉴》

药材名 枳实《本经》、《中药大辞典》

文献名 枳壳《雷公炮炙论》, 枳根皮《本草拾遗》, 枳、枳茹、枳本皮屑、臭橘、汝州枳壳、成州枳实《图经》, 臭橘叶《夏之益治奇疾方》, 枸橼子《履巉岩本草》, 野橙子、枸橼叶、枸橼刺、枸橼核《纲目》, 铁篱笆《名实图考》, 唐橘《树分》, 绿衣枳壳、绿衣枳实《中药志》

地方名 臭橘子(山东、江苏、安徽、湖南), 青皮(山东、湖北、四川), 枸橼子(江苏、安徽), 〔香橙〕(山西、陕西、青海、江苏、河南), 铁篱寨、铁李寨(山西、河南); 陕西: 土枳实, 青旦旦, 枸橼子; 山东: 臭棘, 臭枳子; 江苏: 枸橼李(苏州), 臭杞(南云台山), 钢枳子(泰县、盱眙), 〔香圆〕(镇江), 钢枳子, 江枳(淮阴), 枸橼梨(苏州、常熟), 杨枳(松江); 上海: 枸橼李, 野梨子, 苦橘子; 浙江: 小青皮(慈溪), 狗吉利、狗枳梨、狗枳李、狗枳篱、狗枳子、苦枳篱(杭州); 安徽: 枸橼蛋子, 野橘子; 福建: 鹅眼枳实, 臭山枳(泉州); 河南: 陈刺蛋, 臭鸡蛋, 香元, 绿角刺, 臭枸橼蛋; 湖北: 黄泥巴(神农架); 湖南: 臭柑子, 狗屎柑; 广西: 野柑子(全州); 四川: 槿橘圆橘, 正青皮、真青皮(成都), 雀不站(峨眉山)。

功效 幼果(枳实): 破气消积, 化痰散痞。用于积滞, 痞满胀痛, 泻痢后重, 大便不通, 痰滞气阻胸痹, 结胸, 胃下垂, 脱肛, 子宫脱垂; 根皮: 用于齿痛, 痔疾, 便血; 叶: 理气, 祛风, 消肿, 散结; 棘刺: 用于风虫牙痛; 树皮屑(枳茹): 用于水肿, 骨节疼痛; 种子: 用于肠风下血不止; 未成熟果皮(枳壳): 理气宽中, 行滞消胀。

备考 1. 沈括补笔谈云: 六朝以前医方, 唯有枳实, 无枳壳, 后人用枳之小嫩者为枳实, 大者为枳壳; 2. 宋代以前的枳实、枳壳即为本种, 宋代以后则多以酸橙为枳实和枳壳; 3. 湖北罗田以罗汉橙 *Poncirus trifoliata* Raf. 与 *Citrus aurantium* L. 杂交品种的近成熟果实为枳壳。

#### 7194108

*Psilopeganum sinense* Hemsl.

植物名 山麻黄《高植图鉴》

药材名 虱子草《中国药植志》

文献名 臭草《名实图考》,大蓼《植物名汇》,裸芸香《科属词典》,蛇皮草《植分学报》,臭虫草、麝香草《汇编》

地方名 湖北:隔蚤七、臭麝香草(巴东);四川:蛇咬药,千垂乌;贵州:草见血飞,小黄药。

功效 全草:消积止呕,定喘。用于感冒,咳嗽,水积病,呕吐,疔疮,毒蛇咬伤。

7194109

*Ruta graveolens* L.

植物名 芸香《高植图鉴》

药材名 芸香《纲目》、《汇编》

文献名 臭草《生草药性备要》,香叶《和汉药物学》

地方名 福建:猴仔草(诏安);台湾:臭芙蓉,玉蕊花;广东:狗屎臭香(潮安),百应草(新会);广西:臭艾,小香草(梧州),荆芥七(全州),鸡鬼草(宁明),〔灵香草〕(平南)。

功效 全草:清热解暑,散瘀止痛。用于感冒发热,牙痛,月经不调,小儿湿疹。外用于疮疖肿毒,跌打损伤。

备考 李时珍本草纲目木部“山矾”一名“芸香”,与此为异物同名。

7194110

*Skimmia arborescens* T. Anders ex Gamble --- *S. melanocarpa* Rehd. et Wils.

植物名 乔木茵芋《云南种录》

药材名 茵芋《滇南本草》

文献名 黑果茵芋《高植图鉴》

地方名 广西:大青木(武鸣);云南:蓝木树,鸡肉果(屏边);其他:茵荪,卑山竹。

功效 茎皮、枝叶:有小毒。用于风湿麻木,手足拘挛,筋骨疼痛,瘫痪。

备考 拉丁学名正、异名,在《高植图鉴补编》分别列为两种,《云南种录》(1984)则合二为一。

7194111

*Skimmia multinervia* Huang

植物名 多脉茵芋《云南种录》

药材名 多脉茵芋《迪庆藏药》

功效 叶:清肺热,肾热。用于传染病发热,腰肌劳损,口腔炎。

7194112

*Skimmia reevesiana* Fortune --- *S. fortunei* Mast.

植物名 茵芋《高植图鉴》

药材名 茵芋《本经》、《汇编》

文献名 卑山共《吴普本草》,茺草、卑共《别录》,因预《纲目》,深红茵芋《树分》,黄山桂《中国药植图鉴》

功效 叶:有毒。祛风湿湿。用于顽痹拘急挛痛。

7194113

*Toddalia asiatica* (L.) Lam. --- *T. aculeata* Pers.

植物名 飞龙掌血《高植图鉴》

药材名 飞龙掌血《名实图考》、《汇编》

文献名 血莲肠、见血飞、黄椒《分类草药性》

地方名 三百棒(陕西、浙江、湖北、湖南),散血丹(福建、广西),大救驾(陕西、四川、贵州),八大王(广东、贵州),筋钩(湖北、广东、云南),溪椒(四川、云南);陕西:白三百棒,见血而亡(镇巴);福建:铜皮铁骨(连城),翻皮铁骨(龙岩),鸟不踏(闽侯、永泰);台湾:小叶黄肉树,小叶黄肉刺,细叶黄肉刺,黄树根藤,鸟踏刺;湖北:红三百棒,萱子刺(神农架),通关亭,八百棒,来血皮;湖南:见血散(凤凰),剥皮打、破皮走血(永顺),刮皮见血(古丈);广东:山胡椒公,下山虎、出山虎(曲江、阴山),假花椒(连山),红筋俚(始兴),单面针(连县),油婆芳,鸡爪芳,牛麻筋藤,牛丹子(万宁);广西:小金藤(南宁、忻城),〔通城虎〕(大瑶山),〔花椒〕(邕宁),山椒(贵县),小山甲(梧州),〔山黄皮〕(昭平),飞龙掌,入地金牛,铜皮猫爪筋,散飞血,〔蛇总管〕,灯勾公、〔山胡椒〕(玉林);四川:〔紫金镖〕,血贯肠;云南:飞龙斩血,野木椒,细蜜桶藤,龙掌,白见血飞(曲靖),黄大金银(红河),小格藤(临沧),血棒头、血淋甲(保山),走筋买,〔三加〕,刺枇杷(昆明);贵州:〔血见愁〕,血灌肠,刺蓬青,坐山虎。

功效 根皮:散瘀止血,祛风除湿,消肿解毒。用于跌打损伤,风湿性关节炎,肋间神经痛,胃痛,月经不调,痛经,闭经,子宫出血,鼻血,吐血,疟疾。外用于骨折,外伤出血;叶:外用于痢疾肿毒,毒蛇咬伤。

7194114

*Zanthoxylum acanthopodium* DC.

植物名 刺花椒《高植图鉴补编》

药材名 刺花椒《红河中草药》

文献名 野花椒《玉龙山药植》

地方名 云南:岩椒、拘椒、见血飞(昆明)。

功效 根、果:温中散寒,止痛,杀虫,避孕。用于胃痛,风湿关节痛,虫积腹痛,避孕。

7194115

*Zanthoxylum acanthopodium* var. *timbor* Hook. f. --- *Z. acanthopodium* DC. var. *villosum* Huang

植物名 毛刺花椒《高植图鉴补编》

药材名 岩椒《昆明民药》

文献名 毛刺椒油《中国经植志》,毛叶花椒《云南种录》

地方名 云南:木本化血丹,野花椒。

功效 根:温胃,杀虫。用于虫积腹痛。

7194116

*Zanthoxylum ailanthoides* Sieb. et Zucc. --- *Fagara ailanthoides* Engl.

植物名 樗叶花椒《高植图鉴》

药材名 浙桐皮(浙江)

文献名 桫(尔雅),藪(礼记),越椒(广雅),食茱萸《千金·食治》,椴子《本草拾遗》,艾子《图经》,辣子《纲目》,樗叶花椒《广西植物》,樗椒《经济植物学》,鼓钉树《鉴别手册》

地方名 丁桐皮、海桐皮(浙江、福建);福建:鼓钉柴

(福鼎);台湾:大叶荊葱,红荊葱,荊葱,仁荊葱,刺江母,刺公牡;广西:满天星,满天星斗,木花椒,木满天星,百鸟不招,有勒鸭脚木;其他:鸡山椒。

功效 树皮:祛风湿,通络止痛。用于腰膝疼痛。外用于湿疹。

备考 陈藏器谓吴、食二茱萸是一种。

#### 7194117

*Zanthoxylum armatum* DC. --- *Z. planispinum* Sieb. et Zucc. --- *Z. alatum* (Roxb.) var. *planispinum* (Sieb. et Zucc.) Rehd. et Wils.

植物名 竹叶花椒《高植图鉴补编》

药材名 竹叶椒《图经》、《汇编》

文献名 秦椒、蜀椒、崖椒《名实图考》,印度花椒《经手手册》,醉根、麻树根《江苏野生植志》

地方名 野花椒(浙江、安徽、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南),野胡椒(浙江、江西),山胡椒(浙江、江西),山花椒(浙江、安徽、广东、广西、四川、云南),山椒(浙江、台湾、广西、云南),花椒(山东、江苏、江西、福建、湖南、湖北、广西),花椒树(浙江、江西),川椒(江苏、福建),土花椒(浙江、湖北、湖南、广西),狗椒(陕西、广西),单面针(广东、广西),两面针(湖北、广西),鱼椒子(福建、湖南),土椒(广西、云南),花胡椒(湖南、广西);青海:“叶尔玛”(藏名);浙江:鸡椒(天目山),老鼠刺,青椒(温州),白蒲叶桃(文成),椒目〔种子〕;江西:白总管,万花针,土花椒根,木本飞天蜈蚣、飞天蜈蚣(德兴),鱼椒树;福建:大号乌不踏(福州),四季春;湖南:臭花椒,三叶花椒,玉椒,四面麻(黔阳、江华),川花椒(来阳);广东:花椒筋,铁将军,花椒仔(粤北),铁罗汉,贝椒子(惠阳、紫金),山巴椒(五华),鱼椒(惠阳);广西:搜山虎,山川椒(北流),山辣党(容县),党子(梧州),花椒刺(兴安),小党木(平南),两叶针,出山虎,椒党,被针勒,椿芽贼(桂林);四川:岩椒,野椒子树,臭椒子,刺椒,狗屎椒(南川、峨眉山);贵州:散血飞,见血飞,打狗棒(瓮安),臭胡椒;云南:“哥干”(西双版纳傣语),何胡椒,〔两背针〕,〔入地舍牛〕,菜椒,假胡椒。

功效 根、树皮、叶、果实及种子:有小毒。温中理气,祛风除湿,活血止痛;根、果:用于胃腹冷痛,胃肠功能紊乱,蛔虫病腹痛,感冒头痛,风寒咳嗽,风湿性关节痛,毒蛇咬伤;叶:外用于跌打肿痛,痈肿疮毒,皮肤瘙痒。

备考 湖南马王堆一号汉墓出土药物中之花椒即为本品。

#### 7194118

*Zanthoxylum armatum* DC. f. *ferrugineum* (Rehd. et Wils.) Huang --- *Z. alatum* var. *planispinum* f. *ferrugineum* Rehd. et Wils. --- *Z. planispinum* Sieb. et Zucc. f. *ferrugineum* (Rehd. et Wils.) Huang

植物名 毛竹叶花椒《高植图鉴补编》

药材名 毛竹叶椒《广西药录》

文献名 扁刺花椒《西昌中草药》

地方名 竹叶椒(江西、四川),野胡椒(江西、广西),

野花椒(广西、四川);江西:花椒(丰城),山胡椒(婺源),木本飞天蜈蚣(德兴),白总管(吉水),万花针(景德镇);广西:土花椒(靖西),山花椒(龙州);四川:青椒,山椒。

功效 根:用于跌打损伤,骨折;果实:用于水肿。

#### 7194119

*Zanthoxylum asperum* Huang

植物名 糙叶花椒《广西药录》

功效 根:用于跌打损伤;果实:用于牙痛。

#### 7194120

*Zanthoxylum austrosinense* Huang

植物名 岭南花椒《高植图鉴补编》

药材名 岭南花椒根《汇编》

地方名 广西:搜山虎,蛇总管(桂林、天等、全州),收山虎。

功效 根:有小毒。祛风解表,散瘀消肿,行气止痛。用于感冒风寒,胃痛,风湿痹痛,跌打损伤,骨折,龋齿痛,毒蛇咬伤;果实:用于蛇咬伤。

#### 7194121

*Zanthoxylum austrosinense* Huang var. *stenophyllum* Huang

植物名 狭叶岭南花椒《高植图鉴补编》

药材名 麻口皮子药《汇编》

地方名 搜山虎(江西、广西);江西:蛇总管;广西:总管(天等)。

功效 根皮、树皮:有小毒。祛风散寒,解毒镇痛。用于风湿痹痛,跌打损伤,牙痛,毒蛇咬伤。

#### 7194121a

*Zanthoxylum avicennae* (Lam.) DC.

植物名 勒欖花椒《高植图鉴补编》

药材名 筋欖《汇编》

文献名 鹰不泊、鹰不泊莲《本草求原》,乌鸦不企树、笏当《岭南采药录》,勒欖《广州植志》,筋欖《中药志》

地方名 山胡椒(广东、广西),土花椒(广东、海南、广西),鸟不宿(广东、福建、江西),狗花椒(江西、广西);福建:刺楸(龙溪),鸟不踏(龙海、平和、南靖),百鸟不站模(寿宁),飞天蜈蚣(建宁);广东:筋欖树(河源、龙川、连平、紫金),牛群勒、麻米勒(从化),刺苍根、鸡青盲、黄鸡母根(潮阳、普宁),鸡蕊树(阳江),鸡吸木(化县),鸡胡欖、鸡蕊木、〔川椒〕(阳春),鸡王党,鹰不踏,乌鸦不企,辣木,茨苍、菊葱(普宁),〔常山〕(中山),〔土常山〕、画眉架(广州),蚊子草(高州、茂名),土芙跳(高要),画眉勒(宝安),风档树(花县),鸡碎木(电白、徐闻、海康、廉江),杨档树(惠阳);海南:刺倒树(海口、定安、屯昌),刺倒叶(琼中、乐东),鸡咀木(儋县),雉母簪(澄迈、琼海),鸟不企;广西:花椒(桂平、北流、贵县、博白),山猪屎(博白),画尾跳(容县、梧州、桂平),雀儿踏(平南),画眉木,华眉跳木,盲鸡筋、山花椒(北海)。

功效 根、叶、果:祛风利湿,活血止痛;根:用于黄疸型肝炎,肾炎水肿,风湿性关节炎;果:用于胃痛,腹痛;叶:用于跌打损伤,腰肌劳损,乳腺炎,疖肿。

## 7194122

*Zanthoxylum bungeanum* Maxim. --- *Z. bungei* Planch. et Linden --- *Z. fraxinoides* Hemsl.

植物名 花椒《高植图鉴》

药材名 花椒《日用本草》、《药典》

文献名 大椒《尔雅》，蜀椒《本经》，巴椒、唐椒《别录》，汗椒、椒目《本草经集注》，南椒《雷公炮炙论》，陆拔《药性论》，汉椒、椒叶《日华子本草》，川椒《圣惠方》，川椒目《赤水玄珠》，点椒、花椒叶、花椒根《纲目》

地方名 花椒树(青海、河南)，野花树、山花椒(湖北、湖南)，大红袍(华北)，红花椒、红椒(华北、西北、中南、四川)；山西：金黄椒；陕西：凤椒；青海：“叶儿玛”(藏名)；福建：叶早藏针；湖北：山椒，家花椒(神农架)；湖南：土花椒，臭花椒，臭胡椒；广西：〔蛇总管〕；四川：花椒子，川花椒，椒子(峨眉山)，“叶尔马”(若尔盖藏名)。

功效 果皮：温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛，蛔虫症。外用于湿疹瘙痒，牙痛；种子：用于水肿胀满，痰饮喘逆；叶：用于寒积，霍乱转筋，脚气，漆疮，疥疮；根：有小毒。用于肾与膀胱虚冷，血淋血瘀者。外用于脚气、湿疮。

## 7194123

*Zanthoxylum bungeanum* Maxim. var. *pubescens* Huang

植物名 毛叶花椒《高植图鉴补编》

功效 果皮：有小毒。温中止痛，杀虫止痒。

## 7194124

*Zanthoxylum calcicola* Huang

植物名 石山花椒《高植图鉴补编》

地方名 广西：黑狗椒(凭祥)；贵州：小见血飞；云南：岩椒(文山)。

功效 根皮、果实：活血化瘀，祛风止痛。用于风湿疼痛，咳嗽，蛔积腹痛，吐血，刀伤出血。

## 7194125

*Zanthoxylum dissitoides* Huang

植物名 拟蜆壳花椒《高植图鉴补编》

地方名 广西：单面针(上林)。

功效 根：消肿止痛。用于跌打损伤，风湿痹痛，胃痛，牙痛。

## 7194126

*Zanthoxylum dissitum* Hemsl.

植物名 蜆壳花椒《高植图鉴补编》

药材名 单面针《汇编》

文献名 大叶花椒《湖南药物志》，拟山枇杷《广西药录》，蚌壳椒《广西植录》，白皮两面针《广西本草选编》，蚌壳花椒《汇编》

地方名 山枇杷(湖北、广西、贵州、云南)；陕西：大救驾、打救架(宁强)；福建：叶下穿针、猫公刺(厦门)；湖北：三百棒(利川、神农架)，八大王(利川)，鸡合子，雀不踏，白五加(神农架)；湖南：见血飞，大元帅；广西：公麒麟，麻疯刺、九牛藤(阳朔)，长叶花椒，大花针，大布针，大花椒(桂林)；四川：钻山虎，黄椒根，山椒根；贵州：铁杆椒，铁杆椒根，岩花椒。

功效 根：有小毒。活血散瘀，续筋接骨。用于跌打损伤，扭伤，骨折；种子：理气止痛。用于疝气痛；茎皮或叶：祛风散瘀，杀虫，止痛。

## 7194127

*Zanthoxylum echinocarpum* Hemsl.

植物名 刺壳花椒《高植图鉴补编》

药材名 刺壳椒《湖南药物志》

文献名 毛刺壳花椒《广西药录》

地方名 湖北：二百棒(鹤峰)；湖南：土花椒，单面针；广西：大麻痧(桂平)，一面针、见血飞(乐业)。

功效 根皮、茎叶：有小毒。消食，止痛，清暑。用于胃痛，腹痛，消化不良，厌食饱胀，中暑。

## 7194128

*Zanthoxylum echinocarpum* Hemsl. var. *tomentosum* Huang

植物名 毛刺壳花椒《高植图鉴补编》

药材名 毛刺壳花椒《广西药录》

功效 根：消肿止痛。用于跌打损伤。

## 7194129

*Zanthoxylum esquirolii* Levl.

植物名 贵州花椒《高植图鉴补编》

药材名 崖椒《图经》

文献名 西南花椒《峨眉药植资源》，岩椒《高植图鉴》，细柄花椒《云南种录》

地方名 四川：藤椒(峨眉山)；贵州：龙背茨；云南：狗椒(蒙自)。

功效 根、果：温中散寒，止痛。用于心腹冷痛，蛔积，刀伤出血。

## 7194130

*Zanthoxylum kwangsiense* (Hand. -Mazz.) Huang

植物名 广西花椒《高植图鉴补编》

地方名 广西：白念今(凌云)，土红花椒(武鸣)。

功效 根、果实：用于痧症，舌头肿。

## 7194131

*Zanthoxylum micranthum* Hemsl.

植物名 小花花椒《高植图鉴补编》

文献名 刺辣树《云南种录》

地方名 贵州：刺三百棒；云南：见血飞。

功效 根、果：温中散寒，止痛。用于心腹冷痛，蛔积，刀伤出血。

## 7194132

*Zanthoxylum molle* Rehd.

植物名 朵花椒《高植图鉴补编》

药材名 浙桐皮《浙江药植志》

文献名 朵椒《浙江药植志》，毛海桐皮《鉴别手册》，朵椒油《中国经植志》

地方名 浙江：树椒，水疗柴，海桐皮。

功效 树皮：祛风湿，通络止痛。用于腰膝疼痛。外用于湿疹；根、根皮：祛风活血，麻醉止痛，解毒消肿。

## 7194133

*Zanthoxylum multijugum* Franch. --- *Z. multifoliolatum* Hemsl.

植物名 多叶花椒《高植图鉴补编》

药材名 蜈蚣藤《昆明民药》

文献名 小叶刺椒《中药大辞典》

地方名 云南:蜈蚣刺,止血丹、马胶根、接骨药(红河),见血飞(昭通),马椒。

功效 根或茎:有小毒。祛风止痛。用于风湿关节疼痛。外用于牙痛,癣;叶:用于外伤出血。

#### 7194134

*Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC. --- *Fagara nitida* Roxb.

植物名 两面针《高植图鉴补编》

药材名 两面针(福建)、《汇编》

文献名 蔓椒、豕椒《本经》,猪椒、豉椒、狗椒《别录》,稀椒《本草经集注》,金椒《图经》,入地金牛《本草求原》,金牛公、两边针《岭南采药录》,光叶花椒《中草药学》,崖椒《台湾药植志》

地方名 上山虎、下山虎、双面针(广东、广西、福建、云南),花椒刺(湖南、广西),山胡椒(福建、广东、广西),鸟不宿(福建、台湾),山椒(湖南、海南、四川),野花椒(湖南、广东、云南);福建:鸟不踏(福州、福清、闽侯、浦城、东山、厦门、南安),猫公刺(龙海、同安、泉州),鸟不居(长汀),叶下穿针(南靖),猫蕉刺,猫椒刺,大号鸟不踏(泉州);台湾:鸟踏刺,白马屎,古月枝,古月根,双面刺,蜆壳刺,黄根,壳刺,花椒;广东:川椒,牵牛刺(惠来),恶家婆(东莞),猫支箭、大叶猫枝箭、平山虎(惠阳),鸡胡椒(阳春),胡椒刺(揭阳),双面刺,鞋底刺(潮汕),落地金牛、牛膝勒、金牛母(广州),野牵牛(揭阳、澄海),草鞋刺(澄海),夜牵牛(陆丰),花椒根、荊刀根(潮安),牛刀刺(普宁),红心刺刀根(潮阳),拦路虎,两便针;海南:马药子(澄迈),胡椒箭、大叶椒箭(儋县);广西:出山虎,入山虎(北流、玉林),两背针,红花椒(宁明),单面针(宁明、梧州),出山钩(藤县),桐皮(平南),红倒钩箭(北海),金笔本蕈,山胡椒刺;四川:藤椒(南川);云南:“哈哪喝”(西双版纳傣语);其他:真椒党。

功效 根:有小毒。行气止痛,活血化瘀。用于跌扑肿痛,风湿痹痛,胃痛,牙痛,咽喉肿痛,毒蛇咬伤;茎:用于疟疾;果实:收敛,驱虫,发汗,健胃。

#### 7194135

*Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC. f. *fastuosum* How ex Huang

植物名 毛两面针《高植图鉴补编》

药材名 毛两面针《广西药录》

地方名 广西:单面针(邕宁)。

功效 根:用于感冒,跌打损伤,牙痛,风湿痹痛,胃痛。

#### 7194136

*Zanthoxylum pashanense* N. Chao

植物名 巴山花椒《高植图鉴补编》

药材名 巴山花椒果、巴山花椒根《神农架药录》

地方名 湖北:大红袍(神农架),三百棒、山花椒(利川)。

功效 果实:燥湿杀虫;根:祛风胜湿。

#### 7194137

*Zanthoxylum piaszekii* Maxim. --- *Z. piperitum* auct. non DC.

植物名 川陕花椒《高植图鉴补编》

药材名 山椒(湖北)、《汇编》

地方名 红花椒、红椒、花椒(华北、西北、中南、四川);山西:金黄椒;湖北:山花椒,野花椒,岩椒;四川:川花椒;其他:大红袍。

功效 果:健胃,驱虫。用于胃肠冷痛及吐泻;椒目:利尿。用于心脏病水肿,膀胱炎,小便不利,神经性喘息症。

备考 有些文献将本种学名误订为 *Zanthoxylum piperitum* DC.

#### 7194138

*Zanthoxylum pistaciiflorum* Hayata

植物名 三叶花椒《台湾药植志》

文献名 楷叶山椒《台湾药植志》

功效 叶:用于头痛。

#### 7194139

*Zanthoxylum rhesoides* Drake --- *Z. myriacanthum* Wall. ex Hook. f.

植物名 大叶臭花椒《高植图鉴补编》

药材名 驱风通《汇编》

文献名 大叶臭椒《广西药录》

地方名 有刺盐肤木、刺椿木、天星木(广东、广西);广东:红箭通,大叶花椒(阳春),血虎;广西:火筒木(博白),〔满天星〕(平南、苍梧、昭平),山铁尺(平南),木满天星(平乐)。

功效 茎、枝、叶:祛风除湿,活血散瘀,消肿止痛。用于风湿骨痛,感冒风寒,小儿麻痹后遗症。外用于跌打骨折,外伤出血,烧烫伤,毒蛇咬伤。

#### 7194140

*Zanthoxylum rhombifoliolatum* Hang

植物名 菱叶花椒《高植图鉴补编》

药材名 菱叶花椒《贵州药录》

功效 根、果:温中散寒,止痛。用于心腹冷痛,蛔积,刀伤出血。

#### 7194141

*Zanthoxylum scandens* Blume --- *Z. cuspidatum* Champ.

植物名 花椒箭《高植图鉴补编》

药材名 蔓椒(湖北)

文献名 尖叶花椒《种分》

地方名 湖北:藤花椒(崇阳);广东:七大白;广西:蛇通管(钟山),生藤勒通(北流),单面针,入山虎,假椒党,通墙虎(金秀),山花椒(贺县)。

功效 根、果:温中散寒,止痛。用于心腹冷痛,蛔积,刀伤出血,牙痛。

#### 7194142

*Zanthoxylum schinifolium* Sieb. et Zucc. --- *Fagara schinifolia* Engl. --- *Zanthoxylum mantschuricum* Benn.

植物名 青花椒《高植图鉴补编》

药材名 花椒《日用本草》、《药典》

文献名 人椒《尔雅》，善葳、椒目《本草经集注》，天椒《盛京通志》，野椒《树分》，青椒《汇编》，崖椒《中药志》

地方名 野花椒（山东、江苏、浙江、湖南），山花椒（东北、山东、江苏），狗椒棘子（东北），香椒子、香椒（山东、湖南）；辽宁：山椒，川椒；山东：狗椒，花椒茴香；江苏：土花椒（镇江、清江），大花椒（镇江），小花椒（徐州）；浙江：海桐（天目山），野胡椒；福建：刺葱；湖南：臭胡椒子，狗花椒，野总管，大叶总管皮（衡山）；广东：香花椒；广西：散血胆、血背草（全州），刺搜山虎（资源）。

功效 果皮：温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛，蛔虫病。外用于湿疹瘙痒；根、叶：清热解毒，行气止痛。用于胃脘痛，风湿痹痛，跌打损伤，毒蛇咬伤。

7194143 见 7194144a

7194144

*Zanthoxylum simulans* Hance --- *Z. setosum* Hemsl.

植物名 野花椒《高植图鉴》

药材名 野花椒《汇编》

文献名 椒聊《诗经》，檉、丑菜、者聊《尔雅》，秦椒《本经》，茱萸《尔雅义疏》，桵、桵、桵家椒《诗毛氏传疏》，蔓椒《名实图考》，川椒《药材学》，崖椒《中草药学》，刺花椒《江苏植药志》，刺山椒《台湾药植志》

地方名 花椒、大花椒（山东、江苏）；山东：花椒茴香、椒目（烟台），小花椒（文登），狗椒（崂山）；江苏：花椒叶，麻醉根叶，刺叶椒；江西：黄总管，香椒；福建：高脚刺、铁边鸟不踏（泉州）；台湾：臭刺仔；湖北：狗花椒；湖南：臭胡椒；广西：土花椒、大神符、筋葱木、珊瑚跳架（陆川）；云南：青椒。

功效 果皮：有小毒。温中止痛，驱虫健胃。用于胃痛，腹痛，蛔虫病。外用于湿疹，皮肤瘙痒，龋齿疼痛；种子：利尿消肿。用于水肿，腹水；根、叶：祛风湿，止痛。用于胃寒腹痛，牙痛，风寒痹痛，毒蛇咬伤。

7194144a

*Zanthoxylum simulans* Hance var. *podocarpum* (Hemsl.) Huang --- *Z. podocarpum* Hemsl.

植物名 柄果花椒《高植图鉴补编》

药材名 麻口皮子药《湖南药物志》

地方名 野花椒、皮子药、总管皮（江西、湖南）；湖南：满山香，四皮麻，杜椒子（新宁），小山椒、红山椒（古丈、淑浦），山胡椒（浏阳），细叶野花椒，麻口皮、红总管（城步苗族），“图税叭”（凤凰苗语）。

功效 树皮或根皮：有小毒。祛风散寒，解毒镇痛。用于风湿筋骨疼痛，跌打损伤，牙痛，毒蛇咬伤，止血，抗过敏。

7194145

*Zanthoxylum stenophyllum* Hemsl. --- *Fagara stenophylla* (Hemsl.) Engl.

植物名 狭叶花椒《高植图鉴》

地方名 湖北：狗花椒（巴东），野花椒（神农架）；四川：臭南椒。

功效 根皮：理气止痛。用于气痛，肚子痛。

7194146 见 7194121a

7194147

*Zanthoxylum tibetanum* Huang

植物名 西藏花椒《高植图鉴补编》

药材名 野花椒《西藏中草》

文献名 西藏野花椒《汇编》

地方名 西藏：“叶尔玛”（藏名）。

功效 果皮：有小毒。温中散寒，燥湿杀虫。用于胃脘冷痛，呕吐，寒湿腹泻，痢疾，蛔虫病；种子：行水。用于水肿胀满。

7194148

*Zanthoxylum trifolium* Wright --- *Z. dimorphophyllum* Hemsl.

植物名 异叶花椒《高植图鉴补编》

药材名 羊山刺《贵州草药》

地方名 湖北：狗花椒（神农架、恩施），三叶花椒（神农架）；广西：〔川椒〕（桂平）；四川：见血飞，青椒皮；贵州：散血飞；云南：狗椒。

功效 果实、根：祛风止痛，止血。用于风湿疼痛，吐血，外伤出血。

7194149

*Zanthoxylum trifolium* Wright var. *spinifolium* (Rehd. et Wils.) Huang --- *Z. dimorphophyllum* Hemsl. var. *spinifolium* Rehd. et Wils.

植物名 刺异叶花椒《广西药录》

药材名 散血飞《贵州》、《汇编》

文献名 刺叶花椒《种分》

地方名 陕西：刺三加，红三百棒；湖北：冬花椒（恩施）；四川：见血飞，青椒皮；贵州：黄椒。

功效 根：祛风散寒。用于风湿麻木，风寒咳嗽。外用于跌打损伤；皮：理气止痛。用于胃气痛，腹痛；果：接骨生肌，止痛消肿。用于跌打损伤，腰酸腿痛。

7194150

*Zanthoxylum undulatifolium* Hemsl.

植物名 波叶花椒《湖北植志》

药材名 波叶花椒《神农架药录》

文献名 浪叶花椒《高植图鉴补编》

地方名 湖北：花椒（神农架）。

功效 根皮：祛风湿，止痹痛。

## 7195 苦木科 Simaroubaceae

7195001

*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle --- *A. glandulosa* Desf.

植物名 臭椿《群芳谱》、《高植图鉴》

药材名 臭椿皮《滇南本草》，凤眼草〔果〕《品汇精要》、《中药大辞典》

文献名 椿《诗经》，椿白皮《药性论》，椿木叶、椿木、椿树、椿椿、椿椿白皮、椿椿根皮《唐本草》，臭椿《食疗本草》，山椿、虎目、椿木皮、椿根皮《本草拾遗》，虎眼树《四声本草》，鬼目《图经》，椿根白皮《近效方》，椿皮《日华子本草》，椿荚《圣济总录》，虎眼、虎目树、大眼桐、椿

莢、檉叶(纲目),凤眼子《兽医常用中药》,山樗、恶木、木砮树《中国药植志》,椿皮《药典》,臭椿实《药材学》,田樗、鬼眼《诗草木今释》

地方名 白椿(陕西、浙江、安徽、河南、广西),椿白皮(东北、甘肃、广西),椿根皮(东北、河北、浙江、广西),椿树(河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南),臭椿根皮(河北、江苏);北京:臭槐树角;山西:樗树子;内蒙古:“干达嘎利”(蒙名),珍珠杆(乌审旗),“乌没黑-尼楚根-好布鲁”(蒙语);陕西:苦椿皮;甘肃:马椿,雪白皮;山东:姑姑翅(淄博、泰山、益都),谷谷翅(果实),椿谷谷(蒙山),神树(青岛),髀膊膊(崂山),樗树凸凸,江苏:臭椿子,椿树根皮(南通),青树花(六合);上海:臭树;浙江:苦木松(温州、乐清);福建:婆子树(龙岩),七叶金、水椿(同安),木椿(泉州);广西:皮麻(上林),凤眼树;四川:毛椿树。

功效 根皮、干皮:清热燥湿,收涩止带,止泻,止血。用于赤白带下,湿热泻痢,久泻久痢,便血,崩漏;果实(凤眼草):清热利尿,止痛,止血。用于胃痛,便血,尿血。外用于阴道滴虫;叶:有小毒。用于疥疮,风痕。

#### 7195002

*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle var. *sutchuenensis* (Dode) Rehd. et Wils.

植物名 大果臭椿《云南植志》

药材名 臭椿皮《滇南本草》

文献名 大果樗树《树分》,椿皮《新华本草纲要》

地方名 湖北:臭椿树、臭椿树根(神农架);云南:白家香(维西),臭椿,龙树(富宁),川臭椿。

功效 树皮:凉血,止血,止泻,解毒杀虫。用于大肠下血,产后流血,红崩,疮毒红肿,红、白痢疾,漆疮,痈疽。

#### 7195003

*Ailanthus altissima* Swingle var. *tanakai* (Hayata) Kanehira et Sasaki

植物名 台湾樗树《台湾中药材图鉴》

药材名 凤眼草《台湾中药材图鉴》

功效 荚果:清热利尿,止痛,止血。

#### 7195004

*Ailanthus malabarica* DC.

植物名 岭南樗树《树分》

文献名 臭椿《新华本草纲要》

功效 鲜树皮:清热燥湿,收敛固肠。用于湿热带下,梦遗滑精,痢疾等;树脂:用于痢疾。

#### 7195005

*Ailanthus vilmosiniana* Dode

植物名 刺樗《树分》

药材名 刺臭椿《贵州药录》

文献名 刺椿、刺叶椿《山东树木志》

地方名 臭椿(湖北、贵州);云南:白香胶[树脂](滇西北),“格格”(傣语);西藏:“给哥儿”(拉萨藏名)。

功效 根皮:清热凉血。用于便血,红白痢疾,红崩白带;树脂:用于头痛,手足皸裂。

#### 7195006

*Brucea javanica* (L.) Merr. --- *B. sumatrana* Roxb.

植物名 鸦胆子《高植图鉴》

药材名 鸦胆子《纲目拾遗》、《药典》

文献名 老鸦胆《生草药性备要》,鸦胆、苦榛子《古云旅钞》,苦参子《纲目拾遗》,鸦蛋子《名实图考》,老鸦胆叶《本草求真》,鸭蛋子《医学衷中参西录》,苦胆子、苦子《中草药学》,鸭胆子、雅旦子《中药志》

地方名 福建:羊屎豆(厦门、同安),羊屎兰(厦门),苦山参;广东:老鸭蛋(广州),天胆子、苦透心(新会);海南:苦杉木;广西:山黄柏、猪胆药(玉林),羊不食(北海),小苦楝(藤县),秤星根,解苦楝,老鸦胆根。

功效 果实:有毒。清热解毒,截疟,止痢,腐蚀赘疣。用于痢疾,疟疾。外用于赘疣,鸡眼。

#### 7195007

*Brucea mollis* Wall.

植物名 毛鸦胆子《云南植志》

药材名 毛鸦胆子《广西药录》

功效 果实:用于痢疾,痔疮出血。

#### 7195008

*Harrisonia perforata* (Blanco) Merr.

植物名 牛筋果《海南植志》

地方名 海南:弓刺,连江筋。

功效 根、茎:清热解毒。用于疟疾,疮疖;叶:用于眼痛。

#### 7195009

*Picrasma javanica* Blume

植物名 常绿苦树《云南植志》

功效 根皮:代金鸡纳用。

备考 根皮:据《云南种录》载,本品含苦楝树甙,味极苦,可代金鸡纳用,但不含生物碱。

#### 7195010

*Picrasma quassioides* (D. Don) Benn. --- *Picrasma quassioides* var. *glabrescens* Pamp.

植物名 苦木《高植图鉴》

药材名 苦木《药典》

文献名 黄楝树《救荒本草》,黄楝子《和汉药标本目录》,苦树《树分》,黄楝《种分》,苦树皮、苦楝根皮《中国药植志》,山熊胆《新医学》,光序苦楝《云南种录》

地方名 苦皮子(甘肃、河南、四川),苦皮子树(四川、云南),苦皮树(河南、湖南、四川、贵州),苦胆木(甘肃、广西),山核桃树(华中),[苦楝树](湖北、湖南、四川);河北:[苦楝];山东:土樗子(昆崙山),红连茶(崂山),榆香枝(威海),空条;江苏:苦桑头(连云港);浙江:小叶嫩蒲柴(东天目),苦木霜(温州、乐清);安徽:黄连树,槐杨木;河南:苦楝,苦楝木;湖北:小苦楝(鹤峰);湖南:老麻藤,进口苦,苦力芽,苦通皮,罗卜药,黄楝木;广东:胆木,猪胆木,寒苦树;广西:苦青树,狗胆木,赶狗木,鱼胆树,青鱼胆,臭椿芽,熊胆木;四川:[川楝皮](广安、巴县),狗胆树皮(蓬溪),苦弹子,苦楝药树;贵州:土苦楝,土苦楝子,〔苦楝子〕,金条子,秤杆树,崖漆树,野漆木;云南:苦胆树(文山、砚山),熊胆



树;其他:山苦楝。

功效 枝、叶:有小毒。抗菌消炎,祛湿解毒。用于感冒,急性扁桃体炎,咽喉炎,肠炎,细菌性痢疾,湿疹,疮疖,毒蛇咬伤。

#### 7195011

*Picrasma quassioides* (D. Don) Benn. f. *dasycarpa* Kitag. --- *P. ailanthoides* (Bunge) Planchon var. *dasycarpa* Kitag.

植物名 毛果苦树《东北木本图志》

药材名 毛果苦树《东北药用植物》

功效 树皮、根皮或茎木:有毒。清热燥湿,解毒杀虫。用于菌痢,胃肠炎,胆道感染,蛔虫病,急性化脓性感染,淋巴结炎,副睾炎,盆腔炎,胃痛,肋膜炎,慢性支气管炎,疥癣,湿疹,烧伤。

#### 7195012

*Quassia amara* L.

植物名 苏林南苦木《台湾药植志》

药材名 洋苦木(拟)

文献名 苦木(赵《生药》),括矢亚《中国植物图鉴》,苦白木《西药大成》

功效 木材:用于消化不良,贫血症。

### 7196 橄榄科 Burseraceae

#### 7196001

*Balsamodendron ehrenbergianum* Berg.

植物名 爱伦堡没药树《中药大辞典》

药材名 没药《中药大辞典》

功效 胶树脂:散瘀止痛。外用消肿生肌。用于跌打瘀血肿痛,痈疽肿痛,胸腹诸痛。

#### 7196002

*Boswellia bhaw dajiana* Birdw.

植物名 药胶香树《汇编》

药材名 乳香《汇编》

文献名 鲍达乳香树《中药志》

功效 油胶树脂:活血止痛。外用于消肿生肌。

#### 7196003

*Boswellia carterii* Birdw. --- *B. sacra* Fluek.

植物名 乳香树《汇编》

药材名 乳香《别录》、《汇编》

文献名 熏陆香《南方草木状》,马尾香、乳头香《海药本草》,塌香《梦溪笔谈》,西香《本草衍义》,天泽香、摩勒香、多伽罗香、缠末、杜噜香、滴乳、明乳、浴香、瓶香、袋香、拣香《纲目》,名香、名乳、的乳、明王珍、麻初香《新纲》,阿乳香、阿拉伯乳香《中国药植图鉴》,卡氏乳香树《中药志》

功效 油胶树脂:活血止痛,外用消肿生肌。用于心腹诸痛,筋脉拘挛,跌打损伤,疮痈肿痛。

#### 7196004

*Boswellia neglecta* M. Moore

植物名 野乳香树《汇编》

药材名 乳香《汇编》

功效 油胶树脂:活血止痛。用于心腹诸痛,筋脉

拘挛,跌打损伤,疮痈肿痛。外用于消肿生肌。

#### 7196005

*Canarium album* (Lour.) Raeusch.

植物名 橄榄《食疗本草》、《高植图鉴》

药材名 青果《宛陵集》、《药典》

文献名 橄欖子《南方异物志》,橄欖(孟诜),忠果《记事珠》,青子《东坡诗集》,谏果《齐东野语》,青橄欖《海槎余录》,橄欖仁、橄欖核《纲目》,南威、味谏《花镜》,白榄《广东新语》,白榄根《岭南采药录》,白橄欖子《植物名汇》,柑榄《树分》,白椿皮、白椿根、橄欖树根《鉴别手册》,黄榄果《中药志》

地方名 芹榄(福建、广东),黄榄(广西、云南);台湾:绿榄;广东:白蛇、白蛇根、生橄欖根(潮阳、潮安),红心白蛇;海南:红榄;广西:榄子(横县);四川:干青果,上青果,梭子果;云南:“麻梗”(西双版纳傣语),〔琥珀〕(树脂名),黄榔果。

功效 果实:清热,利咽,生津,解毒。用于咽喉肿痛,咳嗽,烦渴,鱼蟹中毒;根:舒筋活络,祛风除湿。用于风湿腰痛,产后风瘫,手脚麻木。

#### 7196006

*Canarium austro-sinensis* Huang

植物名 华南橄欖《广西植志》

地方名 广西:三角榄。

功效 果实:清热,利咽,生津,解毒。

#### 7196007

*Canarium commune* L.

植物名 爪哇橄欖《台湾药植志》

地方名 台湾:爱留米脂。

功效 树脂:用于支气管炎,肺病,溃疡性创面。

#### 7196008

*Canarium pimela* Leenh. --- *C. nigrum* (Lour.) Engl. --- *Pimela nigra* Lour.

植物名 乌榄《高植图鉴》

药材名 乌榄《纲目》、《汇编》

文献名 威子、木威、木威子、金楼子《本草拾遗》,乌橄欖《海槎余录》,乌榄仁《纲目》,乌榄叶《生草药性备要》,乌榄根《岭南采药录》

地方名 黑榄(广东、广西);广西:北榄木皮(北流)。

功效 果实:止血化痰,利水消肿;根:舒筋活络,祛风去湿。用于风湿腰腿痛,手足麻木,内伤出血;叶:清热解毒,消肿止痛。用于感冒,上呼吸道感染,肺炎,多发性疖肿。

#### 7196009

*Canarium tonkinense* Engl.

植物名 越榄《云南植志》

文献名 东京榄《中国经植志》

地方名 云南:黄榄果、黄郎果(河口)。

功效 果实:止血化痰,利水消肿;根:舒筋活络,祛风除湿;叶:清热解毒,消肿止痛。

#### 7196010

*Commiphora abyssinica* (Berg.) Engl.

植物名 阿比西尼亚没药树《药材学》

药材名 没药《药性论》、《药材学》

功效 油胶树脂:散瘀止痛。用于跌打瘀血肿痛,痈疽肿痛,胸腹诸痛。外用于消肿生肌。

#### 7196011

*Commiphora myrrha* Engl. --- *C. molmol* End.

植物名 没药树《大明一统志》、《云南植志》

药材名 没药《药性论》、《汇编》

文献名 末药《纲目》,蜜儿拉树《树分》,没药珠、明没药、全没药、克香、黑香、马皮没药、狗皮没药《药材学》

功效 油胶树脂:散瘀止痛。用于跌打瘀血肿痛,痈疽肿痛,胸腹诸痛。外用于消肿生肌,疮口久不收敛。

#### 7196012

*Garuga pinnata* Roxb.

植物名 羽叶白头树《高植图鉴》

药材名 棵麻《汇编》

文献名 白头树《广西植录》,毛叶嘉榄《西双版纳傣药志》

地方名 云南:“埋坑”(西双版纳傣语),嘉榄。

功效 树皮:清热解暑,化腐生肌。用于烧伤,过敏性皮炎。

### 7197 楝科 Meliaceae

#### 7197001

*Aglaia odorata* Lour.

植物名 米仔兰《高植图鉴》

药材名 米仔兰《汇编》

文献名 夜兰、蚊惊树《纲目拾遗》,树兰《台湾府志》,碎米兰、三叶兰《植物名汇》

地方名 鱼子兰(广东、广西);内蒙古:兰米;台湾:秋兰;广东:暹罗花,米子兰,〔山胡椒〕(茂名);广西:而子兰(平南),鱼骨木(五林),千里香(陆川);四川:兰花米,〔珠兰〕,木珠兰;贵州:米兰,米兰花。

功效 枝叶:活血散瘀,消肿止痛。用于跌打骨折,痈疮;花:行气解郁。用于气郁胸闷,食常腹胀。

#### 7197002

*Aglaia odoratissima* Lour.

植物名 香米籽兰《汇编》

功效 枝叶:活血散瘀,消肿止痛;花:行气解郁。

#### 7197003

*Aglaia tsangii* Merr.

植物名 铁梗《海南植志》

功效 树皮:用于除虱。

#### 7197004

*Aphanamixis grandifolia* Blume

植物名 大叶山楝《广西药园药录》

文献名 大叶沙罗《海南植志》

地方名 广东:苦柚木(茂名),苦油木,罗浪果;海南:山楝;广西:红萝卜,红罗木,红罗木;云南:〔胡桐〕,“叶好娇”(红河哈尼族语)。

功效 树皮、叶:祛风消肿。用于风湿病。

#### 7197005

*Aphanamixis polystachya* (Wall.) R. N. Parker  
*Amoora rohituka* (Roxb.) Wight et Arn.

植物名 山楝《高植图鉴》

文献名 阿麻拉树《台湾药植志》,铁罗、红罗、沙罗《高植图鉴》

地方名 云南:小红果、云连树(河口),红果树、〔油桐〕(金平)。

功效 树皮:收敛药

#### 7197006

*Chukrasia tabularis* A. Juss.

植物名 麻楝《高植图鉴》

地方名 云南:白椿(西双版纳)。

功效 树皮:用于感冒发热。

#### 7197007

*Chukrasia tabularis* A. Juss. var. *velutina* (Wall.) King

植物名 毛麻楝《高植图鉴》

药材名 毛麻楝《广西药园药录》

功效 树皮:用于退热;叶:祛风止痒。

#### 7197008

*Cipadessa baccifera* (Roth) Miq.

植物名 浆果楝《云南植志》

地方名 云南:“苦亚罗椿”、“埋皮仿”、“秧勒”、“哈皮仿”、“亚罗椿”(西双版纳傣语),老鸦树,老鸡饭。

功效 根、树皮:疏风解表,截疟。用于疟疾,感冒,腹泻,痢疾,皮肤瘙痒,外伤出血。

#### 7197009

*Cipadessa cinerascens* (Pell.) Hand. -Mazz. -- *C. fruticosa* Blume var. *cinerascens* Pell.

植物名 灰毛浆果楝《高植图鉴》

文献名 野桐椒《中药大辞典》,假茶辣《广西药录》

地方名 广西:软柏木(那坡),大苦木(宁明),假吴萸(凌云),鱼胆木(龙州),鱼眼木(大新),串黄皮(融安),野茶辣(龙胜),黄皮(桂平),黄连茶,鱼苦胆(凤山),蟬子叶,“美别”(壮语),〔鸭胆子〕;四川:野胡椒,抱鸡婆,臭子;云南:石岩青、老鸦树(红河),老鸡饭(禄劝、红河),碎未青,罗汉香(永平),白酒药(禄劝),野白腊(河口),“亚罗青”、“亚洛轻”、“亚罗椿”、“黑亚罗椿”(思茅傣语)。

功效 根、叶:清热解暑,行气通便,截疟。用于感冒,发热不退,疟疾,便秘,腹痛,痢疾,风湿关节痛。外用于小儿皮炎,皮肤瘙痒,烧、烫伤。

#### 7197010

*Dysoxylum hongkongense* (Tutch.) Merr.

植物名 香港葱臭木《新华本草纲要》

文献名 香港桤木《高植图鉴》

地方名 云南:“早望”(西双版纳傣语)。

功效 根、皮:抗疟。

#### 7197011

*Lansium domesticum* Jack.

植物名 兰撒果《台湾药植志》

功效 叶:用于痢疾,眼痛;树皮:用于痢疾,疟疾。

外用于蝎蟹伤;种子:驱虫。

## 7197012

*Melia azedarach* L.

植物名 楝树《高植图鉴》

药材名 苦楝皮《证类本草》、《药典》,苦楝子《图经》、《汇编》

文献名 楝实《本经》,楝皮《日华子本草》,金铃子《图经》,楝叶、楝花、楝根木皮《纲目》,苦楝《名实图考》,晚客、栝苓、苦苓、楝、金楝子、森木、石茱萸、森楝《植物名汇》,仁枣《新纲》,楝子树《中国经植志》,楝树果《汇编》,花心树、苦辣树《中药大辞典》

地方名 苦楝树(浙江、江西、湖北),楝(甘肃、山东、江苏、海南、广西),楝枣树(江苏、浙江),楝枣子(山东、江苏),翠树、紫花树(山西、江苏、浙江),森树(山西、广东、广西);山东:楝孔;江苏:苦楝根皮(清江),楝果子(盱眙);上海:土楝子,哑子树,楝树叶;浙江:苦皮楝;福建:楝枣,苦心子(南安),楝柴(福安),楝柴草,苍蝇枣,李楝(宁德);湖北:楝树皮;湖南:苦枣子(常德),苦楝芽,苦令芽,“图儿夹矮”(苗语);广东:洋花森,木楝树(兴宁),洋花参,火槿杨;广西:苦楝木(玉林、北流、平南、贵县),苦皮树、枯心木(北海),山苦楝(柳州),五虎下西川,花心木,花纹木(梧州),金斗木,大楝树,相心树;云南:野苦楝(富宁、河口)。

功效 树皮、根皮:有毒。驱虫疗癣。用于蛔虫病,蛲虫病,虫积腹痛。外用于疥癣瘙痒;果实(苦楝子):有毒。泻火,止痛,杀虫。用于胃痛,虫积腹痛,疝痛,痛经;鲜叶:可以灭钉螺。

备考 吴其浚《名实图考》引《湘阴志》云:“苦楝掘沟埋之可成楝城,植当风处,可辟白蚁”。

## 7197013

*Melia azedarach* L. var. *japonica* Makino

植物名 日本楝《中草药学》

文献名 仁枣、楝实《新纲》,苦楝皮《台湾中药材图鉴》

功效 树皮、根皮:驱虫疗癣。

## 7197014

*Melia dubia* Cav.

植物名 南岭楝树《高植图鉴》

文献名 大楝树《广西植录》

地方名 贵州:苦楝;云南:苦楝皮、苦楝子(红河)。

功效 茎皮:理气止痛,解毒杀虫。用于疝气,蛔积,头癣,疥疮,阴道滴虫;果:用于胸腹胀满,腹痛。

## 7197015

*Melia toosendan* Sieb. et Zucc. --- *M. azedarach* L. var. *toosendan* Makino

植物名 川楝《摘元方》、《高植图鉴》

药材名 川楝皮《药材学》,川楝子《本草正》、《药典》

文献名 楝实《本经》,楝实《本草经集注》,金铃子、仁枣(侯宁极《药谱》),苦楝子《图经》,苦楝皮《证类本草》,唐苦楝《新纲》,川楝树《中药志》,楝子《常用中药名辨》,川元《品种论述》

地方名 川楝实(湖北、四川、贵州),苦楝(四川、云

南);广西:大苦楝树(旧林),大果苦楝(阳朔),大苦楝(三江);贵州:苦楝实,苦楝果;云南:“哥亨”、“梅亨”(西双版纳傣语)。

功效 果实:有小毒。舒肝行气止痛,驱虫。用于胸胁、脘腹胀痛,疝痛,虫积腹痛;树皮、根皮:有毒。驱虫疗癣。用于蛔虫病,虫积腹痛。外用于疥癣瘙痒;叶:用于疝气,驱蛔虫,疮秃,丝虫病,外伤出血,蜈蚣、毒蛇咬伤,湿疹,小儿疳积,牙痛。

## 7197016

*Munronia delavayi* Franch.

植物名 云南地黄连《高植图鉴》

药材名 小地黄连(云南绥江)、《云南中草药选》

地方名 广西:思茅地黄连,千年矮,白花矮陀陀;云南:矮陀陀(绥江),小独根,金丝矮陀陀,滇地黄连(屏边),小独脚。

功效 全株:清热解毒,消肿止痛。用于跌打骨折,风湿痹痛,咽喉炎,痈肿疔毒;根:用于气胀腹痛,恶性疟疾。

## 7197017

*Munronia hainanensis* How et T. Chen

植物名 海南地黄连《高植图鉴》

药材名 七叶仔《汇编》

功效 枝、叶:清热解毒。用于毒蛇咬伤。

## 7197018

*Munronia henryi* Harms

植物名 滇黔地黄连《高植图鉴》

药材名 地黄连《云南中草药》

文献名 亨氏地黄连《广西中药志》,矮地黄连《广西植录》,矮陀陀《汇编》

地方名 白花矮陀陀、白花矮朵朵、铁冬青(广西、云南);广西:假苦楝,矮秃秃(隆林),矮托托(隆林、田林),鸡血散(那坡),鸡血伞,小罗伞(凌云),长生不老(德保),长生不死,万年矮(乐业),千年矮(天峨、凤山);云南:七匹散、金丝岩陀、小独根、火石五(临沧),滇地黄连(文山),思茅地黄连(红河),金丝矮陀陀(曲靖),金丝矮陀,〔土黄连〕(思茅、临沧),麻鸡翅膀(双江),万灵丹,岩松(思茅),小岩三(景谷),小花药、小花叶子、小野椒(新平),小白花,“雅害黑”(西双版纳傣语),“利鲁吐”(楚雄彝名)。

功效 全株:有小毒。舒筋活络,祛风止痛,解热截疟。用于跌打损伤,风湿性关节炎,胃痛,气胀腹痛,感冒发热,疟疾。

## 7197019

*Munronia heterotricha* H. S. Lo

植物名 小芙蓉(广东湛江)、《植分学报》

功效 全株:用于风湿骨痛,跌打损伤。

## 7197020

*Munronia sinica* Diels

植物名 地黄连《高植图鉴》

药材名 地黄连《四川中药志》

文献名 花叶矮陀陀《四川中药志》

地方名 四川:花叶矮陀陀,花叶细辛,花叶寻胆,土

黄连(南川);贵州:矮陀陀。

功效 全株:用于五癆咳嗽,跌打损伤,风湿病。外用于无名肿毒。

#### 7197021

*Munronia unifoliolata* Oliv.

植物名 单叶地黄连《高植图鉴》

药材名 单叶地黄连《湖南药物志》

文献名 地柑子《云南植志》

地方名 矮陀陀(四川、贵州);湖南:矮叶南,矮子南,矮脚南;贵州:石柑子,小白花草。

功效 全株:清热解毒,活血止痛。用于跌打损伤,无名肿毒,胃炎。外用于疮痍。

#### 7197022

*Sandoricum indicum* Cav.

植物名 山陀儿《台湾药植志》

功效 根:用于祛风,腹泻,痢疾。

#### 7197023

*Swietenia macrophylla* King

植物名 大叶桃花心木《台湾药植志》

功效 树皮:解热,强壮,收敛。

#### 7197024

*Swietenia mahagoni* Jacq.

植物名 桃花心木《高植图鉴》

药材名 桃花心木《台湾药植志》

功效 树皮:解热,强壮,收敛。

#### 7197025

*Toona ciliata* Roem. --- *Cedrela toona* Roxb. --- *Toona sureni* auct. non (Blume) Merr.

植物名 红椿《云南植志》

文献名 红椿树《元江哈尼族药》

地方名 红辣子(四川、云南);广东:森木,抗姑笋;海南:赤昨工;广西:红辣;云南:“热热尼玻”(元江哈尼语);其他:大红椿树。

功效 根皮:除热,燥湿,涩肠,止血,杀虫。用于久泻久痢,肠风便血,崩漏带下,遗精,白浊,痞积,蛔虫,疮癣。

备考 有的文献将学名误订为 *Toona sureni* (Blume) Merr.

#### 7197026

*Toona ciliata* Roem. var. *pubescens* (Franch.) Hand. - Mazz.

植物名 毛红椿《贵州药录》

地方名 贵州:红辣子,红椿。

功效 茎皮:祛风除湿,活血化痰。用于月经过多,白带,痢疾,麻疹不透。

#### 7197027

*Toona microcarpa* (C. DC.) Harms --- *Cedrela microcarpa* C. DC.

植物名 小果香椿《高植图鉴》

药材名 小果香椿《广西药园药录》

文献名 紫椿《云南种录》

地方名 云南:红椿树。

功效 叶、根皮、果:祛风除湿,抗菌收敛,止血止痛;果:用于溃疡病;根皮:用于胃出血,直肠出血,蛇咬伤,痈疖,皮肤瘙痒,痢疾,肠炎,便血,血崩,风湿腰腿痛;嫩叶:用于痔疮。

#### 7197028

*Toona sinensis* (A. Juss.) Roem. --- *Cedrela sinensis* A. Juss.

植物名 香椿《高植图鉴》

药材名 椿白皮《食疗本草》、《中药大辞典》

文献名 樛《山海经》,椿木叶、椿《唐本草》,猪椿(孟诜),椿树芽《救荒本草》,香椿皮《经验方》,椿树子《生生编》,红椿《名实图考》,春颠皮《分类草药性》,椿芽树花《民药汇编》,春尖油《重庆草药》,香椿籽、香椿木油《中国经植志》,椿芽花、椿芽树皮、椿树皮《四川中药志》,香椿叶、香椿根皮《安徽中草药》,香椿子《东北药植志》,春菜树、白椿、香树《中药大辞典》

地方名 椿芽树(陕西、广西、四川),椿蕈(四川、贵州),香椿树(山东、广西),香甜树(四川、湖北);河北:香椿铃当;陕西:香椿铃;山东:香铃子;浙江:红椿菜(临安),椿菜头(淳安),香椿枝;福建:椿根(厦门、诏安),白椿根(龙溪),红通,通树根;台湾:大红椿树,红椿根;广西:青先树(钟山),椿芽木(德保、临桂),椿根白皮(来宾),椿木皮(凤山);湖北:椿树(神农架);四川:春尖叶,春尖花,椿花,春阳树(宝兴),椿颠树(峨眉山);贵州:椿菜;云南:毛椿(田畴),马泡子树(镇雄)。

功效 根皮、叶、嫩枝及果:祛风利湿,止血止痛;根皮:用于痢疾,肠炎,泌尿道感染,便血,血崩,白带,风湿腰腿痛;叶及嫩枝:用于痢疾;果:用于胃、十二指肠溃疡,慢性胃炎。

7197029 见 7197030a

#### 7197030

*Trichilia connaroides* (Wight et Arn.) Benth. --- *Heynea trijuga* Roxb. et Sims

植物名 老虎楝《新华本草纲要》

地方名 广西:“阿注美勒”(瑶语),鸬鹚菜;云南:老母猪树,漆赖,假黄皮,“鸡波”(傣语)。

功效 根:有小毒。清热解毒,祛风湿,利咽喉。用于风湿腰腿痛,咽喉炎,扁桃腺炎,感冒,胃痛。

#### 7197030a

*Trichilia connaroides* (Wight et Arn.) Benth. f. *glabra* Benth.

植物名 海木《广西药录》

文献名 鸬鹚花《高植图鉴》, [鸬鹚菜]《汇编》

地方名 广西:老虎楝;贵州:野椿芽树;云南:“叫沙洞”(西双版纳傣语),“鸡波”(思茅傣语)。

功效 根、叶:有小毒。清热解毒,祛风湿,利咽喉。外用于顽癣,猩红热。

#### 7197031

*Trichilia sinensis* Benth. --- *Heynea velutina* How et Chen

植物名 皱果海木《广西药录》

药材名 白骨走马《汇编》

文献名 苦果鹧鸪花《高植图鉴》, 崖骨鹧鸪花《汇编》

地方名 广西: 黑骨走马(灵山、钦州)。

功效 根: 用于慢性骨髓炎, 疮疡肿毒。

7197032

*Turraea pubescens* Hellen

植物名 杜楝《海南植志》

功效 枝、叶: 解毒, 收敛, 止泻。用于急慢性菌痢, 泄泻, 咽喉炎, 内外伤出血

### 7193 无患子科 Sapindaceae

7198001

*Allophylus caudatus* Radlk.

植物名 波叶异木患《中国植志》

药材名 三叶茶《广西药录》

功效 全株: 用于风湿痹痛, 肾炎, 肝炎, 骨折。

7198002

*Allophylus cobbe* (L.) Raeusch. var. *velutinus* Corner

植物名 滇南异木患《中国植志》

文献名 异木患《广西植录》

功效 叶: 清热解暑。用于蛇咬伤, 烧烫伤, 湿疹, 皮炎。

7198003

*Allophylus longipes* Radlk.

植物名 长柄异木患《中国植志》

地方名 云南: “叶沙短”(西双版纳傣语)。

功效 根: 用于外热内冷, 痢疾腹泻, 尿道炎, 产后虚弱, 恶露不净, 跌打损伤。

7198004

*Allophylus repandifolius* Merr. et Chun

植物名 单叶异木患(海南)、《中国植志》

功效 根、茎、叶: 用于风湿痹痛, 跌打损伤, 瘀血作痛。

7198005

*Allophylus viridis* Radlk.

植物名 异木患《中国植志》

药材名 异木患《海南中草药》

文献名 大果《中药大辞典》, 小叶枫《中国植志》

功效 根、茎、叶: 通利关节, 散瘀活血。用于风湿痹痛, 跌打损伤; 叶: 用于感冒。

7198006

*Cardiospermum halicacabum* L. --- *C. halicacabum* L. var. *microcarpum* (Kunth) Blume

植物名 倒地铃《中国植志》

药材名 倒地铃《汇编》

文献名 假苦瓜《生草药性备要》, 假蒲达《本草求原》, 小果倒地铃、痲痧藤《广西药录》

地方名 包袱草、风船葛(广东、广西、浙江、安徽、四川)、三角泡、鬼灯笼、臭苦瓜(广东、广西)、金丝苦楝(福建、广东、广西)、灯笼泡(湖南、广东); 河北: 风船草; 福建: 棕仔草、眼睛草、倒地苦楝(泉州), 单藤苦楝、炆子目周草、倒地虹、金丝五叶藤、炆子目珠、金丝苦令

(同安、厦门、晋江、诏安、泉州), 倒苦瓜(龙岩), 倒藤苦楝, 肉棕草; 台湾: 白花仔草; 湖南: [胡椒], 野胡椒, 镜罗藤, [白胡椒], 草胡椒, 风船藤; 海南: 坡芹(澄迈); 广东: 假灯笼(乐昌), 灯笼花、灯笼草、带藤苦楝、软枝苦楝(汕头), 假苦楝(洪江), 方骨带藤苦楝(潮安), 蔓藤苦楝(海丰), 大藤苦楝(普宁), 穿藤苦楝、天灯笼、段藤苦楝(陆丰), 三角楼(揭阳), 楝仔, 苦楝, 天灯笼、灯笼朴; 广西: 三角灯笼, 三角炮, 假骨根, 金丝苦楝藤、炮卜草, 三角藤(龙州), 爆卜草(宁明), 过三户蛇(梧州), 打卜子(贵县), 一胎三子, 苦楝藤(那坡); 云南: 炮掌果, 野苦瓜(河口)。

功效 全草: 散瘀消肿, 凉血解毒。用于跌打损伤, 疮疖痈肿, 湿疹, 毒蛇咬伤。

7198007

*Delavaya toxocarpa* Franch. --- *D. yunnanensis* Franch.

植物名 茶条木《中国植志》

药材名 鸡腰子果(云南)

文献名 滇木瓜《高植图鉴》

地方名 广西: 槽果, 米椿树, 米麻, “吱壮”(壮语); 云南: 黑枪杆(文山), 打油果、三麻子果(禄劝)。

功效 种子油: 用于头虱, 疥癣。

7198008

*Dimocarpus longan* Lour. --- *Euphoria longan* (Lour.) Steud. --- *Nephelium longana* Camb.

植物名 龙眼《本经》、《中国植志》

药材名 龙眼肉《开宝本草》、《药典》

文献名 [益智]《本经》, 比目《吴普本草》, 亚荔枝《开宝本草》, 荔枝奴《南方草木状》, 荔枝《图经》, 蜜脾、木弹、骊珠、燕卵、蛟泪、圆眼《纲目》, 海珠丛、绣水团《群芳谱》, 桂圆《药品化义》, 桂圆核仁《纲目拾遗》, 龙目《蜀都赋》, 绣木团、川弹子《清异录》, 魁圆、龙月、荔枝、荔枝、细荔、益志、龙眼锦、龙眼巾、荔枝奴、绣水团《新纲》, 龙眼树皮《岭南采药录》

地方名 圆圆、圆肉(四川、云南); 福建: 宝圆, 龙眼干、龙眼花、龙眼根(泉州); 四川: 桂圆肉, 枝圆; 云南: 羊眼果树(景东)。

功效 假种皮(龙眼肉): 补益心脾, 养血安神。用于气血不足, 心悸怔忡, 健忘失眠, 血虚萎黄; 根: 利湿通络。用于乳糜尿, 白带, 风湿关节痛; 叶: 清热解毒, 解表利湿。用于预防流感, 流行性脑脊髓膜炎, 感冒, 肠炎。外用于外伤出血; 树皮: 用于疳积; 花: 用于诸种淋症。

7198009

*Dodonaea viscosa* (L.) Jacq.

植物名 车桑子《中国植志》

药材名 车桑子《四川中药志》

文献名 坡柳《广西药录》, 车桑仔《中国经植志》, 山杨柳、野碧桃、白石楝《汇编》

地方名 明油子(四川、云南); 福建: 溪柳(福州、三明), 石故纸、石荔(泉州), 毛乳(龙海、南靖、长泰、平和), 山杨梅(莆田), 水黄枝、[黄析](厦门); 台湾: 车门仔, 车栓仔; 海南: 铁扫把; 四川: 山枝莲, 妙米柴; 云南:

明子柴、狗闹子、夜闹子(武定),明油脂、密柚子(禄劝),〔透骨草〕、羊不吃(宾川),崖油枝(丽江),“虎排儿打打”(丽江纳西族语);其他:白石栋,叶扇。

功效 全株:解毒,消炎,止痒。外用于疮毒,湿疹,荨麻疹,皮疹;根:有大毒。消肿解毒。用于牙痛,风毒流注;叶:清热渗湿,消肿解毒。用于皮肤疮痒;花、果:用于百日咳。

## 7198010

*Dodonaea viscosa* (L.) Jacq. var. *vulgaris* Benth. f. *burmanniana* (DC.) Radlk. --- *D. burmanniana* DC.

植物名 坡柳《广西药录》

文献名 夜闹子、野碧桃、狗闹子、车桑子《云南种录》

功效 叶:用于咽喉炎;花:用于百日咳。

## 7198011

*Erioglossum rubiginosum* (Roxb.) Blume

植物名 赤才(海南)、《中国植志》

文献名 灵树《中国植志》

地方名 广东:孖仔树(徐闻)。

功效 根梢:强壮药。

## 7198012 见 7198013

## 7198013

*Koelreuteria bipinnata* Franch. --- *K. bipinnata* Franch. var. *apiculata* (Rehd. et Wils.) How et Ho --- *K. bipinnata* var. *puberula* Chun

植物名 复羽叶栾树《中国植志》

药材名 摇钱树(四川、云南、贵州)、《汇编》

文献名 栾树《名实图考》,花椒树、泡花树《树分》,毛叶栾树《广西植录》,毛叶栾树《云南植志》,尖果栾树《贵州植志》

地方名 湖南:响炮树,野胡椒树,腰径树;四川:摇钱树根;云南:吹风果(西畴),白苦楝,灯笼果(广南);贵州:灯笼花(荔波),马鞍树(瓮安、凤岗),一串钱。

功效 根、花:疏风清热,止咳,杀虫。用于风热咳嗽,驱蛔虫。

## 7198014

*Koelreuteria bipinnata* Franch. var. *integrifoliola* (Merr.) T. Chen --- *K. integrifoliola* Merr.

植物名 全缘叶栾树《中国植志》

文献名 全缘栾树《高植图鉴》,全缘栾木《江西药录》

地方名 山膀胱(华东),黄山栾树(浙江、广西);浙江:灯笼木(临安),栾华;湖南:图扎拉,巴拉子。

功效 根、花:疏风,清热,止咳,驱蛔。用于风热咳嗽,风湿痹痛,蛔虫病。

## 7198015

*Koelreuteria paniculata* Laxm.

植物名 栾树《中国植志》

药材名 栾花《本经》、《中药大辞典》

文献名 木栾《救荒本草》,栾树《名实图考》,茶条《盛京通志》,黑叶子树《陕甘宁植志》

地方名 山茶叶(东北),灯笼花(河北、甘肃);河北:

乌拉,黑色叶树,木老芽,侧树,乌拉胶;甘肃:五乌拉叶;山东:板棵子(历城、沂水、五莲),栾棒(泰山、长清),栾伞子(平邑),黄楝(苍山),软棒;浙江:石栾树;安徽:灯笼树,山黄栗头;河南:黑叶树,木栏牙;四川:摇钱树;其他:菩提树,肥珠子,黑茶树,黑色茶树,假洋桃,野海椒,槐树,木栾子,栾木。

功效 花:用于胃痛,泪出伤眦,月肿。

## 7198016

*Litchi chinensis* Sonn.

植物名 荔枝《南方草木状》、《中国植志》

药材名 荔枝核《本草衍义》、《药典》

文献名 离支《上林赋》,荔支《齐民要术》,荔枝根《图经》,荔枝壳《本草蒙筌》,离枝、丹荔《纲目》,丽枝《纲目拾遗》,火山荔《生草药性备要》,荔枝叶《岭南采药录》,大荔、荔锦、荔果、分相枝、琼珠、福果、甜壳、大八娘、五德子、天垢子、玉暗子、燕胎子、棘索珠、海山仙人、蜂衣仙子《新纲》,大荔核、离枝核、丹荔核《药材学》

地方名 福建:丹枝(泉州);台湾:荔枝肉,荔枝干;四川:枝核;广西:荔仁;其他:荔枝果,丽支,元红,黄离,甘节。

功效 种子(荔枝核):行气散结,祛寒止痛。用于寒疝腹痛,睾丸肿痛;根:消肿止痛。用于胃脘胀痛;假种皮(果肉):益气补血。用于病后体弱,脾虚久泻,血崩;湿疹;叶:外用于贴烂脚。

## 7198017

*Mischocarpus pentapetalus* (Roxb.) Radlk. --- *Mischocarpus fuscescens* Blume

植物名 褐叶柄果木《中国植志》

文献名 柄果木《云南植志》,五瓣柄果木《云南种录》

地方名 云南:铃子果、假荔枝、野荔枝、假龙眼(河口),“董威果”(屏边瑶语)。

功效 根:止咳。用于感冒咳嗽。

## 7198018

*Nephelium chryseum* Blume --- *N. lappaceum* L. var. *topengii* (Merr.) How et Ho

植物名 韶子《中国植志》

药材名 韶子《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 山韶子《桂海虞衡志》,毛荔枝《名实图考》,藤韶子《叶生药》,海南韶子《中国经植志》

地方名 山荔枝(广东、云南);海南:酸古蚁,毛杖,毛条;广西:毛召(陆川);云南:山龙眼(金平),假荔枝、狗骨头(屏边),“姊不蓝牛”(屏边瑶语)。

功效 果实:用于暴痢,心腹冷;果皮:消炎杀菌。用于痢疾,泄泻,口腔炎。外用于洗溃疡。

## 7198019

*Nephelium lappaceum* L.

植物名 红毛丹《中国植志》

文献名 韶子《台湾药植志》

地方名 毛荔枝(广东、广西);台湾:毛龙眼;海南:山荔枝。

功效 根:用于发烧;树皮:用于舌疾患;果实:用

于暴痢,心腹冷气;果皮:用于痢疾。

#### 7198020

*Pometia pinnata* J. R. et G. Forst.

植物名 番龙眼《中国植志》

药材名 番龙眼《台湾药植志》

地方名 台湾:台东龙眼。

功效 根:驱虫,解热;叶、树皮:用于发热,溃疡。

#### 7198021

*Sapindus delavayi* (Franch.) Radlk.

植物名 川滇无患子《中国植志》

药材名 皮哨子《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 菩提子《名实图考》,云南无患子《中国经植志》,康滇无患子《西昌中草药》

地方名 油患子(四川、云南),无患子(四川、云南);四川:皮皂果,皮哨果(会理);云南:菩提珠(曲靖),皮哨子果、云南皮哨子(红河),胰哨子果(蒙自),皮皂子,打冷冷,黑苦辣,苦辣珠,山哨子,苦子,油皂子,肥皂子。

功效 果皮或种子:用于疝气,疥癬。

#### 7198022

*Sapindus mukorossi* Gaertn.

植物名 无患子《中国植志》

药材名 无患子《本草拾遗》、《汇编》

文献名 桓《山海经》,拾栌木《崔豹古今注》,櫟子《多能鄙事》,无患皮《日华子本草》,櫟娄《本草拾遗》,无患树、拾栌鬼木《中华古今注》,木患子、肥珠子、油珠子、菩提子、鬼见愁《纲目》,櫟子肉皮《濒湖集简方》,无患子荚《本草汇言》,黄目树《台湾府志》,无患树蓇《岭南采药录》,木櫟子、木桓、无櫟、櫟《植物名汇》,木患子《本草新注》,油皂子《科技》,木槐子《树分》,圆肥皂、桂圆肥皂《现代实用中药》,猴儿皂《中国药植志》

地方名 洗衫子(江西、湖南、广东),肥皂树(浙江、福建、江西、安徽),圆眼皂荚(浙江、江苏),洗手果、苦患树(广东、广西);陕西:油枣(宝鸡);浙江:桂圆皂树(乐清),皂树,圆眼皂;安徽:野肥珠,圆皂角,山柳树,野肥猪;江西:洗衫子树(定南),肥皂荚(瑞金);福建:龙眼肥猪、肥猪(福州),肥皂(龙岩),肥猪子树,苗美子,肥柴;台湾:黄目子,目浪子,目浪树,延命皮;湖南:洗衣子,退斑膏;广东:木槐根(广州),肥珠祗树(五华),油萝树(兴宁),木眼树(曲江),洗手仔(仁化),洗衫果(韶关),墨驴子;海南:苦子树(琼中、澄迈),木槐树(儋县);广西:苦枝子,苦患木(贵县),木板木(平南),木患蓇(苍梧),苦患子,木患树;四川:川滇无患子,櫟树,黄木子,黄木树,油患子、患子(峨眉山);云南:肥皂果(河口);其他:木葛,油罗树。

功效 果:有小毒。清热除痰,利咽止泻。用于白喉,咽喉炎,扁桃体炎,支气管炎,百日咳,急性胃肠炎。外用用于厚皮癣,小儿疳积;根:清热解毒,化痰散瘀。用于感冒高热,咳嗽,哮喘,白带,毒蛇咬伤;树皮:用于白喉,疥癬,疳疮;叶:外用用于蛇伤。

#### 7198023

*Sapindus rarak* DC.

植物名 毛瓣无患子《中国植志》

药材名 毛瓣无患子《西双版纳傣药志》

地方名 云南:“麻尚”、“买马萨”(西双版纳傣语)。

功效 果皮、叶:用于痢疾,咽喉痛,过敏性湿疹,尿频,尿痛,血尿。

#### 7198024

*Sapindus tomentosus* Kurz

植物名 绒毛无患子《中国植志》

药材名 星丹菩提《名实图考》、《云南种录》

文献名 茸毛无患子《高植图鉴》

功效 种子:作菩提子用;果:用于堕胎。

#### 7198025

*Xanthoceras sorbifolia* Bunge

植物名 文冠果《中国植志》

药材名 文冠果《救荒本草》、《汇编》

文献名 文冠花、文官果《救荒本草》,文光果《广群芳谱》,文冠树《高植图鉴》,文灯果、文官花《华北树木志》,崖木瓜《中国植志》,文冠木、“西拉·森登”(蒙名)《药典》

地方名 温旦革子(东北),木瓜、木瓜籽(华北、西北);内蒙古:“森登”、“新根本道”、“戈他拉音吉木斯”(蒙名);甘肃:龙瓜。

功效 茎、干或枝条的木部:有小毒。祛风湿,消肿止痛,敛干黄水。用于风湿性关节炎,风湿内热,皮肤风湿;果:用于麻风,鼻渊流涕,瘰癧疥疮,风寒湿痹等。

### 7198a 七叶树科 Hippocastanaceae

#### 7198a01

*Aesculus chinensis* Bunge

植物名 七叶树《纲目拾遗》、《中国植志》

药材名 娑罗子《纲目》、《药典》

文献名 莎婆子《百草镜》,武吉《杨春涯经验方》,娑罗树《留青日札》,娑罗果《名实图考》,七叶枫叶、猴板栗《树分》

地方名 梭罗树(河北、河南、山西),杪罗树(陕西、河南);北京:天师栗;陕西:索罗果,梭罗子;江苏:开心果(镇江、无锡、宜兴),苏罗子;河南:杪罗果;云南:“丕邹”(楚雄彝语),七叶莲。

功效 种子:理气宽中,和胃止痛。用于胸腹胀闷,胃脘疼痛。

#### 7198a02

*Aesculus chinensis* Bunge var. *chekiangensis* (Hu et Fang) Fang --- *A. chekiangensis* Hu et Fang

植物名 浙江七叶树《中国植志》

药材名 娑罗子《药典》

地方名 浙江:浙江天师栗。

功效 种子:理气宽中,和胃止痛。用于胸腹胀闷,胃脘疼痛。

#### 7198a03

*Aesculus hippocastanum* L.

植物名 欧洲七叶树《中国植志》

药材名 马栗《中草药学》

文献名 欧七叶树《中草药学》, 马栗树《汇编》

功效 花、果实、叶、树皮: 用于血液循环障碍, 胃病, 风湿痛; 种子: 用于痔疮, 子宫出血, 骨折等。

备考 原产阿尔巴尼亚、希腊。我国有引种栽培。果实中含的皂甙, 在临床上广泛用作增强静脉和毛细血管抵抗力的药物, 并有较好的抗炎作用。

#### 7198a04

*Aesculus wangii* Hu

植物名 云南七叶树《中国植志》

药材名 云南娑罗子(拟)

文献名 水茄子《元江哈尼族药》

地方名 贵州: 阴阳果; 云南: “阿克帮杯”(元江哈尼语)。

功效 果: 理气宽中, 利湿消肿, 杀虫。用于蛔积, 痢疾, 腹痛, 浮肿。

#### 7198a05

*Aesculus wilsonii* Rehd.

植物名 天师栗《益州方物记》、《中国植志》

药材名 娑罗子《纲目》、《药典》

文献名 娑罗果《纲目》, 七叶树《留青日札》, 猴板栗《树分》

地方名 开心果(湖北、江苏、四川), 梭罗子(江苏、四川); 江苏: 苏噜子; 河南: 梭罗树, 苏罗子; 湖北: 梭罗果, 梭罗树、沙罗子(巴东、均县), 阴阳果(武当山); 贵州: 马孢子。

功效 种子: 理气宽中, 和胃止痛。用于胸腹胀闷, 胃脘疼痛。

### 7198b 钟萼木科 Bretschneideraceae

#### 7198b01

*Bretschneidera sinensis* Hemsl.

植物名 伯乐树《中国植志》

药材名 钟萼木《汇编》

文献名 南华木《广西植志》, 山桃树《中药大辞典》

地方名 江西: 冬桃(遂川)。

功效 树皮: 祛风活血。用于筋骨痛。

### 7200 槭树科 Aceraceae

#### 7200001

*Acer barbinerve* Maxim.

植物名 髭脉槭《中国植志》

药材名 簇毛槭《长白山植志》

文献名 辽吉槭树《树分》, 毛脉槭《中国经植志》

功效 枝、叶: 祛风除湿, 活血逐瘀。用于风湿骨痛, 骨折, 跌打扭伤。

#### 7200002

*Acer bicolor* F. Chun

植物名 两色槭《中国植志》

药材名 两色槭《广西药园药录》

功效 根: 祛风除湿。

#### 7200003

*Acer bicolor* F. Chun var. *serrulatum* (Metz.) Fang

植物名 圆齿两色槭《中国植志》

药材名 圆齿两色槭《广西药园药录》

功效 根: 祛风除湿。

#### 7200003a

*Acer cinnamomifolium* Hayata

植物名 樟叶槭《新华本草纲要》

文献名 桂叶槭《经植手册》

功效 根: 用于祛风湿。

#### 7200004

*Acer davidii* Franch.

植物名 青榨槭《中国植志》

药材名 青榨槭《湖南药物志》

文献名 青虾蟆《树分》, 青蛤蟆、青皮槭《广西植志》, 大卫槭《峨眉植物图志》, 鸡脚手、五龙皮、茶条槭《彝药志》

地方名 青皮槭(安徽、河南、云南); 陕西: 青蛙树; 湖北: 青壳皮, 青楂子树(神农架); 湖南: 光陈子, 飞故子; 四川: 青娃皮, 青蛙舌树, 青岩刷子, 青渣子; 云南: 千层皮, “日药资”(楚雄彝语)。

功效 根皮、树皮: 消炎, 止痛, 止血。用于风湿腰痛, 骨折; 花: 用于结膜炎, 小儿消化不良。

#### 7200005

*Acer elegantulum* Fang et P. L. Chiu

植物名 秀丽槭《中国植志》

药材名 秀丽槭《浙江药植志》

地方名 浙江: 五角枫(临安)。

功效 根及根皮: 用于关节疼痛, 骨折。

#### 7200006

*Acer fabri* Hance

植物名 罗浮槭《中国植志》

药材名 蝴蝶果《汇编》

文献名 红翅槭《植分学报》, 费伯槭《广西药录》

地方名 广东: 红槭; 广西: 蝴蝶草(龙胜、三江), 单双蛾(龙胜), 蜻蜓翅(三江), 红蝴蝶(全州)。

功效 果实: 清热, 利咽。用于声音嘶哑, 咽喉炎, 扁桃腺炎, 肺结核。

#### 7200007

*Acer ginnala* Maxim.

植物名 茶条槭《中国植志》

药材名 茶条槭《汇编》

文献名 华北茶条槭《植分学报》, 枫树《高植图鉴》, 北茶条《华北树木志》

地方名 茶条(吉林、河南、青海、安徽); 吉林: 茶条子, 茶条芽; 辽宁: 茶枝子, 茶叶枝, 山茶叶树; 宁夏: 麻良子(六盘山); 江苏: 青桑头(溧阳), 女儿红(句容), 樟芽、桑条(吴县), 桑芽, 马尿随; 山东: 涩木(昆崙山、崂山); 河南: 稀椒叶; 其他: 茶条木, 茶条树。

功效 叶、芽: 清热明目。用于肝热目赤昏花。

#### 7200008

*Acer ginnala* Maxim. subsp. *theiferum* (Fang) Fang ---

*A. theiferum* Fang



植物名 苦茶槭《中国植志》

药材名 桑芽茶《汇编》

文献名 茶条槭《浙江药植志》, 茶条《中药大辞典》

地方名 桑芽(江苏、浙江); 江苏: 女儿红, 青桑头; 浙江: 青桑(临安), 鸡骨枫(鄞县); 河南: 苦津茶, 银桑叶。

功效 幼芽: 散风热, 清头目。用于风热头痛。

#### 7200009

*Acer grosseri* Pax var. *hersii* (Rehd.) Rehd. --- *A. hersii* Rehd.

植物名 长裂葛萝槭《中国植志》

文献名 葛氏槭《湖南药物志》

地方名 湖南: 飞蛾楠, 蝴蝶树, 飞蛾树, 鸡火树。

功效 嫩枝、果实: 消火镇咳。用于久咳, 咳嗽, 蛾口疮。

#### 7200010

*Acer henryi* Pax

植物名 建始槭《中国植志》

药材名 五角枫根《浙江天目药志》

文献名 亨利槭《经植手册》, 亨氏槭《华北经植志要》, 三叶槭《江苏南部种册》

地方名 浙江: 三叶鸭枫(临安); 湖北: 鸡爪子树(神农架)。

功效 根: 祛风湿, 止痛。用于关节疼痛。

#### 7200011

*Acer kweilinense* Fang et Fang f.

植物名 桂林槭《中国植志》

药材名 桂林槭《广西药录》

地方名 广西: 三角枫(龙胜)。

功效 果实: 用于咽喉炎。

#### 7200012

*Acer mono* Maxim. --- *A. pictum* Thunb. --- *A. pictum* var. *mono* (Maxim.) Maxim. et Franch.

植物名 色木槭《中国植志》

药材名 五龙皮《汇编》

文献名 水色树《树分》, 五角槭《江苏南部种册》, 地锦槭《高植图鉴》, 色树皮、色树叶《中国经植志》

地方名 色木、色树(辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北), 五角枫(江苏、山西、山东、甘肃); 陕西: 山霸王; 山东: 涩树(昆崙山、蒙山、平邑), 元宝树(崂山、牙山), 枫树(五莲); 湖北: 山茶枫(神农架)。

功效 枝、叶: 祛风除湿, 活血逐瘀。用于风湿骨疼, 骨折, 跌打扭伤。

#### 7200013

*Acer oblongum* Wall. ex DC.

植物名 飞蛾槭《中国植志》

药材名 飞蛾槭《广西药录》

文献名 飞蛾树《树分》

地方名 广西: 蝴蝶草(兴安)。

功效 果实: 清热利咽。用于声音嘶哑。

#### 7200014

*Acer oliverianum* Pax --- *A. campbellii* subsp.

*oliverianum* (Pax) E. Murr.

植物名 五裂槭《中国植志》

药材名 五裂槭《贵州药录》

功效 枝、叶: 清热解毒, 理气止痛。用于腹痛, 背重, 痢疾。

#### 7200015

*Acer palmatum* Thunb.

植物名 鸡爪槭《中国植志》

药材名 鸡爪槭《汇编》

文献名 鸡爪枫《山东树木志》

地方名 浙江: 小叶五角鸡枫(临安); 江西: 五叶槭。

功效 枝叶: 止痛, 解毒。用于腹痛, 外用于痈疖肿毒。

#### 7200016

*Acer paxii* Franch.

植物名 金沙槭《中国植志》

药材名 树三角枫《西昌中草药》

文献名 川滇三角枫《树分》, 川滇三角槭《经植手册》, 金河槭《植分学报》, 金江槭《高植图鉴》

功效 根皮、枝叶: 有小毒。祛风除湿, 舒筋活血, 止痛。用于风湿腰痛, 接骨, 皮肤痒疹, 疝气。

#### 7200017

*Acer sinense* Pax

植物名 中华槭《中国植志》

药材名 五角枫根《浙江天目药志》

文献名 丫角树《树分》, 华槭树《经植手册》, 华槭《植分学报》, 五裂槭《山东树木志》

地方名 湖北: 五角风(神农架); 贵州: 五角枫。

功效 根或根皮: 用于关节疼痛, 骨折。

#### 7200018

*Acer sinopurpurascens* Cheng

植物名 天目槭《中国植志》

文献名 五角枫根《浙江天目药志》

地方名 浙江: 小叶鸭脚柴(临安)。

功效 根: 用于关节疼痛。外用于扭伤。

#### 7200019

*Acer sycopseoides* Chun

植物名 角叶槭《中国植志》

药材名 角叶槭《广西药园药录》

文献名 丝栗槭《植分学报》

功效 根: 祛风除湿。

#### 7200020

*Acer truncatum* Bunge

植物名 元宝槭《中国植志》

药材名 元宝槭《汇编》

文献名 槭(许慎《说文》), 五脚树《树分》, 平基槭《经植手册》, 华北五角枫《华北树木志》

地方名 五角枫(山东、陕西); 河北: 元宝树; 山东: 色树(昆崙山), 五角槭; 河南: 枫千树。

功效 根皮: 祛风除湿。用于腰背痛。

#### 7200021

*Acer tutcheri* Duthie

植物名 岭南槭《中国植志》  
 药材名 岭南槭《广西药录》  
 文献名 岭南槭树《树分》  
 功效 果实;清热。

## 7201 清风藤科 Sabiaceae

### 7201001

*Meliosma cuneifolia* Franch.

植物名 泡花树《中国植志》  
 药材名 泡花树《汇编》  
 文献名 黑果木、龙须木《树分》, {清风藤}《华北树木志》  
 地方名 陕西:灵寿茨,降龙木;甘肃:山麻杆(文县);四川:黑黑木,山漆槁(峨眉)。  
 功效 根皮;利水,解毒。用于水肿,腹水。外用于痈疽肿毒,毒蛇咬伤。

### 7201002

*Meliosma cuneifolia* Franch. var. *glabriuscula* Cufod.

植物名 光叶泡花树《中国植志》  
 药材名 光叶泡花树《神农架药录》  
 地方名 湖北:见风干(保康、神农架)。  
 功效 根皮;利水,解毒。用于水肿,腹水。外用于痈疽肿毒,毒蛇咬伤。

### 7201003

*Meliosma fordii* Hemsl.

植物名 香皮树《中国植志》  
 文献名 霍氏泡花树《广西药录》,罗浮泡花树《广西植录》,钝叶泡花树《中国植志》  
 地方名 广东:过家见,过假麻;广西:亚婆膏(博白)。  
 功效 茎皮、叶;滑肠。用于便秘。

### 7201004

*Meliosma rigida* Sieb. et Zucc.

植物名 笔罗子《中国植志》  
 药材名 笔罗子《汇编》  
 文献名 野枇杷《树分》  
 地方名 浙江:粗糠柴;湖南:山枇杷,毛鼻良;广东:花木香。

功效 根皮;解毒,利水,消肿。用于水肿腹胀,无名肿毒,蛇咬伤;果实:用于感冒咳嗽。

### 7201005

*Meliosma thorelii* Lecomte

植物名 山榭叶泡花树《中国植志》  
 药材名 山榭叶泡花树《贵州药录》  
 地方名 海南:罗壳木。  
 功效 根、叶、枝;祛风除湿,消肿止痛。用于风湿骨痛,跌打劳伤,腰膝疼痛。

### 7201006

*Meliosma velutina* Rehd. et Wils. --- *M. costata* Cufod.

植物名 毛泡花树《中国植志》  
 文献名 显脉泡花树《广西药录》  
 地方名 广西:山枇杷(平南)。

功效 根、叶;用于咳嗽。

### 7201007

*Sabia campanulata* Wall. et Roxb. ssp. *ritchiae* Y. F. Wu --- *S. ritchiae* Rehd. et Wils. --- *S. gaultheriifolia* Stapf ex L. Chen

植物名 鄂西清风藤《中国植志》  
 文献名 白珠清风藤《神农架药录》  
 地方名 湖北:女儿藤(神农架)。  
 功效 茎藤及叶;祛风通络,消肿止痛。

### 7201008

*Sabia dielsii* Levl.

植物名 平伐清风藤《中国植志》  
 药材名 平伐清风藤《广西药录》  
 功效 根;用于肝炎。

### 7201009

*Sabia discolor* Dunn

植物名 灰背清风藤《中国植志》  
 文献名 防己叶清风藤《广西植录》,白背清风藤《贵州药录》  
 地方名 广西:大发散(金秀),广藤根(昭平);贵州:叶上果。  
 功效 根、茎;祛风除湿,止痛消炎。用于风湿骨痛,跌打劳伤,肝炎。

### 7201010

*Sabia fasciculata* Lecomte et L. Chen

植物名 簇花清风藤《中国植志》  
 药材名 小发散《汇编》  
 地方名 广西:散风藤(大瑶山)。  
 功效 全株;祛风除湿,散瘀消肿。用于跌打损伤,风湿痹痛,产后恶露不尽,肾炎水肿。

### 7201011

*Sabia japonica* Maxim.

植物名 清风藤《中国植志》  
 药材名 清风藤《安徽中草药》  
 文献名 云石《高植图鉴》  
 地方名 青风藤(福建、湖北);浙江:过山龙(宁波、温州),牢钩刺(龙泉),一个刺二个头(衢县);福建:双嘴棘、臀风药(宁化);湖南:金金藤,一刺两咀;广西:一口两个针,两口针,一口两咀,一嘴两刺,一刺两口,双嘴刺,金钩下海,双肾藤。  
 功效 藤茎;祛风湿,利小便。用于风湿痹痛,鹤膝风,水肿,脚气。

### 7201012

*Sabia limoniacea* Wall.

植物名 柠檬清风藤《中国植志》  
 地方名 广西:大散风藤。  
 功效 茎;用于风湿病,产后瘀血。

### 7201013

*Sabia limoniacea* Wall. var. *artisioides* (Hook. et Arn.) L. Chen

植物名 毛萼清风藤《高植图鉴补编》  
 药材名 毛萼清风藤《广西药录》

地方名 广西:黑风藤(融水),大发散(金秀)。  
功效 根、茎:用于产后瘀血,风湿痹痛。

**7201014**

*Sabia parviflora* Wall. ex Roxb.

植物名 小花清风藤《中国植志》

药材名 小花清风藤《民族药志》

功效 枝、叶:用于黄疸型传染性肝炎,刀伤出血,消炎等;根:消肿止痛。用于跌打损伤。

**7201015**

*Sabia puberula* Rehd. et Wils.

植物名 柔毛清风藤《湖北植志》

药材名 柔毛清风藤《神农架药录》

地方名 湖北:黑豆瓣菜(神农架)。

功效 藤茎:祛风胜湿,通络。

**7201016**

*Sabia schumanniana* Diels

植物名 四川清风藤《中国植志》

药材名 钻石风《江西草药》

文献名 [青木香]《高植图鉴》

地方名 女儿藤(湖北、四川);江西:铁牛钻石(吉安),石钻子,清风藤;湖北:和尚叶,林林树,黑豆瓣菜(保康),豆瓣菜(神农架);四川:钻石藤,青风藤,清木香。

功效 根:祛痰,止咳,平喘。用于慢性支气管炎。

**7201017**

*Sabia swinhoei* Hemsl. ex Forb. et Hemsl.

植物名 尖叶清风藤《中国植志》

药材名 尖叶清风藤《广西药录》

文献名 台湾清风藤《广西植录》

功效 根、茎:祛风止痛。用于风湿痹痛,跌打损伤。

**7201018**

*Sabia yunnanensis* Franch.

植物名 云南清风藤《中国植志》

药材名 羊肌藤《汇编》

文献名 滇清风藤《科种》

地方名 云南:风藤草,羊肌藤,鸡舌头草,老鼠吹箫(昆明)。

功效 根皮、叶:有小毒,祛风湿,止痛。用于风湿瘫痪,风湿腰痛,胃痛,皮肤疮毒,毒蛇咬伤。

**7201019**

*Sabia yunnanensis* Franch. ssp. *latifolia* (Rehd. et Wils.) Y.F. Wu --- *S. latifolia* Rehd. et Wils.

植物名 阔叶清风藤《中国植志》

文献名 毛清风藤《树分》,宽叶清风藤《贵州药录》

地方名 四川:清藤菜(金阳)。

功效 根、枝:祛风除湿,止痛消炎。用于风湿骨痛,跌打劳伤,肝炎。

**7204 省沽油科 Staphyleaceae****7204001**

*Euscaphis japonica* (Thunb.) Dippel.

植物名 野鸦椿《中国植志》

药材名 野鸦椿《名实图考》、《汇编》

文献名 栲《诗经》,柅《说文》,木鱼柴、野山漆《中药大辞典》

地方名 红梁、枫桉树(华中),鸡眼椒(陕西、四川),鸡眼睛(四川、江苏),开口椒(广西、福建),鸡矢柴(湖南、浙江),鸭椿子树(湖南、江西),雨伞树(湖南、浙江),红果栲(湖南、安徽),鸟腿花(台湾、湖南、福建),夜夜椿(湖南、浙江);江苏:鸭鸭椿;浙江:鸟眼睛(临安),花柴(宁波),鸡屁股(天台),红三七(乐清),鸡屁股柴(龙泉);安徽:鸡矢头,秤杆树,鸦雀树;江西:野鸭椿;福建:鸡屁股花,鸡屁股子(宁化、上杭),野屁股花(永安、大田),鸡脸花;湖北:山椿,鸡火子树,岩油子,娘仔树(神农架);湖南:秤杆木(溆浦、凤凰),淡椿子、狗椿子(衡山),乌打腊(新邵),枸椿子(衡山),鸟儿椿(常德);广西:头狗椒(北流),百日红(苍梧),铁将军(平南),大郎伞(藤县),鸡肾树(临桂),鸡肾果,酒药树,黄箭木(玉林);四川:土亲家母,荷包花,淡亲家母;贵州:花臭木(剑河),鸡嗓子花(湄潭);云南:小山辣子(镇雄),山海椒(威信),鸡屁股果(昭通)。

功效 根:解表,清热,利湿;用于感冒头痛,痢疾,肠炎;果:祛风散寒,行气止痛。用于月经不调,疝痛,胃痛。

**7204002**

*Staphylea burnaldia* DC.

植物名 省沽油《中国植志》

药材名 省沽油《救荒本草》、《汇编》

文献名 珍珠花《救荒本草》

地方名 辽宁:水条(本溪);浙江:双蝴蝶(临安),马铃柴(余姚)。

功效 果实:润肺止咳;根皮:行瘀止血。用于产后瘀血不净。

**7204003**

*Staphylea holocarpa* Hemsl.

植物名 膀胱果《中国植志》

药材名 膀胱果《峨眉药植资源》

文献名 大果省沽油《峨眉植物图志》

地方名 陕西:白凉子(太白山),泡泡果(佛坪、丹凤),铃子树(合阳);河南:凉子树(伏牛山);湖北:鸡合子树(神农架)。

功效 根、果:祛痰,镇咳。

**7204004**

*Tapiscia sinensis* Oliv.

植物名 瘿椒树《中国植志》

文献名 银鹊树《江西药录》,银雀树[误译名]《中国植志》

地方名 湖北:瘿漆树;湖南:皮巴风;广东:丹树;广西:豆腐渣,泡花。

功效 叶:用于洗漆疮。

**7204005**

*Turpinia arguta* (Lindl.) Seem.

植物名 锐尖山香圆《中国植志》

药材名 两指剑(广东)、《汇编》

文献名 山香圆《高植图鉴》

地方名 湖南:千锤打;广东:千打锤(新丰),七寸钉(佛冈);广西:五寸铁树,尖树,黄柿,五寸刀,大驳骨(融水),小熊胆木(金秀)。

功效 根、叶:活血散瘀,消肿止痛。用于跌打损伤,脾脏肿大。

#### 7204006

*Turpinia pomifera* (Roxb.) DC. --- *T. nepalensis* Wall.

植物名 大果山香圆《中国植志》。

功效 全株:祛风活血,通经络。

### 7205 漆树科 Anacardiaceae

#### 7205001

*Anacardium occidentale* L.

植物名 腰果《中国植志》

药材名 腰果《汇编》

文献名 都咸树《南方草木状》,都咸子《本草拾遗》,鸡腰果《汇编》,心果树《中药大辞典》

地方名 台湾:榧如实,介寿果;云南:榧如树。

功效 树皮:有毒。截疟,杀虫。用于疟疾;果实:用于咳逆,心烦,口渴;树胶脂:外用于麻疯,多年溃疡,鸡眼;花托:利尿;果壳油:用于牛皮癣,铜钱癣,香港脚

#### 7205002

*Bouea macrophylla* Griff.

植物名 皮大利《台湾药植志》

功效 叶汁:用于鹅口疮。

#### 7205003

*Choerospondias axillaris* (Roxb.) Burtt et Hill --- *Spondias axillaris* Roxb.

植物名 南酸枣《中国植志》

药材名 广枣《药典》

文献名 人面子《南方草木状》,建枣《闽南书志》,酸醋树、羊矢子、山桉果《植分学报》,广酸枣《中药材》

地方名 [酸枣](四川、浙江、云南、贵州、广西),五眼果(云南、贵州、广西、广东),五眼果(四川、广西、福建、云南、广东),山枣(云南、广西、广东、湖北),山枣树(华南),鼻子果、鼻涕果(云南、广西),酸枣树(福建、广西);内蒙古:“吉如罕·苟沙”(蒙名),冬东子;浙江:五眼铃子(文成);江西:山枣皮;福建:鱼岭树(莆田),流鼻枣(永安、龙岩),[枣子],[枣];广东:连华、反眼子(阳春),连麻树、鼻涕树(惠阳),连麻果,花心木,棉麻树,啃不死,啃死仔,厚皮树,棉麻木;广西:山枣木(平南),鱼石兰,小苦楝木(凌云),四眼果,酸枣木、反眼子木(陆川);贵州:酸枣子;云南:货郎果,五眼果树;西藏:“拧消夏”(藏名)。

功效 果实:行气活血,养心,安神。用于气滞血瘀,胸痹作痛,心悸气短,心神不安;树皮:解毒,收敛止痛,止血。外用于烧烫伤,外伤出血,牛皮癣。

备考 《中药材》(1985)称:过去有些藏医误作川楝子入药,应注意鉴别。

#### 7205004

*Cotinus coggygria* Scop. var. *cinerea* Engl.

植物名 红叶《中国植志》

药材名 黄栌《本草拾遗》、《汇编》

文献名 黄道栌、黄栌材《树分》,栌木、经植手册,灰毛黄栌《植物学报》,红叶黄栌《山东树木志》

地方名 山东:黄龙头(益都),黄栌台(淄博);湖北:栌木树、木梭栲、摩林栲(巴东),六木树(神农架);四川:黄溜子。

功效 根、树枝:清热解毒,散瘀止痛。用于急性黄疸型肝炎,慢性肝炎(迁延性肝炎),无黄疸型肝炎,麻疹不出;叶:用于丹毒,漆疮。

备考 过去有些文献曾将本种学名误订为原变种(该种产匈牙利和捷克,我国不产)。

#### 7205005

*Cotinus coggygria* Scop. var. *glaucohylla* C. Y. Wu

植物名 粉背黄栌《中国植志》

地方名 黄栌柴(河南、陕西);陕西:栌木树(西乡)。

功效 枝、叶:消炎,清湿热。

#### 7205006

*Cotinus coggygria* Scop. var. *pubescens* Engl.

植物名 毛黄栌《中国植志》

药材名 毛黄栌《汇编》

文献名 栌木《植物名汇》,毛叶黄栌《中药大辞典》,柔毛黄栌《植物学报》,黄栌《陕西中草药》

地方名 陕西:黄栌木,岩棕树、卷子树(镇坪);浙江:彭皮连、金告碑木(临安);安徽:黄栌;湖北:栌木棵子、黄栌根(神农架);贵州:红叶,月亮柴。

功效 根皮:用于妇女产后劳损;根:祛风毒,活血散瘀。用于皮肤瘙痒症,跌打损伤,骨折,虚肿。

#### 7205007

*Dobinea delavayi* (Baill.) Baill.

植物名 羊角天麻《中国植志》

药材名 羊角天麻(云南)

文献名 多檳碱《中药大辞典》

地方名 四川:九股牛、土赤芍、称托根(西昌);云南:[绿天麻],九子不离母(鸡足山),大九股牛(昆明),大接骨。

功效 根:清热解毒,止痛,止咳。用于肺热咳嗽,肋膜炎,乳腺炎,疔疮,肿毒。

#### 7205008

*Dracontomelon duperreanum* Pierre --- *D. sinense* Grapf

植物名 人面子《南方草木状》、《中国植志》

药材名 人面子《汇编》

文献名 人面树《树分》

地方名 人面果(广东、广西);广东:仁面树叶,银樟;广西:仁面(宁明);云南:银莲果(河口)。

功效 果:健脾消食,生津止渴。用于消化不良,食欲不振,热病口渴;叶:外用于烂疮,褥疮;根皮:散乳痛;核:用于惊风。

#### 7205009

*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. --- *L. grandis*

(Dennst.) Engl.

植物名 厚皮树《中国植志》

药材名 厚皮树皮《汇编》

地方名 海南:十八拉文公,牛纠树,(万年青),胶皮麻,蜜中,牛脚树,蛇皮果,厚皮麻;广西:喃木、胶皮树、牛瘦木(北海)。

功效 树皮:解毒。用于河豚鱼中毒,木薯中毒,地菠萝中毒。

备考 万年青应为百合科草本植物,非本品。

#### 7205010

*Mangifera indica* L.

植物名 芒果《中国植志》

药材名 芒果《岭南采药录》、《汇编》

文献名 庵罗果《开宝本草》,摩罗迦果《纲目》,香盖《大明一统志》,莽果、密望子《肇庆府志》,抹猛果《云南志》,望果、蜜望《纲目拾遗》,沙果梨、莽果《名实图考》,穰《岭南采药录》,加果《本草新注》,芒果《树分》,糠果《植物学大辞典》

地方名 横仔(台湾、福建);河北:毛角(张家口);内蒙古:藏毛角,“阿哲”(藏名);福建:番尝(福州);台湾:番蒜,穰子;广东:仙桃,蜜罗子;广西:天桃木,芒果核,芒果核;云南:“麻芒”、“马蒙”(西双版纳傣语);其他:扁桃。

功效 果、果核:止咳,健胃,行气。用于咳嗽,食欲不振,睾丸炎,坏血病;叶:止痒。用于湿疹瘙痒;树皮:用于伤暑,身热;花:作茶饮。用于膀胱炎。

#### 7205011

*Mangifera persiciformis* C. Y. Wu et T. L. Ming

植物名 扁桃《中国植志》

药材名 扁桃《广西药录》

地方名 广西:“嘎嘣”(壮语),酸果,天桃木。

功效 叶:外用于湿疹;果实、种仁:用于咳嗽,食欲不振,疝气。

#### 7205012

*Melanorrhoea usitata* Wall.

植物名 缅甸漆《台湾药植志》

功效 漆:驱虫。用于麻疯病。

#### 7205013

*Pegia nitida* Colobr.

植物名 藤漆《中国植志》

药材名 泌脂藤《西双版纳傣药志》

地方名 云南:“檬嘿”(傣语)。

功效 藤茎:用于风湿关节痛,重症肌无力。

#### 7205014

*Pegia sarmentosa* (Lect.) Hand.-Mazz. ---

*Phlebociton sinense* Diels

植物名 利黄藤《中国植志》

药材名 刺黄藤《广西药录》

文献名 飞天蜈蚣《汇编》

地方名 广西:大飞天蜈蚣,红根叶(上林),退黄藤,泌脂漆,脉果漆,酸脚草,追风藤(凌云),肥力漆(马山)。

功效 茎、叶:清热利湿,解毒消肿。用于黄疸型肝炎,风湿痹痛,神经性头痛,腹痛,疮疡溃烂,毒蛇咬伤,湿疹。

#### 7205015

*Pistacia chinensis* Bunge

植物名 黄连木《名实图考》、《中国植志》

药材名 黄练芽《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 黄楝树《救荒本草》,凉茶树《八闽通志》,黄楝头、蓝香《食物考》,黄楝头、黄连头、回味《物理小识》,胜铁力木《岭南琐记》,楷木《淮南草木谱》,黄练芽《名实图考》,《黄连》《元和县志》,苦楝子树、黄银树、山庵子树《植物名汇》,孔木、孔菜《说蒿》,黄儿茶、黄连茶《树分》

地方名 [茶树](云南、陕西),黄鹌菜(浙江、湖南),石连(湖南、安徽),黄连树(四川、云南),黄槿芽树(湖北、四川);陕西:黄果树(宁强),药树;甘肃:药木,药木子(武都);山东:茶棵子(五莲),黄连丝(淄博、牙山);浙江:香柏莲(临安),淡茶(平阳),香连(乐清),黄华,黄鹌头,香梨铁;台湾:鸡冠木,烂心木,洋杨;河南:楷树;湖北:木蓼树,田苗树,黄连香,黄林子,红梗树,黄芽子树(神农架),甜苗(麻城);湖南:木黄连,黄楝芽;广东:白刺(崖县);广西:黄梨木,石山漆,倒鳞木(昭平);四川:黄芩树(忠县),岩拐角;云南:鸡冠果。

功效 叶芽:清热,止渴,解毒。用于暑热口渴,痧症,痢疾,咽喉肿痛,口舌糜烂;树皮、叶:有小毒。清热解毒。用于痢疾,皮肤瘙痒,痒疹。

#### 7205016

*Pistacia lentiscus* L.

植物名 粘胶乳香树《汇编》

药材名 熏陆香《别录》、《汇编》

文献名 马尾香《海药本草》,天泽香、摩勒香、多伽罗香《纲目》,乳香、乳香树、滴乳、滴乳珠、牛奶乳珠、乳珠、原乳、乳香米、乳香末、豆乳香、统乳香《药材学》,洋乳香《中药志》,薰陆香树《药学名词合编》

功效 油胶树脂:镇痛,消瘀血。外用于龋齿痛。

#### 7205017

*Pistacia terebinthus* L.

植物名 苣欐香树(拟)

药材名 苣欐香《纲目》、《台湾药植志》

文献名 白苣欐、黑苣欐《纲目》,洋乳香《中药志》,薰陆树《植物名汇》

功效 油胶树脂:用于面皴肝,固齿,祛口臭。

#### 7205018

*Pistacia vera* L.

植物名 阿月浑子《中国植志》

药材名 阿月浑子《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 胡榛子《本草拾遗》,无名本(徐表《南州记》),无名子、无名木皮《海药本草》,必思答《饮膳正要》,苾思檀《明代药名》《新注纲目》,开心果《中药通报》

功效 种子:温肾,暖脾。用于肾虚腰冷,阳痿,脾虚冷痢;树皮:用于肾阴萎弱,囊下湿疹。

## 7205019

*Pistacia weinmannifolia* J. Poisson ex Franch.

植物名 清香木《中国植志》

药材名 紫油木《汇编》

文献名 昆明乌木《名实图考》，四川楷木《树分》，香树叶于《云南的造林树》

地方名 细叶楷木(四川、云南)；广西：假椿(贵县)，花梨、火斑(龙州)；云南：清香树(思茅、东川)，对节皮(昆明、文山)，香叶，香叶树，紫叶，青香木，紫柚木，“梅江”(傣语)。

功效 叶、树皮、嫩叶尖：清热解毒，收敛止血。用于痢疾，肠炎，腹泻，外伤出血，疮疡，湿疹；树：用于肺结核，跌打损伤，骨折。

## 7205020

*Rhus chinensis* Mill. --- *R. semialata* var. *osbeckii* DC.

植物名 盐肤木《正字通》、《中国植志》

药材名 五倍子(虫瘿)《纲目》、《药典》

文献名 楸木《山海经》，盐肤子根《日华子本草》，叛奴盐、酸桶、酢桶《本草拾遗》，盐肤树、盐肤子、盐肤树白皮、盐肤根白皮《开宝本草》，肤木《图经》，木盐《通志》，天盐《灵草篇》，盐肤子、盐梅子、盐楮子、五楸、盐肤子木《纲目》，盐霜柏《生草药性备要》，夫烟树《田居蚕室录》，枯盐其《宁乡县志》，文蛤根、五倍根、泡木根、耳八蜈蚣《分类草药性》，文蛤、法酸、川文蛤、五去风、五楮子、百虫仓《新纲》，木附子《现代实用中药》，角倍《药典》，盐酸木《汇编》

地方名 盐酸白(广东、福建)，肤杨树(湖北、湖南)，角楮、楮子、百药煎、羊子树(河南、湖南、山西)，倍子树(广西、浙江)，盐树(东北、福建、广东)，破凉伞(湖南、浙江)，盐子树(安徽、江西)；陕西：盐肤木根皮、肤杨树(石泉、紫阳)，美连树(平利、白河)，地蜈蚣、铺地蜈蚣、泡木树(凤县)，见石穿，花倍(旬阳)；山东：土楮树(昆嵛山)，臭楮子(海阳)，山楮子(烟台、崂山)，酸酱头、漆巴拉；江苏：柘柴树、柘柴、柘菜树、独角树(连云港)，猪枣楮(江浦)；浙江：肤盐桃(浦江、武义、开化)，潮涨盐(温州、瑞安、乐清)，乌烟桃(云和、龙泉、遂昌)，落梅漆(临安)，乌酸桃，盐酸根，龙梅风(天目山)，盐霜柴(永嘉)，五叶桃(永嘉、乐清、洞头)，红叶桃，咸水鹇(乐清)，乌烟头、山乌烟、猴头盐(文成)，老鸦盐(平阳)，盐树根；安徽：猪草树，野漆树，猪草树，福越尖；江西：山盐木，盐树苗，盐桶鬃(南昌)，莲蓬柴(丰城)，敷盐柴，红盐柴，红盐果，倍子柴，野鸡毛，盐冬膨(泰和)；福建：浦连盐(福州、南平、永安、三明、龙岩)，猴盐柴(永安、三明、宁德地区)，老公担盐(漳州、龙海、长泰、漳浦、厦门)，盐糟碎(永定)，老鼠盐、土地公盐(建阳)，铺年盐、盐波菱(南平)，铺地连(福安)，波连田，铺林盐、江南盐、木南盐、铺地盐(闽东)，盐东胖(宁化)，埔盐、咸酸藤(厦门)，斧神盐，蒲盐，盐钱，铺盐钱，天掇兜，盐桑柴，浮萝盐，蒲芦盐，铁凉伞，猴盐，埔成盐，魁盐树，几百件，山木盐，山杜仲，浦涯前，九节鞭，碱酸仔，浦练盐；台湾：山盐青；湖北：肤连树、角倍树(神农架)，川漆树，乌桃叶、乌盐泡(武汉)，迟倍子树(鹤峰)，芙蓉树；

湖南：山盐菁，飞天蜈蚣(衡山)，乌叶树(岳阳)，枯烟箕、藕节树(长沙)，七倍子(大庸)，报母树(安化)，报木树(新宁)，披腊木叶(永兴)，五倍柴(黔阳)，天蜈蚣(常德)；山东：山漆树(始兴)，盐霜树(广宁、四会、德庆、封开、怀集)，盐普双(罗定)，盐风柏(韶关、化州、茂名、阳江、阳春)，埠盐(潮安)，盐仔木(电白)，盐公柏(五华)，杨梅吊(东莞)，盐灰树，盐砒霜；广西：盐公男(合浦、钦县)，假五味子，油盐果，咸酸木(北流)，五倍树(大瑶山、钟山)，土五味(贵县)，盐霜木、盐灰木(陆川)；四川：敷烟树，盐白木；贵州：倍树；云南：柞木树根(文山)，洋松毛根(红河)，扶烟叶、盐霜果(保山)，盐酸果、盐酸树(保山、思茅)，肤烟叶(保山)，肤盐渣树(思茅)，盐碱果，呼烟叶子(盐津)，柞树(西畴)。

功效 寄生虫瘿(五倍子)：敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮。用于肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，盗汗，消渴，便血痔血，外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂；果实(盐肤子)：生津润肺，降火化痰，敛汗，止痢。用于痰嗽，喉痹，黄疸，盗汗，痢疾，顽癣，痈毒，头风白屑；叶(盐肤叶)：化痰止咳，收敛，解毒。用于痰嗽，便血，血痢，盗汗，疮疡；根(盐肤子根)：祛风，化湿，消肿，软坚。用于感冒发热，咳嗽，腹泻，水肿，风湿痹痛，跌打伤肿，乳痈，癰疮，消酒毒；花(盐肤木花)：用于鼻痔，痈毒溃烂；树白皮(盐肤树白皮)：用于血痢，肿毒，疥疮；根白皮(盐肤根白皮)：祛风湿，散瘀血，清热解毒。用于咳嗽，风湿骨痛，水肿，黄疸，跌打损伤，肿毒疥疮，蛇咬伤。

## 7205021

*Rhus chinensis* Mill. var. *roxburghii* (DC.) Rehd. ---

*Rhus semialata* var. *roxburghii* DC.

植物名 滨盐肤木《中国植志》

药材名 滨盐肤木《汇编》

文献名 盐霜白《岭南采药录》

地方名 福建：山杜仲、盐蒲、盐酸(泉州)，盐冬有、明盐子(宁化)，倍壳樵(清流)，咸敬敬、行更更(明溪)，蒲葫盐、下下盐、暴落盐(大田)，普芦盐(三胆)，蒲连盐(永安)；台湾：山盐菁，埔盐仔，山埔盐，盐东花，埔盐，埔盐片；广东：羊风，咸榄叶，咸霜柏，咸虎柏，盐仔木，盐布根，盐东柏，盐虎泡，盐宝树，盐炭根，滨盐肤，杨梅吊；广西：沙盐木(藤县)，盐霜柏(贵县)，盐酸木(平南)，五倍子(德保)，咸盐木(平南、玉林)，盐肤木(武鸣、苍梧)，抱茎木，土五倍子树；云南：羊松毛，盐酸果，海滨盐肤木，山漆树，野漆树，盐酸树，女木，五倍柴，枯盐箕，五倍子树。

功效 根：祛风，化湿，消肿，软坚；叶：化痰止咳，收敛，解毒；果实：生津润肺，降火化痰，敛汗，止痢。

## 7205022

*Rhus potaninii* Maxim.

植物名 青肤杨《中国植志》

药材名 肚倍(虫瘿)《药典》，青肤杨根《重庆草药》

文献名 五倍子《药典》，波氏盐肤木《中药志》

地方名 杜倍、倍子(河南、甘肃、云南)，野漆树(四川、甘肃)，楮子树(四川、湖北)，五倍子树(甘肃、陕西、

湖北), 倍子树(陕西、贵州); 河南: 乌倍子; 湖北: 铁麸杨(神农架); 四川: [漆树], 铁楮树, 百虫仓。

功效 虫瘿: 敛肺降火, 涩肠止泻, 敛汗止血, 收湿敛疮。用于肺虚久咳, 肺热痰嗽, 久泻久痢, 盗汗, 消渴, 便血痔血, 外伤出血, 痈肿疮毒, 皮肤湿烂; 根: 用于小儿缩阴症, 九子烂痒。

## 7205023

*Rhus punjabensis* Stewart var. *pilosa* Engl.

植物名 毛叶麸杨《中国植志》

药材名 五倍子〔虫瘿〕(云南)

文献名 毛红麸杨《云南植志》

功效 虫瘿: 敛肺降火, 涩肠止泻, 敛汗止血, 收湿敛疮。

## 7205024

*Rhus punjabensis* Stewart var. *sinica* (Diels) Rehd. et Wils.

植物名 红麸杨《中国植志》

药材名 五倍子《药典》

文献名 铁麸杨《树分》, 肚倍《药典》

地方名 甘肃: 林麸子(文县); 湖北: 旱倍子, 肚倍子, 漆倍子, 狗倍子, 野杨漆, 铁麸杨树(巴东、建始), 清火楸(神农架); 湖南: 莲蓬树(郴县); 四川: [漆树], 漆倍子, 麸杨, 富眼楮, 五倍子树、肚倍(峨眉山); 贵州: 倍子树, 五倍子树。

功效 虫瘿: 敛肺降火, 涩肠止泻, 敛汗止血, 收湿敛疮。用于肺虚久咳, 肺热痰嗽, 久泻久痢, 盗汗, 消渴, 便血痔血, 外伤出血, 痈肿疮毒, 皮肤湿烂。

## 7205025

*Rhus succedanea* L. var. *dumoutieri* (Pierre) Kudo et Matsum

植物名 安南漆《台湾药植志》

功效 下漆: 通经, 驱蛔虫。

## 7205026

*Rhus taishanensis* S.B. Liang

植物名 泰山盐肤木《山东树木志》

药材名 五倍子〔虫瘿〕(山东)

功效 虫瘿: 敛肺降火, 涩肠止泻, 敛汗止血, 收湿敛疮。

## 7205027

*Rhus typhina* L.

植物名 火炬树《华北树木志》

功效 根皮、树皮: 用于局部出血。

## 7205028

*Rhus wilsonii* Hemsl.

植物名 川麸杨(云南)、《中国植志》

功效 根: 祛风, 化湿, 消肿, 软坚; 叶: 化痰止咳, 收敛, 解毒; 花: 用于鼻咽, 痈毒溃烂; 果实: 生津润肺, 降火化痰, 敛汗, 止痢。

## 7205029

*Semecarpus gigantifolia* Vidal

植物名 大叶肉托果《中国植志》

药材名 台东漆《台湾药植志》

地方名 台湾: 台东漆树。

功效 生漆: 用于虫积, 水蛊。

## 7205030

*Terminthia paniculata* (Wall. ex G. Don) C. Y. Wu et T. L. Ming --- *Rhus paniculata* Wall.

植物名 三叶漆《中国植志》

文献名 扁果《汇编》, 野荔枝《云南药录》

功效 皮、果: 消炎, 收敛, 舒筋活血。用于扁桃腺炎, 风湿性关节炎, 消化不良, 腹泻。

## 7205031

*Toxicodendron delavayi* (Franch.) F. A. Barkl. --- *Rhus delavayi* Franch.

植物名 小漆树《中国植志》

药材名 山漆树《贵州草药》

地方名 铁象杆、野漆树(四川、贵州); 云南: 漆树。

功效 根、叶: 祛风除湿, 消肿止痛。用于风湿病, 无名肿毒。

## 7205032

*Toxicodendron radicans* (L.) O. Kuntze ssp. *hispidum* (Engl.) Gillis --- *Rhus toxicodendron* var. *hispida* Engl. --- *Rhus intermedia* Hayata

植物名 刺果毒漆藤《中国植志》

文献名 野葛《唐本草》, 冶葛、钩吻、毒葛、毒葛叶《新纲》

备考 1. 过去文献报导, 《抱朴子》、《唐本草》记载的野葛为 *Toxicodendron radicans* (L.) O. Kuntze, 此种分布于美国, 我国不产。故“野葛”当指其变种“刺果毒漆藤”; 2. 本种极毒, 能引起漆疮。

## 7205033

*Toxicodendron succedaneum* (L.) O. Kuntze --- *Rhus succedanea* L.

植物名 野漆树《名实图考》、《云南植志》

药材名 野漆《广西药录》

文献名 白蜡、木蜡、黄桢树《新纲》, 桢木《和汉药标本目录》, 木腊树《树分》, 红色树《种分》, 漆、生漆《中国经植志》

地方名 痒漆树(四川、广东、广西、河南), 痒漆树(广西、四川、河南); 江苏: 臭毛漆树; 安徽: 山漆树; 福建: 奇柴; 台湾: 山贼子, 山漆, 漆七树, 樟仔漆; 湖北: 大木漆, 野洋漆(利川), 火漆树; 广东: 漆树、油星(阳春), 老鸦胆, 老鸡蛋; 海南: 光叶漆, 黄碰; 广西: 漆木(横县、宁明、桂平、博白), 痒漆; 四川: 野漆树根; 贵州: 林背子; 云南: “克可尼”(元江哈尼语)。

功效 根、叶、树皮及果: 有小毒。平喘, 解毒, 散瘀消肿, 止痛止血。用于哮喘, 急性肝炎, 胃痛, 跌打损伤。外用于骨折, 创伤出血。

## 7205034

*Toxicodendron sylvestre* (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze --- *Rhus sylvestris* Sieb. et Zucc.

植物名 木蜡树《中国植志》

药材名 木蜡树《广西药录》

文献名 野漆树、染山红《名实图考》, 毛漆树《广西

## 本草选编

地方名 山漆树(广西、安徽、台湾、湖北);浙江:野毛漆;安徽:野漆疮树;福建:山漆,漆柴(福安),蜻蜓花(南平、上杭);湖南:七月倍;贵州:林背子;其他:毛叶漆。

功效 根、叶、树皮、果:平喘,解毒,散瘀消肿,止痛止血。

## 7205035

*Toxicodendron trichocarpum* (Miq.) O. Kuntze *Rhus trichocarpa* Miq.

植物名 毛漆树《中国植志》

药材名 毛果漆(湖北)

文献名 山漆树、白蜡、木蜡《新纲》,山漆《中国植物图鉴》,毛果漆树《湖北植志》,臭毛漆树《浙江药植志》

功效 根皮及茎叶:有小毒。平喘,解毒,散瘀消肿,止痛止血。

## 7205036

*Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F. A. Barkl. --- *Rhus verniciflua* Stokes --- *R. vernicifera* DC.

植物名 漆《诗经》、《中国植志》

药材名 干漆《本经》、《药典》

文献名 生漆《本经》,漆《说文解字》,漆树《蜀本草》,漆叶《图经》,漆子《纲目》,木蜡《新纲》,甘七《增订和汉药考》,枒苗《中国药植志》,漆渣、漆底、漆脚《中药材手册》,光五倍子《陕甘宁青中草药选》

地方名 山漆(福建、湖南);陕西:(杜倍)、(五倍子)(南郑);山东:瞎妮子(枣庄市);浙江:家漆(临安);福建:漆树根(闽南);湖北:大本漆,小木漆,山大本,二毛漆,冲天小木,花漆树,野太木,生漆树(神农架);湖南:楮苻;广西:漆树皮、漆树木心(陆川)。

功效 干漆(树脂加工品):有毒。破瘀血,消积,杀虫。用于妇女闭经,瘀血癥瘕,虫积腹痛;生漆(树脂):有毒。用于虫积,水蛊;种子(漆子):有毒。用于便血,尿血;叶(漆叶):有小毒。用于紫云病,外伤出血,疮疡溃烂;干皮或根皮(漆树皮):有小毒。用于接骨;树根:有毒。用于打伤久积;心材:有小毒。行气,镇痛。用于心胃气痛。

## 7206 牛栓藤科 Connaraceae

## 7206001

*Agelaea trinervis* (Llanoe) Merr.

植物名 果豆藤(海南)、《中国植志》

功效 根:用于风湿病,胃痛。

## 7206002

*Connarus paniculatus* Roxb. --- *C. hainanensis* Merr. --- *C. tonkinensis* Lecomte

植物名 牛栓藤《中国植志》

药材名 牛栓藤《广西药录》

地方名 广西:小叶藤(大新)。

功效 茎、叶:用于感冒。

## 7206003

*Rourea microphylla* (Hook. et Arn.) Planch. ---

*Santaloides microphyllum* (Hook. et Arn.) Schell --- *Rourea minor* (Gaertn.) Leenh. ssp. *microphylla* (Hook. et Arn.) J. Vidal

植物名 小叶红叶藤《中国植志》

药材名 红叶藤《广西药录》

地方名 牛见愁、荔枝藤(广东、广西);广东:红叶秋树;广西:牛栓藤,伍藤(平南),铁藤,霸王藤;云南:细叶果,假辣子,酸果。

功效 根、茎、叶:活血通经,止血止痛。用于闭经,跌打损伤,外伤出血,小儿热毒疮。

## 7206004

*Rourea minor* (Gaertn.) Leenh. --- *Rourea santaloides* Wight & Arn. --- *Santaloides roxburghii* O. Ktze.

植物名 红叶藤《中国植志》

文献名 大叶红叶藤《广西本草选编》

地方名 广西:牛栓藤,霸王藤。

功效 根、叶:活血通经,止血止痛。用于闭经;叶:外用于跌打损伤肿痛,外伤出血。

## 7206a 马尾树科 Rhoiteaceae

## 7206a01

*Rhoiptelea chilantha* Diels et Hand. -Mazz.

植物名 马尾树《高植图鉴》

药材名 马尾树《贵州药录》

地方名 贵州:漆榆。

功效 树皮:收敛止血。用于肠炎。

## 7207 胡桃科 Juglandaceae

## 7207001

*Carya cathayensis* Sarg. --- *Hicoria cathayensis* (Sarg.) Chun

植物名 山核桃《中国植志》

药材名 山核桃《浙江药植志》

文献名 山胡桃(刘恂《岭表录异》)

地方名 浙江:小核桃,山蟹;安徽:核桃,野漆树;广西:山桐子。

功效 种仁:滋润补养。用于腰痛。

## 7207002

*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch --- *Carya pecan* (Marsh.) Engl. et Graebn.

植物名 美国山核桃《中国植志》

文献名 美洲胡桃《台湾药植志》,薄壳山核桃《江苏植志》

功效 种仁:滋润补养。

## 7207003

*Cyclocarya pahirus* (Batal.) Iljinsk.

植物名 青钱柳《中国植志》

药材名 青钱柳《汇编》

地方名 山麻柳(湖北、湖南);浙江:青钱李;安徽:山化树;江西:甜茶树,摇钱树;湖北:铜钱树(罗田)。

功效 皮、叶、根:杀虫止痒,消炎,止痛,祛风。用于湿疹,疥疮,过敏性皮炎,痈肿疮疖,膝关节痛,脚癣。



## 7207004

*Engelhardtia colebrookiana* Lindl. ex Wall

植物名 毛叶黄杞《中国植志》

文献名 短翅黄杞《树分》，绒毛叶黄杞《中国经植志》，黄杞《云南药录》

地方名 广东：山马劣树；贵州：豆腐渣；云南：盐抱肚，胖母猪果树，胖婆娘树。

功效 茎皮、根：收敛，消炎。用于痢疾，慢性肠炎，腹泻，脱肛，外伤出血。

备考 本品为紫草茸寄主植物之一。

## 7207005

*Engelhardtia roxburghiana* Wall.

植物名 黄杞《中国植志》

药材名 黄杞《汇编》

文献名 仁杞《中国植物图鉴》

地方名 黄棒（福建、浙江、广西），假玉桂（云南、广东、海南），山蓉糖（福建、浙江），黑油换（四川、福建），杨杞麻（广东、广西）；福建：良柴，银杞，香头，溪棒；广东：杨杞树，水杨基树，水杨居，杪木；海南：柏竦矮；广西：土厚朴（临桂），杪木，甘露茶，山羊杞（博白），山甜菜（平南），甜菜（凌云），黄古木（防城）；四川：黄泡木。

功效 树皮：行气，化湿，导滞。用于脾胃湿滞，胸腹胀闷，湿热泄泻；枝叶：用于白带多，癣症，象皮肿；种仁：补肾，润肺，定喘。用于虚寒咳嗽，腰膝酸软，遗精阳痿。

## 7207006

*Juglans cathayensis* Dode

植物名 野核桃《中国植志》

药材名 野核桃仁《浙江天目药志》

文献名 华核桃《中国植物图鉴》，台湾胡桃《台湾中药材图鉴》，野胡桃《四川中药志》

地方名 山核桃（云南、湖北、浙江、山东、陕西、贵州）；陕西：麻核桃（秦岭）；浙江：华胡桃；湖北：小核桃（均县），巴核桃（神农架）。

功效 种仁：补养气血，润燥化痰，益命门，利三焦，温肺润肠。用于虚寒咳嗽，下肢酸痛；油：缓下药，能驱除绦虫。外用于皮肤疥癣，冻疮，腋臭。

## 7207007

*Juglans mandshurica* Maxim.

植物名 胡桃楸《中国植志》

药材名 核桃楸皮（东北）

文献名 山胡桃《纲目》，马核果《树分》，楸马核果《中国药植图鉴》，核桃楸《东北木本图志》，满州胡桃《华北经植志要》，楸子树《鉴别手册》

地方名 （秦皮）（华北、西北、华东、东北），楸皮、楸树（东北），山核桃（东北、河北），楸子（黑龙江、河北）；吉林：核桃楸子，核桃，〔胡桃仁〕；辽宁：楸子皮（凤城）；北京：桃树皮（京西矿区），麻核桃；甘肃：楸树皮，野核桃，野胡桃。

功效 种仁：敛肺定喘，温肾润肠。用于体质虚弱，肺虚咳嗽，肾虚腰痛，便秘，遗精，阳痿，尿路结石，乳汁缺少；青果：有毒。止痛。用于胃、十二指肠溃疡，

胃痛。外用于神经性皮炎；树皮：清热解毒。用于细菌性痢疾，骨结核，麦粒肿。

## 7207008

*Juglans regia* L.

植物名 胡桃《开宝本草》，《中国植志》

药材名 核桃仁《纲目》，《药典》

文献名 蛾螭《酉阳杂俎》，胡桃肉《海上集验方》，青胡桃皮《救急方》，播罗斯《梵书》，胡桃油《普济方》，核桃、核桃仁、铁核桃、桃仁、油胡桃、胡桃仁、胡桃壳《纲目》，万岁子《花镜》，胡桃衣《本草再新》，羌桃《名物志》，吴桃、唐楸、播罗子、陈皮珍果《新纲》，分心木《山西中药志》，胡桃荚《现代实用中药》

地方名 北京：核桃窗；青海：“达卡”（藏语）；山东：合头，合桃，胡桃隔，青龙衣〔未熟外果皮〕；河南：山核桃；云南：茶核桃。

功效 种仁：补肾，温肺，润肠。用于腰膝酸软，虚寒喘嗽，遗精阳痿；种隔（分心木）：补肾涩精。用于肾虚遗精，滑精，遗尿；外果皮：有毒。消肿，止痒。用于慢性气管炎。外用于头癣，牛皮癣，痈肿疮疡；叶：有毒。解毒，消肿。用于象皮肿，白带过多，疥癣。

## 7207009

*Juglans sigillata* Dode

植物名 泡核桃《中国植志》

药材名 泡核桃《广西药录》

地方名 铁核桃（四川、云南）；云南：漾鼻核桃，茶核桃。

功效 种仁：润肺止咳。

## 7207010

*Platycarya longipes* Wu

植物名 圆果化香树《中国植志》

药材名 化香树叶《贵州民间药物》

文献名 长化香树《广西植录》

地方名 贵州：小化香，水化香，艾叶子树。

功效 枝、叶：有毒。消肿解毒，理气，杀虫。用于无名肿毒。

## 7207011

*Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc. --- *Fortunaea chinensis* Lindl. --- *Petrophiloides strobilacea* Koidz.

植物名 化香树《中国植志》

药材名 化香树果《湖南药物志》

文献名 怀《尔雅》，必栗香、化木香、詹香《本草拾遗》，怀香、兜婆婆香《纲目》，化香《名实图考》，兜栌、栲花《植物名汇》，花果儿树、放香树、柄香、栲蒲、花栲树、还香、返香《中国药植志》，花果儿、铜果、铁果《经济植物学》，花果、花龙树、本枣子树、化树《江苏野生植志》，化香树球《中药大辞典》

地方名 山麻柳（四川、贵州），化果树（安徽、江苏），麻柳树（贵州、甘肃、陕西），花树果、花树、山栲树（江苏、浙江），还香树、皮杆条（河南、湖北），返青（四川、贵州），换香树（河北、四川、湖北），小化香（四川、贵州），饭香树（广西、湖北）；陕西：化香柳（陕南）；山东：花木香；江苏：花郎果；浙江：化树蒲（临安），栲花树（余姚、

定海), 拷果树(乐清), 坏树, 坏树皮, 花香果; 福建: 鱼化车; 湖南: 山柳叶, 板香树; 四川: 山麻柳树; 贵州: 艾叶子树(水城), 干化香。

功效 叶: 有毒。消肿解毒, 理气, 杀虫。外用于疔疮肿毒, 阴囊湿疹, 顽癣。

## 7207012

*Pterocarya hupehensis* Skan

植物名 湖北枫杨《中国植志》

药材名 麻杆柳叶《神农架药录》

文献名 山柳树《树分》

地方名 湖北: 麻杆柳(神农架)。

功效 枝、叶: 清热解暑, 杀虫。用于血吸虫病, 皮肤疮癣, 脚癣。

## 7207013

*Pterocarya insignis* Rehd. et Wils.

植物名 华西枫杨《中国植志》

文献名 瓦山水胡桃《树分》

地方名 湖北: 麻柳树、白柳(神农架)。

功效 叶、树皮: 杀虫。用于脚癣, 疥疮。

## 7207014

*Pterocarya stenoptera* C. DC. --- *P. stenoptera* C. DC. var. *brevialata* Pampan.

植物名 枫杨《中国植志》

药材名 枫杨《汇编》

文献名 柾柳(《尔雅》郭璞注), 枫柳, 枫柳皮《唐本草》, 柾柳榘《纲目》, 柾柳、鬼柳《群芳谱》, 麻柳、麻柳叶《草本便方》, 麻柳树根《分类草药性》, 臭柳树、挂头杨柳叶、河麻柳《土农药志》, 溪麻柳、溪杨、元宝枫、溪榘、燕子树、榘、杞柳、大叶柳、水槐柳《中国药植志》, 柾柳《山东树木志》, 麻柳皮《陕西中草药》, 短翅枫杨《甘肃中草》

地方名 鬼柳杨(江苏、湖南), 水麻柳(四川、甘肃、云南、湖北), 白杨(江苏、安徽), 鬼柳树(湖北、湖南、河南), 元宝柳(辽宁、江苏), 平杨柳(辽宁、江苏、湖南), 嵌宝枫(台湾、山东), 元宝树(浙江、福建、上海), 柳丝子(福建、云南); 山东: 平柳, 燕子柳; 江苏: 大叶头杨树, 鬼头杨, 白杨树, 元宝杨树, 魁柳(扬州), 元宝杨柳; 浙江: 水化香(临安), 溪沟树(临安、镇海、衢县), 溪柳(乐清), 溪谷树, 溪柳树, 枸树, 挂头杨树, 挂头杨柳树, 溪口树, 溪榘树, 溪隔树; 安徽: 鬼叶柳, 肥柳, 泡柳, 槐柳, 水桦, 蜈蚣杨柳, 野扁豆, 蜈蚣柳; 江西: 锯树、苍蝇树(泰和), 羊树叶, 杞树宛; 福建: 溪边树、貽梗柴(永安), 鲍干树(武平); 湖北: 柳树叶, 柳树、皂柳树(神农架); 湖南: 枫杨皮, 耿柳(常德), 鬼柳叶, 江柳(溆浦), 鬼柳树皮; 广东: 寄仔树; 广西: 金豆木(龙州), 沙柳本(岑溪), 臭杨柳(临桂), 臭柳, 沙柳树, 沙柳, 吊花树, “米芯”(壮语); 四川: 麻柳树, 山麻柳(蓬溪), 一群鸭、雁鹅群(果名); 云南: 水槐树, 小鸡树。

功效 枝、叶: 有小毒。杀虫止痒, 利尿消肿; 叶: 用于血吸虫病。外用于黄癣, 脚癣; 枝、叶: 捣烂可杀蛆虫, 孑子。

## 7209 山茱萸科 Cornaceae

## 7209001

*Aucuba chinensis* Benth ssp. *omeiensis* (Fang) Fang et Soong --- *Aucuba omeiensis* Fang

植物名 峨眉桃叶珊瑚《中国植志》

药材名 天脚板(四川峨眉)

文献名 青皮树《高植图鉴》

地方名 四川: 大青竹标(峨眉山)。

功效 叶: 用于火伤, 烫伤, 痔症, 解毒。

## 7209002

*Aucuba himalaica* Hook. f. et Thoms. --- *A. chinensis* auct. non Benth.

植物名 喜马拉雅珊瑚《中国植志》

药材名 桃叶珊瑚《汝南圃史》、《中药大辞典》

文献名 植楠树《质问本草》, 香木《和汉药植》, 西藏桃叶珊瑚《高植图鉴补编》, 喜马桃叶珊瑚《神农架药录》

地方名 台湾: 珊瑚, 榘叶; 湖北: 青竹叶、紫竹叶、紫竹根、紫竹实(神农架); 广西: 软叶罗伞(融安), 野蓝靛; 四川: 天脚板、大青竹叶(峨眉山)。

功效 叶、果实: 用于脚肿, 烫火伤, 痈疽, 肿毒; 根: 祛风除湿, 舒筋活络。用于风湿骨痛, 跌打劳伤。

备考 过去文献常将本种误订为 *Aucuba chinensis* Benth.

## 7209003

*Aucuba himalaica* Hook. f. et Thoms. var. *pilosissima* Fang et Soong

植物名 密毛桃叶珊瑚《中国植志》

文献名 柔毛桃叶珊瑚《神农架药录》

地方名 湖北: 紫竹叶(神农架)。

功效 根: 用于腿痛; 叶: 止血散瘀; 果实: 止带。

## 7209004

*Aucuba obcordata* (Rehd.) Fu

植物名 倒心叶珊瑚《中国植志》

文献名 倒心桃叶珊瑚《神农架药录》

地方名 湖北: 青竹叶(神农架)。

功效 叶: 用于烫火伤。

## 7209005

*Bothrocaryum controversum* (Hemsl.) Pojark. --- *Cornus controversa* Hemsl.

植物名 灯台树《中国植志》

药材名 灯台树《浙江药植志》

文献名 灯台木《牧野日图》, 灯台山茱萸《东北木本图志》, 狭叶灯台树《神农架药录》

地方名 瑞木(山东、湖南); 浙江: [鸡肫皮]; 安徽: 乌牙树; 河南: [五加皮]; 湖北: 青旦树, 黄楸树, 白蜡子木(神农架); 广西: “米杯”(壮语), 伞把树, 果杯, 狗骨木; 四川: 六角树; 云南: 伞柄树, 猫猫头; 其他: 水木(日本)。

功效 树皮: 祛风止痛, 舒筋活络; 心材: 用于骨折, 破血, 养血, 安胎, 止痛, 生肌; 果: 清热利湿, 止血,

驱蛔。用于蛔积,肝炎。

#### 7209006

*Cornus chinensis* Wanger. --- *Macrocarpium chinensis* (Wanger.) Hutch.

植物名 川鄂山茱萸《中国植志》

文献名 绿杞《峨眉药植资源》

地方名 湖北:野枣树(神农架);四川:野枣皮(峨眉山);云南:对节子、人山胡椒(维西),枣皮。

功效 果:滋阴敛汗,补肾。

#### 7209007

*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. --- *Macrocarpium officinale* (Sieb. et Zucc.) Nakai

植物名 山茱萸《中国植志》

药材名 山茱萸《本经》、《药典》

文献名 蜀枣《本经》,魅实、鼠矢、鸡足《吴普本草》,思盖寇实《别录》,山萸肉《小儿药证直诀》,实枣儿《救荒本草》,肉枣《纲目》,枣皮《会约医镜》,萸肉《医学衷中参西录》,石枣、实枣儿树、汤主《新纲》,春黄金花、秋珊瑚《牧野日图》

地方名 药枣(山西、陕西、浙江、四川),红枣皮(浙江、安徽);江苏:白蒲枣(上海);浙江:甜瓜(龙游),枣皮树(淳安);四川:酸枣皮。

功效 果肉:补益肝肾,涩精固脱。用于眩晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱,内热消渴。

#### 7209008

*Dendrobenthamia angustata* (Chun) Fang --- *Cornus kousa* Hance var. *angustata* Chun

植物名 尖叶四照花《中国植志》

药材名 狭叶四照花《中药大辞典》

地方名 山荔枝(广西、云南);云南:野荔枝(红河);贵州:上荔枝。

功效 花、叶:收敛止血。用于外伤出血,痢疾,骨折;全株:外用于水肿;果实:用于痢疾。

#### 7209009

*Dendrobenthamia capitata* (Wall.) Hutch. --- *Cornus capitata* Wall.

植物名 头状四照花《中国植志》

药材名 鸡嗉子果《云南中草药》

文献名 石蓼子《中国经植志》

地方名 山荔枝、四照花、鸡嗉子、野荔枝(四川、云南);四川:〔一枝箭〕,云母树,石泡子,节节树,猴头果;云南:羊梅,鸡嗉果,山覆盆(昆明),猴鸡嗉,“四子那卡”(维西族语)。

功效 叶、果、根皮、树皮:清热解毒,利胆行水,消积杀虫。用于食积气胀,小儿疳积,肝炎,蛔虫病。外用于烧烫伤,外伤出血。

#### 7209010

*Dendrobenthamia gigantea* (Hand. -Mazz.) Fang

植物名 大型四照花《中国植志》

功效 果:药用。

#### 7209011

*Dendrobenthamia hongkongensis* (Hemsl.) Hutch. ---

*Cornus hongkongensis* Hemsl.

植物名 香港四照花《中国植志》

文献名 糖黄子树《高植图鉴》

地方名 湖南:“天崽风”(蓝山县瑶名);广西:山荔枝(贺县),癩杨梅。

功效 根:活血,止痛,消肿。用于风湿痹痛。

#### 7209012

*Dendrobenthamia japonica* (DC.) Fang var. *chinensis* (Osborn) Fang --- *Cornus kousa* Hance var. *chinensis* Osborn

植物名 四照花《中国植志》

药材名 四照花《黄山志》、《浙江药植志》

文献名 羊婆奶《树分》,石枣《中国经植志》,小车轴木《华北树木志》

地方名 山东:山荔枝;浙江:四面花(天目山),梅球木、梅株果(临安);河南:〔石枣子〕,小车轴,凉子;湖北:石楂子树,石枣子树,荔枝巴子树(神农架),青皮树;四川:小六角,羊梅。

功效 叶:清热解毒,止血。用于烫伤,外伤出血,肝炎;果实:用于驱蛔;根、树皮:用于劳伤乏力,肺病咯血。

#### 7209013

*Dendrobenthamia melanotricha* (Pojark.) Fang --- *Cynoxylon melanotricha* Pojark.

植物名 光叶四照花《贵州植志》

文献名 黑毛四照花《四川植志》

功效 花:用于乳痈,牙痛,喉蛾,月经不调,消肿。

#### 7209014

*Helwingia chinensis* Batal.

植物名 中华青荚叶《中国植志》

药材名 叶上花(陕西、湖北、四川、云南)

文献名 青荚叶、阴症药《名实图考》,华青荚叶《红河中草药》

地方名 小通草〔茎髓〕(湖北、湖南、云南),叶上果(四川、云南),叶上珠(陕西、四川、云南);陕西:老汉背娃娃(镇坪);台湾:大叶通草,小录果,大部参,叶长花,转兰,通条花;湖北:〔通草〕〔茎髓〕,树儿茶(神农架);云南:小绿通、通花草、叶婆婆树(红河),月亮公公树。

功效 全株及根:活血化瘀,清热解毒。用于跌打损伤,骨折,风湿性关节炎,胃痛,痢疾,月经不调。外用于烧烫伤,疮疖脓肿,毒蛇咬伤。

#### 7209015

*Helwingia chinensis* Batal. var. *crenata* (Lingelsh. ex Limpr.) Fang

植物名 钝齿青荚叶《中国植志》

地方名 湖北:叶底珠、小通草(神农架)。

功效 根(叶底珠):活血化瘀,清热解毒;茎髓(小通草):利尿,下乳。

#### 7209016

*Helwingia himalaica* Hook. f. et Thoms.

植物名 西域青荚叶《中国植志》

药材名 叶上花《汇编》

文献名 西南青莢叶《汇编》, 西藏青莢叶《高植图鉴》, 喜马拉雅青莢叶《树分》

地方名 叶上果(广西、云南); 四川: 叶上珠(峨眉山); 云南: 小通草(曲靖), 木本叶上花(昆明), 巴巴花杜(临沧), 叶婆婆树(红河), 泡通青莢叶(思茅), 通心草(玉溪), 野山花(景东), 绿泡通(文山)。

功效 全株及根: 活血化瘀, 清热解毒。用于跌打损伤, 骨折, 风湿性关节炎, 胃痛, 痢疾, 月经不调。外用于烧烫伤, 疮疖肿痛, 毒蛇咬伤。

#### 7209017

*Helwingia japonica* (Thunb.) Dietr.

植物名 青莢叶《名实图考》、《中国植志》

药材名 小通草《药典》

文献名 青莢儿菜《救荒本草》, 阴证药、大部参《名实图考》, 叶上花《汇编》

地方名 叶上子(湖南、四川), 叶上果(广西、云南), 叶上珠(陕西、浙江、四川); 河南: 大叶通草; 湖北: 通草; 湖南: [山豆根], 叶生子, 青茄子, 青皮通草, 舌泡草, 斑鸡石; 四川: 小录果, 转兰; 贵州: 叶上果根; 云南: 叶上花根, 叶上珠根; 其他: 绿叶托红珠, 通条花。

功效 茎髓: 清热, 利尿, 下乳。用于小便不利, 乳汁不下, 尿路感染; 全株及根: 活血化瘀, 清热解毒。用于跌打损伤, 骨折, 风湿性关节炎, 胃痛, 痢疾, 月经不调。外用于烧烫伤, 疮疖肿痛, 毒蛇咬伤。

#### 7209018

*Helwingia japonica* (Thunb.) Dietr. var. *hypoleuca* Hemsl.

植物名 白粉青莢叶《中国植志》

药材名 白背青莢叶《汇编》

文献名 粉背青莢叶《云南种录》

地方名 湖北: 野通草、树儿茶(神农架); 广西: 青通草(全州)。

功效 茎髓: 清热, 利尿, 通乳; 根: 活血化瘀, 清热解毒。

#### 7209019

*Helwingia japonica* (Thunb.) Dietr. var. *szechuensis* Fang --- *Helwingia szechuensis* Fang

植物名 四川青莢叶《中国植志》

地方名 四川: 叶上花、叶上珠(峨眉山)。

功效 果、叶: 清热除湿, 补虚, 止咳, 止痛。

#### 7209020

*Swida alba* Opiz --- *Cornus alba* L.

植物名 红瑞木《中国植志》

药材名 红瑞木《长白山植药志》

文献名 红茎木《山东树木志》, 红瑞山茱萸《东北木本图志》

地方名 江苏: 凉子木(徐州)。

功效 树皮: 收敛, 止血; 叶: 用于胸膜炎, 肾病。

#### 7209021 见 7209022b

#### 7209022

*Swida hemsleyi* (Schneid. et Wanger.) Sojak --- *Cornus*

*hemsleyi* Schneid. et Wanger.

植物名 红棕子《中国植志》

药材名 红棕子《神农架药录》

地方名 湖北: 娘孑木(神农架); 四川: 青枸(峨眉山)。

功效 树皮: 祛风止痛, 舒筋活络。用于风湿筋骨疼痛, 腰腿痛, 肢体瘫痪。

#### 7209022a

*Swida macrophylla* (Wall.) Sojak --- *Cornus macrophylla* Wall.

植物名 株木《中国植志》

药材名 棕子木《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 棕、株《尔雅》, 松杨、凉木《本草拾遗》, 棕子《闽书》, 棕子树《救荒本草》, 冬青果《名实图考》, 屈曲瑞本《中国植物图鉴》, 台湾灯台树《台湾省志》, 毛梗株木《西藏植录》

地方名 光皮子树(湖南、贵州); 陕西: 丁木树(略阳), 大叶台灯树, 丁榔皮; 甘肃: [梭罗树](康县), 红条子; 浙江: 后味清香(临安); 江西: 光皮树; 河南: 凉子、大叶棕子; 湖北: [落地金钱], 红娘孑树(神农架); 四川: 灯台树, 六角树, 杆木, 白对节子(峨眉山); 其他: 小株木。

功效 根及树皮: 祛风止痛, 舒筋活络。用于风湿筋骨疼痛, 腰腿痛, 肢体瘫痪; 心材: 用于骨折伤, 破血, 养血, 安胎, 止痛, 生肌。

#### 7209022b

*Swida oblonga* (Wall.) Sojak --- *Cornus oblonga* Wall.

植物名 长圆叶株木《中国植志》

文献名 矩圆叶株木《高植图鉴》, 黑皮楠《中国树木志》, 水泡叶树《中国经植志》

地方名 四川: 臭条子; 云南: 黄皮, 粉帕树(嵩明), 救驾。

功效 皮: 温经活络。用于风寒湿痹, 腰痛, 骨折, 跌打损伤。

#### 7209023

*Swida parviflora* (Chien) Holub --- *Cornus parviflora* Chien

植物名 小花株木《中国植志》

文献名 贵州四照花《贵州药录》

功效 树皮: 通经活络。用于瘫痪, 骨折, 痛经, 痞块, 跌打损伤, 高烧不退, 疟疾。

#### 7209024

*Swida paucineris* (Hance) Sojak --- *Cornus paucineris* Hance

植物名 小株木《中国植志》

药材名 小株木《汇编》

文献名 [臭黄荆]、南天种《植物名汇》, 疏脉山茱萸《红河中草药》

地方名 四川: 灯台树(重庆), 地姑娘, 火烫药(峨眉山); 云南: [水杨柳], 大穿鱼草、穿鱼藤(红河), 水棕子、乌金草(曲靖), 茶豆接筋叶、穿鱼条(玉溪); 其他: 酸皮条。

**功效** 全株:清热解表,止痛。用于感冒头痛,风湿性关节痛。外用于烫火伤。

7209025

*Swida walteri* (Wanger.) Sojak --- *Cornus walteri* Wanger.

**植物名** 毛楝《中国植志》

**药材名** 毛楝枝叶《江苏药材志》

**文献名** 楸树叶《汇编》,八树、红零子、楸树、红梗山茶《中药大辞典》

**地方名** 棕子木(华北),油树(华北、陕西、云南),车梁木、黑棕子(华北、山东);山东:大叶黄连(费县、平邑),黄心树(章丘),油种子树(益都),黑连子(博山、邹平),毛楝子;湖北:红棕子(神农架);四川:小六谷(峨眉);云南:凉子树。

**功效** 枝、叶:用于漆疮。果实亦可使用。

7209026 见 7209022a

7209027

*Torriceilia angulata* Oliv.

**植物名** 角叶鞘柄木《中国植志》

**药材名** 大接骨丹《汇编》

**文献名** 裂叶鞘柄木、叨里木《汇编》,有齿多角叨里木《广西药录》

**地方名** 湖北:水冬瓜,〔打不死〕,烂泥巴树,烂枇杷,酒麸子树,接骨丹(神农架);广西:懒茶叶,烂泥树;四川:懒插莲(峨眉山);云南:〔接骨木〕,楂巴树。

**功效** 根皮、叶:活血祛瘀,祛风利湿。用于风湿关节痛,产后腰痛,慢性肠炎,腹泻。外用子骨折,跌打损伤;花:用于血瘀经闭。

7209028

*Torriceilia angulata* Oliv. var. *intermedia* (Harms ex Diels) Hu

**植物名** 有齿鞘柄木《中国植志》

**药材名** 大接骨丹《汇编》

**文献名** 水冬瓜木《名实图考》,齿裂鞘柄木《汇编》,齿叶烂泥树《广西植录》,叨里木《云南中草药选》,齿叶叨里木《中药大辞典》,中型夺雨木《峨眉药植资源》,椴叶鞘柄木《峨眉药植研究》,粗齿角叶鞘柄木《中国树木志》

**地方名** 水冬瓜、接骨丹、懒茶叶(广西、云南);陕西:五加皮七(平利),接骨草;广西:红浆叶(隆林),烂泥巴树,楂茶树,烂泥树;四川:大叶接骨丹,懒插莲;贵州:水冬瓜(昭通),水五加,清明花;云南:接骨木、楂巴树(红河),大接骨(大理、保山),“呀门奴”(保山),接骨草树。

**功效** 根皮、叶:活血祛瘀,祛风利湿。用于风湿关节痛,产后腰痛,慢性肠炎,腹泻。外用子骨折,跌打损伤;花:用于血瘀经闭。

7209029

*Torriceilia tiliifolia* (Wall.) DC.

**植物名** 鞘柄木《中国植志》

**药材名** 大接骨丹《汇编》

**文献名** 椴叶烂泥树《云南种录》,椴叶叨里木《云南

中草药选》,大接骨《拉拔种称》,叨里木、椴叶鞘柄木《汇编》

**地方名** 云南:大葫芦叶(思茅),象耳朵,接骨丹;其他:水冬瓜。

**功效** 根皮、叶:活血祛瘀,祛风利湿。用于风湿关节痛,产后腰痛,慢性肠炎,腹泻。外用子骨折,跌打损伤;花:用于血瘀经闭。

## 7210 八角枫科 Alangiaceae

7210001

*Alangium chinense* (Lour.) Harms

**植物名** 五角枫《简易草药》、《汇编》

**药材名** 白龙须《根》《简易草药》、《汇编》

**文献名** 八角枫《名实图考》,白金条《分类草药性》,华瓜木《中国植物图鉴》

**地方名** 八角梧桐(浙江、江西、湖北),七角枫(湖北、广东、湖南),三角枫(广东、湖南),〔接骨木〕(广东、湖南、云南),白筋条(湖南、四川),二珠葫芦(甘肃、河南);陕西:山霸王(镇坪),白尖子(略阳),白龙锡;甘肃:八筋条,白锦条;山东:水桃(威海);浙江:八角柴(文成),牛尾巴花(临安),六角金盘(兰溪),花冠木(余姚);安徽:芙蓉麻,知亲婆;福建:一杯醉(寿宁);河南:榧木,八角树;湖北:白锦茶,老龙须;湖南:山药黄;广东:八角王,水芒树,包子树、大枫树(清远);广西:百解;四川:白荆条(峨眉山),鹅脚板;云南:大力丸(玉溪、曲靖、红河),大力王,大风药,大白龙须,山哈风(玉溪),酸酱叶树(昆明),“美腊冷”(傣语)。

**功效** 根、叶、花:有小毒。祛风除湿,舒筋活络,散瘀止痛。用于风湿痹痛,四肢麻木,跌打损伤。

7210002

*Alangium faberi* Oliv. --- *A. barbatum* (R. Br.) Ball. ssp. *deciens* (Evard) Bloemb.

**植物名** 小花八角枫《中国植志》

**文献名** 候风藤《名实图考》,西南八角枫《广西植录》,狭叶八角枫《贵州药录》

**地方名** 湖南:〔九牛造〕,伪八角枫;广西:三角枫(金秀)。

**功效** 根、叶:祛风除湿,通经活络,行气止痛。用于风湿性腰腿痛,妇女臂痛,胃痛,跌打损伤。

7210003

*Alangium faberi* Oliv. var. *platyphyllum* Chun et How

**植物名** 阔叶八角枫《中国植志》

**文献名** 阔叶西南八角枫《广西植录》

**地方名** 广西:五代同堂(扶绥),猴疳药(恭城),鸡肾棱木(上林)。

**功效** 根:行气除湿。用于胃痛,风湿病,跌打损伤。

7210004

*Alangium faberi* Oliv. var. *heterophyllum* Yang

**植物名** 异叶八角枫《中国植志》

**文献名** 裂叶八角枫《品种论述》

**地方名** 四川:〔土防风〕。

备考 四川民间以其根混称土防风。

#### 7210005

*Alangium kurzii* Craib

植物名 毛八角枫《中国植志》

文献名 长毛八角枫《海南植志》,毛瓜木《江西药录》,绒毛八角枫《云南种录》

地方名 广西:鸡肾楞,山万寿;贵州:白龙须。

功效 种子:拔毒消炎。用于疗毒;花:清热解毒。用于咽喉肿痛。

#### 7210006

*Alangium kurzii* Craib var. *handelii* (Schnarf) Fang ---  
*A. handelii* Schnarf

植物名 云山八角枫《中国植志》

文献名 大花八角枫《中草药》,心叶八角枫《云南种录》

功效 根、茎、枝条:具有肌肉松弛和镇痛作用。

#### 7210007

*Alangium platanifolium* (Sieb. et Zucc.) Harms

植物名 八角枫《名实图考》、《汇编》

药材名 白龙须(湖北)

文献名 大空《唐本草》,独空《纲目》,八角金盘《本草从新》,木八角《纲目拾遗》,白锦条、八筋条、青白皮楠、麻桐树《树分》,广西八角枫《广西植志》,瓜木《中国植志》

地方名 八角梧桐(湖北、湖南、江西),岩桐(台湾、四川),七角枫(湖北、湖南),白金条(湖北、四川),〔山茱萸〕(台湾、湖北);陕西:白尖子(略阳),山霸王(镇坪);甘肃:白麻树(文县);山东:水桃;浙江:敏子树;安徽:〔五加〕,白虎柴,鸡骨白,通钱婆;江西:八角将军(婺源);台湾:柜木;河南:猪耳桐;湖北:山药萸,白锦茶,老龙须,大救驾,山杨叶(神农架);广西:八角王,大退;四川:扒骨风;贵州:白荆条,野芙蓉;云南:大树白龙须,白筋条。

功效 根:有小毒。祛风除湿,舒筋活络,散瘀止痛。用于风湿痹痛,四肢麻木,跌打损伤。

#### 7210008

*Alangium salviifolium* (L. f.) Wanger.

植物名 土坛树《中国植志》

文献名 鼠尾草叶八角枫《广西药录》

地方名 海南:割舌罗。

功效 根皮:用于催吐,解毒。

### 7211 珙桐科 Nyssaceae

#### 7211001

*Camptotheca acuminata* Decne.

植物名 喜树《中国植志》

药材名 喜树《汇编》

文献名 旱莲、旱莲本《名实图考》,水栗、旱莲子、野芭蕉《天津医学通讯》,喜树果《中药志》

地方名 水桐树(江苏、广东、广西);上海:南京树;湖南:天梓树;四川:千丈树,千张树,水冬瓜,水栗子(邛崃),秧青树(南川);云南:水漠子,南京梧桐。

功效 根、果、树皮、树叶、树枝:抗癌,清热,杀虫。用于食道癌,肝癌,胃癌,结肠癌,直肠癌,卵巢腺癌,慢性粒细胞性白血病,急性淋巴细胞性白血病。外用于牛皮癣。

#### 7211001a

*Davidia involucrata* Baill.

植物名 珙桐《贵州省中药名录》

药材名 珙桐《新华本草纲要》

地方名 湖北:山白果;四川:水梨子,水冬瓜。

功效 根:收敛,止泻。

#### 7211002

*Nyssa sinensis* Oliv.

植物名 蓝果树《中国植志》

药材名 蓝果树《江西药录》

文献名 紫树《树分》,柅萨木《中国植物图谱》

功效 根:抗癌。

### 7211b 锁阳科 Cynomoriaceae

#### 7211b01

*Cynomorium songaricum* Rupr.

植物名 锁阳《高植图鉴》

药材名 锁阳《本草衍义补遗》、《药典》

文献名 锁阳《丹溪心法》,不老药《国药的药理学》,地毛球《中药志》,新疆锁阳《药材学》,锁药、黄菇卵、准噶尔锁阳《沙漠药植》,锁严子《陕甘宁青中草药选》

地方名 内蒙古:羊锁不拉,〔铁棒锤〕,“锁阳·玛格”、“乌兰告亚”、“乌兰高腰”、“贵臭”、“沙宗”(蒙名);宁夏:黄骨狼;青海:锁燕;新疆:“耶尔买他格”(维名),锈铁棒。

功效 肉质茎:补肾阳,益精血,润肠通便。用于腰膝痿软,阳痿滑精,肠燥便秘。

### 7212 五加科 Araliaceae

#### 7212001

*Acanthopanax evodiaefolius* Franch.

植物名 吴茱萸五加《中国植志》

药材名 吴萸叶五加皮(拟)

文献名 吴茱萸叶五加《种分》,萸叶五加《广西植志》,树三加《浙江药植志》

地方名 云南:刺五加(玉龙山),树五加。

功效 根皮:祛风湿,补肝肾,强筋骨。用于风湿痹痛,筋骨痿软,小儿行迟,体虚乏力,水肿,脚气。

#### 7212002

*Acanthopanax evodiaefolius* Franch. var. *ferrugineus* W. Smith

植物名 锈毛吴茱萸五加《中国植志》

药材名 锈毛吴萸叶五加皮(拟)

文献名 锈毛吴茱萸叶五加《云南植志》,乔木五加《汇编》

地方名 西藏:五加皮,刺五加,“五加星给驯巴”(藏名)。

功效 根皮:祛风湿,补肝肾,强筋骨。

## 7212003

Acanthopanax giraldii Harms

植物名 红毛五加《中国植志》

药材名 红毛五加皮《中药志》

文献名 豺漆、五加皮《本经》，五抓刺《滇南本草》，刺加皮《药材资料汇编》，刺五加皮、五甲皮、毛五甲、纪氏五加《中药志》

地方名 刺五加(西北)；陕西：藤五甲，藤五加；甘肃：毛五加，猪尿疮瘡；青海：陕甘五加，老鸦眼珠子；湖北：红五加(神农架)；四川：刺五甲，毛五甲皮，刺甲皮，川加皮。

功效 根皮：祛风湿，通关节，强筋骨。用于痿痹，拘挛疼痛，风湿寒痹，足膝无力，皮肤风湿，阳痿囊湿。

## 7212004

Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith

植物名 五加《中国植志》

药材名 五加皮《本经》、《药典》

文献名 豺漆《本经》，五茄、豺节《别录》，文章草《巴蜀异物志》，五花《雷公炮炙论》，木骨、追风使、刺通《图经》，五佳、白刺、金盐《纲目》，五加蕪《名实图考》，茨五甲《草木便方》，五叶木、白刺颠、羽化魁、金盐母《新纲》，〔七里香〕、倒勾刺《土农药志》，细柱五加、五叶路刺《中国药植志》，五加花《中药大辞典》

地方名 刺五甲(浙江、河南、四川、广西)，刺五加(浙江、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南)，五皮风(安徽、江西、广西)，鸡脚风(江西、福建)，小五爪风(广东、广西)，五加风(江西、云南)；浙江：五爪刺(缙云)，白路刺(温州、平阳、乐清)；安徽：五加枫；江西：鸟不站(景德镇)；福建：五花眉(闽东)，白芦刺(福鼎)，强脚根(光泽)，五加筋，水面油(闽东)，刺眼；湖北：南五加，刺加皮；广西：五加勒(苍梧)，五加疳(北流)，五爪龙，五加刺；四川：树五甲，五甲，五甲皮，白刺头，毛五加，毛五甲，白刺尖；云南：节花五加，“戈哈”(红河哈尼族名)，大五加，刺叶黄风，南五加皮，鸡脚菜，茨五加；其他：八角茶。

功效 根皮：祛风湿，补肝肾，强筋骨。用于风湿痹痛，筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力，水肿，脚气。

## 7212005

Acanthopanax henryi (Oliv.) Harms --- Eleutherococcus henryi Oliv.

植物名 糙叶五加《中国植志》

药材名 五加皮《中药大辞典》

文献名 亨利五加《种分》

地方名 湖北：南五加，白五加(神农架)。

功效 根皮：祛风湿，补肝肾，强筋骨。用于风湿痹痛，筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力，水肿，脚气。

## 7212006

Acanthopanax lasiogyne Harms

植物名 毛蕊三加《汇编》

药材名 藏三加《汇编》

文献名 康定五加《中国植志》，箭炉五加《植分学报》

地方名 西藏：三加皮，“甲赛日”(藏语)。

功效 根、根皮：祛风除湿，壮筋骨，逐瘀活血。

## 7212007

Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms

植物名 藤五加《中国植志》

药材名 藤五加《中药志》

文献名 白根五加《种分》

地方名 五加皮(甘肃、陕西、宁夏、四川)；湖北：三加皮(神农架)；云南：秤杆树，刺五加(丽江)。

功效 根皮、茎皮：祛风湿，强筋骨，益气。

## 7212008

Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms f. angustifolius Hoo

植物名 长叶藤五加《中国植志》

地方名 湖北：五加皮(神农架)；四川：刺五加(峨眉山)。

功效 树皮或根皮：强筋骨，祛风湿。

## 7212009

Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. fulvescens Harms et Rehd.

植物名 糙叶藤五加《中国植志》

药材名 藤五加(拟)

文献名 红毛五加《四川中药志》，毛叶藤五加《云南植志》

地方名 湖北：毛五加；四川：五加皮、刺五加(峨眉山)，红毛五加皮，刺五甲，毛五甲皮，刺甲皮。

功效 树皮：祛风除湿，通关节，强筋健骨。用于风寒湿痹，手足拘挛，四肢痿软，阳痿囊湿。

## 7212010

Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms var. scaberulus Harms et Rehd.

植物名 狭叶藤五加《中国植志》

地方名 湖北：磨五加(神农架)。

功效 根、茎皮：强筋骨，祛风湿，止痛。

## 7212011

Acanthopanax rehderianus Harms

植物名 匙叶五加《中国植志》

药材名 白五加皮《神农架药录》

功效 根皮、树皮：祛风湿，通关节，止痛。

## 7212012

Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms --- Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. --- E. senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. f. inermis Komarov

植物名 刺五加《中国植志》

药材名 刺五加《药典》

文献名 少刺五加、五加皮木《东北药植志》

地方名 刺拐棒、老鸦刺、刺木棒、刺花棒、刺针、老虎獠子(河北、东北)，五加皮(东北、河北)；吉林：坎拐棒子；河北：一百针(兴隆)，老虎獠(涿鹿)，南五加皮，乌鸦子。

功效 根、根茎：益气健脾，补肾安神。用于脾胃

阳虚, 体虚乏力, 食欲不振, 腰膝酸痛, 失眠多梦。

#### 7212013

*Acanthopanax sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) Seem.

--- *Panax sessiliflorum* Rupr. & Maxim.

植物名 无梗五加《中国植志》

药材名 五加皮(东北)、《汇编》

文献名 短梗五加《东北木本图志》, 五加皮木《东北药植志》, 南五加皮、刺五加、刺五甲《汇编》

地方名 五加、老鸦刺、刺木棒、刺拐棒(东北); 河北; 乌药子。

功效 树皮: 祛风除湿, 强筋壮骨。用于风湿关节痛, 腰腿酸痛, 半身不遂, 跌打损伤, 水肿。

#### 7212014

*Acanthopanax sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) Seem.

var. *parviceps* Rehd.

植物名 小果无梗五加《中国植志》

药材名 五加皮(东北)

文献名 小果短梗五加《东北药用植物》

功效 根、皮: 祛风除湿, 强筋壮骨, 活血祛瘀, 益气健脾, 补肾安神, 健胃利尿及补中益精。用于风湿关节痛, 筋骨痿软, 腰膝作痛, 水肿, 小便不利, 寒湿脚气, 阳痿, 囊下湿, 小便余沥, 神疲体倦。

#### 7212015

*Acanthopanax setchuenensis* Harms ex Diels

植物名 蜀五加《中国植志》

药材名 川加皮《中国药植志》

文献名 四川五加《种分》, 红毛五加皮《中国药植志》, 川五加皮、多刺五加皮《药材学》, 蜀加皮《中国经植志》

地方名 湖北: 三加皮(神农架); 四川: 红毛五加, 刺五加, 瞎子花, 五甲皮, 刺五甲, 甲皮, 毛五甲, 刺加皮。

功效 根皮、茎皮: 祛风湿, 强筋骨, 益气。

#### 7212016

*Acanthopanax setchuenensis* Harms var. *latifoliatum* Hoo

植物名 阔叶蜀五加《中国植志》

地方名 湖北: 刺五加(神农架)。

功效 根皮: 祛风湿, 强筋骨。

#### 7212017

*Acanthopanax setulosus* Franch.

植物名 细刺五加《中国植志》

功效 根皮: 强筋骨。

#### 7212018

*Acanthopanax simonii* Schneid.

植物名 刚毛五加《中国植志》

药材名 雷五加《贵州草药》

文献名 西蒙五加《植分学报》, 西门五加《经植手册》

地方名 贵州: 白五加。

功效 根皮: 祛风除湿, 强筋壮骨, 化瘀生肌。

#### 7212019

*Acanthopanax trifoliatum* (L.) Merr.

植物名 白药《中国植志》

药材名 三加皮(浙江、福建、湖南、广东、广西)

文献名 白药叶《分类草药性》, 白药、白药藤、白药根《生草药性备要》, 白药根、山五甲《草木便方》, 刺三甲《天宝本草》, 苦药藤、风药藤、苦药葱《岭南采药录》, 鹅掌药《高植图鉴》, 三加《汇编》, 三叶五加《广西药录》

地方名 三加刺(浙江、福建、湖北、广西), 刺三加(湖南、广东、四川、贵州), 苦刺、三叶刺、倒钩刺(福建、广东), 三爪风(广东、广西), 刺藤乌(广东、四川), 臭刺(广东、云南); 浙江: 落地五加(临安), 三加芪(龙泉), 五加; 福建: 白药花叶, 白刺仔(永定), 三加风(宁化), 三加根, 白药刺, 刺虎, 红药刺, 三花眉, 栏路虎, 三叶牌, 龙江藤; 台湾: 香藤药, 贴肉刺; 湖北: 山加皮(神农架); 湖南: 山花莲, 五虎刺, 三股风, 三加杏(衡山); 广东: 禾掌药, 白刺藤, 药钩菜、药菜(阳春), 苦药藤、槐药菜、白药花、白药葱(惠阳、五华), 街头药(五华), 三叶苦刺(潮阳), 灯芯药(河源、阳山), 鸡杜药, 白通藤(连山); 海南: 山麻虎(屯昌、定安), 山木把(琼中); 广西: 十三加皮(北流); 四川: 三甲皮, 白刺根(重庆), 曲药藤(峨眉山); 贵州: 苦刺头; 云南: 鸡脚菜, 刺五爪(红河), “哈扁”(傣语), “包其络赛”(楚雄彝名), 刺果果。

功效 根、叶、全株: 清热解毒, 祛风除湿, 散瘀止痛。用于黄疸, 肠炎, 胃痛, 风湿性关节炎, 腰腿痛。外用于跌打损伤, 疮疖肿毒, 湿疹。

#### 7212020

*Acanthopanax trifoliatum* (L.) Merr. var. *setosum* Li ---

*Eleutherococcus setosus* (Li) Y. R. Ling

植物名 刚毛白药《中国植志》

药材名 毛三加(拟)

文献名 刚毛三叶五加《广西植录》, 有毛三叶五加《广西药录》, 毛三叶五加《台湾药植志》, 刚毛叶五加《云南种录》

地方名 广西: 五加皮(柳江)。

功效 根、叶、全株: 清热解毒, 祛风除湿, 散瘀止痛。用于风湿, 跌打损伤, 感冒发烧, 肠炎。

#### 7212021

*Acanthopanax verticillatum* Hoo

植物名 轮伞五加《中国植志》

药材名 藏五加(拟)

地方名 西藏: 五加皮, 刺五加。

功效 根皮、茎皮: 祛风湿, 强筋骨, 益气。

#### 7212022

*Aralia apioides* Hand. -Mazz.

植物名 芹叶龙眼独活《中国植志》

药材名 牛角七(云南)、《汇编》

地方名 云南: 黑羌活, 肉五加。

功效 根: 祛风除湿, 通经活络, 消炎生肌。用于风湿疼痛, 跌打损伤。

#### 7212023

*Aralia armata* (Wall.) Seem.

植物名 虎刺楸木《中国植志》

药材名 广楸木(拟)

文献名 广东楸木《树分》, 鹰不朴《广西中草药》



地方名 鸟不宿(广西、云南);广东:小鸟不仑;广西:小郎伞(凤山), 榑木, 打散根, 百鸟不落, 雷公木, 鹰不抓(博白), 黑勒雷公(平南), 鸟不站, 牛尾针(那坡), 百鸟不宿, 钻地风;云南:刺老包, 土花椒, 乌豆(西畴), “当介”(西双版纳傣语)。

功效 根皮、茎皮:祛风除湿,利尿消肿,活血止痛。用于肝炎,淋巴结肿大,肾炎水肿,糖尿病,白带,胃痛,风湿关节痛,腰腿痛,跌打损伤。

## 7212024

*Aralia atropurpurea* Franch.

植物名 浓紫龙眼独活《中国植志》

药材名 西藏九眼独活《汇编》

功效 根茎:祛风燥湿,活血止痛,消肿。

## 7212025

*Aralia chinensis* L.

植物名 榑木《中国植志》

药材名 榑木《本草拾遗》、《汇编》

文献名 吻头、榑根《本草拾遗》,刺脑包、刺老苞、鹊不宿《滇南本草》,鹊不踏《纲目》,刺老包根《草木便方》,树头菜《本草推陈》

地方名 鸟不宿(陕西、江苏、浙江、江西、福建、湖南),飞天蜈蚣(陕西、四川、云南),刺包头(湖北、湖南),刺老包(安徽、湖北、四川、云南),老虎刺(福建、河南、湖南),百鸟不落(陕西、湖南),鸟不踏(福建、湖北、湖南),虎阳刺(浙江、福建),[海桐皮](江苏、浙江、福建),破凉伞(陕西、湖南、四川),雀不站(陕西、云南),刺龙袍(陕西、四川),黄龙袍(湖南、四川),刺椿头(陕西、湖南、贵州),老虎吊(江苏、江西),刺榑头(陕西、贵州);陕西:飞天蜈蚣(平利、柞水、镇坪),刺龙包(洋县、眉县、太白),飞天蜈蚣七(汉中、眉县、太白),天蜈蚣(镇巴),丫棚树(宝鸡);甘肃:五龙头;青海:榑木皮;江苏:前娘棒,晚娘棒,野楸树,脱楸树;浙江:百鸟不栖(丽水、龙泉、温州),刺桐(平阳县),老虎八字刺,红桐刺,红刺蒙桐,千枚针(嵊县),水牛刺(天目山),白千枚针(温州),白百鸟不歇树(乐清、永嘉、洞头),白老虎刺、白刺党(泰顺),白汤头刺(瑞安),榑木白皮;福建:白刺桑柴(周宁),白刺椿(福安),鸟不落(宁德),刺杖(罗源),红刺通,白刺中柴(周宁),红梗满头棘、红毛番(宁化),通刺,鸟不栖,吊龙骨;江西:老虎肥,鸟不停(定南),猫儿刺(德兴),箭当树根,老虎卵,红老虎刺、猫里刺(德兴);台湾:刺榑;河南:老虎愁,鹊不登;湖北:红刺老包,雀不踏,刺泡头;湖南:老刺莛,刺龙苞,[白鲜皮](常德),勒蓬树(衡山),百鸟不站,毛刺通(黔阳),刺椿树,泥巴佬,小刺大木,鸟不站,清凉伞,白心皮,刺椿兜,虎柏刺;海南:老虎尾巴,老虎獠子,乌鸦不栖;广西:鹰不扑;四川:山通花根,山通花,蛇不拔,大刺老包,黄龙苞(宝兴),刺龙柏(峨眉),刺树椿(北碚);贵州:泡木刺;云南:大榑根,刺龙泡,刺楸树,刺木通,刺椿,刺头菜;其他:红宽刺,虎楸刺,白塔刺头,黄狼尾巴,仙人杖,鹊不站,鸟不企草,老虎刺草。

功效 根皮、茎皮:祛风除湿,利尿消肿,活血止痛。用于肝炎,淋巴结肿大,肾炎水肿,糖尿病,白带,

胃痛,风湿关节痛,腰腿痛,跌打损伤。

## 7212026

*Aralia chinensis* L. var. *nuda* Nakai

植物名 白背叶榑木《中国植志》

药材名 狼牙棒《中药大辞典》

文献名 光榑木《汇编》,黄花榑木《华北经植志要》,白背榑木《江西药录》,光叶榑木《广西植录》,乌郎头《中药大辞典》

地方名 甘肃:[羌活](文县);湖北:刺包头、雀不踏(神农架)。

功效 根皮、茎皮:祛风除湿,利尿消肿,活血止痛。

## 7212027

*Aralia continentalis* Kitagawa

植物名 东北土当归《中国植志》

药材名 东北土当归《民族药志》

文献名 长白榑木《东北木本图志》,[独活]《朝鲜植物图鉴》

地方名 河北:香桔颗。

功效 根、根茎:散风寒,祛湿,通经活络,止痛。用于风寒湿痹,腰膝酸痛,头痛,齿痛,跌打损伤,痈肿等。

## 7212028

*Aralia cordata* Thunb.

植物名 食用土当归《中国植志》

药材名 九眼独活《汇编》

文献名 土当归《纲目》,食用榑木《经植手册》,心叶九眼独活《汇编》,心叶榑木《药材学》

地方名 独活(甘肃、湖南、广西、四川、云南);安徽:[隔山香];福建:蛀虫草,刺葱公母;湖北:大活;湖南:土独活,鹅脚板,土党;广西:水白芷;四川:杜当归,鸟不栖,雀不站;贵州:九占牛。

功效 根茎:祛风燥湿,活血止痛,消肿。用于风湿性腰腿痛,腰肌劳损。

备考 《本草拾遗》所载的土当归为荷包牡丹之根,《名实图考》所载的土当归为伞形科紫花前胡。

## 7212029

*Aralia dasycphylla* Miq.

植物名 头序榑木《中国植志》

药材名 毛榑木《江西药录》

文献名 毛叶榑木《浙江药植志》,厚叶榑木、大叶榑木《广西植录》,鸡姆盼《高植图鉴》

地方名 广东:鸡姆盼、牛尾木(乐昌),雷公种(广州);广西:鸟不宿,百鸟不宿,猪脚刺。

功效 根皮及茎皮:有小毒。祛风除湿,利尿消肿,活血止痛。

## 7212030

*Aralia decaisneana* Hance

植物名 黄毛榑木《中国植志》

药材名 鹰不扑(广东、广西)

文献名 刺榑、榑木《台湾药植志》

地方名 鸟不宿(福建、广东、广西);福建:老虎刺

(清流、明溪), 老虎追草(明溪、三明), 将军刺(清流), 上花椒、白棘根(永安), 硬头棘、红梗满头棘(宁化); 台湾: 细号刺葱, 刺葱树, 刺葱, 鹊不踏; 广东: 鸟不企(广州), 大叶鸟不企, 鹰不泊, 老鸦怕, 火筒树(新会), 老鸦唔落树, 鸡鹳棒, 鸟不服(广宁、四会), 红心茨江亩(普宁), 白心筋椈树(惠阳), 刺江亩, 江亩树(潮阳), 刺葱根(揭阳), 跌死猫(潮安), 老鸦不企(东莞), 老鸦不泊树、一朵云(增城), 刺龙苞; 广西: 鸟不站, 鸟不栖, 酒筒木, 酒漏水, 筋通木, 土筋通, 鸡云木(桂平), 鸡母木(贵县), 芙蓉(平南), 雷公木(贺县); 其他: 大鹰不扑。

**功效** 根、根皮: 祛风除湿, 散瘀消肿。用于风湿腰痛, 肝炎及肾炎水肿; 叶: 用于眩晕。

## 7212031

*Aralia echinocaulis* Hand. -Mazz.

**植物名** 棘茎榎木(中国植志)

**药材名** 红榎木(浙江)

**文献名** 刺茎榎木(广西植录)

**地方名** 浙江: 红老虎刺, 鸟不踏, 红刺筒, 红毛刺桐, 红鸟不踏刺, 虎椒刺, 干枚针, 红叶大猫刺, 红叶雨伞刺, 红刺虎, 鸟不宿。

**功效** 根皮: 祛风除湿, 行气活血, 消肿解毒。用于风湿痹痛, 溃疡病, 跌打损伤, 痈疽, 骨髓炎。

## 7212032

*Aralia elata* (Miq.) Seem. --- *A. mandshurica* Seem.

**植物名** 辽东榎木(中国植志)

**药材名** 刺龙牙(东北)

**文献名** 龙牙榎木(东北木本图志), 东北榎木(中草药)

**地方名** 刺老鸦、榎木子(东北); 黑龙江: [五加皮](五常、尚志、宁安); 其他: 刺楞牙, 虎阳刺。

**功效** 根皮: 健胃, 利水, 祛风除湿, 活血止痛。用于胃、十二指肠溃疡, 慢性胃炎, 肝炎, 糖尿病, 风湿性关节炎, 水肿。

## 7212033

*Aralia elata* (Miq.) Seem. f. *subinermis* Y. C. Chu

**植物名** 少刺龙牙榎木(东北药用植物)

**地方名** 辽宁: 绵刺龙牙(宽甸)。

**功效** 根皮: 补气安神, 强精滋肾, 健胃, 利水, 祛风除湿, 活血止痛。用于神经衰弱, 风湿性关节炎, 肝炎, 慢性胃炎, 胃痉挛, 胃及十二指肠溃疡, 肾炎水肿, 糖尿病, 气虚无力, 肾虚阳痿。

## 7212034

*Aralia elegans* C. N. Ho

**植物名** 秀丽榎木(中国植志)

**药材名** 红总管(湖南蓝山)

**地方名** 广西: 小鹰不扑(桂平)。

**功效** 全株: 清热解暑, 行气止痛; 根: 用于跌打损伤。

## 7212035

*Aralia fargesii* Franch.

**植物名** 龙眼独活(中国植志)

**药材名** 牛尾参(四川会东)

**文献名** 盐源独活(西昌中草药)

**地方名** 湖北: 九眼独活、八地麻(神农架); 四川: 牛尾独活, 独活(峨眉山)。

**功效** 根: 祛风除湿, 散寒解表。用于风寒感冒, 风湿疼痛。

## 7212036

*Aralia henryi* Harms

**植物名** 柔毛龙眼独活(中国植志)

**药材名** 九眼独活(汇编)

**文献名** 大叶龙须参(黄山植物续志), 短序九眼独活(汇编), 小叶龙眼独活(中药大辞典), 短序榎木(中药志)

**地方名** 湖北: 水田七(神农架)。

**功效** 根状茎: 祛风燥湿, 活血止痛, 消肿。用于风湿性腰腿痛, 腰肌劳损。

## 7212037

*Aralia hupehensis* Hoo

**植物名** 湖北榎木(中国植志)

**地方名** 湖北: 飞天蜈蚣、白刺包头(神农架)。

**功效** 根: 活血祛瘀, 利水消肿。

## 7212038

*Aralia melanocarpa* (Levl.) Lauener --- *A. dumetorum* Hand. -Mazz.

**植物名** 黑果土当归(中国植志)

**文献名** 丛枝土当归(植分学报), 丛林榎木(汇编)

**地方名** 云南: 牛角七, 蜜油参, 白九股牛。

**功效** 根: 托毒外出, 补中益气。用于淋巴腺炎, 疔瘤, 慢性化脓性骨髓炎, 气虚头晕, 耳鸣。

## 7212039

*Aralia spinifolia* Merr.

**植物名** 长刺榎木(中国植志)

**药材名** 长刺鹰不扑(拟)

**文献名** 刺叶榎木(广西药录)

**地方名** 广西: 鸟不企(平南、贺县、钟山), 鸡云木(藤县、桂平), 鹰不扑(陆川), 雷公木(苍梧)。

**功效** 根: 驳骨, 解毒。用于头昏, 头痛, 吐血, 血崩, 风湿, 蛇咬伤, 跌打损伤。

## 7212040

*Aralia undulata* Hand. -Mazz.

**植物名** 波缘榎木(中国植志)

**文献名** 波叶榎木(广西植录)

**地方名** 湖南: “董睡”(蓝山县瑶名); 贵州: 红刺老包, 顶天刺, 三百棒。

**功效** 根: 活血通经, 行瘀止痛。用于经闭, 骨折, 劳伤疼痛, 风湿病, 跌打损伤。

## 7212041

*Aralia wilsonii* Harms --- *Pentapanax wilsonii* (Harms) Shang

**植物名** 西南榎木(中国植志)

**文献名** 小叶榎木(西昌中草药), 川西榎木(云南植志), 西南羽叶参(中国树木志)

**地方名** 四川: 岩参(会理), [土人参](会东), [柯

参](西昌)。

功效 根:补中益气。用于体虚自汗,老年性慢性咳嗽,老年性支气管炎咳嗽,风湿性心脏病。

#### 7212042

*Aralia yunnanensis* Franch.

植物名 云南龙眼独活《中国植志》

药材名 云南九眼独活(拟)

地方名 四川:小白升麻(西昌);云南:龙眼独活、牛角七、独活、大九股牛、珠钱草、松香疳药(红河),草独活(玉溪),〔桔梗〕(楚雄),九股牛(大理)。

功效 根:发散风寒,健脾利湿,强筋壮骨。用于感冒,咳嗽,胸满胁痛,腰痛,跌打损伤,风湿病,月经不调,小儿疳积。

#### 7212043

*Brassaiopsis glomerulata* (Blume) Regel

植物名 罗伞《中国植志》

药材名 鸭脚罗伞(广西、广东)、《海南植志》

文献名 柏那参《树分》,掌叶树《种称》,华丽柏那参《种分》,掌叶木《广西药录》,刺鸭脚木《广西本草选编》

地方名 广东:刺参;广西:空壳桐(隆林),七加皮,刺鸭脚;四川:树五加,五加皮。

功效 根、树皮、叶:祛风除湿,活血散瘀。用于风湿骨痛,跌打扭伤,腰肌劳损。

#### 7212044

*Brassaiopsis phanerophlebia* (Merr. et Chun) C. N. Ho  
--- *Acanthopanax phanerophlebia* Merr. & Chun

植物名 显脉罗伞《中国植志》

文献名 显脉柏氏参《植分学报》,显脉掌叶树《广西植录》

地方名 广西:三叶莲(防城)。

功效 全株:舒筋活络,祛风,壮阳。用于风湿骨痛,跌打损伤,阳痿。

#### 7212045

*Brassaiopsis tripteris* (Levl.) Rehd. --- *Heptapleurum tripteris* Levl.

植物名 三叶罗伞《中国植志》

功效 茎:用于风湿骨痛。

#### 7212046

*Dendropanax dentiger* (Harms) Merr. --- *D. chevalieri* (Vig.) Merr. --- *D. chevalieri* (Vig.) Merr. var. *dentigerus* (Harms) Li

植物名 树参《中国植志》

药材名 枫荷梨(江西草药)

文献名 枫荷桂、齿叶枫荷桂《广西植录》,谢氏杞李蓯《中国植志》

地方名 半枫荷(广东、海南、广西、安徽、福建),半枫荷(浙江、江西、湖南),梨荷枫(江西、福建),木五加(广东、广西);浙江:梨枫桃、木荷枫(临安),〔五加皮〕、鸭脚板、鸭掌柴、白山鸡骨、金鸡趾(温州),风气树(金华),半边枫(衢县、永康),札李参(杭州);江西:偏荷枫(吉水),鸭脚木(定南),三叉一枝镖;福建:鸭脚风(宁化),荷连枫(清流);湖南:小荷枫;广东:白半枫荷、白

荷、白皮半枫荷、鸭脚荷(阳春);广西:阴阳枫(桂林、梧州)。

功效 根及茎:祛风湿,活血脉。用于风湿痹痛,偏瘫,偏头痛,月经不调。

备考 半枫荷异名同品甚多,正品半枫荷应是梧桐科异叶翅子木 *Pterospermum heterophyllum* Hance

#### 7212047

*Dendropanax proteus* (Champ.) Benth. --- *D. parviflorus* (Champ.) Benth. --- *D. acuminatissimus* Merr.

植物名 变叶树参《中国植志》

药材名 白半枫荷(广东)

文献名 窄叶树参《汇编》,长尖叶木五加《广西药录》,小花木五加《广西植录》

地方名 广西:枫荷竹桂,半枫柯,三层楼;贵州:半枫荷、铁揪树、鸭公头(安龙)。

功效 根茎:祛风除湿,舒筋活血。用于风湿痹痛,半身不遂,扭挫伤,偏头痛。

#### 7212048

*Euaraliopsis ciliata* (Dunn) Hutch.

植物名 假通草《中国植志》

文献名 纤齿柏那参《植分学报增刊》,睫毛掌叶树《广西植录》

地方名 四川:水通花、水泡通(峨眉山)。

功效 根皮:清热解毒,祛风除湿。用于麻疯。

#### 7212049

*Euaraliopsis ferruginea* (Li) Hoo & Tseng --- *Dendropanax ferrugineus* Li --- *Brassaiopsis ferruginea* (Li) Hoo

植物名 锈毛掌叶树《中国植志》

文献名 锈毛树参、阴阳枫《汇编》,锈毛柏那参《植分学报》,锈毛罗伞《高植图鉴》,黄毛掌叶树《广西植录》

地方名 广西:鸡爪风(凌云),枫荷桂(龙胜)。

功效 根、茎、叶:祛风除湿,舒筋活血。

#### 7212050

*Fatsia japonica* (Thunb.) Dence. & Planch.

植物名 八角金盘《中国植志》

药材名 手树(北京)

文献名 金刚纂《中国植物图鉴》

功效 根皮及叶:用于气管炎咳嗽,咳痰不松。

#### 7212051

*Hedera helix* L.

植物名 洋常春藤《中国植志》

文献名 欧常春藤《汇编》

地方名 江苏:长春藤(南京);浙江:野脚风(天目山);四川:三角枫(成都),小风藤;贵州:三角风、大排风藤(罗甸);其他:百脚蜈蚣。

功效 全株:祛风利湿,活血消肿。

#### 7212052

*Hedera nepalensis* K. Koch var. *sinensis* (Tobl.) Rehd.  
--- *H. sinensis* Tobl.

植物名 常春藤《中国植志》

药材名 常春藤《本草拾遗》、《汇编》

文献名 土鼓藤《本草拾遗》、龙鳞薜荔《日华子本草》、尖叶薜荔《圣惠方》、三角尖、三角风《纲目》、上树蜈蚣《分类草药性》、槭枫、尖角枫《树分》、中华常春藤《汇编》

地方名 钻天风(江西、四川)、三角藤(浙江、安徽、江西、福建、广东)、三角枫(陕西、安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川、云南)、三角枫藤(浙江、湖南、四川)、爬墙虎(安徽、湖北、湖南)、风藤(上海、湖南、云南)、爬山虎(湖北、湖南、云南)、[清风藤](上海、湖南);陕西:追风藤(安康、柞水)、爬岩枫(南部、镇坪)、上天龙(略阳)、抓山虎、岩疙瘩(洵阳)、扒岩枫(宁强)、爬崖藤(佛坪);浙江:犁头南枫藤、三角箭、散骨风、三叶木莲(云和)、土枫藤(天台);安徽:枫藤;江西:枫荷梨藤、猴子草(丰城)、枫树藤(婺源);福建:豆腐石(南平)、犁头腰(宁德)、三角耙(松溪、政和)、[山葡萄];湖北:爬岩茎、爬树藤;湖南:三角香、大风藤、藤三角、百脚蜈蚣、过墙风、巴壁藤、岩骨香、巴岩风、大枫藤(常德);广东:狗姆蛇;广西:十二两、三角青、天仲(大瑶山)、下山虎(融安)、[石南藤](全州);四川:牛一枫(峨眉)、大五加皮、牛皮枫、藤三角枫;云南:岩药、树穿衣、枫叶、爬树龙(曲靖)、白杜仲(临沧)、岩筋(丽江)、风藤草、扁毛杜仲、罗蛇藤、风药;其他:木葛(日本)。

功效 全株:祛风利湿,活血消肿。用于风湿关节痛、腰痛、跌打损伤、急性结膜炎、肾炎水肿、闭经。外用于痈疽肿毒、荨麻疹、湿疹。

#### 7212053

*Hedera rhombea* (Miq.) Bean

植物名 菱叶常春藤《中国植志》

文献名 百脚蜈蚣《牧野日图》、常春藤《台湾药植志》

功效 茎叶:有毒。发汗,解热。用于衄血、痈疽或其他肿毒初起。

#### 7212054

*Hedera rhombea* (Miq.) Bean var. *formosana* (Nakai) Li

植物名 台湾菱叶常春藤《中国植志》

药材名 台湾常春藤《台湾药植志》

功效 茎、叶:发汗,解毒。

#### 7212055

*Heteropanax brevipedicellatus* Li

植物名 短梗幌伞枫《中国植志》

药材名 肉郎伞(广西平南)

文献名 短梗罗汉伞《中国植志》、短柄幌伞枫《广西植志》、短柄罗汉伞《广西药志》

功效 根和树皮:用于跌打损伤、烫火伤、疮毒。

#### 7212056

*Heteropanax chinensis* (Dunn) H. L. Li

植物名 华幌伞枫《中国植志》

药材名 罗汉伞《云南种录》

功效 根、树皮:用于疔疮、跌打损伤。

#### 7212057

*Heteropanax fragrans* (Roxb.) Seem.

植物名 幌伞枫《中国植志》

药材名 凉伞木(广西)

文献名 五加通《广西植志》

地方名 大蛇药(广东、广西);广东:牛喉、石突;广西:阿婆伞(桂林)、火蕾木、大木通。

功效 根皮、树皮:清热解毒,活血消肿,止痛。用于感冒、中暑头痛、痈疽肿毒、淋巴结炎、骨折、烧烫伤、扭挫伤、蛇咬伤;髓心:利小便。

#### 7212058

*Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz. --- *K. pictum* (Thunb.) Nakai

植物名 刺楸《救荒本草》、《中国植志》

药材名 鸟不宿《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 鸟不踏、刺根白皮(汪连仕《采药书》)、鸟不停《周益生家宝方》、晚娘棒《纲目》、老虎草、昏树《纲目拾遗》、刺楸、海东木《满洲植志》、川桐皮《汇编》

地方名 [丁桐皮](江苏、浙江、四川)、[海桐皮](东北、江苏、浙江、安徽、湖南、广西、四川)、刺儿楸(东北)、[五加皮](陕西、浙江、河南)、钉木树(贵州、安徽);吉林:茨楸;辽宁:[常山](营口);河北:云楸;陕西:刺楸皮、上山虎(洛南)、狼牙棒;山东:老虎棒子(崑崙山、崂山)、后娘棍(费县、蒙山);江苏:秃楸(云台山)、前娘棒;浙江:五叶刺楸(临安)、野海桐皮(建德)、鼓钉刺;湖北:枯钉楸(神农架);湖南:勒枫树、刺大本、刺桐树、五加刺、刺桐;广东:辣枫树;广西:有筋鸭脚木、百鸟不落;四川:钉皮、刺楸树皮、刺楸树根、鹅足板树、鹅脚板树;贵州:[刺五加]、鸭脚板叶(望谟)、刺椿(绥阳)、丁木树、刺木楸、刺秋木、鸭板叶;其他:丁皮树、丁桐树。

功效 树皮:有小毒。祛风湿,通络,止痛。用于风湿性关节炎、腰膝酸痛。外用于皮肤湿疹。

#### 7212059

*Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz. var. *maximowiczii* (V. Houtte) Hand. -Mazz. --- *Aralia maximowiczii* V. Houtte --- *Acanthopanax ricinifolium* Seem. var. *maximowiczii* Schneid. --- *Kalopanax ricinifolium* Miq. var. *maximowiczii* Nakai --- *Acanthopanax septemlobum* Koidz. var. *maximowiczii* Cheng --- *Kalopanax pictum* (Thunb.) Nakai f. *maximowiczii* Hara --- *Kalopanax pictum* (Thunb.) Nakai var. *maximowiczii* Hara ex Li

植物名 深裂刺楸《中国植志》

药材名 丁桐皮《东北药用植物》

功效 根皮或树皮(丁桐皮):祛风除湿,清热祛痰,活血止痛,杀虫。用于风湿痹痛、腰膝酸痛、肾炎水肿、跌打损伤、赤白久痢、内痔便血、痢疾、疮癣;茎枝:追风,行血。用于风湿痹痛、紫云风、胃痛。

#### 7212060

*Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz. var. *magnificum* (Zabel) Hand. -Mazz.

植物名 毛叶刺楸《中国植志》

地方名 湖北:鼓钉楸(神农架)。

功 效 树皮:祛风除湿,活血。

7212061

*Macropanax orophyllum* Miq. --- *M. floribundum* Miq.

植物名 大参《中国植志》

地方名 贵州:油散木。

功 效 根:健脾理气,舒筋活络。用于小儿疳积,筋骨疼痛。

7212062

*Macropanax rosthornii* (Harms) C. Y. Wu ex Hoo

植物名 短梗大参《中国植志》

药材名 七角风《贵州草药》

文献名 节梗大参《广西植志》,卢氏梁王茶《中国植志》,七角风《汇编》

地方名 湖南:七叶风,〔七叶莲〕;广西:小五加;贵州:接骨丹,小豆鼓干,五爪金。

功 效 根、叶:祛风除湿,活血。用于风湿痛,骨折。

7212063

*Nothopanax davidii* (Franch.) Harms ex Diels --- *N. latifolius* Hand. -Mazz.

植物名 异叶梁王茶《中国植志》

文献名 阔叶良旺茶《云南药录》,树五加《峨眉药志》,梁王茶《种分》,大卫梁王茶《经植手册》

地方名 湖北:树参(神农架);四川:三叶枫,五爪枫,通药,五皮风;贵州:梗木;云南:良旺茶,良旺头,白鸡骨头树,金刚散,山槟榔,凉碗茶,闷头黄(镇雄),细叶五加,鸡骨头叶,三叶树,小五加皮,金钢尖,阔叶假参,小白鸡骨头,汉五加。

功 效 根皮:祛风湿,通经止痛,生津止渴。用于月经不调,风湿性关节炎,肩关节周围炎,跌打损伤。

7212064

*Nothopanax delavayi* (Franch.) Harms ex Diels

植物名 掌叶梁王茶《中国植志》

文献名 良旺头《名实图考》,梁王茶《科属词典》,良旺茶《汇编》,台氏梁王茶《种分》

地方名 四川:康滇假参,香根,香广(会东),羊毛茶(会理);贵州:(兰花),小牛角兰;云南:宝金刚,金刚树(思茅),白鸡骨头树(红河),金刚散、山槟榔(丽江),“雅害黑”(傣名),金刚尖,良旺头,良王茶,羊毛金刚,凉碗茶(昆明),“给厦”(苗名)。

功 效 全株或根:清热解毒,活血舒筋。用于急性咽炎,急性结膜炎,消化不良,风湿腰腿疼。外用于骨折,跌打损伤。

7212065

*Oplopanax elatus* Nakai --- *Echinopanax elatum* Nakai

植物名 刺参《中国植志》

药材名 刺参(吉林)

文献名 东北刺人参《吉野》,刺人参《吉林中草药》

功 效 根:解热,镇咳。据国外研究,谓“刺人参近似人参作用”,有待进一步研究。

7212066

*Panax ginseng* C. A. Mey. --- *P. schin-seng* Nees

植物名 人参《中国植志》

药材名 人参《本经》、《药典》

文献名 人衔、崑崙《本经》,参《说文解字》,土精、血参、神草、人微、黄参、玉精《吴普本草》,皱面还丹、人菱、地精、海腹《广雅》,紫团参《唐本草》,白尺杵、上党人参、潞州人参《附经》,人参芦《本草蒙筌》,上党参、孩儿参《纲目》,人参须〔茎基〕《本经逢原》,人参条、参叶《本草从新》,人参子、东洋参《纲目拾遗》,人参叶《伪药条辨》,人菱、白物、黄石、楝参、百济参、白修参、辽东参、皱面丹、别直参、高丽参《新纲》,人参花《中药志》,萝卜七《植分学报》,人精、人祥《中草药》,园参〔栽培品〕,山参〔野生品〕,移山参〔人工移植后加工品〕,野山参、野山参水子、移山参水子〔鲜根〕,园参水子〔园参主根〕,生晒参〔园参去小根晒干或烘干〕,白干参〔主根去表皮生晒〕,全须生晒参〔未去须根者〕,红参〔蒸制品〕,边条参、边条红参〔红参带较长支根者〕,红参须〔蒸制过的红参支根〕,白参须〔园参的小支根或须根〕,糖参〔糖浸制品〕,掐皮参〔加工类似糖参〕,大力参〔煮后晒下〕《中药大辞典》,生晒山参《药典》,野山人参、吉林野参、吉林人参、吉林参、老人参、移山人参、石柱参、条参、朝鲜人参、朝鲜参、朝鲜红参、朝鲜白参、皮尾参〔幼小移山参加工品〕、人参条、人参须、参须、参须尖〔常用中药名辨〕

地方名 棒槌(东北);吉林:皇封参,长白人参,白直须,红直须,白弯须,红弯须。

功 效 根:大补元气,复脉固脱,补脾益肺,生津,安神。用于体虚欲脱,肢冷脉微,脾虚食少,肺虚喘咳,津伤口渴,内热消渴,久病虚羸,惊悸失眠,阳痿宫冷,心力衰竭,心原性休克;叶:清肺,生津,止渴。

备 考 1.《本草图经》之上党人参、潞州人参,从《证类本草》转载药图观之,其叶轮生,复叶由五小叶组成,伞形花序顶生,可以断定为五加科人参,而非桔梗科党参。2.《本经逢原》之竹节参系指参芦而言。

7212067

*Panax japonicum* C. A. Mey. --- *P. pseudo-ginseng* Wall. var. *japonicum* (C. A. Mey.) Hoo & Tseng

植物名 竹节参《中药志》

药材名 竹节参《药典》

文献名 土参、土精、血参《花镜》,竹节三七《百草镜》,〔人参三七〕、参叶、竹节人参、昭参《纲目拾遗》,甜七、竹根七《草木便方》,竹鞭人参、节人参《和汉药物学》,竹节人参《中国药植志》,珠子七《高植图鉴》,疙瘩七、竹节七、竹七《形性鉴别》

地方名 白三七(江西、湖北、湖南、四川),野三七(江西、广西、云南),竹鞭三七(浙江、湖南、云南),罗汉三七(湖北、湖南、云南),竹三七(浙江、安徽);陕西:扭子七,扭子七,七叶子,定风草;甘肃:孩儿参;浙江:竹节参叶;安徽:龙须参(黄山);湖南:七参,九节龙,大五爪,扣子三七,竹叶莲,算盘七;广西:蜈蚣七,马鞭七(全州),野田七;四川:萝卜七(屏山),峨三七、峨眉三七(峨眉),芋儿七〔肉质根〕,竹漆,竹根漆;贵州:水三七(梵净山);云南:萝卜参(彝良),人竹根七(昭通),大

竹根, 竹七参, 美姑, 明七, 竹子七, 竹子三七。

功效 根茎: 滋补强壮, 散瘀止痛, 止血, 祛痰。用于病后虚弱, 劳嗽咯血, 痰多, 咳嗽, 跌扑损伤。

#### 7212068

*Panax japonicus* C. A. Mey. var. *angustifolius* (Burk.) Cheng et Chu --- *P. pseudo-ginseng* Wall. var. *angustifolia* (Burk.) Li

植物名 狭叶竹节参《云南植志》

药材名 狭叶竹节参《广西药录》

文献名 狭叶假人参《中国植志》

地方名 广西: 土田七(田林); 四川: 竹根七, 竹漆, 峨三七, 柳叶三七(峨眉); 云南: 土三七(腾冲), 鸡头七, 野三七(龙陵), 藏三七。

功效 根茎: 滋补强壮, 散瘀止痛, 止血, 祛痰。

#### 7212069

*Panax japonicus* C. A. Mey. var. *bipinnatifidus* (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng --- *Panax pseudo-ginseng* Wall. var. *bipinnatifidus* (Seem.) Li --- *Panax bipinnatifidum* Seem.

植物名 羽叶三七《中国植志》

药材名 珠子参《药典》

文献名 扭子三七《中国药植志》, 复羽裂参《种分》, 兴山三七, 羽叶参《植分学报》, 扭子七《药典》

地方名 竹根七(湖北、四川), 花叶三七(四川、西藏); 青海: 土三七; 湖北: 扣子七, 扭子七(神农架); 广西: 乌七、火七(全州); 四川: 黄连七、扭子七(茂汶), 羽叶扭子七(西昌), 黄连三七, 峨三七, 竹漆; 云南: 羽叶七、疙瘩七(中甸)。

功效 根茎: 补肺, 养阴, 活络, 止血。用于气阴双亏, 烦热口渴, 虚癆咳嗽, 跌扑损伤, 关节疼痛, 咳血, 吐血, 外伤出血。

#### 7212070

*Panax japonicus* C. A. Mey. var. *major* (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng --- *P. major* (Burk.) Ting --- *Panax pseudo-ginseng* Wall. var. *elegantior* (Burk.) Hoo & Tseng

植物名 大叶三七《汇编》

药材名 珠子参《药典》

文献名 珠儿参《本草从新》, 珠参、草根《纲目拾遗》, 扭子三七、七药子《中国药植志》, 雪三七《品种论述》, 秀丽假人参《中国植志》

地方名 扭子七(陕西、甘肃、湖北、四川、云南), 扣子七(陕西、湖北、四川、西藏), 参叶子(陕西、四川), 土三七(青海、四川、云南); 安徽: 龙须参; 湖北: 大型竹节参, 小叶扣子七(神农架); 湖南: 珠珠参(常德); 四川: 三叉五叶一支花、七叶子(南江), 七叶, 参叶, 芋儿七; 云南: 盘七(曲靖), 大药子。

功效 根茎: 补肺, 养阴, 活络, 止血。用于气阴双亏, 烦热口渴, 虚癆咳嗽, 跌扑损伤, 关节疼痛, 咳血, 吐血, 外伤出血。

#### 7212071

*Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen --- *Panax pseudo-*

*ginseng* Wall. var. *notoginseng* (Burk.) Hoo et Tseng --- *Panax sanchi* Hoo

植物名 三七《中国植志》

药材名 三七《纲目》、《药典》

文献名 山漆、金不换、三七叶《纲目》, 血参《医林纂要》, 参三七《本草便读》, 田三七、田漆《伪药条辨》, 昭参、铜皮铁骨、苏家三七、苏三七、人参三七《纲目拾遗》, 春七[种后第3~4年秋季开花前采挖]、冬七[11月种子成熟后采挖]、三七头子[主根]、剪口[芦头]、筋条[较粗支根]、绒根[细小支根及须根]、旱三七《中药志》

地方名 蜈蚣七(广西、云南); 安徽: 广三七, 汉三七; 广西: 田七, 田七参; 四川: 盘龙七; 云南: 滇三七(曲靖), 三七花, [血见愁], 剪口三七; 其他: 滇七, 三七参, 开花三七, 狗头三七, 参叶。

功效 根: 散瘀止血, 消肿定痛。用于咯血, 吐血, 衄血, 便血, 崩漏, 外伤出血, 胸腹刺痛, 跌扑肿痛; 叶: 止血, 消肿, 定痛。用于衄血, 便血, 外伤出血, 痈肿毒症; 花: 清热平肝, 降压。用于高血压, 头昏, 目眩, 耳鸣, 急性咽喉炎。

#### 7212072

*Panax pseudo-ginseng* Wall.

植物名 喜马拉雅人参《药理学学报》

药材名 西藏参三七(拟)

文献名 假人参、[人参三七]《中国植志》

功效 根茎和肉质根: 止血散瘀, 消肿定痛, 滋补强壮。用于跌打损伤。

#### 7212073

*Panax quinquefolius* L.

植物名 西洋参《中国植志》

药材名 西洋参《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 西洋人参《本草从新》, 洋参《药性考》, 西参《伪药条辨》, 美国人参《新纲》, 花旗参、广东人参、粉光西洋参、原皮西洋参《中国药植志》, 美洲人参《药理学学报》, 野原皮[野生品]、种原皮[栽培品]、野山参、正光、正光结、粉光、正面参、野顶光[去皮野生品]、种参、光结、种面参、种顶光、白拆尾[去皮栽培品]《药材学》

地方名 上海: 法兰参, 顶顶光; 江苏: 种洋参(南京)。

功效 根: 益肺阴, 清虚火, 生津止渴。用于肺虚久嗽, 失血, 咽干口渴, 虚热烦倦。

#### 7212074

*Panax stipuleanatus* H. T. Tsai et K. M. Feng

植物名 屏边三七《云南植志》

药材名 屏边三七《汇编》

地方名 云南: 土三七(马关), 白三七、竹节七(红河), 香刺(屏边), 野三七(马关、麻栗坡)。

功效 根茎: 舒筋活络, 补血止血。

#### 7212075

*Panax zingiberensis* C. Y. Wu & K. M. Feng et C. Chow et al.

植物名 姜状三七《中国植志》

文献名 鸡骨七《汇编》  
地方名 云南:野三七(思茅、文山、蒙自),鸡蛋七(思茅)。  
功效 根茎:散瘀止痛,疗伤出血。

## 7212076

*Pentapanax henryi* Harms

植物名 锈毛五叶参《中国植志》  
文献名 圆锥五叶参《高植图鉴》  
地方名 云南:马肠子树(砚山),大麻漆。  
功效 茎皮、根皮:除风湿,散寒,止痛。

## 7212077

*Pentapanax henryi* Harms var. *wangshanensis* Cheng

植物名 黄山锈毛五叶参《中国植志》  
文献名 黄山五叶参《中药材科技》  
功效 茎皮、根皮:除风湿,散寒,止痛。

## 7212078

*Pentapanax leschenaultii* (Wight & Arn.) Seem.

植物名 五叶参《中国植志》  
文献名 羽叶五加《种称》,光叶五叶参《红河中草药》,羽叶参《中国树木志》  
地方名 云南:石头菜、石夹参、石夹枫(红河),岩五加。  
功效 茎皮、根皮:除风湿,散寒,止痛。用于关节痛,胃痛。

## 7212079

*Polyscias fruticosa* (L.) Harms --- *Panax fruticosum* L.  
--- *Nothopanax fruticosum* (L.) Miq.

植物名 南洋参《中国植志》  
文献名 槭叶假蕨《台湾药植志》,木川芎《广西药园药录》  
地方名 台湾:土三七。  
功效 全株:用于热病,神经痛,风湿痛;叶、根:利尿。用于结石,尿砂,小便困难。

## 7212080

*Schefflera arboricola* Hay.

植物名 鹅掌藤《中国植志》  
药材名 七叶莲《中药大辞典》  
文献名 小叶鸭脚木《广西中草药》  
地方名 七叶烂(湖南、广东、贵州),七加皮(湖南、海南、广西),汉桃叶(湖南、广西);台湾:狗脚蹄;广西:手树,七叶藤,七豆(武鸣),鸡鸭脚(北流),七张叶、七朵(忻城),有勒鸭脚(博白),七指木(龙州),凉茶,汉桃,七多(靖西)。  
功效 根或茎叶:祛风除湿,活血止痛。用于风湿痹痛,胃痛,跌打骨折,外伤出血。

## 7212081

*Schefflera cinnamomifoliolata* Shang

植物名 樟叶鹅掌柴《广西药录》  
地方名 广西:火柴木(龙州)。  
功效 叶:用于跌打肿痛。

## 7212082

*Schefflera delavayi* (Franch.) Harms ex Diels --- S.

*delavayi* (Franch.) Harms var. *ochracea* Hand. -Mazz. --- *Agalma delavayi* (Franch.) Hutch.

植物名 穗序鹅掌柴《中国植志》

药材名 大泡通(四川、贵州)

文献名 塔树《指示植物》,绒毛鸭脚木《广西本草选编》,德氏鸭脚木《植分学报》

地方名 假通脱木、柴厚朴(四川、贵州),大加皮、大五加皮(湖南、广西),隔子通(四川、云南);湖南:大风叶,香五加,五爪风;广西:五加皮(全州、钟山),山五加(贺县),厚皮茶(桂平),大风柏(北流);四川:生肌散(米易),上厚朴(会理),万贯钱、格格通、树五加、大通花、支子皮(峨眉);贵州:大通塔,伞把木;云南:野巴戟,大通,大通草,山加皮,云南鹅掌柴,厚朴草。

功效 根或茎:祛风活络,补肝肾,强筋骨。用于骨折,扭挫伤,腰肌劳损,风湿关节痛,肾虚腰痛,跌打损伤恢复期。

## 7212083

*Schefflera glomerulata* Li

植物名 球序鹅掌柴《中国植志》  
药材名 七甲皮(云南马关)  
文献名 团花鸭脚木《广西植录》  
地方名 广西:七斗,七叶莲(龙州),汉桃叶(乐业);云南:〔五加皮〕。  
功效 根及树皮:用于跌打损伤,风湿性关节炎,骨折,肝硬化腹水。

## 7212084

*Schefflera hypoleuca* (Kurz) Harms

植物名 白背鹅掌柴《中国植志》  
药材名 牛嗓管《红河中草药》  
文献名 白背叶鹅掌柴《云南植志》,白叶鸭脚木《广西植录》  
地方名 大木通、大泡通(贵州、云南);四川:隔子通、豆豉叶(南川);贵州:大豆豉叶(榕江),饭包叶(剑河),三叉木(望谟),伞把木(都匀),大通塔(镇远),柴厚朴(绥阳);云南:野巴戟、泡通树、伞托树(红河),牛嗓管叶,泡通。  
功效 根、茎、树皮、叶:消肿止痛,祛风除湿,舒筋活络,通便;根、茎:用于牙痛,胃痛,腹痛,便秘,跌打损伤,闭合性骨折;树皮:用于风湿麻木,关节肿痛,跌打瘀痛,腰膝酸痛,胃痛;叶:用于皮炎,湿疹,风疹。

功效 根、茎、树皮、叶:消肿止痛,祛风除湿,舒筋活络,通便;根、茎:用于牙痛,胃痛,腹痛,便秘,跌打损伤,闭合性骨折;树皮:用于风湿麻木,关节肿痛,跌打瘀痛,腰膝酸痛,胃痛;叶:用于皮炎,湿疹,风疹。

## 7212085

*Schefflera khasiana* (C.B. Clarke) Vig.

植物名 扁盘鹅掌柴《中国植志》  
药材名 七叶加《云南药录》  
文献名 印度鹅掌柴《云南植志》,西南鹅掌柴《云南中草药》

地方名 云南:龙爪树、鸭脚木、七叶莲(红河)。

功效 茎皮、叶:祛风除湿,止痛。用于跌打损伤,风湿关节疼痛,胃痛,感冒,皮炎,湿疹。

## 7212086

*Schefflera kwangsiensis* Merr. ex Li

植物名 广西鹅掌柴《中国植志》

药材名 汉桃叶《药典》

文献名 广西鸭脚木《广西植录》

地方名 广西：七叶莲(那坡)，七多(上林)。

功效 茎枝或带叶茎枝：祛风止痛，舒筋活络。用于三叉神经痛，神经性头痛，坐骨神经痛，风湿关节痛。

#### 7212087

*Schefflera lociana* Grushv. et N. Skvorts. var. *megaphylla* Shang

植物名 龙州鹅掌柴《广西药录》

地方名 广西：大叶鸭脚木(天等)。

功效 叶：用于骨折，跌打损伤。

#### 7212088

*Schefflera metcalfiana* Merr. ex Li

植物名 多叶鹅掌柴《中国植志》

药材名 伞叶半枫荷《中草药通讯》

文献名 上思鸭脚木《广西植录》

地方名 广西：半枫荷，半荷枫，伞状枫荷(上思、东兴)。

功效 根、茎皮：用于风湿病。

#### 7212089

*Schefflera minutistellata* Merr. ex Li

植物名 星毛鸭脚木《中国植志》

文献名 小星鸭脚木《广西植录》，微星毛鸭母树《中国植志》，星毛鹅掌柴《云南种录》，小泡通树《元江哈尼族药》

地方名 江西：九龙探亲；广东：鸭麻木；广西：七加皮(鹿寨)；云南：“卡汤”(元江哈尼语)。

功效 根、根皮、茎：发散风寒，舒筋接骨。用于风寒感冒，骨折。

#### 7212090

*Schefflera octophylla* (Lour.) Harms

植物名 鹅掌柴《中国植志》

药材名 鸭脚木《汇编》

文献名 鸭脚木皮、鸭脚皮《岭南采药录》，鸭母树《种称》

地方名 鸭脚树(福建、广东、广西)，伞托树(湖南、广东)，甘蒲叶(广西、云南)，七叶莲(广东、云南)；浙江：角叶鸭踏菜，鸭踏柴(温州)；江西：鹅掌藤，七加皮；福建：江牡(龙溪、晋江)，鹅脚木，猴接骨；台湾：江某，江母，脚母树，鸭母右，鸭麻瓜，鸭踏木，公母；湖南：夫麻；广东：细叶鸭脚木(从化、增城、南海、河源、兴宁、乐昌)，细种鸭脚(合浦)，鸭魁掌、白腊苗(东莞)，细叶鸭脚麻(惠阳)，鸭麻骨(英德)，鸭麻甲(粤北)，江亩(潮安)，鸭麻蹄树(兴宁)；海南：江补叶(澄迈、琼海)，江斧；广西：鸭姆加、西加皮(陆川)，大罗伞(贵县)，有刺鸭脚木(北流)，鸭脚罗伞(桂平)，九接牛(龙州)，七刃木，七星剑，八叶五加，七莛，腊鸭脚，五指通，高郎伞，大鸭脚木，[五加皮]，花心木皮；云南：龙爪叶，公母树，汉桃叶、鸭脚板(文山)，小叶鸭脚木，汉桃树。

功效 根皮、根、叶：清热解暑，散瘀消肿；根皮：用于感冒发热，咽喉肿痛，风湿骨痛，跌打损伤；叶：外用于过敏性皮炎，湿疹。

#### 7212091

*Schefflera odorata* (Blanco) Merr. et Rolfe

植物名 香鹅掌柴《台湾药植志》

功效 树皮：用于咳嗽；叶：用于坏血病。

#### 7212092

*Schefflera parvifoliolata* Tseng et Hoo

植物名 小叶鹅掌柴《中国植志》

药材名 小叶七叶莲(拟)

文献名 七叶莲《元江哈尼族药》

地方名 云南：“见的那雌”(元江哈尼语)。

功效 全草：祛风逐湿，舒筋活络，止血止痛。用于风湿麻木，跌打损伤，咯血，吐血，便血。

#### 7212093

*Schefflera venulosa* (Wight et Arn.) Harms

植物名 密脉鹅掌柴《中国植志》

文献名 密脉鸭脚木《广西植录》，七叶藤、七加皮、狗脚蹄《汇编》

地方名 七叶莲(湖南、云南)；云南：五加风、木克实(思茅)，[五加皮]，汉桃叶，龙爪树。

功效 茎及叶：止痛散瘀，消肿；茎：用于跌打损伤，风湿关节痛，胃及十二指肠溃疡疼痛；叶：外用于外伤出血。

#### 7212094

*Tetrapanax papyrifera* (Hook.) K. Koch

植物名 通脱木《本草拾遗》、《中国植志》

药材名 通草《本草拾遗》、《药典》

文献名 寇脱《山海经》，离南、活茺、倚南《尔雅》，葱草《本草汇言》，白通草《药性切用》，通草花《花镜》，通花《草木便方》，通棍《药材学》，方草《中草药学》，通草木《科裁》，方通草、丝通草、马蔺花《中药大辞典》，空心通草《鉴别手册》

地方名 大通草(陕西、湖北、湖南、广西、四川、云南)；泡通(安徽、四川、贵州)，通花根(贵州、云南)，大通塔(湖南、广西)；浙江：土黄芪(临安)，大叶王(江山)；安徽：通木，通打根；台湾：花草；湖南：五加风，宽肠，五角加皮，大叶五加皮；广西：五加通(全州)，老虎风(贺县)，五爪风，五甲通，方通，大通；四川：花泡通，水龙泡；贵州：通大海，通达根；云南：紫金莲(昭通、鲁甸)，木通树(丽江)，天麻子(西畴)，通大根，通根(文山)，白龙须(昭通)。

功效 茎髓：清热利尿，通气下乳。用于湿热尿赤，淋病涩痛，水肿尿少，乳汁不下；花蕾：用于男子阴囊下坠；根：行气，利水，消食，下乳。用于水肿，淋病，食积胀满，乳汁不通。

#### 7212095

*Trevesia palmata* (Roxb.) Vis.

植物名 刺通草《中国植志》

药材名 天罗伞(广西玉林)

文献名 广叶参《科属词典》，柃树《树分》

地方名 广西：脱树，脱萝，党楠(龙州)；云南：柃木，“挡凹”(西双版纳傣语)。

功效 根、叶：用于跌打损伤，创伤，腰痛，滋补强



叶。

### 7212096

*Tupidanthus calyptratus* Hook. f. et Thoms.

植物名 多蕊木《中国植志》

文献名 脱辟木《树分》

地方名 贵州:〔朱砂莲〕(兴义),老虎鞭(黄平);云南:〔七叶莲〕(勐连),大七叶莲,龙爪叶,“单盾”(傣语)。

功效 茎、叶:舒筋活络,散瘀止痛,行气除湿。用于跌打损伤,骨折痛,风湿骨痛,肝炎,感冒,神经痛;根:解热,止痛。

## 7213 伞形科 Umbelliferae

### 7213001

*Acronema schneideri* Wolff

植物名 丽江丝瓣芹《中国植志》

文献名 丝瓣芹《品种论述》,线叶丝瓣芹《云南种录》

地方名 云南:〔竹叶防风〕(玉龙山)。

功效 根:解表祛风,胜湿。

### 7213002

*Aegopodium alpestre* Ledeb.

植物名 东北羊角芹《中国植志》

地方名 小叶芹(吉林、辽宁);黑龙江:山芹菜(伊春)。

功效 地上部分:用于眩晕。外用干风湿疼痛。

### 7213003

*Ammi visnaga* (L.) Lam.

植物名 阿米芹《中国植志》

功效 果实:用于冠状动脉性疾病,如狭心症,冠脉血栓症等。

备考 欧州民间用于泌尿系统疾患和通经。

### 7213004

*Anethum graveolens* L.

植物名 莳萝《本草拾遗》、《中国植志》

药材名 莳萝子《中药大辞典》

文献名 时美中《侯宁极《药谱》》,慈谋勒《开宝本草》,莳萝椒《本草蒙筌》,瘕谷茴香《本草正义》,香莳萝《济南植录》,臭小茴《鉴别手册》

地方名 〔小茴香〕(吉林、辽宁、山西、甘肃、内蒙古、广西、四川),土茴香(黑龙江、广西),野茴香(甘肃、广西、四川),马芹(华南);黑龙江:洋茴香(哈尔滨);天津:北茴香;甘肃:野小茴;上海:香草;广西:〔茴香〕(凤山),川茴(桂平)、〔大茴香〕(大瑶山)。

功效 果实:温脾胃,开胃,散寒,行气,解鱼肉毒。用于痧秽呕逆,腹中冷痛,寒疝,痞满少食;嫩茎叶:下气,利膈。

备考 许多地方以莳萝子误作小茴香入药。小茴香为 *Foeniculum vulgare* Mill. 之果实;两者不宜混用,应注意鉴别。

### 7213005

*Angelica acutiloba* (Sieb. et Zucc.) Kitag. --- *Lig-*

*ticum acutilobum* Sieb. et Zucc.

植物名 东当归《高植图鉴》

药材名 东当归《汇编》

文献名 日本药用当归《增订本草图说》,当归《本草图谱》,地仙园《和汉药考》,大芹、白蕲、乾归、象马、女三天、夷灵芝、僧庵草《新纲》,日本当归《药材学》,延边当归《汇编》,大深当归、大和当归、本口当归《台湾药植志》,大和归《鉴别手册》,倭当归《朝鲜》《品种论述》

地方名 吉林:朝鲜当归,“刀党贯”(延边朝语)。

功效 根:补血和血,调经止痛,润燥滑肠。用于月经不调,经闭腹痛,瘀血结聚,崩漏,血虚头痛,眩晕,痿痹,肠燥便秘,赤痢后重,痈疽疮疡,跌打损伤。

### 7213006

*Angelica acutiloba* (Sieb. et Zucc.) Kitag. f. *iwatensis* Hikino

植物名 仙台当归《台湾药植志》

药材名 仙台当归《台湾药植志》

文献名 越后当归、伊吹当归、岩手当归、本口当归、大和当归、日本当归《台湾药植志》

功效 根:补血和血,调经止痛,润燥滑肠。

备考 本品原产日本,现台湾有引种栽培。

### 7213007

*Angelica acutiloba* (Sieb. et Zucc.) Kitagawa f. *sugiyamae* Hikino

植物名 北海当归《台湾药植志》

文献名 北海当归、北海道当归、大和当归、外口当归《台湾药植志》

功效 根:补血和血,调经止痛,润燥滑肠。

备考 本品原产日本,现台湾有引种栽培。

### 7213008

*Angelica acutiloba* (Sieb. et Zucc.) Kitagawa f. *tsukubana* Hikino

植物名 常陆当归《台湾药植志》

文献名 本口当归、大和当归、日本当归《台湾药植志》

功效 根:补血和血,调经止痛,润燥滑肠。

备考 本品原产日本,现台湾有引种栽培。

### 7213009

*Angelica amurensis* Schischk. --- *A. anomala* auct. non Ave-Lall.

植物名 黑水当归《中国植志》

药材名 朝鲜白芷《品种论述》

文献名 朝鲜当归《东检》,阿穆尔独活《鉴别手册》,黑龙江当归《高植图鉴补编》

地方名 黑龙江:水大活(依兰);吉林:土当归(琿春、汪清、和龙、延吉);辽宁:叉子芹,碗儿芹(本溪)。

功效 根:散风除湿。

### 7213010

*Angelica anomala* Ave-Lall.

植物名 白山独活《东检》

药材名 白山独活《东北草本植志》

文献名 库页白芷、异形当归《高植图鉴补编》,狭叶

当归《长白山植药志》，额水独活《东检》

地方名 黑龙江：香棒，香大活、水大活（依兰）。

功效 根：祛风胜湿。

备考 过去文献常误认本品为川白芷，其实本品只分布于东北及内蒙古，且根部含两种有毒香豆素为白芷所无，与白芷实不相同。

7213011 见 7213130a

7213011a

*Angelica biserrata* (Shan et Yuan) Yuan et Shan --- *A. pubescens* Maxim. f. *biserrata* Shan et Yan --- *A. pubescens* auct. non Maxim.

植物名 独活《药典》

药材名 独活《本经》、《药典》

文献名 独摇草《别录》，独滑《本草蒙筌》，长生草《纲目》，毛白芷《药材学》，毛当归、重齿毛当归《高植图鉴》，毛独活《汇编》，柔毛当归《广西药录》，重齿当归《中国植志》

地方名 水独活（安徽、广西），香独活（浙江、湖北、广西），大活（安徽、湖北），玉活（江西、湖北），浙独活（浙江、湖南），续独活（安徽、江苏），川独活、肉独活（四川、陕西）；湖北：山大活，巴东独活，恩施独活，资丘独活，野独活，羌活（神农架）。

功效 根：祛风除湿，通痹止痛。用于风寒湿痹，腰膝疼痛，少阴伏风头痛。

备考 《中国植志》55(3): 37, 1992 注称：毛当归 *Angelica pubescens* Maxim. 产日本。

7213012

*Angelica cartilagino-marginata* (Makino) Nakai var. *foliosa* Yuan et Shan --- *A. cartilagino-marginata* auct. non Nakai

植物名 骨缘当归《中国植志》

药材名 山蕪本《江苏植药志》

地方名 江苏：土蕪本、野芹菜（苏州），药芹桔、蕪本（清江）。

功效 全草：祛风散寒。

7213013 见 7213023a

7213014

*Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav.

植物名 大活《东北草本植志》

药材名 东北大活《汇编》

文献名 达呼尔白芷《药材学》，白芷《中国植志》，独活《东北药植志》，和白芷《日本》《品种论述》，河北独活《北京植志》

地方名 香大活（东北），走马芹（东北、内蒙古），走马芹筒子（黑龙江、吉林），狼山芹（黑龙江、内蒙古）。

功效 根：祛风除湿，通痹止痛。

7213015

*Angelica dahurica* cv. *Hangbaizhi* --- *A. dahurica* var. *pai-chi* Kimura --- *A. dahurica* var. *formosana* auct. non (de Boiss.) Shan et Yuan

植物名 杭白芷《中国植志》

药材名 白芷《本经》、《药典》

文献名 浙白芷《经植手册》，川白芷《品种论述》，台湾当归《中药大辞典》

地方名 浙江：香白芷；台湾：大本山芹菜，台湾白芷，台湾独活，独活；贵州：白法罗海；云南：吴白芷。

功效 根：散风除湿，通窍止痛，消肿排脓。用于感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿痛。

7213016

*Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav. cv. *Qibaizhi* --- *A. dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) auct. non Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav.

植物名 祁白芷《中国植志》

药材名 白芷《本经》、《药典》

文献名 蕪、芷《楚辞》，芳香《本经》，蕪、苻离、泽芬、葩《吴普本草》，白芷、莞、苻离、蕪麻《别录》，香白芷《夷坚志》

地方名 内蒙古：“苏格巴”、“不路各尔匝克”（蒙名），龙牙香；安徽：毫白芷（亳县）；台湾：大本山芹菜，山芹菜；河南：禹白芷、会白芷（禹县、长葛）；湖北：鄂白芷；四川：老川白芷（崇庆）。

功效 根：散风除湿，通窍止痛，消肿排脓。用于感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿痛。

备考 《中药材品种论述》(1984)称：过去植物学和药学文献都将白芷学名订为 *A. dahurica*，这样就把东北野生的大活和广大地区栽培的白芷混为一谈。而二者植物形态、药材性状及气味、功效均有差异，因此将白芷作为东北大活之变型处理。

7213017

*Angelica decursiva* (Miq.) Franch. et Sav. --- *Peucedanum decursivum* (Miq.) Maxim. --- *Porphyros-cias decursiva* Miq.

植物名 紫花前胡《药典》

药材名 前胡《药典》

文献名 滁州当归《图经》，〔杜当归〕《救荒本草》，历阳当归《纲目》，〔土当归〕《名实图考》，全胡、〔血藤〕、射香菜、蜘蛛菜《新纲》，满胡、西天蔓《和汉药物学》，〔家当归〕《药学报》，连叶前胡《西昌中草药》，鸭脚七、野辣菜、山芫荽、桑根子苗《中药大辞典》

地方名 麝香菜（甘肃、青海、安徽、湖南），〔当归〕（湖北、四川），野当归（西南），〔独活〕（浙江、江西、广西），土独活（福建、广西）；陕西：南前胡；江苏：山独活（宜兴）；浙江：小独活（临海、乐清），冬前胡（奉化），大猫脚趾（龙泉、云和）；安徽：榔参，草当归（和县）；江西：野香芹（泰和），七棱麻；湖北：野白芷（神农架）；湖南：老虎爪（江华），芹菜七、鸭脚板（武冈），蜘蛛草（衡山），鸭脚当归，鸭脚前胡；广东：土前胡（英德、曲江、连江、南雄），金鸡爪（英德），大叶三步猫（佛冈），涯鹰爪（连南）；广西：鱼骨草、守姑草（桂林），〔白芷〕（梧州），土羌活（陆川），马连鞍（资源、罗城、忻城、环江），山前胡；四

川:水前胡(西昌),长前胡(温江),信前胡、光前胡(万县),大柴胡、臭野胡萝卜(广元);贵州:[牛尾独活];其他:香前胡。

功效 根:散风清热,降气化痰。用于风热咳嗽痰多,痰热喘满,咯痰黄稠。

## 7213018

*Angelica decursiva* (Miq.) Franch. et Sav. f. *albiflora* (Maxim.) Nakai --- *Peucedanum decursivum* Maxim.  $\beta$  *albiflorum* Maxim. --- *Porphyroscia decursiva* Miq. f. *albiflora* (Maxim.) Nakai

植物名 鸭巴前胡《东北草本植志》

药材名 鸭巴前胡《东北药用植物》

文献名 白花日本前胡《东检》

地方名 辽宁:大鸭巴芹(丹东),独梗芹、鸭巴芹(庄河),黑瞎子芹、碗儿芹(凤城),叉子芹(新宾)。

功效 根:散风清热,降气化痰。用于感冒,上呼吸道感染,肺热咳嗽,咳喘痰多,风热头痛,呕逆,胸膈满闷。

## 7213019

*Angelica gigas* Nakai

植物名 大独活《东北草本植志》

药材名 大独活《中药大辞典》

文献名 朝鲜当归《东北草本植志》,东北独活、独活《台湾药植志》,大当归《高植图鉴补编》

地方名 [当归](吉林、辽宁),土当归、野当归、老活、大活(东北);吉林:历当归、真当归、鲜当归(浑江、舒兰、柳河),大野芹;辽宁:紫花芹(本溪)。

功效 根:祛风和血。用于关节痛,闪挫肿痛。

备考 本品在日本作独活,在朝鲜作当归。

## 7213020

*Angelica laxifoliata* Diels --- *A. erythrocarpa* Wolff

植物名 疏叶独活《秦岭植志》

药材名 疏叶独活《汇编》

文献名 弛缓叶当归《药材学》,疏叶当归《高植图鉴》,扫羌活《植物名汇》,红果当归《药学报》

地方名 陕西:臊羌、臭羌(凤县),山芹菜(佛坪),[秦归],[土当归];湖北:独活,野独活;四川:散叶独活,猪独活(阿坝)。

功效 根:祛风胜湿,散寒止痛。用于风寒湿痹,腰膝酸痛,风寒感冒头痛,疮疮肿痛。

## 7213021

*Angelica megaphylla* Diels

植物名 大叶独活《中国植志》

药材名 大叶独活《神农架药录》

文献名 贵州当归《药学报》,独活《经植手册》

地方名 西归(西南),土当归(湖北、贵州),[当归](四川、贵州)。

功效 根:祛风胜湿,散寒止痛。

## 7213022

*Angelica morii* Hayata

植物名 福参《高植图鉴》

药材名 福参《药性考》、《汇编》

文献名 建人参《金御乘方》,建参《纲目拾遗》,山独活《台湾药植志》,福参当归《拉汉英种称》

地方名 福建:七当归(福鼎、清流),土人参(福清、莆田),土参(宁德),山芹菜,天池参,[前胡](闽侯)。

功效 根:补中益气。用于脾虚泄泻,肺虚咳嗽,蛇咬伤。

## 7213023

*Angelica morrisonicola* Hayata --- *Peucedanum morrisonicola* (Hayata) Hiroe

植物名 玉山芹菜《台湾药植志》

文献名 玉山当归《中国植志》

功效 叶:外用于疮疖。

## 7213023a

*Angelica nitida* Wolff --- *A. chinghaiensis* Shan

植物名 青海当归《中国植志》

药材名 青海当归《新华本草纲要》

地方名 甘肃:[白芷](玛曲);青海:[独活](门源),[当归](互助县);四川:"麻母"(若尔盖藏名)。

功效 根:用于血虚,月经不调,血瘀疼痛,关节炎;花:用于头痛。

## 7213024

*Angelica omeiensis* Yuan et Shan

植物名 峨眉当归《新华本草纲要》

地方名 四川:[羌活]、岩白芷、骚羌活(峨眉),山芹菜(冕宁),野当归(峨眉、洪溪),[当归](雷波),香白芷(茂汶)。

功效 根:用于难产。

## 7213025

*Angelica oncostepala* Hand. -Mazz.

植物名 隆萼当归《中国植志》

文献名 松香瘡药《云南药录》

地方名 云南:土当归。

功效 根:活血调经,补血润燥,滑肠。用于月经不调,痛经,瘀血闭经,贫血,肺结核,风湿骨痛,跌打损伤,肠燥便秘,感冒,消化不良。

## 7213026

*Angelica paeoniifolia* Shan et Yuan

植物名 牡丹叶当归《植分学报》

地方名 西藏:[当归](波密)。

功效 根:活血调经。

## 7213027

*Angelica polyclada* Franch.

植物名 白根独活《中药大辞典》

地方名 独活(东北、山西、四川);东北:大活;湖北:土羌活(神农架),紫金砂。

功效 根:祛风胜湿,散寒止痛。

## 7213028

*Angelica polymorpha* Maxim.

植物名 拐芹《高植图鉴》

药材名 山芎藭《中国植物图鉴》

文献名 巫山当归、四川当归《药学报》,白根独活《东检》,拐芹当归《东北草本植志》

地方名 山片菜(辽宁、山东);辽宁:倒钩芹(丹东),小叶片,紫杆芹(鞍山),西当归(庄河),拐子芹(本溪、宽甸、桓仁、西丰);山东:独活,[白芷];浙江:[土当归](开化);四川:岩归(天全),[前胡]。

功效 根:祛风散寒。

## 7213029

*Angelica porphyrocaulis* Nakai et Kitag.

植物名 零灵独活《高植图鉴》

药材名 山独活《品种论述》

文献名 兴隆独活、零灵白芷《汇编》,紫茎独活《高植图鉴》,独活《中药大辞典》

地方名 河北:走马芹;山西:务灵白芷,山白芷(阳城)。

功效 根:散风寒,祛湿止痛。

7213030 见 7213011a

7213031 见 7213011a

## 7213032

*Angelica silvestris* L.

植物名 林当归《新华本草纲要》

地方名 新疆:“阿克克尔克哈”(维名)。

功效 根:祛风湿,发汗解表。

备考 过去文献将本品误订为新疆羌活(伊犁)。

## 7213033

*Angelica sinensis* (Oliv.) Diels --- *A. polymorpha* Maxim. var. *sinensis* Oliv.

植物名 当归《高植图鉴》

药材名 当归《本经》、《药典》

文献名 干归《本经》,薛、山蕲、白蕲《尔雅》,文无(崔豹《古今注》),马尾当归《本草经集注》,秦归头、马尾归《纲目》,胡首归、归头(根头)、原枝归、通底归、原来归、常形归、全归身、归尾、归腿尾《药材学》,文州当归、子蕲《药学学报》,秦当归、全当归、当归头、当归身、当归尾、当归须、归须、白归身、粉归身《常用中药名辨》

地方名 秦归(陕西、甘肃);甘肃:西当归,岷当归,岷归;湖北:窑归;四川:川当归;云南:云归。

功效 根:补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽疮疡。

## 7213034

*Angelica tarokoensis* Hayata

植物名 太鲁阁独活《台湾药植志》

功效 茎、叶:用于神经痛。

## 7213035

*Angelica tschiliensis* Wolff

植物名 车里当归《中药志》

地方名 青海:土当归。

功效 根:青海以此作土当归入药。

## 7213036

*Angelica valida* Diels

植物名 盐菜独活《药学学报》

文献名 粗壮当归《药学学报》

地方名 四川:[金山当归]、岩当归、鸟当归(南川),

差风、光头差风(武隆)。

功效 根:祛风胜湿,散寒止痛。

## 7213037

*Anthriscus aemula* (Woron.) Schischk. var. *hurdufructus* (Ohwi) Kitag

植物名 东北峨参(东检)

药材名 东北峨参《长白山植药志》

功效 根:补中益气,祛瘀生新。

## 7213038

*Anthriscus nemorosa* (M. Bieb.) Spreng. --- *Anthriscus aemula* (Woron.) Schischk.

植物名 刺果峨参《中国植志》

药材名 峨参《长白山植药志》

文献名 林地峨参《云南种录》

地方名 山胡萝卜缨子(东北);吉林:胡萝卜缨子(长白山);辽宁:水胡萝卜(本溪),野胡萝卜(清原),山地姜。

功效 根:补中益气,祛瘀生新。用于跌打损伤,腰痛,肺虚咳嗽,痰中带血,脾虚腹胀,四肢无力,老人尿频,水肿。

备考 东北地区误作前胡入药,应注意鉴别。

## 7213039

*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.

植物名 峨参《中国植志》

药材名 峨参《峨眉药植》

地方名 陕西:[见肿消](镇巴);浙江:小叶山水芹(临安);湖北:萝卜七(神农架),小洋参,[土当归];湖南:[土白芷],广三七;四川:[田七],金山田七,冷峨参,冬峨参(峨眉),土田七;贵州:水田七。

功效 根:补中益气,祛瘀生新。用于跌打损伤,腰痛,肺虚咳嗽,咳嗽咯血,脾虚腹胀,四肢无力,老人尿频,水肿;叶:外用于创伤。

## 7213040

*Apium graveolens* L. --- *A. intergrilobum* Hayata

植物名 旱芹《履巉岩本草》、《中国植志》

药材名 芹菜《滇南本草》、《中草药学》

文献名 野茺荽、野园荽《救荒本草》,云芎、南芹菜《滇南本草》,和兰鸭儿芹《中国植物图鉴》,药芹菜、旱芹菜《中国蔬裁》,香芹、蒲芹《本草推陈》,洋芹菜《高植图鉴》,旱菜《汇编》,荷兰三叶、清正人参、芹人参《台湾药植志》

地方名 药芹(江苏、上海、浙江);上海:野芹,土藁本;浙江:穿葱(衢县、建德);台湾:塘蒿;广西:芹菜(南宁);云南:“哪代姆”(楚雄彝名),川芎菜,毛驴菜。

功效 全草:利尿,止血,降压。用于高血压,高血压动脉硬化,尿血,乳糜尿,神经痛,关节痛;叶柄:用于妇人赤白带下,头晕,耳鸣,腰痛。

备考 本种曾被误订为 *A. graveolens* L. var. *dulce* DC.

## 7213041

*Archangelica brevicaulis* (Rupr.) Rechb. --- *Angelica brevicaulis* (Rupr.) B. Fedtsch.

植物名 短茎古当归《高植图鉴补编》  
文献名 短茎独活《汇编》,水防风《高植图鉴》  
地方名 新疆:[独活]。  
功效 根:祛风、除湿、止痛。用于风湿性关节炎,腰膝冷痛,风火牙痛。

## 7213042

*Archangelica decurrens* Ledeb.

植物名 下延叶古当归《中国植志》  
药材名 野白芷《品种论述》  
地方名 内蒙古:走马芹;新疆:[白芷](阿尔泰)。  
功效 根:散风除湿。用于白癜风。

## 7213043

*Archangelica officinalis* (Moench.) Hoffm.

植物名 古当归《中国植志》  
文献名 圆叶当归《品种论述》  
地方名 新疆:[白芷]。  
功效 根:散风除湿。

## 7213044

*Bupleurum angustissimum* (Franch.) Kitagawa --- *B. scorzoneraefolium* Willd. var. *angustissimum* (Franch.) Huang

植物名 线叶柴胡《中国植志》  
药材名 线叶柴胡《中药志》  
文献名 符柴胡《东北草本植志》  
地方名 河北:红柴胡(宣化);内蒙古:"那林-宝日车-额布苏"(蒙名)。  
功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213045

*Bupleurum aureum* Fisch. --- *Bupleurum longifolium* var. *aureum* (Fisch.) Wolff

植物名 金黄柴胡《中国植志》  
药材名 金黄柴胡《汇编》  
文献名 贯叶柴胡《汇编》,穿叶柴胡《中药大辞典》  
地方名 新疆:柴胡(阿勒泰、哈拉、玛拉、新二台、乌鲁木齐、木垒河)。  
功效 花、叶:用于胆囊炎,肝炎。

## 7213046

*Bupleurum bicaule* Helm

植物名 锥叶柴胡《中国植志》  
药材名 双茎柴胡《汇编》  
地方名 柴胡(黑龙江、吉林),红柴胡(内蒙古、陕西)。  
功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213047

*Bupleurum candollei* Wall. ex DC.

植物名 川滇柴胡《中国植志》  
药材名 飘带草《昆明民药》  
文献名 窄叶柴胡《中药大辞典》,麦门冬叶柴胡《云南种录》,窄叶飘带草《云南药录》  
地方名 云南:金柴胡(昆明)。  
功效 全草:消炎解毒,祛风止痒。用于疮毒,疖子。

## 7213048

*Bupleurum chaishoui* Shan et Sheh

植物名 柴首《中国植志》  
药材名 柴首《中药志》  
地方名 四川:柴胡,狭叶柴胡(黑水)。  
功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213049

*Bupleurum chinense* DC.

植物名 北柴胡《中国植志》  
药材名 柴胡《本经》、《药典》  
文献名 苕姜《月令》,苕草《尔雅》,地薰、苕胡《本经》,山来、如草《吴普本草》,山菜、茹草、芸蒿《别录》,柴草《品汇精要》,才胡、北胡、汉柴胡《药材学》,硬苗柴胡《东北植药图志》,津柴胡《中药志》  
地方名 竹叶草根(河北、北京),硬柴胡(华北、安徽),非叶柴胡(江苏、安徽);辽宁:蚂蚱腿,竹叶柴胡;河北:黑柴胡,黑柴、山菜根(张家口),黑胡,剪子股草;山东:大柴胡(沂水、莒县),狗头柴胡(崑崙山),山竹子(烟台);内蒙古:毛柴胡,山柴胡。

功效 根:疏散退热,舒肝,升阳。用于感冒发热,寒热往来,疟疾,胸胁胀痛,月经不调,子宫脱垂,脱肛。

## 7213050

*Bupleurum chinense* DC. f. *chiliosciadium* (Wolff) Shan et Y. Li

植物名 多伞北柴胡《中国植志》  
药材名 柴胡(河北)  
功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213051

*Bupleurum chinense* DC. f. *octoradiatum* (Bunge) Shan et Sheh --- *Bupleurum octoradiatum* Bunge

植物名 百花山柴胡《中国植志》  
药材名 八伞柴胡《汇编》  
地方名 宁夏:柴胡。  
功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213052

*Bupleurum chinense* DC. f. *pekinense* (Franch.) Shan et Y. Li --- *B. pekinense* Franch.

植物名 北京柴胡《中国植志》  
药材名 北柴胡《内蒙古中草药》  
地方名 硬柴胡、黑柴胡、柴胡(河北、陕西);内蒙古:"哲格仁-希拉"(蒙名),毛柴胡。  
功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213053

*Bupleurum condensatum* Shan et Y. Li

植物名 簇生柴胡《中国植志》  
药材名 柴胡草(青海)  
功效 全草:和解退热,舒肝解郁。

## 7213054

*Bupleurum dalhousieanum* (Clarke) K.-Pol. --- *B. longicaule* var. *dalhousieanum* Clarke

植物名 匍枝柴胡《中国植志》  
药材名 柴胡子(迪庆藏药)

功 效 果实: 开胃, 理气。用于胃寒, 食滞, “龙”病。

## 7213055

*Bupleurum densiflorum* Rupr.

植物名 密花柴胡《中国植志》

药材名 宁夏柴胡(拟)

地方名 宁夏: 柴胡。

功 效 根: 和解退热, 疏肝解郁。

## 7213056

*Bupleurum exaltatum* Marsch. - Bieb.

植物名 新疆柴胡《中国植志》

地方名 新疆: 柴胡(阿勒泰、哈拉、玛拉、新二台、乌鲁木齐、木垒河等)。

功 效 根: 和解退热, 疏肝解郁, 升提中气; 花、叶: 用于胆囊炎, 肝炎。

## 7213057

*Bupleurum jucundum* Kurz

植物名 异叶柴胡《汇编》

药材名 西藏柴胡(拟)

地方名 西藏: 柴胡。

功 效 根: 和解退热, 疏肝解郁, 升提中气, 截疟。

## 7213058

*Bupleurum kaoi* Liu, Chao et Chuang

植物名 高氏柴胡《台湾药植志》

药材名 台湾柴胡草(拟)

功 效 全草: 台湾作柴胡用。

## 7213059

*Bupleurum komarovianum* Lincz. --- *B. chinense* DC.

var. *komarovianum* (Lincz.) Liou et Huang

植物名 长白柴胡《中国植志》

药材名 长白柴胡《东北植药图志》

文献名 柯氏柴胡《吉野》, 柞柴胡《东检》

地方名 柴胡、北柴胡(辽宁、吉林)。

功 效 根: 和解退热, 疏肝解郁, 截疟。

## 7213060

*Bupleurum krylovianum* Schischk. ex Kryl.

植物名 阿尔泰柴胡《中国植志》

药材名 新疆柴胡《汇编》

地方名 新疆: 柴胡。

功 效 根: 和解退热, 舒肝解郁。

## 7213061

*Bupleurum kunmingense* Y. Li et S. L. Pan

植物名 韭叶柴胡《植分学报》

药材名 柴胡(云南)

功 效 根: 和解退热, 疏肝解郁, 升提中气。

## 7213062

*Bupleurum longicaule* Wall. ex DC. var. *amplexicaule* C. Y. Wu

植物名 抱茎柴胡《中国植志》

药材名 柴胡(青海、云南)

文献名 竹叶柴胡《云南药录》, 秦岭柴胡《秦岭植志》

地方名 金柴胡(陕西、云南); 青海: 野槐子; 四川: 苳胡, 竹柴胡, 北柴胡, 南柴胡; 云南: 飘带草(昆明), 大柴胡(丽江)。

功 效 根: 和解退热, 疏肝解郁, 升提中气。

## 7213063

*Bupleurum longicaule* Wall. ex DC. var. *franchetii* de Boiss.

植物名 空心柴胡《中国植志》

药材名 空心柴胡(四川巫溪)、《汇编》

文献名 《银柴胡》《云南药录》

地方名 湖北: 软柴胡、竹叶柴胡(神农架)。

功 效 根: 和解退热, 疏肝解郁, 升提中气。

## 7213064

*Bupleurum longicaule* Wall. ex DC. var. *giraldii* Wolff

植物名 秦岭柴胡《中国植志》

药材名 柴胡草《药典》

地方名 陕西: 金柴胡(太白山)。

功 效 全草: 发表祛风, 清肝利胆, 清心火, 通经。用于感冒, 虚癆骨蒸, 月经不调, 肝气不舒, 黄疸, 糖尿病。

## 7213065

*Bupleurum longicaule* Wall. ex DC. var. *strictum* Clarke

植物名 坚挺柴胡《中国植志》

药材名 黄柴胡(湖北)

功 效 全草: 解表, 疏散风热。

## 7213066

*Bupleurum longiradiatum* Turcz.

植物名 大叶柴胡《中国植志》

药材名 大叶柴胡《东北药植志》

文献名 猫眼子、地板鞋《湖南药物志》

地方名 吉林: [柴胡]; 辽宁: 羊莫果(义县), (银柴胡)(营口)。

功 效 根: 有毒。解热, 消炎。

备 考 《药典》(1985)注称: 大叶柴胡之干燥根, 表面密生环节, 有毒, 不可当柴胡用。

## 7213067

*Bupleurum longiradiatum* Turcz. f. *australe* Shan et Y. Li

植物名 南方大叶柴胡《中国植志》

地方名 江西: 南柴胡。

功 效 根: 解表散热, 疏肝开郁, 镇痛调经, 截疟。

备 考 本品是否有毒尚待研究。

## 7213068

*Bupleurum longiradiatum* Turcz. var. *breviradiatum* Fr. Schmidt --- *B. sachalinense* Fr. Schmidt

植物名 短伞大叶柴胡《中国植志》

地方名 辽宁: 大叶柴胡、柴胡(庄河)。

功 效 根茎: 吉林省产地当柴胡使用, 是否有毒, 尚待研究。

## 7213069

*Bupleurum longiradiatum* Turcz. var. *porphyranthum* Shan et Y. Li --- *B. longiradiatum* var. *genuinum* Wolff

植物名 紫花大叶柴胡《中国植志》  
 文献名 大叶柴胡《神农架药录》  
 地方名 湖北:红柴胡(神农架)。  
 功效 全草:解表,调经解郁。  
 备考 本品是否有毒尚待研究。

## 7213070

*Bupleurum luxiense* Y. Li et S. L. Pan

植物名 泸西柴胡《植分学报》  
 药材名 竹叶柴胡(云南)  
 功效 带根全草:解表,调经解郁。

## 7213071

*Bupleurum malconense* Shan et Y. Li

植物名 马尔康柴胡《中国植志》  
 药材名 马尾柴胡《中药通报》  
 地方名 四川:柴胡(阿坝),竹叶柴胡(汶川、茂县)。  
 功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213072

*Bupleurum marginatum* Wall. ex DC.

植物名 膜缘柴胡《汇编》  
 药材名 竹叶柴胡(四川、云南、湖北、福建)、《中国植志》

文献名 南柴胡《广西本草选编》  
 地方名 柴胡(广西、四川、贵州、云南、西藏);湖北:紫柴胡(宜昌);云南:竹柴胡、金柴胡、〔竹叶防风〕(昆明),大叶柴胡(峨山),大叶子柴胡(玉溪),神养,“西舍斯勒扒儿”(玉溪彝名)。

功效 根、全草:和解退热,疏肝解郁,升提中气。用于感冒发热,月经不调,疟疾,脱肛。

## 7213073

*Bupleurum marginatum* Wall. ex DC. var. *stenophyllum* (Wolff) Shan et Y. Li

植物名 窄竹叶柴胡《中国植志》  
 药材名 西藏柴胡《中药志》  
 文献名 狭叶神养《云南种录》,窄叶柴胡《贵州药录》

地方名 西藏:竹叶柴胡(拉萨)。  
 功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213074

*Bupleurum microcephalum* Diels

植物名 马尾柴胡《中国植志》  
 药材名 马尾柴胡(四川)、《汇编》  
 地方名 四川:竹叶柴胡、狭叶柴胡(马尔康),线柴胡(康定)。

功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213075

*Bupleurum multinerve* DC.

植物名 多脉柴胡《汇编》  
 地方名 内蒙古:柴胡。  
 功效 根:和解退热,疏肝解郁。

## 7213076

*Bupleurum petiolulatum* Franch. var. *tenerum* Shan et Y. Li

植物名 细茎有柄柴胡《中国植志》

地方名 云南:柴胡。  
 功效 根:和解退热,疏肝解郁。

## 7213077

*Bupleurum polyclonum* Y. Li et S. L. Pan

植物名 多枝柴胡《植分学报》  
 地方名 云南:柴胡。  
 功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213078

*Bupleurum pusillum* Krylov

植物名 短茎柴胡《中国植志》  
 文献名 狭小柴胡《中草药学》  
 功效 全草:和解退热,疏肝解郁。

## 7213079

*Bupleurum rockii* Wolff

植物名 丽江柴胡《西藏植志》  
 地方名 云南:柴胡。  
 功效 根:和解退热,疏肝解郁。

## 7213080

*Bupleurum scorzonifolium* Willd. --- *B. falcatum* L. var. *scorzonifolium* (Willd.) Ledeb. --- *Bupleurum falcatum* auct. non L.

植物名 狭叶柴胡《高检图鉴》  
 药材名 柴胡《本经》、《药典》

文献名 软柴胡《本草汇言》,南柴胡《新纲》,蛇叶柴胡《江苏植药志》,细叶北柴胡《北华药讯》,香柴胡、细叶柴胡《东北药植志》,硬边柴胡《西昌中草药》,红柴胡《中国植志》,软苗柴胡《中药志》

地方名 小柴胡(甘肃、山东、江苏),韭叶柴胡(江苏、安徽);辽宁:蚂蚱腿;山西:山韭菜叶;内蒙古:斩龙草,“立槽得”、“乌兰·宝日·额布苏”(蒙名);甘肃:野槐子(武都);山东:山竹子(蓬莱、海阳、牙山、烟台),麦苗柴胡,牙柴胡;江苏:芽胡(徐州),扁叶胡(新沂),春柴胡,牙胡苗,红胡根;浙江:羊舌头草(天目山);安徽:小药,山菜;四川:竹叶柴胡(成都),“热根”(若尔盖藏名),竹柴胡。

功效 根:疏散退热,舒肝,升阳。用于感冒发热,寒热往来,疟疾,胸胁胀痛,月经不调,子宫脱垂,脱肛。

备考 有些文献将柴胡的原植物学名误订为 *B. falcatum* L. 该种产欧洲,我国未见分布。

## 7213081

*Bupleurum scorzonifolium* Willd. f. *longiradiatum* Shan et Y. Li

植物名 长伞红柴胡《中国植志》  
 药材名 红柴胡《中国植志》  
 功效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

## 7213082

*Bupleurum scorzonifolium* Willd. f. *pauciflorum* Shan et Y. Li

植物名 少花红柴胡《中国植志》  
 药材名 柴胡(江苏、安徽)  
 地方名 春柴胡、牙胡(江苏、安徽)。

功 效 全草:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

### 7213083

*Bupleurum sibiricum* Vest

植物名 兴安柴胡《中国植志》

药材名 柴胡(东北、河北、内蒙古)

地方名 北柴胡(东北、河北)。

功 效 根:和解退热,舒肝解郁。

### 7213084

*Bupleurum smithii* Wolff var. *parvifolium* Shan et Y. Li

植物名 小叶黑柴胡《中国植志》

药材名 柴胡(青海)、《中药通报》

地方名 青海:北柴胡。

功 效 根:和解退热,疏肝解郁,升提中气。

### 7213085

*Bupleurum tenue* Buch. -Ham. ex D. Don --- *B. hamiltonii* Belank

植物名 小柴胡《中国植志》

药材名 小柴胡《汇编》

文献名 滇银柴胡《名实图考》,纤弱柴胡《品种论述》

地方名 四川:柴胡,柴首,竹柴胡,南柴胡,竹叶柴胡(南川),金柴胡(凉山、雷波),芫荽柴胡(甘洛、会东);云南:宽叶飘带草,野柴胡,〔银柴胡〕,“西舍施勃”(玉溪峨山彝语),水柴胡、细柴胡(思茅)。

功 效 全草:消炎解毒,祛风止痒。

### 7213086

*Bupleurum tianschanicum* Freyn

植物名 天山柴胡《中国植志》

药材名 天山柴胡《中药通报》

地方名 新疆:柴胡(天山阿克苏、湿宿)。

功 效 根、全草:和解退热,舒肝解郁。

### 7213087

*Bupleurum wenchuanense* Shan et Y. Li

植物名 汶川柴胡《中国植志》

药材名 汶川柴胡《中药志》

地方名 四川:马尾柴胡(阿坝、汶川)。

功 效 根:和解退热,舒肝解郁。

### 7213088

*Bupleurum yinchowense* Shan et Y. Li

植物名 银州柴胡《中国植志》

药材名 银州柴胡《中药志》

文献名 柴胡《图经》

地方名 北柴胡(陕西、甘肃);陕西:红柴胡(陕北),红软柴胡,软柴胡,卧银花(横山);甘肃:硬柴胡,黑柴胡。

功 效 根:和解退热,舒肝解郁,升提中气。

备 考 据考证,古代银柴胡,应为本种。

### 7213089

*Bupleurum yunnanense* Franch.

植物名 云南柴胡《中国植志》

药材名 云南柴胡《云南药录》

文献名 柴胡《滇南本草》,滇柴胡《云南种录》

地方名 云南:竹叶柴胡。

功 效 带根全草:疏散退热,舒肝,升阳,调经。

### 7213090

*Carlesia sinensis* Dunn

植物名 山茴香《中国植志》

药材名 山茴芹《汇编》

地方名 辽宁:〔沙参〕,〔防风〕(千山);山东:山茴(青岛),岩茴香;四川:“拉拉柏”(藏名)。

功 效 根:温中散寒,祛风下气,活血镇痛,健胃止痢。用于肠炎痢疾,脘腹胀痛。

### 7213091

*Carum buraiaticum* Turcz.

植物名 田葛缕子《中国植志》

文献名 田黄蒿《汇编》

地方名 〔防风〕、小防风、狗英子、狗英子防风〔西北〕;河北:土沙参、〔沙参〕、〔北沙参〕(保定、通县);山沙参;山西:山小茴,野小茴;陕西:抽麻苔;青海:〔前胡〕、马英子、马缨子(民和);四川:“作尔儿”(若尔盖藏名)。

功 效 根:行气散寒,镇静祛风,消食健胃,镇吐驱虫。

### 7213092

*Carum carvi* L.

植物名 葛缕子《中国植志》

药材名 藏茴香《中国药植图鉴》

文献名 香旱芹菜(叶《生药》),马缨子《鉴别手册》,知兰芹、香旱芹菜子《台湾药植志》,加尔蒲、山竹叶、麦香菜《经济植物学》,欧山竹叶《种分讲义》,黄蒿《汇编》

地方名 光防风、小防风、马英子防风、〔防风〕(甘肃、宁夏、青海),“贡牛”、“羔乌”、“郭乌”、“裸虐”(四川、青海、西藏藏名);河北:〔旱芹菜〕;青海:〔野胡萝卜〕,马英子;四川:野红萝卜。

功 效 根:发表祛风,除湿止痛。用于风湿性关节炎,感冒,骨关节疼痛,头痛,寒热无汗;果实:芳香健胃,祛风理气。用于胃痛,腹痛,小肠疝气,眼病及夜盲。

### 7213093

*Carum carvi* L. f. *gracile* (Lindl.) Wolff

植物名 细葛缕子《中国植志》

文献名 藏茴香〔种子〕《中草药》

地方名 小防风(西北)。

功 效 根:祛风。

### 7213094

*Centella asiatica* (L.) Urban

植物名 马蹄草《滇南本草》

药材名 马蹄草《滇南本草》

文献名 积雪草《名实图考》,大马蹄草、土细辛《草木便方》,老公根、葵蓬菜、崩口碗《生草药性备要》,葵菜菜、雷公根、钱菜草《岭南采药录》,咕喽菜、大铜钱《中国药植图鉴》

地方名 落得打、金灯盏、铜钱草(江苏、浙江、安徽),崩崩碗(华东),崩大碗(广东、广西、四川、云南),



大叶金钱草(安徽、江西、福建、湖北),大叶破铜钱(安徽、江西、湖北),大铜钱草、半边钱(湖北、湖南),铁灯盏(浙江、江西),〔金钱草〕(福建、湖南),灯盏菜(广东、广西),荷包草(浙江、江西、湖南),老鸦碗(浙江、福建);江苏:偷鸡落得打(常熟),旧铜钱草;上海:野芦草;浙江:大叶伤筋草,葫瓜草,落地梅花,破铜钱草(建德),蛤壳草(洞头),大叶落地金钱(温州),大叶郎郎碗(温州、永嘉、瑞安),刺蟆碗(平阳),大蛤蟆碗(永清);安徽:缺碗叶;江西:野荠菜,马脚迹,遍地金钱草,半边月,缺碗草(吉水),大金钱(吉安、彭泽),芋子草(宜黄),野苣菜,钱齿草,透骨消,大叶蛇;福建:复老碗草,莹圭草,乞食碗,蚌壳草(晋江、龙溪、厦门、同安),车田草(连城),老豺碗(政和、霞浦、平和),大水钱(宁化、武平、永定),蜆杓草(福州、福清、莆田、仙游、南安),老称碗、黄排碗、老地碗(南平),肺风草、田螺碗、浮荖碗叶、水灯盏、大比钱、蚌壳钱草、白骨蛤壳草(福安),乞丐婆碗(三明),大叶克食碗(大田);台湾:蚌壳仔草,蚶仔草,〔透骨草〕;湖北:拔地麻,缺灯盏;湖南:扣子草(通道),节节莲、盘龙草(凤凰),破铜钱(桑植),野冬苋草,野冬苋菜、蛇皮草(新邵),地浮萍、寸步肤、大救驾、灯盏蒿、野冬苋(衡山),边碗草、边碗莲(常德),刚果龙(保靖),细叶马蹄草(洞口),大星子草(麻阳),马脚草(东安),米钱草、灯盏青(江华);广东:老当根(惠阳),老帮根(新丰),两老根(惠来),两公根(潮阳),背背草(饶平),入骨箭、二角箭、遍地金钱、红花蚌壳草(潮阳),雷公碗(英德),〔粪箕笃〕(曲江),大利钱(翁源),纸钱齿、钱串草、钱齿口(南澳),蛤拐帽(新会),跌破碗,田特菜,田药口(五华),乞儿钵壳草(广州),鼎盖草(潮汕);海南:止占草(琼中);广西:牛浴菜(南宁),酒杯菜,花灯盏(苍梧),四泽菜(北海),四方雷公根(龙州);四方藤、损伤药(富川),灯盏草、螺丝草、雷公菜(桂林),铜钱菜(罗城);四川:地蓬草,地细辛,地排草,地脚草,大碗碗草,碗碗草,马蹄细辛,细马蹄;云南:芽黄草(保山),草如意(昆明),马蹄叶,红马蹄草,绿叶划,地索草。

**功效** 全草:清热利湿,解毒消肿。用于湿热黄痘,中暑腹泻,砂淋血淋,痢疮疮毒,跌扑损伤。

**备考** 许多植物学和药学文献曾将本品称为“积雪草”,但“积雪草”在本草文献中有同名异物存在。《本经》、《纲目》之“积雪草”为唇形科植物活血丹(*Glechoma longituba* (Nakai) Kupr.),《名实图考》之“积雪草”为本种。为避免误用,本品沿用《滇南本草》之名,改称“马蹄草”。

#### 7213095

*Changium smyrnioides* Wolff

植物名 明党参(中国植志)

药材名 明党参(纲目拾遗)、《药典》

文献名 土人参(履巉岩本草),百丈光、天瓢(证治准绳),粉沙参、红党参(本草从新),金鸡爪(本草求真)

地方名 山花(江苏、安徽),山萝卜(江苏、安徽、浙江);江苏:山花根;安徽:明党,山胡萝卜,山荷宝,野菱菜,狗尿粘,山河茵子根、山淮宝、牙党、黄牙、银牙(滁

县),三花;浙江:〔南沙参〕。

**功效** 根:润肺化痰,养阴和胃,平肝,解毒。用于肺热咳嗽,呕吐反胃,食少口干,目赤眩暈,疔毒疮疡。

7213096 见 7213102a

#### 7213097

*Chuanminshen violaceum* Sheh et Shan

植物名 川明参(植分学报)

药材名 川明党(中药志)

地方名 四川:沙参,明沙参,土明参,明参,银牙党。

**功效** 根:用于肺热咳嗽,热病伤阴。

#### 7213098

*Cicuta virosa* L.

植物名 毒芹(中国植志)

药材名 毒芹(汇编)

文献名 芹叶钩吻(金匱要略),钩吻(满蒙药植)

地方名 野芹菜花(东北、河北),走马芹(黑龙江、辽宁);黑龙江:杈子芹;辽宁:河毒(本溪);河北:野蔓荆;江苏:〔蒟蒻〕(淮阴、兴化),野芹;新疆:野胡萝卜。

**功效** 根茎:有大毒。外用于拔毒,祛瘀,化脓性骨髓炎。

**备考** 黑龙江省偶将本品之根茎,混充“香大活”,江苏、浙江以其种子伪充“蒟蒻子”,均应注意鉴别。

#### 7213099

*Cicuta virosa* L. f. *angustifolia* (Kitaibel) Schube

植物名 细叶毒芹(东北草本植志)

药材名 细叶毒芹(长白山植药志)

**功效** 根及全草:有剧毒。用于骨髓炎。

#### 7213100

*Cicuta virosa* L. var. *latisepta* Celak. --- *C. nipponica* Franch.

植物名 宽叶毒芹(中国植志)

药材名 毒芹(药材学)

文献名 芹叶钩吻(药材学)

地方名 江苏:〔蒟蒻子〕。

**功效** 根茎:有大毒。外用于拔毒,祛瘀。

**备考** 江苏商品蒟蒻子,常以毒芹子代替,应注意鉴别。

#### 7213101

*Cicuta virosa* L. f. *longinvolucellata* Chu

植物名 长苞毒芹(长白山植药志)

**功效** 根及全草:有剧毒。外用于拔毒,祛瘀。

#### 7213102

*Cnidium dahuricum* (Jacq.) Turcz. ex Fisch. et Mey.

植物名 兴安蛇床(中国植志)

地方名 吉林:〔当归〕(吉林市)。

**备考** 吉林市混称本品为当归。

#### 7213102a

*Cnidium monnieri* (L.) Cuss.

植物名 蛇床(中国植志)

药材名 蛇床子(本经)、《药典》

文献名 盱(尔雅),蛇粟、蛇米(本经),蛇珠(吴普本草),虺床、思益、绳毒、枣棘、墙藤(别录),马床(广雅),

蛇床仁《药性论》，蛇床实《千金方》，气果、双肾子《分类草药性》，蛇常、赤木草、赤目草、鬼老子、连阳八座《新纲》，滨芹、滨人参《中农药志》

地方名 野胡萝卜子(东北、河北、甘肃、江苏、安徽、广西)，野胡萝卜(吉林、内蒙古、江苏、广西)，野芫荽(山东、浙江、安徽、广西)，野茴香(吉林、辽宁、内蒙古、江苏、浙江、江西)，假芹菜(广东、广西)；河北：野萝卜碗子，野胡萝卜蔓，秃子花，山胡萝卜蔓；内蒙古：“拉拉富德”(蒙名)；山东：山芫荽、秃胞个渣(烟台)，野蒿子(胶县)；江苏：蛇狼草、蛇娘子(泰州)，蛇床草，野胡萝卜棵(沛县)，吸床子；浙江：癞头花子；安徽：假胡萝卜子，癩痢花。

功效 果实：有小毒。温肾壮阳，燥湿，祛风，杀虫。用于阳痿，宫冷，寒湿带下，湿痹腰痛。外用于外阴湿疹，妇人阴痒，滴虫性阴道炎。

#### 7213103

*Cnidium monnieri* (L.) Cuss. var. *formosana* (Yabe) Kitag. --- *C. formosanum* Yabe

植物名 台湾蛇床子(拟)

药材名 蛇床子《台湾中药材图鉴》

文献名 台湾芎藭《台湾药植志》

地方名 台湾：嘉义野萝卜，野芫荽。

功效 全草：用于衰弱性腰骨神经痛，阳痿；果实：台湾作蛇床子用。

#### 7213104

*Cnidium officinale* Makino

植物名 东川芎《民族药志》

药材名 东川芎《中药志》

文献名 洋川芎《汇编》，日本川芎《云南种录》，芎藭《牧野日图》

功效 根茎：活血行气，祛风止痛。

#### 7213105

*Coelopleurum saxatile* (Turcz.) Drude --- *Angelica saxatile* Turcz. --- *Coelopleurum alpinum* Kitag.

植物名 高山芹《高植图鉴》

药材名 高山芹《长白山植志》

地方名 四川：“吗母洼”(若尔盖藏名)。

功效 根：用于健胃；全草：有小毒。驱虫逐水。用于鞘膜积液。

#### 7213106

*Conioselinum morrisonense* Hayata

植物名 台湾山芎《中国植志》

文献名 玉山芎藭《台湾药植志》

功效 根茎：用于头痛，开气郁。

#### 7213107

*Conioselinum vaginatum* (Spreng.) Thell. --- *Ligusticum vaginatum* Spreng.

植物名 鞘山芎《中国植志》

药材名 新疆藁本《中药大辞典》

文献名 鞘叶芎藭《新疆中草药》，姨妈菜《汇编》，[川芎]、[芎藭]《秦岭植志》，滇前胡《云南种录》

地方名 [藁本] (西北、西南、北京)；湖北：山白芷

(神农架)；云南：[前胡]。

功效 根茎：散风止痛，活血散瘀，疏肝解郁。

#### 7213108

*Conium maculatum* L.

植物名 毒参《中国植志》

文献名 片叶钩吻《拉汉英种称》

功效 全草：有毒。用于镇痛，镇痉，子宫纤维瘤。

#### 7213109

*Coriandrum sativum* L.

植物名 芫荽《中国植志》

药材名 芫荽《日用本草》、《汇编》

文献名 香菜《韵略》，胡荽《食疗本草》，胡荽子《千金·食治》，香荽《本草拾遗》，胡菜《外台秘要》，园荽《东轩笔录》，胡藭《日用本草》，芫荽、芫荽子《普济方》，原荽《纲目》，原荽实《药材学》，高柴《和汉药物学》，松须菜、川椒《朝鲜植汇》，元荽子、高柴子、薰荽子、盐荽子《新纲》

地方名 白卵假花(东北)，芫荽棋(江苏、上海)，香菜子(江苏、四川)；青海：“乌素”(藏名)；上海：胡荽棋；浙江：芫荽草；福建：延荽(厦门)；台湾：芫荽；湖北：芫荽菜；湖南：筵荽菜，筵葛草，筵席菜、[满天星](长沙)，园心(临湘)；广东：芫茜(柳江)，原荽，地胡椒，地茵蒿，小苜蓿(马山)；四川：“喔斯”(藏名)，香荽子(成都)；云南：“帕布”(西双版纳傣语)。

功效 全草：发表透疹。用于麻疹不透，感冒无汗；果：用于消化不良，食欲不振。

#### 7213110

*Cryptotaenia japonica* Hassk. --- *C. canadensis* (L.)

DC. var. *japonica* (Hassk.) Makino

植物名 鸭儿芹《中国植志》

药材名 鸭儿芹《国药提要》

文献名 三叶、起莫、二石、当田《别录》，赴鱼《蜀本草》，野蜀葵《国药提要》，[当归]《名实图考》

地方名 六月寒(陕西、四川)，鸭脚板(陕西、广西、贵州)，鸭脚板草(四川、江西)，野芹菜(湖南、贵州)，鸭脚菜(浙江、湖南、广西)，水芹菜(广西、贵州)；陕西：水蒲莲(宁强)，铜箍散(镇巴)，梭丹子；甘肃：牙痛草，明光光；湖北：鸭脚七，六豆菜，鸭脚掌；湖南：三叶芹，三角板；广西：鸭脚风；四川：鹅脚板、桃心菜、三脚蟹(成都)；贵州：水白芷，大鸭脚板；红鸭脚板；云南：[土当归] (西畴)，鸭脚板芹。

功效 茎叶：消炎，解毒，活血，消肿。用于肺炎，肺脓肿，淋病，疝气，风火牙痛，痈疽疔肿，带状疱疹，皮肤瘙痒；根：发表散寒，止咳化痰。用于风寒感冒，水呛咳嗽，跌打损伤，疟疾；果实：消积顺气。用于食积。

#### 7213111

*Cuminum cyminum* L.

植物名 孜然芹《中国植志》

药材名 孜然《新疆药物志》

文献名 马芹《台湾药植志》，香旱芹《中药材》

地方名 台湾：罗马香旱芹菜，马芹子；新疆：[小茴香]；西藏：“斯惹嘎保”(藏名)。

功 效 果实:祛寒止痛,理气和胃。用于消化不良,胃寒腹痛。

## 7213112

*Cyclorhiza waltonii* (Wolff) Sheh et Shan --- *Ligusticum waltonii* Wolff

植物名 环根芹《中国植志》

地方名 云南:岩白芷。

功 效 全草:外用于蛇虫咬伤。

## 7213113

*Daucus carota* L.

植物名 野胡萝卜《救荒本草》、《高植图鉴》

药材名 南鹤虱《药典》

文献名 胡萝卜《纲目》,鹤虱风、野萝卜《分类草药性》,山萝卜、赤珊瑚、香萝卜、金笋、〔鹤虱〕《中国药植志》,北鹤虱《药材学》

地方名 野胡萝卜子(江苏、四川);江苏:黑实(江宁),鹤虱子;江西:粘裤蛆,虱子草;台湾:红菜头;西藏:“郭阿萝卜珠古”(藏名)。

功 效 果实:有小毒。杀虫消积。用于蛔虫,蛲虫,绦虫病,虫积腹痛,小儿疳积。

## 7213114

*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.

植物名 胡萝卜《高植图鉴》

药材名 胡萝卜《日本本草》、《中药大辞典》

文献名 黄萝卜《本草求真》,胡芦菔、红芦菔《随息居饮食谱》,胡萝卜子《纲目》,赤珊瑚《西安县志》,丁香萝卜《现代实用中药》,红萝卜《岭南草药志》

地方名 北京:红根;台湾:红菜头;湖北:红大根,洋花萝卜;广东:金笋(广州);广西:伞形棱菜(南宁)。

功 效 根:健脾,化滞。用于消化不良,久痢,咳嗽;果实:有小毒。驱虫。用于蛔虫病,虫积腹痛,慢性痢疾。

## 7213115

*Dickinsia hydrocotyloides* Franch.

植物名 马蹄芹《中国植志》

文献名 荻更芹《峨眉药植资源》,大苞芹《高植图鉴》

地方名 四川:双叉草,〔山荷叶〕;云南:大天胡荽。

功 效 全草:解表清热。用于头痛。

## 7213116

*Eriocyclus albescens* (Franch.) Wolff --- *Pimpinella albescens* Franch.

植物名 绒果芹《拉汉英种称》

地方名 河北:小防风,〔防风〕,硬苗防风、小胡萝卜(怀安)。

功 效 根:解表散寒。

## 7213117

*Eryngium foetidum* L.

植物名 刺芹《中国植志》

药材名 刺芫荽《广西本草选编》

文献名 日本芫荽《台湾药植志》,刺芫荽《科属词典》,假芫荽《陆川本草》,臭刺芹《中药大辞典》

地方名 野芫荽(广东、云南),洋芫荽(广西、云南),石芫荽、山芫荽、假小薊(福建、广西);广东:芫荽、地芫荽(佛冈),山香菜(惠阳),节节花,野香草,番鬼芫荽;海南:洋园荽,牙锯草、酒肉菜(保亭),假芫荽;广西:香芫荽,番香荽(博白),假香荽,香信(桂平);云南:大芫荽,阿瓦芫荽(思茅),德马炸锁、模纳野酸枣模、细芫荽(红河)。

功 效 全草:疏风解热,健胃。用于感冒,麻疹内陷,气管炎,肠炎,腹泻,急性传染性肝炎。外用于跌打肿痛。

## 7213118

*Ferula assafoetida* L. --- *F. scorodosma* Benth. et Trim. --- *F. foetida* Regel

植物名 阿魏草《中药志》

药材名 阿魏《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 熏渠《唐本草》,魏去疾(侯宁极《药谱》),阿虞、形虞《酉阳杂俎》,哈昔泥、隐展、央展《纲目》,阿虞截《新纲》,彩魏、五彩芸、五彩阿魏、含沙阿魏、块状阿魏、胶阿魏草《药材学》

地方名 天津:五彩魏。

功 效 树脂:消积,杀虫。用于瘰癧痞块,虫积,肉积,心腹冷痛,疟疾,痢疾。

备 考 本种国内不产,为外来药物。

## 7213119

*Ferula bungeana* Kitag. --- *Peucedanum rigidum* Bunge --- *Ferula borealis* Kuan

植物名 硬阿魏《高植图鉴》

药材名 沙茴香《汇编》

文献名 赛防风、假防风、野茴香、沙前胡、沙前胡子《沙漠药植》

地方名 沙防风(东北),〔北沙参〕(华北、陕西),〔防风〕(黑龙江、陕西);山西:加工沙参(天镇、阳高),砂椒、花条(晋西);内蒙古:“额勒森-照日古达苏”、“嘎斯诺”、“汉-图梅尔”(蒙名),〔前胡〕,牛叫磨,刚前胡;陕西:沙椒(陕北),〔银柴胡〕,沙窖。

功 效 根:解热,祛痰。用于感冒,发热头痛,气管炎,咳嗽,喘息,胸闷;种子:理气健胃。用于消化不良,急性胃炎;全草:祛风除湿。用于风湿性关节炎。

## 7213120

*Ferula conocaula* Korov.

植物名 圆锥茎阿魏《高植图鉴补编》

药材名 大叶阿魏(新疆)

文献名 圆锥阿魏《中草药通讯》,阿魏《新疆药植志》,圆锥阿魏《汇编》,宽叶阿魏《中药大辞典》

功 效 树脂:消积,杀虫。用于瘰癧痞块,虫积,肉积,心腹冷痛,疟疾,痢疾。

## 7213121

*Ferula ferulaeoides* (Steud.) Korov. --- *Peucedanum ferulaeoides* Steud.

植物名 多伞阿魏《高植图鉴补编》

药材名 阿魏《新疆药植志》

功 效 树脂和根:消积,杀虫,祛湿,止痛。

## 7213122

*Ferula fukanensis* K. M. Shen

植物名 阜康阿魏《高植图鉴补编》

药材名 阿魏《药典》

地方名 云南：“分英”(西双版纳傣名)。

功效 树脂：消积，散痞，杀虫。用于肉食积滞，瘀血癥瘕，腹中痞块，虫积腹痛。

## 7213123

*Ferula krylovii* Korov.

植物名 托里阿魏《高植图鉴补编》

药材名 阿魏《新疆药植志》

功效 树脂：消积，散痞，杀虫。

## 7213124

*Ferula olivacea* (Diels) Wolff ex Hand. -Mazz.

植物名 橄绿阿魏《中国植志》

药材名 橄榄阿魏《品种论述》

文献名 [土当归]《品种论述》，丽江万丈深《云南种录》

地方名 云南：[白芷]、万丈深(丽江)。

备考 部分地区误以其根作土当归或白芷用。

## 7213125

*Ferula sinkiangensis* K. M. Shen

植物名 新疆阿魏《高植图鉴补编》

药材名 阿魏《药典》

文献名 细叶阿魏《汇编》，彩魏《新华本草纲要》

地方名 新疆：臭阿魏，“亨”(维名)。

功效 树脂：消积，散痞，杀虫。用于肉食积滞，瘀血癥瘕，腹中痞块，虫积腹痛；阿魏油：外用于关节痛。

## 7213126

*Ferula songorica* Pall.

植物名 准噶尔阿魏《高植图鉴补编》

药材名 阿魏《新疆药植志》

功效 树脂：消积，散痞，杀虫。

## 7213127

*Foeniculum vulgare* Mill.

植物名 茴香《图经》、《中国植志》

药材名 小茴香《千金方》、《药典》

文献名 茴香菜《千金·食治》，藿香《唐本草》，茴香子《开宝本草》，土茴香《图经》，野茴香《履巉岩本草》，草藿香《本经逢原》，香丝菜《名实图考》，谷香《现代实用中药》，八角珠、八月珠、香子《中国药植志》，西小茴、瘪茴香、瘪谷茴香《常用中药名辨》

地方名 小茴(东北、四川、湖北、广西)，小香(四川、青海)，南茴香、南小茴、南茴、西茴(东北)，谷茴(江西、四川)；天津：北茴香；内蒙古：“找日哈得苏”(蒙语)；青海：“丝拉嘎保”(藏名)；江苏：土小茴(泰州)，刺梦(铜山)；浙江：鱼茴香；江西：谷柏(万年)；福建：丁香草(泉州)；湖北：谷茴香，草子，马尾茴；海南：茺茴，青茺茴；四川：鱼香子；西藏：“赛拉嘎博”(藏名)。

功效 果实：散寒止痛，理气和胃。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经，少腹冷痛，脘腹胀痛，食少吐泻，睾丸鞘膜积液；盐小茴香：暖肾散寒止痛。用于寒疝腹

痛，睾丸偏坠，经寒腹痛。

## 7213128

*Glehnia littoralis* F. Schmidt ex Miq. *Phellopterus littoralis* Benth. --- *Cymopterus littoralis* A. Gray ex Stev.

植物名 北沙参《中药志》

药材名 北沙参《本草汇言》、《药典》

文献名 真北沙参《卫生易简方》，[珊瑚菜]《江淮杂记》，伊势防风、八百屋防风、滨防风《新纲》，龙须菜、六角菜《经济植物学》，米沙参《常用中药名辨》，野香菜根《中药材手册》，条沙参《汇编》

地方名 莱阳参(山东、江苏)，银条参、白条参(江苏、安徽)，海沙参(河北、江苏)；辽宁：辽沙参；山东：野沙参(威海)，莱阳沙参；上海：北条参，细条参；福建：建沙参；广东：土沙参(文昌)；其他：苏条参，洪防风，石防风。

功效 根：养阴清肺，益胃生津。用于肺热燥咳，癆嗽痰血，热病津伤口渴。

备考 《新华本草纲要》(1988)注称：“本草所述‘珊瑚菜’乃指一种生长在内地山野之伞形科植物，《植物学大辞典》误将日本海边所产的滨防风即我国之北沙参称为珊瑚菜，故此名不宜再用”。

## 7213129

*Haploscelis alepidoides* Wolff et Hand. -Mazz.

植物名 单叶邪蒿《西昌中草药》

药材名 西昌红前胡(拟)

文献名 [红前胡]《西昌中草药》

地方名 四川：山萝卜(本里)，黄桔梗(盐源)。

功效 根：润肺止咳，消食。用于止咳，食积腹胀。

## 7213130

*Heracleum acuminatum* Franch.

植物名 渐尖叶牛尾独活(拟)

药材名 牛尾独活《中药志》

文献名 渐尖独活《药学报》，尖叶白芷《云南种录》，渐尖叶独活《中药志》

地方名 四川：独活(小金)。

功效 根：祛风胜湿，止痛。

备考 《药典》正品独活为 *Angelica* 属植物，故不宜将 *Heracleum* 订为独活属，本书将其改称为牛尾独活属。

## 7213130a

*Heracleum apaense* (Shan et Yuan) Shan et T. S. Wang

--- *Angelica apaensis* Shan et Yuan

植物名 法落海《中国植志》

药材名 法罗海(云南、四川)、《滇南本草》

文献名 土川芎、法落梅《滇南本草》，阿坝当归《高植图鉴补编》

地方名 四川：骚独活(阿坝)；云南：臭法罗海、红法罗海、臭法落海(东川)，发落海。

功效 根：理气定痛，疏风止咳。用于胃气痛，腹胀腹痛，风寒咳嗽，头痛。

备考 有学者认为本品应改为 *Ligusticum* 属。

## 7213131

*Heracleum barbatum* Ledeb.

植物名 髯毛牛尾独活(拟)  
药材名 臭独活(汇编)  
文献名 髯毛独活(汇编)  
地方名 老山芹、黑瞎子芹(东北);  
功效 根:祛风胜湿,止痛。

#### 7213132

*Heracleum betonicifolium* Wolff

植物名 水苏叶牛尾独活《品种论述》  
药材名 云南香白芷(拟)  
文献名 水苏叶白芷《云南药录》  
地方名 云南:[香白芷]  
功效 根:发表。用于感冒,头痛。

#### 7213133

*Heracleum candicans* Wall. ex DC.

植物名 白亮牛尾独活《品种论述》  
药材名 白独活《西昌中草药》  
文献名 白亮独活《高植图鉴补编》,藏当归《中药志》  
地方名 青海:“朱嘎尔”(藏名);四川:毛蜡烛,骚独活,土白芷;云南:[香白芷]、土全归、土当归(曲靖),岩川(昭通),白羌活,滇独活;西藏:“朱嘎尔”(藏名)。  
功效 根:祛风除湿,止痛。用于风寒头痛,风湿性关节炎,牙痛。

#### 7213134

*Heracleum dissectifolium* K. T. Fu --- *Heracleum yungningense* auct. non Hand. -Mazz.

植物名 多裂牛尾独活(拟)  
文献名 多裂独活《秦岭植志》  
功效 根:祛风除湿,镇痛。用于风寒湿痹,腰膝酸痛,四肢痿痹。

备考 《高植图鉴》(1972)将本品学名误订为 *H. yungningense* Hand. -Mazz.

#### 7213135

*Heracleum dissectum* Ledeb.

植物名 兴安牛尾独活(拟)  
文献名 兴安牛防风《东北草本植志》,兴安独活《拉汉英种称》  
地方名 老山芹(内蒙古、黑龙江);吉林:[土当归](珲春县);辽宁:黑瞎子芹(千山);其他:牛尾独活。  
功效 根:祛风胜湿,镇痛。

#### 7213136

*Heracleum fargesii* Boiss.

植物名 城口牛尾独活(拟)  
药材名 骚独活(汇编)  
文献名 城口独活《中国植志》  
功效 根:祛风胜湿,镇痛。

#### 7213137

*Heracleum hemsleyanum* Diels

植物名 川鄂牛尾独活《品种论述》  
药材名 牛尾独活(陕西、甘肃、四川、贵州)  
文献名 独活《名实图考》,川鄂独活(汇编)

地方名 湖北:毛独活,毛芹菜;四川:毛羌(峨眉),土白芷(南川),大活,假羌活。

功效 根:祛风胜湿,排脓,生肌止痛。用于风寒湿痹,腰膝酸痛,痈肿。

#### 7213138

*Heracleum henryi* Wolff

植物名 南瓜七《新华本草纲要》  
文献名 思茅独活《中国植志》  
地方名 云南:荷花七,缅甸七。  
功效 根:通经活络,镇痛散瘀。用于跌打损伤,风湿疼痛,痛经,月经不调等。

#### 7213139

*Heracleum millefolium* Diels

植物名 千叶牛尾独活(拟)  
文献名 千叶独活《秦岭植志》,裂叶独活《西藏植志》,多裂独活、“知尔尔巧”(藏名)《青藏药图》,多裂叶独活《拉汉英种称》  
地方名 多叶土当归(西北)。  
功效 全草:止血,愈创。用于创伤及麻疯病等。

#### 7213140

*Heracleum moellendorffii* Hance --- *Heracleum lanatum* auct. non Michx.

植物名 短毛牛尾独活《品种论述》  
药材名 牛尾独活《中药通报》  
文献名 茂州独活《图经》,河北独活《汇编》,短毛独活《中国植志》,短毛白芷、东北牛防风《东北草本植志》,河北牛防风《药学学报》,软毛独活《中药大辞典》,绵毛独活《中国药植志》,毛白芷《药材学》,山荷叶《陕西中草药》,绵毛白芷《云南种录》,牛防风《种分讲义》,花土当归《四川中药志》,花当归《植物学大辞典》

地方名 山独活(陕西、安徽),老山芹(辽宁、山东),独活(山东、安徽、四川),大活(山东、安徽),白独活(陕西、四川),黄眼草(河北、内蒙古),[白芷](河北、江西);辽宁:大叶芹(盖县、庄河、义县),[土当归](清原);河北:黄眼子;内蒙古:猫眼子;陕西:山毛羌、毛羌、臭独活(太白),[羌活](宁强),阿儿七、[窝儿七](眉县),窝儿参(凤县);青海:马尿杆;江苏:水防风(苏北);浙江:水独活;湖北:毛腿杆,毛羌活;四川:尾活。

功效 根:祛风胜湿。用于风寒湿痹,腰膝酸痛,头痛,齿痛及肿疡漫肿等。

备考 过去文献常将本种学名误订为 *Heracleum lanatum* Michx (此种中国不产)。

#### 7213141

*Heracleum moellendorffii* Hance var. *paucivittatum* Shan et T. S. Wang

植物名 走马芹《药学学报》  
文献名 少管短毛独活《中国植志》  
地方名 山东:大活。

功效 根:清热解毒,消肿止痛,通乳散结。用于乳腺炎,萎缩性胃炎,气管炎,扁桃腺炎,副鼻窦炎,骨髓炎,肺结核,疔疮肿毒等。

#### 7213142

*Heracleum moellendorffii* Hance var. *sagenifolium* K. T. Fu

植物名 深裂短毛牛尾独活(拟)

文献名 深裂短毛独活《秦岭植志》

功效 根:祛风,除湿,镇痛。用于风寒湿痹,腰膝酸痛,四肢痉挛等。

#### 7213143

*Heracleum moellendorffii* Hance var. *subbipinnatum* (Franch.) Kitag.

植物名 多裂短毛牛尾独活(拟)

文献名 多裂短毛独活《北京植志》,狭叶东北牛防风《长白山植药志》,狭叶白芷《东检》

功效 根:祛风胜湿,散寒止痛。

#### 7213144

*Heracleum rapula* Franch. --- *Heracleum candicans* auct. non Wall. ex DC.

植物名 白云花《汇编》

药材名 白云花根《汇编》

文献名 独活《滇南本草》,滇独活《名实图考》,鹤庆独活《中国植志》

地方名 云南:土全归,毛爪参,白毛参,〔羌活〕,羌活骨,岩川,香白芷,〔白芷〕《昆明》。

功效 根:止咳平喘,祛风湿,止痛。用于风寒咳嗽,风湿痹痛,脘腹痛。

备考 白云花根原植物学名过去误订为 *Heracleum candicans* Wall. ex DC. 并为一些文献和资料所引用,应予更正。

#### 7213145

*Heracleum scabridum* Franch.

植物名 滇白芷《中国植志》

药材名 滇白芷《品种论述》

文献名 〔白芷〕《滇南本草》,糙叶白芷《汇编》,糙叶独活《中药志》,糙白芷《药材学》,粗糙独活《中国药植志》,云南牛防风《中药大辞典》,糙独活《中国植志》

地方名 四川:“直挂”(藏名);贵州:南明川芎;云南:大马芹、大翻白叶、山白芷、马尿芹、白面风、香白芷、野香芹、〔野当归〕、猪钱草(红河),水白芷(丽江),〔蛇床子〕。

功效 根:祛风散湿,排脓,生肌止痛。

#### 7213146

*Heracleum souliei* de Boiss.

植物名 茂纹牛尾独活(拟)

药材名 茂纹独活《汇编》

文献名 康定独活《中国植志》

地方名 四川:小独活。

功效 根:祛风胜湿,散寒止痛。

#### 7213147

*Heracleum stenopterum* Diels

植物名 狭叶牛尾独活《品种论述》

药材名 牛尾独活《云南药录》

文献名 狭翅独活《中国植志》,狭翅白芷《云南种录》

地方名 陕西:〔白芷〕;云南:独活。

功效 根:祛风胜湿,散寒止痛。

#### 7213148

*Heracleum tibifolium* Wolff

植物名 楸叶牛尾独活(拟)

药材名 牛尾独活(拟)

文献名 楸叶独活《中国植志》

地方名 安徽:独活(歙县);湖南:〔前胡〕。

功效 根:祛风胜湿,散寒止痛。

#### 7213149

*Heracleum vicinum* Boiss.

植物名 牛尾独活《汇编》

文献名 独活《名实图考》,平截独活《中国植志》

地方名 陕西:毛羌(太白山);其他:西大活。

功效 根:祛风胜湿,散寒止痛。

#### 7213150

*Heracleum yungningense* Hand. -Mazz.

植物名 永宁牛尾独活(拟)

药材名 毛独活(四川)

文献名 永宁独活《中国植志》,永宁白芷《云南种录》

地方名 独活(陕西、甘肃、云南);陕西:白羌活(南郑);湖北:土独活(神农架)

功效 根:祛风胜湿,散寒止痛。用于风寒湿痹,腰膝酸痛,四肢痉挛。

#### 7213151

*Hydrocotyle benguetensis* Elm. --- *Hydrocotyle ranunculifolia* Ohwi

植物名 吕宋天胡荽《中国植志》

文献名 槭叶止血草《台湾药植志》

地方名 台湾:遍地锦。

功效 全草:解热,利尿,解毒,凉血。用于喉痛,感冒,胎毒,肾结石,脑炎,肠炎,跌打损伤;鲜草:用于疔疮、缠身蛇。

#### 7213152

*Hydrocotyle chinensis* (Dunn) Craib --- *H. javanica* var. *chinensis* Dunn ex Shan et S. L. Liou

植物名 中华天胡荽《中国植志》

药材名 大铜钱菜《贵州草药》

文献名 长梗天胡荽《云南种录》

地方名 四川:地弹花(米易),铜钱草(城口);贵州:大马蹄草。

功效 全草:镇痛,清热利湿。用于腹痛,小便不利,湿疹,黄疸。

#### 7213153

*Hydrocotyle dichondroides* Makino --- *H. delicata* Elmer

植物名 毛柄天胡荽《中国植志》

药材名 毛天胡荽《台湾药植志》

地方名 台湾:假遍地锦,遍地锦舅。

功效 全草:清热,利尿。

#### 7213154

*Hydrocotyle handelii* Wolff

植物名 普渡天胡荽《中国植志》

药材名 五叶藤《西昌中草药》

文献名 普渡河天胡荽《云南种录》

地方名 四川:小红袍,五月藤;云南:大叶五瓣草、“思火喇吗”(元江哈尼名),地星(曲靖)。

功效 藤:有小毒。祛风除湿,活血散瘀。用于风湿麻木,跌打肿痛,骨折;全草:截疟,止痛,止咳。

#### 7213155

*Hydrocotyle keelungensis* Liu, Chai et Chung

植物名 基隆天胡荽《台湾药植志》

地方名 台湾:遍地锦舅。

功效 全草:解热。

#### 7213156

*Hydrocotyle nepalensis* Hook. --- *H. polycephala* Wight et Arn. --- *Hydrocotyle javanica* auct. non Thunb.

植物名 红马蹄草《中国植志》

药材名 红马蹄草《四川中药志》

文献名 红石胡荽《汇编》,尼泊天胡荽《西昌中草药》

地方名 铜钱草(湖南、四川),[金钱薄荷](浙江、台湾、广东);浙江:塌菜(临安、云和),八角金钱(泰顺),大叶止血草,八角铜盘(温州);台湾:乞食碗,红骨含壳草,含壳钱草,变地忽;湖南:蜘蛛草;广东:大样驳骨草(乐昌);广西:五叉雷公根、(冬葵子)(博白),大甲草(大瑶山),大雷公根(玉林),水钱草(那坡),山莲藕(陆川),风盘,水银草(那坡);四川:马蹄肺筋草,接骨草,一串钱,大马蹄草,大满天星,大破铜钱草,红筋马蹄草;贵州:大地星宿;云南:阔鱼草(河口)。

功效 全草:清肺止咳,活血止血。用于感冒,咳嗽,吐血,跌打损伤。外用于外伤出血,痔疮。

备考 过去一些文献,常将本品误定为 *Hydrocotyle javanica* Thunb.

#### 7213157

*Hydrocotyle pseudo-conferta* Masamune

植物名 密伞天胡荽《中国植志》

药材名 亮叶草《元江哈尼族药》

文献名 假密伞天胡荽《植分学报》,假密伞花天胡荽《云南种录》

地方名 云南:“然姑加里那雌”(元江哈尼语)。

功效 全草:清热,利胆,止咳,止泻。用于小儿高热惊厥,小儿腹泻,小儿腹胀,呃逆,小儿百日咳,咳嗽,小儿黄疸性肝炎,阻塞黄疸。

#### 7213158

*Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. --- *Hydrocotyle formosana* Masamune --- *H. rotundifolia* Roxb.

植物名 天胡荽《中国植志》

药材名 天胡荽《千金方》、《汇编》

文献名 [鸡肠菜]《千金·食治》, [石胡荽]《四声本草》, [鹅不食草]《食性本草》,破钱草、[千里光]、千光草《滇南本草》,野园荽《纲目》,地光钱草《邵武府志》,翳草《医林纂要》,滴滴金《生草药性备要》,铺地锦《潮州府志》,肺风草《质问本草》,破铜钱、[积雪草]《名实

图考》,满天星《草木便方》,明镜草《分类草药性》,翳子草、盆上荒茜《岭南采药录》

地方名 落地金钱(江苏、浙江、湖南、广东、四川、贵州),铜钱草(江苏、湖南),遍地锦(福建、台湾、湖南、广东),小金钱草(陕西、上海、浙江、湖南),花边灯盏(广东、广西),小叶金钱草(江西、湖北),镜面草(陕西、四川),雨点草(湖北、湖南);江苏:移星草;上海:破铜钱草;浙江:母鸡草,九头胡荽(天目山),落地梅花(鄞县、嵊县),遍地金(杭州、温州);安徽:蒙翳草,小叶铜钱草(休宁);江西:[金钱草],小叶破铜钱(定南),小叶钱凿草,野芹菜,克麻藤,小金钱(景德镇),烂金钱(吉安),小叶遍地香(瑞昌),[马蹄草],小叶花金钱(泰和);福建:过路蜈蚣草,鱼寮子草,蔡达草(龙岩),光钱草(寿宁),光面钱,细叶金钱,细叶地钱(宁化),细地星钱,赵钱子,雷比草,地干钱,八卦草,发无踪,雷匪草,百花草,鱼寮子,引水草(泉州),地锦草;湖南:遍地青,四片孔,星子草,地光钱,遍地金钱,补锅钉(衡阳),锅钉草(长沙),铜皮草(凤凰、麻阳),冬新木(醴陵、沅陵、花垣、通道),盆荽;广东:假荒茜,细种老公根(增城、罗定、乐昌、阳江),细样钱蚕茶(阳江、阳春),细叶钱凿口(梅县),钱凿草(阳江、阳春、茂名、高州、化州),钱凿菜(电白、徐闻、海康、廉江、遂溪),鱼擦仔草(紫金、兴宁),鱼鳞草(饶平),鱼擦里(兴宁),地面一点油,一点油,一点气,拐仔草(高鹤),五合子(五华),桂花草(汕头、南澳),[血见愁](惠来),大叶鹅不食,铺地满天星、铺地金钱、细叶鱼闪子(惠阳),龙灯碗(徐闻),圆地炮(大埔);海南:铁画亭,鹅仔草(澄迈、琼海),马脚油(临高),钱三草(海口、定安、屯昌);广西:天星草(北海),[猫爪草],伤寒草,鼠迹草,花灯盏(藤县),细种雷公根、芍草(合浦),灯盏菜(恭城),细螺足,小花绿灯盏,花边灯盏菜;四川:蠹虫草,星宿草;贵州:地星宿,小铜钱草;云南:星秀草(曲靖),地荒荽,小马蹄草,“则娃白”(楚雄彝名)。

功效 全草:清热利湿,祛痰止咳。用于黄疸型传染性肝炎,肝硬化腹水,胆石症,泌尿系感染,泌尿系结石,伤风感冒,咳嗽,百日咳,咽喉炎,扁桃体炎,目翳。外用于湿疹,带状疱疹,衄血。

#### 7213159

*Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. var. *batrachium* (Hance) Hand. -Mazz. ex Shan --- *H. batrachium* Hance --- *H. rotundifolia* Roxb. var. *batrachium* (Hance) Cherm.

植物名 破铜钱《中国植志》

药材名 破铜钱《名实图考》、《汇编》

文献名 鸡肠菜《千金方》,白毛天胡荽《中药大辞典》,江西金钱草、南昌金钱草《中药通报》

地方名 陕西:满天星;安徽:小叶铜钱草;江西:[金钱草],小金钱,满天得,野芹菜,[鹅不食草];广西:地迎倪(柳江),铜钱草,雨点草(凤山),天星草;云南:星秀草;其他:雷比草,过路蜈蚣草,野荒荽,鱼寮子草。

功效 全草:清热利湿,祛痰止咳。

#### 7213160

*Hydrocotyle wilfordi* Maxim.

植物名 肾叶天胡荽《中国植志》

文献名 镜面草《植物名汇拾遗》

地方名 浙江:花地丁(黄岩);广东:冰大海(阳山), [透骨草](翁源);海南:水雷公根(临高), 大样雷公根(澄迈);广西:山灯盏(龙胜), 鱼藤草(全县), 小灯盏;四川:〔满天星〕, 星宿草, 明镜草, 蠹虫草;云南:小叶铜钱草, 盆上堇菱, 花边灯盏, 过路蜈蚣。

功效 全草:清热利湿。

#### 7213161

*Hydrocotyle wilsonii* Diels

植物名 鄂西天胡荽《中国植志》

地方名 湖北:金钱草(神农架)。

功效 全草:清热利湿、止血。用于黄疸型肝炎, 赤痢, 中耳炎, 龋子, 白口疮, 肝硬变, 热淋, 石淋。

#### 7213162

*Krasnovia longiloba* (Kar. & Kir.) M. Pop.

植物名 块茎芹《中国植志》

文献名 块茎参《中草药通讯》

地方名 新疆:〔元胡〕。

备考 块茎在新疆有被混淆作元胡, 应注意鉴别。

#### 7213163

*Levisticum officinale* Koch --- *Ligusticum levisticum* L.

--- *Angelica levisticum* Baillon

植物名 欧当归《中药志》

文献名 保当归《新华本草纲要》

功效 根:用于闭经, 月经涩少, 痛经, 头晕, 头痛, 四肢麻, 失眠, 大便干燥等症。

#### 7213164

*Libanotis buchtormensis* (Fisch.) DC. --- *Seseli giraldii* Diels

植物名 岩风《中国植志》

药材名 长春七(陕西)、《汇编》

地方名 陕西:长虫七(眉县、太白县);新疆:〔防风〕(阿勒泰)。

功效 根:发表散寒, 祛风活络。用于感冒, 咳嗽, 头痛, 牙痛, 风湿关节痛, 跌打损伤。

#### 7213165

*Libanotis condensata* (L.) Crantz --- *Seseli condensatum* (L.) Reichb. f.

植物名 密花岩风《中国植志》

地方名 山西:胡芹菜;河北:山胡萝卜。

功效 根:解痉。用于扩张冠状动脉。

#### 7213166

*Libanotis iliensis* (Lipsky) Korov. --- *Seseli iliense* (Rgl. et Schmalh.) Lipsky

植物名 伊犁岩风《中国植志》

药材名 伊犁岩风《品种论述》

文献名 伊犁防风《汇编》, 细叶防风《中药大辞典》, 线叶防风《品种论述》, 新疆防风《中药大辞典》, 伊犁利北芹《新疆中草药》

地方名 新疆:〔防风〕, “克买克”(维名)。

功效 根:发表, 祛风, 除湿, 镇痛。用于风热感冒, 偏头痛, 风湿性关节炎, 荨麻疹, 表虚自汗。

#### 7213167

*Libanotis lanceifolia* K. T. Fu

植物名 条叶岩风《中国植志》

药材名 岩风(陕西、河南)

地方名 河北:黑风(内邱);陕西:长春七(华阴)。

功效 根:发表散寒, 祛风活络。

#### 7213168

*Libanotis laticalcina* Shan et Sheh

植物名 宽萼岩风《中国植志》

药材名 水防风(山西、河南)

地方名 山西:防风;河南:汜水防风。

功效 根:发表散寒, 祛风活络。

#### 7213169

*Libanotis seseloides* (Fisch. et Mey. ex Turcz.) Turcz. --- *Ligusticum seseloides* Fisch. et Mey. ex Turcz. --- *Seseli seseloides* (Fisch. et Mey.) Hiroe --- *S. libanotis* Koch var. *daucifolia* (DC.) Franch. et Sav.

植物名 香芹《中国植志》

药材名 邪蒿《中药大辞典》

文献名 伊吹防风(和汉药标本目录)

地方名 黑龙江:野胡萝卜(集贤);内蒙古:“昂给拉玛·朝古日”(蒙名)。

功效 全草:利肠胃, 通血脉。用于痢疾, 恶疮。

备考 对“邪蒿”之原植物考订, 学者意见不一。作者认为古本草之“邪蒿”, 当为伞形科邪蒿属(*Seseli*)植物, 其叶形似柴胡似竹叶之 *Seseli mairei* Wolff。

#### 7213170

*Libanotis sibirica* (L.) C. A. Mey.

植物名 亚洲岩风《中国植志》

地方名 陕西:〔石防风〕、石黄风(太白山、宝鸡)。

功效 根:解热。

#### 7213171

*Libanotis spodotrichoma* K. T. Fu

植物名 灰毛岩风《中国植志》

药材名 长春七(陕西)

地方名 陕西:长虫七(眉县、周至、佛坪), 岩风(山阳、旬阳);甘肃:〔万年青〕(徽县)。

功效 根:发表散寒, 祛风活络。

#### 7213172

*Ligusticum acuminatum* Franch.

植物名 尖叶藁本《中国植志》

药材名 水藁本(四川)

文献名 渐尖叶藁本《中药志》, 光叶藁本《云南种录》

地方名 河南:藁本菜;四川:黄藁本(四川西部);云南:西归。

功效 根:祛风, 散寒, 止痛。

#### 7213173

*Ligusticum angelicifolium* Franch.

植物名 归叶藁本《中国植志》



文献名 当归叶蕺本《秦岭植志》

功效 根:止咳。

#### 7213174

*Ligusticum brachylobum* Franch.

植物名 短片蕺本《中国植志》

文献名 [前胡]《滇南本草》,短裂蕺本《广西药录》

地方名 四川:毛前胡(宜宾、涪陵),土蕺本,七川芎,岩川芎;贵州:动虫草;云南:旱前胡。

功效 根:解表镇痛,祛风胜湿。用于外感表症,头痛昏眩,关节疼痛,四肢拘挛,目赤疮疡,破伤风。

备考 过去一些文献,常将本种误称为川防风。

#### 7213175

*Ligusticum calophlebicum* Wolff

植物名 美脉蕺本《中国植志》

地方名 四川:[前胡](西昌)。

功效 根:祛风,散寒,止痛。

#### 7213176

*Ligusticum chuanxiong* Hort.

植物名 川芎《中国植志》

药材名 川芎《汤液本草》、《药典》

文献名 山鞠穷《左传》,芎藭《本经》,香果《吴普本草》,胡穷、[蕺芎]《叶》《别录》,雀脑芎、京芎《图经》,川芎苗《履巇岩本草》,贯芎《珍珠囊》,台芎《本草蒙笙》,闾莫伽《金光明经》,小叶川芎《中药志》

地方名 四川:坝川芎,芎藭子,乳芎,秦芎;贵州:细叶川芎,广川芎。

功效 根茎:活血行气,祛风止痛。用于月经不调,闭经痛经,癥瘕腹痛,胸肋刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛。

#### 7213177

*Ligusticum chuanxiong* Hort. cv. Fuxiong

植物名 抚芎《植分学报》

药材名 抚芎《纲目》

地方名 江西:抚川芎,茶芎,茶川芎,武芎。

功效 根茎:活血行气,祛风止痛。江西作川芎入药。

#### 7213178

*Ligusticum dauroides* (Franch.) Franch.

植物名 羽苞蕺本《中国植志》

药材名 滇前胡《汇编》

文献名 羽裂蕺本《汇编》

地方名 山芹菜(四川、云南);湖北:药茴香;云南:旱前胡,〔前胡〕,〔当归〕,胡萝卜状蕺本,红前胡。

功效 根:祛痰,止喘。用于感冒,支气管炎,月经不调。

#### 7213179

*Ligusticum delavayi* Franch.

植物名 丽江蕺本《中国植志》

药材名 丽江蕺本《云南种录》

文献名 滇蕺本《名实图考》,黄蕺本《汇编》

地方名 云南:黑蕺本。

功效 根:散风除湿。用于头痛,风湿痹痛。

#### 7213180

*Ligusticum discolor* Ledeb.

植物名 异色蕺本《中国植志》

文献名 三色蕺本《品种论述》

地方名 新疆:野当归、上当归(阿尔泰)。

功效 根:调经。

#### 7213181

*Ligusticum glaucescens* Franch.

植物名 粉绿蕺本《云南种录》

药材名 野当归《云南药录》

文献名 粉绿当归《中药大辞典》

地方名 云南:野秦归,云南野当归,土当归。

功效 根:补血调经。

#### 7213182

*Ligusticum jeholense* (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.

--- *Cnidium jeholense* Nakai et Kitag.

植物名 辽蕺本《中国植志》

药材名 蕺本《本经》、《药典》

文献名 鬼卿、地新《本经》,微茎《别录》,山香菜《中草药学》,北蕺本《东北草本植志》,野芹菜《简明中医辞典》,热河蕺本《中药志》

地方名 香蕺本(河北、山西),山香叶(辽宁、吉林);辽宁:家蕺本、水蕺本(凤城),旱蕺本(朝阳);山东:野芫荽(五莲),野香草(蒙山),山蕺本(海阳)。

功效 根茎、根:祛风,散寒,除湿,止痛。用于风寒感冒,巅顶疼痛,风湿关节痹痛。

#### 7213183

*Ligusticum jeholense* (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.

var. *tenuisectum* Chu

植物名 细裂辽蕺本《东北草本植志》

功效 根茎、根:祛风,散寒,除湿,止痛。

#### 7213184

*Ligusticum pteridophyllum* Franch.

植物名 蕨叶蕺本《中国植志》

药材名 黑蕺本《汇编》

文献名 蕨叶白芷《滇南本草》整理本)

地方名 云南:蕺本,野川芎,打不死,岩林,岩川芎。

功效 根:散寒止痛。用于风寒感冒,头痛,偏头痛,神经性头痛,胃寒痛,肌肉关节痛。

#### 7213185

*Ligusticum reptans* (Diels) Wolff

植物名 匍匐蕺本《中国植志》

药材名 匍匐蕺本《贵州药录》

功效 根:活血行气,祛风止痛。用于风湿痹痛,风寒头痛,跌打损伤,月经不调。

#### 7213186

*Ligusticum sinense* Oliv.

植物名 蕺本《中国植志》

药材名 蕺本《本经》、《药典》

文献名 蕺芎《山海经》,鬼卿、地新《本经》,山茝、蕺香《广雅》,微茎《别录》,山园芎《救荒本草》,蕺木香《纲目》,野芹菜《简明中医辞典》,净蕺本、香蕺本《常用中

药名辨》，南郑藁本《药材学》，西芎藭本《品种论述》

地方名 西芎(陕西、安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川)；陕西：土芎，山芎；湖北：水藁本；湖南：西野芎，辛香，上川芎，土辰菜，香草根，广川；广西：川香，野川芎(全州)；四川：香本，香头子，秦芎，小芎茅根。

功效 根茎、根：祛风，散寒，除湿，止痛。用于风寒感冒，巅顶疼痛，风湿痹节痹痛。

#### 7213187

*Ligusticum tachiroei* (Franch. et Sav.) Hiroe et Constance --- *Tilingia tachiroei* (Franch. et Sav.) Kitagawa

植物名 岩茴香《中国植志》

文献名 细叶藁本《秦岭植志》

地方名 浙江：桂花三七、柏子三七(临安)。

功效 根：用于伤风感冒，跌打损伤。

#### 7213188

*Ligusticum tenuissimum* (Nakai) Kitagawa --- *Angelica tenuissima* Nakai

植物名 细叶藁本《中国植志》

药材名 细叶藁本《药材学》

文献名 薄叶藁本(《滇南本草》整理本)，北藁本《中药大辞典》，香藁本《常用中药名辨》

地方名 藁本(辽宁、吉林)；辽宁：早藁本、山藁本(凤城)，火藁本(岫岩)。

功效 根、根茎：祛风，散寒，止痛。

#### 7213189

*Nothosmyrnium japonicum* Miq.

植物名 白苞芹《中国植志》

药材名 紫茎芹《浙江药植志》

文献名 华美叶芹《江西药录》

地方名 山西：香藁本；山东：山藁本(烟台)；浙江：土藁本(临安、云安)，芹菜三七(临安、天台)；湖北：水芹菜；湖南：石防风。

功效 根：镇痉止痛。用于风寒感冒，头痛，筋骨疼痛。

#### 7213190

*Nothosmyrnium japonicum* Miq. var. *sutchuensis* de Boiss.

植物名 川白苞芹《中国植志》

文献名 四川白苞芹《新华本草纲要》

功效 根：镇静止痛。用于咳嗽。

#### 7213191

*Notopterygium franchetii* de Boiss. --- *N. forbesii* de Boiss.

植物名 宽叶羌活《中国植志》

药材名 羌活《本经》、《药典》

文献名 羌青《本经》，胡王使者《吴普本草》，岷羌活《秦岭植志》，福氏羌活《中药志》，西羌活《常用中药名辨》

地方名 大头羌(湖北、青海)；青海：“朱那”(藏名)，狗引子花，曲药，牛尾羌；四川：“直满”(若尔盖藏名)，川羌活，条羌，空洞草；云南：云南羌活。

功效 根茎、根：散寒，祛风，除湿，止痛。用于风

寒感冒头痛，风湿痹痛，肩背酸痛。

备考 据顾哲民考证：本品学名正名应为 *N. franchetii*，而 *N. forbesii* 为其异名。

#### 7213192

*Notopterygium franchetii* de Boiss. var. *oviforme* --- *Notopterygium forbesii* de Boiss. var. *oviforme* (Shan) H. T. Chang --- *Notopterygium oviforme* Shan

植物名 卵叶羌活《中国植志》

药材名 水独活(四川南川)、《药学报》

地方名 四川：水当归。

功效 根茎及根：解表散寒，除湿止痛。

#### 7213193

*Notopterygium incisum* Ting ex H. T. Chang

植物名 羌活《中国植志》

药材名 羌活《本经》、《药典》

文献名 羌青、护羌使者《本经》，胡王使者《吴普本草》，羌滑《本草蒙筌》，追风使者《国药的药理学》，裂叶羌活《中药志》，螺丝羌《中药大辞典》，蚕羌、竹节羌《药典》，西羌活《常用中药名辨》

地方名 青海：黑药，“朱那”(藏名)，狗引子花，曲药，西羌；四川：“布玛”(藏名)，竹节羌活(马尔康)，川羌，炉羌，雅羌，羌王，正羌；云南：大马尿芹。

功效 根茎及根：散寒，祛风，除湿，止痛。用于风寒感冒，头痛，风湿痹痛，肩背酸痛。

#### 7213194

*Oenanthe benghalensis* Benth. et Hook. f.

植物名 短辐水芹《中国植志》

药材名 水芹菜《昆明民药》

文献名 少花芹菜《中药大辞典》，少花水芹《高植图鉴》

功效 全草：平肝，解表，透疹。用于麻疹初期，高血压，失眠。

#### 7213195

*Oenanthe dielsii* de Boiss.

植物名 西南水芹《中国植志》

文献名 细叶水芹《秦岭植志》

地方名 江西：野芹菜；广西：野羌萎；四川：细叶川芎(峨眉山)；湖北：水萝卜，野茴香，臭蒿，胡萝卜七。

功效 全草：祛风除湿，止痛。

#### 7213196

*Oenanthe dielsii* de Boiss. var. *stenophylla* de Boiss.

植物名 细叶水芹《中国植志》

地方名 江西：野芹菜；湖北：野茴香；四川：水防风(南川)。

功效 全草：祛风除湿，清热解毒。

#### 7213197

*Oenanthe javanica* (Blume) DC. --- *O. decumbens* K. - Pol. --- *O. stolonifera* (Roxb.) DC.

植物名 水芹《中国植志》

药材名 水芹《千金翼方》、《汇编》

文献名 楚葵《尔雅》，芹菜(《尔雅》郭璞注)，笠《周礼》，蒹菜《说文》，水蕲、水英《本经》，蒹《集韵》，水芹菜

《滇南本草》, 芹(小泉《药植》)

地方名 河芹(东北), 野芹(安徽、云南), 野芹菜(辽宁、甘肃、山东、江苏、浙江、江西、湖南、广西、云南), 野水芹(江西、云南); 黑龙江: 小叶芹(双城); 云南: “帕安俄”(西双版纳傣语), 马芹(昆明), 姨妈菜; 西藏: 密介芹菜。

功效 根及全草: 清热利湿, 止血, 降血压。用于感冒发热, 呕吐腹泻, 尿路感染, 崩漏, 白带, 高血压。

#### 7213198

*Oenanthe rivularis* Dunn

植物名 蒙白水芹《中国植志》

药材名 溪边水芹《云南药录》

文献名 野水芹《汇编》

地方名 贵州: 水芹; 云南: 水芹菜。

功效 全草: 清热利尿, 解毒消肿。用于慢性胃炎, 食积胃痛, 白淋。外用于挫伤肿痛, 血虚风毒。

#### 7213199

*Oenanthe rosthornii* Diels

植物名 卵叶水芹《中国植志》

地方名 湖北: 水芹, 水川芎; 四川: 山芹菜草(南川); 贵州: 水芹菜。

功效 全草: 发表, 祛寒, 补气血, 止外伤出血。

#### 7213200

*Oenanthe sinensis* Dunn

植物名 中华水芹《中国植志》

药材名 鸭芹《广西药录》

地方名 广西: 拔疮药(隆林), 水芹菜(凌云), 野芹菜(融水)。

功效 茎、叶: 用于头痛, 跌打损伤。

#### 7213201

*Osmorhiza aristata* (Thunb.) Makino et Yabe

植物名 香根芹《中国植志》

文献名 东北香根芹《东北草本植志》

地方名 [羌活](江苏、台湾), [鹤虱](浙江、台湾、湖南), 野胡萝卜(江苏、湖南); 吉林: [当归](盘石); 辽宁: 香瓜草, [藁本]; 上海: 鹤虱子; 浙江: 野芫荽(天目山); 安徽: 水芹三七(歙县)。

功效 根、根茎: 发汗, 祛风, 除湿, 宣通经络止痛。用于风寒感冒, 头痛身疼, 恶寒无汗发热, 风湿性关节疼痛, 痈肿疮毒, 跌打损伤。

#### 7213202

*Osmorhiza aristata* (Thunb.) Makino et Yabe var. *laxa* (Royle) Constance et Shan

植物名 疏叶香根芹《中国植志》

文献名 香根芹《西藏中草》

地方名 南鹤虱、野胡萝卜(江苏、湖南); 四川: 野当归。

功效 全草: 散寒, 发表, 止痛。用于风寒感冒, 头顶痛, 周身疼痛等。

#### 7213202a

*Ostericum citriodorum* (Hance) Yuan et Shan --- *Angelica citriodora* Hance

植物名 隔山香《中国植志》

药材名 隔山香《名实图考》、《汇编》

文献名 鸡山香《名实图考》, 香白芷《广西药录》, 柠檬当归《新华本草纲要》

地方名 人参归、鸡爪参、鸡爪前胡(广东、广西), [土当归](浙江、安徽、江西、湖南、广东), 小当归(福建、广东), 正香前胡(浙江、福建、广东), 金鸡爪(湖南、广东), [前胡](浙江、福建), 野当归(浙江、安徽、湖南), 柠檬香碱草(浙江、湖南、广东、广西); 浙江: [独活](龙泉), 山竹青(平阳、莒溪), 九步香(温州、乐清), [白花前胡], 岩风, 雄前胡; 江西: 土柴胡、野茴香(会昌), 山党参(南丰), 十里香, 天木香、金爪参、野天竹; 福建: [香前胡](浦城县); 湖南: 过山香、[满山香](衡阳), 三皮消, 上防风, 水防风, 鸡爪爪, 岩鹰爪; 广东: 豆叶寮刁竹、鹤脚蕲(阳春), 土前胡(惠阳), 假前胡, 英雄草; 广西: 一支香、马连鞍(平南), 山茴香(柳江), 羌活(贵县、玉林), 三脚鹤(博白), 土伏神, 豆豉蓉, 搔古羊, 上白芷, 假当归; 其他: 山竹香。

功效 根或全株: 疏风清热, 活血散瘀, 行气止痛。用于风热咳嗽, 心绞痛, 胃痛, 疟疾, 痢疾, 经闭, 白带, 跌打损伤。

#### 7213203

*Ostericum grosseserratum* (Maxim.) Kitag. --- *Angelica grosseserrata* Maxim.

植物名 大齿独活《汇编》

文献名 大齿当归《中药大辞典》, 粗齿当归《浙江药植志》, 大齿山芹《高植图鉴补编》, 粗锯齿叶当归《药材学》, 碎叶山芹、朝鲜当归《东北草本植志》, 内山当归、芳香性独活《台湾药植志》

地方名 小芹菜(辽宁、福建), [藁本](辽宁、吉林); 吉林: 香独活; 辽宁: 小叶芹(建昌、本溪、新宾、丹东、岫岩), 鸡爪子芹(丹东), 碎叶芹(开原), 藁本下脚(凌源), 山芹菜(绥中、建昌、普口、庄河、本溪、开原); 浙江: 山水芹菜(临安), 独活。

功效 根: 祛风, 除湿, 止痛。

备考 有些文献将本种误订为福参 *Angelica morii* Hayata.

#### 7213204

*Ostericum sieboldii* (Miq.) Nakai --- *Angelica miqueliana* Maxim.

植物名 山芹《高植图鉴补编》

文献名 背翅独活《汇编》, 山芹当归《高植图鉴》, 秦陇当归《经植手册》, 山芹独活《东检》

地方名 西归(西南); 辽宁: 山芹菜(安图、抚顺、新金、文县、凌源), 望天芹(千山), 对叶芹(抚顺); 内蒙古: “哲日力格-朝古昌”(蒙名); 江苏: 独活; 湖南: [水田七]; 四川: [前胡]。

功效 根: 祛风胜湿, 散寒止痛; 全草: 用于急性乳腺炎。

#### 7213205 见 7213202a

#### 7213206

*Petroselinum crispum* (Mill.) Hill

植物名 欧芹《中国植志》

功效 果实:用于利尿。

备考 我国有栽培或成野生状态

### 7213207

*Peucedanum dielsianum* Fedde ex Wolff --- *Ligusticum brachylobum* auct. non Franch.

植物名 竹节前胡《中国植志》

药材名 竹节前胡《药物分析杂志》

地方名 湖北:崖风,崖防风;四川:川防风、竹节防风(万县、涪陵、宜宾、泸州),西风。

功效 根:解表镇痛,祛风胜湿。

备考 四川的川防风为本种,过去一些文献常误订为 *Ligusticum brachylobum* Franch. (短片藁本)

### 7213208

*Peucedanum dissolutum* (Diels) Wolff

植物名 南川前胡《中国中药杂志》

药材名 南川前胡(四川)

地方名 四川:光前胡,光头前胡。

功效 根:散风清热,降气化痰。

7213209 见 7213208

### 7213210

*Peucedanum elegans* Komarov

植物名 刺尖前胡《中国植志》

文献名 雅致前胡《拉汉英种称》,刺尖石防风《东检》

功效 根:止血,祛痰。用于咳嗽。

7213211 见 7213270

### 7213211a

*Peucedanum harry-smithii* Fedde ex Wolff var. *grande* (K. T. Fu) Shan et Sheh --- *P. praeruptorum* Dunn var. *grande* K. T. Fu

植物名 广序北前胡《中国植志》

药材名 大前胡《秦岭植志》

功效 根:散风清热,降气祛痰。用于风热感冒,咳嗽痰多,痰热喘满,咯痰黄稠。

### 7213212

*Peucedanum japonicum* Thunb. --- *Anethum japonicum* K. - Pol.

植物名 滨海前胡《中国植志》

药材名 防葵《本经》、《台湾药植志》

文献名 梨盖《本经》,房葵、梁盖、爵离、房苑、晨草、利如、方盖《吴普本草》,慈房、农果《别录》,萨摩防风、五岛防风、牡丹人参、木防风、削防风、瀬户防风《新纲》

地方名 [防风](陕西、台湾);浙江:[前胡]。

功效 根、根茎:有毒。用于感冒,痛风,咳嗽,膀胱及肠疾患。

备考 《新华本草纲要》(1988)认为《本经》之防葵非本种。

### 7213213

*Peucedanum ledebourielloides* K. T. Fu

植物名 华山前胡《秦岭植志》

地方名 陕西:[关防风](三原),防风(扶风、岐山、华县、潼关),硬防风(华阴、岐山),水防风。

功效 根:解表,散风胜湿。

### 7213214

*Peucedanum medicum* Dunn

植物名 华中前胡《高植图鉴》

药材名 华中前胡《汇编》

地方名 光前胡(湖北、四川);湖北:光头前胡,棕包头,前胡(宜昌、恩施),石防风(神农架);广西:鸡脚前胡(全州),独活(容县);四川:光头独活(万县、巫山、巫溪),竹节防风(开县、巫山),光防风(川东);贵州:岩防风,岩棕,土前胡,官防风。

功效 根:化痰止咳,散风热。

### 7213215

*Peucedanum medicum* Dunn var. *gracilis* Dunn ex Shan et Sheh

植物名 岩前胡《中国植志》

药材名 光前胡(四川)、《中药志》

地方名 四川:光头前胡。

功效 根:化痰止咳,散风热。用于风热咳嗽,痰多气喘,胸膈满闷。

### 7213216

*Peucedanum praeruptorum* Dunn

植物名 白花前胡《高植图鉴》

药材名 前胡《别录》、《药典》

文献名 山葵、山萝卜《安徽志》,全胡、西天蔓、射香菜《新纲》,云前胡、小前胡《云南药录》

地方名 岩风(江苏、浙江、湖南),官前胡(湖北、四川),鸡脚前胡(陕西、江西、湖北、湖南),山芹菜(浙江、台湾),山独活(山东、江苏、湖北、四川);山东:小防风,山芫荽、山胡荽、山胡萝卜(烟台),水防风;浙江:土当归、野芹菜(考丰);安徽:香前胡,野前胡;江西:野香芹,田螺菜,信前胡,水前胡,射香草;台湾:山葡萄,山当归,山人参,牡丹人参,本前胡;湖北:香草根,棕包头;湖南:岩川芎(古丈、凤凰、麻阳),棕苞前胡;广东:土前胡;四川:岩棕(南川),毛前胡,叉风(川东);其他:南石防风,坡地石防风,土防风。

功效 根:散风清热,降气化痰。用于风热咳嗽痰多,痰热喘满,咯痰黄稠。

7213217 见 7213211a

### 7213218

*Peucedanum rubricaudium* Shan et Sheh

植物名 红前胡《中国植志》

药材名 红前胡(西南)、《中药志》

地方名 前胡(四川、云南、贵州)。

功效 根:化痰止咳,散风热。用于风热咳嗽,痰多气喘,胸膈满闷。

### 7213219

*Peucedanum terebinthaceum* (Fisch.) Fisch. ex Turcz.

植物名 石防风《高植图鉴》

药材名 石防风《图经》、《中药大辞典》

文献名 珊瑚菜《纲目》,山葵(山东通志),硬苗前胡《中药大辞典》

地方名 前胡(甘肃、河北、内蒙古、陕西、山东、河

南、广西), [防风] (山东、云南); 辽宁: 小叶芹幌子(宽甸), 山芹菜(营口、抚顺、庄河、建昌), 山香菜(清原、本溪、海城); 内蒙古: “汗-铁木尔”、“哈尔-疏日古根”(蒙名); 甘肃: 射香草; 山东: 山胡萝卜(沂源), 山芹(海阳), 山胡芹; 广西: 鸡脚前胡(全州)。

功效 根: 用于感冒咳嗽, 支气管炎咳嗽, 妊娠咳嗽。

## 7213220

*Peucedanum terebinthaceum* (Fisch.) Fisch. ex Turcz. var. *deltoideum* Makino --- *P. terebinthaceum* (Fisch.) Fisch. ex Turcz. var. *paishanense* (Nakai) Huang

植物名 宽叶石防风《中国植志》

药材名 宽叶石防风《长白山植药志》

文献名 白川防风、山人参、石防风、山防风、芹叶防风《新纲》, 白山石防风《长白山植药志》

地方名 辽宁: 风芹(千山)。

功效 根: 用于感冒咳嗽, 支气管炎咳嗽, 妊娠咳嗽。

7213221 见 7213220

## 7213222

*Peucedanum turgenifolium* Wolff

植物名 长前胡《中国植志》

药材名 长前胡(四川阿坝)、《中药志》

文献名 川西前胡《中药志》

功效 根: 化痰止咳, 散风热。用于风热咳嗽, 痰多气喘, 胸膈满闷。

## 7213223

*Peucedanum wawrum* (Wolff) Shan --- *Seseli wawrae* Wolff

植物名 泰山前胡《江苏植志》

文献名 山东邪蒿《东北草本植志》

地方名 前胡(山东、江苏); 山东: 小防风(蒙山); 江苏: 防风(连云港)。

功效 根: 解热, 镇咳, 祛痰。用于感冒, 发热, 咳嗽, 喘息, 胸闷。

## 7213224

*Peucedanum wulongense* Shan et Sheh

植物名 武隆前胡《中国中药杂志》

药材名 武隆前胡《中国中药杂志》

地方名 四川: 毛前胡, 武隆防风。

功效 根: 祛风解表, 止咳化痰。

## 7213225

*Physospermopsis delavayi* (Franch.) Wolff

植物名 滇芎《中国植志》

文献名 拟囊果芹《高植图鉴》

地方名 云南: 前胡叶滇芎, 金钱参。

功效 根: 云南民间以其根作前胡人药。

## 7213226

*Pimpinella anisum* L.

植物名 洋茴芹(拟)

药材名 洋茴香《台湾药植志》

文献名 洋茴香实《台湾药植志》

功效 果实: 健胃, 祛风, 镇静, 祛痰, 矫味。用于疝痛, 腹胀, 通乳。

备考 本品原产小亚细亚, 台湾有引种。

## 7213227

*Pimpinella arguta* Diels

植物名 锐叶茴芹《中国植志》

文献名 尖齿茴芹《神农架药录》

地方名 湖北: 山芹菜(神农架); 贵州: 洋芹菜。

功效 根茎: 清热解毒, 止泻。

## 7213228

*Pimpinella brachycarpa* (Komar.) Nakai *Spuriopimpinella brachycarpa* (Komar.) Kitag.

植物名 短果茴芹《中国植志》

药材名 短果茴芹《贵州药录》

文献名 大叶芹《东北草本植志》

功效 根茎: 祛风散寒, 理气止痛。用于胃寒痛, 痢疾, 腹泻。

## 7213229

*Pimpinella candolleana* Wight et Arn.

植物名 杏叶茴芹《中国植志》

药材名 杏叶防风《滇南本草》、《汇编》

文献名 骚羊古、瘙痒股《草木便方》, 蜘蛛香、山当归《分类草药性》, 九月白花草、天蓬草、土当归、满身串、三足蟬、白花箭《天宝本草》

地方名 马蹄防风(四川、云南); 广西: 胡荽(百色), 小英雄(桂平); 四川: 阳山臭, 羊山臭, [清当归], [野当归], 三角蟾, 骚羊骨(蓬溪), [犁头尖]; 贵州: 小菊花, 山茴香, 大寒药, 蛇倒退; 云南: 羊膻臭(昆明、保山、曲靖), 小羊膻, 马蹄叶(红河), 地胡椒(昭通), 羊山泉(丽江), 大叶防风, 臭党参, 臭丹参, 心叶茴芹, [防风], 鸭脚板。

功效 全草: 祛风解表, 行气散结, 健脾截疟。用于感冒, 咳嗽, 风湿关节疼痛, 疟疾, 食欲不振, 胃痛, 疝痛, 颈淋巴结结核。

备考 云南丽江地区的竹叶防风药材中常混杂有杏叶防风的根。

## 7213230

*Pimpinella coriacea* (Franch.) de Boiss. --- *Carum coriaceum* Franch.

植物名 革叶茴芹《中国植志》

药材名 羊膻臭《元江哈尼族药》

地方名 云南: “咪母母奴”(元江哈尼语)。

功效 根: 温中, 散寒, 截疟, 引产。用于胃寒腹痛, 疟疾。外用作早期引产。

## 7213231

*Pimpinella diversifolia* DC. --- *Pimpinella sinica* Hance --- *Platyrhaphe japonica* Miq.

植物名 异叶茴芹《中国植志》

药材名 鹅脚板《峨眉药植》

文献名 苦爸菜、野芎《台湾药植志》, 苦爹菜《江西南部种册》, [山当归]《品种论述》

地方名 六月寒(陕西、甘肃、宁夏、青海、安徽), 八

月白(浙江、安徽、湖北),白花草(广东、广西、四川),百路通(浙江、安徽、湖北),茜芹(湖南、广西),三脚蛤蟆(湖北、广东),山雄黄(浙江、安徽),羊膻草、蛇咬草(陕西、甘肃、宁夏、青海),骚羊古(四川、贵州),野芹菜(安徽、广东),铁铲头(浙江、广东),〔野当归〕(陕西、四川);陕西:羊膻七(平利),小六月寒(眉县、平利),虎羊丁(镇坪),蛇莽草;浙江:三十六女子(东阳),羊腥(开化、浦江、嵊县);安徽:〔小当归〕;福建:金锁匙,白花仔;河南:冬青草,异叶芹;湖北:公草,公降蛇草;湖南:〔柴胡〕,毛升菟;广东:大叶半边莲,白花雷公根(阳春),白花丹(翁源),白花莲、四季菜(惠阳),流氓草、贼佬命(英德),贼佬骨、茅汁、散血丹、三大王、花古草、土灵芝草(乳源),蛇头草,三将军,细叶六月雪,贼佬胆;广西:〔犁头草〕、香草(宁明),韩信草(武鸣),八宝丹,吊香根,〔土细辛〕(贵县、北流),白花香(永福);四川:〔犁头尖〕,阳山臭,〔土当归〕,〔六月雪〕,天蓬草;贵州:凉山草,蛇倒退,山茴香,大寒药,小菊花,肚寒药;云南:羊山臭(昭通),空心草。

功效 全草、根;祛风活血,解毒消肿。用于感冒,咽喉肿痛,痢疾,黄疸型肝炎,急性胆囊炎。外用于毒蛇咬伤,跌打损伤,皮肤瘙痒。

## 7213232

*Pimpinella thellungiana* Wolff

植物名 羊红膻《中国植志》

药材名 羊洪膻(陕西)、《汇编》

文献名 缺刻叶茴芹《高植图鉴》,东北茴芹《东检》,回芹《中国经植志》

地方名 陕西:六月寒。

功效 根或全草:温中散寒。用于克山病,心悸,气短,咳嗽。

## 7213233

*Pleurospermum cristatum* de Boiss.

植物名 鸡冠梭子芹《中国植志》

地方名 湖北:水羌活(神农架)。

功效 根:祛风散寒,解表。

## 7213234

*Pleurospermum davidii* Franch.

植物名 宝兴梭子芹《中国植志》

药材名 棉参《云南药录》

功效 根:滋补。用于体虚。

## 7213235

*Pleurospermum giraldii* Diels --- *P. limprichtii* Wolff ---

*P. meoides* Diels

植物名 太白梭子芹《中国植志》

文献名 药茴香《陕西中草药》

地方名 北沙参(华北)。

功效 全草:温中理气,健脾燥湿。用于胃寒腹痛,腹胀,不思饮食,白带。

## 7213236

*Pleurospermum hookeri* C. B. Clarke var. *thomsonii* C. B.

Clarke --- *P. tibeticum* Wolff

植物名 西藏梭子芹《中国植志》

药材名 紫茎梭子芹《西藏中草》

文献名 “加哇”(藏名)《青藏药图》

地方名 西藏:哉果。

功效 根:滋补健胃。用于肾炎,腰痛,消化不良;全草:理气活血,止痛。用于月经不调,瘀滞腹痛。

## 7213237

*Pleurospermum prattii* Wolff

植物名 康定梭子芹《中国植志》

药材名 康定梭子芹《新华本草纲要》

功效 全草:消肿。

## 7213238

*Pleurospermum rivulorum* (Diels) K. T. Fu et Y. C. Ho

--- *Pterocyclus rivulorum* (Diels) Wolff

植物名 心叶梭子芹《中国植志》

药材名 滇羌活《汇编》

地方名 云南:羌活(福田),龙头羌活,蛇头羌活(丽江)。

功效 根茎:发汗祛风,除湿,宣通经络,止痛。

## 7213239

*Pternopetalum botrychioides* (Dunn) Hand. -Mazz.

植物名 散血芹《中国植志》

药材名 散血芹《峨眉药植资源》

文献名 水芹菜《峨眉药植》

地方名 四川:水芹花、散血草(峨眉)。

功效 全草:收敛止血,消炎。用于刀伤,烫伤。

## 7213240

*Pternopetalum kiangsiense* (Wolff) Hand. -Mazz. ---

*Cryptotasiopsis kiangsiensis* Wolff

植物名 江西囊瓣芹《中国植志》

药材名 肺珍草《广西药录》

文献名 江西肿瓣芹《广西药录》

地方名 广西:凤凰草(龙胜);贵州:细青草。

功效 根:理气止痛,祛风除湿。用于风热头痛,风湿。

## 7213241

*Pternopetalum leptophyllum* (Dunn) Hand. -Mazz.

植物名 薄叶囊瓣芹《中国植志》

地方名 四川:水中生(峨眉山)。

功效 全草:发表散寒,解肌舒筋。

## 7213242

*Pternopetalum nudicaule* (de Boiss.) Hand. -Mazz. ---

*Cryptotaeniopsis nudicaule* de Boiss.

植物名 裸茎囊瓣芹《中国植志》

地方名 云南:药芹菜。

功效 根茎:用于劳伤,疮毒。

## 7213243

*Pternopetalum trichomanifolium* (Franch.) Hand.

-Mazz.

植物名 膜蕨囊瓣芹《中国植志》

药材名 亮火虫草《峨眉药植》

文献名 细叶囊瓣芹《云南种录》

地方名 四川:细沙毛(兴文)。

功 效 全草;收敛止血。用于刀伤,消炎。

## 7213244

*Pternopetalum vulgare* (Dunn) Hand. -Mazz. --- *Cryptotaeniopsis vulgaris* Dunn

植物名 五四青《中国植志》

药材名 紫金沙(湖北)、《汇编》

文献名 囊瓣芹、五四青囊瓣芹《高植图鉴》,肿瓣芹《红河中草药》

地方名 四川:亮火虫(峨眉山);云南:岩川(红河),岩棕、滇羌活、羽轮芹(西畴)。

功 效 根:散寒,理气,止痛。用于胃痛,腹痛,胸肋痛。

## 7213245

*Pternopetalum vulgare* (Dunn) Hand. -Mazz. var. *acuminatum* C. Y. Wu

植物名 尖叶五四青《中国植志》

文献名 尖叶囊瓣芹《云南种录》

地方名 四川:刷把草(石柱县)。

功 效 全草:祛风除湿,活血祛瘀。用于跌打损伤。

## 7213246

*Pternopetalum vulgare* (Dunn) Hand. -Mazz. var. *strigosum* Shan et Pu --- *P. chaochunae* Fang

植物名 毛叶五四青《中国植志》

药材名 毛叶五四青《峨眉药植资源》

功 效 全草及根:消炎解毒。用于淋巴结核。

## 7213247

*Pternopetalum wangianum* Hand. -Mazz.

植物名 天全囊瓣芹《中国植志》

药材名 天全囊瓣芹《贵州药录》

功 效 全株:理气止痛,祛风除湿。用于胃痛,头痛,肺热咳嗽,风湿病,感冒。

## 7213248

*Sanicula astrantiifolia* Wolff ex Kretsch.

植物名 川滇变豆菜《中国植志》

药材名 小黑药《云南中草药》

地方名 四川:变豆菜、黑根、野透骨消(西昌),五四风;贵州:肺形草,山芹菜;云南:铜脚威灵仙、昆明变豆菜、叶三七(曲靖),草本三角枫、三角草(昆明),三台草。

功 效 根:补肺益肾。用于肺结核,肾虚腰痛,头昏。

## 7213249

*Sanicula chinensis* Bunge

植物名 变豆菜《中国植志》

药材名 变豆菜《救荒本草》、《浙江药植志》

文献名 杜当归、山芹菜《救荒本草》

地方名 辽宁:紫花芹(西丰、开原、本溪、桓仁),白梗芹(宽甸、凤城),鸭巴芹(本溪),鸭巴掌(丹东、本溪),鸭掌芹(西丰),碗儿芹(丹东、西丰);山东:〔鹤虱〕(崂山),山芹(青岛);浙江:鸭脚菜(临安),犬脚迹(龙泉);湖南:三叶香(瑶名);广西:五指疳(环江);四川:

〔蓝正布〕,鸭脚板,五批风;贵州:野当归(荔波、平塘)。

功 效 全草:散寒止咳,行血通经。用于风寒咳嗽,百日咳,月经不调,经闭,腰痛。

## 7213250

*Sanicula coerulescens* Franch. --- *S. stapfiana* Wolff

植物名 大蕨变豆菜《中国植志》

药材名 大肺经草《汇编》

文献名 半边钱《天宝本草》,尖叶肺经草《汇编》

地方名 四川:肺经草,肺筋草,反背红,血经草,散血草(峨眉);贵州:心肺草。

功 效 全草:散寒止咳,行血通经。用于风寒咳嗽,月经不调,经闭,腰痛。

## 7213251

*Sanicula elata* Hamilt.

植物名 高变豆菜《云南种录》

药材名 软雀花《中国植志》

地方名 四川:三叶七,水茯苓。

功 效 全草:散寒止咳。

## 7213252

*Sanicula hacquetioides* Franch.

植物名 鳞果变豆菜《中国植志》

药材名 鳞果变豆菜《贵州药录》

功 效 全株:温化寒痰,祛风通经。用于风寒感冒,扁桃腺炎,百日咳,经闭,乳痈,膀胱结石,尿频。

## 7213253

*Sanicula lamelligera* Hance

植物名 薄叶变豆菜《云南种录》

药材名 大肺经草《四川中药志》

文献名 肺经草、半边钱、脐风草《天宝本草》,薄片山芹菜《广西药录》,掌脉山芹菜《广西植录》,薄片变豆菜《中国植志》

地方名 乌豆草(贵州、云南),肺筋草(广西、四川、贵州、云南),散血草(四川、云南),野芹菜(广东、四川);浙江:水黄连(丽水、泰顺),瓣练(云和),小山芹菜;安徽:鹅掌脚草;广东:山芹菜;广西:小铜钱草,五爪风(资源),子仔七(兴安);四川:反背红,血经草,血当归,表血莲(成都);贵州:乌兜,一支箭,打不死。

功 效 全草:散寒止咳,行血通经。用于风寒咳嗽,百日咳,月经不调,经闭,腰痛。

## 7213254

*Sanicula orthacantha* S. Moore --- *S. henryi* Wolff

植物名 直刺变豆菜《中国植志》

药材名 野鹅脚板《汇编》

文献名 直刺山芹菜《广西植录》,蒙自山芹菜《广西植录》,亨氏变豆菜《红河中草药》

地方名 浙江:小紫花菜;湖北:小肺金草;湖南:老虎须;四川:大肺经草,黑鹅脚板,地黄连(南川),肺经草;贵州:水芹菜;云南:水虎掌草,小黑药(红河)。

功 效 全草:清热解毒。用于麻疹后热未尽,身热瘙痒,跌打损伤。

## 7213255

*Sanicula orthacantha* S. Moore var. *brevispina* de Boiss.

植物名 短刺变豆菜《中国植志》

地方名 四川:鸭脚七。

功效 全草:用于跌打损伤。

#### 7213256

*Sanicula rubriflora* Fr. Schmidt

植物名 红花变豆菜《中国植志》

药材名 鸡爪芹《长白山植志》

文献名 紫花变豆菜《东北草本植志》

地方名 辽宁:紫花芹(西丰、开原、本溪、桓仁),大叶片(岫岩、庄河),碗儿芹(丹东、西丰),鸭巴芹(本溪),鸭巴掌(丹东、本溪),鸭掌芹(西丰)。

功效 根:利尿。

#### 7213257

*Sanicula serrata* Wolff

植物名 锯齿变豆菜《中国植志》

文献名 锯齿变豆菜《秦岭植志》,锯齿山芹菜《云南种录》

功效 根:用于跌打损伤。

#### 7213258

*Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. --- *Ledebouriella divaricata* (Turcz.) Hiroe --- *Siler divaricatum* (Turcz.) Benth. et Hook. f. --- *Stenocoelium divaricatum* Turcz.

植物名 防风《高植图鉴》

药材名 防风《本经》、《药典》

文献名 铜芸《本经》,迴云、回草、百枝、蒿根、百韭、百种《吴普本草》,茴草、屏风、百蜚《别录》,山花菜、铜草、续弦胶、回辛《新纲》,西口风《药材学》,风肉《药材资料汇编》,关防风、东防风《中药志》,笔防风《品种论述》

地方名 旁风(东北、河北、内蒙古、山东),山防风(河北、山西、山东),公防风、母防风(东北);辽宁:屏风草(铁岭),白毛草(义县),白毛花(桓仁);河北:黄风,黄防风,青防风,口防风,硬防风,软防风,北风,北防风;内蒙古:“浩尼·舒日”、“帚尔老色尔布”、“哲里根呢”(蒙名);山东:旁蒿、旁洪、旁旁(烟台),傍风,山芹菜根。

功效 根:解表祛风,胜湿,止痉。用于感冒头痛,风湿痹痛,风疹瘙痒,破伤风。

#### 7213259

*Seseli aemulans* M. Pop.

植物名 大果邪蒿(拟)

文献名 大果西风芹《中国植志》

地方名 宁夏:〔防风〕,贺兰山防风。

功效 根:祛风利湿。

#### 7213260

*Seseli asperulum* (Trautv.) Schischk.

植物名 碎叶邪蒿(拟)

文献名 碎叶西风芹《高植图鉴补编》

地方名 青海:防风;四川:川防风,西风。

备考 本品在四川、青海地区民间充防风应用。

#### 7213261

*Seseli delavayi* Franch. --- *Seseli mairei* auct. non Wolff

植物名 多毛邪蒿《中药志》

药材名 毛果竹叶防风《云南种录》

文献名 多毛西风芹《中国植志》

地方名 〔防风〕(四川、云南);云南:云防风,鸡足防风(昆明),鸡脚防风。

功效 根:发表疏肝,祛风利湿。用于伤寒,感冒。

备考 《滇南本草》原整理本学名误订为 *S. mairei* Wolff (竹叶防风),本种果有毛,可资区别。

#### 7213262

*Seseli mairei* Wolff --- *Seseli delavayi* auct. non Franch.

植物名 竹叶邪蒿《中药志》

药材名 竹叶防风《滇南本草》、《汇编》

文献名 邪蒿《博物志》,竹叶西风芹《中国植志》

地方名 防风(四川、贵州),云防风(四川、云南);四川:西防风,西风;云南:鸡足防风,鸡脚防风,鸡脚暗消,鸡爪防风,三叶防风;贵州:小防风(威宁)。

功效 根:解表祛风。用于感冒,风寒湿痹,痈肿疮疡,破伤风。

备考 1.《高植图鉴》(1972)学名误订为 *Seseli delavayi* Franch. 2.按邪蒿之名最早见于西晋张华《博物志》。陶弘景引《博物志》之言曰:“芸蒿叶似邪蒿”。《别录》谓柴胡“叶名芸蒿”。宋《图经》论柴胡曰:“叶似竹叶稍紧,亦有似斜蒿”。这些说明古代本草最早出现的“邪蒿”或“斜蒿”,其叶形似柴胡,似竹叶。《纲目》、《名实图考》谓邪蒿“叶纹皆邪,故名”,此与今之伞形科植物 *Seseli delavayi* Franch. 及 *S. mairei* Wolff 等种叶似竹叶,叶脉“网状脉近平行”的描述甚相符合。故前人考订邪蒿或斜蒿为伞形科属植物并将 *Seseli* 译为邪蒿属是正确的,不宜改名为西风芹属。至于《救荒本草》、《纲目》、《名实图考》之“邪蒿”,或谓“其叶似青蒿”,或作其图似青蒿者,显然是另一类植物,是邪蒿的后出同名。

#### 7213263

*Seseli squarulosum* Shan et Sheh

植物名 粗糙邪蒿(拟)

药材名 川防风(四川道孚)、《中国植志》

文献名 粗糙西风芹《中国植志》

地方名 青海:防风(同仁);四川:西风。

功效 根:解表,镇痛。

#### 7213264

*Seseli yunnanense* Franch.

植物名 云南邪蒿《西昌中草药》

药材名 松叶防风《云南药录》

文献名 黄风《玉龙本草标本图影》,松叶西风芹《中国植志》

地方名 云防风(四川、云南);四川:西风;贵州:三叶防风;云南:竹叶防风(保山、曲靖、玉溪),松叶柴胡(昆明),防风;其他:松叶邪蒿。

功效 根:祛风解表,解毒。用于感冒,风湿骨痛,头痛,解附子中毒。

#### 7213265



*Seselopsis nanschanicum* Schischk.

植物名 西归芹《中国植志》

文献名 天山邪蒿《高植图鉴补编》, 天山竹叶防风、天山假邪蒿《品种论述》。

地方名 新疆: 上当归。

功效 根: 用于跌打损伤, 贫血等。

#### 7213266

*Sinodielsia yunnanensis* Wolff

植物名 滇芹《中国植志》

药材名 黄蘗本《云南药录》

文献名 蘗本《滇南本草》, 昆明芹《云南种录》

地方名 云南: “搓纳儿”(玉溪彝名), 滇蘗本, [秦归]。

功效 根: 解毒镇痛, 渗湿利尿。用于上呼吸道感染, 急、慢性肾盂炎, 偏头痛。

#### 7213267

*Sium suave* Walt. --- *Sium cicutifolium* Schrenk

植物名 泽芹《中国植志》

药材名 泽芹《江苏药材志》

文献名 毒人参《种称》, 狭叶泽芹《东检》

地方名 江苏: 野蒲芹, [药芹] (南通), 野芹菜 (苏州), 山蘗本, 土蘗本。

功效 全草: 散风寒, 止头痛, 降血压。用于感冒头痛, 高血压。

#### 7213268

*Sphallerocarpus gracilis* (Bess.) K. -Pol.

植物名 迷果芹《中国植志》

药材名 迷果芹《汇编》

文献名 东北迷果芹《东检》

地方名 辽宁: [党参]; 河北: 小叶山红萝卜 (宛平); 青海: 青海防风, [防风]; 四川: “达扭” (德格藏名)。

功效 根: 祛风, 解表。

#### 7213269

*Spuriopimpinella drachystyla* (Hand. -Mazz.) Kitag.

植物名 短柱假茴芹《品种论述》

地方名 吉林: [土当归] (琿春)。

备考 吉林琿春充土当归用。

#### 7213270

*Tongoloo dunnii* (de Boiss.) Wolff --- *Pimpinella dunnii* de Boiss. --- *Peucedanum giraldii* Diels

植物名 宜昌东俄芹《中国植志》

药材名 丝叶石防风《品种论述》

文献名 红花芹《高植图鉴》, 川鄂前胡《神农架药录》

地方名 辽宁: [防风]; 湖北: 土芹菜、野白芷 (神农架)。

功效 根: 祛风湿, 强筋骨, 活血, 止血。用于风湿关节痛, 崩漏, 跌打损伤, 外伤出血; 全草: 疏风解毒。

#### 7213271

*Tongoloo silaifolia* (de Boiss.) Wolff --- *Pimpinella silaifolia* de Boiss.

植物名 城口东俄芹《中国植志》

药材名 太白三七 (陕西太白)

文献名 太山东俄芹《秦岭植志》

地方名 陕西: 甜三七 (秦岭)。

功效 根: 止血镇痛, 活血散瘀, 祛风湿, 强筋骨。用于跌打损伤, 外伤出血, 崩漏, 风湿性腰腿, 周身疼痛。

#### 7213272

*Tongoloo stewardii* Wolff

植物名 牯岭东俄芹《中国植志》

文献名 庐山东俄芹《江西药录》

地方名 江西: 山蛇床。

备考 据《江西药植名录》谓本种在江西民间作川芎用。

#### 7213273

*Torilis japonica* (Houtt.) DC.

植物名 小窃衣《中国植志》

药材名 破子草《四川中药志》

文献名 夫娘子《留青日札》, [蛇床子]、破衣草《满洲植录》, 破草《东检》, 鬼麦《植物名汇》, 华南鹤虱《中药志》, 窃衣《汇编》

地方名 [鹤虱] (湖南、广东、四川); 吉林: 小叶芹; 辽宁: 罗藜 (千山); 河北: 大叶山胡萝卜; 江苏: 虱子草, 日本蛇床子 (苏北); 浙江: 臭婆娘, 臭花姑娘; 湖南: 家子草 (古丈), 面子草 (凤凰); 广东: 蚊菜; 广西: 白花草, 假芹菜 (乐业); 四川: 粘连子; 贵州: [水防风] (剑河)。

功效 果实: 有小毒。活血消肿, 收敛杀虫。用于慢性腹泻, 蛔虫病, 痢疮溃烂久不收口, 阴道滴虫。

#### 7213274

*Torilis scabra* (Thunb.) DC.

植物名 窃衣《中国植志》

药材名 窃衣《四川中药志》

文献名 小窃衣《拉汉种称》

地方名 [鹤虱] (陕西、四川); 浙江: 臭毛虫草; 湖北: 草粘子; 贵州: 水防风。

功效 果实: 清热解毒, 祛风湿, 杀虫。

#### 7213275

*Trachyspermum ammi* (L.) Sprague

植物名 粗糙芹《中药大辞典》

药材名 阿育魏实《新疆药植志》

文献名 阿育魏《民族药志》

地方名 新疆: [小茴香]。

功效 果实: 祛寒除湿, 理气开胃, 止痛。用于风湿疼痛, 胃寒腹痛, 消化不良, 泌尿系结石。

#### 7213276

*Vicatia tibetica* de Boiss.

植物名 西藏凹乳芹《中国植志》

地方名 四川: 野当归、独脚当归 (马尔康)。

备考 四川马尔康一带将根代当归使用。

### 7214 山柳科 Clethraceae

#### 7214001

*Clethra barbinervis* Sieb. et Zucc.

植物名 髭脉桤叶树《中国植志》  
 药材名 山柳《汇编》  
 文献名 华东桤叶树《拉汉英种称》，华东山柳《高植图鉴》  
 地方名 浙江：马尾柴（临安）。  
 功效 根：清热解毒。用于疔毒痈肿。

## 7214002

*Clethra cavaleriei* Levl.

植物名 贵定桤叶树《中国植志》  
 文献名 江南桤叶树《拉汉英种称》，江南山柳《高植图鉴》，华中山柳《广西植录》，贵定山柳《拉汉种称》  
 地方名 湖南：“直端莲”（蓝山县瑶名）。  
 功效 树皮、根：活血祛瘀，强筋壮骨；叶：外用于皮肤瘙痒。

## 7214003

*Clethra fargesii* Franch.

植物名 城口桤叶树《中国植志》  
 药材名 华中山柳《神农架药录》  
 文献名 城口桤叶树《贵州药录》  
 地方名 湖北：高粱树、山柳村（神农架）；贵州：构骨树（梵净山）。  
 功效 果实：外用于乳痈；根：祛风除湿。用于风湿痛，劳伤跌打。

## 7214004

*Clethra kaipoensis* Levl.

植物名 贵州桤叶树《中国植志》  
 药材名 大叶山柳《广西药录》  
 文献名 大叶桤叶树《拉汉英种称》，嘉宝山柳《广西植录》，正安山柳《拉汉种称》  
 地方名 广西：脱壳树（三江）。  
 功效 根、叶：用于风湿痹痛。

## 7215 杜鹃花科 Ericaceae

## 7215001

*Agapetes lacei* Craib

植物名 柳叶树萝卜《高植图鉴》  
 药材名 岩龙香《彝药志》  
 文献名 灯笼花《名实图考》，深红树萝卜《云南种录》  
 地方名 云南：“法罗喜”（彝药名），树萝卜、小叶爱楠（思茅）。  
 功效 根：散瘀止痛，利尿消肿。用于跌打损伤，风湿骨痛，胃痛，肝炎，水肿，无名肿毒。

## 7215002

*Agapetes mannii* Hemsl.

植物名 白花树萝卜《高植图鉴》  
 药材名 树萝卜《云南中草药》  
 地方名 云南：陆次，葫芦暗消，猴子板凳，囊袋花（红河）。  
 功效 块根：散瘀止痛，利尿消肿。用于跌打损伤，风湿疼痛，胃痛，肝炎，水肿，无名肿毒。外用于外伤出血。

## 7215003

*Agapetes nerifolia* (King et Prain) Airy-Shaw

植物名 夹竹桃叶树萝卜《中国植志》  
 药材名 树萝卜《云南中草药选》  
 地方名 云南：石萝卜，叶上花。  
 功效 根：活血，散瘀，消炎，利尿。用于骨折，跌打损伤，水肿

## 7215004

*Cassiope fastigiata* (Wall.) D. Don --- *Andromeda fastigiata* Wall.

植物名 扫帚岩须《高植图鉴》  
 地方名 西藏：雪灵芝、血地红（亚东）。  
 功效 全株：用于气喘。

## 7215005

*Cassiope selaginoides* Hook. f. et Thoms. --- *C. mairei* Levl.

植物名 岩须《高植图鉴》  
 药材名 草灵芝《汇编》  
 文献名 长梗岩须《高植图鉴》  
 地方名 四川：灵芝草、卷柏锦条花（西昌），铁刷把（松潘），捆仙绳（峨眉山）；云南：[万年青]（中甸），雪灵芝，水麻黄。  
 功效 全株：行气止痛，安神。用于肝胃气痛，食欲不振，神经衰弱。

## 7215006

*Craibiodendron scleranthum* (Dop) Judd var. *kwangtungense* (S. Y. Hu) Judd --- *C. kwangtungense* S. Y. Hu

植物名 广东金叶子《中国植志》  
 药材名 独角牛《汇编》  
 文献名 广西山柳《广西植录》，广东假木荷《高植图鉴》  
 地方名 广东：红皮紫陵，广东克雷木，碎骨红；其他：独脚牛。

功效 叶、根：通经活络，散瘀消肿。用于跌打损伤，扭伤。

## 7215007

*Craibiodendron stellatum* (Pier.) W. W. Smith

植物名 金叶子《中国植志》  
 药材名 狗脚草根《中药大辞典》  
 文献名 星芒克雷木《中国经植志》，假吊钟《广西植录》，泡花树《广西药录》，厚皮金叶子、星芒假吊钟《云南种录》，假木荷《高植图鉴》  
 地方名 广西：“美娥”（天等壮语），火炭木，厚皮树；云南：无花狗足草，老火树（屏边），粗糠树（蒙自），火炭树。

功效 根、叶：有毒。舒筋活络。用于风湿性关节炎，跌打损伤，瘫痪。

## 7215008

*Craibiodendron yunnanense* W. W. Smith

植物名 云南金叶子《中国植志》  
 药材名 金叶子《云南中草药》  
 文献名 云南假木荷《高植图鉴》

地方名 广西：“美娥”、“果母”(壮语)；云南：紧羊叶，〔闹羊花〕(玉溪)，马虱子草(保山)，马虱子、马虱子树(保山、龙陵)，疯姑娘(昆明)，云南克雷木、胜威灵、大力叶、狗脚迹柴(红河)，细叶子(新平)，毒羊叶(元江)，云南泡花树，泡花树，狗脚草，补骨灵，麻虱子，劳伤叶，七叶挣，三张叶，假吊钟。

功效 叶：有小毒。散瘀止痛，祛风除湿，止血通窍。用于跌打损伤，外伤性昏迷，扭挫伤，腰腿痛，半身不遂，瘫痪，风湿性关节炎，外伤出血，骨折。

## 7215009

*Diplarche multiflora* Hook. f. et Thoms.

植物名 多花杉叶杜《高植图鉴》

药材名 骨痛药《元江哈尼族药》

地方名 云南：“沙雨果思那雌”(元江哈尼语)。

功效 全草：祛风止痛，调经止带。用于风湿骨痛，月经不调，白带过多。

## 7215010

*Enkianthus chinensis* Franch.

植物名 灯笼花《高植图鉴》

药材名 灯笼花《神农架药录》

文献名 贞榕《高植图鉴》

地方名 湖北：女儿红(神农架)。

功效 种子：用于疝气。

## 7215011

*Enkianthus deflexus* (Griff.) Schneid. --- *E. himalaicus* Hook. f.

植物名 毛叶吊钟花《高植图鉴》

药材名 小丁木叶(拟)

文献名 小丁花《高植图鉴》

地方名 广西：油萝树(融安)；四川：小丁木。

功效 叶：用于跌打损伤。

## 7215012

*Gaultheria forrestii* Diels

植物名 地檀香《中国植志》

药材名 大透骨消《汇编》

文献名 康滇白珠树《西昌中草药》

地方名 〔透骨草〕、透骨消(四川、云南)；四川：满山香(西昌)；云南：老鸡果(龙陵)，香叶子药草、香叶子(洱源)，“阿门吉利”(丽江纳西语)，岩子果(丽江)，冬青叶，炸山叶。

功效 根、茎、叶：祛风除湿，舒筋活络。用于风湿瘫痪，冻疮。

## 7215013

*Gaultheria griffithiana* Wight --- *G. caudata* Stapf

植物名 尾叶白珠《高植图鉴》

文献名 高山地坛香《药学报》

地方名 四川：〔山胡椒〕(米易)；云南：“阿门支力”(丽江纳西语)。

功效 新鲜枝叶：祛风除湿。

## 7215014

*Gaultheria hookeri* C. B. Clarke --- *G. fragrantissima* Wall. var. *hirsuta* auct. non (Gard.) C. B. Clarke

植物名 红粉白珠《高植图鉴》

药材名 白背透骨草《元江哈尼族药》

文献名 狭叶地坛香《云南种录》

地方名 云南：〔沙果〕、火炭头果、枝热、火炭头果(红河)，地坛香，香白珠，火炭果，“爬坡鹅思”(元江哈尼语)。

功效 全草及根果：祛风除湿，止咳平喘。用于风湿关节痛，跌打损伤，胸膜炎，咳嗽，哮喘；嫩枝及叶：祛风止痒。用于皮肤瘙痒。

备考 有的文献将学名误订为 *Gaultheria fragrantissima* Wall. var. *hirsuta* (Gard.) C. B. Clarke

## 7215015

*Gaultheria leucocarpa* Blume var. *crenulata* (Kurz) T. Z. Hsu --- *G. yunnanensis* (Franch.) Rehd.

植物名 滇白珠《云南植志》

药材名 透骨香《贵阳民间药草》

文献名 透骨草《滇南本草》，满山香、〔搜山虎〕《分类草药性》，云南白珠树《中药大辞典》，滇白珠树《四川中药志》

地方名 白珠木(湖南、广西)，九木香(湖南、广东)；湖南：苗婆风(芷江)，“登能”(侗语)，野鸡凉(通道)，火炭崽、老虎尿、驼背姑娘(凤凰)，瑶婆枫(江华瑶族)；广东：宁香风藤(阳春)，乌翠树(乐昌)，〔鸡骨香〕(连南)，钻骨风(惠阳)，康乐茶(乐业)，过山香，老饭团，〔爬山虎〕，豹骨风，冬绿树，香油藤；广西：下山黄(大瑶)，石灵香(贺县、蒙山)，万里香(昭平)，下山虎(富川、鹿寨)，香莲(南丹)，金钗(桂平、瑶族)，惊采风(钟山)；四川：左右拐(南川)，筒花木(马边)；贵州：老鸦泡，煤炭子，煤炭果；云南：火炭树、洗澡叶、芳香草(红河)，满山香、小透骨草、透骨消(昆明)，芳香叶(保山)，火炭子(文山)，冬莲(文山苗名)，“借麦凶”(楚雄彝名)，黑油果(昭通)，洗澡草，香叶，炮叶，地坛香，白珠白果。

功效 全株、茎、叶、根：祛风除湿，舒筋活络，活血止痛。用于风湿性关节炎，跌打损伤，胃寒疼痛，风寒感冒。

## 7215016

*Gaultheria leucocarpa* Blume var. *cumingiana* (Vidal) T. Z. Hsu --- *Gaultheria cumingiana* Vidal

植物名 白珠树《高植图鉴》

药材名 白珠树《湖南药物志》

地方名 湖南：老虎尿，老虎面，满山香；广东：牛头药。

功效 根、全株：祛风除湿。用于风湿关节痛，跌打损伤。

## 7215017

*Gaultheria leucocarpa* Blume var. *hirsuta* (D. Fang et N. K. Liang) T. Z. Hsu --- *G. yunnanensis* (Franch.) Rehd. var. *hirsuta* D. Fang et N. K. Liang

植物名 硬毛白珠《云南植志》

文献名 硬毛满山香《广西药录》，硬毛滇白珠《植分学报》

地方名 广西：〔金钗〕(桂平)，透骨香、满山香(隆

林)。

功效 全株：用于痧气，肚痛，劳伤，牙痛，风湿病，蛇咬伤，跌打及皮肤瘙痒等症。

#### 7215018

*Gaultheria semi-infera* (C. B. Clarke) Airy-Shaw

植物名 五雄白珠《高植图鉴》

地方名 云南：〔山胡椒〕、“哈索索让”(元江哈尼名)。

功效 根：祛风止痒。外用于风疹，荨麻疹，皮肤瘙痒。

#### 7215019

*Hugeria vaccinioides* (Levl.) Hara -- *Vaccinium japonicum* Miq. var. *sinicum* (Nakai) Rehd.

植物名 扁枝越橘《高植图鉴》

文献名 山小檗《高植图鉴》

地方名 湖南：鞭猪郎(蓝山县瑶名)。

功效 全株：疏风清热，降火解毒。

#### 7215020

*Ledum palustre* L.

植物名 宽叶杜香《中草药》

功效 叶：祛痰。

#### 7215021

*Ledum palustre* L. var. *angustum* N. Busch

植物名 狭叶杜香《高植图鉴》

药材名 细叶杜香《汇编》

地方名 黑龙江：绊脚丝(伊春)；吉林：白山苔(安图)，喇叭茶。

功效 叶：调经。用于月经不调，不孕，胃溃疡。

#### 7215022

*Ledum palustre* L. var. *dilatatum* Wahl.

植物名 杜香《高植图鉴》

药材名 杜香《汇编》

文献名 安春香、〔安息香〕《食用植物图说》，宽叶杜香《东北木本图志》

地方名 吉林：喇叭茶。

功效 叶提取的挥发油：化痰，止咳，平喘。用于慢性气管炎。

#### 7215023

*Lyonia ovalifolia* (Wall.) Drude --- *Xolisma ovalifolia* (Wall.) Rehd.

植物名 珍珠花《名实图考》、《中国植志》

药材名 小米柴《贵州民间药物》

文献名 米饭花《名实图考》，卵叶南烛《西昌中草药》，红蜡烛、野细胡椒《中草药》，〔南烛〕《高植图鉴》

地方名 〔山胡椒〕、野胡椒(四川、云南)，饱饭花(湖南、四川)；广西：泪木；贵州：炒米柴，小豆柴，牛屎柴，亮子药；云南：狗核桃(昭通)，炒米子、炒米子花(丽江)，碎米花叶，狗胡椒。

功效 枝叶：有毒。杀虫，止痒。外用于疥疮，麻风。

备考 古代本草中所指南烛是杜鹃花科植物 *Vaccinium bracteatum* Thunb. 的果实，而乌饭树《高植

图鉴》等文献误以本种为“南烛”，应注意鉴别。本品有毒，嫩叶有人毒，切不可混作南烛用。

#### 7215024

*Lyonia ovalifolia* (Wall.) Drude var. *elliptica* (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz. --- *Andromeda elliptica* Sieb. et Zucc.

植物名 小果珍珠花《中国植志》

药材名 续木《本草拾遗》、《汇编》

文献名 小果米饭花《云南植志》

地方名 陕西：白心木；浙江：毛米饭花(泰顺)，野乌饭子(临安)；湖北：当饭树(神农架)；湖南：羊尘饭，羊吉根，羊豆饭，羊头饭；云南：〔山胡椒〕(昆明)，〔野胡椒〕。

功效 根、果、叶：健脾止泻，活血，强筋。用于脾虚腹泻，跌打损伤，全身酸麻。

#### 7215025

*Lyonia ovalifolia* (Wall.) Drude var. *hebecarpa* (Franch. ex Forb. et Hemsl.) Chun

植物名 毛果珍珠花《中国植志》

文献名 毛果南烛《浙江植志》，毛果米饭花《云南植志》

功效 根、叶：用于脾虚腹泻，头晕目眩，跌打损伤等。

#### 7215026

*Lyonia ovalifolia* (Wall.) Drude var. *lanceolata* (Wall.) Hand. -Mazz.

植物名 狭叶珍珠花《中国植志》

药材名 烧香树《云南药录》

文献名 剑叶南烛《广西植志》，披针叶米饭花《云南植志》，狭叶南烛《高植图鉴》

地方名 广西：灯笼草(上林)。

功效 全株：有毒。用于骨颤喉，疮疖；根：用于跌打损伤，感冒。

#### 7215027

*Lyonia villosa* (Wall. ex C. B. Clarke) Hand. -Mazz.

植物名 毛叶珍珠花《中国植志》

药材名 小米柴《汇编》

文献名 西域檉木、毛叶米饭花《云南植志》，毛叶南烛《高植图鉴》，西域南烛《峨眉药植研究》

地方名 广西：油箩树(融安)，〔野胡椒〕(金秀)；贵州：小豆柴，牛屎柴，亮子药。

功效 枝、叶：杀虫止痒。用于疥疮发痒，麻风。

#### 7215028

*Oxycoccus microcarpus* Turcz. ex Rupr.

植物名 毛蒿豆《东北药用植物》

药材名 毛蒿豆《东北药用植物》

文献名 小果红莓苔子《高植图鉴》

功效 果实：止血，抗菌，消炎。用于糠疹，瘰癧，各种皮肤病；果汁注射液：用于血栓静脉炎，动脉粥样硬化症，血管栓塞。

备考 据国外文献报道，可用于泌尿系统的感染性疾病，预防肾结石的形成。

## 7215029

*Oxycoccus quadripetalus* Gilib.

植物名 红莓苔子《高植图鉴》

药材名 红莓苔子《长白山植药志》

文献名 大果毛蒿豆、甸虎《高植图鉴》

功效 果实:止血,抗菌,消炎。用于各种皮肤病,糠疹,瘰癧;果汁(注射液):用于血栓静脉炎,动脉粥样硬化症,血管栓塞。

## 7215030

*Pieris japonica* (Thunb.) D. Don ex G. Don --- *P. polita* W. W. Smith et J. E. Jeff.

植物名 马醉木《中国植志》

药材名 桤木《本草拾遗》

地方名 山东:沽药草(青岛);浙江:平头杨(乐清),蓝盘子、五梭椒(临安),泡泡花,泡步花,红蜡烛树,炮苔柴。

功效 叶:有剧毒。外用于疥疮。

## 7215031

*Rhododendron aggregatum* Balf. f. et Forrest ---

*Rhododendron phaeochrysum* Balf. f. et W. W. Smith var. *aggregatum* (Balf. f. et Forrest) Chamberlain

植物名 凝毛杜鹃《高植图鉴》

文献名 凝毛栎叶杜鹃《西藏植志》,“达玛”(藏名)《民族药志》

地方名 甘肃:大叶枇杷。

功效 花、叶:清热解毒。用于肺部疾病肺脓肿,咽喉疾病,气管炎,梅毒性炎症。

## 7215032

*Rhododendron anhweiense* Wils.

植物名 安徽杜鹃《华南杜鹃花志》

药材名 安徽杜鹃《汇编》

文献名 黄山杜鹃《高植图鉴》

功效 根:活血止痛。用于跌打损伤。

## 7215033

*Rhododendron anthopogonoides* Maxim.

植物名 烈香杜鹃《高植图鉴》

药材名 烈香杜鹃《汇编》

文献名 黄花杜鹃《青藏药图》,白香柴、小叶枇杷《中药大辞典》,黄香柴《民族药志》,头花杜鹃《中草药学》

地方名 青海:“大勒”、“塔阳”(藏名)。

功效 叶:祛痰,止咳,平喘。用于咳嗽,哮喘,支气管炎。

## 7215034

*Rhododendron apricum* Tam

植物名 上杭杜鹃《华南杜鹃花志》

功效 枝、花芽:用于咳嗽。

## 7215035

*Rhododendron arboreum* Smith

植物名 粉红树形杜鹃《西藏植志》

文献名 红花杜鹃《西藏中草》

地方名 西藏:“打玛”美多玛尔布”(藏名)。

功效 花:有小毒。平喘,清热,拔毒,止血,调经用于慢性支气管炎,骨髓炎,消化道出血,衄血,咯血,月经不调

## 7215036

*Rhododendron bachii* Levl.

植物名 腺萼马银花《高植图鉴》

药材名 腺萼马银花《贵州药录》

地方名 贵州:杜鹃花。

功效 叶:清热利湿,化痰止咳。用于白带,咳嗽;根:用于痢疾。

## 7215037

*Rhododendron campylocarpum* Hook. f.

植物名 弯果杜鹃《高植图鉴》

文献名 黄花杜鹃《西藏中草》

功效 花:有小毒。平喘,清热,拔毒,止血,调经。

## 7215038

*Rhododendron capitatum* Maxim.

植物名 头花杜鹃《高植图鉴》

药材名 头花杜鹃《青海中草》

文献名 小叶杜鹃《陕甘宁青中草药选》

地方名 青海:香柴,黑香柴。

功效 枝、叶:止咳平喘,祛痰。用于慢性气管炎,哮喘。

## 7215039

*Rhododendron cephalanthum* Franch.

植物名 毛喉杜鹃《高植图鉴》

文献名 小叶杜鹃《西藏中草》,“塔丽”(藏名)《民族药志》,鬼枇杷、白香柴、苏鲁夏《中草药通讯》

地方名 甘肃:小叶枇杷,枇杷叶。

功效 花:有小毒。平喘,清热,拔毒,止血,调经。

## 7215040

*Rhododendron championae* Hook.

植物名 刺毛杜鹃《高植图鉴》

文献名 太平杜鹃、广东杜鹃《广西植录》,张宾杜鹃《浙江药植志》

地方名 浙江:狗脚骨、牛舌柴(泰顺);广西:瘦石榴(金秀)。

功效 根、茎:祛风解表,活血止痛。用于感冒,流行性感,风湿性关节炎,跌打损伤。

## 7215041

*Rhododendron chrysanthum* Pallas --- *R. aureum* Georgi

植物名 牛皮杜鹃《东北木本图志》

药材名 牛皮茶《长白山植药志》

文献名 石南花、七里香、香树《满蒙野卉》,黄花万病草《药学报》

地方名 吉林:冬桃(临江)。

功效 叶:为朝鲜民间常用草药。用于高血压病,心脏病,类风湿等症。长白山民间代茶饮。

## 7215042

*Rhododendron dabanshanense* Fang et Wang

植物名 大坂山杜鹃《民族药志》

文献名 “达玛”(藏名)《民族药志》

**功效** 花、叶：清热解毒。用于肺部疾病，肺脓肿，咽喉疾病，气管炎，梅毒性炎症。

#### 7215043

*Rhododendron dauricum* L.

植物名 兴安杜鹃《高植图鉴》

药材名 满山红、满山红油《药典》

地方名 达子香(东北、内蒙古)，映山红、迎山红、山崩子、靠山红(东北)；吉林：野杜鹃花。

**功效** 叶及挥发油：止咳，祛痰。用于急、慢性支气管炎；根：止痢。用于肠炎，痢疾。

#### 7215044

*Rhododendron dauricum* L. f. *albiflorum* (Turcz.) Y. C. Chu --- *R. dauricum* L. var. *albiflorum* Turcz.

植物名 白花兴安杜鹃《黑龙江树木志》

药材名 白花兴安杜鹃《东北药用植物》

**功效** 叶及根：止咳，祛痰，清肺，解表。用于急慢性气管炎，支气管喘息，咳嗽，感冒头痛；根：止痢。用于肠炎及急性菌痢。

#### 7215045

*Rhododendron davidii* Franch.

植物名 腺果杜鹃《高植图鉴》

地方名 四川：杜鹃花(峨眉山)。

**功效** 花：清热解毒，止血，调经。

#### 7215046

*Rhododendron delavayi* Franch. --- *R. arboreum* Smith ssp. *delavayi* (Franch.) Chamberlain

植物名 马缨杜鹃《高植图鉴》

药材名 马缨杜鹃《汇编》

文献名 马缨花《滇海虞衡志》，[马银花]《名实图考》

地方名 贵州：[映山红]；云南：密筒花，[红山茶]，杜鹃，麻力光，“麦诺”(楚雄彝名)，玛瑙缨花。

**功效** 花：有小毒。清热，解毒，止血，调经。用于骨髓炎，流感，痢疾，消化道出血，衄血，咯血，月经不调；全草：除湿，止带。

#### 7215047

*Rhododendron discolor* Franch.

植物名 喇叭杜鹃《高植图鉴》

药材名 喇叭杜鹃《贵州药录》

地方名 贵州：映山红。

**功效** 根：活血化瘀，除湿止痛。用于月经不调，痢疾，风湿关节痛。

#### 7215048

*Rhododendron farrerae* Tate

植物名 丁香杜鹃《高植图鉴》

文献名 华丽杜鹃《广西植录》

**功效** 根、叶：用于气管炎，咳嗽。

#### 7215049

*Rhododendron fortunei* Lindl.

植物名 云锦杜鹃《高植图鉴》

文献名 天目杜鹃《树分》

地方名 浙江：厚叶朱标花(临安)；其他：野枇杷。

**功效** 根、花、叶：清热解毒，敛疮。用于皮肤抓破溃烂，跌打损伤。

#### 7215050

*Rhododendron latoucheae* Franch.

植物名 鹿角杜鹃《高植图鉴》

文献名 鹿角杜鹃《浙江药植志》，岩杜鹃《广西植录》

地方名 广东：大叶羊角(乐昌)。

**功效** 根、茎、叶、花：清热解毒，敛疮；根：镇痛。

#### 7215051

*Rhododendron lingii* Chun

植物名 乳源杜鹃《高植图鉴》

药材名 乳源杜鹃《福建药物志》

**功效** 叶、根：用于咳嗽，慢性支气管炎。

#### 7215052

*Rhododendron mariae* Hance

植物名 岭南杜鹃《高植图鉴》

药材名 紫花杜鹃《中草药学》

文献名 异叶杜鹃《汇编》，广东紫花杜鹃《中药大辞典》

地方名 广东：假吊钟(高要)，紫杜鹃；广西：土牡丹；土牡丹花(桂平)，满山红。

**功效** 叶：镇咳，祛痰，平喘。用于咳嗽，哮喘，支气管炎。外用于对口疮；根：清凉解热，散瘀。

#### 7215053

*Rhododendron mariesii* Hemsl. et Wils.

植物名 满山山红《高植图鉴》

文献名 山石榴《陕西通志》，马礼士杜鹃《树分》

地方名 浙江：石榔头(安吉)，三叶杜鹃；湖北：红杜鹃(神农架)。

**功效** 根：有毒。祛风湿，活血祛瘀，止血；花、叶：清热解毒，化痰止咳，止痒。

#### 7215054

*Rhododendron micranthum* Turcz.

植物名 照山白《高植图鉴》

药材名 照山白《汇编》

文献名 照白杜鹃《高原中草》，小花达子香《指示植物》，小花杜鹃《经济植物学》，白花杜鹃《中草药》，白镜子《高植图鉴》

地方名 辽宁：药芦；河北：[冬青]，达子香，蓝荆；山西：白花晚荆(太行)；山东：万斤，万经棵，万金棵，望江(平邑)，万金(泰山)，铁石茶；河南：黄金花；湖北：[蜂猪刺]，白杜鹃(神农架)；四川：“达里”(藏名)。

**功效** 枝、叶：有毒。祛风通络，调经止痛，化痰止咳。用于慢性气管炎，风湿痹痛，腰痛，痛经，产后关节痛。

#### 7215055

*Rhododendron microphyton* Franch.

植物名 亮毛杜鹃《高植图鉴》

药材名 酒瓶花《云南中草药》

地方名 云南：小杜鹃；贵州：艳山红。

**功效** 根：清热解表，利尿。用于感冒，急、慢性肾

炎,肾盂肾炎,小儿惊风。

#### 7215056

*Rhododendron molle* (Blume) G. Don

植物名 羊躑躅《本经》、《高植图鉴》

药材名 闹羊花《纲目》、《药典》

文献名 羊躑躅花《吴普本草》,玉支《名医别录》,羊不食草《本草拾遗》,躑躅花《图经》,黄杜鹃《本草蒙笙》,黄躑躅、惊羊花、老虎花、羊躑躅根《纲目》,闹阳花《外科正宗》,山芝麻根《梁侯瀛集验良方》,巴山虎、山芝麻《百草镜》,闹羊花子、南天竺草《汪连仕采药书》,天芝麻《杨氏便易良方》,黄色映山红、石棠花、闹羊花根《纲目拾遗》,土连翘《本草从新》,搜山虎《名实图考》,六轴子《果序》《饮片新参》,八里麻《药典》,〔山枇杷〕、黄稻节柴、黄株标、大叶株标《中药大辞典》,闹羊花头、八厘麻子《中草药学》

地方名 一杯倒、毛老虎、惊羊草(江西、广西),黄杜鹃(上海、浙江、安徽),黄杜鹃花(浙江、福建),闷头花(浙江、广西、贵州),三钱三(广东、广西),映山黄(江苏、湖南),水兰花(湖南、广西),羊不食(江苏、安徽);江苏:羊不吃草(无锡),〔山茶花〕(江阴),牛狂花,黄花,黄花花,石六轴花,石绿轴花,牛不食(铜山);浙江:三月黄(临安),黄喇叭花,黄牯牛花,石菊花,牛狼花,翻天印;江西:八棱麻、黄花石榴(泰和),抵婆花;福建:黄蛇豹花(宁德);湖北:八厘麻;湖南:老鸡花,豹狗花,大黄花,老虎麻,老闹羊花,出山彪(长沙);广东:黄子女(南雄),雷公花(连县);广西:一杯醉,老虎子、羊开口、猛力将军(桂林),闹羊木,豺狗花,〔喇叭花〕,闹虫花,狗头花,坐山虎,闹头花;云南:〔马银花〕,〔石南藤〕;其他:蝎牛花,毒羊草,老虎兜,老更花,烧山处虎,苦安花,羊惊花。

功效 花:有大毒。祛风除湿,散瘀定痛。用于风湿痹痛,跌打损伤,皮肤顽癣;根:有毒。祛风,止咳,散瘀,止痛,杀虫。用于风湿痹痛,跌打损伤,神经痛,慢性支气管炎。外用于肛门瘻管,杀灭钉螺;果(六轴子、八里麻):有大毒。搜风止痛,止咳平喘。用于跌打损伤,风湿关节痛;茎、叶:杀蝇蛆、子、钉螺。

#### 7215057

*Rhododendron mucronatum* (Blume) G. Don

植物名 白花杜鹃《高植图鉴》

药材名 白杜鹃《汇编》

文献名 白躑躅《新纲》,尖叶杜鹃《中国植物图鉴》,〔照山白〕《华北经植志要》

地方名 白花映山红、白杜鹃花(广东、四川);浙江:白鲛花,白柴鲛花(浙南);四川:映山白、满山白(南充);贵州:白艳山红。

功效 花、根或茎、叶:和血,散瘀,止咳,固精,止带。用于咳嗽,遗精,白带,吐血,肠风下血,血崩,跌打损伤。

#### 7215058

*Rhododendron mucronulatum* Turcz. --- *R. dauricum* L.  
var. *mucronulatum* Maxim.

植物名 迎红杜鹃《高植图鉴》

药材名 迎山红《吉林中草药》

文献名 山躑躅《满鲜植汇》,尖叶杜鹃《山东树木志》

地方名 蓝荆子(河北、山东);吉林:满山红;山西:红花晚荆(太行);山东:〔映山红〕。

功效 叶:有毒。解表,化痰,止咳,平喘。用于感冒头痛,咳嗽,哮喘,支气管炎。

#### 7215059

*Rhododendron mucronulatum* Turcz. f. *ciliatum* (Nakai) Kitag. --- *R. mucronulatum* Turcz. var. *ciliatum* Nakai

植物名 毛叶迎红杜鹃《东北本图志》

药材名 毛叶迎红杜鹃《东北药用植物》

功效 叶:解表,止咳,祛痰,平喘。用于感冒头痛,咳嗽,哮喘,急、慢性支气管炎。

#### 7215060

*Rhododendron naamkwanense* Merr. --- *R. riparium* A. Wang et Tam

植物名 南昆山杜鹃《华南杜鹃花志》

文献名 南昆杜鹃《高植图鉴》

地方名 广东:细石榴花(增城)。

功效 叶:用于慢性气管炎。

#### 7215061

*Rhododendron oreodoxa* Franch.

植物名 山光杜鹃《高植图鉴》

文献名 光背杜鹃、山景杜鹃《中草药通讯》

地方名 甘肃:野枇杷。

功效 叶:镇咳,祛痰。用于气管炎。

#### 7215062

*Rhododendron ovatum* (Lindl.) Planch. ex Maxim.

植物名 卵叶杜鹃《广西植录》

文献名 〔马银花〕《高植图鉴》

地方名 浙江:阔叶杜鹃、白杜鹃、〔白茶花〕(温州),白杜鹃花(乐清),紫花映山红、朱标花(临安);江西:清明花(资溪)。

功效 根:有毒。清热利湿。用于湿热带下,疥疮。

#### 7215063

*Rhododendron primulaeflorum* Bur. et Franch.

植物名 樱草杜鹃《高植图鉴》

文献名 “塔丽”(藏名)《民族药志》

功效 叶或带叶嫩枝及花:清热消炎,止咳平喘,强身抗老。用于气管炎,消化道疾病,胃下垂,胃扩张,肝脾肿大,水肿,体虚。外用于疮毒痈肿。

#### 7215064

*Rhododendron przewalskii* Maxim.

植物名 陇蜀杜鹃《树分》

药材名 光背杜鹃《汇编》

文献名 青海杜鹃《高植图鉴》

地方名 陕西:金背枇杷;甘肃:枇杷、野枇杷(榆中);青海:“达玛”、“大玛”(藏名);四川:“达米罗玛”(藏名)。

功效 叶:有大毒。止咳,祛痰,降血压。用于老

年慢性支气管炎,高血压病;花:清肺泻火,止咳化痰。用于咳嗽,咯血,肺病,白带,头晕痛;果实:镇咳祛痰,清肺和胃,降气消暑。用于肺热咳嗽,呕吐,口渴。

## 7215065

*Rhododendron purdomii* Rehd. et Wils.

植物名 太白杜鹃《高植图鉴》

地方名 陕西:药枇杷(太白)。

功效 叶:有大毒。止咳,祛痰,降血压;花:清肺泻火,止咳化痰;果实:镇咳祛痰,清肺和胃,降气消暑。

## 7215066

*Rhododendron racemosum* Franch.

植物名 腋花杜鹃《高植图鉴》

功效 叶及挥发油:祛痰,止咳。

## 7215067

*Rhododendron seniavinii* Maxim.

植物名 毛果杜鹃《高植图鉴》

药材名 满山白《汇编》

文献名 福建杜鹃《树分》,密枝杜鹃《浙南本草新编》、

地方名 福建:〔照山白〕(南平)。

功效 叶、全株:止咳,祛痰,平喘,消炎。用于慢性气管炎;根皮:清热解毒,散瘀。

## 7215068

*Rhododendron simsii* Planch.

植物名 杜鹃《高植图鉴》

药材名 杜鹃《汇编》

文献名 杜鹃花、山踯躅、山石榴、映山红《纲目》,翻山虎、搜山虎(汪连仕《采药书》),红踯躅《洛阳花木记》,艳山红《分类草药性》,照山红《树分》

地方名 清明花(江西、福建、广西),迎春花(湖北、河南),满山红(安徽、江西、福建),〔山茶花〕(江西、浙江、广西),焰山红(四川、贵州);山东:迎山红;浙江:红柴萼花,灯笼红花,朱标花,三月红(临安、泰顺);江西:虫鸟花,〔报春花〕;福建:春子花(浦城),羊角花(龙岩、武平、大田、清流),蛇豹花(宁德地区),符骨仔,春明花,度姜,红花符骨仔,礼山红花(宁化),笋花(大田),黄格老、睡眠花(永安),石灰樵(清流),茅寮结(三明);湖北:野山红(宜昌);湖南:小苏山(衡山);广东:〔石榴花〕,红花杜鹃,红杜鹃;四川:遍山红;贵州:山归来,艳山花。

功效 根、花:活血,调经,祛风湿。用于月经不调,跌打损伤,风湿痛,吐血;果实:用于伤痛;叶:清热解毒。

## 7215069

*Rhododendron spadiceum* Tam

植物名 蔗黄杜鹃《华南杜鹃花志》

功效 叶:止咳祛痰。

## 7215070

*Rhododendron spinuliferum* Franch.

植物名 爆仗杜鹃《广西植录》

药材名 大杜鹃《汇编》

文献名 细刺杜鹃花《西昌中草药》,爆仗花《高植图

鉴》

地方名 四川:映山红,艳山红,杂糖花(会东);云南:密通花(昆明);其他:红杜鹃。

功效 根、叶、花:有毒。祛风除湿,通经活络,消炎。用于崩漏,白带。外用于跌打劳伤,疮,疖,痈,癣。

## 7215071

*Rhododendron stamineum* Franch. --- *R. cavaleriei* var. *chaffanjonii* Levl. --- *R. aucubaefolium* Hemsl. --- *R. pittosporaeifolium* Hemsl.

植物名 长蕊杜鹃《高植图鉴》

文献名 六骨筋《高植图鉴》

功效 根:用于狂犬病。

## 7215072

*Rhododendron thymifolium* Maxim.

植物名 千里香杜鹃《高植图鉴》

药材名 千里香杜鹃《民族药志》

文献名 百里香叶杜鹃《青海中草》,黑香柴《民族药志》,百里香杜鹃《中草药》

地方名 青海:香柴。

功效 叶、花:平喘止咳,祛胃寒。

## 7215073

*Rhododendron tsinghaiense* Ching

植物名 青海杜鹃《中草药》

功效 鲜叶、嫩枝:用于慢性支气管炎。

## 7215074

*Rhododendron tubulosum* Ching

植物名 长管杜鹃《中草药通讯》

功效 挥发油:祛痰。

## 7215075

*Rhododendron westlandii* Hemsl. --- *Rhododendron moulmainense* Hook. f.

植物名 丝线吊芙蓉《高植图鉴》

药材名 丝线吊芙蓉《广西药录》

文献名 毛棉杜鹃花《海南植志》

地方名 广西:上树芭蕉(上林),白花木(那坡),白杜鹃。

功效 根:用于肺结核,跌打损伤,水肿。

## 7215076

*Vaccinium ardisioides* Hook. f. ex Clarke

植物名 红梗越橘《中国植志》

文献名 大叶树萝卜《云南药录》,紫金牛状越橘《云南种录》

功效 根:活血散瘀,消炎利尿。用于骨折,跌打损伤,水肿。

## 7215077

*Vaccinium bracteatum* Thunb.

植物名 乌饭树《高植图鉴》

药材名 南烛《开宝本草》、《汇编》

文献名 南烛草木、猴药、男续、后卓、维那木、草木之王、猴菽草、染菽(陶弘景《登真隐诀》),牛筋《本草拾遗》,南烛枝叶、乌草、文烛《开宝本草》,乌饭草、乌饭、饭草《日华子本草》,墨饭草、南烛子、青精饭、杨桐《纲



日》, 饱饭花《名实图考》, 华越橘《中国植物图鉴》, 乌饭果《药材学》, 苞越橘、康菊紫《中药大辞典》

地方名 江苏: 南竺叶、西烛叶(苏州), 南竺子(苏州、清江), 乌米饭(无锡), 乌饭草头(宜兴), 南烛叶; 浙江: 乌饭糯(遂昌), 黑米饭(平阳), 南竹子(宁波), 起子儿, 穆子、饭花、乌子, 南天烛, 糯米台, 山乌饭; 安徽: 大米饭叶, 乌拉饭, 乌饭果子, 乌果子树, 青茶条; 江西: 零丁子; 福建: 沙莲子; 湖南: 十月乌, 小叶乌饭子, 小刺辣, 羊头饭柴, 羊坐饭, 羊桐饭, 冷饭, 细叶羊头饭, 瓠花子, 羊豆饭, 夏波, 乌饭子, 小三条筋子树, 珍珠花, 洋桐饭子, 杨桃饭、羊头饭(衡山); 海南: 乌饭叶、谷粒木、谷伙(澄迈); 广西: 鸡眼果(灵山), 米碎果(防城); 其他: 沙沙面。

功效 果实: 强筋骨, 益肾气。用于身体虚弱, 脾虚久泄, 梦遗滑精, 赤白带下; 叶: 益精气, 强筋骨, 明目, 止泻; 根: 散瘀, 消肿, 止痛。

#### 7215078

*Vaccinium bullatum* (Dop) Sleumer

植物名 泡泡叶越橘《高植图鉴》

地方名 广西: 山木薯(那坡)。

功效 根: 用于风湿骨痛。

#### 7215079

*Vaccinium carlesii* Dunn

植物名 短尾越橘《高植图鉴》

文献名 小叶乌饭树《浙江药植志》, 福建乌饭树《广西植录》

地方名 福建: 卡氏乌饭, 和尚头; 云南: 小灰果, “思郎郎哈”(元江哈尼语)。

功效 果实: 强筋骨, 益肾气; 叶: 用于牙龈腐烂; 根: 活血化瘀, 消肿止痛。用于跌打损伤。

#### 7215080

*Vaccinium chengae* Fang --- *V. saxicolum* Chun ex Sleumer

植物名 四川越橘《高植图鉴》

药材名 石瓜子莲《四川中药志》

文献名 石生越橘《中药大辞典》, 峨眉越橘《峨眉药植资源》

地方名 四川: 珠珠树, 诚君珍珠树。

功效 枝叶: 通经散瘀。用于跌打损伤, 闪腰挫气。

#### 7215081

*Vaccinium delavayi* Franch.

植物名 苍山越橘《高植图鉴》

文献名 土地瓜、山梨儿《中药大辞典》

地方名 四川: 岩檀香, 野万年青(米易); 云南: 老鸦果(会泽)。

功效 球根: 行气, 消食。用于胸腹胀痛, 食物不消。

#### 7215082

*Vaccinium dunalianum* Wight

植物名 长尾越橘《中国植志》

文献名 樟叶越橘《西藏植志》, 尾叶越橘《高植

图鉴》

地方名 云南: 大透骨草(昆明), 饭米果。

功效 全株: 祛风除湿, 舒筋活络。用于风湿关节痛。

备考 《新华本草纲要》2: 359, 991 注称: 《中药大辞典》等所载 *Vaccinium dunalianum* Wight var. *urophyllum* Rehd. et Wils. 系本种之误定名。

#### 7215083

*Vaccinium fragile* Franch.

植物名 乌鸦果《中国植志》

药材名 土千年健《滇南本草》、《汇编》

文献名 乌饭子、千年矮、米饭果、马饭果根《滇南本草》, 毛叶乌饭树《汇编》, 午饭果《高植图鉴》

地方名 四川: 蚂蚁果, 小马扎豆, 易碎乌饭; 云南: 冷饭果(昆明), 沙汤果(曲靖), 乌饭果(昆明、曲靖、丽江), 老鸦牙(楚雄), [千年健], 土千年剑, 老鸦果, 老鸦泡, 纯阳子, 黑果果叶。

功效 根、叶: 舒筋活血, 消炎止痛。用于风湿性关节炎, 跌打损伤, 腮腺炎, 急性结膜炎, 痢疾, 胃痛; 果实: 用于怔忡睡卧不宁。

#### 7215084

*Vaccinium fragile* Franch. var. *mekongense* (W. W. Sm.) Sleumer

植物名 大叶乌鸦果《中国植志》

药材名 左黑果《云南药录》

文献名 大理土千年健《云南种录》

地方名 云南: 救军粮。

功效 树皮: 收敛止血, 清热除湿。用于外伤出血, 烧、烫伤, 疮疡, 急性胃肠炎, 湿疹, 白带过多。

#### 7215085

*Vaccinium henryi* Hemsl.

植物名 无梗越橘《高植图鉴》

药材名 无梗越橘《神农架药录》

地方名 湖北: 吊穗花《神农架》。

功效 枝、叶: 祛风除湿, 消肿。

#### 7215086

*Vaccinium iteophyllum* Hance

植物名 黄背越橘《高植图鉴》

文献名 鼠刺乌饭树《广西植录》, 鼠刺叶乌饭树《云南药录》

地方名 广西: 小龙木(乐业); 云南: 大树萝卜。

功效 根: 散瘀止痛, 利尿消肿。用于肝炎, 无名肿毒, 病后体虚, 跌打损伤, 风湿疼痛, 胃痛。外用于伤出血。

#### 7215087

*Vaccinium laetum* Diels

植物名 西南越橘《中国植志》

药材名 饱饭花《四川中草》

文献名 小叶珍珠花《中药大辞典》

地方名 四川: 乌饭子, 米饭花。

功效 枝叶、果实: 强筋益气, 消肿。用于筋骨酸软, 四肢无力。

## 7215088

*Vaccinium mandarinorum* Diels --- *V. hangchouense* (Matsuda) Komatsu --- *V. sprengelii* auct. non (D. Don) Sleumer

植物名 江南越橘《浙江植志》  
药材名 米饭花《汇编》  
文献名 门达乌饭树《广西药录》, 乌饭树《西昌中草药》

地方名 浙江: 南烛子, 南烛叶; 广西: 退子弹药(隆林); 四川: 乌饭, [山胡椒]; 贵州: “黄拉摆”(侗语)。

功效 果实: 健脾益肾, 消肿。用于久泻, 梦遗, 赤白带下, 消化不良, 全身浮肿; 叶: 明目乌发, 消肿止痛。用于白带多, 跌打损伤。

备考 过去一些文献常将本品误订为 *Vaccinium sprengelii* (D. Don) Sleumer

## 7215089

*Vaccinium omeiense* Fang

植物名 峨眉越橘《高植图鉴》  
文献名 峨眉珍珠树《高植图鉴》  
地方名 四川: 珍珠树(峨眉山)。  
功效 花、叶、枝: 消肿, 平喘。

## 7215090

*Vaccinium pseudorobustum* Sleumer

植物名 椭圆叶越橘《高植图鉴》  
文献名 壮叶乌饭树《广西药录》  
地方名 广西: 大首伞(桂平)。  
功效 根: 补血, 强壮。用于肺结核。

## 7215091

*Vaccinium uliginosum* L.

植物名 笃斯越橘《中国植志》  
药材名 笃斯(黑龙江、内蒙古)  
地方名 吉林: 甸果, 地果, 黑豆树(大兴安岭), 龙果, 蛤塘果; 内蒙古: “讷日苏(蒙语)。”  
功效 叶、果: 收敛, 清热。用于腹泻, 肠炎, 胃炎; 树皮(粉): 外用于伤口。

## 7215092

*Vaccinium urceolatum* Hemsl.

植物名 红花越橘《高植图鉴》  
药材名 红花越橘《贵州药录》  
地方名 贵州: 羊桐, 酒糟果。  
功效 枝、叶: 清热解毒, 止咳化痰。用于咳嗽, 疔疮。

## 7215093

*Vaccinium vitis-idaea* L.

植物名 越橘《闽书南产志》、《高植图鉴》  
药材名 越橘《汇编》  
文献名 温普《盛京通志》, 山果儿《满洲野生植物图说》, 山中果、山里果儿《朝鲜植汇》, 苔桃、岩桃、越橘叶《中药大辞典》, 熊果叶《新疆中草药手册》  
地方名 红豆、牙疙瘩(黑龙江、吉林、内蒙古); 吉林: 越橘果。  
功效 叶: 有小毒。利尿, 解毒。用于尿道炎, 膀

胱炎; 果: 止痢。用于肠炎, 痢疾。

## 7215a 鹿蹄草科 Pyrolaceae

## 7215a01

*Cheilotheca humilis* (D. Don) H. Keng --- *Monotropastrum tschanbaischaicum* L. Y. Chang et Chou

植物名 球果假水晶兰《中国植志》  
文献名 长白拟水晶兰《东北草本植志》, 长白假水晶兰《长白山植药志》, 坛果拟水晶兰、球状拟水晶兰《拉汉种称》, 东北假水晶兰《植分学报》  
功效 全草: 补虚。用于虚咳。

## 7215a02

*Cheilotheca macrocarpa* (H. Andres) Y. L. Chou --- *Monotropastrum macrocarpum* H. Andres --- *M. lungchuanense* K. F. Wu

植物名 大果假水晶兰《中国植志》  
文献名 拟水晶兰《高植图鉴》, 假水晶兰、浙江假水晶兰、台湾假水晶兰《植分学报》, 大果假水晶兰《云南种录》  
地方名 四川: 梦兰花(峨眉山)。  
功效 全草: 补虚, 止咳, 养阴润肺。

## 7215a03

*Chimaphila japonica* Miq. --- *C. astyla* Maxim.

植物名 喜冬草《中国植志》  
药材名 梅笠草《神农架药录》  
地方名 湖北: 铺地梅(神农架); 陕西: 罗汉草。  
功效 茎: 活血调经。用于月经不调。

## 7215a04

*Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton

植物名 伞形喜冬草《中国植志》  
文献名 伞形梅笠草《高植图鉴》  
功效 叶: 利尿, 收敛, 镇痛。

## 7215a05

*Monotropa hypopitys* L. --- *Hypopitys monotropa* Crantz

植物名 松下兰《中国植志》  
药材名 松下兰《长白山植药志》  
地方名 陕西: 地花, 土花。  
功效 全草: 镇静, 解痉, 镇咳; 地下部分: 用于利尿, 催吐。

## 7215a06

*Monotropa hypopitys* L. var. *hirsuta* Roth --- *Hypopitys monotropa* Crantz var. *hirsuta* Roth

植物名 毛花松下兰《中国植志》  
文献名 松下兰《元江哈尼族药》  
地方名 云南: “书回那雌”(元江哈尼语)。  
功效 根: 健肾壮腰, 利尿通淋。

## 7215a07

*Monotropa uniflora* L.

植物名 水晶兰《中国植志》  
药材名 水晶兰《贵州民间药物》  
地方名 浙江: 水兰草, 银锁匙, 梦兰花; 四川: 崖姜草; 贵州: 孟兰花, 地气花, 水兰花。

功效 全草:补虚止咳。用于肺虚咳嗽。

#### 7215a08

*Pyrola alboreticulata* Hayata

植物名 花叶鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿衔草(台湾)

文献名 白脉鹿蹄草《拉汉种称》

功效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

备考 本种为台湾特产种,与普通鹿蹄草 *P. decorata* H. Andres 相近,常误视为同种异名。

#### 7215a09

*Pyrola atropurpurea* Franch.

植物名 紫背鹿蹄草《高植图鉴》、《中国植志》

药材名 紫背鹿蹄草《汇编》

文献名 鹿蹄草《云南药录》,深紫鹿蹄草《云南种录》

功效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

#### 7215a10

*Pyrola calliantha* H. Andres --- *P. rotundifolia* L. subsp. *chinensis* H. Andres

植物名 鹿蹄草《纲目》、《中国植志》

药材名 鹿衔草《药典》

文献名 潞安茶《中草药学》,美花鹿蹄草,河北鹿蹄草《拉汉种称》,川北鹿蹄草《高植图鉴》

地方名 鹿含草(河北、云南),常绿茶(山西、江西、安徽);山西:鹿安茶;陕西:鹿寿茶、白鹿寿草(眉县),鹿寿草(长安、眉县、太白、洋县、宝鸡);湖北:地青菜(神农架);四川:大肺筋草、红肺筋草、紫背金牛草(重庆),肺癆草(南充),白茵陈,高山鹿衔草(峨眉山),罗汉茶(松潘);贵州:肺心草;其他:鹿寿灵芝。

功效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。用于风湿痹痛,腰膝无力,月经过多,久咳痰嗽。

#### 7215a11

*Pyrola corbieri* Levl.

植物名 贵阳鹿蹄草《高植图鉴》

药材名 贵阳鹿蹄草《贵州药录》

文献名 柯氏鹿蹄草《拉汉种称》

地方名 贵州:鹿蹄草,紫背鹿衔草。

功效 全草:补虚,益肾,祛风除湿,活血调经。用于虚弱咳嗽,劳伤吐血,风湿关节痛,崩漏,白带。

#### 7215a12

*Pyrola dahurica* (H. Andres) Komar. --- *P. incarnata* Fisch. ex DC. ssp. *dahurica* (H. Andres) Krisa

植物名 兴安鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿衔草(东北)

功效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

#### 7215a13

*Pyrola decorata* H. Andres --- *Pyrola oreodoxa* H. Andres

植物名 普通鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿衔草《滇南本草》、《药典》

文献名 卵叶鹿蹄草《药典》,鹿蹄草、小秦王草、秦王试剑草《纲目》,破血丹《名实图考》,雅美鹿蹄草《秦岭植志》,普通鹿蹄草《浙江药植志》,云南鹿蹄草《汇

编》,山美人鹿蹄草《拉汉种称》

地方名 肺心草(西南);陕西:鹿寿草;湖北:天青地红(神农架);云南:紫背鹿衔草,鹿含草(大理),背红厚叶(玉溪),马鹿草(红河)。

功效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。用于风湿痹痛,腰膝无力,月经过多,久咳痰嗽。

#### 7215a14

*Pyrola elegantula* H. Andres

植物名 长叶鹿蹄草《中国植志》

药材名 红肺心草(贵州)

文献名 鹿蹄草、雅致鹿蹄草《广西药录》,极品鹿蹄草《拉汉种称》

功效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

#### 7215a15

*Pyrola elliptica* Nutt.

植物名 椭圆叶鹿蹄草《中药大辞典》

药材名 鹿衔草(四川)

功效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

#### 7215a16

*Pyrola incarnata* Fisch. ex DC.

植物名 红花鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿衔草(陕西太白)

文献名 红花一药草(小泉《药植》),鹿蹄草《兴安植群》

地方名 陕西:鹿寿茶、鹿素草、鹿含草(太白)。

功效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

#### 7215a17

*Pyrola japonica* Klenze ex Alef.

植物名 日本鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿衔草(东北、陕西、安徽)

文献名 鹿蹄草、小秦王草、秦王试剑草《纲目》,一药草、鹿饱草《新纲》,金刚草、破血丹(小泉《药植》)

地方名 陕西:鹿寿茶,鹿寿草;安徽:鹿含草;贵州:无心草,无颠草。

功效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

#### 7215a18

*Pyrola mattfeldiana* H. Andres

植物名 贵州鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿衔草《贵州药录》

功效 全草:补虚,益肾,祛风除湿,活血调经。用于虚弱咳嗽,劳伤吐血,风湿关节痛,崩漏,白带。

#### 7215a19

*Pyrola minor* L.

植物名 短柱鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿衔草(东北)

地方名 鹿蹄草(东北、新疆、云南、西藏)。

功效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

#### 7215a20

*Pyrola renifolia* Maxim.

植物名 肾叶鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿衔草(东北)

地方名 鹿蹄草(东北、河北、内蒙古)。

功 效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

#### 7215a21

*Pyrola rotundifolia* L. --- *P. tianochanica* Poljak.

植物名 圆叶鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿衔草(新疆)

文献名 冬绿《中国药植志》

地方名 新疆:鹿含草,鹿蹄草。

功 效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

#### 7215a22

*Pyrola rugosa* H. Andres

植物名 皱叶鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿衔草(西北)

地方名 鹿蹄草(陕西、甘肃、四川)。

功 效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

#### 7215a23

*Pyrola szechuanica* H. Andres

植物名 四川鹿蹄草《中国植志》

药材名 鹿蹄草(四川)

功 效 全草:祛风湿,强筋骨,止血。

### 7219 岩梅科 Diapensiaceae

#### 7219001

*Berneuxia tibetica* Decne.

植物名 岩匙《高植图鉴》

药材名 岩筋菜《汇编》

地方名 四川:石风丹、铁灼菜、岩波菜、白奴花(峨眉山);云南:石莲(禄劝),露寒草(丽江)。

功 效 全草:散寒,平喘。用于感冒风寒,咳嗽,哮喘,劳伤,跌打损伤。

### 7221 柿树科 Ebenaceae

#### 7221001

*Diospyros cathayensis* Steward --- *Diospyros fochowensis* auct. non Metc. et Chen --- *Diospyros sinensis* auct. non Hemsl.

植物名 乌柿《中国植志》

药材名 黑塔子《四川中药志》

文献名 长柄柿《云南植志》,油柿根《分类草药性》

地方名 浙江:丁香柿;四川:[金弹子],野油柿子,山柿子,柿树根(峨眉山),黑油柿子,黑丁香。

功 效 根:清热凉血,除湿。用于痔疮,肠风下血,风火牙痛,肺热咳嗽,疔肿,烫火伤;果:清热,润肺,止渴。用于热渴,咳嗽,吐血,口疮;鲜叶:外用于敷疔疮,烧伤。

备 考 《四川中药志》(1960)将本种学名误订为 *Diospyros fochowensis* Metc. et Chen。有些文献将本种学名订为 *Diospyros sinensis* Hemsl. 也属误订。

#### 7221002

*Diospyros cathayensis* Steward var. *fochowensis* (Metc. et Chen) S. Lee --- *Diospyros fochowensis* Metc. et Chen

植物名 福州柿《中国植志》

药材名 猴脑子《纲目拾遗》、《新华本草纲要》

文献名 仙茅果《纲目拾遗》

功 效 根:清热,凉血。

#### 7221003

*Diospyros chunii* Metc. et L. Chen

植物名 崖柿《中国植志》

药材名 陈柿《广西药录》

地方名 广西:小刺果(大瑶山)。

功 效 树皮:止疳。

#### 7221004

*Diospyros dumetorum* W. W. Smith --- *D. mollifolia* Rehd. et Wils.

植物名 岩柿《中国植志》

药材名 石柿《云南种录》

文献名 小叶柿《树分》,崖柿、小叶山柿《广西药录》,毛叶柿《云南种录》

地方名 广西:帮搞(上林),石榄树(融安),耳木(德保);云南:涩藿香、紫藿香(玉溪),乌木(文山、武定、丽江、宁蒗、禄劝),乌木果(文山),乌木树(武定),“色依哩”(楚雄彝名),山塔蔗,涩果,石柿花,“涩米粒”(双柏彝语),毛叶柿花。

功 效 叶:清热,消炎,健脾胃。用于小儿营养不良,慢性腹泻,小儿消化不良。外用于疮疖,烧烫伤;果实:用于红崩白带,咯血,肠风下血,遗精滑精。

#### 7221005

*Diospyros ebenum* Koen.

植物名 乌木《中国植志》

药材名 乌木屑《纲目》、《中药大辞典》

文献名 乌文木、翳木(崔豹《古今注》),文木《南方草木状》,乌楠木《纲目》,黑檀《中药大辞典》

功 效 木屑:解毒。用于霍乱吐痢。

备 考 本种商用乌木产印度、斯里兰卡,我国不产。

#### 7221006

*Diospyros eriantha* Champ. ex Benth.

植物名 乌材(台湾)、《中国植志》

药材名 乌材《广西药园药录》

地方名 台湾:乌材仔,乌杆仔;海南:乌蛇,小叶乌椿,乌木,乌眉;广西:米来,米汉。

功 效 根皮、果:用于风湿,疝气痛,心气痛。

#### 7221007

*Diospyros glaucifolia* Metc.

植物名 粉叶柿(江西庐山)、《中国植志》

地方名 浙江柿(江苏、浙江);浙江:丁香柿(开化),毛梨壳(仙居),鸡粪柿(天台)。

功 效 宿萼:降逆气;叶:用于降高血压,咳嗽,肺气胀,各种内出血。

#### 7221008

*Diospyros kaki* Thunb.

植物名 柿《别录》、《中国植志》

药材名 柿蒂《本草拾遗》、《药典》

文献名 火柿、软熟柿《别录》,干柿《日华子本草》,柿钱《洁古家珍》,柿木皮《图经》,柿饼《日用本草》,柿

花、柿霜、柿皮、红柿《滇南本草》，柿根、柿漆、镇头迦《纲目》，孤柿子根皮《疡医准绳》，柿干《本草备要》，柿子把《中药材手册》，柿萼、柿饼霜、柿霜饼《药材学》，柿涩《药材资料汇编》，柿丁《中药志》

地方名 柿树(浙江、四川)，柿子(山东、浙江)；甘肃：柿子树；江苏：柿饼蒂(常熟)；福建：丁柿(泉州)，扁柿、瓮柿(宁德)；湖南：朱果、猴枣、锁头迦；广西：方柿、水柿、凉柿、桐柿、柿顶；四川：柿子根、柿子蒂；云南：刺花树(丽江)，牛心柿、米柿、柿树皮、金柿、柿花树；其他：白柿。

功效 宿萼(柿蒂)：降逆下气。用于呃逆；果实(柿子)：清热，润肺，止渴，止血。用于热渴，咳嗽，吐血，肠出血，痔疮肿痛和出血；外果皮(柿皮)：外用于贴疔疮，无名肿毒；柿饼：润肺，涩肠，止血。用于吐血，咯血，血淋，肠风，痔漏，痢疾；柿霜(柿饼的白色粉霜)：清热润燥化痰。用于肺热燥咳，咽干喉痛，口舌生疮，吐血，咯血，消渴；柿漆(未成熟果实加工制成的胶糊状液)：用于高血压；柿花(干粉末)：外用于痘疮破烂；柿叶(加工提取物)：止血。用于胃溃疡出血，肺结核出血，功能性子宫出血，痔漏出血，急性肾炎的血尿，血小板减少性紫癜，血友病等；柿幼叶：为茶剂。用于冠心病患者和老年人饮料；树皮(柿木皮)：用于下血，火烫伤；柿根：凉血，止血。用于血崩，血痢，痔疮。

#### 7221009

*Diospyros kaki* L. f. var. *costata* Andre.

植物名 四棱柿《贵州药录》

地方名 贵州：柿花。

功效 果实：清热，润肺，止渴。用于热渴，咳嗽，吐血，口疮；根：凉血，止血。用于血崩，血痢，痔疮；宿萼：降逆气，止呃逆，呕秽。用于气膈反胃；叶：用于咳嗽，肺气胀，各种内出血。

#### 7221010

*Diospyros kaki* Thunb. var. *sylvestris* Makino

植物名 野柿《中国植志》

文献名 黑柿《云南种录》，油柿《树分》。

地方名 山柿(浙江、四川)；江苏：柿子；浙江：山油柿，乌柿；湖北：小油柿；广西：柿饼树；四川：棣柿；云南：“麻嘿顿”(傣名)，毛柿花(景东)，(马槟榔)(双柏)。

功效 宿萼：降逆气；叶：降压；根：用于吐血，痔疮出血；果实：用于肺燥咳嗽。

#### 7221011

*Diospyros lotus* L.

植物名 君迁子《中国植志》

药材名 君迁子《本草拾遗》、《汇编》

文献名 博枣、小柿、楔枣《广志》，牛奶柿(崔豹《古今注》)，羊矢枣、羊矢子(《尔雅》郭璞注)，红蓝枣(齐民要术)，软枣《千金·食治》，丁香柿(《日用本草》)，狗柿子、羊枣《经济植物学》

地方名 黑枣(河北、河南、山东、江苏、四川、云南)，油柿(湖北、四川)；辽宁：牛奶柿，丁香柿；山东：黑软枣(莒县)；台湾：乌材柿；湖北：油柿子、软枣子(神农架)；广东：猴枣；四川：野柿(会理)，山柿子(峨眉山)，野柿

子；贵州：小柿陀；云南：小柿子(丽江、砚山、昆明)，小柿子树，枣柿花；其他：[酸枣]。

功效 果实：止渴，除痰，清热，消炎，健胃；叶、树皮：止血，止泻。用于外伤出血，久泻不止；柿漆：用于高血压病。

#### 7221012

*Diospyros morrisiana* Hance

植物名 罗浮柿《中国植志》

药材名 野柿花《云南药录》

文献名 黑浮柿《树分》，山埤柿《高植图鉴》

地方名 柿漆(华南)，山柿(台湾、广西、云南)；台湾：山红柿；广东：山埤树(惠阳)，牛古柿(汕头)，乌蛇木(新丰)，猴鬼仔、猴公(曲江)；广西：黑皮木(防城)；云南：小柿子(西畴)，野柿子(文山、屏边)，野柿果(屏边)，山柿子，山柿花，毛柿子。

功效 果、叶、茎皮：解毒，消炎，收敛；叶：用于食物中毒；树皮：用于腹泻，赤白痢疾；绿果：外用于水火烫伤；根：清热，健胃。

#### 7221013

*Diospyros oleifera* Cheng

植物名 油柿《中国植志》

药材名 洞柿《广西药录》

地方名 漆柿、绿柿、油绿柿、棣柿、青棣、乌棣(江苏、浙江)；浙江：方柿。

功效 根：用于吐血，痔疮出血；果实：用于肺燥咳嗽；宿萼：用于呃逆；柿霜：用于咽喉痛，咳嗽。

#### 7221014

*Diospyros rhombifolia* Hemsl.

植物名 老鸦柿《中国植志》

药材名 老鸦柿《汇编》

文献名 土柿《纲目拾遗》

地方名 江苏：山柿子，野山柿；浙江：牛奶柿(长兴、德清、临安)，拳李、大肚老姆、颠和尚、糯米饭刺、烂糖鸡脚柿、丁香柿(上虞、衢县、文成)，丁季李、野柿子(临安)，苦李，苦黎，月月有，枝柿，苦梨，黑柿子。

功效 根、枝：活血利肝。用于肝硬化，跌打损伤，急性黄疸型肝炎，肾结核。

#### 7221015

*Diospyros siderophylla* H. L. Li

植物名 山榄叶柿《中国植志》

文献名 枚辣柿《广西药录》

地方名 广西：凌扣、牙辣、米亚辣(龙州)，喃吟(德保)。

功效 枝、叶：外用于体癣。

### 7222 山榄科 Sapotaceae

#### 7222001

*Chrysophyllum lanceolatum* (Bl.) A. DC. var. *stellato-carpon* van Royen --- *Chrysophyllum roxburghii* auct. non G. Don

植物名 金叶树《中国植志》

药材名 大横纹(广东)、《汇编》

地方名 广东:横纹独须。

功效 根、叶:活血祛瘀,消肿止痛。用于跌打瘀肿,风湿关节痛,骨折脱臼。

备考 有的文献将学名误订为 *C. roxburghii* G. Don

#### 7222002

*Eberhardtia aurata* (Pierre ex Dubard) Lecte.

植物名 锈毛梭子果《中国植志》

药材名 血胶树《广西药录》

地方名 山枇杷(广西、云南);广东:油柯木;广西:嘿哼(龙州);云南:水母鸡果。

功效 叶:用于咳嗽,百日咳。

#### 7222003

*Madhuca pasquieri* (Dubard) Lam. --- *M. subquincuncialis* Lam. et Kerpel

植物名 紫荆木《中国植志》

药材名 紫荆木《广西药录》

文献名 山树榕《高植图鉴》

地方名 广东:马胡卡,海胡卡;广西:铁色,木花生;云南:滇紫荆木,滇木花生,出奶木。

功效 根:用于风湿性心脏病。

#### 7222004

*Manilkara zapota* (L.) van Royen

植物名 人心果《中国植志》

药材名 人心果《广西药录》

功效 树皮:清热凉血。用于急性胃肠炎,扁桃腺炎,咽喉炎;果:用于胃痛。

#### 7222005

*Planchonella obovata* (R. Br.) Pierre

植物名 山榄《中国植志》

功效 叶:用于腹痛。

#### 7222006

*Pouteria annamensis* (Pierre) Baehni

植物名 桃榄《中国植志》

地方名 海南:大核果树;广西:敏果。

功效 树皮:用于毒蛇咬伤。

#### 7222007

*Synsepalum dulcificum* Daniell

植物名 神秘果《中国植志》

药材名 神秘果《广西药园药录》

功效 果:矫味剂。

备考 将果肉在口内嚼碎后,再吃其他食物,能使酸味食物变甜而得名。

### 7223 紫金牛科 Myrsinaceae

#### 7223001

*Ardisia affinis* Hemsl.

植物名 细罗伞《中国植志》

药材名 细罗伞《广西药录》

文献名 波叶紫金牛《高植图鉴》

地方名 湖南:小凉伞,千年不出山;广西:小郎伞(来宾),铁罗伞(贵县),小狮子头,小紫金牛,狮子头,

矮脚凉伞(钟山)。

功效 全株:用于扁桃腺炎,牙痛,骨折,风湿痹痛,跌打损伤。

#### 7223002

*Ardisia alyxiaefolia* Tsiang ex C. Chen

植物名 少年红《中国植志》

药材名 少年红《广西药录》

文献名 念珠藤叶紫金牛《广西植志》,八里麻《中草药通讯》

地方名 广西:老来红,细凉伞。

功效 全株:平喘止咳。用于气管炎,哮喘,跌打损伤。

#### 7223003

*Ardisia arborescens* Wall.

植物名 小乔木紫金牛《中国植志》

文献名 地打果树《云南药录》,〔石狮子〕《云南植志》

功效 茎皮:退热。用于感冒。

备考 《中国植志》(1979)称:本种广西不产,《云南植志》(1977)引广西“石狮子”之名系误用。

#### 7223004

*Ardisia brevicaulis* Diels

植物名 九管血(江西)、《中国植志》

药材名 九管血《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 活血胎《高植图鉴》,矮茎珠砂根《汇编》,短茎紫金牛《广西植志》

地方名 〔山豆根〕(贵州、云南),小罗伞(广东、广西),团叶八爪金龙(四川、贵州),血党(浙江、江西、湖南、广西),血猴爪、真猴爪(安徽、江西),〔开喉箭〕(湖北、四川),乌肉鸡(江西、福建);浙江:矮茶(丽水、云和、龙泉),短脚铜盘(泰顺),大叶紫金牛(衢县);江西:矮凉伞子;福建:矮脚坐(清流);湖北:八爪龙根;湖南:三管血,三支血,九支血;广西:大郎伞(钟山、贺县),散血丹(昭平);四川:八爪金龙、八爪龙、猪总管(南川);贵州:矮陀陀,地柑子。

功效 根或全株:祛风清热,散瘀消肿。用于咽喉肿痛。痈疮肿毒,蛇咬伤,风湿关节疼痛,跌打损伤。

备考 根及根茎在少数地区作百两金(*A. crispa* (Thunb.) A. DC.)用。

#### 7223005

*Ardisia brunnescens* Walker

植物名 凹脉紫金牛《中国植志》

文献名 棕紫金牛《广西植志》

地方名 广东:山脉根,山脑根;广西:石狮子,石凉伞(大新)。

功效 根:用于喉痛,跌打损伤。

#### 7223006

*Ardisia caudata* Hemsl.

植物名 尾叶紫金牛《中国植志》

药材名 峨眉紫金牛《四川中药志》

地方名 广西:“点抵改房”、“两迳”(金秀瑶语);贵州:红豆子。

功效 根：用于胃痛，牙痛，咽喉肿痛，淋巴结肿大，风湿病，跌打骨折。

## 7223007

*Ardisia chinensis* Benth.

植物名 小紫金牛《中国植志》

药材名 小狮子《汇编》

文献名 小叶紫金牛《江西药录》，华紫金牛《浙南本草新编》。

地方名 广西：入骨风（北流），小郎伞（博白），小凉伞，矮紫金牛，矮凉伞，矮茶婆，矮山茶（桂林），狮子头，敷地郎伞，石狮子，产后草，衫纽根，黑果凉伞。

功效 全株：活血散瘀，解毒止血。用于肺结核，咯血，吐血，跌打损伤，痛经，黄疸，睾丸炎，尿路感染。

## 7223008

*Ardisia conspersa* Walker

植物名 散花紫金牛《中国植志》

药材名 散花紫金牛《广西药录》

地方名 广西：大罗伞（龙州），铁凉伞（三江）。

功效 根、叶：用于跌打损伤，拔弹头。

## 7223009

*Ardisia cornudentata* Mez

植物名 腺齿紫金牛《中国植志》

药材名 雨伞仔《台湾中药材图鉴》

文献名 角齿紫金牛《中草药》

功效 根：用于跌打损伤。

## 7223010

*Ardisia corymbifera* Mez

植物名 伞形紫金牛《中国植志》

药材名 紫背绿（云南、广西）、《汇编》

文献名 西南紫金牛《高植图鉴》，紫绿西南紫金牛《汇编》，伞序紫金牛《云南药录》，伞房紫金牛《广西植录》

地方名 贵州：大红消，八爪龙；云南：反背红（红河），紫绿，不待劳（河口），“毛高”（傣语）。

功效 根：清热解暑，消肿止痛。用于风湿关节炎，跌打损伤，咽喉肿痛，心胃气痛。

## 7223011

*Ardisia corymbifera* Mez var. *ruberifera* C. Chen

植物名 块根紫金牛《中国植志》

药材名 块根紫金牛《广西药录》

地方名 广西：小郎伞（柳江）。

功效 根：消肿止痛，活血散瘀，祛风除湿。用于咽喉肿痛，胃脘痛，月经不调，贫血，骨折，跌打损伤。

## 7223012

*Ardisia crenata* Sims

植物名 朱砂根《中国植志》

药材名 朱砂根《纲目》、《汇编》

文献名 平地木《花镜》，凤凰草、老鼠尾《生草药性备要》，叶底红、矮脚樟《纲目拾遗》，石膏子、凉伞遮金珠、[山豆根]、地杨梅、铁伞《名实图考》，散血丹、浪伞根、金鸡爪《岭南采药录》，圆齿紫金牛《汇编》

地方名 [土丹皮]、小凉伞（广西、广东），大罗伞（陕

西、福建、湖南、广东、云南），开喉箭（湖北、湖南），铁凉伞（江西、福建、安徽、湖南），铁雨伞（福建、台湾），八爪龙（陕西、湖北），八爪金龙（陕西、广西、云南），珍珠伞（江苏、浙江）；陕西：八爪箭（镇平），开口箭，百两金；上海：大种地竹；浙江：红铜盘（温州），高脚铜盘（临安、温州），青红草、硬脚金鸡（临安），桂苕油，雨伞头；金鸡凉伞；安徽：千年不忘林；江西：矮婆子，高茶（萍乡），凉伞子；福建：真珠凉伞，真珠铁凉伞，高脚凉伞子，[走马胎]（邵武），高脚坐，高脚铁凉伞，矮错子，矮脚坐；台湾：雨伞仔，万龙，万雨金；湖北：破血草；湖南：金锁匙，金竹连，三条根，三两金（凤凰），高茶风，红尘屑（会同），红元宵，梁山柏（东安），梁山根（通道），上山虎，鬼打伞、地状子（长沙），断钢桥（郴县），矮脚娘子（酃县），珍珠盖凉伞、雪里开花（衡阳），“千年暮”（瑶名）；广东：郎伞树、凤凰翔，凤凰驹（广州、从化），大凉伞（廉江、遂溪、电白、徐闻、海康、韶关），浪伞、大浪伞（新会），大叶矮婆树、浪伞盖珍珠（南雄），娘伞树（始兴、普宁、惠阳、陆丰），金牛根（东莞），落地蟾蜍（增城、东莞），九管血（仁化），龙山子；广西：大郎伞（昭平、博白），大鸟脚，小郎伞（邕宁、藤县、昭平、蒙山），小罗伞（南宁、桂林），小散血丹，小九节木，小百两金，小金鸡爪，青郎伞（资源），高脚郎伞（陆川），高脚罗伞，高郎伞，矮茶婆，[竹根七]，凉伞盖珍珠，倒水莲，铁马昭、[丹皮]（玉林）；四川：八爪金（西昌）；贵州：红八爪金龙，地红硝，山背两红；云南：高陀陀、地钥匙、铁芝撒（红河），豹子眼睛果。

功效 根：行血祛风，解毒消肿。用于上呼吸道感染，咽喉肿痛，扁桃体炎，白喉，支气管炎，风湿性关节炎，腰腿痛，跌打损伤，丹毒，淋巴结炎；鲜根或鲜叶：外用于外伤肿痛，骨折，毒蛇咬伤。

备考 据报导，根可用于避孕。

## 7223013

*Ardisia crenata* Sims f. *hortensis* (Migo) W. Z. Fang et K. Yao --- *A. crenata* Sims var. *bicolor* (Walker) C. Y. Wu et C. Chen --- *A. bicolor* Walker

植物名 红凉伞《中国植志》

药材名 红凉伞（江西、湖南）。

文献名 绿天红地、铁伞《名实图考》，朱砂根《汇编》，紫背硃砂根《品种论述》，两色紫金牛《广西植录》

地方名 铁凉伞、[开喉箭]（江西、湖北），八爪龙（湖北、广西），[山豆根]（贵州、云南），天青地红（湖南、云南）；江西：叶下红，叶底红、凉伞遮珍珠（德兴），真猴枣（吉水），乌脚鸡（丰城）；湖北：破血草，八爪龙根；湖南：红凉伞，“万年暮”（瑶名）；贵州：八爪金龙（贵阳），红八爪金龙；云南：高陀陀，地钥匙，木本反背红，反背红，大罗伞。

功效 根：清热解毒，散瘀止痛。用于上感，扁桃体炎，急性咽炎，白喉，丹毒，淋巴结炎，劳伤吐血，心胃气痛，风湿骨痛，跌打损伤。

## 7223014

*Ardisia crispa* (Thunb.) A. DC. --- *A. hortorum* Maxim. ex Regel --- *A. henryi* Hemsl.

植物名 百两金《中国植志》

药材名 百两金《图经》、《中药大辞典》

文献名 地杨梅、山豆根《名实图考》，八爪龙、八爪金龙《草木便方》，[开喉剑]、叶下藏珠《天宝本草》

地方名 [开喉箭]（安徽、江西、湖北、湖南、四川、贵州），珍珠伞（浙江、江西、广东），珍珠凉伞、铁骨散（江西、福建），大罗伞（福建、广西），八爪金（安徽、四川），矮茶（浙江、广东）；陕西：状元红（太白）；浙江：高脚地橘（天目山）；安徽：小凉伞；江西：野猴枣，野山豆根，铁凉伞，凉伞树（丰城），叶底白（婺源），逃山虎（赣州），土丹皮（吉安），矮何仔；福建：铁雨伞；台湾：矮脚铁娘；湖北：三百两，八爪龙根，白八爪，祖司箭（神农架）；湖南：三叶银、小罗伞（溆浦），三两金、[八里麻]（常德），八叶麻，天青地白，高参茶，凉伞盖珍珠，珍珠盖凉伞，野丹皮，金锁匙，[山豆根]；广西：破凉散、竹叶胎（富川），竹叶走马胎（钟山），高脚凉伞，蛇连天（全州）；四川：八爪筋，八爪根，白八爪金龙，高八爪金龙，高八爪，五爪龙（长寿），猪总管，树开喉箭、山开喉箭、万寿红（成都），豆根（万县）；贵州：土豆根。

功效 根及根茎：清热，祛痰，利湿。用于咽喉肿痛，肺病咳嗽，咯痰不畅，湿热黄疸，肾炎水肿，痢疾，白浊，风湿骨痛，牙痛，睾丸肿痛；叶：用于包损伤，涂诸疮，通淋。

#### 7223015

*Ardisia crispa* (Thunb.) A. DC. var. *amplifolia* Walker

植物名 大叶百两金《中国植志》

文献名 伞形紫金牛《贵州药录》

地方名 广西：红走马胎（罗城）；四川：八爪金，高八爪。

功效 根：用于跌打损伤，风湿病，喉症，并有健脑作用。

#### 7223016

*Ardisia crispa* (Thunb.) A. DC. var. *dielsii* (Levl.) Walker

植物名 细柄百两金《中国植志》

文献名 细柄小罗伞《广西药录》，细叶百两金《贵州药录》

地方名 广西：山洋伞（柳江），郎伞盖金珠（大瑶山），招板竹（资源），高脚凉伞；云南：[山豆根]（广南）。

功效 根：用于跌打损伤，风湿病，喉痛。

#### 7223017

*Ardisia densilepidotula* Merr.

植物名 密鳞紫金牛《中国植志》

地方名 海南：罗芒树（红毛山），黑度，仙人血树，山马皮（保亭、陵水），山龟，大叶紫金牛。

功效 根皮、树皮：用于疥癣。

#### 7223018

*Ardisia depressa* Clarke

植物名 圆果罗伞《中国植志》

文献名 拟罗伞树《高植图鉴》，平展紫金牛《云南药录》，平顶紫金牛《广西植录》

地方名 广西：癆病木（桂平）。

功效 叶：止血。用于鼻出血；根：用于肺结核。

#### 7223019

*Ardisia elegans* Andr.

植物名 郎伞木（海南）、《中国植志》

文献名 珍珠盖罗伞《广西药录》，美丽紫金牛《高植图鉴》

地方名 广东：高脚鸡眼，小罗伞；广西：花针木（龙州），硬骨伞（乐业），大罗伞（那坡、凌云），雀儿肾，胭脂木。

功效 叶：止痛。用于跌打损伤，内伤。

#### 7223020

*Ardisia ensifolia* Walker

植物名 剑叶紫金牛《中国植志》

药材名 剑叶紫金牛《广西药录》

地方名 广西：[开喉箭]（乐业、那坡）。

功效 根、叶：用于喉蛾，跌打损伤。

#### 7223021

*Ardisia faberi* Hemsl.

植物名 江南紫金牛《高植图鉴》

药材名 江南紫金牛《贵州药录》

文献名 檀罗伞《广西药录》，峨眉紫金牛《广西植录》，月月红《中国植志》

地方名 毛青杠（云南、贵州、四川）；广西：白毛金刚（隆林），毛矮茶苞（资源），毛虫草，[开喉箭]（凤山）；四川：[走马胎]，[红毛走马胎]，木步马胎，木步走马胎。

功效 全株：清热利湿，活血止血。用于产后心悸，癆咳血崩，风湿麻木，疮疡。

#### 7223022

*Ardisia filiformis* Walker

植物名 狭叶紫金牛《中国植志》

药材名 狭叶紫金牛《广西药录》

文献名 线状紫金牛《广西植录》

地方名 广西：喘咳木，石龙桐（上思），竹叶凉伞（天等）。

功效 全株：镇咳平喘。用于咳嗽，哮喘。

#### 7223023

*Ardisia fordii* Hemsl.

植物名 灰色紫金牛《中国植志》

药材名 灰色紫金牛《广西药录》

文献名 两广紫金牛《广西植录》

地方名 广西：细罗伞。

功效 全株：活血消肿。用于跌打损伤。

#### 7223024

*Ardisia gigantifolia* Stapf

植物名 走马胎《中国植志》

药材名 走马胎《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 大叶紫金牛《汇编》

地方名 山鼠、走马风、血枫（广西、广东）；广东：白马胎，白走马，走马藤，马胎；海南：山猪药（保亭）；广西：马兜菜（平南），大走马胎（忻城），大发药（陆川）；贵州：九丝马。

功效 根、叶或全株：祛风活血，消肿止痛；根：用于风湿关节炎，腰腿痛，跌打肿痛；叶：外用扭伤，癰疖。



肿痛,慢性溃疡。

#### 7223025

*Ardisia hanceana* Mez

植物名 大罗伞树《中国植志》

地方名 广西:凉伞盖珍珠(钟山)。

功效 根:用于跌打损伤,风湿痹痛,经闭。

#### 7223026

*Ardisia humilis* Vahl

植物名 矮紫金牛(海南)、《中国植志》

功效 树皮:用于头痛,便血。

#### 7223027

*Ardisia japonica* (Thunb.) Blume

植物名 矮地茶《汇编》

药材名 矮地茶《汇编》

文献名 平地木、叶下红《李氏草秘》,矮脚樟、叶底红《阳春涯经验方》,矮茶、短脚三郎《名实图考》,雪里珠、矮脚草、地茶《名实图考长编》,矮茶荷《草木便方》,矮茶风、地青杠《分类草药性》,矮茶子《天宝本草》,金牛草、茶果《树分》,小五托、小凉伞《中草药通讯》,〔紫金牛〕《中国植志》

地方名 矮脚樟茶(陕西、浙江、江西、福建),矮脚茶(陕西、湖北、上海、江西、湖南),千年矮(江苏、安徽、湖南),千年不大(江苏、浙江),老勿大(江苏、上海、浙江),老不大(浙江、安徽),地枇杷、凉伞盖珍珠(广东、湖南),叶下珍珠(江西、湖南),不出林(江苏、广西),四叶茶(江苏、湖南),五托香、火炭酸(广东、江苏);河北:〔石楠叶〕;上海:阴山红,映山红,野枇杷叶,地竹;浙江:矮爪,矮茶儿(瑞安),矮脚铜盘(温州、乐清、洞头),矮脚平盘、山红茶、地桔(永嘉),地桔子(临安),地桔根、地茶根(嵊县),山桔,千年勿大(瑞安、嵊县),青果芭;湖南:矮山茶(溆浦),矮茶盘(黔阳),矮子李,矮枇杷,矮脚凉伞,矮茶花,矮茶参,矮矮朵,珠子贵,地山茶,小青花,鸡鸭兰,铁菜盆,扑地虎,三两金,开口箭,千心包,一点珠,金牛茶,海参茶,山丹皮,凉伞遮珍珠,女儿红;河南:破血菊;江西:平瓜木(德兴),五爪金龙、百两金、矮苗子(泰和);广东:细叶过山龙(新丰),火屎炭(翁源);广西:艾山茶(钟山),三抬草(藤县),小羊伞(柳江),矮婆茶(富川),铺地凉伞(阳朔),矮郎伞(临桂),马台剪(金秀瑶族);四川:矮青桐,地青桐,山枇杷,矮青杠,毛青杠。

功效 全株:化痰止咳,利湿,活血。用于新久咳嗽,痰中带血,慢性支气管炎,湿热黄疸,跌扑损伤。

备考 “紫金牛”名见宋《图经》。《证类本草》“经外草类”转载有“福州紫金牛图”,显然不是 *Ardisia japonica*,而与朱砂根相似。过去很多植物学文献均以 *A. japonica* 为本草之紫金牛,实属欠妥。

#### 7223028

*Ardisia maclurei* Merr.

植物名 心叶紫金牛《中国植志》

药材名 红云草(广西)、《汇编》

地方名 广西:假地榕,红毛藤,红铺地毯(藤县),打不死(苍梧),〔不出林〕,铺地走马(蒙山)。

功效 全株:止血,清热解毒。用于吐血,便血,疮疖等。

#### 7223029

*Ardisia maculosa* Mez

植物名 珍珠伞《中国植志》

药材名 珍珠伞《云南中草药》

文献名 多斑紫金牛《中药大辞典》

地方名 广西:白八爪龙(凌云);云南:小罗伞、紫绿果根、紫背绿(保山),天青地红、天青地绿(临沧),山豆根(富宁)。

功效 全株:理气止痛,舒筋活络,清咽利喉。用于咽喉肿痛,胃痛,急性肠炎,风湿关节痛。外用于骨折,跌打损伤。

#### 7223030

*Ardisia mamillata* Hance

植物名 红毛紫金牛《汇编》

药材名 红毛走马胎《四川中药志》

文献名 红地毯《高植图鉴》,乳毛紫金牛《中药大辞典》,虎舌红《中国植志》,红毛山豆根《云南中草药》,毛叶紫金牛《福建药物志》

地方名 红毛毡(贵州、广西、云南、四川、浙江),老虎脚、老虎舌(广东、广西),红毡毯(广东、广西、云南),毛金刚(广西、四川),红毛针(广西、云南);福建:虎舌痕(闽南);广东:毛茸,毛虫药,蛇草,百骨哽,山猪耳,大毛虫,蟾蜍皮,豺狗舌,红毡;广西:毛罗伞(南丹、柳州、陆川),铺地毡(桂平、昭平、北流),红毡草(容县、岑溪),红毛过江,红蝴蝶(那坡),毛凉伞,毛郎伞(罗城、临桂),毛地红,毛虎舌(陆川),铜郎伞(钟山),白铺地毡(藤县),白毛毡,一口血(田林),虎舌利、老虎利(梧州),大虫利、铺地红、地明珠(乐业);四川:红毛青杠,红毛金刚,毛青杠,走马胎(成都、西昌);贵州:红胆(榕江);云南:虎舌红牛、矮朵朵、红八爪爪、红花矮陀陀(红河),肉八枣、肉八爪(保山、文山),山豆根(砚山、西畴)。

功效 全株及根:散瘀止血,清热利湿。用于风湿关节痛,跌打损伤,肺结核咯血,月经过多,痛经,肝炎,痢疾,小儿疳积。

#### 7223031

*Ardisia nervosa* Walker --- *A. aquifolioides* W. Z. Fang et K. Yao

植物名 多脉紫金牛(海南)、《中国植志》

功效 根皮:用于腹痛,便血。

#### 7223032

*Ardisia primulaefolia* Gardn. et Champ.

植物名 莲座紫金牛(海南)、《中国植志》

药材名 落地金牛《广西药录》

文献名 落地紫金牛、报春花叶紫金牛《广西药图药录》,莲座叶紫金牛《高植图鉴》

地方名 广西:贴地空(苍梧),咳嗽草(桂平),短节罗伞(博白),铺地罗伞(金秀),红地毯,白毛过江,毛脚皮,脚皮,赫地涩,打铁树;海南:毛虫药,毛虫药公,老虎脚;云南:老虎毛虫药。

**功效** 全株:补血,消肿。用于瘀伤咳嗽,风湿病,跌打损伤,疥疮。

## 7223033

*Ardisia punctata* Lindl

**植物名** 沿海紫金牛《高植图鉴》

**药材名** 血党《广西本草选编》

**文献名** 山血丹《中国植志》,斑叶紫金牛《汇编》,斑叶朱砂根《广西植志》,腺点紫金牛《广西药录》,斑点紫金牛《浙江药植志》

**地方名** 小罗伞(广东、云南),小凉伞、散血丹、珍珠盖凉伞、石狮子(广东、广西),百两金(湖南、广东);浙江:山豆根(临海),铁雨伞;江西:郎伞;福建:(山豆根)(闽东、罗源),头痛子(闽东),真珠凉伞,馒头子,雨伞仔;湖南:金锁匙,凉伞盖金珠(黎明),「八里麻」、高脚凉伞(衡山);广东:凉伞树,金牛子,金牛根(东莞),细罗伞树,开喉箭,斑鸡爪、山马胎(潮阳),金鸡爪(南海),鹅览树(阳江),脚笼草(高州),刀仔苗(英德),马胎(五华);广西:活血胎,珍珠盖伞(富川),假血党(容县),大巴戟(桂平),铁郎伞(平南),散血草(昭平),美女怀胎(融安),白叶胎(临桂),螃蟹根(北海),山狮子(岑溪);云南:铁凉伞、(土丹皮)、珍珠伞(文山),矮芥。

**功效** 根、叶:散瘀消肿,祛风止痛,舒筋活络;用于跌打损伤;根:用于咽喉肿痛,口腔炎,月经不调,经闭,风湿性关节炎,瘫痪。

## 7223034

*Ardisia pusilla* A. DC.

**植物名** 九节龙《中国植志》

**药材名** 九节龙《广西药录》

**文献名** 小紫金牛《种分》,地茶、猴接骨《高植图鉴》,毛茎紫金牛《浙南本草新编》,细小金牛《广西药录》

**地方名** 狮子头(福建、广西);浙江:野痴草(乐清),五莲草(青田),五叶头(云和);江西:矮茶子;福建:千年不大,矮地茶(福州);台湾:轮叶紫金牛;广东:蛇药;广西:灯托草(平南),五兄弟(苍梧、贺县),五托莲(桂平),小马胎、(不出林);贵州:斩龙剑,九节茶,毛青杠。

**功效** 全株:清热解毒,消肿止痛。用于黄疸,痛经,跌打损伤。

## 7223035

*Ardisia quinqueгона* Blume

**植物名** 罗伞树(海南)、《中国植志》

**药材名** 罗伞树《汇编》

**地方名** 高脚罗伞(广东、广西);广东:小罗伞、高脚罗伞树(阳春),鸡眼青(中山),鸡眼树,火屎炭树,火泡树,火炭树,黄檀树;海南:“提枯杨”、“晒梗”(黎语),山桃叶(儋县);广西:圈鸡尾(博白),小青山(昭平),筷子根(岑宁),高脚凉伞(融安),五脚紫金牛。

**功效** 根、叶:清咽消肿,散血止痛。用于咽喉肿痛,风湿关节痛,跌打损伤,疔肿。

## 7223036

*Ardisia triflora* Hemsl.

**植物名** 五花紫金牛《中国植志》

**药材名** 五花紫金牛《广西药录》

**地方名** 广西:光叶不出林(上林),石狮子。

**功效** 全株:用于肺炎,气管炎,肺结核。

## 7223037

*Ardisia velutina* Pitard

**植物名** 紫脉紫金牛《中国植志》

**药材名** 紫脉紫金牛《广西药录》

**功效** 全株:用于风湿骨痛。

## 7223038

*Ardisia villosa* Roxb.

**植物名** 雪下红《中国植志》

**药材名** 雪下红《花镜》、《汇编》

**文献名** 珊瑚珠、珊瑚树《花境》,短脚三郎《名实图考》,卷毛紫金牛《高植图鉴》,毛茎紫金牛《四川中药志》

**地方名** 毛青杠(四川、贵州);上海:小青;福建:九节龙,地茶,猴接骨,蝴蝶红,虎舌痕;广东:细茶(东莞),脚龙子(湛江);广西:矮脚罗伞、小罗伞(陆川、博白),毛罗伞(博白),石狮子(容县),铁羊伞(柳江),大罗伞树,土丹皮(北流),小郎伞,斑点朱砂根(上思);四川:矮茶风,矮茶荷,矮青杠,地青杠,矮茶;贵州:红刺毛藤;云南:医药师。

**功效** 全株:活血散瘀,消肿止痛。用于跌打肿痛,痢疾,痲疹,咳血。

## 7223039

*Ardisia virens* Kurz

**植物名** 扭子果《中国植志》

**药材名** 豹子眼睛果《云南中草药》

**文献名** 绿叶紫金牛《高植图鉴》,圆齿紫金牛《海南植志》

**地方名** 大罗伞(广西、云南);台湾:黑尾紫金牛;云南:(山豆根)(文山、曲靖),扣子果、扭子果(屏边),厚皮树,米汤果(陇川),“愉尼尼麻”(元江哈尼语)。

**功效** 根:清热解毒,活血散瘀。用于感冒咳嗽,扁桃腺炎,咽喉炎,肺结核咯血,颈淋巴结核,牙龈肿痛,小儿疳积,消化不良,胃痛,小儿口腔炎,风湿关节炎,月经不调,跌打肿痛,骨折,外伤出血。

## 7223040

*Ardisia yunnanensis* Mez

**植物名** 滇紫金牛《中国植志》

**药材名** 滇紫金牛《贵州药录》

**文献名** 云南紫金牛《高植图鉴》

**功效** 根、叶:清热解毒,舒筋活络。用于毒蛇咬伤,咽喉肿痛。

## 7223041

*Embelia laeta* (L.) Mez

**植物名** 酸藤子《中国植志》

**药材名** 酸果藤《汇编》

**文献名** 白背酸藤《陆川本草》

**地方名** 入地龙、酸藤果(广东、广西);福建:信筒子;广东:酸甜树、酸藤树(惠阳),酸咪子,酸冬子,入山虎,林酸藤,酸藤头,酸藤叶(从化),酸味藤,酸醋叶(肇

庆), 酸针酸(化州), 咸酸根, 咸酸强, 咸酸藤, 咸酸鸡(潮安), 甜酸藤(雷州半岛), 大叶酸味根, 乌鸦草(连山), 发藤果, 山盐酸鸡(潮阳), 独脚花(花县); 海南: 甜酸叶; 广西: 通天箭、炮子藤、酸藤木(陆川), 鸡母果(宁明), 鸡母苗, 鸡母酸(邕宁), 海底龙(贵县), 挖不尽(平南、藤县), 掘不尽, [五味子](武鸣), 酸藤根(博白), 酸味草(梧州), 酸强子, 透地龙(南宁), 酸醋木(蒙山), 酸醋藤、酸味美、心酸花, 大酸醋(北海)。

功效 根、叶: 祛瘀止痛, 消炎止泻。用于痢疾, 肠炎, 消化不良, 咽喉肿痛, 跌打损伤; 叶: 外用于跌打损伤, 皮肤瘙痒; 果: 强壮, 补血。用于闭经, 贫血, 胃酸缺乏。

## 7223042

*Embelia longifolia* (Benth.) Hemsl.

植物名 长叶酸藤子《中国植志》

文献名 长叶酸藤果《高植图鉴》, 大叶酸藤、马桂花《汇编》

地方名 广东: 酸盘子(惠阳); 广西: 大鸡母酸(隆林), 吊罗果; 云南: “没归息”(陇川、德宏景颇语), “木桂拾”(潞西景颇语)。

功效 全株: 生肌, 利尿消肿, 散瘀止痛。用于肾炎水肿, 肠炎腹泻, 跌打瘀肿等。

## 7223043

*Embelia oblongifolia* Hemsl.

植物名 多脉酸藤子《中国植志》

文献名 矩叶酸藤果《高植图鉴》, 长圆叶酸藤子《中药大辞典》, 长圆叶酸藤果《云南中草药》, 多脉信筒子《汇编》

地方名 广西: 断骨藤, 白当归(凤山), 生胶藤(防城); 云南: “麻桂花”(西双版纳傣名), 马桂花、木桂花(思茅), 粗藤果、纽子果、日头果(屏边); 西藏: 酸藤果, “齐党嘎”(藏名)。

功效 果实: 驱虫, 祛风湿, 止泻。用于驱蛔虫, 绦虫。

## 7223044

*Embelia parviflora* Wall.

植物名 小花酸藤子《汇编》

药材名 筛箕(广西、广东)

文献名 当归藤《中国植志》, 小花信筒子《品种论述》

地方名 广东: 大力王; 广西: 千里香(龙州), [上当归](永福、昭平、上林), 保妇强(博白), 走马胎(柳江), 石箕藤(藤县), 小箭赶风(忻城), 米筛藤(桂平), 土丹桂(德保), 藤当归、簸箕墙、筛箕藤; 云南: 虎尾草(思茅), 纽子树(屏边), “他枯”(河口瑶语)。

功效 根、老藤: 补血调经, 强腰膝。用于贫血, 闭经, 月经不调, 白带, 腰腿痛。

备考 老藤还用子不孕症。广西有“谁人懂得筛箕强, 不愁不生养”之谚语。

## 7223045

*Embelia pauciflora* Diels --- *E. pauciflora* var. *blinii* Walker

植物名 疏花酸藤子《中国植志》

药材名 过山消《汇编》

文献名 狭叶少花酸藤子《中药大辞典》, 少花当归藤《广西药园药录》, 少花信筒子《贵州药录》

地方名 贵州: 刹喉箭, 开喉箭(清溪)。

功效 根: 祛痰, 解毒, 行血消肿。用于扁桃体炎, 发痘, 红丝疔。

## 7223046

*Embelia ribes* Burm. f.

植物名 白花酸藤果《中国植志》

药材名 咸酸强《生草药性备要》、《中药大辞典》

文献名 丧回《生草药性备要》, 入地龙、酸味强《岭南采药录》, 白花酸果藤《汇编》, 白花酸藤子《广州植志》。

地方名 广东: 早禾藤、养公斑藤、牛尾乌(惠阳), 牛脾蕊, 拟茶藤子; 海南: “牛尾藤”(临高), 羊公板仔, 小种楠藤; 广西: 血皮藤, 血皮英(忻城), 脉沙、红背酸藤(桂平), 生党(百色), [鸡血藤](南宁), 和凉心(贺县), 香公藤(博白), 早和米(平南); 云南: 枪子果、水淋果(思茅), 蓑衣果(保山), 酸藤, 黑头果(河口), 碎米果、香胶藤(蒙自), “马桂郎”(傣语); 西藏: 酸藤果, “齐党嘎”(藏名)。

功效 根: 清热除湿, 止血消炎。用于急性胃炎, 痢疾, 腹泻, 刀枪伤, 外伤出血, 蛇咬伤; 叶(水煎): 外用于外科洗药。

## 7223047

*Embelia ribes* Burm. f. var. *pachyphylla* Chun ex C. Y. Wu et C. Chen

植物名 厚叶白花酸藤果《中国植志》

文献名 厚叶白花酸藤子(拉汉英种称)

地方名 广西: 上海风藤(武鸣)。

功效 根: 用于跌打损伤。

## 7223048

*Embelia rudis* Hand. -Mazz.

植物名 网脉酸藤子《中国植志》

药材名 白木浆果《云南药录》

文献名 网脉叶酸藤果《高植图鉴》, 大样酸藤子《广西药录》

地方名 广西: 筛箕强(苍梧), 了哥桐(玉林), 假倒刺(金秀); 贵州: 蚂蝗藤; 云南: 老鸦果、[山胡椒](华宁), 红杨梅(江川)。

功效 根、茎、果实: 清热解毒, 滋阴补肾, 补血, 活血。用于脱肛, 月经不调, 痛经, 宫寒不孕, 风湿病。外用于疮癣。

## 7223049

*Embelia scandens* (Lour.) Mez

植物名 瘤皮孔酸藤子《中国植志》

文献名 瘤皮酸藤子《云南植志》

地方名 广西: 鸟肺叶(大新), 红鸡羽, 假刺藤。

功效 根、叶: 有小毒。舒筋活络, 敛肺止咳; 根: 用于风湿痹痛, 肺结核, 小儿疳积。外用子灭头虱。

## 7223050

*Embelia subcoriacea* (C. B. Clarke) Mez

植物名 大叶酸藤子《中国植志》

药材名 大叶酸藤子《广西药录》

文献名 近革叶酸藤果《高植图鉴》, 厚叶酸藤子《广西植录》

地方名 广西: 大叶十八症(大新), 大母鸡酸(隆林); 云南: “阿林稀”(贡山怒族语)。

功效 果: 用于驱蛔虫; 茎皮: 用于消化不良, 产后腹痛。

#### 7223051

*Embelia vestita* Roxb.

植物名 密齿酸藤子《中国植志》

药材名 打虫果(云南)

地方名 云南: 米汤果(龙陵), 白腊树(杞麓)。

功效 果: 用于驱蛔虫, 绦虫。

#### 7223052

*Maesa argentea* (Wall.) A. DC.

植物名 银叶杜茎山《中国植志》

文献名 银花杜茎山《云南药录》

地方名 云南: 观音树。

功效 全株: 解毒。外用于小儿皮肤病。

#### 7223053

*Maesa balansae* Mez

植物名 顶花杜茎山《中国植志》

药材名 顶花杜茎山《广西药录》

文献名 中越杜茎山《广西植录》

功效 根: 用于吐血; 叶: 用于小儿消化不良。

#### 7223054

*Maesa hupehensis* Rehd.

植物名 湖北杜茎山《中国植志》

地方名 广西: 白点秤(天等), 点秤木(凌云); 四川: 山胡椒(峨眉山)。

功效 根: 祛风除湿, 消肿。用于咽喉炎。

#### 7223055

*Maesa indica* (Roxb.) A. DC.

植物名 包疮叶《中国植志》

药材名 两面青《云南药录》

文献名 千年树《中药大辞典》

地方名 云南: “甲满”、“怕卡”(西双版纳傣语), 小姑娘茶(思茅), 洋辣子, 大白饭果(河口)。

功效 全株: 清热解毒。用于肝炎, 腹泻, 胃痛, 麻疹, 高血压。

#### 7223056

*Maesa insignis* Chun

植物名 毛穗杜茎山《中国植志》

药材名 毛穗杜茎山《贵州药录》

功效 根茎: 祛风除湿, 消肿止痛。用于风湿肿痛, 浮肿, 跌打损伤。

#### 7223057

*Maesa japonica* (Thunb.) Moritz. ex Zoll.

植物名 杜茎山《中国植志》

药材名 杜茎山《图经》、《汇编》

文献名 土恒山《纲目》

地方名 白花茶(云南、海南); 浙江: 苦重香(龙泉), 水莲柴(平阳), 水光钟; 江西: 山茄子, 金沙根(黎川); 台湾: 山桂花; 湖南: 踏天桥, 水麻叶, 多木带、铁树叶、登带纱、董胃被(通道), 高茶(双峰); 广东: 白茅茶(番禺); 广西: 白胡椒(资源), 野胡椒, 鱼芒藤(全川), 鱼子花(南宁), 大兰草(玉林), 豆叶, 女儿茶, 鲫鱼胆, 胡椒树(龙胜)

功效 根、叶: 祛风利尿, 止血, 消肿; 根: 用于头痛, 腰痛, 水肿, 腹水, 白带崩漏; 叶: 外用于创伤出血。

#### 7223058

*Maesa montana* A. DC.

植物名 金珠柳《中国植志》

药材名 观音茶(四川、云南)

文献名 山地杜茎山《高植图鉴》, 山杜茎山《广西植录》

地方名 广西: 大叶良箭(未宾), 白胡椒(资源), 红斑鸡米(邕宁); 四川: 野兰, 白子木, [普洱茶]; 云南: “阿哦吐都西”(楚雄彝语), “拍那儿莫拍”(玉溪彝语), 洋辣子, 青叶树(峨山)。

功效 根: 消炎, 祛风除湿, 活血化瘀。用于风湿麻木, 筋骨疼痛, 痢疾。

#### 7223059

*Maesa parvifolia* A. DC.

植物名 小叶杜茎山《中国植志》

地方名 海南: 小种茶(澄迈)。

功效 叶: 海南用叶制成一种美味的茶。

#### 7223060

*Maesa perlarius* (Lour.) Merr. --- *M. sinensis* A. DC.

植物名 鲫鱼胆《中国植志》

药材名 鲫鱼胆(云南、广西)

文献名 杜茎山《树分》, 中华杜茎山《广西药录》

地方名 海南: 草盆; 广西: 狗肚皮(玉林), 嫩肉木(梧州), 嫩肉药、黄茶(平南), 牛屎木(柳江), 丁茶(宁明), 观音茶(罗城), 樟心粮(融安), 软木(百色), 木肺叶(那坡), “梅打”(壮语), 空心花; 四川: 老婆茶(峨眉山); 云南: 冷饭果(屏边)。

功效 全株: 接骨消肿, 生肌祛腐。用于跌打刀伤, 疔疮。

#### 7223061

*Maesa ramentacea* (Roxb.) A. DC.

植物名 秤杆树《中国植志》

药材名 秤杆树《广西药录》

地方名 广西: 接骨钻(鹿寨); 云南: 冷饭果。

功效 根、叶: 用于骨折, 跌打损伤, 风湿痹痛; 茎皮: 外用于牛皮癣。

#### 7223062

*Myrsine africana* L.

植物名 铁仔《中国植志》

药材名 铁仔《汇编》

文献名 簸箕子《名实图考》, [女贞子]《植分学报》, 小火炮草《中草药通讯》, 碎米棵《高植图鉴》

地方名 小铁仔(四川、贵州、云南), 碎米果(四川、云南); 陕西: 野茶; 广西: 明立花; 四川: 小爆蛇蚤、小火炮根、碎米柴、水渣子(夹江), 小密花树, 小密树、火爆柴(南川), 火炮叶(南充), 抱格枣, 爆格蚤(峨眉山), 别拉子; 贵州: 矮零子、豆瓣柴(贵阳), 铁打杵(安龙), 大红袍(平塘), 炒米柴; 云南: 牙痛草(昆明), 碎米枝(红河、新平), 扫把棵、铁扫把(中甸、蒙自), 火碳果树、炸炸棵、铁离干(红河), 万年青(绥江), 连年果(丽江); 其他: 矮林子, 露拉子。

功效 根、全株或叶: 清热利湿, 收敛止血, 消炎镇痛。用于肠炎, 痢疾, 血崩, 便血, 肺结核咯血, 牙痛, 脱肛, 子宫脱垂; 叶: 外用用于烧、烫伤, 刀伤。

## 7223063

*Myrsine semiserrata* Wall.

植物名 针齿铁仔《中国植志》

文献名 齿叶铁仔《高植图鉴》, 刺叶铁仔《神农架药录》

地方名 湖北: 千年矮(神农架)。

功效 全株或根: 行气活血; 果实: 用于驱绦虫。

## 7223064

*Rapanea kwangsiensis* Walker

植物名 广西密花树《中国植志》

地方名 广西: 土厚朴。

功效 根: 用于跌打损伤。

## 7223065

*Rapanea yunnanensis* Mez --- *Rapanea nerifolia* (Sieb. et Zucc.) Mez --- *R. nerifolia* var. *yunnanensis* Walker

植物名 密花树《中国植志》

文献名 云南密花树《高植图鉴》

地方名 台湾: 大明橘; 海南: 打铁树; 广西: 鹅骨梢; 云南: 狗骨头(普洱), “哈雷”(西双版纳傣语)。

功效 叶、根皮: 清热解毒, 凉血, 祛湿。用于乳腺炎初起。外用用于湿疹, 疮疖, 跌打损伤; 根: 用于肾结石。

## 7224 安息香科 Styracaceae

## 7224001

*Alniphyllum fortunei* (Hemsl.) Makino

植物名 赤杨叶《中国植志》

文献名 拟赤杨《树分》, 福氏赤杨《中国植物图鉴》

地方名 广东: 高山望(阳春), 冬瓜木(英德), 白花盏(广州), 白苍木(封川); 海南: 红皮岭麻, 鹿食(澄迈); 广西: 水冬瓜; 云南: 豆渣树(屏边), “依果白”(瑶语)。

功效 枝、叶: 外用用于水肿; 根: 祛风除湿, 利尿消肿。用于风湿关节痛, 水肿。

## 7224002

*Meliiodendron xylocarpum* Hand. -Mazz. --- *M. wangianum* Hu *M. jifungense* Hu

植物名 陀螺果《中国植志》

药材名 川鸭头梨《峨眉药植研究》

文献名 鸭头梨《高植图鉴》

地方名 广西: 水冬瓜(大苗山); 四川: 木瓜红; 云南: 冬瓜木;

功效 枝、叶: 用于滑肠, 小儿头疮

## 7224003

*Pterostyrax psilophyllus* Diels ex Perk.

植物名 白辛树《中国植志》

药材名 白辛树《救荒本草》

文献名 鄂西野茉莉《树分》, 裂叶白辛树《广西植录》

功效 叶: 焯熟食, 救荒用。

## 7224004

*Styrax argentifolia* Li

植物名 银叶安息香《中国植志》

文献名 银叶野茉莉《广西药录》

地方名 广西: 青天白口(桂平)。

功效 叶: 止痛, 消肿。用于跌打刀伤, 疥疮

## 7224005

*Styrax benzoin* Dryand

植物名 安息香树《酉阳杂俎》、《中药大辞典》

药材名 安息香《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 辟邪树《酉阳杂俎》, 拙贝罗香[梵名]《纲目》, 安悉香、千金木脂、便牵牛、安息香脂、命门录事、辟邪搗香《新纲》, 水安息[伊朗产品]、早安息、金银香[伊朗、苏门答腊产品]、[白胶香][印度产品]《药材学》, 苏门答腊安息香[商品名]《中药志》

功效 树脂: 开窍, 辟秽, 行气血。用于卒中暴厥, 心腹疼痛, 产后血晕, 小儿惊痫, 风痹腰痛。

备考 商品全系进口货。

## 7224006

*Styrax calvescens* Perk.

植物名 灰叶安息香《中国植志》

文献名 毛垂珠花《中国经植志》, 变壳安息香《广西植录》, 灰叶野茉莉《高植图鉴》

功效 叶: 润肺止咳。

## 7224007

*Styrax chinensis* Hu et S. Y. Liang

植物名 中华安息香《中国植志》

文献名 大果安息香《中国植志》

地方名 广西: 米哥蚊, 山柿; 云南: 大籽安息香。

功效 树脂: 作安息香入药。

## 7224008

*Styrax confusa* Hemsl.

植物名 赛山梅(浙江)、《中国植志》

文献名 狗奶柴《广西植录》, 白花龙《高植图鉴》, 白龙条《华北树木志》

地方名 湖南: 水辣标(蓝山县瑶名); 广东: 油榨果, 猛骨子, 乌蚊子; 广西: 白扣子。

功效 果: 清热解毒, 消痈散结; 全株: 止泻, 止痒。

## 7224009

*Styrax dasyanthus* Perk. --- *S. argyi* Levl.

植物名 垂珠花《中国植志》

药材名 垂珠花《汇编》

文献名 白克马叶《贵州民间药物》, 江苏安息香《广西植录》

地方名 浙江: 小叶硬田螺; 湖南: 白花树。

功效 叶: 止咳润肺。用于咳嗽, 肺燥。

#### 7224010

*Styrax faberi* Perk.

植物名 白花龙《中国植志》

药材名 白花龙《广西药录》

文献名 白花龙《广州植志》, 扫酒树籽《植分学报》, 垂珠花《贵州药录》

地方名 江西: 梦童子, 扣子柴, 野梦芋子, 响铃子; 广东: 白龙条, 棉子树, 扫酒树; 广西: 假蔓京子(北流), 红头葱木(平南), 扣子树(忻城), 打扑子(梧州), 铜零木, 铜锤子(来宾), 衣扣果(蒙山); 贵州: 山白果, 山客蚂叶。

功效 全株: 止泻, 止痒; 根: 用于胃脘痛; 叶: 止血, 生肌, 消肿。用于外伤出血, 风湿痹痛, 跌打损伤; 果实: 有小毒。用于感冒发热。

#### 7224011

*Styrax japonicus* Sieb. et Zucc.

植物名 野茉莉《中国植志》

药材名 野茉莉《救荒本草》、《汇编》

文献名 粉豆花《名实图考》, 茉莉苞、野花梔《植物名汇》。

地方名 木香柴(四川、贵州); 陕西: 山麻杆、灰荆条籽(丹凤), 野拐枣(洋县), 香拐枣(平利), 脆果子树(镇巴), 木倍子(镇坪); 浙江: 侯风藤, 嫩蒲柴(临安); 福建: 鸡骨盏子, 鸡骨头子, 龙兰树子, 扣子, 焦子山龙眼子, 牛尾西子, 耳环锤子; 湖北: 狗梔子、木梔子、狗爪梔子(利川); 广东: 耳完桃(翁源); 四川: 黑茶花, [椿树]; 贵州: 野白果树; 其他: 山白果。

功效 全株: 外用于风湿痹痛; 花: 清火。用于喉痛, 牙痛。

#### 7224012

*Styrax obassius* Sieb. et Zucc.

植物名 玉铃花《广群芳谱》、《中国植志》

药材名 玉铃花《汇编》

地方名 山东: 老开皮, 山榛子(昆嵛山、文登), 薄皮树, 白云木; 浙江: 分松子(临安)。

功效 果实: 驱虫。用于蛲虫病。

#### 7224013

*Styrax odoratissima* Champ.

植物名 芬芳安息香《中国植志》

文献名 郁香野茉莉《高植图鉴》, 郁香安息香《拉汉英种称》, 郁芳安息香《植分学报》

地方名 广西: 白木(永福); 贵州: 白花龙, 白客蚂叶。

功效 叶: 润肺止咳, 清热解毒。用于肺热咳嗽, 癆咳, 疔疮。

#### 7224014

*Styrax roseus* Dunn --- *S. bracteolata* Guill.

植物名 粉花安息香《中国植志》

文献名 粉花野茉莉《峨眉药植资源》

地方名 四川: 见桃花(峨眉山)。

功效 种子: 用于赤白痢疾, 腹痛下血。

#### 7224015

*Styrax suberifolia* Hook. et Arn. --- *S. suberifolia* Hook. et Arn. var. *caloneurus* Perk.

植物名 栓叶安息香《中国植志》

药材名 红皮《贵州草药》

文献名 滇红皮《云南植志》

地方名 红皮树(四川、贵州、广西、浙江); 台湾: 赤血仔, 叶下血, 赤仔尾; 广东: 丙柯子, 山龙眼, 赤橘子, 铁甲子, 稠树, 狐狸公; 广西: 灰包木, 赤皮(永福); 四川: 粘高树。

功效 叶、根: 祛风除湿, 理气止痛。用于胃气痛, 风湿关节痛。

#### 7224016

*Styrax tonkinensis* (Pierre) Craib ex Hartw. --- *S. macrothyrsus* Perk. --- *S. hypoglaucus* Perk. --- *S. subniveus* Merr. et Chun

植物名 越南安息香《中国植志》

药材名 安息香《唐本草》、《药典》

文献名 滇桂野茉莉《树分》, 白背安息香《中国植物图鉴》, 暹罗安息香、暹罗安息香树《中药志》, 泰国安息香、泰国安息香树《药材学》, 滇桂安息香《广西植录》, 白叶安息香《广西本草选编》, 白花树《药典》, 越南安息香树《高植图鉴》

地方名 白花木(广东、广西); 广东: 白花榔树(茂名); 广西: 白脉安息香, 白背娘(龙州), 白花榔、白花浪(博白), 青山安息香, 粉背安息香(那坡); 云南: 牛油树、姊永(屏边), 八翻龙(河口), 小马桑树。

功效 树脂: 开窍醒神, 行气, 活血, 止痛。用于中风痰厥, 气郁暴厥, 中恶昏迷, 心腹疼痛, 产后血晕, 小儿惊风。

### 7225 山矾科 Symplocaceae

#### 7225001

*Symplocos botryantha* Franch.

植物名 总状山矾《中国植志》

药材名 总状山矾《贵州药录》

功效 花、叶: 清热解毒, 理气止痛。用于黄疸, 无名肿毒。

#### 7225002

*Symplocos chinensis* (Lour.) Druce

植物名 华山矾《中国植志》

药材名 华山矾《广西中药志》

文献名 野李花、山末利、钉地黄、贡檀兜、降痰王《名实图考》, 豆腐果《中草药彩图》, 土常山《广西中药志》, 华灰木《广西兽药》

地方名 狗屎木、地黄木、[白花丹](广东、广西); 山东: 锦织木, 黑狗弹; 浙江: 木地牛(温州、瑞安), 千年蓬(金华), 土山矾(黄岩), 狗骨柴头、乌子柴头(温州、瑞安、泰顺), 蛙蟆吐饭(乐清), 砒霜柴(平阳), 流涎柴(泰

顺),白柴头(洞头);江西:檬子树(安福),檬子柴,羊子屎(德兴),狗屎槎(泰和),毛壳子树,毛柴子(丰城),毛格子(宜黄),闷门子(大余),猪婆柴(新建),渣子树(德兴、婺源),狗樟树,野常山(吉安);福建:狗屎米(仙游),灰木;湖南:杠檀根、杠檀兜、杠檀树、卜地王、铜暂板(长沙),画眉叶、小米叶(江华),碎米叶(湘潭),金叶葱、狗扣子(蓝嘉),九连齐黄,狗屎拉子柴(衡山);广东:闷子,狗喷烟(阳春),狗蚊子,狗闷子,狗屎子,江黄子(广州);广西:牛特木,山牛特木,牛屎木,牛曲线,雷公针,膨药,七针,上黄柴,米碎木,米碎柴,米碎花木,大米仔花(南宁),米茹菜,水泡木,糯米树,止血树,猪糠木(昭平),〔常山〕(北流、容县、忻城、来宾、临桂),连夜串,贼老矢,狗蛇子,个吓舍,顿地黄,“美捐善”(罗城仫佬语);贵州:小药木(遵义);云南:野李子。

**功效** 叶:有小毒。清热利湿,止血生肌。用于痢疾,泄泻,创伤出血,烫火伤,溃疡;根:有小毒。清热利湿,化痰截疟。用于感冒发热,痰火,疟疾,筋骨疼痛,疮疖;果(研米):用于烂疮。

#### 7225003

*Symplocos cochinchinensis* (Lour.) S. Moore

**植物名** 越南山矾《中国植志》

**药材名** 火灰树《广西药录》

**文献名** 火样灰树、大叶灰木《高植图鉴》

**地方名** 广西:山枇杷(天等)。

**功效** 根:化痰止咳。用于咳嗽。

#### 7225004

*Symplocos congesta* Benth. -- *S. cuspidata* Brand

**植物名** 密花山矾《中国植志》

**功效** 根:用于跌打损伤。

#### 7225005

*Symplocos dolichotricha* Merr.

**植物名** 长毛山矾《中国植志》

**药材名** 长毛山矾《广西药录》

**地方名** 广西:土白术(昭平)。

**功效** 根:用于脾虚泄泻。外用于目赤肿痛。

#### 7225006

*Symplocos glauca* (Thunb.) Koidz.

**植物名** 羊舌树《中国植志》

**药材名** 羊舌树《广西药录》

**文献名** 粉叶山矾《海南植志》

**地方名** 海南:花眼;广西:羊屎木;贵州:狗舌头叶。

**功效** 树皮:散寒,清热。用于伤风头痛,热邪口燥,感冒身热。

#### 7225007

*Symplocos lancifolia* Sieb. et Zucc. -- *S. fulvipes* (Clarke) Brand

**植物名** 光叶山矾《中国植志》

**药材名** 光叶山矾《广西药录》

**文献名** 毛叶山矾《广州植志》,剑叶灰木《高植图鉴》

**地方名** 广东:刀灰树(惠阳);海南:乌脚看,〔甜茶〕;广西:佳不落根(大瑶山),假垒木(宜山),滑叶常

山;四川:泡花子,黄牛奶树。

**功效** 全株:和肝健脾,止血生肌。用于外伤出血,吐血,咯血,瘕积,眼结膜炎。

#### 7225008

*Symplocos laurina* (Retz.) Wall. --- *S. cochinchinensis* (Lour.) S. Moore ssp. *laurina* (Retz.) Noot.

**植物名** 黄牛奶树《中国植志》

**药材名** 泡花子《四川中药志》

**文献名** 月桂山矾《广西植录》,苦山矾《海南植志》,尖叶灰木《峨眉药植研究》

**地方名** 花香木(广东、海南、广西);广西:散风木(大瑶山),〔四季青〕;四川:水冬瓜(峨眉山);贵州:狗舌头叶(雷公山)。

**功效** 树皮:散寒,清热。用于伤风头昏,热邪口燥,感冒身热。

#### 7225009

*Symplocos paniculata* (Thunb.) Miq.

**植物名** 白檀《中国植志》

**药材名** 白檀《汇编》

**文献名** 白檀山矾《东北木本图志》,山指甲《中国植物图鉴》

**地方名** 定了王、碎米子树(广西、湖南),山矾、灰木(广西、四川);辽宁:狗淋台,茶叶花;陕西:檀花青(丹凤),野丝棉树(平利),白花茶(蓝田),牛筋叶(太白山);甘肃:黄檀树(天水);山东:懒汉筋(蒙山),山杏(苍山),山葫芦,山葫芦子(威海),肘茶(泰山),拗柴,柳柴(青岛);浙江:砒霜子,蛤蟆涎,小叶末散花(天目山);江西:小叶金丝条,萝卜子渣;福建:乌子树;河南:染叶,播瓜叶,高蓝菜;湖北:黑果子树,檀树(鹤峰),水塘瓜、鸡骨头(神农架);湖南:碎米子,狗杞子,黑树子;广西:假鸦胆子(桂平),地黄木;四川:黄檀子木;云南:小黑果,杷杷叶,洋李子,野莽面根,大撵药,地胡椒,“埋糯米”(西双版纳傣语);其他:黑子叶。

**功效** 全株:消炎,软坚,理气。用于乳腺炎,淋巴腺炎,疝气,肠痈,胃癌,疮疖;花:用于高热不语,腹部冷痛,恶心呕吐,腹泻,烧伤。

#### 7225010

*Symplocos phyllocalyx* Clarke --- *S. ernesti* Dunn

**植物名** 叶萼山矾《中国植志》

**药材名** 大树黄《西昌中草药》

**文献名** 茶条果《高植图鉴》,叶萼茶条果《云南种录》

**功效** 根皮:清热解毒,消炎止痛。用于感冒头痛,腰腿痛,咽喉痛,无名肿毒;叶:清热解毒。用于火眼,疮癣。

#### 7225011

*Symplocos poilanei* Guill.

**植物名** 丛花山矾《中国植志》

**功效** 叶:用于癣疥。

**备考** 《高植图鉴》称:木材能抗白蚁。

#### 7225012

*Symplocos racemosa* Roxb.

植物名 珠子树《中国植志》  
 药材名 染饭花《云南药录》  
 文献名 总序山矾《拉汉种称》，总序灰木《广西药录》

地方名 海南：乌口树，乌口木，山麻柴；广西：黄牛叶、七白木（藤县），老鼠梢（北海）；云南：墨胡树

功效 枝、叶：用于月经不调，腿热症，胃炎，风湿痹痛，跌打损伤，外伤出血；树皮：可代金鸡纳。

## 7225013

*Symplocos setchuensis* Brand. *S. sinuata* Brand. *S. lucida* (Thunb.) Sieb. et Zucc.

植物名 四川山矾《中国植志》  
 药材名 四川山矾《汇编》  
 文献名 波缘山矾、波叶灰木、山杉《高植图鉴》  
 地方名 浙江：黄夹柴（临安）；广西：老鼠矢，佳崩（大瑶山）；贵州：灰灰树。

功效 根、茎叶：行水，定喘。用于水肿胀满，咳嗽，咳逆。

## 7225014

*Symplocos stellaris* Brand

植物名 老鼠矢《中国植志》  
 药材名 老鼠矢《广西药录》  
 文献名 星状山矾《广西植录》，毛灰树、千舌树《高植图鉴》  
 地方名 福建：〔老鼠刺〕；广西：佳崩（金秀）；贵州：小药木。

功效 根：用于跌打损伤；叶：止血。用于内出血

## 7225015

*Symplocos sumuntia* Buch. -- Ham. ex D. Don *S. caudata* Wall. ex A. DC.

植物名 山矾《中国植志》  
 药材名 山矾《纲目》、《汇编》  
 文献名 〔芸香〕、春桂《纲目》，木肤花《名实图考》，尾叶山矾《汇编》

地方名 山桂花（湖南、广西）；浙江：甜柴叶（临安），乌面毛（龙泉），黄树丛；江西：十里香（婺源），小元柴（宜黄），田螺柴（吉水），甜叶树，山矾花；福建：土白芷（闽东、福安），棕碱叶、黄仔叶柴（福安），黄仔叶椒（罗源）；湖南：黑厚皮柴，甜菜，山茶树，山蒙花，山香花，二月桂，细叶香花，野桂花（衡山）；广东：细叶味。

功效 根：清湿热，祛风，凉血。用于黄疸，痢疾，风火头痛，腰背关节疼痛，血崩；叶：清热，收敛。用于肺结核咯血，便血，久痢，急性扁桃体炎，急性中耳炎，烂弦风眼，鹅口疮；花：理气化痰。用于咳嗽，胸闷。

## 7225016

*Symplocos viridissima* Brand

植物名 绿枝山矾《中国植志》  
 文献名 披针叶山矾《贵州药录》  
 地方名 贵州：小药木（赤水）。

功效 叶：止血。

## 7228 马钱科 Loganiaceae

## 7228001

*Buddleja albiflora* Hemsl. -- *B. hemsleyana* Koehne

植物名 巴东醉鱼草《高植图鉴》  
 药材名 巴东醉鱼草《神农架药录》  
 地方名 湖北：阿花、小牛尾巴花（神农架）。

功效 花蕾：止咳化痰。用于眼痛

## 7228002

*Buddleja asiatica* Lour. -- *B. salicina* Lam. *B. discolor* Rehd.

植物名 狭叶醉鱼草《汇编》  
 药材名 白背风《汇编》  
 文献名 驳骨醉鱼草《广西植录》，七里香《云南药志》，白花醉鱼草《浙江药植志》，白鱼尾果《闽东本草》  
 地方名 驳骨丹（浙江、福建、海南、四川）；上海：紫阿花；浙江：白烟水鸟（文成）；福建：野桃，杨波叶（光泽），蒲姜痲，白波越子，白鱼鲷（福州、福安、宁德、周宁、浦城、光泽），白波仔越（政和），白花兔子草、白鲍叶、白鱼号、白鱼贺、白鹅号（福安），白鱼尾（福安、宁德、福鼎、周宁），溪桃（罗源）；台湾：白埔姜，杨波，海洋波；河南：水杨柳；湖北：糖壳叶，黄合叶；广东：独叶埔姜（潮阳），独叶埔羌（潮汕），白花洋泡（惠阳），白背枫、白背桃、白背子荆（阳春），河抱；广西：白鸡公尾（阳朔），白背叶、水黄花（凌云、乐业），白背木（凌云），白埔羌，野饭花菜（凤山），尖尾风（来宾、梧州），土范花（忻城），长白花（柳江），“过者卖”（壮名），水红桃，驴尾草，奇鱼树；云南：十里香（临沧），糯米香、千里香、染饭香（思茅）。

功效 全株：有小毒。祛风利湿，行气活血。用于妇女产后面风痹，胃寒作痛，风湿关节痛，跌打损伤，骨折。外用于皮肤湿痒，阴囊湿疹，无名肿毒；果：用于小儿疳积。

## 7228003

*Buddleia caryopteridifolia* W. W. Smith

植物名 菰叶醉鱼草《云南植志》  
 药材名 菰叶醉鱼草《鉴别手册》  
 地方名 四川：〔蒙花〕，黄花醉鱼草。

功效 花苞：润肝明目，散风去翳。用于急性结膜炎，弱视，夜盲；根：用于肾虚眼雾，见风流泪，白带。

## 7228004

*Buddleja davidii* Franch. -- *B. davidii* Franch. var. *magnifica* (Wils.) Rehd. et Wils. -- *B. davidii* Franch. var. *superba* (Veitch) Rehd. et Wils. -- *B. davidii* Franch. var. *veitchiana* (Veitch) Rehd.

植物名 大叶醉鱼草《中国植志》  
 药材名 大叶醉鱼草《汇编》  
 文献名 兴山醉鱼草《树分》，大醉鱼草《中国经植志》，大蒙花《陕西中草药》，绛花醉鱼草、穆坪醉鱼草《中草药大辞典》，紫花醉鱼草《贵州药录》，白背叶醉鱼草《新华本草纲要》

地方名 醉鱼草（四川、贵州）；陕西：蒙花树（旬阳），



蜂糖罐(商南),白脊树(石泉);甘肃:〔密蒙花〕、灰条子(文县);上海:大花醉鱼草;湖北:牛尾巴蒿(神农架);湖南:白毛醉鱼草,密花草;广西:羊花明;四川:紫花醉鱼草(西昌),〔蒙花〕,钓鱼杆(峨眉山);贵州:酒曲花,酒药花(贵阳),麻柳。

功效 根皮及枝叶:有毒。祛风散寒,活血止痛。用于风湿关节疼痛,跌打损伤,骨折。外用于脚癣。

7228005 见 7228004

7228006 见 7228004

7228007

*Buddleja forrestii* Diels -- *B. henryi* Rehd. et Wils.

植物名 滇川醉鱼草《中国植志》

文献名 亨利醉鱼草《贵州药录》,瑞丽醉鱼草《云南植志》,苍山醉鱼草《云南种录》

功效 枝叶、根皮:解毒,杀虫,止痒。用于蜂窝组织炎,疮疖,跌打损伤,脚癣,妇女阴痒。

7228008

*Buddleja lindleyana* Fort. -- *B. lindleyana* var. *sinuato-dentata* Hemsl.

植物名 醉鱼草《中国植志》

药材名 醉鱼草《纲目》、《汇编》

文献名 鱼尾草、醉鱼儿草《履巇岩本草》,榧木《普济方》,闹鱼花《纲目》,茶条树《名实图考》,痒见消《名实图考长编》,七里香《天宝本草》,五薪蒿《树分》,阳包树《中国药植志》,鲤鱼花草《中国上农药志》,雄尾花《南方毒植》,波叶醉鱼草《高植图鉴》

地方名 毒鱼草(浙江、安徽、福建、广西),野江子(浙江、江西),野刚子(浙江、安徽),羊尾巴(湖南、广西),波折越(浙江、福建),光子(江苏、广西);上海:紫阳花;江苏:药杆子,木本黄精(南京);浙江:鱼尾子(临安),鱼花草(建德、温州),鱼不灵(遂昌),鱼尾巴草、疎薄允、野巴豆、萝卜子头、没落子、牛木应(天目山),禾木霜、李木树子、六麻子(嵊县),甜茶(建德),〔雷公藤〕,萝卜花、萝卜树子,〔血见愁〕(乐清、泰顺),红胡水乌(文成),接骨草(洞头),药鳗老醋、老阳花;安徽:鱼迷子,鱼鳞子,洋泡子(太和);江西:鱼门子(德兴),狗头鹰(吉水),鱼尾雪,洋婆兜,鱼尾花,野刚子(德兴);福建:红鱼波、红鱼皂(闽东),鱼泡草(龙溪、将乐、邵武、古田、闽南),鱼藤草,洋波,鱼背子花,洋皮(周宁、光泽、永定),红鱼鲛(福鼎、寿宁、福安、古田),鱼白了花(明溪、三明),洋波叶,鱼目草,雷麻藤、萝卜叶、毒鱼藤(同安、沙县、连城、厦门、周宁),鱼紫子棋、鱼紫花(宁化),鱼紫子,鱼擦花,黄蒲花,牛目到,老崖草,鱼泡丸(南平);湖南:花玉成,四棱麻(汝桂),羊饱药,羊白婆,金鸡尾,洞庭草,白皮消,铁帚尾(古丈),羊脑髓,羊脑髓柴、吊扬尘、羊尾泡(衡山),羊脑蔓、洋花蜜、洋闹眉、洋泡子树、黄刨木、红羊棚(衡阳),凉棚叶(新宁、麻阳),野鸡尾(凤凰),豆腐树、洋包心、猪娘掉尾(黔阳);广东:铁线尾、吊伤药(惠阳),四方麻;广西:驴尾草,防痛树,鸡公尾,百宝花,四方茎,苦叶菜、猪子尾(灵山),公鸡尾(兴安),〔四季青〕,白泡花(钟山),勒婆(金秀);水泡木,梅楼草;四川:土蒙花,驳骨丹,钓鱼杆(峨眉

山),藏山香;其他:鱼眼子花,大婆子,透鱼草,有子花,药鱼子

功效 野根全草、叶、花:祛风除湿,止咳化痰,散瘀,杀虫。用于支气管哮喘,哮喘,风湿性关节炎,跌打损伤。外用于包皮炎,烧烫伤。灭蛆,止痒。

7228009

*Buddleja macrostachya* Wall. ex Benth. -- *B. hookeri* Marq.

植物名 大序醉鱼草《中国植志》

文献名 长德醉鱼草《贵州药录》,锡金醉鱼草《西藏植志》

地方名 云南:白叶子(元江),羊巴巴叶(景东)。

功效 全草:祛风散寒,消积止痛。

7228010

*Buddleja madagascariensis* Lam.

植物名 夜果醉鱼草《中国植志》

文献名 马达加斯加醉鱼草《广西药录》

地方名 广西:假蒙花,假黄花(藤县)。

功效 根、叶:用于黄疸,刀伤,疥疮;全株:用于哮喘,气管炎。

7228011

*Buddleja officinalis* Maxim.

植物名 密蒙花《高植图鉴》

药材名 密蒙花《纲目》、《药典》

文献名 小锦花《雷公炮炙论》,蜜蒙花《开宝本草》,羊耳朵、羊耳朵叶,广中蜜蒙花、虫见死草《滇南本草》,蒙花《本草求真》,老蒙花、水锦花、寒不凋《新纲》,〔莽草〕《植物名汇》,药用醉鱼草《科裁》,疙瘩皮树花《中药材手册》,黄花醉鱼草《四川中药志》,密蒙树《药材学》

地方名 羊春条(陕西、广西、四川),染饭花(广西、云南) 羊耳朵尖、羊耳花、米汤花(四川、云南),蒙花珠(西北、四川);陕西:蒙花树(石泉);湖北:绵糊条子;广西:黄饭花(南宁、邕宁、融安),黄花树(柳江、那坡),骨黄木(田林),番兰木(那坡),迷蒙花,绵条子,假黄花(藤县);四川:鸡骨头花,土蒙花,蜂糖花,醉鱼草(西昌);贵州:断肠草;云南:糯米花(楚雄),七里香、九里香、羊咪咪花(红河),羊叶子,酒药花。

功效 花蕾及花序:清热养肝,明目退翳。用于目赤肿痛,多泪羞明,眼生翳膜,肝虚目暗,视物昏花;叶:用于疔疮,疮久不收口,跌打创伤。

7228012

*Fagraea cedanica* Thunb.

植物名 灰莉《中国植志》

地方名 海南:鲤鱼胆(儋县),灰刺木(万宁);云南:箭黄果、小黄果(麻栗坡)。

功效 叶:外用于伤口溃烂。

7228013

*Gleditsia angustifolia* Wall. -- *G. glabra* Wall. ex D. Don

植物名 狭叶蓬菜葛《中国植志》

药材名 小血光藤《四川中药志》

文献名 光叶蓬菜葛《云南植志》

地方名 四川:迎风藤(峨眉山);贵州:黑老头(根),黑骨藤,大种黑骨藤。

功效 根:利湿祛风,活络健脾。用于劳伤,风湿骨痛;藤茎:用于腰膝疼痛,小便频数,跌损劳伤,耳聋。

#### 7228014

*Gardneria lanceolata* Rehd. et Wils.

植物名 柳叶蓬菜葛《中国植志》

文献名 披针叶蓬菜葛《高植图鉴》,狭叶蓬菜葛《峨眉药植研究》

地方名 四川:血光藤(峨眉山),窄叶血光藤,小血光藤;贵州:黑老头,黑斤藤。

功效 茎:止汗,用于腰腿痛;根:利湿祛风,活络健脾。用于劳伤,风湿骨痛。

#### 7228015

*Gardneria multiflora* Makino --- *Pseudogardneria multiflora* (Makino) Pamp.

植物名 蓬菜葛《中国植志》

药材名 蓬菜葛《汇编》

文献名 多花蓬菜葛《云南植志》

地方名 浙江:红络石藤、大叶石塔藤(建德),九里火(临安);江西:清香藤(会昌);湖南:黄河江;广西:落地拱(大苗山),放光藤(天峨);四川:小血光藤。

功效 根、种子:祛风活血。用于关节炎,创伤出血;茎:用于黄疸型肝炎。

#### 7228016

*Gardneria ovata* Wall.

植物名 卵叶蓬菜葛《中国植志》

文献名 蓬菜葛《中草药》

地方名 广西:放光藤。

功效 根、藤:用于肝炎。

#### 7228017

*Gelsemium elegans* (Gardn. et Champ.) Benth.

植物名 胡蔓藤《南方草木状》、《汇编》

药材名 断肠草《梦溪笔谈》、《汇编》

文献名 胡蔓草《南方草木状》,除辛《蜀本草》,吻蕻《梦溪笔谈》,〔黄藤〕、烂肠草《纲目》,朝阳草《生草药性备要》,虎狼草、大茶药、胡满菰《岭南采药录》,胡满羌《和汉药名汇》,大茶藤《中国药植图鉴》,大鸡苦蔓、羊带归、梭柁《南方毒植》

地方名 大茶根、大茶叶藤(华南、广西),钩吻(广东、贵州、云南),甘尾、梭葛、梭葛草(福建、广东),黄猛菜、猪人参、黄花苦蔓(福建、广西),大炮叶(广东、贵州);福建:山砒霜、大王茶(闽西),黄藤根、苦蔓藤;广东:甘晚树(陆丰),大茶(阳春),荷斑药、苦晚公、大柴药、还江债(阳江、阳春),大叶老、大王根(潮阳),断肠藤、橄榄枯(潮州);广西:断肠草根,黄花苦晚藤,石晚藤,大苦根,大茶叶(北海),发冷藤(凌云),〔藤黄〕(大瑶山);云南:狗闹花(思茅),黄花断肠草(河口),闹狗花(西双版纳),大断肠草(鲁甸);其他:甘阮,甘阮根,〔闹羊花〕,沙葛。

功效 根或根皮、全草:有大毒,攻毒拔毒,散瘀止

痛,杀虫止痒。外用于皮肤湿疹,体癣,脚癣,跌打损伤,骨折,痔疮,疔疮,麻风,除四害,杀蛔虫,灭子。杀。

#### 7228018

*Mitrasacme pygmaea* R.Br. --- *M. nudicaulis* Reinw. --- *M. chinensis* Griseb.

植物名 水田白《高植图鉴》

地方名 广西:大罐草(三江)。

功效 全草:用于小儿疳积,小儿惊风。

#### 7228019

*Strychnos angustiflora* Benth.

植物名 牛眼马钱《高植图鉴》

文献名 狭花马钱《广西药录》,牛眼珠《海南植志》,牛眼球、车前树、高眼睛《高植图鉴》,牛目周、狭叶马钱《汇编》

地方名 福建:〔马钱子〕,土马钱;广西:牛眼睛珠子(博白),白字麻,把子牛。

功效 种子:有大毒。通经络,消肿,止痛。用于风湿关节疼痛,手足麻木,半身不遂。外用于痈疽肿毒,跌打损伤。

#### 7228020

*Strychnos cathayensis* Merr. --- *S. henryi* Merr. & Yamamoto ex Yamamoto

植物名 华马钱《中国植志》

文献名 二脉马钱《海南植志》,牛目椒《云南植志》

地方名 马钱(广东、广西);海南:“登欧梅罗”(苗名);广西:白雪藤、百节藤(平南),九牛入程(苍梧),扣带锁红(龙州)。

功效 全株:解热,止血,排脓,消脓。用于头痛,心气痛,刀伤,疟疾。

#### 7228020a

*Strychnos ignatii* Bergius --- *S. hainanensis* Merr. et Chun --- *S. balansae* Hill

植物名 吕宋果《中国植志》

药材名 吕宋果《纲目拾遗》、《中药志》

文献名 加挖弄、宝豆《本草补》,云海马钱《中药志》,苦果《汇编》,吕宋豆《中药大辞典》,洋苦果《中药通报》,伊拉第豆《种分讲义》,海南马钱《海南植志》,海南马钱子《中草药学》

地方名 广西:解热豆;云南:马金长子;其他:吕宋子,大苦果,苦果子。

功效 种子:有大毒。解毒杀虫。用于中风昏倒,腹痛泄痢,小儿蛔虫,蛇虫咬伤。

7228021 见 7228023a

#### 7228022

*Strychnos nitida* G. Don --- *S. chinensis* Hu --- *S. kerrii* Hill --- *S. wallichiana* var. *intermedia* Hill

植物名 毛柱马钱《中国植志》

药材名 滇南马钱《汇编》

文献名 车里马钱《云南种录》

地方名 云南:云南马钱、马钱子、〔番木鳖〕(红河),车里马钱子。

功效 种子:剧毒。兴奋健胃,消肿毒,凉血。用

于四肢麻木,瘫痪,食欲不振,痞块,痢疮肿毒,咽喉肿痛。

#### 7228023

*Strychnos aux-vomica* L.

植物名 马钱子《中药志》

药材名 马钱子《纲目》、《药典》

文献名 番木鳖、火失刻把都《纲目》,苦实把豆儿《飞鸿集》,苦实《本草原始》,马前、牛眼《本草求原》,马丁子《和汉药名汇》,番鳖、番木鳖子、马前子、毒胡桃子《新纲》,番木鳖树《药材学》,印度马钱《中草药》,大方八《中药材手册》

地方名 天津:翻白子;河北:番瓜子(张家口);广西:牛艮,马钱树;西藏:“郭齐拉”(藏名);其他:伏水,马千子,马蹄子,优牛子。

功效 种子:有大毒。通络止痛,散结消肿。用于风湿顽痹,麻木瘫痪,跌扑损伤,痢疽肿痛,小儿麻痹后遗症,类风湿性关节炎。

#### 7228023a

*Strychnos ovata* Hill --- *S. confertiflora* Merr. et Chun

植物名 密花马钱《中国植志》

文献名 密花马钱子《中草药学》

功效 种子、果皮、茎、叶:均含番木鳖碱和马钱子碱。有大毒。通络止痛,散结消肿。

#### 7228024

*Strychnos umbellata* (Lour.) Merr.

植物名 伞花马钱《高植图鉴》

药材名 伞花马钱《汇编》

文献名 伞花马钱子《种称补编》

地方名 海南:牛目椒,牛目周。

功效 根:有大毒。祛风湿。用于风湿痹痛,寒湿肾水肿。

#### 7228025

*Strychnos wallichiana* Steud. ex DC. --- *S. gauthierana*

*Pierre* ex Dop --- *S. pierriana* Hill

植物名 长籽马钱《中国植志》

药材名 长籽马钱《中药志》

文献名 皮氏马钱《药学报》,马钱子、番木鳖、云南马钱《药典》,皮氏马钱子《中草药学》,瓦氏马钱《中药通报》,尾叶马钱《云南植志》,马钱藤《中药大辞典》

地方名 云南:麻钱子,阔狗药(西畴、麻栗坡)。

功效 种子:有大毒。通络,止痛,散结消肿。用于风湿顽痹,麻木瘫痪,跌扑损伤,痢疽肿痛,小儿麻痹后遗症,类风湿性关节炎。

#### 7228026 见 7228020a

### 7229 木樨科 Oleaceae

#### 7229001

*Chionanthus retusus* Lindl. et Paxt. --- *C. retusus*

Lindl. var. *serrulatus* (Hayata) Koidz.

植物名 流苏树《中国植志》

药材名 炭栗树《名实图考》、《云南种录》

文献名 雪柳《名实图考》,流苏木《云南种录》,乌金

子《高植图鉴》

地方名 山东:牛筋子,茶叶树;云南:萝卜丝花,碎米花。

功效 果实:强壮,兴奋,益脑,健胃,活血脉。用于手足麻木;根:用于疮疡。

#### 7229002

*Forsythia giralddiana* Lingelsh.

植物名 秦连翘《中国植志》

药材名 连翘《陕西》

文献名 秦岭连翘《拉汉英种称》

功效 果实:清热解毒。

#### 7229003

*Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl

植物名 连翘《高植图鉴》

药材名 连翘《本草衍义》、《药典》

文献名 泽州连翘《图经》,寿丹《植物名汇》,空壳《中药志》,绶带《高植图鉴》,青翘、老翘《药典》

地方名 黄花条(河北、陕西),连翘壳(安徽、四川);河北:黄链条花;山西:老连翘,落连翘,黄花瓣,竹根;山东:刮拉鞭(蒙山),黄花鞭(五莲),落翘,括拉鞭子,黄条花,黄绶带;浙江:青连翘,黄连翘;安徽:连翘心;河南:黄花杆,黄花树,黄寿丹,黄绶丹;湖北:元翘衣,元翘,元召(神农架);湖南:连翘子,耳草;四川:连心翘,连召,连招;其他:和合老翘,扫壳,黄翘,硃连翘。

功效 果实:清热解毒,散结消肿。用于痢疽,瘰癧,乳痈,丹毒,风热感冒,温病初起,温热入营,高热烦渴,神昏发斑,热淋尿闭。

备考 《本经》之连翘为金丝桃科植物 *Hypericum ascyron* L., 非本品。

#### 7229004

*Forsythia viridissima* Lindl.

植物名 金钟花《高植图鉴》

药材名 金钟花《浙江药植志》

文献名 单叶连翘《中国植物图鉴》,细叶连翘《高植图鉴》,狭叶连翘《山东树木志》

地方名 连翘(浙江、福建),水金花、连茶、(水杨柳)、[杨柳叶](华东),土连翘(浙江、江西);江苏:迎春条(南京);上海:黄金条;浙江:黄金花(临安),迎春柳;江西:(黄藤)(铜鼓);云南:小花连翘,金梅花、金铃花(丽江)。

功效 根、叶、果壳:清热解毒,祛湿泻火。用于流行性感,颈淋巴结结核,目赤肿痛,筋骨酸痛,肠痢,丹毒,疥疮。

#### 7229005

*Forsythia viridissima* Lindl. var. *koreana* Rehd.

植物名 金钟连翘《东北木本图志》

药材名 朝鲜连翘(拟)

地方名 山东:金钟花(青岛)。

功效 果实:清热解毒。

#### 7229006

*Fraxinus bungeana* DC.

植物名 小叶桤《北京植志》

药材名 秦皮《本经》、《药材学》

文献名 枹《淮南子》, 岑皮、石檀《别录》, 枹皮、枹木、白枹木、秦木、盆桂、樊槐、苦树《纲目》, 白蜡树《植物名汇》, 苦里木、细辛木、枹槐《新纲》, 小叶白蜡树《树分》, 苦枹《经济植物学》

地方名 河北: 小苦枹; 湖南: 称星树。

功效 树皮: 清热燥湿, 止痢, 明目。用于细菌性痢疾, 肠炎, 白带, 慢性气管炎, 目赤肿痛, 迎风流泪, 牛皮癣。

7229007 见 7229024a

7229008

*Fraxinus chinensis* Roxb. --- *F. chinensis* Roxb. var. *rotundata* Lingelsh.

植物名 白蜡树《河北习见树木图说》

药材名 秦皮(四川、云南、贵州), 虫白蜡《本草会编》、《药典》

文献名 枹木《本草拾遗》, 虫蜡《本草求真》, 木蜡《新纲》, 枹《高植图鉴》, 蜡树皮、苦榴皮《简明中医辞典》, 四川秦皮《药学报》

地方名 蜡条(山东、江苏), 白蜡条(陕西、山东), 青榔木(河北、四川), 白荆树(安徽、河南、四川); 山东: 山白蜡(蒙山、泰山、费县); 上海: 南京元宝树; 浙江: 子蹲柴(云和); 河南: 青榔树; 四川: 蜡膏; 贵州: 白蜡花; 云南: 见水青, 水白蜡(永善), 鸡楸树, 见水蓝(思茅、红河)。

功效 枝皮或干皮: 清热燥湿, 收涩, 明目。用于热痢, 泄泻, 赤白带下, 目赤肿痛, 目生翳膜; 叶: 用于烫伤; 果实: 用于头痛; 花: 止咳平喘; 虫白蜡: 作赋形剂。

备考 本品为产生虫白蜡的主要树种。

7229009 见 7229023a

7229010 见 7229023a

7229011

*Fraxinus ferruginea* Lingelsh.

植物名 锈毛枹《中国植志》

药材名 跳皮树《思茅本草》

文献名 锈毛白枪杆《中药大辞典》, 锈毛白蜡树《云南种录》

功效 树皮: 收敛, 消炎。用于顽固性腹泻, 痢疾, 蛔虫病。

7229012

*Fraxinus floribunda* Wall. ex Roxb. --- *F. ulophylla* Wall. ex DC. --- *Ornus floribunda* G. Don

植物名 多花枹《中国植志》

文献名 多花白蜡树《云南植志》

功效 树皮: 醇提液荧光作用极强(目测++ , 紫外+++), 为秦皮之优质资源。

7229012a

*Fraxinus insularis* Hemsl. --- *F. retusa* Champ. ex Benth.

植物名 苦枹木《中国植志》

药材名 苦枹木《广西药录》

功效 枝、叶: 外用于风湿痛; 树皮: 醇提液荧光极

强, 为秦皮之优质资源。

7229013

*Fraxinus lingelsheimii* Rehd. --- *F. yunnanensis* Lingelsh. --- *F. velutina* Lingelsh.

植物名 云南枹《中国植志》

文献名 云南白蜡树《云南植志》

功效 树皮: 醇提液荧光极强(目测++ , 紫外+++), 为秦皮之优质资源。

7229014

*Fraxinus malacophylla* Hemsl.

植物名 白枪杆《高植图鉴》

药材名 白枪杆《科学的民间药草》

文献名 白枪杆皮(李《药植》)

地方名 云南: 大树皮(文山、通海、华宁), 大皮消、毡帽老(红河), 铁杆路(玉溪), 踏皮树(曲靖), 大皮药, 毛叶子树, 狗骨头树, 对节生(西畴), 刷露皮、根根药(文山)。

功效 根、树皮: 清热, 截疟, 利尿, 通便。用于膀胱炎, 膀胱结石, 小便不利, 便秘, 疟疾。

7229015

*Fraxinus mandshurica* Rupr.

植物名 水曲柳《中国植志》

药材名 水曲柳皮《药学报》

文献名 东北枹《华北树木志》, 水曲召木、渠柳《科栽》

地方名 曲柳、(秦皮)(东北)。

功效 树皮: 清热燥湿, 收涩, 明目。质量较正品秦皮为次。

备考 《植物研究》(1985)将本品重新组合为 *Fraxinus nigra* Marsh. ssp. *mandshurica* (Rupr.) S. S. Sun

7229016 见 7229024a

7229017

*Fraxinus ornus* L.

植物名 花枹《中国植志》

文献名 花白蜡树《华北树木志》

功效 树皮: 醇提取物荧光极强(目测++ , 紫外+++ , 荧光计15.3), 为秦皮之优质资源。

备考 本品分布于欧洲南部, 亚洲西部, 北京有引种栽培。

7229018

*Fraxinus paxiana* Lingelsh.

植物名 秦岭枹《中国植志》

药材名 秦皮(陕西)、《中药大辞典》

文献名 秦岭白蜡树《高植图鉴》, 秦岭秦皮《药学报》

功效 树皮: 清热燥湿, 收涩, 明目。

7229019

*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.

植物名 美国红枹《中国植志》

文献名 美洲绿枹《药学报》, 绿枹, 洋白蜡树《华北树木志》, 毛白蜡、洋白蜡《山东树木志》, 新疆秦皮

《药学报》)

地方名 新疆:[秦皮]。

备考 树皮:在新疆混作秦皮用,树皮的醇提物荧光极弱,不宜作秦皮资源。

#### 7229020

*Fraxinus pistacifolia* Feng, mss.

植物名 大皮消(云南)、汇编

地方名 云南:踏皮树,毡帽老、牛尾巴树、大树皮、白枪杆(红河)。

功效 树皮:健胃消食,行气理血。用于食积胃痛,慢性胃炎,气滞经闭,偏头痛,间日疟,恶性疟;根:用于驱绦虫,便秘,小便不利,高热,风湿跌打,骨折。

7229021 见 7229012a

#### 7229022

*Fraxinus rhynchophylla* Hance --- *F. chinensis* Roxb. var. *rhynchophylla* (Hance) Hemsl. --- *F. hopeiensis* Tang

植物名 花曲柳《中国植志》

药材名 秦皮《药典》

文献名 大叶苦槠《中国植物图鉴》,蜡树皮《中药志》,大叶栲《河北习见树木图说》,大苦槠《树分》,大叶白蜡树《高植图鉴》,苦槠白蜡树《药典》,东北秦皮《药学报》

地方名 栲、白蜡树、华曲柳、蜡树(东北),苦槠(河北、东北);云南:见水蓝(江川)。

功效 干皮或根皮:清热燥湿,收涩,明目。用于热痢,泄泻,赤白带下,目赤肿痛,目生翳膜。

备考 《植物研究》(1988)认为本品是卵叶栲 *Fraxinus obovata* Blume (广义种)的异名。

#### 7229023

*Fraxinus rhynchophylla* var. *huashanensis* J. L. Wu et Z. W. Xie

植物名 华山栲《药学报》

药材名 华山秦皮《药学报》

地方名 陕西:秦皮。

功效 树皮:清热燥湿,收涩,明目。

#### 7229023a

*Fraxinus stylosa* Lingelsh. --- *F. fallax* Lingelsh. --- *F. fallax* var. *stylosa* (Lingelsh.) Chu et J. L. Wu

植物名 宿柱栲《中国植志》

药材名 秦皮《药典》

文献名 宿柱白蜡树《华北经植志要》,柳叶栲、陕西白点秦皮《药学报》,户县白蜡树《秦岭植志》

功效 干皮、枝皮:清热燥湿,收涩,明目。用于热痢,泄泻,赤白带下,目赤肿痛,目生翳膜。

#### 7229024

*Fraxinus suaveolens* W. W. Smith

植物名 香白蜡树《云南种录》

药材名 香白蜡树《油庆藏药》

地方名 云南:“皆古思民木”(贡山怒语)。

功效 树皮:清热,燥湿,收敛,明目,接骨。用于热痢,带下,目赤,骨折。

#### 7229024a

*Fraxinus szaboana* Lingelsh. --- *F. chinensis* Roxb. var. *acuminata* Lingelsh. --- *F. chinensis* var. *tomentosa* Lingelsh. --- *F. caudata* J. L. Wu --- *F. medicinalis* S. S. Sun

植物名 尖叶栲《中国植志》

药材名 秦皮《本经》,《药典》

文献名 尾叶栲、陕西秦皮《药学报》,尖叶白蜡树《高植图鉴》

地方名 陕西:水楸、白心木(太白山)。

功效 枝皮或干皮:清热燥湿,收涩,明目。用于热痢,泄泻,赤白带下,目赤肿痛,目生翳膜。

备考 有的文献将本种学名误订为 *F. chinensis* Roxb.

#### 7229025

*Fraxinus velutina* Torr.

植物名 绒毛白蜡树《山东树木志》

地方名 山东:绒毛栲。

功效 树皮:清热燥湿,收涩,明目。

#### 7229026

*Jasminum albicalyx* Kobuski

植物名 白萼素馨《广西药录》

文献名 白萼茉莉《高植图鉴》

地方名 广西:青藤。

功效 根:驱虫。用于蛔虫病,跌打损伤;叶:生肌。

7229027 见 7229030a

#### 7229028

*Jasminum beesianum* Forr. et Diels -- *J. violascens* Lingelsh.

植物名 红素馨《中国植志》

药材名 小酒瓶花《云南药录》

文献名 红茉莉《高植图鉴》,红花素馨、红花茉莉《汇编》

地方名 云南:[巽友](丽江),小铁藤(曲靖)。

功效 全株:通经活络,利尿。用于闭经,风湿麻木,小便不利。

#### 7229029

*Jasminum coarctatum* Roxb. --- *J. tonkinense* Gagnep. --- *J. reticulatum* Wall.

植物名 密花素馨《云南植志》

文献名 东京素馨、紫花断肠草《云南药录》,北越素馨《云南种录》

地方名 云南:白花断肠草、清明花、山葡萄、羊断肠草(屏边),黄花断肠草。

功效 叶、根:外用于麻风,刀伤;全株:用于小儿疳积,皮肤瘙痒。

#### 7229030 (小蔞草)

*Jasminum duclouxii* (Lévl.) Rehd.

植物名 丛林素馨《云南植志》

文献名 鸡爪花《名实图考》,夹竹桃叶素馨《广西药录》

地方名 贵州:鸡爪藤,黑骨头,花内草。

功效 根皮:外用于疥疮;根:理气止痛,清热明目。用于腹痛,火眼。

#### 7229030a

*Jasminum elongatum* (Bergius) Willd. --- *J. amplexicaule* Buch.-Ham. ex G. Don --- *J. undulatum* Ker.-Gawl.

植物名 扭肚藤《中国植志》

药材名 扭肚藤《岭南采药录》、《汇编》

文献名 白花茶、假素馨、青藤仔花《岭南采药录》,波形素馨《江苏植志》,猪肚勒《高植图鉴》

地方名 广东:左扭藤,〔青藤〕(新会、台山),青藤仔(广州、花县、增城、罗定、乐昌),人字草(从化、清远),秀英藤(阳江);海南:哩罗刺(乐东),谢三娘;广西:断骨草(都安),大种牛头狮(博白),毛毛茶(南宁),鸡心,小肠风,蚊藤,山指甲,假银花,硬骨青(合浦)。

功效 茎、叶:清热解毒,利湿消滞。用于急性胃肠炎,痢疾,消化不良,急性结膜炎,急性扁桃体炎;花:通便。用于腹胀。

#### 7229031

*Jasminum floridum* Bunge

植物名 探春花《中国植志》

药材名 探春花《四川中药志》

文献名 探春《中药大辞典》,〔迎春〕、迎夏《科裁》

地方名 长春(山东、河南);陕西:山救驾,小柳拐;上海:金茉莉;湖北:报春花(神农架);四川:败火草,牛虱子;贵州:迎春花。

功效 叶、根:清热解毒,消肿止痛。用于咽喉肿痛,恶疮肿毒,跌打肿痛;叶:外用于烫火伤,刀伤;花:清热利湿,解毒。

#### 7229032

*Jasminum floridum* Bunge ssp. *giraldii* (Diels) Miao --- *J. giraldii* Diels

植物名 黄素馨《中国植志》

药材名 茎皮《汇编》

文献名 全皮、前皮《中药志》,黄馨《树分》,毛叶探春《高植图鉴》

地方名 陕西:小柳拐、山救驾、山柳拐(略阳),刺龙花(石泉),黑牛眼(太白山);甘肃:牛眼睛(徽县);湖北:〔地骨皮〕,大救驾(神农架)。

功效 根:活血祛瘀,生肌,收敛。用于跌打损伤,瘀血内滞,骨折,刀伤。

#### 7229032a

*Jasminum grandiflorum* L. --- *J. officinale* L. f. *grandiflorum* (L.) Kobuski --- *J. officinale* var. *grandiflorum* (L.) Strokes

植物名 素馨花《桂海虞衡志》、《中国植志》

药材名 素馨花《纲目》、《中草药学》

文献名 耶悉茗花《南方草木状》,野悉蜜《酉阳杂俎》,白素馨《纲目》,玉芙蓉《花镜》,素馨《种称》,大茉莉《中草药学》,大花素馨花《汇编》

地方名 广东:素馨针;云南:四季素馨(昆明);其

他:秀英花,苏摩那。

功效 花蕾:舒肝解郁,行气止痛。用于肝炎,肝区疼痛,胸胁不舒,心胃气痛,痢疾腹痛。

#### 7229033

*Jasminum humile* L.

植物名 矮探春《中国植志》

药材名 小黄素馨《汇编》

地方名 四川:败火草、常春小黄馨、火炮子、小黄馨(南川)。

功效 叶:清火,解毒。用于烧烫伤,疮毒红肿。

#### 7229034

*Jasminum lanceolarium* Roxb. --- *J. lanceolarium* Roxb. var. *puberulum* Hemsl. --- *J. pachyphyllum* Hemsl. --- *J. paniculatum* Roxb. --- *J. taiwanianum* Masam.

植物名 清香藤《中国植志》

药材名 破骨风《分类草药性》、《汇编》

文献名 破膝风《分类草药性》,光清香藤《中药大辞典》,北清香藤《高植图鉴》

地方名 江西:破风藤;湖南:川滇茉莉;广西:细入骨风(桂平),双飞藤、牛三叉(苍梧),散骨藤(金秀),碎骨风(蒙山),驳骨通(贺县),山青树(北流);贵州:花木通,小泡通,老鹰柴;云南:疙瘩藤(屏边);其他:青蛇药,白皮藤。

功效 根、茎:有小毒。祛风除湿,活血散瘀。用于风湿关节痛,腰痛,跌打损伤,疮毒,痼疽。

#### 7229035 见 7229034

#### 7229036

*Jasminum lang* Gagnep.

植物名 梔花素馨《广西药录》、《中国植志》

功效 茎:用于慢性肝炎,肝硬化腹水,肾炎,尿道炎,胆囊炎,肺炎,肺结核。

#### 7229037

*Jasminum laurifolium* Roxb.

植物名 桂叶素馨《云南植志》

药材名 桂叶素馨《思茅本草》

文献名 岭南茉莉《高植图鉴》

地方名 云南:大黑骨头(思茅),“鸭色盖”(傣名)。

功效 全草:清热解毒,消炎利尿,消肿散瘀。用于痢疾,尿路感染,膀胱炎,肾炎水肿,跌打损伤,扭挫伤。

#### 7229038

*Jasminum mesnyi* Hance --- *J. primulinum* Hemsl.

植物名 野迎春《云南植志》

药材名 云南黄素馨《广西药园药录》

文献名 云南黄馨《树分》

地方名 广西:迎春花;贵州:重瓣迎春草(贵阳);云南:迎春柳、阳春柳(玉溪、江川),迎春柳花、金腰带(文山),金梅花(丽江),金铃花。

功效 全株:清热,消炎。

#### 7229039

*Jasminum nervosum* Lour. --- *J. cinnamomifolium* Kobuski var. *axillare* Kobuski

植物名 青藤仔《高植图鉴》

药材名 香花藤《汇编》

文献名 蟹鱼胆藤《高植图鉴》

地方名 鲫鱼胆、鲫鱼胆、跌麻草、小黄柏、小叶青藤子(海南、广西);海南:[鸡骨香];广西:千金钱(那坡),老鼠藤(宁明),[忍冬藤]、[金银花](隆林),[四季青](龙州),牛腿虱;云南:青仔藤,“牙晒介”(西双版纳傣名),大素馨花(新平),金丝藤(玉溪)。

功效 茎、叶、花:清湿热,拔脓生肌。用于痢疾,劳伤腰痛,疮疡脓肿,疮疡溃烂;根、叶:消炎,接骨。

#### 7229040

*Jasminum nudiflorum* Lindl. --- *J. sieboldianum* Blume

植物名 迎春花《高植图鉴》

药材名 迎春花《纲目》、《汇编》

文献名 [金腰带]、腰金带、金腰儿《群芳谱》,金梅《滇志》,黄梅《植物学大辞典》,迎春《汇编》

地方名 陕西:四方消(镇坪);上海:金雀花,黄茉莉;湖南:小黄花;四川:迎春藤;贵州:清明花;云南:金梅花(楚雄、保山),阳春柳(红河)。

功效 花:清热利尿,解毒。用于发热头痛,小便热痛,下肢溃疡;枝、叶:用于风热感冒,小便淋涩疼痛,阴道滴虫。

#### 7229041

*Jasminum officinale* L.

植物名 素方花《高植图鉴》

药材名 素馨花《云南药录》

文献名 耶悉茗《南方草木状》,黄素馨《纲目》,素馨、秀英花《和汉药植》,素方《中国经植志》

功效 花蕾:舒肝解郁,行气止痛。用于肝炎,肝区疼痛,胸肋不舒,心胃气痛,痢疾腹痛。

7229042 见 7229032a

#### 7229043

*Jasminum pentaneurum* Hand. -Mazz.

植物名 厚叶素馨《中国植志》

文献名 青竹苗《广西药录》

地方名 广西:硬骨箭、胆草(桂平),假苦曼藤、节节花、丹边桂、万年青(平南),青竹藤(岑溪、贺县),青香藤(藤县),鲫鱼胆(博白)。

功效 全株:清热利胆,祛瘀生新,驳骨止痛。用于口腔炎,咽喉炎,疮疖,跌打损伤。

#### 7229044

*Jasminum polyanthum* Franch.

植物名 多花素馨《云南植志》

药材名 素馨花《汇编》

文献名 素兴花《名实图考》, [狗牙花]《红河中草药》

地方名 云南:鸡爪花(玉溪),白素馨,野素馨(昆明)。

功效 全株:行气调经止痛,清热散结。用于胃痛,肝炎,月经不调,痛经,带下,口腔炎,皮肤瘙痒,睾丸炎,乳腺炎,淋巴结核。

#### 7229045

*Jasminum sambac* (Linn.) Aiton

植物名 茉莉花《南方草木状》、《高植图鉴》

药材名 茉莉《纲目》、《汇编》

文献名 末利《南方草木状》,小南强《清异录》,奈花《丹铅杂录》,曼华《群芳谱》,抹利、暗馨《花镜》,茉莉花露《纲目拾遗》,抹厉《洛阳名园记》,没利《梅溪诗集》,抹丽、抽花、狎客、雅友、磨利、远客、雕琼、山榴花、玉磨《新纲》,木梨花《树分》

地方名 河南:岩花;广西:小紫茉莉(凌云);四川:香花;其他:刺,茉,素馨,三白。

功效 花、叶:清热解表,利湿。用于外感发热,腹泻;花:外用于目赤肿痛;根:有毒,麻醉,镇痛。用于失眠,跌打损伤。

7229046 见 7229047

#### 7229047

*Jasminum segunii* Levl. --- *J. segunii* Levl. var. *latilobum* Hand. -Mazz. --- *J. taliense* W. W. Smith

植物名 亮叶素馨《中国植志》

药材名 四季素馨花《汇编》

文献名 亮叶茉莉、宽瓣茉莉《高植图鉴》,宽瓣大理素馨、大理素馨《海南植志》,大理贵州素馨、贵州素馨《广西植志》,大花西氏素馨《广西药录》

地方名 广西:川骨头(凌云);云南:四季素馨, [银花藤],西氏素馨,白花藤、[金银花](元江),木本素馨(昆明)。

功效 根、叶:舒筋活络,止血。用于跌打损伤,外伤出血,骨折,疮,疖。

#### 7229048

*Jasminum sinense* Hemsl.

植物名 华素馨《中国植志》

药材名 华素馨《广西药录》

文献名 华清香藤《高植图鉴》

地方名 湖南:九龙藤,吊三角;广西:[金银花](柳州), [银花](象州)。

功效 花:解毒,消炎。用于疥疮。

#### 7229049

*Jasminum subhumile* W. W. Smith --- *J. subhumile* W. W. Smith var. *glabricymosum* (W. W. Smith) Miao ex P. Y. Bai --- *J. diversifolium* Kobuski var. *glabricymosum* (W. W. Smith) Kobuski

植物名 滇素馨《中国植志》

文献名 三枝叶《云南中草药》,光素馨《云南植志》,粉毛素馨《植分学报》

地方名 云南:三叉叶,三爪皮、野辣子棵、鸡脚三树(双江)。

功效 根、叶:祛风除湿,行血止痛。用于风湿关节痛,腰痛,感冒发热,全身酸痛,跌打损伤,骨折,外伤出血。

#### 7229050

*Jasminum urophyllum* Hemsl.

植物名 川素馨《广西药录》、《中国植志》

文献名 台湾素馨《植分学报》,川西素馨《云南植

志。

功效 全株：祛风，除湿。用于风湿麻木。

7229051 见 7229060a

7229052

*Ligustrum compactum* (Wall. ex Don) Hook. f. et Thoms. ex Brandis -- *L. yunnanense* L. Henry

植物名 长叶女贞《中国植志》

药材名 长叶女贞《神农架药录》

地方名 湖北：冬青（神农架）。

功效 果实：补肝肾，强筋骨。

7229053

*Ligustrum confusum* Decne.

植物名 散生女贞《云南植志》

文献名 白蜡树果《云南药录》，混女贞《云南种录》

功效 叶、茎皮：用于嘴痛。

7229054

*Ligustrum delavayanum* Har. -- *L. ionandroum* Diels

植物名 紫药女贞《云南植志》

药材名 地灵根《云南中草药》

文献名 川滇蜡树《高植图鉴》

地方名 云南：地柏灵根（丽江），瓦山腊树，白蜡条（东川）。

功效 根：利尿通淋，消食健胃。用于五淋病，消化不良，肝炎。

7229055

*Ligustrum henryi* Hemsl.

植物名 丽叶女贞《中国植志》

药材名 兴山蜡树《贵州药录》

地方名 湖北：圆叶女贞（神农架）；贵州：青麻树，小白蜡。

功效 叶：清热解毒，凉血止痛。用于吐血，咯血，牙床溃瘍，咽喉炎，唇疮。

7229056

*Ligustrum japonicum* Thunb.

植物名 日本女贞《华北树木志》

文献名 东女贞《江苏植录》

地方名 贵州：苦丁茶，小白蜡，苦味散。

功效 茎、叶：清热解毒。用于牙痛，口疮。外用于皮肤热毒和黄水疮。

7229057

*Ligustrum japonicum* Thunb. var. *pubescens* Koidz.

植物名 日本毛女贞《中药大辞典》

药材名 苦茶叶《贵州民间方药集》

文献名 毛序女贞《海南植志》

地方名 苦丁茶（河北、贵州）；台湾：毛女贞；贵州：小白蜡，苦味散。

功效 叶：清热解毒。用于火眼，口疳，齿齲，乳痈，肿毒，烫火伤。

7229058

*Ligustrum japonicum* Thunb. var. *rotundifolium* Nichols

植物名 圆叶日本女贞《贵州药录》

地方名 贵州：千年矮，细白蜡。

功效 叶：清热解毒，消肿止痛。用于烧伤，烫伤，刀伤出血，无名肿毒。

7229059

*Ligustrum lucidum* Ait. -- *L. magnoliaefolium* Hort.

植物名 女贞《唐本草》、《高植图鉴》

药材名 女贞子《本草正》、《药典》

文献名 桢木《山海经》，榎《诗经》，鼠梓《尔雅》，女贞实《本经》，苦楸《诗疏》，冬青叶《海上方》，女贞木《典术》，女贞皮《图经》，〔冬青子〕《济急仙方》，冻青《救荒本草》，虫白蜡《本草会编》，〔冬青〕、蜡树《纲目》，将牢树《临安县图经》，万年枝《花镜》，水蜡树《名实图考》，榎楸、虎梓《诗毛氏传疏》，爆格蚤《分类草药性》，贞木、鼠梓木《新纲》，大女贞《中国植物图鉴》，亮叶女贞《经济植物学》，女贞《中国药植志》，白蜡树子《形性鉴别》，唐鼠梓《诗草木今释》

地方名 白蜡树（浙江、四川、云南），〔冬青树〕（江苏、安徽、贵州），冬青树子（上海、江苏），大叶女贞（江苏、广西、云南）；福建：刀伤药（龙岩）；湖北：〔四季青〕，冻青树（神农架）；广西：鼠梓子，帐皮树（桂林），水桢，水蜡叶，大蜡叶；四川：虫树；贵州：土金刚叶，爆竹叶，山白蜡；云南：白蜡果树（红河）。

功效 果实：滋补肝肾，明目乌发。用于眩晕耳鸣，腰膝酸软，须发早白，目暗不明；叶：祛风，明目，消肿，止痛。用于头目昏痛，风热赤眼，疮肿溃烂，烫伤，口腔炎；树皮：补腰膝。根：散气血，止气痛。用于胸病，咳嗽，白带；虫白蜡：作赋形剂。

7229060

*Ligustrum malongense* B. S. Sun

植物名 狭叶小女贞《汇编》

文献名 四季春《汇编》

地方名 云南：马龙女贞，〔迎春〕。

功效 全株：清热消炎，平肝泻火。用于急性传染性黄疸型肝炎

7229060a

*Ligustrum molliculum* Hance -- *L. acutissimum* Koehne

植物名 蜡子树《中国植志》

药材名 蜡子树《神农架药录》

文献名 水白蜡、黄家榆《高植图鉴》

地方名 湖北：铁骨伞（神农架）。

功效 叶：清热泻火。用于烫伤。

7229061

*Ligustrum ovalifium* Hassk.

植物名 卵叶女贞《峨眉药植资源》

地方名 四川：水白蜡（峨眉山）。

功效 叶、茎皮：清热解毒，凉血，止血。

7229062

*Ligustrum pricei* Hayata -- *L. pedunculare* Rehd.

植物名 总梗女贞《中国植志》

文献名 序梗女贞《汇编》，台湾女贞（台湾《高山药地》）

地方名 湖北：水白蜡树（神农架）；四川：苦丁茶，水白蜡（峨眉山）。



功效 叶:清热散风,除烦解渴。用于头痛,齿痛,耳鸣,目赤红肿;根:散瘀,行气,止痛。用于咳嗽,经闭。

**7229063**

*Ligustrum quiboui* Carr. --- *L. brachystachyum* Decne.

植物名 小叶女贞《高植图鉴》

药材名 小白蜡条《汇编》

文献名 小白蜡树、棟青《高植图鉴》,小白蜡《汇编》

地方名 陕西:野石榴(洋县),水蜡籽(紫阳),水白蜡(镇坪);湖北:白蜡树(神农架);四川:小爆格蚤;贵州:细木蜡;云南:小叶冬青(曲靖),小蜡树(安宁)。

功效 根皮、叶及果:清热解毒。用于小儿口腔炎,烧烫伤,黄水疮。

**7229063a**

*Ligustrum robustum* (Roxb.) Blume --- *L. thibeticum* Decne.

植物名 粗壮女贞《中国植志》

文献名 藏女贞《汇编》

地方名 西藏:女贞子。

功效 果实:滋补肝肾,乌发明目。

**7229064**

*Ligustrum sinense* Lour.

植物名 小蜡《高植图鉴》

药材名 小蜡树《名实图考》,《汇编》

文献名 柎《诗经》,水冬青、鱼蜡《名实图考》,山紫甲树《高植图鉴》

地方名 山指甲(福建、广东、广西),小叶女贞(广东、广西);江苏:茶叶蓬落子,转椒子,土茶叶;浙江:〔女贞子〕,青皮树,水狗骨;福建:指甲花(漳浦),山雪子;湖北:水黄杨;广东:板子茶,板子树,苦枕,米碎花,沙虫药,园篱青,蚊子树;广西:蚊子花(容县、梧州),贼佬药(梧州、平南),小刀伤、蚊毛叶(梧州),满地花(全州),满地红;四川:水白蜡,千张树;云南:白蜡子,黄心柳(景东)。

功效 叶:清热解毒,抑菌杀菌,消肿止痛,去腐生肌。用于急性黄疸型传染性肝炎,痢疾,肺热咳嗽。外用于跌打损伤,创伤感染,烧烫伤,疮疡肿毒。

**7229065**

*Ligustrum sinense* Lour. var. *myrianthum* (Diels) H. Oker --- *L. groffiae* Merr.

植物名 光萼小蜡《云南植志》

文献名 蜡树《广西药录》,毛女贞《湖南药物志》

地方名 湖南:岩白蜡;广西:贼佬药(藤县),细木南(那坡),四嚼(武鸣),山万年青、蚊子木(桂平);贵州:苦丁茶,苦味散。

功效 枝、叶:清热解毒。用于荨麻疹,龋齿,咽喉炎,口腔炎,疮疖,跌打损伤。

**7229066**

*Ligustrum sinense* Lour. var. *nitidum* Rehd.

植物名 亮叶小蜡《云南植志》

文献名 光叶小蜡树《中药大辞典》,亮叶小蜡树《海南植志》

地方名 四川:水白蜡。

功效 树皮、叶:清热降火。用于吐血,牙痛,口疮,咽喉痛,湿热黄水痒疮。

**7229067**

*Ligustrum sinense* Lour. var. *stauntoni* Rehd.

植物名 毛叶小蜡《贵州药录》

功效 叶:清热解毒。用于牙痛。

**7229068**

*Ligustrum strongylophyllum* Hemsl.

植物名 宜昌女贞《秦岭植志》

功效 叶:清热散风,除烦解渴。

**7229069** 见 7229063a

**7229070** 见 7229072a

**7229071**

*Olea dioica* Roxb.

植物名 异株木橄榄《高植图鉴》

地方名 广东:水扫把;海南:白茶木,铜叶银税。

功效 树皮:解热。

**7229072**

*Olea europaea* L.

植物名 木犀榄《中国植志》

药材名 油橄榄《中草药学》

文献名 齐墩果《西阳杂俎》,棕榄树《高植图鉴》,油橄榄树《中草药学》

地方名 江苏:欧橄榄;广西:洋橄榄。

功效 核果:其油作橄榄油入药。

**7229072a**

*Olea ferruginea* Royle --- *O. cuspidata* Wall.

植物名 锈鳞木犀榄《中国植志》

文献名 尖叶木犀榄《高植图鉴》,旱柳《元江哈尼族药》

地方名 云南:“阿铺帕柏”(元江哈尼语),“吉利”(傣语),吉利树。

功效 叶、根:利尿,止血,通淋。用于血淋,血尿。

**7229073**

*Osmanthus asiaticus* Nakai

植物名 银桂《浙江植志》

功效 花:散寒破结,化痰生津,明目。用于牙痛,止喘咳。

**7229074**

*Osmanthus delavayi* Franch. --- *Siphonosmanthus delavayi* (Franch.) Stapf

植物名 管花木犀《云南植志》

药材名 豆瓣香《汇编》

文献名 山桂花《高植图鉴》,云南桂花《拉汉英种称》

地方名 云南:千年矮,豆瓣叶。

功效 叶、皮:清热消炎,止血生肌。用于慢性气管炎。外用于骨折,外伤出血,扭伤疼痛等。

**7229075**

*Osmanthus fragrans* (Thunb.) Lour. --- *Olea fragrans* Thunb.

植物名 木犀《高植图鉴》

药材名 桂花《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 木犀《尔雅》，桂《南方草木状》，木犀花《纲目》，岩桂《群芳谱》，银桂《花镜》，〔九里香〕《墨庄漫录》，桂树根、桂根、桂花露《纲目拾遗》，桂花根《分类草药性》，桂花子《江苏药材志》

地方名 桂花树(江苏、浙江、湖北)；江苏：木犀花子，桂花树子；浙江：桂子；安徽：八月桂；福建：山桂花(武平)，山木犀(浦城)，举木(顺昌)；湖北：红糖茶(利川)；广西：桂花钻；四川：桂花树根。

功效 花：散寒破结，化痰止咳。用于牙痛，咳嗽痰多，经闭腹痛；果：暖胃，平肝，散寒。用于虚寒胃痛；根：祛风湿，散寒。用于风湿筋骨痛，腰痛，肾虚牙痛；花露(花的蒸馏液)：疏肝理气，醒脾开胃。用于腹胀，牙痛，咽干，口燥，口臭。

备考 “犀”与“樺”字，前者多指动物犀牛，后者专指植物木犀，实宜区别使用，不宜混称。近年文献多将“木犀”简称“木犀”，并广为习用，暂从俗。

#### 7229076

*Osmanthus fragrans* (Thunb.) Lour. f. *aurantiacus* (Maximo) P. S. Green --- *O. fragrans* var. *aurantiacus* Makino --- *O. aurantiacus* (Makino) Nakai

植物名 金木樨《汇编》

文献名 丹桂《花镜》

地方名 北京：金桂，金粟，桂花。

功效 花：散寒破结，化痰止咳。

#### 7229077

*Osmanthus fragrans* Lour. var. *thunbergii* Makino

植物名 四季桂《江苏植药志》

文献名 金桂《花镜》，银桂《拉汉种称补编》，淡黄木犀《汇编》，银木犀《安徽中草药》，金花《四川中药志》

地方名 江苏：桂花树(苏州、常熟)。

功效 花：散寒破结，化痰止咳。

#### 7229078

*Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green --- *O. aquifolium* Sieb. --- *O. ilicifolius* (Hassk.) Standish

植物名 柃树《中国植志》

药材名 冬青叶桂花《拉汉英种称》

文献名 杠骨树《内外植物志》，秋花枸骨《中国植物图鉴》，大功劳《和汉药标本目录》，香木菌挂《现代实用中药》，日本桂花《拉汉种称补编》，〔猫儿刺〕、粘橘、杠谷树《中药大辞典》

地方名 上海：刺桂，东洋桂花，鸟不住；福建：〔枸骨〕；台湾：刺格；其他：香木，桂。

功效 枝、叶及树皮：补肝肾，健腰膝。用于百日咳。外用于疔，疔，肿毒。

#### 7229079

*Osmanthus matsumuranus* Hayata

植物名 牛矢果《高植图鉴》

药材名 牛矢果《广西药录》

地方名 海南：山拐木，白荷狗；广西：羊屎木(南宁)。

功效 叶、树皮：散瘀血。用于痈疮发背。

#### 7229080

*Syringa dilatata* Nakai

植物名 朝鲜丁香《中草药》

文献名 丁香叶《中草药》

功效 叶：抗菌消炎，止痛。

#### 7229081 见 7229089a

#### 7229082

*Syringa oblata* Lindl. --- *S. japonica* Hemsl.

植物名 紫丁香《花史汇编》、《中国植志》

文献名 跑马子《满州植录》，灵柏《兴安植群》，华北紫丁香《树分》，白龙柏、龙柏木《陕甘宁植志》，〔丁香〕《云南种录》，扁球丁香《广西植录》，龙柏子《高植图鉴》

地方名 苦丁香(东北)；陕西：龙背木(耀县)；宁夏：〔连翘〕、〔小连翘〕(平罗、青铜峡)；其他：丁香花。

功效 叶、皮：用于腹泻，肝炎。

#### 7229083

*Syringa pekinensis* Rupr.

植物名 北京丁香《高植图鉴》

文献名 山丁香、臭多罗《高植图鉴》

功效 嫩叶：可代茶用；花：可制取芳香油。

#### 7229084

*Syringa persica* L.

植物名 花叶丁香《高植图鉴》

药材名 野丁香《西藏中草》

文献名 小叶丁香《西藏中草》，波斯丁香《山东树木志》

地方名 西藏：“所细”(藏名)。

功效 花蕾：温胃散寒，降逆止呕。用于胃寒呃逆，呕吐，胃粘膜充血。

#### 7229085

*Syringa pinnatifolia* Hemsl.

植物名 羽叶丁香《高植图鉴》

地方名 宁夏：山沉香

功效 根或枝干：降气，温中，暖肾。

#### 7229086

*Syringa pubescens* Turcz.

植物名 毛丁香《高植图鉴》

文献名 巧玲花、〔雀舌花〕《高植图鉴》，毛叶丁香《秦岭植志》，小叶丁香《东北木本图志》

功效 茎：入药；花：作香料。

#### 7229087

*Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *mandshurica* (Rupr.) Pringle --- *S. amruensis* Rupr.

植物名 暴马丁香《中国植志》

药材名 暴马子《吉林中草药》

文献名 棒棒木《北方中草》，跑马子《陕甘宁青中草药选》，暴马子皮《民族药志》

地方名 青杠子(东北)，荷花丁香(河南、宁夏)；吉林：白丁香；甘肃：龙柏，香樟。

功效 干皮或枝皮：清肺祛痰，止咳平喘。用于慢性支气管炎。

## 7229088

*Syringa vulgaris* L.

植物名 欧丁香《中国植志》

文献名 紫丁香花《植物名汇》, 丁香花《满蒙植汇》, 欧洲丁香《树分》, 洋丁香《秦岭植志》, 普通丁香《西藏植志》, 西洋丁香《拉汉英种称》

功效 根: 清心热。用于头痛, 失眠, 烦躁。

## 7229089

*Syringa vulgaris* L. f. *alba* (Weston) Voss. --- *S. vulgaris* L. var. *alba* West.

植物名 白花欧丁香《中国植志》

文献名 白花洋丁香《树分》, “阿尔加”(藏名)《青藏药图》

功效 根: 清心热。用于健忘, 失眠, 烦躁。

## 7229089a

*Syringa wolffii* Schneid.

植物名 辽东丁香《中国植志》

药材名 辽东丁香《长白山植志》

功效 树皮: 清肺祛痰, 止咳平喘。

## 7230 夹竹桃科 Apocynaceae

## 7230001

*Aganosma harmandiana* Pierre

植物名 云南香花藤《中国植志》

文献名 黄毛香花藤《云南种录》

地方名 云南: 老鼠牛角, “刺色龙珠”(傣语)。

功效 根: 用于水肿。

## 7230001a

*Aganosma kwangsiense* Tsiang

植物名 广西香花藤《中国植志》

药材名 广西香花藤《广西药录》

地方名 广西: 石上羊奶树(那坡)。

功效 全株: 用于水肿。

## 7230002

*Aganosma navaillei* (Levl.) Tsiang --- *Trachelospermum navaillei* Levl.

植物名 贵州香花藤《中国植志》

药材名 贵州香花藤《广西药录》

功效 叶: 用于皮肤湿疹。

## 7230003

*Aganosma schlechteriana* Levl.

植物名 海南香花藤《中国植志》

文献名 施氏香花藤《广西药录》, 香花藤《广西植志》

地方名 广西: 小血藤(凌云)。

功效 叶: 外用于皮肤湿疹; 茎: 补血, 通络, 催乳。

## 7230003a

*Allemanda cathartica* L.

植物名 软枝黄蝉《新华本草纲要》

功效 茎、叶: 有毒。泻剂。

## 7230004

*Allemanda cathartica* L. var. *hendersonii* (Bull. ex

Dombr.) Bail. et Raff.

植物名 大花软枝黄蝉《中国植志》

文献名 软枝黄蝉《广西《园林药录》》

地方名 广西: 大花黄蝉。

功效 叶: 有大毒。消肿杀虫。外用于跌打肿痛, 疥癬, 杀虫, 灭蛆。

## 7230005

*Allemanda nerifolia* Hook.

植物名 黄蝉《中国植志》

地方名 广东: 黄兰蝉(宝安)。

功效 全株: 外用于杀虫, 灭子。

## 7230006

*Alstonia guangxiensis* D. Fang et X. X. Chen

植物名 广西羊角棉《植分学报》

药材名 广西羊角棉《广西药录》

地方名 广西: 水柳(武鸣)。

功效 叶、根: 外用于疮疡肿毒。

## 7230006a

*Alstonia macrophylla* Wall. ex G. Don

植物名 大叶糖胶树《新华本草纲要》

功效 树皮: 用于伤寒头痛。

## 7230007

*Alstonia mairei* Levl.

植物名 羊角棉《中国植志》

药材名 闹狗药《贵州民间药物》

文献名 阿斯木《中药大辞典》

地方名 贵州: 洋笔桃(梵净山), 见血飞; 云南: 小鸡骨常山, 鸡舌头树。

功效 叶: 有大毒。散血止痛, 排脓生肌。用于刀伤出血, 疮毒。

## 7230008

*Alstonia scholaris* (L.) R. Br. --- *Echites scholaris* L. ---

*Para scholaris* Roberty

植物名 糖胶树《中国植志》

药材名 灯台叶《汇编》

文献名 灯台树《药典》, 鸭脚树《云南药录》, 凳板风《陆川本草》

地方名 大桔树(广西、云南), 灯台木、面条树(广东、广西、云南), 阿根木、肥猪叶、鹰爪木(广东、云南), 英台木、鸭脚木(广东、广西); 广东: 灯架树; 广西: 九度叶(那坡), 面架木, 金瓜南木皮(北流), 象皮木(陆川); 云南: 土杜仲(盈江), 大树将军, 大树理肺散, 五爪皮(红河), “吃力秀”, “买担别”(傣名), 大矮陀陀, 细口袋花, 理肺散, 肥猪菜(思茅)。

功效 叶、嫩枝: 有毒。消炎, 化痰, 止咳, 止痛。用于支气管炎, 百日咳, 胃痛, 腹泻, 疟疾。外用于跌打损伤。

## 7230009

*Alstonia yunnanensis* Diels

植物名 鸡骨常山《名实图考》、《中国植志》

药材名 滇鸡骨常山《品种论述》

文献名 云南鸡骨常山《汇编》, 云南糖胶树《广西植

录), 云南鸭脚树《广西中药志》

地方名 野辣椒(广西、贵州); 广西: 白虎木(凌云、乐业), 红辣树(隆林), 红辣椒; 云南: 八棱马、三皮柳(临沧), 三台高, 三台红花、火山麻(思茅), “杀期努恰”(红河), 永固生, 四角枫, 红花岩陀, 滇常山。

功效 根、叶: 有小毒。解热截疟, 止血, 止痛用于疟疾, 口腔炎, 骨折, 跌打损伤

#### 7230010

*Alyxia levinii* Merr.

植物名 筋藤《中国植志》

药材名 筋藤(广西大瑶山)

文献名 李万念珠藤《广西药录》, 广东念珠藤《广西植志》

地方名 广西: 三托藤, 香藤(平南), 坎香藤(龙州), 藤满山香(苍梧), 九牛藤(融安), 骚羊果(全州)。

功效 全株及根: 有小毒。祛风利湿, 活血通络。用于风湿痹痛, 小儿疳积, 疮疖。

#### 7230011

*Alyxia schlechteri* Levl. --- *Daphne bodinieri* Levl. --- *wikstroemia bodinieri* Levl. --- *Alyxia bodinieri* Woodson

植物名 狭叶链珠藤《中国植志》

地方名 贵州: 满山香, 鸡骨香, 过山香。

功效 全草及根: 解热镇痛, 消肿解毒, 祛风利湿, 活血通络。用于风火牙痛, 风湿性关节痛, 胃痛, 跌打损伤, 妇人经闭, 脾虚泄泻, 脚气, 周身浮肿。

#### 7230012

*Alyxia siamensis* Craib

植物名 大果链珠藤《云南种录》

药材名 浆包藤《云南药录》

文献名 勐龙链珠藤《植分学报》

功效 根、茎: 有小毒。清热解毒。用于疟疾。

#### 7230013

*Alyxia sinensis* Champ. ex Benth.

植物名 链珠藤《中国植志》

药材名 念珠藤《浙江药植志》

文献名 阿利藤《树分》

地方名 瓜子金(浙江、福建), 瓜子藤(浙江、福建、广东、广西), 过山香、春根藤(福建、广东); 浙江: 猪油藤(仙居); 福建: 山红木, 瓜子英, 过骨边, 七里香(晋江、龙海、同安、华安、武中等), 香藤(闽北、永春、大田)。

功效 全株及根: 有小毒。祛风利湿, 活血通络。用于风湿性关节疼痛, 脾虚泄泻, 脚气, 周身浮肿, 妇人经闭, 跌打损伤。

#### 7230014

*Alyxia yunkumana* Tsiang

植物名 长序链珠藤《中国植志》

药材名 长序链珠藤《广西药录》

地方名 广西: [白龙须](凤山)。

功效 茎: 通乳。

#### 7230015

*Amalocalyx yunnanensis* Tsiang --- *A. burmanicus* Chatt.

植物名 毛车藤《中国植志》

药材名 酸果藤《云南药录》

地方名 云南: 锯子藤。

功效 根: 催乳。用于妇女缺奶。

#### 7230016

*Amsonia sinensis* Tsiang et P. T. Li

植物名 水甘草《中国植志》

药材名 水甘草《图经》、《汇编》

文献名 筠州水甘草《证类本草》

功效 全草: 用于小儿风热, 丹毒。

#### 7230017

*Apocynum venetum* L. --- *Trachomitum venetum* (L.)

Woodson --- *T. lancifolium* (Russon.) Pobed.

植物名 罗布麻《中国植志》

药材名 罗布麻叶《药典》

文献名 小花夹竹桃、小花罗布麻《沙漠药植》, 披针叶茶叶花《中国植志》

地方名 红麻(内蒙古、河北、陕西、新疆、河南), 茶叶花(东北、北京、河北、山西、陕西、甘肃), 泽漆麻(陕西、江苏、安徽、河南), 野茶(陕西、山东、江苏), 野麻(山西、陕西、甘肃、青海、新疆), 野柳树(江苏、安徽); 吉林: 牛茶(大安); 山西: 红毛子棵, 河马秋子, 奶流; 内蒙古: “老布、敖鲁苏”(蒙名); 陕西: 羊肚拉角(陕北); 新疆: “亚瓦其盖”、“罗布欢的尔”、“野务其干”(维名); 山东: 泽漆棵(烟台), 水条子棵(昌潍), 地里茶(孤岛), 茶棵子(广饶、无棣、沾化、海阳、孤岛), 草夹竹桃, 盐柳(青岛), 野茶棵(历城); 江苏: 吉吉麻, 女人茶, 女儿茶, 红根草, 驴儿茶, 野苏叶, 野茶叶; 安徽: 小赤麻; 其他: 红柳子。

功效 叶: 平肝安神, 清热利水。用于肝阳眩晕, 心悸失眠, 浮肿尿少, 高血压病, 神经衰弱, 肾炎浮肿。

#### 7230017a

*Beaumontia breviflora* Oliv.

植物名 断肠花《中国植志》

地方名 海南: 大果夹竹桃。

备考 《新华本草纲要》称: 叶及乳汁等均极毒。含强心甙, 为有希望的强心甙资源植物。

#### 7230018

*Beaumontia grandiflora* Wall.

植物名 清明花《中国植志》

药材名 清明花《广西药录》

文献名 大花清明花《云南药录》

地方名 炮弹果(广西、云南); 云南: “刺抱龙”(西双版纳傣语), 藤杜仲(保山)。

功效 根、叶: 祛风湿, 散瘀活血, 接骨。用于骨折, 腰肌劳损, 风湿性关节炎。

#### 7230019

*Beaumontia pitardii* Tsiang

植物名 广西清明花《中国植志》

药材名 广西清明花《广西药录》

地方名 广西: 补乳藤(那坡)。

功效 叶: 催乳。

## 7230020

*Carissa spinarum* L.

植物名 假虎刺《中国植志》

药材名 老虎刺《云南药录》

地方名 云南:绣花针,三颗针,刺郎果,刺檀香,黑奶果,黑奶奶果。

功效 根:消炎,解热,止痛。用于黄疸型肝炎,胃疼,风湿性关节炎,疮,疖,淋巴腺炎,急性结膜炎,牙周炎,咽喉炎。

备考 本种植株外形与茜草科的虎刺 *Damnacanthus indicum* (L.) Gaertn. f. 很相似,故称假虎刺。

## 7230021

*Catharanthus roseus* (L.) G. Don --- *Vinca rosea* L. --- *Lochnera rosea* (L.) Reichb. --- *Ammocallis rosea* Small

植物名 长春花《中国植志》

药材名 长春花《名实图考》、《汇编》

文献名 四时春《本草彩图》

地方名 日日新(安徽、广东),三万花、日日草(广东、广西)、雁来红(安徽、广东、广西);上海:四时花,花海棠,海棠花;台湾:日日春;广东:百日红;云南:红长春花。

功效 全草:有毒。抗癌,降血压。用于急性淋巴细胞性白血病,淋巴肉瘤,巨滤泡性淋巴瘤,高血压病。

## 7230022

*Catharanthus roseus* (L.) G. Don cv. *Albus* --- *C. roseus* (L.) G. Don var. *albus* G. Don

植物名 白长春花《中国植志》

药材名 白花长春花《广西药录》

文献名 长春花《广西中药志》

地方名 广西:日日草,日日新,白日新,三万花。

功效 全草:有毒。抗癌,降血压。用于高血压病,白血病,淋巴肉瘤。

## 7230023

*Cerbera manghas* L.

植物名 海芒果《中国植志》

药材名 牛心茄子《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 山样仔《树分》,海檬果《海洋药物》

地方名 台湾:海样仔,猴欢喜;海南:山杭果,牛心荔、牛金茄、黄金调(文昌),牛心茄,黄金茄(琼海),香军树。

功效 树液:催吐,泻下。用于心力衰竭的急性病例;种仁:有毒。作麻药用,入外科膏药用。

备考 本种久与印度和马来西亚产的 *Cerbera odollam* Gaertn. 相混,其实后者花冠白色,喉部染黄色,花冠裂片长过花冠筒,雄蕊着生在冠筒中部,二者有明确的区别。

## 7230024

*Chonemorpha eriostylis* Pitard

植物名 鹿角藤《中国植志》

文献名 毛柱鹿角藤《广西药录》,大叶鹿角藤《广西植录》

## 7230024a

*Chonemorpha macrophylla* G. Don --- *C. fragrans* Alston

植物名 大叶鹿角藤《新华本草纲要》

文献名 香花鹿角藤《高植图鉴》

功效 根、茎:用于风湿骨痛。

地方名 广西:奶汁花,奶汁藤,康膜藤,黄藤,毛凉薯藤(忻城),大奶藤(岑溪);云南:“沙保弄南”(傣语),大九牛藤(屏边)。

功效 老茎:用于风湿骨痛,浊淋。

## 7230025

*Chonemorpha megacalyx* Pierre

植物名 长萼鹿角藤《中国植志》

药材名 大萼鹿角藤《汇编》

文献名 巨萼鹿角藤《云南药录》

地方名 云南:大杜仲、藤仲(华宁),土杜仲,金丝杜仲,银丝杜仲,大叶杜仲,大藤仲,水晶凉粉籽,草杜仲(通海)。

功效 茎藤:通经活络,活血止痛,接骨生肌,降压。用于肾亏腰痛,高血压病,风湿性腰腿痛,骨折,跌打损伤。

## 7230026

*Chonemorpha valvata* Charr.

植物名 毛叶藤仲《中国植志》

药材名 藤仲《汇编》

文献名 瓣裂鹿角藤《云南药录》,大叶鹿角藤《思茅中草药》

地方名 云南:枪花药(保山),“刹抱龙嘴”(傣语),〔杜仲〕(思茅),土杜仲、金丝杜仲(保山),大杜仲(大理),银丝杜仲(临沧),九牛藤。

功效 茎皮、根:有小毒。祛风活络,接骨,止血。用于风湿性关节炎痛。外用于外伤出血,骨折。

7230027 见 7230072a

## 7230028

*Ecdysanthera rosea* Hook. et Arn.

植物名 酸叶胶藤《中国植志》

药材名 酸叶胶藤《汇编》

文献名 酸藤《广西中药志》

地方名 乳藤(台湾、云南),头林心(广东、广西);湖南:细叶榕藤,石酸藤,麻骨风;海南:斑鸠藤(澄迈),厚皮藤(儋县);广西:酸藤子(隆安),黑风藤,风藤,三酸藤(藤县),酸藤木、酸醋藤(陆川),红背酸藤(宁明、凌云、北流、玉林、陆川、博白),伞风藤、熏烟(宁明),十八症(贵县),裙带沙(北流),藤风(龙州),牛卷藤(昭平),金丝钱(平南),蚂蝗藤(桂平);云南:酸叶藤,“宋姆必”、“麻火哈”(傣语)。

功效 全株:利尿消肿,止痛。用于咽喉肿痛,慢性肾炎,肠炎,风湿骨痛,跌打瘀肿。

## 7230029

*Ecdysanthera utilis* Hayata et Kaw.

植物名 花皮胶藤《中国植志》

药材名 花皮胶藤(广西、云南)

文献名 花杜仲藤《高植图鉴》,有用花皮胶藤《广西药录》

地方名 花喉崩、喉崩癩、头钳模、眼角蓝(海南、广西);河北:(杜仲);广西:刺耳南、刺耳蓝(上林),土杜仲,花杜仲。

功效 茎皮:用于小儿白泡疮。

### 7230030

*Epigynum auritum* (Schneid.) Tsiang et P. T. Li - *Tra-chelospermum auritum* Schneid.

植物名 思茅藤《中国植志》

药材名 牛皮杜仲《云南药录》

文献名 具耳络石、心叶络石《云南药录》

地方名 云南:藤仲。

功效 藤、根皮:祛风活络,止血生肌。用于风湿疼痛,感冒。外用于跌打肿痛,骨痛,外伤出血。

### 7230031

*Ervatamia divaricata* (L.) Burk.

植物名 单瓣狗牙花《中国植志》

功效 叶:清热解毒。用于目赤肿痛,乳痈,疮疖,疯狗咬伤。

### 7230032

*Ervatamia divaricata* (L.) Burk. cv. *Gouyahu* --- *E. divaricata* (L.) Burk. var. *gouyahu* Tsiang

植物名 狗牙花《中国植志》

药材名 狗牙花根(广西)

文献名 重瓣狗牙花《广西药录》

地方名 广西:白狗牙(梧州),豆腐花(南宁),狗獾木、狗头木(平南),狮子花(凌云);云南:“风沙门”(西双版纳傣语)。

功效 根、叶:清热解毒;叶:用于疥疮,乳腺炎,疯狗咬伤,提制高血压病药;根:用于咽喉肿痛,骨折等。

### 7230033

*Ervatamia hainanensis* Tsiang

植物名 海南狗牙花《中国植志》

药材名 单根本《汇编》

地方名 鸡爪花(海南、广西);海南:独根本,山辣椒树,艾角背,震天雷。

功效 根:有小毒。清热解毒,止痛,降血压。用于高血压病。咽喉肿痛,风湿关节痛,胃痛,痢疾。外用于乳腺炎;叶:有小毒。用于蛇咬伤,疮疖,跌打肿痛。

备考 根易混作萝芙木用,应注意鉴别。

### 7230034

*Ervatamia kwangsiensis* Tsiang

植物名 广西狗牙花《中国植志》

药材名 广西狗牙花《汇编》

地方名 广西:大驳骨(百色),山狮子(凌云)。

功效 根皮、叶:活血散瘀。用于跌打接骨。

### 7230035

*Ervatamia officinalis* Tsiang

植物名 药用狗牙花《中国植志》

地方名 海南:山辣椒树;广西:狗牙花(龙州)。

功效 根:用于肚痛,喉痛。

备考 根与萝芙木根相似,易混作萝芙木,应注意

鉴别。

### 7230035a

*Ervatamia yunnanensis* Tsiang

植物名 云南狗牙花《新华本草纲要》

功效 叶:解毒,降压。

### 7230036

*Holarrhena antidiysenterica* Wall. ex A. DC. --- *H. pubescens* (Buch.-Ham.) Wall. ex G. Don

植物名 止泻木《中国植志》

文献名 止泻木皮《广西植志》

地方名 广西:止泻树;云南:“埋母”(西双版纳傣语)。

功效 树皮、叶、根:止泻。用于痢疾,肠胃气胀,产后瘀血;种子:补肾壮阳。

### 7230036a

*Hunteria zeylanica* (Retz.) Gard. ex Thw

植物名 仔榄树《中国植志》

文献名 黄羊《高植图鉴》

地方名 海南:黄羊树,洪达木。

功效 根:消炎止痛。用于毒蛇咬伤,跌打肿痛。

### 7230037

*Ichnocarpus frutescens* (L.) W. T. Aiton

植物名 腰骨藤《中国植志》

药材名 腰骨藤《云南药录》

地方名 海南:犁田公藤,羊角藤,勾临链;广西:钓连石;云南:青豆藤。

功效 种子:祛风,除湿,止痛。用于风湿痛;叶:用于小儿消化不良。

### 7230038

*Ichnocarpus frutescens* (L.) W. T. Ait. f. *pubescens* Markgr.

植物名 毛叶腰骨藤《中国植志》

药材名 毛叶腰骨藤《广西药录》

功效 茎、叶:外用治荨麻疹。

### 7230039

*Ichnocarpus oliganthus* Tsiang

植物名 少花腰骨藤《中国植志》

文献名 疏花腰骨藤《广西药录》

地方名 广西:红杜仲(岑溪)。

功效 树皮:舒筋活血。用于筋骨疼痛。

### 7230039a

*Kopsia fruticosa* (Ker.) A. DC.

植物名 红花蕊木《新华本草纲要》

功效 根皮:清热解毒。用于上感,咽喉炎。

### 7230039b

*Kopsia hainanensis* Tsiang

植物名 海南蕊木《新华本草纲要》

功效 果、叶:有毒。消炎止痛,舒筋活络。用于咽喉炎,扁桃体炎,风湿骨痛,四肢麻木;树皮:利水。用于水肿。

### 7230040

*Kopsia officinalis* Tsiang et P. T. Li

植物名 云南蕊木《中国植志》

药材名 柯蒲木《思茅本草》

地方名 云南:梅桂,“马蒙加锁”(西双版纳傣语),“勐呵”(傣名),蕊木(西双版纳)。

功效 果、叶:清热消炎。用于咽喉炎;树皮:消肿;用于水肿;果:用于麻风。

#### 7230041

*Melodinus fusiformis* Champ. ex Benth. --- *M. seguini* Levl. --- *M. wrightioides* Hand. - Mazz.

植物名 尖山橙《中国植志》

药材名 尖山橙《汇编》

文献名 乳藤《粤志》

地方名 广西:竹藤、青竹藤(容县),乳汁藤(陆川),藤皮黄(北流),鸡藤果(岑溪),石芽枫(平南),哼头果,黄狗合藤,山橙,驳筋树(桂平)。

功效 全株:活血,祛风,补肺,通乳。用于风湿性心脏病;果实:有毒。化气,止痛。

#### 7230042

*Melodinus hemsleyanus* Diels

植物名 川山橙《中国植志》

药材名 川山橙《峨眉植物图志》

文献名 蔷薇根《四川中药志》

功效 根:补血,清热。用于脾胃虚弱,消化不良,血虚乳少,口舌生疮,牙龈痛。

#### 7230043

*Melodinus henryi* Craib

植物名 思茅山橙《中国植志》

文献名 蔷薇根《四川中药志》,岩山枝《贵州本草》,长果山橙《云南种录》

地方名 四川:毛药藤。

功效 果实:解热,镇痉,活血散瘀。用于小儿角弓反张(脑膜炎等)。

#### 7230044

*Melodinus magnificus* Tsiang

植物名 茶藤《中国植志》

药材名 大山橙《广西药录》

功效 叶:作茶饮,有兴奋作用。

#### 7230045

*Melodinus suaveolens* Champ. ex Benth.

植物名 山橙《中国植志》

药材名 山橙《名实图考》、《汇编》

文献名 屈头鸡《本草求原》,冬荣子《粤志》,山大哥《岭南采药录》

地方名 马骝藤、马骝橙藤、猴子果(广东、广西);广东:马骝藤果(中山),马骝橙,狗猫果,檣那;广西:铜锣锤(防城)。

功效 果:行气止痛,消积化痰。用于消化不良,小儿疳积,睾丸炎,疝气痛,腹痛,咳嗽痰多。

#### 7230046

*Nerium indicum* Mill. --- *N. odorum* Soland

植物名 夹竹桃《中国植志》

药材名 夹竹桃《名实图考》、《汇编》

文献名 拘那夷、拘拿儿《竹谱详录》,柳叶桃《花历百咏》,拘那、桃叶桃《花镜》,拘那日《名实图考》,柳叶桃树《中国药植志》

地方名 红花夹竹桃(广东、广西、云南),叫出冬、柳条花(东北);黑龙江:柳桃;山西:洋桃梅;山东:柳叶树;江苏:三季红,三季白;安徽:碧桃花;福建:状元竹(福安),柳竹桃(福州、莆田);台湾:桃竹,桃仔;河南:洋桃(开封);湖南:九节肿,大节肿;广西:四季红(平南);云南:白羊桃(楚雄),红毛皮(永善);其他:半年红。

功效 叶:有大毒。强心利尿,祛痰杀虫。用于心力衰竭,癫痫。外用于甲沟炎,斑秃,杀蝇。

#### 7230047

*Nerium indicum* Mill. cv. *Paihua*

植物名 白花夹竹桃《中国植志》

地方名 四川:碧桃。

功效 叶:有大毒。强心利尿,祛痰杀虫。

#### 7230048

*Nerium oleander* L.

植物名 欧洲夹竹桃《中国植志》

功效 植株:有毒。用于堕胎,杀鼠。

备考 原产地中海,我国南方有栽培。

#### 7230049

*Parabarium chunianum* Tsiang --- *P. handelianum* Tsiang

植物名 红杜仲藤《中国植志》

药材名 红杜仲藤《汇编》

文献名 两广杜仲藤《广西植录》,陈氏杜仲藤《植分学报》

地方名 河北:[杜仲];广东:土杜仲,红杜仲;广西:“喉崩”、“红喉崩”、“陶林模”、“依喉洪”(壮语)、“米崧”、“美送”(瑶语),红九牛藤,乳叶藤。

功效 茎皮、根:有小毒。祛风活络,强筋壮骨。用于风湿痹痛,跌打损伤;叶:用于外伤出血。

#### 7230050

*Parabarium hainanense* Tsiang

植物名 海南杜仲藤《中国植志》

地方名 广东:土杜仲。

备考 树皮:在广东民间称为土杜仲,为中药杜仲的混淆品,应注意鉴别。

#### 7230051

*Parabarium huatingii* Chun et Tsiang

植物名 毛杜仲藤《中国植志》

药材名 杜仲藤《汇编》

地方名 九牛藤、大白皮胶藤、土杜仲、毛杜仲、藤杜仲(湖南、广东、广西);广西:[杜仲](北流、平南、玉林、罗城、钟山等),红杜仲(苍梧、忻城),鸡头藤(容县),[银花藤](贺县),[续断](陆川、藤县),牛腿子藤,鸡头子,鸡腿子,香藤,鹤嘴藤,引汁藤,藤仲,锐果结衣藤,交登杆、交杜仲[侗语]、“不见合”、“棵一豪”、“个一豪”、“蒙钳菱”(瑶语)、“力酱梗”、“九龙丝”、“扣近”、“扣柄”、“扣乙厚”、“啤嫁粗”、“婢嫁”、“白喉崩”、“麦卡

拉”(壮语)。

功效 老茎及根:有小毒。祛风活络,强筋壮骨。用于风湿痹痛,腰脊劳损,腰腿痛,跌打损伤。外用于外伤出血。

#### 7230052

*Parabarium linearicarpum* (Pierre) Pichon

植物名 牛角藤《中国植志》

地方名 云南:“养当杜”(傣名),杜仲藤。

备考 茎皮:胶乳总固形物含胶量达 90.9%,但在云南称杜仲藤。

#### 7230053

*Parabarium micranthum* (A. DC.) Pierre ex Spire

植物名 白杜仲藤《汇编》

药材名 藤杜仲《陆川本草》

文献名 杜仲藤《中国植志》

地方名 “白喉崩”、“英廖”(海南、广西壮语),鸡嘴藤、棺材钉、老鸡嘴、老鸡嘴藤(广东、广西),九牛藤、白皮胶藤、小白皮胶藤、小赛格多、土杜仲、松筋藤、假杜仲(湖南、广东、广西、四川、云南);湖南:“飞天驳”(瑶语);广东:上续断(阳春),红及藤;海南:大种笔须藤(澄迈);广西:红杜仲(藤县),〔杜仲〕(桂平、平南、容县),白杜仲(岑溪),软羌藤(容县),小白皮藤,结衣藤,红杜仲藤,“喉崩”、“依喉”、“裸杜仲”(壮语),白胶藤。

功效 老茎及根:有小毒。祛风活络,强筋壮骨。用于小儿麻痹,风湿骨痛,跌打驳骨。

#### 7230054

*Parameria laevigata* (Juss.) Moldenke--*Parameria barbat* (Blume) K. Schum.

植物名 长节珠《中国植志》

药材名 长节珠《汇编》

地方名 云南:金丝藤仲,金丝杜仲、银丝杜仲(思茅),银光杜仲,“嘿当杜”、“赫当杜”(傣名)。

功效 全株:祛风活血,散瘀止痛,消炎。用于风湿骨痛,跌打损伤,肾下垂,肾炎等。

#### 7230055

*Parsonsia goniospermon* Hand.-Mazz.

植物名 广西同心结《中国植志》

药材名 广西同心结《广西药录》

功效 全株:用于肝脾肿大。

#### 7230056

*Plumeria rubra* L.

植物名 红鸡蛋花《中国植志》

药材名 红鸡蛋花(广东、广西)

功效 花、树皮:清热解暑,利湿,止咳。

#### 7230057

*Plumeria rubra* L. cv. *Acutifolia* --- *P. rubra* L. var. *acutifolia* (Poir.) Bailey

植物名 鸡蛋花《中国植志》

药材名 鸡蛋花《岭南采药录》、《汇编》

文献名 缙梔子《名实图考》

地方名 番蛋花(华南);台湾:蕃花,蕃花仔;广东:蛋黄花,搗蛋花;广西:鸭脚木(龙州),大季花(桂平);

云南:“哥儒章巴的”(西双版纳傣语),“摩克章巴”(傣语)。

功效 花、树皮:清热解暑,利湿,止咳。用于预防中暑,细菌性痢疾,消化不良,小儿疳积,传染性肝炎,支气管炎。

#### 7230058

*Poacynum hendersonii* (Hook. f.) Woodson ---

*Apocynum hendersonii* Hook. f.

植物名 大叶白麻《中国植志》

药材名 大花罗布麻(内蒙古、甘肃、青海、新疆)

文献名 白麻叶《中草药》

地方名 白麻、野麻(甘肃、青海、新疆)。

功效 叶:民间作茶饮。用于头晕,头痛,高血压症。

#### 7230059

*Poacynum pictum* (Schrenk) Baill.

植物名 白麻《中国植志》

药材名 白麻叶《中草药》

文献名 紫斑罗布麻《高植图鉴》

功效 叶:民间作茶饮。用于头晕,头痛,高血压等症。

#### 7230060

*Pottsia grandiflora* Markgr.

植物名 大花帘子藤《中国植志》

药材名 大花帘子藤《广西药录》

地方名 广西:乳汁藤。

功效 茎:用于产后虚弱。

#### 7230061

*Pottsia laxiflora* (Blume) O. Ktze.

植物名 帘子藤《中国植志》

药材名 花拐藤根《泉州本草》

文献名 长角胶藤《高植图鉴》

地方名 乳汁藤(广东、广西);广东:山羊角(五华),火烧角(兴隆),长果胶藤(封川),黄心泥藤(新兴),腰骨藤(万宁);海南:亚八藤、笔须藤(澄迈),坭藤母(临高),厚皮藤、钩婆藤(儋县);广西:红杜仲藤,多须根,花拐藤(上思),蚂蝗藤(桂平),能藤(苍梧),麻子藤,产后补(岑溪),菜豆藤(藤县)。

功效 根:活络行血,除湿祛风。用于跌打损伤,风湿关节痛,痼疽,妇女经闭,贫血。

#### 7230062

*Rauvolfia latifrons* Tsiang

植物名 风湿木《中国植志》

药材名 风湿木《汇编》

文献名 阔叶萝芙木《广西植录》,大叶萝芙木《广西药录》

地方名 广西:山熊胆(防城),奎宁木(天等)。

功效 根、茎:祛风活血。用于风湿痹痛,胆囊炎,疟疾,高血压病。外用于接骨。

#### 7230063

*Rauvolfia perakensis* King et Gamble

植物名 霹雳萝芙木《中国植志》



地方名 云南：“呼木那杂”(傣语)。

功效 根：降血压。用于高血压症。

#### 7230064

*Rauvolfia serpentina* (L.) Benth. ex Kurz

植物名 蛇根木《中国植志》

药材名 蛇根木《汇编》

文献名 印度蛇木、印度蛇根草、印度萝芙木、印度蛇根木《药学报》，蛇根《中国药植志》

地方名 广西：马蹄根，三叉苦，羊屎子，青辣椒，鱼胆木，短青木，假辣椒，塘婢粘，黑子苦蔓，野辣椒；云南：“呼木那杂”(傣语)；其他：蛇根草。

功效 根、茎皮、叶：降压。用于高血压病，退热，癫痫，虫蛇咬伤。

#### 7230065

*Rauvolfia tetraphylla* L.

植物名 四叶萝芙木《中国植志》

药材名 四叶萝芙木《汇编》

文献名 异叶萝芙木《中国植志》

功效 树汁：催吐，下泻，祛痰，利尿，消肿。

#### 7230066

*Rauvolfia tiaolushanensis* Tsiang

植物名 吊罗山萝芙木《中国植志》

功效 根：有小毒。镇静，降压，活血，止痛，清热解毒。

#### 7230067

*Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill. --- *Dissolaena verticillata* Lour. --- *Ophioxylon chinense* Hance --- *Rauvolfia chinensis* Hemsl.

植物名 萝芙木《中国植志》

药材名 萝芙木《中国药植志》

文献名 中国萝芙木、云南萝芙木《药学报》，山胡椒、山辣椒树《中国药植志》，蛇根草《简明中医辞典》

地方名 山椒、小种羊角藤、中国萝芙藤、羊屎尿、拐子药、狗牙树、扭子菜(华南)，羊屎木(广东、广西、贵州)，羊屎果、马蹄根(广西、云南)，羊屎子、鱼胆木、野辣椒(广东、广西)，矮青木(海南、广西)；台湾：山马蹄(北部)，山马蹄花，糊蕉，白花莲；广东：大叶了哥王，四叶齐(阳春)，山椒叶，中念子，白花丹，铁羊屎，假辣椒子，萝芙藤，染布子；海南：鸡眼子，羊角钗；广西：青辣椒，塘婢粘，羊姆奶，毒狗药，假鱼胆，火烙木(南宁)，万药归宗，通骨消(上林)，甘榕木(藤县)，先生木(凤山)，刀伤药(罗城)，假辣椒(东兰、融安、忻城、贵县)，三叉虎(柳江、融安、忻城)，地郎伞(邕宁)，高三、四楼王(环江)，辣椒贼(桂林)，山马蹄花树，黑子苦晚，黑子苦蔓，辣椒树；贵州：十八瓜，红果木；云南：白花矮陀，三叉叶，羊屎米根、“麻三端”、“麻桑端”(傣语)。

功效 根：有小毒。降压，镇静，活血，止痛，清热解毒。用于高血压病，头痛，眩晕，失眠，癫痫，高热不退。外用于跌打损伤，毒蛇咬伤。

#### 7230068

*Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill. var. *hainanensis* Tsiang

植物名 海南萝芙木《中国植志》

地方名 海南：海南红果萝芙木，山番椒，山马蹄椒。

功效 根：有小毒。镇静，降压，活血，止痛，清热解毒。用于高血压病等。

#### 7230069

*Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill. var. *oblongolata* Tsiang

植物名 倒披针叶萝芙木《中国植志》

文献名 百色萝芙木《广西植志》

功效 全株、根：有小毒。镇静，降压，活血，止痛，清热解毒。用于高血压病，感冒头痛，咳嗽，胃脘痛，疟疾。

#### 7230070

*Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill. var. *officinalis* Tsiang

植物名 药用萝芙木《中国植志》

药材名 药用萝芙木《广西药志》

地方名 广西：奎宁树(天等)，大叶萝芙木(龙州)，假杞子(德保)。

功效 根：有小毒。镇静，降压，活血，止痛，清热解毒。用于高血压病，感冒头痛，咳嗽，胃脘痛，疟疾。

#### 7230071

*Rauvolfia vomitoria* Afzel. ex Spreng.

植物名 催吐萝芙木《中国植志》

功效 根：用于高血压，呕吐，下泻；茎皮：用于高热，消化不良，疥癣；乳汁：用于腹痛，泻下。

#### 7230072

*Rauvolfia yunnanensis* Tsiang

植物名 云南萝芙木《中国植志》

药材名 萝芙木《汇编》

地方名 “勒毒”、“辣多”(广西、云南)；云南：“麻三端”(傣名)，三叶暗消，苦闷药。

功效 根：有小毒。镇静，降压，活血，止痛，清热解毒。用于高血压病，体癣。

#### 7230072a

*Sindechites henryi* Oliv.

植物名 毛药藤《中国植志》

地方名 广西：土牛党七；四川：黄丝树，薔薇根。

功效 根：补血，清热。用于脾胃虚弱，消化不良，血虚乳少，口舌生疮及牙龈痛等症。

#### 7230073

*Strophanthus divaricatus* (Lour.) Hook. et Arn. --- *Pergularis divaricata* Lour. --- *Periploca divaricata* Spreng. --- *Strophanthus divergens* Grah. --- *Strophanthus chinensis* G. Don

植物名 羊角拗《中国植志》

药材名 羊角拗《本草求原》、《药材学》

文献名 羊角拗《本草求原》，羊角草，倒钩草，羊角拗(岭南采药录)，华毒毛旋花子《药材学》，羊角黎，猪屎壳《中国植志》，猫屎壳《高植图鉴》

地方名 羊角扭(广东、广西、贵州)，(羊角藤)(福建、广东、广西)，羊角藕、羊角树、牛角藤、黄葛扭(广东、广西)；福建：打破碗(同安、诏安、漳浦)，(打破碗

花], 牛角刺、花拐藤, 金角(泉州), 武靴藤, 蜚脚仔, 鲤鱼橄榄(福州、泉州、厦门), 螺心鱼(南平); 广东: 大叶羊角扭, 牛头相答(潮安), 山羊角, 布渣叶, 羊角, 羊角亨(五华), 羊角果, 羊角咬, 羊角柳, 羊角墓, 沥口花, 菱角扭(郁南); 广西: 大羊角扭藤(北流), 牛角槽, 阳角石藤, 断肠草(梧州); 西藏: “图木绒”(藏名)。

功效 种子、叶: 有大毒。强心消肿, 止痛, 止痒, 杀虫。用于风湿关节肿痛, 小儿麻痹后遗症, 皮癣, 多发性疖肿, 腱鞘炎, 骨折; 种毛: 刀伤止血。

## 7230074

*Strophanthus gratus* (Wall. et Hook. ex Benth.) Baill.

植物名 旋花羊角拗《中国植志》

功效 植株: 有大毒。乳汁可作箭毒药; 种子: 用于心脏病。

## 7230075

*Strophanthus hispidus* DC.

植物名 箭毒羊角拗《中国植志》

药材名 箭毒羊角拗《汇编》

文献名 白毛羊角拗《树分》, 棕毒毛旋花子《药学名词合编》, 刚毛毒毛旋花子(李《生药》)

地方名 广东: 毒毛旋花子。

功效 种子: 有剧毒。强心, 利尿, 作箭毒。

## 7230076

*Strophanthus sarmentosus* DC.

植物名 西非羊角拗《中国植志》

功效 植株: 有毒。用于风湿性关节炎。

## 7230077

*Strophanthus wallichii* A. DC.

植物名 云南羊角拗《中国植志》

文献名 羊角拗《云南药录》, 藤羊角拗《云南种录》

功效 种子: 强心。用于血管硬化。

## 7230078

*Thevetia peruviana* (Pers.) K. Schum. --- *Cerbera thevetia* L. --- *Cerbera peruviana* Pers. --- *Thevetia nereifolia* Juss. ex Steud.

植物名 黄花夹竹桃《中国植志》

药材名 黄花夹竹桃《汇编》

文献名 黄夹竹桃《拉汉种称》, 吊钟花《南方毒植》

地方名 柳木子(广东、广西); 福建: 夹竹桃, 番仔桃(泉州); 广东: 黄花状元竹(潮汕), 美国黄蝉(广州), 台湾柳, 相等子; 海南: 大飞酸子(文昌), 竹陀子, 酒杯花; 云南: “马克沙基登”、“树都拉”(傣语), [杨柳树](元谋), 杨石榴, 铁石榴, 菱角树, 瘰疮叶, 铁菱角(蒙自), 都拉树(景谷)。

功效 叶及种子: 有大毒。强心, 利尿, 消肿。用于各种心脏病引起的心力衰竭, 阵发性室上性心动过速, 阵发性心房纤颤。

## 7230079

*Trachelospermum axillare* Hook. f.

植物名 紫花络石《中国植志》

药材名 紫花络石《汇编》

文献名 腋花络石《中国经植志》, 藤序络石《云南药

录》

地方名 车藤(湖南、广西), 牛角藤、秤秤果(湖南、云南); 河北: (杜仲); 湖北: 香加皮(神农架); 湖南: 藤杜仲, 银丝藤, 白九牛藤。

功效 全株: 有毒。解表发汗, 通经活络, 止痛。用于感冒, 风湿病, 跌打劳伤, 支气管炎, 肺结核。

## 7230080

*Trachelospermum brevistylum* Hand. - Mazz.

植物名 短柱络石《中国植志》

药材名 短柱络石《广西药录》

地方名 广西: 龙骨风(全州), 盖墙风(临桂)。

功效 茎: 用于风湿痹痛。

## 7230081

*Trachelospermum cathayanum* Schneid. - *T. cathayanum* Schneid. var. *longipedicellatum* Lingelsh. --- *T. wenchowense* Tsiang

植物名 乳儿绳《中国植志》

文献名 温州络石《中国经植志》

地方名 浙江: 五根树, 鸡屎老, 鸡屎藤, 络石藤(嵊县)。

功效 全株: 祛风止痛, 通经络, 利关节。

## 7230082

*Trachelospermum dunnii* (Levl.) Levl.

植物名 锈毛络石《中国植志》

药材名 锈毛络石《汇编》

地方名 湖南: 六角藤; 广西: 大黑骨头, 橡胶藤。

功效 叶芽: 活血散瘀。用于跌打损伤。

## 7230083

*Trachelospermum eglandulatum* D. Fang

植物名 无腺络石《植分学报》

药材名 无腺络石《广西药录》

功效 茎、根: 祛风活络。用于风湿痹痛。

## 7230084

*Trachelospermum gracilipes* Hook. f.

植物名 细梗络石《中国植志》

文献名 长梗络石《台湾中药材图鉴》

地方名 湖北: 爬山虎藤子(神农架)。

功效 全株: 祛风除湿, 活血散瘀。

## 7230085

*Trachelospermum gracilipes* Hook. f. var. *hupehense* Tsiang et P. T. Li --- *T. gracilipes* Hook. f. var. *cavaleriei* (Levl.) Schneid.

植物名 湖北络石《中国植志》

药材名 湖北络石《神农架药录》

地方名 湖北: 络石藤(神农架)。

功效 茎或全株: 祛风除湿, 活络。

## 7230086

*Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. --- *Rhynchospermum jasminoides* Lindl.

植物名 络石《本经》、《中国植志》

药材名 络石藤《本草拾遗》、《药典》

文献名 石鲛《本经》, 石蹉、略石、领石、石龙藤(别

录》, 酸石、明石、悬石、云化、云珠、云英、云丹《吴普本草》, 耐冬《唐本草》, 络石草《近效方》, 鬼系腰《外科精要》, 石薜荔《医学入门》, 白花藤《名实图考》, 红对叶肾、对叶藤《中草药学》

地方名 石南藤(吉林、陕西、江西、河南、湖南、湖北); 万字茉莉(北京、山东、河南); 过墙风(广东、广西、四川); 爬山虎(江苏、湖北); 爬墙虎(江苏、湖北); 绿刺、膏链(华南); 扒墙虎、石盘藤、过桥风(江苏、江西、华南、海南、湖南、河南); 墙络藤(江苏、华南、湖南、河南); 石邦藤、骑墙虎(江西、福建、华南、湖南); 吉林: 楠藤(蛟河); 陕西: 上树龙、花蛇草(镇坪); 石岩皮(山阳); 对肾藤(宝鸡); 山东: 糯米花(栽培种); 江苏: 六角草(连云港); 鹿角草(云台山); 浙江: 风旋花、乳风绳、吸壁藤(福建); 双对叶(宁化); 双合子、双合草、合掌藤、剃头草(闽东); 双合藤、对叶钳壁虎、钳壁藤(泉州); 双合仔、尖刀痕、芽桐草、乳汁藤、酸树藤; 湖北: 白花络石藤; 湖南: 风藤、折骨草(泸溪); 交脚风(安仁); 沿壁藤(宜章); 铁线草(通道); 藤络; 广东: 石佛、树掌、钻骨风、钻骨蛇、敷布藤、感冒藤(惠阳); 上山夹杂、打不死; 海南: 牛角藤、扫把藤、羊角苻、匙羹藤、猪屎苻; 广西: 见水生、羊角藤、苦连藤、软筋藤(融安); 四川: 万字金银、石气柑。

功效 带叶藤茎: 祛风通络, 凉血消肿。用于风湿痹痛, 筋脉拘挛, 腰膝酸痛, 喉痹, 痈肿, 跌扑损伤。

#### 7230087

*Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. var. *heterophyllum* Tsiang

植物名 石血《中国植志》

药材名 石血《图经》、《汇编》

文献名 爬墙虎、鹿角草、石龙藤《药材学》, 异叶络石《品种论述》

地方名 九庆藤(陕西、江苏、安徽、广西); 爬山虎(陕西、江苏、安徽、山东); 茉莉藤(山东、浙江); 浙江: 络石(温州); 对叶肾(平阳); 红对叶肾、拉藤肾(温州、永嘉、平阳); 安徽: 风车花、白花藤、爬壁藤、魁星草; 贵州: 铁信、铁栏杆、“家阿豆”(苗语); 西藏: “加不勒”(藏名)。

功效 全株: 祛风止痛, 通经络, 利关节。用于风湿骨痛, 腰膝酸痛, 肾虚腹泻, 跌打损伤。

#### 7230088

*Trachelospermum tenax* Tsiang

植物名 韧皮络石《中国植志》

地方名 贵州: 黑骨藤。

功效 茎、叶: 通络, 止血, 消瘀。用于风湿痹痛, 筋脉拘挛, 吐血, 痈肿, 跌打损伤, 喉痹。

#### 7230089

*Vallaris indecora* (Baill.) Tsiang et P. T. Li --- *V. grandiflora* Hemsl. et Wils.

植物名 大纽子花《中国植志》

药材名 纽子花《云南药录》

地方名 云南: 糯米饭花, 长山一枝烛。

功效 种子: 有大毒。强心; 植株: 用于血吸虫病。

#### 7230090

*Vinca major* L. cv. *Variegata* --- *V. major* var. *variegata* Loud.

植物名 花叶蔓长春花《中国植志》

地方名 金钱豹(江苏、浙江)。

备考 地上部分: 具有降压作用。

#### 7230091

*Vinca minor* L.

植物名 小蔓长春花《中国植志》

功效 叶和茎: 用于脑血管病。

#### 7230092

*Winchia calophylla* A. DC. --- *Winchia glaucescens* K. Schum. --- *Alstonia pachycarpa* Merr. et Chun --- *Alstonia glaucescens* Monachino

植物名 盆架树《中国植志》

药材名 盆架树《汇编》

文献名 亮叶面盆架子《海南主要经济树木》, 野灯台对、小叶灯台树《汇编》, 厚果鸭脚木《云南药录》

地方名 海南: 列蛇牌(东方), 丁格树(澄迈), 粉叶鸭脚树(保亭), 岭刀柄, 灯架, 山告常, 鸭脚常, 阿斯通木, 白叶糖胶, 摩那; 云南: “埋丁介”(西双版纳傣语), 野橡胶, 马灯盆。

功效 叶、树皮: 止咳平喘。用于急性慢性支气管炎; 乳汁: 外用止血。

备考 根常易混作萝芙木用, 应注意鉴别。

#### 7230093 见 7230094a

#### 7230094

*Wrightia laevis* Hook. f. --- *W. hainanensis* Merr. --- *W. tinctoria* R. Br. var. *laevis* (Hook. f.) Pichon

植物名 蓝树《中国植志》

药材名 蓝树《汇编》

文献名 倒吊笔《广西本草选编》, 光叶倒吊笔《云南种录》, 海南倒吊笔《广西植录》

地方名 木蓝(海南、广西); 广东: 七星树(阳江); 海南: 山蓝(儋县), 滞良(东方), 蓝木(澄迈), 岭刀把(琼中、定安); 广西: [大青叶](邕宁), 大蓝靛(藤县), 木靛(苍梧), 羊角汁(东兴), 米木(上思), [板蓝根](博白、南宁), 野蓝靛, 野蓝靛树(凌云), 木蓝木(灵山)。

功效 根、叶: 有小毒。止血, 止痛, 消肿生肌。用于跌打损伤, 刀伤止血。

#### 7230094a

*Wrightia pubescens* R. Br.

植物名 倒吊笔《中国植志》

药材名 倒吊笔《汇编》

文献名 倒吊蜡烛《生草药性备要》, 章表根《药典》

地方名 广东: 九龙木、刻印木(阳春), 九脉木(兴宁), 土北芪(新会、外海), 枝桐木、猪松木(茂名), 屐木(廉江), 常子(海康), 墨柱根、章表、神仙蜡烛(广州), 绵羊皮(双水); 海南: 马凌(临高), 乳酱树(儋县), 苦常(陵水、澄迈、嘉积), 刀柄(黄流、三亚), 猪菜母(白沙), 苦杨(兴隆), 细姑木。

功效 根、根皮或茎: 祛风利湿, 化痰散结。用于

颈淋巴结结核, 风湿性关节炎, 腰腿痛, 慢性支气管炎, 黄胆型肝炎, 肝硬化腹水, 白带; 叶: 祛风解表。用于感冒发热。

**7230095**

*Wrightia sikkimensis* Gamble --- *W. schlechteri* Lev. ---

*W. hainanensis* Merr. var. *chingii* Tsiang

植物名 个溲《中国植志》

药材名 个溲《广西药录》

文献名 两广倒吊笔、广西倒吊笔《广西植录》, 倒吊笔、锡金倒吊笔《云南种录》

功效 叶: 有小毒。止血, 散瘀消肿。外用于跌打损伤, 痈疮, 止血。

**7230096**

*Wrightia tomentosa* (Roxb.) Roem. et Schult.

植物名 胭木《中国植志》

药材名 胭木《汇编》

文献名 毛倒吊笔《广西植录》

功效 茎皮、根: 解毒消肿。用于蛇咬伤; 叶: 用于小儿疳积。

**7231 萝藦科 Asclepiadaceae****7231001**

*Adelostemma gracillimum* (Wall. ex Wight) Hook. f.

植物名 乳突果《中国植志》

药材名 乳突果《广西药录》

文献名 无冠藤《中国植志》

地方名 广西: 细老鼠偷瓜(邕宁), 乳浆藤(田林); 贵州: (隔山消)(威宁)。

功效 果实: 外用于疮疖, 蛇咬伤; 根: 消食健胃, 理气止痛。用于食积饱胀, 胸腹胀痛, 胃脘疼痛, 消化不良。

**7231002**

*Asclepias curassavica* L.

植物名 马利筋《中国植志》

药材名 马利筋《汇编》

文献名 莲生桂子花《名实图考》, 细牛角仔树《南方毒植》

地方名 山桃花(福建、广西); 福建: 状元红(闽南), 羊不离胎, 莲生桂子草, 七姊妹, 山玉凤, 鹤嘴绒; 广东: 金凤花(广州), 羊角丽, 唐绵, 黄花仔, 芳草花; 海南: 四季花, 金凤; 广西: 羊角(天等), 贼佬戎、野辣椒(苍梧), 野鹤嘴(南宁), 透云花(北海); 贵州: 草木棉; 四川: 刀口药; 云南: 竹林标(思茅、红河), 金银花台(保山), 细叶红花, 野辣子, 金盏银台, [土常山](玉溪), 辣子七, 对叶莲, 老鸦嘴, 红花矮陀陀。

功效 全草: 有毒。消炎止痛, 止血。用于乳腺炎, 痈疖, 痛经。外用于骨折, 刀伤, 湿疹, 顽癣。

**7231003**

*Biondia chinensis* Schltr.

植物名 秦岭藤《中国植志》

药材名 秦岭藤《神农架药录》

地方名 湖北: 土麻黄(神农架)。

功效 全株: 解表, 祛风散寒。

**7231004**

*Biondia henryi* (Warb. ex Schltr. et Diels) Tsiang et P.

T. Li --- *Cynanchum henryi* Warb. ex Schltr. et Diels

植物名 青龙藤《中国植志》

药材名 青龙藤《汇编》

地方名 陕西: 九龙香、埋香(镇坪), 还阴草、捆仙绳(旬阳), 捆仙绳、藤叶细辛、青龙筋(平利), 青龙带(山阳)。

功效 带根全草: 活血舒筋, 理气祛风。用于跌打损伤, 下肢冷痛麻木, 风湿手足麻木, 牙痛。

**7231005**

*Biondia insignis* Tsiang

植物名 黑水藤《中国植志》

药材名 黑水藤《云南》

地方名 湖南: “罗公闷背”(蓝山县瑶名); 贵州: 黑骨藤。

功效 全株: 清热解毒。用于毒蛇咬伤。

**7231005a**

*Brachystelma edule* Coll. et Hemsl.

植物名 润肺草《中国植志》

药材名 润肺草《汇编》

文献名 短梗藤《中国植志》, 可食短梗藤《广西药录》

地方名 广西: 地饼(南宁)。

功效 块根: 润肺, 止咳。

**7231006**

*Brachystelma kerrii* Craib

植物名 长节润肺草《中国植志》

药材名 长节润肺草《广西药录》

功效 块根: 用于毒蛇咬伤。

**7231007a**

*Calotropis gigantea* (L.) Dryand. ex Ait. f.

植物名 牛角瓜《中国植志》

药材名 牛角瓜(广东、海南)

地方名 羊浸树(广东、云南); 广东: [断肠草](徐闻); 海南: 五狗卧花心(崖县); 广西: 哮喘树, 越南枇杷; 四川: 牛耳树, 牛角瓜叶; 云南: 大麻风药, 野攀枝花。

功效 叶: 有毒。祛痰定喘。用于百日咳, 支气管炎, 哮喘; 根皮: 有毒。外用于疥癣。

**7231008**

*Calotropis procera* (L.) Dry. ex Ait. f.

植物名 白花牛角瓜《中国植志》

功效 植株: 乳汁含多种强心甙, 供药用; 叶: 用于哮喘。

**7231009**

*Ceropegia christenseniana* Hand. -Mazz.

植物名 短序吊灯花《中国植志》

药材名 吊灯花《贵州草药》

地方名 贵州: 小鹅儿肠。

功效 全草: 清热解毒。用于无名肿毒, 骨折。

**7231010**

*Ceropegia dolichophylla* Schltr. --- *C. dolichophylla* Schltr. var. *brachyloba* Hand. -Mazz. --- *C. profundorum* Hand. -Mazz. --- *C. longifolia* Wall. ssp. *sinensis* H. Huber var. *sinensis* H. Huber

植物名 长叶吊灯花《中国植志》

药材名 双剪菜《贵州草药》

地方名 贵州:〔蕤参〕。

功效 根:祛风除湿,补虚。用于脚气病,劳伤虚弱。

**7231011**

*Ceropegia driophila* Schneid.

植物名 巴东吊灯花《中国植志》

药材名 巴东吊灯花《神农架药录》

地方名 湖北:倒吊和尚(神农架)。

功效 根:清热解毒。用于毒蛇咬伤,蜂螫伤,疖疽疮毒。

**7231012**

*Ceropegia mairei* (Levl.) H. Huber

植物名 金雀马尾参《中国植志》

药材名 金雀马尾参《名实图考》

文献名 普吉藤《高植图鉴》

地方名 云南:〔太子参〕(楚雄)。

功效 根:用于癰疮。

备考 普古藤系由该植物产于云南昆明大普吉而得名。

**7231013**

*Ceropegia pubescens* Wall.

植物名 西藏吊灯花《中国植志》

药材名 对叶林《贵州草药》

文献名 柔毛吊灯花《中药大辞典》

地方名 贵州:底线参,〔蕤参〕。

功效 全草或根:解毒,杀虫。用于蛔虫病,疔疮。

**7231014**

*Ceropegia trichantha* Hemsl. --- *C. angustilimba* Merr.

植物名 狭瓣吊灯花《广西植志》

药材名 吊灯花《中国植志》

地方名 广西:宽筋藤(容县)。

功效 全株:用于癰癤,骨折,跌打损伤,疮疖。

**7231015**

*Cryptolepis buchananii* Roem. et Schult. --- *Trachelospermum cavaleriei* Levl.

植物名 古钩藤《中国植志》

药材名 古钩藤《汇编》

文献名 白叶藤《药学报》

地方名 老鸦嘴(广东、广西),奶浆藤(广西、云南);广东:羊麻,羊排果,扣过杯;广西:白马连鞍(龙州、宁明、凌云),牛角藤(那坡),母乳藤(百色),大老鸦藤,大叶白叶藤,个卜汁,牛奶藤,乳汁藤(隆林),乳藤、麻雀嘴(靖西),海上霸王(百色、乐业),断肠草(凌云);贵州:大奶浆藤;云南:大晴消、白都宗、〔羊角藤〕、羊排角(红河),半架牛(永平),白浆藤(临沧),小瓣角,阿齐那

(楚雄彝名),牛挂脖子藤。

功效 根、叶:有毒。舒筋活络,消肿止痛,解毒。用于腰痛,腹痛,跌打损伤,骨折,痈疮,癰。

**7231016**

*Cryptolepis sinensis* (Lour.) Merr. --- *Cryptolepis elegans* Wall.

植物名 白叶藤《中国植志》

药材名 白叶藤《汇编》

地方名 红藤仔(广东、海南);广东:七娘藤(广州),红丝线(惠阳),脱皮藤(博罗),扛棺回;海南:飞扬藤,牛蹄藤,〔羊角藤〕,淋汁藤,乌仔藤(崖县);广西:上树蛇花藤,勾汉,密疏根,白奶藤,沫藤,母乳藤(龙州),对面笑(博白),〔羊角扭〕(北流),乳汁藤、细羊角扭(陆川),铁边、〔蜈蚣草〕(苍梧),篱尾蛇(昭平),藤角扭(藤县)。

功效 全株:有小毒,清热解毒,散瘀止痛,止血。用于肺结核咯血,肺热咯血,胃出血,毒蛇咬伤,疮毒溃瘍,疥疮,跌打刀伤。

**7231017**

*Cynanchum alatum* Wight et Arn.

植物名 翅果杯冠藤《中国植志》

功效 根:有小毒。祛风除湿,解毒镇痉。用于风湿骨痛,风疹瘙痒,癰瘤,狂犬咬伤,毒蛇咬伤。

**7231018**

*Cynanchum amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Hemsl. --- *Vincetoxicum amplexicaule* Sieb. et Zucc. --- *Antitoxicum amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Pobed.

植物名 黄绿花合掌消(拟)

药材名 合掌消《汇编》

文献名 野英豆《满蒙野卉》,山老鸦瓢子《指示植物》

地方名 〔白薇〕(黑龙江、江西),野豆蕉(东北);安徽:〔白前〕(泗洪),水马尾,拱地龙;江西:土胆草,合同硝,合掌草,甜胆草,硬皮草;湖南:〔对坐草〕,〔仙人对坐草〕(常德),〔神仙对坐草〕;云南:“诸培挪茨”(楚雄彝名),豆叶参;其他:肿三消,抱茎白薇。

功效 根:祛风,行气,消肿,解毒。用于风湿性关节炎,腰痛,偏头痛,跌打损伤,月经不调,乳腺炎。外用于疔疮肿毒。

**7231019**

*Cynanchum amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Hemsl. var. *castaneum* Makino --- *Vincetoxicum amplexicaule* Sieb. et Zucc. var. *castaneum* Kitagawa ReP.

植物名 合掌消《名实图考》、《秦岭植志》

药材名 合掌消《汇编》

文献名 紫花合掌消《中国植志》,栗色花合掌消《药学报》

地方名 〔白薇〕(黑龙江、辽宁、湖北),土胆草、甜胆草(江西、湖南);陕西:野留心波子(神木);湖南:合掌草,合掌硝,硬皮草。

功效 根:祛风,行气,消肿,解毒。

备考 《秦岭植志》(1983)称:本种根味甜,故有

“甜甘草”之称。

### 7231020

*Cynanchum ascyrifolium* (Franch. et Sav.) Mats-  
ura. --- *Vincetoxicum ascyrifolium* Franch. et Sav. ---  
*Vincetoxicum acuminatum* Decne. --- *Cynanchum acumi-*  
*natifolium* Hemsl.

植物名 潮风草《中国植志》

文献名 [尖叶白前]《东检》

地方名 [白薇]、小葛瓢、大葛瓢(东北);内蒙古:  
[白前];陕西:老君须(太白山)。

功效 根:有似白薇的作用。

### 7231021

*Cynanchum atratum* Bunge --- *Vincetoxicum atratum*  
Morr. et Decne. --- *Alexitoxicon atratum* (Bunge) Pobed.

植物名 白薇《中国植志》

药材名 白薇《本经》、《药典》

文献名 莨、春草《尔雅》,白薇《本草经集注》,白幕、  
薇草、骨美《别录》,知微老《药谱》,白龙须《名实图考》,  
草常山《满州植录》,白味《和汉药名汇》,龙胆白薇《药  
材资料汇编》,直立白薇、直生白薇《药理学》,拉瓜瓢  
《中草药学》

地方名 三百根(湖南、贵州),山烟根子(东北、北  
京),[白前](陕西、山东、江苏、湖南、广东、广西),白马  
尾(江苏、安徽),老君须(陕西、湖南、四川、贵州),老虎  
瓢(陕西、江苏),婆婆针线包(贵州、云南),老瓜瓢根、  
山黄瓢根、老和尚帽子、羊奶子、拉瓜瓢根(东北);吉  
林:“阿好俊”(朝名);辽宁:老角(旅大),老鸱瓢根;北  
京:小叶鸡芦(京都);河北:山老鸱瓢;内蒙古:“默道  
格”、“奇勒马”(蒙名);陕西:山烟,马蹄香、双二连(镇  
坪),九龙须(柞水);山东:大瓜葵(莱阳),大瓢儿瓜(威  
海),山瓜拉瓢、瓢儿瓜(昆崙山),老槌子夹(昆崙山、牙  
山、艾山),老槌甲根、金金甲根(烟台);江苏:山鸱瓢,  
白马薇(盱眙),白鸱瓢;上海:东白薇;浙江:带屯三屯  
青(天目山);安徽:嫩白薇;湖南:上天梯、大向沙(古  
丈),九根角(新宁),土参须(衡南),双角果(汝桂),毛  
莉箭、八盖王(黔阳),[一枝箭],木老君,细辛根,老龙  
角(凤凰),羊角细辛(永顺),大百砂(吉首、花垣),节节  
空(溆浦),树老君须(蓝嘉),[隔山消](桃源);广西:土  
白前(凌云),牛角细辛(全州),牛角胆草,百荡草,阿婆  
针,苦胆草,独角牛(昭平),石须(大新);四川:白为,正  
骨草,绒针,婆婆衣;贵州:针线盒;云南:大白薇,杨角  
柳(曲靖);其他:大龙须,牛角枫,底线补,大向砂。

功效 根、根茎:清热凉血,利尿通淋,解毒疗疮。  
用于湿邪伤营发热,阴虚发热,骨蒸劳热,产后血虚发  
热,热淋,血淋,痢疽肿毒。

### 7231022

*Cynanchum auriculatum* Royle ex Wight --- *Endotropis*  
*auriculata* Decne. --- *Vincetoxicum auriculatum* O. Kuntze  
--- *Cynanchum boudieri* Lev. et Van.

植物名 牛皮消《救荒本草》、《中国植志》

药材名 白首乌(江苏)

文献名 飞来鹤《名实图考》,奶浆藤、隔山鞭《天宝

本草》,隔山鞭《分类草药性》,胡苏《南京药草》,耳叶牛  
皮消《中国药植志》

地方名 白何首乌(江苏、江西),野蕃薯(浙江、江  
西),隔山消(陕西、安徽、湖北、湖南、广西、四川、贵  
州),牛皮冻(湖南、四川);江苏:七股莲,[何首乌](南  
京、茅山),山鸱藤,老牛瓢,老虎瓢,飘飘藤,瓢瓢藤;浙  
江:山番茄(温州、乐清、文成),[白木香](淳安、宁波、  
天台),[白番茄](平阳);安徽:刀口药,土参,洋辣椒;  
江西:先苦后甜、剪蛇珠(婺源),万世竹(景德镇),上花  
旗参(定南),张果老(庐山),山步虎,[万寿竹],铁罗  
汉;福建:墙基薯(福州);河南:牛尿筋;湖南:一肿三  
消,[天花粉](长沙);广东:和平参、山花旗(惠阳);广  
西:大肚南省、过山消、[羊角扭](富川),[沙参](钟  
山),黑党参(金秀);四川:[白薇][根],野红苕(成都、  
蓬溪),白苕(成都、重庆);贵州:羊角藤(息水),[狼毒]  
(湄潭);其他:耳叶隔山消,土白薇,庐山何首乌,鬼角。

功效 块根:有小毒。健胃消积,解毒消肿。用于  
食积腹痛,胃痛,小儿疳积、痢疾。外用干毒蛇咬伤,疔  
疮;根:用于角膜白斑,赘肉。

### 7231023

*Cynanchum bungei* Decne. --- *Asclepias hastata* Bunge

植物名 泰山白首乌《品种论述》

药材名 泰山白首乌《品种论述》

文献名 白首乌《中国植志》,戟叶牛皮消《汇编》,大  
根牛皮消《中药大辞典》,柏氏牛皮消《中草药学》,本氏  
牛皮消《中药通报》,山东何首乌《山东经植》

地方名 白首乌藤(山东、安徽);北京:山葫芦(京  
郊);河北:地葫芦,野山药;内蒙古:“本吉-音-特莫根-  
呼呼”(蒙名);山东:白何首乌(济南),[何首乌](临朐、  
泰山),和尚乌。

功效 块根:补肝肾,强筋骨,益精血。用于肝肾  
不足,腰膝酸软,失眠,健忘。

### 7231024

*Cynanchum callalata* Ham. ex Wight

植物名 美翼杯冠藤《中国植志》

药材名 大白药《云南中草药》

地方名 云南:小瓣果、蛆藤(保山),萝藤藤(腾冲)。

功效 根:有毒。舒筋活络,补虚平喘。用于夜  
尿,哮喘,心悸,风湿性关节炎,刀伤,骨折。

### 7231025

*Cynanchum chekiangense* M. Cheng ex Tsiang et P. T. Li

植物名 蔓剪草《中国植志》

药材名 蔓剪草《浙江药植志》

文献名 剪草《普济本事方》

地方名 浙江:大藤山靛青(临安),四叶对剪草(天  
台),蔓白薇;河南:四叶细辛(商城);湖北:对叶草(神  
农架)。

功效 根:理气健胃,祛暑,散瘀消肿,杀虫。用于  
胃寒疼痛,中暑,跌打损伤,疥疮。

### 7231026

*Cynanchum chinense* R. Br. --- *Cynanchum pubescens*  
Bunge

植物名 鹅绒藤《中国植志》

药材名 鹅绒藤《宁夏中草药》

文献名 老牛肿《高植图鉴》, 羊奶角角、牛皮消《中药大辞典》

地方名 辽宁: 祖师花、盘龙叶(锦州); 河北: 白龙须(百花山); 山西: 仙人丹; 陕西: 趋姐姐叶; 江苏: 天鹅绒藤(苏北), 毛萝菜、河瓢棵子(连云港), 飘飘藤(射阳、启东); 河南: [白鲜皮], 羊角秧, 软毛牛皮消; 其他: 牛犄角蔓。

功效 根、乳汁: 祛风解毒, 健胃止痛。用于小儿食积; 藤茎中的乳汁: 外用于寻常性的疣赘。

#### 7231027

*Cynanchum corymbosum* Wight --- *Cynoctonum corymbosum* Decne.

植物名 刺瓜《中国植志》

药材名 刺瓜藤(拟)

文献名 乳汁藤《广西药录》, 刺果牛皮消《广西植录》

地方名 广东: 乳蚕(惠阳); 云南: 小刺瓜, 野苦瓜, [土人参]。

功效 全草: 益气, 催乳, 解毒。用于乳汁不足, 神经衰弱, 慢性肾炎。

#### 7231028

*Cynanchum decipiens* Schneid.

植物名 豹药藤《中国植志》

文献名 西川鹅绒藤《中国植志》

备考 根: 有毒, 有混作青羊参(*Cynanchum otophyllum* Schneid.) 俗称和使用。挖出根后捣碎可作毒弩箭。

#### 7231029

*Cynanchum forrestii* Schltr.

植物名 群虎草《高植图鉴》

药材名 群虎草(汇编)

文献名 [大理白前]《中国植志》, 丽江白薇《云南药录》

地方名 白薇(青海、云南、西藏); 甘肃: 狗毒; 青海: “奥豆毛娘”(藏名); 云南: 白龙须、蛇辣子(昆明、嵩明、丽江), 小白薇, 搜山虎。

功效 根、根茎: 清热凉血, 利尿消肿。

#### 7231030

*Cynanchum giraldii* Schltr.

植物名 峨眉牛皮消《中国植志》

文献名 [峨眉白前]《种称》

地方名 湖北: 奶浆藤(神农架); 四川: 青羊参(峨眉山), 牛尾橐。

功效 根: 清热解暑, 消食健胃; 藤茎: 用于痈疽疮毒。

#### 7231030a

*Cynanchum glaucescens* (Decne.) Hand.-Mazz. --- *Pentstemon glaucescens* Decne.

植物名 芫花叶白前《品种论述》

药材名 白前《本经》、《药典》

文献名 石兰、嗽药《唐本草》, 舒州白前《大观本

草》, 粉绿牛皮消《广西植录》

地方名 水竹消(陕西、福建、湖南、广西), [白薇](江苏、江西、湖南、广西), 沙消(浙江、江西); 陕西: 洋奶子(洋县); 浙江: 土白前(建德), 竹叶白前、鹅管白前; 江西: 沙箭; 福建: 消结草(福州), 乌梗仔(屏南), 溪瓢羹。

功效 根及根茎: 降气消痰止嗽。用于肺气壅实, 咳嗽痰多, 胸满喘急。

备考 白前与白薇是两种功效不同的中药, 在全国颠倒错用的情况非常严重。很多地区误以白前为白薇, 以白薇为白前。作者通过本草考证, 与药材主产区的实地调查, 终于搞清了《唐本草》记载的白前为柳叶白前 *Cynanchum stauntonii* 和芫花叶白前 *C. glaucescens*, 而古代传统药用白薇应为 *C. atratum*。

#### 7231031

*Cynanchum hancockianum* (Maxim.) Al. Iljinski --- *Pycnostelma lateriflorum* Hemsl.

植物名 阔叶徐长卿(汇编)

药材名 牛心朴(内蒙古、甘肃)

文献名 侧花徐长卿《青藏药图》, [华北白前]《中国植志》, 对叶草《沙漠药植》

地方名 黑朴(陕西、甘肃), 竹叶细辛(西北); 内蒙古: 牛心朴子, “达浪吐鲁”(蒙名); 青海: “豆胃娘”(藏名), [白前]; 其他: 牛心秧, 瓢菜。

功效 根、带根全草: 有毒。活血, 止痛, 消炎。外用于各种关节疼痛, 牙痛, 疮疖; 种子: 退烧止泻。用于胆囊炎。

#### 7231032

*Cynanchum hydrophilum* Tsiang et Zhang

植物名 水白前《中国植志》

药材名 水白前《四川中药志》

地方名 四川: 白前。

功效 根茎及根: 降气消痰止嗽。

#### 7231033

*Cynanchum inamoenum* (Maxim.) Loes.

植物名 竹灵消《中国植志》

药材名 川白薇《四川中药志》

文献名 老君须、婆婆针线包《草木便方》, 正骨草、婆婆衣、绒针《民药汇编》, 恶牛皮消《陕西中草药》

地方名 白薇(华北、四川、西藏), 雪里蟠桃(安徽、四川); 陕西: 九造台, 牛角风, 粗梗白薇(太白山); 山东: 大羊角瓢(临沂), 瓢儿瓜(昆崮山); 湖北: 土白薇(神农架); 四川: 白为, 白龙须; 贵州: 小白薇。

功效 根及根茎: 清热凉血, 退热除烦。用于阴虚发热, 久热不退, 产后发热, 虚烦失眠。

#### 7231033a

*Cynanchum komarovii* Al. Iljinski

植物名 老瓜头《中国植志》

药材名 老瓜头《品种论述》

地方名 [白前](甘肃、宁夏)

功效 西北地区以其根与根茎作白前用。

#### 7231034

*Cynanchum mooreanum* Hemsl. *Vincetoxicum chinense* S. Moore --- *Cynanchum affine* Hemsl. --- *Vincetoxicum affine* O. Kuntze

植物名 毛白薇(拟)

药材名 毛白薇(拟)

文献名 [毛白前]《中国植志》,白地生《汇编》

地方名 白薇(江苏、湖北),老君须(浙江、广东);江苏:[龙胆白前];浙江:对叶百条根(温州),百条根(宁波);湖北:蔓生白薇;广西:山薷菜(博白),近缘牛皮消。

功效 根:清热解表,行气健脾,活血通经。用于感冒,中暑,痞积,月经不调,肠结核;全株:外用于疮疖。

#### 7231035

*Cynanchum officinale* (Hemsl.) Tsiang et Zhang --- *Pentstemon officinalis* Hemsl. --- *Cynanchum bodinieri* Schltr. ex Levl. --- *Cynanchum amphibolum* Schneid.

植物名 朱砂藤《中国植志》

药材名 朱砂藤《汇编》

文献名 湖北白前《种称》

地方名 江西:[赤芍];湖北:[朱砂莲],见肿消(神农架);广西:野红薯藤;四川:[桔梗],托腰散;贵州:隔山消;云南:[白敛]。

功效 根:有小毒。理气,止痛,强筋骨,除风湿,明目。用于胃痛,腹痛,腰痛,跌打损伤,癰疽,毒蛇咬伤。

#### 7231036

*Cynanchum orophyllum* Schneid.

植物名 青羊参《中国植志》

药材名 青羊参《名实图考》、《汇编》

文献名 [白敛]《滇南本草》,奶浆草、大耳白薇《高植图鉴》

地方名 [白首乌](湖北、云南);四川:奶浆藤;贵州:牛尾七(梵净山);云南:牛尾参、青阳参、青羊参、白岑、闹狗药(昆明),小绿羊角藤(临沧),小白敛(保山),对节参、断节参(红河),地藕(大理、保山),白药根、大白药根、白芪、白药、奶参(丽江),[白芍](楚雄),千年生、白石参、毒狗药、羊角参、黑阳参、西河参、脱骨参,“肉已勒齐”(楚雄彝名)。

功效 根:有毒。祛风除湿,解毒镇痉。用于风湿骨痛,风疹瘙痒,癰疽,狂犬咬伤,毒蛇咬伤。

#### 7231037

*Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitagawa --- *Asclepias paniculata* Bunge --- *Pycnostelma chinense* Bunge ex Decne. --- *Pycnostelma paniculatum* (Bunge) K. Schum.

植物名 徐长卿《中国植志》

药材名 徐长卿《本经》、《药典》

文献名 鬼督邮《本经》,石下长卿《别录》,别仙踪《图经》,尖刀儿苗《救荒本草》,料刁竹《生草药性备要》,英雄草、料吊《本草求真》,摩何尊《本草纲目启蒙》,竹叶细辛、[獐耳草](纲目拾遗),[上细辛],[九头狮子草]《名实图考》,生竹(岭南采药录),铃柴胡《植物

学大辞典》

地方名 刁竹(江西、广东、广西、云南),一枝香(江苏、浙江、安徽、江西),山刁竹(福建、广东、广西、云南),斩龙草、铜胆草、黑薇、蜈蚣草(东北),[白前](黑龙江、陕西、青海),[白薇](陕西、湖南),对叶草(河北、陕西),[细辛](陕西、山东、四川),柳叶细辛(陕西、浙江、四川),投骨草(辽宁、山东),[透骨草](黑龙江、河北、内蒙古、陕西、甘肃、山东),逍遥竹(江西、湖北、云南),遥竹道(江西、湖北),铜锣草(东北、山东),瑶山竹(江西、广东、广西),寮刁竹(河北、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川),药王、蛇利草(广东、广西),天竹香(浙江、福建);内蒙古:“占龙-乌布斯”(蒙名);陕西:白玉(丹凤),竹叶七(镇坪);山东:七星草;江苏:中心草,中心香,独脚虎;浙江:七里香、九里香(嵊县),天竹儿(龙泉),天竹百条根(温州、洞头);安徽:小柳叶茶,小白薇,香草,寥刁,鱼丁草,鱼鳞草(滁县),鬍子草;江西:一线香(婺源),一枝箭,马尾瑶道,钓鱼竿,满山香;福建:天地根、刁竹根(南平),天竹,天竹根(松溪、政和、福安、福州、宁德、霞浦),观音竹(古田、永安、晋江、泉州、莆田),柳枝癩(同安、晋江、南安),蛇草(福州、闽侯),溪柳;河南:谷荏细辛,痢止草;湖北:牙蚌屑;湖南:三百根,上天梯,老劲树(永兴),老君须,香摇边(新邵),连翘(涟源),自动草、遥竹硝、瑶竹硝(长沙),摇边竹,摇竹消,黄毛细辛(新晃),腰脚青(攸县);广东:一枝竹(连山),刁竹,干云竹,条山竹,英雄寮吊竹,霸上高;广西:百斤草(来宾),对股草,条刁竹,要变竹,瑶刁竹;四川:寮刁细辛;贵州:小对叶草,对月草,对月莲,对叶莲;云南:对叶小疳药,白细辛,对节连(曲靖)。

功效 根、根茎:祛风化湿,止痛止痒。用于风湿痹痛,胃痛胀满,牙痛,腰痛,跌扑损伤,荨麻疹,湿疹。

#### 7231038

*Cynanchum sibiricum* Willd. --- *Cynanchum acutum* L. var. *longifolium* Ledeb.

植物名 戟叶鹅绒藤《中国植志》

药材名 沙牛皮消《沙漠药植》

文献名 羊奶角、羊奶子、乳藤、拉拉蔓《沙漠药植》

地方名 新疆:“对克姆牛”(维名)。

功效 根:化湿利水,祛风止痛。用于急、慢性肾炎,水肿,胃及十二指肠溃疡,慢性胃炎,白带过多,风湿痛;全草:下奶,补虚。用于体弱缺乳;果:用于痢疾,腹泻。

#### 7231039

*Cynanchum stauntonii* (Decne.) Schltr. ex Levl. --- *Pentasacme stauntonii* Decne. --- *Cynanchum linearifolium* Hemsl. --- *Vincetoxicum linearifolium* O. Kuntze --- *Pentasacme brachyantha* Hand.-Mazz. --- *Cynanchum stauntonii* Hand.-Mazz.

植物名 柳叶白前《品种论述》

药材名 白前《别录》、《药典》

文献名 石蓝、嗽药《唐本草》

地方名 毛白前(华东),水杨柳(浙江、江西、安徽、湖南、广西),水豆粘(江西、广西),[白薇](江苏、福建、



广西);〔西河柳〕(江西、湖南);鹅管白前(上海、浙江、湖北、广西);草白前(浙江、江西);江苏:〔草白薇〕(无锡);〔鹅管白薇〕(镇江);大鹤瓢(邳县);白马虎,河花柳;上海:鹅白前;浙江:红前(建德);水杨英,白前草,竹叶白前,软白前;安徽:小河柳,水草柳,顺河柳;江西:水柳子、石杨柳(德兴);水拖藤,光北草(大余);江杨柳;福建:水柳(松溪、政和、福安、宁德、周宁等);九层楼(福清);水天竹(浦城);水柳树(清流);千根秤、百条根(南安);柳叶剪、白盾(福安);溪柳、溪水柳(松溪、政和);湖北:黑鱼头;湖南:土白前(衡山);杨禾根(常德);杨和根(长沙);酒叶草;广东:细了草,细叶蓼,细蓼仔;广西:水了刁(梧州);水了刁竹(平乐);水杨柳草。

功效 根茎及根:降气消痰止咳。用于肺气壅实,咳嗽痰多,胸满喘息。

#### 7231040

*Cynanchum taihangense* Tsiang et Zhang

植物名 太行白薇(拟)

文献名 〔太行白前〕《中国植志》

地方名 河南:白薇(辉县、济源)。

备考 河南省辉县、济源等县山区群众用本种的根当白薇使用,究竟能否作白薇入药,尚待进一步研究。

#### 7231041

*Cynanchum thesioides* (Freyn) K. Schum. --- *Asclepias sibirica* L. --- *Cynanchum sibiricum* (L.) R. Br. --- *Vincetoxicum sibiricum* Deene. --- *Antitoxicum sibiricum* Pobed.

植物名 地梢瓜《中国植志》

药材名 地梢瓜《救荒本草》、《汇编》

文献名 女青《本草新注》,山角、地瓜儿《植物名汇》,砂奶奶、列骨瓢《指示植物》,雀瓜、罗汉草、细叶牛皮消《沙漠药植》

地方名 地瓜子(内蒙古、新疆);地葛、祖子花(东北);地梢花(江苏、安徽);马奶奶(内蒙古、陕西);吉林;地瓜瓢;辽宁:盘龙草;内蒙古:“都格木宁”、“斗格奴”(乌审旗蒙药名)、“台曼科克”、“特莫根-呼呼”(蒙名);老瓜瓢,沙奶奶;陕西:沙奶草(神木);牛梢瓜,羊奶(蓝田、丹凤);羊奶草(旬阳);安徽:羊巴奶;河南:小丝瓜,羊不奶棵,浮瓢棵,梢瓜。

功效 全草及果实:益气,通乳。用于体虚乳汁不下。外用于瘰子。

#### 7231042

*Cynanchum thesioides* (Freyn) K. Schum. var. *australe* (Maxim.) Tsiang et P. T. Li --- *C. sibiricum* R. Br. var. *australe* Maxim. ex Komar.

植物名 雀瓢《中国植志》

药材名 雀瓢(西北)

地方名 陕西:地瓜瓜、马奶草(靖边);江苏:地梢花(苏南);河南:小丝瓜、羊不奶棵,浮瓢棵,地梢瓜。

功效 全草及果实:益气通乳。

#### 7231043

*Cynanchum versicolor* Bunge --- *Vincetoxicum versicolor* Deene. --- *Vincetoxicum mandshuricum* Hance --- *Cynanchum mandshuricum* Hemsl.

植物名 蔓生白薇《品种论述》

药材名 蔓生白薇《品种论述》

文献名 变色牛皮消《药材学》,白花牛皮消《中国药植图鉴》,知微老《高植图鉴》,〔变色白前〕《中国植志》

地方名 小葛藤、小藤葛、山藤葛、柄苧(东北);〔白前〕(山东、安徽、湖南、广东);白马尾(北京、安徽);半蔓白薇(东北、北京);白薇(东北、北京、河北、山东、安徽);北京:白龙须,变色白薇,蔓白薇;河北:半蔓生白薇;山东:山龙瓜(苍山),瓜拉瓢(威海),瓜萎鞭子(昆崙山),巴子根、蔓生金甲根(烟台),老鞭子夹(蓬莱、牙山),爬山甲(沂水、五莲),苦枝子(崂山),结巴子瓜(荣成);上海:东白薇;安徽:〔东白前〕、〔鲜白前〕(滁县);〔硬白前〕(芜湖)。

功效 根及根茎:清热凉血,利尿通淋,解毒疗疮。用于温邪伤营发热,阴虚发热,骨蒸劳热,产后血虚发热,热淋,血淋,痢疾肿毒。

#### 7231044

*Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers. --- *Asclepias vincetoxicum* L. --- *Vincetoxicum officinale* Moench. --- *Alexitoxicon officinale* Saint-Lager

植物名 催吐白薇(拟)

文献名 〔催吐白前〕《中国植志》,〔药用白前〕《高植图鉴》

功效 根:催吐;种子抽提物:对心脏有类似“羊角拗”的强心作用。

#### 7231045

*Cynanchum wallichii* Wight --- *Vincetoxicum wallichii* O. Kuntze --- *Cynanchum kintungense* Tsiang

植物名 昆明杯冠藤《中国植志》

药材名 断节参《红河中草药》

文献名 金线壶芦《名实图考》,〔昆明白前〕《种称》,假马兜铃《高祖图鉴》

地方名 贵州:团花奶浆根,千担芳;云南:对节参、青洋参(红河),青羊参,黑阳参。

功效 根:壮腰健肾,强筋骨,解毒。用于肾虚腰痛,病后体虚,营养不良,跌打损伤,骨折,狂犬咬伤,荨麻疹。

#### 7231046

*Cynanchum wilfordii* (Maxim.) Hemsl. --- *Cynoctonum wilfordii* Maxim. --- *Vincetoxicum wilfordii* Franch. et Sav. --- *Seutera wilfordii* Pobed.

植物名 隔山消《中国植志》

药材名 隔山消《汇编》

文献名 隔山牛皮消《中国植志》

地方名 无梁藤(湖北、四川),过山瓢(吉林、四川),白首乌(吉林、山东、湖北),白何首乌(吉林、江苏),隔山拐(陕西、湖北、四川);山东:小瓜拉瓢(益都),山葫芦(淄博),山瓜萎、鞭子角(牙山),羊角瓜(海阳),羊角棵子(广饶);〔何首乌〕(蒙山、长清、沂源);湖北:〔白

绞)(恩施),牛角消(神农架)。

功效 块根:补益肝肾,强筋壮骨。用于神经衰弱,阳痿,遗精,腰腿疼痛。

7231047 见 7231030a

#### 7231048

*Dischidanthus urceolatus* (Decne.) Tsiang

植物名 马兰藤(海南)、《中国植志》

文献名 假瓜子金《中国植志》

地方名 湖南;金腰带。

功效 全株:用于风湿腰痛。

#### 7231049

*Dischidia australis* Tsiang et P. T. Li

植物名 尖叶眼树莲《中国植志》

药材名 石瓜子(广西藤县)

文献名 南瓜子金《广西药录》

地方名 广西:川甲草(邕宁),土树瓜(苍梧),马榴根(北流),[石仙桃](武鸣),[瓜子金](隆安)。

功效 全株:清热,解毒,补气血,消肿毒。用于哮喘,咳嗽,湿疹,疮痒,关节炎。

#### 7231050

*Dischidia chinensis* Champ. ex Benth.

植物名 眼树莲《中国植志》

药材名 眼树莲《广西药录》

文献名 瓜子核《中草药图》,金瓜核《广西中药志》,石瓜子《汇编》

地方名 上树鳖,翼鱼草(广东、广西),[瓜子金](海南、广东、广西);海南:滴锡藤;广西:上木占达,上石瓜子,小耳环,上树瓜子(凌云),[石仙桃](上思),乳汁藤(陆川),望水王仙桃(乐业)。

功效 全草:清肺化痰,凉血解毒。用于肺结核,肺热咳血,支气管炎,百日咳,咳血,痢疾,小儿疳积。外用于跌打肿痛,疔疮肿毒,毒蛇咬伤,小儿脓疱疮。

#### 7231051

*Dischidia esquirolii* (Levl.) Tsiang

植物名 金瓜核《中国植志》

药材名 金瓜核藤《广西药录》

文献名 黔越瓜子金《云南种录》,瓜子金《云南药录》,瓜子核《广西药录》

地方名 广西:个兴丁,瓜子藤(靖西)。

功效 全草:外用于疥疮;叶:用于目赤肿痛。

#### 7231052

*Dischidia minor* (Vahl) Merr.

植物名 小叶眼树莲《中国植志》

文献名 小瓜子金《植分子报》

地方名 广东:上木鳖;云南:[瓜子金],“麻闭不”(西双版纳傣语),“别不”(傣语)。

功效 叶:用于高热不语,小儿腹部痞硬,腮肿大,眼肿痛。

#### 7231053

*Dolichopetalum kwangsiense* Tsiang

植物名 金凤藤《中国植志》

药材名 金凤藤《汇编》

文献名 广西长梗藤《广西植志》

功效 藤、全株:解毒消肿。用于毒蛇咬伤。

#### 7231054

*Dregea sinensis* Hemsl. --- *Wattakaka sinensis* (Hemsl.) Stapf

植物名 苦绳(浙江)、《中国植志》

药材名 苦绳《汇编》

文献名 南山藤、中华南山藤《汇编》,通光藤《云南药录》,中华假夜来香《中国经植志》

地方名 母猪藤(陕西、宁夏),奶浆藤(贵州、云南),[通光散](四川、云南),[隔山撬](陕西、云南);陕西:豆花藤(镇巴);湖北:水牛角、江溜草(神农架);广西:藤木通(百色);贵州:野泡通;云南:[小木通]、通关散、刀疮药、刀愈药(昆明),白丝藤,白浆草,白浆藤、假夜来香(文山),乌骨藤、萝摩藤(临沧),铁贯藤。

功效 全株:消炎,通乳,利尿,除湿,止痛。用于乳汁不通,小便不利,虚咳,胃痛,风湿疼痛,痈疮疔肿。

#### 7231055

*Dregea sinensis* Hemsl. var. *corrugata* (Schneid.) Tsiang et P. T. Li --- *D. corrugata* Schneid.

植物名 贯筋藤《中国植志》

药材名 贯筋藤《名实图考》、《广西药录》

地方名 广西:藤木通(田林);四川:贯筋绳、蒲滚藤(峨眉山),刀口药;云南:奶浆果(河口)

功效 全株:祛风,通经,下乳。用于黄疸,淋病,少乳,水肿。外用于疮疖,关节强直。

#### 7231056

*Dregea volubilis* (L. f.) Benth. ex Hook. f. - *Wattakaka volubilis* (L. f.) Stapf

植物名 南山藤《中国植志》

药材名 南山藤《汇编》

地方名 假夜来香(广东、广西),[木通](海南、广西);海南:双根藤(澄迈),羊角藤、春筋藤(儋县);广西:上木通,[山木通](南宁、凌云、百色),大果咀彭,木通藤(凌云),鸡屎藤,相木,假猫豆;贵州:各山消;云南:团叶藤,[通光散],苦凉菜、苦菜藤(元江),“帕格牙姆”、“帕格俄姆”、“帕空笋”(傣语),[隔山消]。

功效 全株、根茎:清热,消炎,止吐。用于感冒,气管炎,妊娠呕吐,食管癌,胃癌;茎:利尿。

#### 7231057

*Dregea yunnanensis* (Tsiang) Tsiang et P. T. Li - *Wattakaka yunnanensis* Tsiang

植物名 丽子藤《中国植志》

文献名 奶浆藤《云南药录》,滇假夜来香《云南植志》

地方名 云南:公公藤,云南假夜来香,白血藤,[隔山撬]。

功效 全草:除湿止痛,解毒,健胃消食,通乳。用于胃痛,风湿疼痛,小儿腹胀,催乳。外用于外伤肿痛;根皮:用于虚咳。

#### 7231058

*Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br.

植物名 钉头果《中国植志》

药材名 钉头果《汇编》

功效 全株：用于小儿胃肠病；茎：作催嚏剂；叶：用于肺结核。

备考 本种原产非洲，我国华北和云南有引种。

#### 7231059

*Gongronema nepalense* (Wall.) Decne.

植物名 纤冠藤(海南)、《中国植志》

药材名 纤冠藤《汇编》

地方名 广东：牛奶树；广西：人地龙(平南)，大防己(博白)，双飞蝴蝶(百色)，羊乳藤(南宁)，乳汁藤(藤县)，细羊角(玉林)，睡地金牛(博白)。

功效 全草：祛风活血，通乳。用于腰肌劳损，关节风痛，乳汁不下，子宫下垂。

#### 7231060

*Graphistemma pictum* (Champ.) Benth. et Hook. f. ex Maxim.

植物名 天星藤(海南)、《中国植志》

药材名 天星藤《汇编》

文献名 鸡脚果《高植图鉴》

地方名 海南：罗摩藤；广西：大奶藤(博白、容县)，鸡腿果(博白)，牛奶藤(北流)，奶藤(苍梧)，年藤，骨碗藤(藤县)，对山消(邕宁)。

功效 全株：催乳。

#### 7231061

*Gymnema foetidum* Tsiang

植物名 华宁藤《中国植志》

药材名 跳八丈《云南中草药》

地方名 云南：[木棉](红河、景东)，化肉藤、藤子化石胆(弥勒)，软皮树、臭匙羹藤、[银丝杜仲]、藤子杜仲、橡胶藤(红河)。

功效 根：舒筋活血，安胎止痛。用于跌打损伤，风湿骨痛，腰痛，胎动不安，肾炎，闭经，痛经。

#### 7231062

*Gymnema longiretinaculatum* Tsiang

植物名 会东藤《中国植志》

药材名 会东藤《汇编》

文献名 老妈妈针线包《高植图鉴》

功效 种毛：止血。用于刀伤出血；根：用于心口痛。

#### 7231063

*Gymnema sylvestre* (Retz.) Schult. --- *Gymnema affine* Decne. --- *Gymnema alterniflorum* Merr.

植物名 匙羹藤《中国植志》

药材名 匙羹藤《汇编》

地方名 [羊角藤](海南、广西)，[金刚藤]、饭杓藤、蛇天角(广东、广西)；福建：武靴叶，武靴藤，万根瘡，五更藤，乌鸦藤，鲤鱼橄榄；广东：狗屎藤；海南：猪屎藤(澄迈)；广西：小羊角(南宁)，小羊角扭(藤县、邕宁)，大羊角扭(来宾)，小羊角木(平南)，断肠苦蔓(容县)，老鸦嘴，羹藤，心胀黄(北流)，细叶羊角扭(东兰)。

功效 根及全株：有小毒。清热解毒，祛风止痛。

用于风湿关节痛，脉管炎，痈疽肿毒，毒蛇咬伤。

#### 7231064

*Gymnema tingens* Spreng.

植物名 大叶匙羹藤(海南)、《中国植志》

地方名 广东：猪罗摆；广西：染色无香藤。

功效 根：用于风湿痛；全株：用于小儿麻痹病，肺结核。

#### 7231065

*Gymnema yunnanense* Tsiang

植物名 云南匙羹藤《中国植志》

药材名 化食藤(拟)

文献名 化肉藤《云南中草药》

地方名 云南：化肉丹(玉溪)，藤子化石胆(红河)。

功效 根、叶：消食健胃。用于胃脘饱闷，食肉积滞，体虚，消化不良。

#### 7231066

*Heterostemma alatum* Wight

植物名 醉魂藤(峨眉)、《中国植志》

药材名 醉魂藤《汇编》

文献名 翅脉百灵藤《广西植录》

地方名 广西：对叶羊角扭(藤县)；贵州：老鸦花、[野豇豆](兴义)。

功效 根、全株：除湿，解毒，截疟。用于风湿脚气，胎毒，疟疾。

#### 7231067

*Heterostemma esquirolei* (Lev.) Tsiang

植物名 贵州醉魂藤《中国植志》

药材名 贵州醉魂藤《贵州药录》

文献名 黔桂醉魂藤、黔桂百灵藤《广西植录》

地方名 贵州：老鸦花，野豇豆。

功效 根或全草：除湿，解毒。用于风湿脚气，胎毒，疟疾。

#### 7231068

*Heterostemma oblongifolium* Cost.

植物名 催乳藤《中国植志》

药材名 催乳藤《汇编》

文献名 长圆叶醉魂藤《广西植录》

地方名 广西：奶汁藤。

功效 全株：催乳。用于乳汁不下。

#### 7231069

*Holostemma annulare* (Roxb.) K. Schum. --- *H. adakodien* J. A. Schultes

植物名 绞剪藤《中国植志》

药材名 绞剪藤《汇编》

文献名 绞剪藤《广西植录》

地方名 广西：金丝花，奶汁藤(隆林)。

功效 全株：用于产后虚弱，少乳。

#### 7231070

*Hoya carnosa* (L. f.) R. Br.

植物名 球兰《中国植志》

药材名 球兰《汇编》

文献名 玉蝶梅《名实图考》，玉叠梅《赣州志》

地方名 牛嘴舌、石壁梅、金丝草、金雪药、金雪球、铁线架(华南),爬岩板(广东、贵州),草鞋板(广东、四川),铁脚板(福建、广西),蜡兰(福建、广东);浙江:天灵厚(温州、洞头);福建:牛舌癭(漳浦、诏安),寿球花(泉州),厚叶草,金丝叶(福州),铁线草,铁箬杯,肺炎草(厦门),绣球龙(泉州),绣球叶,绣球花,绣球花藤,雪梅,雪球;广东:玉绣球;广西:大石仙桃,大叶石仙桃,马骝解,狗舌藤,厚叶藤(那坡),达斗藤(龙州)。

功效 叶、藤茎、全草:清热解毒,祛风利湿。用于流行性乙型脑炎,肺炎,支气管炎,睾丸炎,风湿性关节炎,小便不利。外用于痈肿疔疮。

## 7231071

*Hoya fungii* Merr.

植物名 护耳草《中国植志》

药材名 护耳草《汇编》

文献名 冯氏球兰《广西药录》

地方名 打不死(海南、广西);广西:大奶汁藤(龙州),九牛力(上林),仙人桃(来宾)。

功效 全株:用于跌打损伤,脾肿大,吐血,骨折。外用于风湿病。

## 7231072

*Hoya lancilimba* Merr.

植物名 荷秋藤《中国植志》

药材名 剑叶球兰《广西药录》

文献名 荷球藤《中国植志》

地方名 广西:大叶石仙桃、五中土(大瑶山),石龙藤(岑溪)。

功效 茎、叶:消肿驳骨。用于跌打刀伤。

## 7231073

*Hoya lancilimba* Merr. f. *tsai* (Merr.) Tsiang

植物名 狭叶荷秋藤《中国植志》

药材名 狭叶球兰(拟)

地方名 广西:五中土(金秀)。

功效 茎、叶:用于续筋驳骨,消肿止咳,跌打刀伤。

## 7231074

*Hoya lyi* Lev. --- *H. yunnanensis* Hand. -Mazz.

植物名 香花球兰《中国植志》

药材名 石草鞋《四川中草》

地方名 四川:球兰、铁足板、草鞋板(峨眉山),铁草鞋。

功效 全草:除风湿,消食积,散瘀血。用于脚强痛,胸前饱胀,跌打损伤。

## 7231075

*Hoya pandurata* Tsiang --- *H. longipandurata* W. T. Wang

植物名 琴叶球兰《中国植志》

药材名 公鱼藤《全展选编·外科》

地方名 云南:豆瓣绿(临沧),岩浆草(大理),铁草鞋。

功效 叶:有毒。接筋骨,活血祛瘀。

## 7231076

*Hoya pottsii* Traill --- *Hoya obscurinervia* Merr.

植物名 铁草鞋《中国植志》

药材名 铁草鞋《云南中草药》

文献名 三脉球兰《中药大辞典》,波氏球兰《红河中草药》,三叶球兰《海南植志》

地方名 海南:娘鞋藤(澄迈),亚娘鞋藤(儋县);云南:白江节,老鸦药、金碎叶、厚叶藤(红河),“咪美龙”(傣语)。

功效 叶:有毒。接筋骨,活血祛瘀。用于跌打损伤,骨折,刀枪伤。

## 7231077

*Hoya pottsii* Traill var. *angustifolia* (Traill) Tsiang et P. T. Li

植物名 狭叶铁草鞋《中国植志》

功效 叶:接筋骨,散瘀消肿,拔脓生肌。

## 7231078

*Hoya villosa* Cost.

植物名 毛球兰《中国植志》

药材名 毛球兰《广西药录》

地方名 广西:虎舌(龙州)。

功效 叶:用于跌打损伤。

## 7231079

*Marsdenia cambodiensis* Cost.

植物名 柬埔寨牛奶菜(拟)

文献名 牛奶菜《广西植录》

地方名 广西:[土黄芩](桂平),[地骨皮](贵县),睡地金牛(博白)。

功效 根:补精,通乳,强壮,补气血。用于气虚。

## 7231080

*Marsdenia globifera* Tsiang

植物名 球花牛奶菜《中国植志》

文献名 大白药《云南中草药》

地方名 云南:小瓣果,蛆藤。

功效 根:有毒。舒筋活络,补虚平喘。用于夜尿,哮喘,心悸,风湿性关节炎,刀伤,骨折。

## 7231081

*Marsdenia griffithii* Hook. f.

植物名 大白药《中国植志》

药材名 大白药《云南中草药选》

地方名 云南:大对节生(保山),蛆藤,大瓣角牛,小白前,小白解。

功效 全株:有毒。止血接骨。用于外伤出血,骨折,疮毒。

## 7231082

*Marsdenia longipes* W. T. Wang ex Tsiang et P. T. Li

植物名 百灵草《中国植志》

药材名 百灵草《云南中草药》

地方名 云南:小对节生,小瓣角,小白药(保山),云百部,云南百部,出浆藤。

功效 根或全株:有毒。活血,止血,止咳平喘。用于跌打损伤,风湿痛,内出血,支气管炎,哮喘。外用于骨折,外伤出血。

## 7231083

*Marsdenia officinalis* Tsang et P. T. Li

植物名 药用牛奶菜《品种论述》  
文献名 [海枫屯]《中国植志》  
地方名 浙江:海枫藤,海风藤  
功效 全藤:舒经通络,散寒,除湿,止痛。

#### 7231084

*Marsdenia oreophila* W. W. Sm.

植物名 喙柱牛奶菜《中国植志》  
药材名 背痛药《云南药录》  
功效 根:用于背痛。

#### 7231085

*Marsdenia oreophila* W. W. Sm. var. *glabrifolia* W. T. Wang

植物名 光叶山地牛奶菜《云南药录》  
药材名 藤子杜仲《红河中草药》  
文献名 背痛药《玉龙山药植》  
地方名 云南:中叶杜仲。  
功效 茎、根皮:补肝肾,强筋骨,降压,止血。用于肾虚腰痛,腿膝无力,跌打损伤,骨折,高血压,外伤出血,风湿麻木,阳痿。

#### 7231086

*Marsdenia sinensis* Hemsl.

植物名 牛奶菜《中国植志》  
药材名 牛奶菜《救荒本草》、《汇编》  
文献名 白杜仲《云南中草药》  
地方名 浙江:三百银,婆婆针线包;湖北:喉包草(神农架);云南:中叶杜仲。  
功效 全株、根:舒筋活络,行气止痛,壮筋骨。用于健胃利肠,腰肌扭伤,风湿性关节炎,跌打损伤。

#### 7231087

*Marsdenia tenacissima* (Roxb.) Wight et Arn.

植物名 通光藤《中药大辞典》  
药材名 通光散《滇南本草》、《汇编》  
文献名 奶浆藤、通光散《滇南本草》,通光藤《广西药录》,通天散《中草药学》  
地方名 贵州:龙爪菜,牛奶菜;云南:乌骨藤,下奶藤、大苦藤、地甘草、黄木香(思茅),小扁藤、扁藤、白暗消、癞藤子、癞藤(红河),小铜锤(临沧),白浆藤、细羊奶果、扁担藤(文山),羊奶藤(大理白族),大白楷(普洱),勒藤,黄桧。  
功效 根、藤茎、叶:清热解毒,散结止痛,止咳,祛痰,平喘。用于慢性气管炎,支气管哮喘。

#### 7231088

*Marsdenia tinctoria* R. Br.

植物名 蓝叶藤《中国植志》  
药材名 蓝叶藤《汇编》  
文献名 肖牛耳菜、肖牛耳藤《广西药录》  
地方名 海南:老鸦嘴(保亭);广西:[羊角豆](阳朔),[羊角藤](龙州);四川:牛耳菜(峨眉);云南:染色牛奶菜。  
功效 果实:用于心胃气痛;茎皮:用于风湿骨痛,肝肿大。

#### 7231089

*Marsdenia tinctoria* R. Br. var. *tomentosa* Mas.

植物名 绒毛蓝叶藤《中国植志》  
药材名 绒毛蓝叶藤《广西药录》  
地方名 广西:[羊角豆](阳朔)。  
功效 果实:顺气止痛,温中散寒。用于胃脘痛。

#### 7231090

*Metaplexis hemsleyana* Oliv.

植物名 华萝藤《中国植志》  
药材名 华萝藤《汇编》  
地方名 奶浆藤(四川、贵州),奶浆草(湖北、四川);陕西:小隔山草(平利);广西:萝藤藤;贵州:倒插花。  
功效 全草:补肾强壮。用于肾亏遗精,少乳,脱力劳伤。

#### 7231091

*Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino --- *Metaplexis stauntoni* Roem. et Schult. --- *Metaplexis chinensis* Decne.

植物名 萝藤《中国植志》  
药材名 萝藤《本草经集注》、《汇编》  
文献名 芄兰《诗经》,雀瓢(陆玕《诗疏》),苦丸《本草经集注》,白环藤、熏桑、鸡肠、斫合子《本草拾遗》,羊角菜、羊奶科、细丝藤、过路黄、合钵儿、婆婆针托儿《救荒本草》,婆婆针袋儿《袖珍方》,羊婆奶、婆婆针线包《纲目》,斑风藤、蓂兰《名实图考》,天将壳《饮片新参》,蔓藤毛、天浆果《中草药学》,萝藤英《药材学》

地方名 老刮瓢、水皮花、蛤蜊瓢(东北),鹤光瓢(东北、江苏),蔓藤草、浆罐头(华北),天将果、鹤瓢棵、野藤菜、老人瓢(华东),天浆壳(华北、陕西、上海、江苏、浙江),奶浆藤(东北、华北、陕西、四川、贵州),羊角(华北、上海),麻雀棺材(山东、安徽),赖瓜瓢(黑龙江、华东);黑龙江:针线包(哈尔滨市);辽宁:老鸦瓢;山东:羊角瓢;江苏:大萝藤子,洋瓢瓢,洋瓢瓢,癞巴壳;上海:天鹅绒;浙江:上古藤(宁波),奶合藤(龙泉),闭口封(嘉兴),浆浆罐头(嘉善);安徽:刀口药,大羊泡奶,青小布,初风瓢,和尚瓢,萝藤壳,萝藤子,萝藤绒,萝藤根;江西:野藤(南昌);河南:老婆筋;湖南:刺猬瓜,野羊角,野隔山消;四川:奶浆草,奶浆根;其他:羊奶子

功效 全草、块根:补气益精。用于体质虚弱,阳痿,白带,乳汁不足,小儿疳积。外用:于疔疮,五步蛇咬伤;果壳(天浆壳):补虚助阳,止咳化痰。用于体质虚弱,痰喘咳嗽,百日咳,阳痿,遗精,麻疹透发不畅。外用:于创伤出血;果实:补益精气,生肌止血,解毒。用于虚劳,阳痿,金疮出血;种毛:止血。用于外伤出血;茎藤白汁:用于癰,刺癰,扁平疣。

#### 7231092

*Myriopterion extensum* (Wight) K. Schum. --- *Streptocaulon extensum* Wight

植物名 翅果藤《中国植志》  
药材名 翅果藤《汇编》  
文献名 多翅果《广西植录》

地方名 广西:奶浆果;云南:大对节牛(新平),野甘草(元江、玉溪),婆婆针线包;其他:逗屁股果。

功效 根:补中益气,止咳,调经。用于感冒,咳嗽,月经过多,子宫脱垂,脱肛;全草:用于肺结核。

## 7231093

*Oxystelma esculentum* (L.f.) F. A. Schult.

植物名 尖槐藤《中国植志》

药材名 尖槐藤《汇编》

地方名 广西:小双飞蝴蝶(隆林),催奶藤(龙州);云南:高冠藤。

功效 根:用于黄疸,乳汁不下,跌打损伤;叶:用于蛇咬伤;全株:用于月经不调。

## 7231094

*Pentstemon championii* Benth.

植物名 石萝藦《中国植志》

药材名 石萝藦《汇编》

文献名 南石萝藦《广西药录》,玉来《中国植志》

地方名 广东:水织机,凤尾草;海南:满草;广西:水杨柳(北流、容县、陆川),假了刁竹。

功效 全草:清热解毒。用于肝炎,风火眼痛。

## 7231095

*Periploca calophylla* (Wight) Falc. --- *Streptocaulon calophyllum* Wight

植物名 青蛇藤《中国植志》

药材名 青蛇藤《汇编》

文献名 乌骚风《分类草药性》,铁夹藤《中国经植志》,宽叶风仙藤《云南药录》,美叶杠柳《汇编》

地方名 管人香(湖北、广西),黑骨头(广西、云南);湖北:黑乌骚,毒蛇藤(神农架);广西:听水响、铁骨桃(田林),鸡骨头,铁皮藤;贵州:黑骨藤;四川:乌骨鸡(田林),黑乌骨(峨眉),乌骨藤,乌骚藤,铁乌骚,冷骨风;云南:小黑骨,小软筋藤,化血丹,石杨柳、鸡舌化血丹、宽叶飞仙藤、散血丹、黑牵牛、黑皮杜仲、黑药草(红河),飞天藤,〔清风藤〕。

功效 茎:有小毒。祛风散寒,活血散瘀。用于风湿麻木,腰痛,跌打损伤,月经不调。

## 7231096

*Periploca forrestii* Schltr. --- *Periploca calophylla* (Wight) Falcon. ssp. *forrestii* (Schlecht.) Browicz

植物名 黑龙骨《中国植志》

药材名 滇杠柳《汇编》

文献名 飞仙藤、还阳草《滇南本草》,西南杠柳《广西植志》

地方名 青蛇胆(广西、云南);广西:山筋线(那坡),牛尾藤(南丹),铁骨头(凌云),铁散沙(隆林),黑壳藤(田林);四川:乌骨藤,乌骚风,乌酱藤,黑乌骨;贵州:柳叶过山龙;云南:小青蛇、山杨柳、柳叶夹、黑骨头(昆明),〔小黑牛〕〔楚雄〕,青香藤(昭通),奶浆藤(保山),大风藤,风藤,黑固藤。

功效 根或全株:有小毒。祛风除湿,通经活络。用于风湿关节痛,跌打损伤,乳腺炎,闭经,月经不调,骨折,疟疾。

## 7231097

*Periploca sepium* Bunge

植物名 杠柳(华北)、《中国植志》

药材名 香加皮《药典》

文献名 穿墙柳《指示植物》,狭叶萝藦《中国植物图鉴》,香五加《秦岭植志》,北加皮《常用中药名辨》

地方名 北五加皮(东北、河北、内蒙古、山东),香五加皮(华北、四川),山五加皮、津加皮、兖州加皮、洋桃弯、羊条梢、山柳子、羊刀叶、杨桃根皮(华北),羊角弯(华北、山东),羊奶子(东北、内蒙古、西北),羊奶条、羊角叶(东北、河北、内蒙古、山东、河南),五加皮(山东、四川),臭五加(甘肃、山东、四川),杠柳皮(河北、四川),剪子根(西北),羊桃、刺木棒、羊奶条棵子、臭槐(东北),羊桃叶(东北、河北),羊角桃(山西、河南);辽宁:羊奶藤;河北:乌鸦子;内蒙古:“巴拉古纳·布拉”(蒙名);山西:羊桃梢;陕西:羊肚梢;甘肃:羊角蔓,羊闹蔓;山东:柳柳叶(章丘);江苏:李不李(连云港),桃不桃,柳不柳,立柳,阴柳,银柳,乌龙,羊角梢,狗奶子,〔爬山虎〕(新沂),追风使,钻墙柳;河南:山奈子、羊角条、野柳(烟台),鬼柳叶根,桂柳叶根;广西:浆子叶;四川:臭五加皮,加皮,臭加皮。

功效 根皮:有毒。祛风湿,强筋骨。用于风寒湿痹,腰膝酸软,心悸气短,下肢浮肿。

## 7231098

*Raphistemma pulchellum* (Roxb.) Wall.

植物名 大花藤《中国植志》

药材名 大花藤《广西药录》

功效 茎:通乳。

## 7231099

*Sarcostemma acidum* (Roxb.) Voigt

植物名 肉珊瑚《中国植志》

药材名 肉珊瑚《汇编》

地方名 珊瑚、铁珊(广东、海南);广东:连丝藕,罗丝藕;海南:无叶藤。

功效 全株:收敛,止咳,催乳。

## 7231100

*Secamone lanceolata* Blume --- *Secamone micrantha* Decne.

植物名 鲫鱼藤(海南)、《中国植志》

药材名 鲫鱼藤《汇编》

地方名 海南:四粉块藤,黄花藤(海口);广西:吊山桃(凌云),小羊角扭(东兰)。

功效 花、叶:外用于瘰癧;根:用于风湿痹痛,跌打损伤,疮疡肿毒。

## 7231101

*Secamone sinica* Hand. -Mazz.

植物名 吊山桃《中国植志》

药材名 吊山桃《广西药录》

文献名 细叶青藤《广西药录》,华四粉块藤《广西植志》

地方名 广西:〔羊角扭〕(贵县),有乳藤(龙州),四粉块藤,小叶断肠藤,羊角皂(鹿寨)。

功效 根、叶：强筋壮骨，催乳。用于风湿痹痛，跌打肿痛，疮疡肿毒。

## 7231102

*Stelmatocrypton khasianum* (Benth.) H. Baill. --- *Pentanura khasiana* Kurz

植物名 须药藤《中国植志》

药材名 生藤《云南中草药》

地方名 云南：水逼药，冷水发汗、（羊角藤）（思茅），“够哈哄”（傣语），“叫哈荒”（西双版纳傣语），小杜仲，生藤根，香根藤；其他：大花藤。

功效 藤：祛风通络，行气止痛。用于感冒，支气管炎，风湿关节疼痛，胃痛。

## 7231103

*Stephanotis chinii* Tsiang

植物名 假木通《中国植志》

药材名 假木通《汇编》

文献名 两广千金子藤《广西植志》，陈氏史惠藤《广西药志》

地方名 广西：假上木通（大瑶山），花叶空心草（桂平），十全大补（金秀）。

功效 叶：补血，通经活络。用于产后血虚，乳汁不足，月经不调，痛经。

## 7231104

*Stephanotis mucronata* (Blanco) Merr. --- *Stephanotis chinensis* Champ. ex Benth.

植物名 黑鳗藤《中国植志》

药材名 黑鳗藤《浙江药植志》

文献名 华千金子藤《广西植志》，史惠藤《中国植志》，傅如藤《高植图鉴》

地方名 浙江：白地牛（温州、乐清）。

功效 根：祛风湿，通经络。用于风湿痹痛，腰肌劳损，腰部扭伤。

## 7231105

*Streptocaulon griffithii* Hook. f.

植物名 马连鞍《中国植志》

药材名 古羊藤《广西中药志》

文献名 奶藤、马达《南方毒植》

地方名 南苦参（广东、广西）；广西：毛青才，老鸦嘴，有毛老鸦嘴，毛秀才，红马连鞍（龙州），〔苦参〕（横县），鱼藤（武鸣），虎阴藤（百色）；云南：小暗消（红河），山暗消，白花鸡矢藤，地苦参，〔红藤〕，“哈骂不果”（哈尼语），“哈骂醒合”（傣语），“麻新哈不”（西双版纳傣语），藤苦参。

功效 根、叶：镇痛。用于心胃气痛，上吐下泻，各种痧症；叶：外用于蛇咬伤，烂疮。

## 7231106

*Streptocaulon juvenas* (Lour.) Merr.

植物名 暗消藤《中国植志》

药材名 暗消藤《广西药志》

地方名 广西：〔鱼藤〕（武鸣），〔古羊藤〕（龙州）。

功效 根、茎：健脾胃；乳汁：去目翳。用于结膜炎。

## 7231107

*Telosma cordata* (Burm. f.) Merr. --- *Asclepias cordata* Burm. f. --- *Pergularia odoratissima* Sm. --- *Telosma odoratissima* Coville

植物名 夜来香《名实图考》、《中国植志》

药材名 夜香花（广东、广西）

文献名 断肠草《名实图考》

地方名 广东：夜兰香；广西：千里香。

功效 叶、花、果：清肝，明目，去翳，拔毒生肌。用于急慢性结膜炎，角膜炎，角膜翳；鲜叶：外用于已溃疮疖脓肿，脚癣外伤糜烂。

## 7231108

*Toxocarpus himalensis* Falc. ex Hook. f.

植物名 西藏弓果藤《中国植志》

药材名 化肉藤《元江哈尼族药》

文献名 南弓果藤《广西植志》

地方名 云南：“虾弓弓然”（元江哈尼语）。

功效 全草：破瘀痕，消肿胀。用于子宫颈癌，跌打损伤，疮疡肿毒。

## 7231109

*Toxocarpus villosus* (Blume) Decne. --- *Secamone villosa* Blume

植物名 毛弓果藤《中国植志》

药材名 大叶化肉藤《元江哈尼族药》

地方名 云南：“催期那雌”（元江哈尼族语）。

功效 根及嫩尖：逐湿，去痛，催乳。用于产后乳少，风湿腰痛。

## 7231110

*Toxocarpus wightianus* Hook. et Arn.

植物名 弓果藤《中国植志》

药材名 弓果藤《汇编》

文献名 牛茶藤《高植图鉴》

地方名 牛角藤（海南、广西）；海南：坡水柳（澄迈）；广西：小羊角拗（防城）。

功效 全株：有毒。化气祛风，祛瘀止痛，消肿解毒。外用于跌打损伤，疮痈肿毒。

7231111 见 7231114a

## 7231112

*Tylophora arenicola* Merr.

植物名 老虎须《中国植志》

药材名 老虎须（广东）

文献名 沙地娃儿藤《汇编》

功效 根：用于跌打瘀肿，毒蛇咬伤。

## 7231113

*Tylophora astephanoides* Tsiang et P. T. Li

植物名 阔叶娃儿藤《中国植志》

功效 全株：用于跌打损伤，手指疮。

## 7231114

*Tylophora atrofalliculata* Metcalf

植物名 三分丹《中国植志》

药材名 三分丹《汇编》

文献名 广东娃儿藤《鉴别手册》，毛果娃儿藤《中国

植志》,黑果娃儿藤《云南药录》

地方名 海南:三十六根;广西:[白前](大新、武鸣),[白前草]、白脚藤(上林),土白前(马山),三十六荡(来宾),老虎须(龙州),芸尾蛇(南宁),蛇花藤、黎针,双飞蝴蝶(鹿寨)。

功效 根:有毒。祛瘀止痛。用于跌打损伤,风湿痛。

#### 7231114a

*Tylophora floribunda* Miq.

植物名 七层楼《中国植志》

药材名 双飞蝴蝶《汇编》

文献名 铁扫帚《名实图考》,娃儿藤《中药大辞典》,多花娃儿藤《广西植志》,须参《汇编》

地方名 金线吊胡须(浙江、江西),三十六根(安徽、湖南),土细辛、三十六荡(江西、湖南);浙江:百条根(温州),羊角花(嵊县);安徽:白伟,苦儿藤;江西:一见香(景德镇),小尾伸根(吉安),千层塔、飞天铺、老虎须、青藤、婆婆针线包(婺源);湖南:[白龙须],[老君须],黄茅细辛,藤老君须;贵州:飞菜,地参,山花椒。

功效 根:有小毒。祛风化痰,通经散瘀。用于小儿惊风,白喉,支气管炎,月经不调,毒蛇咬伤,跌打损伤。

#### 7231115

*Tylophora kerrii* Craib --- *Tylophora leveilleana* Schltr. ex Levl.

植物名 人參娃儿藤《中国植志》

药材名 人參娃儿藤《广西药录》

文献名 列氏娃儿藤《广西药录》

地方名 广西:[土人參]、三十六根参(那坡),[土牛七](龙州),[土牛藤],[山豆根],藤了刁竹(武鸣)。

功效 根:止痛。用于胃脘痛,牙痛,肝硬化腹水,癌肿,蛇咬伤,跌打损伤,风湿痹痛。

#### 7231116

*Tylophora koi* Merr.

植物名 通天连《中国植志》

药材名 通天连《汇编》

文献名 锡明娃儿藤《广西药录》,信宜娃儿藤《广西植志》

地方名 [土牛七],[土牛藤](华南);广西:双飞蝴蝶(陆川),扒地蜈蚣,古钩藤(玉林),乳汁藤(南宁),哮喘草;云南:白花鸡屎藤,雨台根,“益糯期”(玉溪峨山彝语),红药。

功效 全株:解毒,消肿。用于感冒,跌打损伤,毒蛇咬伤,疥疮。

#### 7231117

*Tylophora mollissima* Wight

植物名 通脉丹《中国植志》

药材名 通脉丹(广东)

文献名 绵毛娃儿藤《汇编》

地方名 [大白前](广东、广西);海南:老虎须;广西:三门根(靖西)。

功效 根:清肺热,止咳;全草:用于哮喘。

#### 7231118

*Tylophora ovata* (Lindl.) Hook. ex Steud. --- *Diplolepis ovata* Lindl. --- *Tylophora hispida* Decne.

植物名 娃儿藤《中国植志》

药材名 娃儿藤《中药志》

文献名 二十六荡《南宁药志》,卵叶娃儿藤《广西植志》。

地方名 三十六根、土细辛、双飞蝴蝶、老虎须(广东、广西),白龙须、哮喘草(湖南、广东、广西),藤细辛(湖南、广西);湖南:黄茅细辛;广东:巴山须、胆草(阳春),多须公(高要),金钱吊丝线,缠竹消,落土香;海南:虾箭须;广西:一枝香、王芳伤,白须公(平南),土白前(苍梧),[白前](博白),上树蜘蛛、白强根(桂平),千金拔(容县),山辣椒(北流),毛管细辛(全州),老君须(玉林、隆安),芒尾蛇(苍梧),藤叶细辛(容县),关腰草,鸡骨香,落地金瓜,落地蜘蛛;云南:小白薇、白头须(昆明),山辣子、小霸王、藤霸王、婆婆针线包(思茅),小瓢羹,[白薇],羊角草。

功效 根及根茎、全草:有毒。祛风除湿,散瘀止痛,止咳定喘,解蛇毒。用于风湿筋骨痛,跌打肿痛,咳嗽,哮喘,毒蛇咬伤。

#### 7231119

*Tylophora renchangii* Tsiang

植物名 扒地蜈蚣《中国植志》

药材名 扒地蜈蚣《汇编》

文献名 上思娃儿藤《广西植志》,仁昌娃儿藤《广西药录》

地方名 海南:扛梧回;广西:老虎须(平南),假白前(桂平)。

功效 叶:活血散瘀,解毒。用于毒蛇咬伤,跌打损伤。

#### 7231120

*Tylophora secamonoides* Tsiang

植物名 蛇胆草《中国植志》

药材名 蛇胆草《汇编》

文献名 式格娃儿藤《广西药录》

地方名 广西:戏班须。

功效 根:止咳。用于咳嗽。

#### 7231121

*Tylophora silvestris* Tsiang

植物名 贵州娃儿藤《中国植志》

药材名 贵州娃儿藤《广西药录》

地方名 广西:筋骨藤(全州)。

功效 全株:通经络。

#### 7231122

*Tylophora trichophylla* Tsiang

植物名 圆叶娃儿藤《中国植志》

药材名 圆叶娃儿藤《汇编》

地方名 广西:落地金瓜(宁明)。

功效 根:用于风湿病,跌打损伤。

#### 7231123

*Tylophora yunnanensis* Schltr.



植物名 云南娃儿藤《中国植志》

药材名 云南娃儿藤《汇编》

文献名 滇娃儿藤《鉴别手册》, 小白薇《云南中草药》, 金线包《汇编》

地方名 广西: 三十六荡, 关腰草, 沉天儿, 青龙藤(河池); 云南: 娃儿藤, 水辣子根(保山), 蛇辣子(大理), 白藤(曲靖), 山辣子(丽江), 水辣子, 野辣子, 野辣椒, [土细羊], 羊角草, 老妈妈针线包(昆明、大理), 小白龙须(红河), [白龙须](大理、保山、红河), [白薇](红河、保山、玉溪、丽江), 中西林。

功效 根: 舒筋活络, 调经止痛, 截疟。用于肝炎, 胃溃疡, 疟疾, 风湿关节疼痛, 跌打损伤。外用于虫蛇咬伤; 种毛: 止血。

7231124 见 7231007a

## 7232 茜草科 Rubiaceae

### 7232001

*Adina pilulifera* (Lam.) Franch. ex Drake --- *Cephalanthus pilulifera* Lam. --- *Adina globiflora* Salisb.

植物名 水团花《高植图鉴》

药材名 水团花《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 水荆《种称》, 球花水杨梅(江西《草药手册》)

地方名 水杨梅(福建、湖南、广东、广西), 青龙珠(福建), 大叶水杨梅(浙江、福建); 浙江: 水里斜(温州), 水晶树(乐清、云和); 福建: 水加槽、水泡花(泉州), 溪棉条, 水金凉, 水金铃、水金琼(厦门), 水合花, 金京子; 江西: [满山香](铜鼓); 湖南: 水骚鸡; 广东: 穿鱼柳、假杨梅, 杨梅树(英德), 水高厘、半边树、和尚头(潮阳), 水高丽、水柳根(潮安), 水蓼花, 水黄枝(从化), 水圳枝(阳山), 水素木(连山), 水称星(南雄), 鸡子树(始兴), 黄老虎(乳源); 海南: 黄汝子(澄迈), 假马烟树; 广西: 千打槌(平南), 上石王(博白), 石杨梅(玉林), 山杨梅(贵县), [水杨柳](百色), 水棉木, 水黄莆(陆川)。

功效 枝叶或花果: 有小毒。清热利湿, 消瘀定痛, 止血生肌。用于痢疾, 肠炎, 湿热浮肿, 痈肿疮毒, 湿疹, 烂脚, 溃疡不敛, 创伤出血; 根: 清热利湿, 行瘀消肿。用于感冒咳嗽, 肝炎, 腮腺炎, 关节炎, 跌打损伤。

### 7232002

*Adina pilulifera* (Lam.) Franch. ex Drake var. *tonkinensis* (Pitard) Merr. ex Li.

植物名 北越水杨梅《云南种录》

文献名 水团花《纲目拾遗》

功效 根、花、果、叶: 用于感冒发热, 上呼吸道感染, 痢疾, 急性肠胃炎。

### 7232003

*Adina racemosa* Miq.

植物名 鸡仔木《高植图鉴》

药材名 水冬瓜《中草药学》

文献名 水冬瓜《高植图鉴》

地方名 台湾: 梨仔; 湖南: 山白杨; 广西: 米撒沙; 四

川: 野香树皮

功效 根、花、果、叶、茎皮: 清热解毒, 散瘀止痛。

### 7232004

*Adina rubella* Hance

植物名 细叶水团花《高植图鉴》

药材名 水杨梅《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 小叶水团花《广西植录》, 鱼串鳃、沙金子《中药大辞典》

地方名 水团花(江苏、安徽、江西), 假杨梅(湖南、广东), 水石榴(广东、广西); 江苏: 水蜜桃(江宁); 浙江: 水金口, 小叶水杨梅, 水晶, 水金玲(平阳、泰顺); 江西: 红皮杨梅, 篱笆树; 福建: 水荔枝(霞浦), 牛鼓钟; 河南: 白消木; 湖南: 穿鱼柳(溆浦), 水纪连(黔阳), 水串鳃, 杨柳条, 沙荆子, 穿鱼串, 绣球柳, 绣球花, 钉木树, 小叶杨柳, 杨柳渣子; 广东: 小叶团花; 广西: 水毕鸡, 水泡木, 带红花团, 串鱼木。

功效 带花果序: 清热解毒。用于菌痢, 肝炎, 阴道滴虫病; 根: 抗菌消炎, 散瘀活血。用于肺热咳嗽, 感冒发热, 腮腺炎, 咽喉肿痛, 风湿疼痛; 叶、茎皮: 用于跌打损伤, 骨折, 创伤出血, 湿疹。外用于脚癣。

备考 水杨梅, 始载《本草纲目》草部, 湿草类。李时珍云: “生水边, 条叶甚多, 生子或杨梅状。”所述与本种相符, 但李氏所引《庚辛玉册》云: “地椒一名水杨梅”, 这就不是此种了。

### 7232005

*Anotis ingrata* (Wall.) Hook. f.

植物名 假耳草《高植图鉴》

药材名 一柱香《贵州民间药物》

文献名 臭假耳草《广西药录》

地方名 广西: 蛇药(昭平)。

功效 全草: 清热解郁, 消肿明目。用于眼红肿, 无名肿毒, 毒蛇咬伤。

### 7232006

*Anotis urophylla* Wall.

植物名 尾叶假耳草《汇编》

药材名 胖儿草《四川中药志》

文献名 尖叶假耳草《四川中药志》

地方名 四川: 黑脚杆。

功效 全草: 健脾利湿, 消痞。用于小儿疳积, 脾虚水肿, 黄疽。

### 7232007

*Anthocephalus chinensis* (Lam.) Rich. et Walp. --- *A. cadamba* (Roxb.) Miq.

植物名 大叶黄梁木《高植图鉴》

药材名 黄梁木《广西药录》

文献名 团花《广西植录》, 大叶团花(拉汉英种称)

功效 树皮: 退热, 补剂; 叶: 可作含漱剂。

### 7232008

*Borreria articularis* F. N. Will.

植物名 粗叶丰花草《高植图鉴》

地方名 广西: 捕鱼草(防城)。

功效 全草: 外用于鱼刺伤。

## 7232009

*Borreria stricta* (L.f.) G. E. W. Mey.

植物名 丰花草《高植图鉴》

药材名 丰花草《广西药录》

文献名 假蛇舌草、玻利亚草《广西植录》

地方名 广东;〔白花蛇舌草〕(广州)。

功效 全草:清热解毒。用于蛇咬伤。

## 7232010

*Canthium dicoccum* (Gaertn.) Teysmann et Binnendijk

--- *Psydrax dicocca* Gaertn.

植物名 鱼骨木《高植图鉴》

药材名 鱼骨木《广西药录》

地方名 广东;步散;广西:铁屎米,白骨木(上思)。

功效 树皮:解热。

## 7232011

*Canthium horridum* Blume

植物名 猪肚木《高植图鉴》

药材名 猪肚木《广西药录》

地方名 海南:猪腹筋(澄迈);广西:山石榴(邕宁),跌掌随(岑溪),刺鱼骨木(龙州)。

功效 根:利水,消肿止痛。用于黄疸,跌打损伤。

## 7232012

*Canthium parvifolium* Roxb.

植物名 铁屎米《云南种录》

文献名 小叶铁屎米《广西药录》

功效 根:驱虫;幼枝:用于痢疾。

备考 《海南植物志》谓本种我国无分布,观察云南、广西和广东的标本,前人多将 *C. horridum* Blume 误鉴定为 *C. parvifolium* Roxb,特志此,供进一步研究。

## 7232013

*Canthium simile* Merr.

植物名 大叶鱼骨木《高植图鉴》

文献名 相似铁屎米《广西药录》

地方名 广西:六天王(博白)。

功效 全株:外用骨折;树皮:用于痢疾。

## 7232014

*Cephalanthus naucleoides* DC.

植物名 风箱树《汇编》

药材名 风箱树《汇编》

文献名 水杨梅《生草药性备要》,水杨梅蘖《本草求真》,水杨梅根《岭南草药志》,风香树《广西药录》,假番桃《中药大辞典》,水团花《福建药物志》

地方名 大叶水杨梅(福建、广东、广西);浙江:水杨树(温州);福建:杨梅树根,水加槽(泉州、永春),溪棉条(武平),水金琼(龙溪、永安、龙岩),野杨梅(福州、永定);湖南:八卦风,“每佬马”、“息凶”(侗语),螃蟹树,空弯树;广东:假杨梅,水杨柳(清远、韶关、兴宁、徐闻),水常(广宁、四会、德庆、封开、怀集),狗毛树(阳春),水杨芦(新兴);海南:假塘梅,山杨梅,马烟树,死鸡仔树;广西:水泡木、水芍卜(南宁),白肉鸡(桂平),白斩鸡(平南),珠花树,鸡仔木,马烟木,水仔茶须,水壳木,水鸭木(金秀),

红扎树(一丁);四川:獭狗耳。

功效 根:清热解毒,散瘀止痛,止血生肌,祛痰止咳。用于流行性感,上呼吸道感染,咽喉肿痛,肺炎,咳嗽,睾丸炎,腮腺炎,乳腺炎。外用跌打损伤,止血止痛,疖肿,骨折;叶:清热解毒。外用跌打损伤,骨折;花序:清热利湿,收敛止泻。用于肠炎,细菌性痢疾。

备考 《高植图鉴》风箱树的学名为 *Cephalanthus occidentalis* L.

## 7232015

*Cephalanthus spathelliferus* Baker

植物名 大苞风箱树《汇编》

功效 根:清热解毒,散瘀止痛,止血生肌,祛痰止咳。

## 7232016

*Chasalis curviflora* Thwaites

植物名 弯管花《高植图鉴》

药材名 山椒《云南药录》

文献名 假九节木《广西药录》

地方名 广西:柴沙利,水松罗(邕宁),银锦(大新),假蓝枕(靖西);云南:“叫哈蒿”、“牙给哈蒿”(傣语),弯花柴沙利。

功效 根:消炎,祛风。用于风湿骨痛,肺炎,耳疾,眼疾,喉痛。

## 7232017

*Cinchona calisaya* Wedd.

植物名 金鸡纳树《中国经植志》

药材名 金鸡纳皮《药材学》

文献名 黄色金鸡纳树《中药大辞典》,黄规那树、黄规那(小泉《药植》)

功效 树皮、枝皮及根皮:用于疟疾,解热。

## 7232018

*Cinchona ledgeriana* Moens

植物名 金鸡纳树《高植图鉴》

药材名 金鸡纳《汇编》

文献名 金鸡勒《纲目拾遗》,规那树(小泉《药植》),列氏奎宁树、列氏规那树《中国药植图鉴》,列氏金鸡纳树(李《药植》)黄氏金鸡纳树(徐《生药》),莱氏金鸡纳树《中药大辞典》,李氏金鸡纳树《药材学》,杂种金鸡纳《云南种录》

地方名 云南:奎宁树,金鸡纳皮,金鸡纳树皮。

功效 树皮、枝皮及根皮:用于疟疾,解热。

## 7232019

*Cinchona officinalis* L.

植物名 棕金鸡纳树《药材学》

药材名 金鸡纳皮《药材学》

文献名 正鸡纳树《树分》,棕色金鸡纳树《中药大辞典》,棕金鸡纳树《药材学》,正金鸡纳树《中草药学》,黄色金鸡纳皮(李《生药》),褐色规那树、褐规那树(小泉《药植》),金鸡勒(山医《生药》)

功效 树皮、枝皮、根皮:用于疟疾,解热。

## 7232020

*Cinchona succirubra* Pav. ex Klotzsch

植物名 红金鸡纳树《药材学》

药材名 金鸡纳皮《药材学》

文献名 金鸡勒《纲目拾遗》, 鸡纳树、鸡那树、规那树《树分》, 赤规那、赤规那树(小泉《药植》), 规那《中国植物图鉴》, 金鸡纳树《种称》, 红色规那树、红色奎宁树《中国药植图鉴》, 红色金鸡纳《广西中药志》, 红色金鸡纳树《中药大辞典》

地方名 广西: 金鸡纳(南宁)。

功效 树皮、枝皮、根: 用于疟疾, 解热。

#### 7232021

*Coelospermum kanehirae* Merr.

植物名 穴果木《高植图鉴》

药材名 穴果木《广西药录》

地方名 广西: 狗屁藤(上林)。

功效 茎: 用于风湿骨痛。

#### 7232022

*Coffea arabica* L.

植物名 小果咖啡《高植图鉴》

药材名 咖啡《药材学》

文献名 荷兰咖啡《树分》, 咖啡树《药材学》, 小粒咖啡《海南植志》, 咖啡豆(李《生药》)

地方名 小粒种咖啡(中南); 云南: 饭包木。

功效 种子: 兴奋, 利尿。

#### 7232023

*Coffea canephora* Pierre ex Froehn.

植物名 中果咖啡《高植图鉴》

药材名 咖啡(广西)

文献名 中粒咖啡《广西药园药录》

功效 种子: 兴奋, 利尿。

#### 7232024

*Coffea liberica* Bulliard ex Hien

植物名 大果咖啡《高植图鉴》

药材名 咖啡(海南)、《药材学》

文献名 大咖啡树《药材学》, 大粒咖啡《海南植志》, 中粒咖啡《云南种录》

地方名 海南: 大咖啡; 其他: 利比亚咖啡。

功效 种子: 兴奋, 利尿。

#### 7232025

*Coptosapelta diffusa* (Champ. ex Benth.) van Steenis ---

*Thysanosperrum diffusum* Champ.

植物名 流苏子《高植图鉴》

药材名 流苏子《广西药录》

地方名 江西: 黄花藤; 广东: 牛老药, 牛老药藤, 绵丝藤; 广西: 包色龙(乐业), [鸡屎藤](富川、苍梧), [青藤](北流), 利别草(玉林), 血母草(苍梧), 癩拐藤(金秀), 小青藤(资源), 一扫光。

功效 地上部分: 用于疥疮, 湿疹; 根: 用于皮炎。

7232026 见 7232034a

#### 7232027

*Damnacanthus angustifolium* Hayata

植物名 狭叶绣花针《中药材科技》

地方名 湖南: [黄茛](通道、新晃), “恩姆曼”(侗语)。

功效 根、茎枝: 用于痢疾, 黄疸, 牙痛。

#### 7232028

*Damnacanthus henryi* (Levl.) H. S. Lo --- *Prismatomeris henryi* (Levl.) Rehd.

植物名 云桂虎刺《云南种录》

文献名 西南三角瓣花《广西植录》, 亨利三角瓣花《广西药录》

地方名 广西: 对叶草(阳朔)。

功效 叶: 用于跌打损伤。

#### 7232029

*Damnacanthus indicus* (L.) Gaertn. f.

植物名 虎刺《高植图鉴》

药材名 虎刺《图经》、《汇编》

文献名 伏牛花、隔虎刺花《开宝本草》, 刺虎《图经》, 寿星草《寿域神方》, 寿庭木《花镜》, 雀不踏、绣花针《名实图考》, 伏虎花《中草药学》

地方名 小绣花针、鸟不踏(江西、福建), 老鼠刺(浙江、江西、福建), 黄脚鸡(江西、广东), [巴戟天](广东、广西); 浙江: 蛇不过, 朝天刺, 铜针木, 虎叶, 老鼠枪(衢县、江山), 老虎刺, 小叶刺风, 高骨老虎刺, 红老鼠刺, 红远志, 白凤珠, 泥串珠(浦江); 江西: 天针, 矮插子(赣州); 福建: 倒翻针(政和、南平), 矮脚刺通(永泰、永春), 鸟不宿(大母), 剥皮鸡(三明), 红刺党、喜相逢、母子相逢(福安); 湖南: 千口针(衡阳), 虎牙刺、千金刺、鹅嘴花根、[十大功劳](长沙), 黄鸡兰(永兴), 针上叶(凤凰), [万年青]顺茶风(洞口), 脚不踏(临湘), 土鸡爪黄连、猫儿刺、小黄连(新邵); 广西: [两面针](罗城), 细花针(钟山), 天钻; 云南: 羊奶果、刺果、印度伏牛花(红河), 牛角刺; 其他: [巴戟]。

功效 根或全株: 祛风利湿, 活血止痛。用于肝炎, 风湿筋骨痛, 跌打损伤, 龋齿痛。

备考 在广东、广西等互邻省份, 本品为巴戟天 *Morinda officinalis* How 的常见混淆种和掺伪品。

#### 7232030

*Damnacanthus indicus* Gaertn. f. var. *microphyllus* Makino

植物名 小叶虎刺《中草药学》

功效 全株: 祛风湿, 活络, 止痛。

#### 7232031

*Damnacanthus macrophyllus* Sieb. et Zucc. --- *D. major* Sieb. et Zucc. var. *macrophyllus* (Sieb.) Maxim. --- *D. indicus* Gaertn. f. var. *macrophyllus* (Sieb.) Makino

植物名 大叶虎刺《浙江药志》

文献名 大叶绣花针《广西植录》

功效 花、根或全株: 祛风湿, 活络, 止痛。

#### 7232032

*Damnacanthus macrophyllus* Sieb. ex Miq. var. *giganteus* (Makino) Koidz. --- *D. indicus* Gaertn. f. var. *giganteus* Makino

植物名 长叶数珠树《汇编》

药材名 鸡筋参《湖南药物志》

地方名 湖南:长叶数珠根、黄鸡胖、黄鸡郎;其他:[巴戟天]。

功效 根:补养气血,收敛止血。用于妇女血崩,肠风下血,体弱血虚。

#### 7232033

*Damnacanthus major* Sieb. et Zucc. --- *D. indicus* Gaertn. fil. var. *major* (Sieb. et Zucc.) Makino --- *D. indicus* Gaertn. fil. var. *latifolius* Nakai

植物名 大形虎刺《中药大辞典》

文献名 大叶虎刺《中草药学》,小叶绣花针《广西植物志》,串珠虎刺《浙江药植志》

功效 花、根或全草:祛风湿,活络,止痛。

#### 7232034

*Damnacanthus officinarum* Huang

植物名 四川虎刺《拉汉英种称》

药材名 四川虎刺《中药通报》

文献名 恩施巴戟《中药通报》,四川伏牛花《广西植物志》

地方名 湖北:[巴戟天](恩施、宣恩、咸丰)、鄂西巴戟天、鸡儿肠。

功效 根:补肝肾。用于阳痿,阴疝,白浊,腰痛,风湿痛。

#### 7232034a

*Damnacanthus subspinosus* Hand. -Mazz.

植物名 短刺虎刺《拉汉英种称》

药材名 短刺虎刺《广西药志》

地方名 江西:黄鸡脚;广西:岩石羊(灌阳),树莲藕(临桂),半球莲(恭城)。

功效 根:补气,安神,止咳。用于神经衰弱,贫血,肝炎,瘰疬,骨结核,小儿疳积,肿瘤;叶:用于跌打损伤。

#### 7232035

*Emmenopterys henryi* Oliv.

植物名 香果树《高植图鉴》

药材名 香果树《浙江药植志》

地方名 陕西:丁木树(略阳);浙江:大猫舌(临安);湖北:野枇杷(神农架);四川:丁木;云南:小冬瓜(镇雄)。

功效 根、树皮:止呕。用于反胃呕吐。

#### 7232036

*Galium acutum* Edgew.

植物名 尖瓣拉拉藤《西藏植志》

文献名 拉拉藤《云南药志》

功效 全草:用于久热不退。

#### 7232037

*Galium aparine* L.

植物名 猪殃殃《野菜谱》、《高植图鉴》

药材名 猪殃殃《汇编》

文献名 锯锯藤《植物名汇》

地方名 锯锯藤(四川、贵州),锯子草(陕西、江苏、江西、福建、湖南、广西、贵州),八重葎(江苏、江西、福

建),拉拉藤(陕西、江苏、江西、福建、湖南、贵州、云南);青海:"桑子嘎保"(藏名);浙江:四季柚(黄岩);江西:细叶茜草,土茜草(丰城),[八仙草](万年),活血草,蓬子草,红叶茜草,活血丹;福建:三宝莲,四角金(厦门);湖南:小锯子草,小禾镰草,狮子草(衡山);广西:小茜草,小飞扬藤,红丝线,血见愁,小红线线草(忻城),小红丝线;四川:大红袍(会理);贵州:小锯藤;云南:细茜草;西藏:"商志"(藏名);其他:锯锯草。

功效 全草:清热解毒,利尿通淋,止血。用于感冒,牙龈出血,急性慢性阑尾炎,泌尿系感染,水肿,痛经,崩漏,白带,癌症,白血病。外用于乳腺炎初起,痈疖肿毒,跌打损伤。

#### 7232038

*Galium aparine* L. var. *echinospermum* (Wallroth) Cufodontis --- *G. spurium* L. var. *echinospermum* (Wallroth) Hayek

植物名 刺果猪殃殃《云南种录》

药材名 猪殃殃《安徽中草药》

功效 全草:清热解毒,利尿通淋,止血。

#### 7232039

*Galium aparine* L. var. *tenerum* (Gren. et Godr.) Rechb.

植物名 拉拉藤《名实图考》、《浙江药植志》

药材名 拉拉藤(浙江、湖北、云南)

文献名 猪殃殃《野菜谱》

地方名 锯子草(湖北、云南);陕西:燃燃草(石泉),老鸦枕头(太白山),粘粘草(周至),小锯草(平利);浙江:小叶锯子草(嘉兴、临安),毛丝草(建德),锯草(常山),利戟草(衢县),麦缠(青田,瑞安);河南:麦筛子,锯儿齿,拉拉亭;湖北:土茜草,猪儿菜,小女儿红(神农架);广西:小茜草;云南:细茜草(昆明)。

功效 全草:清热解毒,利尿通淋,止血。用于急性慢性阑尾炎,尿路感染,热症出血,乳腺炎,痈疮疖疖,癌症,白血病。

#### 7232040

*Galium asperifolium* Wall. --- *G. aparine* auct. non L.

植物名 粗叶拉拉藤《中药大辞典》

药材名 八仙草《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 小茜草《云南药志》,六叶葎《神农架药志》

地方名 湖北:拉拉草(神农架);云南:小舒筋(华宁),拉拉藤,小血藤(玉溪),锯锯藤(昆明)。

功效 全草:清热解毒,利尿通淋,止血。用于湿热,热淋,尿痛尿血。

备考 《滇南本草》整理本原第一卷,学名误订为 *Galium aparine* L.

#### 7232041

*Galium asperuloides* Edgew. var. *hoffmeisteri* (Klotzsch) Hand. -Mazz. --- *Asperula hoffmeisteri* Klotzsch

植物名 六叶葎《高植图鉴》

药材名 六叶葎《峨眉药植资源》

文献名 车叶草拉拉藤《云南种录》

地方名 陕西:小八棱麻(镇坪),散血丹(南郑)。

功效 花、叶:清热解毒,消炎止痛。

**7232042***Galium boreale* L.

植物名 北方拉拉藤《高植图鉴》

药材名 北拉拉藤《品种论述》

文献名 砧草《青藏药图》

地方名 湖北:拉拉藤(神农架);青海:“丝拉朵保”(藏名);新疆:[小血藤]。

功效 全草:用于肺炎。

**7232043***Galium bungei* Steud. --- *Galium gracilens* (A. Gray) Makino

植物名 四叶葎《高植图鉴》

药材名 四叶葎《汇编》

文献名 小将军《纲目拾遗》, 四叶拉拉藤《广西植录》, 四叶莲《拉汉英种称》

地方名 四方草(江西、广西), 天良草(福建、广东); 陕西: 散血丹(柞水), 小拉马藤(丹凤); 浙江: 地胡椒(鄞县), 四倍叶, 娘饭团(天台); 安徽: 吐血草, 老豆藤; 江西: [冷水丹](丰城), 风车草(婺源), 四叶草(德兴); 福建: 四角金(厦门), 四叶蛇舌癍(同安), 蛇舌癍(龙海、漳州、同安、泉州), [鸡肠草], 七厘丹(泉州); 广东: 四叶莲、四合梅(潮阳); 广西: 小叶四耳草(河池); 其他: 小锯锯藤, 细四叶葎。

功效 全草: 清热解毒, 利尿, 止血, 消食。用于痢疾, 尿路感染, 小儿疳积, 白带, 咳血。外用于蛇头疔, 跌打损伤。

**7232044***Galium elegans* Wall. ex Roxb. --- *G. latifolium* Buch. Ham. --- *G. hamiltoni* Spreng.

植物名 西南拉拉藤《横断山区维管植物》

药材名 拉拉藤小红参(拟)

地方名 云南: 小红参、小活血(昆明)。

功效 根: 舒筋活血, 祛瘀生新。用于跌打损伤, 风湿疼痛, 内伤出血, 痰中带血, 经闭, 月经不调, 带下, 产后关节痛, 失眠, 肺结核, 头晕头昏。

备考 《汇编》小红参之学名为 *Galium yunnanensis* (Franch.) Diels**7232045***Galium manshuricum* Kitag.

植物名 东北猪殃殃《长白山植药志》

功效 全草: 清热解毒, 利尿通淋, 止血。

**7232046***Galium spurium* L.

植物名 锯锯藤《中药大辞典》

药材名 锯锯藤《西藏本草》

地方名 四川: 爬拉殃(若尔盖), “决呷”(藏名); 西藏: 猪殃殃, “桑恣噶尔布”(藏名)。

功效 全草: 有小毒。清热解毒, 活血通络, 利尿止血。用于跌打损伤, 筋骨疼痛, 阑尾炎, 尿血。外用于脓性甲沟炎。

**7232047***Galium tricornis* Stokes

植物名 麦仁珠《高植图鉴》

药材名 麦仁珠《汇编》

文献名 弯梗拉拉藤《西藏植志》

地方名 辽宁: 紫茜草(辽阳); 陕西: 拉拉蔓(山阳); 甘肃: 粘粘子(文县); 江苏: [血茜草], [白茜草]; 四川: 猪殃殃。

功效 全草: 清热解毒, 利尿通淋, 止血。

备考 在江苏地区有以其根部误作茜草用者, 应注意鉴别。

**7232048***Galium trifidum* L.

植物名 小叶猪殃殃《高植图鉴》

药材名 小叶猪殃殃《贵州药录》

功效 全草: 清热解毒, 利尿消肿。用于感冒, 牙龈出血, 泌尿系统感染, 水肿, 痛经, 中耳炎。

**7232049***Galium trifloriforme* Komarov

植物名 三花状拉拉藤《云南种录》

地方名 云南: 猪殃殃。

功效 根: 清凉解毒。用于中暑。

**7232050***Galium verum* L.

植物名 蓬子菜《秦岭植志》

药材名 蓬子菜《救荒本草》、《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古: 疗毒蒿, “乌茹木都勒”(蒙名); 陕西: 重台草(蓝田), 土黄连(陇县); 青海: “座”(藏名)。

功效 全草及根: 解毒, 利湿, 止痒。用于急性荨麻疹, 疮疖疗毒等。

**7232051***Galium verum* L. var. *asiaticum* Nakai

植物名 长叶蓬子菜《秦岭植志》

药材名 蓬子菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 松叶草《中国植物图鉴》

地方名 [鸡肠草](黑龙江、吉林), 黄米花、疗毒蒿、柳夫绒蒿、喇嘛黄(东北、内蒙古), 黄牛尾(山东、江苏); 黑龙江: 鸡肠子; 吉林: “包嘴扎菜”(朝名); 山东: 黄牛衣(郯城); 江苏: [白茜]、[白茜草]、[土茜草根]、[土茜草](镇江、南京); 四川: 铁尺草, 月经草, “扑那”(藏名), 铁尺子、铁脚蜈蚣(成都); 其他: 刘芙蓉草, 刘蒿绒, 小茜草。

功效 全草及根: 有小毒。解毒, 利湿, 止痒。用于急性荨麻疹, 水田皮炎, 静脉炎, 痢疖疔疮。

**7232052***Galium verum* L. var. *trachyphyllum* Wall.

植物名 粗糙蓬子菜《秦岭植志》

地方名 陕西: 毛拉拉蔓(蓝田)。

功效 根: 利湿, 止痒。

**7232053***Gardenia jasminoides* Ellis --- *G. florida* L. -- *G. augusta* Merr.

植物名 栀子《高植图鉴》

药材名 栀子《本经》、《药典》

文献名 木丹《本经》, 越桃《别录》, 鲜支《上林赋》, 桥桃《广雅》, 支子《本草经集注》, 卮子《汉书》孟康注, 枝子《唐本草》, 山卮子《药性论》, 唐卜花《酉阳杂俎》, 老山卮子仁《圣惠方》, 栀子花《滇南本草》, 卮子仁《普济方》, 小卮子《本草原始》, 林兰《谢康乐集》, 黄枝叶《生草药性备要》, 黄栀花《宁波府志》, 黄香影子、红栀子、猪桃、芝士、越桐《新纲》, 加栀《和汉药标本目录》, 唐卜、黄栀子、山栀、黄栀、白蟾、山黄枝、水横枝《中国药植志》

地方名 黄枝子、黄鸡子(广东、广西), 山枝子(江苏、江西、广东), 山枝(福建、广东、广西), 黑山栀(江苏、四川), 山黄栀(江苏、浙江), 黄枝(江苏、江西、广东); 江苏: 大红栀(震泽西、洞庭山), 红山栀, 小红栀, 红枝子, 黑枝子, 山枝花, 黄山枝; 黄山栀, 黑栀, 召枝; 浙江: 玉荷花(天台), 黑栀子, 潮枝, 红枝; 安徽: 栀果; 福建: 黄栀子(松政), 藤枝花(泉州), 水鸡花(周宁), 黄衣(三明), 黄叶下; 湖南: 药枝子; 广东: 生枝子(花县、化县、高明、阳江), 山黄果(河源、连平、龙川、五华), 黄果仔(英德、乐昌、阳山), 山横枝树(从化), 水晶花、山蟬卜(潮安、潮州), 山枝根, 赖地黄果(五华), 黄果祇树(兴宁); 海南: 黄果树、支木(澄迈); 其他: 禅友。

功效 果实: 泻火除烦, 清热利尿, 凉血解毒。用于热病心烦, 黄疸尿赤, 血淋涩痛, 血热吐衄, 目赤肿痛, 火毒疮疡。外用子扭挫伤痛; 焦栀子: 凉血止血。用于血热吐衄, 尿血崩漏。

#### 7232054

*Gardenia jasminoides* (L.) Ellis var. *fortuneana* Lindl.

植物名 重瓣栀子《浙江药植志》

药材名 栀子花(江苏、浙江、广西、云南)、《滇南本草》

文献名 白蟾《海南植志》, 滇南栀子《云南种录》

地方名 浙江: 玉珥花、白玉珥(温州), 玉荷花; 广西: 白蟬, 枝子草(临桂)。

功效 花: 用于产后子宫收缩痛; 果实: 泻火除烦, 清热利尿, 凉血解毒。

#### 7232055

*Gardenia jasminoides* Ellis var. *longicarpa* Z. W. Xie et Okada --- *G. jasminoides* Ellis var. *grandiflora* auct. non Nakai

植物名 水栀子《八闽通志》、(日本《植物研究杂志》)

药材名 水栀子(湖北、四川、江西、广西)

文献名 伏尸栀子《雷公炮炙论》, 水鸡花《质问本草》, 卮子、栀子《牧野日图》, 马牙栀、建栀、黄栀子《药材学》

地方名 山栀子(华南), 水栀(福建、四川); 福建: 黄箕子, 黄枝; 其他: 大红栀。

功效 果实: 散热毒。外用子扭伤; 叶: 消肿。用于跌打损伤; 根: 解热凉血, 镇静止痛, 祛风除湿。用于黄肿黄疸, 关节炎, 牙痛。

备考 过去文献常将本品误订为大花栀子 *G. jasminoides* Ellis var. *grandiflora* Nakai, 按大花栀子为大

栀子, 果体纺锤形, 与水栀子不同。

#### 7232056

*Gardenia radicans* Thunb. --- *G. jasminoides* Ellis var. *radicans* (Thunb.) Makino

植物名 雀舌花《观赏树木学》

文献名 小果栀子《药典》, 狭叶栀子《中药大辞典》

地方名 江苏: 海栀子, 小叶栀子花; 浙江: 碧罗春;

功效 根: 清热利湿。

#### 7232057

*Gardenia radicans* Thunb. var. *simpliciflora* Nakai

植物名 单瓣雀舌花《浙南本草新编》

地方名 浙江: 水边黄栀根。

功效 根: 用于湿热黄疸。

#### 7232058

*Gardenia stenophylla* Merr.

植物名 狭叶栀子《高植图鉴》

地方名 广西: 水黄枝(防城); 四川: 栀子(峨眉山); 贵州: 黄栀子。

功效 果实、花: 清热解毒, 利尿止血。用于黄疸型肝炎, 胆结石, 胆囊炎, 小儿高热惊风, 心悸烦躁。

#### 7232059

*Geophila herbacea* (L.) O. Ktze.

植物名 爱地草《高植图鉴》

药材名 爱地草《广西药录》

地方名 广西: 出山虎(博白), 边耳草(鹿寨)。

功效 全株: 用于胃脘痛, 胃炎, 毒蛇咬伤。

#### 7232060

*Hedyotis acutangula* Champ.

植物名 金草《高植图鉴》

药材名 锐棱耳草《广西药录》

地方名 海南: 猪粉草、甜仔茶、三捻草(罗浮山)。

功效 全草: 清热解毒, 凉血去毒, 利水。用于肝胆实火, 喉痛, 咳嗽, 小便不利, 淋沥赤浊。

#### 7232061

*Hedyotis ampliflora* Hance --- *Oldenlandia ampliflora* (Hance) O. Ktze.

植物名 广花耳草《高植图鉴》

药材名 理肺散《元江哈尼族药》

地方名 海南: 亚婆巢, 土五加皮; 云南: “姑索那雌”(元江哈尼语)。

功效 根、叶、果: 清热利湿, 舒筋活络。用于肝胆湿热, 跌打扭伤, 风寒湿痹, 腰腿酸痛, 筋骨无力。

#### 7232062

*Hedyotis assimilis* Tutch.

植物名 近缘耳草(拟)

文献名 剑叶耳草《中药通报》

地方名 湖南: “匪干”(蓝山县瑶名)。

功效 全草: 润肺止咳, 化痰理气。

#### 7232063

*Hedyotis auricularia* L. --- *Oldenlandia auricularia* (L.) F. Muell.

植物名 耳草《高植图鉴》

药材名 耳草《汇编》

文献名 鲫鱼胆草《岭南采药录》, 细叶丑婆草《中药大辞典》

地方名 山蜈蚣(浙江、福建), 节节花(广东、广西); 浙江: 对叶寸节草, 山茄, 爪叶草; 福建: 山过路蜈蚣, 蜈蚣草, 行路蜈蚣, 绿蜈蚣, 上山旗(闽东), 地龙草, 下山蜈蚣, 地蜈蚣草, 过路蜈蚣, [仙人对坐草]; 广东: 苦胆草, 鲫鱼草(海康、廉江、遂溪、徐闻), 鲫鱼胆(高州), 大凉藤(湛江), 细叶羊胆草(新会), 细样鲫鱼草(惠阳), 细叶龙胆草、熊胆草、[龙胆草](广州), 细叶婆娑(紫金), 细叶亚婆草(五华), 细叶亚婆巢, [苦地胆]、大号节节花(潮阳), 苦节节花、竹叶节节花(潮安、潮州), 山节节花(汕头、揭阳), 山龙胆草(揭阳), 阿婆草(陆丰), 羊胆草(高要), 假熊胆草、[苦草](惠阳), 皱面婆, 九节连, 鲮鱼胆草, 鲮鱼草; 海南: 鲫鱼龙胆草、大样鸭草(儋县), 黑心草(琼中); 广西: 节节白花(南宁、横县), 细叶假江兰(宁明), [散血草](崇左), 鸡肠风; 贵州: 对节草; 云南: [对座草], 黑头草, 养糕草。

功效 全草: 清热解毒, 凉血消肿。用于感冒发热, 肺热咳嗽, 喉痛, 急性结膜炎, 肠炎, 痢疾, 蛇咬伤, 跌打损伤, 痈疮肿毒, 乳腺炎, 湿疹。

#### 7232064

*Hedyotis biflora* (L.) Lam. --- *Oldenlandia biflora* L.

植物名 双花耳草《高植图鉴》

药材名 双花耳草《广西药录》

地方名 广东: 大米蛇针草(澄海、隆都), 出鳃虎(潮州); 广西: 青骨蛇(陆川)。

功效 全草: 消肿, 止痛。用于疮疖。

#### 7232065

*Hedyotis cantonensis* How --- *Oldenlandia cantonensis* How

植物名 广东耳草《汇编》

药材名 广东耳草《汇编》

文献名 广州耳草《中药大辞典》

地方名 江西: 甜草(吉安), 野甘草(吉水), 山甘草(南丰)。

功效 全草: 清热解毒。用于黄疸型肝炎。外用于外伤出血。

#### 7232066

*Hedyotis capitellata* Wall. --- *Oldenlandia capitellata* (Wall.) O. Ktze.

植物名 小头凉喉茶《云南种录》

药材名 沙糖根《云南中草药》

文献名 头花耳草《红河中草药》

地方名 云南: 莽花黄连(曲靖), 节节乌, 黑节草(红河), 巾参、小伸筋草(保山), [接骨丹], 梵兰花、小兰花(思茅), 上红参(玉溪), 小筋骨草。

功效 全株: 散寒通络, 养血截疟。用于感冒, 疟疾。外用于骨折。

#### 7232067

*Hedyotis capituligera* Hance --- *Oldenlandia capituligera* (Hance) O. Ktze.

植物名 头花耳草《西双版纳傣药志》

文献名 一柱香《汇编》

地方名 云南: “姆嘿”(西双版纳傣语)。

功效 全草: 清热散郁。用于急性结膜炎, 无名肿毒。

#### 7232068

*Hedyotis chrysotricha* (Palib.) Merr. --- *Oldenlandia chrysotricha* (Palib.) Chun --- *Anotis chrysotricha* Palib.

植物名 金毛耳草《高植图鉴》

药材名 黄毛耳草《汇编》

文献名 腹泻草《中药大辞典》, 铺地耳草、敷地两耳草《广西药录》, 地蜈蚣草《云南种录》, 拖地连、白头走马仔、细种节节花《汇编》, [石打穿]《中草药学》

地方名 过路蜈蚣(浙江、江西、福建), 地蜈蚣(上海、浙江、江西、湖南), 铺地蜈蚣(浙江、湖南、广西); 浙江: 山蜈蚣(杭州、天台), 对叶寸节草, 串地蜈蚣、白山茄(乐清), 穿地蜈蚣(丽水), 落地蜈蚣(临安), 摊地蜈蚣(青田), 地麻筋、山茄、山莲(天台), 踏地蜈蚣(温州、瑞安、平阳), 铺路蜈蚣(文成), 蜈蚣草(洞头), 止血草(温州); 江西: 扑地蜈蚣、爬地蜈蚣、网地蜈蚣、下山蜈蚣(宜黄), 野地脚(丰城), 坝地蜈蚣, 白地茄; 湖南: 繁被草、紧牙草、金锁匙, 细花草, 对口草, 瓜子草, 花生草, 扑地瓜子; 广西: 铜眼狮, 地坎风, 翻石草(兴安), 等灰哉, 节节花(横县、昭平), 布筋草(龙胜); 贵州: 伤口药; 云南: 伤口草。

功效 全草: 清热利湿, 解毒消肿。用于肠炎, 痢疾, 急性黄疸型肝炎, 小儿急性肾炎, 乳糜尿, 功能性子宫出血, 咽喉肿痛。外用于蛇、虫咬伤, 跌打损伤, 外伤出血, 疔疮肿毒。

#### 7232069

*Hedyotis corymbosa* (L.) Lamk. --- *Oldenlandia corymbosa* L.

植物名 伞房花耳草《高植图鉴》

药材名 水线草《名实图考》、《汇编》

文献名 白花蛇舌草《中国药植志》, 伞花耳草《广西中药志》

地方名 蛇舌草(广东、广西、云南); 陕西: 竹叶对经草; 浙江: 水胡椒(丽水), 汤气草(平阳); 江西: 瓜子仁, 乌蝇翅(赣州); 台湾: 龙吐珠, 定经草; 广东: 田蛇舌草、企枝蛇舌草、白花仔、小白花仔、金城榴、蛇针草、白嘴玉(潮阳), 节节一枝枝(五华), 多子蛇舌草(广州), 涂藤头、白碎玉、甜白碎玉(潮州), 杜藤、狗头藤(惠来); 广西: 了哥利草(玉林), 田基骨, 矮脚白花蛇利草; 云南: 闹蛭药。

功效 全草: 清热解毒, 利尿消肿, 活血止痛。用于恶性肿瘤, 阑尾炎, 肝炎, 泌尿系感染, 支气管炎, 扁桃体炎, 喉炎, 跌打损伤。外用于疮疖脓肿, 毒蛇咬伤。

#### 7232070

*Hedyotis costata* Roxb. --- *Oldenlandia costata* (Roxb.) K. Schum.

植物名 脉耳草《高植图鉴》

药材名 脉耳草《汇编》

文献名 中肋耳草《广西植录》, 肋腺耳草《云南种录》

地方名 海南: 亚婆潮草、(千里及)(儋县); 云南: 黑节草、大黑节草、肝炎草、小接骨丹、大接骨草、四棱草(红河)。

功效 全草: 清热除湿, 消炎接骨、用于疟疾, 肝炎, 风湿骨痛, 结膜炎, 骨折, 外伤出血。

#### 7232071

*Hedyotis diffusa* Willd. --- *Oldenlandia diffusa* (Willd.) Roxb.

植物名 白花蛇舌草《高植图鉴》

药材名 白花蛇舌草《广西中药志》

文献名 二叶葎《中国药植志》

地方名 蛇舌草(浙江、福建、湖南、广西、四川), 蛇针草(福建、安徽、湖南), 竹叶菜(湖南、广西), 蛇舌癩(福建、湖南), 甲猛草(浙江、湖南、广东), 了哥利(广东、广西); 浙江: 蛇雀草(东阳), 鸡口舌(平阳); 江西: 尖刀草(德兴), 白花十字草(婺源); 福建: 日日生珠草, 节节结蕊草, 蛇总管(三明), 鹤舌草, 细叶柳子、细叶柳(宁化), 杉刺癩, 鹤舌珠, 丝线草, 鸡舌癩, 白锁匙, 四时春; 台湾: 龙吐珠, 珠仔草; 湖南: 散草; 广东: 鹤哥利, 千打捶, 羊须草, 节节一枝花(五华), 金石榴(南澳), 金城榴(饶平), 小白花仔(澄海), 白花仔(揭阳), 软枝蛇舌草(潮阳), 蛇仔草(茂名), 蛇脐草, 灵前草, 细号蛇舌仔(普宁), 小米蛇针草; 广西: 矮脚白花蛇利草, 蛇利草(贵县、容县), 龙利草(平南), 骨节草(梧州), 龙舌草, 小竹叶菜, 一摸消; 四川: 奶沙尔; 云南: 小杉叶, “牙灵俄”(傣名), 小叶锅巴草(峨山); 其他: 披散耳草。

功效 全草: 清热解毒, 利尿消肿, 活血止痛。用于恶性肿瘤, 阑尾炎, 肝炎, 泌尿系感染, 支气管炎, 扁桃体炎, 喉炎, 跌打损伤。外用于疮疖痈肿, 毒蛇咬伤。

#### 7232072

*Hedyotis effusa* Hance

植物名 顶湖耳草《高植图鉴》

功效 全草: 清凉解热。外用于跌打损伤。

#### 7232073

*Hedyotis hedyotideia* DC. --- *Oldenlandia hedyotideia* (DC.) Hand.-Mazz.

植物名 牛白藤《高植图鉴》

药材名 牛白藤《广西本草选编》

文献名 广花耳草《汇编》

地方名 [甜茶](广东、广西); 广东: [土五加], [土加藤], 大叶鲫鱼胆, 大叶鳝鱼草, 大叶亚婆线, 大叶亚婆巢(惠阳), 大叶鲫鱼草、大叶龙胆草(广州), 大叶婆(紫金), 大凉藤(湛江), 猪肠根(潮阳、阳江、湛江), 节节草, 节节花、黑面先锋(化县), 黑节蕨, 甜菜, 甜甘草(阳江、阳春、高州、茂名、化州), 牛白苕, 牛奶藤、了哥梨(电白、徐闻、海康、廉江), 白碎玉(潮州、澄海、惠来), 白嘴玉(潮阳), 白花鸡屎藤、甜白碎玉(潮州), 亚婆巢(高要、高鹤、广州、化州、清远), 亚婆潮(增城、乐昌、罗定), 亚婆茶(仁化), 鸡爪风(曲江), 爆骨蛇(翁源), 猪鞭藤(阳春、阳江、湛江), 鲫鱼胆(东莞、番禺、南

海、增城、罗定), 糯米藤(新兴), 涂藤头(潮汕), 杜藤、狗头藤(惠来); 海南: 大种鸭坡草(儋县); 广西: 有毛鸡屎藤(平南), 猿见消(苍梧), 斑痧藤(藤县), 火煲藤, 凉茶藤, 藤耳草(武鸣), 白藤草(柳江); 云南: 接骨丹, 排骨连, 大败; 其他: (五加皮)(香港), [土五加皮]。

功效 根、藤: 祛风活络, 消肿止血。用于风湿关节痛, 痔疮出血, 疮疖痈肿, 跌打损伤; 叶: 清热祛风。用于感冒, 肺热咳嗽, 肠炎。外用于湿疹, 皮肤瘙痒, 带状疱疹。

#### 7232074

*Hedyotis herbacea* L. --- *Oldenlandia herbacea* (L.) Roxb.

植物名 丹草《海南植志》

药材名 丹草《品种论述》

地方名 [白花蛇舌草](华南)。

功效 全草: 外用于消肿。

#### 7232075

*Hedyotis hispida* Retz. --- *Oldenlandia hispida* Poir. --- *Hedyotis verticillata* (L.) Lam.

植物名 粗叶耳草《高植图鉴》

药材名 粗叶耳草《广西本草选编》

地方名 节节花(福建、广东); 广东: 小号节节花(潮阳), 白芽草(潮安), 大样蛇刷草(增城), 蛇刷草(连平), 开口蛇(广宁、四会); 广西: 锅老根(武鸣), 莺哥利(玉林), 杀虫草(大新), 追虫根(隆林), 锡老根, 光天化戟; 贵州: 黄瓜草; 云南: 细西草。

功效 全草: 清热解毒, 消肿止痛。用于小儿麻痹症, 感冒发热, 咽喉痛, 胃肠炎。外用于虫、蛇咬伤, 狗咬伤。

#### 7232076

*Hedyotis lancea* Thunb. --- *Oldenlandia lancea* (Thunb.) O. Ktze.

植物名 剑叶耳草《高植图鉴》

药材名 剑叶耳草《广西药录》

文献名 长尾耳草《广西本草选编》

地方名 千年茶(广东、广西); 湖南: 咳嗽癆, 小柴胡; 广东: 铁扫把, 鲮鱼胆草, 少年癆; 广西: 少年红(贺县、针山), 癆病草(富川), 少头郎(贺县), 黑骨风、天蛇木(容县), 必儿药(桂平), 产后茶(北流), 暗酸草(玉林), 龙九肝(博白)。

功效 全草: 润肺止咳, 消积, 止血。用于支气管炎, 咳血, 小儿疳积, 跌打肿痛, 外伤出血。

#### 7232077

*Hedyotis mellii* Tutch. --- *Oldenlandia mellii* (Tutch.) Chun

植物名 卷毛耳草《高植图鉴》

药材名 卷毛耳草《湖南药物志》

文献名 腰消竹《高植图鉴》, 光叶耳草《广西植录》, 红花耳草《汇编》

地方名 野甘草(江西、广西), 甜酒娘(湖南、广西); 广西: [甜茶], 竹根草(全州), 白花茶(临桂)。

功效 全草、根: 祛风, 清热, 消食, 止血, 解毒。用



于刀伤出血,毒蛇咬伤,乳腺炎,痢疾,小儿伤食发热。

## 7232078

*Hedyotis paridifolia* Dunn *Oldenlandia paridifolia* (Dunn) Cun

植物名 延龄耳草《高植图鉴》

地方名 海南:红柴藤(崖县)。

功效 叶:外用于疳疮。

## 7232079

*Hedyotis pinifolia* Wall. --- *Oldenlandia pinifolia* (Wall.) K. Schum.

植物名 松叶耳草《高植图鉴》

药材名 松叶耳草《广西药录》

文献名 鸛哥舌《陆川本草》

地方名 广东:[白花蛇舌草];海南:蛇舌草(澄迈);广西:了哥利、了哥舌(陆川),鸟舌草,利尖草(玉林);云南:“娘接波堰”(楚雄彝名),牛毛草,细叶草。

功效 全草:消肿止痛。用于跌打损伤,疮痛,蛇咬伤。

## 7232080

*Hedyotis platystipula* Merr. --- *Oldenlandia platystipula* (Merr.) Chun

植物名 大托叶耳草《高植图鉴》

药材名 大托叶耳草《广西药录》

文献名 阔托叶耳草《广西药录》

地方名 广西:月禁风(北流),山耳草(博白)。

功效 全株:用于妇女产后骨痛,小儿腹痛。

## 7232081

*Hedyotis scandens* Roxb.

植物名 攀援耳草《汇编》

药材名 凉喉茶《汇编》

文献名 理肺散《云南中草药》

地方名 云南:小接骨(临沧),[接骨丹](思茅),大接骨草(西双版纳),“牙端顷”(西双版纳傣语),接首草,[接骨草],老人拐棍(丽江),“羊梅功”(瑶族语)。

功效 全株:润肺,止咳,接骨。用于气管炎,肺炎,肺结核,口腔炎。外用于骨折。

## 7232082

*Hedyotis tenelliflora* Blume --- *Oldenlandia tenelliflora* (Blume) O. Ktze.

植物名 纤花耳草《高植图鉴》

药材名 纤花耳草《汇编》

文献名 虾子草《四川中药志》

地方名 [白花蛇舌草](福建、湖北、广西、四川、云南);浙江:鸡口舌(青田);江西:蛇总管(景德镇);福建:毛乌(明溪),甜茶子(清流),甜茶子(宁化),山甘草(大田);广西:蛇舌草(博白、富川),了哥利,“个学”(隆林壮语),方便白花蛇利草,石耳草;四川:红虾子草,舌舌草;云南:石枫药(文山),箭头草(保山),铁青草(思茅),扎郎草(临沧),黄瓜米草;其他:波志加草。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于癌症,阑尾炎,痢疾。外用于跌打损伤,蛇咬伤。

## 7232083

*Hedyotis retrangularia* Korth. --- *Oldenlandia tetragangularis* (Korth.) Merr.

植物名 方茎耳草《高植图鉴》

药材名 方茎耳草《广西药录》

地方名 广东:[白花蛇舌草];广西:白花草(博白)。

功效 全株:清热解毒。用于急慢性肝炎,肺结核。

## 7232084

*Hedyotis uncinella* Hook. et Arn. --- *Oldenlandia uncinella* (Hook. et Arn.) O. Ktze.

植物名 长节耳草《高植图鉴》

药材名 长节耳草《汇编》

文献名 小钩耳草《云南种录》

地方名 节节花(湖南、广西);湖南:蜂窝草,出波浪,白痧药,“每说帕”(侗语);广西:四方梗(富川),大疳茶(桂平),甜甜娘,竹根草;贵州:穿心草;云南:酒药草(保山),灯台兰花(澜沧),黑头草,小绣球,[一扫光]。

功效 全草:祛风,散寒,除湿。用于风湿关节疼痛,痢疾,腹泻。

## 7232085

*Hedyotis uncinella* Hook. et Arn. var. *scabrida* Franch. --- *Oldenlandia uncinella* (Hook. et Arn.) O. Ktze. var. *scabrida* (Franch.) Hand. -Mazz.

植物名 糙叶长节耳草《广西植录》

药材名 牙疳药《汇编》

文献名 长节糙叶耳草《汇编》,粗糙钩毛耳草《中药大辞典》,糙叶小钩耳草《云南种录》,四棵关,骨叶《汇编》

地方名 广西:节节花(南宁),骨叶节节花,四方梗(富川);云南:[对坐叶],酒药草(保山),野鸡草,叶上绣球,小绣球,天麻(思茅)。

功效 全草:祛风利湿,健脾消积,清热解毒。用于风湿关节痛,小儿疳积,久泻,痢疾,牙疳。外用于皮肤瘙痒,结膜炎。

## 7232086

*Hedyotis xanthochroa* Hance --- *Oldenlandia xanthochroa* (Hance) O. Ktze.

植物名 黄叶耳草《高植图鉴》

功效 全草:用于风湿病,腰痛。

## 7232087

*Hymenodictyon excelsum* (Roxb.) Wall.

植物名 高网膜木(拟)

药材名 土连翘《思茅中草药》

文献名 高网膜木《云南种录》

地方名 云南:“梅宋戈”(思茅傣名)。

功效 树皮:清热解毒,止咳,抗疟。用于外感高热,咳嗽痰多,疟疾;叶:外用于关节红肿,疮疖肿毒。

## 7232088

*Hymenodictyon flaccidum* Wall.

植物名 网膜木(拟)

文献名 土连翘《高植图鉴》,网膜木《云南种录》

地方名 云南：“枸宋戈”(傣名)。

功效 树皮：清热解暑，止咳，抗疟。

#### 7232089

*Hymenopogon oligocarpus* L.

植物名 疏果藏丁香《云南种录》

地方名 云南：石针打不死。

功效 全草：用于跌打损伤，接骨。

7232090 见 7232091

#### 7232091

*Hymenopogon parasiticus* Wall. --- *H. parasiticus* Wall.  
var. *longiflorus* How

植物名 石丁香《西藏植志》

药材名 石丁香(西藏)

文献名 石老虎、石参、藏丁香《名实图考》

功效 全草：用于营养不良性水肿，跌打损伤，湿疹，肾虚腰痛。

#### 7232092

*Ixora cephalophora* Merr.

植物名 团花龙船花《高植图鉴》

功效 根：用于产后流血过多。

#### 7232093

*Ixora chinensis* Lam. --- *Pavetta chinensis* Roem.

植物名 龙船花《高植图鉴》

药材名 龙船花《生草药性备要》、《汇编》

文献名 卖子木《唐本草》，红绣球、山丹《学圃杂疏》，五月花《生草药性备要》，[映山红]《本草求真》，牛兰、珠桐、番海棠《岭南采药录》，仙丹花、仙丹、英丹花《树分》，红缨树《汇编》

地方名 厚壳(华南)；广东：红樱花、红樱花树根，小红缨、马缨球、大英雄、红花映(新会)，糯米花(惠阳)，红花影、红山影、鸡公花，对面红，粒红；广西：大将军，罗伞木(博白)，木绣球，百日红(合浦、岑溪)。

功效 根、茎：散瘀止血。用于肺结核咳血，胃疼，风湿关节痛，跌打损伤；花：调经，降压。用于月经不调，闭经，高血压。

#### 7232094

*Ixora coccinea* L. var. *lutea* Corner

植物名 黄龙船花《广西药园药录》

功效 全株：清热凉血，消肿止痛，续筋接骨。用于咯血，胃痛，疮疡，跌打，风湿，月经不调，闭经，高血压病。

#### 7232095

*Ixora henryi* Levl.

植物名 白花龙船花《高植图鉴》

药材名 白花龙船花《广西药录》

文献名 白英丹(广西《园林药录》)，小仙丹花《云南种录》

地方名 广西：白龙船花，白骨木(上思)；云南：绣球花(思茅)。

功效 全株：清热消肿，止痛，接骨。用于痢疮肿毒，骨折。

#### 7232096

*Ixora nienkui* Merr. et Chun

植物名 长叶龙船花《高植图鉴》

药材名 长叶龙船花《广西药录》

功效 全株：用于肝炎。

#### 7232097

*Kelloggia chinensis* Franch.

植物名 云南钩毛果《科属词典》

文献名 华克洛草《广西药园药录》

功效 全株：散血，去热毒。

#### 7232098

*Knoxia valerianoides* Thorel ex Pitard --- *K. corymbosa* auct. non Willd.

植物名 红大戟《汇编》

药材名 红大戟《药典》

文献名 红芽大戟、紫大戟、广大戟、南大戟《药材学》，星星大黄《云南药录》，红牙戟、红牙大戟《汇编》，红毛大戟、红芽戟《中药大辞典》，假纈草《中草药学》

地方名 广西：土红参，红戟，红玄参，红萝卜(隆林)，红心薯、走沙黄(贵县)，黄鸡薯(贺县)，[红参]，[土人参]，红其根，黄花小罗伞(龙州)，山必时(苍梧)；四川：红孩儿，下乌，红茶参；云南：将军草，娃娃参、云南大戟(文山)，“石刀”(楚雄彝名)，理肺散，大红参，土生地，娃儿参、红娃娃、伞房序诺斯草(红河)，野黄萝卜。

功效 块根：有小毒。泻火逐饮，攻毒消肿散结。用于胸腹积水，二便不利，痢症疮毒，瘰癧痰核。

备考 过去文献中将红大戟原植物误订为 *Knoxia corymbosa* Willd. 实为 *K. valerianoides* Thorel ex Pitard. 前者根木质且不呈肥厚纺锤状，与红大戟有别。

#### 7232099

*Lasianthus chinensis* Benth.

植物名 粗叶木《高植图鉴》

文献名 粗叶树、树鸡屎藤、鸡屎木《汇编》

地方名 台湾：白果鸡屎树；海南：鸡屎树；广西：木黄(北流)，木鸡屎藤(桂平)。

功效 根：补肾活血，行气，祛风，止痛。用于风湿腰痛，骨痛；叶：用于黄疸湿热症。

备考 《高植图鉴》以 *Lasianthus cyanocarpus* Jack 为鸡屎树。

#### 7232100

*Lasianthus glaberrima* Chun

植物名 光粗叶木《广西药录》

功效 根：用于身骨痛。

#### 7232101

*Lasianthus hartii* Thunb.

植物名 污毛粗叶木《高植图鉴》

药材名 污毛粗叶木《汇编》

文献名 江南鸡屎树《云南种录》，福建粗叶木《广西药录》，哈特粗叶木《广西药录》

地方名 广西：[节节花](桂平)，沙莲树(融水)；贵州：十万错；其他：铁骨银参。

功 效 根:行气活血,祛湿强筋,止痛。用于跌打损伤,风湿关节痛,腰肌劳损。外用于湿疹。

## 7232102

*Lasianthus henryi* Hutch.

植物名 西南粗叶木《高植图鉴》

药材名 西南粗叶木《峨眉药植资源》

文献名 云南粗叶木《广西植录》,蒙自鸡屎树《云南种录》

地方名 四川:粗叶木(峨眉山)。

功 效 全草:行气活血,祛湿强筋,止痛。

## 7232103

*Lasianthus koi* Merr. et Chun

植物名 黄毛粗叶木《高植图鉴》

药材名 黄毛粗叶木《广西药录》

文献名 高氏粗叶木《广西药录》

地方名 广西:蛇咬草(宁明),斩蛇剑(龙州)。

功 效 叶:用于毒蛇咬伤。

## 7232104

*Lasianthus lancilimbus* Merr.

植物名 榄绿粗叶木《高植图鉴》

文献名 披针叶粗叶木《广西植录》

地方名 湖南:竹节郎(蓝山瑶名)。

功 效 根:通经脉,活血止痛。

## 7232105

*Lasianthus longicauda* Hook. f.

植物名 云广粗叶木《高植图鉴》

药材名 云广粗叶木《中药材科技》

文献名 长尾粗叶木《拉汉英种称》

地方名 湖南:“每登帕”(侗名)。

功 效 茎、枝:用于感冒发烧。

## 7232106

*Lasianthus trichophlebus* Hemsl.

植物名 钟萼粗叶木《高植图鉴》

药材名 毛脉粗叶木《广西药录》

地方名 广西:木王(北流)。

功 效 茎:利湿。用于面黄,肢软无力。

## 7232107

*Lasianthus tsangii* Merr. ex Li

植物名 上思粗叶木《广西药录》

地方名 广西:千里马(博白)。

功 效 地上部分:用于跌打损伤。

## 7232108

*Lasianthus wallichii* Wight --- *L. plagiophyllus* Hance

植物名 斜基粗叶木《高植图鉴》

药材名 斜基粗叶木《广西药录》

文献名 小叶鸡屎树《广西药录》,斜脉鸡屎树《云南种录》

地方名 广西:金果子,鸡屎木,扛狗木(邕宁)。

功 效 根:舒筋,活血。用于跌打损伤,蛇、狗咬伤。

## 7232109

*Leptodermis pilosa* (Franch.) Diels

植物名 长毛野丁香《云南种录》

药材名 长毛野丁香《云南药录》

文献名 毛野丁香《中药大辞典》,毛野丁香叶《汇编》

地方名 云南:[石楠叶](昆明)。

功 效 叶:祛风除湿。用于头痛,风湿关节痛

## 7232110

*Luculia gratissima* Sweet

植物名 馥郁滇丁香《高植图鉴》

文献名 滇丁香《汇编》,野丁香《红河中草药》

功 效 根、花、果:止咳化痰,活血调经,消炎止痛。

## 7232111

*Luculia intermedia* Hutch.

植物名 中型滇丁香《云南种录》

药材名 小黄树《汇编》

文献名 滇丁香《名实图考》,〔隔山香〕《中草药》,露球花《高植图鉴》

地方名 广西:满山香、桂丁香(凤山),白花木(那坡);云南:[梔子花]、野丁香、酒瓶花、〔丁香花〕、野黄杨木(红河)。

功 效 根、花、果:止咳化痰,活血调经,消炎止痛。用于咳嗽,百日咳,慢性支气管炎,肺结核,月经不调,痛经,风湿疼痛,偏头痛,尿路感染,尿路结石,病后头昏,心慌,毒蛇咬伤,外伤感染,黄肿病。

## 7232112

*Luculia pinceana* Hook. f.

植物名 藏丁香《西藏植志》

药材名 丁香叶《滇南本草》

文献名 滇丁香《云南种录》

功 效 叶:用于肺寒咳嗽,咳血,痰上带血。

## 7232113

*Morinda angustifolia* Roxb.

植物名 狭叶鸡眼藤《云南种录》

文献名 狭叶巴戟《西双版纳傣药志》

地方名 云南:“沙腊”(傣名)。

功 效 根、皮、叶:用于黄疸型肝炎,过敏性皮炎,漆疮。

## 7232114

*Morinda citrifolia* L.

植物名 海巴戟《高植图鉴》

药材名 橘叶巴戟《汇编》

文献名 橘叶巴戟天《中草药学》,海巴戟天《海南植志》

地方名 檳树(华南);台湾:水冬瓜;其他:万古都(爪哇),东印度树状紫草(南洋)。

功 效 根皮:含檳树素甙(Morindin);根的乙醇提取物:对麻醉狗有降压作用。

## 7232115

*Morinda cochinchinensis* DC.

植物名 大果巴戟《高植图鉴》

药材名 越南鸡眼藤《广西药录》

文献名 毛鸡眼藤《广西植录》,三角藤《高植图鉴》,

大果巴戟天《海南植志》

地方名 广东:黄心藤;海南:酒饼藤(儋县);广西:扣灯(龙州),〔防己〕(博白),白鸡屎藤(桂平)。

功效 根:祛风,止咳。

#### 7232116

*Morinda officinalis* How

植物名 巴戟《高植图鉴》

药材名 巴戟天《药典》

文献名 鸡肠风、糠藤《中药志》,兔子肠《中药材手册》,巴吉天、戟天、巴戟肉、连珠巴草、鸡肠风根《药材学》。

地方名 福建:巴戟母、半公母、猫肠筋、兔儿肠;广东:巴吉,吉天,括巴天;广西:鸡眼藤,黑藤钻,三角藤。

功效 根:补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,小腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痿软。

#### 7232117

*Morinda parvifolia* Benth.

植物名 百眼藤《高植图鉴》

药材名 百眼藤《汇编》

文献名 细叶巴戟天《海南植志》,细叶巴戟《中草药学》,山甘草《生草药手册》,小叶羊角藤《中药大辞典》

地方名 广东:扒山虎、五眼子、〔爬山虎〕(广州),小叶百眼藤,坭藤(增城、电白、茂名),坭藤草(电白、徐闻、海康、遂溪),坭秧草(乐昌),上藤(普宁),斗藤、白蚁藤(湛江),纪末草(广州、从化),鸡眼藤(阳山、新会、高要),巴山虎,下山虎,五眼子头(新会),咸鱼头、大甘草(惠阳);海南:柯棉(澄迈、琼海),黎田公;广西:猪藤藤。

功效 全株:清热利湿,化痰止咳,散瘀止痛。用于感冒咳嗽,支气管炎,百日咳,腹泻,跌打损伤,腰肌劳损,湿疹。

#### 7232118

*Morinda shunghuaensis* C. Y. Chen et M. S. Huang

植物名 假巴戟《中药志》

药材名 双华巴戟(福建)

文献名 副巴戟《广西植物》

地方名 巴戟公(福建、广东);福建:光叶巴戟。

备考 有以本品的根作巴戟天用,应注意鉴别。

#### 7232119

*Morinda umbellata* L. --- *M. howiana* S. Y. Hu

植物名 羊角藤《高植图鉴》

药材名 羊角藤《汇编》

文献名 牛角藤《种称》

地方名 三角藤、糠藤、鸡眼藤(广东、广西);福建:巴戟公,穿骨虫(福州),放筋藤(福鼎),牛的藤(南平),乌捻藤,乌皮藤,猫江藤(南靖),鸭屎藤;湖南:黑风藤,鳝鱼藤,湘巴戟;广东:乌泥藤,塘羊扭,羊角扭,乌苑藤,乌沙藤(惠阳),钹把藤,乌烟藤;广西:白面麻(钟山),红头根(陆川),山八角(苍梧),〔巴戟〕(贺县),乌藤,机笼藤,黑藤钻,乌浪藤,鸡矢藤,龙骨风(全州),麻骨风(灵川);其他:伞花巴戟天。

功效 根或全株:祛风除湿,止痛,止血。用于胃痛,风湿性关节痛;叶:外用于创伤出血。

备考 商品常以本品混充巴戟天使用。

#### 7232120

*Mussaenda divaricata* Hutch.

植物名 展枝玉叶金花《中药大辞典》

药材名 白常山《四川中药志》

文献名 蛾儿花《四川中药志》,散玉叶金花《广西植录》

地方名 四川:玉叶金花(重庆)。

功效 根:有毒。截疟。用于疟疾;茎:清热解暑,利湿。用于中暑,暑热感冒,暑湿腹泻,下焦湿热,小便不利。

备考 根常为常山之混杂物。

#### 7232121

*Mussaenda erosa* Champ.

植物名 啮状玉叶金花《广西植录》

药材名 大茶根《广西药录》

文献名 厚叶白纸扇《高植图鉴》

地方名 海南:〔楠藤〕,马仔藤;广西:大洋藤(博白),玉叶金华(桂平),火烧藤,胶乌藤(上思),大白纸扇(邕宁)。

功效 茎、叶:清热解毒,消肿。用于感冒,疥疮。

#### 7232122

*Mussaenda esquirolii* Levl. --- *M. wilsonii* Hutch.

植物名 大叶玉叶金花(拟)

药材名 大叶白纸扇《广西药录》

文献名 藕花《名实图考》,玉叶金花《浙江药植志》,贵州玉叶金花《广西植录》,白扇宝心《高植图鉴》

地方名 浙江:大叶靛青(临安);湖南:“搭息黄”(瑶名);广西:〔木通〕;云南:白叶藤(元江),“色扎衣仪麻”(元江哈尼语)。

功效 枝、叶:清热解毒。用于风热感冒,咽喉肿痛,痢疾;根:降气化痰。用于支气管炎。

#### 7232123

*Mussaenda hainanensis* Merr.

植物名 海南玉叶金花《海南植志》

地方名 海南:加迈菜藤(澄迈)。

功效 根:清热解毒。

#### 7232124

*Mussaenda hirsutula* Miq.

植物名 粗毛玉叶金花《高植图鉴》

药材名 粗毛玉叶金花《贵州药录》

功效 茎、叶:清热解毒,祛风利湿。用于风热感冒,中暑,咽喉炎,暑湿泄泻,痢疾,疮疡脓肿,跌打损伤,毒蛇咬伤。

#### 7232125

*Mussaenda hossei* Craib

植物名 红毛玉叶金花《云南种录》

药材名 叶天天花《汇编》

文献名 玉叶金花《云南药录》

地方名 云南:“期里”(傣名),“广叶里”(佤尼名)。

功 效 根:清热解毒,凉血,止血。用于疟疾。

## 7232126

*Mussaenda kwangsiensis* Li

植物名 广西玉叶金花《高植图鉴》

药材名 广西玉叶金花《广西药录》

地方名 广西:安给军(金秀)。

功 效 根:用于风湿骨痛;果实:用于腹泻。

## 7232127

*Mussaenda kwangtungensis* Li

植物名 广东玉叶金花《高植图鉴》

药材名 广东玉叶金花《中药材科技》

地方名 湖南:“叫百解”、“百解”(侗语)。

功 效 全草:用于感冒发烧。

## 7232128

*Mussaenda parviflora* Miq.

植物名 小花玉叶金花(拟)

药材名 白常山(李《药植》)

文献名 玉叶金花《广西中药志》

地方名 山甘草(福建、台湾);浙江:桐子叶藤(天目山)。

功 效 根:有毒。截疟;枝、叶:洗疮,有去腐生新之效。

## 7232129

*Mussaenda pubescens* Ait. f.

植物名 玉叶金花《高植图鉴》

药材名 玉叶金花《汇编》

文献名 山白蟾、假金银花《植物名汇》,毛玉叶金花《中药大辞典》,假忍冬、蝴蝶藤《实用中草药》,白常山《峨眉药植研究》

地方名 山甘草、土甘草、凉茶藤(福建、广东),白蝴蝶、凉茶(福建、广西),白纸扇(广东、广西、云南),凉藤(广东、广西、福建),野甘草(福建、湖南、广东),〔甜茶〕(浙江、福建、广东);浙江:甘茶、大号山甘草(平阳、温州);福建:白茶,水藤根,水根藤(福州、龙溪、南平、建瓯),山茶心(仙游、莆田),甜草子(清流),清凉藤、山白菊、甘晚枯、牙八树、甘草藤(福安),山胡椒,丈老仔;广东:野白纸扇,凉丸(英德),白头公,白毛茶(化州),白花藤(高州、化州、茂名),白花茶(韶关、花县),白叶仔(新兴),春甘藤(五华),凉藤子(河源、连平),小凉藤(湛江),凉口茶(龙门),蛱蝶藤、尾蝶藤(潮汕),山甘茶、水甘茶(潮州),仙甘藤(揭阳、潮阳、普宁),五指蛇,假凉茶,三根茶,井水凉,大凉藤(阳春),两口烟藤,良口茶,银田茶,金露花,百花茶;海南:白梅,无藤;广西:黄蜂藤,生肌藤,粘雀藤,白叶树(乐业),〔银花〕(陆川),〔金银花〕(平南),鸡良藤(桂平),小良藤(博白),假辣椒(钟山),吹风凉,安眠药,蝴蝶草,蜻蜓痴,鸡凉茶,东带藤(龙胜),土麻药(天等),鸡肠风;云南:月亮翻白叶(双柏母名)。

功 效 藤、根:清热解暑,凉血解毒。用于中暑,风热感冒,支气管炎,扁桃体炎,咽喉炎,肾炎水肿,肠炎,子宫出血,毒蛇咬伤;茎:清凉消肿。

## 7232130

*Mycetia sinensis* (Hemsl.) Craib

植物名 华腺萼木《高植图鉴》

文献名 腺萼《广西药录》,腺萼木《广西植录》

地方名 广西:〔甜茶〕(龙州)。

功 效 根:除湿,利大小便;叶:用于扭伤。

## 7232131

*Nauclea officinalis* (Pierre ex Pitard) Merr. et Chun

植物名 乌檀《高植图鉴》

药材名 胆木《汇编》

文献名 药乌檀《科属词典》

地方名 山熊胆(广东、广西);广东:熊胆树,细叶黄染木,黄杨木(茂名);海南:树黄柏;广西:细叶黄棵木(防城)。

功 效 枝干、树皮:清热解毒,消肿止痛。用于感冒发热,急性扁桃体炎,咽喉炎,支气管炎,肺炎,泌尿系感染,肠炎,痢疾,胆囊炎。外用于乳腺炎,痈疖脓肿。

## 7232132

*Nauclea orientalis* L.

植物名 东方乌檀《汇编》

文献名 乌檀《植物名汇》

地方名 海南:胆木。

功 效 枝、树皮:清热解毒,消肿止痛。

## 7232133

*Neanotis hirsuta* (L. f.) W. H. Lewis --- *Anotis hirsuta* (L. f.) Boerl. --- *Oldenlandia hirsuta* L. f.

植物名 薄叶新耳草《广西药录》

药材名 小沙锅草《元江哈尼族药》

文献名 薄叶假耳草《高植图鉴》

地方名 广西:〔见消肿〕(昭平);云南:“秋素苏让”(元江哈尼语)。

功 效 全草:消肿止痛。用于耳内流脓,疖疮红肿,毒蛇咬伤。

## 7232134

*Neanotis ingrata* (Wall. ex Hook. f.) W. H. Lewis

植物名 新耳草《广西药录》

文献名 假耳草《西藏植志》

功 效 全草:用于毒蛇咬伤。

## 7232135

*Nertera sinensis* Hemsl.

植物名 薄柱草《高植图鉴》

药材名 薄柱草《湖南药物志》

地方名 四川:水泽兰(峨眉山)。

功 效 全株:止咳化痰,清肺平喘。用于哮喘。外用于烧烫伤。

## 7232135a

*Ophiorrhiza cantoniensis* Hance

植物名 广州蛇根草《高植图鉴》

药材名 广州蛇根草《广西药录》

文献名 大蛇根草《广西植录》,广东蛇根草《贵州药录》

地方名 湖南:朱砂草;贵州:紫金莲。

功效 根茎：用于咳嗽，神经衰弱；全草：用于肠炎，泄泻。

## 7232136

*Ophiorrhiza japonica* Blume -- *O. japonica* Blume var. *leicalyx* Hand. -Mazz.

植物名 日本蛇根草《高植图鉴》

药材名 蛇根草《汇编》

文献名 中蛇根草《广西植录》，平萼蛇根草《中草药》，血和散《汇编》，天青地红、自来血、血经草《中药大辞典》

地方名 雪里开花（浙江、湖南）；浙江：四季花（临安、杭州），雪里梅（温州、泰顺），地红草（余姚），佩玉英（乐清）；湖南：活血丹，阴蛇风，血贯肠，小枇杷，死后红；广西：散血草（全州）；贵州：岩泽兰，白指甲花，天青地白。

功效 全草：止咳祛痰，活血调经。用于肺结核咯血，气管炎，月经不调。外用于扭挫伤。

## 7232137

*Ophiorrhiza mungos* L.

植物名 蛇根草《高植图鉴》

药材名 硬毛蛇根草《中草药》

文献名 蛇根《云南种录》

功效 根：蛇药。

## 7232138

*Ophiorrhiza pumila* Champ. ex Benth.

植物名 短小蛇根草《高植图鉴》

药材名 小蛇根草《广西植录》

文献名 大叶蛇根草《广西药录》，绿蛇根草《海南植志》

地方名 广西：马黄桥（贺县）。

功效 根、叶：消肿，解毒。

## 7232139

*Ophiorrhiza succirubra* King ex Hook. f.

植物名 滇桂蛇根草《广西植录》

药材名 地贵草《汇编》

文献名 红汁蛇根《云南种录》，红汁蛇根草《西藏植志》，地贵草根《贵州民间药物》

功效 根：舒筋活络。用于风湿疼痛。

## 7232140

*Ophiorrhiza umbricola* W. W. Smith

植物名 荫生蛇根《云南种录》

药材名 自来血《汇编》

文献名 皱皮草《南充中草药》

地方名 贵州：岩泽兰，血经草，天青地红。

功效 全草：活血调经，补气养血，生肌，止咳。用于劳伤咳嗽，月经不调。外用于月经不调。

## 7232141 见 7232135a

## 7232142

*Paederia pertomentosa* Merr. ex Li

植物名 广西鸡屎藤《高植图鉴》

药材名 广西鸡屎藤《广西药录》

地方名 广西：毛鸡矢藤（罗城、鹿寨、桂林、资源），

狗屁藤（全州）；云南：“克思峨补”（元江哈尼语），鸡屎臭药（元江）。

功效 嫩叶、根：平肝熄风，健脾消食，壮肾固涩。用于小儿惊风，咳喘不息，小儿疳积，遗尿，皮肤痒痒；全株：用于疳疮肿毒。

## 7232143

*Paederia scandens* (Lour.) Merr. -- *P. scandens* var. *mairei* (Levl.) Hara

植物名 鸡矢藤《高植图鉴》

药材名 鸡矢藤《名实图考》、《汇编》

文献名 鸡屎藤《生草药性备要》，斑鸠饭、女育、主尿藤《质问本草》，却节《李氏草秘》，皆治藤、臭藤根《纲目拾遗》，牛皮冻、臭皮藤、臭茎子、迎风子《名实图考》，臭藤《天宝本草》，毛葫芦《岭南采药录》，臭狗藤《民药汇编》，牛皮藤《简明中医辞典》，臭老婆蔓、老鸱食《秦岭植志》

地方名 狗屁藤（广西、云南），臭屁藤（福建、广东、云南），鸡脚藤（江苏、云南），鸡香藤（台湾、广西），母狗藤（上海、四川），〔天仙藤〕、〔清风藤〕（福建、广东），青藤（湖南、广东）；陕西：鸡屎蔓，百花根（太白）；江苏：鸡粪藤（启东），臭藤子（云台山）；浙江：鸡屎藤，土巴戟（温州、乐清、泰顺），红鸡屎藤（平阳），福建：土巴吉（福鼎），犬屎藤（福清），苦藤（泉州），玉明砂（福安、周宁）；台湾：五德藤，山鸡屎藤；河南：老婆臭脚跟；湖北：大粪臭；湖南：光珠子（临湘、古丈），哑巴藤（常德、新宁）；广东：红花鸡屎藤（潮阳、陆丰），凤凰长（紫金），凤凰肠，扭肚藤（化县），臭鸡屎藤（潮州、普宁），小号鸡屎藤（普宁），乌肉鸡屎藤、〔风藤〕、〔土木香〕（潮州），〔青木香〕（潮汕），解暑藤、乌援藤（新会）；广西：甜藤，田藤（富川），雀儿藤（藤县）；四川：香藤、五香藤、臭母狗藤（成都）；云南：“嘿多吗”（西双版纳傣语），臭屎藤（文山）。

功效 根及全草：祛风利湿，消化积滞，止咳，止痛。用于风湿筋骨痛，跌打损伤，外伤性疼痛，肝胆、胃肠绞痛，黄疸型肝炎，肠炎，痢疾，消化不良，小儿疳积，肺结核咯血，支气管炎，放射反应引起的白细胞减少症，农药中毒。外用于皮炎，湿疹，疮疡肿毒。

## 7232144

*Paederia scandens* (Lour.) Merr. var. *tomentosa* (Blume) Hand. -Mazz. -- *P. tomentosa* Blume

植物名 毛鸡矢藤《高植图鉴》

药材名 毛鸡矢藤《汇编》

文献名 臭皮藤、臭茎子、迎风子《名实图考》，绒毛鸡屎藤《云南种录》

地方名 狗屁藤（湖南、广西）；浙江：毛牛皮冻，红鸡矢藤；湖北：鸡屎藤（神农架）；湖南：肺病藤；广东：皆治藤，毛葫芦，红花鸡屎藤（潮阳、陆丰），凤凰长（紫金），〔青藤〕、扭肚藤（化县），臭鸡屎藤（潮州、普宁），小号鸡屎藤（普宁），乌肉鸡屎藤、〔风藤〕、〔土木香〕（潮州），〔天仙藤〕（惠来），臭屁藤（陆丰），〔青木香〕（潮汕）；白毛鸡矢藤，鸡屎香藤；广西：小鸡矢藤（岑溪）；四川：五香藤（峨眉山）；云南：打屁藤（澜沧），“支布路区”（哈尼族语）。

功 效 根及全草：祛风利湿，消食化积，止咳，止痛。

#### 7232145

*Paederia yunnanensis* (Levl.) Rehd. - *Cynanchum yunnanensis* Levl.

植物名 云南鸡矢藤《高植图鉴》

药材名 云南鸡矢藤《汇编》

文献名 滇鸡屎藤《云南种录》，毛叶黄药《云南药录》

地方名 广西：黄根藤（百色），白占羊藤（百色、田东），白狗屁藤（隆林），白鸡屎藤（乐业），白鸡矢藤；云南：狗屁藤（澄江），臭屁藤。

功 效 根：消炎，止痛，接骨。用于肝炎，急性结膜炎，拔异物，骨折。

#### 7232146

*Pavetta arenosa* Lour.

植物名 大沙叶《高植图鉴》

药材名 大沙叶《广西药录》

地方名 广西：红皮狗骨（钦州），狗骨木（博白）。

功 效 根：用于肺结核；叶：用于跌打损伤。

#### 7232147

*Pavetta hongkongensis* Brem.

植物名 广东大沙叶《海南植志》

药材名 大沙叶《生草药性备要》、《汇编》

文献名 茜木《广西植录》，港大沙叶《云南种录》，满天星《高植图鉴》，大叶满天星《汇编》

地方名 广东：巴佛他树（阳春）；广西：猪屎栏，山铁风（蒙山），清风木（鹿寨）。

功 效 全株：清热解暑，活血祛瘀。用于中暑，感冒发热，肝炎，跌打损伤。

#### 7232148

*Prismatomeris tetrandra* (Roxb.) K. Schum.

植物名 南山花《高植图鉴》

药材名 黄根《汇编》

文献名 三角瓣花《高植图鉴》，四蕊三角瓣花《广西植录》

地方名 广西：白狗骨（博白），狗骨木。

功 效 根：凉血止血，利湿退黄。用于白血病，再生障碍性贫血，牙龈出血，肝炎，尿路感染，煤矽肺病。

#### 7232149

*Psychotria calocarpa* Kurz

植物名 美果九节《云南种录》

药材名 美果九节木《云南药录》

文献名 小功劳《云南中草药》，花叶九节木《汇编》

地方名 云南：牙齿硬。

功 效 全株：清热解毒，祛风利湿，镇痛。用于细菌性痢疾，肠炎，腹泻，咳嗽，癫痫，肾炎，膀胱炎，风湿性腰腿痛。

#### 7232150

*Psychotria rubra* (Lour.) Poir. --- *Antherura rubra* Lour.

植物名 九节《高植图鉴》

药材名 山大颜《岭南采药录》、《汇编》

文献名 山大刀、大舟叶、暗山公《生草药性备要》，暗山香、吹筒管《岭南采药录》

地方名 刀伤木、刀枪木（广东、广西）；福建：山壁耳、狗骨草、山棧、九节仔头、九节香、弄楼子；广东：山打大刀、山大刀根、山九节（普宁），山打劫（南海），山大雁，吹筒树（南海、增城），吹彤树，蚊同树（陆丰），〔六月雪〕（罗定），厚皮楠（高要），火筒树，刀背香（阳春），大口唇（东莞），驳节兰（英德），白面将军（五华），水母子（中山），苦竹条，九节草（惠阳），刀斧枪（湛江），雌雄叶，脂红叶（潮州），饭筒树（潮州、饶平），盆筒、接过龙（潮阳）；海南：大节（澄迈、琼中），山大眼，吹龙杆；广西：刀斧伤（北流、陆川），刀斧伤根，血丝罗伞，大退七，金鸡爪，〔大罗伞〕，散血丹，假木竹，山柴刀（平南），大刀伤（梧州、岑溪），大骨节（蒙山），〔大接骨〕（龙州），大牛力（苍梧），大木甘（贵县），九节木（武鸣），〔万年青〕（容县），狗脚梢（北海），浪伞根，浪伞树，黑门神，〔百两金〕，大穴症。

功 效 根、叶：清热解毒，消肿拔毒。用于白喉，扁桃体炎，咽喉炎，痢疾，肠伤寒，胃痛，风湿骨痛；叶：外用于跌打肿痛，外伤出血，毒蛇咬伤，疮疡肿毒，下肢溃疡。

#### 7232151

*Psychotria serpens* L.

植物名 蔓九节《高植图鉴》

药材名 穿根藤《福建中草药》

文献名 匍匐九节《中药大辞典》

地方名 风不动藤（浙江、台湾）；福建：白花风不动（霞浦、闽侯、福州、诏安），山芡实（莆田），潭薏米（福州），多泥红（龙岩），和尚头藤、蝶花藤、甘哥晚（漳浦），飞蛇草（福清），匍匐九节木、犬龙、飞天蜈蚣、半壁蜈蚣、青竹丝草、风不动（泉州）；台湾：捻壁龙；广东：春根藤、松根藤、伸筋藤、石邦子（惠阳），松筋藤、香根藤、石面莲（新会），〔络石藤〕，透筋藤，石山飞莲，白饭藤，铁骨椿根（潮州），川筋藤（澄海），香藤仔（普宁）；海南：蜈蚣藤（儋县）；广西：木头疳（北流），骨碎药、折伤木（玉林），上木蛇、细杀蛇（陆川），上树蛇（博白），上树金钱（岑溪），上石螺庵（苍梧）；其他：口筋藤，小春根，过桥风，过墙风，细风藤，爬壁藤。

功 效 枝、叶或全株：祛风湿，壮筋骨，止痛，消肿。用于风湿关节痛，咽喉肿痛，痈肿，疥疮，骨结核，坐骨神经痛。

#### 7232152

*Psychotria siamica* (Craib) Hutch. --- *Cephaelis siamica* Craib

植物名 毛九节《高植图鉴》

药材名 毛九节《广西药录》

文献名 花叶九节木《广西本草选编》，花叶九节《云南种录》，驳骨九节《广西药园药录》，泰国九节、驳骨草《广西药录》

地方名 广西：百样花（罗城、融安），茶山虫（田阳）；云南：小功劳，“牙卖硬”（西双版纳傣名）。

功 效 全株：清热解毒，祛风止痛。用于感冒，肠

炎,痢疾,风湿骨痛,跌打伤折。

### 7232153

*Psychotria straminea* Hutch.

植物名 黄脉九节《高植图鉴》

药材名 黄脉九节《广西药录》

功效 全株:解毒,消肿,止血。用于解木薯、断肠草中毒,风湿骨痛,刀伤出血。

### 7232154

*Psychotria tutchera* Dunn

植物名 假九节《广西药录》

功效 全株:消肿,止痛,祛风。

### 7232155

*Randia canthioides* Champ.

植物名 香楠《高植图鉴》

药材名 香楠《广西药录》

功效 茎、叶:用于跌打损伤。

### 7232156

*Randia cochinchinensis* (Lour.) Merr.

植物名 山黄皮《高植图鉴》

药材名 山黄皮《贵州药录》

功效 根:利湿清热,润肺止咳。用于痢疾,咳嗽。

### 7232157

*Randia henryi* Pritz.

植物名 西南香楠《广西药录》

功效 茎、叶:用于跌打损伤,骨折。

### 7232158

*Randia oxyodonta* Drake

植物名 尖萼山黄皮《海南植志》

药材名 尖萼山黄皮《广西药录》

文献名 尖萼山黄皮《广西药录》

地方名 广西:公王枝(平南)。

功效 根、叶:外用于跌打损伤,刀伤,出血。

### 7232159

*Randia salicifolia* Li

植物名 柳叶香楠《广西植录》

药材名 柳叶香楠《广西药录》

文献名 柳叶山黄皮《广西药录》

地方名 广西:凤凰尾、八大木(博白),五痛消(北流)。

功效 根、叶:用于痢疾,骨折。

### 7232160

*Randia sinensis* (Lour.) Schult. --- *Oxyceros sinensis* Lour.

植物名 鸡爪筋《高植图鉴》

药材名 鸡爪筋《广西药录》

文献名 鸡爪藤(拉汉英种称),狗筋《海南植志》

地方名 广东:鸡捶笏(广州);广西:凉粉木,痧麻木(武鸣),九耳木(大新),塘角鱼笏、鸡爪笏(南宁)。

功效 全株:祛瘀生新,收敛。用于痢疾。外用于疮疡,跌打肿伤。

### 7232161

*Randia spinosa* (Thunb.) Poir. --- *Xeromphis spinosa*

(Thunb.) Keay --- *Randia dumetorum* Lam. --- *Gardenia spinosa* Thunb.

植物名 山石榴《高植图鉴》

药材名 山石榴《广西本草述编》

文献名 筋拈树《高植图鉴》,山黄皮《云南药录》

地方名 什面花(广西、云南);浙江:刺榴(湖州);台湾:刺仔;广东:牙白子,刺球子,山蒲桃,屎缸拔,牛头箭、山葡萄(广州);广西:假石榴(平南),猪丧木(苍梧),猪肚筋,猪头果(贵县),筋泡木;其他:猪桑勒,〔穿破石〕,〔川破石〕。

功效 根、叶、果:有毒。散瘀消肿。用于跌打瘀肿,外伤出血。外用于防山蚂蚁叮咬,洗皮肤疥疮。

### 7232162

*Rubia chinensis* Regel et Maack

植物名 中华茜草《中药志》

药材名 大砧草《汇编》

文献名 华茜草《东北药植志》,红茜草《中药志》

地方名 〔茜草〕(东北、四川);浙江:染卵草,活血龙,接骨草;四川:丝线藤。

功效 根、根茎:凉血,止血,祛瘀,通经。

### 7232163

*Rubia chinensis* Regel & Maack f. *glabrescens* (Nakai)

Kitag. --- *R. mitis* Miq. f. *glabrescens* Nakai --- *R. chinensis* Regel & Maack var. *glabrescens* (Nakai) Kitag.

植物名 疏毛大砧草《东北药用植物》

功效 根及根茎:凉血,止血,活血祛瘀,通经活络,止咳祛痰。用于衄血、吐血,便血,尿血,崩漏,月经不调,经闭腹痛,过敏性紫癜,风湿痹痛,黄疸型肝炎,慢性气管炎。外用于肠炎,瘀滞肿痛,神经性皮炎;茎、叶:止血,行瘀,用于吐血,血崩,跌打损伤,风痹,腰痛,痈毒,疔肿。

### 7232164

*Rubia chinensis* Regel & Maack f. *mitis* (Miq.) Kitag.

植物名 光滑大砧草《东北药用植物》

功效 根及根茎:凉血,止血,活血祛瘀,通经活络,止咳祛痰。用于衄血、吐血,便血,尿血,崩漏,月经不调,经闭腹痛,过敏性紫癜,风湿痹痛,黄疸型肝炎,慢性气管炎。外用于肠炎,瘀滞肿痛,神经性皮炎;茎、叶:止血,行瘀。用于吐血,血崩,跌打损伤,风痹,腰痛,痈毒,疔肿。

### 7232165

*Rubia cordifolia* L.

植物名 茜草《高植图鉴》

药材名 茜草《本经》、《药典》

文献名 蒐《山海经》,茜根《本经》,地血、茹蕙、茅蒐、蓐《别录》,染绛草《本草经集注》,染绯草《蜀本草》,蓐藤、五叶藤《履巉岩本草》,过山龙《格致余论》,七茜苗《救荒本草》,血见愁、四补草、西天王草、四岳近阳草、铁塔草、风车儿草《土宿本草》,牛蔓《纲目》,地苏木、活血丹、八仙草《纲目拾遗》,金线草、红丝线、锦子草《名实图考》,地红、地苏、血藤、茹蕙、过山红《新纲》,辽茜草《东北药植志》



地方名 拉拉秧(北京、河北、青海、山东、西藏),拉拉藤(东北、陕西、上海、江苏、安徽、西北),小血藤(甘肃、湖北、贵州、云南),小活血(陕西、浙江、安徽、江西、福建、湖南、广东),小女儿红(陕西、湖南),女儿红(湖北、湖南),红茜草(河北、山东、江苏、浙江、安徽、湖北、江西、广东),红内消(安徽、江西、福建),红茜(江苏、安徽、湖北、广西),红根草(江西、福建),大红参(甘肃、云南),大茜草(四川、云南),破血丹(陕西、湖南),入骨丹(福建、台湾),锯锯草(陕西、甘肃、湖北),舒筋草(甘肃、云南),茜草根(江苏、台湾),血茜草(江苏、山东),调经草(湖南、江西、广东),四轮草(甘肃、江苏、湖南、广东、广西),活血草(江苏、江西、广东),沙茜秧根(河南、湖南),拉狗蛋(河北、山东);黑龙江:娘娘全、蛤蚧哈(哈尔滨);吉林:挂拉豆(临江),娘娘拳,粘草,“告杜蛇”(朝名);河北:牛席先,驴高麦,驴龙头,驴干粮,马脚子,拉巴秧,拉巴蔓,拉把草根;内蒙古:“纳嘎朗亥-乌布斯”、“哲木苏初”、“皂得”(蒙名);陕西:粘蔓草,〔鸡血藤〕、大活血丹(平利),大锯锯藤(太白);甘肃:粘粘草(武都);青海:“座”(藏名);山东:红裸子根,小孩拳,娃娃拳,拉拉秧子根,小孩拳头(烟台),绿伞(蓬莱),驴面汤(文登、荣成);江苏:红茜根(镇江、南京、盱眙),麦珠子、铁血藤(常熟),五爪龙(镇江),满江红(宜兴),九龙根(松江),血苋草,大麦珠子(邳县、铜山、徐州),家八仙、野八仙、醉八仙、地苏子、铁丝藤(常熟),小活血藤;上海:茜草藤;浙江:小活血龙,染蛋草(丽水、云和),染卵草(温州、永嘉、泰顺),鸡子草(乐清、平阳);安徽:四棱草,猫药草,伤力草;江西:锯消(宜黄),红线草,红米消(德兴);福建:土丹参,四方红根子,红根藤、草本入骨丹(泉州),红根锯子草(宁化),染蛋藤、鸭蛋藤(宁德),大叶锯子草,红根子(清流),人藤藤(明溪),四角钱、四角草(大田),三角草(三明),穿骨草,红髻巾,〔红藤子〕;台湾:金剑草;河南:涩拉秧,小涩拉秧;湖北:四轮藤,四轮分筋、马拉草(神农架);湖南:锯子叶,过江龙,三方割子草,上天梯,风车叶,割子草,四眼草,楼梯草(黔阳),四方草;广东:光叶老虎荆(阳山);海南:四敛梗、红丝线藤(儋县),三爪龙(澄迈);广西:少年风(北流);四川:“左”(藏名),土茜草,茜草血藤,锯锯藤,大仙藤;贵州:红龙须根;云南:铁箭草,刮眼草,锯齿草;西藏:过山藤;其他:山龙草,涩涩玻,大叶茜草。

功效 根、根茎:凉血,止血,祛瘀,通经。用于吐血,衄血,崩漏下血,外伤出血,经闭瘀阻,关节痹痛,跌扑肿痛。

#### 7232166

*Rubia cordifolia* L. var. *herbacea* Chun et How

植物名 肉叶茜草〔汇编〕

药材名 肉叶茜草〔广西药录〕

地方名 广西:茜草(隆林、贺县、阳朔);贵州:小血藤。

功效 根、根茎:凉血,止血,祛瘀,通经。

#### 7232167

*Rubia cordifolia* L. var. *longifolia* Hand.-Mazz. --- *Rubia*

*lanceolata* Hayata

植物名 长叶茜草〔云南种录〕

药材名 长叶茜草〔广西药录〕

文献名 接筋草〔《滇南本草》整理本〕,披针叶茜草〔秦岭植志〕,四轮草〔贵州药录〕

地方名 锯锯藤(陕西、四川);陕西:沾沾草(石泉),老麻藤(丹凤);甘肃:锯锯草(文县);湖北:小锯拉草、红茜草(神农架);广西:茜草(贺县);四川:“左”(藏名),土茜草;贵州:狭叶茜草。

功效 根、根茎:凉血,止血,祛瘀,通经;根(去皮):用于牙痛;叶汁:用于白癣。

#### 7232168

*Rubia cordifolia* L. var. *molliflora* --- *R. akane* Nakai var. *molliflora* Hsu

植物名 毛花茜草〔黄山植物研究〕

药材名 土茜草〔品种论述〕

地方名 山东:茜草。

功效 根:凉血,止血,祛瘀,通经。

#### 7232169

*Rubia cordifolia* L. var. *mollis* Chun et How

植物名 柔毛茜草〔广西药录〕

文献名 金线草〔名实图考〕,圆叶茜草〔广西兽药〕

地方名 台湾:红藤仔草,红根仔草;广西:白变花(都安),红散血(隆林),小血藤(龙胜);其他:风车儿草。

功效 根:补血,调经。用于小儿惊风,跌打损伤。

#### 7232170

*Rubia cordifolia* L. var. *pratensis* Maxim.

植物名 黑果茜草〔汇编〕

文献名 伏茜草〔东北药植志〕

地方名 茜草(黑龙江、辽宁、甘肃)。

功效 根、根茎:凉血,止血,祛瘀,通经。

#### 7232171

*Rubia cordifolia* L. var. *stenophylla* Franch.

植物名 狭叶茜草〔广西药录〕

文献名 辽茜草〔东北药植志〕,四轮草〔汇编〕

地方名 吉林:挂拉豆(临江、吉林);北京:拉拉秧;台湾:金剑草,茜草,红根子草;广西:红茜草(河池),节节草(乐业),四棱草,小叶红丝线(昭平、富川),土茜草(龙胜、兴安),红丝线,小血藤;四川:小女儿红(万县)。

功效 根、根茎:凉血,止血,祛瘀,通经。

#### 7232172

*Rubia magna* Hsiao

植物名 大茜草〔植分学报〕

药材名 大茜草〔中药志〕

地方名 四川:茜草。

功效 根、根茎:凉血,止血,祛瘀,通经。

#### 7232173

*Rubia mandersii* Coll. et Hemsl. --- *Rubia ustulata* Diels

植物名 大理茜草〔高植图鉴〕

药材名 大理茜草〔中药志〕

文献名 带褐茜草〔汇编〕,黑花茜草〔云南种录〕

地方名 云南: 小红参、茜草(昆明), 小茜草, 鸡血生。

功效 根: 凉血, 止血, 祛瘀, 通经。

## 7232174

*Rubia membranacea* (Franch.) Diels

植物名 膜叶茜草《秦岭志》

地方名 陕西: 猪猪藤(石泉), 大活血丹(眉县); 四川: 茜草(木里)。

功效 根: 凉血, 止血, 祛瘀, 通经。

## 7232175

*Rubia mungista* Roxb. - *R. cordifolia* L. var. *mungista* Miq.

植物名 木本茜草《品种论述》

地方名 台湾: 茜草, 红根仔草, 红藤仔草。

功效 根: 凉血, 止血, 祛瘀, 通经。

## 7232176

*Rubia oncotricha* Hand. - Mazz.

植物名 钩毛茜草《高植图鉴》

药材名 钩毛茜草《广西药录》

地方名 广西: 四棱草(乐业)。

功效 根: 用于病后虚弱。

## 7232177

*Rubia podantha* Diels

植物名 红花茜草《高植图鉴》

药材名 红花茜草《滇南本草》整理本)

文献名 柄花茜草《云南种录》

地方名 云南: 茜草。

功效 根茎、叶: 凉血, 止血, 祛瘀, 通经。

## 7232178

*Rubia schumanniana* Pritz. - *R. maillardi* Levl. et Van

--- *R. leiocaulis* (Franch.) Diels

植物名 大叶茜草《高植图鉴》

药材名 大叶茜草《中药志》

文献名 小红藤《汇编》, 川黔茜草、光茎茜草《云南种录》, 西南茜草《滇南本草》整理本)

地方名 贵州: 四块瓦; 云南: 茜草, 大茜草(曲靖), 小茜草(丽江), 沙糖根、小血散(丽江)。

功效 根茎、叶: 凉血, 止血, 活血散瘀。

## 7232179

*Rubia sylvatica* Nakai

植物名 林茜草《吉野》

药材名 林茜草《汇编》

地方名 吉林: 茜草。

功效 根茎、叶: 凉血, 止血, 散瘀, 通经。

## 7232180

*Rubia tinctoria* L.

植物名 染料茜草《品种论述》

文献名 西洋茜草《品种论述》

地方名 新疆: 茜草。

功效 根: 凉血, 止血, 散瘀, 通经。

## 7232181

*Rubia truppeliana* Loes.

植物名 山东狭叶茜草(拟)

药材名 狭叶茜草《汇编》

地方名 山东: 茜草。

功效 根: 凉血, 止血, 通经。

## 7232182

*Rubia wallichiana* Decne.

植物名 贵州肉叶茜草(拟)

文献名 肉叶茜草《贵州药录》

地方名 贵州: 小血藤。

功效 根: 凉血祛瘀, 用于衄血, 吐血, 便血, 尿血, 月经不调, 风湿性关节炎, 肝炎, 跌打损伤。

## 7232183

*Rubia yunnanensis* (Franch.) Diels

植物名 小红参《高植图鉴》

药材名 小红参《昆明民药》

文献名 [紫参]《滇南本草》, 滇紫参《名实图考》, 滇茜草《汇编》, 云南茜草《云南中草药》

地方名 云南: 小茜草, 小活血(昆明), 小红药、活血(红河), 红根, 小舒筋, “色子片”(普米族药名), 风车草、茜草(玉龙山), 沙糖根。

功效 根及根茎或全草: 活血通经, 镇静, 止痛。用于月经不调, 跌扑损伤, 风寒湿痹, 胃痛, 心烦失眠; 叶: 用于角膜云翳。

## 7232184

*Schizomussaenda dehiscens* (Craib) Li

植物名 裂果金花《高植图鉴》

药材名 树甘草《云南中草药》

地方名 广西: 根辣、木辣(龙州), 白头将军(天等); 云南: 大树甘草(思茅), “当娜”(傣名)。

功效 根、茎: 清热解毒, 消炎利尿, 祛风化痰。用于支气管炎, 肺热咳嗽, 咽喉炎, 扁桃腺炎, 肾炎水肿, 尿道感染, 疟疾。

## 7232185

*Serissa foetida* Comm. - *S. japonica* (Thunb.) Thunb.

植物名 白马骨《江苏植志》

药材名 白马骨《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 悉茗、素馨《花镜》, 曲节草、六月凌、六月霜、绿豆青、蛇蓝《和汉药标本目录》, 路边金《宁乡县志》, 六月雪《广西本草选编》

地方名 路边鸡(湖南、四川), 千年矮(河南、湖南), 满天星(福建、江苏); 江苏: 节节草(吴县); 江西: 鱼骨刺; 安徽: 千年短; 福建: 日日有(福州、福清、闽清、罗源、古田), 笔蒲花(福安、宁德、周宁、清流、宁化), 天星花(将乐、南靖), 日日春花(晋江), 白华蒲花(闽东), 白花花节节草, 喷雪花、白雪丹(泉州); 河南: 白千年矮; 白银球; 湖南: 坐山虎(长沙), 千年树(怀化), 白花树(蓝嘉), 铁线树(辰溪), 路边草(汝桂), 黄羊脑(新邵); 四川: 路边鸡, 路边姜, 路边荆, 路姜。

功效 全株: 健脾利湿, 疏肝, 活血。用于小儿疳积, 急、慢性肝炎, 经闭, 白带, 风湿骨痛; 茎(烧灰): 外用于目翳。

## 7232186

*Serissa serissoides* (DC.) Druce

植物名 六月雪《花镜》、《江苏植志》

药材名 六月雪《汇编》

文献名 白马骨根《名实图考》，路边鸡《草木便方》，路边金《宁乡县志》，满天星《阳春县志》，六月冷、曲节草《岭南采药录》，鱼骨刺、光骨刺、过路黄荆《中药大辞典》

地方名 天星木(广西、四川)，千年矮(江西、贵州)；浙江：鸡骨头草、鸡脚骨、鸡骨柴、鸡骨头柴(金华)，千年勿大、白马里梢、野黄杨树、水勿大、千年不大、米筛花冻米柴、月月有、朱米雪；安徽：猪积草、小白柴、白千年矮、地骨柴；江西：硬骨柴、白毛骨(吉水)，雪花盖顶、路边荆、白麻骨；福建：白花子樵、白花樵、笔蒲花(宁化)，白花子草(三明)，白壳子(明溪)，白花香雪籽(永安)，凸雪根(大田)，白花滴滴金、米碎花、日日有；湖北：野千年矮；湖南：铁线树、千年树、坐山虎(黔阳)，铁线树、马利子(溆浦)；广东：幼叶黄花蚊(东莞)，牛特草(阳江)，细叶满天星(惠阳)，臭屎荆(阳山)，白点秤；广西：细牙家、五经风(苍梧)，路边基、路边风、过路黄金、天星儿、天星草、五更风、惊风草(梧州)；四川：路边姜(峨眉山)，路姜；贵州：白金条(松桃)。

功效 全株：健脾利湿，疏肝，活血。用于小儿疳积，急、慢性肝炎，经闭，白带，风湿骨痛；茎(烧灰)：外用于日翳。

#### 7232187

*Spradiclis oblanceolata* W. L. Sha et X. X. Chen

植物名 长叶螺序草《广西药录》

功效 根：外用于疮疡肿毒。

#### 7232188

*Tarenna attenuata* (Voigt) Hutch.

植物名 乌口树《高植图鉴》

药材名 乌口树《汇编》

文献名 达仑木《广西本草选编》，假桂乌口树《广西植录》

地方名 广东：树节(海康)；海南：狗节木；广西：假桂(龙州)，茶山虫(南宁)，土五味子。

功效 全株：祛风消肿，散瘀止痛。用于跌打损伤，风湿骨疼，蜂窝组织炎，脓肿，胃肠绞痛，口疮炎。

#### 7232189

*Tarenna attenuata* (Voigt) Hutch. var. *puberula* Chun et How

植物名 毛萼乌口树《高植图鉴》

地方名 广西：茶山虫(天等)。

功效 全株：用于肝炎，风湿骨痛，扭伤。

#### 7232190

*Tarenna depauperata* Hutch.

植物名 白皮乌口树《高植图鉴》

药材名 白皮乌口树《广西药录》

文献名 白骨木《中国经植志》

地方名 广西：杂桂(龙州)，假枝子(邕宁)；云南：狗骨头。

功效 叶：外用于痢疮溃瘍。

#### 7232191

*Tarenna lanceolata* Chun et How

植物名 广西乌口树《贵州药录》

功效 全株：祛风消肿，散风止痛。用于风湿病，跌打损伤，关节炎，坐骨神经痛。

#### 7232192

*Tarenna mollissima* (Hook. et Arn.) Rob. --- *Cupia mollissima* Hook. et Arn. --- *Webera mollissima* Benth. ex Hance

植物名 密毛乌口树《海南植志》

药材名 毛乌口树《浙江药植志》

文献名 乌口树《名实图考》，白花苦灯笼《高植图鉴》，麻糖风《汇编》

地方名 浙江：白地骨皮、白秋风吹、白过冬青(温州、瑞安、乐清、泰顺、平阳)，白土地骨皮(温州、瑞安、平阳)，七西洋参(温州)，十样白(浙南)；广东：一枪到底、白花鬼点灯、大叶鬼点灯(粤北)，长叶白灯笼、白花鬼点火(惠阳)，小肠枫(梅县)，育作树(曲江)；广西：乌木(陆川)，达仑木。

功效 根、叶：清热解毒，消肿止痛。用于感冒发热，急性热病发热(流感、麻疹、流脑、乙脑等高热不退)，肺结核咳血，咳嗽，热性胃痛，疝气痛，坐骨神经痛；叶：外用于创伤，疮疖脓肿。

#### 7232193

*Tricalysia dubia* (Lindl.) Ohwi --- *T. viridiflora* (DC.) Matsum. --- *Diplospora dubia* Lindl.

植物名 狗骨柴《高植图鉴》

药材名 狗骨柴《汇编》

地方名 浙江：狗骨子，白鸡金(泰顺)，白秋制盘(龙泉)；海南：肖蒲树(临高)。

功效 根：消肿排脓。用于颈淋巴结核，背痛，头疖。

#### 7232194

*Tricalysia fruticosa* (Hemsl.) K. Schum.

植物名 毛狗骨柴《高植图鉴》

药材名 毛狗骨柴《中药通报》

文献名 狗骨柴《云南种录》，小狗骨柴《广西植录》，黄脚鸡《江西药录》

地方名 江西：黄鸡卵；湖南：“节捏莲”(蓝山县瑶名)。

功效 根：顺气化痰，止血。用于血崩，肠风下血，血虚，关节炎。

#### 7232195

*Uncaria formosana* (Mats.) Hayata

植物名 台湾钩藤《台湾中药材图鉴》

药材名 钩藤《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾：倒吊风。

功效 带钩枝：清热平肝，熄风定惊，降血压。

#### 7232196

*Uncaria gambier* Roxb.

植物名 儿茶钩藤《汇编》

药材名 方儿茶《汇编》

文献名 孩儿茶《饮膳正要》,乌爹泥、乌垒泥、乌丁泥《纲目》,古伦扑阿仙药《新纲》,刚皮尔、干巴阿仙药《中国植物图鉴》,干巴尔茶树、棕儿茶《药材学》,儿茶《汇编》,新儿茶、老儿茶、褐儿茶《中药大辞典》

功效 干枝煎汁浓缩的浸膏:清热化痰,敛疮止血。用于肺热咳嗽,咯血,腹泻,小儿消化不良。外用于疮疡久不收口,皮肤湿疹,口疮,扁桃腺炎。

## 7232197

*Uncaria hirsuta* Havil.

植物名 毛钩藤《高植图鉴》

药材名 钩藤《药典》

地方名 台湾:满天红,倒吊风,台湾钩藤;广西:红钩藤(藤县),双钩藤(龙州);贵州:倒钩藤。

功效 带钩茎枝:清热平肝,熄风定惊。用于头痛眩晕,感冒夹惊,惊痫抽搐,妊娠子痛,高血压症。

## 7232198

*Uncaria homomalla* Miq. --- *U. tonkinensis* Havil.

植物名 印支钩藤《云南种录》

药材名 四棱通《汇编》

文献名 北越钩藤《云南种录》,东京钩藤《药学报》,越南钩藤《云南药录》

地方名 云南:钩藤,双钩藤、四楞通、大通气(红河),倒挂金钩。

功效 根:清热平肝,熄风镇痉,活血通经。用于风湿关节炎,跌打损伤,坐骨神经痛,骨折,小儿惊风,高血压病,偏头痛,小儿脱肛,带下,外伤出血;带钩茎枝:清热平肝,熄风定惊。用于头痛眩晕,感冒夹惊,惊痫抽搐,妊娠子痛,高血压症。

## 7232199

*Uncaria laevigata* Wall. ex G. Don

植物名 平滑钩藤《广西药录》

药材名 倒挂金钩《汇编》

文献名 双钩藤《云南种录》

地方名 云南:“牛妈肩哦”(爱尼语)。

功效 带钩的藤:清热平肝,活血通经。

## 7232200

*Uncaria lancifolia* Hutch.

植物名 披针叶钩藤《汇编》

药材名 钩藤(云南)

文献名 倒挂金钩《云南经济植物》

功效 带钩茎枝:清热平肝,熄风定惊。

## 7232201

*Uncaria macrophylla* Wall.

植物名 大叶钩藤《高植图鉴》

药材名 钩藤《药典》

文献名 嫩双钩、鹰爪风、钩丁《简明中医辞典》

地方名 广西:大钩丁(桂平),水泡木(南宁);云南:双钩藤,“怀免王”(傣名)。

功效 带钩茎枝:清热平肝,熄风镇惊。用于头痛眩晕,感冒夹惊,惊痫抽搐,妊娠子痛,高血压症;根:舒筋活血。用于风湿性关节炎,坐骨神经痛,跌打损伤。

## 7232202

*Uncaria membranifolia* How

植物名 膜叶钩藤《品种论述》

地方名 广西:钩藤(上林)。

功效 带钩茎枝:清热平肝,熄风镇惊。

## 7232203

*Uncaria rhynchophylla* (Miq.) Jacks.

植物名 钩藤《高植图鉴》

药材名 钩藤《本草原始》、《药典》

文献名 钩藤《别录》,吊藤《本草经集注》,钩藤钩子《小儿药证直诀》,钩钩藤《滇南本草》,鹰爪风《草木便方》,天吊藤《植物名汇》,吊藤钩《新纲》,钩葛《树分》,嫩钩钩《饮片新参》,挂钩藤《药材学》,嫩双钩《简明中医辞典》,嫩钩藤、钩钩、双钩钩《常用中药名辨》,双钩《中草药学》

地方名 金钩藤(浙江、福建、广西、四川、贵州),双钩藤(浙江、江西、安徽、福建、湖南、广西、贵州、云南),鹰爪风(湖北、湖南、四川、云南),金钩钩(浙江、福建),钩丁(陕西、安徽);福建:金钩草(福安),倒吊钩(清流),吊钩子(松政),钩藤根(闽东);湖南:倒挂金钩,倒挂刺,倒钩藤,老鹰爪,猫鹰爪,鹰爪红,内消,内红消,倒挂钩;广东:吊风根、勾勾根(潮阳),吊风(普宁),倒吊风根(潮州);广西:方钩藤(岑溪),桂双钩(桂林);四川:金钩莲。

功效 带钩茎枝:清热平肝,熄风定惊,降血压。用于头痛眩晕,感冒夹惊,惊痫抽搐,妊娠子痛,高血压症;根:舒筋活血。用于风湿性关节炎,坐骨神经痛,跌打损伤。

## 7232204

*Uncaria scandens* (Smith) Hutch. --- *Nauclea scandens* Smith --- *Uncaria pilosa* Roxb.

植物名 攀枝钩藤《高植图鉴》

药材名 钩藤(广西、四川、云南)

文献名 倒钩风《高植图鉴》,攀茎钩藤《云南中草药志》

地方名 鹰爪风(广西、四川);云南:双钩,双钩藤。

功效 带钩茎枝:清热平肝,熄风定惊。用于头痛眩晕,感冒夹惊,惊痫抽搐,妊娠子痛,高血压症。

## 7232205

*Uncaria sessilifructus* Roxb.

植物名 白钩藤《高植图鉴》

药材名 钩藤《药典》

文献名 无柄果钩藤《广西植录》,无梗钩藤《中国经植志》,耿马钩藤、双钩藤、双钩《汇编》

地方名 云南:倒挂金钩。

功效 带钩的藤:清热平肝,熄风定惊。用于头痛眩晕,感冒夹惊,惊痫抽搐,妊娠子痛,高血压症。

## 7232206

*Uncaria sinensis* (Oliv.) Havil.

植物名 华钩藤《高植图鉴》

药材名 钩藤《药典》

文献名 钩藤《名实图考》,钩钩、双钩、双钩钩《常用中药名辨》,金钩莲、老鹰爪《品种论述》

地方名 鹰爪风(陕西、四川),双钩藤(陕西、湖北);  
陕西:鹰爪枫(平利、南郑);湖北:勾丁;其他:米钩。

功效 带钩的藤:清热平肝,熄风定惊。用于头痛  
眩晕,感冒夹惊,惊痫抽搐,妊娠子痫,高血压症。

## 7232207

*Uncaria wangii* How

植物名 鹰爪风《高植图鉴》

药材名 鹰爪风《中草药学》

文献名 王氏钩藤《药学报》,云南钩藤《广西植  
录》,启昌钩藤《中国经植志》

地方名 钩藤(广东、广西)。

功效 带钩茎枝:清热平肝,熄风定惊;根:用于肾  
炎;叶:用于解暑。外用于急性风湿痛。

## 7232208

*Uncaria yunnanensis* K. C. Hsia

植物名 云南钩藤《云南种录》

药材名 云南钩藤《中草药学》

地方名 云南:“麦和海”(勐腊傣语)。

功效 根:用于腰痛。

## 7232209

*Uronyllum chinense* Merr. et Chun

植物名 尖叶木《高植图鉴》

药材名 尖叶木《广西药录》

地方名 广西:千里马(凌云),鱼骨木(防城)。

功效 叶:散积。用于跌打损伤,产后骨痛。

## 7232210

*Wendlandia formosana* Cowan ssp. *breviflora* How

植物名 台湾水锦树《广西药录》

地方名 广西:沙牛木(宁明),伞月红(南宁)。

功效 叶:用于跌打损伤。

## 7232211

*Wendlandia scabra* Kurz

植物名 粗叶水锦树《广西药录》

地方名 广西:千里木、朱赤木(凌云)。

功效 叶:产后骨痛。

## 7232212

*Wendlandia tinctoria* (Roxb.) DC. ssp. *orientalis* Cowan

植物名 东方水锦树《广西药录》

药材名 东方水锦树《广西药录》

地方名 广西:沙牛木(平南)。

功效 叶:用于跌打损伤。

## 7232213

*Wendlandia uvariifolia* Hance

植物名 水锦树《高植图鉴》

药材名 水锦树《汇编》

文献名 黄藤芽、红木《汇编》

地方名 广西:红水柴(邕宁),沙牛木(灵山),大虫  
耳(平南),猪血木(龙州、容县),牛伴木(容县),双耳蛇  
(苍梧),饭汤木。

功效 根:祛风除湿,散瘀消肿,止血生肌。用于  
风湿性关节炎,跌打损伤;叶:外用于外伤出血,疮疡溃  
烂久不收口。

## 7233 忍冬科 Caprifoliaceae

## 7233001

*Abelia biflora* Turcz.

植物名 六道木《中国植志》

药材名 六道木《汇编》

文献名 六条木《盛京通志》,二花六条木《东北木本  
图志》,双花六道木《中国树木志》

地方名 浙江:交翅木。

功效 果实:祛风湿,消肿毒。用于风湿筋骨疼  
痛,痈毒红肿。

## 7233002

*Abelia chinensis* R. Br.

植物名 糯米条《中国植志》

药材名 糯米条《名实图考》、《湖南药物志》

文献名 茶条树《名实图考》,华六条木《山东树木  
志》

地方名 浙江:大叶白马骨;广西:白花树(富川);湖  
南:小桑鸡,小榆蜡树,山柳树,水蜡,毛蜡叶子树。

功效 茎、叶:清热解毒,止血。用于泄泻,小儿口  
疮,对口疮,疔腮,止血,小儿疳虫蚀齿;叶:用于跌打损  
伤,流感。外用于小儿口疮,腮腺炎。

## 7233003

*Abelia dielsii* (Graebn.) Rehd. --- *A. zanderii* (Graebn.)  
Rehd.

植物名 南方六道木《中国植志》

药材名 南方六道木《浙江药植志》

文献名 太白六道木《树分》

功效 果实:用于风湿痹痛。

## 7233004

*Abelia engleriana* (Graebn.) Rehd.

植物名 通梗花《中国植志》

药材名 通花梗《四川中药志》

文献名 短枝六道木《高植图鉴》

地方名 陕西:鸡骨头(太白、山阳、石泉),神仙叶  
子,神仙菜;四川:紫荆丫;贵州:寸花木(凤冈)

功效 果实或花:祛风湿,解热毒。用于风湿筋骨  
疼痛。外用于痈疮红肿;根:理气止痛,清热燥湿。用  
于牙痛,高热,火眼。

## 7233005

*Abelia macrotera* (Graebn. et Buchw.) Rehd.

植物名 二翅六道木《中国植志》

药材名 通花梗《贵州药录》

功效 根:理气止痛,清热燥湿。用于牙痛,高热,  
火眼;果实:祛风湿,解热毒。用于风湿筋骨痛。

## 7233006

*Abelia parvifolia* Hemsl.

植物名 小叶六道木《中国植志》

药材名 紫荆梗《四川中药志》

文献名 鸡壳肚花、鸡肚子、裸裸兜《高植图鉴》,福  
建六道木《云南种录》

地方名 贵州:对月花。

功 效 全株:祛风除湿,消肿解毒。用于风湿筋骨疼痛,痈疽肿毒。

## 7233007

*Dipelta yunnanensis* Franch. --- *D. ventricosa* Hemsl.

植物名 云南双盾木(中国植志)

药材名 鸡骨柴(汇编)

文献名 鸡骨柴、垂枝双盾(四川中药志),云南双盾(树分)

地方名 四川:鸡骨柴(峨眉山)。

功 效 根:散寒发汗。用于麻疹,痘毒,湿热身痒,穿踝风等症。

## 7233008

*Leycesteria formosa* Wall.

植物名 鬼吹箫(中国植志)

药材名 鬼吹箫(云南中草药)

文献名 空心木、来色木(中国树木志)

地方名 风吹箫(云南、西藏);云南:夜吹箫(红河),水笛草,鬼吹箫(玉龙山),梅叶竹(昆明),野芦柴(曲靖),“大木比替力”(楚雄彝名),大追风,炮胀筒;西藏:云通,金鸡一把锁。

功 效 全株:破血,祛风,平喘。用于哮喘,风湿性关节炎,月经不调,黄疸型肝炎,尿道炎,水肿,眼病。

## 7233009

*Leycesteria formosa* Wall. var. *stenosepala* Rehd. --- *L. formosa* Wall. var. *glandulosissima* Airy. - Shaw

植物名 狭萼鬼吹箫(中国植志)

药材名 炮仗筒(汇编)

文献名 狭萼风吹箫(云南种录)

地方名 云南:大笔杆草(曲靖),水梭子、梅竹叶、猴橘子、金鸡一把锁(丽江),“叉活活”(纳西族语),空心草(大理、曲靖),鬼炮仗(昆明),鬼竹子,炮掌筒,炮竹筒。

功 效 全株:消炎,理气,活血。用于膀胱炎,水肿,支气管哮喘,食积,腹胀,风湿痛,痔疮。外用于骨折,出血。

7233010 见 7233023a

7233011 见 7233038a

## 7233012

*Lonicera acuminata* Wall. --- *L. henryi* Hemsl. --- *L. henryi* Hemsl. var. *subcoriacea* Rehd. --- *L. fuschsioides* Hemsl.

植物名 淡红忍冬(中国植志)

药材名 淡红忍冬(品种论述)

文献名 巴东忍冬(高植图鉴),山银花(植分学报),渐尖叶忍冬(汇编),茶银花、短吊银花(药学报),小银花、石山金银花(品种论述)

地方名 浙江:小叶巴东忍冬;广西:大山金银花(全州),渐尖忍冬,光冠银花;四川:肚子银花;云南:金银花(丽江、大姚),野金银花(大理)。

功 效 花蕾:清热,解毒;茎、枝:清热,解毒,通络。

## 7233013

*Lonicera bournei* Hemsl.

植物名 西南忍冬(中国植志)

药材名 短唇金银花(品种论述)

地方名 云南:金银花(峨山)。

功 效 花蕾:清热,解毒。用于风热感冒,咽喉肿痛,肺炎,痢疾,疮疡肿毒,丹毒。

## 7233014

*Lonicera buechananii* Lacc

植物名 滇西忍冬(中国植志)

药材名 金银花(药学报)

功 效 花蕾:清热,解毒。

## 7233015

*Lonicera caerulea* L. var. *edulis* Turcz. ex Herd.

植物名 蓝锭果(高植图鉴)

药材名 蓝锭果(长白山植药志)

文献名 蓝锭果忍冬(东北木本图志),乌啄李(中国树木志)

地方名 吉林:黑瞎子果,狗奶子。

功 效 果实:清热解毒。

## 7233016

*Lonicera calcarata* Hemsl.

植物名 长距忍冬(中国植志)

药材名 长距忍冬(药学报)

文献名 距花忍冬(贵州药录)

地方名 四川:通骨藤(峨眉山);贵州:大金银花。

功 效 花蕾:清热解毒。用于上呼吸道感染,乳腺炎,急性结膜炎,热痢,便血,肿毒。

## 7233017

*Lonicera chrysantha* Turcz. --- *L. chrysantha* Turcz. var. *longipes* Maxim.

植物名 金花忍冬(中国植志)

文献名 黄金银花(树分),黄花忍冬(东北木本图志)

功 效 花蕾:清热解毒。

## 7233018

*Lonicera confusa* (Sweet) DC.

植物名 华南忍冬(中国植志)

药材名 山银花(汇编)

文献名 土银花(岭南草药志),毛萼忍冬(中草药学),山金银花(鉴别手册),假金银花(海南植志),忍冬(民族药志),金银花(药典)

地方名 土忍冬、银花藤(广东、广西);广东:银花(河源、连平、阳江、阳春、高州),忍冬藤(广州、清远),假银花(广州),金钱花(饶平),手巾花(海丰),山起藤(潮安、潮州),土银花藤,左缠苻,左转藤,耳盘花(兴宁),土花、黄鳞花(云浮);广西:旱花,糖花,永淳银花,土金银花,大金银花;四川:肚子银花(峨眉山);云南:双花,二宝花。

功 效 花蕾或初开的花:清热解毒,凉散风热。用于痈肿疔疮,喉痹,丹毒,热毒血痢,风热感冒,温病发热。

## 7233019

*Lonicera crassifolia* Batal. --- *L. rhodoendroides* Graebn.

植物名 匍匐忍冬《中国植志》  
 药材名 毛金银花《品种论述》  
 地方名 四川:金银花(武隆)。  
 功效 花蕾:清热,解毒。用于风湿病。

## 7233020

*Lonicera dasystyla* Rehd.

植物名 水忍冬《中国植志》  
 药材名 金银花《药典》  
 文献名 毛花柱忍冬《药典》,毛柱忍冬《广西药录》,毛柱金银花《广西植录》  
 地方名 广西:水银花(宜山、横县、都安、忻城),水花(扶绥),忍冬藤(忻城)。  
 功效 花蕾:清热解毒,凉散风热。用于痈肿疔疮,喉痹,丹毒,热毒血痢,风热感冒,温病发热。

## 7233021

*Lonicera ferruginea* Rehd. --- *L. fulva* Merr.

植物名 锈毛忍冬《中国植志》  
 药材名 锈毛忍冬《广西药录》  
 文献名 锈毛金银花《广西植录》  
 地方名 广东:老虎合藤(从化);贵州:金银花。  
 功效 花蕾:清热解毒;藤:清热解毒,通络。

## 7233022

*Lonicera fragrantissima* Lindl. et Paxt. subsp. *standishii* (Carr.) Hsu et H. J. Wang --- *L. standishii* Carr.

植物名 苦糖果《中国植志》  
 药材名 苦糖果《汇编》  
 文献名 大金银花、小金银花《中药大辞典》  
 地方名 骆驼布袋(山东、河南);陕西:神仙豆腐、鸡骨头(石泉),苦竹泡(宁陕),驴奶果(蓝田);山东:狗蛋子(烟台);浙江:山铜盆;安徽:磨把树(黟县);四川:羊尿泡(南川);贵州:破骨风;云南:千层皮(镇雄)。  
 功效 嫩枝叶:祛风除湿,清热止痛。用于风湿性关节痛。外用子疔疮。

## 7233023

*Lonicera fulvotomentosa* Hsu et S. C. Cheng

植物名 黄褐毛忍冬《中国植志》  
 药材名 黄褐毛忍冬《广西药录》  
 文献名 褐绒忍冬、黄毛忍冬《品种论述》  
 地方名 广西:金银花(隆林)。  
 功效 花蕾:清热解毒。

## 7233023a

*Lonicera gynochlamydea* Hemsl.

植物名 蕊被忍冬《中国植志》  
 药材名 蕊被忍冬《贵州药录》  
 地方名 贵州:大金银花。  
 功效 花蕾:清热解毒。用于上呼吸道感染,乳腺炎,急性结膜炎,热痢,便血,肿毒。

## 7233024

*Lonicera hildebrandiana* Coll. et Hemsl.

植物名 大果忍冬《云南种录》  
 药材名 大果忍冬《广西药录》  
 文献名 金银花《中草药》

功效 根、茎、叶:用于跌打损伤。

## 7233025

*Lonicera hispida* Pall. ex Roem. et Schult.

植物名 刚毛忍冬《中国植志》  
 药材名 刺毛忍冬《品种论述》  
 文献名 刺毛金银花《树分》,子弹把子《高植图鉴》  
 功效 花蕾、果:清热散风,明目止咳。

## 7233026

*Lonicera hypoglaucha* Miq. --- *L. affinis* Hook. et Arn. var. *pubescens* Maxim.

植物名 菰腺忍冬《中国植志》  
 药材名 金银花《药典》  
 文献名 腺叶忍冬《中草药学》,盘腺忍冬《品种论述》,忍冬《民族药志》,腺背忍冬《广西药录》,盾腺忍冬《浙江药植志》,毛金银花《广西植录》,大叶银花藤、小毛花、大禾花《药学报》,光冠银花《中药大辞典》  
 地方名 山银花(浙江、广东、广西);江西:大叶金银花(安福);广西:银花(崇左),金银藤(平南、容县、藤县),忍冬藤(贵县),和生坤(龙州),双花,大金银花(临桂);湖南:岩银花,“叫波老”(侗语),大银花(新化);广东:〔狗牙花〕。  
 功效 花蕾:清热解毒,凉散风热。用于痈肿疔疮,喉痹,丹毒,热毒血痢,风热感冒,温病发热。

## 7233027

*Lonicera hypoglaucha* Miq. subsp. *nudiflora* Hsu et H. J. Wang

植物名 净花菰腺忍冬《中国植志》  
 药材名 金银花(广东、广西、湖南、贵州)、《药学报》

功效 花蕾:清热解毒,凉散风热。用于痈肿疔疮,喉痹,丹毒,热毒血痢,风热感冒,温病发热。

## 7233028

*Lonicera japonica* Thunb. --- *L. japonica* var. *chinensis* (Watson) Baker --- *L. japonica* Thunb. var. *sempervillosa* Hayata

植物名 忍冬《别录》、《中国植志》  
 药材名 金银花《履巉岩本草》、《药典》  
 文献名 忍冬藤《本草经集注》,忍冬花《唐本草》,老翁须、金钗股、大薜荔、水杨藤、〔千金藤〕《苏沈良方》,鸳鸯草《墨庄漫录》,忍寒草《洪氏集验方》,鸳鸯藤《履巉岩本草》,忍冬草《证治要诀》,左缠藤《余居士选奇方》,通灵藤、蜜桶藤《土宿本草》,金银花藤《丹溪心法》,金银藤《乾坤生意秘辑》,金银花杆《滇南本草》,甜藤《本草述》,银花《温病条辨》,金银露《金氏药帖》,鸳鸯花《名实图考》,左篆藤《分类草药性》,缠藤《植物名汇》,由比得、老公须、左纹藤、蜜吸花、左纽、金银花草、过冬藤、鸳鸯草、耐冬《新纲》,金银花子《饮片新参》,苏花《药材资料汇编》,双花《中药材手册》,忍冬花露《中国医学大辞典》,金花藤《药材学》,尖子银花《品种论述》

地方名 二花(陕西、江苏、安徽、河南、湖北),二宝花(辽宁、河北、江苏、浙江),土银花(浙江、安徽),右旋

藤(四川、贵州、云南),茶叶花(东北、山东),银花藤(江苏、江西、湖南),两宝花、两宝藤(上海、江西),包双花(东北),银藤(江苏、浙江);黑龙江:王八骨头;河北:金藤花;山东:东银花,济银花,红金银花;江苏:金花,净山银花;上海:二色花藤;浙江:双苞花,子风藤(丽水),双宝花(温州、乐清、平阳、瑞安),二苞花;安徽:山银花;福建:鸳鸯藤;台湾:四时春;河南:二花秧,银花秧,南银花,怀银花,密银花,淮密,怀密,禹密,密二花,山二花;湖北:〔茶花〕;湖南:密桶草,开口花,二双,二宝;广西:小山金银花(兴安),小金银花,小叶银花藤,小山花(全州);四川:右转藤(成都),二宝藤;

功效 花蕾:清热解毒,凉散风热。用于痈肿疔疮,喉痹,丹毒,热毒血痢,风热感冒,温病发热;茎枝:清热解毒,疏风通络。用于温病发热,热毒血痢,痈肿疮疡,风湿热痹,关节红肿热痛。

## 7233029

*Lonicera lanceolata* Wall.

植物名 柳叶忍冬《中国植志》

药材名 小叶金银花《中药大辞典》

文献名 西藏小叶忍冬《汇编》

功效 花蕾:清热解毒。

备考 在西藏亦作金银花用。

## 7233030

*Lonicera ligustrina* Wall.

植物名 女贞叶忍冬《中国植志》

地方名 四川:矮托托(峨眉山)。

功效 花蕾、藤:清热解毒,消炎利湿,通络。

## 7233031

*Lonicera longiflora* (Lindl.) DC.

植物名 长花忍冬《中国植志》

药材名 长花忍冬《汇编》

文献名 长花银花《广西植录》

功效 花蕾、藤:清热解毒,消炎利湿,通络。

备考 在广东亦作金银花用。

## 7233032

*Lonicera maackii* (Rupr.) Maxim. --- *L. maackii* (Rupr.) Maxim. f. *podocarpa* Franch. ex Rehd.

植物名 金银忍冬《中国植志》

药材名 金银木《湖南药物志》

文献名 冠骨头《满蒙野卉》,短柄忍冬《汇编》,小花金银忍冬《东北木本图志》,短柄金银忍冬《西藏植志》,马氏忍冬《山东树木志》

地方名 吉林:王八骨头;辽宁:千层皮,马尿树;江苏:胯把树;河南:狗巢谷,狗狗木;湖北:鸡骨头树;湖南:木金银,树金银,木银花,金银藤;四川:鸡骨头;云南:狗骨头树。

功效 全株:祛风,解百毒,消肿止痛。用于梅毒,头晕,跌打损伤。

## 7233033

*Lonicera macrantha* (D. Don) Spreng. --- *L. hirtiflora* Champ. --- *L. guillonii* Levl. et Vant.

植物名 大花忍冬《中国植志》

药材名 大花金银花《品种论述》

地方名 大金银花(上海、贵州),金银花(广西、广东、浙江)。

功效 花蕾、叶:清热,解毒,消炎。

## 7233034

*Lonicera macrantha* (D. Don) Spreng. var. *heterotricha* Hsu et H. J. Wang --- *L. esquirolii* Levl.

植物名 异毛忍冬《中国植志》

药材名 小银花《药学报》

文献名 异毛大花忍冬、急尖忍冬《云南种录》,短尖忍冬《广西药录》

地方名 广西:金银花(隆林、那坡);四川:鸢子银花(兴文)。

功效 花蕾:清热,解毒,消炎。

## 7233035

*Lonicera macranthoides* Hand. -Mazz.

植物名 灰毡毛忍冬《中国植志》

药材名 大山金银花(广西全州)

文献名 拟大花忍冬《高植图鉴》,假大花忍冬《广西药录》,中银花、小山银花《药学报》

地方名 大山花(江西、广西),大银花、岩银花、木银花、山银花(湖南、贵州),大金银花(湖南、广西);江西:左转藤(遂川);湖南:金银木(邵阳);广西:野金银花,大解毒茶(富川)。

功效 花蕾:清热解毒,凉散风热。

## 7233036

*Lonicera myrtillos* Hook. f. et Thoms.

植物名 越橘叶忍冬《中国植志》

文献名 越橘忍冬《云南种录》

地方名 青海:“旁玛那保”(藏名);西藏:丘马(亚东)。

功效 果:用于心脏病,月经不调。

## 7233036a

*Lonicera nubium* (Hand. -Hazz.) Hand. -Mazz.

植物名 云雾忍冬《中国植志》

药材名 湖广金银花《品种论述》

文献名 湖南金银花《广西植录》,湖广忍冬《拉汉种称》

功效 花蕾:清热解毒。

## 7233037

*Lonicera pampaininii* Levl.

植物名 短柄忍冬《中国植志》

药材名 小金银花(湖南、贵州)、《品种论述》

文献名 贵州忍冬《高植图鉴》,秃花柱忍冬、土银花《鉴别手册》,小银花《药学报》

地方名 广西:狗爪花(全州);安徽:山银花(青阳)。

功效 花蕾:清热,解毒;藤茎:清热,解毒,通络。

## 7233038

*Lonicera pileata* Oliv.

植物名 蕊帽忍冬《中国植志》

地方名 四川:水绿。

功效 花蕾、藤:清热解毒,祛风除湿。



**7233038a**

*Lonicera reticulata* Champ. var. *rushanensis* Y. C. Tang

植物名 独山忍冬《高植图鉴》

药材名 独山忍冬《贵州药录》

功效 花蕾:清热解毒。用于上呼吸道感染,乳腺炎,急性结膜炎,热痢,便血,肿毒。

**7233039**

*Lonicera rhytidophylla* Hand.-Mazz. --- *L. reticulata* Champ. --- *Caprifolium reticulatum* O. Ktze.

植物名 皱叶忍冬《中国植志》

药材名 皱叶金银花(拟)

文献名 网脉叶忍冬《汇编》,网脉忍冬《广西药录》,网脉银花《广西植志》,左转藤《高植图鉴》

地方名 广西:大山金银花(临桂),早黄米(贺县),金银花。

功效 花蕾、叶:清热,消炎。

**7233040**

*Lonicera rupicola* Hook. f. et Thoms. var. *syringantha* (Maxim.) Zabel --- *L. syringantha* Maxim. --- *L. syringantha* Maxim. var. *wolfii* Rehd.

植物名 红花岩生忍冬《中国植志》

药材名 红花忍冬《青藏药图》

文献名 红花矮小忍冬《西藏植志》

地方名 青海:“日吉阿日那”(藏名);四川:茶西(若尔盖)。

功效 茎、枝:强心,消炎。

**7233041**

*Lonicera similis* Hemsl. --- *L. similis* Hemsl. var. *delavayi* (Franch.) Rehd. --- *L. delavayi* Franch.

植物名 细毡毛忍冬《中国植志》

药材名 吊子银花《汇编》

文献名 细苞金银花《树分》,细绒忍冬《云南种录》,细苞忍冬《高植图鉴》,相似忍冬《广西药录》,土银花《鉴别手册》

地方名 金银花(浙江、广西、四川);湖南:岩银花,茶花,大银花;贵州:大金银花;云南:山金银,山金银花。

功效 全草:镇惊,祛风,败毒。用于小儿急惊风,一切疮毒。

**7233042**

*Lonicera similis* Hemsl. var. *omeiensis* Hsu et H. J. Wang

植物名 峨眉忍冬《中国植志》

功效 花蕾、叶:清热,解毒,消炎。

**7233043**

*Lonicera subaequalis* Rehd.

植物名 川黔忍冬《中国植志》

药材名 酥骨散《峨眉药植资源》

功效 花蕾:清热解毒,排脓消肿。

**7233044**

*Lonicera tangutica* Maxim.

植物名 唐古特忍冬《中国植志》

药材名 陇塞银花(拟)

文献名 鬼脸刺《秦岭植志》,矮金银花《树分》

功效 花蕾、果:清热解毒。

**7233045**

*Lonicera tragophylla* Hemsl. --- *L. harmsii* Graebn. ex Diels

植物名 盘叶忍冬《中国植志》

药材名 盘叶忍冬《汇编》

文献名 贯叶忍冬《中国树木志》,叶藏花《高植图鉴》

地方名 大银花(陕西、贵州),土银花(甘肃、四川),杜银花(陕西、甘肃、四川);河南:大叶银花;贵州:大金银花(印江)。

功效 花蕾、叶:清热,解毒,消炎。

**7233046**

*Lonicera trichosepala* (Rehd.) Hsu --- *L. henryi* Hemsl. var. *trichosepala* Rehd.

植物名 毛萼忍冬《中国植志》

药材名 毛萼忍冬《浙江药植志》

功效 花蕾:清热解毒;藤茎:清热解毒,通络。

**7233047**

*Lonicera webbiana* Wall. --- *L. heteroloba* Batal. --- *L. adenophora* Franch. --- *L. tatsiensis* Franch.

植物名 华西忍冬《中国植志》

文献名 西南忍冬《西藏植志》,华南忍冬《云南种录》,康定忍冬(拉汉英种称),裂叶忍冬(拉汉种称)

功效 全株:祛风除湿,通筋活络,平喘。

**7233048**

*Sambucus adnata* Wall. ex DC.

植物名 血满草《中国植志》

药材名 血满草《名实图考》、《云南中草药》

文献名 贴生接骨木《青藏药图》,珍珠麻《云南中草药选》

地方名 血莽草(云南、西藏),大接骨丹(陕西、甘肃);青海:“由格兴那保”(藏名);贵州:血当归;云南:大血草(保山),血管草(大理),红山花、接骨药(红河),接骨丹(曲靖),接骨草,血风草,血藤草,臭草;西藏:“榆古兴那布”(藏名);其他:贴生接骨草。

功效 全株、根:活血散瘀,祛风湿,利尿。用于风湿性关节炎,慢性腰痛腿痛,扭伤瘀血肿痛,水肿。外用于骨折,跌打损伤。

**7233049**

*Sambucus chinensis* Lindl. --- *S. javanica* auct. non Reinw. ex Blume

植物名 陆英《汇编》

药材名 陆英《本经》、《汇编》

文献名 蒴藋、葇、葇草《别录》,蜀州陆英《证类本草》,玉梗半枝莲《百草镜》,玉净瓶《纲目拾遗》,排风草、珊瑚花、珍珠花《名实图考》,排风藤、铁篱笆《名实图考长编》,臭草《草木便方》,英雄草《分类草药性》,苛草《天宝本草》,走马箭、赤苓叶《岭南采药录》,蒴藋苗、馥馥苗《植物名汇》,公道老《树分》,鸡蹄风《中国药植志》,八厘麻《中草药》,接骨草《中国植志》

地方名 八棱麻(陕西、安徽、江西、湖北、湖南、广东、贵州),尖尾风(广东、广西),接骨丹(陕西、广西、四川),落得打(浙江、江西),走马风(江苏、广东、广西),八里麻(陕西、湖北),七里麻(江西、湖南),马鞭三七(浙江、湖南),臭草根(陕西、四川);陕西:乌鸡腿、水马桑(略阳),地马桑;甘肃:见肿消、开口剪、臭香叶(文县),丑二籽;江苏:去风草、赶山虎;浙江:珍珠莲(兰溪、天台、乐清、温州),百轮麻(天目山);江西:地七叶黄荆(婺源),排草、顺筋草、强盗草、七棱麻(德兴),观音笋、野杂兰、管山莆(泰和);福建:梭草(宁化),毛骨仔(松政),有骨消(泉州),水椿,水椿根,乌脚仙,散血椒,七叶金,猴接骨,〔七叶莲〕、大水柴根、大血药(清流),山当归(永安),七爪洋羌(三明);湖北:臭黄金;湖南:草接骨木,朔草、藜藿芬(常德);广东:七叶星(普宁),七星剑(潮仙),尺茎叶根(广州),金桃叶(潮安),鸡爪风,鸭仔风,七皮莲,臭打药;广西:〔五加皮〕,耳割草(平南),鸭爪风(蒙山),鸭脚风(梧州),鹤膝风、升骨丹(贵县),鹤虱风、穿窗风(昭平),白走马风(博白),过墙风(玉林),大桔草(南丹),大鹰爪(苍梧),大枝草(大瑶山),七叶五加皮、拔地麻(临桂),山走马、沙塘菜(桂平),江狗草、鬼把火、接骨通、潘享(龙州),消满风(忻城),臭菜(凌云),野巴林麻(资源),黑节风(平南、桂平、藤县),藤地风(钟山),五甲皮,龙州三七,葛辣;四川:小臭牡丹,秧心草,苟草根,〔臭牡丹〕,〔鸡骨常山〕,散血草,大臭草;贵州:扫地风,英鸡草;云南:大血草,小血满草,小漆树草,小接骨丹,“牙沙办”(傣名),吸风草,珍珠麻。

功效 全草或根:散瘀消肿,祛风活络。用于跌打损伤,扭伤肿痛,骨折疼痛,风湿性关节痛;茎、叶:利尿消肿,活血止痛。用于肾炎水肿,腰膝酸痛。外用于跌打肿痛;果实:用于手足疣目。

备考 过去文献常将本品误订为 *Sambucus javanica* Reinw. ex Blume

#### 7233050

*Sambucus nigra* L.

植物名 西洋接骨木《中国植志》

药材名 洋接骨木《汇编》

功效 花:舒筋活络,接骨镇痛,止血生肌。

#### 7233051

*Sambucus peninsularis* Kitag.

植物名 长尾叶接骨木《东北木本图志》

功效 枝:利尿消肿,活血止痛。

#### 7233052

*Sambucus williamsii* Hance --- *S. manshurica* Kitag. --- *S. foetidissima* Nakai et Kitag. --- *S. latipinna* auct. non Nakai --- *S. coreana* auct. non Kom.

植物名 接骨木《中国植志》

药材名 接骨木《唐本草》、《汇编》

文献名 接骨树、接骨花、木蒴藋《唐本草》,接骨木叶、接骨木根《本草拾遗》,续骨草、续骨木、木英树《纲目》,扞扞活《本经逢原》,七叶黄荆、放棍行、珊瑚配(汪连仕《采药书》),铁骨散《名实图考》,接骨丹《草木便

方》,萌树、野黄杨《植物名汇》,木英、章漆木《新纲》,蓝节朴《陇海树产目录》,无梗接骨木《东资》,东北接骨木、宽叶接骨木、朝鲜接骨木、钩齿接骨木《东北木本图志》

地方名 马尿梢(吉林、辽宁),马尿骚、马尿洩、也卜涛(东北),气不愤(辽宁、河北),公道老(辽宁、河北、内蒙古、山东、江苏、湖南),五加皮(浙江、广西),接骨风(湖南、广西、四川),大接骨丹(陕西、湖北);吉林:“者姆高儿木克”(朝名);辽宁:马尿梢子;河北:榔榔木;陕西:白马桑;山东:八角棵(莒南);江苏:空头树(泰县),舒筋树(连云港);安徽:插地活;福建:七叶金,〔透骨草〕;河南:山绣球,臭芥棵,暖骨树;湖南:大婆参,五叶剑、接骨柳(衡阳);广西:根花木(大瑶山),大接骨,大叶接骨木,大叶蒴藋;四川:九节风,臭草叶;贵州:臭草柴(惠水),青杆错(都匀);云南:狗爪子树,“咖汤剌爬啊周”(元江哈尼语),木本接骨丹,小接骨丹,走马箭(红河),树五加(大理),接骨散(曲靖),大五加(保山)。

功效 全株:接骨续筋,活血止痛,祛风利湿。用于骨折,跌打损伤,风湿性关节炎,痛风,大骨节病,急、慢性肾炎。外用于创伤出血;花:发汗;茎、根:预防麻疹,水肿,尿闭。

备考 《东北木本图志》(1955)所订 *Sambucus latipinna* Nakai 及 *S. coreana* Kom. 为本种之误订名。

#### 7233053

*Sambucus williamsii* Hance var. *miquelii* (Nakai ex Kom. et K. Alis.) Y. C. Tang --- *S. buergeriana* auct. non Blume

植物名 毛接骨木《中国植志》

药材名 接骨木《内蒙古中草药》

文献名 兴安毛接骨木《拉汉种称》

地方名 马尿梢(东北);黑龙江:马尿烧,马尿骚,本巴木;内蒙古:“包格-音-包勒岱”(蒙名),公道老儿。

功效 全株:接骨续筋,活血止痛,祛风利湿;叶:活血,行瘀,止痛;花:发汗,利尿。

备考 《东北木本图志》(1955)将本种学名误订为 *Sambucus buergeriana* Blume

#### 7233054

*Triosteum himalayanum* Wall. --- *T. fargesii* Franch. --- *T. erythrocarpum* H. Smith

植物名 穿心莲子蕨《中国植志》

药材名 五转七《陕西中草药》

地方名 陕西:大对月草(镇安、镇坪),包谷陀子、包谷花(镇坪),钻子七(旬阳);四川:上天梯(峨眉山);云南:野鸡果(维西),大红参(丽江),老鸡爪子(中甸)。

功效 根和全草:利尿消肿,活血调经。用于水肿,小便不利,月经不调。

#### 7233055

*Triosteum himalayanum* Wall. var. *chinense* Diels et Graebn.

植物名 中华莲子蕨《汇编》

地方名 湖北:巴东手参、〔手参〕(巴东)。

功效 块根:温补药。

#### 7233056

*Triosteum pinnatifidum* Maxim.

植物名 莛子藨《中国植志》

药材名 鸡爪七《汇编》

文献名 羽裂莛子藨《陕西中草药》, 羽裂叶莛子藨《中国北部植物志》, 天王七《陕西中草药》

地方名 陕西: 五转七、白果七(旬阳), 四大天王(太白山)。

功效 根: 祛风活血, 健脾胃, 调经止痛。用于风湿腰腿痛, 跌打损伤, 消化不良, 月经不调, 白带; 叶: 止血生肌。用于刀伤; 果实: 调经, 止带。

#### 7233057

*Viburnum betulifolium* Batal. --- *V. ovatifolium* Rehd.

植物名 梓叶荚蒾《中国植志》

药材名 红对节子《四川中药志》

文献名 阔叶荚蒾《华北树木志》, 卵叶荚蒾《四川中药志》, 藤草《中药大辞典》

地方名 陕西: 糯米条(周至、眉县); 四川: 高粱花, 山杞子、对节子(峨眉), 老婆子(宝兴); 云南: 酸果果(维西)。

功效 根: 活血, 调经, 涩精。用于风湿痛, 跌打损伤, 月经不调, 梦遗虚滑, 肺热口臭及白浊, 带下; 花: 用于风热咳嗽。

#### 7233058

*Viburnum brachybotryum* Hemsl.

植物名 短序荚蒾《中国植志》

药材名 羊屎条(四川峨眉)

文献名 短总序荚蒾《广西植志》, 球花荚蒾《分类学报》, 尖果荚蒾《云南种录》, 短球荚蒾《拉汉种称》

功效 全株: 活血祛瘀, 消肿止痛。用于跌打损伤, 筋骨疼痛。外用于体癣, 皮肤瘙痒。

#### 7233059

*Viburnum chinshaense* Graebn.

植物名 金佛山荚蒾《中国植志》

药材名 金山荚蒾《四川中药志》

文献名 贵州荚蒾《植分学报》

地方名 四川: 黑桃子(南充), 雀儿屎树(夹江)。

功效 根或全株: 清热利湿, 祛风活络, 凉血止血。

#### 7233060

*Viburnum cylindricum* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 水红木《中国植志》

药材名 灰叶子《云南药录》

文献名 狗肋巴《高植图鉴》, 粉叶荚蒾《云南药录》

地方名 山女贞(广西、四川); 湖北: 斑鸠柘, 灰色树; 广西: 大路通(乐业), 灰包木(凤山), [四季青]; 四川: 抽刀红; 贵州: 吊白叶(遵义); 云南: 小黑籽、黑籽(祥云), 炭叶苏(玉龙山), 粉帕叶、羊脆骨(昆明), 翻脸叶(玉溪), 野灰靛叶、摸翻脸(红河), 粉桐叶(思茅), 睡眠果, 粉果叶, 小灰果, 粉果, 灰果叶, 粉条果, 粉栗, 红经果, 揉白叶。

功效 叶: 清热解毒。用于痢疾, 急性胃肠炎, 口腔炎, 尿路感染。外用于烧烫伤, 疮疡肿毒, 皮肤瘙痒; 根: 祛风活络。用于跌打损伤, 风湿筋骨疼痛; 花: 润肺

止咳。用于肺燥咳嗽。

#### 7233061

*Viburnum diloatatum* Thunb.

植物名 荚蒾《中国植志》

药材名 荚蒾《唐本草》、《汇编》

文献名 槲蒾(陆玑《诗疏》), 羿先、荚蒾子《唐本草》, 孩儿拳头《救荒本草》, 棒叶荚蒾《云南种录》

地方名 江苏: 酸梅子(苏州); 浙江: 山梨儿, 酒子; 安徽: 野花绣球; 福建: 人丹子、火夫草(大田), 双龙秋、茶柴子、苦茶子(宁化), 苦哉子(明溪), 苦才子樵(清流), 赤籽(永安), 蜂车籽(三明); 河南: 土桑条, 土兰条; 湖南: 红植梅(宜章), 招果, 猪婆子藤, 糯米子, 糯米树; 广东: 火柴果(连南); 广西: 乌酸木(全州); 贵州: 酸汤汗(剑河); 云南: 对节子(镇雄)。

功效 枝、叶: 清热解毒, 疏风解表。用于疮痍发热, 风热感冒。外用于过敏性皮炎; 根: 祛瘀消肿。用于淋巴结炎, 跌打损伤; 果实: 用于破血, 止痢消肿, 蛊症, 蛇毒。

#### 7233062

*Viburnum erosum* Thunb. var. *ichangense* (Hemsl.) Rehd.

植物名 宜昌荚蒾《中国植志》

药材名 宜昌荚蒾《汇编》

文献名 野绣球《名实图考》, 啮蚀荚蒾《秦岭植志》, 蚀齿荚蒾《中国树木志》, 小叶荚蒾《山东树木志》

地方名 糯米条子(陕西、江苏、湖北); 山东: 山绣球(崂山), 白空枝(昆崙山); 浙江: 苦索花; 湖南: 对叶散花, 甌皮崽子树; 四川: 羊屎条, 对节木; 云南: 大糯米果(镇雄), 羊舌条(盐津); 其他: 小鱼辣树, 猪婆子藤。

功效 茎、叶、根: 清热, 祛风, 除湿, 止痒。用于口腔炎, 风湿痹痛, 脚丫湿痒; 果: 补血。

#### 7233063

*Viburnum foetidum* Wall. --- *V. prernaceum* Wall. ex DC.

植物名 臭荚蒾《中国植志》

药材名 冷饭果《云南中草药》

文献名 珍珠花《名实图考》, 小叶荚蒾《红河中草药》, 碎米荚蒾《中国经植志》

地方名 广西: 酸酊, 心伴木, 山人丹, [映山红]; 云南: 糯米果(红河), 老米粗、山五味子、老米酒(昆明), 碎米果团、碎米团果(临沧), 碎米果果树尖(保山)。

功效 叶、果: 清热解毒, 止咳, 接骨; 果: 用于头痛, 咳嗽, 肺炎, 跌打损伤, 走马牙疳, 荨麻疹; 叶: 用于脓肿。

#### 7233064

*Viburnum foetidum* Wall. var. *ceanothoides* (CH. Wright) Hand.-Mazz.

植物名 珍珠荚蒾《中国植志》

药材名 老米酒树《汇编》

文献名 珍珠花《名实图考》

地方名 贵州: 冷饭子(兴义); 云南: 老米酒、山五味

子(昆明), 碎米果(盈江), 冷饭果(屏边), 杨梅果(河口), 糯米果, 碎米团果。

功效 果: 清热解毒, 止咳, 止血。用于咳嗽, 肺炎, 百日咳; 根、叶: 消肿止痛, 敛疮生肌, 止血止泻; 根: 用于肠炎, 痢疾, 血崩, 先兆流产, 荨麻疹; 叶: 外用于骨折, 疖肿, 跌打损伤, 刀伤。

## 7233065

*Viburnum foetum* Wall. var. *rectangulatum* (Graebn.) Rehd.

植物名 直角荚蒾《中国植志》

药材名 直角荚蒾《贵州药录》

地方名 贵州: 万年散。

功效 嫩枝、叶: 清热凉血, 疏风止咳。用于风热咳嗽, 白口疮, 刀伤出血。

## 7233065a

*Viburnum fordiae* Hance

植物名 南方荚蒾《中国植志》

药材名 南方荚蒾《汇编》

文献名 福氏荚蒾《广西药录》, 火柴子树《广西植录》, 东南荚蒾《拉汉种称》, [满山红]《广西本草选编》

地方名 上柴胡(广东、广西); 湖南: “登奔”、“每登奔”(侗语), 酸汤泡; 广东: 山柴胡、毛荚蒾、香波萝(阳春), 火斋、火柴树、猫屎树(惠阳); 广西: [映山红](密县、岑溪), 火柴木、猪血树(桂平), 心伴木(岑溪), 白毛风(临桂), 苍伴木(平南), 疮伴木, 酸闷木, 小雷公子, 猫屎果, 荚蒾木。

功效 根、茎: 祛风清热, 散瘀活血。用于感冒, 发热, 月经不调。外用于肥大脊椎炎, 风湿痹痛, 跌打骨折, 湿疹。

## 7233066

*Viburnum hainanense* Merr. et Chun

植物名 海南荚蒾《中国植志》

药材名 海南荚蒾《广西药录》

地方名 广西: 油炸木(陆川), 牛瘦鞭(防城), 簕箕藤(陆川)。

功效 根、叶: 用于跌打损伤, 风湿骨痛, 蛇咬伤, 痢疾, 尿路感染, 蛔虫病。

## 7233067

*Viburnum inopinatum* Craib. --- *V. sambucium* Blume var. *tomentosum* auct. non Hallier f.

植物名 厚绒荚蒾《中国植志》

药材名 厚绒荚蒾《广西药录》, 特异荚蒾《拉汉种称》, 毛叶荚蒾《高植图鉴》

功效 叶: 外用于风湿骨痛。

备考 《高植图鉴》(1975)将本种学名误订为 *Viburnum sambucinum* Blume var. *tomentosum* Hallier f.

## 7233068

*Viburnum lancifolium* Hsu

植物名 披针叶荚蒾《中国植志》

药材名 长叶荚蒾《广西药录》

地方名 浙江: 猪母柴, 六角藤; 江西: 沙罗树(黎川)。

功效 根: 用于疮疡肿毒。

## 7233069

*Viburnum lutescens* Blume

植物名 淡黄荚蒾《中国植志》

药材名 黄荚蒾《广西药录》

地方名 广西: 罗盖叶(桂林), 坚甲树, 正皮叶树, 螃蟹子, 石兰树, 早禾子树, 猪肚木。

功效 叶: 祛瘀, 生新, 消肿。用于风湿骨痛。

## 7233070

*Viburnum luzonicum* Rolfe --- *V. fochowense* W. W. Smith

植物名 吕宋荚蒾《中国植志》

药材名 吕宋荚蒾《广西药录》

文献名 罗盖荚蒾《广西植录》, 福州荚蒾《拉汉种称》

地方名 台湾: 红子仔; 广东: 细叶火柴枝树; 广西: 果绿勒(上林), 罗盖叶, 牛伴木(博白)。

功效 茎、叶: 驳骨。用于枪伤, 跌打损伤。

## 7233071

*Viburnum macrocephalum* Fortune

植物名 绣球荚蒾《中国植志》

药材名 木绣球茎《中药大辞典》

文献名 绣球《广群芳谱》, 中国绣球荚蒾《拉汉英种称》, 木绣球、木球荚蒾《中药大辞典》

地方名 江苏: 八仙花、[绣球花]、紫阳花(南京)。

功效 茎: 用于风湿病, 疥癣湿烂痒痛。

## 7233072

*Viburnum macrocephalum* Fort. form. *keteleeri* (Carr.) Nichols.

植物名 大花绣球(拟)

文献名 [琼花]《中国植志》, 蝴蝶木《拉汉种称》

地方名 江苏: 假琼花(扬州); 浙江: 蝴蝶花(杭州)。

功效 茎: 外用于洗疥癣, 风湿病。

备考 扬州真正的琼花为虎耳草科植物聚八仙, 非本种。此种在扬州称为假琼花。

## 7233073

*Viburnum nervosum* D. Don --- *V. cordifolium* Wall.

植物名 显脉荚蒾《中国植志》

药材名 心叶荚蒾根《中药大辞典》

文献名 心叶荚蒾《高植图鉴》

功效 根: 用于风湿麻木, 筋骨痠痛, 跌损瘀凝, 胸胁气胀。

## 7233074

*Viburnum odoratissimum* Ker. -Gawl.

植物名 珊瑚树《中国植志》

药材名 沙糖木《汇编》

文献名 高炉树《高植图鉴》, 极香荚蒾《拉汉种称》, 珊瑚荚蒾《东北木本图志》

地方名 上海: 橡皮冬青, 外国冬青; 广东: 沙掌树(阳春), 早禾树(广州、惠阳); 广西: [四季青](兴安), 利洞风(容县), 利桐木(梧州), 猪儿水、猪耳水(苍梧), 鸭屎木(桂平), 雷片木(陆川), 香柄树, 篱椿木。

功 效 叶、树皮、根：清热祛湿，通经活络，拔毒生肌。用于感冒，风湿病，跌打肿痛，骨折。

## 7233075

*Viburnum odoratissimum* Ker. - Gawl. var. *awabuki* (K. Koch) Zabel ex Ruml. --- *Viburnum awabuki* K. Koch

植物名 日本珊瑚树《中国植志》

文献名 珊瑚树《中国树木志》

地方名 法国冬青(江苏、上海、浙江)；上海：橡皮冬青，外国冬青；台湾：山猪肉。

功 效 叶、树皮、根：清热祛湿，通经活络，拔毒生肌。用于感冒，风湿病，跌打肿痛，骨折；树皮、叶：外用于蛇咬伤，跌打损伤。

## 7233076

*Viburnum opulus* L.

植物名 欧洲荚蒾《中国植志》

药材名 折伤木《唐本草》，白雪树《植物名汇》

地方名 雪球(华北)。

功 效 叶、枝：通经活络，解毒止痒；果：止咳。

## 7233077

*Viburnum opulus* L. var. *calvescens* (Rehd.) Hara --- *V. sargentii* Koehne --- *V. sargentii* Koehne var. *calvescens* Rehd.

植物名 鸡树条《中国植志》

药材名 鸡树条《汇编》

文献名 琼花《群芳谱》，天目琼花《树分》，鸡树条荚蒾、苍绿鸡树条荚蒾〔《东北木本图志》，少毛鸡树条荚蒾《秦岭植志》]

地方名 [接骨木]、荚蒾(东北)，鸡树条子(东北、山东)、糯米条(山东、四川)，佛头花(黑龙江、吉林)；内蒙古：“柴日音-毛都”(蒙名)；山东：山绣球(崂山)，八仙条(泰山)，红枣鸭雀食；浙江：春花子(临安)，高山野茱肉；其他：山竹子。

功 效 枝、叶：通经活络，解毒止痒。用于风湿性关节炎，腰酸腿痛，跌打损伤；叶：外用于疮疖，癣，皮肤瘙痒；果：止咳。用于慢性气管炎，咳嗽。

## 7233077a

*Viburnum opulus* L. var. *calvescens* (Rehd.) Hara f. *puberulum* (Kom.) Sugimoto --- *V. sargentii* Koehne f. *puberula* Kom. --- *V. pubinerve* Blume f. *puberulum* (Kom.) Nakai --- *V. sargentii* Koehne var. *puberulum* (Kom.) Kitag.

植物名 毛叶鸡树条《中国植志》

文献名 密毛鸡树条荚蒾《东北药用植物》

功 效 叶、嫩枝及果实：祛风通络，活血消肿，解毒止痒，风湿性关节炎，腰酸腿痛，跌打损伤。

## 7233078

*Viburnum opulus* L. f. *roseum* (L.) Hegi.

植物名 玫瑰红欧洲荚蒾(拟)

文献名 欧洲雪球《山东树木志》

地方名 山东：雪球。

功 效 叶、枝：通经活络，解毒止痒；果：止咳。

## 7233079 见 7233077a

## 7233080

*Viburnum plicatum* Thunb. f. *tomentosum* (Thunb.) Miq. --- *V. tomentosum* Thunb.

植物名 蝴蝶戏珠花《名实图考》、《中国植志》

药材名 灵寿木《本草拾遗》

文献名 楮《诗经》，楨《尔雅》，蝴蝶树《典籍便览》，八仙花《花镜》，糯米树、糯米树《植物名汇》，扶老杖《诗草木今释》，蝴蝶荚蒾《高植图鉴》，毛荚蒾、绣球《汇编》，蝴蝶花《中国植志》

地方名 浙江：蝴蝶绣球花(泰顺)；四川：绣球花；贵州：苦酸汤(剑河)，蝴蝶木。

功 效 根茎：清热解毒，健脾消积。用于风热感冒，风湿痛，淋巴结炎，小儿疳积，疮疡肿毒。

## 7233081

*Viburnum propinquum* Hemsl.

植物名 球核荚蒾《中国植志》

药材名 六股筋《陕西中草药》

文献名 兴山绣球、兴山荚蒾《拉汉种称》，鸡壳精、淮角筋《汇编》

地方名 浙江：仙人茶(云和)；湖北：水马蹄；广西：臭药(阳朔)；四川：三条筋(南充)，鱼串子

功 效 叶、根皮、全株：止血，消肿止痛，接骨续筋。用于骨折，跌打损伤，外伤出血。

## 7233082

*Viburnum punctatum* Buch. - Ham. ex D. Don

植物名 鳞斑荚蒾《中国植志》

药材名 小鳞荚蒾《广西药园药录》

文献名 点叶荚蒾《高植图鉴》

地方名 广西：独行千里；云南：大青藤(富民)。

功 效 根、叶：活血祛风。用于风湿病。

## 7233083

*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl.

植物名 皱叶荚蒾《中国植志》

药材名 枇杷叶荚蒾《贵州药录》

地方名 贵州：山枇杷。

功 效 根、茎：清热解毒，健脾消积。用于小儿疳积，风热感冒，风湿痛，淋巴结炎。

## 7233084

*Viburnum sempervirens* K. Koch --- *V. nervosum* Hook. et Arn. --- *V. venulosum* Benth.

植物名 常绿荚蒾《中国植志》

药材名 坚荚树《救荒本草》、《广西药录》

文献名 长叶火柴枝树《广西植录》

地方名 广东：冬红果(高要)，苦柴枝，猪妈柴，咸鱼枝树；广西：[四季青]、厚茶青(龙胜)，冷杆木(兴安、全州)，醉鱼草，罗汉木(全州)，铜钮扣(阳朔)，野蓝靛(富川)，结牛胖木(博白)，雪里藏珠(融安)，萝卜叶，坚荚蒾；云南：“奕硬”(西双版纳傣语)。

功 效 茎、叶：接骨，散血，驱绦虫。用于内伤，寒毒，痧气，风湿骨痛，腰痛，血尿，尿痛，脱肛。

## 7233085

*Viburnum setigerum* Hance --- *V. bodinieri* Levl. --- *V.*

therferum Rehd.

植物名 茶茱萸《中国植志》

药材名 鸡公柴《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 垂果茱萸《中国植物图鉴》, 汤饭子《高植图鉴》, 糯米树、糯米树《亨氏中国树木名录》, 霜降子、虎柴子《中药大辞典》

地方名 饭汤子(江苏、浙江), 跑路杆子(湖北、湖南); 湖南: 水茶子(永兴); 广西: 大雷公子(龙胜); 四川: 甜茶; 云南: “卖硬”(西双版纳傣语)。

功效 果: 健脾。用于脾胃虚弱, 胃纳呆钝; 根: 破血通经, 止血。用于吐血, 肺热咳嗽; 叶: 用于腰痛, 血尿, 尿痛, 脱肛。

#### 7233086

*Viburnum sympodiale* Graebn.

植物名 合轴茱萸《中国植志》

药材名 合轴茱萸《贵州药录》

地方名 贵州: 茱萸。

功效 根、茎: 清热解毒, 健脾消积。用于小儿疳积, 风热感冒, 风湿痛, 淋巴结炎。

#### 7233087

*Viburnum taitoense* Hayata

植物名 台东茱萸《中国植志》

药材名 台东茱萸《湖南药物志》

地方名 湖南: 对叶油麻, 冷芥子; 广西: [四季青](龙胜), 雪里藏珠(融安)。

功效 根、叶: 祛瘀, 镇痛, 通便; 茎、叶: 用于跌打损伤。

#### 7233088

*Viburnum triplinerve* Hand. - Mazz.

植物名 三脉叶茱萸《中国植志》

文献名 三脉茱萸《广西药录》

地方名 广西: 木捻草山(龙州), 玉郎伞(贵县)。

功效 叶: 消肿, 止痛。用于跌打损伤。

#### 7233089

*Viburnum utile* Hemsl.

植物名 烟管茱萸《中国植志》

药材名 羊屎子《四川中药志》

文献名 牛屎柴《乾坤生意》, 羊屎柴《纲目》, 羊奶根、羊屎条《分类草药性》, 羊屎柴根《简明中医辞典》, 有用茱萸《拉汉种称》, 灰猫条、灰猪藤、羊舌条《中药大辞典》

地方名 黑汉条(湖北、四川); 四川: 羊食子根, 洋石子, 黑擦子树花; 贵州: 灰毛条, 冷饭团。

功效 根或全株: 清热利湿, 祛风活络, 凉血止血。用于痢疾, 痔疮出血, 风湿筋骨疼痛, 跌打损伤, 瘀血肿痛。

7233090 见 7233065a

#### 7233091

*Weigela japonica* Thunb. var. *sinica* (Rehd.) Bailey ---

*W. sinica* (Rehd.) Cheng

植物名 半边月《名实图考》、《中国植志》

药材名 水马桑《汇编》

文献名 杨栌《唐本草》, 木绣球《树分》, 羊白、粗糠树《汇编》

地方名 锦带花(湖南、海南), 白马桑(湖北、广西、四川); 浙江: 水吞骨(大台); 铃钟花(临安), 大号黄山掌, 鸡骨柴; 江西: 麻布柴; 湖北: 包头杆子(宜昌)。

功效 根: 理气健脾, 滋阴补虚。用于食少气虚, 消化不良; 枝、叶: 外用于疮疡肿毒。

备考 《本草拾遗》之杨栌耳, 为寄生于杨栌树上的木耳, 主老血结块, 破血, 止血。

7233092 见 7233036a

### 7235 败酱科 Valerianaceae

#### 7235001

*Nardostachys chinensis* Bat.

植物名 甘松《中国植志》

药材名 甘松《本草拾遗》、《药典》

文献名 甘松香《开宝本草》, 正甘松、把松、条把松《药材学》

地方名 青海: “邦贝”(藏名); 四川: “棒比”(藏名), 香松, 坝松, 副松, 条把, 条松; 云南: 香穗草; 西藏: “邦勃欧”(藏名); 其他: 细叶甘松, 中国甘松, 芽甘松

功效 根茎及根: 理气止痛, 开郁醒脾。用于脘腹胀满, 食欲不振, 呕吐。外用子牙痛, 脚肿。

#### 7235002

*Nardostachys jatamansi* (D. Don) DC. --- *N. grandiflora* DC.

植物名 匙叶甘松《中国植志》

药材名 甘松《本草拾遗》、《药典》

文献名 甘松香《开宝本草》, 人身香《新纲》, “苦弥多”、“珥占哆”(藏名)《金光明经》, 长匙甘松香《四川中药志》, 匙叶甘松香《汇编》, 宽叶甘松《中药大辞典》, 大花甘松《中药志》, 大花甘松香《云南种录》

地方名 青海: 香草; 四川: “棒比”(藏名), 香松; 云南: [万年青], “榜贝”(藏名)。

功效 根及根茎: 理气止痛, 开郁醒脾。用于脘腹胀满, 食欲不振, 呕吐。外用子牙痛, 脚肿。

#### 7235003

*Patrinia heterophylla* Bunge

植物名 异叶败酱《高植图鉴》

药材名 异叶败酱《汇编》

文献名 墓头回《中国植志》, 墓头灰《山西中药志》

地方名 摆子草(河北、甘肃); 河北: 追风箭; 内蒙古: “敖恩道-斯日桂勒-其其格”(蒙名); 陕西: 九头鸟(柞水), 刀尖草, 刀伤草(旬阳), 老虎草; 甘肃: 脚汗草, 铜班道, 虎牙草; 广西: 箭头风(天等)。

功效 根、全草: 清热燥湿, 止血, 止带, 截疟。用于子宫颈炎, 早期宫颈癌, 白带, 崩漏, 疟疾。

#### 7235004

*Patrinia heterophylla* Bunge subsp. *angustifolia* (Hemsl.)

H. J. Wang --- *P. angustifolia* Hemsl.

植物名 窄叶败酱《中国植志》

药材名 狭叶败酱《汇编》

地方名 浙江:盲菜(雁荡山);安徽:败酱草;江西:苦菜(庐山);湖北:条叶败酱草(神农架);湖南:败酱;广西:天罗地网(龙州);贵州:白升麻,大升麻,九层叶。

功效 根:散寒,燥湿。用于风寒感冒,疟疾,肠炎。

## 7235005

*Patrinia intermedia* (Horn.) Roem. et Schult.

植物名 中败酱《中国植志》

药材名 中败酱《品种论述》

功效 根:用于痛经,赤白带。

## 7235006

*Patrinia monandra* C. B. Clarke

植物名 少蕊败酱《中国植志》

文献名 单雄蕊败酱《广西植志》,单药败酱《鉴别手册》,单蕊败酱《汇编》

地方名 河北:山芥花;湖北:败酱草(神农架);四川:介头草,黄凤仙(马尔康);贵州:白升麻,土花蓝;云南:败酱。

功效 全草、根茎及根:清热解毒,祛瘀排脓,宁心安神。

## 7235007

*Patrinia punctiflora* Hsu et H. J. Wang

植物名 斑花败酱《中国植志》

地方名 浙江:无心草(德清);江西:马竹臂(安福);广西:细样苦斋(桂林)。

功效 全草、根茎:清热解毒,祛瘀排脓,活血去瘀。用于阑尾炎,痢疾,肠炎,肝炎,眼结膜,产后瘀血腹痛,痈肿疔疮。

## 7235008

*Patrinia punctiflora* Hsu et H. J. Wang var. *robusta* Hsu et H. J. Wang

植物名 大斑花败酱《中国植志》

地方名 浙江:萌菜(天台山)。

功效 全草、根茎:清热解毒,祛瘀排脓,活血祛瘀。用于阑尾炎,痢疾,肠炎,肝炎,眼结膜,产后瘀血腹痛,痈肿疔疮。

## 7235009

*Patrinia rupestris* (Pall.) Juss.

植物名 岩败酱《中国植志》

药材名 岩败酱《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古:“哈敦·斯日给勒格·其其格”(蒙名)。

功效 全草:清热解毒,活血,排脓。用于肠炎,痢疾,阑尾炎,肝炎,黄疸;根:镇静。用于神经衰弱,又可代缬草用。

备考 个别地区有以根混作墓头回。

## 7235010

*Patrinia rupestris* (Pall.) Juss. subsp. *scabra* (Bunge) H. J. Wang --- *P. scabra* Bunge

植物名 糙叶败酱《中国植志》

药材名 墓头回《纲目》、《汇编》

文献名 脚汗草、铜班草、虎牙草、追风箭、摆子草

《汇编》,墓头灰《简明中医辞典》

地方名 河北:血晕草;福建:观音菜,白苦爹(周宁、福安),苦苣(福鼎、罗源);河南:见肿消,木头回,盆棵,臭脚眼。

功效 根、全草:清热燥湿,止血,止带,截疟。用于子宫糜烂,早期宫颈癌,白带,崩漏,疟疾。

## 7235011

*Patrinia scabiosaefolia* Fisch. ex Trev. --- *P. scabiosaefolia* Fisch. var. *hispida* (Bunge) Franch.

植物名 败酱《本经》、《中国植志》

药材名 败酱草《汇编》

文献名 鹿肠《本经》,鹿首、马草、泽败《别录》,《鹿药》《药性论》,酸益《日华子本草》,黄花龙芽《名实图考》,女郎花《新纲》,粗毛败酱《广西植志》,鹿酱《简明中医辞典》,刚毛败酱《云南种录》,鸡肠子草、萌菜《中药大辞典》

地方名 黄花败酱(东北、北京、河北、湖北);苦菜(江西、福建、湖北),野黄花(黑龙江、吉林、湖南);黑龙江:山白菜(带岭),野芹;吉林:鹤立鸡群;河北:龙芽败酱,孤儿菊;陕西:大救驾(凤县);山东:山芝麻、山芝麻叶(蒙山);江苏:土龙草,将军草(云台山),黄屈花(南京);浙江:黄花苦菜(西天目山);江西:麻鸡婆(新建);福建:苦苣(厦门),苦斋(三明、永安),苦抓、红株草(大田),红苦芥,苦芥,观音菜,苦栽,苦猪菜;河南:见肿消,苦麻菜;广东:毛苦斋(乳源),地黄菜、苦斋菜,苦斋婆(连北),苦斋麻(连南);广西:土柴胡(宜山),鸡肠风(博白),黄花草(桂平),假芥菜(百色),臭艾(邕宁);云南:黄花参、野青菜(红河),“舍维隆”(楚雄彝名),黄龙芽。

功效 全草、根茎及根:清热利湿,解毒排脓,活血祛瘀。用于阑尾炎,痢疾,肠炎,肝炎,眼结膜炎,产后瘀血腹痛,痈肿疔疮。

## 7235012

*Patrinia sibirica* (L.) Juss.

植物名 西伯利亚败酱《中国植志》

备考 据《沈阳学报》(1986)称:根含皂甙及黄酮类(槲皮素、山柰酚、芦丁),后者含量大于 30mg/g 可作为败酱的药用植物资源。

## 7235013

*Patrinia villosa* (Thunb.) Juss. --- *Valeriana villosa* Thunb. --- *Patrinia sinensis* (Levl) Koidz.

植物名 攀倒甍《图经》、《中国植志》

药材名 败酱草《汇编》

文献名 败酱《本经》,〔苦菜〕、〔苦蕒〕《纲目》,野苦菜、接骨草、斑杖茎《名实图考》,孩儿菊、斑刀箭、攀刀峻、男郎花《满蒙野卉》,白花败酱《高植图鉴》

地方名 苦斋(江西、福建、广东、四川),苦斋公(湖南、四川),毛败酱(台湾、广西);浙江:山茅菜(乐清),苦叶菜(通称),萌菜(普陀、乐清);安徽:拔郎鼓子棵;江西:苦猪菜,野苦斋(赣州),苦蕒菜(丰城);福建:白苦爹,苦苣;广东:山黄菊,苦斋草(大埔);广西:白风草(桂林);四川:豆豉草,豆渣草,胭脂麻(泸县);贵州:大

升麻。

**功效** 根茎、根或全草：清热利湿，解毒排脓，活血祛瘀。用于阑尾炎，痢疾，肠炎，肝炎，眼结膜炎，产后瘀血腹痛，痈肿疔疮。

#### 7235014

*Valeriana amurensis* Smir. ex Komarov

植物名 黑水缬草《中国植志》

药材名 黑水缬草《汇编》

文献名 缬草《汇编》，黑龙江缬草《中药通报》

地方名 媳妇菜、人参媳妇（东北）；黑龙江：野鸡膀子（阿城）。

**功效** 根茎及根：安神，理气，止痛。用于神经衰弱，失眠，瘧病，癲癇，脘腹胀痛，腰腿痛，跌打损伤。

#### 7235014a

*Valeriana fauriei* Briq. --- *V. officinalis* L. var. *angustifolia* Miq. --- *V. officinalis* L. var. *latifolia* Miq. --- *V. coreana* Briq.

植物名 宽裂缬草《植物研究》

药材名 宽叶缬草《汇编》

文献名 野甘松、山甘松《新纲》，日本缬草（李《药植》），广叶拔地麻《中国植物图鉴》，阔叶缬草《四川中药志》

地方名 拔地麻（江西、湖北）；甘肃：香草（武都）；浙江：小石花（天目山）；江西：臭草；湖北：墨香（神农架）；四川：缬草，缬草根，古草。

**功效** 根、根茎：安神，理气，止痛。

#### 7235015

*Valeriana flaccidissima* Maxim.

植物名 柔垂缬草《中国植志》

药材名 柔垂缬草《四川中药志》

文献名 缬草《四川中药志》，蔓甘松《高植图鉴》，细臭灵丹《元江哈尼族药》

地方名 湖北：小蜘蛛香（神农架）；四川：岩边香（峨眉山），小缬草，古草，缬草根；贵州：蛇头细辛、蜘蛛香（兴义），水臭草；云南：“哦板药康”（元江哈尼语）。

**功效** 根或全草：健脾消食。用于食积腹胀，腹痛吐泻。

#### 7235016

*Valeriana hardwickii* Wall.

植物名 长序缬草《中国植志》

药材名 豆豉草《汇编》

文献名 阔叶缬草《广西植录》，西南缬草《中药大辞典》，岩边香《汇编》

地方名 老君须（广西、四川）；四川：金山缬草，斗什草；贵州：毛打花，小蜘蛛香；云南：通经草，三叶细辛，细叶马蹄香，玉把草，空心草，岩参，蛇头细辛，哈氏缬草，小红草。

**功效** 根或全草：活血调经，散瘀止痛，健脾消积。用于月经不调，痛经，闭经，血栓闭塞性脉管炎，跌打肿痛，风湿骨痛，小儿疳积，神经衰弱。外用于身痒。

#### 7235017

*Valeriana jatamansi* Jones --- *V. wallichii* DC.

植物名 蜘蛛香《中国植志》

药材名 蜘蛛香《纲目》、《汇编》

文献名 〔鬼见愁〕、〔马蹄香〕《滇南本草》，心叶缬草《四川中药志》，养心莲、猫儿屎、老虎七《汇编》

地方名 大救驾（陕西、四川）；陕西：老龙须，老君须，连香草，香草子；甘肃：香草，铃铃香；湖南：〔土细辛〕（龙山、宝靖、桑植），灯香；广西：小马蹄香（凌乐），豆豉菜；四川：乌参，养血莲（峨眉山），香疙瘩（万县），臭药（成都），白花细辛，猫屎细辛；贵州：豆豉菜根，九转香，雷公七；云南：马蹄暗消、鸡屎臭药（红河），磨脚花（保山），臭狗药。

**功效** 根茎、根：理气止痛，消炎止泻，祛风除湿。用于脘腹胀痛，消化不良，腹泻，痢疾，风湿痹痛，腰膝酸软。

#### 7235018

*Valeriana pseudofficinalis* C. Y. Cheng et H. B. Chen --- *V. officinalis* auct. non L.

植物名 缬草《植物研究》

药材名 缬草《汇编》

文献名 穿心排草《物理小识》，鹿子草《植物学大辞典》，西洋缬草（小泉《药植》），穿心排草根《种分讲义》，东北缬草、毛节缬草《东北药植志》，欧缬草《药材学》，阔叶缬草《四川中药志》，法氏缬草、互生叶缬草《中药通报》，蜘蛛七《汇编》

地方名 人参媳妇、媳妇菜、野鸡膀子、〔当归〕、拔地麻（东北、内蒙古、陕西、新疆、山东、湖北），七里香（陕西、湖北），大救驾、小救驾（陕西、四川），败酱（青海、广西），香草（河北、山西、甘肃、山东），满山香（陕西、湖南、贵州）；黑龙江：臭草（哈尔滨）；吉林：“拒奥租姆普儿”（朝名）；河北：甘松；内蒙古：“珠勒根-呼吉”（蒙名）；陕西：小救驾草，抓地虎，珍珠香，蜘蛛香；甘肃：搜山虎；青海：“知玛尔”（藏名）；新疆：猫食菜；山东：山茱萸、姜十八（昆崙山），张十八（烟台）；上海：天山缬草；湖北：七星、马蹄、地花椒、珍珠七、墨香、猫儿香（神农架）；湖南：七姐妹，山射，五里香，地胡椒，满坡香；四川：古草，“甲比”（藏名），缬草根；贵州：狗足香，枝香；其他：胜花草（朝鲜），兴安缬草。

**功效** 根茎及根：安神，理气，止痛。用于神经衰弱，失眠，瘧病，癲癇，胃腹胀痛，腰腿痛，跌打损伤。

**备考** 据《植物研究》1991，陈虎彪、诚静容考订，本种在我国广布，过去一般文献常将其某些野生种误订为欧缬草（*Valeriana officinalis* L.）该种原产欧洲，我国药圃常引种植培。

7235019 见 7235014a

#### 7235020

*Valeriana tangutica* Bat.

植物名 小缬草《中国植志》

药材名 小缬草《汇编》

文献名 唐古特缬草《青藏药图》，香草仔《汇编》，小香草《高植图鉴》

地方名 青海：“知贝”（藏名）。

**功效** 连根全草：止血，止咳，止痛。用于功能性



子宫出血, 产后阴道出血, 胃出血, 肺出血, 鼻出血, 咳嗽, 风湿性关节炎, 腰腿痛。

## 7236 川续断科 Dipsacaceae

### 7236001

*Dipsacus asperoides* C. Y. Cheng et T. M. Ai

植物名 川续断《纲目》、《中国植志》

药材名 续断《滇南本草》、《药典》

文献名 川断《临证指南》, 鼓槌草、和尚头《滇南本草》, 续断肉、川断肉《常用中药名辨》

地方名 山萝卜(广西、云南), 山萝卜根(湖北、四川); 甘肃: 老猫吹火; 广西: 苦菜药; 湖北: 小续断(利川), 黑老鸦头; 四川: 马前, 滋油菜; 云南: 苦小草(临沧), 帽子疙瘩菜(文山), 苦小菜, 泡头草。

功效 根: 补肝肾, 强筋骨, 续折伤, 止崩漏。用于腰膝酸软, 风湿痹痛, 崩漏经多, 胎漏下血, 跌打损伤。

备考 过去文献以印度产的 *D. asper* Wall. 为川续断, 实误。

### 7236002

*Dipsacus atropurpureus* C. Y. Cheng et Z. T. Yin

植物名 深紫续断《中国植志》

药材名 陆汗(四川)

地方名 四川: 卢汉, 六汗。

功效 根: 活血消肿, 续筋接骨, 生肌止痛。

### 7236003

*Dipsacus chinensis* Bat.

植物名 大头续断《中国植志》

文献名 华续断《汇编》, 中华续断、大花续断《云南种录》, 巨胜子《药材学》

地方名 四川: 山萝卜(武隆)。

功效 种子: 滋补肝肾, 养血润肠, 通乳。

备考 本种根为木质, 与川续断肉质根有明显区别, 实际上并不作续断入药。

### 7236004

*Dipsacus fullonum* L.

植物名 起绒草《中国植志》

药材名 拉毛果《药材学》

地方名 浙江: [巨胜子](余姚)。

功效 果实: 补肾活血, 化瘀镇痛。用于腰痛, 遗精, 胎漏, 崩漏带下, 金疮痈疡等。

### 7236005

*Dipsacus japonicus* Miq.

植物名 日本续断《中国植志》

药材名 北巨胜子《中国药植志》

文献名 北续断、巨胜子《祁州药志》, 南草、[续断]《中国药植志》

地方名 锅菜(甘肃、河南); 陕西: 山萝卜, 臭脚草; 浙江: 刺梅球; 安徽: 巨胜; 湖北: 六旦(神农架); 贵州: 小血转, 恶鸡婆, 和尚头, 刺萝卜, 刺刺菜, 大刺芥, 大黄瓜头。

功效 果实: 补肝肾, 强筋骨, 利关节, 止崩漏。用

于腰膝酸痛, 风湿骨痛, 骨折, 跌打损伤, 先兆流产, 功能性子宫出血, 白带, 遗精, 尿频。

备考 果实: 果实在北方药店称为“巨胜子”, 为中药“巨胜子”主要来源之一。用于滋补肝肾, 养血润肠, 通乳。本种之根系木质, 与“川续断”之肉质根有显著区别, 实际并不作续断入药。

### 7236006

*Morina chinensis* (Bat.) Diels --- *Morina chinensis* (Bat. ex Diels) Pal

植物名 圆萼刺参《中国植志》

药材名 圆萼刺参《汇编》

文献名 摩苓草《西藏药图》, 华刺参《汇编》

地方名 青海: “息才尔”(藏名)。

功效 全草: 健胃, 催吐, 消肿。用于胃痛, 外用于疮痈肿痛; 果实: 用于关节疼痛, 小便失禁, 腰痛, 眩晕, 口眼歪斜。

### 7236007

*Morina nepalensis* D. Don --- *M. betonicoides* Benth.

植物名 刺续断《中国植志》

药材名 细叶刺参《西藏中草》

文献名 刺参《西藏中草》, 红花刺参、降扯《汇编》, 水苏叶摩苓草《中药大辞典》

地方名 青海: “江才嘎保”(藏名); 四川: “江择呷波”(藏名), 摩苓草(若尔盖)。

功效 全草: 催吐; 茎、叶: 用于化脓性创伤。

### 7236008

*Morina nepalensis* D. Don var. *alba* (Hand. -Mazz.) Y. C. Tang --- *M. alba* Hand. -Mazz. --- *M. leucoblephara* Hand. Mazz.

植物名 白花刺参《中国植志》

药材名 白毛刺参《云南药录》

文献名 白花摩苓草《云南药录》

地方名 云南: 刺参(玉龙山)。

功效 根: 滋补。用于体虚, 贫血。

### 7236009

*Morina nepalensis* D. Don var. *delavayi* (Franch.) C. H. Hsing --- *M. bulleyana* Forr. et Diels --- *Morina delavayi* Franch.

植物名 大花刺参《中国植志》

药材名 大花刺参《汇编》

文献名 刺参、细叶刺参《云南中草药选》, 细叶摩苓草《中药大辞典》

地方名 云南: 鸡刺参, 白仙茅, 白花刺参。

功效 根: 补气血, 接筋骨。用于神经官能症, 贫血, 肺虚咳嗽, 消化不良, 白带过多, 子宫脱垂。外用于跌打损伤。

### 7236010

*Pteroccephalus bretschnideri* (Bat.) Pritz.

植物名 裂叶翼首花《中国植志》

药材名 裂叶翼首花《汇编》

地方名 四川: 岩七(西昌), 爬岩夕(会理), 小刺锤(木里); 云南: 大树小黑牛, “哀诺期”(玉溪峨山彝名)。

功效 根及全草：祛风除湿，活血祛瘀，止痛。

## 7236011

*Pteroccephalus hookeri* (C.B. Clarke) Hoek.

植物名 匙叶翼首花《中国植志》

药材名 翼首草《西藏中草》

文献名 “榜姿多乌”、“榜姿桃沃”(藏名)《民族药志》

地方名 青海：“邦子多吾”(藏名)；四川：“邦子毒乌”(藏名)；云南：土苦参。

功效 全草：有小毒。清热解毒，祛风湿，止痛。用于感冒发烧，关节炎，痢疾，心热，血热。

## 7236012

*Scabiosa comosa* Fisch. ex Roem. et Schult.

植物名 窄叶蓝盆花《中国植志》

文献名 细叶山萝卜《东检》，蒙古山萝卜《内蒙古中草药》，山萝卜《汇编》

地方名 内蒙古：“乌和日-西鲁苏”(蒙名)。

功效 花：清热泻火。用于肝火头痛，发烧，肺热咳嗽，黄疸。

## 7236013

*Triplotegia glandulifera* Wall. ex DC.

植物名 双参《中国植志》

药材名 双参《汇编》

文献名 囊苞花《汇编》，肚拉、西南囊苞花《四川中药志》

地方名 对对参(四川、云南)；四川：土洋参(木里)，[一支蒿]，白都拉、萝卜都拉(西昌)，小肚拉、白毛参(米易)，都拉，都拉参，东汉章、山油菜(峨眉)；云南：土败酱、萝卜参(昆明)，双香(丽江)。

功效 根：有毒。健脾益肾，活血调经，解毒。用于肾虚腰痛，贫血咳嗽，遗精，阳痿，风湿关节痛，月经不调，倒经，崩漏，带下，不孕症。外用于止血。

## 7236014

*Triplotegia grandiflora* Gagnep.

植物名 大花双参《中国植志》

药材名 大花双参《汇编》

文献名 双叶参、萝卜参《滇南本草》，大花囊苞花《中药大辞典》

地方名 云南：双参，羊蹄参(楚雄)，对对参、山苦参、野苦参、对肾参、双肾参、土参(红河)，合合参，青羊参、童子参、子母参(丽江)。

功效 块根：有毒。健脾益肾，活血调经，止崩漏，解毒。外用于止血。

## 7238 菊科 Compositae

## 7238001

*Achillea alpina* L. --- *A. sibirica* Ledeb. --- *A. mongolica* Fisch. ex Spreng.

植物名 高山蓍《中国植志》

药材名 蓍草《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 蓍、蓍实《本经》，聚雪、灵草《和汉药理学》，羽衣草、蚰蜒草、锯齿草《经济植物学》

地方名 一枝蒿(华北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、四川)，一支蒿(四川、贵州)，飞天蜈蚣(河北、湖南、广西、四川、贵州)，锯草(河北、内蒙古、陕西、宁夏)，蜈蚣草(黑龙江、甘肃、江西、湖南)；吉林：“嘎塞普儿”(朝名)；内蒙古：千锯草，“图勒格其-乌布期”(蒙名)；陕西：蜈蚣七、蜈蚣蒿(宝鸡)；甘肃：蛇见草(榆中)；江西：千条蜈蚣；贵州：乱头发，土一支蒿；其他：北蓍，北京一枝蒿，抬头蜈蚣，独角蒿。

功效 地上部分：抗菌消炎，解毒，镇痛。用于扁桃体炎，肠炎，痢疾，阑尾炎，肾盂肾炎，盆腔炎，毒蛇咬伤。

备考 近年来科学研究，发现本种有抗菌消炎作用，临床疗效观察，验证了急性阑尾炎、急性扁桃体炎、泌尿系统感染、细菌性痢疾、盆腔炎等感染性疾病 604 例，总有效率为 90.1%，显效率为 72.6%，未见明显毒副作用。

## 7238002

*Achillea millefolium* L.

植物名 蓍《中国植志》

药材名 千叶蓍《汇编》

文献名 西洋蓍草《祁州药志》，西洋锯草(小泉《药植》)，洋蓍草《中国药植图鉴》，欧蓍《东检》，蓍草《汇编》，多叶蓍《中草药学》

地方名 一支蒿(陕西、湖南)；内蒙古：千锯草，西洋花蓍；陕西：一苗蒿(略阳)，蛇咬草，蜈蚣蒿，锯草；宁夏：长虫草(六盘山)；湖南：一支箭，千年蓍，飞天蜈蚣，白蜈蚣，雪花菊；四川：雷公草，蜈蚣草(峨眉)。

功效 全草：有小毒。解毒消肿，止血，止痛。用于风湿疼痛，牙痛，经闭腹痛，胃痛，肠炎，痢疾。外用于毒蛇咬伤，痈疽肿毒，跌打损伤，外伤出血。

## 7238003

*Achillea wilsoniana* Heimerl ex Hand.-Mazz. --- *A. sibirica* ssp. *wilsoniana* Heimerl ex Hand.-Mazz.

植物名 云南蓍《中国植志》

药材名 西南蓍草《汇编》

文献名 蓍草《汇编》，西南蓍《中药志》

地方名 一枝蒿、一支蒿(湖北、四川、贵州、云南)，土一支蒿(四川、贵州、云南)，飞天蜈蚣(湖北、广西、云南)，蜈蚣草(广西、云南)；湖北：蜈蚣蒿；云南：四乱蒿、茴香一枝蒿(红河)，茅草一枝蒿(昭通)，马茴香、蒿子跌打(思茅)，刀口伤皮，白花一枝蒿(文山、红河)，野一枝蒿(文山)，刀口药，细杨柳，乱头发(曲靖)。

功效 全草：有毒。活血祛风，消肿止痛。用于跌打损伤，风湿痹痛，胃痛，牙痛，经闭腹痛，急性乳腺炎，疔疮肿毒。

## 7238004

*Achyroperus ciliatus* (L.) Scop. --- *Hypochoeris grandiflora* Ledeb. --- *H. ciliata* (Thunb.) Mak.

植物名 猫儿菊《高植图鉴》

药材名 猫儿黄金菊《汇编》

文献名 黄金菊根《吉林中草药》，黄金菊《中药大辞典》

地方名 吉林:高粱菊。

功效 根:利水。用于腹胀。

#### 7238005

*Acroptilon repens* (L.) DC. --- *Centaurea picris* Pall. ---

*Acroptilon picris* DC.

植物名 项羽菊《高植图鉴》

药材名 项羽菊《汇编》

文献名 [苦蒿]《高植图鉴》

地方名 苦菜(西北);内蒙古:“达兰-陶尔戈依”(蒙名);新疆:“克可尔日”、“克可日”(维名)。

功效 地上部分:清热解毒,活血消毒。用于痈疽疔疮,无名肿毒,关节炎。

#### 7238006

*Adenocaulon himalaicum* Edgew. --- *A. adhaerescens*

Maxim. --- *A. bicolor* Hook. var. *adhaerescens* Makino

植物名 和尚菜《救荒本草》、《中国植志》

药材名 腺梗菜《汇编》

地方名 四川:胡豆叶;贵州:水葫芦,葫芦叶,水马蹄草,白马蹄草,大马蹄香,白马蹄叶;其他:马铃薯。

功效 根茎:止咳平喘,利水散瘀。用于咳嗽气喘,水肿,产后瘀血腹痛。外用于骨折。

#### 7238007

*Adenostemma lavenia* (L.) O. Kuntze --- *A. viscosum*

Forst. --- *A. tinctorius* (Lour.) Cass. --- *Verbesina lavenia* L.

植物名 下田菊《中国植志》

药材名 下田菊《汇编》

地方名 浙江:尖叶野葵花(临安),猪屎草(平阳),大叶水苦叶(云阳);江西:水胡椒(南丰);台湾:四叶紫苏,竹节癭,马薯棚,麻薯棚,麻芝棚;湖南:“兰脱”(侗语),大退消;广西:仁皂刺(上林),水大靛(岑溪),乳痢药(贵县),[见肿消](百色),红球花;贵州:汗苏麻(兴仁),回筋草,风气草(兴义);云南:白龙须(思茅),雪满草(文山),蛇毒一颗蒿(保山),肥猪草,老母猪耳朵(红河),“马桑西哈”(傣名),猪耳朵叶,胖婆娘,胎盘草;其他:沼大根(日本名)。

功效 全草:清热利湿,解毒消肿。用于感冒高热,支气管炎,咽喉炎,扁桃体炎,黄疸型肝炎。外用于痈疔疮疡,蛇咬伤。

#### 7238008

*Adenostemma lavenia* (L.) O. Kuntze var. *latifolium* (D.

Don) Hand. - Mazz. --- *A. latifolium* D. Don

植物名 阔叶下田菊《云南种录》

文献名 宽叶下田菊《西藏植志》

地方名 四川:重皮冲。

功效 全草:用于脚气病,感冒。外用于痈肿疮疖。

#### 7238009

*Adenostemma lavenia* (L.) O. Kuntze var. *parviflorum*

(Blume) Hochreut. --- *A. parviflorum* (Blume) DC.

植物名 小花下田菊(拟)

功效 全草:用于感冒,疟疾。外用于痈肿疮疖,

五步蛇咬伤。

#### 7238010

*Ageratum conyzoides* L.

植物名 藿香薷《中国植志》

药材名 胜红蓟《汇编》

地方名 猫屎草(广东、四川),白花草(福建、广东、广西、云南),白花臭草(广东、云南),臭草(广东、广西、云南),白毛苦(广东、广西);福建:马英汉、白头花草(泉州),苦椒(三明),白花香草,泽兰合,咸虾草,柠檬七星菊,桂花草,路遇香;台湾:〔一枝香〕,小本田央饭,细本蜻蜓饭,南风草,柳仔黄,蝶仔草;广东:鱼苗草、咸虾花(广州),白咸虾花(新会),大叶咸虾花,臭咸虾花;海南:臭炉草;广西:白痧草(临桂),〔香草〕 (桂平),毛麝香,鱼草,鱼花草,臭炉草;贵州:脓泡草,〔绿升麻〕,狗扯尾,野棉花;云南:广马草、重阳草、紫花毛草(文山),水丁药、油贴贴果(保山),鬼点火(昆明),野草杨(连山),“牙货”(傣名),胜红药,鱼眼草,消炎草。

功效 全草、叶或嫩茎:祛风清热,消肿止痛,止血,排石。用于上呼吸道感染,扁桃体炎,咽喉炎,急性胃肠炎,胃痛,腹痛,崩漏,肾结石,膀胱结石,湿疹,鹅口疮,疔疮肿毒,蜂窝组织炎,下肢溃疡,中耳炎,外伤出血。

#### 7238011

*Ageratum houstonianum* Miller --- *A. mexicanum* Sims

植物名 熊耳草《中国植志》

药材名 熊耳草《广西药录》

功效 全草:清热解毒,祛风,消炎,止血。用于感冒风热,咽喉痛,刀伤出血,疮疖等。外用于中耳炎。

#### 7238012

*Ainsliaea bonatii* Beauvd. --- *A. cardiophylla* Franch.

植物名 心叶兔耳风《高植图鉴》

药材名 心叶兔耳风《汇编》

文献名 毛叶威灵仙《云南药录》,大一枝箭、小接骨丹《汇编》

地方名 四川:红毛三七(甘孜);贵州:兔儿风;云南:双股箭(昆明),大俄火把(红河)。

功效 根:祛风湿,舒筋络。用于风湿筋骨疼痛,跌打损伤,关节脱臼复位。

#### 7238013

*Ainsliaea elegans* Hemsl.

植物名 秀丽兔耳风《高植图鉴》

药材名 秀丽兔耳风《广西药录》

地方名 广西:背毛红草(靖西)。

功效 全草:用于风湿骨痛,肺结核。

#### 7238014

*Ainsliaea elegans* Hemsl. var. *strigosa* Mattf.

植物名 红毛叶兔耳风《云南种录》

文献名 奇异兔耳风《红河中草药》

地方名 云南:红毛叶马蹄香、毛叶马蹄香、反背红马蹄香、红马蹄香(红河),兔耳风,红毛叶,〔马蹄香〕,反背马蹄香。

功效 根、叶：清热利湿，止咳化痰；叶：用于感冒发热，支气管炎；根：用于小儿肺炎，头痛，消化不良，风湿痛，跌打损伤。

## 7238015

*Ainsliaea fragrans* Champ.

植物名 杏香兔耳风《高植图鉴》

药材名 杏香兔耳风《汇编》

文献名 兔耳草《慈航活人书》，兔耳箭、金茶匙（汪连仕《采药书》），小鹿衔、银茶匙、忍冬草、月下红《百草镜》，金边兔耳、兔耳一枝箭《纲目拾遗》

地方名 一支枪（江西、广东），一支香（浙江、江西、福建），一支箭（江西、湖南、广东），兔耳风（浙江、江西、湖南、广东），[天青地白]（湖南、广东），兔耳一枝香（安徽、江西）；江苏：白走马胎，金边兔耳草；浙江：山蝴蝶，金边兔耳风（宁波），毛鹿含草，红金交杯，通天草，兔耳金边草，猪心草，铁交杯，铜调羹，倒拔千金；安徽：痧药；江西：山黄菜（定南），朝天一枝香（莲花），四叶一枝香，石香，[鬼督邮]；福建：扑地金钟、金地匙（泉州），一盞茶，[马蹄香]，钢管杯；湖南：马细辛（零陵），毛里一枝箭、猫耳朵（黔阳），肺草（溆浦），牛眼珠草（新宁），毛马香，（麻阳），[肺形草]、橡皮草（新邵）；广东：[老鼠耳]、铁草鞋、磨地风（惠阳），石湖蜆，伏地蜘蛛，石拐蛇药，伏地虎，入地螳螂，金丝风，鬼细参，散血丹；广西：[十大功劳]，六大功劳（博白），飞针（平南），相思草（桂平），老鼠尾，猫耳细辛菊；四川：大一支箭；贵州：一柱香（剑河），大种巴地香（黎平），[牛皮菜]（雷山），巴地虎，红太极图，朝天一柱香；其他：铁火锹。

功效 全草：清热解毒，消积散结，止咳，止血。用于上呼吸道感染，肺脓疡，肺结核咯血，黄疸，小儿疳积，消化不良，乳腺炎。外用于中耳炎，毒蛇咬伤。

## 7238016

*Ainsliaea glabra* Hemsl.

植物名 光叶兔耳风《高植图鉴》

文献名 兔儿风《峨眉药植》，光叶兔儿风《贵州药录》

地方名 四川：心肺草（成都、峨眉），大石风丹、[石风丹]（峨眉）。

功效 全草：养阴清肺。用于肺癆咳嗽吐血。

## 7238017

*Ainsliaea gracilis* Franch.

植物名 纤细兔耳风《高植图鉴》

文献名 软兔耳风《广西药录》

地方名 广西：相思草（桂平）。

功效 全株：用于咳血，无名肿毒，跌打损伤。

## 7238018

*Ainsliaea grossedentata* Franch.

植物名 粗齿兔耳风《高植图鉴》

药材名 粗齿兔儿风《贵州药录》

文献名 灯台草《高植图鉴》

地方名 贵州：青菜果；四川：兔耳风、[光棍草]（峨眉山）。

功效 全草：清热利湿，凉血解毒。用于惊痛，风

热头痛，虚癆咳血，湿热黄疸，痢症肿毒，水肿，淋巴结核，刀伤出血。

## 7238019

*Ainsliaea henryi* Diels

植物名 长穗兔耳风《云南种录》

文献名 滇桂兔儿风《广西植录》

地方名 四川：肺心草（峨眉山），二郎剑。

功效 全草：止咳，平喘，镇痛。用于小儿惊风。

## 7238020

*Ainsliaea lancifolia* Franch.

植物名 披针叶兔耳风《汇编》

文献名 长叶兔耳风《云南种录》，小血金丹、肺经草《中药大辞典》

地方名 四川：毛叶石风丹（峨眉山）。

功效 全草：止血。用于肺结核咳血，胃溃疡出血，支气管扩张出血。

## 7238021

*Ainsliaea latifolia* (D. Don) Sch.-Bip. --- *A. triflora* (Buch.-Ham. ex D. Don) Druce --- *A. pteropoda* DC.

植物名 宽穗兔耳风《云南种录》

药材名 刀口药《昆明民药》

文献名 倒赤伞《西藏中草》，宽叶兔儿风《西藏植志》，三花兔耳风《中药大辞典》，青皮草《四川中药志》

地方名 四川：一把箭，发表药；贵州：[白头翁]；云南：大叶一枝箭（曲靖），白胡子狼毒，紫皱叶子、倒卵叶三花兔儿风（红河）。

功效 全草：止血生肌，祛风散寒。用于刀伤外伤出血，跌打损伤，中耳炎，乳痈，风寒感冒，肠炎痢疾。

备考 《西藏植志》4:921, 1985 认为本种是许多类型的种而将 *Ainsliaea latifolia* (D. Don) Sch.-Bip., *A. triflora* (Buch.-Ham. ex Don) Druce, *A. henryi* Diels, *A. yunnanensis* Franch. 合为一种名宽叶兔儿风，志此供研究参考。

## 7238022

*Ainsliaea latifolia* (D. Don) Sch.-Bip. var. *obovata* (Franch.) Grierson et Lauener --- *A. spicata* Vaniot

植物名 卵叶宽穗兔耳风《云南种录》

地方名 云南：一支箭、肾炎草（澜沧、思茅），牛尾一支箭，小一支箭，杏叶兔耳风，毛叶一支箭（昆明），“茎不罗”（楚雄彝名），马蹄草。

功效 根：消炎，杀菌，利尿，杀虫。用于阿米巴痢疾，喉炎，脚气病，食欲不振，腹胀。

## 7238023

*Ainsliaea macroclinioides* Hayata --- *A. hui* Diels ex Mattf.

植物名 铁灯兔耳风《高植图鉴》

药材名 铁灯兔耳风《汇编》

文献名 卵叶兔儿风《广西植录》，永嘉兔儿风《汇编》

地方名 浙江：九叶莲（临海），铁雨伞（龙泉），高脚一枝香；江西：兔耳风；广东：铁灯兔子草（鼎湖山）。

功效 全草：清热解毒。用于鹅口疮。

## 7238024

*Ainsliaea nervosa* Franch.

植物名 多脉兔耳风《云南种录》

药材名 高脚一枝香《汇编》

文献名 显脉兔耳风《汇编》

地方名 江西:扑地老虎(德兴)。

功效 全草:清热解暑,消积散结,止咳,止血。

## 7238025

*Ainsliaea pertyoides* Franch.

植物名 叶下花《高植图鉴》

药材名 叶下花《峨眉药植资源》

地方名 四川:白背兔耳风(峨眉山);云南:地黄连(思茅),追风箭(昆明)。

功效 全草:行气,接骨,镇痛。

## 7238026

*Ainsliaea pertyoides* Franch. var. *albotomentosa* Beauvd.

植物名 白背叶下花《云南种录》

药材名 叶下花《汇编》

文献名 白背兔耳风《汇编》

地方名 贵州:牛毛细辛;云南:毛叶马蹄香、风湿药、细透骨草、大苦果根(红河),追风箭(玉溪)。

功效 全草:有小毒。除湿止痛,行气活血,接骨。用于风湿关节痛,跌打损伤,淋巴结炎。外用于骨折,外伤出血。

## 7238027

*Ainsliaea ramosa* Hemsl.

植物名 多枝兔耳风《广西药录》

地方名 广西:飞针(平南),白苇(昭平),白眉草(蒙山),相思草、红背子(桂平),红孩连(阳朔),吐血红(临桂),踏地羊(全州),[肺筋草](资源),天青地红(富川)。

功效 全株:清热,败毒,润肺,镇静,止咳,消肿,止血。用于白痢,喉痛,吐血,小儿哮喘。

## 7238028

*Ainsliaea rubrifolia* Franch.

植物名 红背兔耳风《高植图鉴》

药材名 红背兔耳风《峨眉药植资源》

文献名 红走马胎《高植图鉴》

地方名 贵州:[牛皮菜];四川:青兔耳风(峨眉山)。

功效 全草:行气活血,除湿止痛。用于跌打损伤,风湿筋骨痛。

## 7238029

*Ainsliaea rubrinervis* Chang

植物名 红脉兔耳风《高植图鉴》

药材名 青兔耳风《四川中药志》

文献名 走马丹《峨眉药植》,紫背草《民药汇编》

地方名 四川:红走马胎(峨眉山),罗汉草(重庆),血筋草(成都),紫背血筋(南川),[走马胎],[紫背金牛草]。

功效 全草:清热解毒,活血,止痛。用于肺热咳嗽,咽喉肿痛,疮痍肿毒,毒蛇咬伤,跌打损伤,风湿疼痛。

## 7238030

*Ainsliaea yunnanensis* Franch. --- *A. scabrida* Dunn

植物名 云南兔耳风《云南种录》

药材名 燕麦灵《昆明民药》

文献名 [威灵仙]《玉龙本草》,追风箭《云南中草药》,〔铜脚威灵仙〕《药学报》

地方名 四川:独柱香,小发表;贵州:羊耳草;云南:双股箭、地皮屑(昆明),毛叶马蹄香、大麦穗、倒吊花(红河),扁胡子(曲靖),〔铜脚威灵〕(玉溪),兔耳风,接骨一支箭,小一支箭,地草果,“若路娃”(楚雄彝名),〔猫头防风〕(江川)。

功效 全草:祛风湿,舒筋骨,续骨。用于跌打损伤,骨折,风湿骨痛。

## 7238031

*Ajania khartense* Dunn

植物名 铺散亚菊《中国植志》

药材名 铺散亚菊《迪庆藏药》

功效 地上部:杀虫,干“黄水”,愈溃疡。用于虫病,咽喉病,炭疽,溃疡病。

## 7238032

*Ajania variifolia* (Chang) Tzvel. --- *Chrysanthemum variifolium* Chang --- *Ajania manchurica* Poljak. --- *Phaeostigma variibolium* (Chang) Muld.

植物名 异叶亚菊《中国植志》

文献名 太白菊《陕西中草药》

功效 全草:祛风镇静,清热解毒。用于小儿惊风,风湿麻木,阑尾炎。

## 7238032a

*Anaphalis aureo-punctata* Lingelsh. et Borza

植物名 黄腺香青《中国植志》

药材名 黄腺香青《贵州药录》

功效 全草:清热解毒,利湿消肿。用于口腔炎,小儿惊风,疮毒,赤、白痢,水肿,蛇咬伤。

## 7238033

*Anaphalis bicolor* (Franch.) Diels

植物名 二色香青《中国植志》

药材名 三轮蒿《贵州民间药物》

地方名 贵州:白头蒿(贵阳)。

功效 全草:清暑,镇痛,补虚。用于中暑腹痛,肺病。

## 7238034

*Anaphalis bulleyana* (J. F. Jeffr.) Chang

植物名 粘毛香青《中国植志》

药材名 野辣烟《汇编》

文献名 昆明香青《中药大辞典》

地方名 贵州:风蒿;云南:午香草、五香草(中甸、丽江),香附草(丽江),香辣烟。

功效 全草:清热利湿,止咳,截疟。用于感冒,气管炎,扁桃体炎,百日咳,急性胃肠炎,膀胱炎,尿道炎,小儿疳积,疟疾。

## 7238035

*Anaphalis busua* (Ham.) DC. --- *Anaphalis araneosa* DC.

植物名 蛛毛香青《中国植志》

药材名 蛛毛香青《广西药录》

地方名 广西:〔白头翁〕,天青地白(乐业),火绒艾;云南:五香草(丽江、中甸)。

功效 全株:用于眼病。

#### 7238036

*Anaphalis contorta* (D. Don) Hook. f.

植物名 旋叶香青《中国植志》

地方名 云南:小火草(元江),“地杂扎然”(元江哈尼语)。

功效 全草:清肝明目,止血止痛。用于肝阳头痛,风火眼痛,外伤出血。

#### 7238037

*Anaphalis flavescens* Hand. - Mazz.

植物名 淡黄香青《中国植志》

地方名 四川:铜钱花(川西),清明菜(康定)。

功效 全草:用于疮癣。

#### 7238038

*Anaphalis flavescens* Hand. - Mazz. var. *lanata* Ling

植物名 绵毛淡黄香青(拟)

地方名 四川:铜钱花(川西)。

功效 全草:用于疮癣。

#### 7238039

*Anaphalis flavescens* Hand. - Mazz. var. *taipeiensis* J. Q. Fu

植物名 太白淡黄香青《秦岭植志》

地方名 陕西:五月霜。

功效 全草:清热解毒,杀虫。用于子宫炎,阴道滴虫。

#### 7238040

*Anaphalis hancockii* Maxim.

植物名 铃铃香青《中国植志》

药材名 灵香蒿《汇编》

文献名 〔零陵香〕《中国经植志》,五月霜《陕西中草药》,零零香《高植图鉴》,稀毛香青《汇编》

地方名 河北:铃铃香;四川:铜钱花。

功效 全草:清热解毒,杀虫。用于子宫颈炎,阴道滴虫。

#### 7238041

*Anaphalis lactea* Maxim.

植物名 乳白香青《中国植志》

药材名 乳白香青《青海中草》

文献名 大茅香艾《青海中草》

地方名 青海:“哇日多罗”(藏名),大白茅香。

功效 全草:活血散瘀,平肝潜阳,祛痰。用于止血,血瘀包块,肝阳上亢,肺热咳嗽,创伤出血,头痛。

#### 7238042

*Anaphalis lactea* Maxim. f. *rosea* Ling

植物名 红花乳白香青《青海中草》

功效 全草:活血散瘀,平肝潜阳,祛痰。外用于止血。

#### 7238043

*Anaphalis margaritacea* (L.) Benth. et Hook. f.

植物名 珠光香青《中国植志》

药材名 山萩《汇编》

文献名 一面青《分类草药性》,大叶白头翁《四川中药志》,蕹蒿《药材学》,香青《中药大辞典》

地方名 大火草、火草(四川、贵州),〔白头翁〕(四川、广西);山东:避风草,九头艾,仙人艾;浙江:九里香青,香丝棉;湖南:毛女儿菜,射岩,柳叶青;广西:白艾(北流),白头婆(玉林),土白头翁(龙州、平南);贵州:小火草(遵义),大曲花(湄潭);其他:毛女儿草,牛舌草。

功效 全草或根:清热解毒,祛风通络,驱虫。用于感冒,牙痛,痢疾,风湿关节痛,蛔虫病。外用于刀伤,跌打损伤,颈淋巴结结核。

#### 7238044

*Anaphalis margaritacea* (L.) Benth. var. *cinnamomea* (DC.) Herd. ex Maxim.

植物名 黄褐珠光香青《秦岭植志》

药材名 白萩《峨眉药植资源》

地方名 四川:白头翁(峨眉山)。

功效 全草:消肿,解毒。

#### 7238045

*Anaphalis margaritacea* (L.) Benth. et Hook. f. var. *japonica* (Sch. - Bip.) Makino

植物名 线叶珠光香青《西藏植志》

文献名 条叶珠光香青《贵州药录》

地方名 广西:天青地白(乐业)。

功效 全草:清暑化瘀,补虚止痛,润肺止咳。用于肺癆咳嗽,急腹症,肝炎,黄疸。

#### 7238046

*Anaphalis nepalensis* (Spreng.) Hand. - Mazz.

植物名 尼泊尔香青《中国植志》

药材名 打火草《汇编》

文献名 清明草《高植图鉴》

地方名 火草(四川、西藏、云南);四川:清明茶;西藏:香青,“扎瓦”(藏名)。

功效 全草:清热解毒,平咳定喘。用于感冒咳嗽,急性气管炎,风湿性腿痛,高血压。

#### 7238047

*Anaphalis sinica* Hance --- *A. pterocaula* (Franch. et Savat.) Maxim.

植物名 香青《中国植志》

药材名 香青草《汇编》

文献名 翅茎香青,枫茄香、白四棱锋《中药大辞典》

地方名 通肠香(浙江、江苏);山东:〔野艾〕(长清),香人艾(蒙山、平邑),避风草(平邑、滕县);江苏:山萩;浙江:〔九里香〕(建德、淳安、天台),白四棱风(温州),大叶蓬(丽水、云和),白冷风(秦顺),白四轮风(温州、瑞安、永嘉、洞头);云南:午香草,五花。

功效 全草:祛痰,镇咳,平喘,消炎。用于急、慢性支气管炎,感冒。

#### 7238048

*Anaphalis sinica* Hance var. *remota* Ling

植物名 疏生香青(秦岭植志)

药材名 疏叶香青(拟)

功效 全草:用于肺炎。

#### 7238049

*Anaphalis surculosa* (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz.

植物名 萌条香青(中国植志)

地方名 云南:五香花(丽江)。

功效 全草:用于感冒,头痛,急性胃肠炎。

#### 7238050

*Anaphalis szechuanensis* Ling et Y. L. Chen

植物名 四川香青(中国植志)

药材名 甘达八渣(迪庆藏药)

功效 地上全草:祛风湿,消痞。用于“培根”病,痞块,风湿病,流感,灰色水肿。

7238051 见 7238032a

#### 7238052

*Anisopappus chinensis* (L.) Hook. et Arn. --- *Inula chrysanthi* auct. non Diels

植物名 山黄菊(中国植志)

药材名 山黄菊(汇编)

文献名 齿叶旋覆花(中药志),山菱花(云南药录),菊洞菊(中国植志)

地方名 [旋覆花](江西、湖南、广西、广东);广东:福花,六耳苓,鹿耳苓;广西:覆花、甘菊花(北流),金菊花(苍梧),根紫花(藤县),旱山菊。

功效 花:清热化痰。用于感冒头痛,慢性气管炎。

备考 《药学报》18(12):962,1983称:《中药志》(Ⅲ)、(1960)学名 *Inula chrysanthi* Diels 系误订。

#### 7238053

*Antennaria dioica* (L.) Gaertn. --- *Gnaphalium dioicum* L.

植物名 蝶须(中国植志)

文献名 兴安蝶须(东检)

功效 全草:用于创伤,咳嗽,并作缓和剂。

#### 7238054

*Arctium lappa* L. --- *A. majus* Schk.

植物名 牛蒡(别录)、《高植图鉴》

药材名 牛蒡子(图经)、《药典》

文献名 恶实、鼠粘草(别录),牛蒡根(药性论),鼠粘子(图经),黍粘子(珍珠囊),大力子(卫生易简方),牛菜、夜叉头(救荒本草),蝙蝠刺、茅翁菜、便牵牛(纲目),饿死囊(本草医林纂要),鼠粘根(延年方),恶疾、牛菜子、道人头、夜叉头(新纲),黑根儿(满州植录)

地方名 老母猪耳朵、关大力、[如意草]、老母猪哼哼、野狗宝、天龙子、黑萝卜(东北),牛子(江苏、广西、安徽、山东、河北),老鼠愁(陕西、北京),大夫叶(北京、台湾),象耳朵(四川、贵州);辽宁:粘苍子,疙瘩菜(朝阳);北京:口牛子,小菜毛,大老鼠愁;河北:鼠粘,粘耗子蛋(张家口);山西:大牛子,黑板儿;内蒙古:绣耗子疙瘩,“高哈-吉木斯”、“吉松”(蒙名);陕西:老鼠捻捻;甘肃:粘粘子,牛爬叶(文县);青海:毛然然子,毛然然

疙瘩,毛然然,毛粘粘,然娃娃,牛鼻犟,黑风子,“切桑”(藏名);江苏:鼠尖子(镇江),弯巴钩子(徐州、泰州),万把钩(泰县),土大桐子(六合);上海:钩刺果草;安徽:赶马回;湖南:[升麻](麻阳),牛疔疮(怀化);四川:“血绒”(藏名),大力子根;贵州:毛锥子。

功效 果实:疏散风热,宣肺透疹,解毒利咽。用于风热感冒,咳嗽痰多,麻疹、风疹,咽喉肿痛,疔疮丹毒,痈肿疮毒;根:祛风热,消肿毒。用于风毒面肿,头昏,咽喉热肿,齿痛,咳嗽,消渴,痈疽疮疥;茎叶:用于头风痛,烦闷,金创,乳痈,皮肤风痒。

#### 7238055

*Arctium tomentosum* Mill. --- *A. lappa* L. var. *tomentosum* A. Gray

植物名 毛牛蒡(拟)

药材名 牛蒡(沙漠药植)

地方名 河北:大力子。

功效 果实:疏散风热,宣肺透疹,解毒利咽;根:祛风热,消肿毒。

#### 7238056

*Artemisia absinthium* L.

植物名 中亚苦蒿(植物研究)

文献名 苦艾(中草药学),苦蒿(江苏植药志),洋艾(江苏南部种册)

功效 全草:健胃,驱虫,消炎,利尿。

备考 本品含苦味素,常用作饮料的苦味剂。

#### 7238057

*Artemisia adamsii* Bess.

植物名 东北丝裂蒿(植物研究)

文献名 阿氏蒿(汇编)

地方名 内蒙古:[茵陈];四川:“看阿中”(藏名)。

功效 全草:清热解暑,健胃。用于肺炎,胃炎,喉炎,扁桃体炎,结膜炎。

#### 7238058

*Artemisia anethifolia* Weber --- *A. multicaulis* Ledeb. --- *Absinthium divaricatum* Fisch. ex Bess.

植物名 大蒺藜蒿(高植图鉴)

药材名 碱蒿(沙漠药植)

地方名 内蒙古:[茵陈]。

功效 幼苗:清热利湿。

#### 7238059

*Artemisia anethoides* Mattf. --- *A. anethifolia* Weber var. *anethoides* (Mattf.) Pamp.

植物名 蒺藜蒿(高植图鉴)

药材名 蒺藜蒿(沙漠药植)

地方名 [茵陈](河北、天津、山东、西北)。

功效 幼苗:清热利湿。

#### 7238060

*Artemisia angustissima* Nakai --- *A. japonica* Thunb. var. *angustissima* (Nakai) Kitam.

植物名 狭叶牡蒿(植物研究)

功效 全草:清热,凉血,解暑。

#### 7238061

*Artemisia annua* L. --- *A. wadei* Edgew. --- *A. stewartii* C. B. Clarke --- *A. chamomilla* C. Winkl.

植物名 黄花蒿《纲目》、《高植图鉴》

药材名 青蒿《本经》、《药典》

文献名 草蒿、方溃《本经》，青蒿子《食疗本草》，猗蒿《蜀本草》，臭蒿《纲目》

地方名 马屎蒿（贵州、四川），细叶蒿（湖南、广西），香蒿花（东北），香蒿（江西、广西），黄蒿（安徽、江苏、山东、广西），秋蒿（安徽、上海），臭蒿（安徽、浙江、广西），苦蒿（贵州、四川、江苏），香青蒿（江苏、江西），蒿子（山东、广西、青海）；内蒙古：“希拉·希口勒吉”、“莫林·沙里尔日”（蒙名），臭蒿， “沙拉翁”（乌审旗蒙名）；新疆：“康伯”（维名）；山东：黑蒿（莱芜），黄蒿子；江苏：黄香蒿（苏州），野筒蒿（镇江），咸蒿子；上海：野苦草，苦草；浙江：细花蒿；湖北：鱼子青蒿（蕲春）；广东：假香菜，番红草；广西：臭草（苍梧），臭菊，青艾（旧林），细青蒿，草青蒿，草蒿子；云南：牛屎蒿（大关）。

功效 地上部分：清热解暑，除蒸，截疟。用于暑邪发热，阴虚发热，夜热早凉，骨蒸劳热，疟疾寒热，湿热黄疸；果实：清热明目，杀虫。用于劳热骨蒸，痢疾，恶疮，疥癣，风疹；根：用于劳热骨蒸，关节酸痛，大便下血。

#### 7238062

*Artemisia annua* L. f. *macrocephala* Pamp.

植物名 大头黄花蒿《云南种录》

药材名 青蒿《云南药录》

文献名 大头黄花蒿《拉汉英种称》

功效 地上部分：解热，截疟，止盗汗，杀虫。

#### 7238063

*Artemisia anomala* S. Moore

植物名 奇蒿《高植图鉴》

药材名 刘寄奴草《唐本草》、《汇编》

文献名 刘寄奴、金寄奴《日华子本草》，滁州刘寄奴《图经》，乌藤菜《通志》，六月霜《纲目拾遗》，异形蒿《广西植录》

地方名 六月雪（湖南、江西、福建、浙江、安徽、广西），化食丹（上海、安徽），南刘寄奴（江苏、上海、浙江、福建）；江苏：大叶蒿，铁杆茵陈，[血见愁]（镇江）；浙江：消食草（杭州），消饭花（诸暨、鄞县），野马兰头（寿昌），小米花，一枝梅，白头毛公（温州、文成）；安徽：山菊花、艾丸药（广德），香蒿子（贵池），[四季青]；福建：苦连婆（周宁），[九里光]（福安）；湖南：白花尾（郴县），白雷公（浏阳），白油婆（新邵），白肚婆（长沙），斑得正（永兴），仙人草（衡山），炭包包，千粒米，斑枣子，细白花草，九牛草；广东：白虎门；广西：斑麻草，六月白（全州）；其他：白花草。

功效 带花全草：清暑利湿，活血行瘀，通经止痛。用于中暑，头痛，肠炎，痢疾，经闭腹痛，风湿疼痛，跌打损伤，血丝虫病。外用于创伤出血，乳腺炎。

#### 7238064

*Artemisia anomala* var. *tomentella* Hand. - Mazz.

植物名 密毛奇蒿《拉汉英种称》

药材名 密毛刘寄奴《江西药录》

功效 全草、花穗：清暑利湿，活血行瘀，通经止痛。

#### 7238065

*Artemisia argyi* Levl. et Vant. --- *A. argyi* var. *incana* Ramp. - *A. vulgaris* L. var. *incanescens* Franch. - - *A. nutans* Nakai - *A. nutantiflora* Nakai

植物名 艾蒿《纲目》、《高植图鉴》

药材名 艾叶《别录》、《汇编》

文献名 艾、医草、冰台《别录》，艾实《药性论》，艾子《食疗本草》，黄草、灸草《埤雅》，蕪艾《蕪艾传》，蕪州艾《本草衍义》，北艾《纲目》，家艾《医林纂要》，甜艾《本草求真》，草蓬、野蓬头《中药大辞典》，五月艾、熟艾、陈艾叶《常用中药名辨》

地方名 艾蒿叶（河北、山东），祁艾（云南、河北、广西），白艾（辽宁、江苏），艾蓬（浙江、上海），阿及艾（浙江、江苏），陈艾（云南、四川），艾绒（上海、江苏）；河北：大叶艾；内蒙古：“随哈”、“纳洞纳各”、“卜如各老”（蒙名）；山东：野艾（临沂），狼尾蒿子叶（烟台）；江苏：杜艾叶（苏州），上艾（无锡），香艾，大艾叶（苏州、吴县）；湖南：团鱼蒿，端阳艾；四川：“坑热”（藏名）；其他：病草，艾叶油。

功效 叶：有小毒。散寒止痛，温经止血。用于少腹冷痛，经寒不调，宫冷不孕，吐血，衄血，崩漏经多，妊娠下血。外用于皮肤瘙痒；醋艾炭：温经止血。用于虚寒性出血症；艾卷：作艾灸用；艾实：明目，壮阳，助水藏，利腰膝。

#### 7238066

*Artemisia argyi* Levl. et Vant. f. *eximia* (Pamp.) Kitam.

植物名 无齿艾蒿《拉汉英种称》

药材名 大艾蒿《东北药植志》

地方名 贵州：白蒿，艾叶。

功效 叶：止血，强壮。用于吐血，衄血，直肠出血，子宫出血，经闭，月经不调，腹痛，吐泻，气喘。

#### 7238067

*Artemisia argyi* Levl. et Vant. var. *gracilis* Pamp. --- *A. chiarugii* Pamp.

植物名 朝鲜艾蒿《东检》

文献名 白艾蒿《东北药植志》

地方名 艾叶（东北、华北）。

功效 叶：散寒止痛，温经止血。

#### 7238068

*Artemisia argyi* Levl. et Vant. cv. *Qiai*

植物名 蕪艾《蕪艾传》、《植物研究》

药材名 艾叶《别录》

文献名 艾、冰台、医草《别录》，蕪州艾《本草衍义》

地方名 湖北：艾蒿，家艾，陈艾。

功效 叶：散寒止痛，温经，止血，并作艾灸用。

#### 7238069

*Artemisia atrovirens* Hand. - Mazz.



植物名 暗绿蒿《植物研究》  
 药材名 暗绿艾(拟)  
 地方名 艾叶(西北、华东、中南、西南)。  
 功效 叶:散寒止痛,温经止血。

## 7238070

*Artemisia austro-yunnanensis* Ling et Y. R. Ling --- *A. burmanica* Pamp. f. *latifolia* Pamp. --- *A. dubia* Wall. ex Bess. var. *longeracemulosa* Pamp. f. *tonkingensis* Pamp.

植物名 滇南艾《植物研究》  
 地方名 云南:艾叶(南部及西南部)。  
 功效 叶:散寒止痛,温经止血。

## 7238071

*Artemisia brachyloba* Franch.

植物名 山蒿《高植图鉴》  
 药材名 山蒿《汇编》  
 文献名 岩蒿《内蒙古中草药》  
 地方名 内蒙古:“乌拉-音-沙巴嘎”(蒙名)。  
 功效 全草:清热燥湿,杀虫排脓。用于偏头痛,咽喉肿痛,风湿等症。

## 7238072

*Artemisia capillaris* Thunb. --- *A. capillaris* Thunb. var. *arbuscula* Miq. --- *A. sacchalensis* Tiles ex Bess. --- *Oligosporus capillaris* (Thunb.) Poljak.

植物名 茵陈蒿《别录》、《中国植志》  
 药材名 茵陈《本经》、《药典》  
 文献名 茵陈《本经》,因尘《吴普本草》,马先《广雅》,石茵陈《口华子本草》,山茵陈、家茵陈《图经》,茵陈蒿《纲目》,绵茵陈《本经逢原》,思节蓬《朝鲜植汇》,黄蒿《祁州药志》

地方名 (青蒿)(山东、江苏、福建、广东),白绵蒿(东北),白蒿(山东、江苏),铁青蒿(湖北、山东),绒蒿(广西、江苏),细叶青蒿(广西、浙江),香蒿(湖南、陕西),羊毛茵陈(湖北、甘肃);山东:婆婆蒿(昆嵛山、海阳),黑蒿,米蒿,勃勃蒿,白白蒿,鸡爪蒿,白头蒿(黄县、平邑);江苏:臭蒿、安吕草(苏州),桐蒿草(泗洪),苦艾(射阳),野蓬蒿(苏北);浙江:白茵(吴兴),草茵陈(长兴),狗毛青、床丝毛青(嵊县),细青蒿(平阳),松毛艾;安徽:细叶蒿,绿茵陈;福建:蚊子艾,蚊子苏,蚊烟草,茵陈草,土茵陈,秋花子;台湾:蚊仔烟草,青蒿草,青荷;湖北:(白头翁)(孝感),细米蒿;湖南:野兰蒿,青蒿子(新邵),小青蒿(花垣),狗毛青蒿(长沙),西茵陈、牛尾茵陈、杀虫药(沅江)。

功效 幼苗:清湿热,退黄疸。用于黄疸尿少,湿疮瘙痒,传染性黄疸型肝炎。

## 7238073

*Artemisia capillaris* Thunb. f. *villosa* Korsh. --- *A. scoparia* Waldst. et Kit. f. *villosa* Korsh.

植物名 柔毛茵陈蒿《云南种录》  
 药材名 茵陈(东北)  
 文献名 绢毛东北茵陈蒿《东北药植志》  
 地方名 茵陈蒿(东北)。  
 功效 幼苗:清湿热,利胆退黄。用于黄疸病,

驱虫。

## 7238074

*Artemisia caruifolia* Buch. -Ham. --- *A. apiacea* Hance --- *A. abrotanum* Thunb. - *A. thunbergiana* Maxim. --- *A. caruifolia* Buch. -Ham. var. *apiaceae* Pamp.

植物名 香蒿《品种论述》  
 药材名 香蒿《本草衍义》、《品种论述》

文献名 草蒿、方溃《本经》,〔邪蒿〕《本草拾遗》,青蒿子《食疗本草》,三庚草《履巉岩本草》,青蒿《头注国译本草纲目》,藿蒿《药材学》,青蒿露《中国医学大辞典》

地方名 鱼花草(广东、广西);河北:大青蒿,香蒿子,臭蒿子;山东:黑蒿;福建:臭艾子、蚊香、苦松、青叨蒿、巴蒿(泉州),白染良;湖南:野三蒿;广西:蚊子草;四川:“看巴”(藏名);云南:牛屎蒿,“施伍白”(楚雄彝名),茅头草,蒿子,臭青蒿,草蒿子。

功效 全草:清热,解暑,除蒸。用于湿病,暑热,骨蒸癆热,痢疾。

备考 据《植物研究》(8)(4):16,1988)载:林有润查阅了存英皇家植物园标本馆及印度国立植物园本馆有关模式标本,发现 *Artemisia apiacea* Hance (1852)是 *Artemisia caruifolia* Buch. -Ham. (1814)的晚出异名,从而加以归并处理。

## 7238075

*Artemisia chingii* Pamp.

植物名 南毛蒿《植物研究》  
 文献名 广西蒿《广西植志》,仁昌蒿《广西药录》  
 功效 叶:理气血,逐寒湿,止血,温经安胎。

## 7238076

*Artemisia codonocephala* Diels

植物名 细叶苦蒿《云南中草药》  
 文献名 毛头野艾《中国经植志》,白艾蒿《东北药植志》,苛丹艾《陕甘宁植志》,苦蒿《云南种录》  
 地方名 江西:野艾叶;云南:野蒿。  
 功效 全草:用于塞鼻止血,破血散血,血瘤,血鼠,血风等症。

## 7238077

*Artemisia conaensis* Ling et Y. R. Ling

植物名 错那蒿《西藏植志》  
 功效 全草:消炎,止咳。

## 7238078

*Artemisia demissa* Krasch. --- *Oligosporus demissus* (Krasch.) Poljak.

植物名 纤秆蒿《西藏植志》  
 地方名 (茵陈)(西北)。

备考 《植物研究》8(4):52,1988载:本品的基生叶及幼苗常作茵陈的代用品。

## 7238079

*Artemisia dracunculus* L. --- *A. dracunculoides* Pursh. --- *A. desertorum* Spreng. var. *macrocephala* Franch.

植物名 龙蒿《高植图鉴》  
 文献名 狭叶青蒿《高植图鉴》

功效 全草：用于暑湿发热。

#### 7238080

*Artemisia dracunculus* L. var. *turkestanica* Krasch.

植物名 宽裂龙蒿《植物研究》

功效 全草：用于暑湿发热。

#### 7238081

*Artemisia dubia* Wall. ex Bess. --- *A. subdigitata* Martf.  
var. *thomsonii* (Clarke ex Pamp.) S. Y. Hu

植物名 香野艾《中国经植志》

文献名 牛尾蒿《名实图考》，野艾《浙江药植志》，可疑蒿《云南种录》，疑蒿《植物研究》

地方名 艾绒、艾叶（东北、华北、北京）；浙江：大艾（浙南），青蓬头（平湖），蓬蒿（临安、诸暨、丽水）。

功效 全草：理气血，逐寒湿，调经，安胎，止血。用于月经不调，痛经，产后腹痛，尿路感染，肾盂肾炎，慢性气管炎。外用于腰酸背痛；叶炭：用于吐血，衄血，便血；艾绒：作艾灸用。

#### 7238082

*Artemisia dubia* Wall. var. *acuminata* Pamp.

植物名 渐尖香野艾（拟）

文献名 五月艾《广西《园林药录》》

功效 地上部分之茎叶：除寒止痛，温经安胎。用于月经过多，吐衄便血，经痛，胎动不安，产后腹痛。外用于风湿病，跌打损伤，驱蚊，杀蛆虫。

#### 7238083

*Artemisia dubia* Wall. ex Bess. var. *longeracemulosa* Pamp.

植物名 长穗香野艾（拟）

文献名 [黑蒿]《云南中草药选》，长穗可疑蒿《云南种录》

地方名 云南：艾蒿。

功效 全草：清热解毒，解暑，止血。用于阴虚潮热，中暑，外感，吐血，衄血，皮肤瘙痒。

#### 7238084

*Artemisia edgeworthii* Balakr. --- *A. stricta* Edgew.

植物名 直茎蒿《西藏植志》

文献名 [茵陈蒿]《西藏中草》，短叶蒿《汇编》，劲直蒿《青藏药图》

地方名 青海：“察尔汪”（藏名）。

功效 根：用于气管炎，肺病。

#### 7238085

*Artemisia eriopoda* Bunge --- *A. japonica* Thunb. var. *eriopoda* Komar.

植物名 南牡蒿《高植图鉴》

药材名 南牡蒿《汇编》

文献名 北牡蒿《中草药学》

地方名 江苏：直牡蒿，田蒿。

功效 全草及根：祛风除湿，解毒。用于风湿关节痛，头痛，浮肿，毒蛇咬伤。

#### 7238086

*Artemisia fauriei* Nakai --- *A. fukudo* Makino var. *mokpensis* Pamp. --- *A. nakai* Pamp. --- *A. haichowensis*

Chang

植物名 海州蒿《植物研究》

药材名 海州蒿《品种论述》

地方名 [茵陈]（山东、河北）。

功效 幼苗：系天津地区药用茵陈混乱品种主要来源之一。

#### 7238087

*Artemisia frigida* Willd. --- *A. lanata* Willd. var. *alpina* Liu --- *Absinthium frigidum* Bess.

植物名 冷蒿《高植图鉴》

药材名 小白蒿《汇编》

地方名 [茵陈蒿]（吉林、新疆）；内蒙古：兔毛蒿，“抗姆巴”（乌审旗蒙名），“阿给”（蒙名），白蒿；新疆：[茵陈]；甘肃：刚蒿；其他：小艾。

功效 带花的全草：燥湿，杀虫。用于胆囊炎，驱蛔虫、蛲虫。外用于慢性风湿关节痛。

#### 7238088

*Artemisia gilvescens* Miq. --- *A. vulgaris* L. var. *gilvescens* Nakai

植物名 湘赣艾《植物研究》

药材名 南艾叶（拟）

地方名 野艾、艾叶（江西、湖南、湖北、四川）。

功效 叶：散寒止痛，温经止血。

#### 7238089

*Artemisia glauca* Pall.

植物名 灰绿蒿《高植图鉴》

药材名 灰蒿《青藏药图》

地方名 青海：“察尔汪”（藏名）。

功效 根：用于气管炎，肺病。

#### 7238090

*Artemisia gmelinii* Web. ex Stechm. --- *A. sacrorum* Ledeb. var. *minor* Ledeb. --- *A. vestita* Wall. ex DC. var. *discolor* (Kom.) Kitag. --- *A. turschaninowiana* Krasn.

植物名 细裂叶莲蒿《植物研究》

文献名 [白莲蒿]《高植图鉴》，[菴间子]《植物研究》

功效 全草：消炎，止血，除湿。

#### 7238091

*Artemisia halodendron* Turcz. ex Bess. --- *A. intramongolica* H. C. Fu --- *Oligosporus halodendron* (Turcz. ex Bess.) Poljak.

植物名 盐蒿《高植图鉴》

药材名 盐蒿《汇编》

文献名 差把嘎蒿、沙漠嘎《沙漠药植》，差不嘎蒿《高植图鉴》

地方名 内蒙古：“普勒罕达”（奈曼旗蒙名），沙蒿，沙把嘎。

功效 嫩枝叶：止咳，祛痰，平喘，解表，祛湿。用于慢性气管炎，哮喘，感冒，斑疹伤寒，风湿关节炎。

#### 7238092

*Artemisia hedinii* Ostenf.

植物名 臭蒿《高植图鉴》

药材名 臭蒿《青藏药图》

地方名 青海：“桑子那保”(藏名)。

功效 地上部分：有小毒。清热凉血，退黄，消炎。用于胆囊炎，黄疸型肝炎。

#### 7238093

*Artemisia igniaria* Maxim.

植物名 歧茎艾(拟)

文献名 歧茎蒿《高植图鉴》

地方名 野艾、艾叶(东北、华北)。

功效 叶：散寒，止痛，止血。

#### 7238094

*Artemisia indica* Willd. --- *A. vulgaris* L. var. *indica* Maxim. --- *A. asiatica* Nakai ex Pamp. --- *A. longiflora* Pamp.

植物名 五月艾《植物研究》

药材名 艾叶《别录》、《台湾中药材图鉴》

文献名 艾、冰台、医草《别录》，宁州庵蒿《图经》，黄草、艾蒿《纲目》，半葶、炙草、吐里屏风《新纲》，炙蒿《满洲植录》，蒿、蓬、蒿萎《满蒙产药植》，病草《典籍便览》，艾蒿蓬《小泉药植》，小野艾《广西植录》，艾根《台湾中药材图鉴》，野艾蒿《沙漠药植》，印度蒿《秦岭植志》

地方名 大艾(广东、贵州)，野艾(上海、江苏、广东、广西)；台湾：艾头[根]；广东：火艾(广州)，鸡子艾(四会、广宁、封开)，山艾(饶平)，生艾叶、土艾(揭阳)，艾草(潮汕)，鸡仔艾(广宁、四会)，大叶艾草(河源)，小山艾；广西：[野菊叶]；四川：白艾；贵州：艾绒。

功效 叶：止血。用于吐血，衄血，直肠出血，子宫出血，腹痛，吐血闭经；根：用于头痛，头风。

#### 7238095

*Artemisia integrifolia* L. --- *A. vulgaris* L. var. *integrifolia* Ledeb. --- *A. komarovii* Poljak.

植物名 柳叶蒿《高植图鉴》

药材名 柳叶蒿《汇编》

文献名 九牛草《图经》

地方名 [艾](东北)；四川：“卜尔猛纳火”(藏名)；其他：单叶蒿。

功效 全草：清热解毒。用于痈疽，疮肿。

#### 7238096

*Artemisia japonica* Thunb.

植物名 牡蒿《高植图鉴》

药材名 牡蒿《别录》、《汇编》

文献名 蔚《诗经》，牡蒿《毛诗传》，齐头蒿《唐本草》，水辣菜《救荒本草》

地方名 [青蒿](上海、江苏、浙江、湖北、广西、四川)，嫩青蒿(东北、河北、江苏)，沙祖叶、沙竹叶(东北)，油蒿(浙江、陕西)，土柴胡、野塘蒿(广东、湖南、广西)，香青蒿(江苏、安徽)，布菜(广东、四川)；陕西：一朵云(宝鸡)；山东：米蒿(蒙山、莒县)，蒿子(沂水)，拔拉蒿(崂山)；江苏：牛尾蒿，白花蒿，熊掌草，青蒿草(无锡)，青蒿子(镇江、苏州)，香蒿(宜兴)；浙江：油蓬、奶疳药(兰溪)，花艾草，[六月雪]，老鸦青，马莲蒿，马根柴，鹅草药，铁洗帚(嵊县)，铁指甲；安徽：脱叶蒿；江

西：猴掌草，石艾(大余)；福建：臭艾，碗头青，油艾，傲菜头(松政)，茶西蓬，火烧草；湖南：脚板蒿，和尚菜(衡阳)，鸭脚板草，鸡脚痧，毛柴胡，野柴胡；广东：山芙蓉(新会、惠阳)，土前胡(翁源)，布艾，[银柴胡](南雄)，耗子药(始兴)，鸡肉菜(乳源)；广西：大青蒿，三托莲、五托莲(平南)，[柴胡](博白、北流)，追痧药(富川)，鸡锥啼(桂平)，山鸡锥(昭平)，草柴胡、白鸡肉菜(梧州)，假柴胡(宁明、崇左)，菊叶柴胡，假青蒿；四川：流尿蒿(峨眉)，“择拢洼”(藏名)，麦头草、七灯花、布菜子(南充)，铁菜子；云南：“二可依卡”(楚雄彝语)，铁蒿，壮蒿。

功效 全草：清热，凉血，解暑。用于感冒发热，中暑，疟疾，肺结核潮热，高血压病。外用于创伤出血，疔疖肿毒；根：用于风湿痹痛，寒湿浮肿。

#### 7238097

*Artemisia japonica* Thunb. var. *hainanensis* Y. R. Ling

植物名 海南牡蒿《植物研究》

功效 全草：清热，凉血，解暑。

#### 7238098

*Artemisia japonica* Thunb. f. *resedifolia* Takeda

植物名 木樨草牡蒿《中药大辞典》

文献名 齐头蒿《四川中药志》

地方名 四川：流尿蒿(峨眉山)，布菜子(成都)。

功效 全草：清热，凉血，解暑。

#### 7238099

*Artemisia keiskeana* Miq.

植物名 菴蒿《高植图鉴》

药材名 菴蒿子《本经》、《中药大辞典》

文献名 菴芦《本草经集注》，菴蒿草《千金翼方》，菴蒿蒿《广利方》，淹蒿《履巉岩本草》，菴蒿《救荒本草》，覆蒿《纲目》，狗乳花《名实图考》，臭蒿《药材资料汇编》

地方名 吉林：菴蒿。

功效 全草：行瘀，祛湿。用于妇女血瘀经闭，跌打损伤，风湿痹痛；种子：用于产后停瘀腹痛。

#### 7238100

*Artemisia lactiflora* Wall. ex DC. --- *A. lactiflora* Wall. ex DC. f. *septemlobata* Levl. Pamp. --- *A. septemlobata* Levl. et Van.

植物名 白苞蒿《高植图鉴》

药材名 鸭脚艾《生草药性备要》、《汇编》

文献名 菴蒿《本经》，秦州菴蒿《图经》，鸡鸭脚艾《纲目拾遗》，菊叶蒿《名实图考》，[落得打]《百草镜》，白花蒿《中药志》，甜蒿子《鉴别手册》，肺癆草《四川中药志》

地方名 鸭脚菜(广西、浙江)，[刘寄奴]、路寄拿(上海、浙江、广东、华南)，甜菜子、四季菜(广西、湖南、广东、广西)，红艾(广西、广东)，[珍珠菜](台湾、广东)；浙江：[大力王](杭州)，阴毒草(云和)，白鹤草(嘉兴)；福建：珍珠菊，土嫩菜；台湾：角菜；湖南：[土三七]；广东：五指艾(广州)，真珠花菜(潮汕)，真珠菜(潮汕)，珍珠花菜(汕头、潮安)，黄菊(遂溪)，假菊花(湛江)，甜子菜(乐昌)，野勒菜(惠阳)；广西：鸡甜菜(陆川)，甜艾，

[甜菜](平南、博白、北流),沙欧(贵县),紫欧(博白),蹲太(钟山),鸭脚风,红甜菜;四川:白花五棱草,五棱肺癆草;贵州:红姨妈菜。

功效 全草:理气,活血,调经,利湿,解毒,消肿。用于月经不调,闭经,慢性肝炎,肝硬化,肾炎水肿,白带,荨麻疹,腹胀,疝气、外用于跌打损伤,外伤出血,烧、烫伤,疮疡,湿疹。

## 7238101

*Artemisia lagocephala* Fisch. ex Bess. - *Absinthium lagocephalum* Fisch. ex Bess. --- *Artemisia kruhsiana* Bess. --- *A. besseriana* Ledeb. --- *Artemisia lagocephala* Fisch. var. *triloba*(Ledeb.) Herd.

植物名 白山蒿《东检》

药材名 白山蒿《东北药用植物》

地方名 黑龙江:石艾(黑河市)。

功效 叶:镇咳,祛痰,平喘,消炎,抗过敏。

## 7238102

*Artemisia lancea* Vant. --- *A. feddei* Levl. et Vant. --- *A. minutiflora* Nakai --- *A. lavandulaefolia* DC. var. *feddei* (Levl. et Vant.) Pamp. --- *A. lavandulaefolia* DC. var. *lancea*(Vant.) Pamp.

植物名 矮蒿《高植图鉴》

文献名 臭蚊艾《广西植录》,细叶艾、小花苦蒿、南野艾《广西药录》,细叶蒿《江苏植志》。

地方名 辽宁:牛尾巴蒿;陕西:短叶蒿;浙江:小叶艾;广西:[青蒿],艾(灵山)。

功效 叶、根:用于流行性感胃。

## 7238103

*Artemisia lavandulaefolia* DC. --- *A. vulgaris* L. var. *umbrosa* Bess. --- *A. umbrosa* (Bess.) Turcz. --- *A. selengensis* Turcz. ex Bess. var. *umbrosa* Ledeb.

植物名 野艾蒿《高植图鉴》

药材名 野艾《汇编》

文献名 苦蒿尖《滇南本草》,野艾蒿《救荒本草》,艾《满州植录》

地方名 山东:黄蒿蒿(滕县);江苏:水艾(新海连),白芷蒿(盱眙);浙江:野毛蒿(瑞安);广西:细叶艾,(祁艾)(陆川);云南:苦蒿。

功效 叶:散寒,止痛,止血,安胎。

## 7238104

*Artemisia leucophylla* (Turcz. ex Bess.) C. B. Clarke --- *A. vulgaris* L. f. *minor* Ledeb. --- *A. vulgaris* L. var. *leucophylla* Turcz. ex Bess. --- *A. mongolica* (Fisch. ex Bess.) Nakai var. *leucophylla* W. Wang et H. T. Ho ex H. C. Fu

植物名 白叶艾(拟)

文献名 白叶蒿《西藏植志》

地方名 艾叶、野艾(东北、华北)。

功效 叶:散寒,止痛,止血,安胎。

## 7238105

*Artemisia littoricola* Kitam. --- *Oligosporus littoricola* (Kitam.) Poljak.

植物名 滨海牡蒿《植物研究》

功效 全草:清热,凉血,解暑。

## 7238106

*Artemisia mairei* Levl. ex Fedde

植物名 小亮苞蒿《植物研究》

文献名 东川蒿《云南种录》,滇茵陈《汇编》

地方名 云南:[茵陈],[茵陈蒿]。

功效 全草:除湿热,散风解郁,发汗利尿。

## 7238107

*Artemisia manshurica* (Komar.) Komar. --- *A. japonica* Thunb. var. *manshurica* Kom.

植物名 东北牡蒿《植物研究》

功效 全草:清热,消炎,止血,杀虫。

## 7238108

*Artemisia mongolica* (Fisch. ex Bess.) Nakai --- *A. vulgaris* L. var. *mongolica* Fisch. ex Bess. --- *A. vulgaris* L. var. *tenuifolia* Turcz. ex DC.

植物名 蒙古艾《中药志》

药材名 艾叶(东北、华北、西北)

文献名 蒙古蒿《高植图鉴》

地方名 辽宁:狼尾蒿,水红蒿。

功效 叶:散寒,止痛,止血,安胎。

## 7238109

*Artemisia moorcroftiana* Wall. ex DC. --- *A. wallichiana* Bess.

植物名 小球花蒿《高植图鉴》

功效 叶:消炎,止血。

## 7238110

*Artemisia myriantha* Wall. ex Bess. --- *A. vulgaris* L. var. *myriantha* (Wall. ex Bess.) C. B. Clarke --- *A. yunnanensis* Levl. --- *A. burmanica* Pamp. --- *A. dolichocephala* Pamp.

植物名 多花蒿《植物研究》

功效 叶:外用于消炎。

## 7238111

*Artemisia ordosica* Kraschen.

植物名 黑沙蒿《高植图鉴》

药材名 黑沙蒿《内蒙古中草药》

文献名 黑沙蒿子、黑沙蒿根《内蒙古中草药》,鄂尔多斯蒿《沙漠药植》

地方名 内蒙古:油蒿,“哈拉-沙巴嘎”、“陶森-沙巴嘎”(蒙名)。

功效 茎叶及花蕾:祛风湿,清热,拔脓。用于风湿性关节炎,疮、疖痈肿,感冒头痛;种子:利尿;根:止血。用于鼻衄,吐血,功能性子宫出血。

## 7238112

*Artemisia orientali-hengduangensis* Ling et Y. R. Ling --- *A. roxburghiana* Bess. var. *orientalis* Pamp.

植物名 东方蒿《植物研究》

功效 叶:清热,解毒。用于消炎。

## 7238113

*Artemisia parviflora* Buch.-Ham. ex Roxb. --- *A. glabrata*

Wight -- *A. tongtchouanensis* Levl. --- *A. japonica* Thunb. var. *parviflora* (Buch.-Ham. ex Roxb.) Pamp.

植物名 小花牡蒿(云南种录)

药材名 滇青蒿(拟)

文献名 青蒿(滇南本草), 西南牡蒿(中药志), 小花蒿(广西药录)

地方名 贵州:野蒿。

功效 全株:下血,清热,止盗汗,杀虫。外用于疥疮,蜂毒。

#### 7238114

*Artemisia princeps* Pamp. --- *A. vulgaris* L. var. *indica* (Willd.) Maxim. f. *nipponica* Nakai --- *A. vulgaris* L. var. *maximowiczii* Nakai --- *A. parvula* Pamp.

植物名 魁蒿(高植图鉴)

药材名 魁艾(拟)

文献名 王侯蒿(广西药录)

地方名 五月艾(广西、江苏、云南);江苏:野蓬头(无锡),艾蒿(射阳);广西:黄花艾(阳朔),艾叶,端午艾。

功效 叶:理气血,逐寒湿,止血,温经,安胎。

#### 7238115

*Artemisia qinlingensis* Ling et Y. R. Ling

植物名 秦岭艾(拟)

文献名 秦岭蒿(植物研究)

地方名 野艾、艾叶(陕西、甘肃、河南)。

功效 叶:散寒,止痛,止血,安胎。

#### 7238116

*Artemisia roxburghiana* Bess. --- *A. hypoleuca* Edgew. --- *A. revoluta* Edgew. --- *A. eriocephala* Pamp. --- *A. indica* Willd. var. *exilis* Pamp.

植物名 灰苞艾(拟)

文献名 灰苞蒿(植物研究),小叶艾(广西植录)

地方名 艾叶、野艾(陕西、甘肃、青海、湖北、四川、贵州、云南);陕西:雪蒿(凤县);云南:“额哈哈拍”(元江哈尼语),土艾叶。

功效 叶:散寒,止痛,止血,安胎。

#### 7238117

*Artemisia rubripes* Nakai --- *A. vulgaris* L. var. *parviflora* Maxim. --- *A. nipponica* Pamp. var. *rubripes* Pamp. --- *A. mongolica* Nakai subsp. *parviflora* Kitag.

植物名 红足蒿(高植图鉴)

药材名 红足艾(拟)

文献名 小香艾(中国经植志)

地方名 艾叶(华北、华东)。

功效 叶:散寒,止痛,止血。

#### 7238118

*Artemisia rupestris* L. --- *A. dentata* Willd. --- *A. viridis* Willd. --- *A. viridifolia* Spreng.

植物名 岩蒿(汇编)

药材名 新疆一支蒿(汇编)

文献名 一枝蒿(纲目拾遗),一支蒿(民族药志)

功效 全草:清热解毒。用于胃痛,胃胀,痛经。外用于痔疮出血,无名肿毒,跌打损伤,毒蛇咬伤,荨麻

疹,神经性皮炎。

#### 7238119

*Artemisia sacrorum* Ledeb. --- *A. messerschmidtiana* Bess. var. *viridis* Bess. --- *A. sacrorum* Ledeb. var. *viridis* Garn. - *A. iwayomogi* Kitam. --- *A. gmelinii* auct. non Web. ex Stechm.

植物名 白莲蒿(植物研究)

药材名 白莲蒿(品种论述)

文献名 白蒿(本经),石山蒿(广西植录)

地方名 万年蒿(黑龙江、内蒙古、青海);黑龙江:〔茵陈蒿〕(宁安);内蒙古:阴蒿,“哈尔·沙瓦格”,“哈日·沙巴嘎”(蒙名);陕西:铁杆蒿(蓝田);山东:野艾蒿(莱芜),珍珠蒿(莱芜、章丘);广西:供蒿(兴安),蚊烟草(罗城);其他:里白岩蒿。

功效 全草:清热解暑,凉血止血。用于肝炎,阑尾炎,小儿惊风,阴虚潮热。外用于创伤出血。

备考 《高植图鉴》(四)将本品学名误订为 *Artemisia gmelinii* Web. ex Stechm.

#### 7238120

*Artemisia sacrorum* Ledeb. var. *incana* (Bess.) Y. R. Ling --- *A. messerschmidtiana* Bess. var. *incana* Bess. --- *A. sacrorum* Ledeb. ssp. *manshurica* Kitam. --- *A. gmelinii* Web. ex Stechm. var. *incana* (Bess.) H. C. Fu

植物名 灰莲蒿(植物研究)

功效 全草:清热解暑,凉血止血。

#### 7238121

*Artemisia sacrorum* Ledeb. var. *messerschmidtiana* (Bess.) Y. R. Ling --- *A. gmelinii* Web. ex Stechm. var. *messerschmidtiana* (Bess.) Poljak. --- *A. sacrorum* Ledeb. subsp. *laxiflora* (Nakai) Kitag. --- *A. sacrorum* Ledeb. subsp. *intermedia* (Ledeb.) Kitam.

植物名 密毛白莲蒿(植物研究)

功效 全草:清热解暑,凉血止血。

#### 7238122

*Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. --- *A. capillaris* Thunb. var. *scoparia* (Waldst. et Kit.) Pamp. --- *A. capillaris* Thunb. var. *acaulis* Pamp. --- *Oligosporus scoparius* (Walst. et Kit.) Less.

植物名 猪毛蒿(高植图鉴)

药材名 茵陈(本经)、《药典》

文献名 茵陈(本经),茵陈蒿(别录),因陈(吴普本草),石茵陈(日华子本草),山茵陈、绛州茵陈蒿、家茵陈(图经),绵茵陈(本经逢原),臭蒿子(指示植物),东北茵陈蒿(东北药志),扫帚艾(广西药录),扫帚艾蒿(秦岭植志),滨蒿(药典)

地方名 东北茵陈(内蒙古、吉林、辽宁),〔青蒿〕、黄蒿、狼尾蒿(东北),白头蒿(北京、山东),〔香蒿〕(吉林、辽宁),西茵陈(西北、湖北、陕西),小白茵(吉林、陕西、河北、山东);辽宁:五梨蒿,吱啦蒿;河北:臭蒿,蒿蒿头,蒲蒿;内蒙古:米米蒿,“阿荣”、“阿各弄”(蒙名);陕西:铁杆茵陈;甘肃:白蒿叶,白蒿头;青海:三月白蒿,“察尔汪”(藏名);山东:白蒿(沾化、无棣),婆婆蒿,勃

勃蒿：湖北：北茵陈(蕲州)；广西：绒蒿；其他：苣荬蒿。

功效 幼苗：清湿热，退黄疸。用于黄疸尿少，湿疮痒疹，传染性黄疸型肝炎。

备考 秋采者名茵陈蒿，药力更强。

#### 7238123

*Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. var. *heteromorpha* Kitag.

植物名 宽叶猪毛蒿(拟)

药材名 宽叶东北茵陈蒿《东北药植志》

地方名 茵陈、茵陈蒿(东北)。

功效 幼苗：清湿热，利胆退黄。用于黄疸病，驱虫。

#### 7238124

*Artemisia selengensis* Turcz. ex Bess. --- *A. selengensis* Turcz. ex Besser var. *cannabifolia* (Levl.) Pamp. --- *A. cannabifolia* Levl. --- *A. vulgaris* L. var. *selegensis* Maxim. --- *A. vulgaris* L. var. *vulgatissima* auct. non Bess.

植物名 萎蒿《食疗本草》、《高植图鉴》

药材名 红陈艾《汇编》

文献名 萎《诗经》，藜、藜蒿《尔雅》，白蒿(水生者)《本经》，[菴蒿]《名实图考》，高茎蒿《东北植药图志》，狭叶艾、芦蒿《中药大辞典》，红艾《品种论述》，柳叶蒿《植物研究》

地方名 水蒿(东北、江苏、云南)，野艾(上海、江苏、云南)；北京：白艾；甘肃：艾蒿，艾叶；江苏：蒿子，柳蒿，小蒿子，驴蒿，水艾(盱眙)，萎蒿子(东海)；台湾：生艾；四川：刘寄奴，野艾蒿；其他：白蒿子。

功效 全草：破血行瘀，下气通络。用于产后瘀血停积，小腹胀痛，跌打损伤，瘀血肿痛，因伤而大小便下血。

备考 《中药大辞典》萎蒿学名系误订。

#### 7238125

*Artemisia selengensis* Turcz. ex Bess. f. *subintegra* (Pamp.) Kitag. --- *A. selengensis* Turcz. f. *integerrima* (Kom.) Kitag.

植物名 全缘柳蒿(东检)

药材名 全缘柳蒿(东北药用植物)

功效 全草：破血行瘀，下气通络。用于产后瘀血停积，小腹胀痛，跌打损伤，瘀血肿痛，大小便下血。

#### 7238126

*Artemisia sieversiana* Ehrh. ex Willd. --- *A. koreana* Nakai --- *A. chrysolepis* Kitag. --- *A. sparsa* Kitag.

植物名 大籽蒿《高植图鉴》

药材名 大籽蒿《汇编》

文献名 白蒿《本经》，北京野菊花《祁州药志》，蓬蒿、艾汤蓬《满鲜植汇》，臭蒿子《汇编》

地方名 大头蒿(陕西、黑龙江、内蒙古)，大白蒿、(东北)，一枝蒿(华北)；辽宁：大白蒿子；内蒙古：“埃勒姆”、“察尔乌”(蒙名)；青海：“塔加”(藏名)；贵州：小艾叶，洋艾。

功效 花蕾：消炎止痛。用于痈肿疔毒，黄水疮，

皮肤湿疹，宫颈糜烂，太阳紫外线灼伤；全草：用于风寒湿痹，黄疸，热痢，疥癬恶疮。外用于消肿，止血，刀伤。

#### 7238127

*Artemisia sieversiana* Ehrh. ex Willd. f. *grandis* Pamp.

植物名 大花大籽蒿《高植图鉴》

地方名 贵州：大叶蒿，白蒿。

功效 全草：祛风除湿，理气散寒。用于寒湿脚气，黄疸，热痢，风寒湿痹，腹冷痛。

#### 7238128

*Artemisia simulens* Pamp.

植物名 中南艾(拟)

药材名 南艾《广西药录》

文献名 中南蒿《植物研究》

地方名 广西：艾叶(贵县)。

功效 叶：用于痛经，崩漏，胎动不安。

#### 7238129

*Artemisia sphaerocephala* Krasch. --- *A. salsoloides* Willd. var. *mongolica* Pamp. --- *Oligosporus sphaerocephalus* (Krasch.) Poljak.

植物名 白沙蒿《高植图鉴》

药材名 白沙蒿《沙漠药植》

文献名 圆头沙蒿(拉汉英种称)，圆头蒿《植物研究》，籽蒿《汇编》

地方名 内蒙古：“扑勒蒙”(乌审旗蒙名)，“沙拉-沙巴嘎”(蒙名)。

功效 果实：消炎散瘀，利气，杀虫。用于腮腺炎，扁桃腺炎，疮疖红肿，肠梗阻，腹胀。

#### 7238130

*Artemisia stolonifera* (Maxim.) Komar. --- *A. vulgaris* L. var. *stolonifera* Maxim. --- *A. vulgaris* L. var. *kusiana* Makino --- *A. integrifolia* L. var. *stolonifera* Pamp.

植物名 宽叶山蒿《高植图鉴》

药材名 山艾(拟)

地方名 野艾、艾叶(东北、华北、山东)。

功效 叶：理气血，逐寒湿，温经，止血。

#### 7238131

*Artemisia subdigitata* Mattf.

植物名 牛尾蒿《高植图鉴》

药材名 牛尾蒿《名实图考》、《民族药志》

文献名 野蒿《滇南本草》，茶绒《汇编》

地方名 青海：“普尔茫那保”(藏名)；四川：指叶蒿(峨眉山)，牛屎蒿；其他：苦蒿。

功效 全草：止咳，化痰，平喘。用于慢性支气管炎。

#### 7238132

*Artemisia sylvatica* Maxim.

植物名 阴地蒿《高植图鉴》

药材名 阴地艾(拟)

地方名 艾叶(东北、华北)；贵州：野蒿。

功效 叶：散寒，止痛，止血；全草：用于止痒。

#### 7238133

*Artemisia tainingensis* Hand. -Mazz.

植物名 川藏蒿《西藏植志》  
功效 地上部分(藏药);外用于数鼻出血。

## 7238134

*Artemisia tournefortiana* Reichb.

植物名 湿地蒿《高植图鉴》  
功效 全草:清热,解毒,止血。

## 7238135

*Artemisia verbenacea* (Komar.) Kitag. --- *A. vulgaris* L.  
var. *verbenacea* Komar. --- *A. mongolica* (Fisch. ex Bess.) Nakai var. *verbenacea* Pamp. --- *A. obscura* Pamp. var. *congesta* Pamp. --- *A. liaotungensis* Kitag.

植物名 辽东艾(拟)  
文献名 辽东蒿《东检》  
地方名 辽宁:艾叶,野艾。  
功效 叶:散寒,止痛,止血,安胎。

## 7238136

*Artemisia verlotorum* Lamotte

植物名 南艾(拟)  
药材名 南艾《广西药录》  
文献名 南艾蒿《植物研究》  
地方名 艾叶、野艾(华东、西南、华南)。  
功效 叶:散寒,止痛,止血,安胎。

## 7238137

*Artemisia vestita* Wall. ex DC. --- *A. laciniata* C. B. Clarke  
--- *A. potentillaefolia* Levl. --- *A. sacrorum* Ledeb. var.  
*vestita* (Wall. ex DC.) Kitag. --- *A. sacrorum* Ledeb.  
var. *minor* Ledeb. f. *wallichiana* Pamp.

植物名 毛蓬蒿《高植图鉴》  
药材名 毛蓬蒿《汇编》  
文献名 白背蚊艾《广西植志》,万年蓬《高植图鉴》,  
结血蒿《西藏中草》,万年蒿、铁杆蒿《西藏植志》  
地方名 内蒙古:“哈尔”、“砂瓦格”(藏名);广西:蚊  
子蒿(富川);云南:白茵陈,茵陈;西藏:“普尔那”(藏  
名)。

功效 茎、叶:清虚热,健胃,祛风止痒。用于温疫  
内热,四肢酸痛,骨蒸发热。

## 7238138

*Artemisia vulgaris* L. --- *A. samamisica* Bess. --- *A.*  
*superba* Pamp.

植物名 北艾《植分学报》  
药材名 艾叶《别录》  
文献名 白蒿《纲目》,藁、高蒿、艾蒿、艾子、野艾蒿、  
白蒿子、炙草《植物名汇》,艾根《新纲》  
地方名 甘肃:艾,苦艾子,野艾,火艾,蚊艾,山艾。  
功效 全草:温经止血,祛风止痒。用于衄血,吐  
血,子宫功能性出血,月经不调。

备考 本品原产欧洲,我国陕西(秦岭)、甘肃(西  
部)、青海、新疆、四川(西部)等省区也有分布。据《植  
物研究》8(4):25,1988称:“我国过去记载的‘艾蒿’*A.*  
*vulgaris* auct. non L.,实际是包括了艾蒿 *A. argyi* Leve.  
et Vant.,野艾蒿 *A. lavandulaefolia* DC.,南野艾 *A.*  
*verlotorum* Lamotte,蒙古蒿 *A. mongolica* (Fisch. ex

Bess.) Nakai,五月艾 *A. indica* Willd.,魁蒿 *A. princeps*  
Pamp及歧茎蒿 *A. igniaria* Maxim.等多种复合种的混  
称。”

## 7238139

*Artemisia wellbyi* Hemsl. et Pears.

植物名 藏沙蒿《西藏植志》  
功效 地上部分(藏药):用于消炎,内脏出血。

## 7238140

*Aster ageratoides* Turcz.

植物名 三脉马兰(拟)  
药材名 山白菊《贵州民间药物》  
文献名 野白菊、野白菊花《名实图考》,日马兰头  
《经济植物志》,山雪花、三脉叶马兰《中国植物图鉴》,  
三褶脉马兰、红管药《汇编》,三褶脉紫菀《中草药学》,  
三脉紫菀《中国植志》

地方名 马兰(江苏、江西、湖南、湖北、四川),(银柴  
胡)(广西、贵州);内蒙古:鸡儿肠、“拉白·其格洛”(蒙  
名);上海:[旋覆花];浙江:山马兰,消食花,常年青,白  
花千里光,八月霜,八月白,白马兰,刘寄奴(淳安);江  
西:换肺草(景德镇),牛嘴同(萍乡);福建:蟛蜞菊;河  
南:小野菊;湖南:田边菊、马兰丹、穿鱼草(衡阳),泥鳅  
草、泥鳅串、红马兰、田蓬菜、黄鳝草(溆浦),干鱼草、田  
辰草、兰菊花(黔阳),铁线蒿、鲫鱼草、黄鳝串(常德),  
黄花剑,小样急症草,田菊花;广西:白花土柴胡(桂  
平);四川:鱼鳅串(重庆),土银柴胡;贵州:小雪花,白  
升麻;云南:金柴胡。

功效 全草及根:清热解毒,止咳祛痰,利尿,止血。  
用于上呼吸道感染,支气管炎,扁桃体炎,腮腺炎,乳腺  
炎,肝炎,泌尿系感染。外用于痈疽肿毒,外伤出血。

备考 据《中国植志》74:160,1985载称:此种与  
*Aster trinervius* D. Don (三基脉紫菀)显然接近,主要以  
叶具显明的离基三出脉,基部渐狭,侧脉在渐狭部分以  
上发出等特征与后者区别。Grierson (1964)曾述及在  
喜马拉雅南部(阿萨密)有这两种的中间类型存在,将  
此种与上述三基脉紫菀合并作为后者的一个亚种,这  
是适宜的。由于此种种名在东亚沿用已久,且有大量的  
变种。为了避免引起混乱,仍保留为独立的种。

## 7238141

*Aster ageratoides* Turcz. var. *heterophyllus* Maxim.

植物名 异叶三脉马兰《中国植志》  
文献名 [紫菀]《陕甘宁植志》,异叶紫菀、红管药  
《药典》,西紫菀《药材学》,异叶三褶脉马兰《汇编》,  
异叶三褶脉紫菀《中草药学》,异叶山白菊《云南种录》,  
异叶三脉紫菀《中药志》

地方名 河北:玉米托子花;江西:山红管药。  
功效 全草:止咳,祛痰。用于慢性支气管炎。

## 7238142

*Aster ageratoides* Turcz. var. *lasiocladus* (Hayata )  
Hand. -Mazz. --- *Aster lasiocladus* Hayata

植物名 毛枝三脉马兰《中国植志》  
文献名 毛茎马兰、大鱼鳅串《汇编》,毛枝山白菊  
《云南种录》

地方名 [银柴胡](四川、贵州);广西:细叶六月雪(梧州);贵州:大柴胡, 马兰头(独山县), 青箭杆草(望漠)。

功效 全草:散风热,理气止痛,解毒。用于风热感冒,头痛,咳嗽,胸痛,周身疼痛。外用于蛇咬伤,烧、烫伤。

## 7238143

*Aster ageratoides* Turcz. var. *laticorymbus* (Vant.) Hand.-Mazz.

植物名 宽序三脉马兰(拟)

文献名 红管药、宽序紫菀《药典》,宽序三褶脉紫菀《中草药学》,宽序三脉紫菀《中药志》,宽伞山白菊《云南种录》

地方名 江西:山红管药。

功效 全草:止咳,祛痰。用于慢性支气管炎。

## 7238144

*Aster ageratoides* Turcz. var. *oophyllus* Ling --- *Aster ageratoides* Turcz. var. *ovatus* Hand.-Mazz.

植物名 卵叶三脉马兰(拟)

药材名 卵叶三白菊《广西药园药录》

文献名 卵叶三褶脉紫菀《秦岭植志》

地方名 浙江:山白菊;广西:喜草(平南);四川:“木米”(藏名)。

功效 全株:用于腰骨痛,感冒,蛇咬伤。

## 7238145

*Aster ageratoides* Turcz. var. *scaberulus* (Miq.) Ling

植物名 微糙三脉马兰(拟)

文献名 微糙叶紫菀《江西药录》,微糙山白菊《云南种录》

地方名 山白菊(广东、广西);江苏:马兰;湖南:野粉团儿。

功效 全草及根:清热解毒,止咳祛痰,利尿,止血。

## 7238146

*Aster alatis* Hemsl.

植物名 翼柄紫菀《中国植志》

地方名 湖北:伏花,九灵光,[柴胡],大柴胡,[红柴胡];贵州:(野菊花),山紫菀。

功效 全草:祛热,止渴,止汗,表寒。用于疮疡,活血。

## 7238147

*Aster albescent* (DC.) Hand.-Mazz.

植物名 小舌紫菀《中国植志》

文献名 白卷耳梢《峨眉药植资源》,白背紫菀《云南种录》

功效 全草:止咳化痰,平喘。

## 7238148

*Aster alpinus* L. --- *A. pulchellus* Willd.

植物名 高山紫菀《中国植志》

地方名 四川:“姜母起洼”(若尔盖藏名)。

功效 全草:清热解毒,平肝明目,风热头痛,结膜发炎;花:用于头面风热;茎、叶:用于清热抗菌。

## 7238149

*Aster asteroides* (DC.) O. Ktze.

植物名 星舌紫菀《中国植志》

药材名 块根紫菀《青藏药图》

地方名 青海:“漏庆”(藏名)。

功效 花:清热,解毒。用于流行性感冒,发烧,食物中毒等。

## 7238150

*Aster auriculatus* Franch.

植物名 耳叶紫菀《中国植志》

药材名 蕤衣莲《汇编》

文献名 耳状紫菀《广西植录》

地方名 贵州:毛叶子,散药;云南:银钱菊。

功效 根:祛风散寒,止咳平喘。用于感冒,哮喘,肺结核咳嗽,慢性支气管炎。

## 7238151

*Aster batangensis* Bur. et Franch. var. *sticticifolius* (Franch.) Ling --- *A. sticticifolius* Franch.

植物名 匙叶巴塘紫菀《云南种录》

药材名 打毒根(云南)

地方名 云南:[万年青](丽江)。

功效 根:用于解毒。

## 7238152

*Aster batangensis* Bur. et Franch.

植物名 巴塘紫菀《中国植志》

药材名 巴塘紫菀《迪庆藏药》

地方名 云南:[万年青](丽江)。

功效 花:清热解毒,止痛。用于炭疽病,疔疮,肿毒,各种疼痛。

## 7238153

*Aster diplostaphioides* (DC.) C. B. Clarke

植物名 重冠紫菀《中国植志》

药材名 寒风参《云南药录》

地方名 青海:“罗米”(藏名);云南:风耳草,太阳花(丽江)。

功效 根:用于妇科病;花:退烧,解毒。用于头痛,眼痛。

备考 在西藏地区,混作紫菀入药。

## 7238154

*Aster farreri* W. W. Sm. et J. F. Jeffr.

植物名 狭苞紫菀《中国植志》

文献名 线叶紫菀《青藏药图》

地方名 青海:“漏庆”(藏名)。

功效 花:清热,解毒。用于流行性感冒,发烧,食物中毒等。

## 7238155

*Aster flaccidus* Bunge

植物名 萎软紫菀《中国植志》

药材名 太白菊《陕西中草药》

文献名 柔软紫菀《青藏药图》,紫菀千花《汇编》

地方名 陕西:[肺经草](眉县);青海:“漏庆”(藏名)。



**功 效** 全草:清热解毒,止咳,明目。用于肺癰,肺炎,肺结核,百日咳,目疾。

**备 考** 在西藏地区也作紫菀入药。

#### 7238156

*Aster flaccidus* Bunge f. *griseobarbatus* Griens.

**植物名** 灰毛柔软紫菀《云南种录》

**药材名** 藏紫菀花《迪庆藏药》

**功 效** 花:清热解毒,解痉,干脓血。用于温疫病,邪热,痉率,中毒病,癰,疮。

#### 7238157

*Aster himalaicus* C. B. Clarke --- *A. mekongensis* Onno

**植物名** 须弥紫菀《中国植志》

**药材名** 须弥紫菀《迪庆藏药》

**文献名** 喜马拉雅山紫菀《高植图鉴》

**功 效** 花:清热。用于温病,时疫。

#### 7238158

*Aster jeffreyanus* Diels

**植物名** 滇西北紫菀《中国植志》

**药材名** 藏紫菀花《迪庆藏药》

**地方名** 云南:灯笼花(中甸)。

**功 效** 花:清热解毒,解痉,干脓血。用于温疫病,邪热,痉率,中毒病,癰,疮。

#### 7238159

*Aster oreophilus* Franch.

**植物名** 石生紫菀《中国植志》

**药材名** 野冬菊《云南药录》

**地方名** 云南:菊花暗消,肋痛草(丽江)。

**功 效** 花:清热消炎。用于牙痛,喉痛,眼痛,口腔炎。

#### 7238160

*Aster panduratus* Nees ex Walper --- *A. fordii* Hemsl.

**植物名** 琴叶紫菀《中国植志》

**药材名** 岗边菊《汇编》

**文献名** 福氏紫菀《广州植志》,萎蕤紫菀《江苏植志》

**地方名** 江西:铁锯利;广东:大风草,死娼花、泥鳅菜、[散血草]、[黄鳝草]、鸟丹草(始兴)。

**功 效** 全草:温中散寒,止咳,止痛。用于肺寒咳嗽,慢性胃痛。

#### 7238161

*Aster poliothamnus* Diels

**植物名** 灰枝紫菀《中国植志》

**文献名** 灰木紫菀《青藏药图》

**地方名** 青海:“漏穷”(藏名)。

**功 效** 花:退烧,解毒。用于流行性感胃,发烧,食物中毒等症。

#### 7238162

*Aster prainii* (Drumm.) Y. L. Chen --- *Aster gossypiphorus* Ling

**植物名** 厚棉紫菀《中国植志》

**文献名** 棉毛紫菀《青藏药图》

**地方名** 青海:“江松美多”(藏名);西藏:“昌拉博

笃”(藏名)。

**功 效** 全草:消炎止痛。用于各种炎症。

#### 7238163

*Aster salwinensis* Onno

**植物名** 怒江紫菀《中国植志》

**药材名** 小紫菀花《迪庆藏药》

**功 效** 花:清热解毒。用于瘟病时疫,“木保”病,脉热,流感。

#### 7238164

*Aster sampsonii* (Hance) Hemsl.

**植物名** 短舌紫菀《中国植志》

**文献名** 桑氏紫菀《广州植志》,黑根紫菀《汇编》

**地方名** 贵州:小儿还魂草。

**功 效** 根:理气活血,消积,止汗。用于小儿疳积,气虚自汗,月经不调。

#### 7238165

*Aster sampsonii* (Hance) Hemsl. var. *isochaetus* Chang

**植物名** 等毛短舌紫菀(拟)

**地方名** 广西:接骨草(宁明)。

**功 效** 全草:外用于骨折。

#### 7238166

*Aster smithianus* Hand. -Mazz. --- *Kalimeris smithiana* (Hand. -Mazz.) S. Y. Hu

**植物名** 甘川紫菀《中国植志》

**药材名** 甘川紫菀《迪庆藏药》

**功 效** 带花枝叶:清热解毒,疗疮,愈伤,接骨。用于肝胆诸热,热毒,外伤,骨折。对疮痍,创伤效果尤佳。

#### 7238167

*Aster souliei* Franch.

**植物名** 缘毛紫菀《中国植志》

**文献名** 西藏紫菀《汇编》

**地方名** 青海:“罗米”(藏名);西藏:“阿恣”(藏名),紫菀。

**功 效** 根茎:温肺,下气,祛痰,止咳。用于风寒咳嗽气喘,虚癆咳吐血,喉痹,小便不利;花:清热解毒。用于头痛,眼痛。

#### 7238168

*Aster sphaerotus* Ling --- *Erigeron panduratus* Chang

**植物名** 圆耳紫菀《中国植志》

**药材名** 圆耳紫菀《广西药录》

**功 效** 全草:用于胃脘痛,肺寒喘咳。

#### 7238169

*Aster striatus* Champ. ex Benth.

**植物名** 接骨紫菀《汇编》

**文献名** 线纹紫菀《广西药园药录》

**地方名** 广西:接骨草。

**功 效** 全草:活血散瘀,消肿止痛。用于跌打损伤,骨折,风湿痹痛。

#### 7238170

*Aster subulatus* Michx.

**植物名** 钻叶紫菀《中国植志》

药材名 瑞连草《汇编》  
文献名 钻形紫菀《湖南药物志》  
地方名 湖南：白菊花，上柴胡，九龙箭。  
功效 全草：清热解毒。用于湿疹，肿毒。

## 7238171

*Aster tataricus* L.f.

植物名 紫菀《中国植志》  
药材名 紫菀《本经》、《药典》  
文献名 青菀《吴普本草》，紫菀《别录》，返魂草根、夜牵牛《斗门方》，紫菀草《本草述》，白菀、茈菀、紫旧、万金茸、白羊须草、紫情《新纲》，软紫菀、紫苑《汇编》  
地方名 山白菜、驴耳朵菜（东北），小瓣（吉林、河北）；吉林：夹根菜；河北：返魂草，小瓣儿，青牛舌头花；内蒙古：“呼荣、温都苏”（蒙名）；湖北：红泥鳅串；其他：瓣紫菀，夜牛萼，驴夹板菜。

功效 根及根茎：润肺下气，祛痰止咳。用于痰多喘咳，新久咳嗽，癆嗽咳血。

## 7238172

*Aster techinensis* Ling

植物名 德钦紫菀《中国植志》  
药材名 藏紫菀花《迪庆藏药》  
功效 花：清热解毒，解痉，干脓血。用于瘟疫病，邪热，痉挛，中毒病，癰，疮。

## 7238173

*Aster trinervius* D. Don --- *Aster ageratoides* Turcz. ssp. *trinervius* Griens.

植物名 三基脉马兰（拟）  
药材名 山白菊《云南药录》  
文献名 三脉叶马兰《安徽中草药》，三脉山白菊《广西药录》，三基脉紫菀《中国植志》  
地方名 六月雪（广西、云南）；安徽：山马兰头；广西：一支箭、土田七（贵县），白花草、涩杏草（博白），野白菊（陆川），饭时草（平南），〔银柴胡〕（北流），白花土柴胡（桂平）；云南：白升麻，金柴胡，红升麻。

功效 全株：止血，清热，祛风，健胃，化痰。用于跌打损伤，蛇咬伤，白痢。

## 7238174

*Aster turbinatus* S. Moore

植物名 陀螺紫菀《中国植志》  
药材名 陀螺紫菀《汇编》  
文献名 一枝香《高植图鉴》，单头紫菀《浙江药植志》，牛舌草、打风草、野白菊《中药大辞典》  
地方名 浙江：喉风草（德清），虎头马兰（杭州），牛口舌（温州），百条根；其他：猫舌草。  
功效 根、全草：清热解毒，健脾，止痢。用于感冒，急性乳腺炎，急性扁桃体炎，小儿疳积，消化不良，痢疾。

## 7238175

*Aster turbinatus* S. Moore var. *chekiangensis* C. Ling

植物名 仙白草《中国植志》  
药材名 仙百草《浙南本草新编》  
功效 根：消肿止痛，解蛇毒。用于毒蛇咬伤。

## 7238176

*Aster vestitus* Franch. --- *Aster mairei* Levl. --- *Aster sherriffianus* Hand. -Mazz.

植物名 密毛紫菀《中国植志》  
药材名 菊花暗消《云南中草药》  
地方名 云南：胃药、白花暗消、马氏紫菀（红河）。  
功效 根：行气止痛，祛风除湿。用于胃痛，胃及十二指肠溃疡，感冒，风寒疼痛。

## 7238177

*Aster yunnanensis* Franch.

植物名 云南紫菀《中国植志》  
药材名 大紫菀花《迪庆藏药》  
功效 花：清热解毒，敛脓血。用于流行性感胃，发烧，食物中毒，疮疖。

## 7238178

*Atractylodes carlinoides* (Hand. -Mazz.) Kitam.

植物名 鄂西苍术《高植图鉴》  
药材名 鄂西苍术《沈药学报》  
功效 根茎：抗菌消炎。

## 7238178a

*Atractylodes coreana* (Nakai) Kitam.

植物名 朝鲜苍术《中国植志》  
药材名 朝鲜苍术《品种论述》  
地方名 辽宁：苍术。  
功效 根茎：健脾燥湿，祛风辟秽。

## 7238179

*Atractylodes japonica* Koidz. ex Kitam. --- *Atractylis japonica* (Koidz.) Kitag.

植物名 关苍术《高植图鉴》  
药材名 关苍术《品种论述》  
文献名 东苍术《中药大辞典》，异叶苍术《东北植药图志》，和苍术《高植图鉴》  
地方名 苍术、明叶菜、关东苍术、枪头茶（东北）；其他：三叶苍术。

功效 根茎：健脾燥湿，祛风辟秽。

备考 本种在日本作白术使用。

## 7238180 见 7238178a

## 7238181

*Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. --- *Atractylis lancea* Thunb.

植物名 茅苍术《药典》  
药材名 苍术《本草衍义》、《药典》  
文献名 术、山蓟《本经》，山连、山芥、〔山姜〕、天蓟《吴普本草》，山精《抱朴子》，赤术《本草经集注》，青术《张袞《水南翰记》》，仙术《纲目》，天精、地葵《新纲》，南苍术《中国药植志》，山刺叶《药材学》，山苍术《药学报》  
地方名 碧苏术、南京术、昌竹（华东）；江苏：茅术，大苍术，茅山苍术（镇江、无锡），汉苍术（苏州）；上海：穹窿术；湖北：霜苍术，武汉苍术。

功效 根茎：燥湿健脾，祛风，散寒，明目。用于脱腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿痹，风湿痹痛，风寒感冒，雀

目夜盲。

### 7238182

*Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. var. *chinensis* (Bunge) Kitam. --- *A. chinensis* (Bunge) Koidz. --- *Atractylis chinensis* (Bunge) DC.

植物名 北苍术《秦岭植志》

药材名 苍术《药典》

地方名 枪头菜(东北、西北、内蒙古), 山刺儿菜(河北、陕西、宁夏、青海), 山苍术(陕西、宁夏、甘肃、青海), 华苍术(辽宁、宁夏); 河北: 津苍术; 内蒙古: “呼和-呼吉”(蒙名); 山东: 大芥芥菜(昆崙山), 大七七菜(烟台), 山薊根; 其他: 苍术芽。

功效 根: 燥湿健脾, 祛风, 散寒, 明目。用于脘腹胀满, 泄泻, 水肿, 脚气痿痹, 风湿痹痛, 风寒感冒, 雀目夜盲。

### 7238183

*Atractylodes macrocephala* Koidz. --- *Atractylis macrocephala* (Koidz.) Hand.-Mazz.

植物名 白术《高植图鉴》

药材名 白术《本草经集注》、《药典》

文献名 杨枹蓯《尔雅》, 术、山薊《本经》, 山芥、山姜、天薊、山连《吴普本草》, 术苗《本草经集注》, 乞力伽《日华子本草》, 山精《神药精》, 浙术、云头术、歙术、狗头术《本草蒙筌》, 吴术、马薊、削术、片术《纲目》, 於术《杭州府志》, 冬白术《得配本草》, 枹蓯、杨枹、白大寿、沙邑、条根《新纲》, 杭术、飞子术、金钱吊葫芦、金钱术、仙居术、於潜术、鹤形野术、冬术、江西术、江西白术、江西子、徽术、种术、烘术、广术、扣子术《药材学》, 土白术《药典》

地方名 鸡冠术(东北); 浙江: 於潜白术, 家种白术, 壶瓶术, 田鸡术, 花术, 长形术, 台术(天台), 浙江白术, 带叶术; 安徽: 徽州术, 祁门术; 湖南: 平江术, 天生术, 平术; 四川: 贡术; 其他: 狮子术, 鸡腿术。

功效 根茎: 健脾益气, 燥湿利水, 止汗, 安胎。用于脾虚食少, 腹胀泄泻, 痰饮眩悸, 水肿, 自汗, 胎动不安; 土白术: 健脾, 和胃, 安胎。用于脾虚食少, 泄泻便溏, 胎动不安。

备考 日本文献多以 *A. ovata* Thunb. 为本品之学名。

### 7238184

*Aucklandia costus* Falc. --- *A. lappa* Decne. --- *Saussurea lapa* C. B. Clarke

植物名 云本香《原色中国本草图鉴》

药材名 木香《本经》、《品种论述》

文献名 密香《别录》, 青木香《本草经集注》, 五香《三洞珠囊》, 五木香《乐府诗集》, 南木香《世医得效方》, 广木香《普济方》, 矩瑟佗香《金光明经》, 五香一根草、大通绿、木香神《新纲》, 唐木香《中国北部之药草》, 老木香、新木香、印木香《药材学》

地方名 河北: 印度木香(天津); 云南: “板荒”(西双版纳傣语); 其他: 乞罗突安, 车乘童子, 千秋, 千年, 长生, 生木香, 番木香。

功效 干燥根: 行气止痛, 健脾消食。用于胸腹胀痛, 泻痢后重, 食积不消, 不思饮食; 煨木香: 实肠止泻。用于泄泻腹痛。

### 7238185

*Bidens bipinnata* L.

植物名 婆婆针《中国植志》

药材名 鬼针草《本草拾遗》、《汇编》

文献名 鬼针草《本草拾遗》, 石见穿、铁笔帚《纲目拾遗》, 大黄花《科裁》, 刺针草《汇编》

地方名 粘身草(内蒙古、河北、四川), 一包针、索人衣(江西、安徽), 跟人走(安徽、江西、福建), 小鬼针(安徽、江苏); 北京: [稀荇草], 金镖, 虾草, 小叶稀荇草, 北山稀荇草; 山东: 锅叉(烟台); 江苏: 鬼骨针、止血草(苏州), 鬼葛草(邳县), 粘花衣草, 脱力草; 上海: 家脱力草; 浙江: 引线包, 针包草, 一把针, 竭力草, 刺儿鬼、鬼葵蓼(杭州), 针线包; 安徽: 摘不净; 江西: 叉子草(德兴); 福建: 鬼黄花, 山东老鸦草, 盲肠草, 跳虱草, 粘花衣、鬼菊、播钻草、老鸦草、山虱母、粘衣草、咸丰草(闽东), 金丝苦令, 针刺草, 烛台草, 内月红, 小儿参, 黄花老鸦草, 旗檀草, 鬼针, 鬼针, 家蚤刺, 大头锁, 乌藤菜、清胃草、鬼兰草(泉州); 台湾: 铁钓竿, 山苦楝, 山苦苓; 湖南: 饿蚂蟥, 攀倒甌, 鸡婆针, 斑头甌; 四川: 豆渣菜(峨眉山), 豆渣; 贵州: 锥叉菜, 毛锥子草; 其他: 钢叉草, 叉婆子。

功效 全草: 清热解毒, 祛风活血。用于上呼吸道感染, 咽喉肿痛, 急性阑尾炎, 急性黄疸型肝炎, 胃肠炎, 消化不良, 风湿关节疼痛, 疟疾。外用于疮疖, 毒蛇咬伤, 跌打肿痛。

### 7238186

*Bidens biternata* (Lour.) Merr. et Sherff

植物名 金盏银盘《中国植志》

药材名 金盏银盘《广东中药》

文献名 铁笔帚、千条线《纲目拾遗》, 一包针、盲肠草、粘身草、虾钳草《简明中医辞典》

地方名 广东: 复三叶鬼针草(鼎湖山); 四川: 婆婆针(峨眉山)。

功效 全草: 疏表清热, 解毒散瘀。用于流感, 乙脑, 咽喉肿痛, 肠炎, 痢疾, 黄疸, 肠痈, 小儿惊风, 疳积, 疮疡疥痔。

### 7238187

*Bidens cernua* L.

植物名 柳叶鬼针草《中国植志》

药材名 柳叶鬼针草《甘肃中草》

功效 全草: 清热解毒, 祛风活血。

### 7238188

*Bidens frondosa* L.

植物名 大狼把草《拉汉英种称》

药材名 大狼把草《汇编》

文献名 大狼把草《中国植志》

地方名 上海: 狼把草, 接力草, 针线包, 一包针, 外国脱力草, [仙鹤草]。

功效 全草: 清利湿热。

## 7238189

*Bidens parviflora* Willd.

植物名 小花鬼针草《中国植志》

药材名 小花鬼针草《汇编》

文献名 细叶刺针草、小花刺针草《汇编》，细叶鬼针草《鉴别手册》

地方名 桐花菜、锅叉草、后老婆针、小鬼叉、小刺叉、一包针(东北)，鬼针草(东北、江苏、广西)；黑龙江：鬼叉子；内蒙古：“哈日卜嘎其-乌布斯”(蒙名)；江苏：小鬼叉子，鬼针菜；河南：鬼疙草，鬼疙针。

功效 全草：清热解毒，活血散瘀。用于感冒发热，咽喉肿痛，肠炎，阑尾炎，痔疮，跌打损伤，冻疮，毒蛇咬伤。

## 7238190

*Bidens pilosa* L.

植物名 鬼针草《本草拾遗》、《中国植志》

药材名 三叶鬼针草《中药大辞典》

文献名 黄花雾《生草药性备要》，鬼针《植物名汇》，黄花母、虾钳草、金杯银盏《岭南采药录》，刺针草、三叶刺针草《汇编》，细毛鬼针草《陕西中草药》

地方名 一包针(广东、广西、江苏、浙江、福建、云南)，盲肠草(广东、广西、福建)，粘身草、鬼菊(广东、福建)，蟹钳草(广东、广西、湖南)，引线包(江苏、浙江)，豆渣草、豆渣菜(四川、陕西)，鬼黄花(福建、广西)，金盏银盆(广西、云南)，[血见愁](陕西、广西)；陕西：豆青菜，狗札(周至)；浙江：一把针，狗屎粘(嵊县)；福建：金丝苦令，草鞋坪；湖南：四叉草，哑婆针(衡山)；广东：玉盏载银杯，婆婆针，感冒草，金盏银盆，金盘银盏，石兰(阳江、高州、茂名)，玉盏载金杯、空针草(广州)，黄花猛、猛兜头、虱仔、伤寒草、阿婆针、箭猛(新会)，方骨苦楝、四方骨苦楝、四方枝苦楝(潮汕)，方枝苦耐(惠来)，虾尾草(潮安、普宁)，三叶兰(普宁)，老蟹夹(兴宁、五华)，亥户朗，山虾钳(郁南)；广西：黄花草，黄花丹，针人草(忻城)，红背艾(北流)，三叉枪，鸡脚风、假甜菜(北海)，乌藤菜，山东老鸭菜，鸟雀根，老鸭菜，对丫草(乐业)，鸡脚草(百色)，鬼谷针(临群)，三叶婆婆针，路边针；云南：鬼针刺(昆明)，剪子草，叉叉菜，对叉草，粘连子，粘人草，“牙景布”(西双版纳傣语)，“牙金甫”(傣语)。

功效 全草：疏表清热，解毒散瘀。用于流感，乙脑，咽喉肿痛，肠炎，痢疾，黄疸，肠痢，小儿惊风，疳积，疮疡疥痔。

## 7238191

*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.-Bip. --- *B. pilosa* var. *minor* (Blume) Sherff.

植物名 白花鬼针草《中国植志》

药材名 咸丰草《台湾中药材图鉴》

文献名 金杯银盏《岭南采药录》，小三叶刺针草《汇编》，盲肠草《西藏中草》

地方名 鬼针草(台湾、西藏)；台湾：同治草，差查某仔，婆婆针，符因头；广东：金盏银盆。

功效 全草：解热，利尿，消炎。用于慢性阑尾炎，

肾炎，痢疾。

## 7238192

*Bidens sulphurea* (Cav.) Sch.-Bip. --- *Cosmos sulphureus* Cav.

植物名 硫黄菊《云南种录》

药材名 硫黄菊《广西药园药录》

地方名 广西：黄波斯菊。

功效 全草：清热解毒。用于痢疾。

## 7238193

*Bidens tripartita* L.

植物名 狼把草《高植图鉴》

药材名 狼把草《本草拾遗》、《汇编》

文献名 耬、乌阶《尔雅》，乌把(《尔雅》郭璞注)，郎耶草《本草拾遗》，附草、虱草《新纲》，狼把草、夜叉头《中国植志》

地方名 针包草、引线包(内蒙古、浙江)，一包针(上海、安徽、湖南)，小鬼叉、鬼叉(东北)；北京：[稀荇草]；内蒙古：“哈嘎日亥-哈日卜嘎其”(蒙名)；陕西：鬼刺，鬼针；青海：“切才曼巴”(藏名)；上海：大狼把草，接力草，针线包；安徽：大鬼针草，狼尾裸，狗布针；福建：田边菊(福鼎)；湖南：叉子草，鬼针草，老蟹叉，野阿婆针；广西：金盏银盆(贺县)；四川：豆渣草，山豆渣菜，豆渣苗，豆昌苗。

功效 全草：清利湿热。用于咽喉疼痛，肠炎，痢疾，尿路感染。外用于疖肿，皮癣。

## 7238194

*Biainvillaea acmella* (L.) Phillipson --- *B. latifolia* (L. f.) DC.

植物名 异芒菊《高植图鉴》

药材名 鱼鳞菜《广西药录》

文献名 假麦莱草《高植图鉴》，百能威《中国植志》

功效 全草：用于肺结核咯血，感冒。外用于扭伤。

## 7238195

*Blumea aromatica* DC.

植物名 馥芳艾纳香《中国植志》

药材名 山风《汇编》

文献名 艾纳《中草药通讯》

地方名 广西：香艾纳，香艾；云南：黄药，“罕苦娜”(彝名)。

功效 全草：祛风消肿，活血止痒。用于风湿性关节炎，湿疹，皮肤瘙痒。外伤止血。

## 7238196

*Blumea balsamifera* (L.) DC. --- *Congza balsamifera* L.

植物名 艾纳香《中国植志》

药材名 艾纳香《开宝本草》、《简明中医辞典》

文献名 大风艾、牛耳艾、大风叶、紫再枫《生草药性备要》，再风艾《岭南采药录》，龙脑(小泉《药植》)，白手龙脑《新纲》，艾脑香《现代实用中药》，艾片《增订伪药条辨》，艾粉、结片《药材资料汇编》，龙脑冰片《中药志》，冰片《汇编》

地方名 枝片、家风叶、冰片叶(华南)，大艾(海南、

福建), 家风艾(广西、贵州); 台湾: 大枫草, 大丁黄, 三  
 棱草, 盖手香, 大方草; 广东: 牛大艾(徐闻、海康、廉江、  
 遂溪、五华), 山大艾(罗定), 大山艾(翁源); 海南: 冰片  
 艾(保亭), 打蛇艾、打蚊艾(澄迈), 鹤老麻, 大青草; 广  
 西: 大骨风(南宁), 山枫, 枚电, 大枫艾; 四川: 艾粉树  
 (重庆); 贵州: 大毛药, 大毛香, 九女药, 羊九儿, 八里  
 香, 乌骨鸡(贵阳), 硬巴棒(锦屏、剑河); 云南: “娜登”  
 (傣语), 真金草, 真荆, 冰片草(思茅), 金针叶, 车里; 其  
 他: 艾纳香根。

**功效** 根、嫩枝、叶: 祛风消肿, 活血散瘀。用于感  
 冒, 风湿性关节炎, 产后风痛, 痛经。外用于跌打损伤,  
 疮疖痈肿, 湿疹, 皮炎; 艾片(叶加工品): 去恶气, 辟瘟  
 疫, 杀虫疗癣。用于中暑, 霍乱。

## 7238197

*Blumea clarkei* Hook. f. --- *Blumea hongkongensis* Levl. et  
 Van.

植物名 七里明《中国植志》

药材名 七里明《广西药录》

文献名 东风草《高植图鉴》

**功效** 全草: 用于肠炎腹泻。外用于蛇虫咬伤。

## 7238198

*Blumea densiflora* DC.

植物名 密花艾纳香《中国植志》

药材名 密花艾纳香《云南中草药》

地方名 云南: 大黑蒿(保山), 大升麻(滇南), “歪  
 那”(傣名)。

**功效** 全草: 清热凉血, 截疟。用于疟疾, 高血压,  
 肠炎, 感冒发烧。

## 7238199

*Blumea fistulosa* (Roxb.) Kurz --- *B. glomerata* (Wall.)  
 DC.

植物名 节节红《中国植志》

药材名 节节红《广西药录》

文献名 聚花艾纳香《高植图鉴》

地方名 广西: 草骨黄(田林)。

**功效** 全株: 强壮。用于身体虚弱。

## 7238200

*Blumea formosana* Kitam.

植物名 台北艾纳香《中国植志》

文献名 台湾艾纳香《浙南本草新编》

**功效** 全草: 清热解毒, 利尿消肿。

## 7238201

*Blumea hieracifolia* (D. Don) DC.

植物名 毛毡草《中国植志》

药材名 毛毡草《浙南本草新编》

文献名 臭毛毡草《汇编》

地方名 海南: 地菊(儋县), 坡艾草(临高); 广西: 锯  
 齿草(南宁), 臭草。

**功效** 全草: 清热解毒。用于肠炎腹泻, 毒蛇咬  
 伤, 肿痒疼痛。

## 7238202

*Blumea lacera* (Burm. f.) DC. --- *Conyza lacera* Burm.

f. --- *Blumea subcapitata* DC. --- *Blumea bodinieri* Van.

植物名 见霜黄《中国植志》

药材名 红头草《云南中草药》

地方名 台湾: 山白菜, 生毛将军; 广东: 黄花地胆头  
 (惠阳); 广西: 甲冬仗(龙州); 云南: 红根草, 白毛倒提  
 壶(玉溪)。

**功效** 全草: 清热解毒, 消肿止痛。用于扁桃  
 炎, 口腔炎, 牙龈脓肿, 流行性腮腺炎, 小儿肺炎, 痈疮  
 肿毒, 皮肤瘙痒。

## 7238203

*Blumea laciniata* (Roxb.) DC. --- *Conyza laciniata*  
 Roxb. --- *Blumea glandulosa* Benth. --- *Blumea*  
*membranacea* Hayata

植物名 六耳铃《中国植志》

药材名 走马风《汇编》

文献名 六耳草《植分学报》, 波缘艾纳香《广西本草  
 选编》

地方名 福建: 金线菊、喉菊(泉州); 广东: 牛耳三  
 稔, 羊耳三稔, 飞山虎, 六耳苓; 广西: 水马胎, 赶风茜,  
 吊钟黄, 牛耳草。

**功效** 全草、叶: 祛风除湿, 通经活络。用于风湿  
 骨痛, 跌打肿痛, 湿疹, 毒蛇咬伤。

## 7238204

*Blumea lanceolaria* (Roxb.) Druce --- *Blumea*  
*myriocephala* DC.

植物名 千头艾纳香《中国植志》

药材名 火油草《汇编》

文献名 大叶艾纳香《海南植志》

地方名 台湾: 双合剑叶草, 双马胎, [走马胎]; 广  
 西: 走马风。

**功效** 叶: 祛风湿, 消肿止痛。用于风湿骨痛, 产  
 后关节痛, 跌打肿痛。

## 7238205

*Blumea martiniana* Van.

植物名 裂苞艾纳香《中国植志》

文献名 马丁艾纳香《广西药录》, 大叶艾纳香《高植  
 图鉴》

地方名 广西: [走马胎](都安)。

**功效** 全草: 用于风湿骨痛。

## 7238206

*Blumea megacephala* (Randeria) Chang et Tseng ---  
*Blumea riparia* (Blume) DC. var. *megacephala* Randeria  
 --- *B. pubigera* (L.) Merr.

植物名 东风草《中国植志》

药材名 大头艾纳香《汇编》

文献名 华艾纳香《广西药录》, 中华艾纳香《广西植  
 录》

地方名 广东: 黄帽顶(乐昌), 无毛大艾; 广西: [葵  
 藜](藤县), 青羊藤(玉林), [六月雪](陆川), 千里光  
 (苍梧), [九里明](昭平、博白), 白花九里明(龙州), 管  
 芽; 云南: 青钓鱼杆(绥江)。

**功效** 全草: 祛风除湿, 活血调经。用于风湿骨

痛,跌打肿痛,产后血崩,月经不调,疮疖。

#### 7238207

*Blumea mollis* (D. Don) Merr. --- *Blumea wightiana* DC. --- *Erigeron molle* D. Don

植物名 柔毛艾纳香《中国植志》

药材名 红头小仙《汇编》

文献名 毛艾纳香《广西药录》,红头草《药典》,紫色花《广西本草选编》

地方名 湖南:肥儿宝;广西:毛干药(隆林),甲冬仗(龙州),那猪草(乐业),紫花草;云南:紫背倒提壶(昆明)。

功效 地上部分:消炎,解毒。用于肺炎,腮腺炎,口腔炎,乳腺炎,鼻渊。

#### 7238208

*Blumea oblongifolia* Kitam.

植物名 长圆叶艾纳香《中国植志》

药材名 长圆叶艾纳香《浙南本草新编》

地方名 浙江:大黄草、大红草(温州),白叶(乐清)。

功效 全草:清热解毒,利尿消肿。用于急性气管炎,痢疾,肠炎,急性肾小球性肾炎,尿路感染,多发性疖肿,外伤肿痛。

#### 7238209

*Blumea sagittata* Gagnep.

植物名 戟叶艾纳香《中国植志》

药材名 戟叶艾纳香《广西药录》

功效 全草:用于风湿骨痛。

#### 7238210

*Blumea sericans* (Kurz) Hook. f.

植物名 丝毛毛毡草《汇编》

文献名 毛毡草《汇编》,拟毛毡草《中国植志》

地方名 须将军(华南);福建:猫舌癩、田英草(厦门);台湾:兔耳草,毛将军。

功效 全草:清热利尿。用于急性慢性肾炎。外用用于肿毒,毒蛇咬伤。

#### 7238211

*Cacalia adenyloides* Franch. et Sav.

植物名 蟹甲草《汇编》

地方名 陕西:[山紫菀]。

功效 根:润肺,化痰,止咳。

#### 7238212

*Cacalia ainsliaeflora* (Franch.) Hand. -Mazz.

植物名 兔耳风花蟹甲草《高植图鉴》

药材名 兔耳风蟹甲草《峨眉药植研究》

文献名 八角香《贵州民间药物》,白花蟹甲草《高植图鉴》,蟹甲草《贵州药录》

地方名 陕西:小八里麻(镇坪);四川:羊角天麻;贵州:蜘蛛草。

功效 块茎:解毒,杀虫。外用于疮疖肿毒,头癣。

#### 7238213

*Cacalia davidii* (Franch.) Hand. -Mazz.

植物名 双舌蟹甲草《高植图鉴》

药材名 西南蟹甲草《汇编》

文献名 角角天麻《汇编》,大卫蟹甲草《四川中药志》,双舌华蟹甲草《秦岭植志》,角天麻《高植图鉴》

地方名 甘肃:[天麻];四川:羊角天麻,红川乌。

功效 块茎:有小毒。祛风,化痰,平肝。

#### 7238214

*Cacalia farfarefolia* Sieb. et Zucc.

植物名 贵州蝙蝠草(拟)

文献名 蝙蝠草《贵州药录》

地方名 贵州:刀口药。

功效 叶:活血化痰,清热解毒。用于咳血瘀伤,无名肿毒,刀伤出血。

#### 7238215

*Cacalia hastata* L.

植物名 山尖子《高植图鉴》

药材名 山尖菜《长白山植药志》

功效 叶:消炎,泻下。用于化脓性伤口,小便不利。

#### 7238216

*Cacalia hastata* L. f. *glabra* (Ledeb.) Kitagawa --- *Cacalia glabra* Ledeb. --- *Cacalia hastata* L. var. *glabra* (Ledeb.) Ledeb. --- *Senecio sagittatus* Schultz Bip. var. *glabra* (Ledeb.) Maxim.

植物名 无毛山尖子《东检》

药材名 无毛山尖子《东北药用植物》

功效 鲜叶:消炎,泻下。用于小便不利等。

备考 茅蟹甲草裂碱具有解痉作用,而所含胡萝卜素被认为具有加速创伤愈合作用。有临床上用本种新鲜叶子的煎剂冲洗化脓性伤口或将鲜叶贴在伤口上,起消炎作用。还有强烈泻下作用,用于小便不利等。

#### 7238217

*Cacalia palmatisecta* (Jeffr.) Hand. -Mazz.

植物名 掌裂蟹甲草《高植图鉴》

药材名 掌裂蟹甲草《彝药志》

文献名 掌裂海甲草《彝药志》

地方名 云南:虎草,“罗娃”(彝名)。

功效 全草:祛风除湿,舒筋活血。用于腰腿痛,跌打损伤,感冒头痛,发热咳嗽。

#### 7238218

*Cacalia tangutica* (Franch.) Hand. -Mazz. --- *Sinacalia tangutica* (Maxim.) B. Nord.

植物名 羽裂蟹甲草《高植图鉴》

药材名 猪肚子《品种论述》

文献名 角角天麻《鉴别手册》,蟹甲草《高原本草》,羽裂华蟹甲草《秦岭植志》,羽叶蟹甲草《神农架药录》

地方名 陕西:水葫芦七,登云鞋,水萝卜(洋县);甘肃:[天麻],鸡多囊(岷县);湖北:蒿萝卜、水胡萝卜(神农架);四川:羊角天麻,[兔儿伞](若尔盖)。

功效 块茎:有小毒。祛风,化痰,平肝。用于头痛眩晕,风湿疼痛,偏瘫,咳嗽痰多。

#### 7238219

*Calendula arvensis* L.

植物名 小金盏花《中药大辞典》

药材名 金盏草《纲目》、《中药大辞典》

文献名 金盏花、醒酒花(《宛陵集》诗注),金盏儿花《救荒本草》,〔长春花〕《纲目》,长春菊《学圃杂疏》,金仙花、长春草《现代实用中药》,金盏草根《中药大辞典》

功效 全草及花:利尿,发汗,兴奋,缓下,通经。用于肠痔下血不止,小便不利,月经不调;根:用于疝气。

#### 7238220

*Calendula officinalis* L.

植物名 金盏花《秦岭植志》

药材名 金盏花《救荒本草》、《广西药录》

文献名 金盏草《纲目》,金盏菊花、杏叶、金盏花儿、黄花秋、红西番莲《植物名汇》,黄金盏、〔常春花〕《华北观赏植物》,黄金魁《科裁》,金盏菊《汇编》

地方名 福建:水涨菊(莆田、福州),山金菊、山菊花(龙岩);广西:大金盏花;贵州:捧红,甘菊花;云南:〔月红〕(昭通、丽江)。

功效 全草、根:活血散瘀,行气利尿。用于瘰癧疝气,胃寒疼痛;花:凉血,止血。用于肠风便血。

#### 7238221

*Callistephus chinensis* (L.) Nees

植物名 翠菊《群芳谱》、《中国植志》

药材名 翠菊《广西《园林药录》》

地方名 江西腊(江苏、广西);江苏:七月菊,兰菊;广西:苏菊;云南:五月菊。

功效 花、叶:清热,凉血;花:用于感冒头痛,眼赤肿;叶:外用于疔疮,烂疮。

#### 7238222

*Cancrinia discoidea* (Ledeb.) Poljak. --- *C. brachypappus* C. Winkl.

植物名 小甘菊《中国植志》

文献名 〔甘菊〕《沙漠药植》,草甘菊《拉汉英种称》

地方名 内蒙古:茵陈蒿(阿拉善右旗)。

功效 幼苗:清湿热,退黄疸。用于黄疸型肝炎,胆囊炎。

#### 7238223

*Carduus acanthoides* L.

植物名 节毛飞廉《中国植志》

药材名 刺飞廉《中草药学》

文献名 红马刺《云南药录》,利刺飞廉《中药大辞典》,藏飞廉、飞廉《汇编》

地方名 宁夏:大蓟(六盘山区);云南:小蓟,“策尔娘绛策子”(藏名)。

功效 全草:散瘀止血,清热利湿。用于吐血,鼻衄,尿血,功能性子宫出血,白带,乳糜尿,泌尿系感染。外用于痢疾、疔疮。

#### 7238224

*Carduus crispus* L.

植物名 丝毛飞廉《中国植志》

药材名 飞廉《本经》、《汇编》

文献名 飞轻《本经》,天芥、伏猪、伏兔、飞雉、木禾、

〔漏芦〕《别录》,飞廉蒿《千金翼方》,飞帘《东检》,〔小蓟〕《玉龙山药植》

地方名 〔大蓟〕(陕西、江苏),老牛错(黑龙江、吉林),刺萝卜(陕西、四川);内蒙古:“其尼瓦·乌日格苏”(蒙名),老牛错;陕西:马刺蓟,铺地蜈蚣(太白),牛扎口(佛坪);青海:马踏盖,刺盖,“江才尔”(藏名);江苏:大力王,枫头棵,刺针草(苏北);浙江:白野红花(温州、乐清),白牛口刺、白花大蓟(乐清),白己(天目山);安徽:大刺刺芽;湖南:红花草,刺打草,雷公菜;四川:“降择尔纳簸”(若尔盖藏名),恶鸡婆,刺芭草(峨眉山);贵州:大牛嘴口。

功效 全草或根:散瘀止血,清热利湿。用于吐血,鼻衄,尿血,功能性子宫出血,白带,乳糜尿,泌尿系感染。外用于痢疾、疔疮。

#### 7238225

*Carduus nutans* L.

植物名 飞廉《中国植志》

文献名 麝香飞廉《汇编》

地方名 山东:〔大蓟〕。

功效 全草:凉血止血,散瘀消肿。

#### 7238226

*Carlina biebersteinii* Bernh. ex Hornem.

植物名 刺苞菊《中国植志》

文献名 新疆刺苞菊《拉汉英种称》,新疆刺苞术《植分学报》,卡林菊《中草药》

功效 全草:据《中草药》载,本品有人参样强壮作用。

#### 7238227

*Carpesium abrotanoides* L.

植物名 天名精《中国植志》

药材名 鹤虱〔果实〕《开宝本草》、《药典》,天名精〔茎叶〕《本经》、《中药大辞典》

文献名 豕首《尔雅》,麦句姜、虾蟆蓝《本经》,天门精、玉门精、蜚颜、蟾蜍兰、葜、天蔓菁《别录》,天芫菁《小品方》,杜牛膝《圣济总录》,皱面草《履巉岩本草》,皱面地菰草《卫生家宝方》,鹤虱草《伤寒总要》,母猪芥《孙天仁集效方》,蚬蛄草《经效济世良方》,白粟柴子、刘栖草《纲目》,土牛膝、鬼虱《本草崇原》,鸡蹠子草《本草正义》,地葱、天蔓精《新纲》,地菰《高植图鉴》,癞蜥草《中国植物图鉴》,北鹤虱《中药志》,天名精实《药材学》,野菸草、牛儿打架《土农药志》

地方名 野烟(陕西、湖南、江西、上海、贵州),癞蛤蟆草(江苏、浙江、四川),挖耳草(上海、四川、江苏),野烟叶(安徽、贵州),癞团草(广东、浙江);北京:南鹤虱;天津:大鹤虱;山东:山菊花(费县),烟袋锅(烟台);江苏:绵苍娘子,拔子盖子,烟管头子;上海:癞头草,臭草;浙江:臭狐娘草,野烧酒,麻痒芥,麻面芥;安徽:杀虫草,狐狸臊,牙疼草,野苣;福建:臭婆娘,覆地菊;有地菊;湖南:臭花娘子,皱面叶;广东:烟斗菊;广西:野青菜;四川:烟管头草,烟头草,烟斗草,青毛草,地秧;云南:癞木树,娃儿草(昭通、文山);贵州:山烟,野叶子烟,癞格宝草。

**功效** 果实(鹤虱):有小毒。杀虫消积。用于蛔虫病,蛲虫病,绦虫病,虫积腹痛,小儿疳积;茎叶(天名精):祛痰,清热,破血,止血,解毒,杀虫。用于乳蛾,喉痹,疟疾,急性传染性肝炎,急慢惊风,虫积,血痢,衄血,血淋,疗肿疮毒,皮肤痒疹。

## 7238228

*Carpesium cernuum* L.

**植物名** 烟管头草《中国植志》

**药材名** 挖耳草《滇南本草》、《汇编》

**文献名** 杓儿菜《救荒本草》,芸香草、毛叶草、毛叶云香草《滇南本草》,野烟叶、野思草《草木便方》,野烟、挖耳草根《分类草药性》,烟袋草《植物名汇》,烟管草《广西植志》,大粒天名精《鉴别手册》,北鹤虱《汇编》

**地方名** 金挖耳(四川、云南);吉林:小金挖耳;河北:鹤虱;甘肃:烟锅草;湖北:见血飞;广西:〔蒲公英〕(靖西),蛋黄草(三江);四川:挖耳子草,鼻吸草、金耳草(南川);贵州:大白泡草,〔冬葵草〕;云南:野葵花、六氏草(红河),野朝阳柄、臭钟丹(保山),倒提壶(曲靖、昆明、红河),虾蟆芸香草。

**功效** 全草:有小毒。清热解毒,消肿止痛。用于感冒发热,咽喉肿痛,牙痛,急性肠炎,痢疾,尿路感染,淋巴结结核。外用于疮疖肿毒,乳腺炎,腮腺炎,带状疱疹,毒蛇咬伤;果实:驱肠虫;根:用于痢疾,牙痛,子宫脱垂,脱肛。

## 7238229

*Carpesium divaricatum* Sieb. et Zucc.

**植物名** 金挖耳《中国植志》

**药材名** 金挖耳《名实图考》、《中药大辞典》

**文献名** 滁州鹤虱《图经》,倒提壶、金挖耳根《分类草药性》,烟袋草《满蒙植志》,倒盖菊、北鹤虱《汇编》

**地方名** 辽宁:〔旱莲草〕;福建:朴地菊(厦门),劳伤草;湖南:野烟,野向日葵,野菸秧、黄牯牛打架草、牛相打、臭花娘子、牡牛膝(黔阳),铁抓子草,铁骨消,〔翻天印〕;广东:山烟筒头(惠来),山烟(潮阳),大野菊,野烟仔;广西:野葵花(南丹);四川:野烟头(重庆);云南:大挖耳草(文山);其他:鹤虱。

**功效** 全草:有小毒。清热解毒,消肿止痛。用于感冒发热,咽喉肿痛,牙痛,急性肠炎,痢疾,尿路感染,淋巴结结核。外用于疮疖肿毒,乳腺炎,腮腺炎,带状疱疹,毒蛇咬伤;果实:驱肠虫。

## 7238230

*Carpesium lipskyi* Winkl. --- *C. lipskyi* Winkl. var. *potaninii* Winkl.

**植物名** 高原天名精《中国植志》

**药材名** 高山天名精《云南药志》

**文献名** 挖耳草《玉龙山药志》,金挖耳《西藏中草药》,高山金挖耳《云南药志》,挖耳子草《汇编》,高原金挖耳《拉汉英种称》

**地方名** 西藏:天名精,“贡布美多露米”(藏名)。

**功效** 全草:清热解毒,祛痰,截疟。用于牙痛,喉痛,疟疾。

## 7238231

*Carpesium macrocephalum* Franch. et Sav. --- *C. eximium* Winkl.

**植物名** 大花金挖耳《中国植志》

**药材名** 大花金挖耳草《汇编》

**文献名** 千日草《祁州药志》,大烟锅草《甘肃中草》,大粒天名精、大花天名精《鉴别手册》,天名精《科裁》

**地方名** 香油罐、神灵草、仙草(东北);陕西:鹤虱(蓝田),大烟管头草。

**功效** 全草:凉血,散瘀,止血。用于跌打损伤;鲜草:外用于敷患处,外伤出血。

## 7238232

*Carpesium minus* Hemsl.

**植物名** 小花金挖耳《中国植志》

**药材名** 小花金挖耳草(拟)

**文献名** 小金挖耳《高植图鉴》

**地方名** 广西:茄叶细辛(全州)。

**功效** 全草:用于蛇咬伤。

## 7238233

*Carpesium nepalense* Less. var. *lanatum* (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitam. --- *C. cernuum* L. var. *lanatum* Hook. f.

**植物名** 棉毛尼泊尔天名精《中国植志》

**药材名** 棉毛金挖耳草(拟)

**文献名** 棉毛天名精《秦岭植志》,绵毛烟管头《贵州药志》

**地方名** 野烟、野叶子烟(云南、贵州);广西:野向阳花;四川:挖耳子草;贵州:鬼马石;云南:挖耳草,倒提壶,地朝阳、野葵花、野烟叶子、云香草(滇南)。

**功效** 全草:清热解毒,消肿止痛。用于甲沟炎,偏头痛。外用于疥疮,脓疱疮,痔疮等。

## 7238234

*Carpesium nepalense* Less.

**植物名** 尼泊尔天名精《中国植志》

**药材名** 尼泊尔天名精《迪庆藏药》

**文献名** 藏药天名精《迪庆藏药》

**功效** 全草:清热解毒,消肿。用于咽喉肿痛,疮肿。

## 7238235

*Carpesium szechuanense* Chen et C. M. Hu

**植物名** 四川天名精《中国植志》

**药材名** 四川挖耳草(拟)

**文献名** 天明精《峨眉药植资源》

**地方名** 四川:小挖耳(峨眉山)。

**功效** 全草:清热解毒,消肿止痛。

## 7238236

*Carpesium trist* Maxim. var. *manshuricum* (Kitam.) Kitam.

**植物名** 东北金挖耳《东北药用植物》

**功效** 花、全草:凉血,散瘀,止血。用于跌打损伤,外伤出血,吐血,衄血。

## 7238237

*Carthamus tinctorius* L.



植物名 红花《高植图鉴》

药材名 红花《图经》、《药典》

文献名 红蓝花《金匱要略》，黄蓝《博物志》，红蓝（崔豹《古今注》），红花苗《开宝本草》，红花子《图经》，红花草《履巉岩本草》，红花菜《救荒本草》，红蓝子《广利方》，大红花、药花《植物名汇》，丹华、摘花、未摘花、胭脂、经赤、经粉《新纲》，红温花《满洲植录》，金红花、红花樱子《中草药学》

地方名 [天仙]、白萍子、白平子（浙江、上海），怀红花、杜红花（浙江、江苏），草红花（浙江、青海、湖北、甘肃、河北），红花尾子（辽宁、湖南、江苏）；内蒙古：“古日古术”、“古力本力”（蒙名）；甘肃：丹红；青海：“杂各尔更”（藏名）；新疆：“扎郎孜切奇盖”（维名）；江苏：淮红花（南通）；贵州：散花，今日；云南：蓝叶红花，大寨花，小寨花；其他：中国红花，燕脂，药红花，红草，散红花，红花毛，板红花，红花饼。

功效 花：活血通经，散瘀止痛。用于经闭，痛经，恶露不行，癰疽痞块，跌打损伤，疮疡肿痛；果实：活血解毒。用于出痘不快，妇女气血瘀滞腹痛。

#### 7238238

*Cavea tanguensis* (Drumm.) W. W. Smith et J. Small --- *Saussurea tanguensis* J. R. Drumm.

植物名 葶菊《中国植志》

地方名 西藏：“嘎”（藏名）。

功效 全草：用于头痛。

#### 7238239

*Centaurea ruthenica* Lam.

植物名 欧亚矢车菊《中国植志》

药材名 黄花漏芦《新疆中草药》

功效 根：清热解毒，排脓消肿，通乳。

#### 7238240

*Centipeda minima* (L.) A. Br. et Aschers. --- *Artemisia minima* L. --- *Myriogyne minuta* Less.

植物名 球子草《名实图考》、《浙江药植志》

药材名 鹅不食草《食性本草》、《药典》

文献名 石胡荽《四声本草》，食胡荽《品汇精要》，野园荽《濒湖集简方》，鸡肠草、天胡荽《纲目》，鹅不食《生草药性备要》，地元荽《医林纂要》，满天星、沙飞草、地胡椒、大救驾《简易草药》，三节剑《分类草药性》，山胡椒、连地神《岭南采药录》，鹅儿不食草《中草药学》

地方名 地杨梅（福建、浙江），二郎箭（四川、上海、安徽、陕西），不食草（河北、江苏），胡椒草（江西、四川），猪屎潺、猪屎残（广东、广西），猪屎草（广东、福建），小救驾（贵州、湖南）；陕西：小龙芽草，地下草、地胡荽（宝鸡），三箭（洋县）；江苏：砂药草；浙江：铁拳头（龙泉），散星草，三牙钻（温州、泰顺），蚊子草（平湖），珠草（平阳），偷鸡环（天目山）；安徽：野荽荽，脾寒草；江西：猪屎豆（临川），偷鸡打（德兴），打不死；福建：猪屎咀，匍地杨梅，小还魂，小本过饥草，白珠子草（厦门），杜网草（周宁、南平、闽清、闽侯、连江、平潭、仙游）；台湾：龙吐珠，蝶仔兰，蝶仔草，真珠癭，蛤婆黄；湖南：消食草，园子草，细细草，痧痒草，野苘蒿，冰水丹，

铁金花；广东：猫沙，小拳头，雾水沙，出世老、蛆仔草（烧平）；广西：白地苣，疟疾草（南丹），老鼠脚只（北流），地苘蒿，老鼠脚迹（桂林），老鼠耳、老鼠脚（百色），牙楔菜，移星草，地苣；四川：通天窍，二郎剑，九逆黄，石胡椒；贵州：二郎戟；云南：鸡宗胆、鱼眼草（红河），鞭打绣球（普洱）；其他：三牙戟，杜远草，地辣椒，大本肚边草，白苍蝇翼，水射留，烂耳草。

功效 全草：通鼻窍，止咳。用于风寒头痛，咳嗽痰多，鼻塞不通，鼻渊流涕。

#### 7238241

*Chamaemelum nobile* (L.) All. --- *Anthemis nobilis* L.

植物名 果香菊《中国植志》

文献名 罗马茴香辣《中国植物图鉴》，白花春黄菊《北京植志》

功效 花或全草：祛风解表；花序：清热解毒，止喘咳，祛风湿。

#### 7238242

*Chrysanthemum segetum* L. --- *C. coronarium* L. var. *spatiosum* Bailey

植物名 南茼蒿《中国植志》

药材名 茼蒿《千金·食治》、《中药大辞典》

文献名 同蒿《嘉祐本草》，蓬蒿《饮膳正要》，同蒿菜《滇南本草》，蓬蒿菜《本草从新》，蒿菜《得配本草》，菊花菜《名实图考》，艾菜《海南植志》

地方名 四川：筒蒿菜（峨眉山）；云南：蒿子杆，春菊。

功效 茎叶：和脾胃，利二便，消痰饮。

#### 7238243

*Cicerbita cyanea* (D. Don) Beauv. --- *Sonchus cyaneus* D. Don --- *Lactuca hastata* DC.

植物名 蓝岩参菊《云南种录》

文献名 蓝锡莎菊《汇编》，蓝花岩参《西藏植志》，戟叶锡莎菊《贵州药录》

地方名 贵州：大棒口草；云南：〔苦参〕（红河），锡莎菊，〔犁头尖〕。

功效 根、全草：清热消炎，健脾和胃，止痛。用于胃痛，肠胃炎，食积饱胀，水肿，湿疹。

#### 7238244

*Cicerbita macrorhiza* (Royle) Beauv.

植物名 蓝岩参菊《云南种录》

药材名 岩参《云南种录》

文献名 扎赤《民族药志》

功效 全草：清热，利胆。用于黄疸型肝炎，胆囊炎，胃炎，“脉病”等。

#### 7238245

*Cichorium glandulosum* Boiss. et Hout

植物名 毛菊苣《秦岭植志》

药材名 菊苣《药典》

地方名 新疆：“卡斯尼”（维名）。

功效 地上部分：清肝利胆，健胃消食，利尿消肿。用于湿热黄疸，胃痛食少，水肿尿少。

#### 7238246

*Cichorium intybus* L.

植物名 菊苣《高植图鉴》  
 药材名 菊苣《药典》  
 文献名 苦苣、莢菜、苦马草、苣菜《植物名汇》  
 地方名 新疆：“卡斯尼”《维名》。  
 功效 地上部分：清肝利胆，健胃消食，利尿消肿，用于湿热黄疸，胃痛食少，水肿尿少。

## 7238247

*Cirsium belingshanicum* Petrak.

植物名 罗平蓟《高植图鉴》  
 药材名 罗平蓟《汇编》  
 文献名 大刺盖、大牛舌口《中药大辞典》  
 地方名 四川：刺盖草；贵州：小蓟。  
 功效 根：清热，凉血，利水，祛风，补虚。用于吐血，下血，水肿病，虚弱，跌打损伤，痈疮红肿，痒疹，疥癣。

## 7238248

*Cirsium chinense* Gardn. et Champ.

植物名 绿蓟《植分学报》  
 药材名 苦苣《本草经集注》、《中药大辞典》  
 文献名 钩苣《尔雅》，苦板《纲目》，马刺芥、蓟《植物名汇》，中国蓟《中药大辞典》，小蓟《广西中药志》，华蓟《广西药录》

地方名 甘肃：马刺根（宕昌）；江苏：蓟菜（临邛），山蓟蓟芽、山荠芽（赣榆），轮蓟；湖南：狭叶蓟，牛刺犁，小样刺米草；广西：大小蓟（蒙山、苍梧、博白），牛参（贵县），牛儿参（桂平），老虎力（藤县），白花大蓟（贺县），虎利草（苍梧、岑溪），大蓟（贺县、北流、博白、贵县、邕宁）。

功效 全株：清热，凉血，活血，解毒。用于暑热烦闷，妇女崩漏，跌打吐血，痔疮，疔疮。

## 7238249

*Cirsium chlorolepis* Petrak.

植物名 滇大蓟《云南种录》  
 药材名 滇大蓟《汇编》  
 文献名 大蓟、鸡脚刺《滇南本草》，母鸡刺《玉龙山药植》，青刺蓟《汇编》，两面刺《中国植志》  
 地方名 刺蓟、刺盖（西南）；云南：白马刺，鸡刺根、抱母鸡刺根、尖刺刀、鹅菜、水红花根、鸡足刺（红河），牛口利，马刺，鸡足刺根，蓟刺根。

功效 根或全草：破血散瘀，凉血止血。用于吐血，咳血，衄血，尿血，子宫出血，月经过多，小儿疳积，水肿，贫血，胃痛，产后腹痛，淋巴结核。外用：烧烫伤，跌打瘀肿，疮疖肿毒。

## 7238250

*Cirsium eriophoroides* (Hook. f.) Petrak.

植物名 绵头蓟《西藏植志》  
 药材名 藏大蓟《汇编》  
 文献名 大刺儿菜《西藏中草》，毛头蓟《云南种录》，贡山蓟《植分学报》

地方名 西藏：大蓟，“绛策尔那布”（藏名）。

功效 全草：凉血止血，散瘀消肿。用于衄血，吐血，尿血，子宫出血，黄疸，疮痈。

## 7238251

*Cirsium esculentum* (Sievers) C. A. Mey.

植物名 莲座蓟《高植图鉴》  
 药材名 莲座蓟《内蒙古中草药》  
 地方名 内蒙古：食用蓟，“塔卜青图-阿吉口嘎纳”（蒙名）。

功效 全草：散瘀消肿，排脓，托毒，止血。用于肺脓肿，疮痈肿毒，皮肤病，肝热，各种出血。

## 7238252

*Cirsium griseum* Levl. --- *C. botryodes* Petrak.

植物名 灰蓟《植分学报》  
 药材名 白花小蓟《云南药录》  
 文献名 小蓟、鸡脚刺《滇南本草》，总状蓟《高植图鉴》  
 地方名 云南：鸡刺根。

功效 根：养精保血。用于破宿血，生新血，暴下血，金疮或血崩，除风热，月经不调，乳癌，烧伤。

## 7238253

*Cirsium hupehense* Pamp. --- *C. lineare* var. *linearifolium* f. *tomentosum* Patrak. --- *C. lineare* auct. non (Thunb.) Sch. -Bip.

植物名 湖北蓟《植分学报》  
 功效 根、全草：活血散瘀，消肿解毒。  
 备考 《高植图鉴》4:614, 1975 学名 *Cirsium lineare* (Thunb.) Sch. -Bip. 系误订。

## 7238254

*Cirsium japonicum* DC. --- *Cnicus japonicus* (DC.) Maxim. --- *Cirsium hainanense* Masamune

植物名 大蓟《高植图鉴》  
 药材名 大蓟《别录》、《药典》  
 文献名 大小蓟根《别录》，马蓟《范汪方》，虎蓟《本草经集注》，刺蓟、山牛蒡《口华子本草》，鸡项草《图经》，刺蓟菜《救荒本草》，野红花《纲目》，苾草《本草述》，刺儿菜、〔紫花地丁〕《纲目拾遗》，牛触嘴、鼓椎《医林纂要》，鸡姆刺《质问本草》，恶鸡婆《草木便方》，山蓟、地疗、地丁香、地下草、大居寒、牛溺刺《新纲》，青刺蓟《植物名汇》，刺桔子、马刺草《中药材手册》，野刺菜、刺楸子《药材学》，千针草《中国药植志》，牛刺口、牛口蓟《民间药与验方》，蓟、大蓟草、大蓟根《药典》，海南蓟《品种论述》

地方名 老牛挫口、婆婆丁（东北），山萝卜（湖南、广东、广西、贵州），大青青菜（山东、云南），大刺刺菜（安徽、山东、河南），〔铺地蜈蚣〕（陕西、广西），牛不嗅（浙江、福建），老虎刺（广东、广西），牛触嘴（上海、安徽），老虎刺（福建、广西），红毛帚（安徽、江西），地萝卜（浙江、广西）；河北：扎扎嘴；山西：驴扎嘴，马刺刺；陕西：番阳花（山阳），地蜈蚣（镇坪）；山东：大七七菜、驴插口、驴齐口（烟台），马刺刺（昆崙山、荣成、海阳、威海），老牛扁口（莒南、益都）；江苏：铁刺艾（泰州），马脚壳草（常熟、苏州），野辣菜（溧阳），大齐牙、肢壳草（常熟），红花草，将军草；上海：大蓟姆，戳人蓟草，六轮台；浙江：牛口刺，六月冻（温州），牛水刺（文成），鸡公刺（洞

头);安徽:牛刺芽,牛鼻刺,野芥菜;江西:牛刺筋菜,筋菜,乌不扑,老虎卵(泰和),苕柴(奉新),牛戳咀(婺源);福建:蚊姆刺,猪妈菜,[六月雪](福州),六月霜(光泽、南平、福州、德化、泉州),鸡母刺(长乐、福州、永泰、福清、莆田),牛母刺(武平、泉州),刺菜(明溪、大田、松溪、政和),猪菜、鸡菊刺、七菜、老鸡刺(三明),老虎舌根、鸡角刺、牛烘巷、莉叶刺、千针菜、猪母刺、山红花(厦门),白利叶刺,老虎草,牛刺鼻,养猪菜,竹高刺,牛海风,精鸡齿;河南:大刺儿菜,山刺儿菜,野腊菜;湖南:大刺家草,千口针,裂婆兜,刺刺菜,牛倒口(常德);广东:牛芝芳(英德),牛不食草(连县),山老鼠筋,老鼠筋,猫仔刺头,牛枝筋,牛参,猪哥刺头(惠来),剪刀菜(陆干),山芥菜(广宁),肺翁树(电白),猫头树(徐闻),猫枝筋(丛化),牛枝勒菜(河源),牛参茹(化州),牛枝参(博罗),牛炸口(始兴),假人参、牛参树(罗定);海南:山萝藦(澄迈),鬃刺薯(定安),[蒲公英];广西:牛口舌,草鞋刺,刷把头,牛口参(河池),刺青菜(富川),土洋参,地通(柳江),大小蓟(贺县、岑溪、博白),小蓟(北流、贵县),土人參(桂林);四川:土红花,大恶鸡婆(峨眉山),刺红花,刺萝卜;贵州:大牛噎口,小牛噎口;云南:抱母鸡刺(文山),马利草。

**功效** 地上部分或根:凉血止血,祛瘀消肿。用于衄血,吐血,尿血,便血,崩漏下血,外伤出血,痈肿疮毒。

**备考** 《纲目拾遗》之刺儿菜,根状如人参,系指大蓟,而非小蓟。

## 7238255

*Cirsium lineare* (Thunb.) Sch.-Bip.

**植物名** 线叶蓟《植分学报》

**药材名** 条叶蓟《浙江药植志》

**文献名** 滇小蓟《云南种录》

**地方名** 野红花(浙江、四川);山东:山瓦明,空心草、无心草(烟台),大莽荠菜(招远);浙江:山红花(德清、仙居、黄岩、温州、平阳、泰顺),尖叶小蓟(龙泉);广西:小蓟(平果);四川:小刺盖;贵州:细叶蓟,刺儿菜。

**功效** 根、全草:活血散瘀,消肿解毒。用于月经不调,闭经,痛经,乳腺炎,尿路感染,赤白带下,跌打损伤,神经性皮炎,疖,痈,毒蛇咬伤。

## 7238256

*Cirsium maackii* Maxim. --- *C. japonicum* DC. var. *maackii* (Maxim.) Nakai

**植物名** 野蓟《植分学报》

**药材名** 大蓟《汇编》

**地方名** 马刺草(甘肃、山西),牛戳口(东北);山东:驴刺口(昆嵛山、荣成、海阳、威海),老牛扁口(莒南、益都),大刺刺菜(淄博、章丘),青青菜;江苏:纽扣子;四川:刺萝卜,大野红花,恶老婆。

**功效** 地上部分或根:凉血止血,祛瘀消肿。

## 7238257

*Cirsium pendulum* Fisch. ex DC.

**植物名** 烟管蓟《高植图鉴》

**药材名** 烟管蓟《汇编》

**文献名** 垂蓟《兴安植群》,马蓟《种称》

**地方名** 大蓟(北京、黑龙江);黑龙江:刺儿菜(黑河)。

**功效** 地上部分或根:凉血止血,祛瘀消肿。

## 7238258

*Cirsium racemiforme* Ling et Shih

**植物名** 总序蓟《广西药录》

**功效** 根:用于小儿消化不良,外伤出血。

## 7238259

*Cirsium segetum* Bunge --- *Cephalanoplos segetum* (Bunge) Kitam.

**植物名** 刺儿菜《纲目拾遗》、《高植图鉴》

**药材名** 小蓟《本草经集注》、《汇编》

**文献名** 猫刺《本草经集注》,刺蓟《日华子本草》,青刺蓟、千针草《图经》,刺蓟菜《救荒本草》,野红花《纲目》,青青菜、萋萋菜、枪刀菜《医学衷中参西录》,小蓟草《中国药植志》,小蓟根《常用中药名辨》

**地方名** 刺刺、小刺菜、恶鸡婆、扎扎嘴、大小蓟(华北),小恶鸡婆(华北、四川),刺芥菜(华北、浙江),刺刺芽(江苏、湖南),刺刺菜(湖南、山东、江苏),曲曲菜、刺菜(河北、山东),七七菜(山西、山东);河北:茨菜,青其菜;内蒙古:“巴嘎-阿吉日嘎纳”(蒙名);陕西:小刺蓟芽(安康);山东:齐齐毛,蓟蓟毛,荠荠菜(历城、荣成、海阳、崂山),济济菜;江苏:刺角菜、木刺艾(泰州),刺杆菜(泰县),刺杀草(苏州),蓟蓟芽,小蓟头(启东),刺旁花(江宁);上海:刺儿草,牛戳刺,刺尖头草;安徽:茨茨菜;福建:白鸡角刺(厦门),小鸡角刺(泉州),小牛扎口;湖北:刺狗牙,荆芥牙子(神农架);广西:山蓟(隆林);贵州:小刺盖,细叶蓟;四川:刺萝卜,“姜泽”(藏名),刺草苗(蓬溪)。

**功效** 地上部分:凉血止血,祛瘀消肿。用于衄血,吐血,尿血,便血,崩漏下血,外伤出血,痈肿疮毒;根茎:用于传染性肝炎。

**备考** 《植分学报》将本种并入 *Cirsium setosum* Bieb.

## 7238260

*Cirsium setosum* Bieb. --- *Cephalanoplos setosum* Kitam.

**植物名** 刺叶刺儿菜《中药志》

**药材名** 小蓟《本草经集注》、《药典》

**文献名** 猫刺《本草经集注》,大刺儿菜《高植图鉴》,大蓟《内蒙古中草药》,缺刺刺儿菜《甘肃中草》,长冠毛刺蓟《东北植药图志》,刺蓟《中国经植志》,枪刀菜《鉴别手册》,刻叶刺菜《汇编》,刺儿菜《药典》

**地方名** 大刺刺(华北),刺叶、枪头菜(东北),七七菜(山东、河南);吉林:老牛锉,“恩恩更亏”(朝名);内蒙古:“阿吉日嘎纳”、“章斯尔钦布”(蒙名),大刺菜;新疆:“活哈提砍”(维名);山东:刺菜,刺刺菜(昆嵛山、广饶、沂水),青青菜(历城、无棣、章丘),小刺刺菜(沾化),曲曲菜(牙山),大蓟儿菜,大青青菜,济济菜;河南:刺脚菜,刺脚芽;湖北:刺狗牙。

**功效** 地上部分:凉血止血,祛瘀消肿。用于衄血,吐血,尿血,便血,崩漏下血,外伤出血,痈肿疮毒;根茎:用于传染性肝炎。

## 7238261

*Cirsium setosum* (Willd.) Bieb. f. *altissimum* (Kitag.)

植物名 白花刺叶刺儿菜(拟)

药材名 白花刺儿菜《东北药用植物》

功效 带花全草或根:凉血,止血,祛瘀。用于咯血,衄血,鼻塞,尿血,传染性肝炎,功能性子宫出血,外伤出血,痢疾。

## 7238262

*Cirsium souliei* (Franch.) Mattf.

植物名 聚头蓟《高植图鉴》

药材名 聚头蓟《汇编》

文献名 金针大蓟、葵花大蓟《西藏中草》

功效 全草:凉血,消瘀散肿。用于吐血,鼻出血,尿血,子宫出血,黄疸,疮痍。

## 7238263

*Cirsium vlassovianum* Fisch. ex DC.

植物名 绒背蓟《高植图鉴》

药材名 绒背蓟《汇编》

文献名 绒毛蓟《兴安植群》

地方名 黑龙江:猫腿姑;吉林:柳叶蓟。

功效 块根:祛风除湿,止痛。用于风湿性关节炎,四肢麻木。

## 7238264

*Conyza blinii* Levl. --- *Conyza dunniiana* Levl.

植物名 熊胆草《中国植志》

药材名 金龙胆草《汇编》

文献名 苦龙胆草《滇南本草》,苦蒿《药典》,苦草、龙胆蒿《中国植志》,小苦蒿《汇编》,幼直假蓬《云南中草药选》

地方名 云南:鱼胆草,苦艾,细叶苦蒿,金蒿枝(玉溪),矮脚苦蒿,一枝蒿,云南白酒草(昆明),[地胆草],苦头一支蒿,毛脚一枝蒿,拖一拖,毛苦蒿,细苦蒿,油蒿,黑蒿枝,虎胆草,〔龙胆草〕,短脚蒿,“阿壳西”(傣语),“季蔽诗”(楚雄彝语),苦慢嘴,毛苦,苦丁,金枝蒿,黄花蒿枝,〔刘寄奴〕,蒿枝龙胆草,黄胆草,灭疮药,毒蛆草,羊子草。

功效 地上部分:清热解毒,消炎祛痰,止咳平喘。用于慢性气管炎,痢疾,口腔炎。

## 7238265

*Conyza bonariensis* (L.) Cronq. --- *Erigeron crispus* Pourr. --- *Erigeron linifolius* Willd.

植物名 香丝草《中国植志》

药材名 野塘蒿《汇编》

文献名 灰绿白酒草《秦岭植志》,小山艾,火草苗《汇编》

地方名 台湾:消息草;湖南:雷公鞭,野蒿菜;广东:野地黄菊;广西:牛尾草(临桂),鸡毛草(龙州),蓑衣草;四川:小齐头蒿;云南:小白菊。

功效 全草:清热祛湿,行气止痛。用于感冒,疟疾,急性风湿性关节炎。外用于小面积创伤出血。

## 7238266

*Conyza canadensis* (L.) Cronq. --- *Erigeron canadensis* L.

植物名 小蓬草《中国植志》

药材名 小白酒菜《汇编》

文献名 一枝蒿、祁州一枝蒿《祁州药志》,小飞蓬《湖南药物志》,加拿大飞蓬《广西药录》,小白酒草《拉汉英种称》,小蓬《云南种录》,加拿大白酒草《西藏植志》,加拿大蓬《海南植志》,绒线草、小白蒿《中草药》,飞蓬《中国植志》

地方名 牛尾巴蒿(辽宁、湖南);山东:狼尾巴(泰山),蓬,白蒿;江苏:休息草(启东),小燕草(苏北),鸡尾草;湖南:风头花,百灵草,七天风,羊尾巴,蒿子;广东:臭艾、一枝笔、鬼艾、烂布巾(惠阳),破布艾;广西:补菜、蛇舌草(富川),竹叶艾(梧州),柳叶艾,假茵蒿;云南:〔鱼胆草〕、〔苦蒿〕(玉溪)。

功效 全草或鲜叶:清热利湿,散瘀消肿。用于肠炎,痢疾,传染性肝炎,胆囊炎。外用于牛皮癣,跌打损伤,疮疖肿毒,风湿骨痛,外伤出血;鲜叶(捣汁):外用于中耳炎,眼结膜炎。

## 7238267

*Conyza japonica* (Thunb.) Less. ex DC.

植物名 白酒草《中国植志》

药材名 白酒草《汇编》

文献名 山地菊《广西植录》,白酒棵、白酒香、酒谷草、银钮子《中国植志》

地方名 假蓬(广西、云南);云南:酒药草、小白酒草(曲靖),喉痛草,喉痹草,“嘿柏弄什”(楚雄彝语)。

功效 根:消炎镇痛,祛风化痰。用于肋膜炎,小儿肺炎,喉头炎,小儿惊风;花:清热,祛痰,镇咳。用热咳伤阴;叶:用于疮疖肿毒。

## 7238268

*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker --- *Erigeron sumatrensis* Retz.

植物名 苏门白酒草《中国植志》

药材名 苏门白酒草《广西药录》

地方名 广西:竹叶艾(梧州)。

功效 全草:用于咳嗽,风湿骨痛,子宫出血。

## 7238269

*Coreopsis lanceolata* L.

植物名 剑叶金鸡菊《中国植志》

药材名 剑叶金鸡菊《广西药录》

文献名 剑叶波斯菊《广州经植》,线叶金鸡菊《汇编》

地方名 广西:大金鸡菊;四川:金鸡菊(峨眉山);贵州:〔除虫菊〕。

功效 全草:化瘀消肿,清热解毒。用于无名肿毒,刀伤。

## 7238270

*Coreopsis tinctoria* Nutt.

植物名 两色金鸡菊《中国植志》

药材名 金鸡痢疾草(拟)

文献名 蛇目菊《江苏南部种册》,痢疾草《广西中

选编), 铁菊《广州植志》, 波斯菊《汇编》

地方名 [孔雀草] (广东、广西)。

功效 全草: 清热解毒, 化湿。用于急慢性痢疾, 目赤肿痛, 痈疮肿毒。

#### 7238271

*Cosmos bipinnata* Cav.

植物名 秋英《中国植志》

文献名 波斯菊《华北观赏植物》, 大波斯菊《广西《园林药录》》

功效 全草: 清热解毒, 明目化湿。用于目赤肿痛。外敷痈疮肿毒。

#### 7238272

*Cotula anthemoides* L.

植物名 茼蒿菊《高植图鉴》

药材名 茼蒿菊《广西药录》

文献名 山茼蒿《种称》

地方名 广西: 鹅不食; 四川: 二郎剑(重庆)。

功效 全草: 用于孕妇呕吐。

#### 7238273

*Cremanthodium angustifolium* W. W. Sm.

植物名 狭叶垂头菊《中国植志》

药材名 明洞色波《迪庆藏药》

功效 花序: 清热解毒, 止痛。用于疔疮, 肿痛。

#### 7238274

*Cremanthodium brunneo-pilosum* S. W. Liu --- *C. plantagineum* Maxim. var. *ellisii* Hook. f. --- *C. plantagineum* Maxim. f. *ellisii* (Hook. f.) Good.

植物名 褐毛垂头菊《中国植志》

文献名 点头菊《西藏中草》

功效 全草: 祛痰止咳, 宽胸利气。用于痰喘咳嗽, 癆伤, 老年虚弱头痛。

#### 7238275

*Cremanthodium bupleurifolium* W. W. Smith

植物名 柴胡叶垂头菊《中国植志》

药材名 垂头菊《迪庆藏药》

功效 花序: 清热解毒, 止痛。用于炭疽病, 疔疮, 肿毒, 各种疼痛。

#### 7238276

*Cremanthodium campanulatum* (Franch.) Diels

植物名 钟花垂头菊《中国植志》

药材名 副品木琼单圆《迪庆藏药》

功效 全草: 养骨, 补骨, 接骨。用于头伤, 骨折。

#### 7238277

*Cremanthodium decaisnei* Clarke

植物名 喜马拉雅垂头菊《中国植志》

药材名 喜马拉雅垂头菊《青藏药图》

文献名 须弥垂头菊、“哦嘎”(藏名)《云南种录》

地方名 青海: “罗肖”(藏名)。

功效 全草: 用于健胃, 止咳。

#### 7238278

*Cremanthodium discoideum* Maxim.

植物名 盘花垂头菊《中国植志》

药材名 盘花垂头菊《青藏药图》

地方名 青海: “曲豆那保”(藏名)。

功效 全草: 用于中风。

#### 7238279

*Cremanthodium ellisii* (Hook. f.) Kitam. --- *C. plantagineum* Maxim.

植物名 车前状垂头菊《中国植志》

药材名 车前状垂头菊《青藏药图》

地方名 青海: “奥嘎”(藏名); 西藏: “俄尔”(藏名)。

功效 全草: 用于胆囊炎, 头痛, 中毒性疼痛。

#### 7238280

*Cremanthodium helianthus* (Franch.) W. W. Smith

植物名 向日垂头菊《中国植志》

药材名 垂头菊《迪庆藏药》

文献名 向日葵垂头菊《迪庆藏药》

功效 花序: 清热解毒, 止痛。用于炭疽病, 疔疮, 肿毒, 各部疼痛。

#### 7238281

*Cremanthodium humile* Maxim. --- *Senecio kansuensis* Franch.

植物名 矮垂头菊《中国植志》

药材名 小垂头菊《青藏药图》

地方名 青海: “芒见赛保”(藏名)。

功效 全草: 镇静, 退烧, 消炎。用于全身肿。

#### 7238282

*Cremanthodium lineare* Maxim.

植物名 条叶垂头菊《中国植志》

药材名 条叶垂头菊《汇编》

文献名 线叶垂头菊《西藏植志》, 线叶点头菊《汇编》

地方名 青海: “热肖”(藏名); 四川: “盲尖色鲁”(藏名)。

功效 全草: 清热消肿。用于高热症引起的急惊痉挛, 神志昏迷; 嫩苗: 健胃。用于呕吐。

#### 7238283

*Cremanthodium nepalense* Kitam.

植物名 尼泊尔垂头菊《中国植志》

药材名 尼泊尔垂头菊《青藏药图》

地方名 青海: “奥嘎”(藏名)。

功效 全草: 祛痰止咳, 宽胸利气。用于痰喘咳嗽, 癆伤, 老年虚弱头痛。

#### 7238284

*Cremanthodium rhodocephalum* Diels

植物名 长柱垂头菊《中国植志》

药材名 副品木琼单圆《迪庆藏药》

文献名 红头垂头菊《高植图鉴》

功效 全草: 养骨, 补骨, 接骨。用于头伤, 骨折。

#### 7238285

*Cremanthodium smithianum* (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz. --- *Cathcartia smithiana* Hand.-Mazz. ---

*Cremanthodium acernum* Good --- *C. decaisnei* auct. non C. B. Clarke

植物名 紫茎垂头菊《中国植志》  
 药材名 副品木琼单圆《迪庆藏药》  
 功效 全草: 养骨, 补骨, 接骨。用于头伤, 骨折。  
 备考 有的文献将本种学名误订为 *C. decaisnei*

C. B. Clarke

7238286

*Cremanthodium stenactinium* Diels ex Limpr.

植物名 膜苞垂头菊《中国植志》  
 药材名 阔叶垂头菊《汇编》  
 文献名 垂头菊《高原中草》, 丛叶垂头菊《汇编》  
 地方名 四川: “干穷娃”(藏名)。  
 功效 全草: 清热解毒。用于痈疽肿毒, 外伤感染, 烧伤疼痛。

7238287

*Crepis bodinieri* Levl.

植物名 果山还阳参《云南种录》  
 文献名 还阳参《云南药录》, 波氏还阳参《红河中草药》

功效 根: 润肺止咳, 清热解毒, 消食理气, 催乳。

7238288

*Crepis chloroclade* Coll et Hemsl.

植物名 竹叶还阳参《品种论述》  
 地方名 云南: 竹叶防风, 小竹叶防风(剑川、景东)。  
 功效 全草: 云南部分地区民间入药  
 备考 本品与防风效用不同, 不宜与防风混用。

7238289

*Crepis crocea* (Lamk.) Bab. --- *C. turezaninowii* C. A. Mey.

植物名 黄花还阳参《汇编》  
 药材名 驴打滚草《汇编》  
 文献名 还羊参《高植图鉴》, 驴打滚儿草《内蒙古中草药》, 盾还阳参《中药大辞典》  
 地方名 内蒙古: “包给·乌布斯”(蒙名)。  
 功效 全草: 益气, 止咳, 化痰, 平喘, 清热降火。用于支气管炎, 肺结核。

7238290

*Crepis lignea* (Vant.) Bab. --- *Lactuca lingnea* Vant.

植物名 万丈深《高植图鉴》  
 药材名 万丈深《云南中草药选》  
 文献名 万丈深茎叶《昆明民药》, 还阳参《海南植志》, 绿茎还阳参《红河中草药》  
 地方名 云南: 铁刷把、铁扫把、细草、细叶万丈深(昆明), 有根无叶, 奶浆参(红河), 土麻黄、马尾参(峨山); 贵州: 刷把细辛。

功效 茎叶: 发汗。用于外感无汗, 风湿筋骨疼痛; 根: 润肺止咳, 清热解毒, 消食理气, 催乳。用于支气管炎, 肺炎, 痢疾, 小儿疳积, 乳汁不足, 结膜炎。

7238291

*Crepis napifera* (Franch.) Bab.

植物名 肉根还阳参《汇编》  
 文献名 祖先花《滇南本草图谱》, 一支箭《云南中草药》, 羌薺还羊参《高植图鉴》, 丽江一支箭《云南种录》,

大一支箭《中草药》

地方名 云南: 捕地风(曲靖), 万丈深、拙荦还阳参(红河), 奶浆草, 玉枝箭, “塔路娃”(楚雄彝名)。

功效 根或全草: 润肺止咳, 消炎生肌。用于夜盲, 支气管炎, 百日咳, 咳嗽。外用于刀枪伤, 疮伤, 开放性骨折。

7238292

*Crepis phoenix* Dunn

植物名 竹叶万丈深《汇编》  
 药材名 甜远志《滇南本草》  
 文献名 还阳参、天竹参、万丈深、竹叶青《滇南本草》

地方名 云南: 小粘连(曲靖), 瘦地草、细防风、奶浆柴胡(思茅), 奶浆参(昆明), 马尾参(红河)。

功效 全草: 祛风散寒, 消炎解毒。用于感冒, 上呼吸道感染, 气管炎, 支气管炎。

7238293

*Crepis rigescens* Diels

植物名 川滇还阳参《汇编》  
 药材名 还阳参《滇南本草》  
 文献名 天竹参、万丈深、竹叶青《滇南本草》, 川滇还羊参《高植图鉴》, 滇川还羊参《拉汉英种称》  
 地方名 云南: 竹叶参。

功效 根: 破血行瘀。凉血止血, 祛瘀生新。用于吐血, 鼻出血, 小儿尿血, 妇人红崩下血。外用于疮毒, 瘰癧, 痢疔。

7238294

*Crepis rigescens* Diels ssp. *lignescens* Bab.

植物名 腾冲还阳参《云南种录》  
 功效 根: 破血行瘀, 凉血止血, 祛瘀生新。

7238295

*Crepis tibetica* Bab. --- *Crepis elongata* Bab.

植物名 长茎还阳参《云南种录》  
 文献名 西藏还羊参《西藏植志》  
 地方名 云南: 铁刷把、有根无叶(文山)。  
 功效 根: 补肾阳, 益气血, 健脾胃。用于神经衰弱, 妇人宫冷不孕, 白带漏下, 头晕耳鸣, 心慌怔忡, 小儿消化及营养不良。

7238296

*Crossostephium chinense* (L.) Makino --- *Artemisia chinensis* L. --- *Tanacetum chinense* A. Gray ex Maxim. --- *Crossostephium artemisioides* Less.

植物名 芙蓉菊《中国植志》  
 药材名 芙蓉菊《福建药物志》  
 文献名 千年艾、蕪艾《名实图考》, 香菊、玉芙蓉《岭南采药录》, 蜂草《汇编》, 艾《华北药聚》, 芙蓉菊根《福建中草药》

地方名 芙蓉(广东、台湾); 浙江: 海芙蓉、岩头白(洞头); 福建: 白艾(漳州、长泰), 白香菊, 芙蓉花(同安), 白芙蓉(泉州); 广东: 细叶芙蓉(广州)。

功效 根、叶: 祛风除湿, 解毒消肿, 止咳化痰。用于风寒感冒, 麻疹, 风湿关节疼痛。胃痛, 支气管炎, 百

日咳, 疔疮肿毒, 乳腺炎。

#### 7238297

*Cyathocline purpurea* (Buch.-Ham. ex De Don) O. Kuntze -- *C. lyrata* Cass. --- *Dichrocephala minutiflora* Van. --- *Tanacetum purpureum* Buch.-Ham. ex De Don

植物名 杯菊《中国植志》

药材名 杯菊《汇编》

地方名 广西: 紫花艾(德保), 新红花(乐业), 小艾(平果); 云南: 小红蒿(思茅), 红蒿枝(红河)。

功效 全草: 清热解毒, 消炎止血, 截疟, 除湿利尿, 杀虫。用于急性胃肠炎, 中暑, 疟疾膀胱炎, 尿道炎, 咽喉炎, 口腔炎, 吐血, 衄血, 外伤出血。

#### 7238298

*Cynara cardunculus* L.

植物名 刺苞菜蓟《中国植志》

文献名 刺菜蓟《拉汉英种称》, 西班牙菜蓟《秦岭植志》

功效 叶: 用于慢性肝炎, 肝胆病, 消化系统疾病, 肾脏疾病, 过敏症等。

#### 7238299

*Cynara scolymus* L.

植物名 菜蓟《中国植志》

文献名 洋蓟《种称》, 食托菜蓟《中国植志》

功效 叶: 用于慢性肝炎, 肝胆病, 消化系统疾病, 肾脏疾病, 过敏症等。

#### 7238300

*Dahlia pinnata* Cav. --- *D. variabilis* Willd.

植物名 大丽花《中国植志》

药材名 大丽菊《湖北中草药志》

文献名 大理花、天竺牡丹、洋牡丹《中国植物图鉴》, 大理菊《鉴别手册》

地方名 苕菊(华北、广东); 北京: 西粉莲, [西番莲]; 山东: 地瓜花; 广东: 洋芍药(广州); 广西: (芍药)(乐业、兴安), [大乌头](南丹), 土芍药; 四川: 洋菊花、红苕花(成都), 苕花(重庆); 贵州: 金黄花。

功效 根: 用于牙痛, 腮肿痛, 无名肿毒。

备考 有将其块根伪充天麻者。

#### 7238301

*Dendranthema indicum* (L.) Des Moul. --- *Chrysanthemum indicum* L. --- *C. nankingense* Hand.-Mazz.

植物名 野菊《本草拾遗》、《中国植志》

药材名 野菊花《本草正》、《药典》

文献名 苦蕒《本草经集注》, 野山菊《名实图考》, 路边菊《岭南采药录》, 蕒花《新纲》, 黄菊仔《中国药植志》

地方名 野黄菊(广东、四川、广西、江苏、云南), 山菊花(广西、安徽、云南、福建), 金菊花(广西、云南), 黄菊花(安徽、云南、湖南、浙江), 野黄菊花(云南、江苏), 黄菊(广东、福建), 路边黄菊(广东、广西), 九月菊(辽宁、云南), 田边菊(上海、湖北); 辽宁: 山九月菊; 山西: 黄菊子; 内蒙古: “浩尼-努都-其其格”(蒙名); 陕西: 油菊, 大菊花, 黄花艾; 甘肃: 黄花草; 江苏: [满天星](苏

州), 疟疾草, 菊花脑、篱菊花(南京); 上海: 连梗野菊, 小土菊花, 菊花头; 安徽: 千层菊; 江西: 溪边黄花(吉水); 福建: 土甘菊(厦门), 狗屎艾(三明), 猪母艾(清流), 金芯菊、土菊花(南平), 金蕊, 路边黄; 湖南: 毛蒿菜(衡阳), 毛菊花、金钱菊(黔阳); 广东: 假菊(广宁、四会、德庆、怀集), 山岗菊(顺德), 苦菊, 假菊花(东莞); 广西: 鬼仔菊, 山甘菊花(桂林); 云南: 东篱菊, 石艾。

功效 头状花序: 清热解毒。用于疔疮痈肿, 目赤肿痛, 头痛眩晕; 全草、根: 清热解毒。用于痈肿, 疔疮, 目赤, 瘰癧, 天疱疮, 湿疹。

#### 7238302

*Dendranthema lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih --- *Chrysanthemum lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Makino

植物名 细裂野菊《汇编》

药材名 北野菊《内蒙古中草药》

文献名 野菊《日华子本草》, 野菊花《本草正》, 金铃菊《纲目拾遗》, 香叶菊《中国植物图鉴》, 草莓菊《经济植物学》, 拉芬野菊《中国经植志》, 岩香菊(东检), 苦蕒《陕甘宁植志》, [甘菊]《中国植志》

地方名 山菊、甘菊花(东北); 云南: [千里光]、千光草(昆明)。

功效 地上部分: 清热解毒。用于头痛, 目赤, 肺炎。外用于痈疖疔疮, 宫颈糜烂。

备考 本品味苦, 不宜称为“甘菊”。

#### 7238303

*Dendranthema lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. *seticuspe* (Maxim.) Shih --- *Chrysanthemum boreale* (Makino) Makino ---

*Dendranthema boreale* (Makino) Ling

植物名 北野菊《中国经植志》

药材名 野菊花《中药志》

文献名 甘野菊《高植图鉴》, 日本野菊(东资), 甘菊《江苏植志》, 甘菊花《朝鲜植汇》, 岩香菊《中药志》

地方名 九月菊(东北); 山东: 千头菊(泰山), 山菊花(蒙山、鲁山); 江苏: 野菊。

功效 全草: 清热解毒。

#### 7238304

*Dendranthema lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih var. *tomentellum* (Hand.-Mazz.) Ling et Shih --- *Chrysanthemum lavandulifolium* var. *tomentellum* Hand.-Mazz.

植物名 绒毛野菊《云南中草药》

药材名 破钱草《云南中草药》

文献名 野菊《云南药录》, 毛叶甘菊《云南种录》

地方名 河北: 北野菊; 广西: 金菊花(北流); 云南: 千里光、千里草(昆明)。

功效 全草: 发散风寒, 祛风利湿, 清肝明目。用于风寒感冒, 头痛, 角膜云翳, 黄疸; 头状花序: 用于疮疡肿毒, 目赤肿痛, 头痛眩晕。

#### 7238305

*Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzvel. --- *Chrysanthemum sinense* Sabine --- *Chrysanthemum morifolium* Ramat. --- *Tanacetum morifolium* (Ramat.) Kitam.

植物名 菊花《中国植志》

药材名 菊花《本经》、《药典》

文献名 鞠《尔雅》，长生《太清经》，鞠花、节华《本经》，菊华、白华、女华、女室《吴普本草》，日精、女节、女茎、更生、周盈、傅延年、阴成《别录》，金精、容成、玉英《金匱玉函方》，甘菊、真菊《抱朴子》，黄甘菊《圣惠方》，小白菊《滇南本草》，金蕊、治薺《纲目》，家菊《群芳谱》，白菊花根《本草正》，馒头菊、簪头菊《医林纂要》，甜菊花《随息居饮食谱》，菊花苗《得配本草》，白茶菊《纲目拾遗》，女花《新纲》，甘菊花《和汉药标本目录》，料理菊《小泉《药植》》，大白菊《广西药录》，田峰菊《药物试植报告》

地方名 白菊花(广西、湖南、浙江、云南)，药菊(河北、云南)，黄菊花(华南、浙江)；北京：秋菊；河北：祈菊；浙江：杭菊花，杭菊，杭白菊，杭黄菊，德菊(德清)；安徽：滁菊，毫菊，贡菊，池菊；河南：大白莲，怀菊；湖南：药菊花，毛蒿菜；广西：红菊花(河池)；四川：川白菊，都菊，川杭菊，茶菊，川菊。

功效 头状花序；散风清热，平肝明目。用于风热感冒，头痛眩晕，目赤肿痛，眼目昏花；根：善利水，大治癰闭，疔肿；叶：用于疔疮，痈疽，头风，目眩。

#### 7238306

*Dichrocephala auriculata* (Thunb.) Druce --- *D. integrifolia* (L. f.) O. Ktze. --- *Dichrocephala bicolor* (Roth.) Schlecht --- *Dichrocephala latifolia* (Pers.) DC.

植物名 鱼眼草《中国植志》

药材名 鱼眼草《滇南本草》、《汇编》

文献名 山胡椒《植物名汇》，茯苓菜、山胡椒菊《广州植志》，鱼眼菊《广西本草选编》，泥鳅菜《汇编》

地方名 胡椒草(四川、贵州、福建)，水胡椒(福建、四川)，白花菜(广东、湖南)；福建：肉桂草，泥鳅草，蜘蛛草(南平)，臭婆子、山牡丹、尿鹅草(泉州)，解毒药(松政)；湖南：[白花菜]；广东：猪油草、龟药(惠阳)；广西：白头菜(南宁)，夜明草(田林)，斑鸠窝(富川)；四川：花头菊，[荔枝草]，大马鞭草，胡椒菜，[满天星](峨眉)；贵州：白顶草、白口疮药、仆地菊(贵阳)，白芽草，翳子草，牙草细辛，白芽草细辛，翳子花，地细辛；云南：大鱼眼草，茯苓草，地胡椒，口疮叶，馒头草，地苋菜，“帕滚姆”(傣名)，鸡饴草。

功效 全草：活血调经，解毒消肿。用于小儿口疮，妇女月经不调，扭伤肿痛，毒蛇咬伤，疔毒。

#### 7238307

*Dichrocephala benthamii* C. B. Clarke

植物名 小鱼眼草《中国植志》

药材名 小鱼眼草《汇编》

文献名 小鱼眼菊《贵州药录》，白芽草、白顶草、翳子花、地细辛《中药大辞典》

地方名 广西：鸡眼菊《乐业》；贵州：翳子草；云南：

地胡椒(保山)，鼓丁草、星宿草(昆明)，蛆头草(思茅)，三仙菜，小馒头草，“帕滚姆”(傣语)，“我迷肚”(楚雄彝语)。

功效 全草：清热解毒，利湿，祛翳。用于疟疾，痢疾，腹泻，肝炎，妇女白带，目翳口疮，疮疡；根：利小便，用于五淋溺时疼痛。

#### 7238308

*Dichrocephala chrysanthemifolia* DC.

植物名 菊叶鱼眼草《中国植志》

药材名 菊叶鱼眼草《汇编》

文献名 鱼眼草《汇编》，菊叶鱼眼菊《贵州药录》

地方名 贵州：辣菜；云南：白顶草，鸡眼草，小馒头草。

功效 全草：清热解毒，祛风明目。用于肝炎，小儿消化不良，小儿感冒高烧，肺炎，痢疾，疟疾，牙痛，夜盲症。外用于疮疡，蛇咬伤，皮炎，湿疹，子宫脱垂，脱肛，腮腺炎；根：利小便。用于五淋，溺时疼痛。

#### 7238309

*Doellingeria marchandii* (Levl.) Ling --- *Aster marchandii* Levl.

植物名 短冠东风菜《中国植志》

药材名 菊花暗消《云南药录》

地方名 广西：[白花菜](恭城)；云南：胃药。

功效 根：行气止痛，祛风除湿。用于胃痛，胃及十二指肠溃疡，感冒，风湿疼痛。

#### 7238310

*Doellingeria scaber* (Thunb.) Nees --- *Aster scaber* Thunb.

植物名 东风菜《中国植志》

药材名 东风菜《开宝本草》、《汇编》

文献名 东风《纲目》，东风菜根、[仙鹤草]《中国药植志》

地方名 烂屁股三七(浙江、安徽)，仙白草(广西、浙江、安徽)，白云草(湖南、安徽)，钻山狗(安徽、湖南、广东)；黑龙江：路标子，路柞(哈尔滨)；内蒙古：“敖孰-花儿”(蒙名)；山东：[紫苑]、[紫菀]、马耳足(青岛)；浙江：尖叶山苦蕒，山白菜，小叶青，雌雄剑(开化、永康、金华、丽水)，冷水丹(临安、兰溪、浦江)，烂股臀(乐清、泰顺)，山蛤芦(吴兴)；安徽：烂尾七；湖南：盘龙草，土苍术(长沙)，[苍术](新邵、衡山)；广东：辣菜，双脚蜘蛛，沙药王，山茄，黄马腰，蛇仔草；广西：山田七、多根薯(博白)，归身艾(北流)；四川：复占康(峨眉山)；贵州：疙瘩药，草三七。

功效 全草、根：有小毒。清热解毒，祛风止痛，活血。用于毒蛇咬伤，风湿性关节炎，跌打损伤，感冒头痛，目赤肿痛，咽喉肿痛。外用于疮疖，毒蛇咬伤。

#### 7238311

*Doronicum altaicum* Pallas --- *Cremanthodium calotum* Diels

植物名 阿尔泰多榔菊《高植图鉴》

药材名 太白小紫菀《汇编》

文献名 太白菊《汇编》



地方名 陕西:小紫菀(太白山)。

功效 全草:祛痰止咳,宽胸利气。用于痰喘咳嗽。

#### 7238312

*Dubyaea atropurpurea* (Franch.) Stebb.

植物名 紫舌厚喙菊《云南种录》

药材名 匝赤那波《迪庆藏药》

功效 地上全草或花:清热,通脉。用于“赤巴”病,胆病,肝炎,筋脉病。

#### 7238313

*Dubyaea hispida* (D. Don) DC.

植物名 厚喙菊《云南种录》

药材名 匝赤那波《迪庆藏药》

功效 地上全草或花:清热,通脉。用于“赤巴”病,胆病,肝炎,筋脉病。

#### 7238314

*Echinops albicaulis* Kar. et Kir.

植物名 白茎蓝刺头《品种论述》

地方名 新疆:蓝刺头。

功效 根:清热解毒,排脓通乳。

备考 在新疆作为漏芦的代用品。

#### 7238315

*Echinops gmelinii* Turcz. --- *E. turczaninowii* Trautv.

植物名 砂蓝刺头《中国植志》

药材名 砂蓝刺头《汇编》

文献名 刺甲盖、刺头、恶背火草、沙蓝刺头、火绒草、沙漏芦《沙漠药植》

地方名 和尚头(陕西、山西);内蒙古:“拉姆-塔里赫”、“查拉-乌乌尔”、“泰日英-仁斯”(蒙名)。

功效 全草:安胎,止血,镇静。用于先兆流产,产后出血;根:清热解毒,排脓通乳。用于疮痈肿痛,乳腺炎,乳汁不通,淋巴结核,痔漏。

#### 7238316

*Echinops grijsii* Hance --- *E. cathayanus* Kitag.

植物名 华东蓝刺头《中国植志》

药材名 华东漏芦(拟)

文献名 东南蓝刺头《中药大辞典》, 格利氏蓝刺头《药材学》, 南兰刺头《广西药录》

地方名 漏芦(江苏、上海、安徽、广东);江苏:禹州漏芦,一枝箭(邳县),地芦、老和尚头、漏漏根(镇江),追骨风,八里花,〔八里麻〕;广西:土防风(钟山)。

功效 根:清热解毒,排脓通乳。用于乳腺炎,乳汁不通,腮腺炎,痈疖。

#### 7238317

*Echinops integrifolius* Kar. et Kir.

植物名 全缘叶蓝刺头《中国植志》

药材名 全缘叶蓝刺头《品种论述》

文献名 绿刺头《品种论述》

地方名 新疆:漏芦。

功效 根:清热解毒,排脓通乳。

#### 7238318

*Echinops latifolius* Tausch.

植物名 蓝刺头《高植图鉴》

药材名 禹州漏芦《药典》

文献名 单州漏芦《图经》, 鹿驢根《救荒本草》, 野兰莱蒿、鬼油麻《和汉药标本目录》, 球花漏芦、蓝球花《中国植物图鉴》, 〔火绒草〕《高植图鉴》, 驴欺口《中国植志》

地方名 棕包三七(华南), 和尚头(东北、山东);吉林:火球花;河北:火绒球花, 火绒球草, 狼头花;甘肃:马刺薊(固原);山东:火绒根子, 火绒头(威海), 秃妮子头(平邑), 老头捶子(泰山);江苏:毛头, 追骨风, 八里花, 八里麻(南京);山西:刺革;福建:〔防风〕(漳浦);河南:龙葱根, 漏芦葱。

功效 根:清热解毒, 消痈, 下乳, 舒筋通脉。用于乳痈肿痛, 痈疽发背, 瘰癧疮毒, 乳汁不通, 湿痹拘挛。

#### 7238319

*Echinops latifolius* Tausch f. *angustilobus* (DC.)

Kitag. --- *E. dahuricus* Fisch. var. *angustilobus* (DC.)

Prodr. --- *E. latifolius* Tausch var. *angustilobus* (DC.)

Kitag.

植物名 狭叶蓝刺头《东北药用植物》

药材名 漏芦(东北)

功效 根:清热解毒, 排脓消肿, 通乳, 止血;花序(追骨风):用于活血, 跌打损伤。

#### 7238320

*Echinops maritimus* L.

植物名 滨蓝刺头《品种论述》

地方名 云南:漏芦。

功效 根:清热解毒, 排脓通乳。

#### 7238321

*Echinops ritro* L.

植物名 硬叶蓝刺头《中国植志》

药材名 新疆蓝刺头《汇编》

文献名 小蓝刺头《拉汉英种称》

地方名 新疆:漏芦。

功效 根:清热解毒, 排脓通乳。

#### 7238322

*Echinops sphaerocephalus* L.

植物名 球花蓝刺头《拉汉英种称》

药材名 球序蓝刺头《品种论述》

文献名 蓝刺头《中国植志》

地方名 新疆:漏芦。

功效 根:清热解毒, 排脓通乳。

#### 7238323

*Eclipta prostrata* (L.) L. --- *Eclipta alba* (L.) Hassk.

植物名 鳢肠《唐本草》、《中国植志》

药材名 墨旱莲《饮片新参》、《药典》

文献名 金陵草《千金月令》, 莲子草《唐本草》, 旱莲草、旱莲子《图经》, 白旱莲《履巉岩本草》, 獐孙头《居家必用事类全集》, 莲草《滇南本草》, 墨斗草《医学正传》, 墨烟草、墨菜、墨头草、猪牙草《纲目》, 鳢肠、八哥草、八哥菜、耐惊菜、麦豆草、假莲蓬《植物名汇》, 鸡肠草《草药性》, 白花草、白花鳢肠菊《岭南采药录》, 猪眼草、蜜

菜、水芝麻、野田青、白果草《田间的杂草》，墨记菜《现代实用中药》，野水凤仙《药材资料汇编》

地方名 墨汁草(江西、福建、湖北、广东)，黑墨草(浙江、广西、广东、云南)，土旱莲(广东、海南)，黑头草(云南、广西)，野菱花(江苏、河南)，墨草(浙江、福建、河南、广东、广西)，莲蓬草(安徽、广东)，乌墨菜(福建、广东)，白花螞蟥草(广东、广西)，大粪草(江西、河北)，野向日葵(山东、福建、湖南)，水凤仙(江苏、上海)，田乌草(浙江、台湾)，止血草(安徽、福建)，烂脚草(上海、河南)；江苏：水凤仙草，臭脚梗(清江)，臭脚把子草(盱眙)，烂丫菜，烂安菜，[野菊花]；山东：片蒿(莒县)；上海：旱莲姆，水杨树，水马兰，米凉头草，野老姜，早蓼姆；浙江：摘头乌，滴落乌，镰刀草(金华、兰溪、义乌、浦江)，摘落乌(富阳、余姚、建德、诸暨)，水葵花，墨点水草(嵊县)，摘断乌草(湖州)，乌心草(平阳)，水石榴、稻劫草(温州)；安徽：烂脚丫草，田腔草，子弹头，七七草，壮猪草；江西：墨水草(奉新)，炭煤草(婺源)，墨药子；福建：假日头花仔，绕莲花，火炭草，白田乌草(闽南)，节节乌(霞浦、福安、福鼎)，白花冬节草、索血草、扭莲乌、对面乌、跳鱼草、乌莲乌(福安)，龙舌草、疗草(闽东)；台湾：田黑草，黄花密菜，细号粘力仔，乌田草，田乌仔草；河南：胖婆娘腿；湖北：退血草；湖南：水旱莲，冰冻草，八角草(常德)，墨苋(衡山)，禾冻草(益阳)，墨斗苋；广东：白花螞蟥菜，白菜旗草(潮安、潮阳)，白花棕草(汕头、潮阳、澄海、饶平、南沃)，白花螞草(惠来、普宁、潮阳)，白花断血草(惠来、普宁)，白花蛆草、白花磨螞草(潮阳)，墨汁旱莲，来防草，白花墨草、乌墨草、执鼠草(潮州)，乌目菜(海丰)，墨汁旱莲草、黄牛麦、墨汁菜、白墨草、白花墨菜、磨其草(兴宁)；广西：古城墨，黑骨草(北海)，黑旋风(南宁)，黑口草，“过味少”(壮语)，密菜(博白)，污口草(北流)，老鼠靛(昭平)；四川：打斗菜(南川)，苦参花，长鸡草；贵州：金丝麻，金钩麻(兴仁)，地葵花(荔波)，墨兜草；云南：野西番莲，水向葵，小铜锤；其他：墨口菜，川鲤肠，火旦草。

功效 地上部分：滋补肝肾，凉血止血。用于牙齿松动，须发早白，眩晕耳鸣，腰膝酸软，阴虚血热，吐血，衄血，尿血，血痢，崩漏下血，外伤出血。

#### 7238324

*Elephantopus scaber* L.

植物名 地胆草《中国植志》

药材名 地胆草《滇南本草》、《汇编》

文献名 苦龙胆草《滇南本草》，天芥菜、鸡疳粘《纲目》，土柴胡、马驾百兴、苦地胆、苦地胆根《生草药性备要》，草鞋底《岭南采药录》

地方名 地胆头(浙江、江西、广东、云南)，披地挂(福建、浙江)，牛吃埔(湖南、广东)，草鞋根(广东、云南)，[土蒲公英](广西、广东)，铁灯盏(江西、湖南)，理肺散(云南、湖南)；浙江：儿童草(温州、青田)，羊下巴(文成、泰顺)；江西：铁灯柱，毛刷子，豆仔根(赣州)；福建：牛插鼻，牛托鼻，铁烛台，铁扫帚、铁答杯、铁丁镜、铁钉钳、一刺针(闽东)，地枇杷(宁德、德化、泉州、晋江、永定)，丁伽夫(龙溪、周宁)，丘草，姑婆头，山公英，

扁托鼻，一盏灯，和土鼻，狗绑草，一支香，一支纓，止鼻草，老公须(建阳)，鸠草，扁屎，扁屎抓兜，净丘草；台湾：登竖圪，丁竖字，红登竖圪，细本登竖圪；湖南：鞋底草，青鱼胆，鱼胆草，路边草，银锁匙，倒边连，落地消，毛芥菜，毛苦菜(常德)；广东：地占头(五华)，药丸草、牛食埔(潮安)，牛舌草，蛤仔头(阳春、阳江)，蛤仔草(阳江)，埔大菜(汕头、澄海、南澳)，了鸦头(潮州、饶平)，角蚁草、埔乞(潮安、澄海)，羊耳草、贴地枇杷(潮州)，酒饼草(澄海、南澳)，杜盖头(海丰)，草鞋板根，马驾百臭，草鞋头，牛触鼻，草鞋公，红花地胆头，土公英，牛过埔(普宁)；海南：鹿耳草(澄迈)，假公英(临高)；广西：吹火根，毛兜细辛，埔地娘，敷地胆(来宾)，草鞋板(柳江)，草鞋拔(罗城)，[蒲公英](富川、蒙山)，毛儿细辛，坐地凉(北海)，红脚一枝花(德保)，白眉草，“鞋底咪”、“笃当归”(瑶名)；贵州：兔儿风，疗疮药；云南：地松牛、追风散(保山)，小朝阳(临沧)，白地胆、黑头翁(文山)，青矮草，“牙三十双哈”(西双版纳傣名)。

功效 全草：清热泻火，凉血解毒。用于感冒高热，咽喉肿痛，肺热咳嗽，目赤，痢疾，痈疮肿毒。

#### 7238325

*Elephantopus tomentosus* L. --- *E. elatus* Dertol.

植物名 白花地胆草《中国植志》

药材名 白花地胆草《汇编》

文献名 白花地胆头《中草药学》，毛地胆草、高地胆草《汇编》

地方名 地胆草(福建、广东、广西)；福建：大号丘草，大号地枇杷；广东：白花蛤仔头(阳江)，白花药丸草(潮安)；海南：羊耳草，牛舌草(澄迈)；广西：大草鞋根；贵州：白毛地胆草。

功效 全草：清热泻火，凉血解毒。用于风热感冒，百日咳，传染性肝炎，肾炎。

#### 7238326

*Emilia prenanthoides* DC.

植物名 细红背叶《广州植志》

药材名 小一点红《汇编》

文献名 小叶一点红《江西药录》

地方名 一点红(广西、福建)；广东：耳挖草(广州)；广西：红背菜(藤县)，红背草(博白)，红背地丁(梧州)，红背金牛(桂平)，天青地红(资源、临桂、龙胜)，番背红、假芥兰(平南)，白沙药(富川)，七十二枝花；贵州：散血草，羊蹄草。

功效 全株：清热解毒，活血祛瘀。用于跌打损伤，红白痢，疮疡肿毒。

#### 7238327

*Emilia sagittata* (Vahl) DC. --- *Gynura sagittata* DC. ---

*Emilia javanica* (Burm. f.) Roxb.

植物名 缨绒花《江苏植志》

药材名 止血丹《汇编》

地方名 广西：小七十二枝花。

功效 全草：散毒，行血。外用于蛇咬伤。

#### 7238328

*Emilia sonchifolia* (L.) DC. --- *Cacalia sonchifolia* L.

植物名 一点红《高植图鉴》

药材名 一点红《汇编》

文献名 紫背草《名实图考》，牛石条、牛石屎、牛石花、牛屎花《植物名汇》，羊蹄草、假芥兰、爆仗草《岭南采药录》，绒缨菊《拉汉种称》，毛虫药《简明中医辞典》

地方名 [蒲公英] (华南)，叶下红 (浙江、安徽、福建、江西、湖南)，红背叶 (江苏、广东、广西、四川)，红背草 (江西、台湾、湖南、广东、广西)，小蒲公英、马蹄香 (广东、广西)，野芥蓝 (湖南、广西)，红背莲 (陕西、江西)，喇叭红草 (福建、广西)，散血丹 (江西、湖南)；浙江：山羊草、天毛草、野苦葵 (遂昌)，乳草 (丽水)；福建：兔草 (福州)，兔子参 (武平)，兔耳一支箭、红背子草 (永定、清流、宁化)，奶草 (福鼎)，乌疗草 (安溪)，牛奶草 (永安)，[苦草] (大田)，紫鼻草 (明溪)，叶底红、红胶草、红花乳草、丁仔草、银汤匙、摸壁痂、山芥蓝、连脚仁、二光草、石青红；台湾：下叶红、红背仔、牛石菜、万斤草；湖南：小毛芥菜 (衡山)；广东：星艳草、小叶下红、[马蹄草] (徐闻、海康、廉江、遂溪、电白)，软骨红背叶、细叶红背叶 (连平、河源)，叶花红 (普宁、陆丰)，红背紫菀 (从化)，谷毛菜 (罗定)，烂耳痒 (新会、台山)，走马天红、红背灯、狗毛仔 (英德)，片江青 (昌江)，耳背羊、紫背菜、山芥兰、匙羹草 (新会)，布芬草 (广州)，红下叶 (普宁)，叶背红、高血仔草 (南澳)，紫背苦脉 (连县)，半边红 (广州)，红背菜、耳飞痒、羊蹄菜 (阳春)，羊蹄春、耳环草、花樽草、猫菜祗 (兴宁)，红娘仔、猫菜里、声色草；海南：苏鼠草、坡艾草 (乐东)，后红叶 (临高)，红背果 (儋县)；广西：[土公英]，七十二枝花、牛尾膝、土黄连、紫背犁头草 (南宁)，紫背指丁、红背指丁、红背菜儿、红背地丁 (南宁、苍梧)，红背紫丁、红娘 (贵县)，鸡屎堆 (大瑶山)，岳母娘 (北海)，野芥菜、天红菜、天红仔 (蒙山)，了耳草 (龙州)，满天红 (平南)，大紫背地丁 (梧州)，[刘寄奴] (忻城)；四川：牛舌花、紫背地丁；贵州：饿死老公草、野木耳菜 (兴义)，花古帽 (绥阳)，饿死老公公；云南：野苦菜 (曲靖)，旱地蒲公英 (昆明)，奶浆草、乳汁草、牛奶奶 (玉溪)，红头草 (易门)。

功效 全草：清热解毒，消炎，利尿。用于肠炎，痢疾，尿路感染，上呼吸道感染，结膜炎，口腔溃疡，疮痈。

7238329

*Epilates australis* Less. --- *Sphaeromorphaea russeliana* DC.

植物名 球菊《中国植志》

药材名 大鹅不食草《广西本草选编》

文献名 鹅不食《岭南草药志》，苡芭菊《广西药录》

地方名 鹅不食草 (广东、海南、广西)，地胡椒 (广东、广西)；广东：球子草；海南：拳头草 (崖县)；广西：拳头菊，老鼠脚迹。

功效 全草：用于风寒感冒，疟疾，百日咳，小儿疳积，跌打损伤，赤眼肿痛。外用于鼻炎。

7238330

*Erigeron acer* L.

植物名 飞蓬《中国植志》

药材名 飞蓬《长白山植药志》

文献名 蓬《诗经》

地方名 吉林：蓬草；其他：柳蓬 (日本名)。

功效 花、花序：用于发热性疾病；种子：用于血性腹泻，胃炎，皮疹，疥疮。

7238331

*Erigeron annuus* (L.) Pers.

植物名 一年蓬《中国植志》

药材名 一年蓬《汇编》

地方名 牙肿消《江苏、浙江》，治疟草、野蒿 (江苏、安徽、湖南)，千层塔 (江苏、江西、湖南)，长毛草 (浙江、安徽)；江苏：牙根消；浙江：千张草、墙头草、地白菜、油麻草、白马兰；安徽：毛毛菜、平头蒿、大叶蒿、大牛尾巴蒿；湖南：姬女苑；云南：光绪光 (昭通)，[齐头蒿] (文山)，[茵陈]，[茵陈蒿]。

功效 全草、根：清热解毒，截疟。用于消化不良，肠炎腹泻，传染性肝炎，淋巴结炎，疟疾，血尿。外用于齿龈炎，蛇咬伤。

7238332

*Erigeron breviscapus* (Vant.) Hand.-Mazz. --- *E. praecox* Vierh. et Hand.-Mazz.

植物名 短萼飞蓬《中国植志》

药材名 灯盏细辛《云南中草药》

文献名 灯盏花、灯盏菊、细辛草《滇南本草》，短花茎飞蓬《广西药录》

地方名 青海：“罗米” (藏名)；广西：假朝阳草 (龙胜)；云南：地顶草、狗吞草 (丽江)，地朝阳，双葵花，东菊，细草根 (文山)，[土细辛] (昆明)，短萼飞蓬 (红河)，灯盏草 (曲靖)；贵州：细药，牙陷药，踏地蓬花菜，野菠菜。

功效 全草：散寒解表，祛风除湿，活络止痛。用于瘫痪，跌打损伤，胃痛，牙痛，感冒。

7238333

*Erigeron elongatus* Ledeb.

植物名 长茎飞蓬《中国植志》

药材名 红蓝地花《云南中草药》

文献名 紫苞飞蓬《高植图鉴》

地方名 云南：灯盏花 (曲靖)，白带丹 (大理)。

功效 全草、根：解毒，消肿，活血。用于结核型、瘤型麻风，视物模糊。

7238334

*Erigeron fukuyamae* Kitam. --- *E. morrisonense* Hayata var. *fukuyamae* Kitam.

植物名 台湾飞蓬《中国植志》

药材名 肺英草《台湾中药材图鉴》

功效 全草：用于肺病脓胸。

7238335

*Erigeron multifolius* Hand.-Mazz.

植物名 密叶飞蓬《中国植志》

文献名 多叶飞蓬《贵州药录》

地方名 贵州：牙瘤药。

功效 全草：活血化瘀，健脾消积。用于小儿疳积，半边风，牙痛，瘫痪，咳嗽，癩疔，牙出血。

## 7238336

*Eupatorium ageratoides* L.

植物名 团聚佩兰(拟)

文献名 团聚泽兰《广西药志》

地方名 广西:假白花草。

功效 叶:消炎,止血。用于外伤出血。

## 7238337

*Eupatorium chinense* L. --- *E. reevesii* Wall.

植物名 多须公《生草药性备要》、《中国植志》

药材名 华佩兰《中药志》、刘寄奴《名实图考》

文献名 斑骨相思、土牛膝、六月霜《生草药性备要》,白须公《本草求真》,牛舌大黄、小罗伞《岭南采药录》,飞机草、石辣《南方毒植》,大泽兰《海南植志》,广东土牛膝、六月雪叶《中药大辞典》,华泽兰《广西本草选编》

地方名 六月雪、(白头翁)、白花姜、秤杆草、野升麻(广东、广西),佩兰(江苏、浙江、云南);江苏:[野马追](盱眙);浙江:红茎八月白(天目山);江西:泽兰,白花泽兰,白兰叶(新建),山俭婆(婺源);湖南:白毛婆(衡山),搬倒甌、麻脚消(衡阳),泽三七、不老草、山兰、山竹兰(黔阳);广东:土黄菊(普宁),蛇王草(连县),广土牛膝、土牛夕(广州),六月雪树(惠阳),白花榜,百根草,入骨相思,〔刘寄奴〕;广西:孩儿草,大麻(富川),土升麻(梧州),大斑早,斑刀根,斑麻,大腿七,斑爪,白花莲;贵州:水泽兰;云南:对叶蒿(保山)。

功效 地上部分:发表祛湿,和中化浊。用于伤暑头痛,无汗发热,胸闷腹满,口中甜腻,口臭。

## 7238338

*Eupatorium chinense* L. var. *angustatum* (Makino) Hara

植物名 狭叶华佩兰(拟)

文献名 狭叶华泽兰《贵州药录》

地方名 贵州:水泽兰。

功效 地上部分:芳香化湿,醒脾开胃,发表解暑。

## 7238339

*Eupatorium coelestinum* L.

植物名 紫茎佩兰(拟)

文献名 紫茎泽兰《云南中草药》

地方名 云南:解放草、破坏草、黑头草、大泽兰、黑节草、桤苦(红河),细升麻,花升麻,马鹿草。

功效 地上部分:芳香化湿,醒脾开胃,发表解暑。

备考 1.《云南种录》记载的解放草为*Eupatorium adenophorum* Spreng.; 2.据《云南种录》称:全株及花粉会引起牛、马的过敏性肺炎而致死,垫圈会引起牛、马烂蹄。

## 7238340

*Eupatorium formosanum* Hayata

植物名 台湾佩兰(拟)

文献名 原枝相思草《台湾中药材图鉴》,台湾泽兰《中国植志》

地方名 台湾:泽兰,六月雪,大本白花仔草。

功效 全草:芳香化湿,醒脾开胃,发表解暑。

## 7238341

*Eupatorium fortunei* Turcz. --- *E. stoechadosmum* France --- *E. caespitosum* Miq. --- *E. chinense* L. var. *tripartitum* Miq.

植物名 佩兰《中国植志》

药材名 佩兰《本草再新》、《药典》

文献名 简《诗经》,兰《毛诗传》,兰草、水香《本经》,都梁香(李当之《药录》),兰泽草《本草经集注》,大泽兰《雷公炮炙论》,燕尾香、香水兰《开宝本草》,孩儿菊、千金草《续古今考》,省头草《唐瑶经验方》,女兰、香草《纲目》,千金花《本草乘雅半偈》,醒头草《得配本草》,佩兰梗、鲜佩兰《常用中药名辨》,丛生泽兰《广西植志》、上海佩兰《浙江药植志》

地方名 野佩兰(安徽、上海),山泽兰(广东、广西),石兰(云南、广西);江苏:八月白,失力草;上海:草佩兰,佩兰叶,老花草;湖北:铁脚升麻,称杆升麻;广东:石瓣,针尾凤;广西:水泽兰(平果、凌云),老山茶,鸡骨香,红泽兰(梧州),石骨兰(平南),泽兰(乐业、桂平、博白、苍梧);四川:[败酱](简阳);云南:麻杆药,山兰,泽兰叶,孔雀花(玉溪),蓝花一支蒿(峨山),野泽兰(易门);其他:白垢草,普息草。

功效 地上部分:芳香化湿,醒脾开胃,发表解暑。用于湿浊中阻,脘痞呕恶,口中甜腻,口臭,多涎,暑湿表症,头胀胸闷。

备考 江南各省有以其全草作泽兰用。

## 7238342

*Eupatorium heterophyllum* DC.

植物名 异叶佩兰(拟)

文献名 泽兰、红梗草、红秆草《滇南本草》,异叶泽兰《高植图鉴》

地方名 四川:大泽兰,攀倒甌;云南:黄力花(红河),接骨丹(玉溪),佩兰草(昆明),〔红升麻〕(丽江、昆明、曲靖、红河),〔土细辛〕(保山),小升麻(思茅)。

功效 全草:活血祛瘀,除湿止痛。用于腹痛,痢疽疮毒,排脓,行血破瘀,通经。

## 7238343

*Eupatorium japonicum* Thunb. --- *E. japonicum* Thunb.

var. *simplicifolium* (Makino) Nakai --- *E. fortunei* Turcz.

var. *simplicifolium* (Makino) Nakai --- *Eupatorium*

*chinense* L. var. *simplicifolium* (Makino) Kitam.

植物名 单叶佩兰《中药志》

药材名 单叶佩兰《中药志》

文献名 泽兰《本经》,孩儿菊《花镜》,白头婆《名实图考》,山竹兰、不老草《中国药植志》,单叶泽兰《广西植志》,圆梗泽兰《汇编》,野升麻、麻杆秤、白升麻、红升麻《中药大辞典》

地方名 秤杆升麻(贵州、四川、陕西),土升麻(贵州、四川),山泽兰、六月霜(广西、河南),佩兰(江苏、山东、浙江);山东:龙须草(烟台),抓麻子(牙山);江苏:佩兰叶(清江),药佩兰(南通),省头草(无锡);浙江:消食花(建德、嵊县、仙居),疾风草药(嵊县),大发散(龙泉、遂昌),山佩兰,花斑菊(温州、永嘉、乐清),饭金丝瓜(瑞安、文成),花竹仔、〔白头翁〕(泰顺),斑竹香丝

(平阳), 化食丹(乐清), 八月白(天目山); 安徽: 野紫花; 江西: 六月雪, 白花莲, 麻杆消; 河南: 日泽兰, 红花蛇草, 伤力草; 湖北: 麻婆娘; 湖南: 山兰, 香草, 孩儿兰, 香泽兰、家泽兰(衡山); 广东: 焦尾风、尖尾风、倒苏蓼(惠阳); 海南: 六月雪草(临高), 细叶泽兰; 广西: 青绿芩, 白花蛇药, 斑早俊, 攀倒甌, 白辣(龙州); 四川: 称杆心, 虎兰, 龙枣, 风药; 云南: 红泽兰, 蓝花一枝蒿, 孔雀花, 野泽兰, 破骨散, 细黑升麻(思茅)。

**功效** 地上部分: 芳香化湿, 醒脾开胃, 发表解暑。用于湿浊中阻, 脘痞呕恶, 口中甜腻, 口臭, 多涎, 暑湿表症, 头胀胸闷。

## 7238344

*Eupatorium japonicum* Thunb. var. *tripartitum* Makino --- *E. fortunei* var. *triparticum* (Makino) Nakai

植物名 裂叶山佩兰《浙南本草新编》

文献名 三裂叶泽兰《浙江药植志》, 裂叶泽兰《江苏植志》, 三裂叶白头婆《云南种录》

地方名 泽兰(湖南、云南); 湖南: 罗花草, 佩兰, 天心花; 云南: “香怕曼”(西双版纳傣语)。

**功效** 全草: 芳香化湿, 醒脾开胃, 发表解暑。

## 7238345

*Eupatorium lindleyanum* DC. --- *E. kirilowi* Turcz. --- *Eupatorium lindleyanum* DC. var. *trifoliatum* Makino --- *E. cannabinum* auct. non L.

植物名 尖佩兰《汇编》

文献名 白鼓钉《药材学》, 野马追、轮叶泽兰《药典》, 西藏佩兰、三叶尖佩兰《汇编》, 毛泽兰《中国经植志》, 林氏泽兰、轮叶佩兰《中药志》, 林泽兰《中国植志》

地方名 山佩兰(华东), 柳好花(东北), 白鼓丁(江苏、江西、四川、贵州), 佩兰(甘肃、山东、江苏、浙江、湖南、北京), 白头婆(江苏、河北); 陕西: 八里麻; 江苏: 佩兰叶(苏州), 野佩兰(镇江); 浙江: 落马菜, 铁门槛; 湖南: 顶天开花, 葡萄草, 攀倒甌; 广西: 小斑爪, 马兰; 贵州: 斑麻, 麻沙菜, 白花根, 米点菜, 土升麻, 猫儿翻甌, 搬倒甌, 秤杆升麻(湄潭), (升麻)(毕节), 路边升麻(安顺), 白花菜、半打秤(梨平)。

**功效** 地上部分: 化痰止咳, 平喘。用于慢性支气管炎, 痰多咳嗽。

**备考** 《西藏中草药》记载的佩兰(*Eupatorium cannabinum* L.) 实际上是本种。

## 7238346

*Eupatorium lindleyanum* DC. var. *eglandulosum* Kitam.

植物名 无腺尖佩兰(拟)

文献名 无腺泽兰《贵州药录》

**功效** 地上部分: 芳香化湿, 醒脾开胃, 发表解暑。

## 7238347

*Eupatorium odoratum* L.

植物名 飞机草《中国植志》

药材名 飞机草《汇编》

地方名 香泽兰(海南、云南); 云南: 雅把棒, 飞茛草(红河)。

**功效** 全草: 有小毒。散瘀消肿, 截疟, 止血, 杀

虫。用于疟疾, 跌打肿痛, 外伤出血, 旱蚂蝗叮咬出血不止, 疮疡肿毒。

## 7238348

*Eupatorium shimadai* Kitam.

植物名 毛果佩兰(拟)

文献名 佩兰《台湾中药材图鉴》, 毛果泽兰《中国植志》

**功效** 茎叶: 芳香化湿, 开胃醒脾, 发表解暑。

## 7238349

*Eupatorium tashiroi* Hayata --- *E. gracillimum* Hayata

植物名 木佩兰(拟)

文献名 木泽兰《中国植志》, [泽兰]《台湾中药材图鉴》

**功效** 茎叶: 芳香化湿, 开胃醒脾, 发表解暑。

## 7238350

*Farfugium japonicum* (L. f.) Kitam. --- *Ligularia kaempferi* (DC.) Sieb. et Zucc. --- *Ligularia tussilaginea* Makino

植物名 大吴风草《中国植志》

药材名 大吴风草《汇编》

文献名 囊吾、[独脚莲]《质问本草》, 大马蹄香、马蹄当归、一叶莲《汇编》, 款冬叶囊吾《沈药学报》

地方名 活血莲(江苏、福建、湖北、湖南), 金钵盂(湖北、湖南、福建); 江苏: 八角乌; 浙江: 荷叶术, 荷叶三七(海宁、平湖、嘉善、嘉兴、桐乡、长兴), 岩红, 独足莲, 铁铜盘(温州、乐清), 野金瓜, 畚斗荷叶(镇海); 江西: 铁冬苋; 福建: 金杯盂, 莲蓬草; 湖南: 冬苋莲, 血三七, 竿头七, 双音莲, 大马蹄。

**功效** 全草: 活血止血, 散结消肿。用于咳嗽咯血, 便血, 月经不调, 跌打损伤, 乳腺炎, 疮疡肿毒。

## 7238351

*Filifolium sibiricum* (L.) Kitam. --- *Tanacetum sibiricum* L.

植物名 线叶菊《中国植志》

药材名 兔毛蒿《汇编》

文献名 疗毒花、惊草、荆草《汇编》, 西伯利亚艾菊《中药大辞典》

地方名 内蒙古: “希拉-宝日勒吉”(蒙名), 兔子毛。

**功效** 全草: 清热解毒, 抗菌消炎, 安神镇惊, 调经止血。用于传染病高热, 心跳, 失眠, 神经衰弱, 月经过多, 月经不调。外用于肿痛, 脓疮, 中耳炎, 其他化脓性感染疾病。

## 7238352

*Galinsoga parviflora* Cav.

植物名 牛膝菊《中国植志》

药材名 辣子草《云南中草药选》

地方名 四川: 水寒草(峨眉山); 云南: 兔儿草, 铜锤草, 天文草(红河), 珍珠草(昆明), 向阳花。

**功效** 全草: 止血, 消炎。用于扁桃腺炎, 咽喉炎, 急性黄疸型肝炎。外用于创伤出血; 花: 清肝明目。用于夜盲症, 视力模糊及其他眼疾。

## 7238353

*Gerbera delavayi* Franch.

植物名 钩苞大丁草《高植图鉴》

药材名 钩苞大丁草《汇编》

文献名 白地紫苑《昆明民药》, 钩毛大丁草《中药大辞典》, 钩苞扶郎花《云南种录》

地方名 云南: 大火草、牛耳朵火草(昆明), 白叶不翻, 小一支箭, 白头翁, 昆明白头翁, 羊耳朵, 背面白(通海), 一枝蒿。

功效 根: 清热利湿, 理气化痰, 消积杀虫。用于痢疾, 胃痛, 消化不良, 蛔虫症, 扁桃体炎, 气喘痰多。外用于止血。

7238354

*Gerbera jamesonii* Bolus

植物名 扶郎花《高植图鉴》

文献名 非洲菊《广州植志》, 灯盏花《广西《园林药录》》

功效 全草: 清热止泻。用于肠炎。外用于疮痍肿毒。

7238355

*Gerbera piloselloides* (L.) Cass. --- *G. ovalifolia* DC. --- *Piloselloides hirsuta* (Forssk.) C. J. Jeffr. ex Cufod.

植物名 毛大丁草《高植图鉴》

药材名 毛大丁草《汇编》

文献名 小一枝箭、[白头翁]《滇南本草》, 兔耳一枝箭、独叶一枝枪、金边兔耳《纲目拾遗》, 一枝香《名实图考》, 兔耳风、毛耳风《草木便方》, 白花白头翁《形色鉴别》

地方名 一支香(福建、广东、广西), 踏地见(福建、广东), 白眉、[白薇](广东、广西), 一支箭(云南、四川), 扑地香(江西、西藏); 陕西: 朝天一枝香、顶头一枝香(宝鸡); 浙江: 银高杯(仙居), 一株香(温州、丽水); 江西: 头顶一枝草, 贴地消, 磨地香; 福建: 锁地虎, 一枝花(泉州、福州、晋江), 地枇杷、[白前]、踏地燕、答地燕、仆地虎(南平), 叶下红、铜管杯、天灯芯(闽东); 湖南: 四皮香, 满地香, 伏地老, 踏地消, 朝天一柱香, 铺地箭, 铺地灰, 牛皮草, 秀颜花, 瘰癧药, 七星草, 衫本岩, 草鞋藤, [蒲公英](邵东); 广东: 白花一枝香(惠阳、兴宁); 海南: 一柱香; 广西: 三十根(龙州), 酒饼药(宁明), 独脚跌打(桂平), 贴地风, 铺地娘(河池), 粘地, 贴地娘; 四川: 兔耳草, 马耳朵, 毛目风; 贵州: 巴地香, 兔耳风根, 兔儿风(红河), 棉花头; 云南: 山坡草, 伞状根(丽江), 白蛇胆(文山), 大一支箭(楚雄); 西藏: 毛扶郎花。

功效 全草: 宣肺, 止咳, 发汗, 利水, 行气, 活血。用于伤风咳嗽, 哮喘, 水肿, 胀满, 小便不通, 小儿食积, 妇女经闭, 跌打损伤, 痢疾, 疔疮, 流注; 根及根茎: 清热解毒, 理气和血。用于痢肿, 乳蛾, 疔疮, 瘰癧结核, 胸胁痞气, 疝气, 痢疾, 衄血, 下血。

7238356

*Glossogyne tenuifolia* Cass.

植物名 鹿角草《中国植志》

药材名 鹿角草《汇编》

文献名 小号--包针《汇编》, 矮鬼针草《中药大辞典》

地方名 抹香茹(华南), 金锁匙(海南、台湾); 福建: 小叶鬼针草, 香草仔(福清), 沙参仔草(龙海), 月月红(莆田), 金葫芦(平潭), 上洋参(漳浦), 不怕日草、山黄连、上黄连(泉州), 细叶香茹(厦门); 台湾: 山参仔, 香茹; 广东: 落地柏, 细种牛舌头, 风湿草(惠阳); 广西: 地松草、松丝草(玉林), 鸢鹰爪, 了哥利(贵县)。

功效 全草: 清热解毒, 利湿消肿, 祛瘀活血。用于急性扁桃腺炎, 齿龈炎, 支气管炎, 肠炎, 尿道炎, 浮肿。外用于带状疱疹, 跌打损伤。

7238357

*Gnaphalium adnatum* (Wall. ex DC.) Kitam. --- *Anaphalis adnata* Wall. ex DC. --- *Gnaphalium formosanum* Hayata

植物名 宽叶鼠麴草《中国植志》

药材名 地毛香《云南药录》

文献名 贴生鼠麴草《广西植录》, 贴生香青《广西药录》, 大棉花草《品种论述》, 老鸦编《汇编》, 翅茎鼠麴草《湖南药物志》

地方名 湖南: 梭干青, 大鼠曲草, 野水牛蒿, 散痰草, 白头婆公公; 广西: [岩白菜](南丹), 雾水草(北流), [白头翁](田东、北流、博白), 大白艾; 贵州: 兔耳风; 云南: 地膏药(昆明), 大黑药(通海)。

功效 全草: 清热解毒, 化痰止咳。用于痢疾, 咳嗽痰多, 小儿惊风, 口疮, 疮毒, 外伤出血; 叶: 消炎, 散肿, 止血。用于疮痍肿毒, 刀伤出血。

7238358

*Gnaphalium affine* D. Don --- *Gnaphalium multiceps* DC.

植物名 鼠麴草《中国植志》

药材名 鼠曲草《本草拾遗》、《汇编》

文献名 鼠耳、无心草《别录》, 鼠耳草、香茅《本草拾遗》, 蚰蜒酒草《酉阳杂俎》, 黄花白艾《履巉岩本草》, 茸母(邵桂子《雪舟题语》), 佛耳草、米曲、毛耳朵《纲目》, [黄蒿]《本草会编》, 水菊《质问本草》, 绵絮头草、[金沸草]、地莲、黄花草《纲目拾遗》, 水蚊草《名实图考》, 清明香《天宝本草》, 猫耳朵、毛女儿菜、暑菊、茸母草《新纲》, 母子草《牧野日图》

地方名 清明菜(江苏、陕西、四川、广东、云南), 黄花草、白头草(江西、湖南), 绒毛草(山东、上海), 棉花菜(贵州、四川), 棉花草(安徽、四川), 追骨风(黑龙江、江苏), 棉茧头(浙江、江苏), 棉青(上海、浙江), 土茵陈(广东、广西), 醉蚊草、碎米花(广西、江西), [白头翁](广西、四川); 陕西: 火草(周至); 山东: [野艾](历城), 白蒿子(益都), 香草(海阳), 大练草(威海); 江苏: [凤尾草](常熟), 绵鸡头(苏州), 棉见头; 上海: 丝棉草, 小耳朵草, 羊耳朵草, 猫耳朵草, 孩儿草, 猫脚药草, 花佛草, 老棉絮草, 毛毛头草, 天青地白; 浙江: 宽繁草, 黄花草, 糯米饭青, 棉菜, 绵曲(泰顺), 黄花棉青(临安), 黄花草, 黄花头青, 黄花奶; 安徽: 棉花团, 白毛头, 棉线头; 江西: 白面风(萍乡), 棉艾(南昌); 福建: 波波草, 黄花草(莆田、福州), 波波菜(福州), 黄招曲(政和、松

溪),野菊、爪老鼠、香茅黄蒿、韭草(泉州),蒲杨;台湾:〔本白头翁〕,鼠曲;河南:打火草,火母;湖南:鼠密艾,水蒿,耙菜,水蚊子,水曲(石门),社蒿,棉絮草(淑浦);广东:酒曲绒、〔小白头翁〕(潮阳),白花山鼠壳、山薯壳棉、细米白花药九草头、老鼠艾、棉絮头、田艾、鼠曲棉(潮安),白头公,黄花艾,毛毡草;广西:〔蒲公英〕(田林),田艾祗(兴宁),白头艾,清明草;四川:黑蒿蒿,软雀,一面青,清明蒿;云南:鼠米花;西藏:“甘达八渣”(藏名)。

功效 全草:祛痰,止咳,平喘,祛风湿。用于咳嗽,痰喘,风湿痹痛。

## 7238359

*Gnaphalium hypoleucum* DC. --- *G. confertum* Benth.

植物名 秋鼠麴草《中国植志》

药材名 秋鼠麴草《汇编》

文献名 天水蜈蚣《名实图考》,翻白鼠麴草《汇编》,下白鼠麴草《中国药植图鉴》,毛女儿菜《食用植物图说》,白头风《高植图鉴》

地方名 火草(湖南、四川),〔白头翁〕(广西、四川);江苏:白鼠麴草,佛耳草(宜兴);浙江:土白头翁(平阳、秦顺),白四轮风;江西:山果花,大叶毛鼠曲,碎鼠草,碎米花,黄花草;福建:石曲菇、白调羹、鼠麴、大石曲、牛尺旭(闽东),大白招曲,白观音;湖南:大叶青花,大水牛草,大白艾,水杨花杆,碎叶青花,青节草,毛鼠肉,野火草,雷公青;海南:黄花艾;广西:白相公,白头婆(玉林),山艾;四川:“扑芒老握”(藏名),山蕨;贵州:老火草,小火草,大曲花,毛毡药,黄火草。

功效 全草:祛风止咳,清热利湿。用于感冒,肺热咳嗽,痢疾,淋巴结核。外用于下肢溃疡。

## 7238360

*Gnaphalium japonicum* Thunb.

植物名 细叶鼠麴草《中国植志》

药材名 细叶鼠曲草《汇编》

文献名 毛女儿菜《质问本草》,清明草《分类草药性》,白背鼠麴草《福建药物志》

地方名 天青地白(浙江、福建、江西、广西),〔翻白草〕(广东、四川),叶下白(浙江、福建),日本鼠曲草(浙江、福建);浙江:上青下白(德清、建德、余姚、温州、泰顺),白蒿蓍;江西:翻底白,青天白地,千斤拔子、鬼矮子、地艾(泰和);福建:父子草,小叶鼠曲草(同安),小叶金鸡舌,小姑娘,白招曲,小白根菊、小地罗汉、小白招曲、白草仔、锦鸡舌(闽东),乌云盖雪,棉花草,金艾(龙岩),心叶能孤,天光地白,兄弟草(仙游);台湾:本白头翁;湖南:雷公青,菠萝草,耙子青(衡山),毛水蚊、癞头水蚊(长沙),铁打白(辰溪),矮天青地白(通道),小蔬菜(蓝嘉);广东:磨地莲、白面蛇、铺地蛇、沿地蛇(惠阳);广西:〔白头翁〕(龙胜、梧州),白地针(兴安),钩坚草(柳江),路边经(富川),神仙眼镜草(玉林),小天青地白(乐业);四川:小火草,野清明草(重庆),天青地白草;贵州:地火草,惊风草;其他:狭叶鼠曲草。

功效 全草:清热利湿,解毒消肿。用于结膜炎,角膜白斑,感冒,咳嗽,咽喉肿痛,尿道炎。外用于乳腺

炎,痈疽肿毒,毒蛇咬伤。

## 7238361

*Gnaphalium polycaulon* Pers. --- *G. indicus* auct. non L.

植物名 多茎鼠麴草《中国植志》

药材名 多茎鼠曲草《广西药录》

文献名 老鼠艾《高植图鉴》

地方名 白花艾(广东、广西),〔白头翁〕(广西、福建);台湾:鼠壳舅,鼠麴舅;海南:黄花艾,田艾(澄迈);广西:青天白地(临群),田灰艾。

功效 全草:用于痢疾,咽肿,感冒发热。

备考 过去文献曾将本种误订为 *G. indicus* L.

## 7238362

*Gnaphalium tranzschelii* Kirp. --- *Gnaphalium uliginosum* L.

植物名 湿生鼠麴草《中国植志》

药材名 湿鼠曲草《汇编》

文献名 鼠曲草《内蒙古中草药》,湿地鼠曲草《中草药学》,无心草《沙漠药植》

地方名 〔白头翁〕(东北)。

功效 全草:止咳平喘,理气止痛,降血压。用于咳嗽气喘,支气管炎,风湿疼痛,胃溃疡,高血压。

## 7238363

*Grangea maderaspatana* (L.) Poir.

植物名 黄花球《广西植录》

文献名 〔荔枝草〕《广西药录》,〔田基黄〕《中国植志》

地方名 广西:田黄菜。

功效 叶:镇痛,调经。用于胃脘痛,咳嗽,月经不调。

## 7238364

*Gynura bicolor* (Roxb.) DC.

植物名 紫背菜《汇编》

文献名 木耳菜、血皮菜、紫背天葵《名实图考》,土三七《华北药志》,天青地红、水前草、水前菜、地黄菜《经济植物学》,观音苋、观音苋根《重庆草药》,红背菜《广西药录》,两色三七草《海南植志》,红背三七《江西药录》,紫背三七、旱三七《中药通报》,红背叶《中草药学》

地方名 红番苋(浙江、福建),红菜(浙江、福建、台湾),当归菜(福建、广西);浙江:叶下红(温州);福建:红毛番(南平),红苋菜,红冬枫(漳州、长泰、南靖),红凤菜(泉州),红番苋,大红菜,血结菜(宁化);台湾:红凤菜;广西:石兰(北流);四川:血匹菜(重庆);云南:水三七(昆明);其他:三七。

功效 全草或茎、叶:凉血止血,清热消肿。用于咳血,血崩,痛经,血气痛,支气管炎,盆腔炎,中暑,阿米巴痢疾。外用于创伤出血,溃疡久不收口,疔疮痈肿,甲沟炎;根:截疟。

## 7238365

*Gynura crepidioides* Benth. --- *Crassoucephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore

植物名 野苘蒿《高植图鉴》

药材名 满天飞《汇编》

文献名 野木耳菜《名实图考》,假苘蒿《南宁药志》

地方名 山苘蒿(海南、广西),革命菜(福建、湖南、广东、广西、云南);福建:金黄花草(晋江、泉州),皇爷膏(福安、福鼎),假苦芥(龙岩),观皮芥(长汀),解放草(大田);湖南:红兵菜;广西:冬风菜(博白),神仙菜(南宁、乐业),野棉花,天旱菜,飞机菜,鸡肉菜,安南草,东风菜,竹筒蒿;云南:民革菜,野青菜(江川),宣伟草。

功效 全草:健脾消肿。用于消化不良,脾虚浮肿。

#### 7238366

*Gynura cusimbua* (D. Don) S. Moore --- *Cacalia cusimbua* D. Don --- *Gynura angulosa* (Wall.) DC.

植物名 西藏三七草《西藏植志》

文献名 木耳菜《名实图考》,箐跌打《汇编》

地方名 云南:石头菜。

功效 全草:接筋续骨,消肿散瘀。用于骨折,跌打扭伤,风湿性关节炎。

#### 7238367

*Gynura divaricata* (L.) DC. --- *Senecio divaricata* L.

植物名 白子菜《汇编》

文献名 白背三七《云南中草药》,叉花土三七《广西植志》

地方名 大肥牛(广东、广西),白血皮菜(广东、四川);浙江:白番苋、白红菜、疔拔(温州);福建:土三七(厦门);广东:白背土三七、白冬枫、东方茶(汕头),白丹枫、白东枫、白东方、枪刀药(潮安),牛肥菜(南澳),清心菜(潮州),红白菜(饶平),东风菜、东方菜(惠阳);海南:白三七,鸡菜;广西:土生地(南宁),土田七,白仔菜药,散血姜,山东风(博白),安屯、软筋草(那坡),山当归(乐业),[白术](富川),红东风菜(陆川),黄土生地,厚面皮;四川:胡豆七,胖儿草;贵州:玉枇杷;云南:三百棒,地滚子,大救驾,百步还阳(昭通),石三七(红河),树三七(保山),接骨丹,紫背天葵,大绿叶。

功效 全草:有小毒。清热解毒,舒筋接骨,凉血止血。用于支气管炎,肺炎,小儿高热,百日咳,目赤肿痛,风湿关节痛,崩漏。外用于跌打损伤,骨折,外伤出血,乳腺炎,疮疡疔肿,烧、烫伤。

#### 7238368

*Gynura procumbens* (Lour.) Merr. --- *Cacalia procumbens* Lour.

植物名 平卧土三七《云南种录》

药材名 蛇接骨《汇编》

文献名 蔓三七草《海南植志》,乌风七《中药大辞典》

地方名 广东:水红背菜、细叶猫菜、小红背菜、小样一点红(惠阳);贵州:烂脚杆叶;云南:回筋口干、树三七(保山),石三七(红河),见肿消,羊草跌打,白叶跌打,接骨草,“帕蚌板”(西双版纳傣语)。

功效 全草:通经活络,消肿止痛,消炎止咳。用于跌打损伤,软组织挫伤,支气管炎,肺结核。

#### 7238369

*Gynura pseudo-china* (L.) DC. --- *Gynura bodinieri* Levl.

植物名 滇紫背天葵《云南药录》

药材名 矮人陀《汇编》

文献名 紫背天葵《名实图考》,牛舌三七《中药大辞典》,土生地《广西中药志》

地方名 广西:土田七;云南:狗头七、岩七(昆明),[水三七](红河),岩三七,反背红,老母猪花头;贵州:[见肿消],[鹿衔草],萝卜母。

功效 块根:有小毒。舒筋活血,凉血,止血。用于贫血或失血过多,风湿痛,跌打损伤,胃痛,疔疮痈肿,皮炎,湿疹。

#### 7238370

*Gynura segetum* (Lour.) Merr. --- *G. japonica* (Thunb.) Juel --- *G. pinnatifida* (Lour.) DC. --- *Cacalia segetum* Lour. --- *Senecio japonicus* Thunb.

植物名 菊叶三七《汇编》

药材名 土三七《滇南本草》、《汇编》

文献名 三七草《纲目》,金不换《秘方集验》,见肿消、乳香草、奶草《纲目拾遗》,[泽兰]、叶下红《辰溪县志》,散血草、和血丹《简易草药》,天青地红《名实图考》,赛三七《质问本草》,破血丹《分类草药性》,血牡丹《天宝本草》,广东人参《新纲》,白田三七《中国土农药志》,汉三七《广西植志》,菊三七《中药大辞典》

地方名 [血当归](湖北、贵州、四川、云南),狗头三七(上海、江苏、浙江),散血丹(陕西、四川、云南),血三七(江西、湖北、湖南、贵州、云南),水三七(河北、云南),艾叶三七(福建、湖南),红背三七(浙江、安徽);黑龙江:东北水三七;北京:鲜三七;陕西:红叶菊,猴子连;江苏:紫三七(南京),红三七(射阳),万肿消(泰县);上海:草三七;安徽:秋三七;江西:狗头七(奉新、婺源),五子爬山(定南),野田七,八能棱,大叶土三七,白田七草(都昌);福建:土山七、香三七(宁德、福安),番三七、红黄、菜三七(霞浦);湖北:紫背三七;湖南:紫蓉三七,铁罗汉,乌七(永兴),破血草(新邵),真泽兰(涟源),苋菜藤(怀化),萝卜三七(黔阳);广西:山田七(全州),三七;四川:鸡血七(巫溪),红当归(叙永),土当归、血气当归(南川);贵州:血七,血格答;云南:九头狮子草(昆明),散血当归、白蒿枝根(红河),盘龙七(东川),九头七(思茅),大泽兰(丽江),岩陀,紫金枝,白田七。

功效 根或全草:散瘀止血,解毒消肿。用于吐血,衄血,尿血,便血,功能性子宫出血,产后瘀血腹痛,大骨节病。外用于跌打损伤,痈疽疮疡,蛇咬伤,外伤出血。

7238371 见 7238372a

#### 7238372

*Helianthus annuus* L.

植物名 向日葵《秘传花镜》、《中国植志》

药材名 向日葵《汇编》

文献名 丈菊、西番菊、迎阳花、西番葵《群芳谱》,向



日葵子(汪连仕《采药书》),一丈菊《名实图考》,向日葵、秋葵子、春葵《分类草药性》,向日葵根《岭南采药录》,向日葵叶《中国药植图鉴》,向日葵花、向日葵壳《民药汇编》,向日葵花托《浙江药录》,向日葵茎髓《江苏药材志》,葵花茎髓《简明中医辞典》

地方名 葵花(湖北、浙江、湖南、山东),向阳花(湖北、甘肃),朝阳花(湖北、浙江、山东),日头花(福建、浙江),望日葵(湖北、湖南),葵花子(湖北、江苏);黑龙江:葵房;河北:向日葵,望日莲(新城);山西:照日葵,日照葵;内蒙古:向日葵瓢;甘肃:转日莲;江苏:向日葵梗心;江西:向日葵茎心;福建:向日葵花盘,头晕花,瓜子花;湖北:向日葵饼,葵花盘,葵梗心,葵根;湖南:向阳光(长沙);四川:太阳花根,太阳花,葵花根;其他:草天葵,九莲灯,黄葵花,滑葵子。

功效 种子:滋阴,止痢,透疹。用于食欲不振,虚弱头风,血痢,麻疹不透;叶:清热解毒。用于疟疾。外用于烫火伤;花序托(花盘):养肝补肾,降压,止痛。用于高血压,头痛目眩,肾虚耳鸣,牙痛,胃痛,腹痛,痛经;根、茎髓:清热利尿,止咳平喘。用于小便涩痛,尿路结石,乳糜尿,咳嗽痰喘,浮肿,白带。

#### 7238372a

*Helianthus tuberosus* L.

植物名 菊芋《中国植志》

药材名 菊芋《汇编》

文献名 芋乃、丫治竹《植物名汇》,菊藷、洋大头《中国植物图鉴》

地方名 洋姜(山东、江苏、河南),洋生姜(浙江、江苏),鬼子姜(东北、河北);北京:拐子姜;陕西:洋菜;上海:洋老姜;广东:番茛;广西:五星草(龙州);贵州:黄葵花;云南:菊薯。

功效 块根、茎、叶:清热凉血,接骨。用于热病,肠热泻血,跌打骨折。

备考 浙江有以地下部分蒸熟,伪充“熟地黄”出售者,宜辨之。

#### 7238373

*Helichrysum arenarium* (L.) Moench.

植物名 沙生蜡菊《中国植志》

功效 全草汁液:利胆,驱虫,利尿。

#### 7238374

*Hemistepta lyrata* (Bunge) Bunge --- *Saussurea affinis* Spreng. --- *S. carthamoides* (Buch.-Ham.) Benth.

植物名 泥胡菜《高植图鉴》

药材名 泥胡菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 苦马菜、牛槁鼻《质问本草》,水苦葵《名实图考》,野苦葵、野红花《植物名汇》,野苦麻《食用植物图说》

地方名 石灰菜(江苏、广西、河南),臭虱子(广东、广西);陕西:小牛箍口(佛坪),奶浆藤(宁陕);山东:秃苍个儿(昆崙山);浙江:石灰青(临安),田青(浙东);安徽:苦尿苔;江西:假蒲公英;湖南:[蒲公英](永兴),剪刀草(新邵);广东:绒球(广州);海南:艾草;广西:胡呢菜,[土白头翁],艾草绒球;贵州:糯米菜,猫骨头;云

南:苦蓝头菜,苦葵菜。

功效 全草:消肿散结,清热解毒。用于乳腺炎,颈淋巴结炎,痈肿疔疮,风疹瘙痒。

#### 7238375

*Heteropappus altaicus* (Willd.) Novopokr. --- *Aster altaicus* Willd.

植物名 阿尔泰狗娃花《中国植志》

药材名 阿尔泰紫菀《汇编》

文献名 铁杆蒿《汇编》,燥原蒿《沙漠药植》,阿尔泰狗娃花《中药大辞典》

地方名 内蒙古:“宝日-拉伯”、“芦格琼”(蒙名);其他:祁州野菊花。

功效 根:散寒润肺,降气化痰,止咳,利尿。用于阴虚咳血,慢性支气管炎;花或全草:清热降压,排脓。用于传染性热病,肝胆火旺,疮疹疮疖,降血压。

备考 新疆以根作紫菀入药;甘肃河西地区及内蒙古阿拉善右旗代野菊花入药。

#### 7238376

*Heteropappus crenatifolius* (Hand.-Mazz.) Griens.

植物名 圆齿狗娃花《中国植志》

药材名 路旁菊《西藏中草》

文献名 圆齿狗娃花《中药大辞典》

地方名 西藏:“其米”(藏名)。

功效 全草:解毒消炎,止咳。用于感冒咳嗽,咽痛,蛇咬伤。

#### 7238377

*Heteropappus hispidus* (Thunb.) Less. --- *Aster hispidus* Thunb.

植物名 狗娃花《中国植志》

药材名 狗娃花《汇编》

文献名 铁杆蒿《植物名汇》,粗毛紫菀《中药志》

地方名 [野菊花]、[野菊](内蒙古、河北);福建:客鸟花;广西:三十六样风(武鸣)。

功效 根:解毒消肿。用于疮肿,蛇咬伤;全草:用于小儿慢惊风。

备考 青海局部地区以根作紫菀用

#### 7238378

*Hieracium coreanum* Nakai

植物名 宽叶山柳菊《长白山植药志》

功效 全草、根:清热解毒,利湿消积。

#### 7238379

*Hieracium krameri* Franch. et Sav.

植物名 山柳菊《名实图考》、《中药大辞典》

药材名 山柳菊《中药大辞典》

文献名 九里明、黄花母《名实图考》

地方名 贵州:细叶水苦葵,牛舌片细辛,剪刀菜(贵阳),刷把细辛(兴义)。

功效 全草、根:外用于洗肿毒。

备考 《高植图鉴》之山柳菊为伞花山柳菊 *H. umbellatum* L.

#### 7238380

*Hieracium umbellatum* L.

10080

山柳菊

植物名 伞花山柳菊《高植图鉴》  
文献名 山柳菊《汇编》, 柳叶蒲公英《品种论述》  
功效 根、全草: 清热解毒, 利湿消积。

## 7238381

*Hippolytia delavayi* (Franch. ex W. W. Smith) Shih ---  
*Tanacetum delavayi* Franch. ex W. W. Smith ---  
*Chrysanthemum delavayi* (W. W. Smith.) Hand.  
-Mazz.

植物名 川滇女蒿《中国植志》  
药材名 菊花参《滇南本草》、《汇编》  
文献名 西南艾菊《汇编》  
地方名 云南: 土参、孩儿参(宾川), 止咳菊(丽江), 止喘菊, 珠儿参。

功效 块根: 补肺止咳, 化痰。用于肺虚咳嗽, 久咳不止, 支气管炎。

## 7238382

*Hippolytia kennedyi* (Dunn) Ling --- *Tanacetum kennedyi* Dunn --- *Chrysanthemum kennedyi* (Dunn) Kitam.

植物名 垫状女蒿《中国植志》  
文献名 藏女蒿《高植图鉴》  
地方名 西藏: “宁把把”(藏名)。  
功效 全草(藏药): 用于喉炎。

## 7238383

*Hololeion maximoviczii* Kitam. --- *Hieracium hololeion* Maxim.

植物名 全光菊《高植图鉴》  
药材名 全光菊《长白山植药志》  
文献名 全缘叶山柳菊《高植图鉴》  
功效 全草: 用于黄疸; 花序: 用于产后流血。

## 7238384

*Inula britannica* L. --- *I. britannica* L. var. *tymiesis* Kudo --- *Conyza britannica* Moris. ex Rurrata

植物名 欧亚旋覆花《中国植志》  
药材名 旋覆花《本经》、《药典》  
文献名 金沸草、盛榘《本经》, 旋覆华、戴榘《别录》, 大花旋覆花《中药大辞典》, 覆花、全福花、全覆花、伏花、旋覆梗《常用中药名辨》

地方名 广西: 福花, 金沸花。  
功效 头状花序(旋覆花): 降气, 消痰, 行水, 止呕。用于风寒咳嗽, 痰饮蓄结, 胸膈痞满, 喘咳痰多, 呕吐噎气, 心下痞硬。

## 7238385

*Inula britannica* L. var. *sublanata* Komar.

植物名 棉毛欧亚旋覆花(拟)  
文献名 毛旋覆花《东北药植志》  
地方名 内蒙古: 旋覆花。  
功效 头状花序: 降气, 消痰, 行水。

## 7238386

*Inula cappa* (Buch.-Ham.) DC.

植物名 羊耳菊《中国植志》  
药材名 羊耳菊《汇编》

文献名 山白芷、土白芷、毛老虎《生草药性备要》, [密蒙花]《名实图考》, 小茅香《分类草药性》, 羊耳菊根《《药典》附录》

地方名 羊耳草(福建、广东、云南), 白面风(浙江、江西、湖南、广东、广西、四川), 大力工(湖南、广西、云南), 白背风、羊耳白背风、白面猫子骨(广东、广西), 叶下白、毛将军(广东、福建), 白毛公(浙江、广东), [白头翁](福建、江西), 白牛胆(浙江、福建、湖南、广东、江西、云南), 过山香(广西、云南), 羊耳风(广西、贵州); 浙江: 八面风; 江西: 白毛风(泰和), 壮牛浪, 绵毛旋覆花(彭泽), 白头枫, 燥骨头, 硬骨飞扬, 看牛郎, [满山香], 黄鼠狼, 白头公(大余), 白面老虎(连山), 黄鼠郎(信丰); 福建: 羊耳茶, 毛茶, 大叶毛什、兔耳草、大叶摩抓(永安), 白头公公、白头风(宁化), 硬壳飞扬(清流、明溪), 水合草, 乌根籽(三明), 乌根、生毛将军、茅香、山枇杷、大过肌草、过肌草、白牛胆根(泉州); 湖南: 毛柴胡, 大麻香, 毛柴香, 土蒙花, 毛秀才、铁牛尾(常德), 土茵陈(东安), [柴胡](麻阳、常宁), 公白头(常宁、藏江), 毛相公、羊耳朵(通道), 白都和(新晃), 隔山香(岳阳), 土紫花(淑浦); 广东: 山芷梅(广州), 白毛茶(顺德、茂名、高州、徐闻、海康), 白面虎(五华), 大力牛(广宁、四会、德庆、封开、怀集), 牛耳风(揭阳), 山鹿茸、冲天白(普宁), 山纸霉、贼佬纸霉(新会), 天鹅绒(阳春), 土柴胡、白毛秀才(黔阳), 土川芎(兴宁), 过山风, 鱼骨草, 白帽顶仔树, 金不换(阳江); 广西: 猪耳风, 大力黄, 白叶菊, 大刀药(桂平), 白羊耳(苍梧), 华耳木(上林), 金边草, 上大黄(龙州), 白背娘, 白饼木(藤县), 白头婆(北流), 白石虎(富川), 山白背(贵县), 驳指草(陆川), 羊耳白背叶, 羊耳白背草, 羊耳白背木, 羊耳木, 柱头草, 补力王, 大黄药; 四川: [寻骨风], 铁杆香, 大茅香(重庆), 大毛香、铁脚毛(南川), 蜡毛香, 毛香叶(峨眉山); 贵州: 乌骨鸡(贵阳); 云南: 黑骨风(昆明), 四能草、真金草、贺郎格、白贺郎格、捻尿棍、白叶黄花、赶火棍、狗屎加贵、毛叶旋覆花(红河), 斑毛叶(玉溪), 蜜蜂干(保山), 黄菜(临沧), 马甘蔗(楚雄、保山), 拈丝根、风肿消(文山), 止血肌, 毛舌头, 止血胆, “娜罕”(傣名)。

功效 全草: 散风清热, 解毒消肿。用于感冒发热, 咽喉肿痛, 风湿疼痛, 痢疮疔毒, 乳腺炎, 疟疾。

## 7238387

*Inula helenium* L. --- *I. racemosa* Hook. f.

植物名 土木香《中国植志》  
药材名 土木香《蜀本草》、《药典》

文献名 青木香《本草衍义》, [黄花菜](小泉《药植》), 新疆本香《鉴别手册》, 总状青木香《中药大辞典》, 总状土木香《中国植志》, 藏木香《中药志》

地方名 河北: 祁木香; 青海: 旋覆花; 新疆: “热散·衣勒特效”(维名); 四川: “麻拉八檀”(藏名); 西藏: “玛奴”(藏名)。

功效 干燥根: 健脾和胃, 调气解郁, 止痛安胎。用于胸胁、脘腹胀痛, 呕吐泻痢, 胸肋挫伤, 岔气作痛, 胎动不安。

备考 《中药通报》11(2):14, 1986 载称:“经实地调查及标本鉴定,新疆木香和藏木香之原植物 *Inula racemosa* Hook. f. (1881) 与祁木香 *Inula helenium* L. (1753) 的植物形态、组织、理化鉴别特征基本一致,分类上无甚区别,宜予合并,后者应作合法学名。”

## 7238388

*Inula helianthus-aquatica* C. Y. Wu ex Ling --- *Inula serrata* Burch. et Franch. --- *Inula yunnanensis* Franch.

植物名 水朝阳旋覆花《中国植志》

药材名 水朝阳旋覆花《鉴别手册》

文献名 [旋覆花]、水朝阳草《滇南本草》,水朝阳、水朝阳根《云南中草药》

地方名 金佛花(四川、云南);四川:伏花;云南:水旋覆,水葵花,野葵花(昆明),金沸草(楚雄),金钱花,水朝阳花。

功效 花:解表,化痰。用于感冒头痛,胸闷咳嗽;根:消肿。用于牙龈、口腔糜烂。

## 7238389

*Inula hookeri* C. B. Clarke

植物名 锈毛旋覆花《中国植志》

功效 全草:用于肌肉神经痛。

## 7238390

*Inula hupehensis* (Ling) Ling --- *Inula helianthus-aquatica* C. Y. Wu ssp. *hupehensis* Ling

植物名 湖北旋覆花《中国植志》

药材名 湖北旋覆花《药学报》

文献名 湖北朝阳花《湖北中草药志》

地方名 旋覆花(湖北、四川、贵州)。

功效 花序:降气,消痰,行水。

## 7238391

*Inula japonica* Thunb. --- *I. britannica* L. var. *japonica* (Thunb.) Franch. et Savat. --- *I. chinensis* Rupr. --- *I. britannica* L. var. *chinensis* Regel

植物名 旋覆花《中国植志》

药材名 旋覆花、金沸草《本经》、《药典》

文献名 覆、盗庚《尔雅》,盛堪《本经》,旋覆华、戴椹《别录》,飞天蕊《侯宁极《药谱》》,金钱花《图经》,野油花《小儿卫生总微论方》,滴滴金、夏菊《纲目》,金钱菊《花史》,艾菊、迭罗黄《群芳谱》,金佛草、白芷胡《分类草药性》,满天星《岭南采药录》,全福花《药材学》

地方名 黄丁香、大黄花、野黄羊(东北),小黄花子、鼓子花(东北、华北),黄花子(东北、江苏),覆花(新疆、河北、陕西、山东、江苏),伏花(上海、四川、青海),小黄花(河北、内蒙古、安徽),六月菊(辽宁、北京、河北、安徽),金沸花(北京、河北、上海、湖北),黄菊花(湖南、青海、山东),牛郎花(北京、河北),[野菊花](山东、青海);吉林:“哈放”(朝名);河北:野菸草,野烟花;内蒙古:“阿拉坦·图素拉·其其格”、“哈用各色槐”(蒙名);陕西:水茵茵(西安);青海:苦苦菜花;山东:猫耳朵花,驴耳朵花,〔野烟〕、狗尾巴、姐姐花(烟台),猫耳朵(莒县、费县、平邑、五莲),猫儿花(郯城、莒南、临沂),柳叶菊(淄博);江苏:旋覆梗,〔黄花草〕,黄熟花(南京),驴

儿菜花(清江),元伏花(苏州),猫耳棵(邳县、睢宁),羊蹄子金棵(铜山),百叶草(泰县),金覆草(东台),旋覆杆(苏州),杨树草(启东),杨树草花,金覆花;浙江:黄花儿(瑞安),白马兰(平阳);安徽:火连草,火镰子棵,蚂蚱膀子;河南:羊耳朵花,鸭子嘴;湖南:独脚黄菊花,黄白花草,吊杆草,金菊花(衡山);四川:毛柴胡,黄柴胡;贵州:水葵花,金盏花。

功效 头状花序(旋覆花):降气,消痰,行水,止呕。用于风寒咳嗽,痰饮蓄结,胸膈痞满,喘咳痰多,呕吐噎气,心下痞硬;地上部分(金沸草):降气,消痰,行水。用于风寒咳嗽,痰饮蓄积,痰壅气逆,胸膈痞满,喘咳痰多。外用于疮疖肿毒。

## 7238392

*Inula linariifolia* Turcz. --- *I. britannica* L. var. *linariifolia* Regel

植物名 条叶旋覆花《药典》

药材名 金沸草《药典》

文献名 细叶旋覆花《吉野》,窄叶旋覆花《沙漠药植》,线叶旋覆花《中药志》,柳穿鱼叶旋覆花《药学报》

地方名 黄菊花、〔旋覆花〕(山东、湖南);山东:毛耳朵花,猫耳朵花,金钱花,驴耳朵花,猫耳朵(莒县、费县、平邑、五莲),〔野菊花〕(平邑),柳叶菊(淄博);江苏:地地筋,牛舌棵;上海:小朵旋覆花,金沸花,伏花,金福花,水马兰,天打马兰,蝎蜈头,羊须草花,黄花鱼草;安徽:蚂蚱膀子,驴耳朵;湖南:独脚黄菊花,金菊草,独脚黄;其他:金沸草。

功效 地上部分(金沸草):降气,消痰,行水。用于风寒咳嗽,痰饮蓄积,痰壅气逆,胸膈痞满,喘咳痰多。外用于疮疖肿毒。

备考 1. 据《中药志》(1988)载:文献中“线叶旋覆花”学名曾用 *Inula linariifolia* Turcz. 或 *Inula lineariifolia* Turcz. 根据《国际植物命名法》规定,应写成 *Inula linariifolia* Turcz. 2. 本品的花序入药服后有恶心呕吐等副作用,有的地区已停止收购。

## 7238393

*Inula nervosa* Wall. ex DC. --- *Aster velliereus* Franch. --- *Inula esquirolii* Levl.

植物名 显脉旋覆花《中国植志》

药材名 小黑药《云南中草药》

文献名 [威灵仙]《滇南本草》,多脉旋覆花《广西药录》,脉叶旋覆花《红河中草药》,威灵菊《汇编》

地方名 广西:牛舌片,黑根草,乌草根(百色);贵州:黑根(兴义);云南:草灵仙(昆明),黑威灵(思茅),〔黑升麻〕,小黑根,〔铜脚威灵〕,〔铁脚威灵〕(丽江),“细那基”(楚雄彝名),头晕药,〔铁脚威灵仙〕。

功效 根:祛风除湿,活络止痛,健胃消食。用于风湿疼痛,腰膝酸软,食欲不振,胃痛。

## 7238394

*Inula pterocaula* Franch.

植物名 翼茎羊耳菊《中国植志》

药材名 大黑药《云南中草药》

文献名 翼茎旋覆花《中药大辞典》

地方名 云南:大黑根(曲靖),货郎杆、(铁脚威灵仙)(红河),〔青羊参〕,大威灵仙,大黑洋参,石如意。

功效 根:补虚,清热解毒。用于跌打损伤,胃痛,体虚,虚咳,腹泻,头晕,耳鸣,自汗,失眠,阿米巴痢疾,脾脏肿大,产后血虚,骨结核,疮痈肿痛;嫩枝:外用于外伤。

#### 7238395

*Inula salicina* L.

植物名 柳叶旋覆花《中国植志》

文献名 歌仙草《中药志》

备考 北方某些地区商品旋覆花中发现有用本品的花瓣掺杂者。

#### 7238396

*Inula salsoloides* (Turcz.) Ostenf.

植物名 藜子朴《中国植志》

药材名 黄蓬花《汇编》

文献名 沙旋覆花《内蒙古中草药》,沙地旋覆花《中药大辞典》,小叶旋覆花《汇编》,〔黄花蒿〕《沙漠药植》

地方名 河北:山猫眼(宣化);内蒙古:绞蛆爬,“额勒森·阿拉坦·都拉苏”(蒙名);新疆:“巴不那”(维名);甘肃:旋覆花,小黄花,黄花叶,黄花叶杆,四棱草,秃女子草,黄喇嘛;陕西:细叶黄花,钻骨草。

功效 全草:清热利湿,杀虫。用于急性细菌性痢疾,急、慢性肠炎。外用于疮痈肿毒,黄水疮,湿疹,灭蛆。

#### 7238397

*Inula wissemanniana* Hand.-Mazz. --- *I. eupatorioides* auct. non DC.

植物名 滇南羊耳菊《中国植志》

药材名 小羊耳菊《峨山彝族药》

地方名 云南:“恩喀勃西里若”(峨山彝名),“纳绕西利若”(玉溪彝名),火把梗。

功效 根:健脾消食,补中益气。用于小儿疳积。

备考 《云南种录》(1984)将 *I. eupatorioides* DC. 列作误订异名。

#### 7238398

*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai --- *Lactuca chinensis* (Thunb.) Makino

植物名 山苦荬《高植图鉴》

药材名 苦菜《汇编》

文献名 光叶苦荬菜《内蒙古中草药》,山苦菜《汇编》,兔仔草《台湾中药材图鉴》

地方名 〔败酱草〕(吉林、辽宁、陕西、宁夏、山东、河南),黄鼠草(陕西、甘肃),高砂草(华南),鸭子食(东北),苦麻菜(东北、四川),苦荬菜(内蒙古、陕西);内蒙古:“素斯·乌布斯”、“塞勒·得嘎拉”(蒙名),燕儿衣;陕西:小苦苣,活血草,隐血丹,小苦荬,奶浆菜(眉县),面条子(洛南);青海:“杂迟”(藏名);山东:小苦菜、大苦菜(崂山、威海、文登、荣成、莱芜),白刺刺菜(广饶),苦酱碟菜(荣成),酱碟子、苦丁菜(烟台);浙江:中华苦荬菜;福建:小号蒲公英,台湾:〔蒲公英〕(台北),鹅仔

菜,兔仔菜,小金英,鹅仔草,英仔草,本蒲公英;河南:叶叶苗,叶苗,剪子股,燕屈子,燕子鱼;广西:七托莲(苍梧),小苦荬菜(富川);四川:〔银柴胡〕(峨眉);其他:苦叶苗,尖刀仔菜,〔败酱〕,野苣荬,奶浆草。

功效 全草:清热解毒,破瘀活血,排脓。用于阑尾炎,腹腔脓肿,肠炎,痢疾,急、慢性盆腔炎,肺热咳嗽,肺结核,吐血,衄血,跌打损伤,疮疖肿痛,黄水疮,阴囊湿疹。

#### 7238399

*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai ssp. *versicolor* (Fisch. ex Link) Kitam. --- *Lactuca versicolor* (Fisch.) Sch.-Bip. --- *Ixeris graminifolia* (Ledeb.) Kitag.

植物名 变色山苦荬《云南种录》

药材名 苦苣《嘉祐本草》、《中药大辞典》

文献名 野苣《千金·食治》,编苣、苦苣根《嘉祐本草》,苦麻儿、尖刀子草、兔仔菜《植物名汇》,兔子菜《江苏植志》,山苦荬、苦菜《中药志》,变色苦荬《西藏植志》,变色苦菜、东北苦菜、丝叶山苦荬《汇编》

地方名 苦麻菜、鸭子食(东北),〔败酱〕、〔败酱草〕(吉林、辽宁、宁夏、山东);吉林:苦麻子,小蓟;福建:〔蒲公英〕(厦门),兔草、乳草、〔大本蒲公英〕(泉州);广东:金锁匙;其他:强刀苦花。

功效 全草:用于黄疸,疔疮,痈肿;根:用于痢疾。

#### 7238400

*Ixeris debilis* A. Gray --- *I. japonica* Nakai --- *Lactuca debilis* Maxim.

植物名 剪刀股《高植图鉴》

药材名 剪刀股《救荒本草》、《汇编》

文献名 低滩苦荬菜《拉汉英种称》,日本苦荬菜《广西药录》

地方名 〔蒲公英〕(浙江、福建、广西);广东:鸭舌草,假蒲公英,假脉蒲公英(惠阳),软枝鸭舌草、田鸭舌草(潮阳),黄花鸭舌草(澄海),鸭舌苦草(汕头),鸭舌红(普宁),鹅公英(揭阳),淡水鸭舌草(南沃),红背仔(陆丰);广西:假脉菜、土公英(陆川);四川:剪刀草(成都)。

功效 全草:清热凉血,利尿消肿。用于肺热咳嗽,喉痛,口腔溃疡,急性结膜炎,阑尾炎,水肿,小便不利。外用于乳腺炎,疮疖肿毒,皮肤瘙痒。

#### 7238401

*Ixeris dentata* (Thunb.) Nakai --- *Lactuca thunbergii* Gray

植物名 齿缘苦荬《高植图鉴》

文献名 小苦菜《广西植录》,苦瓜菜《中药志》,齿缘苦菜《云南种录》

地方名 江西:苦菜。

功效 全草:清热解毒,活血祛瘀,排脓。用于阑尾炎,痢疾,肠炎,疮疖,脓肿,吐血,衄血。

#### 7238402

*Ixeris denticulata* (Houtt.) Stebb. --- *Youngia denticulata* (Houtt.) Kitamura

植物名 苦荬菜《高植图鉴》

药材名 苦蕒菜《嘉祐本草》、《中药大辞典》

文献名 总《诗经》，苕菜《诗义疏》，光叶苦《名实图考》，野苦蕒菜《汇编》，苦蕒《植物名汇》

地方名 [大蕒] (陕西、甘肃)，[败蕒草] (吉林、辽宁、河北、青海、宁夏、山东)，苦蕒 (陕西、安徽)；陕西：盐儿草，[一点红] (榆林)；甘肃：秋苦蕒菜，苦蕒罐罐；江苏：[墓头回] (苏州)，稀须菜 (新海连)；浙江：[千里光]；安徽：剪子股，猴屁股，大雁尾，小燕尾，瞿瞿菜；湖北：山林水火草，苦蕒麻 (宜昌)；湖南：[鸭舌草]，苦球菜；广西：[黄花草] (靖西)；贵州：牛舌片 (绥阳)。

功效 全草或根：清热解毒，散瘀止痛，止血，止带。用于子宫颈糜烂，白带过多，子宫出血，下腿淋巴管炎，跌打损伤，无名肿毒，乳痈脓肿，烧、烫伤，阴道滴虫病。

#### 7238403

*Ixeris denticulata* (Houtt.) Stebb. f. *pinnatipartita* (Makino) Stebb. --- *Youngia denticulata* (Houtt.) Kitamura f. *pinnatipartita* (Makino) Kitamura --- *Paraixeris pinnatipartita* (Makino) Tzvelev --- *Paraixeris denticulata* (Houtt.) Nakai f. *pinnatipartita* (Makino) Nakai

植物名 羽叶苦蕒菜《东检》

药材名 羽叶苦蕒菜《东北药用植物》

功效 全草或根：清热解毒，凉血消肿，散瘀止痛，止血，止带。用于子宫颈糜烂，白带过多，子宫出血，血淋，下腿淋巴管炎，跌打损伤，无名肿毒，阑尾炎，肺病，疖肿，烧、烫伤，毒虫咬伤，阴道滴虫病。

#### 7238404

*Ixeris gracilis* (DC.) Stebb. --- *Lactuca gracilis* (Wall.) DC.

植物名 细叶苦蕒《高植图鉴》

药材名 细叶苦蕒《湖南药物志》

文献名 细苦蕒菜《广西药录》，细叶苦蕒菜、粉苞苣《汇编》，细叶苦蕒《云南种录》

地方名 浙江：纤细苦蕒菜 (浙南)；湖南：白花莲；广西：蛇箭草 (金秀)，蛇前草，小黄草，铁扫把 (西林)，生枪药 (隆林)；贵州：牛舌片细辛；西藏：“杂赤威包” (藏名)。

功效 全草：清热解毒，消炎，止痛。用于黄疸型肝炎，结膜炎，疖肿，酒糟鼻。

#### 7238405

*Ixeris laevigata* (Blume) Sch.-Bip. var. *lanceolata* (Makino) Kitam.

植物名 马尾丝《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾：刀伤草，大公英，大本蒲公英，牛舌痲，三板刀，龙舌痲。

功效 全草：用于痢行，胆炎，肝炎，肠炎。

#### 7238406

*Ixeris polycephala* Cass. --- *Lactuca polycephala* (Cass.) Benth.

植物名 多头苦蕒《高植图鉴》

药材名 多头苦蕒《中药志》

文献名 多头苣荬《广州植志》，野苦蕒《中药志》，多头苦蕒菜《秦岭植志》，多头苦蕒《云南种录》

地方名 [蒲公英] (广东、广西)；江苏：[剪子股]，[还魂草] (宝应)；广东：黄花山鸭舌草、山鸭舌草 (潮阳)，[黄花地丁] (汕头)，鸭舌草 (海丰)，剪刀菜 (潮安)，鹅仔菜 (饶平)。

功效 全草：清热解毒，利湿消痞。用于肺热喉痛，腹痛，痞块，阑尾炎。外用于疔疮肿毒，乳癌，目赤肿痛，皮肤风疹。

#### 7238407

*Ixeris ramosissima* (Benth.) Stebb.

植物名 剪刀菜《贵州药录》

功效 全草：清热解毒，利尿消肿。用于乳腺炎，急性结膜炎，淋病，水肿，无名肿毒。

#### 7238408

*Ixeris sonchifolia* (Bunge) Hance --- *Ixeris denticulata* (Houtt.) Stebb. ssp. *sonchifolia* Stebb.

植物名 抱茎苦蕒菜《高植图鉴》

药材名 苦碟子《汇编》

文献名 苦蕒菜《汇编》，抱茎苦蕒菜《鉴别手册》

地方名 [败蕒草] (辽宁、新疆、山东)；黑龙江：[满天星]；陕西：黄鼠草 (石泉)；山东：小苦蕒，大苦蕒 (昆嵛山、威海、文登、莱芜)，白刺刺菜 (广饶)，苦蕒菜 (荣成)。

功效 全草：止痛，清热解毒，消肿。用于头痛，牙痛，胃肠痛，外伤作痛，阑尾炎，肠炎，肺脓肿，痈肿疮疖。

#### 7238409

*Ixeris sonchifolia* (Bunge) Hance var. *serotina* (Maxim.) Kitag.

植物名 秋抱茎苦蕒菜《长白山植药志》

药材名 苦碟子《中草药》

功效 全草：镇痛，清热，解毒，消肿。

#### 7238410

*Ixeris versicolor* (Fisch.) DC. var. *chrysantha* Freyn

植物名 黄花苦蕒菜《海南植志》

功效 全草：泻下。

#### 7238411

*Jurinea mongolica* Maxim. --- *J. potanini* auct. non Ilijin

植物名 蒙疆苓菊《高植图鉴》

药材名 鸡毛狗《宁夏中草》

文献名 蒙古久苓草《中药大辞典》，蒙新久苓菊《内蒙古植志》

地方名 内蒙古：“呼绷图-乌布斯” (蒙名)，地棉花。

功效 茎基部绵毛：止血。用于外伤出血，鼻血。

备考 《新华本草纲要》注称：*Jurinea potanini* Ilijin 我国不产。

7238412 见 7238411

#### 7238413

*Kalimeris indica* (L.) Sch.-Bip. --- *Asteromoea indica* (L.) Blume --- *Aster indicus* L.

植物名 马兰《中国植志》

药材名 马兰《本草拾遗》、《汇编》

文献名 紫菊《本草拾遗》，阶前菊《履巉岩本草》，鸡儿肠、马兰头《救荒本草》，竹节草《摘元方》，马兰菊《医林纂要》，蟋蟀菊《质问本草》，鱼鳅串《草木便方》，红便菜《本草正义》，山菊花、蓝菊花、紫蒿、鳅串儿《植物名汇》，马兰草《药典》

地方名 田边菊(江西、福建、湖南、广东、四川)，路边菊(上海、安徽、福建、湖北、广东、云南)，泥鳅串(陕西、湖北、广西、四川、贵州、云南)，散血草(湖北、云南、四川)，泥鳅菜(湖北、四川、贵州、广西)，山菊(华南)，(野菊花)(广东、湖南、广西)，一枝香(江西、安徽)，黄鳝草(云南、四川)；上海：蟋蟀头草；浙江：红马兰，马兰青，马来青(平阳)；江西：黄鳅串(德兴)，马兰格(婺源)，田梗菜(丰城)，黄鸡菜，马连甲，黄秋菜，黄秋草；福建：田菊(莆田、松溪、政和、寿宁、龙溪)，毛麒麟(闽南)，蓝花菊(泉州)，田头菊(龙岩)，田茶菊(建阳)，水金菊(厦门)，黄秋串(宁化)，马兰齐，(南柴胡)、园地菊(福安)，咽喉草，土菊花，马兰参，兰花仔，黄鳅莲，松扁簪，乌鸡菊，老鸡樵，田菊花，乌脚草，草菊仔，丕草，其草；湖北：烧伤草；湖南：鸡油肠，田蒿子，剪刀草，马兰丹，马儿蛋；广东：无人花，田基菊(广州)，脾草(汕头)，白花莲(翁源)，百罗草，鸡肉菜(惠阳)，青里及、定经草(潮阳)，脾仔草(潮汕)，脾白草(澄海)，伤脾草(潮安)，天脾草(潮安、揭阳)，马兰花(广州)；广西：叶扬(贵县)，地锦、菊花根(藤县)，茶子草(玉林)；四川：鱼鳅草，乌丹草，红蓝菊，鱼鳅鳝；云南：蓑衣莲，细根药。

功效 全草：理气，消食，清利湿热。用于胃脘胀痛、痢疾、水泻、尿路感染。

#### 7238414

*Kalimeris indica* (L.) Sch.-Bip. var. *stenolepis* (Hand.-Mazz.) Kitam. --- *Asteromoea indica* var. *stenolepis* Hand.-Mazz.

植物名 狭苞马兰《浙南本草新编》

药材名 路边草《陕西中草药》

文献名 窄叶马兰《陕西中草药》，窄叶鸡儿肠《中药大辞典》

地方名 陕西：星星蒿、花叶鱼鳅串(眉县)，鸡儿肠。

功效 全草：消食健胃，祛瘀解毒。用于小儿疳积、腹泻、痢疾、蛇咬伤、外伤出血。

#### 7238415

*Kalimeris integrifolia* Turcz. ex DC. --- *Asteromoea pekinensis* Hance

植物名 全叶马兰《中国植志》

药材名 全缘叶马兰《浙南本草新编》

文献名 全叶鸡儿肠《江苏植志》，野粉团花《高植图鉴》

地方名 江苏：铁条蒿；广西：路边菊。

功效 根及全草：理气，消食，清利湿热。

#### 7238416

*Kalimeris lautureana* (Debx.) Kitam. --- *Asteromoea lautureana* (Debx.) Hand.-Mazz.

植物名 山马兰《中国植志》

药材名 山马兰《长白山植药志》

文献名 山野粉团花《高植图鉴》，伤食草、开脾草《品种论述》，山鸡儿肠《东检》

地方名 天津：[一枝蒿]。

功效 全草：理气，消食，清利湿热。

#### 7238417

*Kalimeris mongolica* (Franch.) Kitam. --- *K. pinnatifidus* (Makino) Kitam. --- *Aster mongolicus* Franch.

植物名 蒙古马兰《中国植志》

药材名 裂叶马兰《汇编》

文献名 北紫菀《广西植录》，北方马兰《高植图鉴》，羽叶马兰《中药志》

地方名 陕西：鱼鳅串(黄龙)。

功效 全草：理气，消食，清利湿热。

备考 全草在四川民间作刘寄奴用。

#### 7238418 见 7238417

#### 7238419

*Kalimeris shimadai* (Kitam.) Kitam. --- *Aster shimadai* (Kitam.) Nemoto --- *Asteromoea shimadi* Kitam.

植物名 毡毛马兰《中国植志》

药材名 毡毛马兰《浙南本草新编》

文献名 岛田鸡儿肠《江苏南部种册》

功效 根及全草：理气，消食，清利湿热。

#### 7238420

*Lactuca formosana* Maxim.

植物名 台湾莴苣《汇编》

药材名 丁萝卜《汇编》

文献名 小山萝卜、龙啞口《草木便方》，花苦菜《植物名汇》，苦丁《四川中药志》，八楞木、八楞麻《中草药通讯》

地方名 高脚蒲公英(华南、华中)；江苏：九刀参(盱眙)，乳浆草(吴县)；浙江：双股金钗(衢县)；江西：(满天星)，一逢雪，野芥菜，野苦菜，野苦麻，花叶野萝卜，见肿消，银锁匙，苦麻；河南：娥子草；湖南：大叶蜈蚣草，苦蕒，野苦蕒，羊奶草，杨梅蕒；四川：叉头草，龙吞口，双叉萝卜(峨眉山)，奶参(南充)。

功效 全草或根：有小毒。清热解毒，祛风活血。用于口腔溃瘍，咽喉肿痛，慢性阑尾炎，阑尾周围炎，瘀血腹痛，白带。外用于乳腺炎，疮痈肿毒，毒蛇咬伤，痔疮。

#### 7238421

*Lactuca graciliflora* (Wall.) DC.

植物名 细花莴苣《高植图鉴》

文献名 纤花莴苣《广西药录》

地方名 广西：小叶野苦石菜(凤山)。

功效 全草：用于癆咳，疮疖，蛇咬伤。

#### 7238422

*Lactuca henryi* Dunn

植物名 蒙自莴(云南种录)

药材名 箭叶莴《汇编》

文献名 三角草《云南药录》

地方名 云南：土半夏，犁头浆草，犁铧草。

功 效 全草:清热解毒,止血。用于咳嗽,癰疽,痔瘡出血,皮癬。外用于乳腺炎,疮疖,无名肿毒,毒蛇咬伤。

## 7238423

*Lactuca indica* L. --- *Lactuca brevirostris* Champ. --- *L. lanciniata* (Houttuyn) Makino --- *Prenanthes squarrosa* Thunb.

植物名 山莴苣《高植图鉴》。

药材名 山莴苣《救荒本草》、《汇编》

文献名 仙人杖草《本草拾遗》,山苦菜《满州植录》,鸭子食《东检》,白龙豆、苦芥菜、苦菜《中国药植图鉴》,条裂山莴苣《汇编》,白龙头《南京民间药草》

地方名 野生菜(广东、广西),野莴苣(浙江、海南、广西),〔满天星〕(广东、台湾),〔蒲公英〕(福建、台湾);陕西:〔败酱〕(宜川);江苏:苦地牙,碎骨草,土莴苣,猪人参(苏州),蝴蝶菜(云台山);浙江:苦麻(云和、龙泉);江西:山芥菜;台湾:马尾丝,鹅仔草,山芥草;河南:驴下粮,苦马菜,野大烟,假人参;广东:英仔草(广州),山苦菜;广西:〔苦莴菜〕,苦莴菜,山墨菜,山苦菜(贺县),〔剪刀菜〕(全州);四川:苦马地丁、米汤糊,〔败酱草〕(成都);贵州:〔一枝蒿〕,土洋参;云南:〔土人参〕(镇雄);其他:〔人参〕,〔土力参〕,〔朝鲜参〕,〔园参〕。

功 效 全草或根:清热解毒,活血祛瘀。用于阑尾炎,扁桃腺炎,子宫颈炎,产后瘀血作痛,崩漏,痔疮下血,疮疖肿毒。

## 7238424

*Lactuca morii* Hayata

植物名 台湾山莴苣《汇编》

地方名 四川:苦马地丁(成都),〔败酱草〕。

备 考 全草:四川地区有以此混作败酱草入药者,应注意鉴别。

## 7238425

*Lactuca raddeana* Maxim.

植物名 毛脉山莴苣《高植图鉴》

药材名 山苦菜《汇编》

文献名 老蛇药、野洋烟《汇编》

功 效 全草、根:清热解毒,祛风除湿,镇痛。用于风湿关节疼痛,疮痒肿毒,蛇咬伤。

## 7238426

*Lactuca raddeana* Maxim. var. *elata* (Hemsl.) Kitam. --- *L. elata* Hemsl.

植物名 高莴苣《高植图鉴》

药材名 水紫菀《陕西中草药》

文献名 高株山莴苣、野洋烟、野洋烟根《中药大辞典》

地方名 山苦菜(安徽、贵州);广西:兔麦,奶浆草,山蒲公英;广东:老蛇药。

功 效 花、嫩叶及根:清热解毒,驱风,除湿,镇痛;花、嫩叶:用于发痧腹痛,痈疮疔肿;根:用于风湿关节疼痛,蛇咬伤。

## 7238427

*Lactuca sativa* L. --- *L. scariola* L. var. *sativa* (L.) Hook. f.

植物名 莴苣《食疗本草》、《高植图鉴》

药材名 莴苣子《纲目》、《汇编》

文献名 莴苣菜《肘后方》,生菜、白苣《千金·食治》,千金菜《清异录》,莴笋《滇南本草》,莴苣子、石苣、莴菜《纲目》,千层刺《名实图考》,生菜花《植物名汇》,生菜子《祁州药志》,苣子、叶莴苣《中国蔬菜》,藤菜、苣藤子《河北药材》

地方名 河北:巨胜子,白巨胜子(天津);山西:白苣子;浙江:猫舌头(天目山);广东:莴子(梅县);云南:青笋;其他:黑巨胜子,红桂花。

功 效 果实:活血,祛瘀,通乳。用于乳汁不通。扭伤腰痛,跌打损伤,骨折;茎叶:用于热毒,疮肿,口渴,小便不利,尿血。

## 7238428

*Lactuca sativa* L. var. *angustata* Irisch ex Bremet

植物名 莴笋《北京植志》

药材名 巨胜子《北京植志》

功 效 种子(巨胜子):活血,止痛,下乳,利尿。

## 7238429

*Lactuca serriola* Torn.

植物名 锯齿莴苣《秦岭植志》

药材名 野莴苣《新疆中草药》

地方名 新疆:牙娃乌苏(南疆)。

功 效 种子:活血,祛瘀,通乳。

## 7238430

*Lactuca sororia* Miq. --- *L. diversifolia* Van. ---

*Paraprenanthes sororia* (Miq.) Chang

植物名 堆莴苣《高植图鉴》

药材名 山苦菜《救荒本草》、《中国植物图鉴》

文献名 甜麦、空筒菜《广西植录》,异叶莴苣《湖南药物志》,成丛山苦菜《品种论述》,山苦菜《贵州药录》

地方名 江西:〔蒲公英〕;湖南:山活血,江维草,铁麻。

功 效 根、全草:用于疮疖肿毒,外伤出血,蝮蛇咬伤。

## 7238431

*Lactuca tatarica* (L.) C. A. Mey. --- *Mulgedium tataricum* DC.

植物名 紫花山莴苣《内蒙古中草药》

文献名 苦菜《本草经集注》,钩菜《尔雅》,苦板《纲目》,蒙山莴苣《高植图鉴》,紫花莴苣《沙漠药植》

地方名 山西:〔败酱草〕;内蒙古:苦菜。

功 效 地上部分:清热解毒,凉血利湿。

## 7238432

*Lactuca triangulata* Maxim.

植物名 翼柄山莴苣《高植图鉴》

药材名 翼柄山莴苣《长白山植志》

功 效 根及全草:清热解毒,活血祛瘀。

## 7238433

*Lagdera alata* (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv. --- *Conyza*

alata Roxb.

植物名 六棱菊《中国植志》

药材名 六棱菊《汇编》

文献名 鹿耳苓、鹿耳草《生草药性备要》，鹿耳翎《本草求原》，六耳棱《广西中药志》，羊毛草根《贵州草药》，四棱锋《云南种录》

地方名 四方消、三棱艾、六耳消、四方艾（湖南、广西），鸡着裤（湖南、广东），臭灵丹（江苏、浙江、云南），狼毒草（福建、广西、云南）；浙江：红四轮风（温州）；江西：八棱麻（婺源），八棱枫；福建：八十缺，八楞风，八面风（宁德、霞浦），八楞针，八楞锋，六角瓣，六什头，六毒草，六十瓣（福州、闽清），六角心，六盘金（闽东），六角草，六达草（莆田、仙游、龙岩），六角仙（大田），毛六猬，蜡达草，羊仔草，羊仔菊，[土防风]（福安），劳毒草（松溪、政和、漳州、南靖、长泰等），[旋覆花草]（仙游、泉州、晋江、厦门），四角草（三明），四岭风（宁化），百毒草，鹿都草，鹿肚草（罗源），绿肚草，洋桃瓣，[覆花草]（泉州），狗咬痕（漳州），八片风（福安）；湖南：小八面风（黔阳）；广东：羊耳三稔，羊耳三楞，山黄菊、百草王、百鸟朝王、挡路猫（潮阳），三稔草（普宁）；海南：六棱锋，六耳铃；广西：鞭轴风，四方根，陆续消，三面风（贵县），六练风（玉林），六畜草、包骨草（博白），木局草、木碌草（平南），木样草（蒙山），假生烟（钟山），羊耳山（富川），飞荣草；贵州：羊毛草，闷药；云南：大败酱草，白莲草，山臭灵丹。

功效 全草：祛风利湿，活血解毒。用于风湿关节炎，闭经，肾炎水肿。外用于痈疔肿毒，跌打损伤，烧烫伤，毒蛇咬伤，皮肤湿疹；根：调气，补虚，清热，解表。用于妇女虚癆，闭经，风热感冒。

#### 7238434

*Laggera pterodonta* (DC.) Benth. --- *Laggera purpurascens* Sch.-Bip. ex Hochst. --- *Blumea pterodonta* DC.

植物名 翼齿六棱菊《中国植志》

药材名 臭灵丹《滇南本草》、《汇编》

文献名 狮子草《滇南本草》，[飞廉]《名实图考》，阔苞菊、格杂树、栾桦《高植图鉴》，齿翅臭灵丹《中药志》，臭灵丹草《药典》，鹿耳林、大黑药《汇编》

地方名 广西：三棱线（桂平），三棱木（苍梧），六耳棱（苍梧、梧州）；贵州：黄牛草；云南：六棱菊，臭叶子（昆明），臭树、归经草（玉溪），山林丹（楚雄），野腊烟（红河），野辣烟，粘蒿枝，齿翼臭灵丹，“娜溜”（西双版纳傣语），鱼富有，臭草叶。

功效 地上部分：清热解毒，止咳祛痰。用于风热感冒，咽喉肿痛，肺热咳嗽，风热毒疮，痘疮，截疟。

#### 7238435

*Lapsana apogonoides* Maxim.

植物名 稻槎菜《高植图鉴》

药材名 稻槎菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 禾槎草《广西植录》

地方名 浙江：鹅里庵（衢县），回荠（杭州）；福建：小号兔仔草（泉州），小号乳草（福鼎），田黄花草（霞浦），兔草（福安）。

功效 全草：清热凉血，消痈解毒。用于喉炎，痢疾下血，乳痈。

#### 7238436

*Launaea acaulis* (Roxb.) Babc. --- *L. glabra* (Wight) Franch.

植物名 无茎栓果菊《高植图鉴》

药材名 滑背草（广西）

文献名 光栓果菊《广西植录》，栓果菊《海南植志》，滑背草鞋《广西中草药》，滑背草鞋根《汇编》，光茎栓果菊《云南种录》，光叶栓果菊《广西本草选编》

地方名 广西：土蒲公英，[蒲公英]（来宾、南宁），滑叶草鞋根，野破血丹。

功效 全草：清热解毒。用于消化不良，尿路感染，结膜炎，阑尾炎，疖肿腮腺炎，乳腺炎。

#### 7238437

*Leibnitzia anandria* (L.) Nakai --- *Gerbera anandria* (L.) Sch.-Bip.

植物名 大丁草《高植图鉴》

药材名 大丁草《纲目》、《汇编》

文献名 烧金草《纲目》，小火草《云南药录》，天青地白《陕西中草药》，大丁黄《植物名汇》

地方名 和尚头花、芋茨花（东北）；吉林：藤草；内蒙古：“哈达嘎素-乌布斯”（蒙名），地丁；陕西：见肿消、三杆旗（陕北），白龙箭（安康），白背草、猴鼻草（留坝），一柱香（宁强），小青奇（柞水、宝鸡），一枝箭（柞水），野蒿苣，长叶菜，华陀草（宝鸡）；湖南：山萝卜，蛇胆草，七月一枝枪，白脚莲，茅里一枝箭，大退凉、表忠草、清脉液（衡阳），雅白菜（通道侗族），拔毒草、苦白菜（花垣苗族），铺地白（土家族）；广西：蒲脚莲（全州）；贵州：豹子药，苦马菜，米汤菜，鸡毛蒿，白小米菜，踏地香，龙根草，翻白叶，豹子草；云南：“白衣背定”（楚雄彝名），火草，假火草，毛大丁草（丽江），白蒿枝（元江），红叶火草（玉溪）。

功效 全草：清热利湿，解毒消肿，止咳，止血。用于肺热咳嗽，肠炎，痢疾，尿路感染，风湿关节痛。外用于乳腺炎，痈疔肿毒，疔疮，烧烫伤，外伤出血。

#### 7238438

*Leontopodium andersonii* C. B. Clarke

植物名 松毛火绒草《中国植志》

药材名 竹叶火草《元江哈尼族药》

地方名 云南：“地扎杂让”（元江哈尼语），小地松（蒙自），火草。

功效 全草：清热，利湿，止血。用于湿热黄疸，外伤出血。

#### 7238439

*Leontopodium artemisiifolium* (Levl.) Beauv. --- *Gnaphalium atremisiifolium* Levl.

植物名 艾叶火绒草《中国植志》

药材名 蛾药《云南昭通》

功效 全草：用于扁挑体炎，喉炎。

#### 7238440

*Leontopodium calocephalum* (Franch.) Beauv. var.



uliginosum Beauv.

植物名 湿生美头火绒草《云南种录》

功效 全株(磨粉外敷):用于风湿痛。

#### 7238441

*Leontopodium conglobatum* (Turcz.) Hand. - Mazz.

植物名 团球火绒草《中国植志》

药材名 剪花火绒草《内蒙古中草药》

功效 地上部分:清热凉血,利尿。

#### 7238442

*Leontopodium dedekensii* (Bur. et Franch.) Beauv.

植物名 戟叶火绒草《中国植志》

文献名 分枝火绒草《青藏药图》

地方名 青海:“扎哇”(藏名);云南:火绒,火草,白蒿(大理),火艾。

功效 全草:制成艾条状,作艾灸用。

#### 7238443

*Leontopodium forrestianum* Hand. - Mazz.

植物名 鼠麴火绒草《中国植志》

药材名 小火绒草《云南药录》

地方名 云南:小火草、细火草、天育地白(红河)。

功效 全草:清肝明目,消炎生肌,止咳驱虫。用于小儿腹泻,蛔虫症,感冒咳嗽,急慢性支气管炎。外用于角膜云翳,外伤,疮疡久不收口。

#### 7238444

*Leontopodium japonicum* Miq.

植物名 薄雪火绒草《中国植志》

药材名 薄雪火绒草《汇编》

文献名 薄雪草《秦岭植志》,火艾《中国植物图鉴》,小毛香《陕西中草药》

地方名 陕西:火绒草,小白头翁,〔白头翁〕(凤县)。

功效 花:止咳。用于咳嗽。

#### 7238445

*Leontopodium leontopodioides* (Willd.) Beauv.

植物名 火绒草《中国植志》

药材名 火绒草《汇编》

文献名 薄雪草、白艾《陕甘宁植志》

地方名 老头草、老头艾(东北、内蒙古);辽宁:〔白头翁〕(安东、营口、盖县);河北:火绒蒿;内蒙古:“孟根-阿给”、“海哥斯梭利”(蒙名);甘肃:大头毛香;青海:小矛香艾,“扎托巴”(藏名);山东:链草、小白蒿、香草(昆崙山),白花蒿(莱芜),香人艾(莒南、沂水、沂源),白头蒿、香蒿(崂山),九头艾(泰山);四川:“巴娃呷波”(藏名)。

功效 地上部分:清热凉血,利尿。用于急性肾炎,止血。

#### 7238446

*Leontopodium nanum* (Hook. f. et Thoms.) Hand. - Mazz.

植物名 矮火绒草《拉汉英种称》

药材名 矮火绒草(青海)、《中草药》

功效 地上部分:疏风解表,清热凉血,止血。用于风热感冒,急慢性肾炎,尿道炎,创伤出血。

#### 7238447

*Leontopodium sinense* Hemsl. --- *Gnaphalium sinense* (Hemsl.) Franch.

植物名 华火绒草《中国植志》

药材名 多枝火绒草《汇编》

文献名 蛾药《云南中草药》,中国火绒草《中药大辞典》

地方名 云南:火把花、火草(昭通)。

功效 根:清热解毒,消炎止痛。用于扁桃体炎,咽喉炎。

#### 7238448

*Leontopodium wilsonii* Beauv.

植物名 川西火绒草《中国植志》

药材名 细火草《汇编》

文献名 草金杉《云南药录》,小地松《红河中草药》

地方名 星苞火绒草、棉蒿、棉羊头、黄花粑粑叶、火草、羊头火草(四川、云南);云南:七头风、糙叶地丁、松香草、野杉根、白背苇谷草。

功效 全草:止咳平喘,驱虫止泻。用于感冒,咳嗽,哮喘,蛔虫症,小儿腹泻,外伤出血,高血压,癫痫,风湿病等。

#### 7238449

*Ligularia achyrotricha* (Diels) Ling --- *Senecio purdonii* Turr.

植物名 刚毛橐吾《中国植志》

药材名 刚毛山紫菀(拟)

文献名 褐毛橐吾、马蹄草《高植图鉴》

地方名 陕西:一碗水(眉县);青海:“龙肖”(藏名)。

功效 根、叶:催吐。外用于疮疖。

#### 7238450

*Ligularia cremanthodioides* Hand. - Mazz. --- *Cremant-hodium cremanthodioides* (Hand. - Mazz.) R. Good

植物名 垂头橐吾《西藏植志》

药材名 大马蹄香《广西药录》

文献名 小假马蹄香《广西药录》,假垂头菊《云南种录》

地方名 广西:含血莲,马蹄叶、马蹄当归、马蹄菜(百色)。

功效 根:用于跌打损伤。

#### 7238451

*Ligularia cymbulifera* (W. W. Smith) Hand. - Mazz.

植物名 舟叶橐吾《中国植志》

药材名 荃肖《迪庆藏药》

文献名 舷叶橐吾《高植图鉴》,船苞橐吾《云南种录》

功效 幼苗:催吐愈疮。用于“赤巴”病。外用于疮疡。

#### 7238452

*Ligularia dentata* (A. Gray) Hara --- *L. clivorum* Maxim.

植物名 齿叶橐吾《中国植志》

药材名 齿叶山紫菀(拟)

文献名 大齿囊吾、大救驾《汇编》

地方名 陕西:山紫菀;江西:马蹄紫菀;广西:禾叶尺(全州)。

功效 根:舒筋活血,散瘀止痛。用于跌打损伤;根、叶:用于毒蛇咬伤。

#### 7238453

*Ligularia dictyoneura* (Franch.) Hand.-Mazz.

植物名 网脉囊吾《中国植志》

药材名 网脉山紫菀(拟)

地方名 云南:山紫菀(丽江),〔紫菀〕,岩天麻。

功效 根茎:宣肺理气,镇咳祛痰,利尿。用于肺病咳血,伤风感冒,咳嗽,吐血。

#### 7238454

*Ligularia duciformis* (C. Winkl.) Hand.-Mazz.

植物名 大黄囊吾《中国植志》

药材名 大黄山紫菀(拟)

地方名 四川:〔大黄〕(松潘),脑顶须(峨眉山)。

功效 根、全草:散风热。用于头晕,头痛。

#### 7238455

*Ligularia fischeri* (Ledeb.) Turcz. --- *L. sibirica* var. *racemosa* (DC.) Kitam.

植物名 蹄叶囊吾《中国植志》

药材名 蹄叶山紫菀(拟)

文献名 肾叶囊吾、细须毛紫菀《中药志》,圆叶菜《铁岭县志》,大叶毛、小荷叶《沈阳学报》,葫芦七、华丽囊吾《陕西中草药》,硬紫菀、蹄叶紫菀、马蹄紫菀、毛紫菀、总序囊吾《汇编》

地方名 〔紫菀〕、〔紫菀〕(东北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、河南、湖北、湖南),马蹄叶(东北、内蒙古),山紫菀(山西、内蒙古);内蒙古:“汗达盖-合勒”(蒙名);陕西:大救驾,荷叶七,水荷叶;甘肃:马蹄当归;四川:土紫菀(峨眉山),“日学”(若尔盖藏名),紫菀茸,川紫菀。

功效 根、根茎:理气活血,止痛,止咳祛痰。用于跌打损伤,劳伤,腰腿痛,咳嗽,百日咳,肺病咯血;全草:用于黄疸,丹毒炎症。

#### 7238456

*Ligularia hodgsonii* Hook. --- *L. calthaeifolia* Matsum. --- *L. hodgsonii* Hook. var. *sutchuenensis* (Franch.) Henry

植物名 鹿蹄囊吾《中国植志》

药材名 滇紫菀《滇南本草》、《鉴别手册》

文献名 川滇紫菀《云南种录》,囊吾紫菀《广西药园药录》,肾叶囊吾《汇编》,山紫菀、八角乌、四川囊吾《中药大辞典》,紫菀《中草药》,四川鹿蹄囊吾《秦岭植志》

地方名 马蹄当归(四川、云南、贵州);广西:半边伞(大瑶山),一块瓦(融安);四川:南瓜七,马蹄草,马兰花,土紫菀(峨眉山);云南:马蹄细辛、大马蹄香、紫参(昭通),地射香(保山),牛尾参(昆明),〔血当归〕,化血丹(通海),红紫菀(玉溪),毛头七、马蹄散血丹(红河)。

功效 根:活血行瘀。用于劳伤咳嗽,吐血,跌打

损伤。

#### 7238457

*Ligularia hookeri* (Clarke) Hand.-Mazz. --- *Cremantodium hookeri* Clarke

植物名 细茎囊吾《中国植志》

药材名 太白小紫菀《陕西中草药》

文献名 垂头菊《中药大辞典》

地方名 陕西:太白菊,小紫菀,太白紫菀。

功效 全株:化痰止咳,宽胸利气。用于痰喘咳嗽,气管炎,肺结核,肺病,劳伤,头痛。

#### 7238458

*Ligularia hookeri* (Clarke) Hand.-Mazz. var. *polyccephala* (Good) Hand.-Mazz. --- *Ligularia leveillei* (Van.) Hand.-Mazz.

植物名 多头细茎囊吾《云南种录》

文献名 总序筒叶囊吾《贵州药录》

地方名 贵州:接骨丹,马蹄当归。

功效 根:温肺下气,祛痰止咳,通利水道。用于肺病,风寒咳嗽,气道上喘,小便不利,水肿,淋浊。

#### 7238459

*Ligularia intermedia* Nakai --- *L. sinica* Kitag.

植物名 狭苞囊吾《中国植志》

药材名 光紫菀(四川)、《中药志》

文献名 长白囊吾《吉野》,山紫菀《中药大辞典》

功效 根、根茎:温肺,下气,消痰,止咳。

#### 7238460

*Ligularia jaluensis* Kom. --- *L. deltoidea* Nakai

植物名 复序囊吾《中国植志》

药材名 复序山紫菀(拟)

文献名 三角叶囊吾《高植图鉴》,三角囊吾《吉野》

地方名 吉林:东北熊疏(长白山)。

功效 根及根茎:温肺,下气,消痰,止咳。

#### 7238461

*Ligularia jamesii* (Hemsl.) Kom.

植物名 长白山囊吾《中国植志》

药材名 长白山紫菀(拟)

文献名 单花囊吾《吉野》,单头囊吾《高植图鉴》

功效 根:温肺,下气,消痰,止咳。

#### 7238462

*Ligularia japonica* (Thunb.) Less.

植物名 大头囊吾《中国植志》

药材名 大头山紫菀(拟)

文献名 〔望江南〕《名实图考》,猴巴掌《高植图鉴》,

兔打伞《汇编》

地方名 江西:老鸦甲。

功效 根、全草:舒筋活血,解毒消肿。用于跌打损伤,无名肿毒,毒蛇咬伤。

#### 7238463

*Ligularia lankongensis* (Franch.) Hand.-Mazz.

植物名 洱源囊吾《中国植志》

药材名 洱源山紫菀(拟)

文献名 旱囊吾《汇编》,山紫菀《鉴别手册》,浪穹紫

苑《云南种录》

地方名 云南:紫苑(曲靖)。

功效 根:温肺,下气,消痰,止咳。

7238464

*Ligularia lapathifolia* (Franch.) Hand.-Mazz. --- *Senecio lapathifolia* Franch.

植物名 牛蒡叶橐吾《中国植志》

药材名 大独叶草《中药大辞典》

文献名 酸模叶橐吾《高植图鉴》,独叶草《汇编》

地方名 云南:〔紫苑〕、〔发罗海〕(玉溪),大马蹄香、化血丹(昆明)。

功效 根、叶:有小毒。散瘀,活血,止痛。用于跌打损伤,瘀肿疼痛,风湿筋骨痛。

7238465

*Ligularia latihastata* (W. W. Sm.) Hand.-Mazz.

植物名 宽戟橐吾《中国植志》

药材名 毛紫苑(四川)、《中药志》

功效 根及根茎:理气活血,止痛,止咳祛痰。

7238466

*Ligularia macrophylla* (Ledeb.) DC.

植物名 大叶橐吾《中国植志》

药材名 大叶山紫苑(拟)

地方名 新疆:山紫苑。

功效 根、根茎:温肺,下气,消痰,止咳。

7238467

*Ligularia mongolica* (Turcz.) DC.

植物名 全缘橐吾《中国植志》

药材名 蒙古山紫苑(拟)

文献名 蒙古橐吾《吉野》

地方名 北京:大舌花。

功效 根及根茎:温肺,下气,祛痰,止咳。

备考 原苏联报导,有抗凝血作用,能降低凝血酶元,提高肝素在血中的含量,并能增强纤维蛋白溶解活血。

7238468

*Ligularia nelumbifolia* (Bur. et Franch.) Hand.

-Mazz. --- *Senecio nelumbifolia* Bur. et Franch.

植物名 莲叶橐吾《中国植志》

药材名 莲叶山紫苑(拟)

地方名 陕西:一碗水;四川:土紫苑;云南:“曲肖”(迪庆藏名)。

功效 根:止咳化痰,祛风。用于肺结核,风寒咳嗽。

7238469

*Ligularia platyglossa* (Franch.) Hand.-Mazz.

植物名 宽舌橐吾《中国植志》

药材名 宽舌山紫苑(拟)

文献名 宽舌紫苑《云南药录》

地方名 云南:紫苑(曲靖)。

功效 根茎:祛痰,止咳。用于肺虚咳嗽。

7238470

*Ligularia pleurocaulis* (Franch.) Hand.-Mazz. ---

*Senecio pleurocaulis* Franch. --- *S. tatsienensis* Franch. --- *Cremanthodium pleurocaule* (Franch.) Good

植物名 侧茎橐吾《中国植志》

药材名 明润色波《迪庆藏药》

文献名 侧茎垂头菊《高植图鉴》

功效 花序:清热解毒,止痛。用于疔疮,肿痛。

7238471

*Ligularia przewalskii* (Maxim.) Diels

植物名 掌叶橐吾《中国植志》

药材名 掌叶山紫苑(拟)

文献名 裂叶橐吾《汇编》,青甘橐吾《青海中草》

地方名 山紫苑(陕西、甘肃、宁夏)。

功效 花:清热利湿,利胆退黄。用于急性黄疸型肝炎;幼叶:催吐。

7238472

*Ligularia rumicifolia* (Drumm.) S. W. Liu --- *L. leucicotal* Kitam.

植物名 藏橐吾《中国植志》

药材名 卵叶山紫苑(拟)

文献名 卵叶橐吾《汇编》,酸模叶橐吾《西藏植志》

地方名 西藏:“日肖”(藏名)。

功效 根:润肺降气,化痰止咳,利尿。用于风寒咳嗽,支气管炎,肺结核咳血,咽喉炎。

7238473

*Ligularia sagitta* (Maxim.) Mattf. --- *Senecio sagitta* Maxim.

植物名 箭叶橐吾《中国植志》

药材名 箭叶山紫苑(拟)

地方名 青海:“龙肖”(藏名)。

功效 根、叶:用于催吐。外用治疮疖。

7238474

*Ligularia schmidtii* (Maxim.) Kom.

植物名 全苞橐吾《沈药学报》

药材名 全苞山紫苑(拟)

文献名 合苞橐吾《吉野》

功效 根、根茎:温肺,下气,消痰,止咳。

7238475

*Ligularia sibirica* (L.) Cass.

植物名 橐吾《中国植志》

药材名 箭叶山紫苑(拟)

文献名 箭叶橐吾《内蒙古中草药》,毛紫苑、光紫苑《沈药学报》,西伯利亚橐吾《高植图鉴》

地方名 紫苑(新疆、江西、湖南、四川),山紫苑(河北、新疆、江西、湖南、四川);河北:山紫苑,〔细辛〕(魏县);陕西:葫芦七;四川:“更登吉”(若尔盖藏名),北橐吾(若尔盖)。

功效 根茎:用于高血压,肝炎,痔疮,子宫颈溃疡;全草:用于肺结核,黄疸,丹毒。

7238476

*Ligularia stenocephala* (Maxim.) Mats. et Koidz.

植物名 窄头橐吾《中国植志》

药材名 窄头山紫苑(拟)

115

文献名 狭头橐吾《汇编》,戟叶橐吾《台湾植志》

地方名 江西:马蹄草;湖南:山紫菀。

功效 根、全草:清热,利尿,散结,解毒。用于乳痈,水肿,瘰疬,河豚鱼中毒。

#### 7238477

*Ligularia tsangchanensis* (Franch.) Hand.-Mazz.

植物名 苍山橐吾《中国植志》

药材名 尖叶山紫菀(拟)

文献名 尖叶橐吾《汇编》

功效 根:润肺降气,化痰止咳,利尿。用于风寒咳嗽,支气管炎,肺结核咳血,咽喉炎。

#### 7238478

*Ligularia veitchiana* (Hemsl.) Greenm. --- *Senecio veitchianus* Hemsl. --- *Senecillus veitchiana* (Hemsl.) Kitam.

植物名 离舌橐吾《中国植志》

药材名 离舌橐吾《贵州药录》

地方名 湖北:水葫芦叶(神农架);四川:棕色钵头草;贵州:马蹄当归。

功效 根:润肺止咳,舒筋活络。用于风寒咳嗽,支气管炎,肾虚腰痛,跌打损伤,肺癆咯血。

#### 7238479

*Ligularia virgaurea* (Maxim.) Mattf.

植物名 黄帚橐吾《中国植志》

地方名 青海:“热肖”、“日候”(藏名);四川:“嘎和”(藏名)。

功效 嫩苗:健胃。用于呕吐。

#### 7238480

*Ligularia wilsoniana* (Hemsl.) Greenm.

植物名 川鄂橐吾《中国植志》

药材名 川鄂山紫菀(拟)

文献名 鄂贵橐吾《汇编》

地方名 山紫菀(四川、贵州)。

功效 根、根茎:温肺,下气,消痰,止咳。

#### 7238481

*Matricaria recutita* L. --- *M. chamomilla* L.

植物名 母菊《中国植志》

药材名 母菊《湖南药物志》

文献名 欧洲野菊、措暮米辣《中国植物图鉴》,德甘菊《药学名词合编》,措母米拉《中国药植图鉴》,加密列花、加密列《中华药学杂志》

地方名 洋甘菊(湖南、四川);江苏:西洋甘菊;上海:〔白花蛇舌草〕;湖南:欧药菊。

功效 花或全草:祛风解表。用于感冒,风湿疼痛。

#### 7238482

*Microglossa pyrifolia* (Lam.) O. Kuntze

植物名 小舌菊《中国植志》

药材名 小舌菊《广西药录》

文献名 梨叶小舌菊《广西植录》

地方名 〔九里明〕(海南、广西);海南:〔过山龙〕(澄迈);广西:〔千里光〕(凤山),〔白花菜〕(宁明),白花草

(邕宁),火灵丹(藤县);云南:大黑根,“雌那那吗”(元江哈尼名)。

功效 全株:解毒,生肌,明目。用于疥疮,目赤肿痛。

#### 7238483

*Myriactis delavayi* Gagnep.

植物名 羽裂粘冠草《中国植志》

文献名 羽裂千星菊《云南种录》

地方名 云南:牙痛草(鹤庆、会泽)。

功效 全草:用于牙痛。

#### 7238484

*Myriactis nepalensis* Less.

植物名 圆舌粘冠草《中国植志》

药材名 油头草《汇编》

文献名 粗齿齿冠菊、尼泊尔齿冠菊《广西植录》,无喙齿冠草《高植图鉴》,无喙齿冠菊(拉汉英种称),尼泊尔千星菊《云南种录》,大鱼眼草《汇编》

地方名 贵州:大白泡草,冬葵花;云南:山羊梅(曲靖),野朝阳(维西),芒果菜(镇康)。

功效 全草:消炎,止痛。用于痢疾,肠炎,慢性中耳炎,牙痛,关节肿痛。

#### 7238485

*Neopallasia pectinata* (Pall.) Poljak. --- *Artemisia pectinata* Pall.

植物名 栉叶蒿《中国植志》

药材名 篦齿蒿《内蒙古中草药》

文献名 篦叶蒿《中国经植志》

地方名 内蒙古:恶臭蒿,粘蒿籽蒿,“乌合日-希鲁黑”、“乌赫尔-舒利希”(蒙名)。

功效 地上全草:清利肝胆,消炎止痛。用于急性黄疸型肝炎,头痛,头晕。

#### 7238486

*Olgaea leucophylla* Iljin

植物名 蜡菊《高植图鉴》

药材名 蜡菊《汇编》

文献名 白山菊《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古:“乌拉-乌布斯”(蒙名),白背;其他:山白菊,白背火杆,火草疙瘩。

功效 地上部分及根:破血行瘀,凉血,止血。用于外伤,出血,吐血,鼻出血,功能性子宫出血。外用于疮毒痈肿。

#### 7238486a

*Olgaea lomonosowii* (Trautv.) Iljin --- *Takaikatzuchia lomonosowii* (Trautv.) Kitag. et Kitam.

植物名 蜆菊《中国植志》

药材名 蜆菊《汇编》

地方名 山东:驴刺口(昆崙山、荣成、海阳、威海),老牛扁口(莒南、益都),大刺刺菜(淄博、章丘),〔大蜆〕。

功效 全草:破血行瘀,凉血止血。

#### 7238487

*Onopordum acanthium* L.

植物名 大翅蓟(秦岭植志)

功效 全草:止血。

#### 7238488

*Opisthopappus taihangensis* (Ling) Shih---*Chrysanthemum taihangense* Ling

植物名 太行菊(中国植志)

地方名 河南:野菊花(济源)。

功效 花序:清肝明目。

#### 7238489

*Arthenium hysterophorus* L.

植物名 银胶菊(中国植志)

药材名 银胶菊(云南药录)

文献名 野益母艾(云南种录)

地方名 广西:假芹(凌云)。

功效 全草:用于妇科病,疮疡肿毒。

#### 7238490

*Pentanema indicum* (L.) Ling --- *Inula indica* L. --- *Vicoa auriculata* Cass. --- *V. indica* (L.) DC.

植物名 苇谷草(中国植志)

药材名 苇谷草(广西药录)

地方名 广西:野罗伞(平果);云南:草金沙、止血草(红河)。

功效 全草:用于感冒,疟疾,咳嗽,小儿惊风,止血。

#### 7238491

*Pentanema indicum* (L.) Ling var. *hypoleucum* (Hand.-Mazz.) Ling

植物名 白背苇谷草(云南种录)

药材名 白背苇谷草(云南药录)

文献名 粉背苇谷草(广西植录),草金杉(云南中草药)

地方名 广西:登亚严(田林);云南:七头风、糙叶地丁、松香草、野杉根(红河),[黄花地丁]。

功效 全草:清热解毒,利水通淋。用于腮腺炎,扁桃体炎,黄疸型肝炎,小便短赤,感冒,肾结石,膀胱结石,结膜炎,角膜云翳,外伤出血。

#### 7238492

*Pertya discolor* Rehd.

植物名 两色帚菊(高植图鉴)

药材名 二色帚菊(青藏药图)

地方名 青海:“起象”(藏名)。

功效 花:用于气管炎,肺结核。

#### 7238493

*Pertya phyllicoides* J. F. Jeffr.

植物名 小叶帚菊(西藏植志)

药材名 小叶帚菊(迪庆藏药)

功效 花:用于支气管炎。

#### 7238494

*Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt

植物名 蜂斗菜(高植图鉴)

药材名 蜂斗菜(汇编)

文献名 水斗叶、钻冻(图经),葫芦包叶(植物

名汇),[款冬]、氏冬、虎须、款花、款冻、颗冻、冬花蕊、款冬蕊(新纲),蔊(牧野日图),蜂斗叶(中国植物图鉴)

地方名 葫芦叶、看灯花、合包花(西北),[款冬花](陕西、青海);浙江:黑南瓜、南瓜三七(临安、镇海),野南瓜、野金瓜头(平阳);江西:水钟流头,野南瓜叶、疯气药、大叶凉伞、蛇头草(婺源);四川:白紫菀(峨眉山);其他:款冬草,网丝皮。

功效 全草或根茎:消肿,解毒,散瘀。用于毒蛇咬伤,痈疽肿毒,跌打损伤;花蕾:西北地区以之混作款冬花用。

#### 7238495

*Petasites tricholobus* Franch.

植物名 毛裂蜂斗菜(高植图鉴)

地方名 [冬花](甘肃、陕西);陕西:[款冬花],葫芦叶(南郑),旱荷叶(平利)。

备考 陕西、青海等地有以其花蕾混作款冬花用。

#### 7238496

*Picris davurica* Fisch. var. *koreana* (Kitam.) Kitag. --- *P. japonica* Thunb. var. *koreana* Kitam. --- *P. hieracioides* L. ssp. *japonica* (Thunb.) Krylov var. *koreana* (Kitam.) Kitag. --- *P. japonica* Thunb. ssp. *davurica* (Fisch.) Kitag. var. *koreana* (Kitam.) Kitag. --- *P. koreana* (Kitam.) Worosch.

植物名 沿海毛连菜(东检)

药材名 沿海毛连菜(东北药用植物)

功效 花序:理肺止咳,化痰平喘,宽胸解郁。用于咳嗽痰多,咳喘,嗝气,胸腹闷胀;全草:清热,消肿,止痛。用于流行性感冒,乳腺炎,阵痛。

#### 7238497

*Picris divaricata* Vant.

植物名 滇苦菜(高植图鉴)

药材名 云南毛连菜(中药志)

文献名 滇毛连菜(中草药通讯),尖刀苦马菜、叉枝毛连菜(汇编)

地方名 云南:剪刀菜、野葛苣菜(文山),[蒲公英](昆明),黑苦墨(罗平);其他:土公英。

功效 全草:清热解毒。用于感冒发热。外用于毒蛇咬伤,烧伤。

#### 7238498

*Picris hieracioides* L.

植物名 欧亚毛连菜(拟)

文献名 毛连菜(云南种录)

地方名 云南:黑若墨(罗平)。

功效 全草:外用于烧伤。

#### 7238499

*Picris hieracioides* L. subsp. *fuscepilosa* Hand.-Mazz.

植物名 褐毛毛连菜(高植图鉴)

文献名 毛连菜(西藏中草药),褐毛连菜(中药大辞典),长褐毛连菜(云南种录)

地方名 枪刀菜花(东北);云南:黑若墨(罗平)。

功效 头状花序:理肺止咳,化痰平喘,宽胸。用

于咳嗽痰多,咳喘,暖气,胸腹闷胀。

**7238500** 见 7238501。

**7238501**

*Picris japonica* Thunb. --- *P. hieracioides* L. ssp. *japonica* (Thunb.) Krylov

植物名 毛连菜《高植图鉴》

药材名 毛连菜《中药大辞典》

文献名 毛连菜《陕甘宁植志》,步连菜《满鲜植汇》,羊下巴、牛蹄鼻《中药大辞典》,日本毛连菜《云南种录》

地方名 山东:沽药草(青岛);浙江:枪刀菜根;广西:山苦墨(北流);贵州:毛柴胡,毛牛耳大黄。

功效 根:利小便。用于腹部胀满;全草:泻火,解毒,祛瘀止痛。用于跌打损伤,无名肿毒。

**7238501a**

*Picris japonica* Thunb. subsp. *davurica* (Fisch.) Kitag.

植物名 兴安毛连菜《长白山植志》

功效 根:据国外文献报导,地上部分可用作收敛止泻药。

**7238502**

*Pluchea eupatorioides* Kurz

植物名 长叶阔苞菊《中国植志》

药材名 长叶阔苞菊《广西药录》

地方名 广西:香艾(大新)。

功效 全草:用于跌打损伤。

**7238503**

*Pluchea indica* (L.) Less. --- *Baccharis indica* L.

植物名 阔苞菊《中国植志》

药材名 栳樨《岭南采药录》、《中药大辞典》

地方名 江西:独杜草;海南:格杂树(海口),苑樨,烟茜叶,烟茜,燕茜。

功效 茎、叶:用于板痂,胃脘痛。

**7238504**

*Prenanthes henryi* Dunn

植物名 川滇盘果菊《高植图鉴》

文献名 西南垂序苣《广西植志》,亨利福王草《广西药录》

地方名 广西:恶蛇头(资源),〔白前〕、土牛子(桂平)。

功效 根:清热,解毒。用于蛇咬伤。

**7238505**

*Prenanthes sinensis* (Hemsl.) Stebbins ex Babcock

*Faberis sinensis* Hemsl.

植物名 花佩菊《高植图鉴》

药材名 花佩菊《峨眉药植资源》

地方名 四川:小坝王(峨眉山)。

功效 全草:活血祛瘀,祛风除湿,止痛。

**7238506**

*Pterocaulon redolens* (Willd.) F. Vill.

植物名 翼茎草《中国植志》

药材名 粘叶子草《元江哈尼族药》

地方名 云南:“恶疟爬补”(元江哈尼语)。

功效 根或嫩枝:疏散风寒,止咳平喘,利水消肿。

用于外感风寒,风寒感冒,小儿咳嗽,肾虚水肿。

**7238507**

*Pulicaria chrysantha* (Diels) Ling. --- *Inula chrysantha* Diels

植物名 金仙草《中国植志》

文献名 金花蚤草《高植图鉴》,金花虱草《植分学报》,金仙花《拉汉英种称》

功效 全草:消炎解毒,止咳退热。用于感冒,咳嗽,小儿肺炎,气管炎。

**7238508**

*Pulicaria chrysantha* (Diels) Ling var. *oligochaeta* Ling

植物名 少毛金仙草(拟)

功效 全草:用于驱蚤。

**7238509**

*Pulicaria dysenterica* (L.) Gaertn. --- *Inula dysenterica*

L. --- *Asper dysentericus* Scop.

植物名 止痢蚤草《中国植志》

功效 全草:止痢。

**7238510**

*Pulicaria insignis* Drumm. ex Dunn

植物名 臭蚤草《中国植志》

药材名 虱草花《汇编》

文献名 臭虱草《植分学报》

地方名 西藏:“明洞色尔布”(藏名)。

功效 全草:镇咳舒肝,清血热,透骨蒸。用于肺结核咳嗽,两肋疼痛,骨蒸潮热,炭疽病,丹毒。

**7238511**

*Pulicaria prostrata* Gillib.

植物名 蚤草《中国植志》

功效 全草:用于痢疾。

**7238512**

*Pyrethrum cinerariifolium* Trev. --- *Chrysanthemum*

*cinerariifolium* (Trev.) Vis. --- *Tanacetum cinerariifolium* (Trev.) Sch. - Bip.

植物名 除虫菊《中国植志》

药材名 除虫菊《汇编》

文献名 达尔马第亚除虫病《中国药植志》,杀蚊菊《药材学》,瓜叶除虫菊(山医《生药》)

地方名 浙江:白花除虫菊;云南:壁虱格蚤药。

功效 花或全草:有毒。杀虫。外用于疥癣,杀蚊、蝇、壁虱。

**7238513**

*Pyrethrum coccineum* (Willd.) Worosch. --- *Chrysanthemum*

*coccineum* Willd.

植物名 红花除虫菊《中国植志》

功效 花、叶:杀虫。力逊于除虫菊。

**7238514**

*Pyrethrum tatsienense* (Bur. et Franch.) Ling ex Shih ---

*Chrysanthemum tatsienense* Bur. et Franch.

植物名 川西小黄菊《中国植志》

药材名 打箭菊《民族药志》

文献名 鞑新菊《西藏中草》

地方名 青海:“塞仁交”、“塞仁交木”、“塞窘”(藏

名);四川:[野菊花](若尔盖),“仁尔你翁”(若尔盖藏名);西藏:“塞察美多”、“色尔君木美多”(藏名)。

功效 花序:活血,祛湿,消炎,止痛。用于跌打损伤,湿热。

#### 7238515

*Rhaponticum carthamoides* (Willd.) Iljin. --- *Stemmacantha carthamoides* (Willd.) Dittrich

植物名 鹿草《中国植志》

药材名 鹿草《新疆中草药》

功效 根:补气,健脑。用于神经衰弱,食欲不振。

#### 7238516

*Rhaponticum uniflorum* (L.) DC. --- *Centaurea monanthos* Georgi --- *Stemmacantha uniflora* (L.) Dittrich

植物名 祁州漏芦《高植图鉴》

药材名 漏芦《本经》、《药典》

文献名 野兰《本经》,鬼油麻《日华子本草》,大花菊《高植图鉴》,蒜疙瘩花《中草药学》

地方名 [白头翁](陕西、江苏、河南),和尚头(东北、河北),郎头花、牛馒头(河北、内蒙古、陕西、甘肃),独花山牛蒡(陕西、甘肃、宁夏),大脑袋花(东北、西藏),秃老婆顶、野红花、和尚头花、马屁眼子、火球花(东北),狼头花(北京、河北),大口袋花(内蒙古、河北);吉林:“针尔姑代”(朝名);辽宁:茺蒿;北京:正馒头子花;河北:老牛疙瘩根(张家口),牛馒头根,驴粪蛋子花;内蒙古:“洪古尔-珠拉”(蒙名),牛蔓头;陕西:牛馒头花,见肿消(紫阴),马毡鞭(眉县);甘肃:单花山牛蒡;山东:群活(蒙山),秃疮头,出墙头;江苏:毛头;安徽:秧草;西藏:馒头花。

功效 根:清热解毒,消痈,下乳,舒筋通脉。用于乳痈肿痛,痈疽发背,瘰疬疮毒,乳汁不通,湿痹拘挛。

#### 7238517

*Rhynchospermum verticillatum* Reinw.

植物名 秋分草《中国植志》

药材名 秋分草《汇编》

文献名 白鱼鳅串、调羹草《汇编》

地方名 大鱼鳅串(浙江、四川);浙江:林荫菊。

功效 全草:清热除湿,解毒。用于急、慢性肝炎,肝硬化腹水,崩漏,白带。

#### 7238518

*Rudbeckia laciniata* L.

植物名 金光菊《中国植志》

药材名 金光菊《广西本草选编》

文献名 黑眼菊《中国植志》

地方名 广西:太阳菊。

功效 叶:清热解毒。用于急性胃肠炎,痢疾。

#### 7238519

*Saussurea acrophila* Diels

植物名 光叶风毛菊《秦岭植志》

药材名 破血丹《汇编》

地方名 陕西:天青地红。

功效 全草、根:跌打损伤,散瘀结,消肿。用于跌打损伤,妇女经闭。

#### 7238520

*Saussurea amurensis* Turcz.

植物名 龙江风毛菊《高植图鉴》

文献名 东北燕尾风毛菊《长白山植药志》

功效 根、花序:杀虫。

#### 7238521

*Saussurea arenaria* Maxim.

植物名 沙生风毛菊《西藏植志》

药材名 沙生风毛菊《青藏药图》

地方名 青海:“杂迟哇冒卡”、“匝赤把漠卡”(藏名)。

功效 全草:用于肝炎,胆囊炎,感冒发烧。

#### 7238522

*Saussurea bodinieri* Levl. --- *Saussurea pachyneura* Franch. --- *S. sikangensis* Chen

植物名 羽裂风毛菊《高植图鉴》

药材名 羽裂叶风毛菊《贵州药录》

文献名 滇西风毛菊《青藏药图》

地方名 青海:“公巴嘎吉”(藏名);贵州:天朋草,八面风。

功效 全草:止血,用于疮疖。

#### 7238523

*Saussurea cordifolia* Hemsl.

植物名 心叶风毛菊《高植图鉴》

药材名 山芍药《名实图考》、《新华本草纲要》

文献名 马蹄细辛《贵州民间药物》,山牛蒡、水葫芦《中药大辞典》

功效 根:散寒,镇痛。用于关节痛,恶寒头痛,劳伤。

#### 7238524

*Saussurea deltoidea* (DC.) Sch.-Bip. --- *S. radiata* Franch. --- *S. lamprocarpa* Hemsl.

植物名 三角叶风毛菊《秦岭植志》

药材名 三角叶风毛菊《红河中草药》

文献名 射青木香(徐、赵《生药》),铺地风毛菊《广西药录》,毛叶威灵仙《云南药录》,射风毛菊《汇编》

地方名 广西:[白背叶]、(野烟)(富川);云南:白牛蒡根、[翻白叶](红河),[白头翁](昭通),[大叶防风](丽江)。

功效 根:健脾消痞,催乳,祛风湿,通经络。用于产后乳少,白带过多,消化不良,腹胀,小儿疳积,骨折,病后体虚,胃寒痛,风湿骨痛。

#### 7238525

*Saussurea discolor* DC.

植物名 北风毛菊《高原中草》

功效 全株:活血祛风,散痹止痛。

#### 7238526

*Saussurea eopygmaea* Hand.-Mazz.

植物名 矮丛风毛菊《青藏药图》

地方名 青海:“扎川哇毛卡”(藏名)。

功效 地上部分:用于胆囊炎,发烧。

#### 7238527

*Saussurea epilobioides* Maxim.

植物名 柳叶菜风毛菊《高植图鉴》

文献名 柳兰叶风毛菊《青藏药图》

地方名 青海：“叶格象”（藏名）。

功效 全草：镇痛，止血，解毒，愈创。用于刀伤，产后流血不止。

#### 7238528

*Saussurea eriocephala* Franch.

植物名 丽江雪兔子（拟）

药材名 雪莲花《云南药录》

文献名 毛头雪莲花《汇编》

地方名 云南：雪兔子（丽江），白雪兔。

功效 全草：调经活血，补肾壮阳。用于雪盲，牙痛，风湿性关节炎，阳痿，月经不调，崩漏，白带。外用于创伤出血。

#### 7238529

*Saussurea glomerata* Poir. --- *S. amara* (L.) DC.

植物名 驴耳风毛菊《内蒙古中草药》

药材名 驴耳朵草《汇编》

文献名 风毛菊《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古：“淖海-合勒-乌布斯”（蒙名），驴耳朵，狗舌头，狗舌头草（呼和浩特）。

功效 全草：清热，解毒，消肿。外用于颈淋巴结结核，腮腺炎，疖肿。

#### 7238530

*Saussurea gnaphaloides* (Royle) Sch.-Bip.

植物名 鼠曲雪兔子《西藏植志》

药材名 雪莲花（新疆）、《品种论述》

文献名 鼠曲风毛菊《高植图鉴》，鼠曲雪莲花《品种论述》

功效 全草：补肾壮阳，调经活血。用于雪盲，牙痛，风湿性关节炎，阳痿，月经不调，崩漏，白带。外用于创伤出血。

#### 7238531

*Saussurea gossypiphora* D. Don

植物名 雪兔子《西藏植志》

药材名 雪莲花《品种论述》

文献名 玄果搜花《晶珠本草》

地方名 西藏：“麦朵刚拉”（藏名）。

功效 全草：补肾壮阳，调经活血。用于雪盲，牙痛，风湿性关节炎，阳痿，月经不调，崩漏，白带。外用于创伤出血。

#### 7238532

*Saussurea graminea* Dunn --- *S. poophylla* Diels ex Limpricht

植物名 禾叶风毛菊《西藏植志》

药材名 禾叶风毛菊《民族药志》

文献名 线叶风毛菊《高原中草》

地方名 “占车”（西藏、四川藏名）；西藏：“匝赤把漠卡”（藏名）。

功效 全草：清热凉血。用于肝胆发炎，胃肠炎，内脏出血。

#### 7238533

*Saussurea hieracioides* Hook. f. --- *S. villosa* Franch.

植物名 长毛风毛菊《西藏植志》

地方名 青海：“吉休”（藏名）。

功效 全草：用于各种水肿。

#### 7238534

*Saussurea intermedia* Turcz.

植物名 中间风毛菊《广西植录》

药材名 中间风毛菊《广西药录》

地方名 广西：红升麻（乐业）。

功效 根：用于人工流产。

#### 7238535

*Saussurea involucrata* Kar. et Kir.

植物名 新疆雪莲《汇编》

药材名 新疆雪莲花《汇编》

文献名 雪莲花、雪荷花《纲目拾遗》，大苞雪莲花《中药大辞典》，荷莲《高植图鉴》，天山雪莲花《民族药志》

地方名 新疆：雪莲，雪荷，“塔格来利斯”、“塔格来依力斯”（维名）。

功效 全草：有毒。活血通经，散寒除湿，强筋助阳。用于风湿性关节炎，肺寒咳嗽，小腹冷痛，闭经，胎衣不下，阳痿。

#### 7238536

*Saussurea japonica* (Thunb.) DC.

植物名 风毛菊《高植图鉴》

药材名 风毛菊《汇编》

文献名 八楞木《饮片新参》

地方名 风毛菊花（东北），苦麻（西北），八楞麻（上海、吉林）；吉林：八楞蒿；浙江：八棱麻；广西：山苦子（钟山）；四川：四棱香，四棱麻；贵州：青竹标，八面风，三棱草。

功效 全草：祛风活络，散瘀止痛。用于风湿关节痛，腰腿痛，跌打损伤。

#### 7238537

*Saussurea japonica* f. *alata* (Chen) Kitag.

植物名 翼茎风毛菊（东检）

药材名 翼茎风毛菊（东北药用植物）

功效 全草：祛风活络，散瘀止痛。用于风湿关节痛，腰腿痛，跌打损伤。

#### 7238538

*Saussurea japonica* var. *maritima* Kitag.

植物名 海滨风毛菊（东北药用植物）

功效 全草：祛风活络，散瘀止痛。用于风湿关节痛，腰腿痛，跌打损伤。

#### 7238539

*Saussurea japonica* (Thunb.) DC. f. *leucocephala* Nakai et Kitag.

植物名 白花风毛菊（东检）

药材名 白花风毛菊（东北药用植物）

功效 全草：祛风活络，散瘀止痛。用于风湿关节痛，腰腿痛，跌打损伤。



**7238540***Saussurea kingii* C. E. C. Fisch.

- 植物名 拉萨雪兔子《西藏植志》  
 文献名 拉萨风毛菊《高植图鉴》  
 地方名 青海：“公巴嘎吉”(藏名)。  
 功效 全草：止血，用于疮疖。

**7238541***Saussurea lancifolia* Hand. -Mazz.

- 植物名 披针叶风毛菊《青藏药图》  
 药材名 披针叶雪莲花(拟)  
 地方名 青海：“杂迟哇冒卡”、“匝赤把漠卡”(藏名)；四川：“瞎尔古斯哈”(藏名)，大木花，雪莲花(若尔盖)。  
 功效 全草：用于肝炎，胆囊炎，感冒发烧。

**7238542***Saussurea laniceps* Hand. -Mazz.

- 植物名 绵头雪兔子《西藏植志》  
 药材名 雪莲花《汇编》  
 文献名 大姆花《天宝本草》，绵头雪莲花《高植图鉴》，大雪兔子《云南种录》，棉毛雪莲《青藏药图》  
 地方名 青海：“美多冈拉”、“麦朵刚拉”(藏名)；四川：大木花(阿坝)，雪棉花。  
 功效 带根全草：补肾壮阳，调经出血。用于雪盲，牙痛，风湿性关节炎，阳痿，月经不调，崩漏，白带。外用于创伤出血。

**7238543***Saussurea lanuginosa* Vant. --- *S. coerules-vioacea* Levl.

- 植物名 绵毛风毛菊《高植图鉴》  
 药材名 绵毛风毛菊《汇编》  
 文献名 绵毛雪莲花《云南种录》，臭威灵《云南药录》  
 地方名 云南：大叶兔儿风、[威灵仙](玉溪)。  
 功效 根：润肺止咳，解毒止痛。用于肺结核，支气管炎，咯血，偏头痛。外用于狂犬咬伤。

**7238544***Saussurea leiocarpa* Hand. -Mazz.

- 植物名 平滑果风毛菊《西藏植志》  
 药材名 光果风毛菊《中草药通讯》  
 地方名 青海：“公巴嘎吉”(藏名)。  
 功效 叶：用于疮疖，止血。

**7238545***Saussurea leucoma* Diels

- 植物名 白毛雪兔子《云南种录》  
 药材名 雪莲花《品种论述》  
 文献名 红雪兔《品种论述》，雪兔《云南药录》  
 地方名 云南：大雪莲(玉龙山)。  
 功效 全草：凉血，补血。用于夜盲症，月经不调，血崩，肺结核，跌打损伤。

**7238546***Saussurea likiangensis* Franch.

- 植物名 丽江风毛菊《云南种录》  
 药材名 贡巴嘎吉《迪庆藏药》

功效 全草：止血，清解脉热。用于外伤出血，疔疖，肉食中毒。

**7238547***Saussurea medusa* Maxim.

- 植物名 水母雪兔子《西藏植志》  
 药材名 甘青雪莲花《汇编》  
 文献名 玄果搜花《晶珠本草》，水母雪莲花《高植图鉴》，雪莲花《民族药志》  
 地方名 雪莲(西北)；青海：“恰羔素巴”(藏名)；四川：雪荷花(茂县)；西藏：“夏古贝”、“杂各尔手把”(藏名)。  
 功效 全草：有毒。强筋活络，补肾壮阳，通经活血。用于风湿性关节炎，肾虚腰痛，阳痿，妇女小腹冷痛，闭经，胎衣不下，肺寒咳嗽，麻疹不透。

**7238548***Saussurea nigrescens* Maxim.

- 植物名 瑞苓草《高植图鉴》  
 药材名 瑞苓草《陕西中草药》  
 文献名 黑紫风毛菊《中药大辞典》，钝苞雪莲《西藏植志》  
 功效 全草：活血调经，清热明目。用于月经不调，虚癆骨蒸，目疾。

**7238549***Saussurea obvallata* (DC.) Sch. -Bip.

- 植物名 苞叶雪莲《西藏植志》  
 药材名 紫苞雪莲花(拟)  
 文献名 紫苞风毛菊《青藏药图》，苞叶风毛菊《高植图鉴》，苞叶雪莲花《云南种录》  
 地方名 西藏：“漏紫多保”(藏名)；其他：雪莲花。  
 功效 全草：用于风湿关节炎，高山不适症，月经不调，胎衣不下。

**7238550***Saussurea peguensis* Clarke --- *S. phyllocephala* Coll. et Hemsl.

- 植物名 叶头风毛菊《高植图鉴》  
 药材名 鹰爪莲《云南中草药》  
 文献名 头叶风毛菊《品种论述》，多头风毛菊、鸡冠参《汇编》  
 地方名 云南：小蓟草(峨山)，蒿枝黑药(玉溪)，白蒿枝根、野蒿(红河)，蛇咬药(曲靖)。  
 功效 全草、根：滋补，清热，消炎，止血。用于肝炎，头昏盗汗，乳腺炎，肺炎，胸膜炎，消化不良。外用于痈疽，蛇咬伤。

**7238551***Saussurea pookhamys* Hand. -Mazz.

- 植物名 草叶风毛菊《云南种录》  
 文献名 一支箭《云南药录》  
 地方名 云南：蛇眼草(大理、丽江)。  
 功效 根：清热解毒。用于毒蛇咬伤。

**7238552***Saussurea pulchella* Fisch.

- 植物名 姜花风毛菊《高植图鉴》

文献名 球花风毛菊《长白山植药志》

功效 全草：用于止血，解热，风湿性关节炎，止痛，腹泻。

#### 7238553

*Saussurea quercifolia* W. W. Sm.

植物名 榭叶雪兔子《云南种录》

文献名 玄果搜花《晶珠本草》

药材名 榭叶雪莲花《品种论述》

功效 根：润肺止咳，解毒止痛。用于肺结核，支气管炎，咯血，偏头痛。外用于狂犬咬伤。

#### 7238554

*Saussurea romuleifolia* Franch.

植物名 鸢尾叶风毛菊《高植图鉴》

药材名 蛇眼草《云南中草药选》

文献名 线叶风毛菊《汇编》

地方名 云南：大麻草、蛇箭（丽江），粉草（曲靖），雨过天青。

功效 全草或根：祛风活络，解毒，消积。用于风湿关节痛，跌打损伤，小儿疳积。外用于毒蛇咬伤。

#### 7238555

*Saussurea simpsoniana* (Field. et Gardn.) Lipsch. --- *Aplotaxis simpsoniana* Field. et Gardn.

植物名 小果雪兔子《西藏植志》

功效 根：在国外，以牛奶煎煮，用于蛇咬伤，传染病，妇女病等。

#### 7238556

*Saussurea stella* Maxim.

植物名 星状雪兔子《西藏植志》

药材名 星状风毛菊《青藏药图》

文献名 匍地风毛菊《中药大辞典》，伏地风毛菊《汇编》

地方名 威州根（西北）；甘肃：九头草（岷县）；青海：“苏尔公玛保”（藏名）；四川：“巧得木波”（藏名）。

功效 全草：除湿通络。用于风湿筋骨疼痛；花、叶、根：用于中毒性热症，骨折。

#### 7238557

*Saussurea superba* Anthony f. *pigmaea* Anthony

植物名 矮华丽风毛菊《云南种录》

药材名 美丽风毛菊《青藏药图》

地方名 青海：“漏子多保”、“漏子多吾”、“婆子多吾”（藏名）。

功效 根：清热解毒，祛风。用于流行性感冒，咽喉肿痛，麻疹，荨麻疹。

#### 7238558

*Saussurea tangutica* Maxim. --- *S. obvallata* (DC.) Sch. Bip. var. *orientalis* Diels

植物名 唐古特风毛菊（拟）

文献名 东方风毛菊《中药大辞典》，东方雪莲花《云南种录》，唐古特雪莲《西藏植志》

地方名 〔雪莲花〕（甘肃、西藏）；青海：“漏子多保”（藏名）。

功效 全草：清热，退烧。用于流感，咽喉肿痛，麻

疹，荨麻疹，食物中毒。本品不作雪莲花用。

#### 7238559

*Saussurea taraxacifolia* Wall. ex DC. --- *Cyathidium taraxacifolium* Lindl.

植物名 公英叶风毛菊《西藏植志》

药材名 公英叶风毛菊《青藏药图》

地方名 青海：“江托巴”（藏名）。

功效 全草：清热解毒。用于食物中毒。

#### 7238560

*Saussurea tridactyla* Sch. Bip. ex Hook. f.

植物名 三指雪兔子《西藏植志》

药材名 雪莲花（西藏、云南）、《民族药志》

文献名 玄果搜花《晶珠本草》，西藏雪莲花《汇编》，三指雪莲《民族药志》，小红兔《品种论述》，三指雪莲花《云南种录》

功效 带根全草：补肾壮阳，调经止血。

#### 7238561

*Saussurea umbrosa* Kom

植物名 山风毛菊《高原中草》

地方名 四川：“也谷香”（若尔盖藏名）。

功效 全草：消炎抗菌，行血祛瘀，感染化脓。

#### 7238562

*Saussurea uniflora* Wall. ex Hook. f.

植物名 单花雪莲《西藏植志》

文献名 单花风毛菊《云南种录》

地方名 雪莲花（西藏、四川、云南）。

功效 带根全草：补肾壮阳，调经止血。

#### 7238563

*Saussurea ussuriensis* Maxim.

植物名 乌苏里风毛菊《高植图鉴》

文献名 山牛蒡《汇编》，乌苏里野苦麻《中国植物图鉴》，漏芦《祁州药志》，裂叶苦麻《陕甘宁植志》

地方名 贵州：马蹄细辛（湄潭），水葫芦（绥阳）。

功效 根：祛寒，散瘀，镇痛。用于感冒头痛，关节痛，劳伤。

#### 7238564

*Saussurea velutina* W. W. Smith

植物名 黄绒风毛菊《云南种录》

药材名 煞杜构固《迪庆藏药》

文献名 毡毛风毛菊《迪庆藏药》

功效 地上部分：用于凶曜病（癩病，中风，癲狂，麻风等）。

#### 7238565

*Scorzonera albicaulis* Bunge

植物名 白茎鸦葱《汇编》

药材名 鸦葱《鉴别手册》

文献名 笔管草《高植图鉴》，仙茅参、华北鸦葱《陕西中草药》，细叶鸦葱《内蒙古中草药》

地方名 牛奶子（内蒙古、北京），〔漏芦〕（湖北、陕西），黄籽花（东北）；吉林：羊奶子（镇赉）；内蒙古：“哈瓦斯嘎纳”（蒙名）；陕西：水风，水防风，条参，丝茅七，猪尾巴（宝鸡、周至），箭头草（蓝田），土人参（太白、华

山);山东:板登腿(烟台),老鸡葱,土参;江苏:小鬼腿,〔黄花地丁〕(南京);河南:笔管葱;湖北:〔防风〕;四川:柳叶防风,茅草连,独脚茅草;贵州:茅草细辛(遵义),毛草七(铜仁),倒扎草根,土秦艽,倒扎花,倒扎草。

功效 根:清热解毒,祛风除湿,平喘。用于感冒发热,哮喘,乳腺炎,疔疮,关节痛。外用于带状疱疹。

#### 7238566

*Scorzonera albicaulis* Bunge var. *macrosperma* (Turcz.) Kitag. --- *S. macrosperma* Turcz. ex DC. --- *Piptopogon macrospermus* (Turcz.) C. A. Meyer ex Turcz. --- *Achyroseris macrosperma* (Turcz.) Schultz-Bip.

植物名 伞花鸦葱《东检》

药材名 伞花鸦葱《东北药用植物》

地方名 羊奶子、牛奶子(东北)。

功效 根:清热解毒,祛风除湿,活血消肿,通乳,理气平喘。用于感冒发热,哮喘,五劳七伤,乳汁不足,妇女倒经,跌打损伤,乳腺炎,疔疮痈肿,风湿关节痛,毒蛇咬伤,带状疱疹,扁平疣。

#### 7238567

*Scorzonera divaricata* Turcz.

植物名 叉枝鸦葱《高植图鉴》

药材名 叉枝鸦葱《汇编》

文献名 羊奶及及、散枝鸦葱、苦葵鸦葱《沙漠药植》,分枝鸦葱《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古:女苦奶,“阿查·哈华斯嘎纳”、“哈维斯哈纳”(蒙名);甘肃:线防风、细风(文县)。

功效 鲜植物汁液:消肿散结。外用于瘰子;全草、根:清热解毒。用于疗毒恶疮。

#### 7238568

*Scorzonera mongolica* Maxim. var. *putjatae* C. Winkl.

植物名 蒙古鸦葱《高植图鉴》

药材名 蒙古鸦葱《汇编》

文献名 羊奶子、兔儿苗、羊角菜、滨鸦葱、张牙牙《沙漠药植》

地方名 江苏:面条菜,羊角草(连云港)。

功效 根:清热解毒,活血消肿。

#### 7238569

*Scorzonera radiata* Fisch.

植物名 狭叶鸦葱《汇编》

文献名 根叶鸦葱《陕甘宁植志》

地方名 草防风(东北);广西:羊奶子(兴安);四川:“萎依木”(藏名)。

功效 根:清热解毒,活血消肿。

#### 7238570

*Scorzonera sinensis* Lipsch. et Krasch.

植物名 桃叶鸦葱《高植图鉴》

药材名 鸦葱《救荒本草》、《汇编》

文献名 〔仙茅〕《朝鲜植汇》

地方名 老鸦葱(华北、华东、东北),〔防风〕(东北),〔土人参〕(华东),〔漏芦〕(山西、河南);黑龙江:羊奶子、笔管草(哈尔滨);河北:驴鼓嘴,草参;陕西:羊奶菜(华山);青海:“巴多拉”(藏名);山东:兔儿奶(烟台、海

阳),驴板肠、张牙子(昆崙山),山花(长清),乌鸦嘴(苍山),扁扁竹(昌乐),马奶子(威海、昆崙山),琉璃嘴(长清、淄博);江苏:土参、〔黄花地丁〕(南京),人头发,老鸦嘴子,老呱嘴、老鸦嘴、老鸦嘴(徐州);安徽:〔老鸦草〕、老鸦嘴(宿县);河南:老观笔,〔菊花参〕,谷罗葱,罗罗葱,〔白头翁〕。

功效 根:清热解毒,活血消肿。外用于疔疮痈疽,毒蛇咬伤,蚊虫叮咬,乳腺炎。

备考 河南新乡有将本品误充白头翁,应注意鉴别。

#### 7238571

*Senecio adnatus* DC.

植物名 贴生狗舌草《汇编》

功效 全草:用于胆、肠、肾等绞痛,支气管喘息,痉挛性结肠炎,神经性高血压,耳鸣,头痛,血液循环障碍,溃疡病,痉挛性便秘等。

备考 眼科用其1%溶液作散瞳药。

#### 7238572

*Senecio aggregatifolius* Chang

植物名 聚叶千里光《广西药录》

功效 叶:用于咳嗽,跌打损伤。

#### 7238573

*Senecio argunensis* Turcz.

植物名 额河千里光《高植图鉴》

药材名 羽叶千里光《汇编》

文献名 〔黄花蒿〕《满洲植录》,〔望江南〕《陕甘宁植志》,阿贡千里光《江苏南部种册》,蛛毛千里光《广西植录》,〔狗舌草〕、〔光明草〕《沙漠药植》,大蓬蒿《高植图鉴》

地方名 斩龙草(东北);内蒙古:“乌敦·合其格俄”(蒙名);甘肃:黄花一枝蒿;新疆:千里光,〔黄花败酱〕。

功效 全草:清热解毒。用于毒蛇咬伤,蝎、蜂螫伤,疮疖肿毒,湿疹,皮炎,急性结膜炎,咽炎。

#### 7238574

*Senecio argunensis* Turcz. f. *pilosa* (Kitam.) Kitag. --- *S. argunensis* Turcz. var. *pilosa* Kitam.

植物名 柔毛羽叶千里光《东北药用植物》

功效 带根全草:有小毒。清热解毒。用于痢疾,瘰癧,急性结膜炎,毒蛇咬伤,蝎、蜂螫伤,疮疖肿毒,湿疹,皮炎,咽炎;带花的地上部分:用于骨髓造血功能障碍,脑炎,贫血等症。

#### 7238575

*Senecio asperifolius* Franch.

植物名 糙叶千里光《高植图鉴》

文献名 毛叶杆杆草《云南药录》

功效 根:健胃消炎。用于喉炎,扁桃体炎,胃痛,腹胀。外用于湿疹。

#### 7238576

*Senecio cannabifolius* Less. --- *S. palmatus* Pallas

植物名 麻叶千里光《高植图鉴》

文献名 宽叶返魂草《长白山植药志》,鸭脚、〔九里光〕、〔六月雪〕、金寄奴、乌藤菜、大叶蒿子、〔刘寄奴草〕

《新纲》,羽叶狗舌草《金种详述》

地方名 四川:刘寄奴。

功效 全草:用于止血、肿瘤、分娩前镇痛。

#### 7238577

*Senecio cannabinifolius* Less. f. *pubinervis* Kitag.

植物名 毛背返魂草《长白山植药志》

功效 全草:用于止血、肿瘤、分娩前镇痛。

#### 7238578

*Senecio cannabinifolius* Less. var. *davuricus* (Hervey) Kitag.

植物名 返魂草《高原中草》

功效 全草:清热解毒,行血祛瘀,热咳疮疡。

#### 7238579

*Senecio cannabinifolius* Less. var. *integrifolius* (Koidz.) Kitam.

植物名 单叶返魂草《长白山植药志》

功效 全草:破血行瘀,下气通经。

#### 7238580

*Senecio chrysanthemoides* DC.

植物名 菊状千里光《高植图鉴》

药材名 菊叶千里光《中药大辞典》

文献名 紫背草、山苦菜《滇南本草》,沙苗《王龙山药植》,拟菊千里光《广西植录》

地方名 野青菜(四川、云南),天青地红(西藏、云南);云南:紫背叶青菜,野白菜,大红青菜,山青菜,滇败酱(潞西);西藏:土三七,菊三七。

功效 全草及根:活血消肿,清热解毒。用于跌打损伤,瘀积肿痛,疮痈肿疡,乳腺炎。

#### 7238581

*Senecio cymatocrepis* Diels

植物名 聚伞千里光《云南种录》

药材名 聚伞千里光《广西药园药录》

功效 根:用于人工流产。

#### 7238582

*Senecio densiflorus* Wall. ex DC.

植物名 密花千里光《高植图鉴》

药材名 密花千里光《湖南药物志》

地方名 湖南:火草,白头毛,“每崩”、“崩”(侗语)。

功效 根、全草:消炎,止咳。用于咳嗽,白带,子宫炎。

#### 7238583

*Senecio dianthus* Franch.

植物名 双花千里光《高植图鉴》

药材名 一扫光《西藏中草》

地方名 西藏:“榆古兴喀尔布”(藏名)。

功效 全草:清热解毒,祛风湿,止痒。用于急性结膜炎,疮疖,皮炎,跌打损伤。

#### 7238584

*Senecio duclouxii* Dunn

植物名 滇东千里光《云南种录》

文献名 大叶万丈深《峨山彝族药》,血当归《峨眉药植资源》

地方名 四川:金毛草,银毛草;云南:阮多儿,阮多毛,“阿克火”(峨山彝名)。

功效 根:解毒,消肿,下乳。用于跌打损伤。

#### 7238585

*Senecio exul* Hance

植物名 散生千里光《高植图鉴》

药材名 散生千里光《贵州药录》

地方名 贵州:大白顶草。

功效 全草:清热解毒,祛瘀消肿。用于口疮,湿疹,无名毒疮,跌打损伤。

#### 7238586

*Senecio faberi* Hemsl.

植物名 密伞千里光《高植图鉴》

文献名 峨眉千里光《峨眉药植资源》

地方名 四川:山青菜、大风草(峨眉山)。

功效 全草:清热解毒,明目。

#### 7238587

*Senecio flammeus* Turcz. ex DC.

植物名 红轮千里光《高植图鉴》

药材名 红轮千里光《汇编》

地方名 四川:“甲客儿”(藏名)。

功效 全草:清热解毒。用于疗毒痈肿;花:活血调经。

#### 7238588

*Senecio fulvipes* L.

植物名 湖南千里光《湖南药物志》

地方名 湖南:血见草,肺癆草,红菠菜,土参叶。

功效 全草:清热,生津。用于热病伤津口渴,流行性出血热。

#### 7238589

*Senecio guangxiensis* Chang

植物名 广西千里光《广西药录》

地方名 广西:走马须(灵川),百背青(阳朔)。

功效 全草:用于风湿骨痛。

#### 7238590

*Senecio hoi* Dunn

植物名 滇南千里光《高植图鉴》

药材名 大叶千里光《广西本草选编》

文献名 何氏千里光《广西药录》,绵毛千里光《广西植录》,细脉千里光《海南植志》

地方名 广西:[防己](忻城),红背藤、强盗头(龙州),软惊风(阳朔),活筋藤(大瑶山),白面水鸡(苍梧),松筋藤。

功效 藤茎:舒筋活络,祛风除湿。用于风湿痹痛,肌腱挛缩,小儿麻痹后遗症。

#### 7238591

*Senecio hygrophilus* Cuatrec.

植物名 湿生狗舌草《汇编》

功效 全草:用于胆、肠、肾等绞痛,支气管喘息,痉挛性结肠炎,神经性高血压,耳鸣,头痛,胆汁分泌障碍,溃疡病,痉挛性便秘等。眼科用其1%溶液点眼。

瞳药。

# 7238592

*Senecio integrifolius* (L.) Clairv.

植物名 缘毛狗舌草《民族药志》

药材名 狗舌草《青藏药图》

文献名 旋覆花、金沸草《和汉药名汇》

地方名 [东风菜] (东北), “寒暑” (青海、四川藏名); 青海: “阿夏塞卷” (藏名); 贵州: 朝阳花 (榕江)。

功效 花: 用于头痛, 神经痛。

# 7238593

*Senecio integrifolius* (L.) Clairv. var. *spathulatus* (Miq.) Hara

植物名 匙形缘毛狗舌草 (拟)

药材名 狗舌草《安徽中草药》

地方名 安徽: 太阳花。

功效 全草: 清热解毒, 活血消肿。用于尿路感染, 疖肿, 跌打损伤, 湿疹, 阴道滴虫。

# 7238594

*Senecio kaschkarovii* C. Winkl.

植物名 长梗千里光《高植图鉴》

药材名 长梗千里光《峨眉药植资源》

地方名 四川: 野青菜 (峨眉山)。

功效 全草: 清热解毒, 明目。

# 7238595

*Senecio kirilowii* Turcz. ex DC. --- *S. campestris* (Retz.) DC. --- *S. integrifolius* (L.) Clairv. var. *fauriei* et (Vant.) Kitam.

植物名 狗舌草《高植图鉴》

药材名 狗舌草《唐本草》、《汇编》

文献名 [旋覆花]《和汉药名汇》, 田野千里光《广西植录》

地方名 [东风菜] (东北); 浙江: 狗舌头草, 白火丹草, 铜交杯, 糯米青, 铜盘一支香 (缙云、遂昌), 狗舌草根; 贵州: 朝阳花 (榕江)。

功效 全草: 清热, 解毒, 利尿。用于肺脓疡, 尿路感染, 小便不利, 白血病, 口腔炎, 疖肿。

备考 据木村康一报道, 朝鲜以本品之花为狗舌草, 以草为金沸草。

# 7238596

*Senecio ligularia* Hook. f.

植物名 橐吾千里光《广西植录》

药材名 橐吾千里光《广西药录》

地方名 广西: 马蹄莲 (武鸣), 马蹄香附子。

功效 根: 止咳, 化痰; 叶: 消肿。

7238597 见 7238598a

# 7238598

*Senecio nagensium* C. B. Clarke

植物名 白千里光《广西植录》

药材名 白千里光《云南药录》

文献名 拿戛千里光《广西药录》

地方名 广西: 白背艾 (阳朔), 火门艾、蒿艾 (富川), 大叶艾 (钟山), [满山香] (南宁), 白艾 (乐业), [大风

艾] (昭平) 大木艾 (苍梧); 云南: 大白叶子火草、白叶火草 (思茅)。

功效 根或全草: 清热, 发表, 定喘, 驱虫。用于感冒高烧, 尿赤尿闭, 肾炎水肿, 气管炎, 支气管炎, 哮喘, 驱蛔虫。

# 7238598a

*Senecio nagensium* Clarke var. *lobbi* (Hook. f.) Craib

植物名 大茅香 (四川《南充中草》)

功效 全草: 止咳平喘, 祛风除湿。用于哮喘, 肺热咳嗽, 风湿疼痛。

# 7238599

*Senecio nemorensis* L.

植物名 林荫千里光《高植图鉴》

药材名 林荫千里光《中药志》

文献名 森林千里光《中国药植志》, 黄菀《高原中草》

功效 全草: 清热解毒。用于热痢, 眼肿, 痈疖疔毒。

# 7238600

*Senecio nimicola* Franch.

植物名 肾叶千里光《广西药录》

地方名 广西: 黄花草 (资源)。

功效 全草: 清热解毒。

# 7238601

*Senecio nudicaulis* Buch.-Ham. ex D. Don --- *S. pallens* Wall.

植物名 裸茎千里光《云南种录》

药材名 紫背千里光《中药大辞典》

文献名 紫背天葵草、紫背天葵草根、紫背鹿含草、天葵《滇南本草》, 反背红《云南中草药》

地方名 云南: 紫背草, 紫背叶, 紫背天葵, 紫背鹿衔草 (昆明), 红青菜, 草本反背红 (玉溪), 天青地红 (思茅), 老母猪花头, 反背绿丸, 山青菜、野青菜、无茎千里光 (红河)。

功效 全草: 消炎, 清热, 通经活络, 利湿, 调经。用于肝炎水肿, 小儿疳积, 月经不调, 白带过多, 产后腹痛, 跌打骨折; 根: 有小毒。外用于敷大恶疮。

# 7238601a

*Senecio obtusatus* Wall. ex DC.

植物名 钝叶千里光《广西药录》

功效 全草: 用于蛇伤, 阑尾炎。

# 7238602

*Senecio oldhamianus* Maxim.

植物名 蒲儿根《高植图鉴》

药材名 蒲儿根《汇编》

文献名 绵丝菜《名实图考》, 猫耳朵《陕西中草药》, 肥猪苗《贵州民间药物》

地方名 浙江: 火管青; 江西: 瓜叶菊; 湖南: 野麻叶, 犁头草; 广西: 黄菊莲 (天等), [刘寄奴]; 四川: [黄花草] (峨眉山); 其他: 野蒲桃, [野葡萄]。

功效 全草: 有小毒。清热解毒。用于疮疖肿毒。

# 7238603

*Senecio oryzetorum* Diels

植物名 田野千里光《高植图鉴》

药材名 大白顶草《贵州草药》

功效 全草:清热解毒。用于小儿白口疮,疔疮。

#### 7238604

*Senecio platyphyllus* DC.

植物名 宽叶狗舌草《汇编》

功效 全草:用于胆、肠、肾等绞痛,支气管喘息,急性结膜炎,神经性高血压,耳鸣,头痛,血液循环障碍,溃疡病,急性便秘等。

备考 眼科用全草1%溶液作散瞳药。

#### 7238605

*Senecio scandens* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 千里光《高植图鉴》

药材名 千里光《图经》、《汇编》

文献名 千里及《本草拾遗》,千里急、黄花演《图经》,眼明草《履巉岩本草》,九里光《滇南本草》,金钗草《医便》,九里明《生草药性备要》,黄花草《纲目拾遗》,千里明、九里及《名实图考》,九岭光《草木便方》,一扫光《分类草药性》

地方名 黄花母(江西、福建),九龙光(广东、湖南);陕西:光明草(略阳);浙江:箭草,青龙梗,木莲草,黄茄菜(浙南),九里香(龙泉);安徽:鸡浆草;江西:七里光;福建:软藤黄花草,〔黄花蒿〕(永安),黄花籽(三明);湖南:〔野菊花〕,白苏杆,九龙冠、鹅荣深根(黔阳、通道),九月白、大菊花(常德),九负刚(辰溪),花王位、九里宫(新晃),短子九里光(怀化),王位(通道),成邻鲜(吉首),走牙疳(汝桂);广东:金花草(潮安);广西:百花草,红花九里明(平南),竹根青、百里明(北海),黄花九里明,“过单显”(壮语);四川:九龙明;云南:糠枇花,粗糠花、风藤草(红河),勐努(思茅)。

功效 地上部分:清热解毒,明目,止痒。用于风热感冒,目赤肿痛,泄泻痢疾,皮肤湿疹,疮疖。

#### 7238606

*Senecio spelaeicolus* (Vant.) Gagnep.

植物名 岩穴千里光《高植图鉴》

地方名 广西:芦山藤(环江)。

功效 茎、叶:用于风湿骨痛,小儿慢惊风,跌打损伤。

#### 7238607

*Senecio stauntonii* DC.

植物名 闽粤千里光《高植图鉴》

药材名 闽粤千里光《湖南药物志》

功效 全草:清热解毒,消肿止痒。用于疥疮肿毒,疥癣,湿疹。

#### 7238608

*Senecio villiferus* Franch. --- *Ligularia villifera* (Franch.) Diels

植物名 紫毛千里光《高植图鉴》

药材名 紫毛千里光《贵州药录》

文献名 长毛千里光《云南种录》

地方名 贵州:蜈蚣七。

功效 全草:清热解毒,祛风除湿。用于风热感冒,黄疸,赤痢,白带,急性风湿性关节炎,无名肿毒,痔疮,湿疣,肾囊炎。

#### 7238609

*Senecio vulgaris* L.

植物名 欧洲千里光《高植图鉴》

药材名 欧洲千里光《贵州药录》

文献名 普通千里光《云南种录》

地方名 贵州:欧洲狗舌草,白顶草。

功效 全草:清热解毒,祛瘀消肿。用于口腔炎,湿疹,无名毒疮,肿瘤。

7238610 见 7238601a

#### 7238611

*Seriphidium brevifolium* (Wall. ex DC.) Ling et Y. R. Ling --- *Artemisia brevifolia* Wall. ex DC.

植物名 短叶绢蒿《西藏植志》

药材名 短叶绢蒿(拟)

功效 头状花序:可提取山道年。用于驱蛔虫。

#### 7238612

*Seriphidium cinum* (Berg. et Poljak.) Poljak. --- *Artemisia cinu* Berg. ex Poljak.

植物名 山道年蒿《中国药植图鉴》

药材名 绢蒿《中国药植图鉴》

文献名 鹤虱、西戎鹤虱、波斯鹤虱、鹤虱《唐本草》,支那花(小泉《药植》),山道尼格、希那《中国植物图鉴》,支那花、山道年花(山医《生药》),山道年草《中草药学》

功效 花序和叶:驱肠虫剂。用于蛔虫病,蛲虫病,线虫病。

#### 7238613

*Seriphidium finitum* (Kitag.) Ling et Y. R. Ling --- *Artemisia finita* Kitag.

植物名 东北绢蒿《东检》

药材名 东北绢蒿《汇编》

文献名 绢蒿《汇编》

地方名 黑龙江:海拉尔绢蒿(海拉尔);内蒙古:“塔乐斯图-哈木巴-沙里尔日”(蒙名);其他:山道年蒿。

功效 花序:有毒。驱虫。用于蛔虫病

备考 本品头状花序含 $\alpha$ 、 $\beta$ -山道年,经化学处理转化成 $\alpha$ -山道年后,可作驱蛔虫的原料。另外还含有东北绢蒿素 $\gamma$ -inun等。

#### 7238614

*Seriphidium incanum* --- *Artemisia incana* (L.) Druce

植物名 灰毛绢蒿《药学报》

药材名 绢蒿《中草药学》

文献名 单雌蕊绢蒿《药学报》,灰色绢蒿《中草药学》

功效 花序:驱虫。

备考 全草含山道年0.3%左右,花序中含山道年2~3%。

#### 7238615

*Seriphidium junceum* (Kar. et Kir.) Poljak. ---

*Artemisia juncea* Kar. et Kir.

植物名 三裂叶绢蒿《植物研究》

药材名 三裂叶蛔蒿(拟)

功效 花序:驱蛔虫。

#### 7238616

*Seriphidium junceum* (Kar. et Kir.) Poljak. var. *macrocladium* (Poljak.) Ling et Y.R.Ling

植物名 大头三裂叶绢蒿《植物研究》

药材名 大头三裂叶蛔蒿(拟)

功效 花序:驱蛔虫。

#### 7238617

*Seriphidium maritimum* (L.) Poljak. --- *Artemisia maritima* L.

植物名 海岸绢蒿《植物研究》

药材名 蒙古蛔蒿《中草药学》

地方名 其他:海滨蒿。

功效 花序:驱蛔虫;全草:抗生育。

#### 7238618

*Seriphidium terrae-albae* (Krasch.) Poljak. --- *Artemisia terrae-albae* Krasch.

植物名 白茎绢蒿《植物研究》

药材名 白茎蛔蒿(拟)

地方名 新疆:〔白蒿〕。

功效 花序:驱蛔虫。

#### 7238619

*Seriphidium transiliense* (Poljak.) Poljak. --- *Artemisia transiliensis* Poljak.

植物名 伊犁绢蒿《植物研究》

药材名 伊犁蛔蒿(拟)

功效 花序:驱蛔虫。

备考 花序主要成分为山道年(santonin),可提取作驱蛔虫药的原材料。

#### 7238620

*Serratula chinensis* S. Moore

植物名 华麻花头《高植图鉴》

药材名 广东升麻《广东中药》

文献名 土升麻《名实图考》,鸭麻菜《高植图鉴》,菊科华麻花头《中药材》

地方名 麻花头、〔绿升麻〕(广东、广西、福建),升麻(福建、湖南、广东、广西);福建:大叶油心菜,苦菜根,大叶菜根,牛香根。

功效 根:发豆疹,解毒。

备考 吉林部分地区有以根作漏芦用。

#### 7238621

*Serratula coronata* L.

植物名 副冠麻花头《江苏植志》

文献名 〔鼠尾草〕《满洲植志》,〔漏芦〕《祁州药志》,青刺薊《指示植物》,假泥糊菜《中国植物图鉴》,黄草《江苏植志》,伪泥胡菜《长白山植药志》

地方名 陕西:黄升麻(太白),牛尾升麻(凤县),〔升麻〕(商县),〔绿升麻〕(关中)。

功效 根:发豆疹,解毒。

#### 7238622

*Sheareria nana* S. Moore

植物名 虾须草《中国植志》

药材名 虾须草《名实图考》、《汇编》

文献名 沙小菊《高植图鉴》,绿绿草、〔草麻黄〕《中药大辞典》

地方名 贵州:绿心草。

功效 全草:清热解毒,利水消肿,疏风。用于水肿,无名肿毒,风热头痛。

#### 7238623

*Siegesbeckia glabrescens* Makino --- *Siegesbeckia orientalis* var. *glabrescens* Makino

植物名 毛梗豨薟《中国植志》

药材名 豨薟草《药典》

文献名 豨薟《唐本草》,豨薟根《滇南本草》,光豨薟草《兴安植群》,光豨薟《东检》,毛梗豨薟草《四川中药志》,少毛豨薟《广西药录》,粘糊菜、粘身草、虾蚰草《鉴别手册》,疏毛豨薟《汇编》,稀毛豨薟《中草药学》,豨薟果《浙江民药》

地方名 肥猪苗(广西、四川、云南),肥猪草(甘肃、云南);江苏:棉苍狼(云台山);浙江:山豨薟(煤山);广西:〔鹤虱〕(昭平),黄花草(宁明),铜锤草,红痴头婆(梧州);其他:狗屎粘。

功效 地上部分:祛风湿,利关节,解毒。用于风湿痹痛,筋骨无力,腰膝酸软,四肢麻痹,半身不遂,风疹湿疮。

#### 7238624

*Siegesbeckia orientalis* L.

植物名 豨薟《唐本草》、《中国植志》

药材名 豨薟草《药典》

文献名 豨薟草《海上方》,火豨、猪膏葍、虎膏、狗膏、火杖草《唐本草》,猪膏草《本草拾遗》,粘糊菜《救荒本草》,豨薟根《滇南本草》,希仙、虎豨、猪膏《纲目》,黄猪母《医林纂要》,猪膏母《名实图考》,肥猪苗《分类草药性》,类鼻、虎豨、羊屎菜、猪为豨、豨薟《新纲》,正豨薟草《祁州药志》,豨薟果《浙江民药》,绿豨草《中药志》,母猪油《现代实用中药》,亚婆针《国药的药理学》

地方名 虾蚰草(广东、广西),稀贤草、猪肝麻叶(华中),猪屎草(福建、台湾),珠草(广东、云南),黄花草(福建、广西);山东:棉黍棵;江苏:老奶补补丁,野芝麻,毛擦拉子,大叶草;上海:风湿草;浙江:老前婆,野向日葵,牛人参,鸡屎粘(泰顺),猪尿糊(平阳);江西:老陈婆(德兴、婺源),油草子,粘糊草;福建:猪母菜,土伏虱、金耳钩、有骨消(闽南),油英草、油夹草(宁化),卑巴兰、粘糊叶(泉州),野茄子(永安),黄花油夹草(清流),猴母梯(明溪),胡椒草(三明),黄花仔(南平),黄花豨薟草,大本黄花草,大号痢草,粘衣儿,假目头花,金蝴蝶,低山黄花草,金耳钩草,苦草,粘粘子,乌丁草,狗屎粘;台湾:猪屎菜;湖南:猪冠麻叶,四棱麻,大接骨;广东:感冒草,榄角草(广州),黄花晒(新丰),镇静草(乳源),〔鹤虱〕(连山),小豨薟,黄蜂草(惠阳),猴仔掇目(潮安);广西:铜锤草,五星花;四川:肥猪草(成

都);贵州:肥猪菜;云南:破布叶,烂帕布叶、毛稀荑(红河),贴贴果(昆明),猪草(文山),“牙阿公”(西双版纳傣语)。

功效 地上部分:祛风湿,利关节,解毒。用于风湿痹痛,筋骨无力,腰膝酸软,四肢麻痹,半身不遂,风疹湿疮。

#### 7238625

*Siegesbeckia pubescens* Makino --- *Siegesbeckia orientalis* var. *pubescens* Makino

植物名 腺梗稀荑《中国植志》

药材名 稀荑草《药典》

文献名 稀荑、火荑、虎膏、狗膏、火枚草《唐本草》,猪膏草《本草拾遗》,粘糊菜《救荒本草》,稀荑根《滇南本草》,希仙、虎荑、猪膏《纲目》,黄猪母《医林纂要》,猪膏母《名实图考》,希贤、火荑、类鼻、羊屎菜、猪为稀、蟾荑衿《新纲》,西荑《中国药植志》,柔毛稀荑《拉汉种称补编》,粘身草、虾蚶草《鉴别手册》,毛稀荑《汇编》,牛人參《简明中医辞典》

地方名 粘不沾(东北),粘不扎(东北、河北),粘苍子(吉林、辽宁),粘糊草(吉林、安徽),野葵花(安徽、江苏),珠草(福建、广东);吉林:“迈得利”(朝名);山西:粘分札;陕西:肥猪草(略阳);山东:棉荑,小胡麻(莒南),稀荑子(滕县),粘鼠(淄博),棉荑子(诸城),粘猪子,大粘珠子、粘珠草、粘叶子(烟台),棉荑,棉黍棵;江苏:棉荑狼(南云台山),粘强子(邳县),大叶草,老奶奶,婆婆丁,野芝麻,粘金强子,老奶奶补补丁;上海:风湿草;浙江:稀荑果;安徽:粘米糖,野菜姜,野洋姜,猪耳朵边,粘桃子棵,疮痒(滁县琅琊山);福建:黄花草;台湾:〔苦草〕、猪屎药(北部);河南:热粘泥;湖北:母猪油,粘蚊草;湖南:猪冠麻叶,猪母娘,四棱麻,大接骨;广东:感冒草,镇静草(乳源);四川:红通苗,皱皮葱,垮皮凑,肥猪菜,肥猪苗;云南:贴贴果(昆明);其他:黄花儿。

功效 地上部分:祛风湿,利关节,解毒。用于风湿痹痛,筋骨无力,腰膝酸软,四肢麻痹,半身不遂,风疹湿疮。

#### 7238626

*Siegesbeckia pubescens* Makino f. *eglandulosa* Ling et Hwang

植物名 无腺腺梗稀荑(拟)

药材名 稀荑草(广西贺县)

功效 全草:用于风湿骨痛。

#### 7238627

*Silybum marianum* (L.) Gaertn.

植物名 水飞蓟《中国植志》

药材名 水飞蓟《汇编》

文献名 水飞蓟《华北经植志要》,奶蓟、老鼠簕《汇编》,紫花水飞蓟《药学报》

地方名 广西:乳蓟。

功效 果:清热解暑,保肝,利胆,保脑,抗X射线。用于急、慢性肝炎,肝硬化,脂肪肝,代谢中毒性肝损伤,胆石症,胆管炎,肝胆管周围炎等。

#### 7238628

*Solidago altissima* L.

植物名 高一枝黄花《中药志》

备考 本品的甲醇提取液能抑制多种细菌和家蝇、果蝇卵的孵化作用。

#### 7238629

*Solidago canadensis* L.

植物名 加拿大一枝黄花《中国植志》

药材名 一枝黄花《四川中药志》

文献名 金棒草《中国植志》

地方名 四川:金柴胡。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于感冒风热头痛,咽喉肿痛,肺热咳嗽,疮痈肿毒,毒蛇咬伤,肺结核咳嗽咯血,外伤出血,脚癣,手癣,鹅掌风。

#### 7238630

*Solidago decurrens* Lour. --- *Solidago virgaurea* L. var. *leiocarpa* (Benth.) A. Gray

植物名 一枝黄花《中国植志》

药材名 一枝黄花《名实图考》、《汇编》

文献名 一枝蒿《和汉药标本目录》,秋麒麟《满州植录》

地方名 百根草、黄花仔(福建、广东),满山黄(江苏、浙江、江西、安徽),蛇头王(上海、江苏、浙江、湖北、广西),黄花草(陕西、江苏、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西),金柴胡(四川、广西、贵州、云南),百条根(福建、浙江),一枝枪、一支箭、一枝香、朝天一柱香(江西、湖南),〔竹叶柴胡〕、钓鱼杆柴胡(广西、贵州),土细辛(广西、广东、云南、贵州),六叶七星剑、蛇头黄、山白菜、黄花一枝香(广东、广西),金锁匙(浙江、江苏),〔土柴胡〕(福建、广东、四川),一柱香、金花草(湖南、广东),山马兰(陕西、江西),老虎尿(江西、广东);陕西:大叶泥鳅窜、苦斋草(宝鸡);浙江:黄花儿,黄儿(温州),金钗串;安徽:白百条根;江西:山边半枝香,洒金花,黄花虎、一朵黄花(泰和),大叶马兰、活血丹、一支香(德兴),肺痈草(丰城),丝线蛇、野细辛(信丰),金锁钥;福建:千根痕(厦门、龙溪),土泽兰、铁金拐(泉州),红胶苦菜,黄花母(云霄、诏安、东山),千条竹、红脚仔、黄花仔草、红头苦斋(清流),黄花菜(明溪),毛利金钗(三明),牡蛎金钗(永安),红杏苦菜(福鼎),溪边黄,水面油,蛋黄花,鸡蛋黄,塔仔草,毛筋菜,万金丹,万斤丹,千根竹,千金黄,千筋痕,千斤痕,一条香,东节角,水角,千金红,婆者花,金拐仔,冬节花;湖南:荑子草,大败毒(吉首),见血飞、黄花马兰(永兴),〔黄花地丁〕、小白龙须(衡山),黄花箭(麻阳),〔升麻〕(安化),三风散(耒阳),红花刀、青山菜、鸡油草(蓝嘉),开喉剑(湘阴),次泽兰(涟源),小柴胡(衡南),红柴胡(新宁),五爪见(辰溪),小救驾(桃源);广东:大叶七星剑,一枝上,老虎须、黄花蚊、本土细辛(化县),〔六月雪〕、金边菊、土厚合、黄花老虎尿、金汤匙、山金汤匙、〔金顶龙芽〕、土红花、〔山菠菜〕(兴宁),山厚合(汕头、潮汕),山芥采(阳春),百草根,马管子(南雄),铁汤匙(饶平),黄花草,山黄菊,山菠菜(海丰),黑脚莲(阳春);广西:



野黄菊(南宁),黄花细辛,一朵云,草里藏金,金星草,细颈蛇;四川:黄柴胡(重庆);贵州:汗马兰(榕江)、红箭杆柴(望漠),疔疮药(兴义);云南:破布叶。

**功效** 全草:疏风清热,抗菌消炎。用于感冒,急性咽喉炎,扁桃腺炎,疮疖肿毒。

#### 7238630a

*Solidago pacifica* Juz. --- *S. Virgaurea* L. ssp. *coreana* Kitag.

**植物名** 钝苞一枝黄花《中国植志》

**药材名** 朝鲜一枝黄花《长白山植志》

**文献名** 一枝蒿《吉林中草药》,一枝黄花《吉野》

**地方名** 吉林:朝鲜一支蒿,“哎给文出里”(朝名)。

**功效** 全草:清热解毒,化痰平喘,止血消肿。用于感冒发热,咽喉肿痛,支气管炎,喘息,肺炎,肺结核咯血,急、慢性肾炎,血尿,子宫出血。外用于痈肿疔毒,乳腺炎,毒蛇咬伤。

#### 7238631

*Solidago virgaurea* L.

**植物名** 毛果一枝黄花《中国植志》

**药材名** 一枝黄花(新疆)

**文献名** 新疆一枝黄花《汇编》

**功效** 全草:有小毒。疏风清热,抗菌消炎。用于麻疹,小儿肺炎,小儿疳积,百日咳,腹胀呕吐,肺病,外伤出血,乳腺炎,疮疖,痔疮,癣,无名肿毒,跌打瘀肿。

#### 7238632

*Solidago virgaurea* L. var. *dahurica* Kitag. --- *Solidago dahurica* Kitag.

**植物名** 兴安一枝黄花《品种论述》

**文献名** 一枝蒿《本草拾遗》,一枝黄花《名实图考》,兴安一枝蒿《东北药植志》

**功效** 全草:用于肾脏病,膀胱炎等,并有解毒作用。

7238633 见 7238630a

#### 7238634

*Soliva anthemifolia* (Juss.) R. Br. --- *Gymnostyles anthemifolia* Juss.

**植物名** 裸柱菊《中国植志》

**药材名** 裸柱菊《广西药园药录》

**地方名** 广东:座地菊(广州)。

**功效** 全草:清热解毒。用于痈疮肿毒。

#### 7238635

*Sonchus arvensis* L.

**植物名** 裂叶苣荬菜《汇编》

**药材名** 苣荬菜《名实图考》、《汇编》

**文献名** 茶、苦《诗经》,苦菜、茶草、选《本经》,游冬《别录》,苦苣《嘉祐本草》,编苣《日用本草》,老鹳菜《救荒本草》,苦苣、天香菜《纲目》,苣菜《晋书五行志》,苦苣麻《经济植物学》,北败酱《中药志》

**地方名** [败酱草](内蒙古、河北、北京、天津、陕西、甘肃、宁夏),野苦苣(广东、湖南),山苦苣(海南、广西),[蒲公英](广西、云南),小薊(东北),苦苣菜(广东、云南);河北:家苣荬,曲曲菜,取麻菜,苣菜;天津:

曲菜;浙江:孟菜,花叶孟菜;湖北:见肿消(荆州);湖南:苦麻菜,牛舌草,苏婆兜,山苣荬,野生菜,接肠草,马蚊花;广东:苦葛麻;广西:山上苦苣菜、鹅仔菜(北海),假苣菜,野苣菜,马家苣荬;四川:牛舌片(南川),牛舌头,苦麻叶;云南:野苦苣菜(红河),黄菜花(丽江),尖刀苦苣菜(文山),滇苦苣菜,苦马菜,羊奶草。

**功效** 全草:清湿热,消肿排脓,化瘀解毒。用于阑尾炎,肠炎,痢疾,疮疖脓肿,产后瘀血腹痛,痔疮。

#### 7238636

*Sonchus arvensis* L. var. *laevioles* Koch.

**植物名** 无毛匍茎苦菜《贵州药录》

**地方名** 贵州:豹子草。

**功效** 全草:清热解毒,散瘀软坚。用于狂犬病,淋巴结核。

#### 7238637

*Sonchus asper* (L.) Hill --- *S. oleraceus* L. var. *asper* L.

**植物名** 大叶苣荬菜《汇编》

**药材名** 滇苦菜、《名实图考》、《云南药录》

**文献名** [续断]《植物名汇》,鬼野葛粟《牧野日图》,续断菊、石白头《高植图鉴》,花叶滇苦菜《云南种录》,圆耳苦苣菜《药学报》

**地方名** [败酱草](吉林、辽宁、甘肃、宁夏、山东);湖南:白花大薊,白牛口刺,苦苣,甜菜草;广西:山苦苣(宁明);云南:苦苣菜,苦马菜,苦益菜,羊奶菜,小鹌菜。

**功效** 全株:凉血,止血。用于吐血,衄血,咯血,咳血,衄血,大肠下血。

#### 7238638

*Sonchus brachyotus* DC. --- *S. arvensis* L. ssp. *brachyotus* Kitam.

**植物名** 苣荬菜《汇编》

**药材名** 苣荬菜《中药志》

**文献名** 苦菜、苦决《陕甘宁植志》,野苦苣《中药志》,芻荬苦菜《江苏植志》

**地方名** 苦葛麻、苦麻子、苦苣菜、苣菜、[小薊](东北),[败酱](陕西、内蒙古、甘肃、河北、广西),[败酱草](华北),野苦菜(河北、江苏);吉林:“协士利”(朝名),[白头翁](延吉);河北:苣菜,取麻菜,曲心菜,刺薊,马薊,虎薊;内蒙古:“嘎顺-淖嘎”、“章色尔冲欧”、“加苦勒”(蒙名),甜苣;江苏:趣趣菜(东海),牛浆(连云港),须须菜(射阳);其他:苦沫菜,曲麻菜。

**功效** 全草:清热解毒,凉血利湿。用于急性咽喉炎,急性细菌性痢疾,吐血,尿血,痔疮肿痛。

#### 7238639

*Sonchus oleraceus* L. --- *S. ciliatus* Lam.

**植物名** 苦苣菜《高植图鉴》

**药材名** 滇苦菜《名实图考》、《汇编》

**文献名** 茶、苣《诗经》,苦菜、茶草、选《本经》,游冬《别录》,野苦马《普济方》,苦苣菜、野苣苣菜、天精菜《救荒本草》,苦马菜、羊奶菜《滇南本草》,苦菜花子《江颖食物本草》,苦苣、苦苣、苦菜根《纲目》,老鹳苦苣

《医林纂要》，苦苣麻《经济植物学》，取麻菜《祁州药志》，滇苦苣菜《云南种录》

地方名 〔败酱草〕(陕西、新疆、甘肃)；甘肃：苦菜花、苦苣麻、黄花郎(临洮)；江苏：石血头(苏北)；江西：野苦麻、苦麻(泰和)；福建：山菜头、大本蒲公英(厦门)；湖北：见肿消，土洋参；湖南：大苣蒲公英，牛口刺，高脚蒲公英(常德)；广西：苦麦菜(北流)，〔蒲公英〕(富川)；云南：空心苦马菜(华宁)，奶浆草(通海)，羊奶草，奶浆叶，小鹅菜(峨山)；其他：苣麻，苦地胆。

功效 全草：有小毒。清热解毒，凉血止血。用于肠炎、痢疾，急性黄疸型传染性肝炎，阑尾炎，乳腺炎，口腔炎，咽炎，扁桃腺炎，吐血，衄血，咯血，便血，崩漏。外用于疮痍肿毒，中耳炎。

#### 7238640

*Soroseris hookeriana* (C. B. Clarke) Stebb. --- *Crepis hookeriana* C. B. Clarke --- *Crepis glomerata* Hook. f.

植物名 绢毛菊《云南种录》

药材名 空筒参(陕西太白)

文献名 空桶参《陕西中草药》，空洞参《中药大辞典》

地方名 陕西：空空参，空筒参、喇叭草、喇叭花(太白山)；青海：“扫工色尔布”(藏名)。

功效 带根全草：润肺止咳，消炎下乳，调经止血。用于感冒咳嗽，支气管炎，乳腺炎，疮疖痈肿，乳汁不下，月经不调，崩漏，白带，衄血。

#### 7238641

*Soroseris hookeriana* (C. B. Clarke) Stebb. subsp. *erysimoides* (Hand.-Mazz.) Stebb.

植物名 糖芥绢毛菊《高植图鉴》

药材名 空筒参(陕西)

文献名 空桶参《汇编》，绢毛苣《西藏本草》

地方名 陕西：喇叭花(太白山)；青海：“苏尔公”(藏名)；西藏：“扫工色尔布”(藏名)。

功效 全草：润肺止咳，消炎下乳，调经止血。用于感冒咳嗽，支气管炎，乳汁不下，乳腺炎，月经不调，红崩，白带，衄血，疮疖痈肿。

#### 7238642

*Soroseris rosularis* (Diels) Stebb.

植物名 莲状绢毛菊《云南种录》

药材名 条参《云南药录》

地方名 云南：条条参。

功效 根：补益气血。用于贫血，病后体虚。

#### 7238643

*Soroseris umbrellata* (Franch.) Stebb.

植物名 伞花绢毛菊《高植图鉴》

药材名 红条参《云南药录》

地方名 云南：条参、条条参(丽江)，雪条参。

功效 根：补气血。用于身体虚弱，四肢无力，头晕。

#### 7238644

*Sphaeranthus africanus* L.

植物名 戴星草《中国植志》

药材名 戴星草《广西药录》

文献名 翅珠菊《高植图鉴》

地方名 广东：〔荔枝草〕；海南：田艾草(儋县)，三点花(澄迈)。

功效 全草：健胃，利尿，止痛。

#### 7238645

*Sphaeranthus indicus* L.

植物名 绒毛戴星草《中国植志》

药材名 戴星草《西双版纳傣药志》

地方名 云南：“麻腊干”(西双版纳傣语)。

功效 全草：有毒。强壮，清凉，利尿。用于泌尿系感染，消化不良。用于皮癣，麻风，腹胀腹疼，风湿关节痛。

#### 7238646

*Sphaeranthus senegalensis* DC.

植物名 非洲戴星草《中国植志》

功效 全草：清凉利尿，强壮。用于泌尿系统感染，消化不良。

#### 7238646a

*Spilanthes acmella* L. var. *oleracea* Clarke

植物名 六神花《台湾中药材图鉴》

地方名 广西：桂圆花。

功效 花：用于齿痛，腹痛。

#### 7238647

*Spilanthes callimorpha* A. H. Moore

植物名 美形金纽扣《中国植志》

药材名 小铜锤《云南中草药》

地方名 云南：〔黄花草〕、过海龙(红河)，小麻药(文山、玉溪)，细麻药(文山)，乌龙过江(曲靖)，铜锤草、遍地红(玉溪)，麻辣草，八股麻，野辣子草，黄花，小散药，辣子麻药，“牙爬拔”(西双版纳傣语)。

功效 全草：有小毒。祛风除湿，散瘀止痛。用于骨折，跌打损伤，风湿关节痛，痛经，胃寒痛，牙痛，感冒风寒，外伤出血。

7238648 见 7238646a

#### 7238649

*Spilanthes paniculata* Wall. ex DC. --- *S. acmella* auct. non (L.) Murr.

植物名 金纽扣《中国植志》

药材名 天文草《汇编》

地方名 散血草(广东、云南)，〔黄花草〕(广西、云南)；广东：拟千日菊，山天文草，蟾蜍沙(湛江)，山骨皮(五华)，黑节关(茂名)，香云草(潮阳)，大黄花(普宁)，黄花苦草(陆丰)，雨伞草；海南：苦草(琼中)；云南：红铜水草，小铜锤，遍地红，过海龙。

功效 全草：解毒利湿，止咳定喘，消肿止痛。用于疟疾，牙痛，肠炎，痢疾，咳嗽，哮喘，百日咳，肺结核。外用于毒蛇咬伤，狗咬伤，痈疖肿毒。

备考 过去文献常将本品误订为 *S. acmella* (L.)

Murray

#### 7238650

*Stevia rebaudina* (Bertoni) Hemsl.

植物名 甜叶菊《秦岭植志》

文献名 甜菊《科属词典》

功效 叶：用于肥胖病，糖尿病的辅助治疗药。

备考 本品原产南美，现我国引种成功。叶含6~12%的双萜甙，其甜度为蔗糖的300倍。

#### 7238651

*Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn.

植物名 金腰箭《中国植志》

药材名 金腰箭《汇编》

文献名 苞壳菊《广西本草选编》

地方名 广西：苦草（梧州）；云南：〔水慈姑〕、猪毛草（河口）。

功效 全草：清热解毒，散瘀消肿。用于感冒发热，痈肿疔疮。

#### 7238652

*Syneilesis aconitifolia* (Bunge) Maxim. --- *Cacalia aconitifolia* Bunge --- *Senecio aconitifolius* Turcz.

植物名 兔儿伞《高植图鉴》

药材名 兔儿伞《救荒本草》、《汇编》

文献名 雷骨散《高植图鉴》，雨伞菜、帽头菜《北方中草》

地方名 一把伞（陕西、广西、贵州），铁雨伞、雨伞草（浙江、安徽），鬼打伞（安徽、江西），小鬼伞（江苏、安徽）；陕西：贴骨伞，龙头七，伞草，阴阳伞；上海：七里麻；浙江：破阳伞、铁凉伞（金华）；安徽：独足莲；江西：雪里伞（婺源），〔独脚莲〕；湖南：南天扇，伞把草；其他：水鹅掌。

功效 根或全草：有小毒。祛风湿，舒筋活血，止痛。用于腰腿疼痛，跌打损伤。

#### 7238653

*Synurus deltoides* (Ait.) Nakai --- *S. pungens* (Franch. et Savat.) Kitam. --- *Serratula atriplicifolia* (Trev.) Benth. et Hook. f.

植物名 山牛蒡《中国植志》

药材名 山牛蒡《长白山植药志》

地方名 陕西：〔草果〕、大果草（镇坪）；浙江：臭山牛蒡。

功效 花、种子：用于瘰癧。

7238654 见 7238653

#### 7238655

*Tagetes erecta* L.

植物名 万寿菊《中国植志》

药材名 万寿菊《名实图考》、《汇编》

文献名 臭芙蓉《名实图考》，红菊花、红芙蓉花《植物名汇》

地方名 金鸡菊（云南、四川），伞段花（东北），黄芙蓉（华北）；天津：北美蓉花，芙蓉花；广西：黄菊（苍梧），〔红花〕（上林），柏花（岑溪），里苦艾（西林）；四川：金菊花，金菊，〔西番莲〕（成都）；云南：蜂窝菊、金菊花（昆明），臭菊花（红河）。

功效 花：清热解毒，化痰止咳。用于上呼吸道感染，百日咳，气管炎，眼结膜炎，咽炎，牙痛。外用于腮腺炎，乳腺炎，疖疮肿毒。

#### 7238656

*Tagetes patula* L.

植物名 孔雀草《中国植志》

药材名 孔雀草《汇编》

文献名 藤菊、〔西番莲〕《花镜》，细叶万寿菊《中国植物图鉴》，红黄草《科种》，万寿菊（拉汉种称），红黄万寿菊、小芙蓉花《汇编》

地方名 步步登高花（东北），西番菊（广东、云南），缎子花（四川、云南）；贵州：黄菊花，臭草；云南：臭菊花（玉龙山），〔野菊花〕、老来红（峨山），五瓣莲，小万寿菊。

功效 全草：清热利湿，止咳，止痛。用于上呼吸道感染，痢疾，咳嗽，百日咳，牙痛，风火眼痛。外用于腮腺炎，乳腺炎。

7238657 见 7238486a

#### 7238658

*Tanacetum variifolium* (Chang) Ling

植物名 太白艾《陕西中草药》

功效 全草：祛风镇静，清热解毒。用于小儿惊风，风湿麻木，阑尾炎。

#### 7238659

*Taraxacum apargiaeforme* f. *antegrifolium*

植物名 天全蒲公英《中药志》

文献名 蒲公英《中药志》

功效 全草：清热解毒，利尿散结。

#### 7238660

*Taraxacum brassicaefolium* Kitag.

植物名 芥叶蒲公英《吉野》

药材名 蒲公英《中药志》

功效 全草：清热解毒，消肿散结，利尿通淋。用于疔疮肿毒，乳痈，瘰癧，目赤，咽痛，肺痈，湿热黄疸，热淋涩痛。

#### 7238661

*Taraxacum brevirostre* Hand. - Mazz.

植物名 短喙蒲公英《迪庆藏药》

药材名 蒲公英《西藏》

文献名 藏药蒲公英《迪庆藏药》

功效 全草或根：清热解毒，健胃。用于旧热，“培根”病，“木保”病，“赤巴”病，肝胆病，血病，胃病，喉热病，急性中毒，疔痈；茎、叶：催乳。

#### 7238662

*Taraxacum calanthodium* Dahlst.

植物名 丽花蒲公英《中药志》

药材名 蒲公英《中药志》

功效 全草：清热解毒，利尿散结。用于急性乳腺炎，淋巴腺炎，疔毒疮肿，急性结膜炎，感冒发热，急性扁桃腺炎，急性支气管炎，肝炎，胆囊炎，尿路感染。

#### 7238663

*Taraxacum ceratophorum* DC.

植物名 角状蒲公英《中药志》

文献名 蒲公英《中药志》

功效 全草：清热解毒，消肿散结，利尿通淋。

## 7238664

*Taraxacum coreanum* Nakai

植物名 朝鲜蒲公英《吉野》

地方名 蒲公英(东北)。

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

## 7238665

*Taraxacum dissectum* (Ledeb.) Ledeb.

植物名 多裂蒲公英《中药志》

药材名 蒲公英(西北)、《品种论述》

文献名 裂叶蒲公英《云南种录》,决菜蒲公英《品种论述》

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

## 7238666

*Taraxacum erythropodium* Kitag.

植物名 红梗蒲公英《吉野》

药材名 蒲公英(东北)、《品种论述》

地方名 黑龙江:婆婆丁。

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。用于疔疮肿毒,乳痈,瘰癧,目赤,咽痛,肺痈,湿热黄疸,热淋涩痛。

## 7238667

*Taraxacum falcilobum* Kitag.

植物名 兴安蒲公英《东检》

地方名 黑龙江:蒲公英(兴安)。

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

## 7238668

*Taraxacum formosanum* Kitag.

植物名 台湾蒲公英《品种论述》

地方名 蒲公英(华中、华南、台湾)。

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

## 7238669

*Taraxacum heterolepis* Nakai et H. Koidz.

植物名 异苞蒲公英《吉野》

药材名 蒲公英《中药志》

地方名 黄花地丁、奶汁草(东北);吉林:公英,婆婆丁。

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。用于疔疮肿毒,乳痈,瘰癧,目赤,咽痛,肺痈,湿热黄疸,热淋涩痛。

## 7238670

*Taraxacum junpeianum* Kitag.

植物名 长春蒲公英《吉野》

地方名 吉林:蒲公英。

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

## 7238671

*Taraxacum lamprolepis* Kitag.

植物名 光苞蒲公英《吉野》

地方名 吉林:蒲公英。

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

## 7238672

*Taraxacum asiaticum* Dahlst. --- *T. leucanthum* (Ledeb.) Ledeb. --- *T. cuspidatum* Dahlst.

植物名 亚洲蒲公英《中药志》

药材名 蒲公英《中药志》

文献名 裁片蒲公英、白花蒲公英《高植图鉴》,蒲公英《中药志》

地方名 四川:[地丁](峨眉山)。

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

## 7238673

*Taraxacum liaotungense* Kitag.

植物名 辽东蒲公英《长白山植药志》

药材名 蒲公英《长白山植药志》

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

## 7238674

*Taraxacum lugubre* Dahlst.

植物名 川甘蒲公英《高植图鉴》

地方名 蒲公英(四川、甘肃)。

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

## 7238675

*Taraxacum mongolicum* Hand. -Mazz. --- *T. platycarpum* Dahlst.

植物名 蒲公英《高植图鉴》

药材名 蒲公英《唐本草》、《药典》

文献名 鬼公英《千金方》,蒲公英、構榔草《唐本草》,仆公英《千金翼方》,仆公瞿《图经》,[地丁]《本草衍义》,金簪草《土宿本草》,李字丁菜、黄花苗、黄花郎《救荒本草》,鸛鸛英《庚辛玉册》,婆婆丁《滇南本草》,白鼓丁《野菜谱》,黄花地丁、蒲公英、耳癰草、狗乳草、公英、地丁花、[苦菜]、白白菜、婆婆丁花、[苦马菜]《纲目》,奶汁草《本经逢原》,残飞坠《生草药性备要》,黄狗头《名实图考》,[卜地蜈蚣]、[鬼灯笼]《草木便方》,牛奶草《本草正义》,太奈、陆英、蒲英、鼓钉、波波丁、[大丁草]、石长生、金鼓草、構榔子、花郎草《新纲》,蒙古蒲公英《内蒙古中草药》

地方名 矮脚蒲公英(华中),古古丁、婆补丁(江苏、福建),灯龙花(四川、浙江),[黄花菜](上海、青海),黄黄苗(湖南、河南);北京:婆婆英;河北:把儿英,没根,高冠子簪花,蘑菇丁;山西:木姑姑,木根根,扑灯蛾;内蒙古:“巴嘎巴盖-其其格”、“库尔芒”(蒙名),姑姑英,推推;甘肃:阁老杆,阁老苔,灯盏花,黄花篮;青海:花花草,马曲曲菜;山东:步步丁;江苏:黄花郎子(泰县),[黄花草];上海:马花郎,羊花郎,地贡,田癰塌,皮癰塌,田鼠塌,水山药,水山菜;浙江:黄花三七,黄南姜;安徽:鹅儿菜,风吹一把伞;河南:崩杆苗,随风飘,小鸡蛋,勃勃丁,鹅娃子草,鹅娃菜,鹅耳食;湖南:乳汁草,马舌子;四川:茅萝卜,灯龙草;贵州:双英卜地;云南:黄花绿叶草,李字丁,地丁草(昭通),小莱花(红河)。

功效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。用于疔疮肿毒,乳痈,瘰癧,目赤,咽痛,肺痈,湿热黄疸,热淋涩痛。

## 7238676

*Taraxacum multisectum* Kitag.

植物名 细裂蒲公英《吉野》

地方名 吉林:蒲公英。

功 效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

7238677

*Taraxacum ohwianum* Kitam.

植物名 东北蒲公英《高植图鉴》

药材名 蒲公英《汇编》

功 效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

7238678

*Taraxacum platycedum* Diels --- *T. albo-marginatum* Kitag.

植物名 白缘蒲公英《高植图鉴》

药材名 蒲公英《中药志》

文献名 白边蒲公英《吉野》,白膜蒲公英《东检》,高山蒲公英《汇编》,热河蒲公英、河北蒲公英《中药志》

功 效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。用于疔疮肿毒,乳痈,瘰癧,目赤,咽痛,肺痈,湿热黄疸,热淋涩痛。

7238679

*Taraxacum pseudo-albidum* Kitag.

植物名 白花蒲公英《吉野》

药材名 蒲公英《中药志》

功 效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

7238680

*Taraxacum pseudo-albidum* Kitag. var. *lutescens* Kitag.

植物名 淡黄花蒲公英《中药志》

文献名 蒲公英《中药志》

功 效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

7238681

*Taraxacum sikkimense* Hand.-Mazz.

植物名 锡金蒲公英《迪庆藏药》

药材名 蒲公英《西藏》

文献名 藏药蒲公英《迪庆藏药》

功 效 全草或根:清热解毒,健胃。用于旧热,“培根”病,“木保”病,“赤巴”病,肝胆病,血病,胃病,喉热病,急性中毒,疔痈;茎或叶:催乳。

7238682

*Taraxacum sinicum* Kitag.

植物名 碱地蒲公英《药典》

药材名 蒲公英《药典》

文献名 扑灯蛾《指示植物》,华蒲公英《高植图鉴》

功 效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。用于疔疮肿毒,乳痈,瘰癧,目赤,咽痛,肺痈,湿热黄疸,热淋涩痛。

7238683

*Taraxacum tibeticum* Hand.-Mazz.

植物名 西藏蒲公英《西藏植志》

药材名 蒲公英《西藏》

文献名 藏蒲公英《云南种录》

功 效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

7238684

*Taraxacum variegatum* Kitag.

植物名 斑叶蒲公英《吉野》

地方名 吉林:蒲公英。

功 效 全草:清热解毒,消肿散结,利尿通淋。

7238685

*Tithonia diversifolia* A. Gray

植物名 肿柄菊《中国植志》

药材名 肿柄菊《广西药录》

文献名 假向日葵《广西药录》

地方名 广西:安日葵(苍梧)。

功 效 叶:用于急性胃肠炎。外用干疮疡肿毒。

7238686

*Tragopogon porrifolius* L.

植物名 蒜叶婆罗门参《高植图鉴》

药材名 婆罗门参《云南中草药》

文献名 植物嫁《经济植物学》,土泡参《云南中草药》

地方名 云南:绿苣(红河),洋参。

功 效 叶、根:健脾益气。用于小儿疳积,体虚,头癣。

7238687

*Turczaninowia fastigiata* (Fisch.) DC. --- *Aster fastigiatus* Fisch.

植物名 女菀《中国植志》

药材名 女菀《本经》、《中药大辞典》

文献名 女菀、白菀、织女菀《吴普本草》,女肠《广雅》,羊须草《雷公炮炙论》,白菀、织女菀、茺《别录》,女复《纲目》,野马兰《纲目拾遗》

地方名 [紫菀](黑龙江、湖南);浙江:牛尾巴甩(天台);福建:客鸟花(厦门);湖南:夜奔牛。

功 效 全草或根:温肺化痰,和中,利尿。用于咳嗽气喘,肠鸣腹泻,痢疾,小便短涩。

7238688

*Tussilago farfara* L.

植物名 款冬《高植图鉴》

药材名 款冬花《本经》、《汇编》

文献名 菟奚《尔雅》,款冻、苦萃《广雅》,兔奚、橐吾、颛冻、虎须《本经》,氏冬《别录》,钻冻《本草衍义》,代冬、水平菜《救荒本草》,冬花《万氏家抄方》,款花《疮疡经验全书》,看灯花《本草崇原集说》,八角乌《名实图考》,嫂冬《本草新注》,狗足草(叶《生药》),连三朵《中草药学》

地方名 山西:艾冬花;内蒙古:“温都森-朝英日勒格”(蒙名);陕西:西冬花;甘肃:灵台冬花;青海:九尽花;安徽:九九花;其他:款冬叶,正手攀,副手攀,顶冬花,上冬花。

功 效 花蕾:润肺下气,止咳化痰。用于新久咳嗽,喘咳痰多,癆嗽咳血。

7238689

*Vernonia anthelmintica* (L.) Willd.

植物名 驱虫斑鸠菊《中国植志》

药材名 驱虫斑鸠菊《民族药志》

文献名 印度山茴香《中国植志》

功 效 果实:清热消炎,活血化瘀,杀虫去斑。用

于白癰风,驱蛔虫、蛲虫。外用于疮疖肿痛。

### 7238690

*Vernonia aspera* (Roxb.) Buch.-Ham.

植物名 糙叶斑鸠菊《中国植志》

药材名 糙叶斑鸠菊《广西药录》

文献名 粗叶斑鸠菊《广西植志》,糙叶咸虾花《海南植志》,黑升麻《贵州民间药物》

地方名 [六月雪](海南、广西);广西:双色花(隆林)。

功效 根:发表散寒。用于风寒感冒。

### 7238691

*Vernonia chingiana* Hand.-Mazz.

植物名 广西斑鸠菊《中国植志》

药材名 广西斑鸠菊《广西药录》

文献名 仁昌斑鸠菊《广西药录》

地方名 广西:太阳关、(石南藤)(忻城),大叶敢宽(龙州)、棠菊。

功效 根:用于小儿惊风,日赤肿痛,成人败阳,烂疮。

### 7238692

*Vernonia cinerea* (L.) Less. --- *Conyza cinerea* L.

植物名 夜香牛《中国植志》

药材名 夜香牛《汇编》

文献名 伤寒草《岭南采药录》,伤寒草根《广东中药》,斑鸠菊《广西植志》

地方名 [一枝香](广东、台湾);福建:四季春(南安),紫花蒲公英(安溪),向日红(泉州),[月月红](莆田);小背草(仙游);台湾:生枝香;广东:夜牵牛,星拭草,返魂香,田基箭(阳春),[紫花地丁]、[搜山虎](潮汕),土地丁(普宁),假咸虾、枝香草(南澳),[蒲公英]、腊仔草(饶平);海南:消山虎;广西:小气菜(隆林),御绣花(岑溪),耳扫草(柳江),寄生草、断根黄(大瑶山),马踢香(陆川),白花草、札面草(玉林),猫儿根、狗斑狗白(平南),染色草、假咸虾花;云南:缩盖斑鸠菊,拐棍参(昆明);其他:断根草。

功效 全草:疏风散热,凉血解毒,安神。用于感冒发热,咳嗽,痢疾,黄疸型肝炎,神经衰弱。外用于痈疖肿毒,蛇咬伤;根:用于风毒流注。

### 7238693

*Vernonia clivorum* Hance

植物名 岗斑鸠菊《中国植志》

文献名 茄叶一枝蒿《云南中草药》

功效 全草:消炎止痛。用于腮腺炎,风火牙痛。

### 7238694

*Vernonia cumingiana* Benth. --- *Vernonia andersonii* auct. non Clarke --- *Vernonia scandens* auct. non DC.

植物名 毒根斑鸠菊《中国植志》

药材名 毒根斑鸠菊《汇编》

文献名 细脉斑鸠菊《海南植志》

地方名 [过山龙]、藤牛七(广东、广西);广东:软骨川山(阳春),蔓斑鸠菊(广州),发痧藤;广西:大木菊,小叶过山龙,夜牵牛(博白),[苦参](平南、大瑶山),上

牛七(藤县),过山风、白藤(龙州),过浜龙(昭平),黄药儿(苍梧),鸡肠风(蒙山),白狗称(桂平),牵牛藤、野牵牛、上白芍(北流),惊风红,虎二头;其他:毛叶咸虾花。

功效 藤茎或根:有小毒。祛风解表,舒筋活络,截疟。用于风湿关节痛,腰腿痛,跌打损伤。外用于眼结膜炎。

备考 过去文献常将本品误订为 *Vernonia andersonii* Clarke, 或 *V. scandens* DC.

### 7238695

*Vernonia esculenta* Hemsl. --- *V. papillosa* Franch.

植物名 斑鸠菊《中国植志》

药材名 斑鸠菊《汇编》

地方名 广西:鸡菊花,大藤菊;云南:火炭树,火烧叶,火炭叶,火炭叶,豆腐渣树,聋耳朵树,菊花树(屏边)。

功效 根:消炎,解毒。用于阑尾炎,疮疖;叶:用于烫伤。

### 7238696

*Vernonia extensa* (Wall.) DC.

植物名 展枝斑鸠菊《中国植志》

药材名 茄叶一枝蒿《云南药录》

地方名 云南:扩张鸡菊花,棒头斑鸠菊,小黑升麻(耿马)。

功效 全草:消炎止痛。用于腮腺炎,风火牙痛。

### 7238697

*Vernonia parishii* Hook. f. --- *V. laosensis* Gandog.

植物名 滇斑斑鸠菊《中国植志》

药材名 豆豉叶《云南药录》

地方名 云南:马耳朵草,镇心丸、大红花远志、大发散(思茅),野辣烟(文山)。

功效 根:清热消炎,截疟。用于疟疾,感冒发热,心慌心悸,产后体虚,风湿骨疼,肝炎。

### 7238698

*Vernonia patula* (Dryand.) Merr. --- *V. chinensis* Lam.

植物名 咸虾花《中国植志》

药材名 咸虾花《广西药录》

文献名 展叶斑鸠菊《广西植志》,大叶斑鸠菊《红河中草药》

地方名 黑升麻(广西、贵州);福建:猫屎草、闪筋草(厦门);广东:大叶咸虾花(广州),假咸虾花(阳春),鲫鱼草、臭草(曲江),紫花鲫鱼草、安仔草、花头草、插花苦草、鲫鱼胆(潮安),厝边蜂(潮州),红花仔(饶平),乌仔歇阴、乌仔陕阴(海丰),企枝鲫鱼草;海南:狗仔菜(崖县);广西:万重花、狗狗木根(玉林),狗仔花(大新),狗里狗红(龙州),狗汪汪(河口),狗罗罗(北海),大叶咸虾菜,白花草,狗白花;云南:大黑药、小黑树、贺郎格、牛鞭子草、巴大碗、[铁脚威灵仙](红河),大风艾(玉溪),鬼点火、烟斗草(河口)。

功效 全草:清热利湿,散瘀消肿。用于感冒发热,头痛,乳腺炎,急性胃肠炎,痢疾。外用于疮疖,湿疹,荨麻疹,跌打损伤。

### 7238699

*Vernonia saligna* (Wall.) DC.

植物名 柳叶斑鸠菊《中国植志》

文献名 柳叶威虾花《广西药录》

地方名 广西:日月药(田林),牙金药(北流),催产草;云南:白头升麻(思茅),白龙须(澜沧),铁球草,“米碌塞”(楚雄彝名)。

功效 根:健脾消食,止痛,凉血止血,润肺止咳。用于咽喉肿痛,肺结核,咳嗽咯血,白带,子宫脱垂,催产堕胎;全草:用于疟疾。

#### 7238700

*Vernonia solanifolia* Benth.

植物名 茄叶斑鸠菊《中国植志》

药材名 斑鸠木《汇编》

文献名 糙叶威虾花《海南植志》,茄叶威虾花《中国植志》

地方名 斑鸠菊(广东、广西);广东:夜牵牛(惠阳),飞花婆、硬骨夜牵牛、牛肠风(阳春),白花毛桃,苦伤根(鼎湖山);海南:大过山龙(澄迈);广西:月中风、空心痲麻(梧州),白沉沙(北流),硬骨过山龙(博白),威虾花,大消藤(灵山);四川:飞扬花(成都)。

功效 根:叶或全草:凉血止血,润肺止咳;根:用于咽喉肿痛,肺结核咳嗽,咯血;叶:外用于外伤出血。

#### 7238701

*Vernonia spirei* Gandog.

植物名 折苞斑鸠菊《广西药录》

地方名 广西:[六月雪](陆川)。

功效 根、叶:用于疟疾。

#### 7238702

*Vernonia squarrosa* (D. Don) Less. --- *Vernonia teres* Wall. ex DC. --- *Vernonia squarrosa* var. *orientalis* Kitam.

植物名 刺苞斑鸠菊《中国植志》

文献名 紫威灵、白脚威灵《汇编》,圆柱斑鸠菊《广西药录》,剪子草《云南中草药》

地方名 云南:黑继参(弥勒),白脚威灵仙(通海),风毛菊(红河),[紫花地丁](峨山)。

功效 根:健脾消食,止痛除湿,消炎。用于消化不良,腹胀闷,风湿关节痛,偏头痛,疮疖,食管癌,胃癌。

#### 7238703

*Vernonia volkameriifolia* (Wall.) DC.

植物名 大叶斑鸠菊《中国植志》

药材名 大叶斑鸠菊《广西药录》

地方名 云南:大叶鸡菊花,“当毫温”(西双版纳傣名)。

功效 根、茎叶:用于风湿关节炎,关节疼痛,小便脓血,尿石,尿痛。

#### 7238704

*Vladimiria berardioides* (Franch.) Ling --- *Saussurea edulis* Franch. var. *berardioides* Franch. --- *Jurinea berardioides* (Franch.) Diels --- *Dolomiaea berardioides* (Franch.) Shih

植物名 厚叶木香《高植图鉴》

药材名 理木香《鉴别手册》

文献名 青木香《云南中草药选》,越西木香《中草药》,厚叶川木香《中国植志》

地方名 云南:木香,“阿巴”(纳西族语)。

功效 根:疏肝理气,健胃止痛。用于腹痛,慢性胃肠炎,消化不良,支气管炎。

备考 《中国植志》将 *Vladimiria* 属改为 *Dolomiaea* 属。

#### 7238705

*Vladimiria denticulata* Ling --- *Dolomiaea denticulata* (Ling) Shih

植物名 越西木香《汇编》

药材名 越西木香《汇编》

文献名 越隽木香《植分学报》,越隽川木香《中国植志》

地方名 上海:雅安木香。

功效 根:行气止痛,温中和胃。用于脘腹胀痛,呕吐,泄泻,痢疾里急后重。

#### 7238706

*Vladimiria edulis* (Franch.) Ling --- *Jurinea edulis* (Franch.) Franch. --- *Saussurea edulis* Franch. --- *Dolomiaea edulis* (Franch.) Shih

植物名 菜木香《高植图鉴》

药材名 菜木香《汇编》

文献名 越西木香《中草药》

地方名 云南:大理木香,青木香,理木香。

功效 根:舒肝理气,健胃止痛。用于腹痛肠鸣,下痢,慢性胃肠炎,消化不良。支气管炎。

#### 7238707

*Vladimiria edulis* (Franch.) Ling f. *bracteata* Ling

植物名 长苞菜木香《高植图鉴》

文献名 越西木香《中草药》,有苞菜木香《汇编》,具苞菜木香《云南种录》

功效 根:行气止痛,温中和胃。用于脘腹胀痛,呕吐,泄泻,痢疾里急后重。

#### 7238708

*Vladimiria edulis* (Franch.) Ling f. *caulescens* (Franch.) Ling

植物名 具茎菜木香《高植图鉴》

药材名 越西木香《汇编》

文献名 有茎菜木香《汇编》

功效 根:行气止痛,温中和胃。用于脘腹胀痛,呕吐,泄泻,痢疾里急后重。

#### 7238709

*Vladimiria forrestii* (Diels) Ling --- *Dolomiaea forrestii* (Diels) Shih

植物名 膜缘木香《高植图鉴》

药材名 理木香《云南药录》

文献名 越西木香《中草药》,膜缘川木香《中国植志》

地方名 云南:青木香,“压巴”(丽江)。

功 效 根:行气止痛,温中和胃。

## 7238710

*Vladimiria muliensis* (Hand.-Mazz.) Ling

植物名 木里木香《高植图鉴》

药材名 越西木香《汇编》

文献名 木里久苓草《中国经植志》

地方名 上海:雅安木香;四川:越隽木香,泡木香(冕宁),木香。

功 效 根:行气止痛,温中和胃。用于脘腹胀痛,呕吐,泄泻,痢疾里急后重。

## 7238711

*Vladimiria souliei* (Franch.) Ling --- *Jurinea souliei* Franch. --- *Dolomiaea souliei* (Franch.) Shih

植物名 川木香《高植图鉴》

药材名 川木香《药典》

地方名 湖南:南木香;四川:铁杆木香,槽子木香。

功 效 根:行气止痛。用于脘腹胀痛,肠鸣腹泻,里急后重,两胁不舒,肝胆疼痛。

## 7238712

*Vladimiria souliei* (Franch.) Ling var. *cinerea* Ling --- *Dolomiaea souliei* (Franch.) Shih var. *mirabilis* (Anth.) Shih

植物名 灰背川木香《高植图鉴》

药材名 川木香《药典》

文献名 灰毛川木香《药典》

地方名 四川:木香。

功 效 根:行气止痛。用于脘腹胀痛,肠鸣腹泻,里急后重,两胁不舒,肝胆疼痛。

## 7238713

*Waldheimia glabra* (Decne.) Rgl.

植物名 西藏扁芒菊《中国植志》

地方名 西藏:“刚布”(藏名)。

功 效 全草:用于感冒。

## 7238714

*Wedelia biflora* (L.) DC.

植物名 李花蟛蜞菊《中国植志》

药材名 黄泥菜《广西药录》

功 效 全草:用于风湿骨痛,跌打损伤,疮疡肿毒。

## 7238715

*Wedelia chinensis* (Osb.) Merr. --- *Wedelia calendulacea* Less.

植物名 蟛蜞菊《中国植志》

药材名 蟛蜞菊《本草求原》、《中药大辞典》

文献名 马兰草、蟛蜞花、路边菊《生草药性备要》,金盏蟛蜞菊《中药志》

地方名 卤地菊(广东、广西),田乌草(浙江、台湾),黄花草(福建、广西);浙江:红叶堆(温州);福建:黄花龙舌草(福州、泉州、仙游、厦门、同安),黄花曲草,杨戩三尖刀(福州、厦门、同安),黄花母(漳州);台湾:〔旱莲草〕,拈力草,黄花田路草,蛇舌草,天红草舅;广东:黄花墨菜、黄花蟛蜞菊(惠阳),黄花蛆草(潮阳),黄花棕草(南澳),黄菊仔、田黄菊(海丰),黄花断血草(惠来),

黄花蟛蜞草(潮汕),大肠血草、〔散血草〕(潮安);广西:水兰(陆川),回春草(玉林),小肠风、小还魂(博白),黄野蒿、臭菊(河池)。

功 效 全草或根:清热解毒,泻火养阴。用于急性咽炎,扁桃体炎。

## 7238716

*Wedelia prostrata* (Hook. et Arn.) Hemsl.

植物名 卤地菊《中国植志》

药材名 卤地菊《福建民间草药》

文献名 龙舌三尖刀、龙舌草、三尖刀《中国药植图鉴》

地方名 鹤舌草、金棒草、旱丹草、黄花草、黄花母(福建、广东);福建:黄花龙舌花,黄花龙舌草,黄花白曲草,黄花冬节草,软枝泽兰(泉州),〔旱莲草〕(漳州),叶内珠,杨晋三尖刀,打不死,田螺草,灵丹草,田边菊;广东:黄花蟛蜞菊,黄花冬菊,黄花冬草(潮阳),黄野蒿,牛笔草,打不死草;四川:汉丹草,水金菊;其它:野黄菊,黄花密菜,黄叶膏。

功 效 全草:清热,解毒。用于喉蛾,喉痹,白喉,百日咳,肺热喘咳,鼻衄,痈肿,疔疮。

## 7238717

*Wedelia urticifolia* DC.

植物名 麻叶蟛蜞菊《中国植志》

药材名 滴血根(云南)、《汇编》

文献名 荨麻叶蟛蜞菊《广西植录》

地方名 云南:血参,女金丹,〔接骨草〕(丽江),〔小血藤〕。

功 效 根:温经,通络,养血,活血,补肾。用于肾虚腰痛,气血虚弱,跌打损伤。

## 7238718

*Wedelia wallichii* Less.

植物名 山蟛蜞菊《中国植志》

药材名 血参《云南中草药选》

文献名 高原蟛蜞菊《广西植录》,麻叶蟛蜞菊《汇编》

地方名 广西:乳腺草(平果);贵州:细针果。

功 效 全草:有毒。补血,活血。用于贫血,产后流血过多,子宫肌瘤,闭经,神经衰弱。

## 7238719

*Xanthium mongolicum* Kitag.

植物名 蒙古苍耳《中国植志》

文献名 东北苍耳《高植图鉴》

地方名 苍耳(东北)。

功 效 果实:散风湿,通鼻窍。

## 7238720

*Xanthium sibiricum* Patr. ex Widder

植物名 苍耳《尔雅》、《中国植志》

药材名 苍耳子《千金·食治》、《药典》

文献名 卷耳《诗经》,苓耳《毛诗传》,耳实、胡臬、地葵《本经》,臬耳实、施、常思《别录》,臬耳《〈楚辞〉王逸注》,白胡要《〈礼记〉郑玄注》,常集《广雅》,菰《广韵》,卷施草《玉篇》,檀菜《尔雅义疏》,爵耳、耳当草(陆玑



《诗疏》),常思菜、羊负来《本草经集注》,只刺、苍耳草《千金·食治》,苍耳根《食疗本草》,进贤菜《记事珠》,道人头《图经》,喝起草《斗门方》,麻虫、蠹虫《圣济总录》,佛耳《履巉岩本草》,缣丝草《证治要诀》,野缣丝《摘元方》,野茄、猪耳、苍耳虫、苍耳花、喝起草《纲目》,双耳子《汉药写真集成》,耳玛、玛草、野落苏、缣绿菜、吐叱古个里《新纲》

地方名 胡苍子(东北、湖南),苍子(东北、天津、青海、山东、河南),野茄子(东北、江苏、安徽、福建、湖南),虱麻头、痴头婆(湖南、广东、广西),苍耳葵藜(陕西、河北),白痴头婆(广东、广西、云南),老苍子、老苍子草(吉林、辽宁、河北、江西),青耳子、母猪癩、散子、回菜场子花(东北);吉林:“捣高麻列”(朝名);北京:塔果(京郊);天津:葵藜狗子;内蒙古:“浩尼-音-章古”、“那宝马”、“诺霍英-赞古”(蒙名),刺儿苗;新疆:“部都是咖克”(维名);陕西:苍棵子;甘肃:菜耳;青海:“切才尔”(藏名);山东:苍子棵;江苏:棉螳螂(云台山),绵苍浪子,棉草狼子,苍郎种(泰州),镔子(铜山、邳县),苍浪子,羌子棵,青棘子,罗春子,野茄果,鱼脚干,枪子,毛苍耳子,金强子;上海:狗耳朵草,芦青株;浙江:疗疮草,丁疮草(杭州),癩头婆子(嵊县),野绿苏(天目山),琴丝(温州、泰顺),油带来(洞头);安徽:歪死缠,毛枪子棵,老虎蛋,胡死赖,见人粘;江西:野茄藤、秋分草(泰和);福建:粘粘葵,野紫菜,头毛刺(厦门),山茄、羊带来(大田),莢籽(永安),牛尾草(明溪),棘葵子、葵子草(宁化),粘肉其(闽东),加郎姆;湖北:刺儿果,母猪蒿(襄阳);湖南:俄螳螂,野紫爪,羊屎草,羊屎果,野苏树,猴子树,粘花子,野茄蕊(常德);广东:粘头婆,虱马头(电白),白孟(连平),阴菜规(普宁),盐菜规(潮安),肥猪草(英德),痴头螳(广州),白花虱母头、虱母头、羊带归(潮汕),猪母带(潮州),胶东仔(潮州、潮阳),胶东只头(汕头、南澳),虱母球(惠来),〔狗脚迹〕(惠来、普宁),大叶痴头婆、大叶挪身子、痴头芒、猪麻茄(粤北),〔荔枝草〕;广西:假矮瓜,白猪母络,俄虱子,羊带归子、大肥猪苗(田林);四川:“刺”(藏名),麻核桃;贵州:牛虱子;云南:粘粘果,〔棉花根〕(临沧),粘马头果、吉马庄(文山),粘头发根,“牙西温”(西双版纳傣名),“葵策尔”(藏名)。

功效 果实(苍耳子):有小毒。散风湿,通鼻窍。用于风寒头痛,鼻渊流涕,风疹瘙痒,风湿拘挛;全草(苍耳草):有小毒。用于子宫出血,深部脓肿,麻风,皮肤湿疹;根(苍耳根):用于疔疮,痈疽,缠喉风,丹毒,高血压,痢疾,糖尿病;花:用于白癞顽癣;蠹虫(寄生茎中):用于疔肿,痔瘡。

#### 7238721

*Xanthopappus subacaulis* C. Winkl.

植物名 黄纓菊《高植图鉴》  
药材名 黄纓菊《汇编》  
文献名 黄冠菊《青海中草》,九头刺盖《中草药通讯》

地方名 青海:“江才尔”(藏名),九头妖,九头妖魔。

功效 全草:有小毒。止血,催吐。用于吐血,子

宫出血,食物中毒。

#### 7238722

*Youngia guangxiensis* Chand

植物名 广西黄鹌菜《广西药录》

地方名 广西:假公英(梧州)。

功效 全草:用于蛇咬伤。

#### 7238723

*Youngia japonica* (L.) DC. --- *Crepis japonica* (L.) Benth.

植物名 黄鹌菜《高植图鉴》

药材名 黄鹌菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 黄菜《救荒本草》,黄瓜菜《名实图考》,黄花草、雀雀菜、雀雀草、雀雀包、雀雀台、牛屎花、牛石花、鸭屎条《植物名汇》

地方名 山飞龙(台湾、广东);福建:山芥菜、土芥菜、野芥菜、野芥兰、芥菜仔、臭头苦苣(晋江),狗舌癩(厦门),喉草、狗舌黄(泉州);台湾:加蝶草,單壁癩,山刈菜,山根龙,山瓜菜;广东:白头公,黄花枝香草(潮汕),天葛菜(汕头),软叶天葛菜(潮州),冲天黄(饶平),菜头草、〔黄花地丁〕、涂飞龙、小米天芥菜(潮安),三脚镇、痲仔草、疔仔草(揭阳);广西:苦菜药(隆林),三枝香(桂平),苦菜草(桂林),野青菜,〔蒲公英〕;四川:野油菜(成都),〔败酱草〕、地波菜(南充)。

功效 全草或根:清热解毒,利尿消肿,止痛。用于咽炎,乳腺炎,牙痛,小便不利,肝硬化腹水。外用于疮疖肿毒。

#### 7238724

*Youngia stenoma* (Turcz.) Ledeb.

植物名 碱黄鹌菜《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古:“希拉-布敦-乌布斯”(蒙名)。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于疮肿疗毒。

#### 7238725

*Zinnia elegans* Jacq.

植物名 百日菊《中国植志》

药材名 百日菊《四川中药志》

文献名 百日草《汇编》

地方名 火毡花(东北),鱼尾菊(广东、四川);北京:步步登高;陕西:〔十样景〕(佛坪);上海:节节高;湖南:〔十姊妹〕、〔合掌消〕(长沙);云南:万寿花(丽江)。

功效 全草:清热利尿。用于痢疾,淋症,乳头痛。

### 7239 龙胆科 Gentianaceae

#### 7239001

*Canscora lucidissima* (Levl. et Vant.) Hand.

-Mazz. --- *Euphorbiopsis lucidissima* Levl. et Vant.

植物名 穿心草《高植图鉴》

药材名 穿心草《汇编》

地方名 广西:穿钱草,顶心风,〔穿心莲〕,狮子草,串钱草(阳朔)。

功效 全草:清热解毒,止咳,活血,止痛。用于肺热咳嗽,胃痛,黄疸型肝炎,毒蛇咬伤。

## 7239002

*Canscora melastomacea* Hand. - Mazz.

植物名 罗星草《高植图鉴》

药材名 罗星草《汇编》

文献名 糖果草《广西本草选编》, 条萼田草《海南植物志》, 堪可可拉草《广西药录》

地方名 广西: 四方草、四不正(博白)。

功效 全草: 清热消肿, 散瘀止痛, 接骨。用于急性胆囊炎, 急性肠炎, 急性扁桃体炎, 跌打损伤, 骨折, 关节肿痛。

## 7239003

*Centaurium pulchellum* Druce var. *altaicum* (Griseb.) Kitag. et Hara --- *Centaurium meyeri* (Bunge) Druce --- *Erythraea meyeri* Bunge

植物名 白金花《高植图鉴》

药材名 白金花《中药大辞典》

文献名 麦氏埃蕾《江苏南部种册》, 埃蕾、东北埃蕾《沙漠药植》

地方名 内蒙古: “苏木珠-地格达”(蒙名)。

功效 带花全草: 清热解毒, 用于肝炎, 胆囊炎, 头痛发烧, 牙痛, 扁桃体炎。

备考 蒙药将本种作紫花地丁入药。

## 7239004

*Comastoma traillianum* (Forrest) Holub --- *Gentiana trailliana* Forrest --- *G. beesiana* W. W. Smith --- *G. trailliana* var. *minima* Marq. --- *Comastoma bessianum* (W. W. Smith) Holub

植物名 高杯喉毛花《中国植志》

药材名 喉毛花《迪庆藏药》

文献名 中甸喉花草《云南种录》

功效 全草: 清热, 舒肝, 利胆。用于肝、胆热症, 时疫发烧。

## 7239005

*Crawfordia campanulacea* Wall. et Griff. ex C. B. Clarke --- *C. bulleyana* Forrest

植物名 云南蔓龙胆《中国植志》

药材名 双蝴蝶《云南中草药》

地方名 云南: 小红参(临沧), 小百部(怒江), 小双参, 四代同堂(保山)。

功效 根: 养阴润肺, 活血止痛, 驱虫。用于肺结核, 百日咳, 月经不调, 腹痛, 蛔虫, 蛲虫, 皮肤发痒, 跌打损伤。

备考 云南保山地区以之代牛膝用。

## 7239006

*Crawfordia pricei* (Marq.) H. Smith --- *Gentiana pricei* Marq.

植物名 福建蔓龙胆《中国植志》

药材名 蝴蝶草《广西药录》

地方名 广西: 接筋藤。

功效 全草: 清热解暑。用于肺热咳嗽, 肺结核, 肾炎, 痢疾, 疔毒, 刀伤。

## 7239007

*Exacum bellum* Hance

植物名 美丽藻百年《广西药录》

文献名 美丽百年草《广西药录》, 美丽藻百年草《广西植录》

地方名 广西: 合排草(凤山), 四方草(上林), (田基黄)(田阳)。

功效 全草: 用于肝炎, 咽喉肿痛。

## 7239008

*Exacum tetragonum* Roxb.

植物名 藻百年《高植图鉴》

药材名 藻百年《广西药录》

功效 全草: 用于口腔炎, 骨折, 跌打损伤。

## 7239009

*Gentiana algida* Pall.

植物名 高山龙胆《高植图鉴》

药材名 高山龙胆《汇编》

文献名 苦龙胆《中国植物图鉴》, 白花龙胆《西藏中草》

地方名 “棒坚朵鲁”(四川、西藏藏名); 西藏: “榜间噶尔布”(藏名)。

功效 全草: 清肝胆, 除湿热, 健胃。用于流行性脑脊髓膜炎, 目赤, 咽痛, 肺热咳嗽, 胃炎, 尿痛, 阴痒, 阴囊湿疹。

## 7239010

*Gentiana apiata* N. E. Brown --- *G. tsinlingensis* Limpr.

植物名 太白龙胆《中国植志》

药材名 茺苓草《陕西中草药》

文献名 秦岭龙胆《秦岭植志》

功效 全草: 调经活血, 清热明目, 利小便。用于月经不调, 痛经, 头晕失眠, 小便不利, 淋症, 崩漏, 白带, 痢疾, 腹痛。

## 7239011

*Gentiana arethusae* Burk. var. *delicatula* Marq. --- *G. heptaphylla* Balf. f. et Forr. --- *G. heptaphylla* var. *mixta* H. Smith --- *G. subocculta* Marq. --- *G. arethusae* Burk. var. *rotundato-lobata* Marq.

植物名 七叶龙胆《中国植志》

药材名 蓝龙胆《迪庆藏药》

文献名 细圆裂龙胆《云南种录》

功效 花: 清热解毒。用于时疫热, 肺热。

## 7239012

*Gentiana aristata* Maxim.

植物名 尖叶龙胆《高植图鉴》

文献名 刺芒龙胆《青藏药图》

地方名 青海: “完布”(藏名)。

功效 全草: 解毒祛湿。用于黄水疮。

## 7239013

*Gentiana atuntsiensis* W. W. Sm.

植物名 德钦龙胆《药学报》

文献名 阿墩子龙胆《西藏植志》

地方名 四川: 龙胆(昭觉、普格)。

功效 根、根茎: 清热燥湿, 泻肝胆火。

**7239014***Gentiana cephalantha* Franch.

植物名 头花龙胆《高植图鉴》

文献名 龙胆《云南种录》

地方名 四川:龙胆草(西昌)。

功效 根、根茎:清热燥湿,泻肝胆火。

**7239015***Gentiana chinensis* Kusnez.

植物名 中国龙胆《中国植志》

药材名 翠兰花《峨眉药植研究》

功效 全草:用于疯狗咬伤。

**7239016***Gentiana crassicaulis* Duthie ex Burk.

植物名 粗茎秦艽《汇编》

药材名 秦艽《药典》

文献名 粗茎龙胆《高植图鉴》,秦艽、左秦艽《简明中医辞典》,厚茎秦艽《云南药录》,萝卜艽、牛尾艽《中药志》,麻花艽《药典》

地方名 四川:“锡汤”(藏名),川秦艽,牛尾秦艽,萝卜秦艽,麻花秦艽。

功效 根:祛风湿,清湿热,止痹痛。用于风湿痹痛,筋脉拘挛,骨节烦痛,日晒潮热,小儿疳积发热。

**7239017***Gentiana crassuloides* Bureau et Franch.

植物名 肾叶龙胆《中国植志》

药材名 肾叶龙胆《迪庆藏药》

文献名 假景天龙胆《云南种录》

功效 全草:清热解毒。用于疮疖,“黄水”病。

**7239018***Gentiana dahurica* Fisch.

植物名 达乌里秦艽《品种论述》

药材名 秦艽《药典》

文献名 山大艽《药学报》,狗尾艽、小秦艽《汇编》,山秦艽、兴安龙胆、五岭龙胆《中药志》,纹秦艽、左秦艽、西秦艽《常用中药名辨》,达乌里龙胆《高植图鉴》

地方名 内蒙古:“呼和-鲁-苏斯”(蒙名),百步草,九股秦,九骨层;甘肃:狗秦艽,狗苳子;青海:左拧根;四川:“锡汤旁注”(藏名)。

功效 根:祛风湿,清湿热,止痹痛。用于风湿痹痛,筋脉拘挛,骨节烦痛,日晒潮热,小儿疳积发热。

备考 《民族药志》注称:内蒙古有的地方,以本种之花代玉簪花用。

**7239019***Gentiana davidii* Franch.

植物名 五岭龙胆《中国植志》

药材名 簇花龙胆《汇编》

文献名 鲤鱼胆《浙江药植志》

地方名 九头青、矮杆鲤鱼胆(浙江、福建);浙江:九头牛(泰顺),落地荷花;福建:歇地龙胆;广西:青叶胆(全州)。

功效 全草:清热解毒,利尿,明目。用于化脓性骨髓炎,尿路感染,结膜炎,急性咽炎,扁桃体炎。外用

于疔疮。

**7239020***Gentiana decumbens* L. f.

植物名 斜升秦艽《汇编》

药材名 小秦艽《汇编》

文献名 斜升龙胆《高植图鉴》

地方名 秦艽(甘肃、青海、新疆);甘肃:狗秦艽。

功效 根:祛风湿,清湿热,止痹痛。

**7239021***Gentiana dendrologi* Marq.

植物名 川西秦艽《中国植志》

药材名 秦艽(四川)

功效 根:祛风湿,清湿热,止痹痛。

**7239022***Gentiana duclouxii* Franch.

植物名 昆明龙胆《云南种录》

文献名 菊花参《红河中草药》

地方名 云南:白洋参、水胖药(红河)。

功效 根:安神补气,生津液。用于气虚体弱,神经衰弱,遗精,贫血,子宫脱垂,小儿疳积,消化不良,遗尿,虚热咳嗽。

**7239023***Gentiana filistyla* Balf. f. et Forrest ex Marq.

植物名 丝柱龙胆《西藏植志》

文献名 双色龙胆《西藏中草》,蓝花龙胆《汇编》

地方名 西藏:“傍间莪那”、“邦见莪那”(藏名)。

功效 全草:清肝胆火,解毒。用于湿热黄疸,目赤,头痛,咽炎。

**7239024***Gentiana hexaphylla* Maxim.

植物名 轮叶龙胆《高植图鉴》

文献名 六叶龙胆《青藏药图》

地方名 青海:“吉解那保”(藏名)。

功效 根:用于炭疽,风湿性关节炎。

**7239025***Gentiana kaufmanniana* Regel et Schmalh.

植物名 中亚秦艽《中国植志》

文献名 狭翅龙胆《高植图鉴》,新疆龙胆《中药通报》,新疆秦艽《药学报》,小秦艽《中药大辞典》

功效 根:祛风湿,清湿热,止痹痛。

**7239026***Gentiana loureiri* (D. Don) Griseb.

植物名 华南龙胆《高植图鉴》

药材名 龙胆地丁《汇编》

文献名 广地丁《中药志》

地方名 紫花地丁(广东、广西、四川),福建:小金瓜管(松政);广东:地丁,土地丁(广州);四川:蓝花草,蓝花地丁(成都)。

功效 全草:清热利湿,解毒消肿。用于咽喉肿痛,阑尾炎,白带,尿血。外用子疮疡肿毒,淋巴结核。

**7239027**

*Gentiana macrophylla* Pall.

植物名 秦艽《高植图鉴》

药材名 秦艽《本经》、《药典》

文献名 秦艽《本草经集注》, 秦艽、秦艽《唐本草》, 秦艽《四声本草》, 宁化军秦艽《大观本草》, 左秦艽《张聿青医案》, 秦艽、网草《新纲》, 大叶龙胆《中国北部植图》, 秦艽王、原秦艽、川秦艽、山秦艽、牛尾秦艽、西秦艽、辫子艽《药材学》

地方名 西大艽、左扭根(河北、陕西、青海), 左拧、左拧根(华北、西北), 山大艽(河北、内蒙古), 萝卜艽(内蒙古、甘肃); 河北: 左扭, 小渠霜、搅根子、烂四股草(张家口); 山西: 曲双, 五星草, 白柴胡; 内蒙古: “哈日-鲁-苏斯”(蒙名); 甘肃: 鸡腿艽, 鹤腿秦艽; 新疆: “巴德然基”(维名); 四川: “锡汤”(藏名)。

功效 根: 祛风湿, 清湿热, 止痹痛。用于风湿痹痛, 筋脉拘挛, 骨节烦痛, 日晡潮热, 小儿疳积发热。

#### 7239028

*Gentiana macrophylla* Pall. var. *fetissowii* (Regel et Winkl.) Ma et K. C. Hsia --- *G. fetissowii* Regel et Winkl. --- *G. wutaensis* Marq.

植物名 大花秦艽《中国植志》

文献名 萝卜艽、麻花艽《药学报》

地方名 鸡腿艽(陕西、甘肃), 山大艽(东北、山西、内蒙古), 辫子艽(青海、甘肃)。

功效 根: 祛风湿, 清湿热, 止痹痛。

#### 7239029

*Gentiana manshurica* Kitag.

植物名 条叶龙胆《高植图鉴》

药材名 龙胆《本经》、《药典》

文献名 长白龙胆《东北药志》, 东北龙胆(东检), 线叶龙胆《广西植志》, 东龙胆、关龙胆、苏龙胆《鉴别手册》, 龙胆草、胆草《简明中医辞典》, 草龙胆、苦龙胆草、焦胆草、胆草焦《常用中药名辨》

地方名 江苏: 山龙胆, 水龙胆。

功效 根、根茎: 清热燥湿, 泻肝胆火。用于湿热黄疸, 阴肿阴痒, 带下, 强中, 湿疹瘙痒, 目赤, 耳聋, 胁痛, 口苦, 惊风抽搐。

#### 7239030

*Gentiana manshurica* Kitag. var. *yanzhouensis* J. P. Luo et Z. C. Lou

植物名 严州龙胆《药学报》

地方名 浙江: 龙胆(淳安)。

功效 根、根茎: 清热燥湿, 泻肝胆火。

#### 7239031

*Gentiana microdonta* Franch. ex Hemsl.

植物名 小齿龙胆《中国植志》

地方名 四川: 小龙胆(峨眉山)。

功效 全草: 清热除湿, 透黄疸。

#### 7239032

*Gentiana nubigena* Edgew. --- *G. przewalskii* Maxim. --- *G. algida* Pall. var. *przewalskii* (Maxim.) Kusnez.

植物名 云雾龙胆《中国植志》

文献名 黄花龙胆《高植图鉴》, 青藏龙胆《青藏药图》, 祁连龙胆《西藏植志》

地方名 青海: “邦见那保”(藏名); 其他: 西藏龙胆。

功效 全草: 清肝胆, 除湿热, 健胃; 花: 用于天花, 气管炎, 咳嗽。

#### 7239033

*Gentiana nutans* Bunge

植物名 垂花龙胆《中国植志》

药材名 俯垂龙胆《新疆中草药》

功效 根、根茎: 清热燥湿, 泻肝胆火。

#### 7239034

*Gentiana officinalis* H. Smith

植物名 黄管秦艽《中国植志》

药材名 秦艽(四川、青海)

地方名 青海: “解古那保”(藏名)。

功效 根: 祛风湿, 清湿热, 止痹痛。

#### 7239035

*Gentiana panthaica* Prain et Burk. --- *G. robustior* Burk. ex Diels --- *G. reynieri* Levl.

植物名 流苏龙胆《中国植志》

药材名 喉毛花《迪庆藏药》

功效 全草: 清热, 舒肝, 利胆。用于肝、胆热症, 时疫发烧。

#### 7239036

*Gentiana parviflora* Hayata

植物名 小花龙胆《鉴别手册》

地方名 贵州: 龙胆(遵义)。

功效 根: 清热燥湿, 泻肝胆火。

#### 7239037

*Gentiana phyllocalyx* C. B. Clarke

植物名 叶萼龙胆《中国植志》

药材名 风嘎琼曼巴《迪庆藏药》

功效 全草: 清热解毒, 止热病。用于发热性疾病, 血与“赤巴”合病, “木保”病, 血管闭塞病, 痢疾, 喉痛。

#### 7239038

*Gentiana primuliflora* Franch.

植物名 报春龙胆《云南种录》

文献名 苦胆草《峨山彝族药》, 报春花龙胆《中国植志》

地方名 云南: “背卡勃西利若”、“米黑期诺期”(彝名)。

功效 全草: 清热利胆, 截疟。用于肝炎, 牙周感染, 风火牙痛, 疟疾。

#### 7239039

*Gentiana pubigera* Marq.

植物名 柔毛龙胆《中国植志》

药材名 小龙胆草《中药大辞典》

文献名 矮脚龙胆《昆明民药》, 具毛龙胆《云南药录》, 被毛龙胆《云南种录》

功效 全草: 清热降火。用于目赤肿痛, 牙痛, 咽喉发炎, 瘀痛, 疔疮, 炎症。

#### 7239040

*Gentiana purdomii* Marq.

植物名 岷县龙胆《中国植志》

地方名 四川:“榜间嘴尔布”,麻龙胆。

功效 花:用于天花,气管炎,咳嗽。

#### 7239041

*Gentiana rhodantha* Franch.

植物名 红花龙胆《高植图鉴》

药材名 红花龙胆《汇编》

文献名 小龙胆草《云南中草药》,青鱼胆草《中药大辞典》

地方名 九月花(湖北、云南),傍雪开(四川、贵州);湖北:穿山七,退云伞(神农架);广西:(款冬花)(大瑶山);四川:草龙胆,对叶草、大瓜子草(峨眉),龙胆草,冷开花,[山梔子],山龙胆,苦龙胆,[紫花地丁](峨眉山),冬季青;贵州:疗药(罗甸);云南:星秀花、星宿花(红河),星秀草、星宿草、小青鱼胆、血龙胆(思茅),小酒药花、寒风草(昭通),细龙胆,凤凰花,小雪里梅,红花龙胆草、雪里梅、小内消(文山),细叶龙胆(昭通、大理),青叶胆,大青叶胆,小酒药花根(保山),雪龙胆,雪里明,酒药草,青鱼草,土白连,冷风吹,小黄连,益胆草,冬季兰。

功效 根及全草:清热利湿,解毒。用于急性黄疸型肝炎,痢疾,小儿肺炎,支气管炎,支气管哮喘,肺结核,淋巴结核,小便不利,眼结膜炎。外用子痈疔疮,烧烫伤。

#### 7239042

*Gentiana rigescens* Franch.

植物名 滇龙胆草《中国植志》

药材名 龙胆《药典》

文献名 龙胆草《滇南本草》,滇龙胆《名实图考》,坚龙胆《高植图鉴》

地方名 四川:川龙胆;广西:胆草;云南:青鱼胆(临沧),大青鱼胆(丽江),苦草(丽江、保山),蓝花根,火把草,炮胀花。

功效 根、根茎:清热燥湿,泻肝胆火。用于湿热黄疸,阴肿阴痒,带下,强中,湿疹瘙痒,目赤,耳聋,胁痛,口苦,惊风抽搐。

#### 7239043

*Gentiana rigescens* Franch. var. *stictantha* Marq.

植物名 点花滇龙胆《汇编》

文献名 龙胆草《红河中草药》,苦龙胆草《云南药录》,地胆草《云南种录》

地方名 云南:龙胆、胆草、清当树(红河)。

功效 根:清热燥湿,泻肝胆火。

备考 《中国植志》62卷将本变种并入原变种滇龙胆草中。

#### 7239044

*Gentiana robusta* King ex Hook. f.

植物名 粗壮秦艽《中国植志》

药材名 藏秦艽

文献名 粗壮龙胆《内蒙古大学学报》

功效 根:祛风湿,清湿热,止痹痛。

#### 7239045

*Gentiana rubicunda* Franch.

植物名 深红龙胆《高植图鉴》

药材名 深红龙胆《汇编》

文献名 小儿血参、路边红、瓜米草《汇编》

地方名 湖北:二郎箭(神农架)。

功效 全草:清热解毒。用于痈疽疔疮,蛇咬伤,跌打损伤,消化不良。

#### 7239046

*Gentiana sarcorrhiza* Ling et Ma

植物名 金钱参《滇南本草》、《汇编》

药材名 菊花参《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 一棵松《滇南本草》,肉根龙胆《中药大辞典》

地方名 云南:半边钱(昆明),白洋参,水胖药,小菊花参。

功效 全草或根:健脾益气,补肾固精。用于病后体弱,小儿疳积,肺虚咳嗽,遗精,遗尿,虚热不退,小儿久泻。

#### 7239047

*Gentiana scabra* Bunge

植物名 龙胆《高植图鉴》

药材名 龙胆《本经》、《药典》

文献名 陵游《本经》,草龙胆《图经》,龙胆草《履巉岩本草》,胆草《药品化义》,苦胆、斜枝大夫、斜枝大士、观音草《新纲》,粗糙龙胆《中药志》

地方名 [龙须草](安徽、江西),山龙胆(浙江、安徽),水龙胆(江苏、安徽),川龙胆(贵州、云南),关龙胆(黑龙江、内蒙古);内蒙古:“鸟各缺”(蒙名);江苏:山龙胆草(镇江),龙胆草根(淮阴);浙江:鲤鱼胆(泰顺);江西:倒挂金钟(婺源),小叶合掌消(景德镇),竹节兰(石城);广东:四叶草;广西:四叶胆;四川:龙胆根。

功效 根、根茎:清热燥湿,泻肝胆火。用于湿热黄疸,阴肿阴痒,带下,强中,湿疹瘙痒,目赤,耳聋,胁痛,口苦,惊风抽搐。

#### 7239048

*Gentiana scabra* Bunge var. *angustifolia* Kusn.

植物名 细叶龙胆《东北药植志》

功效 根、根茎:清热燥湿,泻肝胆火。

#### 7239049

*Gentiana scabra* Bunge ssp. *australis* M. Y. Liou

植物名 南方龙胆《广西药录》

功效 全草:清热利湿,健胃。用于肝炎,胆囊炎,胁痛,目赤肿痛,中耳炎,尿路感染,湿疹。

#### 7239050

*Gentiana scabra* Bunge var. *bungeana* Kusn.

植物名 东北龙胆《东北药植志》

功效 根、根茎:清热燥湿,泻肝胆火。

#### 7239051

*Gentiana scabra* Bunge var. *fortunei* Maxim.

植物名 斑冠龙胆《东北药植志》

功效 根、根茎:清热燥湿,泻肝胆火。

#### 7239052

*Gentiana sino-ornata* Balf. f.

植物名 华丽龙胆《高植图鉴》  
文献名 天蓝龙胆《云南种录》  
地方名 青海：“邦见察保”（藏名）。  
功效 花：用于天花，气管炎，咳嗽。

## 7239053

*Gentiana sino-ornata* Balf. f. var. *gloriosa* Marq.

植物名 瘦华丽龙胆《中国植志》  
药材名 白龙胆《迪庆藏药》  
文献名 华丽天兰龙胆《云南种录》  
功效 花：清热，解毒，利喉。用于时疫热病，热咳，喉炎热闭，毒病。

## 7239054

*Gentiana siphonantha* Maxim. ex Kusn.

植物名 管花秦艽《汇编》  
药材名 小秦艽《中药大辞典》  
文献名 山大艽《药学报》，管花龙胆《高植图鉴》  
功效 根：祛风湿，清湿热，止痹痛。

## 7239055

*Gentiana spathulifolia* Maxim. ex Kusn.

植物名 匙叶龙胆《高植图鉴》  
地方名 青海：“奥拉毛”（藏名）。  
功效 叶、花：用于喉痛。

## 7239056

*Gentiana squarrosa* Ledeb.

植物名 鳞叶龙胆《高植图鉴》  
药材名 石龙胆《本草汇言》、《四川中药志》  
文献名 岩龙胆《种称》，龙胆地丁《汇编》，鳞片龙胆《东检》

地方名 小龙胆（陕西、甘肃、内蒙古）；内蒙古：“巴嘎-地格达”（蒙名）；浙江：石细青（临安）；湖南：细蛇药，兰桃花，千线花；四川：鬼点灯、六月绿花草、绿花（重庆），米布带、紫花地丁、蓝花地丁（成都）。

功效 全草：清热利湿，解毒消肿。用于咽喉肿痛，阑尾炎，白带，尿血。外用于疮疡肿毒，淋巴结结核。

## 7239057

*Gentiana stipitata* Edgew. --- *Gentiana tizuensis* Franch.

植物名 短柄龙胆《中国植志》  
药材名 杂色龙胆《迪庆藏药》  
文献名 提宗龙胆、川西龙胆《迪庆藏药》  
功效 花：用于炭疽，风湿关节炎。

## 7239058

*Gentiana straminea* Maxim.

植物名 麻花秦艽《药典》  
药材名 秦艽《药典》  
文献名 麻花艽《高植图鉴》，薊芥《中国植志》  
地方名 瓣子艽（甘肃、青海）；青海：响炮草，“解吉朵保”（藏名）。

功效 根：祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节烦痛，日晒潮热，小儿疳积发热。

## 7239059

*Gentiana suffrutescens* J. P. Luo et Z. C. Lou

植物名 亚木龙胆《药学报》  
地方名 龙胆（四川、云南）。  
功效 根、根茎：清热燥湿，泻肝胆火。

## 7239060

*Gentiana sutchuenensis* Franch.

植物名 四川龙胆《中国植志》  
药材名 四川龙胆草《贵州药录》  
功效 全草：用于跌打损伤，消化不良。

## 7239061

*Gentiana szechenyi* Kamitz --- *G. georgei* Diels

植物名 大花龙胆《高植图鉴》  
地方名 青海：“邦见恩保”（藏名）；四川：龙胆（西昌）。  
功效 根：清热燥湿，泻肝胆火；花：用于天花，气管炎，咳嗽。

## 7239062

*Gentiana tianschanica* Rupr.

植物名 天山秦艽《汇编》  
药材名 新疆秦艽《药学报》  
文献名 秦艽《鉴别手册》，小秦艽《中药大辞典》，天山龙胆《高植图鉴》  
功效 根：祛风湿，清湿热，止痹痛。

## 7239063

*Gentiana tibetica* King ex Hook. f.

植物名 西藏秦艽《汇编》  
药材名 藏秦艽《中药志》  
文献名 秦艽、萝卜艽《中药大辞典》，西藏龙胆《高植图鉴》  
地方名 西藏：“薊介”（藏名）。  
功效 根：祛风湿，清湿热，止痹痛。

## 7239064

*Gentiana triflora* Pall.

植物名 三花龙胆《高植图鉴》  
药材名 龙胆《药典》  
文献名 草龙胆、苦龙胆草《常用中药名辨》  
地方名 胆草（东北、内蒙古），关龙胆、东龙胆（东北）；内蒙古：“鲁音-苏斯”（蒙名），龙胆草。  
功效 根、根茎：清热燥湿，泻肝胆火。用于湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，强中，湿疹瘙痒，目赤，耳聋，胁痛，口苦，惊风抽搐。

## 7239065

*Gentiana urnula* H. Smith --- *G. amoena* C. B. Clarke f. *pallida* Marq.

植物名 乌奴龙胆《高植图鉴》  
药材名 乌奴龙胆《西藏本草》  
地方名 青海：“冈噶穷”（藏名）；西藏：“冈嘎琼”（藏名）。  
功效 全草：清热解毒，止泻。用于流感发烧，咽喉肿痛，黄疸，热性腹泻。

## 7239066

*Gentiana vetchiorum* Hemsl.

植物名 蓝玉簪龙胆《高植图鉴》

药材名 双色龙胆《中药大辞典》  
文献名 轮叶龙胆《高原中草》, 丛生龙胆《汇编》  
地方名 “棒坚翁波”(四川、西藏藏名); 青海: “邦见恩保”(藏名)。

功效 全草: 清热解毒。用于高热神昏, 肝炎黄疸, 咽喉肿痛, 目赤淋浊; 花: 用于天花, 气管炎, 咳嗽。

## 7239067

*Gentiana veitchiorum* Hemsl. var. *altorum* (H. Smith) Marq.

植物名 哈巴龙胆《迪庆藏药》

药材名 蓝龙胆(西藏)

文献名 藏药蓝龙胆《迪庆藏药》

功效 花: 清热解毒。用于疫热, 肺热。

## 7239068

*Gentiana waltonii* Burk.

植物名 长梗秦艽《中国植志》

药材名 秦艽(西藏)

功效 根: 祛风湿, 清湿热, 止痹痛。

## 7239069

*Gentiana waltonii* Burk. f. *lhasaensis* (Hsiao et K. C. Hsia)

T. N. Ho --- *G. lhasaensis* Hsiao et K. C. Hsia

植物名 白花长梗秦艽(拟)

药材名 秦艽(西藏拉萨)

功效 根: 祛风湿, 清湿热, 止痹痛。

## 7239070

*Gentiana walujewii* Regel et Schmalh.

植物名 新疆秦艽《鉴别手册》

药材名 秦艽《中药大辞典》

文献名 瓦氏龙胆《药学学报》, 新疆龙胆《高植图鉴》, 北方龙胆《中药大辞典》, 网根龙胆《中药志》

功效 根: 祛风湿, 清湿热, 止痹痛。

## 7239071

*Gentiana yunnanensis* Franch.

植物名 云南龙胆《高植图鉴》

地方名 四川: 龙胆(盐源)。

功效 根、根茎: 清热燥湿, 泻肝胆火。

## 7239072

*Gentiana zollingeri* Fawc.

植物名 笔龙胆《高植图鉴》

药材名 笔龙胆《中药材科技》

文献名 绍氏龙胆《中国北部植图》

功效 全草: 清热解毒。

## 7239073 见 7239074

## 7239074

*Gentianopsis barbata* (Froel.) Ma --- *G. barbata* (Froel.)

Ma var. *sinensis* Ma --- *Gentiana barbata* Froel.

植物名 扁蕾《高植图鉴》

药材名 扁蕾《内蒙古中草药》

文献名 剪割龙胆、中国扁蕾《东北草本植志》

地方名 内蒙古: “铁木尔-地格达”(蒙名); 青海: “吉合斗”(藏名)。

功效 全草: 清热解毒, 消肿。用于传染性热病,

外伤肿痛, 肝胆湿热。

## 7239075

*Gentianopsis contorta* (Royle) Ma --- *Gentianella contorta* (Royle) H. Smith

植物名 迴旋扁蕾《中国植志》

文献名 迴旋扁蕾《贵州植志》

功效 全草: 外用于敷疮疖。

## 7239076

*Gentianopsis grandis* (H. Sm.) Ma --- *Gentiana grandis* H. Sm. --- *Gentianella grandis* (H. Sm.) H. Sm.

植物名 大花扁蕾《高植图鉴》

药材名 大花扁蕾《贵州药录》

功效 全草: 用于疮疖。

## 7239077

*Gentianopsis paludosa* (Hook. f.) Ma

植物名 湿生扁蕾《高植图鉴》

药材名 湿生扁蕾《汇编》

文献名 沼生篇蕾《青海中草》, 泽扁蕾《高原中草》, “假斗那绕”、“结赫斗”、“假斗格布尔”(藏名)《植分学报》, “斗大那绕”(藏名)《西藏植志》

地方名 “斗大”(青海、西藏藏名); 青海: “机合斗”(藏名), 篇蕾; 四川: “棒坚翁波”(若尔盖藏名); 西藏: [龙胆草], 机合率。

功效 全草: 清热解毒。用于急性黄疸型肝炎, 结膜炎, 高血压病, 急性肾盂肾炎, 疮疖肿毒。

## 7239078

*Gentianopsis paludosa* (Hook. f.) Ma var. *ovato-deltaidea* (Burk.) Ma ex T. N. Ho --- *G. scabromarginata* (H. Sm.) Ma

植物名 卵叶扁蕾《中国植志》

文献名 粗边扁蕾《神农架药录》

地方名 湖北: 土龙胆(神农架)。

功效 全草或根: 清肝明目, 泻肝火。用于目疾。

## 7239079

*Halenia corniculata* (L.) Cornaz --- *H. sibirica* Borkn.

植物名 花锚《高植图鉴》

药材名 花锚《内蒙古中草药》

文献名 西伯利亚花锚《中国北部植图》

地方名 内蒙古: “希赫日-地格达”(蒙名); 陕西: 乌金草(太白)。

功效 全草: 清热解毒, 凉血止血。用于肝炎, 脉管炎, 外伤感染发烧, 外伤出血。

## 7239080

*Halenia elliptica* D. Don

植物名 椭圆叶花锚《高植图鉴》

药材名 黑及草(贵州兴义)、《汇编》

文献名 椭圆叶花锚《中国北部植图》, [龙胆草]《玉龙山药植》, 花锚《高原中草》, 黑耳草《西藏中草》, 紫白花锚《汇编》, 卵萼花锚《西藏植志》, 藏茵陈《植分学报》

地方名 大曲花(四川、贵州), “斗大”、“假斗那拉玛”、“假斗拉过买”、“斗大然高”(青海、西藏藏名); 陕西: 狼鹿草(南郑); 青海: “贾滴仁高玛”(藏名); 四川:

“甲各斗”(若尔盖藏名),花脸猫(南川);云南:黑节苦草,鸡脚莲,青鱼胆,胆炎药(曲靖);其他:四棱草,小见肿消。

功效 根或全草:清热利湿,平肝利胆。用于急性黄疸型肝炎,胆囊炎,胃炎,头晕头痛,蛔虫病,牙痛。

## 7239081

*Halenia elliptica* D. Don var. *grandiflora* Hemsl.

植物名 大花花锚《中国植志》

药材名 大花黑及草(拟)

功效 根或全草:清热利湿,平肝利胆。

## 7239082

*Latouchea fokiensis* Franch.

植物名 匙叶草《高植图鉴》

药材名 匙叶草《贵州药录》

地方名 贵州:红客妈叶。

功效 全草:活血化瘀,清热,止咳。用于癆伤咳嗽,腹内瘀血成块。

## 7239083

*Lomatogonium forrestii* (Balf. f.) Fernald --- *Pleurogyna forrestii* Balf. f.

植物名 云南肋柱花《中国植志》

药材名 侧蕊《迪庆藏药》

文献名 高原侧蕊、肋柱花《迪庆藏药》

功效 全草:清热,解毒,益肾。用于一切药物中毒,骨热。

## 7239084

*Lomatogonium oreocharis* (Diels) Marq. --- *L. cuneifolium* H. Smith --- *Pleurogyna oreocharis* Diels

植物名 圆叶肋柱花《中国植志》

药材名 侧蕊《迪庆藏药》

文献名 大化侧蕊、楔叶侧蕊《中国植志》,肋柱花《迪庆藏药》

功效 全草:清热,解毒,益肾。用于药物中毒,骨热。

## 7239085

*Megacodon stylophorus* (C. B. Clarke) H. Smith

植物名 大钟花《中国植志》

药材名 大钟花《迪庆藏药》

功效 花:清肺热,胆热,解毒,止血,消肿。用于肝胆热症,黄疸,二便不通,炭疽病,疮痍,外伤。

## 7239086

*Menyanthes trifoliata* L.

植物名 睡菜《中国植志》

药材名 睡菜《纲目》、《汇编》

文献名 绵菜、眠菜《南方草木状》,醉草《纲目》,懒妇箴《本草新注》,三榭(小泉《药植》)

地方名 浙江:野慈菇、水华茹(临安);四川:“锡打”(藏名);贵州:〔过江龙〕。

功效 叶或全草:清热利尿,健胃,安神。用于胃炎,消化不良,胆囊炎,黄疸,高血压病,心悸,失眠。

## 7239087

*Nymphoides indica* (L.) O. Kuntze --- *Limnanthemum indicum* Griseb.

植物名 金银莲花《草花谱》、《中国植志》

药材名 金银莲花《广西药录》

文献名 印度苕菜《中国北部植图》,白花苕菜《东检》

地方名 江苏:水萍叶(东海);海南:水浮莲;广西:侧苕菜(容县)。

功效 全草:生津养胃。

## 7239088

*Nymphoides peltatum* (Gmel.) O. Kuntze --- *Limnanthemum peltatum* Gmelin --- *L. nymphoides* Hoffm. ex Link

植物名 苕菜《中国植志》

药材名 苕菜《唐本草》、《汇编》

文献名 苕菜、苕《诗经》,苕、接余《尔雅》,姜余《说文》,鳧葵《唐本草》,水镜草《土宿本草》,苕丝菜、金莲儿、藕蔬菜《救荒本草》,膳子菜《野菜谱》,金莲子、苕公须、苕莠、水葵《纲目》,〔金莲花〕《花镜》,莲叶苕菜《中国北部植图》,莲叶苕菜《东检》,菱角草、金丝荷叶《诗草木今释》

地方名 吉林:莲花菜,小萍蓬草;河北:黄花儿菜;宁夏:〔宁夏浮萍〕,〔浮萍〕,〔大浮萍〕,〔紫背浮萍〕(银川);山东:葫芦瓢子(微山);湖南:水铜钱,马脚草,马脚莲。

功效 全草:发汗,透疹,清热,利尿。用于感冒发热无汗,麻疹透发不畅,荨麻疹,水肿,小便不利。外用于毒蛇咬伤。

## 7239089

*Pterygocalyx volubilis* Maxim. --- *Crawfordia volubilis* (Maxim.) Makino --- *Crawfordia pterygocalyx* Hemsl.

植物名 翼萼蔓《高植图鉴》

文献名 翼萼蔓龙胆《东北草本植志》

地方名 双蝴蝶(吉林、陕西)。

功效 全草:用于肺结核。

## 7239090

*Swertia angustifolia* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 狭叶獐牙菜《贵州植志》

药材名 狭叶獐牙菜《贵州药录》

地方名 贵州:对节莲。

功效 全草:清肝利胆,除湿清热。用于急性黄疸性肝炎,胆囊炎。

## 7239091

*Swertia angustifolia* Buch.-Ham. var. *pulchella* (D. Don) Burk. --- *S. pulchella* (D. Don) Buch.-Ham. --- *S. vacillans* Maxim.

植物名 美丽獐牙菜《高植图鉴》

药材名 青叶胆《云南中草药》

文献名 艳獐牙菜《海南植志》,粤北獐牙菜《广州植志》,思茅獐牙菜《云南药录》,华南当药《汇编》

地方名 海南:假龙胆草(儋县);贵州:对节莲;云南:青鱼胆、青叶丹、鱼胆草、小苦草、细龙胆草、肝炎草、小青鱼胆、土痘药(红河)。

功效 全草:清肝胆湿热,除胃中伏火。用于肝



炎, 尿路感染。

#### 7239092

*Swertia atrovioacea* H. Smith

植物名 黑紫獐牙菜《中国植志》

药材名 色波古轴《迪庆藏药》

文献名 深紫獐牙菜《迪庆藏药》

功效 全草: 清热, 续筋脉, 止血, 生肌。用于时疫, 黄疸, 腹痛, 痢疾, 腑热, 疮疖, 跌打, 外伤。

#### 7239093

*Swertia bifolia* Batal. --- *S. heterantha* Ling --- *S. subspiciosa* Burk.

植物名 二叶獐牙菜《秦岭植志》

药材名 乌金草《陕西中草药》

文献名 异花獐牙菜《中药大辞典》

地方名 陕西: 当药。

功效 全草: 平肝风, 强心养血, 调经。用于血虚头晕, 神经衰弱, 高血压病, 月经不调。

#### 7239094

*Swertia bimaculata* (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms. --- *Ophelia bimaculata* Sieb. et Zucc.

植物名 獐牙菜《救荒本草》、《中国植志》

药材名 双斑獐牙菜《中药志》

文献名 双点獐牙菜《汇编》

地方名 湖北: 紫花龙胆(神农架); 湖南: 大车前, 水红菜, 鬃子草; 四川: 鹿顶鹿(武隆), 刘寄奴(西昌); 贵州: 龙胆草; 云南: 黑节苦菜、黑菊黄、走胆草、大苦草、紫花青叶胆、蕤衣莲(红河), 凉芥, 绿茎牙痛草。

功效 全草: 清热解毒, 舒肝利胆。用于急、慢性肝炎, 胆囊炎, 尿路感染, 肠胃炎, 感冒发烧, 流感, 咽喉炎, 牙痛, 小儿口疮。

#### 7239095

*Swertia ciliata* (L. Don ex G. Don) B. L. Burtt --- *Ophelia purpurascens* Wall.

植物名 普兰獐牙菜《西藏植志》

药材名 川西獐牙菜《民族药志》

文献名 獐牙菜《中药材》

地方名 “斗大”(青海、西藏藏名); 西藏: “蒂达”(藏名)。

功效 全草: 清热利胆。用于急性或亚急性肝炎。

#### 7239096

*Swertia cincta* Burk.

植物名 西南獐牙菜《高植图鉴》

药材名 大青叶胆《元江哈尼族药》

文献名 圈纹獐牙菜《云南种录》

地方名 贵州: 龙胆草; 云南: “哈马资笔”(元江哈尼语)。

功效 全草: 清热, 利湿, 止牙痛。用于湿热黄疸, 慢性肝炎, 感冒咳嗽, 咽喉疼痛, 风火牙痛。

#### 7239097

*Swertia davidii* Franch.

植物名 川东獐牙菜《湖南药物志》

药材名 角胆草《分类草药性》、《汇编》

文献名 金盆《分类草药性》

地方名 水灵芝、[水黄连](湖北、四川); 四川: 青鱼胆草。

功效 全草: 清肺热, 杀虫。用于湿热黄疸, 喉头红肿, 恶疮疥癣。

#### 7239098

*Swertia dichotoma* L. --- *Anagallidium dichotomum* (L.) Griseb.

植物名 歧伞獐牙菜《中国植志》

文献名 腺鳞草《高植图鉴》, 歧伞当药《中国北部植图》, 歧花当药《内蒙古中草药》, 獐牙菜《中药大辞典》

地方名 内蒙古: 当药; 陕西: 接骨丹(山阳)。

功效 全草: 清湿热, 健胃。

#### 7239099

*Swertia diluta* (Turcz.) Benth. et Hook. f. --- *S. chinensis* Franch. ex Hemsl.

植物名 北方獐牙菜《中国植志》

药材名 淡花当药《汇编》

文献名 中国当药《中国北部植图》, 当药《高植图鉴》, 兴安獐牙菜《内蒙古中草药》, 獐牙菜《东检》, 淡花獐牙菜《东北草本植志》, 乌金散、淡味当药《中药大辞典》

地方名 吉林: 泽当药; 山东: [透骨草]; 浙江: 小方杆(嵊县); 湖北: 青叶胆(神农架); 四川: “加达”(藏名), 青鱼胆草, 水灵芝, 鱼胆草, 水黄连(达县)。

功效 全草: 清热解毒。用于骨髓炎, 喉炎, 扁桃腺炎, 结膜炎, 疥癣。

#### 7239100

*Swertia elata* H. Smith

植物名 高獐牙菜《中国植志》

药材名 色波古轴《迪庆藏药》

功效 全草: 清热, 续筋脉, 止血, 生肌。用于时疫, 黄疸, 腹痛, 痢疾, 腑热, 疮疖, 跌打损伤, 外伤。

#### 7239101

*Swertia erythrosticta* Maxim.

植物名 红直獐牙菜《高植图鉴》

药材名 红直当药《汇编》

文献名 獐牙菜《峨眉药植研究》

地方名 四川: [响铃草](峨眉山)。

功效 全草: 清热解毒, 健胃杀虫。用于肺炎黄疸, 咽喉肿痛; 外用于疥癣。

#### 7239102

*Swertia franchetiana* H. Smith --- *S. stricta* Franch.

植物名 抱茎獐牙菜《西藏植志》

文献名 獐牙菜《中药材》

地方名 西藏: “蒂达”(藏名)。

功效 全草: 清热利胆。用于急性或亚急性肝炎。

#### 7239103

*Swertia hicknii* Burkill

植物名 江浙獐牙菜《浙江植志》

功效 全草: 祛湿, 健胃。

#### 7239104

*Swertia kingii* Hook. f.

植物名 黄花獐牙菜《西藏植志》

文献名 “赛保古折”(藏名)《青藏药图》

功效 根;用于黄疸型肝炎,各种出血。

#### 7239105

*Swertia kouitchensis* Franch.

植物名 贵州獐牙菜《汇编》

文献名 四棱草《汇编》

地方名 四川:青鱼胆草;贵州:龙胆草。

功效 全草;用于小儿高烧,口苦潮热,湿热黄疸,咽喉肿痛,蛇咬伤等。

#### 7239106

*Swertia macrosperma* (C. B. Clarke) C. B. Clarke

植物名 大籽獐牙菜《高植图鉴》

药材名 大籽獐牙菜《贵州药录》

地方名 贵州:龙胆草。

功效 全草:清热,健胃,利湿。用于消化不良,胃炎,黄疸,火眼,牙痛,口疮。

#### 7239107

*Swertia marginata* Schrenk.

植物名 膜边獐牙菜《青藏药图》

地方名 青海:“代哇”(藏名)。

功效 花:退烧,利胆。用于流行性感冒。

#### 7239108

*Swertia mileensis* T. N. Ho et W. L. Shih

植物名 青叶胆《植分学报》

药材名 青叶胆《药典》

地方名 云南:青鱼胆,苦胆草,肝炎草,小青鱼胆,上痘药,弥勒獐牙菜,金鱼胆,走肝药,小苦草,细龙胆。

功效 全草:清肝利胆,清热利湿。用于黄疸尿赤,热淋涩痛。

#### 7239109

*Swertia multicaulis* D. Don

植物名 多茎獐牙菜《西藏植志》

地方名 西藏:“赛巴贡珠”(藏名)。

功效 根:止血。

#### 7239110

*Swertia mussoitii* Franch.

植物名 川西獐牙菜《中国植志》

药材名 藏茵陈(青海)、《药学报》

文献名 獐牙菜《中药材》

地方名 桑斗(青海、西藏);西藏:“甲蒂”、“蒂达”、“斗大”(藏名)。

功效 全草:清热利胆。用于肝炎,黄疸型肝炎,肝胆疾病。

#### 7239111

*Swertia mussoitii* Franch. var. *flavescens* T. N. Ho et S. W. Liu

植物名 黄花川西獐牙菜《中国植志》

药材名 黄花当药(四川)

地方名 四川:地鉴。

功效 全草:清热利肝。用于肝炎,黄疸型肝炎,

肝胆疾病。

#### 7239112

*Swertia nervosa* Wall.

植物名 显脉獐牙菜《中国植志》

文献名 翼梗獐牙菜《汇编》,脉瓣獐牙菜《云南种录》

地方名 四川:四棱草。

功效 全草:清热,解毒。用于黄疸,口苦,潮热。

#### 7239113

*Swertia omciensis* Ma

植物名 峨眉獐牙菜《峨眉药植研究》

地方名 四川:疝气草(峨眉山)。

功效 全草:用于耳鸣,耳聋,疝气。

#### 7239114

*Swertia patens* Burk.

植物名 斜茎獐牙菜《中国植志》

文献名 金沙獐牙菜《云南种录》,金沙青叶胆《中草药》

地方名 云南:小儿腹痛草,“落孺病”(彝名),青叶胆,小儿寒药,小苦参,小苦药,阴寒药,岩蓬,地花生,苦蚂蟥,石御草。

功效 全草:用于小儿腹痛,小儿消化不良,上呼吸道感染引起的小儿腹痛及牙痛。

#### 7239115

*Swertia pseudochinensis* Hara --- *S. chinensis* f. *grandiflora* Franch. --- *S. chinensis* f. *violacea* Makino

植物名 瘤毛獐牙菜《高植图鉴》

药材名 当药《中药志》

文献名 水黄连《中草药学》,紫花当药《中药志》

地方名 獐牙菜(东北、内蒙古);内蒙古:“比拉出特地格达”(蒙名);四川:鱼胆草。

功效 全草:清湿热,健胃。用于传染性肝炎,急性慢性细菌性痢疾,食欲不振,消化不良,胃炎。

#### 7239116

*Swertia punicea* Hemsl.

植物名 紫红獐牙菜《高植图鉴》

药材名 紫红当药《汇编》

文献名 山瓢儿草《峨眉药植》,苦胆草、草龙胆、青叶胆《汇编》

地方名 湖南:〔水黄连〕,〔土黄连〕;四川:獐牙菜、山瓢儿菜(峨眉山);贵州:青鱼胆。

功效 全草:清热消炎。用于黄疸型肝炎,风热感冒,风火牙痛,热淋,胆囊炎。

#### 7239117

*Swertia tertaptera* Maxim. --- *Anagallidium dimorphum* (Batal.) Ma --- *Swertia dimorpha* Batal.

植物名 四数獐牙菜《中国植志》

文献名 二型腺鳞草《植分学报》

地方名 “斗大”(青海、西藏藏名);青海:“斗大结考日”、“假斗”(藏名),藏茵陈。

功效 全草:用于急性黄疸型肝炎,水肿,感冒发烧,腮腺炎等。

## 7239118

*Swertia yunnanensis* Burk.

植物名 云南獐牙菜《高植图鉴》

药材名 青叶胆《汇编》

文献名 云南当药《汇编》,滇獐牙菜《中药大辞典》

地方名 云南:走胆药,肝炎草,青鱼胆,小苦胆草。

功效 全草:清肝利胆,清热利湿。用于急性黄疸型肝炎,胆囊炎,泌尿系统感染。

## 7239119

*Tripterospermum chinense* (Migo) H. Smith ---

*Tripterospermum affine* auct. non (Wall.) H. Smith ---

*Crawfordia fasciculata* auct. non Wall. --- *Crawfordia chinensis* Migo

植物名 双蝴蝶《名实图考》、《中国植志》

药材名 肺形草《汇编》

文献名 簇花双蝴蝶《广西药录》,黄金线《汇编》,斑叶蔓龙胆《中药大辞典》

地方名 橡皮草(湖南、湖北);浙江:穿藤金兰花,铁交杯,铁板青,山蝴蝶,金丝蝴蝶,石板青,铜告碑,铜交杯,金交杯(乐清、平阳、丽水、云和),大叶竹叶青,四脚喜,花蝴蝶,白鹿衔(杭州),白鹿含(温州),西瓜皮草、大青(嵊县);江西:胡地连(丰城),乌云盖丹(宜黄),朴地虎(婺源),猪婆耳、花叶子(泰和);湖北:肺叶草,藤龙胆(神农架);湖南:甜甘草,甜茶草,天青地白,天青地红,喇叭藤,甜痧药,龙胆草,缠竹青,淡竹青,月月红,万里青山一朵云(常德);广东:蒲蛇药(惠阳);广西:左藤(富川),一支香、活肉藤(大瑶山),蔓龙胆(贺县),灯盏兰花盖顶(阳朔),鸡肠风(北流)。

功效 全草:清热解毒,止咳止血。用于支气管炎,肺结核咯血,肺炎,肺脓疡,肾炎,泌尿系感染。外用于疔疮疖肿,乳腺炎,外伤出血。

## 7239120

*Tripterospermum cordatum* (Marq.) H. Smith

植物名 峨眉双蝴蝶《中国植志》

药材名 心叶双蝴蝶《贵州药录》

地方名 陕西:黄金钱,百日丹,金钱七,小金腰带;贵州:鱼鳅藤,喷七(湄潭),“鹅采白”(雷公山苗语)。

功效 全草:舒筋活血。用于刀伤,骨折。

## 7239121

*Tripterospermum cordifolium* (Yamamoto) Satake ---

*Crawfordia cordifolium* Yamamoto

植物名 台北肺形草《中国植志》

药材名 缠竹黄《汇编》

地方名 四川:蔓龙胆,虎牙草。

功效 全草:清肝胆火。用于咳嗽,急惊风,肝热目赤,口苦,黄疸,筋骨热痛。

## 7239122

*Tripterospermum volubile* (D. Don) Hara --- *Crawfordia*

*luteo-viridis* C. B. Clarke

植物名 黄绿双蝴蝶《云南种录》

药材名 黄绿花双蝴蝶《云南中草药》

文献名 尼泊尔双蝴蝶《中国植志》,小筋骨藤《云南

中草药》

地方名 云南:小黄藤藤(昭通)。

功效 全草:舒筋活络,接骨。用于骨折,断指。

## 7239123

*Veratilla baillonii* Franch. --- *Swertia mekongensis* Balf.

f. et Forrest

植物名 黄秦艽《中国植志》

药材名 丽江金不换《汇编》

文献名 [滇黄芩]《云南中草药》

地方名 云南:[金不换],大苦参,黄龙胆,假秦艽。

功效 根:有毒。清热,消炎,杀虫。用于肺热咳嗽,阿米巴痢疾,烧伤,黄疸性肝炎,蛔虫病,痢疮肿毒。

备考 四川盐源、西昌等当地民间自采自用,作秦艽入药。本品与秦艽不同,不能作秦艽药用,应注意鉴别。

## 7240 报春花科 Primulaceae

## 7240001

*Anagallis arvensis* L.

植物名 琉璃繁缕《中国植志》

药材名 见风红《台湾中药材图鉴》

地方名 福建:四念瘡。

功效 全草:解鱼毒,驱水蛭。用于脑病,麻风病,狂犬病,水肿,癰疽,肝脾肿大,结石,鼠疫,蛇咬伤等。

## 7240002

*Anagallis arvensis* L. f. *coerulea* (Schreb.) Baumg

植物名 蓝琉璃繁缕《中国植志》

药材名 九龙吐珠(福建)

文献名 琉璃繁缕《高植图鉴》,金丝繁缕《江苏植志》,海绿《中药大辞典》

地方名 福建:龙吐珠,大麻草,天灯花,翳目草,四念瘡。

功效 全草:祛风通络,化腐生肌。用于阴症,疮疡,鹤膝风,风湿性关节炎,毒蛇、狂犬咬伤。

## 7240003

*Androsace bulleyana* Forr. --- *A. aizoon* var. *coccinea* Franch.

植物名 景天点地梅《植分学报》

文献名 红花点地梅《汇编》,点地梅《西藏中草》,大红花点地梅《中药大辞典》

地方名 西藏:“噶蒂幕布”(藏名)。

功效 全草:利水。用于热性水肿。

## 7240004

*Androsace erecta* Maxim. --- *Mitrasacme mairei* Levl.

植物名 直立点地梅《迪庆藏药》

药材名 直立点地梅《迪庆藏药》

文献名 直茎点地梅《高植图鉴》

功效 全草:用于心悸,神经衰弱,失眠。

## 7240005

*Androsace filiformis* Retz. --- *A. filiformis* Retz. var. *glandulosa* Kryl.

植物名 东北点地梅《高植图鉴》

文献名 丝点地梅《汇编》, 点地梅《内蒙古中草药》  
地方名 内蒙古: 喉咙草, 报春花, “达兰—陶卜其”  
(蒙名)。

功效 全草: 清热解毒, 消炎止痛。用于咽喉炎, 扁桃体炎, 口腔炎, 急性结膜炎, 偏正头痛, 牙痛, 跌打损伤。

## 7240006

*Androsace henryi* Oliv.

植物名 莲叶点地梅《高植图鉴》

地方名 湖北: 破头风、云雾草、一朵云(神农架); 贵州: 大虎耳草。

功效 全草: 清热解毒, 利湿止痒。用于皮疹, 疔疮。

## 7240007

*Androsace integra* (Maxim.) Hand.-Mazz.

植物名 石莲叶点地梅《中国植志》

文献名 高原点地梅《汇编》, 点地梅《高原中草》, 匙叶点地梅《高植图鉴》

地方名 四川: “杂的”(藏名)。

功效 全草: 除湿利尿。用于关节疼痛。

## 7240008

*Androsace mariae* Kanitz --- *A. mariae* Kanitz var. *tibetica* (Maxim.) Hand.-Mazz. --- *A. tibetica* var. *mairae* R. Kunth

植物名 西藏点地梅《植分学报》

药材名 西藏点地梅《内蒙古中草药》

地方名 湖北: 点地梅(神农架)。

功效 全草: 清热解毒, 消炎止痛。用于咽喉炎, 扁桃体炎, 口腔炎, 急性结膜炎, 偏正头痛, 牙痛, 跌打损伤。

## 7240009

*Androsace sarmentosa* Wall.

植物名 匍茎点地梅《植分学报》

文献名 蔓茎点地梅《西藏植志》

地方名 青海: “嘎滴莫保”(藏名); 西藏: “杂滴莫布”(藏名)。

功效 全草: 用于热性水肿。

## 7240010

*Androsace septentrionalis* L.

植物名 北点地梅《植分学报》

药材名 新疆喉咙草(拟)

文献名 北方点地梅《新疆中草药》, 雪山点地梅《高植图鉴》

地方名 新疆: 喉咙草。

功效 全草: 清热解毒, 消肿止痛。用于风火赤眼, 急性咽喉肿痛。

## 7240011

*Androsace spinulifera* (Franch.) R. Kunth --- *A. strigillosa* Franch. var. *spinulifera* Franch. --- *A. prattiana* Kunth

植物名 刺叶点地梅《高植图鉴》

药材名 点地梅《迪庆藏药》

功效 全草: 利水, 解热, 干黄水。用于心脏性水肿, 热性水肿, 黄水病, 溃疡, 炭疽。

## 7240012

*Androsace strigillosa* Franch.

植物名 糙伏毛点地梅《青藏药图》

地方名 青海: “嘎滴莫保”(藏名); 西藏: “杂滴莫布”(藏名)。

功效 全草: 用于热性水肿。

## 7240013

*Androsace umbellata* (Lour.) Mett. --- *A. saxifragaefolia* Bunge

植物名 点地梅《高植图鉴》

药材名 喉咙草《中国药植志》

文献名 雪里花《纲目拾遗》, 佛顶珠、地胡椒、五岳朝天、小虎耳草《草木便方》, 索河花《植物名汇》, 五朵云、汉仙桃草《中国药植志》, 喉蛾草《本草推陈》

地方名 喉痹草(江苏、浙江), 白花珍珠草(上海、四川), 五角星草(上海、安徽), 清明草(四川、贵州), [金钱草](华东); 北京: 白米饭; 陕西: 仙牛桃(眉县), 金牛草(商县); 江苏: 铜钱草, 报春花, 猫眼草; 浙江: 喉痛草(嘉兴), 脐风草(常山), 金盘托珠; 安徽: 白花珍珠菜, 满天星; 广西: 响铃草(凤山), 梅花草(靖西); 四川: 小一口血, 白花草, 波斯草, 清风草, 佛定珠; 贵州: 五佛捧寿, 清明花, 清醒花; 云南: 天星草, 天吊冬(昭通), 顶珠草(文山)。

功效 全草或果实: 清热解毒, 消肿止痛。用于扁桃体炎, 咽喉炎, 口腔炎, 急性结膜炎, 跌打损伤。

## 7240014

*Cortusa stenocalyx* Maxim.

植物名 假报春花《汇编》

地方名 四川: “牙母堂”(若尔盖藏名)。

功效 全草: 解热镇惊。用于高热, 神昏抽搐。

## 7240015

*Lysimachia alfredii* Hance

植物名 广西过路黄《高植图鉴》

药材名 广西过路黄《湖南药物志》

地方名 广西: 大散血(三江), 四叶一支花(临桂), 川金钱草, 过路黄。

功效 全草: 清热解毒, 利尿排石。用于急性黄疸型肝炎, 尿路感染, 尿路结石。

## 7240016

*Lysimachia auriculata* Hemsl.

植物名 耳叶珍珠菜《秦岭植志》

药材名 耳叶排草《汇编》

地方名 陕西: 二郎箭, 耳状珍珠菜。

功效 根、根茎: 止血, 活血, 消肿。用于跌打损伤, 刀伤等症。

## 7240017

*Lysimachia barystachys* Bunge

植物名 狼尾花《高植图鉴》

药材名 狼尾巴花《陕西中草药》

文献名 虎尾草《救荒本草》, 泽珍珠菜《广州植志》,

狗尾酸《沙漠药植》, 重穗珍珠菜《中药大辞典》, 重穗排草《江苏植志》, 血经草《汇编》

地方名 兔儿丝、旱宿菜(江苏、西南); 陕西: 狼尾珍珠菜、狼巴草、红丝毛(柞水), 酸溜子、酸草根(商县), 红芝麻; 江苏: 铁梗将军; 上海: 白珍珠菜; 浙江: 野苦心菜; 河南: 活血莲、红四毛草; 广东: 香花(东莞); 四川: “卜尔孟杂鲁”(藏名), 百日疮, 红丝麻(重庆、峨眉山), 狼尾巴草(若尔盖); 云南: 狐尾草; 其他: 野路虎尾。

功效 带根全草: 调经散瘀, 清热消肿。用于月经不调, 痛经血崩, 感冒风热, 咽喉肿痛, 乳痈, 跌打扭伤。

#### 7240018

*Lysimachia candida* Lindl.

植物名 泽兰宿菜《高植图鉴》

药材名 泽兰宿菜《汇编》

文献名 尾宿菜《救荒本草》, 单条草《名实图考》, 泽珍珠菜《中国植志》

地方名 陕西: 灵疾草; 安徽: 红头绳、红鸡脚; 湖北: 止痛草; 广西: 水白花(南宁), 白花蒲公英(柳江); 贵州: 水珊瑚; 云南: 田菊。

功效 全草: 有毒。清热解毒, 消肿散结, 止咳。外用于无名肿痛, 痢疮脓肿, 稻田皮炎, 跌打骨折。

#### 7240019

*Lysimachia capillipes* Hemsl.

植物名 细梗香草《高植图鉴》

药材名 细梗香草《中国药植志》

文献名 细梗排草、排草香《汇编》, 线柄排草《云南种录》

地方名 满山香(浙江、江西), 排草(湖南、四川、云南); 湖南: 红梗草, 坝地蜈蚣, 铺地龙, 铺地莲; 广西: 毛柄珍珠菜; 四川: 排香、香排草, 香草, 排香草; 云南: 合血香。

功效 全草: 祛风, 止咳, 调经。用于感冒咳嗽, 气管炎, 哮喘, 月经不调, 神经衰弱。

#### 7240020

*Lysimachia capillipes* Hemsl. var. *cavaleriei* (Levl.) Hand. - Mazz.

植物名 石山细梗香草《广西药录》, 《中国植志》

地方名 广西: 山黄花(融安)。

功效 全草: 用于肝炎, 肝癌。

#### 7240021

*Lysimachia chekiangensis* C. C. Wu

植物名 浙江过路黄《植分学报》

药材名 浙江过路黄《浙南本草新编》

文献名 浙江排草《植分学报》

功效 全草或带根全草: 清热利胆, 排石, 利尿。

#### 7240022

*Lysimachia christinae* Hance

植物名 过路黄《名实图考》, 《高植图鉴》

药材名 金钱草《药典》

文献名 神仙对坐草《百草镜》, 地蜈蚣(王安卿《采药志》), 蜈蚣草《纲目拾遗》, 铜钱草《草木便方》, 野花生《植物名汇》, 仙人对坐草《岭南采药录》, 黄痘草《本

草推陈》, 大连钱草《中国药植图鉴》

地方名 延地蜈蚣, 临时救(浙江、江西), [大叶金钱草](上海、中南), 对坐草(陕西、江苏、上海、浙江、广西、四川), 路边黄(湖北、湖南), 金花草(湖南、河南), 大金钱草(湖北、四川); 陕西: 马板长、鸡不食、爬地黄、黄花藤(柞水), 过路蜈蚣(宝鸡), 对月草, 寸金丹, 寸骨七; 甘肃: 小茄子, 对叶草; 浙江: 羊耳菜(龙泉), 老鼠耳朵(瑞安), 白过路蜈蚣(平阳), 小茄, 落地鼠耳草(天目山); 安徽: 对月草; 江西: 爬地蜈蚣(德兴), 黄花过路黄(婺源), 铜钱子带草(吉水、景德镇); 湖南: 四川大金钱草(辰溪), 千里马、地黄花、软筋藤(古丈), 过边黄(常德), 藤黄波萝(新宁), 双铜钱(凤凰), 猫叶苋(衡阳), 糯米草(安仁), 不料草(花垣), 盐有草(来阳), 遍地黄; 广西: 枯疮药(天峨), 四川金钱草; 四川: 一面锣、金钱肺筋草、藤藤侧耳根、白侧耳根、铜钱花、水侧耳根(重庆), 一串钱、红藤、肺筋, 小黄药; 云南: 遍地金, 九节莲, 真金草, 路旁双叶草。

功效 全草或带根全草: 清利湿热, 通淋, 消肿。用于热淋, 沙淋, 尿涩作痛, 黄疸尿赤, 痈肿疔疮, 毒蛇咬伤, 肝胆结石, 尿路结石。

备考 清代乾隆年间(1736~1795)四川百草堂总结草药治病经验的验方抄本中就有金钱草治疗“黄痧走胆”的记载, 其文曰: “黄痧走胆周身黄, 金钱草是救命王, 炕下为末冲甜酒, 草药更比官药强”这里所说的金钱草, 就是本品过路黄。

#### 7240023

*Lysimachia circaeoides* Hemsl.

植物名 露珠珍珠菜《植分学报》

药材名 露珠珍珠菜《贵州药录》

文献名 假露珠菜《云南种录》

地方名 湖南: 苞药三七, 沙红七, 散血草; 贵州: 水杨柳。

功效 全草: 活血散瘀, 消肿止痛, 凉血止血, 消炎生肌。用于骨折, 跌打损伤, 外伤出血, 烫火伤, 疮疖, 蛇咬伤。

#### 7240024

*Lysimachia clethroides* Duby

植物名 珍珠菜《高植图鉴》

药材名 珍珠菜《救荒本草》, 《汇编》

文献名 兔儿尾苗、兔儿丝《救荒本草》, 扯根菜、矮桃《名实图考》, 毛狗尾巴、野七里香《植物名汇》, 过路红、活血莲、红梗草、狼尾珍珠菜《汇编》, 山柳珍珠叶《东北草本植志》, 虎尾珍珠菜《中药大辞典》

地方名 红根草(浙江、江西、广西), 狗尾巴(山东、四川), 狼尾巴、酸姜(东北); 吉林: 狗尾巴酸; 陕西: 红丝毛(眉县、太白), 酸罐罐(旬阳), 狼尾巴花(宁陕), 大酸米草, 高脚酸味草; 江苏: 狗尾巴草(南京), 狼尾草; 浙江: 白花蓼草, 通筋草; 安徽: 山高粱; 江西: 米汤皮, 何树草(德兴), 矮婆子(宜黄), 野何树草(泰和), 野荷子(吉水), 荷树草(景德镇), 金鸡土下黄(丰城), 红头绳, 水荷子, 矮脚荷, 赤脚草; 湖北: 金鸡脚下红, 牛尾巴蒿, 猴子尾巴(神农架); 湖南: 矮桃草; 广西: 狗尾狼(乐

业、凌云);贵州:山地榆,山酸汤杆,大红袍,山马尾,黄参草,〔蓼子草〕,〔辣蓼草〕;云南:毛虫刺药、白花草、白花叶、红血丹、狗尾巴花、真金草、陶鸡尾、撑金散(红河),沙糖根、劳伤药(曲靖),伸筋散(玉溪),九节莲,白花药;其他:虎尾草。

**功效** 根及全草:活血调经,解毒消肿。用于月经不调,白带,小儿疳积,风湿性关节炎,跌打损伤,乳腺炎,蛇咬伤。

## 7240025

*Lysimachia congestiflora* Hemsl.

**植物名** 聚花过路黄《高植图鉴》

**药材名** 风寒草(四川成都)

**文献名** 过路黄《草木便方》,小过路黄《四川中药志》,簇花排草《广西药录》,密花排草《广西植录》

**地方名** 浙江:簇花过路黄;广西:鸡肠菜(临桂),黄花草(凤山),蛇头黄(宾阳),水边黄(武鸣),细样黄瓜草;四川:小风寒、红头绳(成都),小风寒草,〔金钱草〕,匍地龙(峨眉山),铺地黄;贵州:爬地黄;云南:路旁双叶草。

**功效** 全草:祛风散寒,止咳化痰,消积解毒。用于风寒头痛,咽喉肿痛,咳嗽多痰,小儿疳积,腹泻,蛇咬伤。

**备考** 四川部分地区以此混充金钱草,鉴于本品无治疗结石之功,绝对不能误作金钱草用,宜注意鉴别。

## 7240026

*Lysimachia crassifolia* C. Z. Gao et D. Fang

**植物名** 厚叶香草《植分学报》

**药材名** 厚叶香草《广西药录》

**地方名** 广西:四棱牡丹(忻城)。

**功效** 叶:外用于疮疖。

## 7240027

*Lysimachia davurica* Ledeb. --- *Lysimachia vulgaris* L. var. *davurica* (Ledeb.) R. Knuth

**植物名** 黄莲花《名实图考》、《中国植志》

**药材名** 黄莲花《黑龙江中药》

**文献名** 〔粟米草〕《满鲜植汇》

**地方名** 杨柳花(东北);黑龙江:牛心菜;浙江:红根儿(龙泉)。

**功效** 带根全草:镇静,降压。用于高血压,失眠。

## 7240028

*Lysimachia davurica* Ledeb. f. *latifolia* Korsh.

**植物名** 宽叶黄莲花《东北药用植物》

**功效** 带根全草:镇静,降压,消炎,止血。用于高血压,头痛,失眠,子宫脱垂,咯血,痔出血,痢疾,腹泻。外用于跌打损伤,瘰癧,狗咬伤,促进伤口愈合。

## 7240029

*Lysimachia decurrens* Forst. f. --- *L. javanica* Bl.

**植物名** 延叶珍珠菜《中国植志》

**药材名** 痲子草《汇编》

**文献名** 下延叶排草《广西药录》,延叶排草《广西药园药录》,爪哇珍珠菜《中药大辞典》,延脉假露珠草《云

南种录》

**地方名** 广东:树胡椒(曲江);广西:白牡丹(桂平),白当归(凌云),黑疔草(临桂);四川:蜜刀背;贵州:高坡酸。

**功效** 全草:活血调经,消肿散结。用于月经不调。外用于颈淋巴结结核,跌打骨折。

**文献名** 下延叶排草《广西药录》,延叶排草《广西药园药录》,延脉假露珠草《云南种录》

**地方名** 广东:树胡椒(曲江);广西:白牡丹(桂平),白当归(凌云),黑疔草(临桂);贵州:高坡酸。

**功效** 全草:活血调经,消肿散结。用于月经不调。外用于颈淋巴结结核,跌打骨折。

## 7240030

*Lysimachia deltoides* Wight var. *cinerascens* Franch.

**植物名** 小寸金黄《植分学报》

**药材名** 小寸金黄《汇编》

**文献名** 寸金黄《贵州药录》

**地方名** 贵州:小茄。

**功效** 全草:清热解毒,除湿止痛。用于风湿关节痛。

## 7240031

*Lysimachia dushanensis* Chen et C. M. Hu

**植物名** 独山香草《广西药录》

**地方名** 广西:见肿消、三块瓦(环江)。

**功效** 全草:用于跌打损伤。

## 7240032

*Lysimachia filipes* C. Z. Gao et D. Fang

**植物名** 纤柄香草《植分学报》

**药材名** 纤柄香草《广西药录》

**文献名** 排草《植分学报》

**功效** 全草:外用于跌打损伤。

## 7240033

*Lysimachia fistulosa* Hand. -Mazz.

**植物名** 管茎过路黄《植分学报》

**文献名** 头顶一朵花《汇编》

**功效** 全草:用于蛇咬伤。

## 7240034

*Lysimachia fistulosa* Hand. -Mazz. var. *wulingensis* Chen et C. M. Hu

**植物名** 五岭管茎过路黄《广西药录》

**地方名** 广西:白浊草(金秀)。

**功效** 全草:用于淋浊。外用于蛇咬伤。

## 7240035

*Lysimachia foenum-graecum* Hance

**植物名** 灵香草《中国植志》

**药材名** 广零陵香《广西中药志》

**文献名** 排草《名实图考》,陵草《中药材》,广灵香、平南香、满山香《中药大辞典》

**地方名** 广东:搔香草;广西:〔佩兰〕,〔薰衣草〕;台湾:七里香;云南:〔云香草〕,打虫草,尖叶子,闹虫草,驱虫草,驱蛔虫草。

**功效** 地上全草:清热,行气,止痛,驱蛔。用于感

胃头痛,牙痛,咽喉肿痛,胸满腹胀,蛔虫病。

#### 7240036

*Lysimachia fordiana* Oliv.

植物名 大叶过路黄《中国植志》

药材名 大叶过路黄《广西药录》

文献名 大叶排草《高植图鉴》

地方名 广西:背花草(蒙山),破凉伞(兴安),〔七叶莲〕(南丹),老君草、灯台草(阳朔),四块瓦(藤县);其他:一颗星,四叶草,四片瓦,四青花,四散风。

功效 全草:清肝明目,利水消肿。用于肝炎,视力减退,浮肿,跌打损伤;根:用于跌打损伤,瘰癧,喉痛,蛇咬伤,痢毒。

#### 7240037

*Lysimachia fortunei* Maxim.

植物名 星宿菜《高植图鉴》

药材名 大田基黄《广西本草选编》

文献名 矮桃、红根草、红丝毛根《名实图考》,珍珠菜《牧野日图》,红根排草《汇编》

地方名 赤脚草(福建、广东、江西、湖南),红根草(浙江、福建、湖南、广西),散血草(江西、湖南),杜二娘(浙江、福建),泥鳅菜、假辣蓼(广东、广西);江苏:福氏排草(苏南);浙江:红秆草(开化),红根儿(温州、乐清、永嘉),半脚红、地木屎、〔扯根菜〕(嵊县),地木棍,红灯心,红头绳,红筋草,红香子,红梗子,田岸柴,地木回,拔血红;江西:血丝草,红头绳草,黄鳅草;福建:水柯,定经草,矮荷子(光泽),田柯(晋江、龙溪地区),红根仔(福州、厦门、福安、霞浦、浦城),地芥菜(建瓯),红筋仔(霞浦、福安),单身娘、对而生(周宁),赤芽草(清流),红根子草、带爪仔(三明),采肥钗(明溪),小叶吉茶(宁化),同二娘(罗源),对二娘(泰宁),张二娘、红根七、水爪草、水柯草、水椽草、红脚草、红田槐、田爪仔、埂排子、田椽、圆梗红梗根子、喉蛾瘡、高红根、高脚红根仔(松政);湖南:红筷子,红脚青花,红漆根,红姑娘,夜灵珠,里服草,〔血见愁〕,〔孩儿茶〕,大三麦草,水根桃,〔见血飞〕,〔小活血〕,红漆树、黄丝线(衡阳);广东:红脚兰(潮安),流民草(惠阳),假荷树(五华),大叶母基黄,青蛙草,野荷树,家洞草;广西:〔田基黄〕(蒙山),黄鳝头(平南、藤县),通根草、〔牛七〕(贵县),筷子草(富川),百日晒(平南),蛇经草(钟山),土子燕(柳江),串皮黄(罗城),金鸡脚(兴安),牛眼草(玉林),马奶草(昭平),〔千里光〕(大瑶山),蛤蚧草(苍梧),黄鳝草(平南、容县、河池),红曲根,星宿草,红赤根,泥鳅草,黄脚鸡,大叶田基,白丝线,阿生草,星花草,红气根,红七草,百煎草,蛙鳃草;贵州:满天星;其他:红脚菜,矮桃草,张一娘,单条草。

功效 全草或带根全草:清热利湿,活血调经。用于感冒,咳嗽咯血,肠炎,痢疾,肝炎,疳积,疟疾,风湿关节痛,痛经,闭经,白带,乳腺炎,结膜炎,蛇咬伤,跌打损伤。

#### 7240037a

*Lysimachia fukienensis* Hand.-Mazz. --- *L. rosthorniana* Hand.-Mazz.

植物名 福建过路黄《中国植志》

文献名 刘海芦菊《名实图考》,闽赣过路黄《高植图鉴》

功效 全草或带根全草:清热利胆,排石,利尿。

#### 7240038

*Lysimachia glanduliflora* Hanelt

植物名 缝瓣珍珠菜《植分学报》

药材名 缝瓣珍珠菜《湖南药物志》

地方名 湖南:马兰花,过落花,狮子草。

功效 全草:活络调经,解毒消肿。用于慢性肝炎,月经不调,跌打损伤,疮疖肿毒,蜈蚣咬伤。

#### 7240039

*Lysimachia graminica* Hance --- *L. nigrolineata* Hemsl.

植物名 金爪儿《高植图鉴》

药材名 金爪儿《汇编》

地方名 浙江:小茄;湖南:大过路黄,背花草;贵州:五星黄,爬地黄,路边黄,小苦藤菜,枪伤药,小救驾,雷公须,红苦藤菜,过路黄(遵义),苦藤菜(安顺),“阿秋于”(雷公山苗语)。

功效 全草:止血解热,理气活血,拔毒消肿,定惊止痛。用于跌打损伤,无名肿毒,刀斧伤。

#### 7240040

*Lysimachia gymnocephala* Hand.-Mazz. --- *L. hui* Diels ex Hand.-Mazz.

植物名 裸头过路黄《高植图鉴》

药材名 临时救《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 对生黄花叶《元江哈尼族药》

地方名 湖南:无儿肠、过路黄(永顺),毛叶苋、铺地黄(衡阳),仙人对坐草、地黄花草(古文),黄花珠(郴县),九莲灯,匍地龙,黄花草;四川:匍地龙;云南:“爬居扎衣衣收”(元江哈尼语)

功效 全草:消积,散瘀。用于疳积,经闭,跌打损伤,痢疾,疔疮。

#### 7240041

*Lysimachia hemsleyana* Maxim.

植物名 点腺过路黄《高植图鉴》

药材名 点腺过路黄《四川中药志》

文献名 小花排草《中国经植志》,毛过路黄《广西药园药录》

地方名 少花排草(浙江、四川);湖南:女儿红,露天过路黄,露天金钱草;四川:〔金钱草〕。

功效 全草:清热解毒,活血通经。用于经闭干瘦,肾盂肾炎,膀胱炎,慢性肝炎,虫牙痛。

#### 7240042

*Lysimachia henryi* Hemsl.

植物名 宜昌过路黄《植分学报》

文献名 亨利排草《广西药录》,西南排草《广西植录》

地方名 四川:四大天王,四块瓦。

功效 地上部分:调经,养血。

#### 7240043

*Lysimachia heterogenea* Klatt

植物名 黑腺珍珠菜《中国植志》

药材名 黑腺珍珠菜《浙江药植志》

地方名 [满天星](江苏、浙江);浙江:四面剑。

功效 全草:行气破血,消肿解毒。用于闭经。外用于蛇咬伤。

#### 7240044

*Lysimachia hypericoides* Hemsl.

植物名 巴山过路黄《植分学报》

药材名 红毛对筋草《汇编》

功效 全草:清热解毒,凉血止血。用于痢疾神毒,胃肠出血,血崩。

#### 7240045

*Lysimachia insignis* Hemsl.

植物名 三叶排草《高植图鉴》

药材名 三叶排草《汇编》

文献名 土远志、三叶珍珠草《广西中药志》,奇异排草《广西药录》,三叶香草《植分学报》

地方名 三块瓦(广西、云南);广西:三枝叶(德保),节骨风(那坡),解毒草(宁明),[远志](天等、大新),三姐妹(龙州);贵州:八爪金龙(罗甸),排草;云南:三张叶,跌打鼠(文山)。

功效 全株、根:活血散瘀,行气止痛,平肝。用于虚癆咳嗽,胃肠寒痛,风湿骨痛,黄疸型肝炎,跌打肿痛,骨折。

#### 7240046

*Lysimachia japonica* Thunb.

植物名 小茄《高植图鉴》

药材名 大风寒草《品种论述》

地方名 浙江:[小红藤]。

功效 全草:祛风散寒。

#### 7240047 见 7240029

#### 7240048

*Lysimachia klattiana* Hance

植物名 轮叶排草《高植图鉴》

药材名 见血住(湖北)、《汇编》

文献名 克氏排草《中国药植志》,轮叶过路黄《中国植志》

地方名 黄开口(江苏、浙江),老虎脚迹草(安徽、湖北)。

功效 全草:降血压,止血,解蛇毒。用于高血压病,肺结核咯血。外用于毒蛇咬伤,外伤出血。

#### 7240049

*Lysimachia laxa* Baudo --- *L. ramosa* Wall.

植物名 多枝香草《中国植志》

药材名 多枝香草《云南药录》

地方名 云南:灵香草,打虫药(保山),尖叶子。

功效 全草或叶:驱蛔虫。用于蛔虫症。

#### 7240050

*Lysimachia linguensis* C. Z. Gao

植物名 临桂香草《植分学报》

药材名 临桂香草《广西药录》

地方名 广西:牛吊泡、乌龟草(临桂)。

功效 全草:用于肺结核,睾丸炎。

#### 7240051

*Lysimachia lobelioides* Wall.

植物名 长蕊珍珠菜《高植图鉴》

药材名 花被单《汇编》

地方名 假半支莲(广西、云南);广西:乳肿药(隆林);贵州:刀口药,白豆瓣菜;云南:八面风,花汗药,狗咬叶,狗咬药

功效 全草:有小毒。补虚,镇咳,止血,拔毒生肌,消炎止痛。用于乳房肿痛,腹痛,无名肿毒,小儿消化不良,小儿肺炎,狗咬伤,痈疽。

#### 7240052

*Lysimachia longipes* Hemsl.

植物名 长梗排草《高植图鉴》

药材名 长梗排草《浙江药植志》

文献名 长梗过路黄《植分学报》,长梗珍珠菜《广西植志》

地方名 浙江:长柄黄连花;广西:排草。

功效 全草:用于小儿惊风,肺结核咯血,疟疾,刀伤。

#### 7240053

*Lysimachia melamphyroides* R. Knuth

植物名 山萝过路黄《广西药录》《中国植志》

功效 全草:用于梅毒。

#### 7240054

*Lysimachia microcarpa* C. Y. Wu

植物名 小果排草《云南种录》

文献名 排草《云南中草药》,小果香草《中国植志》

地方名 云南:合血香(思茅)。

功效 全草:补气血,解肌表,定喘咳。用于气血虚弱,神经衰弱,气管炎,哮喘,月经不调,感冒,咳嗽。

#### 7240055

*Lysimachia nuntiflora* Chen et C. M. Hu

植物名 垂花香草《广西药录》

功效 全草:外用于疮疖。

#### 7240056

*Lysimachia omeiensis* Hemsl.

植物名 峨眉过路黄《植分学报》

药材名 峨眉排草《峨眉药植资源》

文献名 峨眉对叶黄《云南种录》

地方名 四川:重楼排草(峨眉山)。

功效 全草:祛风除湿,止痛。

#### 7240057

*Lysimachia otophora* C. Y. Wu.

植物名 耳柄过路黄《广西药录》、《中国植志》

地方名 广西:红节草,节节花(田林)。

功效 全草:用于疮疡肿毒。

#### 7240058

*Lysimachia paridiformis* Franch.

植物名 落地梅《名实图考》、《中国植志》

药材名 四块瓦《草木便方》、《中药大辞典》

文献名 大四块瓦《汇编》

地方名 重楼排草(广西、四川、贵州);湖南:四大天



王, 担伞风; 广西: 四皮瓦(全州), 黄心花草(乐业); 四川: 四儿风, 一把伞, 四叶黄。

功效 全草: 祛风, 除湿, 活血, 散瘀。用于风寒咳嗽, 风湿麻木, 疼痛, 月经不调, 跌打劳伤。

#### 7240059

*Lysimachia paridiformis* Franch. var. *stenophylla* Franch. --- *L. trientaloides* Hemsl.

植物名 狭叶落地梅《植分学报》

药材名 追风伞《汇编》

文献名 四块瓦《草木便方》, 伞叶排草《高植图鉴》, 狭叶排草《广西药录》

地方名 四大天王(湖北、四川); 湖北: 四大金刚; 广西: 十八症(阳朔), 破凉伞(灌阳), 黄花一把伞(永福); 四川: 灯盏花, 灯盏窝(峨眉山); 贵州: 一把伞(贵阳), 公接骨丹, 接骨丹, 惊风伞; 其他: 伞形排草。

功效 全草: 祛风除湿, 活血散瘀。用于风湿疼痛, 跌打损伤, 骨折。

备考 有以本种混作及己和细辛用者。

#### 7240060

*Lysimachia parvifolia* Franch. ex Hemsl.

植物名 小叶珍珠菜《中国植志》

文献名 小叶星宿菜《江西药录》

地方名 江西: 小叶排草。

功效 全草: 清热利湿。用于黄疸型肝炎。

#### 7240061

*Lysimachia patungensis* Hand. -Mazz.

植物名 巴东过路黄《高植图鉴》

药材名 大四块瓦《四川中药志》

地方名 四块瓦(湖南、四川、贵州); 湖南: 一颗星, 上紫苑, 四叶一支花, 四叶莲, 顶上天(常德), 四叶草, 四叶肝, 四散风, 四瓣草; 四川: 四叶黄(南川), 天王草(重庆); 贵州: 大叶四大天王、红四块瓦(镇远); 其他: 巴东排草。

功效 全草或带根全草: 清热利胆, 排石, 利尿。

备考 成都草药店所用之四块瓦(四大天王)为唇形科植物, 与本种有别。

#### 7240062

*Lysimachia phyllocephala* Hand. -Mazz.

植物名 叶头过路黄《植分学报》

药材名 大过路黄《汇编》

文献名 头状叶临时救《民药汇编》, 聚叶珍珠菜《广西植录》, 叶头落地梅《云南种录》, 头叶过路黄《神农架药录》

地方名 湖北: 对座草(神农架); 湖南: 临时救; 广西: 大叶过路黄(隆林); 四川: 金钱草、四块瓦、四大天王(成都), 姜花草, 痰药; 云南: 黄药(昭通)。

功效 全草: 祛风, 清热, 化痰。用于风热喉痛, 咳嗽, 大便带血, 坠胀, 热毒疮, 黄疸。

7240063 见 7240037a

#### 7240064

*Lysimachia rubiginosa* Hemsl.

植物名 显苞过路黄《高植图鉴》

药材名 显苞过路黄《贵州药录》

功效 全草: 清热利湿, 消肿解毒。用于黄疸, 水肿, 胆结石, 肾结石, 膀胱结石, 跌打损伤, 疔疮肿毒。

#### 7240065

*Lysimachia sikokiana* Miq.

植物名 排草《名实图考》、《高植图鉴》

文献名 假排草《中国植志》, 密叶排草《云南种录》

地方名 广西: 四块瓦(那坡)。

功效 全草: 用于跌打损伤。

#### 7240066

*Lysimachia stellarioides* Hand. -Mazz.

植物名 茂汶过路黄《植分学报》

药材名 退血草《汇编》

地方名 陕西: 水红袍、对叶红线草(洋县); 贵州: 背花草、高坡酸、筷子草(榕江、剑河)。

功效 全草: 清热拔毒, 利湿。用于火眼, 腹泻, 疮背, 乳痈。

#### 7240067

*Lysimachia stenosepala* Hemsl.

植物名 腺药珍珠菜《中国植志》

药材名 水伤药《贵州民间药物》

文献名 狭萼珍珠菜《中药大辞典》

地方名 陕西: 水红袍, 见缝合, 黄金楼; 湖北: 金线草(神农架); 贵州: 水疗药, 血经草, 数日清, 水伤草, [满天星]。

功效 全草: 行气破血, 消肿, 解毒。用于经闭, 劳伤, 疔疮。

#### 7240068

*Lysimachia tengyuehensis* Hand. -Mazz.

植物名 腾冲落地梅《云南种录》

药材名 腾冲过路黄《贵州药录》

地方名 贵州: 毛叶子; 云南: 尖叶子打虫药。

功效 全草: 清热, 利湿, 消肿, 解毒。用于黄疸, 水肿, 胆结石, 肾结石, 膀胱结石, 跌打损伤, 疔疮肿毒; 叶: 驱蛔虫。

#### 7240069

*Pornatosace filicula* Maxim.

植物名 羽叶点地梅《高植图鉴》

地方名 青海: “热衣巴”(藏名)。

功效 全草: 用于肝炎, 子宫出血, 月经不调, 疝痛, 关节炎。

#### 7240070

*Primula atrodonata* W. W. Smith

植物名 白心球花报春《中国植志》

文献名 黑齿报春《青藏药图》

地方名 西藏: “象治恩保”(藏名)。

功效 花: 止泻。

#### 7240071

*Primula beesiana* Forr.

植物名 霞红灯台报春《中国植志》

药材名 鱼肠草《云南药录》

文献名 霞红报春《高植图鉴》

功 效 根:消炎止痛。用于疔疮。

## 7240072

*Primula boreo-calliantha* Balf. f. et Forr. --- *Primula muliensis* Hand. -Mazz.

植物名 木里报春《中国植志》

药材名 红报春花《迪庆藏药》

功 效 花:清热,敛毒。用于血热,肺病,赤痢,便血,毒扩散。

## 7240073

*Primula cernua* Franch.

植物名 垂花穗状报春《中国植志》

药材名 米伞花《汇编》

地方名 贵州:斜倾报春花,野洋参。

功 效 根:补虚,通乳。用于肺结核咳嗽,乳汁不下。

## 7240074

*Primula denticulata* Smith ssp. *sinodenticulata* (Balf. f. et Forr.) W. W. Smith --- *Primula sinodenticulata* Balf. f. et Forr.

植物名 滇北球花报春《中国植志》

药材名 米伞花《中药大辞典》

地方名 贵州:野洋参;云南:华紫报春花、报春花(红河),三月花。

功 效 全草:止血,消痞。用于产后流血不止,红崩;根:用于小儿疳积,结核,病后体虚,虚癆,乳汁不下。

## 7240075

*Primula efarinosa* Pax

植物名 无粉报春《中国植志》

文献名 偷偷还阳、云苔草《汇编》

地方名 湖北:宝果金白菜(神农架)。

功 效 根:用于蛇咬伤;全草:活血调经。用于劳伤。

## 7240076

*Primula epilosa* Craib --- *Primula cheniana* Fang

植物名 二郎山报春《中国植志》

药材名 豆叶参《汇编》

功 效 根:清湿热,祛风痰。用于头昏,耳聋,湿热黄疸,尿少色黄。

## 7240077

*Primula faben* Oliv.

植物名 峨眉报春《中国植志》

药材名 峨山雪莲花《四川中药志》

文献名 费伯报春花《四川中药志》

功 效 全草:清热利湿,止汗。用于尿路感染,小便混浊,白带多。

## 7240078

*Primula flava* Maxim.

植物名 黄花粉叶报春《中国植志》

文献名 黄花报春《拉汉种称》

地方名 青海:“香智赛饶”(藏名)。

功 效 全草:清热退烧,敛疮散瘀。用于水肿,烫伤。

## 7240079

*Primula forbesii* Franch.

植物名 小报春《中国植志》

药材名 小报春花《汇编》

文献名 报春花《名实图考》

地方名 云南:癩痢头花(玉溪),山白菜,小蓝花。

功 效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于高热咳嗽,小儿肺炎,咽喉炎,口腔炎,扁桃体炎,牙痛,急性结膜炎,肾炎,风湿关节痛,产后出血,红崩白带,外伤出血,跌打瘀血,肾虚阳痿,流产。

## 7240080

*Primula forrestii* Balf. f.

植物名 灰岩约叶报春《中国植志》

药材名 松打七《汇编》

功 效 根:祛风除湿,舒筋活络。用于咳嗽,痰多,风湿痛,腹泻,内外伤出血,跌打扭伤。

## 7240081

*Primula hypoleuca* Hand. -Mazz. --- *Primula forbesii* Franch. ssp. *hypoleuca* (Hand. -Mazz.) W. W. Smith

植物名 白背小报春《中国植志》

地方名 云南:小报春,癩痢头花。

功 效 全草:养阴清热,止血消炎,活络止痛。

## 7240082

*Primula loeseneri* Kitag.

植物名 肾叶报春《中国植志》

文献名 心叶报春《东检》,心叶报春花《高原中草》

功 效 全草:清热除湿,淋浊带下,排毒生肌。

## 7240083

*Primula malacoides* Franch.

植物名 报春花《中国植志》

药材名 报春花《广西药录》

地方名 广西:叉叉草(隆林)。

功 效 全草:退热,消肿,止痛。

备 考 《植物名实图考》之报春花为小报春

*Primula forbesii* Franch., 非本种。

## 7240084

*Primula obconica* Hance

植物名 鄂报春《中国植志》

药材名 鄂报春《汇编》

文献名 四季报春《云南种录》

地方名 湖北:岩丸子(利川)。

功 效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于心悸,肺癆咳嗽,风湿病;根:用于腹痛,解酒毒

## 7240085

*Primula ovalifolia* Franch.

植物名 卵叶报春《中国植志》

药材名 卵叶报春《贵州药录》

地方名 湖北:地枇杷(神农架)。

功 效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于心悸,肺癆咳嗽,风湿病。

## 7240086

*Primula poissonii* Franch.

植物名 海仙报春《中国植志》

药材名 海仙花《名实图考》

文献名 海仙报春花《品种论述》

地方名 四川:水生菜、〔雪莲花〕(西昌);云南:“雁打巴”(丽江纳西语)。

功效 全草:舒经活血,滋阴止咳。

#### 7240087

*Primula pseudodenticulata* Pax --- *Primula pseudodenticulata* Pax ssp. *polyphylla* (Franch.) W. W. Smith

植物名 滇海水仙花《名实图考》、《中国植志》

药材名 海水仙《贵州药录》

文献名 多叶海水仙《云南种录》,大报春花《汇编》

地方名 贵州:地红花,野红花;云南:大瓣痢,水白菜,报春花。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于心悸,肺癆咳嗽,风湿病,小儿发热。

#### 7240088

*Primula secundiflora* Franch. --- *Primula vittata* Bur. et Franch.

植物名 偏花报春《中国植志》

药材名 藏报春花《汇编》

文献名 带叶报春《高植图鉴》,条纹报春《中药大辞典》,带叶报春花《汇编》,偏花钟报春《西藏植志》

地方名 西藏:报春花,“橡只玛尔布”(藏名)。

功效 花:清热燥湿,泻肝胆火,止血。用于小儿高热抽搐,急性胃肠炎,痢疾。外用于外伤出血。

#### 7240089

*Primula sieboldii* E. Morren

植物名 樱草《中国植志》

药材名 翠蓝草《汇编》

文献名 翠南报春《东检》,翠兰花、野白菜《中药大辞典》

地方名 吉林:樱草根。

功效 根、根茎:止咳化痰,平喘。用于上呼吸道感染,咽炎,支气管炎,寒喘咳嗽。

#### 7240090

*Primula sikkimensis* Hook.

植物名 钟花报春《中国植志》

药材名 黄花报春花《汇编》

文献名 锡金报春《高植图鉴》,黄花报春《中药大辞典》

地方名 西藏:“象治赛保”(藏名)。

功效 花:清热燥湿,泻肝胆火,止血,止泻。

#### 7240091

*Primula sinopurpurea* Balf. f.

植物名 紫花雪山报春《中国植志》

药材名 三月花《云南药录》

文献名 中华紫报春《拉汉种称》,金粉雪山报春《西藏植志》,华紫报春《云南种录》

地方名 云南:报春花(红河)。

功效 根或全草:止血,消痞。用于产后流血不止,红崩,小儿疳积,结核,病后体虚。

#### 7240092

*Primula souchifolia* Franch.

植物名 莛叶报春《中国植志》

药材名 峨山雪莲花《汇编》

文献名 苦莛叶报春《汇编》,莛叶脆蒴报春《西藏植志》,峨眉雪莲花《峨眉药植研究》,莛叶报春花《品种论述》

地方名 四川:红花血莲花,〔雪莲花〕(峨眉),〔红雪莲〕。

功效 全草:活血调经,祛风除湿,止咳。用于月经不调,白带,风湿疼痛,咳嗽痰多。

#### 7240093

*Primula szechuanica* Pax

植物名 四川报春《中国植志》

文献名 四川报春花《汇编》

地方名 湖北:偷筋草。

功效 全草:活血散瘀。用于跌打损伤。

#### 7240094

*Primula tangutica* Pax

植物名 甘青报春《中国植志》

药材名 唐古特报春《青藏药图》

文献名 “香智莫葛”(藏名)《高植图鉴》

地方名 青海:“奥勒西”(藏名)。

功效 花、籽:安神止痛,退烧。用于神经痛,关节痛,肺病,心脏病,高血压,烫伤,疖疮。

#### 7240095

*Primula vialii* Delavay ex Franch. --- *P. littoniana* Forr. ---

*P. littoniana* Forr. var. *robusta* Forr.

植物名 高穗花报春《中国植志》

药材名 紫报春花《迪庆藏药》

功效 花:用于肺脓,疮疖,收敛已扩散毒邪。

#### 7240096

*Stimpsonia chamaedryoides* Wight

植物名 假婆婆纳《高植图鉴》

地方名 广西:五星草(临桂),密碎子(金秀)。

功效 全草:用于疮疡肿毒,毒蛇咬伤。

### 7241 蓝雪科 Plumbaginaceae

#### 7241001

*Ceratostigma minus* Stapf ex Prain

植物名 架棚《云南植志》

药材名 紫金标《云南中草药》

文献名 小蓝雪花《中国植志》,攀倒甌《中草药学》,紫金莲《中草药》,小角柱花《高植图鉴》

地方名 架棚(云南、西藏);云南:对节蓝、对节兰(红河),九节莲(曲靖),九结莲,铁狮岩陀,红花紫金标,蓝花岩陀(保山),风湿草(大理),岩五姜(中甸),东南菊(下关),叶叶蓝,小蓝雪;西藏:“兴居茹玛”(藏族语),角柱花。

功效 根:通经活络,祛风湿。用于风湿麻木,脉管炎;全株:用于跌打损伤,接骨,腮腺炎。

备考 四川凉山地区彝族将根茎用于引产。

## 7241002

*Ceratostigma plumbaginoides* Bunge

植物名 蓝雪花《中国植志》

药材名 蓝雪花《中药大辞典》

文献名 角柱花、攀倒甍、七星箭《中草药学》

地方名 河南：山灰柴，假靛；四川：毛角柱花、搬倒甍（绵阳）；贵州：紫金莲，转子莲。

功效 全株：祛风除湿，散寒止痛，健脾消食；根：活血止痛，化瘀生新。用于跌打损伤，接骨。

## 7241003

*Ceratostigma ulicinum* Prain

植物名 刺鳞蓝雪花《中国植志》

文献名 荆苞紫金标《西藏植志》，荆豆角柱花、“兴角柔玛”（藏名）《青藏药图》

功效 地上部分：用于子宫出血，高血压。外用于止血。

## 7241004

*Ceratostigma willmottianum* Stapf

植物名 岷江蓝雪花《中国植志》

药材名 紫金莲《贵州草药》

文献名 紫金标《云南植志》，七星剑《四川中药志》，岷江蓝雪《广西植物》

地方名 扳倒甍（甘肃、四川），搬倒甍（四川、贵州）；四川：紫叶角柱花（绵阳），星星草，蓝雪花；贵州：软子莲；云南：蓝花草、蓝花对节兰、牛鞭子棵（通海），蓝花狗骨节（澄江），蓝花丹（元江），九节连（宜良、曲靖），舒筋、月月花、大吉力、花格草、假玉竹（曲靖），蓝花过节（宜良），铁狮岩陀（保山），对节蓝、普普红、叶叶蓝、九节黑（红河），蓝花矮陀（永平、保山）；西藏：“兴居茹马”（藏名）。

功效 全草：祛风除湿，散寒止痛，健脾消食。用于风湿性关节炎，月经不调，消化不良；根：活血止痛，化瘀生新。用于跌打损伤，接骨。

## 7241005

*Limonium aureum* (L.) Hill

植物名 黄花补血草《中国植志》

药材名 黄花补血草《汇编》

文献名 金色补血草《东北草本植志》，金匙叶草《沙漠药植》，黄花矾松《东检》

地方名 内蒙古：黄花苍蝇架，“伯勒草格”、“沙尔采采格”（蒙名）；甘肃：干活草，石花子；宁夏：黄里子白；青海：金佛花；新疆：“巴甫耐”（维名）。

功效 花：止痛，消炎，补血。用于神经痛，月经量少，耳鸣，乳汁不足，感冒。外用于牙痛及疮疖肿痛；花萼：用于妇女月经不调，鼻衄，带下。

## 7241006

*Limonium aureum* (L.) Hill var. *potaninii* (Ik.-Gal.) Peng

植物名 星毛补血草《中国植志》

文献名 金色补血草《兰州植志》，金匙叶草《兰州植物通志》

地方名 甘肃：干草花。

功效 花萼：用于月经不调，鼻衄，带下

## 7241007

*Limonium bicolor* (Bunge) Kuntze

植物名 二色补血草《中国植志》

药材名 补血草《汇编》

文献名 蝎子菜花、蛇蚤花、野菠菜《救荒本草》，二色匙叶草《山东大学学报》，[矾松]《东检》

地方名 苍蝇架（东北、内蒙古），苍蝇花（东北、宁夏、山东），蝎子架（陕西、甘肃），扫帚草、匙叶草、[血见愁]（华北）；黑龙江：麦条根，刺榆条；河北：屁屁根，哈萝卜根，海蔓荆；内蒙古：“依拉音—花儿”、“察干—采采格”（蒙名），落蝇花（包头）；陕西：[墓头回]（陇县），二色矾松、辽矾松，秃子花；甘肃：燎眉蒿；山东：苍蝇草（栖霞），酱棵子，（威海），河梅花（荣成）；河南：白花菜棵；其他：蝎子草。

功效 根及全草：活血，止血，温中健脾，滋补强壮。用于月经不调，功能性子宫出血，痔疮出血，胃溃疡，脾虚浮肿。

## 7241008

*Limonium gmelinii* (Willd.) Kuntze

植物名 大叶补血草《中国植志》

文献名 补血草《新疆中草药手册》，西伯利亚补血草、大叶矾松《中药大辞典》，矾松《中国经植志》

地方名 新疆：克米克（巩留），拜赫曼（塔城），曲库尔。

功效 全草：止血散瘀。用于功能性子宫出血，宫颈癌，其他出血。

## 7241009

*Limonium sinense* (Girard) Kuntze - *Statice sinensis* Girard

植物名 补血草《中国植志》

药材名 匙叶草《福建中草药》

文献名 中华补血草《拉汉种称》，华曼荆《指示植物》，匙叶矾松、花矾松《东检》，盐云参、海金花、海萝卜《汇编》

地方名 河北：苍蝇花，海蔓荆；山东：海波菜，海蔓；江苏：盐云草；福建：海滩地榆（同安），海芙蓉（闽南），土赤芍（福清），鱼萝卜（晋江），海花（莆田），土地榆，海茎草，一条根，皮官草，海赤芍；台湾：红毛茶，[赤芍]，海当归，海登坚圪，筋仔草；广东：白花玉钱香；广西：咸水参（防城）。

功效 根或全草：祛湿，清热，止血。用于血淋，湿热便血，血热月经过多。

## 7241010

*Limonium wrightii* (Hance) Kuntze - *L. arbusculum* (Maxim.) Makino

植物名 海芙蓉《中国植志》

药材名 海芙蓉（台湾）

文献名 石芙蓉《高植图鉴》

功效 根、全草：用于癌肿，风湿疼痛，高血压病。

## 7241011

*Limonium wrightii* (Hance) Kuntze var. *luteum* (Hara)

Hara

植物名 黄花海芙蓉《中国植志》

功效 根、全草：用于风湿痛，高血压病。

## 7241012

*Plumbagella micrantha* (Ledeb.) Spach

植物名 小蓝雪花《西藏植志》

药材名 鸡娃草《汇编》

文献名 蓝雪草《高原中草》

地方名 青海：“鹤斯格莫日”（藏名），刺叭松；四川：小蓝雪草；西藏：鸡窝草。

功效 全草：解毒，杀虫。用于头癣，体癣，手癣，足癣。

## 7241013

*Plumbago auriculata* Lam. --- *P. capensis* Thunb.

植物名 蓝花丹《中国植志》

文献名 蓝茉莉《华北经济志要》

地方名 北京：花绣球（草桥）；福建：蓝雪花，紫花千里及；广东：蓝花叭松（广州）；云南：红花丹，紫雪花，紫花丹。

功效 根：用于癩子。

## 7241014

*Plumbago indica* L.

植物名 紫花丹《中国植志》

药材名 紫雪花《广西药录》

文献名 红花丹《云南种录》

地方名 谢三娘（福建、海南、广西）；广东：紫花藤；广西：红谢三娘（贵县），红地三娘；云南：“比比娘”，“毕毕良”（傣名），银丝矮陀陀，小散血。

功效 全草：有小毒。散瘀消肿，祛风杀虫。用于风湿骨痛，痢疮肿毒，跌打损伤，牛皮癣。

## 7241015

*Plumbago zeylanica* L.

植物名 白花丹《中国植志》

药材名 白花丹《生草药性备要》、《汇编》

文献名 白花藤《唐本草》，山坡零、假茉莉、总管《生草药性备要》，照药根子《高植图鉴》

地方名 白雪花（广东、广西、四川），一见消（广东、海南），白花茶（华南），白花榜（福建、海南）；福建：千斤称（安溪），[千里及]（泉州），野茉莉（福州、古田），隔布草，山茉莉，白灵花，百里锦，耳钩草，半壁，倒枝梅，臭茉莉，[千里锦]；台湾：黑面马，乌面马；广东：石硬药（翁源），白花仔（潮安），谢三娘（湛江），白云花，白雪花叶；海南：天山娘，白花谢三娘；广西：天槟榔（南宁），白竹花（凌云），破骨丹（桂平），火灵丹（北海、岑溪），苦灵丹（贵县），隔沙草（平南），仙章叶（大新），[走马胎]（德保、靖西），白崩（龙州），火炼丹（苍梧），白粘花叶（河池），鸡血散（那坡），节节红（靖西），铁茉莉、铁贼、猛老虎（桂林），白花根（北海），千槟榔，三娘草，照药，耳丁藤；四川：白皂药，白花皂药；贵州：赵药；云南：白花九牯牛、余笑花、白花铁罗汉、白花大药叶（红河），白花楼根（保山），白花矮陀陀（峨山、新平），白花舒筋（通海），棉白花、日见效（元江），白花狗闹花（勐定），白老金丹，

白花岩陀，白花金丝岩陀，“阿珠阿扯”（红河哈尼族语），“茂占林”（文山州壮语），铁罗汉（玉溪），[金不换]，[钻地风]（思茅），“毕刺个”、“柄比蒿”（西双版纳傣语），“郁蔬”（楚雄彝名）；其他：雁来红。

功效 根和叶：有毒。祛风止痛，散瘀消肿；根：用于风湿骨痛，跌打肿痛，胃痛，肝脾肿大；叶：外用于跌打肿痛，扭挫伤，体癣。

## 7242 车前草科 Plantaginaceae

## 7242001

*Plantago aristata* Michx.

植物名 线叶车前《山东经植》

地方名 山东：车车子（五莲）。

功效 种子：清热利尿，渗湿通淋，明目，祛痰；全草：清热利尿，祛痰，凉血，解毒。

## 7242002

*Plantago asiatica* L. --- *P. hostifolia* Nakai et Kitag.

植物名 车前《高植图鉴》

药材名 车前子《本经》、《药典》，车前草《四声本草》、《药典》

文献名 芣苢《诗经》，马舄《尔雅》，陵舄《列子》，当道《本经》，芣苢、蝦蟆衣、牛遗、胜舄《别录》，牛舌草（陆玑《诗疏》），车前实《神仙服食经》，蝦蟆衣子《履巉岩本草》，车轮菜、胜舄菜《救荒本草》，蝦蟆草《简便单方》，钱贯草《生草药性备要》，牛舄《医林纂要》，鱼草、车过路、车钱、乌足、穿钱《新纲》，牛舌、[地衣]、[地胆头]《中国药植志》，霸王鞭《诗草木今释》，长柄车前《占野》，大车前、江车前（江西产）、关车前（东北产）、淮南车前、衢州车前《药材学》

地方名 蛤蟆草子，猪耳朵棵子（河南、青海、山东、江苏），车轮草（江西、福建），车轮菜子（吉林、辽宁、河北、内蒙古），大粒车前子（吉林、辽宁），车轱辘菜（东北、山东、浙江、福建、河南），驴耳朵菜（东北），[马鞭草]（北京、江苏），五根草（福建、台湾），打官司草（江苏、上海、浙江），前仁（江苏、四川），猪耳朵（山西、湖南），猪耳朵棵（青海、山东、江苏、安徽、河南）；吉林：“查真丸”（朝名）；北京：车古辘草（京郊）；山西：车甲子，猪不扎草；内蒙古：“塔翁—萨拉”、“塔日马”（蒙名）；青海：猪耳草，猪耳朵穗子，驴耳朵穗穗；山东：车车子（五莲），车辙子、穗子（广饶），老牛舌（无棣、沾化），驴耳朵（海阳），车辙子菜、车根种子、道道车（烟台），车辙子棵；江苏：牛耳朵棵，牛耳朵草，猪耳朵草（铜山、睢宁），猪耳边子（盱眙），牛舌头子（南通），车花（如东），猪耳朵鞭子（宝应），牛田菜（启东），牛母亲；上海：牛甜菜，甜菜叶，野甜菜，黄蟆叶，癞蛤蟆草；浙江：五芹草（洞头），红白脚蟆衣（温州、乐清、瑞安、永嘉），蛙蟆衣、蛙蟆叶穗（泰顺），大军敌，老婆线，官司草，相扑草，野田菜，野地菜，猪耳；安徽：车板菜，鲫鱼草；江西：尿不通（吉水），川皮草（婺源），凤眼前仁，车皮草；福建：五金草（福鼎、周宁），蛤蟆衣穗（福鼎），黄排龟（宁德、罗源），七早草，饭匙草，饭瓢草，下马草，踏不死，黄蟆龟草，蜚尾草，五斤草（闽南）；河南：猪耳根棵；

湖南:〔马蹄草〕,车母草,田菠菜,医马草,插心草,〔鸭脚板〕;广东:田贯草;广西:钱串草(南宁),雪草(柳江),竹壳菜(陆川),咳麻草(那坡);四川:“塔尔仁”(藏名),科麻叶(会理),车前仁,毛车前(峨眉山);贵州:喀吗叶,喀吗菜,客妈兜,蛤蟆菜;其他:吕仁豆。

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰。用于水肿胀满,热淋涩痛,暑湿泄泻,目赤肿痛,痰热咳嗽;全草:清热利尿,祛痰,凉血,解毒。用于水肿尿少,热淋涩痛,暑湿泻痢,痰热咳嗽,吐血衄血,痈肿疮毒。

## 7242003

*Plantago camtschatica* Link

植物名 海滨车前《中草药》

功效 种子:朝鲜作车前子入药。

## 7242004

*Plantago cornuti* Gouan.

植物名 长柄车前《新疆药志》

药材名 车前《新疆药志》

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰;全草:清热利尿,祛痰,凉血,解毒。

## 7242005

*Plantago depressa* Willd.

植物名 平车前《高植图鉴》

药材名 车前子《本经》、《药典》,车前草《四声本草》、《药典》

文献名 当道《本经》,芡苢、蝦蟆衣、牛遗、胜鳬《别录》,铺地车前《兰州植志》,扁车前《兴安植群》,小粒车前子《东北药志》,车前实、凤眼前仁、蟾蜍草、打官司草《简明中医辞典》

地方名 鞋底片(华北),车轱辘菜(东北、河北、内蒙古、甘肃),猪耳朵(山西、青海),小水前(河北、山西),驴耳朵菜(东北),猪耳朵棵(河北、山东);北京:车前;河北:碾碾转(张家口),牛舌头棵,荷包菜;山西:猪不扎草;内蒙古:“乌合口一乌热戈纳”(蒙名),车串串;甘肃:车铃菜(岷县);青海:“塔冉”(藏名),猪耳朵草,猪耳朵穗子;山东:车根种子、车轱辘菜、道道车(烟台);四川:蟆蚂叶(峨眉山)。

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰。用于水肿胀满,热淋涩痛,暑湿泄泻,目赤肿痛,痰热咳嗽;全草:清热利尿,祛痰,凉血,解毒。用于水肿尿少,热淋涩痛,暑湿泻痢,痰热咳嗽,吐血衄血,痈肿疮毒。

## 7242006

*Plantago erosa* Wall.

植物名 疏花车前《西藏植志》

药材名 滇车前《汇编》

文献名 车前子、蛤蚂草《滇南本草》,小水前《云南种录》

地方名 云南:“哈帕依札”(傣语),车前草,车轮菜,蛤蟆草,蛤蚂叶,癞蛤蟆草(曲靖),“哈帕一朵”(红河哈尼语)。

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰。用于水肿胀满,热淋涩痛,暑湿泄泻,目赤肿痛,痰热咳嗽;全草:清热利尿,祛痰,凉血,解毒。用于水肿尿少,

热淋涩痛,暑湿泻痢,痰热咳嗽,吐血衄血,痈肿疮毒。

## 7242007

*Plantago formosana* Tateishi et Masam.

植物名 台湾车前(拟)

药材名 台湾车前草(拟)

文献名 车前草《台湾中药材图鉴》

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰;全草:清热利尿,祛痰,凉血,解毒。

## 7242008

*Plantago jeholensis* Koidz.

植物名 毛车前《中草药》

地方名 辽宁:车前子(朝阳)。

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰。

## 7242009

*Plantago lanceolata* L.

植物名 长叶车前《高植图鉴》

药材名 车前子(山东)

文献名 狭叶车前(广西《园林药录》)

地方名 车前、婆婆丁花(东北);山东:车车子(五莲),车轱辘、穗子(广饶),猪耳朵棵(滕县),老牛舌(无棣、沾化),驴耳朵(海阳),车古轮菜(崂山);广西:东北狭叶车前。

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰;全草:清热利尿,祛痰,凉血,解毒。

## 7242010

*Plantago macro-nipponica* Yamamoto

植物名 台湾大车前《品种论述》

药材名 车前子《品种论述》

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰。

## 7242011

*Plantago major* L.

植物名 大车前《高植图鉴》

药材名 车前子《本经》、《汇编》,车前草《四声本草》、《云南中草药选》

文献名 当道《本经》,芡苢、蝦蟆衣、牛遗、胜鳬《别录》,车轮菜《救荒本草》,蝦蟆叶《名实图考》,大叶车前《中药志》

地方名 前仁(浙江、广东、广西、四川),蛤蟆草(浙江、湖南),饭匙草、钱贯草(广东、广西),蟾蜍草(海南、广西);甘肃:车贯;浙江:官司草、抽筋草、蚰麻草(嵊县);福建:五根草(厦门),饭匙婆(大母),铁春榜(三明);湖南:〔马蹄草〕,夫子草,田菠菜,医马草,插心草,蚌蛤草,蛤蟆精,麻拐草,〔鸭脚板〕,猪耳朵;广东:田贯草、钱串草(广州),车茶草(潮汕),青茶草、踏不死(潮安、潮州),蛤婆草(潮安、潮州、南澳),五条根(汕头、南澳),野甜菜(潮阳),野甜草,田干菜,〔地胆头〕,杓仔草,假饭匙,蒲杓草,蛤蚧菜,蛤蚧草;广西:〔马鞭草〕(贵县),前贯草(梧州),咳麻菜(田林),蚂拐草、三月菜、猪耳朵草(桂林),猪肚菜,猪耳草,牛舌草,斧头药,灰盆草;云南:“牙引热”(西双版纳傣语),蛤蚂叶(昆明),其它:小粒车前子。

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰;全

草:清热利尿,祛痰,凉血,解毒。

#### 7242012

*Plantago major* L. var. *sinuata* (Lam.) Decne. --- *Plantago major* L. var. *vulgaris* Pilg. f. *sinuata* (Lam.) Pilg.

植物名 深波大车前《品种论述》

文献名 大叶车前《广西植录》,大车前《云南种录》

地方名 河北:车前子。

功效 全草、种子:为清小肠经火热的主要药物。

#### 7242013

*Plantago medica* L.

植物名 北车前《品种论述》

药材名 车前子(东北、河南)

文献名 中车前《中药志》

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰。

#### 7242014

*Plantago psyllium* L.

植物名 亚麻子车前《高植图鉴》

药材名 车前子(新疆)

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰。

#### 7242015

*Plantago stepposa* Kupr.

植物名 草车前《新疆药植志》

药材名 车前子、车前草(新疆)

功效 种子:清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰;全草:清热利尿,祛痰,凉血,解毒。

### 7243 桔梗科 Campanulaceae

#### 7243001

*Adenophora capillaris* Hemsl. --- *A. longisepala* Tsoong --- *A. leptosepala* Diels var. *linearifolia* C. Y. Wu

植物名 丝裂沙参《中国植志》

药材名 泡沙参(四川)

文献名 泡参草《植物名汇》,线齿沙参《中国经植志》,细萼沙参《峨眉药植资源》,龙胆草、长萼沙参《高植图鉴》,线叶细萼沙参《云南种录》

地方名 南沙参、泡参(四川、贵州、湖北),沙参(湖北、四川);湖北:牛奶菜(神农架);四川:灌粉泡参,泡萝卜;贵州:毛脚鸡。

功效 根:养阴清肺,祛痰止咳。用于肺热燥咳,虚劳久咳,阴伤咽干喉痛。

备考 在四川巴东一带充桔梗用。

#### 7243002

*Adenophora capillaris* Hemsl. subsp. *leptosepala* (Diels) Hong --- *A. leptosepala* Diels --- *A. urceolata* C. Y. Wu

植物名 细萼沙参《中国植志》

文献名 壶花沙参《中国植志》

功效 根:养阴清肺,化痰,益气。用于肺热燥咳,阴虚劳嗽,干咳痰粘,气阴不足,烦热口干。

#### 7243003

*Adenophora divaricata* Franch. et Sav.

植物名 展枝沙参《中国植志》

文献名 南沙参《山东经植》

地方名 山东:沙参。

功效 根:养阴清热,润肺祛痰止咳,养胃生津。用于肺热燥咳,热病口干,饮食不振。

#### 7243004

*Adenophora elata* Nannf. --- *A. wutaiensis* Hurasawa

植物名 狭长花沙参《中国植志》

文献名 沙参《北京植志》

功效 根:清热养阴,润肺止咳。

#### 7243005

*Adenophora gmelinii* (Spreng.) Fisch. --- *A. coronopifolia* Fisch.

植物名 狭叶沙参《中国植志》

文献名 柳叶沙参《东检》,柳齿沙参《兴安植群》,厚叶沙参《中国植志》

功效 根:清肺泻火,养阴止咳。

#### 7243006

*Adenophora himalayana* Feer subsp. *alpina* (Nannf.)

Hong --- *A. alpina* Nannf. --- *A. tsinlingensis* Pax et Hoffm.

植物名 高山沙参《中国植志》

药材名 高山沙参《峨眉药植研究》

地方名 四川:泡参(峨眉山)。

功效 根:补肺固正,止咳祛痰。

#### 7243007

*Adenophora hunanensis* Nannf.

植物名 杏叶沙参《救荒本草》、《中国植志》

药材名 南沙参《本草从新》、《中药志》

文献名 莽苳《别录》,杏参《图经》,白面根《救荒本草》,宽裂沙参《湖北中草药志》,宽叶沙参《神农架药录》  
地方名 沙参(山西、河南、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州);湖北:山根菜(神农架)。

功效 根:养阴清肺,祛痰止咳。用于阴虚,肺热,燥咳痰粘,热病伤津,舌干口渴。

备考 1.据《中药志》(1982)称:“杏叶沙参”首出于《救荒本草》,其图明确画有叶柄,花萼裂片短而宽,这显然指的是 *A. hunanensis* Nannf.,故将植物中文名确定为“杏叶沙参”。2.张璐《本经逢原》云:“沙参有南北二种,北者质坚性寒,南者体虚力微,功同北沙参而力稍逊。”所指“南沙参”即桔梗科 *Adenophora* 属植物之根。而北沙参则为伞形科植物,如东北“辽沙参”,山东“莱阳沙参”等。

#### 7243008

*Adenophora hunanensis* Nannf. subsp. *huadungensis* Hong

植物名 华东杏叶沙参《中国植志》

药材名 华东杏叶沙参《新华本草纲要》

地方名 沙参(华东)。

功效 根:养阴清肺,化痰生津。用于阴虚,肺热,燥咳痰粘,热病伤津,舌干口渴。

#### 7243009

*Adenophora jasionifolia* Franch. --- *A. forrestii* Diels ---

*A. pumila* Tsoong --- *A. atuntzensis* C. Y. Wu

植物名 甘孜沙参《中国植志》

药材名 保利参(云南丽江)  
文献名 滇北沙参《高植图鉴》,阿墩沙参、小钟沙参《中国植志》  
功效 根:在云南丽江地区作沙参用。

## 7243010

*Adenophora khasiana* (Hook. f. et Thoms.) Coll. et Hemsl. --- *A. bulleyana* Diels --- *A. diploidonta* Diels

植物名 云南沙参《中国植志》  
药材名 西南沙参《汇编》  
文献名 沙参《滇南本草》,布氏沙参、南沙参《四川中药志》,玫瑰花参、重齿沙参、变白沙参、两型沙参、丽江沙参、雪花沙参《中国植志》  
地方名 四川:泡沙参、鸡把腿;云南:保利参、鸡把腿根、鸡肉参(红河),鸡半腿、泡参(东川、昆明、丽江),布莱沙参。  
功效 根:清肺泻火,养阴止咳。用于贫血,虚劳咳嗽等。

## 7243011

*Adenophora liliifolioides* Pax et Hoffm.

植物名 川藏沙参《中国植志》  
药材名 川藏沙参《中药大辞典》  
文献名 百合叶沙参《汇编》  
地方名 青海:“勒多道吉曼巴”(藏名);西藏:南沙参、泡参,“陆堆多杰威巴”(藏名)。  
功效 根:清肺泻火,养阴止咳;全草:消炎散肿。用于风湿性关节炎,神经痛。

## 7243012

*Adenophora palustris* Kom.

植物名 沼沙参《中国植志》  
药材名 沼沙参《长白山植药志》  
功效 根:养阴清肺,化痰,益气。

## 7243013

*Adenophora paniculata* Nannf.

植物名 细叶沙参《救荒本草》、《中国植志》  
药材名 南沙参(山东、内蒙古、湖北、四川)  
文献名 嵩参《华北药志》,紫沙参《汇编》,圆锥沙参《山东经植》,长叶沙参《中药志》  
地方名 内蒙古:“草那日”(蒙名);山东:沙参;湖北:兰花沙参(神农架),〔桔梗〕。  
功效 根:养阴清肺,祛痰止咳。用于急慢性支气管炎,肺热咳嗽,痰嗽咯血,咽喉肿痛。

## 7243014

*Adenophora pereskifolia* (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don --- *A. latifolia* Fisch.

植物名 长白沙参《中国植志》  
药材名 长白沙参《沙漠药植》  
文献名 阔叶沙参《汇编》,沙参《常用中药名辨》  
地方名 黑龙江:宽叶沙参;吉林:吉参,老桔梗,人参头,鸡把腿。  
功效 根:养阴清肺,祛痰止咳。

## 7243015

*Adenophora pumifolia* Kitagawa

植物名 松叶沙参《高植图鉴》  
药材名 松叶沙参《高原中草》  
地方名 四川:“向者翁波”(若尔盖藏名)。  
功效 根:润肺止咳,益气生津,肺虚咳嗽,咽干舌燥,胃阴亏损。

## 7243016

*Adenophora polyantha* Nakai --- *A. scabridula* Nannf. ---

*A. polyantha* var. *glabricalyx* Kitagawa  
植物名 石沙参《中国植志》  
药材名 南沙参(河北、山东、江苏)  
文献名 光萼沙参《高植图鉴》,糙萼沙参《中药大辞典》,多花沙参、多蕊沙参、驴干粮《中药通报》  
地方名 沙参(河北、山东、江苏);河北:侧花南沙参,白棉根,面根;山东:甜桔梗。  
功效 根:养阴清肺,化痰,益气。  
备考 河北省个别地区,以此根作北沙参用。

## 7243017

*Adenophora potaninii* Korsh.

植物名 泡沙参《中国植志》  
药材名 泡沙参《中药大辞典》  
文献名 山沙参《汇编》,海氏沙参、波氏沙参《四川中药志》,灯笼花《中国植志》  
地方名 南沙参(西北、河北、四川),沙参(河北、山西、甘肃、青海),泡参(甘肃、四川),面杆杖(河北、青海);甘肃:铃铛花;四川:鸡把腿,奶腥菜花,灯花草(峨眉山)。  
功效 根:养阴清肺,化痰,益气。

## 7243018

*Adenophora remotiflora* (Sieb. et Zucc.) Miq.

植物名 薄叶芥苣《中国植志》  
药材名 芥苣(东北)  
文献名 明叶菜、明叶茶根《满鲜植汇》  
地方名 地参、歪脖菜(东北)。  
功效 根:清热,解毒,化痰;苗叶:用于腹脏风壅,咳嗽上气。

## 7243019

*Adenophora sinensis* A. DC.

植物名 中华沙参《中国植志》  
药材名 南沙参(安徽、江西、福建、湖南、广东)  
地方名 四川:泡参(峨眉山)。  
功效 根:肺虚久咳。用于慢性支气管炎。

## 7243020

*Adenophora stenanthina* (Ledeb.) Kitag.

植物名 长柱沙参《中国植志》  
药材名 长柱沙参《沙漠药植》  
地方名 沙参(东北);宁夏:〔桔梗〕〔硷源〕。  
功效 根:养阴清肺,化痰,益气。

## 7243021

*Adenophora stricta* Miq. --- *A. axilliflora* Borb.

植物名 沙参《中国植志》  
药材名 沙参《本经》、《汇编》  
文献名 〔知母〕《本经》,白沙参、苦心、识美、虎须、



白参、志取、文虎《吴普本草》，文希《别录》，铃儿草、羊婆奶《纲目》，南沙参《本经逢原》，杏参、杏叶沙参《新纲》，挺枝沙参《中药志》，大沙参《常用中药名辨》。

地方名 空沙参、桔参(华东)，泡沙参(湖北、四川)；江苏：沙獐子，龙须沙参，鲜沙参；浙江：土党参(嵊县、淳安)；安徽：沙和尚；江西：小迟草；河南：山沙参；湖南：稳牙参、保牙参、土人参(长沙)，奶沙参(黔阳)，米浆菜(溆浦)；广西：桔梗(武鸣)，奶浆参(恭城)；四川：泡参，鸡把腿。

功效 根：养阴清肺，化痰，益气。用于肺热燥咳，阴虚癆嗽，干咳嗽粘，气阴不足，烦热口干。

备考 《中药志》(1982)称：经考证《神农本草经》、《救荒本草》、《本草纲目》及《植物名实图考》等对沙参文字及图之记载，得知所谓沙参，即指 *Adenophora stricta* Miq. 故确定本种之植物中文名为“沙参”，而不是“杏叶沙参”。

#### 7243022

*Adenophora stricta* Miq. subsp. *confusa* (Nannf.) Hong  
--- *A. confusa* Nannf.

植物名 昆明沙参《中国植志》

文献名 泡参《峨眉药植资源》，罗兰参《云南药录》。

功效 根：补中益气，滋阴生津，止血。用于咳嗽咯血。在云南作南沙参入药。

#### 7243023

*Adenophora stricta* Miq. subsp. *sessilifolia* Hong

植物名 无柄沙参《中国植志》

地方名 沙参(陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南)。

功效 根：养阴清肺，祛痰止咳。

#### 7243024

*Adenophora tetraphylla* (Thunb.) Fisch. --- *A. verticillata* Fisch. --- *A. triphylla* (Thunb.) A. DC. --- *A. obtusifolia* Merr.

植物名 轮叶沙参《中国植志》

药材名 南沙参《本经逢原》，《药典》

文献名 淄州沙参《图经》，空沙参《简明中医辞典》，泡沙参《四川中药志》，泡参《形性鉴别》，三叶沙参《药材学》，钝叶沙参《广西药录》，〔四叶沙参〕《汇编》，〔四叶参〕《新华本草纲要》

地方名 沙参(东北、江苏)，香沙参(东北)；黑龙江：草参、四叶菜；吉林：灯笼菜；内蒙古：“速尔老嘎拉布”(蒙名)；青海：面杆杖；山东：老母鸡肉、鸡肉、山鸡肉(烟台)；湖南：稳牙参，保牙参，土人参；广西：〔桔梗〕(乐业)，白皮参，银叶花，土沙参(桂林)；贵州：鸡怕腿；四川：鸡把腿；云南：鸡肉菜。

功效 根：养阴清肺，化痰，益气。用于肺热燥咳，阴虚癆嗽，干咳嗽粘，气阴不足，烦热口干。

备考 山西、甘肃、浙江曾发现以沙参(*Adenophora* spp.)混充人参出售，应注意鉴别。

#### 7243025

*Adenophora trachelioides* Maxim.

植物名 荠苳《中国植志》

药材名 荠苳《别录》，《中药大辞典》

文献名 荠、苳苳《尔雅》，隐忍〔苗〕《本草经集注》，甜桔梗《纲目》，土桔梗《本草原始》，空沙参《本草从新》，心叶沙参《东检》

地方名 杏叶菜(东北)，沙参(山东、江苏)；辽宁：灯笼菜；山东：老鸭肉(平邑、荣成、泰山)，鸡肉甜(海阳)，杏菜(梁阳、昆崙山)，山樱(威海、昆崙山)，灯笼棵(费县)，水牛肉(莒南)，山铃铛(莒县)，石下苗(莱芜)，南沙参；江苏：山梗菜、山野芋(云台山)；浙江：梅参；湖北：奶浆菜(神农架)；其他：杏芽菜，山蔓菁，臭苏，四季参，荠麦菜，贼参。

功效 根：清热，解毒，化痰。用于燥咳，喉痛，消渴，疔疮肿毒；苗叶：主腹脏风痙，咳嗽上气。

备考 有人认为《别录》之荠苳，应是杏叶沙参，非本种。

#### 7243026

*Adenophora wavreana* Zahlbr.

植物名 多歧沙参《中国植志》

药材名 南沙参《沙漠药植》

文献名 华氏沙参《中药志》，瓦氏参《沙漠药植》

地方名：北京：马儿苗，驴干粮，沙参。

功效 根：养阴清肺热，祛痰止咳。用于肺结核潮热，咳嗽，肺虚咳嗽，百日咳，产后缺乳，感冒头痛，口干舌燥，咽喉肿痛，虚火牙痛。

#### 7243027

*Adenophora wilsonii* Nannf.

植物名 聚叶沙参《中国植志》

药材名 九头沙参《神农架药录》

文献名 妇奶参、细叶沙参《神农架药录》

功效 根：滋阴润肺，生津。

#### 7243028

*Adenophora wulingshanica* Hong

植物名 雾灵沙参《中国植志》

药材名 沙参(雾灵山)

功效 根：养阴清肺，祛痰止咳。

#### 7243029

*Asyneuma chinense* Hong

植物名 球果牧根草《中国植志》

地方名 广西：止咳草、咳嗽草、土沙参(金秀)。

功效 根：用于小儿腹泻，咳嗽，慢性气管炎，肺结核咯血。

#### 7243030

*Asyneuma fulgens* (Wall.) Briq.

植物名 长果牧根草《中国植志》

药材名 鸡肉参《云南药录》

文献名 土参《滇南本草》，西南牧根草(《滇南本草》整理本)，肖牧根草《广西植录》

地方名 云南：喉节草(西畴)，亮牧草根，〔蓝花柴胡〕，“拖当哈沙”(元江哈尼语)。

功效 根：润肺止咳，益气补血。用于肺虚咳嗽，小儿羸瘦。

备考 《中国植志》(1983)称：“过去认为本种广布

于西南地区是不对的,至今只有西藏有分布,其他各省的植物,乃是 *A. chinense* Hong,《高植图鉴》(1975)即属误订”。(《滇南本草》整理本)(1978)所订“土参”之学名同《高植图鉴》,是否也是误订?志此供进一步研究参考。

## 7243031

*Campanula calcicola* W. W. Sm. --- *C. nephrophylla* C. Y. Wu

植物名 灰岩风铃草《中国植志》

药材名 补肺参《新华本草纲要》

地方名 云南:〔蓝花参〕(丽江)。

功效 根:用于肺结核,哮喘,食欲不振,泄泻,崩漏。

## 7243032

*Campanula colorata* Wall. --- *C. pallida* Wall. --- *C. microcarpa* C. Y. Wu

植物名 西南风铃草《中国植志》

药材名 蓝花石参《云南中草药》

文献名 土沙参《中国植志》,着色风铃草《中药大辞典》

地方名 四川:小石参,土桔梗;贵州:岩洋参(兴义),土人参(贵阳);云南:岩蓝花(曲靖),鸡肉参(红河)。

功效 根:祛风,利湿,止血。用于风湿性关节炎,破伤风,肺结核咯血。

## 7243033

*Campanula glomerata* L. ssp. *cephalotes* (Nakai) Hong --- *C. cephalotes* Nakai --- *C. glomerata* var. *salviifolia* Kom.

植物名 聚花风铃草《中国植志》

药材名 阴午草《质问本草》

地方名 山小菜(东北),风铃草(黑龙江、吉林);黑龙江:灯笼花。

功效 全草:清热解毒,止痛。用于咽喉炎,头痛。

## 7243034

*Campanula glomerata* L. f. *canescens* (Maxim.) Kitag. --- *C. glomerata* L. var. *canescens* Maxim. --- *C. cephalotes* Nakai. var. *canescens* (Maxim.) Nakai

植物名 白毛风铃草《东检》、《东北药用植志》

功效 全草:清热解毒,止痛。用于咽喉炎,嘶哑,头痛。

## 7243035

*Campanula punctata* Lam.

植物名 紫斑风铃草《中国植志》

药材名 山小菜《救荒本草》

文献名 萤囊《满蒙野卉》,锦囊花《满鲜植汇》

地方名 灯笼花(东北、河北、陕西),吊钟花(山西、陕西);湖北:灯笼草(神农架);其他:紫风铃草。

功效 全草:清热解毒,止痛。

## 7243036

*Campanumoea javanica* Blume

植物名 大花金钱豹《中国植志》

药材名 土党参《中药志》

文献名 野党参果《中国植志》,挂党参《广西本草选编》,金钱豹《广西药录》

地方名 银藤(华南),臭鸡腿、波罗根、洋酸菜(西南),风铃藤、土人参、人参薯(广东、广西),土洋参(湖南、广西),南人参(广西、云南),蔓桔梗(四川、贵州、云南),奶参(四川、广东、广西);广东:假人参;蔓人参;广西:〔党参〕(天峨、富川、桂平、博白、平南、北流),模登果(阳朔),黄党;贵州:柴党参,野党参,奶浆藤;云南:牛尾参(红河),奶浆根(文山、红河),算盘果、饭包果、饭包谷(红河),白头参,白云参,白洋参,四棱了参,对月参,梭子党参、古灯茶根、古东根(思茅);西藏:“索罗年哇”(藏名)。

功效 根:补中益气,润肺生津。用于气虚乏力,脾虚腹泻,肺虚咳嗽,小儿疳积,乳汁稀少。

## 7243037

*Campanumoea javanica* Bl. ssp. *japonica* (Makino) Hong --- *C. javanica* var. *japonica* Makino --- *C. maximowiczii* Honda

植物名 金钱豹《名实图考》、《中国植志》

药材名 土党参《名实图考》、《药典》

文献名 奶参、土羊乳《草木便方》,小花土党参《汇编》

地方名 土人参(湖南、福建、广东、四川),土洋参(广西、湖南),野党参(湖北、贵州),香浮参(江西、广东、四川);浙江:西乳党参(平阳);江西:土参(丰城);福建:孩儿葛,百丈光(松政);湖南:元藤(黔阳),金钱吊葫芦,惊风圆藤,小人参,奶奶菜,〔隔山消〕,牛皮菜;广东:蔓人参,浮萍参;广西:人参薯,南人参;四川:土沙参,浮瓶子,四季参,川人参;贵州:柴党参,奶浆根。

功效 根:补中益气,润肺生津。用于气虚乏力,脾虚腹泻,肺虚咳嗽,小儿疳积,乳汁稀少。

备考 有的地区如湖南、四川、广西等曾代党参用,也有伪充人参者,应注意鉴别。

## 7243038

*Campanumoea lancifolia* (Roxb.) Merr.

植物名 长叶轮钟草《中国植志》

药材名 蜘蛛果《贵州草药》

文献名 桃叶金钱豹《海南植志》,肉算盘《中国植志》,披针叶金钱豹《中药大辞典》,剑叶金钱豹《广西植录》

地方名 广西:〔沙参〕(藤县),狗儿风(桂平),皮罗盖(富川);四川:锅盖泡(峨眉山),贵州:红果参,山萆薢;云南:〔水杨梅〕(龙陵)。

功效 根:益气,祛瘀,止痛。用于气虚乏力,跌打损伤;茎、叶:用于肺癆咳嗽,吐血,崩漏,白带,瘰癧,疝气。

7243039 见 7243047a

## 7243040

*Codonopsis argentea* Tsoong

植物名 银背叶党参《中国植志》

药材名 银背叶党参《贵州药录》

地方名 贵州:小人参。

功 效 根:补中益气,生津止咳。用于脾虚食少,气血不足,泄泻,脱肛,肺虚咳嗽,中气不足,烦渴不安。

#### 7243041

*Codonopsis bicolor* Nannf.

植物名 二色党参《中国植志》

药材名 黄党(四川松潘、黑水)

功 效 根:补中益气,润肺生津。

#### 7243042

*Codonopsis bulleyana* Forrest ex Diels

植物名 管钟党参《中国植志》

药材名 臭党参(玉龙山药植)

文献名 布菜党参《中药材》

地方名 四川:柴党(成都),小叶党参(盐源);云南:蓝花臭参、胡毛洋参(丽江),土党参,臭参。

功 效 根:补气血,通经络。用于体虚,跌打损伤,风湿麻木。

#### 7243043

*Codonopsis canescens* Nannf.

植物名 灰毛党参《中国植志》

药材名 甘孜党(四川)

文献名 灰白叶党参《汇编》

地方名 四川:蛇头党,北路蛇头党,党参(甘孜),柴党。

功 效 根:补中益气,润肺生津。

#### 7243044

*Codonopsis cardiophylla* Diels ex Komar.

植物名 光叶党参《中国植志》

药材名 大头党《汇编》

文献名 心叶党参《汇编》

地方名 湖北:岩党参(神农架);贵州:小人参。

功 效 根:补虚弱。用于病后体虚,自汗。

#### 7243045

*Codonopsis clematidea* (Schrenk) C. B. Clarke

植物名 新疆党参《中国植志》

药材名 新疆党参《新疆药植志》

文献名 直立党参《汇编》

地方名 党参(西北、新疆)。

功 效 根:补中益气,润肺生津。

#### 7243046

*Codonopsis convolvulacea* Kurz --- *C. convolvulacea* var. *typica* Anthony

植物名 鸡蛋参《中国植志》

药材名 鸡蛋参(云南)、《汇编》

文献名 金线壶芦《名实图考》

地方名 青海:“年哇沃见”(藏名);云南:补血草、山鸡蛋(思茅),牛尾草,独子参,牛尾参(红河),金线吊葫芦、珠子参(昆明),“医尔猫”(姚安彝语);其他:扭子参。

功 效 根:补养气血,润肺生津。用于贫血,自汗,肺阴虚咳嗽,神经衰弱。

#### 7243047

*Codonopsis convolvulacea* Kurz var. *forrestii* (Diels) Ballard --- *C. forrestii* Diels --- *C. forrestii* Diels var.

*hirsuta* Tsoong et L. T. Shen

植物名 珠子参《滇南本草》、《中国植志》

药材名 鸡腰参(云南)

文献名 [鸡肾参]《滇南本草》,甜鸡参《云南药录》

地方名 珠儿参(贵州、云南);贵州:白地瓜;云南:大金线吊葫芦,大臭药,臭参。

功 效 根:补肺虚。用于肺虚咳嗽 外用于刀伤疮。

#### 7243047a

*Codonopsis convolvulacea* Kurz var. *hirsuta* (Hand. -Mazz.) Nannf. --- *C. limprichtii* var. *hirsuta* Hand. -Mazz.

植物名 毛叶鸡蛋参《中国植志》

地方名 云南:兰花参、上党参、獠头参(保山)。

功 效 根:滋补。用于贫血,体虚。

#### 7243048

*Codonopsis convolvulacea* Kurz var. *limprichtii* (Lingel et Borza) Anthony --- *C. limprichtii* Lingel et Borza

植物名 直立鸡蛋参《中国植志》

地方名 云南:浆三七(临沧),奶参(曲靖)。

功 效 根:滋补。用于贫血,体虚。

#### 7243049

*Codonopsis convolvulacea* Kurz var. *pinifolia* (Hand. -Mazz.) Nannf.

植物名 松叶鸡蛋参《中国植志》

药材名 松叶鸡蛋参《云南药录》

文献名 野萝卜花《名实图考》,松叶党参《高植图鉴》

地方名 云南:扭子七。

功 效 根:滋补。用于贫血,体虚。

#### 7243050

*Codonopsis deltoidea* Chipp.

植物名 三角叶党参《中国植志》

地方名 湖北:四叶党参(神农架);四川:党参、土党参、泡参(峨眉山)。

功 效 根:补脾胃,益气血,生津液,止口渴。

#### 7243051

*Codonopsis gombalana* C. Y. Wu

植物名 贡山党参《中国植志》

药材名 贡山臭参《云南种录》

功 效 根:滋补。

#### 7243052

*Codonopsis henryi* Oliv.

植物名 川鄂党参《中国植志》

地方名 四川:党参(汶川);贵州:“阿家廖”(雷公山苗语)。

功 效 根:补中益气,润肺生津。

#### 7243053

*Codonopsis lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Trautv.

植物名 羊乳《别录》、《中国植志》

药材名 四叶参《汇编》

文献名 [地黄]《别录》,白河车(王安卿《采药录》),

山海螺《纲目拾遗》,牛奶子、奶树、奶乳、乳夫人《名实图考》,叶党参《东检》,羊角参《朝鲜植汇》,白河螺《药物试植报告》。

地方名 奶参(河北、山东、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、福建、广东、广西),上党参(福建、湖北、广西),白蚌肉(东北、湖北),奶萝卜(湖北、湖南),猪婆奶(江西、湖南),山胡萝卜(辽宁、安徽),奶浆萝卜(河南、湖南),奶妈头、通乳草(江苏、浙江、安徽),羊乳参(江西、河南),奶薯(江西、广东);黑龙江:白马肉;辽宁:狗头参;北京:狗头胆,狗头蛋;河北:蛤蟆党;内蒙古:蛤蟆党;浙江:蔓参,天海螺(余姚),羊角菜,四叶党参,朝鲜参,台党(天台),老妈头(温州);安徽:乳参,骚乌龟;江西:乳薯(萍乡),乳头薯,〔党参〕(庐山),庐山党参,奶婆娘,乳母,代乳娘,奶婆婆,羊奶参,江西党;福建:罗罗燕、乳藤子(宁化),奶芋(明溪),奶卵(清流),乳碗子,粉葫芦(浦城),上芋(同安);湖北:奶党;湖南:臭萝卜(长沙),盘三七(郴县),油附子(耒阳),萝卜三七(大庸),牛奶参(新宁、永兴),奶尖尖(蓝嘉),地麻(资兴),红帽绒(临武),牛附子(衡山、衡阳);广东:白蹄参、土洋参(惠阳),乳树(南雄、连平),有皮芋(英德),破皮芋(廉江、遂溪),〔五爪金龙〕(湛江),五爪龙(高州),薯蓣头(广州);海南:〔白芍〕(澄迈、儋县);广西:〔南沙参〕、防党(岑溪),苦练森薯(苍梧),奶叶藤;贵州:角参;其他:蛤蟆参,野参。

功效 根:补虚通乳,排脓解毒。用于病后体虚,乳汁不足,乳腺炎,肺脓疡,痈疖疮疡。

## 7243054

*Codonopsis leucalyx* L. T. Shen

植物名 光萼党参《中国植志》

药材名 五花党参(四川南坪)

地方名 四川:党参(若尔盖)。

功效 根:补中益气,健脾益肺。

## 7243055

*Codonopsis macrocalyx* Diels

植物名 大萼党参《中国植志》

文献名 巨萼党参《汇编》

地方名 党参(四川、云南、西藏);四川:线党(汶川)

功效 根:补中益气,健脾益肺。

## 7243056

*Codonopsis meleagris* Diels

植物名 珠鸡斑党参《中国植志》

文献名 珠鸡斑党参《云南药录》

地方名 云南:党参。

功效 根:强壮健胃,祛痰镇咳,清肺。用于体虚,初期糖尿病,消化不良,烦咳。

## 7243057

*Codonopsis micrantha* Chipp.

植物名 小花党参《中国植志》

药材名 土党参《名实图考》、《云南药录》

地方名 四川:党参(普格),细条党参(盐源);云南:臭参,臭党参。

功效 根:补中益气,健脾生津。

## 7243058

*Codonopsis nervosa* (Chipp.) Nannf.

植物名 脉花党参《中国植志》

药材名 文党(甘肃文县)

文献名 大花党参《植分学报》,高山党参《汇编》

地方名 柴党参(甘肃、四川);甘肃:家党(文县);四川:党参(茂汶凤仪),柴党,马党参,顺党参,纹党参,臭党参(丹巴),臭党,文元党。

功效 根:补中益气,健脾益肺。

## 7243059

*Codonopsis nervosa* (Chipp.) Nannf. var. *macrantha* (Nannf.) L. T. Shen - *C. macrantha* Nannf.

植物名 大花党参《中国植志》

药材名 狮头党(四川甘孜)

文献名 大头党参《植分学报》

地方名 党参(四川、云南);四川:泡参(理塘、灌桑),柴党(成都)。

功效 根:强壮健胃,助消化,祛痰镇咳,清肺。用于初期糖尿病,烦咳,神经衰弱。

## 7243060

*Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. - *C. silvestris* Kom.

植物名 党参《中国植志》

药材名 党参《本草从新》、《药典》

文献名 〔上党人参〕《本经逢原》,防党、白党《本草从新》,黄参、上党参、防党参《百草镜》,狮头参《药有良辨误》,防风党参《纲目拾遗》,交党、大山参、文元参《药物试植报告》,红党、南山参《药材学》,大条党《中药通报》,白皮党《中药材》

地方名 潞党(通称),野党(河北、陕西),西党(陕西、甘肃),东党、东党参、狮子头党参、叶子菜(东北),辽党、三叶菜、叶子草(东北、山西),半截缸、中灵草、红皮党、黄党、猴马鸡皮(西北);辽宁:本党参;河北:台党、台参、仙草根、都党;山西:西潞党、潞党参;内蒙古:“希拉—敖日浩岱”(蒙名);青海:“勒都多结”(藏名),草参;河南:辽参,召参;湖北:洋党参(神农架);其他:毛党参,蔓参,蔓人参。

功效 根:补中益气,健脾益肺。用于脾肺虚弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。

备考 “上党人参”文献论述不尽一致,《大观本草》之潞州人参,四棱五叶,确为五加科人参,清·张璐《本经逢原》所述之上党人参则指桔梗科党参而言。编者认为古代的上党人参,应该是真正的人参。

## 7243061

*Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. var. *handeliana* (Nannf.) L. T. Shen - *C. handeliana* Nannf.

植物名 闪毛党参《中国植志》

文献名 圆叶党参《云南种录》

地方名 四川:小叶党参(盐源)。

功效 根:补中益气,健脾益肺。

## 7243062

*Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L. T. Shen -- *C. modesta* Nannf. -- *C. pilosula* Nannf. var. *glaberrima* (Nannf.) Tsoong

植物名 素花党参《中国植志》

药材名 党参《药典》

文献名 无毛党参《植分学报》, 党参《中药志》, 川文党《中药材》

地方名 品党(甘肃、四川); 甘肃: 阶党, 防党, 美人面; 山西: 台党; 四川: 西党, 纹党, 家党参、野党参、刀党(南坪), 南坪党参、文党(成都等地), 南坪党

功效 根: 补中益气, 健脾益肺。用于脾肺虚弱, 气短心悸, 食少便溏, 虚喘咳嗽, 内热消渴。

#### 7243063

*Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. var. *volubilis* (Nannf.) L. T. Shen

植物名 缠绕党参《中国植志》

药材名 茂党(四川茂汶)

地方名 四川: 党参(阿坝、甘孜、丹巴), 甜党、白党(茂汶), 肉党, 臭党。

功效 根: 补中益气, 健脾益肺。

#### 7243064

*Codonopsis purpurea* Wall.

植物名 紫花党参《中国植志》

药材名 岩人参(云南中草药)

功效 全草: 止血镇痛。用于内外伤出血, 伤痛。

#### 7243065

*Codonopsis subglobosa* W. W. Sm.

植物名 球花党参《中国植志》

药材名 蛇头党参《汇编》

文献名 团花党参《云南药录》

地方名 党参(四川、云南); 四川: 甘孜党、蛇头党、柴党(成都), 南路蛇头党; 云南: 臭参(丽江)。

功效 根: 补中益气, 健脾益肺。

#### 7243066

*Codonopsis subscaposa* Komar.

植物名 抽葶党参《中国植志》

药材名 康南党《汇编》

地方名 四川: 党参、野党参(甘孜、阿坝)。

功效 根: 补中益气, 健脾益肺。

#### 7243067

*Codonopsis tangshen* Oliv.

植物名 川党参《中国植志》

药材名 党参《药典》

文献名 川茂党《中药通报》

地方名 排党[扎成把]、川党(陕西、四川); 陕西: 汉中党、兴安党、八仙党、节面党; 湖北: 板党、柴党; 四川: 条参、单支党(南川), 臭党、东沙参、土条参、土沙参(江油、达县), 坝党参, 紫党参, 纹党参, 巫山党、条党、禹党、板桥党、大宁党、副文元党(四川东部), 中坝党(江油、广元、旺苍、南江)。

功效 根: 补中益气, 健脾益肺。用于脾肺虚弱, 气短心悸, 食少便溏, 虚喘咳嗽, 内热消渴。

备 考 根为党参中之佳品。

#### 7243068

*Codonopsis thalictrifolia* Wall. var. *mollis* (Chipp.) L. T. Shen -- *C. mollis* Chipp.

植物名 长花党参《中国植志》

药材名 藏党参《民族药志》

功效 全株: 干黄水, 消肿。用于风湿性关节炎, 麻风病等

#### 7243069

*Codonopsis tsinglingensis* Pax et Hoffm.

植物名 秦岭党参《中国植志》

药材名 岷党《中药通报》

地方名 陕西: 大头党参(眉县), 大头党、直立党参(太白), 大头参。

功效 根: 补中益气, 健脾益肺

#### 7243070

*Codonopsis tubulosa* Komar.

植物名 管花党参《中国植志》

药材名 叙党(四川)

文献名 贵州党《中药通报》, 党参《中药志》, 白党《中药材》

地方名 甜党(广西、四川、云南); 广西: 沙参(临桂); 四川: 叙府党、叙府党参(宜宾), 西昌党参、甜党参(西昌), 西昌甜党, 川党参, 坝党参, 柴党参, 纹党参; 云南: 牛尾党参(永胜), 理党参(大理)。

功效 根: 补中益气, 健脾益肺。用于脾肺虚弱, 气短心悸, 食少便溏, 虚喘咳嗽。

#### 7243071

*Codonopsis ussuriensis* (Rupr. et Maxim.) Hemsl.

植物名 雀斑党参《中国植志》

文献名 乌苏里党参《中国经植志》, 奶树(和汉药标本目录), 山地豆(东检)

地方名 党参(东北); 辽宁: 山土豆。

功效 根: 补气生津, 健脾下乳。用于乳汁不足, 肺病, 体虚神疲, 五更泄泻, 咳嗽, 眩晕。

#### 7243072

*Codonopsis vindiflora* Maxim.

植物名 绿花党参《中国植志》

药材名 柴党参(四川)

文献名 党参《四川中药志》

地方名 四川: 川党参, 坝党参, 纹党参。

功效 根: 补中益气, 健脾益肺。

#### 7243073

*Cyananthus argenteus* Marq.

植物名 总花蓝钟花《中国植志》

药材名 马鬃参(云南丽江)

文献名 银叶蓝钟花《云南种录》

地方名 云南: 马鬃根、补草根、小白棉(丽江)。

功效 根、全草: 健脾除湿, 调气补血, 通经活络。用于小儿乳毒(吃宿奶), 腹泻, 风湿痛, 跌打损伤。

#### 7243074

*Cyananthus chungdianensis* C. Y. Wu

植物名 中甸蓝钟花《中国植志》  
 药材名 蓝钟花《迪庆藏药》  
 功效 全草：缓泻，干黄水，下引诸病。用于黄水病，便秘。

## 7243075

*Cyananthus flavus* Marq.

植物名 黄钟花《云南种录》  
 药材名 丘拉扑《迪庆藏药》  
 功效 全草：消食，解毒。用于消化不良，肉食中毒。

## 7243076

*Cyananthus formosus* Diels

植物名 美丽蓝钟花《中国植志》  
 药材名 蓝钟花《迪庆藏药》  
 功效 全草：缓泻，干黄水，下引诸病。用于黄水病，便秘。

## 7243077

*Cyananthus incanus* Hook. f. et Thoms.

植物名 灰毛蓝钟花《中国植志》  
 药材名 小白棉《云南丽江》、《新华本草纲要》  
 地方名 云南：草补药《丽江》。  
 功效 全草：用于小儿体虚，奶毒，劳伤疼痛。

## 7243078

*Cyananthus inflatus* Hook. f. et Thoms. --- *C. forrestii* Diels

植物名 胀萼蓝钟花《中国植志》  
 地方名 贵州：风药《水城》。  
 功效 全株：清热，祛风，舒肝，解痉。用于小儿惊风，风湿痹痛，结膜炎。

## 7243079

*Cyananthus lichiangensis* W. W. Smith

植物名 丽江黄钟花《高植图鉴》  
 药材名 丘拉扑《迪庆藏药》  
 文献名 丽江蓝钟花《中国植志》  
 功效 全草：消食，解毒。用于消化不良，肉食中毒。

## 7243080

*Echinocodon lobophyllus* Hong

植物名 刺萼参《植分学报》  
 地方名 湖北：野西瓜。  
 功效 全草：用于肺结核。

## 7243081

*Homocodon brevipes* (Hemsl.) Hong --- *Heterocodon brevipes* (Hemsl.) Hand. -Mazz. et Nannf.

植物名 同钟花《中国植志》  
 药材名 扭子菜《贵州草药》  
 文献名 异钟花《拉汉英种称》，白异钟花《高植图鉴》

地方名 云南：小三拐草《腾冲》。  
 功效 全草：清热，止咳。用于高烧，咳嗽。外用于鹅口疮。

## 7243082

*Lobelia chinensis* Lour. *L. radicans* Thunb.

植物名 半边莲《中国植志》  
 药材名 半边莲《滇南本草》、《药典》  
 文献名 急解索《纲目》，蛇利草《岭南采药录》，刺瓜娘《民间药与验方》

地方名 半边菊《福建、广西》，半边花《浙江、安徽、广东》，片花莲《江西、湖北》，小急解索《江苏、江西、湖南、广东、广西》，蛇舌草《江西、福建、广东》，细米草《浙江、安徽、河南、广东、四川》，蛇啄草《江苏、上海》；上海：粪蛆草；浙江：奶儿草，半朵花《金华》，狗牙齿、细叶节节排《天台》，乳儿草，伏田花，半边荷花，偷鸡打，白带草《绍兴》，金丝草、鸡口舌、节节爆《温州》，满地行、奶充草《泰顺》，汤生草《平阳》；安徽：小娘娘根，小娘子草，蚂蚱筋，田边小叶青、娘娘菜《宿县》；江西：鱼尾花，偏莲，瓜仁草《丰城》，净毒草，白水草，耙齿草，鱼尾草，蛇眠草、片叶莲《泰和》；福建：金鸡舌、鸡舌草《莆田、仙游》，半月花《古田》，蛇疔草《福清》，蛇舌仔，观音手，过梗龙《南平》，粉干草、乳子草、叶下红《三明》，瓜子仁、乳汁草《大田》，铁线草《宁化》，蜈蚣草，奶浆草；台湾：水仙花草，拈力拈草，拈力仔草《新竹》；河南：长虫草；湖北：节节生；湖南：小莲花草，绵蜂草，吹血草，[腹水草]，舟积草，白腊滑草，金菊草，小叶狗牙草《常德》，小半边莲，肺经草《长沙》，瓜子金《靖县、耒阳》；广东：蛇蒴草，顺风旗，单片芽，细叶半边莲《广州》，半畔莲《潮汕》，半畔花《潮安、澄海、南沃》，一畔花《潮安、澄海》，一片莲、单片莲《普宁》，半瓣莲，顺风莲《兴宁》，生蛇蛋，乌蝇叶，单片花；广西：[半边旗]，紫花莲《南宁》，[田基王]《富川》；四川：箭豆草，橡皮草。

功效 全草：清热解毒，利尿消肿。用于大腹水肿，面足浮肿，痈肿疔疮，蛇虫咬伤，晚期血吸虫病腹水。

## 7243083

*Lobelia clavata* E. Wimm.

植物名 密毛山梗菜《中国植志》  
 药材名 大将军《云南》  
 文献名 棒柱野烟《云南药录》，蒙自苣《汇编》  
 地方名 云南：白毛大将军《临沧》，“彪蚌法”《傣名》，红雪柳。

功效 根、叶：有毒。消炎，止痛，解毒，祛风，杀虫。用于风湿性关节炎，腮腺炎，痧症，跌打损伤。外用于蛇咬伤，痈肿。

## 7243084

*Lobelia colorata* Wall.

植物名 狭叶山梗菜《中国植志》  
 药材名 红根一枝花《云南植志》  
 功效 全草：用于骨折。

## 7243085

*Lobelia colorata* Wall. var. *haculus* E. Wimm.

植物名 思茅狭叶山梗菜《中国植志》  
 药材名 水将军《云南新平》，《汇编》  
 地方名 云南：水葛笋《峨山》，胃软草《玉溪》，地葛笋、小桃树《师宗》，小桃叶，独脚一枝花、红杆一枝花

(安宁), 红根一枝花(双柏)。

功效 全草: 有毒。消炎, 镇痛。用于感冒头痛, 胃痛。

#### 7243086

*Lobelia colorata* Wall. var. *dsolinhoensis* E. Wimm.

植物名 长萼狭叶山梗菜(中国植志)

文献名 西南水蒿笋(贵州药录)

地方名 贵州: 竹叶人参(瓮安)。

功效 全草: 清热解毒, 祛瘀消肿。用于肝硬化腹水, 痰涌喘咳, 跌打损伤。

#### 7243087

*Lobelia davidii* Franch. --- *L. davidii* Franch. var. *dolichothyrsa* (Diels) E. Wimm.

植物名 江南山梗菜(中国植志)

药材名 大种半边莲(汇编)

文献名 江南大将军、短萼江南大将军(云南植志), [苦菜](高植图鉴)

地方名 山梗菜(浙江、江西); 江西: 节节花, 水苋菜, 水白菜; 福建: 大号半边莲(厦门), 山苋菜, 野苋菜; 云南: 白苋菜; 四川: 野苋、穿耳草、偏杆草(南川)。

功效 根、叶、带花全草: 有小毒。宣肺化痰, 清热解毒, 利尿消肿。

#### 7243088

*Lobelia erectiuscula* Hara -- *L. erecta* Hook. f. et Thoms.

植物名 直立山梗菜(中国植志)

药材名 麻菠萝(云南)

文献名 马菠萝(云南植志), 滇黔山梗菜(高植图鉴)

地方名 云南: 红麻菠萝、红野蒿笋(红河、文山), 竹叶草(屏边), 大将军、野蒿笋(马龙、嵩明), 野烟。

功效 根: 有大毒。用于跌打损伤, 腮腺炎, 乳腺炎; 叶: 有大毒。用于急慢性扁桃体炎, 皮肤瘙痒。

#### 7243089

*Lobelia melliana* E. Wimm.

植物名 线萼山梗菜(中国植志)

文献名 狭萼半边莲(湖南药物志), 山梗菜(汇编), 韶关大将军(中国植志), 东南山梗菜(高植图鉴)

地方名 半边莲(东北), 大种半边莲(湖南、江西、福建); 福建: 山苋菜(福州)。

功效 根、叶、带花全草: 有小毒。宣肺化痰, 清热解毒, 利尿消肿。用于支气管炎, 肝硬化腹水, 水肿。外用于毒蛇咬伤, 蜂螫, 痈肿疔疮。

#### 7243090

*Lobelia pleotricha* Diels

植物名 毛萼山梗菜(中国植志)

药材名 强威生草(四川、贵州)

文献名 毛萼大将军(云南植志)

地方名 四川: 大种半边莲。

功效 根: 补虚弱。用于久病体虚。

#### 7243091

*Lobelia pleotricha* Diels var. *handelii* (E. Wimm.) C. Y.

Wu --- *L. handelii* E. Wimm. --- *L. davidii* Franch. var. *handelii* (E. Wimm.) E. Wimm.

植物名 毛瓣山梗菜(中国植志)

药材名 紫花大将军(云南临沧)、《新华本草纲要》

地方名 云南: 山鸡腿(临沧)。

功效 根: 有毒。用于腮腺炎, 跌打损伤, 风湿痛, 痧症。

#### 7243092

*Lobelia pyramidalis* Wall --- *Lobelia wallichiana* Hook. f. et Thoms.

植物名 塔花山梗菜(中国植志)

药材名 铁栏杆(汇编)

文献名 山梗菜(科种), 抛筒根、野菸(植物名汇)

地方名 四川: 川山梗菜; 贵州: 野叶子烟(惠水); 云南: 尖塔山梗菜, 大将军, 贪报草, 麻菠萝。

功效 全草: 解毒, 杀虫。用于急性阑尾炎。外用于对口疮, 杀臭虫、虱子。

#### 7243093

*Lobelia sequinii* Levl. et Vant.

植物名 西南山梗菜(中国植志)

药材名 野烟(滇南本草)、《中药大辞典》

文献名 [烟草]、小烟草、气死名医草(滇南本草), 大叶半边莲、大叶山梗菜(广西植录), 破天菜(汇编)

地方名 野叶子烟(湖北、贵州、云南); 湖北: 野烟花, 野烟杆; 广西: 破天药; 四川: 毒人参; 贵州: 铁栏杆; 云南: 红雪柳(保山), 红野蒿笋、大将军、红麻菠萝(思茅), “彪蚌法”(傣名), 野烟叶、麻菠萝、野蒿笋(红河), 白雪柳, 红大将军, 蒙自苣。

功效 根或全草: 有剧毒。消炎, 止痛, 解毒, 杀虫。外用于热毒疔疮, 痈疽搭背, 无名肿毒, 风湿性关节炎, 跌打损伤。

#### 7243094

*Lobelia sequinii* Levl. et Vant. f. *longisepala* E. Wimm.

植物名 长萼山梗菜(高植图鉴)

药材名 虎烟(四川盐边)

文献名 大叶半边莲(广西药录), 长萼半边莲(广西植录), 破天菜(广西本草选编), 长萼野烟(中药大辞典)

地方名 野烟(广西、云南); 广西: 山梗菜; 云南: 野蒿笋, 麻菠萝。

功效 全草、根或叶: 有大毒。消肿止痛, 杀虫, 解蛇毒。

#### 7243095

*Lobelia sequinii* Levl. et Vant. f. *brevisepala* E. Wimm.

植物名 短萼山梗菜(贵州药录)

地方名 贵州: 强威生草。

功效 全草: 泻肺利水, 活血解毒。用于肝硬化腹水, 肾炎水肿, 心脏性水肿, 毒蛇咬伤。

#### 7243096

*Lobelia sessilifolia* Lamb.

植物名 山梗菜(中国植志)

药材名 山梗菜(救荒本草)、(汇编)

文献名 山结菜《哈农学报》, 大种半边莲《中国植物图鉴》

地方名 半边莲(东北); 吉林: “苏沽代”(朝名); 浙江: 天竹七(临安); 江西: 水白菜; 福建: 山苋菜; 湖南: 水苋菜, [苦菜], 节节花; 云南: 对节白, 水杨柳。

功效 根、叶或带花全草; 有小毒。宣肺化痰, 清热解毒, 利尿消肿。用于支气管炎, 肝硬化腹水, 水肿。外用于毒蛇咬伤, 蜂螫, 痈肿疔疮。

备考 《新华本草纲要》(1988)称: “《救荒本草》云: 生郑州贾峪山野中, 苗高二尺许, 茎淡紫色, 又似柳叶菜叶, 亦小, 稍间开紫花, 其叶味甜。所述是否本种, 颇有可疑, 因为本品不可能当野菜吃, 河南平原亦不产, 疑系 *Adenophora* 之狭叶者, 梗菜即桔梗, 非山梗菜。但自日本学者误译以后, 沿用已久, 今暂仍沿用。”

#### 7243097

*Lobelia taliensis* Diels -- *L. hybrida* C. Y. Wu

植物名 大理山梗菜《中国植志》

药材名 红雪柳(云南保山), 《汇编》

文献名 大理大将军、杂种大将军《云南种录》

地方名 云南: 紫燕草(腾冲), 大将军, 红色大雪柳、大雪柳、雪柳(保山)。

功效 根: 有小毒。消炎止痛, 杀菌, 解毒。用于疟疾, 疮痈。

#### 7243098

*Lobelia zeylanica* L. --- *L. succulenta* Blume

植物名 卵叶半边莲《中国植志》

药材名 肉半边莲《云南植志》

文献名 棱茎半边莲《广西植志》, 疏毛半边莲《海南植志》

地方名 半边莲、半边旗、半边菊(华南)。

功效 全草: 用于毒蛇咬伤, 狂犬病, 晚期血吸虫病。

#### 7243099

*Peracarpa carcosa* (Wall.) Hook. f. et Thoms.

植物名 袋果草《中国植志》

药材名 袋果草《广西药录》

地方名 云南: 肉荚草。

功效 全草: 用于小儿惊风。

#### 7243100

*Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC. --- *P. glaucus* Nakai --- *P. chinensis* Lindl. et Paxton

植物名 桔梗《中国植志》

药材名 桔梗《本经》、《药典》

文献名 符蘼、[白药]、利如、梗草、卢如、房图《吴普本草》, 莽苳《别录》, 苦梗《丹溪心法》, 苦桔梗《纲目》, 白桔梗、大桔梗《和汉药标本目录》, 大碗花《满洲植志》, 苦黄、都乙罗叱、道乙阿叱、木便、方图、吉祥杵《新纲》, 地参、雀将花《食用植物图说》, 大花桔梗(楼《生药》), 紫花桔梗《中药材》

地方名 和尚帽、喇叭花、和尚头、和尚头花根、包袱花根、四叶菜(东北), 大药(江苏、安徽), 土桔梗(甘肃、四川); 黑龙江: 桔梗菜; 吉林: “道拉基”、“多拉机”、“刀

拉吉”(延边朝名), 明叶菜根子(延边); 北京: 打碗花; 河北: 苦菜根, 和尚帽子花(承德), 狗耳花、掘菜根(张家口); 山西: 芥薹; 内蒙古: “苏格拉”(蒙名); 山东: 过腰菜根, 母铃铛(莒南), 铃当花(临沂、费县、五莲), 姐姐包袱花(莱阳), 紫姐包袱(昆崙山, 牙山), 包袱根(海阳), 芥菠菜(荣成), 光光尖、光棍头、公雀、支锅蒿(烟台), 沙油菜, 山铃铛花; 上海: 六角花; 安徽: 玉桔梗, 大药了(滁县); 福建: [土人参]; 湖南: 洋参, 紫花丁, 蓝花根(淑浦); 广西: 假洋参, 蓝花兜(桂林); 贵州: 绿花根; 云南: 鸡肉参, 臭参。

功效 根: 宣肺, 利咽, 祛痰, 排脓。用于咳嗽痰多, 胸膈不畅, 咽痛, 音哑, 肺癰吐脓, 疮疡脓成不溃。

#### 7243101

*Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC. var. *album* Hort.

植物名 白花桔梗《中药材》

药材名 桔梗《中药材》

功效 根: 祛痰, 利咽, 排脓。

#### 7243102

*Pratia nummularia* (Lam.) A. Br. et Aschers. --- *Pratia begoniifolia* Lindl.

植物名 铜锤玉带草《中国植志》

药材名 铜锤玉带草《名实图考》、《汇编》

文献名 地茄子草、地茄子《分类草药性》, 凉粉草《中国桔梗科植物》

地方名 小铜锤、地钮子(浙江、四川、贵州、云南), 扣子草、扭子草(广西、云南); 浙江: 水珍珠(温州、瑞安、泰顺); 湖南: 地莲子, 地杨梅; 广东: 红船; 广西: 马莲草, 珍珠草、宁痢草(平南), [金钱草](贺县), 姐妹菜(北流), 石蟾蜍(玉林), 落地冬瓜(藤县), 秤砣草, “骂补神”(三江侗语), 鸟金钟(融水苗语), “冬宁骂”(金秀瑶语); 四川: 地浮萍(南川、成都), 鸡肠菜(叙永), 茄子锤(屏山), 山勒子, 土连翘, 打锣锤, 抱鸡婆草, 小金钱草(峨眉); 贵州: 罍子草, 地扣子; 云南: 地石榴, 米汤果, 铜锤草, 红头带, [金铁锁], 龙眼草, 三分七厘散, 九分七厘散, 紫背铜锤, 紫花玉带, 紫袍玉带(昆明), 马蹄草, 钮子果。

功效 全草: 祛风利湿, 活血散瘀。用于风湿疼痛, 风湿性肌炎, 腋下淋巴腺炎, 子宫脱垂, 月经不调, 白带, 遗精。外用于跌打损伤, 创伤出血。

#### 7243103

*Sphenoclea zeylanica* Gaertn.

植物名 尖瓣花《中国植志》

药材名 木空菜(广西玉林)

文献名 楔瓣花《广西药录》

地方名 广西: 牛奶藤; 云南: 空心菜, 牛奶菜。

功效 全株: 外用于热疮。

#### 7243104

*Wahlenbergia marginata* (Thunb.) A. DC.

植物名 蓝花参《中国植志》

药材名 蓝花参《汇编》

文献名 兰花参《滇南本草》, 蓝花草《滇南本草图



诺》，金线钩葫芦、细叶沙参《质问本草》

地方名 娃儿草(广西、云南)；浙江：高脚白根(临安)，细沙参(仙居)；福建：金线草(福安、霞浦、宁德、罗源)，开蓬草，胡芦草(福鼎、福安)，寒草(松溪、周宁、闽侯、福州)，水佛手(泉州)，金线吊虾蟆、马尾猿、马尾红(厦门)；湖南：金撞棒(凤凰)，毛鸡腿(龙山)，小蓝花草(衡山)；广东：娃儿菜；广西：了哥利、清明草(桂平)；四川：罐罐草，蛇须草，沙参，沙参草，破石珠，鼓捶草，玩儿草，鼓锤草，小罐罐草，水经草；贵州：霸王草(遵义)，一窝鸡，小绿细辛；云南：拐棍参(昆明)，乳浆草(曲靖)，小肥药，疳积药；其他：雀舌草，牛奶草，催桔梗。

功效 根或带根全草：益气补虚，祛痰，截疟。用于病后体虚，小儿疳积，支气管炎，肺虚咳嗽，疟疾，高血压病，白带。

## 7245 草海桐科 Goodeniaceae

### 7245001

*Calogyne pilosa* R. Br.

植物名 离根香《中国精志》

药材名 离根香(福建)、《汇编》

地方名 福建：肉桂草。

功效 全草：活血散瘀，止痛解毒。用于跌打损伤，蛇咬伤。

### 7245002

*Scaevola sericea* Vahl

植物名 草海桐(拉汉英种称)

药材名 草海桐(广西药录)

地方名 广西：大网梢(钦州)。

功效 叶：外用于扭伤，风湿骨痛。

## 7246 花柱草科 Stylidiaceae

### 7246001

*Stylidium uliginosum* Swartz ex Willd.

植物名 花柱草(拉汉英种称)

药材名 花柱草(广西药录)

地方名 广西：红口锁(北流)。

功效 全草：用于咽喉肿痛。

## 7247 花苾科 Polemoniaceae

### 7247001

*Polemonium coeruleum* L. --- *P. laxiflorum* auct. non Kitam.

植物名 花苾《中国植志》

药材名 花苾《汇编》

文献名 丝花花苾(拉汉英种称)

地方名 辽宁：鱼翅菜；山西：[手参]，穴菜，电灯花；内蒙古：“灯音—花儿”(蒙名)。

功效 根及根茎：止血，祛痰，镇静。用于咳血，吐血，衄血，便血，胃、十二指肠溃疡出血，功能性子宫出血，急、慢性气管炎，癫痫，失眠。

备考 有的文献将学名误订为 *P. laxiflorum* Kitam.

### 7247002

*Polemonium luniflorum* V. Vassil.

植物名 小花苾《中国植志》

药材名 花苾《吉林中草药》

文献名 丝花花苾《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古：电灯花，“灯音—花儿”(蒙名)。

功效 根及根状茎：止血，祛痰，镇静。用于急、慢性支气管炎，胃溃疡出血，咳血，衄血，子宫出血，癰疽，失眠，月经过多。

## 7249 紫草科 Boraginaceae

### 7249001

*Antiotrema dunnianum* (Diels) Hand.-Mazz. ---

*Cynoglossum dunnianum* Diels --- *C. cavaleriei* Levi.

植物名 长蕊斑种草《中国植志》

药材名 黑阳参(滇南本草)、《中药大辞典》

文献名 黑元参(滇南本草)，铁打苗、狗舌草《名实图考》，[滇紫草]《云南植志》

地方名 白紫草(四川、云南)；广西：跌打药(隆林)；云南：牛舌头，土玄参，火连包、牛舌头菜(文山)，[紫草](丽江)，[漏芦根](保山)。

功效 根：养阴补虚，除热解毒。用于虚劳发热，头昏，热淋，痈肿，口疮，牙疳。

### 7249002

*Arnebia euchroma* (Royle) Johnston - *Macrotonia*

*euchroma* (Royle) Paulsen --- *Lithospermum*

*tschimganicum* auct. non B. Fedtsch.

植物名 软紫草《中国植志》

药材名 紫草《药典》

文献名 新疆紫草《药典》，[天山紫草]《新疆中草药手册》，软苗紫草《鉴别手册》，新藏假紫草《高植图鉴》，西藏紫草《汇编》

地方名 新疆：西紫草，紫草皮。

功效 根：凉血，活血，解毒透疹。用于血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透，疮疡，湿疹，水火烫伤。

备考 有些文献曾将本种误订为 *Lithospermum tschimganicum* B. Fedtsch. (天山紫草)，《中国植志》定名为 *Arnebia tschimganica* (Fedtsch.) G. L. Chu，后者根不含紫色物质，不宜入药。

### 7249003

*Arnebia guttata* Bunge --- *A. thomsonii* Clarke

植物名 黄花软紫草《中国植志》

药材名 紫草《药典》

文献名 滴紫筒草《内蒙古中草药》，内蒙古紫草《鉴别手册》，假紫草《高植图鉴》，蒙紫草《民族药志》，黄花紫草《汇编》

地方名 内蒙古：硬紫草，“毕日莫各”、“沙尔—布勒米格”、“沙尔特米格”、“明登—塞留”(蒙名)。

功效 根：凉血，活血，解毒透疹。用于血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透，疮疡，湿疹，水火烫伤。

### 7249004

*Asperugo procumbens* L.

植物名 糙草《中国植志》

文献名 平卧糙草《新疆中草药》

功效 全草;解表清热,止咳。用于感冒发烧,咳嗽胸痛。

#### 7249005

*Bothriospermum chinense* (Turcz.) Bunge

植物名 斑种草《中国植志》

药材名 蛤蟆草《汇编》

地方名 河北:细送子草;广西:野生烟。

功效 全草;解毒消肿,利湿止痒。用于痔疮,肛门肿痛,湿疹。

#### 7249006

*Bothriospermum secundum* Maxim.

植物名 多苞斑种草《中国植志》

药材名 野山蚂蚱《湖南药物志》

文献名 东北鹤虱、蛤蟆草、《鹤虱》《药学学报》,毛细累子草《东检》

地方名 湖南:山蚂蚱,毛萝菜。

功效 全草;祛风解毒,杀虫。

#### 7249007

*Bothriospermum tenellum* (Hornem.) Fisch. et Mey.

植物名 柔弱斑种草《中国植志》

药材名 鬼点灯《中药大辞典》

文献名 细茎斑种草《江苏南部种册》,斑种草《广西植录》,细累子草《东检》,细叠子草《高植图鉴》

地方名 湖北:狗脚迹(神农架);四川:小马耳朵(成都);贵州:雀灵草(正安)。

功效 全草;有小毒。止咳,用于吐血;根:外用于疔疮;叶:外用于蛇咬伤。

#### 7249008

*Carmona microphylla* (Lam.) G. Don --- *C. retusa* Masam.

植物名 基及树《中国植志》

药材名 基及树《广西药录》

地方名 海南:猫仔树;广西:福建茶。

功效 叶;消肿,解毒。外用于跌打肿痛;全株:用于使血,咯血。

#### 7249009

*Cordia dichotoma* Forst. f. --- *Vernonia sinensis* Lour. --- *Cordia indica* Lam.

植物名 破布木《中国植志》

药材名 破布木《汇编》

文献名 破果子、破布子、破布鸟、破子《植物名汇》,纸鹁高树《汇编》,狗屎木《中药大辞典》

地方名 风筝树(华南);台湾:树子仔,破故子;海南:胶树,风筝子;广西:青桐翠木(梧州),青桐木。

功效 根:行气止痛,化痰止咳。用于心胃气痛,湿热腹泻,急、慢性支气管炎。

#### 7249010

*Cynoglossum amabile* Stapf et Drumm.

植物名 倒提壶《中国植志》

药材名 倒提壶《滇南本草》、《汇编》

文献名 狗屎花、一把抓、蓝狗屎花根、蓝狗屎花叶《滇南本草》,蓝布裙《纲目拾遗》,附地菜、牛舌头花《名实图考》,狗舌花《滇南本草图谱》,《接骨草》《中草药学》,接骨草根《中药大辞典》,土玄参、苗养清《玉龙山药植》

地方名 鸡爪参(贵州、云南);四川:〔龙须草〕,七星箭,毛猫菜,毛毛菜,毛猪粪,老鼠粘,“勒马你阿马”(藏名);贵州:小绿连草;云南:大肥根、蓬子叶、绿花心(昭通),猫眼倒提壶(丽江),蓝花狗屎花、绿花叶、〔蓝花参〕(红河),狗屎萝卜,狗屎荷花,贴骨散,拦路虎

功效 全草、根:清热利湿,散瘀止血,止咳。用于疟疾,肝炎,痢疾,尿痛,白带,肺结核咳嗽。外用于创伤出血,骨折,关节脱臼。

#### 7249011

*Cynoglossum divaricatum* Steph. ex Lehrn.

植物名 大果琉璃草《中国植志》

药材名 大果琉璃草《汇编》

文献名 大鞭毛子《东检》,琉璃草《内蒙古中草药》,展枝倒提壶《沙漠药植》,大琉璃草《陕甘宁青中草药选》

地方名 内蒙古:“淖楚嘎纳”(蒙名),大粘染子,倒提壶;陕西:乌麻黄,铁锁链(凤县);贵州:猪尾巴。

功效 根:清热解毒。用于扁桃腺炎,疮疖脓肿;果:收敛止泻。用于小儿腹泻。

#### 7249012

*Cynoglossum lanceolatum* Forsk.

植物名 小花琉璃草《中国植志》

文献名 狭叶倒提壶《广西植录》,披针形倒提壶《云南药录》,小花倒提壶《云南种录》,披针叶琉璃草、破布草、破布粘、大号疟草、一条龙、母一条根、半边龙《中药大辞典》

地方名 福建:牙痂草;湖北:热恋子(神农架);广西:鸭蓼草(百色),亮火草、出前杨花(乐业),猪尾巴(隆林),生扯拢(田林),青菜参(凌云);贵州:粘娘娘(威宁);云南:〔鹤虱〕(文山),“阿奴得娘”(楚雄彝名),土玄参,白花瞎眼草,粘粘草,狗屎花。

功效 全草、根:清热解毒,利尿消肿,活血。用于急性肾炎,月经不调。外用于疮痍肿毒,毒蛇咬伤。

备考 《云南植志》第4卷收录的“小花倒提壶”为 *Cynoglossum lanceolatum* Forsk. ssp. *eulanceolatum* Brand.

#### 7249013

*Cynoglossum officinale* L.

植物名 红花琉璃草《中国植志》

药材名 药用倒提壶《新疆中草药手册》

文献名 新疆倒提壶《汇编》

功效 根:养阴润肺,清热止咳。用于肺癆咳嗽,失音,鼻出血,吐血。

#### 7249014

*Cynoglossum zeylanicum* (Vahl) Thunb. ex Lehm --- *C. furcatum* Wall. ex Roxb.

植物名 琉璃草《中国植志》

药材名 琉璃草《汇编》

文献名 大琉璃草《中药大辞典》,大琉璃叶《汇编》,锡兰倒提壶《广西药植图志》,叉花倒提壶《云南植志》,鸭燕草《广西本草选编》,拦路虎《陕西中草药》

地方名 猪尾巴(贵州、云南);陕西:铁板道,饿蚂蝗、一马光(镇巴),火草、白牛舌头(洵阳),铁链子,捆仙绳、白母猪油子(柞水),牛舌头草(商县),铁鞭散、贴骨散(平利),铁锁链(凤县);湖北:四季青(神农架);广西:青菜参(凌云),生扯龙;贵州:小生地;云南:蓝长鹤虱(玉龙山),狗屎花,粘娘娘。

功效 根、叶:清热利湿,活血调经。用于肝炎,月经不调,白带,水肿。外用于疮疖痈肿,毒蛇咬伤,跌打损伤,骨折。

#### 7249015

*Ehretia corylifolia* C. H. Wright --- *E. macrophylla* auct. non Wall.

植物名 西南粗糠树《中国植志》

文献名 滇厚朴《名实图考》

地方名 云南:豆浆果,黄杆枫。

功效 树皮:燥湿消痰,下气除满。

备考 本品过去文献常将其误订为 *Ehretia macrophylla* Wall.

#### 7249016

*Ehretia longiflora* Champ. ex Benth.

植物名 长花厚壳树《中国植志》

药材名 长花厚壳树《广西药录》

地方名 广西:鸡肉树(金秀)。

功效 根:用于产后腹痛。

#### 7249017

*Ehretia macrophylla* Wall. ex Roxb. --- *E. dicksoni* Hance --- *Ehretia macrophylla* var. *tomentosa* Cagnep. et Cour.

植物名 粗糠树《中国植志》

药材名 土植肉《南充中草药》

文献名 毛叶厚壳树《海南植志》,云南厚壳树《广西植志》,大叶厚壳树《拉汉英种称》,破布子《中国植志》

地方名 野枇杷(陕西、四川);陕西:山枇杷(西乡、紫阳),糠树;四川:姜桐子(南充)。

功效 树皮:散瘀消肿。外用于跌打肿痛;果实:健胃和中,消食除满。用于食积腹泻,食积胃脘胀满,疝气疼痛。

#### 7249018

*Ehretia thyrsoflora* (Sieb. et Zucc.) Nakai --- *Ehretia taiwaniana* Nakai --- *E. acuminata* R. Br. var. *obovata* (Lindl.) Johnston. --- *E. serrata* f. *obovata* Lindl.

植物名 厚壳树《中国植志》

药材名 厚壳树《汇编》

文献名 松阳《本草拾遗》,厚壳《江苏植志》,梭罗树《山东树木志》,倒卵叶厚壳树《云南种录》,台湾厚壳树《汇编》

地方名 江苏:柿叶树(南京);河南:白莲茶;广东:大江茶、大岭山茶、大岗茶(惠阳);广西:岭南白莲

茶,走马风(钦州),格格(横县),大红茶、松杨、(苦丁茶)(南宁)。

功效 叶、心材、树枝:清热解暑,去腐生肌。用于感冒,偏头痛;心材:破瘀生新,止痛生肌。用于跌打损伤,肿痛,骨折,痈疮红肿;树枝:收敛止泻。用于肠炎腹泻。

#### 7249019

*Ehretia tsangii* Johnston.

植物名 疏毛厚壳树《云南植志》

文献名 怀德厚壳《广西药录》,上思厚壳树《广西植志》

地方名 广西:大天壬、龙新木(武鸣)。

功效 叶:用于蛇咬伤,食物中毒。

#### 7249020

*Eritrichium rupestre* (Pall.) Bunge --- *E. pectinatum* (Pall.) DC. var. *rupestre* (Pall.) Brand

植物名 石生齿缘草《中国植志》

药材名 齿缘草《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古:蓝梅,“额布森·德瓦”(蒙名)。

功效 花、叶:清热解毒。用于感冒,温热病,脉管炎,血热诸病。

#### 7249021

*Heliotropium indicum* L.

植物名 大尾摇《中国植志》

药材名 大尾摇《福建民间草药》

文献名 天芥菜《广西植志》,耳钩草《台湾中药材图鉴》

地方名 [狗尾草](台湾、广西),狗尾虫(福建、台湾、海南、广西);福建:鱿鱼草,斑草,象鼻癩(闽南),象鼻草(漳州、诏安、莆田、龙海、厦门、平潭),墨鱼须草(泉州、晋江、平潭),臭右苏、四角苏(龙岩),荔枝草、荔枝壳草、皱面叶、紫斑草、鼠尾癩(漳平),玉如意,全虫草,皱面黄,鼻皮菜;台湾:金耳坠,蟾蜍草,肺炎草,母交藤;广东:臭柠檬;广西:猫尾草,耳屎钩(北海),大狗尾,象鼻花,勾头蛇(南宁)。

功效 全草或根:清热解毒,排脓消肿。用于肺炎,肺脓肿,脓胸,腹泻,痢疾,睾丸炎,白喉,口腔糜烂,痈疖。

#### 7249022

*Heliotropium strigosum* Willd.

植物名 细叶天芥菜《中国植志》

文献名 金锁匙《台湾中药材图鉴》

功效 全草:血液清净剂。

#### 7249023

*Lappula echinata* (Hornem.) Gilib. --- *L. echinata* Gilib. var. *heteracantha* (Ledeb.) O. Kuntze --- *Lappula heteracantha* (Ledeb.) Gurke --- *Lappula myosotis* V. Wolf --- *Echinospermum lappula* Lehm.

植物名 赖毛子《东北植志》

文献名 伪鹤虱《药学报》,东北鹤虱《东北药植志》,驴然草、然然刺《沙漠药植》,粘珠子《汇编》,蓝花蒿《东北草本植志》

地方名 [鹤虱] (东北、内蒙古、宁夏、青海、新疆); 黑龙江: 软鸡毛子; 吉林: “耳吉其” (朝名); 辽宁: 养汉精; 内蒙古: “囊给-章古”、“速大布格” (蒙名), 小粘染子, 小赖毛子。

功效 果实: 有小毒。消积驱虫, 止痒。用于虫积腹痛, 蛔虫病, 蛲虫病。

## 7249024

*Lappula rodowskii* Greene - *L. intermedia* (Ledeb.) M. Pop.

植物名 单列刺赖毛子《汇编》

文献名 蒙古鹤虱《沙漠药植》, 中间鹤虱《高植图鉴》, 东北鹤虱《东北草本植志》, 卵盘鹤虱《中国植志》

地方名 [鹤虱] (黑龙江、宁夏)。

功效 果实: 有小毒, 驱虫, 止痒。

## 7249025

*Lithospermum arvensis* L. --- *Buglossoides arvensis* (L.) Johnston.

植物名 田紫草《中国植志》

文献名 麦家公《高植图鉴》, 毛女子菜、羊蹄牙《沙漠植志》, 大紫草《中药大辞典》

地方名 陕西: 涩涩芽 (渭南), 花莽莽 (武功); 甘肃: 白紫草 (宕昌); 江苏: 面条菜 (苏北); 其他: 蚂蚁草。

功效 果实: 温中健胃, 消肿止痛。用于胃胀反酸, 胃寒疼痛, 吐血, 跌打损伤, 骨折。

## 7249026

*Lithospermum erythrorhizon* Sieb. et Zucc.

植物名 紫草《中国植志》

药材名 紫草《本经》、《药典》

文献名 藐、苾草《尔雅》, 紫丹、紫芙《本经》, 地血《吴普本草》, 苾蒻《广雅》, 紫草茸《小儿药证直诀》, 鸭嘴草《纲目》, 紫果、紫苑、橘芽《新纲》, 牛舌草花《叶《生药》》, 紫草根《现代实用中药》。

地方名 紫根 (东北、广西、云南), 紫草根子 (吉林、辽宁、山西), 山紫草 (内蒙古、河北、江苏), 硬紫草 (东北、河北、内蒙古), 硬苗紫草 (华东); 吉林: 紫草子; 辽宁: 红石根, 红吃草, 红赤虫; 江苏: 大紫草; 内蒙古: “毕日毛格”、“别力毛格” (蒙名), 红根根; 甘肃: 野指甲草 (武都); 湖南: 野紫草, 野麻灯; 广西: 红条紫草, [红紫胡], 红紫草; 其他: 东紫草。

功效 根: 凉血, 活血, 解毒透疹。用于血热毒盛, 斑疹紫黑, 麻疹不透, 疮疡, 湿疹, 水火烫伤。

## 7249027

*Lithospermum officinale* L.

植物名 小花紫草《中国植志》

文献名 药用紫草《中草药》, 白果紫草《高植图鉴》

地方名 新疆: 硬根紫草, [珍珠透骨草]。

功效 全草: 外用于关节炎。

## 7249028

*Lithospermum zollingeri* DC.

植物名 梓木草《中国植志》

药材名 地仙桃《陕西中草药》

文献名 猫舌仙桃《植物名汇拾遗》, 琉璃草《中国植

物图鉴》

地方名 陕西: 接骨仙桃草 (洋县), 马非 (柞水、宁强); 浙江: 猫舌头草 (临安), 铁铤刀 (嵊县); 贵州: 小紫草 (贵阳)。

功效 果实: 温中健胃, 消肿止痛, 止血。用于胃胀泛酸, 胃寒疼痛, 吐血, 跌打损伤, 骨折。

## 7249029

*Lycopsis orientalis* L.

植物名 狼紫草《中国植志》

文献名 野旱烟《汇编》

功效 叶: 消炎止痛 用于疮肿。

## 7249030

*Onosma confertum* W. W. Smith -- *Onosma forrestii* W. W. Smith

植物名 密花滇紫草《中国植志》

药材名 密花滇紫草《迪庆藏药》

文献名 滇紫草《迪庆藏药》

功效 根或根皮: 清肺热, 解毒, 止血, 和血。用于肺炎, 肺痈, 肺结核, 咯血, 高山多血症。

## 7249031

*Onosma hookeri* Clarke var. *longiflorum* Duthie - *O. longiflorum* Duthie

植物名 长花滇紫草《中国植志》

药材名 藏紫草《民族药志》

文献名 西藏紫草、山紫草《汇编》

地方名 西藏: “芝莫”、“哲磨” (藏名)。

功效 根、根茎: 用于肺炎, 丹毒, 结核空洞, 多血症。

## 7249032

*Onosma multiramosum* Hand. - Mazz.

植物名 多枝滇紫草《中国植志》

药材名 多枝滇紫草《迪庆藏药》

文献名 滇紫草《迪庆藏药》

功效 根皮或根: 清肺热, 解毒, 止血, 和血。用于肺炎, 肺痈, 肺结核, 咳血, 高山多血症。

## 7249033

*Onosma paniculatum* Bur. et Franch.

植物名 滇紫草《中国植志》

药材名 滇紫草《名实图考》、《云南药录》

文献名 紫草《滇南本草》, 伞穗滇紫草《药材学》, 驴臭草《种称》

地方名 红紫草 (西南); 四川: 紫草根, 紫草皮; 云南: 云紫草, 云南紫草。

功效 根: 凉血, 活血, 解毒透疹。用于麻疹并肺炎, 斑疹, 痘毒, 湿疹, 恶疮, 大便燥结, 水火烫伤, 外伤出血。

## 7249034

*Sinojohnstonia moupinensis* (Franch.) W. T. Wang

植物名 短蕊车前紫草《中国植志》

文献名 宝兴车前紫草《神农架药录》

地方名 湖北: 毛乌金草 (神农架)。

功效 根: 行气止痛, 祛风湿。

## 7249035

*Stenosolenium saxatile* (Pall.) Turcz.

植物名 紫筒草《中国植志》

药材名 紫筒草《汇编》

文献名 白毛草、伏地蜈蚣草《沙漠药植》,紫筒草根《中药大辞典》

地方名 蛤蟆草(东北、内蒙古、天津);内蒙古:“敏吉尔·草日”;其他:鬼紫草。

功效 全草:祛风除湿。用于小关节疼痛;根:清热凉血,止血,止咳。用于吐血,肺热咳嗽,感冒。

## 7249036

*Symphytum officinale* L.

植物名 聚合草《中国植志》

文献名 肥羊草、〔紫草根〕《植分学报》

地方名 吉林:友谊草;北京:爱国草。

功效 根:用于赤痢,肠出血,止泻。

## 7249037

*Thyrocarpus glochidiatus* Maxim.

植物名 弯齿盾果草《中国植志》

地方名 贵州:盾形草(剑河)。

功效 叶:清热凉血,润肺止咳。用于跌打损伤,刀伤出血,风湿病,咳嗽。

## 7249038

*Thyrocarpus sampsonii* Hance

植物名 盾果草《中国植志》

药材名 盾果草《汇编》

文献名 森氏盾果草《江苏南部种册》

地方名 湖北:毛和尚(神农架);湖南:野生地,猫条干;广西:黑骨风(兴安),铺墙草(桂林)。

功效 全草:清热解毒,消肿,利咽,止渴。用于痢症,菌痢,肠炎,咽喉痛,口渴。

## 7249039

*Tournefortia montana* Lour.

植物名 紫丹《中国植志》

药材名 紫丹《广西药录》

功效 全株:用于风湿骨痛。

## 7249040

*Trigonotis amblyosepala* Nakai et Kitag.

植物名 钝萼附地菜《北京植志》

功效 全草:清热,消炎,止痛。

## 7249041

*Trigonotis cavaleriei* (Levl.) Hand.-Mazz.

植物名 西南附地菜《中国植志》

药材名 西南附地菜《贵州药录》

地方名 贵州:扫把菜(赤水)。

功效 全草:祛风,镇痛。用于遗尿,赤白痢,发背,热肿,手脚麻木,胸胁骨痛。

## 7249042

*Trigonotis macrophylla* Vant. var. *verrucosa* Tohnst.

植物名 瘤果附地菜《中国植志》

药材名 大叶附地菜《广西药园药录》

地方名 广西:艳肠草(乐业)。

功效 全草:用于风湿病,疝气。

## 7249043

*Trigonotis microcarpa* (A. DC.) Benth.

植物名 毛脉附地菜《中国植志》

地方名 广西:艳肠草(乐业);云南:小白花子,鸡肠草,“是彪子”(彝名)。

功效 全草:温中健胃,活血止血,消肿止痛。用于胃痛吐酸,脾胃虚寒,脘腹疼痛,吐血,遗尿,赤白痢疾,手脚麻木。

## 7249044

*Trigonotis mollis* Hemsl.

植物名 湖北附地菜《中国植志》

文献名 柔软附地菜《神农架药录》

地方名 湖北:鸡肠草(神农架)。

功效 全草:清热毒,祛风湿,止痢疾。

## 7249045

*Trigonotis omeiensis* Matsuda

植物名 峨眉附地菜《中国植志》

地方名 四川:附地菜(峨眉山)。

功效 全草:用于疮疖肿痛,跌打损伤。

## 7249046

*Trigonotis peduncularis* (Trev.) Benth. ex Baker et Moore

植物名 附地菜《中国植志》

药材名 附地菜《名实图考》、《汇编》

文献名 生瓜菜《图经》,鸡肠菜《救荒本草》,野苣荬《名实图考》,生瓜药《满州植录》

地方名 辽宁:不食草(辽阳),〔血见愁〕、〔地锦草〕(营口);河北:〔卧蛋草〕(张家口);内蒙古:“嘎吉H-萍嘎”(蒙名);山东:搓不死(昆嵛山),豆瓣子棵(济宁);贵州:地胡椒(绥阳);其他:伏地菜。

功效 全草:温中健胃,消肿止痛,止血,止痢。用于胃痛,吐酸,吐血,跌打损伤,骨折。

## 7250 茄科 Solanaceae

## 7250001

*Anisodus acutangulus* C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen --- *Scopolia acutangulus* (C. Y. Wu et C. Chen) Hsiao

植物名 三分三《中国植志》

药材名 三分三《药典》

文献名 锐萼东莨菪《云南中草药选》

地方名 四川:野烟;云南:野旱烟,山野烟,山茄子,大搜山虎,藏茄子。

功效 根:有大毒。解痉止痛。用于胃、十二指肠溃疡,胆绞痛,肾绞痛,肠痉挛,震颤麻痹,风湿痹痛。

## 7250002

*Anisodus acutangulus* C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen var. *breviflorus* C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen

植物名 三分七《中国植志》

药材名 三分七(云南)

地方名 四川:野烟(会东);云南:三分三(丽江)。  
功效 根:有大毒。解痉止痛。

## 7250003

*Anisodus luridus* Link et Otto --- *Scopolia lurida* Dunal

植物名 铃铛子《中国植志》

药材名 三分三《汇编》

文献名 东莨菪《中国经植志》, 赛莨菪《西藏中草》, 喜马拉雅东莨菪《中草药学》

地方名 藏茄(西藏、云南);青海:“唐川那保”(藏名);云南:莨菪(丽江), 山茄子, 山野烟, 大搜山虎(昆明);西藏:山烟、“唐冲那薄”(藏名), 唐古特山莨菪。

功效 根:有毒。解痉止痛。用于胃、十二指肠溃疡, 胆绞痛, 肾绞痛, 肠痉挛, 震颤麻痹, 风湿痹痛。

## 7250004

*Anisodus luridus* Link et Otto var. *fischerianus* (Pascher)

C. Y. Wu et C. Chen --- *Anisodus fischerianus* Pascher

植物名 丽江山莨菪《药典》

药材名 三分三(云南丽江)

文献名 丽山莨菪《中国植志》

功效 根:有大毒, 解痉止痛。用于胃、十二指肠溃疡, 胆绞痛, 肾绞痛, 肠痉挛, 震颤麻痹, 风湿痹痛。

## 7250005

*Anisodus mairei* (Levl.) C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen --- *Scopolia mairei* Levl.

植物名 搜山虎《中国植志》

药材名 搜山虎(云南)

地方名 云南:山茄子, 山野烟, 野旱烟, 大搜山虎(滇东北、滇中)。

功效 根:有大毒。解痉止痛。

## 7250006

*Anisodus tanguticus* (Maxim.) Pascher --- *Scopolia tangutica* Maxim.

植物名 山莨菪《中国植志》

药材名 山莨菪《汇编》

文献名 唐古特莨菪《青藏药图》, 七厘散《云南中草药》, 甘青赛莨菪《中草药学》, 唐古特山莨菪《中草药》

地方名 青海:樟柳怪, 藏茄, “唐冲那博”, “唐川那保”(藏名), [商陆](青海);四川:“唐冲椅鸟”(藏名);云南:搜山虎, 五虎下西川(昭通), 无慈、疯药(丽江);西藏:“唐春木那布”(藏名)。

功效 根:有大毒。镇痛解痉, 活血化痰, 止血生肌。用于溃疡病, 急、慢性胃肠炎, 胃肠神经官能症, 胆道蛔虫症、胆石症引起的疼痛, 跌打损伤。外用于疮疖、痈疽、肿毒。

## 7250007

*Anisodus tanguticus* (Maxim.) Pascher var. *viridulus* C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen

植物名 黄花山莨菪《中国植志》

功效 根、种子:镇痛。

## 7250008

*Atropa belladonna* L.

植物名 颠茄《中国植志》

药材名 颠茄草《药典》

文献名 颠茄根、美女草、别拉多娜草《药材学》, 别刺敦那《中国植物图鉴》

功效 全草:抗胆碱药, 解除平滑肌痉挛, 抑制腺体分泌。用于胃及十二指肠溃疡病, 胃肠道、肾、胆绞痛等。

## 7250009

*Atropanthe sinensis* (Hemsl.) Pascher --- *Scopolia sinensis* Hemsl.

植物名 天蓬子《中国植志》

药材名 天蓬子根《汇编》

文献名 新莨菪《高植图鉴》, 搜山虎《云南中草药》

地方名 湖北:紫柳根(神农架);四川:白商陆(石柱);贵州:小独活(赫章);其他:拟颠茄。

功效 根:有大毒。祛风散寒, 舒筋活络, 止痛。用于跌打损伤, 关节疼痛, 瘫痪, 破伤风。

## 7250010

*Brugmansia arborea* (L.) Steud. --- *Datura arborea* L.

植物名 木本曼陀罗《中国植志》

药材名 木曼陀罗《汇编》

文献名 乔木状曼陀罗《中国药植志》, 树状曼陀罗《药学通报》

地方名 [闹羊花](华南);上海:灯泡花, 落苏花。

功效 花、叶和种子:麻醉, 镇痛, 平喘, 止咳。

## 7250011

*Brunfelsia latifolia* Benth.

植物名 鸳鸯茉莉《北京植志》

功效 叶:外用子敷疮疖肿毒。

## 7250012

*Capsicum annuum* L. --- *C. longum* DC. --- *C. frutescens* L. var. *longum* Bailey

植物名 辣椒《中国植志》

药材名 辣椒《名实图考》

文献名 番椒《食物本草》, 辣茄、海椒藤《花镜》, 辣虎《药性考》, 海椒、辣角《遵义府志》, 番姜《台湾府志》, [秦椒]《纲目拾遗》, 唐辛、南蛮胡椒、赤椒、山珊瑚、地珊瑚、海鼠藤、高丽胡椒《新纲》, 辣椒头[根]《岭南采药录》, 长形辣椒、印尼辣椒《药学报》, 红海椒《高植图鉴》, 海椒梗《中药大辞典》

地方名 辣子(四川、云南、陕西、湖北), 青椒(河北、甘肃), 鸡嘴椒(广东、广西), 红金花(东北);吉林:“高醋”(朝名);江苏:大椒;上海:长辣椒, 尖头辣椒;湖北:广椒(神农架);湖南:七姐妹, 斑椒;海南:野辣树;广西:香椒;四川:红辣椒;其他:狗奶子椒, 尖嘴椒。

功效 果:温中散寒, 健胃消食。用于胃寒疼痛, 胃肠胀气, 消化不良。外用于冻疮, 风湿痛, 腰肌痛;根:活血消肿。用于手足无力, 肾囊肿胀;茎:除寒湿, 逐冷痹, 散瘀血凝滞。用于风湿冷痛, 冻疮。

## 7250013

*Capsicum annuum* L. var. *acuminatum* Fingh. --- *C. frutescens* L. var. *acuminatum* Fingh.

植物名 小指椒《汇编》

药材名 小指椒《汇编》  
文献名 象牙辣椒、细长辣椒《汇编》  
地方名 台湾：番姜，辣椒，番椒。  
功效 果：温中散寒，健胃消食。

## 7250014

*Capsicum annuum* L. var. *cerasiforme* Irish --- *C. frutescens* L. var. *cerasiforme* Bailey

药材名 五色椒《广西《园林药录》》  
文献名 樱桃椒《广西植录》  
地方名 广西：五色辣椒。  
功效 根、茎、果：祛风止血，温中健胃。

## 7250015

*Capsicum annuum* L. var. *conoides* (Mill.) Irish --- *C. frutescens* L. var. *conoides* Bailey

植物名 朝天椒《中国植志》  
药材名 朝天椒《湖南药物志》  
文献名 指天椒《岭南采药录》，圆锥辣椒《药学名词合编》  
地方名 江苏：长柄椒；湖北：七姊妹（神农架）。  
功效 果实：温中散寒，健胃消食。

## 7250016

*Capsicum annuum* L. var. *fasciculatum* (Sturt.) Irish --- *C. frutescens* L. var. *fasciculatum* Bailey

植物名 簇生椒《中国植志》  
药材名 朝天辣椒《药学名词合编》  
文献名 朝天番椒《中国植物图鉴》，簇生辣椒《华北经植志要》，朝天椒《汇编》  
地方名 指天椒（华东）。  
功效 果：温中散寒，健胃消食。

## 7250017

*Capsicum annuum* L. var. *grossum* (L.) Sendt. --- *C. frutescens* L. var. *grossum* Bailey

植物名 菜椒《中国植志》  
药材名 灯笼椒《湖南药物志》  
文献名 狮头辣椒《药学名词合编》  
地方名 北京：柿子椒；甘肃：灯笼辣椒，大辣椒，圆辣椒；福建：狮头番椒；湖南：灯笼泡。  
功效 果实、种子：温中散寒，健胃消食。

## 7250018

*Capsicum annuum* L. var. *parvo-acuminatum* Makino

植物名 小指天椒《广西《园林药录》》  
药材名 小指天椒《广西》  
地方名 广西：辣椒。  
功效 根、茎、果、叶：收敛止血，温中健胃。

## 7250019

*Capsicum frutescens* L.

植物名 小米辣《中国植志》  
药材名 米辣《云南》  
地方名 云南：野椒子。  
功效 根、茎皮、果实：用于咳嗽，吐血，消化不良，感冒，风湿腰痛。

备考 据《中国植物志》（卷67）记载：“本种和辣

椒都是林奈建立的种，后来的研究者曾有两种意见：一种是作为两个不同种；一种是合并为一个种，拉丁名用 *C. frutescens* L. 而将 *C. annuum* L. 作为异名。近年来，研究者们都认为应为不同的种。”二者区别如下：在每个开花节上常开1朵花，花果通常俯垂或稀直立生，花冠纯白色、浅蓝白色或稀为紫色者为辣椒 *C. annuum* L.；在每个开花节上二至数朵花，花果直立生，花冠绿白色者为小米辣 *C. frutescens* L.

## 7250020

*Cestrum nocturnum* L.

植物名 夜香树《中国植志》  
药材名 夜来香《广西《园林药录》》  
文献名 洋素馨《中国经植志》  
地方名 洋丁香（华南）；其他：夜香花。  
功效 叶：清热消肿。外用于乳腺炎，痈疮。

## 7250021

*Datura inermis* Jacq.

植物名 无刺曼陀罗《中国药植志》  
文献名 光果曼陀罗、紫花光果曼陀罗《中国药植志》，直果曼陀罗《药学报》  
功效 花、叶和种子：有大毒。麻醉，镇痛，平喘，止咳。

## 7250022

*Datura innoxia* Mill.

植物名 毛曼陀罗《中国植志》  
药材名 北洋金花《药材学》  
文献名 软刺曼陀罗、毛花曼陀罗《中药大辞典》，毛叶曼陀罗《浙江药植志》  
地方名 臭麻子（山东、江苏），洋金花（河北、新疆）；河北：枫茄花，山大麻子花（北京）；江苏：羊惊花，窜经花，大麻子（睢宁）；福建：万桃花。  
功效 花：平喘镇咳，镇痛，解痉；果实或种子：平喘祛风，止痛。用于喘咳，惊痫，风寒湿痹，泻痢，脱肛，跌打损伤；根：用于疯狗咬伤，恶疮。

## 7250023

*Datura metel* L. --- *D. alba* Rumph. ex Nees - *D. fastuosa* L. --- *D. metel* L. f. *alba* Tep.

植物名 白曼陀罗《药典》  
药材名 洋金花《纲目拾遗》、《药典》  
文献名 山茄花《扁鹊心书》，曼陀罗《御院药方》，胡茄花《本草原始》，曼陀罗、风茄儿、山茄子《纲目》，大闹杨花、马兰花、大颠茄《生草药性备要》，风茄花《本草求真》，天茄子、胡茄子《分类草药性》，千叶曼陀罗花、重台曼陀罗花《洛阳花木记》，佛花《中华药学杂志》，南洋金花《药材学》，重瓣曼陀罗、紫花重瓣曼陀罗、壮丽曼陀罗《中国药植志》，白花曼陀罗《中国经植志》，美丽曼陀罗《楼《生药》》，金盘托荔枝[果实]《云南中草药选》  
地方名 [闹羊花]（台湾、广东、海南、广西、四川、云南），喇叭花（山西、江苏、江西、广东），醉仙桃（山西、上海），吃娘花、野老麻子（陕西、甘肃、宁夏），狗核桃（贵州、云南），娇气花（陕西、山东）；河北：洋大麻子，山大麻子；山西：洋蓖麻，弥陀花；内蒙古：耗子阎王；陕西：

风麻花,酒醉花,酒醉马;山东:洋大麻子花,关东大麻子花,虎茄花,痴花(烟台),大麻子,大麻子花;江苏:醉仙桃花;上海:枫茄花;浙江:风果茄,千人花;台湾:万桃花;广东:广东闹洋花,目镜草(普宁),癞茄树(阳江、阳春、茂名、高州、化州),天茄、假塔花(东莞);海南:麻大罗(琼中、乐东);广西:闹陀罗,醉葡萄,金茄子,笏仙桃,猪颠茄,猪波罗;四川:闹羊花子,伏茄子,疯茄子,陀罗子;云南:仿荔枝,玉盘托荔枝,“嘎渣唧”(傣名),麻里棒(景洪),号筒花(河口),保险子;其他:野蓖麻、老鼠愁,大喇叭花。

**功效** 花:有毒。平喘镇咳,镇痛,解痉。用于哮喘咳嗽,皖腹冷痛,风湿痹痛,小儿慢惊,外科麻醉。

**备考** 外感及热咳喘、青光眼、高血压者禁用。

## 7250024

*Datura stramonium* L.

**植物名** 曼陀罗《中国植志》

**药材名** 曼陀罗《滇南本草》、《汇编》

**文献名** 龙蛋草、鬼核桃《滇南本草》,风茄儿、曼陀罗《纲目》,天麻花、大喇叭花、闹陀罗华、天茄弥陀花、高丽牵牛花、杂色、恶客、佛花、善婆草、疯茄《新纲》,绿茎曼陀罗《药学名词合编》,风茄果、醉仙桃、曼陀罗果《药材学》,白花绿茎曼陀罗、欧曼陀罗、佛茄儿《中国药植志》,直果曼陀罗《科裁》,狗核桃《云南中草药》

**地方名** 洋金花(东北、青海、山东、安徽、湖北),臭麻子(安徽、山东、江苏),大麻子(山东、山西),闹羊花(云南、甘肃、湖南、广东),金盘托荔枝(安徽、云南),山茄子(浙江、福建),枫茄花(江苏、上海),酒醉花(陕西、湖北),羊惊花(江苏、湖南);内蒙古:“土木特张姑”、“满达拉吐-其格”(蒙名),野大麻子;甘肃:野芝麻,刺疙瘩,醉仙花;青海:“索玛仁杂”(藏名);新疆:“也泻提羊额盖”、“赛斯哈塔肯”(维名),“沙斯哈多那”(哈萨克名);山东:娇气花,痴花,山茄子(栖霞);江苏:串经花,筋骨花,野麻子,醉心花;浙江:铁落苏,醉人花;安徽:枫茄子,醉八仙,串筋花;福建:弥陀花,万桃花;河南:胡茄,胡茄花;湖南:蔓萝花,野葵花;四川:天茄子,胡茄子,曼托罗;贵州:野蓖麻,打昆果,雷公锤;云南:“大独惹”(藏名),“麻嘿罢”(西双版纳傣名),天生膏、一股箭、一支箭、金盘捧荔枝(红河);其他:山茄花,风茄花,大麻子花,广东闹羊花,假荔枝。

**功效** 花、叶和种子:有大毒。麻醉,镇痛,平喘,止咳。用于支气管哮喘,慢性喘息性支气管炎,胃痛,风湿痛,损伤疼痛,手术麻醉。

## 7250025

*Datura stramonium* L. var. *tatula* Torr. --- *D. tatula* L.

**植物名** 紫花曼陀罗《中国药植志》

**药材名** 紫花曼陀罗《汇编》

**文献名** 紫曼陀罗、紫花紫茎曼陀罗《中国药植志》,紫茎曼陀罗《药学名词合编》,番曼陀罗花《华北经植志要》,香曼陀罗《拉汉种称》

**地方名** 野老麻子(西北),曼陀罗花(上海、四川);四川:曼陀罗子,六轴子,洋金花,闹羊花;贵州:千锤子,三百棒。

**功效** 花、叶和种子:有大毒。麻醉,镇痛,平喘,止咳。

## 7250026

*Hyoscyamus bohemicus* F. W. Schmidt -- *H. agrestis* Kit. ex Schult

**植物名** 小莨菪《中药志》

**药材名** 天仙子《图经》

**文献名** 莨菪子《本经》,偶蕊《纲目》,小天仙子《中国植志》,“他四哈阿落”(朝名)《朝鲜植汇》,北莨菪《汇编》

**地方名** 天仙子、猪耳朵、牙痛子(西北),山菸、山大菸(东北);辽宁:饭捞(锦西);内蒙古:“除都格”(蒙名),薰牙子、榔头子(平地泉、河套);河北:牙痛草(沽源),鬼翻棵子、要命桃子(张家口);青海:狼蘑,虎茄,牙疼子。

**功效** 种子:有大毒。解痉,止痛,安神。用于胃痉挛疼痛,喘咳,癫狂。

## 7250027

*Hyoscyamus niger* L.

**植物名** 莨菪《汇编》

**药材名** 天仙子《图经》、《药典》

**文献名** 莨菪子、横唐《本经》,行唐《别录》,莨菪子、狼蘑《本草经集注》,狼蕘《图经》,秦川莨菪《政和本草》,牙痛子《本草原始》,葱《玉篇》,南蕘《纲目》,小颠茄子《岭南采药录》,黑莨菪《华北药寮》,铃铛草《中药志》,大山菸子《药材学》,山烟、山大烟、野大烟《中药大辞典》,烟子《鉴别手册》

**地方名** 薰牙子(内蒙古、陕西),青草叶、老牛醋(东北);河北:大天仙子;内蒙古:“特纳格-乌布斯”(蒙名),山烟子;甘肃:米罐子;青海:浪汤则,木碗子草,疙瘩子;新疆:“冈伍入克”、“苯格哈兰特”(维族语),“克来名多那”(哈萨克语);湖北:浪当子(神农架);湖南:麻性草;四川:浪蕘子,野烟;西藏:唐葱莨菪子,马铃薯;其他:断肠草,哪咭草。

**功效** 种子:有大毒。解痉止痛,安神定痛。用于胃痉挛疼痛,喘咳,癫狂;叶:有大毒。镇痛,解痉。用于胃痛,牙痛,气管炎咳嗽。

## 7250028

*Hyoscyamus pusillus* L.

**植物名** 矮莨菪《沙漠药植》

**药材名** 小天仙子《新疆药植志》

**文献名** 中亚天仙子《中国植志》

**地方名** 新疆:“帕卡苯格哈兰波”(维语),天仙子。

**功效** 叶、种子:有大毒。解痉,止痛,安神。

## 7250029

*Lycianthes biflora* (Lour.) Bitter

**植物名** 红丝线《名实图考》、《中国植志》

**药材名** 十萼茄《汇编》

**文献名** 《血见愁》《名实图考》,双花红丝线《汇编》,毛药《贵州民间药物》,钮扣子《广西植录》

**地方名** 福建:红珠草(福州),耳坠子(宁德),帮梨子(龙岩),正珍珠瘡(漳州);台湾:金锦耳,耳钩草;广



西:牛七(富川),假天星、满天星(德保),阳房子草(阳朔),猫耳草(百色),猫耳朵(凤山);广东:鸡眼清;海南:山钮果;四川:野海椒(南川);贵州:野苦菜(望漠),野花毛辣角(独山);其他:打破碗。

功效 叶和全株:祛痰止咳,清热解毒。用于咳嗽,疟疾,狂犬病。外用于疔疮红肿,外伤出血。

## 7250030

*Lycianthes biflora* (Lour.) Bitter var. *subtusochracea* Bitter

植物名 密毛红丝线《中国植志》

文献名 [白毛藤]《元江哈尼族药》

地方名 广西:金扣钮(乐业);云南:“批思啊周”(元江哈尼语)。

功效 根:抗癌,祛风,止痒。用于宫颈癌,绒毛膜上皮癌,皮肤瘙痒,风湿跌打。

## 7250031

*Lycianthes lysimachioides* (Wall.) Bitter

植物名 单花红丝线《中国植志》

药材名 佛葵《四川中草》

文献名 排草叶钮扣子《广西植录》

地方名 湖南:野辣椒,小天泡;四川:锈草,红丝线,珍珠菜叶。

功效 全草:有小毒。杀虫,解毒。用于痈肿疮毒。

## 7250032

*Lycianthes subtruncata* (Wall.) Bitter var. *remotidens* Bitter

植物名 疏齿红丝线《中国植志》

文献名 疏齿截萼红丝线《云南植志》

地方名 广西:木参(桂平)。

功效 根:滋补。

## 7250033

*Lycium barbarum* L. --- *L. halimifolium* Mill.

植物名 宁夏枸杞《中国植志》

药材名 枸杞子[果实]、地骨皮[根皮]《药典》

文献名 中宁枸杞《高植图鉴》,甘枸杞、杞子《简明中医辞典》,狭叶枸杞《兰州植志》,枸杞果、红枸杞、甘州枸杞子、甘杞子、北枸杞、骨皮、枸杞根白皮《常用中药名辨》,津枸杞《中国植志》

地方名 西枸杞(青海、浙江),西杞果(西北);山西:山枸杞;内蒙古:“西茹音-温吉勒嘎”(蒙名),白疙针,白葛针;宁夏:茨,茨果子,红果子,红耳坠,明目子,贡果;青海:“旁庆”(藏名),白刺。

功效 根皮(地骨皮):凉血除蒸,清肺降火。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,肺热咳嗽,咯血,衄血,内热消渴;果实(枸杞子):滋补肝肾,益精明目。用于虚劳精亏,腰膝酸痛,眩晕耳鸣,内热消渴,血虚萎黄,目昏不明。

## 7250034

*Lycium chinense* Mill.

植物名 枸杞《本经》、《中国植志》

药材名 地骨皮《药典》,枸杞子(河北、湖北、广东)

文献名 枸《诗经》,枸榘《毛诗传》,杞根、地骨、枸

忌、地辅《本经》,杞芭、羊乳《吴普本草》,却暑、仙人杖、西王母杖《别录》,苦杞、橘乳、地筋《广雅》,象柴、托卢、天精《抱朴子》,枸杞根、苟起根、苟起子《本草经集注》,枸杞根皮《药性论》,地仙、地仙苗《日华子本草》,甜菜《图经》,杞子《藏府药式补正》,枸棘《本草衍义》,甜菜子《救荒本草》,枸杞尖《滇南本草》,天精草《保寿堂经验方》,枸杞苗《纲目》,枸杞菜《中草药性备要》,血灰珊瑚、赤宝、二月录、三尸录、青精子、灵庞、石纳蚶《新纲》,地骨子枸杞、津枸杞《中药志》,血枸杞《中药材手册》,地骨冠、伏尘毡、金山茄根《简明中医辞典》,红枸杞、北枸杞、骨皮枸杞根白皮《常用中药名辨》

地方名 狗奶子(河北、山西、山东、江苏、安徽、江西)、狗奶子根(山东、四川、贵州),枸杞果(河北、江苏),甜菜芽(安徽、河南),土枸杞(江苏、安徽、江西、四川),野枸杞(江西、四川);吉林:“姑哥-扎纳木”(朝名);北京:红榴榴坠根;天津:血杞子;河北:红榴榴;山西:地骨子,枸茄茄;内蒙古:“胖升拔卡”(蒙名);陕西:狗牙根,羊辣子(商南);甘肃:菱叶枸杞,中国枸杞,刺朵根(岷县);青海:“折才尔玛”(藏名),白刺果;山东:山枸杞根,狗奶子根皮,羊奶子(昆崙山);江苏:枸杞头(泰县、南通),狗嘴子根(徐州);上海:杜杞子,枸杞头子;浙江:川骨皮(温州),牛吉力,野朱红柿;安徽:甜菜头,甜刺刺芽,野辣椒,狗尿台棵,古城骨皮(滁县);江西:枸榘(赣州),枸杞芽(南昌);福建:金耳坠(福安、福鼎),姑里确(泉州),红珠子刺;河南:山杞子根,甜齿牙根,红青椒,狗蹄子,枸杞豆,红耳坠;湖南:杨柳风、羊耳风、石寿树(黔阳),羊儿蕻、羊奶奶(溆浦),娘儿红(凤凰),前皮(常德),杀鸭兰(通道),狗猪菜(宜章);广东:土地骨,土古片,土古,土苦皮;广西:枸根菜、金银刺(富川),铃铃菜(隆林),狗比菜,枸杞芽,占杞;四川:狗地芽(峨眉山),狗地芽皮,枸地芽子,枸地菜,狗底耳,狗牙子,狗节,土红杞;西藏:“察策尔玛”(藏语);其他:红果子,白棘根,白棘颗,杞果,土杞子。

功效 根皮(地骨皮):凉血除蒸,清肺降火。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,肺热咳嗽,咯血,衄血,内热消渴;果实(枸杞子):滋补肝肾,益精明目。用于虚劳精亏,腰膝酸痛,眩晕耳鸣,内热消渴,血虚萎黄,目昏不明。

## 7250035

*Lycium chinense* Mill. var. *potaninii* (Pojark.) A. M. Lu  
- *L. potaninii* Pojark.

植物名 北方枸杞《中国植志》

药材名 大枸杞子(河北)

地方名 河北:枸杞子,大枸杞(束鹿)。

功效 果实:河北地区以此作枸杞子入药。

备考 商品多为河北束鹿县栽培品。据报导本种含铅量为1~20ppm,不含维生素C或含量甚微。本品较一般枸杞长大而瘦味苦,易于鉴别。

## 7250036

*Lycium dasystemum* Pojark. --- *Lycium furcomanicum* auct. non Turcz. ex Boiss.

植物名 新疆枸杞《中国植志》

药材名 新疆枸杞子(拟)

文献名 毛蕊枸杞《汇编》

地方名 甘肃:甘州子;新疆:古城子。

功效 果实:补肝肾,强筋骨,益精明目,止消渴。

备考 《中国植志》(第67卷(1)分册)称:过去有些文献将本种学名误订为 *L. furcomanicum* Turcz. ex Boiss. (上库曼枸杞),与本种有别。

#### 7250037

*Lycium ruthenicum* Murr.

植物名 黑果枸杞《中国植志》

药材名 黑枸杞《沙漠药植》

文献名 白刺、苏枸杞《沙漠药植》,苏联枸杞《华北经植志要》,小俄罗斯枸杞《中药通报》

地方名 内蒙古:“乔诺英-哈尔马格”(蒙名)。

功效 根、果:清肺热,镇咳,消炎。用于哮喘性气管炎,止咳,牙龈出血,感冒,退热。

#### 7250038

*Lycium truncatum* Y. C. Wang

植物名 截萼枸杞《中国植志》

地方名 内蒙古:枸杞子。

功效 果实:补肝肾,强筋骨,益精明目,止消渴。

#### 7250039

*Lycopersicon esculentum* Mill.

植物名 番茄《中国植志》

药材名 番茄《中药大辞典》

文献名 蕃柿《群芳谱》,小金瓜、喜报三元《名实图考》,六月柿、洋柿子《满洲植录》,红茄《植物学大辞典》,火柿子《科裁》

地方名 北京:西红柿;福建:洋海椒;台湾:红耳仔蜜;广东:番李子;广西:毛秀山,金橘(陆川);云南:洋辣子。

功效 新鲜果实:生津止渴,健胃消食。

#### 7250040

*Mandragora caulescens* C. B. Clarke ssp. *purpurascens* Grierson et Long --- *Mandragora caulescens* (C. B. Clarke) Diels

植物名 茄参《中国植志》

文献名 向阳花根《汇编》,曼陀茄根《中药大辞典》

地方名 云南:曼陀茄、向阳花(东川);其他:天上一枝龙,野洋芋。

功效 根:有毒。镇痛。用于胃痛,腹痛,跌打损伤。

#### 7250041

*Mandragora chinghaiensis* Kuang et A. M. Lu

植物名 青海茄参《中国植志》

药材名 青海茄参《中药志》

文献名 唐冲嘎博《晶珠本草》

功效 根及全草:用于肺脓肿。

#### 7250042

*Mandragora officinarum* L.

植物名 欧伤牛草《新英汉辞典》

药材名 押不芦《纲目》

文献名 阿不芦《阿汉词典》,曼德拉草《新英汉辞

典》

功效 根:麻醉药。

#### 7250043

*Nicandra physaloides* (L.) Gaertn.

植物名 假酸浆《中国植志》

药材名 大千生《云南中草药》

地方名 鞭打绣球(贵州、云南);广西:苦蕒(凌云);四川:冰粉子(峨眉山);贵州:水晶凉粉;云南:蓝花天仙了、冰粉、草木酸木瓜、野木瓜、田珠(昆明),天茄子、灯笼花(玉溪),古千生。

功效 全草、果及种子:有小毒。镇静,祛痰,清热解暑。用于狂犬病,精神病,癫痫,风湿关节炎,鼻渊,泌尿系感染,疮疖。

#### 7250044

*Nicotiana glauca* Link et Otto

植物名 花烟草《中国植志》

功效 叶:作烟草用。

#### 7250045

*Nicotiana glauca* Graham

植物名 光烟草《中国植志》

文献名 粉兰烟草《茄科本草考证》

功效 叶:作烟草用。

#### 7250046

*Nicotiana longiflora* Cav.

植物名 长花烟草《茄科本草考证》

功效 叶:作烟草用。

#### 7250047

*Nicotiana rustica* L.

植物名 黄花烟草《中国植志》

文献名 烟草《延绥镇志》,水烟《纲目拾遗》

地方名 山烟(山西、甘肃);陕西:小花烟;湖北:兰烟(神农架);云南:蓝花烟。

功效 全草:除作烟草用外,也可做农药杀虫。味辛麻,性尤峻削,豁痰消食,开隔降气。

#### 7250048

*Nicotiana tabacum* L.

植物名 烟草《中国植志》

药材名 烟草《汇编》

文献名 烟花、烟草火《食物本草》,返魂烟《食物本草会纂》,淡把姑、担不归、金丝烟《花镜》,相思草《本草备要》,烟油《百草镜》,金丝醪、五行丹、烟膏、太极膏、气泥、淡肉果、淡巴菰、鼻烟、水烟《纲目拾遗》,蒿草、南蛮草、烟、莨、返魂草《新纲》,仁草、八角草《粤志》,南灵草《芝峰类说》,南草、淡婆姑《和汉药植》,贪报草、延命草《现代实用中药》,红花烟草《药材学》

地方名 生烟(广东、广西),琵琶烟(华中),红花烟、大叶烟、合水烟(陕西、甘肃、宁夏),草烟(湖南、云南);浙江:黄烟;福建:穿墙草,土烟草;台湾:熟烟草;湖北:汗烟、大叶子烟(神农架);湖南:金鸡脚下红(长沙);广东:生烟花;云南:“牙娘”(西双版纳傣语),“喝尼”(哈尼语),小烟草,气死名医草,辣烟。

功效 全草:有毒。消肿解毒,杀虫。外用于疔疮

肿,头癣,白癣,秃疮,毒蛇咬伤等。

#### 7250049

*Nicotiana tabacum* L. var. *angustifolia* Comes

植物名 狭叶烟草《茄科本草考证》

功效 叶;作烟草用。

#### 7250050

*Petunia hybrida* Vilm.

植物名 碧冬茄《中国植志》

药材名 碧冬茄《广西药录》

文献名 矮牵牛、番薯花《高植图鉴》,彩花茄《广西植录》,撞羽朝颜《江苏南部种册》

地方名 广西:草本牵牛(南宁)。

功效 种子:用于腹水,腹胀便秘,蛔虫病。

#### 7250051

*Physalis heterophyllum* (Hemsl.) Migo

植物名 江南散血丹《中国植志》

药材名 刺酸浆《中药大辞典》

文献名 龙须参《南京民间药草》

功效 根:用于补虚癆。

#### 7250052

*Physalis kweichouense* Kuang et A. M. Lu

植物名 散血丹《中国植志》

功效 根:用于虚癆。

#### 7250053

*Physalis alkekengi* L.

植物名 酸浆《中国植志》

药材名 酸浆《本经》

文献名 醋浆《本经》,酢浆《吴普本草》,灯笼草《唐本草》,苦耽《嘉祐本草》,欧亚酸浆《中药志》

地方名 陕西:水灯笼,天泡,红灯笼,酸瓜瓜;湖北:天泡子(利川);贵州:红姑娘;云南:蓝花天仙子,野木瓜,天茄子,酸浆草。

功效 全株:清热解毒,利尿消肿;果:外用于消炎,蛇眼疔。

#### 7250054

*Physalis alkekengi* L. var. *francheti* (Mast.) Makino ---

*P. francheti* Mast. --- *P. francheti* Mast. var. *bunyardii*

Makino --- *P. glabripes* Pojark. --- *P. alkekengi* L. var.

*glabripes* (Pojark.) Grub.

植物名 挂金灯(救荒本草)、《中国植志》

药材名 锦灯笼《药典》

文献名 葳、寒浆《尔雅》,酸浆、醋浆《本经》,酢浆《吴普本草》,苦葳、苦蒺、皮弁草《崔豹古今注》,酸浆草《尔雅》郭璞注,灯笼草《唐本草》,苦耽《嘉祐本草》,金灯笼《履巉岩本草》,姑娘菜、灯笼儿《救荒本草》,天泡草《纲目》,红娘子《柳边纪略》,王母珠、洛神《花镜》,天泡草铃儿《卫生杂兴》,金灯笼、天灯笼、珊瑚架《汪逢仕采药书》,山珊瑚、天灯笼草《纲目拾遗》,九占牛《名实图考》,红姑娘、豆腐娘《名实图考长编》,红娘果、红瓜囊《满蒙产药植》,豆腐娘《满州植录》,泡子草、扑扑子草《中国土农药志》

地方名 灯笼果(辽宁、山东、江苏、湖北、湖南),野

胡椒(江苏、湖南),鬼灯笼(江苏、浙江),红灯笼(河北、陕西),天泡(陕西、四川),姑娘花(东北、四川);河北:豆姑娘皮(承德),豆腐娘儿;陕西:水辣子,浆水罐,勒马回,酸瓜瓜(眉县),水灯笼,灯笼花(佛坪);甘肃:狗辣子(文县);山东:红娘(沂源),红娘娘(章丘),红姑娘子(益都);江苏:端浆果;上海:蛇落灯,家牛尿落灯,野辣茄姆,柏柏子,蛇屎落灯;江西:泡泡草;福建:打扑草,叶下灯,铃儿草,黄唐,蚕茧草、炮仔草(泉州),扑扑草、荷朴(闽东),小酸浆、灯笼泡(三明),拍拍子草(清流),冬野子(明溪),爆子草(大田),灯笼罩(宁化);湖北:天泡子;广西:消泡草(兴安),打拍草,红灯笼泡(三江);贵州:天泡果;云南:蓝花天仙子,野木瓜,天茄子。

功效 宿萼、带果实宿萼:清热解毒,利咽,化痰,利尿。用于咽痛音哑,痰热咳嗽,小便不利。外用于天泡疮,湿疹。

#### 7250055

*Physalis angulata* L. --- *Physalis pubescens* auct. non L.

植物名 苦蕒《中国植志》

药材名 苦蕒《本草拾遗》、《中药志》

文献名 蕒《尔雅》,小苦耽《本草拾遗》,黄藤《植物名汇》,炮仔草《台湾中药材图鉴》

地方名 鬼灯笼(江苏、浙江、江西),灯笼草(江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西),灯笼果(江苏、台湾、广东),灯笼泡(浙江、安徽、广西、贵州),天泡子(安徽、四川),天泡草(浙江、江西、福建),打额泡(湖南、广东);山东:小灯笼棵;江苏:灯笼探(铜山),挂金灯,端浆果;上海:绿灯,野绿灯,青绿灯,牛屎绿灯;安徽:浆泡子;江西:爆仔草,劈拍草,酸浆;福建:泡子草,扑扑子草,雌花草,灯笼花(厦门),母炮草(莆田);台湾:天灯笼,天灯笼,甘仔蜜,蝶仔草;河南:灯笼棵,地灯笼,天泡果,香浆棵,酸不浆;湖南:响铃草,响泡子,王母珠(长沙),天疮疤树,白天泡子,小天泡子,灯泡草,响泡草,打头泡;广东:灯笼泡草,水灯笼;四川:沙灯笼(成都),小天泡草(峨眉山)。

功效 全草:清热解毒,消肿散结。用于咽喉肿痛,腮腺炎,牙龈肿痛,急性肝炎,菌痢;根:利尿,通淋。用于水肿腹胀,黄疸,热淋。

备考 《高植图鉴》等文献,将本种学名误订为 *P. pubescens* L.

#### 7250056

*Physalis minima* L.

植物名 小酸浆《中国植志》

药材名 天泡子《分类草药性》、《四川中药志》

文献名 天泡果《纲目》,《王不留行》《名实图考》,小酸浆果《海南植志》

地方名 打额泡、打头泡(广东、广西),水灯笼(广东、云南);广东:灯笼草,假灯笼果,灯笼菜(广州),水灯笼草,荷卜仔草,打额草;海南:假灯笼;广西:灯笼泡(宁明),打额卜(博白),打额泊(陆川),母依踏棒(北海),灯笼果、鬼灯笼(隆林),泡卜草,打碗泡;四川:黄姑娘,天泡草,沙灯笼,黄灯笼,王母珠(成都);云南:打卜草。

功效 全草或果实：渗湿，杀虫。用于黄疸，小便不利，慢性咳喘，疟疾，瘰癧。外用于天泡疮，湿疮。

## 7250057

*Physalis peruviana* L.

植物名 灯笼果《中国植志》

药材名 灯笼草、汇编

文献名 酸浆草《滇南本草》，天泡草、天泡果、挂灯笼《桂林市药物志》

地方名 打头泡、打卜草、鬼灯笼（广东、广西）；广东：响铃子，水灯笼草，荷卜草，打额泡，苦灯笼草，苦灯笼，水灯笼，荷卜仔草，打泡草，小果酸浆；广西：泡泡草，心不干，爆卜草，灯笼泡；云南：炮掌果（红河），狗屎果，酸浆，野木瓜果，沙灯笼（峨山、澄江）；其他：地灯笼，炮仔草，母炮草。

功效 全草：清热解毒，消炎利水。用于感冒发热，腮腺炎，支气管炎，急性肾盂肾炎，睾丸炎，疱疹，疖疮，疝气痛。

## 7250058

*Physalis pubescens* L.

植物名 毛酸浆《中国植志》

地方名 吉林：洋姑娘，姑娘，苦蕒。

功效 全草或根：清热解毒，消肿利尿。

## 7250059

*Physochlaina infundibularis* Kuang

植物名 漏斗泡囊草《中国植志》

药材名 华山参《药典》

文献名 醉汉草《中草药》，迷汉草《中草药通讯》

地方名 〔人参〕（陕西、河南）；山西：二月旺；河南：白毛参，热参，〔大红参〕，大紫参；陕西：秦参，华山人参。

功效 根：有毒。平喘止咳，安神镇惊。用于寒痰喘咳，心悸失眠易惊。

## 7250060

*Physochlaina physaloides* (L.) G. Don

植物名 泡囊草《中国植志》

药材名 泡囊草《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古：“浩尼-浩日素”（蒙名），大头狼毒，汤乌昔。

功效 根：有毒。补虚温中，安神，定喘。用于虚寒泄泻，咳嗽痰喘，心悸不安；全草：有毒。清热解毒，祛湿杀虫。用于中耳炎，鼻窦炎，咽喉肿痛，疮痈疖肿，头痛。

## 7250061

*Physochlaina praealta* (Decne.) Miers

植物名 西藏泡囊草《中国植志》

药材名 西藏泡囊草《中药通报》

功效 根：有毒。镇痛，解痉，杀虫，消炎。

## 7250062

*Przewalskia tangutica* Maxim.

植物名 马尿泡《中国植志》

药材名 马尿泡《汇编》

文献名 唐古特马尿泡《青藏药图》，矮莨菪《中药

志》，“唐冲嘎博”（藏名）《药典》

地方名 青海：羊尿泡，“唐川杂保”（藏名）。

功效 根：有毒。镇痛，解痉，杀虫，消炎。用于胃肠痉挛疼痛，白喉，炭疽。外用于疮疡，皮肤瘙痒。

## 7250063

*Scopolia carnolicoides* C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen --- *Anisodus luridus* auct. non Link et Otto

植物名 赛莨菪《中国植志》

药材名 三分三《药典》

地方名 云南：搜山虎（中甸、德钦），七厘散，无愁，疯药（丽江）。

功效 根：有剧毒。解痉止痛。用于胃、十二指肠溃疡，胆绞痛，肾绞痛，肠痉挛，震颤麻痹，风湿痹痛。

备考 《高植图鉴》（二）将其学名误订为 *Anisodus luridus* Link et Otto

## 7250064

*Scopolia carnolicoides* var. *dentata* C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen

植物名 齿叶赛莨菪《中国植志》

药材名 三分三（云南）：《药典》

文献名 小赛莨菪《药典》，小莨菪《汇编》

地方名 云南：搜山虎（维西）。

功效 根：有剧毒。解痉止痛。用于胃、十二指肠溃疡，胆绞痛，肾绞痛，肠痉挛，震颤麻痹，风湿痛。

## 7250065

*Solanum aculeatissimum* Jacq. --- *Solanum surattense* auct. non Burm. f.

植物名 牛茄子《云南种录》

药材名 丁茄《汇编》

文献名 冈拈子《名实图考长编》，颠茄《广西药录》，颠茄《海南植志》，刺茄《中药大辞典》，天茄子《中草药学》

地方名 红颠茄（广东、浙江），山茄（华南），钉茄（浙江、四川），野颠茄（浙江、广东）；上海：醉仙桃；浙江：地茄（定海），狗桔（洞头）；福建：大号拦路虎（福州），大号黄感桥，黄水茄、黄果茄（厦门）；湖南：刺辣椒，野茄子，“海茄顺”、“假弄”（侗语），刺辣子；广东：黄贡茄，鬼茄，番鬼茄（连山），大颠茄（宝安、九龙），颠茄子（大埔），野番茄，番鬼筋仔，筋果子，大米黄筒茄、黄筒桥（潮阳），毛茄，山番茄，牛茄，大茄，黄茄，灯球子，小耳盛；广西：山马铃（平南），大丁茄（玉林），小颠茄、假茄子（贵县），假茄根（北流），笏丁茄，红果，大返魂，牙卡，红丁茄；四川：刺天茄（成都）；贵州：油辣果。

功效 果或全株：有毒。活血散瘀，镇痛麻醉。外用于跌打损伤，风湿腿腿痛，痢疮肿毒，冻疮。

备考 《高植图鉴》将本品误订为 *Solanum surattense* Burm. f.

## 7250066

*Solanum alatum* Moench

植物名 红果龙葵《中国植志》

药材名 红果龙葵《中国植志》

文献名 红葵《中国植志》

功 效 地上部分:有小毒。清热解毒,消肿散结,消炎利尿。

## 7250067

*Solanum aviculare* Forst.

植物名 澳洲茄《中国植志》

药材名 澳洲茄《中国药植志》

功 效 叶及果实:可作甾体激素之原料。

备 考 原产于澳大利亚、新西兰、塔斯马尼亚,现我国有引种。

## 7250068

*Solanum cathayanum* C. Y. Wu et S. C. Huang --- *S. dulcamara* L. var. *chinense* Dunal

植物名 千年不烂心《中国植志》

药材名 千年不烂心《名实图考》

文献名 华白英《江西药录》

地方名 苦茄(广东、广西、贵州),野番茄(广西、云南);江西:毛来英,毛老人;广东:六甲草(连县),伤寒草、无名草(阳山),大毛虫;广西:假辣椒(贵县);四川:排风藤(巴县),毛母猪藤(城口);云南:白英,天泡草,毛和尚草。

功 效 茎:用于小儿惊风;枝叶:用于清血,乳房癌,子宫癌。

## 7250069

*Solanum coagulans* Forsk.

植物名 野茄《中国植志》

药材名 黄水茄《汇编》

文献名 凝固茄《广西药录》,黄刺茄《广西植志》,苦天茄《云南中草药》

地方名 广东:丁茄(徐闻);海南:衫钮果,牛茄子(澄迈);广西:(颠茄)(宁明);云南:洋苦茄、洋苦果、刺颠茄(红河),“麻嘿冷”(西双版纳傣语),黄茄子(西双版纳),黄天茄(勐仑),黄颠茄,野颠茄,野苦果,苦颠茄。

功 效 根、叶及果实:有小毒。利湿消肿,止痛。用于风湿性关节炎,睾丸炎,牙痛。

## 7250070

*Solanum deflexicarpum* C. Y. Wu et S. C. Huang

植物名 苦刺《中国植志》

文献名 苦果《元江哈尼族药》

地方名 云南:“思哈哈麻”(元江哈尼语)。

功 效 根、果:清热解毒。用于心火炽盛,口舌生疮,发热,咳嗽,风热感冒,虚劳羸瘦。

## 7250071

*Solanum dulcamara* L.

植物名 欧白英《中国植志》

药材名 欧白英《四川中药志》

地方名 四川:毛秀才,白毛藤,排风藤,毛风藤;云南:排风子,惊风藤。

功 效 全草:清热解毒。

## 7250072

*Solanum ferox* L.

植物名 毛茄《中国植志》

药材名 毛茄《云南药录》

文献名 羊不食《植物名汇》,人叶毛刺茄《广西植志》

地方名 广东:毛茄树;海南:大样颠茄(儋县);广西:毛果牙卡(武鸣),丁茄。

功 效 根、全株:消炎。用于咳嗽,喉痛,水肿,淋病,跌打损伤,疝气。

## 7250073

*Solanum indicum* L.

植物名 刺天茄《滇南本草》、《中国植志》

药材名 金钮扣《汇编》

文献名 天茄子、苦子《滇南本草》,小闹杨、小颠茄《生草药性备要》,五宅茄《树分》,金钮头《岭南采药录》,苦葛《高植图鉴》

地方名 [颠茄](广西、四川),紫花茄(广东、云南);福建:刺茄(华安),紫花茄根,金扣拦路虎(福州),金吊钮(晋江、同安、厦门),金扣头(莆田),千金锤(同安、厦门);台湾:钮仔茄,菊柑子,黄水莽,黄水茄;广东:生刺矮瓜(信宜);海南:鸡刺子(琼山);广西:细黄茄,金扣钮根,细钮扣根,扣子头,勒矮瓜(岑溪),假茄子、细颠茄(贵县),假颠茄(南宁),金扣子(来宾、贵县),丁茄子(绥禄),钉茄(梧州),袖扣果(龙州),筋茄(藤县),刺丁茄,扭茄木(平南);四川:两面针,野海椒(盐边);云南:苦果(禄丰、屏边、文山、砚山),“麻王喝”(西双版纳傣语)。

功 效 根及全草:有毒。解毒消肿,散瘀止痛。用于扁桃腺炎,咽喉炎,淋巴结炎,牙痛,胃痛,跌打损伤。

## 7250074

*Solanum japonense* Nakai

植物名 野海茄《中国植志》

药材名 毛风藤(湖南)

地方名 浙江:(千里光);湖北:毛和尚头(神农架);湖南:白毛英,毛果。

功 效 全草:祛风,活血。用于风湿关节痛,肩棱骨痛,头昏,经闭,大粪毒发痒。

## 7250074a

*Solanum khasianum* C. B. Clarke --- *S. myriacanthum* Dunal

植物名 喀西茄《中国植志》

药材名 苦天茄《汇编》

文献名 刺茄于《中药大辞典》

地方名 云南:大苦葛,金弹子,黄角刺,刺天茄(昆明、楚雄),狗茄子(景东),苦颠茄(文山),“阿公”(哈尼语),[骨碎补](罗平),果角茄,谷雀蛋,苦茄子。

功 效 根、果:有小毒。消炎解毒,镇静止痛。用于风湿跌打疼痛,神经性头痛,胃痛,牙痛,乳腺炎,腮腺炎。外用于疮毒。

## 7250075

*Solanum lyratum* Thunb. --- *S. dulcamara* L. var. *pubescens* Blume --- *S. dulcamara* L. var. *lyratum* (Thunb.) Sieb. et Zucc. ex Bonati

植物名 白英《中国植志》

药材名 白英《本经》、《汇编》

文献名 苋《尔雅》，谷菜《本经》，白草、来甘《别录》，鬼目草《尔雅》郭璞注，白草子《陶弘景》，排风、白藤《本草拾遗》，排风子《纲目》，鬼目菜《吴志》，白毛藤《百草镜》，毛藤果《百花镜》，天灯笼、和尚头草《纲目拾遗》，望冬红、酸尖菜、山甜菜《名实图考》，排风藤《分类草药性》，符鬼目、谷菜《中国药植志》

地方名 毛秀才(陕西、湖南、广西、四川、贵州)，毛相公(湖南、广西)，毛和尚(浙江、湖北)，千年不烂心(江西、广西)，苦茄(江苏、湖南)，苦苓菜(四川、云南)，上防风(福建、贵州)，陕西：野茄子；山东：鹰咬豆子；江苏：天灯笼草；上海：毛藤草、摊背藤草；浙江：红道士，毛藤麻(昌化)，毛道士(遂昌、临安)，白毛箭(乐清)，生毛茸，藤苦芽，火烧龙；安徽：白毛道士，排风草；江西：毛老人、毛胡藤、毛骨风(吉水)，毛老英(临川)，毛冬瓜(婺源)，毛莧菜(丰城)，毛桃仁(新建)，毛脚骨藤，大粪草，绿毛草；福建：葫芦草(福清、莆田、龙海、同安、泉州)，毛燕仔，红麦禾，胡毛藤，羊仔耳，生毛梢、龙毛龟(莆田、霞浦、松溪、政和)，金线绿毛龟草(福州、莆田、龙海、同安、长乐、福清、永安、泉州)，毛菜(沙县、宁化)，葫芦藤，毛毛藤，铃子草；湖北：野荔枝(巴东)；湖南：毛老虎，毛姑娘，毛和尚草，毛斑，猫耳朵草，虎耳草，野辣椒，望风藤，天泡子；广东：生毛鸡屎藤(云浮)；广西：上竹猫(平南、柳城)，小还魂、假辣椒、猪膳菜(贵县)，耳蛇草(梧州)，疔药；四川：野猫耳朵；贵州：耳坠菜；其他：毛千里光。

功效 全草：清湿热解毒，消肿。用于风热感冒，发热，咳嗽，黄疸型肝炎，胆囊炎。外用于痈肿，风湿性关节炎。

7250076

*Solanum mammosum* L.

植物名 乳茄《中国药志》

药材名 五指茄《汇编》

文献名 五角茄《广西药录》

地方名 广西：五指丁茄，五角丁茄(南宁、邕宁)，五代同堂(苍梧)，五子登科(藤县)。

功效 果实：有毒。散瘀消肿。用于淋巴结炎，疮疖肿毒。

7250077

*Solanum melongena* L. --- *S. melongena* L. var. *esculentum* (Dunal) Nees --- *S. melongena* L. var. *depressum* Bailey

植物名 茄《本草拾遗》、《中国药志》

药材名 茄根《开宝本草》，茄蒂《履巉岩本草》，茄花《纲目》，茄子《本草拾遗》

文献名 落苏《本草拾遗》，昆仑瓜《大业杂记》，草鳖甲《养生主论》，酷酥《五代贍子录》，茄母《摘元方》，茄科《鲍氏小儿方》，白茄、青水茄、紫茄、黄茄《图经》，勃海茄、番茄、水茄《王桢农书》，昆仑《御览》，东风草《滇南本草》，银茄《纲目》，黄水茄、酱茄、糟茄《纲目拾遗》，昆仑紫瓜《名实图考》，鸡蛋茄《广西药录》，卵茄《广西药录》

地方名 白茄子根(山东、江苏、四川)，矮瓜(湖南、广东、广西)，吊菜子(湖南、广东)；江苏：落苏；江西：吊菜(井岗山)；湖南：红茄子；云南：茄子花，茄子根。

功效 根：用于久痢便血，脚气，齿痛，冻疮；宿萼(茄蒂)：用于肠风下血，痢疾肿毒，口疮，牙痛；花：用于金疮，牙痛；叶：用于血淋，血痢，肠风下血，痢肿，冻伤；果实(茄子)：清热，活血，止痛，消肿。用于肠风下血，热毒疮痍，皮肤溃疡。

7250078 见 7250074a

7250079

*Solanum nigrum* L.

植物名 龙葵《中国药志》

药材名 龙葵《唐本草》、《汇编》

文献名 苦菜《唐本草》，苦葵、老鸦眼睛草、天茄子《图经》，天茄儿苗《救荒本草》，天天茄、救儿草、后红子《滇南本草》，水茄、天泡草、老鸦酸浆草《纲目》，天泡果《名实图考》，葱子草、野辣子《中国上农药志》

地方名 黑茄(河北、浙江)，山辣椒(河北、湖南)，野辣椒(浙江、江西、湖北、贵州)，天落灯(上海、湖北)，黑天天，黑星星(东北)，白花菜(广东、广西)；吉林：天天果；辽宁：龙眼草；河北：黑姑娘，凉凉茄；内蒙古：“淖海-乌珠玛”(蒙名)，天天；山东：烟榴(崂山、沂水、昌乐)，野茄(历城)，甜茄子(莒南)，洋茄子(淄博)，天茄棵(平邑)，关东芝麻(费县)，黑天地(菏泽)；江苏：黑天棵，黑甜甜(邳县、铜山)，野辣虎(苏州)，狗尿端端，端木棵(铜山)，酸溜子棵(新沂)，龙槐(江宁)；浙江：灯笼珠草(临安)，山辣茄(丽水)，山果茄儿(瑞安)，乌落茄(温州)，金耳垂(泰顺)，五地莽(洞头)；安徽：小天泡子，黑漆棵，端端棵，黑天蓬子，老鸦眼睛；江西：野辣椒树，飞天龙(宜黄)；福建：七粒扣，乌疔草，乌归菜；台湾：乌刺茄，乌只仔草，乌仔茄，乌仔菜；湖北：灯笼草(巴东)，湖南：地泡子，地茄草；广东：假灯笼草(海南儋县)；四川：野海椒(屏山、南川)，小苦菜(会东)，野伞子(城口)；贵州：山海椒，耳坠菜，野茄菜，天茄菜；云南：“怕讲唧”(西双版纳傣语)，酸浆草，“帕点帕”(临沧傣语)，野茄秧(蒙自)，水茄子(玉溪)，小灯笼(峨山)，小果果(河口)，狗扣子，“马点风”；西藏：山茄，甜茄。

功效 地上部分：有毒。清热解毒，消肿散结，消炎利尿。用于感冒发烧，牙痛，慢性支气管炎，痢疾，泌尿系感染，乳腺炎，白带，肿痛。外用于痈疔疔疮，天泡疮，蛇咬伤。

7250080

*Solanum photeinocarpum* Nakamura et Odashima --- *S. nigrum* L. var. *pauciflorum* Liou

植物名 少花龙葵《中国药志》

药材名 少花龙葵《福建药物志》

文献名 古钮子、衣扣草、痣草《中国药志》

地方名 白花菜(云南、广东、福建)；福建：七粒扣(福州、福清、闽侯、福鼎)，乌疔草(南平、福州、福清、晋江、泉州)，耳坠仔(霞浦)，公炮草(莆田)，五宅茄(晋江、同安、厦门、龙海、漳州)；广东：古钮草(广州)，扣子草(梅县、惠州)，衣钮扣；海南：打扑子；广西：小还魂

(贵县), 假辣椒(贵县、平南), 鸡眼睛(平南), 中风十八症(藤县), 左钮草。

功效 全草: 清热, 解毒, 利尿, 散血, 消肿。用于痢疾, 淋病, 目赤, 喉痛, 疔疮。

#### 7250081

*Solanum pittosporifolium* Hemsl.

植物名 海桐叶白英《中国植志》

文献名 海桐白英《峨眉药植资源》

地方名 湖北: 野广椒(神农架); 四川: 白英(峨眉山)。

功效 全草: 祛风除湿, 镇痛。用于无名肿毒。

#### 7250082

*Solanum procumbens* Lour.

植物名 海南茄《中国植志》

药材名 乌疔草(福建、广东)

地方名 细颠茄、金钮头、卜古笏、卜古雀、白花菜、扣子草(华南), 古钮菜(福建、广东); 福建: 雄丑珠花草, 五蒂茄, 五宅茄, 雄炮草, 乌叶疔, 乌鬼菜, 乌归菜, 老鸦酸浆草, 老鸦眼睛草, 珍珠瘰, 路宅茄, 路队仔(松政), 七粒扣, 兰地爬(三明); 广东: 点规菜、乌点规、乌衫钮(潮阳), 乌规表(饶平), 乌目菜(惠来), 钮子草、钮菜、古钮草(广州), 假辣椒(惠阳), 猫屎草, 鼻血仔, 耳环草(茂名), 小丁茄(徐闻); 海南: 衫钮藤(儋县), 鸡公蒴子(澄迈); 广西: [金耳环], 耳环垂, 衫钮扣, 鼻血子(梧州), 龙葵菜。

功效 根: 有小毒。凉血散瘀, 消肿止痛。用于急性扁桃腺炎, 咽喉炎。外用于毒蛇咬伤。

#### 7250083

*Solanum pseudo-capsicum* L.

植物名 珊瑚樱《中国植志》

药材名 冬珊瑚《汇编》

文献名 玉簇《花镜》

地方名 湖北: 看椒(神农架); 湖南: 辣子草, 树天泡, 野斑椒(衡山); 广西: 吉杏(凌云), [满天星](钟山), 吉庆果, 肇庆茄; 贵州: 珊瑚子, 玉珊瑚根, 野辣茄(贵阳)。

功效 根: 有毒。止痛, 解毒。用于腰肌劳损。

#### 7250084

*Solanum pseudo-capsicum* L. var. *diflorum* (Vell.)

Bitter --- *S. capsicastrum* Link ex Schau

植物名 珊瑚豆《中国植志》

药材名 珊瑚豆《汇编》

文献名 毛叶冬珊瑚《四川中药志》

地方名 玉珊瑚(四川、贵州); 陕西: 刺石榴(沔县、勉县); 湖南: 冬珊瑚(安江); 广西: 陈龙茄(环江); 四川: 洋海椒(雷波), 海茄子; 贵州: 岩海椒, 观音莲。

功效 全草: 止痛, 解毒。

#### 7250085

*Solanum septemlobum* Bunge

植物名 蜀羊泉《高植图鉴》

药材名 蜀羊泉《本经》、《汇编》

文献名 羊泉、羊饴《别录》, 漆姑《唐本草》, 青杞《救

荒本草》, 我立丁子花《植物名汇》, 野辣子、药人豆《沙漠药植》, 红葵《内蒙古中草药》, 裂叶龙葵《中药大辞典》

地方名 野枸杞(河北、东北), 野狗杞(内蒙古、陕西), 药鸡豆(东北); 河北: 枸杞子(小五台山); 内蒙古: “哲日利格·哈希”(蒙名); 陕西: 野茄子(吴旗、靖边); 江苏: 野辣椒(铜山); 河南: 野茄, 小孩拳。

功效 全草: 清热解毒。用于咽喉肿痛, 头秃恶疮。

#### 7250086

*Solanum spirale* Roxb.

植物名 旋花茄《中国植志》

药材名 旋柄茄《汇编》

文献名 螺旋茄《广西药录》

地方名 广西: 百两金(凤山、凌云), 山烟木; 云南: 苦凉菜, “帕笠”(思茅傣名), 跌打西(红河), 理肺散(双柏), 滴打稀(屏边), 敷药(河口), 白条花(龙陵), 倒提壶(西畴), 止咳灵(新平), 大苦溜溜、海苦草(思茅), “诸神莫力气”(楚雄彝名)。

功效 全株: 清热解毒, 利湿。用于感冒发热, 咳嗽, 咽喉痛, 疟疾, 腹痛, 腹泻, 菌痢, 小便短赤, 膀胱炎, 风湿病, 跌打损伤, 疮疡肿痛。

#### 7250087

*Solanum surattense* Burm. f.

植物名 牛茄子《广西药录》

地方名 广西: 山马铃(平南)。

功效 全株: 有毒。外用于瘰癧。

#### 7250088 见 7250091a

#### 7250089

*Solanum torvum* Swartz

植物名 水茄《中国植志》

药材名 水茄《汇编》

文献名 茄木《药学报》

地方名 刺茄(福建、云南), 金钮扣、金衫扣(广东、广西); 福建: 拦路虎; 广东: 山颠茄(宝安); 海南: 土烟子; 广西: 一面针(乐业), 小登茄(玉林), 小鸭卡, 扣子根(武鸣), 大金扣、鸭卡(来宾), 扭茄木(平南); 贵州: 天茄子(兴义), 洋毛辣、刺番茄(独山); 云南: 野茄子(河口、金平、西双版纳), “西好”(瑶名), 青茄(河口), 大苦子(德宏州、西双版纳州), “木哈蒿”(傣名), 黄天茄(红河), 黄狗茄, 乌凉(思茅)。

功效 根: 有小毒。散瘀, 消肿, 通经, 止痛, 止咳。用于跌打瘀痛, 腰肌劳损, 胃痛, 牙痛, 闭经, 久咳; 叶: 外用于无名肿毒。

#### 7250090

*Solanum tuberosum* L.

植物名 马铃薯《高植图鉴》

药材名 阳芋《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 山药蛋《名实图考》, 洋番薯《中国蔬裁》, 洋天麻《华北药寮》, 贵天麻《上海中医药》, 地豆《满蒙产药植》

地方名 土豆(江苏、湖北、东北), 洋芋(甘肃、江苏、

湖南);〔山药豆〕(华北);地蛋(山东、江苏);山西:〔山药];甘肃:宝贝蛋;江苏:洋山芋(南京、苏州、常熟);湖南:山洋芋;广东:荷兰薯(梅县),薯仔、茨仔(广州)。

功效 块茎:补气健脾,消炎。用于腮腺炎,烫伤。  
**7250091**

*Solanum verbascifolium* L.

植物名 野茄树《高植图鉴》

药材名 野烟叶《南宁药志》

文献名 大王叶《生草药性备要》,大黄叶《岭南采药录》,野茄《四川中药志》,茄树《中药大辞典》,七烟叶《广西本草选编》,山烟草《广州植志》,假烟叶树《中国植志》

地方名 假烟叶(广东、广西、四川、云南);福建:臭烟,土烟素,老公须,老君须,臭鹧木,二姐妹,土常山;台湾:土烟头〔根〕,土烟,蚊仔烟头〔全草〕,蚊子烟,山蕃仔烟,生烟叶头,生毛将军;广东:臭尿花;广西:石烟,假烟(凌云),假生烟、白卜叶(藤县),臭烟叶(梧州),暖树叶(忻城),青饭叶(宁明),酒饭叶(龙州),麒麟(上林),袖钮果(南宁),鲁胡麒麟,绿奔、暖叶(百色);云南:洗碗叶(腾冲、思茅),毛叶子,天蓬草(澄江),毛叶(红河、河口、建水),大毛叶(玉溪、景洪),臭批把叶(河口),“法便”、“戈吗嘿”(西双版纳傣语),浆树、三桠树、大发散(思茅)。

功效 根、叶:有毒。止痛,收敛。用于黄肿,痛风,血崩,跌打肿痛,牙痛,瘰癧,痢疾,湿疹,皮炎。

#### 7250091a

*Solanum xanthocarpum* Schrad. et Wendl.

植物名 黄果茄《中国植志》

药材名 黄果茄《汇编》

文献名 黄颠茄《广西药志》

地方名 黄水茄(福建、台湾),刺茄(福建、湖北);福建:黄打破碗(晋江),金银茄,有刺拦路虎,麒麟橘,孩儿锤,红柑刺,黄淘茄;台湾:刺茄,钮仔叶,水茄头;四川:天刺果,刺天果(金阳),黄果珊瑚,马刺;云南:野茄果、大苦果(河口),磨莫仔养(禄劝)。

功效 根、果实、种子:清热利湿,消瘀止痛。用于睾丸炎,牙痛,头部发疮,手足麻痹,拔脓头。

#### 7250092

*Tubocapsicum anomalum* (Franch. et Sav.) Makino ---

*Capsicum anomalum* Franch. et Sav.

植物名 龙珠《中国植志》

药材名 龙珠《药性论》、《汇编》

文献名 赤珠《药性论》,龙珠子《本草拾遗》,龙珠根《福建民间草药》

地方名 浙江:灯笼珠草(临安),野靛青(鄞县);江西:大龙葵,山野辣椒;福建:红珠草。

功效 果实、根、茎、叶:清熱解毒,除煩熱。用于惡瘡,疖腫。

### 7251 旋花科 Convolvulaceae

#### 7251001

*Aniseia biflora* (L.) Choisy --- *Ipomoea sinensis* (Desr.)

Choisy --- *I. hardwickii* Hemsl. ex Forb. et Hemsl.

植物名 心萼薯《中国植志》

药材名 心萼薯《广西药志》

文献名 哈氏牵牛《广西药志》

地方名 毛牵牛(广东、广西);广西:〔满山香〕(大瑞山),老虎豆,亚灯堂,华陀花,黑面藤,箭番薯。

功效 全草:用于感冒,小儿疳积,跌打损伤,蛇咬伤,蛇头疮,实热便秘。

7251002 见 7251007a

#### 7251003

*Argyreia acuta* Lour.

植物名 白鹤藤《中国植志》

药材名 白鹤藤《本草求真》、《中药大辞典》

文献名 〔白毛藤〕《品种论述》

地方名 一匹绸(广西、云南),〔白背叶〕、白背绸、白背丝绸、白背藤、银背藤(广东、广西),白底丝绸(广东、云南);广东:白牡丹(汕头),绸缎叶(广州),白膏药根;海南:白面割鸡藤,银背叶;广西:白背丝(苍梧),白背水鸡(玉林、陆川、北流),白背绸缎,白面水鸡(陆川),白被绸缎,女苑(贵县),绸缎木叶,绸缎藤。

功效 全草、根、藤及叶:祛风利尿,化痰止咳,止血活络,拔毒生肌。用于肾炎水肿,肝硬化腹水,风湿疼痛,内伤吐血,崩漏,白带,急慢性支气管炎,跌打损伤。外用于乳腺炎,疮疖脓肿,湿疹,梅毒。

#### 7251004

*Argyreia capitata* (Vahl) Arn. ex Choisy.

植物名 头花银背藤《中国植志》

文献名 硬毛白鹤藤《海南植志》

地方名 海南:毛藤花。

功效 叶:生肌止痛。用于跌打损伤。

#### 7251005

*Argyreia obtusifolia* Lour.

植物名 银背藤《中国植志》

药材名 银背藤《汇编》

文献名 钝叶白鹤藤《广西植志》,黄毛白鹤藤《海南植志》

地方名 一匹绸、白面水鸡、白鹤藤、绸缎根(广东、广西);广西:白底丝绸、白背绸缎、白鹤藤、白鹤藤(北海);云南:合包叶。

功效 全草、根、藤、叶:祛风利尿,化痰止咳,止血活络,拔毒生肌。用于跌打损伤,内伤吐血,血崩,白带,子宫脱垂,喘咳。

#### 7251006

*Argyreia osyrensis* (Roth) Choisy var. *cinerea* Hand.

-Mazz.

植物名 灰毛白鹤藤《中国植志》

文献名 灰毛聚花白鹤藤《云南植志》,聚花白鹤藤《海南植志》,藤本夜关门《汇编》,聚花银藤《云南药志》

地方名 云南:白叶藤、奶浆藤、灯笼藤(红河),红心果(景洪)。

功效 叶、根:消炎收敛。用于子宫脱垂,偏头痛,外伤出血,脱肛,喘咳。



**7251007**

*Argyreia pierreana* Bois --- *A. liliiflora* C. Y. Wu ex C. Y. Wu et Li

植物名 东京银背藤《中国植志》

药材名 一匹绸《云南药录》

文献名 紫苞银背藤《汇编》

地方名 广西:牛白藤(龙州),个吉芸;云南:滇一匹绸。

功效 藤叶:用于跌打损伤,风湿疼痛,急慢性支气管炎,崩漏,内外出血,湿疹,痈疮溃烂,乳腺炎。

**7251007a**

*Argyreia segunii* (Levl.) Van. ex Levl.

植物名 白花银背藤《中国植志》

药材名 白花银背藤《汇编》

文献名 山牡丹《云南中草药》

地方名 广西:白面水鸡(宁明、北流),白牛藤(龙州),白背藤,芡藤(凌云),[黄藤],旋花藤,[葛藤](德保),跌打王,[藤续断]。

功效 全草、根、藤、叶:祛风利尿,化痰止咳,止血活络,拔毒生肌。用于骨折,内伤出血,咳嗽。

**7251008**

*Argyreia wallichii* Choisy

植物名 大叶银背藤《中国植志》

地方名 云南:小团叶,[羊角藤](临沧),猴子烟袋花(勐海)。

功效 根:用于乳腺炎。

**7251009**

*Blinkworthia convolvuloides* Prain

植物名 苞叶藤《中国植志》

药材名 苞叶藤《元江哈尼族药》

地方名 广西:马铃铛(田东);云南:“喝笔着科”(元江哈尼语),鸡帐蓬(建水)。

功效 根:养血安神,益气升提。用于惊悸怔忡,子宫脱垂,小儿腹胀,胃脘痛。

**7251010**

*Calonyction aculeatum* (L.) House

植物名 月光花《中国植志》

药材名 月光花《广西药录》

文献名 天茄儿《救荒本草》

地方名 广西:[牵牛子];云南:嫦娥奔月(昆明)。

功效 全株:用于蛇伤;种子:用于跌打肿痛,骨折。

备考 本植物种子在广西曾误充牵牛子用,应注意鉴别。

**7251011**

*Calonyction muricatum* (L.) G. Don

植物名 丁香茄《中国植志》

药材名 丁香茄《救荒本草》

文献名 天茄《救荒本草》,天茄子《名实图考》,多刺月光花《中药志》

地方名 广西:跌打豆(忻城);云南:[牵牛子]。

功效 叶:用于胃脘痛;种子:外用于跌打损伤。

菲律宾以其种子作蛇药和泻药用。

**7251012**

*Calystegia dahurica* (Herb.) Choisy --- *Convolvulus dahurica* Herb. --- *Calystegia japonica* auct. non Choisy --- *C. sepium* (L.) R. Br. var. *dahurica* (Herb.) Hand.-Mazz.

植物名 毛打碗花《中国植志》

药材名 毛打碗花《北京植志》

地方名 马刺楷(甘肃、青海)。

功效 根及全草:清热,滋阴,降压,利尿。

**7251013**

*Calystegia hederacea* Wall.

植物名 打碗花《救荒本草》、《中国植志》

药材名 面根藤《分类草药性》、《中药大辞典》

文献名 藟子根、兔儿苗、狗儿秧、秧子根、藤长苗、旋菜、缠枝牡丹、穠花《救荒本草》,铺地参、打破碗、盘肠参《滇南本草》,[通草]、燕覆子《名实图考》,奶浆藤《分类草药性》,面根草、狗儿完《天宝本草》,长春藤叶天剑《中国北部植图》,长春藤大箭《田间的杂草》,钩儿藤《峨眉药植》,长春藤打碗花《东经》

地方名 大碗花(东北),小打碗花(陕西、甘肃、宁夏),小旋花(陕西、江苏、四川);天津:燕藟苗;山西:旋花苦蔓;内蒙古:“阿亚根-其其格”(蒙名),天剑草;陕西:狗耳秧,狗儿蔓;甘肃:童小苗;山东:夫子苗(沂水、威海),扶苗,扶子苗;江苏:小牵牛,扶七秧子,扶秧,扶母苗,兔耳草,富苗秧,傅斯劳草,辅秧;浙江:泥灯芯(浙南),野番薯花(临安);湖北:藤儿苗;四川:狗儿碗(蓬溪),狗儿丸,狗耳丸,狗耳苗,南面根,钩耳藤,喇叭藤;云南:老母猪草,铺地参;其他:燕藟苗。

功效 根茎:健脾益气,利尿,调经止带。用于脾虚,消化不良,小儿疳积,月经不调,白带,淋病,乳汁稀少;花:止痛 外用子牙痛。

**7251014**

*Calystegia pellita* (Ledeb.) G. Don

植物名 藤长苗《名实图考》、《中国植志》

药材名 藤长苗《安徽中草药》

文献名 缠绕天剑、脱毛天剑《中国北部植图》

地方名 山东:大扶子苗(沂水、益都),小扶子苗(昌乐);江苏:[野山药],野兔子苗;安徽:大土垠苗,打碗花,兔耳苗,狗藤花,福儿苗;河南:毛胡弯,狗儿秧。

功效 全草:益气利尿,强筋续骨,活血祛瘀。用于劳倦乏力,急性肾炎,跌打肿痛,跌打伤筋。

**7251015**

*Calystegia sepium* (L.) R. Br.

植物名 旋花《名实图考》、《中国植志》

药材名 旋花《本经》、《中药大辞典》

文献名 藟《诗经》,藟、瓠茅《尔雅》,筋根、金沸[花名]《本经》,藟《说文》,美草《别录》,山姜《本草经集注》,燕藟(陆玑《诗疏》),藟、旋藟《唐本草》,旋花苗《本草拾遗》,藟旋《四声本草》,鼓子花,续筋根,纯肠草《图经》,旋藟草根《救急方》,藟子根《救荒本草》,天剑草《纲目》,饭藤《名实图考长编》,串一枝莲《盛京通志》,

麦根藤儿、鸡屎条《植物名汇》,〔挂金灯〕、狗儿泽《新纲》,兔儿苗《满州植录》,篱打碗花《汇编》,宽叶打碗花《东检》

地方名 打碗花(陕西、贵州),篱天剑(湖北、湖南、贵州);陕西:喇叭花;江西:吊茄子;湖北:饭豆藤,饭藤子,野苕,狗儿殃(神农架);湖南:三角枫,三棱叶,三棱花,小旋花,藤儿苗,包颈草;广西:地花节(隆林);四川:狗儿弯藤;贵州:面根藤;云南:打破碗花(昆明),罐罐花。

功效 根:清热利湿,理气健脾。用于急性结膜炎,咽喉炎,白带,疝气;花:益气,去面肝黑色;苗:丹毒,小儿热毒。

备考 各地发现有以本种种子误充牵牛子者,应注意鉴别。

## 7251016

*Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *japonica* (Choisy) Makino --- *C. japonica* Choisy

植物名 长裂旋花《中国植志》

药材名 旋花《本经》、《汇编》

文献名 狗儿释、〔挂金灯〕、牵枝牡丹《新纲》,日本天剑《东北草本植志》,日本打碗花《汇编》

地方名 陕西:苦子蔓(洛川);甘肃:兔子蔓;江苏:扶秧、扶苗秧(铜山);河南:打碗花,夫儿苗,狗娃秧,狗狗秧,夫夫根,狗狗剑;湖南:田王苗,鼓子花,饭豆藤,藤藤草;贵州:面根藤,打碗子,粉根藤,五谷根;云南:洋号花。

功效 根茎及全草:降压,利尿,接骨生肌。用于高血压,小便不利。外用于骨折,创伤,丹毒。

## 7251017

*Calystegia soldanella* (L.) R. Br. --- *Convolvulus soldanella* L.

植物名 肾叶打碗花《中国植志》

药材名 滨旋花(江苏、浙江、福建)、《汇编》

文献名 肾叶天剑《中国北部植图》

地方名 河北:喇叭花;山东:小狗筋、沙蔓(烟台),扶子苗(威海),海地瓜(崂山);江苏:砂附;浙江:马蹄草(平湖),碗碗草(镇海);福建:孝扇草,沙马藤;广东:白花马鞍藤(潮阳)。

功效 全草及根茎:祛风利湿,化痰止咳。用于咳嗽,肾炎水肿,风湿关节疼痛。

## 7251018

*Convolvulus ammannii* Desr.

植物名 银灰旋花《中国植志》

药材名 小旋花《沙漠药植》

文献名 〔漏芦〕《满蒙植汇》,旋花《东检》,亚氏旋花、沙地小旋花《沙漠药植》

地方名 内蒙古:“博尔·埃利格奈”、“彩木”(蒙名)。

功效 全草:解表,止咳。用于感冒咳嗽。

## 7251019

*Convolvulus arvensis* L.

植物名 田旋花《东北草本植志》

药材名 田旋花《宁夏中草》

文献名 打碗花《满蒙植汇》,猪草、鸡儿弯、车子蔓、曲节藤《沙漠药植》

地方名 小旋花(甘肃、四川);内蒙古:“丘杜尔·乌布斯”、“巴捷姆·戈姆巴”(蒙名);甘肃:三齿草藤,苦枝蔓,苦曲菀,喇叭花,鼓子万;宁夏:拉拉菀,野牵牛;新疆:田福花;山东:燕子草;江苏:扶田秧,扶秧苗;四川:白花藤,面根藤。

功效 全草、花、根:有毒。活血调经,止痒,止痛,祛风。用于神经性皮炎,牙痛,风湿性关节痛。

## 7251020

*Convolvulus chinensis* Ker Gawler --- *C. sagittifolium* (Fisch.) Liou et Ling --- *C. arvensis* auct. non L.

植物名 中国旋花《东北草本植志》

文献名 箭叶旋花《高植图鉴》

功效 全草:调经活血,滋阴补虚。

备考 《高植图鉴》(1974)将学名误订为 *C. arvensis* L.

## 7251021

*Cuscuta australis* R. Br.

植物名 南方菟丝子《中国植志》

药材名 菟丝子《汇编》

文献名 南菟丝子《中草药学》,大豆菟丝子《中药大辞典》,〔欧洲菟丝子〕《高植图鉴》

地方名 女萝(江苏、广东);山东:豆寄生,盘死豆;浙江:无头藤(泰顺),无根藤(温州);广东:金钱藤,飞扬藤;广西:黄丝线(南丹),露水藤(南宁)。

功效 种子:补肝肾,固精缩尿,安胎,明目,止泻;全草:用于哮喘,肺炎,肝炎,子宫脱垂。

备考 国内市售菟丝子绝大多数为本种。

## 7251022

*Cuscuta chinensis* Lam.

植物名 菟丝子《中国植志》

药材名 菟丝子《别录》、《药典》

文献名 唐《诗经》,蒙《毛诗传》,女萝、菟丝《尔雅》,兔丝子、菟芦《本经》,鄂罗、复实、菟丝实《吴普本草》,玉女、赤网、菟縷、菟累、蓐蒙《别录》,兔丘《广雅》,野狐浆草《圣惠方》,火焰草《庚辛玉册》,金丝接骨草《滇南本草》,金钱草、野狐丝《纲目》,狐丝《群芳谱》,黄丝草《本草述》,金丝草《药性考》,无根金丝草《王安卿采药志》,豆马黄、缠豆藤《李氏草秘》,吐丝子《本草求原》,莫娘藤《分类草药性》,无娘藤米米《形性鉴别》,乌麻、金抓、老秃鸱、金钱藤、天碧草、难火兰、迎阳子《新纲》,土丝《中国植物图鉴》,吐血丝《岭南采药录》,吐丝《品种论述》,经缠龙子《中药材手册》,小粒菟丝子《鉴别手册》

地方名 无根草(河北、内蒙古、陕西、江苏、台湾、河南),豆寄生(吉林、辽宁、山东、江苏、浙江、安徽、广西),无娘藤(山东、湖北、湖南、四川、贵州、云南),无根藤(安徽、江西、四川、贵州、云南、西藏),没娘藤(陕西、河南、广东、四川、贵州),金丝藤(山西、江西、湖北、湖南),黄丝(河北、山西),黄丝藤(安徽、江西),黄藤子(东北);河北:兔儿须、黄腊须(保安),山麻子,菟儿丝,

独芦丝子、黄蜡草；内蒙古：“希拉 乌日阳古”、“色尔吉 律勃如”(蒙名)；陕西：无娘子(陕南)，热堆子草；甘肃：叩先草；新疆：“色来克欣特”(维名)；山东：盘死豆，缠死豆、豆瓣、豆须子、吐须种(烟台)，龙须子，黄连丝(费县)，黄萝卜(淄博)，黄网子(章丘、昌乐、益都)，黄乱丝种子，黄湾子，麻接丝，缠丝蔓，黄乱丝；江苏：萝丝子；浙江：飞来藤(天目山)，无根有头草，有头无根草，金丝龙门草；安徽：瞌睡草；江西：无叶藤(吉安)，没叶藤(宜黄)，没爷崽(吉水)，没爷藤(南丰)；台湾：豆虎；河南：豆归王，缠龙子；湖北：罗网藤；四川：无娘藤子，禅真，雷真子；云南：黄藤叶、黄藤草(文山)，“们依是”(楚雄彝名)，雾露草，羊弦藤，老鸡白索；西藏：“朱匣凉瓦”(藏名)；其他：金黄丝子，黄浪丝。

**功效** 种子：滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。用于阳痿遗精，尿有余沥，遗尿尿频，腰膝酸软，目昏耳鸣，肾虚胎漏，胎动不安，脾肾虚泻。外用于白癞风；全草：清热，凉血，利水，解毒。用于吐血，衄血，便血，血崩，淋浊，带下，痢疾，黄疸，疔疮，热毒痒疹，痰火，筋骨疼痛，半身不遂。

#### 7251023

*Cuscuta europaea* L. --- *C. major* Bauhin

**植物名** 欧洲菟丝子《中国植志》

**药材名** 小粒菟丝子《品种论述》

**文献名** [大菟丝子]《中国北部植图》，欧菟丝子《汇编》

**地方名** 青海：菟丝子，无板藤子，黄丝子，“赛什格”(藏名)；新疆：苜蓿菟丝子；四川：金灯藤。

**功效** 种子：滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻；全草：用于肺炎，热性头痛。

#### 7251024

*Cuscuta japonica* Choisy

**植物名** 金灯藤《名实图考》、《中国植志》

**药材名** 大菟丝子《汇编》

**文献名** 毛芽藤、两头拿《名实图考》，无娘米、日本菟丝子《中国经植志》，雾水藤《广西植录》，红菟丝子《品种论述》，大无娘藤《陕西中草药》

**地方名** 菟丝子(广西、贵州、四川、湖北)，大粒兔丝子(东北、广西)，无娘藤(陕西、湖北、广西、四川、贵州、云南)，金灯笼(四川、贵州)，无根草(黑龙江、浙江)，金丝草、无根藤(浙江、广西)，没娘藤(广西、四川)；北京：金线草子；河北：大兔丝；山西：红菟丝(太行)；山东：无根藤子，豆须子；江苏：兔丝(盱眙)，罗丝种子(徐州)；浙江：飞来藤(嵊县、临安)，无头藤(平阳)，卷枝藤(温州)，山老虎，卷宁藤，金丝藤，狗嫩藤，狐狸藤，鬼际，鬼织藤，横藤；安徽：黄丝藤；河南：树归王；湖南：无桠藤(醴陵)；广西：红雾水藤(苍梧)，蜈蚣麻黄(彬县)，红无根藤；四川：金线草，兔丝草、废子草(成都)，无娘藤子，无量藤；云南：飞来花。

**功效** 种子：滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。

#### 7251025

*Cuscuta lupuliformis* Krocke

**植物名** 啤酒花菟丝子《中国植志》

**药材名** 啤酒花菟丝子《东北药用植物》

**文献名** 啤酒菟丝子《北京植志》

**功效** 种子或全草：补肝肾，明目益精，安胎。用于腰膝酸软，肾虚，阳痿，遗精，尿频余沥，消渴，头晕目眩，耳鸣，肝虚眼目昏花，视力减退，先兆流产，胎动不安，凉血，清热，利水，解毒。

#### 7251026

*Cuscuta maritima* Makino

**植物名** 海滨菟丝子《山东经植》

**药材名** 海滨菟丝子《中药大辞典》

**地方名** 山东：菟丝子。

**功效** 种子：补肝肾，明目，益精，安胎。

#### 7251027

*Cuscuta reflexa* Roxb.

**植物名** 大花菟丝子《中国植志》

**药材名** 云南菟丝子《高植图鉴》

**文献名** 展瓣菟丝子《汇编》，反折菟丝子《云南药录》

**地方名** 广西：金丝藤；云南：无根花、无娘藤(思茅)，红无娘藤(红河)，黄藤草(保山)，无娘藤米米，蛇系腰，菟丝子。

**功效** 种子：滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。

#### 7251028

*Cuscuta reflexa* Roxb. var. *anguina* (Edgeworth) C. B. Clarke

**植物名** 短柱头菟丝子《中国植志》

**功效** 种子：补肝肾，明目，益精，安胎。

#### 7251029

*Dichondra repens* Forst.

**植物名** 马蹄金《中国植志》

**药材名** 马蹄金《汇编》

**文献名** 荷包草《百草镜》，肉馄饨草《眼科要览》，金锁匙《纲目拾遗》，蔡苔《中国植物图鉴》，金挖草《广西中药志》

**地方名** 镜面草、遍地锦(福建、广东)，黄痘草(江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建、广东、广西、湖北、湖南、四川、贵州)，小金钱草(江苏、上海、浙江、福建、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南)，金挖耳(江苏、上海、广西)，小铜钱草(湖南、广西)，金钱草(江苏、浙江、安徽、福建、广西)，小马蹄草、小马蹄金(江苏、江西、广东、四川、贵州、云南)，鸡眼草(广东、广西)，螺厝草(浙江、安徽)，落地金钱(浙江、福建、贵州)，玉馄饨(江苏、上海、浙江)，螺丕草(浙江、福建、广东)，灯盏窝(江西、福建)，小灯盏(广西、四川)；浙江：小蛤蟆碗，小虾蟆碗，虾蟆碗，蒲包草，扁地锦，羊皮筋，小叶郎郎碗(温州、瑞安)，铜钱草；江西：小金钱(吉安)，小叶马蹄草(婺源)，小叶积雪草(德兴)，小叶缺碗叶(泰和)，缺灯盏(赣州)，铁灯盏；福建：马蹄香、光面草(晋江)，细本萱杓草，沙面、老鼠耳、软枝马蹄金、金钱仔、腹水草(南平)，小叶克食碗(宁化)，细叶克食碗、和尚头草(清

流), 圆钱仔(松政), 圆草仔, 螺仔丕, 田螺草; 台湾: 马茶金; 湖南: 小金莲(常德), 细铜钱草, 小铜钱, 山细铜钱(通道), 细马蹄草(新晃), 小半边钱, 地不腊, 马脚草, 星子草; 广东: 小马香、黄食草(广州), 小叶赵钱子(永安), 小号克食碗, 鱼脐草(潮安), 钏子草(陆丰、惠阳), 蛇蛸草(饶平), 蛻壳草(汕头), 过墙风; 广西: 满天星(罗城), 遍地金钱(靖西), 铺地金钱, 小灯蹄七、酒杯窝, 酒窝菜, 酒窝草; 贵州: 小螺丝草, 地蓬草; 云南: 小毛钱(昭通), 小团叶(玉溪), 小挖耳草、月亮草(文山), 马蹄草, 马蹄黄, [半边莲], 半边钱。

**功效** 全草: 清热利湿, 解毒消肿。用于肝炎、胆囊炎、痢疾、肾炎水肿、泌尿系感染、泌尿系结石、扁桃体炎、跌打损伤。

#### 7251030

*Erycibe elliptilimba* Merr. et Chun

植物名 九来龙(海南)、《中国植志》

文献名 凹脉丁公藤《海南植志》

**功效** 茎叶: 海南民间作轻泻剂, 但会引起重泻, 不可代丁公藤用。

#### 7251031

*Erycibe glaucescens* Wall. --- *E. laevigata* Wall. ex Choisy

植物名 粉绿丁公藤《中国植志》

文献名 光滑丁公藤《中药大辞典》, 光滑麻辣子(广西植录)

**功效** 藤茎: 有小毒。祛风除湿, 消肿止痛。

#### 7251032

*Erycibe obtusifolia* Benth.

植物名 丁公藤《南史》、《中国植志》

药材名 丁公藤《药典》

地方名 广东: 班无烈(化县), 包公藤、班鱼烈、猪母嚼(陆丰), 麻辣仔藤(沿海); 海南: 麻辣子。

**功效** 藤茎: 有小毒。祛风除湿, 消肿止痛。用于风湿痹痛, 半身不遂, 跌打肿痛。

**备考** 丁公藤碱Ⅱ具有较好的缩瞳、降眼压效果, 是治疗原发性青光眼有效而安全的药物。

#### 7251033

*Erycibe schmidtii* Craib

植物名 光叶丁公藤《中国植志》

地方名 海南: 丁公藤。

**功效** 藤茎: 有小毒。祛风除湿, 消肿止痛。用于风湿骨痛, 半身不遂, 跌打损伤, 是制“冯了性药酒”的原料之一。

#### 7251034

*Erycibe versatilihirta* C. Y. Ma

植物名 包公藤《云南植物研究》

药材名 包公藤(广东肇庆、陆丰)

**功效** 藤茎: 有小毒。祛风除湿, 消肿止痛。

#### 7251035

*Evolvulus alsinoides* (L.) L.

植物名 土丁桂《中国植志》

药材名 土丁桂《福建药物志》

文献名 毛棘花《云南植志》

地方名 白鸽草、白毛将、白辣花(湖南、广东、广西), 白头妹(广东、广西), (鹿含草)(福建、广东), 银丝草(湖南、广东、广西、云南); 福建: 小将军、毛将军、小毛将军(泉州), 过饥草(莆田、仙游、泉州、福清、晋江等), (鹿衔草)(福州、莆田), 小本过饥草、白蜈蚣(福州), 天地白(莆田), 小本白花草, 小本白花菜, 石南花, 泻痢草, 小鹿衔, 小过枝草, 蓝花菜草; 广东: 白铺地锦(湛江), 白毛草, 白毛莲, 分阳草, 银锁匙; 广西: 银花草(南宁), 暴臭蛇(平南), 烟油花(贵县)。

**功效** 全草: 止咳平喘, 清热利湿, 散瘀止痛。用于支气管哮喘, 咳嗽, 黄疸, 胃痛, 消化不良, 急性肠炎, 痢疾, 泌尿系感染, 白带, 跌打损伤, 腰腿痛。

#### 7251036

*Evolvulus alsinoides* (L.) L. var. *decumbens* (R. Br.) v. Ooststr.

植物名 银丝草(海南)、《中国植志》

地方名 广西: 白妹头(宁明)。

**功效** 全草: 清热止痛。用于痢疾, 蛇咬伤, 支气管哮喘, 肾虚腰痛, 跌打损伤。

7251037 见 7251041a

#### 7251038

*Ipomoea aquatica* Forsk. --- *I. reptans* Poir.

植物名 蕹菜《中国植志》

药材名 蕹菜《本草拾遗》、《汇编》

文献名 蕹菜《闽书》, 蕹菜根《分类草药性》

地方名 空心菜(福建、江苏、浙江、福建、湖南、广西、四川、贵州、云南), 藤藤菜(江苏、湖南、四川); 福建: 通菜蕹, 蕹菜, 无缝羽管, 武菜(福州); 湖南: 藤蕹菜; 广东: 水蕹菜, 通菜, 翁菜(翁源); 四川: 无心菜, 紫蕹菜, 藤儿菜; 贵州: 空筒菜; 云南: 蕹菜。

**功效** 全草及根: 清热解毒, 利尿, 止血。用于食物中毒, 黄藤、钩吻、砒霜、野菇中毒, 小便不利, 尿血, 鼻衄, 咳血、疟疾。外用于疮痈肿毒。

#### 7251039

*Ipomoea batatas* (L.) Lam. --- *Convolvulus batatas* L.

植物名 番薯《纲目》、《中国植志》

药材名 甘薯《群芳谱》、《汇编》

文献名 朱薯《闽书》, 山芋《群芳谱》, 红山药、唐薯《农政全书》, 香薯、红薯《汲县志》, 玉枕薯《台湾府志》, 金薯《甘薯录》, 番茹、土瓜、甘藷《纲目拾遗》, 地瓜《闽杂记》, 白藜《本草新注》, 西洋甘薯《中国植物图鉴》

地方名 红苕(陕西、江苏、广东、湖北、四川、云南), 白薯(北京、天津、陕西、山东、江苏、浙江、广东), 甜薯(山西、甘肃、河南); 甘肃: 洋甘薯, 蔓薯; 浙江: 番红薯; 福建: 旱薯(泉州); 广东: 番薯藤, [淮山], [山药], [山药片]; 四川: 红苕藤, 番苕藤, 红苕母子; 云南: 红土瓜, “阿鹅”(禄劝彝语)。

**功效** 块根: 补中, 和血, 益气生津, 宽胃肠, 通便秘; 藤(茎、叶): 用于吐泻, 便血, 崩漏, 乳汁不通, 痢疮。

外用于血管痉挛。

#### 7251040

*Ipomoea cairica* (L.) Sweet --- *Convolvulus cairica* L.

植物名 五爪金龙《中国植志》

药材名 五叶藤《汇编》

地方名 五爪龙、五叶茹(华南、福建), 五叶薯、五叶薯(华南); 福建: 佛见笑、五爪金龙花、紫薇(泉州); 台湾: 蕃仔藤; 广西: 上竹龙, [牵牛花](贵县), 牵牛藤, 假土瓜藤, 假薯藤(北流), [黑牵牛]。

功效 叶、块根: 清热解毒, 止咳, 除寒, 通淋利水, 用于骨蒸癆热, 咳嗽咳血, 淋症水肿, 小便不利, 癰肿疔疳; 花: 止咳除蒸。用于骨蒸癆热, 咳嗽溢血; 果: 用于跌打损伤, 虫积。

#### 7251041

*Ipomoea digitata* L.

植物名 七爪龙《中国植志》

药材名 七爪龙《汇编》

地方名 藤商陆(广东、广西), 五爪薯(福建、广西); 广东: 五爪擒龙(惠阳), 牛乳薯, 细种五爪龙; 海南: 栅手; 广西: 山苦瓜(玉林), 五爪金龙(陆川), [何首乌](平南), 苦瓜六、博白), 野番薯(北海), 野牵牛, 山东管, 山水瓜, 五爪龙, 苦瓜藤, 野商陆。

功效 根及叶: 有毒。解毒散结, 逐水消肿。用于水肿腹胀, 便秘。外用于乳腺炎, 癰疮, 淋巴结核。

#### 7251041a

*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.

植物名 小心叶薯《中国植志》

文献名 紫心牵牛《海南植志》

地方名 广东: 小红薯。

功效 种子: 逐水, 利小便。

#### 7251042

*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet

植物名 蜚藤《中药大辞典》

药材名 马鞍藤《汇编》

文献名 后藤《指示植物》, 厚藤、沙灯心《中国植志》, 二叶红薯《高植图鉴》

地方名 海茹藤(华南), 二裂牵牛、马蹄草(福建、华南), 红花马鞍藤(浙江、华南); 浙江: 滨蕹菜, 沙藤; 福建: 马蹄金, 军扇旋花, 狮藤, 海边牵牛花, 校藤; 海南: 马六藤, 海薯, 走马风, 白花藤。

功效 全草: 祛风除湿, 拔毒消肿。用于风寒感冒, 风湿关节痛, 腰肌劳损。外用于疮疖, 痔瘡。

#### 7251043

*Ipomoea pes-tigridis* L.

植物名 虎掌藤《中国植志》

文献名 虎脚牵牛《海南植志》, 毛七爪龙《广西植志》

地方名 海南: 铜钱花草, 生毛藤; 广西: 毛五掌龙, 虎掌牵牛。

功效 根: 消炎, 泻下。用于咯血, 狗咬伤, 癰疮。

#### 7251044

*Merremia boisiana* (Gagn.) v. Ooststr. --- *Ipomoea boisiana* Gagn.

植物名 金钟藤《中国植志》

药材名 金钟藤《广西药录》

地方名 云南: 假白薯(河口)。

功效 茎: 用于血虚。

#### 7251045

*Merremia boisiana* (Gagn.) v. Ooststr. var. *fulvopilosa* (Gagn.) v. Ooststr. --- *Ipomoea boisiana* Gagn. var. *fulvopilosa* Gagn.

植物名 黄毛金钟藤《中国植志》

药材名 黄毛金钟藤《广西药录》

地方名 广西: 白九前(扶绥)。

功效 全草: 用于风湿骨痛。

#### 7251046

*Merremia hederacea* (Burm. f.) Hall. f.

植物名 篱栏网《中国植志》

药材名 篱栏网《汇编》

文献名 篱栏子《岭南采药录》, 鱼黄草、三裂叶鸡矢藤《高植图鉴》, 菜菜藤《广西本草选编》, 小花山猪菜《海南植志》

地方名 广东: 连篱子、过天网、过天芒、篱栏、过天猛、流篱网、龙头网、连篱仔、金花菜菜藤(广州), 龙头洞, 迷篱仔, 奇篱网, 留栏网, 缠篱网; 广西: [何首乌](平南), 百仔, 犁头网, 蛤子花, [满山香], 蛤仔藤, 广西百仔, 鱼网草(南宁)。

功效 全草: 清热解毒, 利咽喉。用于感冒, 急性扁桃体炎, 咽喉炎, 急性结膜炎。外用于疥疮。

#### 7251047

*Merremia hirta* (L.) Merr. --- *Convolvulus hirtus* L. ---

*C. retans* L. --- *Ipomoea linifolia* Blume --- *I.*

*philippinensis* Choisy --- *Lepistemon decurrens* Hand.

-Mazz. --- *Merremia decurrens* (Hand.-Mazz.) Kiu

植物名 毛山猪菜《中国植志》

药材名 毛山猪菜《广西药录》

文献名 毛菜菜藤(广州植志), 宿苞山猪菜《海南植志》

地方名 广东: 九里草, 五月艾; 广西: 万丈丝(玉林)。

功效 全草: 外用于风湿骨痛。

#### 7251048

*Merremia hungaiensis* (Lingelsh. et Borza) R. C. Fang

--- *Ipomoea hungaiensis* Lingelsh. et Borza

植物名 山土瓜《滇南本草》、《中国植志》

药材名 滇土瓜《名实图考》

文献名 土瓜、土瓜皮、红土瓜《滇南本草》, 土蛋《遵义府志》

地方名 四川: 山萝卜、野红苕(越西), 山红苕; 贵州: 野土瓜藤(威宁); 云南: 地瓜(丽江)。

功效 块根: 健脾消积, 利湿。用于小儿疳积, 乳汁缺乏, 肝炎, 白带。外用于烧烫伤。

#### 7251049

*Merremia hungaiensis* (Lingelsh. et Brzoa) R. C. Fang  
var. *linifolia* (C. C. Huang ex C. Y. Wu et H. W. Li) R.  
C. Fang --- *Ipomoea hungaiensis* Lingelsh. et Borza var.  
*linifolia* C. C. Huang ex C. Y. Wu et H. W. Li

植物名 线叶山土瓜《中国植志》

功效 块根：用于小儿疳积，急、慢性肝炎，咳嗽，  
虚热，盗汗等。

#### 7251050

*Merremia linearifolia* R. C. Fang

植物名 线叶鱼黄草《广西药录》

地方名 广西：麻黄藤（宁明）。

功效 根：外用于牛皮癣。

#### 7251051

*Merremia sibirica* (L.) Hall. f. --- *Ipomoea sibirica* (L.)  
Pers. --- *Convolvulus sibiricus* L.

植物名 北鱼黄草《中国植志》

文献名 西伯利亚鱼黄草《高植图鉴》，心叶鱼黄草  
《秦岭植志》，西伯利亚番薯《东北草本植志》，西伯利亚  
牵牛《中药大辞典》

地方名 小牵牛花（东北）；吉林：铃当子；辽宁：〔黑  
丑〕（丹东）；贵州：钻之灵；云南：小瓢花（昆明），壮菜  
菜藤；其他：西伯利亚甘薯。

功效 种子：逐水消肿，泻下去积。用于大便秘  
结，食积腹胀；全草：用于跌打损伤，疔疮。

备考 种子在黑龙江、辽宁、内蒙古、北京、浙江充  
牵牛子，应注意鉴别。

#### 7251051a

*Merremia tridentata* (Linn.) Hall. f. ssp. *hastata*  
(Desr.) v. Ooststr. --- *Merremia hastata* (Desr.) Hall.  
f.

植物名 尖萼鱼黄草《中国植志》

文献名 戟叶菜菜藤《广西药录》，尖萼山猪菜《海南  
植志》

地方名 海南：过腰蛇，飞洋草，凉粉草，山莴萝藤  
（儋县），地旋花（琼海）；广西：万丈丝（玉林）；云南：野  
通心菜（河口）。

功效 全株：外用于骨节疼痛。

#### 7251052

*Merremia umbellata* (L.) Hall. f. ssp. *orientalis* (Hall.  
f.) v. Ooststr.

植物名 山猪菜《中国植志》

地方名 海南：山猪菜藤，假番薯，假番薯藤，小薯  
藤，菜菜藤，假红薯（琼海）；广西：土瓜藤，野薯藤，通奶  
藤（防城）。

功效 根：外用于疮毒；全草：用于乳汁不下。

#### 7251053

*Merremia vitifolia* (Burm. f.) Hall. f.

植物名 掌叶鱼黄草《中国植志》

文献名 掌叶山猪菜《海南植志》

地方名 海南：毛五爪龙，毛牵牛，假番薯；广西：黄  
花牵牛（那坡）；云南：〔红藤〕（河口），五爪龙。

功效 全株：利尿止痛。用于尿痛，淋沥，尿道炎，

胃脘。

#### 7251054

*Merremia yunnanensis* (Couch. et Gagn.) R. C. Gang  
- *Ipomoea yunnanensis* Couch. et Gagn.

植物名 蓝花土瓜《中国植志》

药材名 白云瓜《滇南本草》

地方名 山萝卜（四川、云南）。

功效 叶：用于伤寒头痛；梗（烧灰）：用于走马牙  
疳；块根：用于中风不语，半身不遂；花：用于脑漏；根  
皮：外用于鼻鼾。

7251055 见 7251051a

#### 7251056

*Operculina turpethum* (L.) S. Manso

植物名 盒果藤《中国植志》

药材名 盒果藤《汇编》

地方名 广东：紫翅藤；广西：松筋藤（南宁），红薯藤  
（贵县），水薯藤，软筋藤，假薯藤，假红茹藤，宽筋藤（南  
宁）

功效 全草：利水消肿，舒筋活络。用于水肿，人  
便秘结，骨折后期筋络挛缩，风湿骨痛。

#### 7251057

*Pharbitis nil* (L.) Choisy --- *Ipomoea nil* (L.) Roth ---  
*Convolvulus nil* L. --- *Ipomoea triloba* Thunb.

植物名 牵牛《中国植志》

药材名 牵牛子《别录》、《药典》

文献名 草金铃《雷公炮炙论》，金铃《图经》，黑牵  
牛、白牵牛《仁斋直指方》，盆瓢草《酉阳杂俎》，黑丑、白  
丑、狗耳草《纲目》，牵牛花《花镜》，勤娘子、姜花《名实  
图考》，星牵牛《汉药写真集成》，假君子《新纲》，常春藤  
叶牵牛《中国北部植图》，裂叶牵牛《高植图鉴》

地方名 二丑（华东、湖北、广西），丑牛（华东、广  
西），黑白丑（安徽、湖北、云南），牵牛郎（山东、江苏），  
喇叭花、喇叭花子（江苏、河南）；河北：狗耳草子；山东：  
将立、江良（烟台），降粮子；江苏：大碗花子，筋角拉子；  
上海：马桶花；安徽：牛郎子；台湾：碗公花；河南：江梁  
子（新乡）；湖北：大花牵牛；广西：大牵牛花；四川：紫牵  
牛，连簪簪，丑牛子（峨眉山）；贵州：打破碗花，碗碗花；  
其他：打碗花，“朝颜”（朝鲜语）。

功效 种子：有毒。泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻  
积。用于水肿胀满，二便不通，痰饮积聚，气逆喘咳，虫  
积腹痛，蛔虫病，绦虫病。

备考 《广州植志》（1956）、《中药志》（1959）等文  
献，将本种的一部分订为 *Ipomoea hederacea* Jacq. 或  
*Pharbitis hederacea* Choisy。

#### 7251058

*Pharbitis purpurea* (L.) Voigt --- *Ipomoea purpurea*  
(L.) Lam.

植物名 圆叶牵牛《中国植志》

药材名 牵牛子《药典》

文献名 黑丑、白丑《纲目》，紫花牵牛《广州植志》，  
圆叶牵牛花《东检》

地方名 牵牛花、喇叭花、二丑（内蒙古、青海、河南、

云南),毛牵牛(山西、湖北、广西),洋牵牛(陕西、云南),紫牵牛(山西、江苏),牵牛(青海、内蒙古),丑牛子(四川、云南);山西:打碗花;内蒙古:“混达干-其其格”(蒙名),串紫莲;广西:大牵牛花;四川:丑牛,连簪簪。

功效 种子:有毒。泻水通便,消痰涤饮,杀虫攻积。用于水肿胀满,二便不通,痰饮积聚,气逆喘咳,虫积腹痛,蛔虫、绦虫病。

#### 7251059

*Porana mairei* Gagn. et Courch.

植物名 小萼飞蛾藤《中国植志》

地方名 云南:红薯细辛(大姚)。

功效 根:止咳。

#### 7251060

*Porana racemosa* Roxb.

植物名 飞蛾藤《中国植志》

药材名 飞蛾藤《汇编》

文献名 小翼萼藤《广西植志》,翼萼藤《广西药志》

地方名 白花藤(贵州、云南);浙江:消食藤(临安);广西:小元宝(昭平);贵州:马郎花,打米花;云南:“六甲”(绿春哈尼语),“莫汝刚”(纳西族语)。

功效 全草:发表,消食积。用于伤风感冒,食积不消。

#### 7251061

*Porana sinensis* Hemsl. --- *P. esquirolii* Levl. --- *Vatica cordata* Hu

植物名 大果飞蛾藤《中国植志》

文献名 异萼飞蛾藤《高植图鉴》,飞蛾藤《广西植志》

地方名 贵州:大青藤(凤岗)。

功效 根:破血,行气,消肿毒。用于癆伤疼痛,高烧。

#### 7251062

*Porana spectabilis* Kurz

植物名 美飞蛾藤《中国植志》

药材名 美飞蛾藤《广西药志》

地方名 广西:毛藤(来宾)。

功效 全株:用于子宫脱垂,跌打损伤。

#### 7251063

*Porana spectabilis* Kurz var. *megalantha* (Merr.) How --- *P. megalantha* Merr.

植物名 大花飞蛾藤《中国植志》

药材名 大花飞蛾藤《广西药志》

地方名 广西:知列藤(天等)。

功效 全株:用于胸痛。

#### 7251064

*Quamoclit pennata* (Desr.) Boj. --- *Convolvulus pennatus* Desr.

植物名 莠萝松《名实图考》、《中国植志》

药材名 金凤毛《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 翠翎草(汪连仕《采药书》),女罗《汉音韵府》,莠萝《花历百咏》

地方名 广东:锦屏封(广州),广西:金丝线(南宁),

五角星(鹿寨),云南:龙须草。

功效 叶、种子:清热解表,拔脓生肌;叶:外用于痔疮;种子:用于便秘。

### 7252 玄参科 Scrophulariaceae

#### 7252001

*Adenosma glutinosum* (L.) Druce --- *A. caeruleum* R. Br. --- *A. glutinosum* (L.) Druce var. *caeruleum* (R. Br.) Tsoong

植物名 毛麝香《中国植志》

药材名 毛麝香《生草药性备要》、《汇编》

文献名 五凉草《岭南采药录》,小花毛麝香《海南植志》,蓝色毛麝香《广西药志》

地方名 蓝花草、酒子草(广东、广西);广东:饼草(广州),凉草、山薄荷、五郎草(新会),川麝香(罗定),射香草(清远),三枝香(乐昌),[荆芥](高鹤、五华),[土荆芥](陆丰、普宁),毛老虎;广西:[茵陈](博白),土茵陈(贺县),香鸡(乐业),[香草]、六郎草、[血见愁](玉林),甘脑(上林),辣蓼、辣鸡(陆川),雾水草(容县),酒饼公、咸虫草(北流),九层楼(龙州),黄蜂花草(平南、玉林),伍面草、收背草(平南),[苦草];云南:解菜(屏边)。

功效 全草:祛风止痛,散瘀消肿,解毒止痒。用于小儿麻疹初期,受凉腹痛,风湿骨痛,跌打肿痛,痈疽肿毒,黄蜂螫伤。外用于湿疹,荨麻疹。

#### 7252002

*Adenosma indianum* (Lour.) Merr.

植物名 球花毛麝香《中国植志》

药材名 大头陈《岭南采药录》、《汇编》

地方名 黑头草、神曲草(广东、广西);广东:千锤草,乌头风,土夏枯草,假薄荷(广州),石棘、石辣、紫石棘、地松茶、地松菜(阳春);广西:沙虫药,波香(博白),山薄荷(钟山、昭平、玉林),[夏枯草](桂平),黑头风(贵县),[兰香草](玉林)。

功效 全草:疏风解表,化湿消滞。用于风寒感冒,咳嗽,头痛,消化不良,腹胀泄泻。

#### 7252003

*Adenosma retusilobum* Tsoong et Chin

植物名 凹裂毛麝香《中国植志》

地方名 广西:山薄荷(岑溪),毛麝香(梧州)。

功效 全草:用于跌打损伤。

#### 7252004

*Alectra arvensis* (Benth.) Merr. --- *Melasma arvense* (Benth.) Hand.-Mazz.

植物名 黑蒺《中国植志》

药材名 黑蒺《汇编》

地方名 广西:红根草(南丹、凌云);云南:化血胆(思茅),小化血草、小野蚕豆、小季季草(红河)。

功效 全草:祛湿,平肝,散瘀活血。用于黄疸型肝炎,肝脾大,跌打损伤瘀肿,痛经;根:用于功能性子宫出血,更年期综合症,产后流血过多等。

#### 7252005

*Anurhinum majus* L.

植物名 金鱼草《高植图鉴》

药材名 龙头花(山东、上海、江苏)

文献名 龙头木樨《云南种录》

地方名 洋彩雀(广东、广西);上海:龙口花;广东:彩雀(广州)。

功效 全草:清热,凉血,消肿。外用于痈疮肿毒,跌打扭伤。

#### 7252006

*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.

植物名 假马齿苋《中国植志》

药材名 白花猪母菜《汇编》

地方名 广东:白母猪菜(汕头);广西:细种过塘蛇(防城)。

功效 全草:清热凉血,解毒消肿。用于痢疾,目赤肿痛,丹毒,痔疮肿痛。外用于象皮肿。

#### 7252007

*Brandisia cauliflora* Tsoong et Lu

植物名 茎花来江藤《中国植志》

药材名 茎花来江藤《广西药录》

地方名 广西:红花金银藤(天等)。

功效 全株:舒筋活络。用于风湿骨痛。外用于骨折。

#### 7252008

*Brandisia discolor* Hook. f. et Thoms.

植物名 异色来江藤《中国植志》

药材名 异色来江藤《云南药录》

功效 根:杀菌消肿。用于痢疾。

#### 7252009

*Brandisia hancei* Hook. f.

植物名 来江藤《中国植志》

药材名 蜜桶花(云南)

文献名 小叶来江藤(树分)

地方名 蜂糖罐(湖北、贵州);湖北:奶江藤(神农架);广西:野算盘(凌云);四川:猫花,蜂糖花;贵州:猫咪花(绥阳),小叶毒鱼藤(安顺),大王来江藤;云南:蜜通花(红河、文山),蜜蜂花(红河),蜜糖罐(文山),蜂蜜果,蜂蜜花,铁林杆,小白叶(曲靖),叶上花(昆明),野连翘,“表依图乌鲁诺”(楚雄彝语),连翘(玉龙山)。

功效 全株:清热解毒,祛风利湿。用于骨髓炎,骨膜炎,黄疸型肝炎,跌打损伤,风湿筋骨痛。外用于疮疖。

#### 7252010

*Brandisia kwangsiensis* Li

植物名 广西来江藤《高植图鉴》

药材名 广西来江藤《广西药录》

功效 叶:用于咳嗽。

#### 7252011

*Brandisia swinglei* Merr.

植物名 岭南来江藤《中国植志》

药材名 岭南来江藤《广西药录》

功效 根:清热解毒;叶:外用于梅毒。

#### 7252012

*Buchnera cruciata* Hamilt.

植物名 黑草《中国植志》

药材名 黑草《生草药性备要》、《汇编》

文献名 鬼羽箭《生草药性备要》,坡饼《海南植志》

地方名 福建:墨草(闽南);广东:黑骨草,羽箭,羽箭草,黑鬼草;海南:铁线草(临高);广西:幼克草、克草(南宁),〔夏枯草〕(博白),舒筋赶血草。

功效 全草:清热解毒。用于流感,中暑腹痛,蛛网膜下腔出血,荨麻疹,癫痫。

#### 7252013

*Centranthera brunoniana* Wall.

植物名 台湾胡麻草(拟)

药材名 金锁匙《台湾中药材图鉴》

功效 茎叶:助消化。用于脾脏病。

#### 7252014

*Centranthera cochinchinensis* (Lour.) Merr.

植物名 胡麻草《中国植志》

药材名 胡麻草《思茅本草》

文献名 蓝胡麻草《云南药录》

地方名 广西:五寸疳(贺县),黄脚疳(昭平、柳州);贵州:黑草;云南:“皮虎怀”(傣语)。

功效 全草:消肿散瘀,止血止痛。用于咯血,吐血,跌打内伤瘀血,风湿性关节炎。

#### 7252015

*Centranthera cochinchinensis* (Lour.) Merr. var. *longiflora* (Merr.) Tsoong

植物名 长花胡麻草《中国植志》

药材名 长花胡麻草《广西药录》

地方名 广西:大叶独脚金(上林)。

功效 全草:用于小儿疳积。

#### 7252016

*Centranthera cochinchinensis* (Lour.) Merr. var. *nepalensis* (D. Don) Merr.

植物名 西南胡麻草《中国植志》

功效 全草:消肿散瘀,止血止痛。

#### 7252017

*Centranthera grandiflora* Benth.

植物名 大花胡麻草《中国植志》

药材名 金猫头(广西)、《汇编》

地方名 云南:化血丹、灵芝草、野蚕豆、滑野蚕豆、小红药(红河)。

功效 根:活血调经,舒筋活络,止痛。用于闭经,痛经,崩漏,跌打损伤,风湿骨痛。外用于外伤出血。

#### 7252018

*Cymbaria dahurica* L.

植物名 达乌里苕芭《中国植志》

药材名 苕芭《内蒙古中草药》

文献名 大黄花《高植图鉴》

地方名 内蒙古:“苕玛芭”(蒙名),白蒿茶,兴安苕芭。

功效 全草:祛风湿,利尿,止血。用于风湿关节



炎,月经过多,吐血,衄血,便血,外伤出血,肾炎水肿,黄水疮。

#### 7252019

*Cymbaria mongolica* Maxim.

植物名 蒙古苘芭《中国植志》

文献名 光药大黄花《高植图鉴》

功效 全草:祛风湿,利尿,止血。

#### 7252020

*Digitalis lanata* Ehrh.

植物名 毛花毛地黄《浙江药植志》

药材名 狭叶洋地黄叶(拟)

文献名 洋地黄《药材学》,狭叶洋地黄、狭叶毛地黄、法国毛地黄、希腊毛地黄、白花毛地黄、毛花洋地黄《中国药植志》

功效 叶:强心药。

#### 7252021

*Digitalis purpurea* L.

植物名 毛地黄《中国植志》

药材名 洋地黄叶《药典》

文献名 洋地黄、地钟花《中国药植志》,紫花洋地黄《药典》

功效 叶:强心。

#### 7252022

*Dodartia orientalis* L.

植物名 野胡麻《中国植志》

药材名 倒爪草《汇编》

文献名 紫花秧《中药大辞典》,倒打草、刺儿草、牛汉水、道爪草《沙漠药植》,倒倒草、斗斗草、果果草《中草药通讯》

地方名 多德草(内蒙古、新疆),紫花远志、[远志](西藏、新疆);内蒙古:紫花草,“宝日-其其格”(蒙名);甘肃:牛含水。

功效 根或全草:清热解毒,散风止痒。用于上呼吸道感染,肺炎,气管炎,扁桃体炎,淋巴结炎,尿道感染,神经衰弱。外用于皮肤瘙痒,湿疹。

#### 7252023

*Ellisiophyllum pinnatum* (Wall.) Makino

植物名 幌菊《中国植志》

药材名 幌菊《贵州药录》

功效 全草:滋阴润燥,平肝明目。用于头晕目眩,肺热咳嗽,黄疸。

#### 7252024

*Euphrasia pectinata* Ten. --- *E. tatarica* Fisch. ex Spreng.

植物名 小米草《中国植志》

药材名 小米草(西北)

文献名 芒叶小米草《汇编》

功效 全草:清热解毒。用于咽喉肿痛,肺炎咳嗽,口疮。

#### 7252025

*Euphrasia pectinata* Ten. subsp. *simplex* (Freyn) Hong  
--- *E. tatarica* var. *simplex* (Freyn) Yamazaki --- *E.*

*maximowiczii* Wettst.

植物名 高枝小米草《高植图鉴》

文献名 芒小米草《中药大辞典》

地方名 四川:“尼布兹尔鲁”(若尔盖藏名)。

功效 全草:清热解毒。用于咽喉肿痛,肺炎咳嗽,口疮,痢疾。

#### 7252026

*Euphrasia regelii* Wettst.

植物名 短腺小米草《中国植志》

文献名 小米草《西藏中草》

地方名 西藏:“心木涕区类”(藏名)。

功效 全草:清热,除烦,利尿。用于热病口渴,头痛,小便不利。

#### 7252027

*Hemiphragma heterophyllum* Wall.

植物名 鞭打绣球《中国植志》

药材名 鞭打绣球《名实图考》、《汇编》

地方名 [连钱草](云南、西藏);四川:滚山珠、[四季青](凉山),羊膜草、一串钱(冕宁);贵州:红顶珠;云南:地草果、小红豆(东川),地胡椒,地红参,抓地虎,红豆草(大理),红豆子草,红果草,〔头顶一颗珠〕(楚雄),佛顶珠(思茅),顶珠草、底线果、元当草(红河),〔活血丹〕,四季草,小铜锤,小仲筋草(丽江),〔金钱草〕,金钩如意(曲靖),雀卧丹、冰盘摆果(保山),龙袍玉带(临沧),玉带草,抽筋草,月月换叶;西藏:“区茹程丹”(藏名)。

功效 全草或根:活血调经,舒筋活络,祛风除湿。用于经闭,月经不调,肺结核,扁桃体炎,跌打损伤,风湿腰痛。外用于湿疹,疮疡,口腔炎。

#### 7252028

*Lagotis alutacea* W. W. Smith

植物名 革叶兔耳草《中国植志》

药材名 厚叶洪连(拟)

文献名 厚叶兔耳草《高植图鉴》,洪莲、革叶洪莲《中草药通讯》

功效 全草:清热解毒。用于小儿高热抽搐或高热吐泻。

#### 7252029

*Lagotis brachystachya* Maxim.

植物名 短穗兔耳草《中国植志》

药材名 短穗洪连(拟)

地方名 青海:“直打洒曾”(藏名)。

功效 全草:用于清肺胃瘀血,排脓。

#### 7252030

*Lagotis breviflora* Maxim.

植物名 短筒兔耳草《中国植志》

药材名 洪连《药典》附录

文献名 短筒兔耳草《青藏药图》

地方名 青海:“红林”(藏名)。

功效 带根全草:清热解毒,降血压。

#### 7252031

*Lagotis clarkei* Hook. f.

植物名 大萼兔耳草《中国植志》  
 药材名 大萼洪连(拟)  
 文献名 显萼兔耳草《汇编》  
 功效 带根全草:清热解毒,降血压。用于急慢性肝炎,高血压,乳腺癌。

## 7252032

*Lagotis glauca* Gaertn.

植物名 兔耳草《药典》附录)  
 药材名 洪连《药典》附录)  
 文献名 藏黄连《汇编》  
 功效 全草:清热解毒,行血调经。用于五脏有热,血分热毒,急、慢性肝炎,月经不调,高血压。

## 7252033

*Lagotis integra* W. W. Smith

植物名 全缘兔耳草《中国植志》  
 药材名 全缘洪连《中草药通讯》  
 文献名 全缘叶兔耳草《高植图鉴》,洪连《中草药通讯》

功效 全草:清热解毒。用于小儿高热抽搐或高热吐泻。

## 7252034

*Lagotis kunawurens* (Royle) Rupr.

植物名 噶穆兔耳草《西藏植志》  
 药材名 噶穆洪连(拟)  
 功效 全草:清热解毒,行血调经。

## 7252035

*Lagotis praecox* W. W. Smith

植物名 紫叶兔耳草《中国植志》  
 药材名 洪连《迪庆藏药》  
 功效 全草:清热解毒,清血,除烦。用于“赤巴”高热,烦热,诸脏热,血热,肠痧,炭疽,疮热,刺痛,损伤。

## 7252036

*Lancea tibetica* Hook. f. et Thoms.

植物名 肉果草《中国植志》  
 药材名 肉果草《民族药志》  
 文献名 兰石草《兰州植物通志》,兰石草果《西藏中草药》,蓝石草《云南种录》

地方名 四川:“瓦牙瓦”(若尔盖藏名);西藏:“巴亚巴”、“哇牙巴”、“巴雅杂瓦”(藏名)。

功效 花、果:用于心脏病,血瘀,肠绞痛,肠粘连。

## 7252037

*Limnophila aromatica* (Lam.) Merr.

植物名 紫苏草《中国植志》  
 药材名 水芙蓉《广州部队《中草药》》  
 文献名 止咳草、水管草、香石龙尾《汇编》  
 地方名 三叉草(广东、广西);台湾:水胡椒,田香草;广东:麻雀草,水管筒,水薄荷,软骨倒水莲;海南:水花,双漫草;广西:马上消(苍梧),水筒管、通关草、白指甲花(平南)。

功效 全草:清热解毒,消肿止痒。用于毒蛇咬伤,疮痈肿毒,癣,皮肤瘙痒。

## 7252038

*Limnophila chinensis* (Osb.) Merr.

植物名 中华石龙尾《中国植志》  
 药材名 中华石龙尾《汇编》  
 文献名 华石龙尾《广西本草选编》  
 地方名 广西:水八角(蒙山),过塘蛇(北流),风肿草、水谷毛、狗毛药、小牛蛆草(平南),蛤胆草,肖紫草。  
 功效 全草:清热利尿,凉血解毒。用于水肿,结膜炎,风疹,天疱疮,毒蛇、蜈蚣咬伤。

## 7252039

*Limnophila connata* (Buch.-Ham. ex D. Don) Hand.-Mazz.

植物名 抱茎石龙尾《中国植志》  
 地方名 贵州:瓜米菜,水瓜米菜。  
 功效 全草:清热解毒,利湿消肿。用于风湿热痛,水肿,疮疡肿疖。

## 7252040

*Limnophila rugosa* (Roth) Merr.

植物名 大叶石龙尾《中国植志》  
 药材名 水茴香《分类草药性》、《汇编》  
 文献名 田根草《分类草药性》,皱叶石龙尾《红河中草药》

地方名 水八角(广西、云南),水丁香(浙江、福建);福建:水茴香(泉州),黑沉香、水里薄荷(闽侯),水沉香;广东:八角草;海南:假毛菽草;广西:水痞根(平南),水云草(贵县);四川:水荆芥;云南:水薄荷(红河)。

功效 全草:清热解表,祛风除湿,止咳止痛。用于感冒,咽喉肿痛,肺热咳嗽,支气管炎,胃痛。外用于天疱疮。

## 7252041

*Limnophila sessiliflora* (Vahl) Blume

植物名 石龙尾《中国植志》  
 药材名 石龙尾《湖南药物志》  
 地方名 江西:菊藻(德兴);台湾:双柳痕;湖南:虱婆草;广西:假水八角。  
 功效 全草:用于头虱,疮疖肿毒。

## 7252042

*Linaria vulgaris* Mill. subsp. *acutiloba* (Fisch. ex Rchb.) Hong --- *L. acutiloba* Fisch. ex Rchb.

植物名 新疆柳穿鱼《中国植志》  
 文献名 柳穿鱼《新疆中草药》  
 功效 地上部分:清热解毒,散风止痒。

## 7252043

*Linaria vulgaris* Mill. subsp. *sinensis* (Bebeaux) Hong

植物名 柳穿鱼《中国植志》  
 药材名 柳穿鱼《内蒙古中草药》  
 文献名 水木樨花《遵生八笺》  
 地方名 北京:荷风兰;内蒙古:“浩尼·扎古鲁西”(蒙名);陕西:黄花柳穿鱼;江苏:面条菜(盱眙)。  
 功效 地上全草:清热解毒,散瘀消肿。用于头痛,头晕,黄疸,痔疮,便秘,皮肤痒,烫火伤。

## 7252044

*Lindenbergia philippensis* (Cham.) Benth.

植物名 钟萼草《中国植志》

药材名 钟萼草《广西药录》

地方名 广西;茸草(天等)。

功效 叶:外用于骨髓炎;全草:清热解毒,祛风除湿。用于疔疮肿毒,风湿疼痛,咽喉肿痛,风热咳嗽。

## 7252045

*Lindenbergia ruderalis* (Vahl) O. Ktze.

植物名 野地钟萼草《中国植志》

药材名 野地钟萼草《广西药录》

地方名 贵州:藨药。

功效 全草:用于疮疡肿毒,鼻龋。

## 7252046

*Lindernia anagallis* (Burm. f.) Pennell --- *L. cordifolia* (Colsm.) Merr.

植物名 长蒴母草《中国植志》

药材名 鸭嘴癩《汇编》

文献名 长果母草《高植图鉴》,长蒴母草《浙江药植志》

地方名 四方草(福建、广西);福建:四角草、惊风榴(仙游)、警风榴、双叶珠草(永春),见天红(南安、安溪),见天草,见采东(三明),合香草(福鼎),鸡舌癩(漳浦),羊角草、陌上番椒(莆田),白剑花草(厦门),定经草(泉州、厦门、晋江、福清等),白莲草,田素馨(泉州),田边草(宁化),茄珠子,毒药子,过路蜈蚣;广东:双须蜈蚣、双须公、田槟榔(潮汕),两须草(海丰),盐水蜈蚣(潮阳),咸水蜈蚣、胶维饭、秤槌草(惠来),蛇针草、白花金雀、田蜈蚣(潮安),孩儿草(澄海);广西:水辣椒(藤县、岑溪、玉林、博白、平南),蓝花仔(陆川),车轮草(大瑶山),番背红(平南),[犁头草](贵县),耳挖草(容县),[鹅不食草](临县);四川:小接骨,小脚草。

功效 全草:清热利湿,解毒消肿。用于扁桃腺炎,咳嗽,肠炎,小儿消化不良,痢疮疔毒。

## 7252047

*Lindernia angustifolia* (Benth.) Wettst. --- *L. micrantha* D. Don

植物名 狭叶母草(海南)、《中国植志》

药材名 羊角草(福建晋江)、《中药大辞典》

文献名 窄叶母草《汇编》,陌上番椒《中药大辞典》

地方名 福建:田素香、田香蕉(晋江);贵州:羊角桃,蛇舌草,蛇儿草。

功效 全草:清热利湿,和胃,祛瘀。用于黄疸,痢疾,急性胃肠炎,急性喉炎,扁桃腺炎,跌打损伤。

## 7252048

*Lindernia antipoda* (L.) Alston --- *Ilysanthes antipoda* (L.) Merr.

植物名 泥花草《中国植志》

药材名 水虾子草《四川中药志》

地方名 定经草(福建、台湾),鸭嘴草(广东、广西);江苏:陌上菜(苏南);福建:田素馨(泉州),鸭舌草(厦门);台湾:鸡舌癩,鸭舌癩;广东:淹水芽江,白芽江,芽

江草,水蜈蚣(普宁),蟹叉草(饶平),猪豆树(增城),米碎草(海康);广西:紫照胆(贵县),水辣椒(岑溪、玉林),五马巡城(蒙山),菩萨鱼尾(平南),四方草,鱼尾草。

功效 全草:逐瘀,消肿,解毒,利尿。用于跌打损伤,痢疮疔毒,淋病。

## 7252049

*Lindernia ciliata* (Colsm.) Pennell --- *Ilysanthes serrata* (Roxb.) Urban --- *L. ciliata* (Colam.) O. Ktze.

植物名 刺齿泥花草(海南)、《中国植志》

药材名 锯齿草《汇编》

文献名 岗叶母草《汇编》,齿叶泥花草《广西本草选编》

地方名 定经草(台湾、福建);福建:鸭嘴癩;广东:地下茶(惠阳);广西:菩萨鱼草,车轮草、旱田草、瓜子莲(桂林),[一支箭](忻城),阴锯草(平南),迫及草(玉林),五月莲(来宾);其他:耳环草,龟药。

功效 全草:清热解毒,祛瘀消肿,止痛。用于毒蛇咬伤,跌打损伤,产后瘀血腹痛。外用于疮疖肿毒。

## 7252050

*Lindernia crustacea* (L.) F. Muell

植物名 母草《中国植志》

药材名 母草《名实图考》、《汇编》

地方名 四方草(广东、广西、浙江),细牛毒、气痛草、香辣椒(广东、广西);福建:盒仔草、蝴蝶翼、天球草(泉州);江西:公母草;广东:四方拳草(惠阳),四方仔(郁南),小叶蛇针草,铺地草(广州),蛇通管,[蛇总管],蟹目草;海南:四方拳;广西:水辣椒(博白),小形四方草(玉林),小叶四方草(防城),普地莲,红菩萨鱼(平南),大叶水辣椒;贵州:开怀草。

功效 全草:清热利尿,解毒。用于细菌性痢疾,肠炎,消化不良,肝炎,肾炎水肿,白带。外用于痢疳肿毒。

## 7252051

*Lindernia montana* (Blume) Koord. --- *L. mollis* (Benth.) Wettst.

植物名 红骨草《中国植志》

药材名 红骨草《广西药录》

地方名 广西:狗毛草(北流)。

功效 全草:外用于乳痈,跌打损伤。

## 7252052

*Lindernia nummularifolia* (D. Don) Wettst. --- *Vandellia chinensis* Yamazaki

植物名 宽叶母草《中国植志》

药材名 小地扭(贵州草药)

文献名 圆叶母草《汇编》,铜钱叶母草《广西植录》

地方名 四川:五角菱;云南:“阿头麻车多”(哈尼语),野苞麦,[苦草];其他:飞疗药。

功效 全草:清热解毒,凉血。用于呛咳出血,疔疮,蛇咬伤,狂犬病。

## 7252053

*Lindernia oblonga* (Benth.) Merr. et Chun

植物名 梭萼母草《中国植志》

文献名 公母草、四方草《汇编》

功效 全草：清热解毒，收敛止泻。用于痢疾腹泻，肠炎，疖肿。

#### 7252054

*Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox --- *Lindernia pyxidaria* L.

植物名 陌上菜《中国植志》

药材名 陌上菜《广西药志》

文献名 母草《江苏南部种册》，〔通泉草〕《贵州植志》

地方名 福建：马街草（厦门）；广东：〔白猪母菜〕（普宁）；广西：对坐神仙（环江）。

功效 全草：用于血尿。

#### 7252055

*Lindernia ruellioides* (Colsm.) Pennell

植物名 旱田草《中国植志》

药材名 旱田草《汇编》

地方名 福建：调经草（福安、宁化），鸭嘴癩（龙溪地区），田素香、定经草（漳州、诏安、同安），菜瓜香、白花仔（政和），双头锁、八十缺（福州）；广东：剪席草（万宁）；广西：田螺草、鱼尾草（北流），肯斗（龙州），〔一枝箭〕（忻城），兰地锯（藤县），锯齿草（昭平、蒙山），车轮草（大瑶山），阴锯草、菩萨鱼尾（平南）。

功效 全草：理气活血，消肿止痛。用于闭经，痛经，乳腺炎，瘰癧。外用于跌打损伤，痈肿疼痛，蛇咬伤，狂犬咬伤。

#### 7252056

*Lindernia viscosa* (Hornem.) Merr.

植物名 粘毛母草（海南）、《中国植志》

药材名 粘母草《广西药志》

地方名 见红草（华南）；台湾：〔见风红〕；广西：细毛草、水凉粉草（玉林），黄梁草（博白）。

功效 全草：用于乳痈，毒症。

#### 7252057

*Mazus gracilis* Hemsl. ex Forbes et Hemsl.

植物名 纤细通泉草《中国植志》

功效 全草：健胃，清热解毒，利尿。

#### 7252058

*Mazus japonicus* (Thunb.) O. Kuntze --- *M. rugosus* Lour. --- *M. pumilus* (Burm. f.) van Steenis

植物名 通泉草《中国植志》

药材名 通泉草《庚辛玉册》、《汇编》

文献名 斑鸠窝《植物名汇》

地方名 豆瓣菜（陕西、安徽）；安徽：尿通草，白补药；福建：虎仔草、石淋草、蛇须草（泉州），山刈菜（厦门），五角星（宁化），五瓣梅，五合梅（潮阳），土羚羊（揭阳），钟仔草（普宁），涂格盘、田白菜、肺炎草（潮安）；台湾：定经草，六角定经草；湖南：黄花仔草（长沙），野田菜（古丈），鹅肠草（新宁），奶浆草（凤凰），痲子草（桑植）；广西：白花草（柳江）；四川：乳腺草（西昌），绿蓝花（重庆）；贵州：脓泡药。

功效 全草：止痛，健胃，解毒。用于偏头痛，消化不良，疔疮，脓疱疮，烫伤。

#### 7252059

*Mazus kweichowensis* Tsoong et Yang

植物名 贵州通泉草《中国植志》

功效 全草：清热解毒，利尿消肿。

#### 7252060

*Mazus lecomtei* Bonati

植物名 莲座叶通泉草《中国植志》

文献名 〔小仙桃草〕《云南药志》

功效 全草：消炎，清热，润肺止咳。用于感冒头痛，鼻塞，黄疸型肝炎，肺热咳嗽。

#### 7252061

*Mazus miquelii* Makino --- *M. stolonifer* Makino

植物名 匍茎通泉草《中国植志》

药材名 匍茎通泉草《浙江药植志》

功效 全草：止痛，健胃，解毒。

#### 7252062

*Mazus omeiensis* Li

植物名 峨眉通泉草《峨眉药植研究》

药材名 岩白翠（峨眉山）、《中国植志》

功效 全草：散风，解毒。用于疯狗咬伤。

#### 7252063

*Mazus spicatus* Vant.

植物名 毛果通泉草《中国植志》

药材名 毛果通泉草《神农架药志》

地方名 湖北：铺地菜（神农架）。

功效 全草：用于烫伤，止血。

#### 7252064

*Mazus stachydifolius* (Turcz.) Maxim.

植物名 弹刀子菜《中国植志》

药材名 弹刀子菜《汇编》

地方名 浙江：大叶山麻油（临安）；湖北：水苏叶通泉草、四叶细辛（咸宁）；湖南：地菊花，山刀草。

功效 全草：清热，解毒，消肿。用于毒蛇咬伤，疮疖肿毒。

#### 7252065

*Melampyrum roseum* Maxim.

植物名 山罗花《中国植志》

药材名 山罗花《汇编》

地方名 浙江：球锈草（临安）；广东：石蜡花。

功效 全草：清热解毒。用于痈肿疮毒。

#### 7252066

*Melampyrum roseum* Maxim. var. *obtusifolium* (Bonati)

Hong

植物名 钝叶山罗花《神农架药志》

地方名 湖北：牛草花（神农架）。

功效 全草：清热解毒，消肿。

#### 7252067

*Mimulus szechuanensis* Pai

植物名 四川勾酸浆《中国植志》

药材名 四川勾酸浆《峨眉药植研究》

地方名 湖北:喇叭花(神农架)。

功效 全草:清热,解毒,利湿,消肿,止血。

#### 7252068

*Mimulus tenellus* Bunge var. *nepalensis* (Benth.) Tsoong

植物名 尼泊尔沟酸浆《中国植志》

药材名 铺地半枝莲《湖南药物志》

地方名 湖南:六月青;四川:猫眼睛(峨眉山)。

功效 全草:清热,解毒,利湿。用于肺炎,急性慢性肝炎,银环蛇咬伤,疮疖肿毒。

#### 7252069

*Mimulus tenellus* Bunge var. *platyphyllus* (Franch.) Tsoong

植物名 宽叶沟酸浆《中药大辞典》

药材名 猫眼睛《四川中药志》

文献名 南红藤《中国植志》

功效 全草:收敛,止泻。用于湿热痢疾,脾虚泄泻,白带。

#### 7252070

*Mimulus tenellus* Bunge var. *procerus* (Grant) Hand.-Mazz. --- *M. tenellus* Bunge subsp. *nepalensis* (Benth.)

Hong var. *procerus* (Grant) Hong

植物名 高大沟酸浆《中国植志》

药材名 猫眼睛《四川中药志》

文献名 宽萼沟酸浆《高植图鉴》

功效 全草:收敛,止泻,止带。

#### 7252071 见 7252072a

#### 7252072

*Monochasma monantha* Hemsl.

植物名 单花鹿耳草《中国植志》

药材名 单花鹿耳草《广西药录》

功效 全草:用于传染性肝炎。

#### 7252072a

*Monochasma savatieri* Franch. ex Maxim.

植物名 绵毛鹿耳草《高植图鉴》

药材名 鹿耳草《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 千年艾《庐山志》,沙氏鹿耳草《中国植志》,白毛鹿耳草《汇编》

地方名 六月雪(浙江、湖南),六月霜(陕西、安徽、江西),千层楼(福建、湖南),千层塔(陕西、江西),白蜈蚣(浙江、福建),狗牙齿草、白丝草(陕西、湖南);陕西:白花茵陈(宝鸡);浙江:瓶儿蜈蚣草、山门穹(杭州),千年霜,白头毛,白鸡毛,满山白(文成、永嘉),〔四季青〕,瓜子草,老鼠耳草(临安),冬瓜心(乐清、永嘉);安徽:〔地古牛〕;江西:牙痛草(奉新),〔白头翁〕(婺源),梔子草(吉水),千年春;福建:白山艾(周宁、福州、永泰、闽清、古田、屏南),白艾(永安、明溪),白茅草(光泽),白龙骨(福州、仙游),白杉笠(周宁、政和),白细芒(福安、宁德),白鼻蜈蚣,白地蜈蚣(崇安),白叶路其(宁化);湖南:千层矮,龙须草,白路其,土茵陈,鱼腥草、白丝线、铁牙架(衡阳),毛茵陈(衡山、长沙),千年青(麻阳),野鸡尾(古丈、凤凰),白狗

牙、百日霜、〔凤尾草〕(衡山),白头婆婆(浏阳);其他:白茵陈、鼠耳草。

功效 全草:清热解毒,凉血止血。用于感冒心中烦热,咳嗽,吐血,赤痢,便血,月经不调,风湿骨痛,牙痛,乳痛。

#### 7252073

*Monochasma shearerii* Maxim. ex Franch. et Savat.

植物名 少毛鹿耳草(拟)

药材名 鹿耳草《中国植志》

地方名 浙江:梔子草。

功效 全草:清热解毒,凉血止血。

#### 7252074

*Odontites scrotina* (Lam.) Dum.

植物名 疔齿草《中国植志》

药材名 齿叶草《内蒙古中草药》

地方名 阳花(内蒙古、新疆);内蒙古:“哈拉塔日-其其格”(蒙名)。

功效 全草:清热燥湿,凉血止痛。用于热性传染病,肝胆郁热,瘀血作痛。

#### 7252075

*Paulownia catalpifolia* Gong Tong

植物名 楸叶泡桐《中国植志》

地方名 河北:山东泡桐,无籽泡桐;河南:小叶泡桐。

功效 根:祛风,解毒,消肿,止痛;果:化痰止咳。

#### 7252076

*Paulownia elongata* S. Y. Hu

植物名 兰考泡桐《中国植志》

文献名 河南桐《华北树木志》

地方名 河南:泡桐果。

功效 果实:祛痰,止咳,平喘。

#### 7252077

*Paulownia fargesii* Franch.

植物名 川泡桐《中国植志》

药材名 川泡桐《峨眉药植研究》

地方名 四川:泡桐根(峨眉山)。

功效 根、叶:外用于消肿。

#### 7252078

*Paulownia fortunei* (Seem.) Hemsl. --- *P. duclouxii* Dode

植物名 白花泡桐《中国植志》

药材名 泡桐《纲目》、《汇编》

文献名 白桐(陆玕《诗疏》),荣桐(尔雅),桐叶《本经》,白桐叶、椅桐《本草经集注》,白桐皮《药性论》,黄桐《图经》,白花桐(陈翥《桐谱》),花桐《品汇精要》,水桐树皮《濒湖集简方》,桐、桐木、桐木皮《纲目》,大果泡桐《华北树木志》

地方名 浙江:〔凌霄花〕、新式凌霄花、〔臭梧桐叶〕、大叶毛桐(临安);河南:泡桐果,泡桐花;湖南:水桐树(长沙),空桐木(凤凰),空桐(永兴);广东:华桐,火桐木,沙桐彭,笛螺木;广西:饭桐子,通心条,空桐树(融水);四川:泡桐根(峨眉山);云南:泡桐(盐津),紫

花树。

功效 果实:祛痰,止咳,平喘。用于慢性气管炎;根:祛风,解毒,止痛。用于筋骨疼痛,疮疡肿毒,红崩白带;花:用于上呼吸道感染,支气管肺炎,急性扁桃体炎,菌痢,急性肠炎,急性结膜炎,腮腺炎,疳肿;叶:用于痢疾,疔疮,创伤出血,生发;树皮:用于痔疮,淋病,丹毒,跌打损伤。

#### 7252079

*Paulownia kawakami* Ito

植物名 华东泡桐《高植图鉴》

文献名 台湾泡桐《广西药录》

地方名 广西:空桐树(龙胜)。

功效 叶:外用于跌打损伤。

#### 7252080

*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.

植物名 毛泡桐《中国植志》

药材名 紫花泡桐(拟)

文献名 桐叶、桐皮《本经》,紫花桐(陈嘉《桐谱》),冈桐《纲目》,日本泡桐《江苏南部种册》,绒毛泡桐《中草药通讯》,锈毛泡桐《汇编》,泡桐果《药典》,绒毛泡桐《山东经植》

地方名 〔凌霄花〕(东北、华北、中南、西南),泡桐花(河南、四川);陕西:大接骨丹(柞水),泡桐根皮;山东:梧桐;安徽:泡树;湖北:紫桐,大叶泡桐(神农架);广西:空筒树(大瑶山),鸡筒树(富州),马蹄郎;四川:桐根(重庆),泡桐树根,泡通,大通,鹅笼花(成都)。

功效 果实:止咳,祛痰,平喘;根、叶、花、树皮:祛风解毒,消肿,止痛。

#### 7252081

*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. var. *glabrata* (Rehd.) S. Z. Qu --- *P. tomentosa* (Thunb.) Steud. var. *tsinlingensis* (Pai) T. Gong

植物名 光泡桐《中国植志》

药材名 光泡桐《神农架药录》

文献名 光桐《秦岭植志》,紫桐、籽桐《华北树木志》

地方名 陕西:青桐(眉县);湖北:泡桐树(神农架)。

功效 根:止血,祛风,解毒,消肿;树皮:接骨。

#### 7252082

*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. var. *lanata* (Dode) Schneid.

植物名 小花泡桐《云南植志》

文献名 黄毛泡桐《华北树木志》

地方名 云南:泡桐(镇雄),桐子树(文山)。

功效 树皮:止血。

#### 7252083

*Pedicularis alaschanica* Maxim.

植物名 阿拉善马先蒿《中国植志》

地方名 青海:黄甜蜜蜜,〔夏枯草〕。

备考 青海个别地区混称夏枯草。

#### 7252084

*Pedicularis anas* Maxim. var. *tibetica* Bonati

植物名 藏鸭首马先蒿《西藏植志》

药材名 鸭首马先蒿《西藏中草》

功效 花:利尿平喘,益阴止痛。用于水肿,尿少,气喘,营养不良,骨髓炎引起的针刺样疼痛。

#### 7252085

*Pedicularis armata* Maxim.

植物名 刺肉马先蒿《中国植志》

文献名 “娄肉赛尔保”(藏名)《中草药通讯》

功效 花:用于流感,胆囊炎。

#### 7252086

*Pedicularis cernua* Bonati

植物名 俯垂马先蒿《中国植志》

药材名 虫莲《云南药录》

文献名 垂头马先蒿《云南药录》

功效 根:安胎,明目。用于胎动不安,翳雾遮睛。

#### 7252087

*Pedicularis confertiflora* Prain

植物名 聚花马先蒿《中国植志》

药材名 红蒿枝《元江哈尼族药》

地方名 云南:“耶哈哈尼”(元江哈尼语)。

功效 全草:熄风镇惊,利尿通淋。用于小儿惊风,淋症,腰痛。

#### 7252088

*Pedicularis cranulophya* Maxim.

植物名 凸额马先蒿《中国植志》

药材名 凸额马先蒿《高原中草》

地方名 四川:“郎拉”(若尔盖藏名)。

功效 全草:有小毒。解热抗菌。用于尿路感染,肺炎,肝炎,无名高热。

#### 7252089

*Pedicularis davidii* Franch.

植物名 扭盔马先蒿《高植图鉴》

药材名 黑参《汇编》

文献名 煤参《纲目拾遗》,大卫氏马先蒿《中国植志》,黑参马先蒿《汇编》

地方名 陕西:太白黑参(太白)。

功效 根茎:益气养阴,止痛。用于病后体虚,阴虚潮热,关节疼痛。

#### 7252090

*Pedicularis decora* Franch.

植物名 美观马先蒿《中国植志》

药材名 黑参《汇编》

文献名 煤参《纲目拾遗》,太白参《陕西中草药》

地方名 陕西:太白黑参、太白洋参、黑洋参(太白山)。

功效 根茎:益气养阴,止痛。用于病后体虚,阴虚潮热,关节疼痛。

#### 7252091

*Pedicularis decorissima* Diels

植物名 极丽马先蒿《中国植志》

文献名 “漏口木保”(藏名)《青藏药图》

功效 全草:用于急性胃肠炎,食物中毒等。

#### 7252092

*Pedicularis dissecta* (Bonati) Pennell et Li

植物名 全裂马先蒿《中国植志》

药材名 太白丽参《汇编》

地方名 陕西:太白土高丽参,黑丽参。

功效 肉质根:益气养阴,托毒外出,止痛。用于病后体虚,阴虚潮热,疮毒内陷,关节疼痛。

#### 7252093

*Pedicularis durmiana* Bonati

植物名 褐毛马先蒿《汇编》

药材名 黑参《汇编》

文献名 煤参《纲目拾遗》,等臂马先蒿《云南种录》,邓氏马先蒿《中国植志》

功效 根茎:益气养阴,止痛。用于病后体虚,阴虚潮热,关节疼痛。

#### 7252094

*Pedicularis elwesii* Hook. f.

植物名 衰盔马先蒿《高植图鉴》

药材名 包唇马先蒿《云南种录》

文献名 衰氏马先蒿《中国植志》,“江肖巴”(藏名)《青藏药图》

功效 花:利尿。用于水肿。

#### 7252095

*Pedicularis fortunei* Hemsl.

植物名 山萝卜马先蒿(拟)

文献名 马先蒿《峨眉药植研究》

地方名 四川:山萝卜菜(峨眉山)。

功效 全草:清热消肿,解毒。

#### 7252096

*Pedicularis henryi* Maxim.

植物名 江南马先蒿《高植图鉴》

药材名 凤尾参《昆明民药》

文献名 羊肚参《滇南本草》,亨氏马先蒿《中国植志》,西南马先蒿《广西植录》,互叶凤尾参《中药大辞典》,凤尾马先蒿《汇编》

地方名 江西:粉参;湖南:野太子参;广西:英雄蒿(三江);云南:追风箭、公鸡花根(红河)。

功效 根:补气血,通经络,止咳平喘。用于头晕耳鸣,心慌气短,筋骨疼痛,支气管炎。

#### 7252097

*Pedicularis heydei* Prain

植物名 狭叶马先蒿《西藏植志》

功效 根:用于高血压。

#### 7252098

*Pedicularis integrifolia* Hook. f.

植物名 全叶马先蒿《中国植志》

文献名 “美多浪那”(藏名)《青藏药图》

功效 花:用于水肿,并有滋补作用。

#### 7252099

*Pedicularis integrifolia* Hook. f. ssp. *integerrima* (Pennell et Li) Tsoong

植物名 全缘马先蒿《迪庆藏药》

药材名 全缘马先蒿《迪庆藏药》

功效 花:利尿,平喘,滋补,愈疮。用于水肿,体弱,黄水病,疮疖,气喘。

#### 7252100

*Pedicularis janpinensis* Vant. ex Bonati

植物名 平坝马先蒿《贵州药录》

地方名 贵州:地洋参,地米参。

功效 根:健脾,消积,补虚,益损。用于盗汗,气虚羸瘦,消化不良。

#### 7252101

*Pedicularis kansuensis* Maxim.

植物名 甘肃马先蒿《中国植志》

文献名 “古子玛保”(藏名)《青藏药图》

功效 全草:清热,调经,活血,固齿。用于肝炎,月经不调等。

#### 7252102

*Pedicularis koueytchensis* Bonati

植物名 滇东马先蒿《中国植志》

药材名 滇东马先蒿《贵州药录》

功效 全草:补气血,通经络,止咳平喘。

#### 7252103

*Pedicularis labordel* Vant. ex Bonati

植物名 长喙马先蒿《云南种录》

药材名 凤尾参《元江哈尼族药》

文献名 拉氏马先蒿《中国植志》,西南马先蒿《高植图鉴》

地方名 贵州:鸡爪参,一窝蛆;云南:“加里那雌”(元江哈尼语)。

功效 根、叶:驱风逐湿,益气安神。用于感冒腹胀,小儿惊风,风湿腰痛,肾虚腰痛,脱肛,子宫脱垂,心慌心跳,水火烫伤。

#### 7252104

*Pedicularis longicaulis* Franch. ex Maxim.

植物名 长茎马先蒿《中国植志》

药材名 凤尾参《昆明民药》

文献名 对叶凤尾参《中药大辞典》

功效 根:补气血,通经络,止咳平喘。用于头晕耳鸣,心慌气短,筋骨疼痛,支气管炎。

#### 7252105

*Pedicularis longiflora* Rudolph

植物名 长花马先蒿《中国植志》

文献名 “漏日赛保”(藏名)《青藏药图》

功效 全草:清热。用于肝炎,胆囊炎,水肿,遗精,小便带脓血等。

#### 7252106

*Pedicularis longiflora* Rudolph var. *tubiformis* (Klotz.) Tsoong

植物名 斑唇马先蒿《高植图鉴》

药材名 斑唇马先蒿《汇编》

文献名 长筒马先蒿《西藏中草》

地方名 青海:马先蒿;西藏:“露茹色尔木”(藏名)。

功效 全草:健脾开胃,消食化积,利水涩精。用于小儿疳积食积不化,腹胀满,水肿,遗精,耳鸣。

## 7252107

*Pedicularis macrosiphon* Franch.

植物名 大管马先蒿《中国植志》

药材名 长虫莲《云南药录》

文献名 长管马先蒿《云南药录》

功效 根：安胎，明目。

## 7252108

*Pedicularis megalantha* Don

植物名 硕花马先蒿《中国植志》

文献名 “托赛尔”(藏名)《青藏药图》

功效 花：用于食物中毒，胃溃疡。

## 7252109

*Pedicularis muscicola* Maxim.

植物名 藓生马先蒿《中国植志》

药材名 藓生马先蒿《陕西中草药》

地方名 陕西：〔土人参〕(太白山)；青海：“漏日本保”(藏名)。

功效 根：生津安神，强心。用于气血虚损，虚劳多汗，虚脱衰竭；全草：用于急性胃肠炎，食物中毒。

## 7252110

*Pedicularis nigra* Vaniot ex Bonati

植物名 黑马先蒿《中国植志》

药材名 鸡脚参《峨山彝族药》

地方名 云南：“丫格伯”(玉溪峨山彝语)，“啊哈阿克那雌”(元江哈尼语)。

功效 根：滋阴润肺，补气益血。用于肺结核，久病体虚，气血两亏。

## 7252111

*Pedicularis oederi* Vahl

植物名 广布马先蒿《西藏植志》

药材名 绵马先蒿《青藏药图》

文献名 欧氏马先蒿《中国植志》，藏新马先蒿《汇编》，环极马先蒿《云南种录》，“古子赛保”(藏名)《青藏药图》

功效 全草：用于肉食中毒，胃病，固齿。

## 7252112

*Pedicularis oederi* Vahl var. *sinensis* (Maxim.) Hurus.

植物名 华马先蒿《高植图鉴》

药材名 马先蒿《汇编》

文献名 穗花马先蒿《中药大辞典》

地方名 陕西：土人参、梨参(太白山)；其他：广布马先蒿。

功效 根：祛风湿，杀虫。用于风湿性关节炎，尿路结石，小便不利。外用于疥疮。

## 7252113

*Pedicularis oliveriana* Prain

植物名 扭盔马先蒿《西藏植志》

药材名 茸背马先蒿《青藏药图》

文献名 “罗柔莫保”(藏名)《青藏药图》，粤氏马先蒿《中国植志》，西藏马先蒿《汇编》

功效 花：清热，解毒，燥湿。用于食物中毒，胃及十二指肠溃疡，热性腹泻。

## 7252114

*Pedicularis oxycarpa* Franch. ex Maxim.

植物名 尖果马先蒿《中国植志》

药材名 尖果马先蒿《贵州药录》

功效 全草：补气血，通经络，止咳平喘。

## 7252115

*Pedicularis palustris* L.

植物名 沼生马先蒿《中国植志》

药材名 沼地马先蒿《汇编》

功效 地上部分：利水通淋。用于石淋，膀胱结石，排尿困难，疟疾寒热，中风湿痹，妇女带下。

## 7252116

*Pedicularis phaceliaefolia* Franch.

植物名 草茺莢马先蒿(拟)

文献名 法且利亚叶马先蒿《中国植志》，马先蒿《峨眉药植研究》

地方名 四川：草茺莢(峨眉山)。

功效 全草：清热消肿，解毒。

## 7252117

*Pedicularis przewalskii* Maxim. ssp. *australis* (Li) Tsoong

植物名 南方青海马先蒿《云南种录》

药材名 露姑木波《迪庆藏药》

文献名 青南马先蒿《迪庆藏药》

功效 花：清热，敛毒。用于热性腹泻，食物中毒

## 7252118

*Pedicularis przewalskii* Maxim. subsp. *microphyton* (Bur. et Franch.) Tsoong

植物名 矮小青海马先蒿《西藏植志》

药材名 矮小马先蒿《青藏药图》

文献名 “漏日赛保”(藏名)《青藏药图》

功效 花：清热。用于肝炎，胆囊炎，水肿，遗精，小便带脓血等。

## 7252118a

*Pedicularis pseudo-ingens* Bonati

植物名 假硕大马先蒿《中国植志》

药材名 曲钦巴《迪庆藏药》

功效 根：用于遗尿。

## 7252119

*Pedicularis resupinata* L.

植物名 返顾马先蒿《中国植志》

药材名 马先蒿《本经》、《中药大辞典》

文献名 马尿蒿《本经》，马新蒿(陆机《诗疏》)，烂石草《肘后方》，练石草《别录》，虎麻《唐本草》，马尿烧《植物名汇》，盐杜草《中国植物图鉴》

地方名 山西：〔马尿泡〕；内蒙古：“浩尼·额布日·其格”、“阿兰内”(蒙名)，马矢蒿；陕西：疳积草(镇坪)；山东：野苏子(青岛)；其他：芝麻七。

功效 茎叶或根：祛风，胜湿，利尿。用于风湿关节疼痛，小便不利，尿路结石，妇女白带，疥疮。

备考 《纲目》所指“马先蒿”为紫葳科角蒿 *Incarvillea sinensis* L. 与此有别。



**7252120**

*Pedicularis resupinata* L. ssp. *crassicaulis* (Vant. ex Bonati) Tsoong

植物名 粗茎返顾马先蒿(拟)

药材名 白沙药(广西灵川)

功效 根:行气止痛。

**7252121**

*Pedicularis rex* C.B. Clarke ex Maxim.

植物名 大王马先蒿《中国植志》

药材名 羊肝狼头草《名实图考》

文献名 还阳草根《中药大辞典》

地方名 贵州:四方盒子草,五凤朝阳草,五凤朝阳;  
云南:凤尾参、蒿枝龙胆草(昆明),还阳草,连台参、马先蒿(玉龙山)。

功效 根:补益气血,健脾利湿。用于阴虚潮热,风湿痹痛,肝硬化腹水,慢性肝炎,小儿疳积,妇女乳少;地上部分:清热解表。用于麻疹。

**7252122**

*Pedicularis rhinanthoides* Schrenk ssp. *labellata* (Jacq.) Tsoong

植物名 象鼻马先蒿《云南种录》

药材名 大唇马先蒿《青藏药图》

文献名 “漏日本保”(藏名)《青藏药图》,人拟鼻花马先蒿《高植图鉴》

功效 全草:用于急性胃肠炎,食物中毒。

**7252123**

*Pedicularis siphonantha* Don

植物名 管花马先蒿《中国植志》

药材名 管花马先蒿《迪庆藏药》

文献名 露茹木波《迪庆藏药》

功效 花:清热,敛毒。用于热性腹泻,食物中毒。

**7252124**

*Pedicularis striata* Pall.

植物名 红纹马先蒿《中国植志》

文献名 [一枝蒿]《品种论述》

地方名 陕西:野芝麻(丹凤)。

功效 全草:清热解毒。用于蛇咬伤。

**7252125**

*Pedicularis szetschuanica* Maxim.

植物名 四川马先蒿《中国植志》

文献名 “浪那嘎保”(藏名)《青藏药图》

功效 花:用于水肿,疮疖。

**7252126**

*Pedicularis tenuisecta* Franch. ex Maxim.

植物名 纤裂马先蒿《中国植志》

药材名 凤尾参《云南药录》

文献名 细裂马先蒿《云南种录》

功效 根:补气血,通经络,止咳平喘。

**7252127**

*Pedicularis verticillata* L.

植物名 轮叶马先蒿《中国植志》

地方名 陕西:[土人参],土儿参,太白参。

功效 根:生津安神,强心。

**7252128**

*Pedicularis yunnanensis* Franch. ex Maxim.

植物名 云南马先蒿《中国植志》

功效 全草:入药。

**7252129** 见 7252118a

**7252130**

*Phtheirospermum japonicum* (Thunb.) Kanitz --- *P. chinense* Bunge

植物名 松蒿《中国植志》

药材名 松蒿《汇编》

文献名 小盐灶《中国植物图鉴》,〔荆芥〕《植物名汇》,糯蒿《中药大辞典》

地方名 陕西:[土荆芥](渭南、太白山);浙江:大叶蓬蒿(临安),红壶瓶(嵊县、海宁),草茵陈(平阳),〔土茵陈〕(云和),铃茵陈(鄞县);广西:鸡冠草(钟山);其他:小盐灶草。

功效 全草:清热,利湿。用于湿热黄疸,水肿。外用于疮肿。

**7252131**

*Phtheirospermum tenuisectum* Bur. et Franch.

植物名 细裂叶松蒿《中国植志》

药材名 细裂松蒿《四川中药志》

文献名 松叶蒿、蜈蚣草《汇编》

地方名 四川:松叶接骨草;云南:黄花松蒿,草柏枝(昆明);其他:松蒿,松毛参。

功效 全草、根:清热解毒,养心安神,止痛。用于心脏衰弱,心悸,咳嗽,痰中带血,咽喉肿痛。外用于蛇犬咬伤,骨折疼痛。

**7252132**

*Picria fel-terrae* Lour.

植物名 苦玄参《中国植志》

药材名 苦玄参《汇编》

文献名 苦精草、蛇开口、熊胆草《中草药》,四环素草《汇编》

地方名 蛇总管(广东、广西);广西:项斗、〔地胆草〕、杭筋斗、苦草、苦胆草(龙州),落地小金钱(梧州),鱼胆草;云南:“牙引怀”(西双版纳傣语)。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于感冒风热,咽喉肿痛,胃痛,消化不良,痢疾,毒蛇咬伤,跌打损伤,淋巴结炎,疖肿。

**7252133**

*Picrorhiza scrophulariiflora* Pennell

植物名 胡黄连《中国植志》

药材名 胡黄连《唐本草》、《汇编》

文献名 割孤露泽《开宝本草》,胡连《本草正义》,西藏胡黄连、印度胡黄连《中药志》,绿花胡黄连《云南药录》,“甲黄连”(藏名)《云南种录》

功效 根茎:清热燥湿,消痞。用于小儿疳积,目赤,潮热,黄疸,痢疾,痔疮,疟疾。

备考 过去进口之印度胡黄连为 *P. kurroa* Royle 的根茎。

## 7252134

*Pterygiella duclouxii* Franch

植物名 疏毛翅茎草《高植图鉴》

药材名 紫茎牙痛草《云南中草药》

文献名 杜氏翅茎草《中国植志》

地方名 贵州：山连芝；云南：草连翘、瘡积药（昆明），小桃树（曲靖），翅茎草，松毛杆、鱼芎草、牙痛草（红河）。

功效 全草：清热平肝，消肿止痛。用于急、慢性肝炎，胃肠炎，口腔炎，咽喉肿痛，牙痛。

## 7252135

*Rehmannia chingii* Li

植物名 天目地黄《中国植志》

药材名 浙地黄《汇编》

文献名 紫花地黄《安徽中草药》

地方名 浙江：鲜生地、鲜地黄（浙南），蜜糖罐（杭州），野鲜地黄（临安），天芥菜（台州、温州）。

功效 根茎：清热，凉血。用于鼻衄，热病口干，中耳炎。

## 7252136

*Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey. --- *Rehmannia glutinosa* Libosch. f. *huechingensis* (Chao et Schih) Hsiao

植物名 地黄《中国植志》

药材名 地黄《千金翼方》、《药典》

文献名 苒《尔雅》，干地黄、地髓《本经》，生地黄、地脉、苒《别录》，地黄叶《食疗本草》，熟地黄、地黄花《图经》，熟地《景岳全书》，牛奶子《本草衍义》，婆婆奶《救荒本草》，怀庆地黄《纲目》，鲜生地《本草便读》，原生地《本草正义》，鲜地黄、蜜罐〔花〕、狗奶子《名实图考》，北京地黄、蜂糖罐《药学报》，生干地黄、干生地、大生地、怀生地、小生地、细生地、根生地、大熟地、地黄实《常用中药名辨》

地方名 野地黄（山西、河南、湖北、广西），野生地（陕西、江苏、安徽），狗奶棵子（北京、河北），蛤蟆草（东北、天津），妈妈奶、山菸根、山旱菸根（东北），山白菜（北京、河北、辽宁）；辽宁：酒壶花，山菸（锦州）；北京：妈妈罐；河北：野生地秧，老头喝烧酒，甜酒根；山西：酒盅盅花根，炮掌掌花根；内蒙古：“胡日古情饮-其其格”（蒙名）；陕西：粘地黄（眉县）；山东：地黄根（郯城、费县），荷包纤子（长清），老棉袄（莱芜），喝酒壶（昌乐），甜酒棵（益都），蜜罐棵（滕县）；江苏：婆婆丁（连云港），米罐棵（铜山）；安徽：蜜罐子；河南：蜜蜜罐，蜜蜜罐根，怀地黄；其他：桐花茶（俗），火地〔七月采者〕，冬地〔十二月采者〕。

功效 块根（鲜地黄）：清热生津，凉血，止血。用于热风伤阴，舌绛烦渴，发斑发疹，吐血，衄血，咽喉肿痛；生地黄：清热凉血，养阴，生津。用于热病舌绛烦渴，阴虚内热，骨蒸劳热，内热消渴，吐血，衄血，发斑发疹；熟地黄：滋阴补血，益精填髓。用于肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，眩晕，耳鸣，须发早白；花：用于消渴，

肾虚腰痛；叶：外用于恶疮，手足癣。

## 7252137

*Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Meyer f. *lutea* Y. C. Chu et G. F. Li

植物名 黄花地黄《自然资源研究》

药材名 黄花地黄《东北药用植物》

功效 根茎：清热，凉血，生津。用于高热烦渴，发斑发疹，咽喉肿痛，吐血，衄血，尿血，便血。

## 7252138

*Rehmannia henryi* N. E. Brown

植物名 湖北地黄《中国植志》

药材名 湖北地黄《汇编》

地方名 湖北：鄂地黄（鹤峰），〔岩白菜〕。

功效 根：补血，止血，强壮。用于吐血，鼻衄，子宫出血，鲜根汁液：外用于创伤止血。

## 7252139

*Rehmannia piasezkii* Maxim.

植物名 裂叶地黄《中国植志》

地方名 陕西：红喇叭花，一口钟（平利）。

功效 全草：用于烫火伤，疔疮。

## 7252140

*Russelia equisetiformis* Schlecht. et Cham.

植物名 爆仗竹《高植图鉴》

药材名 爆仗竹《广西药录》

地方名 〔吉祥草〕（广东、广西）；广西：炮仗竹，马鬃花（南宁），铁丝钻，马丁子。

功效 全草：用于跌打损伤，接骨。

## 7252141

*Scoparia dulcis* L.

植物名 野甘草《中国植志》

药材名 冰糖草《汇编》

地方名 假甘草、土甘草（广东、广西）；福建：香仪，珠子草，四时茶（闽南），节节珠；台湾：〔鸡骨草〕，甜珠子草；广东：热乖草；广西：假枸杞，通花草，山甘草、鱼花草、白花草、三角草、〔仙人对座草〕（平南），荆芥草（博白），〔土荆芥〕（平南、桂平）；云南：“牙害补”、“牙海补乌”（西双版纳傣语），米碎。

功效 全草：清热利湿，祛风止痒。用于感冒发热，肺热咳嗽，肠炎，细菌性痢疾，小便不利。外用于疖子，皮肤湿疹。

## 7252142 见 7252144a

## 7252143

*Scrophularia buergeriana* Miq. --- *S. oldhami* Oliver

植物名 北玄参《中国植志》

药材名 玄参《本经》尚本

文献名 元参《本经》孙本

地方名 内蒙古：润元参（包头）；山东：立马鞭（蒙山），大丁黄（烟台）；浙江：山玄参；四川：角参。

功效 根：凉血滋阴，泻火解毒。用于热病伤阴，舌绛烦渴，温毒发斑，津伤便秘，骨蒸劳嗽，目赤，咽痛，瘰癧，白喉，痈肿疮毒。

## 7252144

*Scrophularia buergeriana* Miq. var. *tsinglingensis* Tsoong

植物名 秦岭玄参《秦岭植志》

功效 根:滋阴,降火,生津,解毒。用于扁桃体炎,咽喉炎,瘰疬,肠燥便秘。

#### 7252144a

*Scrophularia fargesii* Franch.

植物名 长梗玄参《中国植志》

药材名 长梗玄参《峨眉药植研究》

地方名 湖北:鄂玄参;四川:玄参(峨眉山)。

功效 根:清热滋阴,凉血解毒。

#### 7252145

*Scrophularia henryi* Hemsl.

植物名 鄂西玄参《中国植志》

地方名 湖北:黑参。

功效 根:消炎,解毒。用于咽喉炎,口腔炎,眼结膜炎,淋巴腺肿,呼吸器官炎症。

#### 7252146

*Scrophularia kakudensis* Franch.

植物名 丹东玄参《中国植志》

文献名 大山玄参《汇编》,安东玄参《高植图鉴》

地方名 四川:玄参(峨眉山),川玄参、土玄参、元参(南川)。

功效 根:滋阴,降火,除烦,解毒。用于热病烦渴,发斑,骨蒸,瘰疬,夜寐不安,咽喉肿痛,癰肿,便秘。

#### 7252147

*Scrophularia macrocarpa* Tsoong

植物名 大果玄参《中国植志》

地方名 云南:一扫光(禄劝)。

功效 根:外用于疮毒。

#### 7252148

*Scrophularia mandarinorum* Franch.

植物名 单齿玄参《中国植志》

地方名 云南:元参,玄参,黑玄参。

功效 根:滋阴降火,清喉热。用于喉炎。

#### 7252149

*Scrophularia ningpoensis* Hemsl.

植物名 玄参《中国植志》

药材名 玄参《本经》、《药典》

文献名 重台《本经》,鬼藏《吴普本草》,玄台、正马、鹿肠、威、端《别录》尚本,逐马《药性论》,黑参《孙天仁集效方》,馥草《开宝本草》,野脂麻《纲目》,元参《本草通玄》,山麻、野芝麻、能消草、凌霄草、玄武精、鹿阳生《新纲》,浙玄参《江苏药材志》,润玄参《常用中药名辨》

地方名 黑玄参(湖北、四川),大布蛇(广东、广西),乌元参(江苏、浙江),水萝卜(广西、江西);江苏:山玄参;浙江:宁波玄参,羊角元参;江西:八棱麻(萍乡、景德镇);湖南:丈角(常德),山当归(长沙),石钩草(凤凰);广东:野萝卜(始兴),麻梗佛(英德);广西:大叶玄参、土玄参(桂林),大玄参。

功效 根:凉血滋阴,泻火解毒。用于热病伤阴,舌绛烦渴,温毒发斑,津伤便秘,骨蒸劳嗽,目赤,咽痛,

瘰疬,白喉,癰肿疮毒。

#### 7252150

*Scrophularia spicata* Franch.

植物名 穗花玄参《中国植志》

地方名 云南:土玄参(西部)。

功效 根:凉血滋阴,泻火解毒。

#### 7252151

*Siphonostegia chinensis* Benth.

植物名 阴行草《名实图考》、《中国植志》

药材名 金钟茵陈《滇南本草》

文献名 鬼麻油《日华子本草》,刘寄奴《本草原始》,山茵陈、角蒿、铃儿茵陈《纲目拾遗》,黄花茵陈《名实图考》,大婆针、蛮老婆针《植物名汇》,铃茵陈、土茵陈、北刘寄奴《中药志》

地方名 灵茵陈、角茵陈(江苏、安徽、浙江),草茵陈(浙江、广西),黑茵陈(四川、上海),铁杆茵陈(浙江、上海),八角茵陈(湖北、江西),[茵陈蒿](湖北、福建),茵陈草(福建、湖南、广西),山芝麻(上海、山东、贵州),山油麻(江西、浙江、福建),鬼芝麻(山东、安徽),芝麻蒿(黑龙江、山东);吉林:除毒草;辽宁:五毒草(凌源),风吹草,吹风草,随风草;河北:罐儿茶,罐茶,麦穗草,野芝麻,山芝麻秧;北京:茶叶棵子;内蒙古:“希拉-乌姑拉-其其格”(蒙名);陕西:罐罐花(安康),罐蒿(旬阳);山东:苍蝇草,介生草,道前草,线儿茶;江苏:吊钟草(南京);浙江:节节瓶(余姚),壶瓶草,金壶瓶(金华),野油麻,山天芝麻(杭州),谷茵陈(丽水);安徽:园香草,葛茵陈;江西:痞积草(吉水),麻夹子草(赣州),倒挂金钟,散黄草,八挂金钟,朝天石榴,张天晏、英雄草(大余);福建:铁雨伞草(泉州),金花屏(宁德、闽东),山洋麻(宁德、福安),一扫光,毛飞扬、碗子草、软壳飞扬(宁化),碗子飞扬(清流),竹船丝(三明);河南:山蓝麻索;湖南:倒吊钟(衡阳),阴文草(零陵),狗牙子草(常宁),黄花剑(麻阳),罐子茵陈(长沙),麻子草(新宁),苦金铃(凤凰);广西:[茵陈](全州、兴安),土茵陈草,陆梅草,山黄麻,鸡肉菜,野蓉麻;四川:月经草(雷波),油蒿;贵州:油罐草,罐子草,油蒿菜,油蒿菜;云南:小瓶花(红河),钟茵陈。

功效 全草:清热利湿,凉血祛瘀。用于黄疸型肝炎,尿路结石,小便不利,便血,外伤出血。

#### 7252152

*Siphonostegia laeta* S. Moore

植物名 腺毛阴行草《中国植志》

文献名 光亮阴行草《中国药植志》,腺毛茵陈《江西药录》

地方名 阴行草(江西、河南);浙江:草茵陈(临安),[茵陈]、壶瓶草、金茵陈(天台)。

功效 地上部分:清利湿热,凉血祛瘀。

#### 7252153

*Sopubia trifida* Buch.-Ham. ex D. Don

植物名 短冠草《中国植志》

药材名 小伸筋草《云南中草药》

地方名 广西:英雄草,虫药(宁明);贵州:地板枝。

功 效 全草:舒筋活络,温肾止痛,驱虫。用于风湿骨痛,胃寒痛,肾虚腰痛,毛囊炎,驱蛔虫。

## 7252154

*Striga asiatica* (L.) O. Kuntze

植物名 独脚金《中国植志》

药材名 独脚金《汇编》

文献名 独脚柑《生草药性备要》,矮脚子《高植图鉴》,独脚柑《广西本草选编》

地方名 疳积草(广东、广西、福建、湖南),小猴草(广东、海南);福建:金锁匙(泉州、漳州、长泰、南靖、诏安),五疳草(晋江),黄花积药草(武平),串金黄(福鼎);湖南:消米虫(巴东);广东:鹿草、乾草(广州),黄花甘,疳钉,疳仔草(阳江),肝经草,猢猻草,猴儿草(阳春),同脚草(新会);海南:黄花草;广西:细独脚马骝(南宁),细独脚金,红花独脚针,地丁草、马佬含菊(玉林);贵州:地莲枝。

功 效 全草:清热,消积。用于小儿疳积,小儿夏季热,小儿腹泻,黄疸型肝炎。

## 7252155

*Striga masuria* (Ham. ex Benth.) Benth.

植物名 大独脚金(海南),《中国植志》

药材名 大独脚金《广西本草选编》

文献名 小白花苏《云南中草药》,独脚金《江苏植志》

地方名 广西:大独脚疳(南宁、邕宁);四川:干草;云南:独脚疳(红河)。

功 效 全草:健脾消食,清热利湿。用于小儿疳积,食欲不振,泌尿系感染,黄疸型肝炎。

## 7252156

*Torenia benthamiana* Hance

植物名 毛叶蝴蝶草《中国植志》

药材名 毛叶蝴蝶草《广西药录》

文献名 毛叶翼萼《高植图鉴》,毛叶蓝猪耳《广西植志》,黄蝴蝶草、粗毛蝴蝶草《海南植志》

地方名 广西:红菩萨鱼(平南),地粘儿(岑溪)。

功 效 全草:用于疔疮,小儿鹅口疮,坐骨神经痛。

## 7252157

*Torenia concolor* Lindl.

植物名 单色蝴蝶草《中国植志》

药材名 蓝猪儿《汇编》

文献名 同色蓝猪耳《广西药录》,单色翼萼《高植图鉴》

地方名 台湾:地蜈蚣,倒地蜈蚣,钉地蜈蚣;广西:灯笼草,蓝花草(南宁);贵州:蝴蝶花、倒胆草、蚌壳草(遵义),散胆草(绥阳),老蛇药(荔波)。

功 效 全草:清热解毒,利湿,止咳,和胃止呕,化痰。用于发痧呕吐,黄疸,血淋,风热咳嗽,腹泻。外用于跌打损伤,蛇咬伤,疗毒。

## 7252158

*Torenia flava* Buch. -Ham. ex Benth.

植物名 黄花蝴蝶草《中国植志》

药材名 黄花蝴蝶草《广西药录》

文献名 黄花翼萼《高植图鉴》,黄花蓝猪耳《广西植志》

地方名 广西:泡卜儿(岑溪),通肺草(苍梧)。

功 效 全草:清肝,明目。用于阴囊肿大。

## 7252159

*Torenia fordii* Hook. f.

植物名 紫斑蝴蝶草《中国植志》

文献名 紫斑翼萼《高植图鉴》

功 效 全草:用于疮毒。

## 7252160

*Torenia fournieri* Linden. ex Fourn.

植物名 蓝猪耳《中国植志》

药材名 蓝猪耳《广西《园林药录》》

文献名 花公草《中国植物图鉴》

功 效 茎:清热消肿,止咳。用于热咳,咳血。外用于疳疔跌打。

## 7252161

*Torenia glabra* Osbeck

植物名 光叶蝴蝶草《中国植志》

药材名 水韩信草《南宁药志》

文献名 光叶蓝猪耳《广西植志》,光蝴蝶草《海南植志》,翼萼《四川中药志》,光叶翼萼《高植图鉴》

地方名 广西:蓝花草、水远志、水韩信(南宁),男换女(龙州),灯笼草(桂平),落地水君(玉林),四方草(北流);贵州:倒胆草,老蛇药,对叶草,蚌角草。

功 效 全草:清热利湿,解毒,化痰。用于热咳,黄疸,泻痢,疗毒,跌打损伤。

## 7252162

*Torenia violacea* (Azaola) Pennell

植物名 紫萼蝴蝶草《中国植志》

药材名 香椒草《浙江临安》

文献名 紫色翼萼《高植图鉴》

地方名 江西:蝴蝶花,蓝猪耳;浙江:金笨斗(龙泉),马铃薯、软骨田方草(云和);广西:方形草(资源)。

功 效 全草:用于小儿疳积,结膜炎,胃肠炎。

## 7252163

*Trienophora rupestris* (Hemsl.) Solereder

植物名 呆白菜《中国植志》

药材名 巴东岩白菜《汇编》

地方名 湖北:岩白菜(巴东)。

功 效 全草:明目补肾。

## 7252164

*Verbascum chinense* L. --- *Verbascum coromandelianum* (Vahl) O. Kuntze --- *Celsia coromandeliana* Vahl

植物名 琴叶毛蕊花《中国植志》

文献名 白花阿生草《广西植志》

地方名 广西:赛尔苗。

功 效 全草:解热。用于痢疾,皮肤病。

## 7252165

*Verbascum thapsus* L.

植物名 毛蕊花《中国植志》

药材名 毛蕊花《汇编》

文献名 毛草(叶《生药》)、毛蕊草(《江苏南部种册》)、  
黄毛蕊草(《华北经济志要》)

地方名 〔霸王鞭〕(四川、云南);青海:“赛尔千曼  
巴”(藏名);新疆:牛耳草;浙江:毒鱼草;云南:大毛叶  
(大理),一柱香(丽江、大理),一毛叶,虎尾鞭(昆明),  
虎鞭草、鬼香烛(玉龙山),楼台香,龟与箭,狼尾巴,“尾  
们”(楚雄彝名),“兴格色尔杰”(藏名);西藏:海绵蒲;  
其他:一丈黄。

功效 全草:有小毒。清热解毒,止血。用于肺  
炎,阑尾炎。外用于创伤出血,关节扭伤,疮毒;种子:  
利尿。用于水肿。

#### 7252166

*Veronica anagallis-aquatica* L.

植物名 北水苦荬(《中国植志》)

药材名 水苦荬(《图经》、《汇编》)

文献名 半边山、谢婆婆(《图经》)、水莫莖、水菠菜(救  
荒本草),无风自动草(《滇南本草》),河白菜(《满州植录》),  
〔仙人对坐草〕(《中国药植图鉴》),兔子草(《简明中医辞  
典》),雪珍珠草、婆婆纳(《沙漠药植》)

地方名 仙桃草(华东、湖北、四川、云南),珍珠草  
(东北),水仙桃草(陕西、四川、贵州、云南),水仙桃(四  
川、陕西);内蒙古:“乌森、钦达干”(蒙名);陕西:蚊子  
草(眉县),蛭蛙草(周至),接骨桃(凤县),水接骨丹(宝  
鸡),水红花(丹凤),水上浮萍(略阳),水波浪(城固、洋  
县),水窝窝(柞水),芒种草,二代草;青海:“曲子嘎保”  
(藏名);江苏:大仙桃草(南京),风云珍珠草(苏北);河  
南:水鳖窝;湖北:蚊虫草;四川:鸭儿草、虫虫草(巴  
县),大仙桃,接骨仙桃,“肯热”(若尔盖藏名);贵州:水  
对叶莲(贵阳),水泽兰(花溪);其他:接骨仙桃草。

功效 带虫瘰果的全草:活血止血,解毒消肿。用  
于咽喉肿痛,肺结核咯血,风湿疼痛,月经不调,血小板  
减少性紫癜,跌打损伤。外用于骨折,痈疔肿毒。

#### 7252167

*Veronica anagallis-aquatica* L. f. *pumila* Kitag.

植物名 小北水苦荬(东北药用植物)

功效 带虫瘰果的全草(仙桃草)、根及果实:清热  
利湿,止血化痰,解毒消肿,活血通经,止痛。用于咽喉  
肿痛,肺结核咳血,吐血,血崩,痢疾,血淋,风湿疼痛,  
妇女产后感受风寒,月经不调,经闭,血小板减少性紫  
癜等。

#### 7252168

*Veronica arvensis* L.

植物名 直立婆婆纳(《中国植志》)

药材名 脾寒草(《中国药植图鉴》)

地方名 上海:花被头草。

功效 全草:清热,除疔。用于疟疾。

#### 7252169

*Veronica ciliata* Fisch.

植物名 长果婆婆纳(《中国植志》)

药材名 纤毛婆婆纳(《西藏中草》)

文献名 长角婆婆纳、青海婆婆纳(《高植图鉴》)

地方名 “帕下嘎”、“八夏嘎”(青海、西藏藏名)。

功效 全草:清热解毒,祛风利湿。用于肝炎,胆  
囊炎,风湿痛,荨麻疹。

#### 7252170

*Veronica ciliata* Fisch. subsp. *cephaloides* (Pennell)  
Hong

植物名 拉萨长果婆婆纳(《西藏植志》)

文献名 矮小婆婆纳(《高植图鉴》)

功效 全草:入藏药。

#### 7252171

*Veronica ciliata* Fisch. ssp. *zhongdianensis* Hong

植物名 中甸长果婆婆纳(《云南种录》)

药材名 中甸婆婆纳(《迪庆藏药》)

文献名 青海婆婆纳(《高植图鉴》),婆婆纳(《迪庆  
藏药》)

功效 全草:清热,愈疮,生肌止血。用于炎症,疮  
疖,创伤。

#### 7252172

*Veronica didyma* Tenore --- *V. didyma* Tenore var.  
*lilacina* Yamazaki --- *V. polita* Fries

植物名 婆婆纳(《中国植志》)

药材名 婆婆纳(救荒本草)、《汇编》

文献名 双果草(《滇南本草》),狗卵草(《百草镜》)

地方名 卵子草、双肾草(四川、甘肃);陕西:老蔓盘  
子(洛南),老鸦枕头(宝鸡),豆豆蔓(渭南),海马含珠  
(宁陕);浙江:将军草(杭州);安徽:鹅肠菜,鹅肠头;湖  
南:石补钉(凤凰),桑肾子(长沙);四川:双铜锤、走肾  
草、铺盖草(成都);贵州:灯笼草;云南:小接骨草,小灯  
笼草;其他:〔地锦〕,双珠草。

功效 全草:凉血止血,理气止痛。用于吐血,疝  
气,睾丸炎,白带。

#### 7252173

*Veronica henryi* Yamazaki

植物名 华中婆婆纳(《中国植志》)

药材名 华中婆婆纳(《广西药录》)

功效 全草:外用于小儿鹅口疮。

#### 7252174

*Veronica incana* L.

植物名 白婆婆纳(《中国植志》)

药材名 白婆婆纳(《内蒙古中草药》)

地方名 内蒙古:“查干、钦达干”(蒙名)。

功效 全草:消肿止血。用于痢疳红肿。

#### 7252175

*Veronica javanica* Blume

植物名 多枝婆婆纳(《中国植志》)

药材名 小败火草(《西藏中草》)

文献名 爪哇婆婆纳(《中药大辞典》)

地方名 西藏:“贡布区敦木”(藏名)。

功效 全草:祛风散热,解毒消肿。用于乳腺炎,  
痢疾,跌打损伤。外用于疮疖肿痛。

#### 7252176

*Veronica laxa* Benth.

植物名 疏花婆婆纳(《中国植志》)

药材名 疏花婆婆纳《广西药录》

功效 全草：用于疮疡肿毒。

#### 7252177

*Veronica linariifolia* Pall. ex Link --- *Pseudolysimachion linariifolium* (Pall. ex Link) Holub --- *Veronica spuria* auct. non L.

植物名 细叶婆婆纳《中国植志》

药材名 细叶婆婆纳《东北药用植物》

功效 全草：祛风湿，解毒，止痛。用于风湿性关节炎痛。

备考 《江苏南部种子植物手册》(1959)等文献，曾将本种误订为 *V. spuria* L. 此种在我国只产新疆。

#### 7252178

*Veronica linariifolia* Pall. ex Link subsp. *dilatata* (Nakai et Kitagawa) Hong

植物名 水蔓菁《中国植志》

药材名 水蔓菁《救荒本草》、《汇编》

文献名 《地肤子》《救荒本草》，勒马回《药典》，气管炎草《中药大辞典》

地方名 河北：追风草；陕西：珍珠花（宁陕），蓼子草（丹凤）；山东：蜈蚣草、斩龙剑（烟台）；江苏：一支香（丹阳、无锡），狼尾拉花；广西：哮喘草（来宾）。

功效 全草：清热解暑，利尿，止咳化痰。用于支气管炎，肺脓疡，急性肾炎，尿路感染等。

#### 7252179

*Veronica longifolia* L.

植物名 兔儿尾苗《中国植志》

药材名 兔儿尾苗《救荒本草》

文献名 长尾婆婆纳《东检》，长叶婆婆纳《新疆中草药》

地方名 新疆：婆婆纳。

功效 地上部分：祛风除湿，解毒止痛。用于风湿性腰腿痛，咳嗽，气管炎，膀胱炎。

#### 7252180

*Veronica peregrina* L.

植物名 蚊母草《纲目》、《中国植志》

药材名 仙桃草《百草镜》、《汇编》

文献名 接骨仙桃草《救生苦海》，八卦仙桃《医方集听》，蟠桃草、夺命丹、活血丹、接骨仙桃《纲目拾遗》，英桃草《本草求原》，蚊公草、本地老鸦草《岭南采药录》，活血接骨丹《本草推陈》

地方名 接骨草（浙江、江西、湖南）；江苏：小头红（镇江）；浙江：地胡椒（临安），病疳草（乐清）；安徽：小伤力草，小虫草；福建：珠桃草；河南：打伤草，夜郎草，接骨丹，止血草；湖南：虫桃草、金灯草（溆浦）；四川：旱仙桃、小将军（成都）；贵州：无风自动草（贵阳）。

功效 带虫瘰全草：活血消肿，止血，止痛。用于吐血，咯血，衄血，便血，跌打损伤。

#### 7252181

*Veronica persica* Poir.

植物名 阿拉伯婆婆纳《中国植志》

药材名 肾子草《贵州民间药物》

文献名 波斯婆婆纳《江苏南部种册》，灯笼婆婆纳《汇编》

地方名 四川：双铜锤，卵子草；贵州：灯笼草；云南：双架草，曲果草（曲靖），小接骨草、小灯笼草（昭通），婆婆纳。

功效 全草：温肝肾，益气，除湿。用于疝气，睾丸肿痛，腰痛，白带，小便频数。

#### 7252182

*Veronica rockii* Li

植物名 光果婆婆纳《中国植志》

文献名 “冬那端迟”（藏名）《青藏药图》

功效 地上部分：生肌愈创。用于疔疮。

#### 7252183

*Veronica serpyllifolia* L.

植物名 小婆婆纳《中国植志》

文献名 百里香叶婆婆纳《陕西中草药》，圆叶婆婆纳《高植图鉴》，地涩涩《汇编》

地方名 陕西：小对经草（眉县），莽皮草（略阳），仙桃草（平利、眉县）；贵州：水马桑。

功效 带虫瘰的全草：活血散瘀，止血，解毒。用于月经不调，跌打损伤。外用于外伤出血，烧烫伤，蛇咬伤。

#### 7252183a

*Veronica teucrium* L.

植物名 卷毛婆婆纳《中国植志》

药材名 卷毛婆婆纳《汇编》

地方名 四川：“邓木扯”（若尔盖藏名）。

功效 全草：清热解暑，祛风除湿。用于风湿疼痛，流感，尿道炎。

#### 7252183b

*Veronica undulata* Wall.

植物名 水苦菜《中国植志》

药材名 水苦菜《图经》、《汇编》

文献名 水蒿苣《救荒本草》，仙桃草《纲目拾遗》，芒种草《汇编》

地方名 大仙桃草（华东）；上海：野竹青，墙头草，兔子草，水杨树，水菠菜；广西：水种草（隆林）；四川：水仙桃草，接骨仙桃草、虫草、鸭儿草（巴县）。

功效 带虫瘰全草：活血止痛，解毒消肿。用于咽喉痛，肺结核咯血，风湿疼痛，月经不调，血小板减少性紫癜，跌打损伤。外用于骨折，疮疡肿毒。

#### 7252184

*Veronicastrum axillare* (Sieb. et Zucc.) Yamazaki ---

*Botryopleuron axillare* (Sieb. et Zucc.) Hemsl. ---

*Botryopleuron venosum* Hemsl.

植物名 爬岩红《中国植志》

药材名 腹水草《浙江中药手册》

文献名 疔疮草（汪连仕《采药书》），仙桥草《李氏草秘》，钓鱼竿《草木便方》，翠梅草，毛叶仙桥《纲目拾遗》，虎尾悬铃草《牧野日图》，两头蛇、三节两梗《中华医学杂志》，两头芽、八仙过桥《新中医药》，腋生腹水草《江苏南部种册》，毛脉腹水草《中草药通讯》，多穗草

## 《高植图鉴》

地方名 仙人搭桥(浙江、安徽、江西、湖北), 梅叶伸筋(广东、湖南), 吊杆风(湖南、广西), 两头拔、两头拉、两头拖, 双头镇(江西、福建), 两头爬(江西、浙江、福建), 两头根、两头半、叶下红(浙江、福建); 陕西: 钓竿藤(平利); 浙江: 霜里红(德清), 二头马兰, 蟹珠草, 汤生草, 金桑鸟草, 天桥草, 过天桥, 一条筋, 秋草(平阳); 江西: 两头棚, 惊天雷, 万里云, 穿山鞭, 双头藤, 双头拿, 仙草, 仙人过桥, 仙人探桥, 见地活, 两头攀(泰和); 福建: 双头粘、散血丹(闽东), 早青绿(周宁), 七厘丹、七必厘(将乐), 兼麻, 十二花兜, 仙人桥, 铁扁担, 夜壶耳, 田暗青, 山冬瓜, 虎桃草, 两头柴, 两头帮, 御风草, 鸡仔粘, 一条龙, 二条龙, 梅子飞扬(三明专区); 湖北: 红冬草, 见毒消; 湖南: 倒地龙, 倒挂风(辰溪), 吊杆梁, 吊杆龙, 吊杆尾(会同), 吊杆草(会同、怀化), 吊笠草(泸溪), 吊线风、钓鱼藤(湘西), 老君丹(岳阳), 金鸡尾(江华); 广西: 姜公钓鱼竿(钟山); 四川: 金钓莲(米易), 小钓鱼竿、杨村草(成都), 一串鱼, 鱼串草, 小串鱼。

功效 全草: 利尿消肿, 散瘀解毒。用于腹水, 水肿, 小便不利, 月经不调, 闭经, 跌打损伤。外用于腮腺炎, 疔疮, 烧、烫伤, 毒蛇咬伤。

## 7252185

*Veronicastrum brunonianum* (Benth.) Hong ---  
*Calorhabdos brunoniana* Benth.

植物名 美穗草《中国植志》

药材名 美穗草《汇编》

地方名 高山四方麻、黑升麻、咳药、叶下红、小寒药、反背红(西南); 台湾: 金锁匙(台北)。

功效 根茎: 消炎解毒, 止咳化痰, 降气平喘, 消肿止痛。用于扁桃体炎, 胃热痛, 膀胱炎, 乳腺炎, 痢症毒, 赤白痢疾, 慢性气管炎等; 叶: 消食。

## 7252186

*Veronicastrum caulopterum* (Hance) Yamazaki ---  
*Calorhabdos cauloptera* Hance

植物名 四方麻《中国植志》

药材名 四方麻《名实图考》、《汇编》

地方名 四棱草(湖南、云南); 湖南: 青鱼胆, 四方青; 广东: 狼尾拉花; 广西: 山练草, 三练草(桂林), 三轮草, 鱼珠草(阳朔), 正泽兰(富川), 假金鸡尾; 贵州: 四棱菜; 云南: 四棱蒿枝(红河), 四棱三百棒(镇雄); 其他: 四方消。

功效 全草: 清热解毒, 消肿止痛。用于流行性腮腺炎, 咽喉炎, 肠炎, 痢疾, 瘰癧。外用于皮肤湿疹, 烧、烫伤, 痈疖疔疮, 跌打损伤。

## 7252187

*Veronicastrum latifolium* (Hemsl.) Yamazaki ---  
*Botryopleuron latifolium* Hemsl.

植物名 宽叶腹水草《中国植志》

药材名 钓鱼竿《草木便方》、《汇编》

功效 全草: 清热解毒, 利尿消肿, 散瘀止痛。用于肺热咳嗽, 肝炎, 水肿。外用于跌打损伤, 毒蛇咬伤,

烧、烫伤。

## 7252188

*Veronicastrum longispicatum* (Merr.) Yamazaki

植物名 长穗腹水草《中国植志》

药材名 长穗腹水草《广西药录》

地方名 广西: 吊杆青筋(全州)。

功效 叶: 用于跌打损伤。

## 7252189

*Veronicastrum robustum* (Diels) Hong ssp. *grandifolium*  
Chin et Hong

植物名 大叶腹水草《中国植志》

药材名 大叶腹水草《广西药录》

地方名 广西: 九拱桥(资源)。

功效 叶: 用于痢疾, 风湿骨痛, 跌打损伤。

## 7252190

*Veronicastrum sibiricum* (L.) Pennell

植物名 草本威灵仙《中国植志》

药材名 草灵仙《汇编》

文献名 威灵仙《图经》, 九盖草、能消、寿祖《新纲》

地方名 吉林: 九轮草, 冷草(延边); 辽宁: 狼尾巴花, 九节草, 山鞭草, 草玉梅; 内蒙古: “钦达干·苏勒”(蒙名); 陕西: 秤杆升麻(留坝、眉县), 草龙胆、山红花(眉县), 二郎箭(陇县); 宁夏: [龙胆](根), 斩龙剑。

功效 全草或根: 祛风除湿, 解毒, 止血。用于感冒, 风湿性腰腿痛, 肌肉痛, 膀胱炎。外用于创伤出血, 毒蛇咬伤, 毒虫螫伤。

## 7252191

*Veronicastrum stenostachyum* (Hemsl.) Yamazaki ---  
*Botryopleuron stenostachyum* Hemsl.

植物名 细穗腹水草《中国植志》

药材名 钓鱼竿《草木便方》

文献名 长穗腹水草《汇编》, 柔穗腹水草《湖北中草药志》, 腹水草《中草药学》

地方名 陕西: 钓竿藤(平利); 湖北: 红冬草; 其他: 见毒消。

功效 全草: 清热解毒, 利尿消肿, 散瘀止痛。用于肺热咳嗽, 肝炎, 水肿。外用于跌打损伤, 毒蛇咬伤, 烧、烫伤。

## 7252192

*Veronicastrum stenostachyum* (Hemsl.) Yamazaki  
subsp. *plukenetii* (Yamazaki) Hong

植物名 江西细穗腹水草(拟)

药材名 江西腹水草(拟)

文献名 腹水草《中国植志》

地方名 江西: 仙人搭桥(铜鼓), 两头拉(金溪), 穿山鞭(浮梁), 钓鱼竿, 两头蹦, 两头蛇, 见肿消。

功效 全草: 用于血吸虫病。

## 7252193

*Veronicastrum villosulum* (Miq.) Yamazaki ---  
*Botryopleuron villosulum* (Miq.) Makino

植物名 毛叶腹水草《中国植志》

药材名 腹水草《浙江中药手册》

文献名 狗尾巴《高植图鉴》

地方名 江西:毛腹水草,仙人搭桥,仙人探桥,两头爬(德兴),万里云(南昌),两头柱,两头拦,两头绷,惊天雷;其他:多穗草,爬崖红,悬铃草。

功效 地上部分:利尿消肿,散瘀解毒。

#### 7252194

*Veronicastrum villosulum* (Miq.) Yamazaki var. *glabrum* Chin et Hong

植物名 铁钩竿(浙江)、《中国植志》

地方名 安徽:两头忙。

功效 全草:用于血吸虫病,外伤。

7252195 见 7252183a

7252196 见 7252183b

#### 7252197

*Wightia speciosissima* (D. Don) Merr.

植物名 美丽桐《中国植志》

文献名 岩梧桐《云南植志》

地方名 云南:[泡桐](临沧),石紫背、紫背金丹、石牡丹(龙陵),大黑牛(昌宁),大黑骨(保山),大接骨(永平),大天青地红(保山、双江),大天绿地红(沧源)。

功效 根:用于跌打骨折,风湿关节炎,四肢麻木,胃痛,月经不调,宫寒不孕,体虚。

### 7253 列当科 Orobanchaceae

#### 7253001

*Aeginetia indica* L.

植物名 野菰《中国植志》

药材名 野菰《质问本草》、《汇编》

文献名 蕪寄生《广西本草选编》

地方名 [金锁匙](浙江、台湾),烟管头草(江苏、江西);江苏:土灵芝草(南京),蕪寄生;浙江:芒杆花(金华),僧帽花(杭州);江西:蛇箭草(瑞昌),白茅花(南丰),赤膊花(婺源),烧不死(景德镇);福建:官真花;台湾:[茶匙痕],芋菰草,官真痕,土地公拐,灌草痕,寄生仔草;湖南:土灵芝,蛇头子药;广西:马口含珠,鸭脚板,烟斗花;云南:黄寄生。

功效 全草:有小毒。解毒消肿,清热凉血。用于扁桃体炎,咽喉炎,尿路感染,骨髓炎。外用于毒蛇咬伤,疔疮。

#### 7253002

*Aeginetia orientalis* L.

植物名 东野菰《汇编》

地方名 浙江:野菰。

功效 根、花:清热解毒,抗菌消炎。用于骨髓炎,扁桃体炎,咽喉炎,尿路感染,小儿高热疔疮,毒蛇咬伤。

#### 7253003

*Aeginetia sinensis* G. Beck

植物名 中国野菰《高植图鉴》

文献名 草寄生《云南种录》

地方名 安徽:横杯草;云南:箭杆七(绥江)。

功效 根、全草、花:有小毒。解毒消肿,清热凉

血。

#### 7253004

*Boschniakia himalaica* Hook. f. et Thoms. --- *Xylanche himalaica* (Hook. f. et Thoms.) G. Beck --- *Boschniakia kawakamii* Hayata

植物名 丁座草《中国植志》

药材名 丁座草《汇编》

文献名 千斤重《全展选编·传染病》

地方名 陕西:枇杷玉(太白山),枇杷芋;青海:半夏;云南:一支腊(楚雄),千斤坠,都拉、蒙茯苓(丽江);其他:西域丁座草。

功效 块茎:有小毒。理气止痛,祛风活络,杀虫解毒。用于胃痛腹胀,跌打损伤,风湿关节疼痛,月经不调,血吸虫病,草乌中毒。外用于腮腺炎;全草:止咳祛痰,消胀健胃。

#### 7253005

*Boschniakia rossica* (Cham. et Schlecht.) Fedtsch. --- *B. glabra* C. A. Mey. ex Bongard

植物名 草苋蓉《高植图鉴》

药材名 草苋蓉《唐本草》、《汇编》

文献名 [肉苋蓉]《高植图鉴》,和肉苋蓉(小泉《药植》)

地方名 兔子拐棍(东北);吉林:苋蓉;内蒙古:“宝日-高要”(蒙名);四川:“达米蓉朵”(若尔盖藏名);其他:日本肉苋蓉。

功效 全草:有小毒。补肾壮阳,润肠通便。用于肾虚阳痿,腰膝冷痛,肠燥便秘。

备考 本植物通常寄生于高山柞木属 *Alnus* 植物的根上,与肉苋蓉的寄主不同。

#### 7253006

*Christisonia hookeri* Clarke --- *C. sinensis* G. Beck --- *Gleadovia lepoense* Hu --- *G. kwangtungense* Hu

植物名 假野菰《中国植志》

文献名 雷波蕪寄生《拉汉英种称》,川蕪寄生《广西药录》

地方名 海南:花菰;广西:石腊竹(临桂),石蜡烛;四川:竹花,竹子花。

功效 全株:用于阴部含疳。

#### 7253007

*Cistanche deserticola* Y. C. Ma

植物名 肉苋蓉《中国植志》

药材名 肉苋蓉《本经》、《药典》

文献名 肉松蓉、黑司令《吴普本草》,纵蓉《本草经集注》,地精《石药尔雅》,金笋、[地丁]、别当、碧水龙、[紫花地丁]《新纲》,甜大芸、淡大芸、盐大芸、咸大芸、咸苋蓉《中药大辞典》

地方名 内蒙古:大芸,苋蓉,“察干-高要”(蒙名),寸芸,沙漠人参(阿拉善),盐苋蓉,淡苋蓉,甜苋蓉。

功效 带鳞片的肉质茎:补肾阳,益精血,润肠通便。用于阳痿,不孕,腰膝酸软,筋骨无力,肠燥便秘。

#### 7253008

*Cistanche salsa* (C. A. Mey.) G. Beck --- *C. ambigua*



(Bunge) G. Beck

植物名 盐生肉苁蓉《中国植志》

药材名 肉苁蓉《本经》、《中药大辞典》

文献名 肉苁蓉、黑司令《吴普本草》、纵蓉《本草经集注》、地精《石药尔雅》、〔地丁〕、金笋、〔紫花地丁〕、碧水龙《新纲》、迷肉苁蓉《沙漠药植》

地方名 大芸(内蒙古、青海、新疆);内蒙古:“呼吉日色格-察干-高要”、“查干-告亚”(蒙名),苁蓉;新疆:甜大芸,淡大芸,盐大芸;其他:寸云,淡苁蓉,甜苁蓉。

功效 肉质茎:补肾,益精,润燥,滑肠。

**7253009***Cistanche sinensis* G. Beck

植物名 沙苁蓉《中国植志》

药材名 沙苁蓉《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古:“盾达地音-察干-高要”(蒙名)。

功效 肉质茎:补肾,益精,润燥,滑肠。

**7253009a***Cistanche tubulosa* (Schenk) Wight

植物名 管花肉苁蓉(新疆)

药材名 肉苁蓉(新疆)

功效 肉质茎:补肾,益精,润燥,滑肠。

**7253010***Gleadovia ruborum* Gamble et Prain --- *G. yunnanense* Hu

植物名 蘼寄生《中国植志》

药材名 蘼寄生《广西药录》

地方名 广西:石腊竹(临桂)。

功效 全草:用于梅毒。

**7253011***Orobanchae coerulescens* Steph. --- *Orobanchae ammophila* C. A. Meyer

植物名 列当《高植图鉴》

药材名 列当《开宝本草》、《汇编》

文献名 栗当《食医心镜》、草苁蓉《开宝本草》、花苁蓉《日华子本草》、〔紫花地丁〕《新纲》、紫花列当《内蒙古中草药》、草庄用《朝植乡名》

地方名 兔子拐棍(东北、内蒙古),兔子拐杖(辽宁、河北、内蒙古),兔子拐棒(辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东),独根草(东北、河北、内蒙古);辽宁:兔子腿;河北:〔鬼见愁〕、〔夏枯草〕;内蒙古:“特莫根-素勒-乌布斯”、“稍镇”、“力木梯克”(蒙名);新疆:“树木布亚”(维吾尔);山东:喇马嘴(文登),猴儿腿(烟台),裂马嘴;湖北:借母怀胎(神农架);云南:降魔杆,蒿枝七星。

功效 全草及根:补肾助阳,强筋骨。用于性神经衰弱,腰腿酸软。外用于小儿腹泻,肠炎,痢疾。

**7253012***Orobanchae megalantha* H. Smith --- *O. eximia* H. Smith

植物名 大花列当《中国植志》

药材名 大花列当《青藏药图》

文献名 “浊香则”(藏名)《青藏药图》

功效 全草:用于子宫出血,鼻衄。

**7253013***Orobanchae pycnostachya* Hance

植物名 黄花列当《高植图鉴》

药材名 列当《开宝本草》、《中药大辞典》

文献名 淡黄花列当《本草图谱》

地方名 河北:兔子拐棒,〔夏枯草〕;内蒙古:独根草,“希日-特木根-苏乐”(蒙名)。

功效 全草及根:补肾助阳,强筋骨。用于性神经衰弱,腰腿酸软。外用于小儿腹泻,肠炎,痢疾。

**7253014***Orobanchae sinensis* H. Smith

植物名 四川列当《中国植志》

药材名 列当(四川)

地方名 青海:兔子拐棒,独根草。

功效 全草:补肾助阳,强筋骨。

**7253015***Orobanchae yunnanensis* (G. Beck) Hand. Mazz. --- *O. alsatica* Kirschl. var. *yunnanensis* G. Beck --- *O. sinensis* auct. non H. Smith

植物名 滇列当《中国植志》

药材名 列当(云南)

文献名 西藏列当《西藏中草药》

地方名 西藏:草苁蓉,栽爪橡则。

功效 全草及根:补肾助阳,强筋骨。用于神经衰弱,腰腿酸软。外用于小儿腹泻,肠炎,痢疾。

**7253016***Phacellanthus tubiflorus* Sieb. et Zucc. --- *Tienmuia triandra* Hu

植物名 黄筒花《高植图鉴》

地方名 湖北:假菌实(神农架);湖南:白莲花(蓝山县瑶名)。

功效 全草:清热利湿,顺气除痰。用于肝炎。

**7254 狸藻科 Lentibulariaceae****7254001***Utricularia aurea* Lour.

植物名 黄花狸藻《中国植志》

文献名 狸藻《华东水植》,黄花挖耳草《台湾植志》

地方名 广东:金鱼苗;广西:水上一枝黄花(钦州)。

功效 全草:外用于急性结膜炎。

**7254002***Utricularia bifida* L.

植物名 狸藻挖耳草(拟)

文献名 耳挖草《植物学大辞典》,〔挖耳草〕《中国植志》

地方名 金耳挖(广西、云南),割鸡芒(广东、贵州)。

功效 全草:用于中耳炎。

**7256 苦苣苔科 Gesneriaceae****7256001***Aeschynanthus acuminatus* Wall. ex A. DC. --- *A. chinensis* Gardn. et Champ.

植物名 芒毛苣苔《中国植志》

药材名 石榕《汇编》

文献名 长果藤《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾:白面风, 阔骨草; 广东:十二两银、石壁风、腰围风(阳春), 大叶榕藤(惠阳), 牛奶树(连县); 广西:石难风(昭平), 石龙凤(藤县), 白背风(金秀、大瑶山)。

功效 全株:补血, 宁神, 祛风湿。用于风湿骨痛, 跌打损伤, 神经衰弱, 慢性肝炎; 根茎:外用于止血。

#### 7256002

*Aeschynanthus austroyunnanensis* var. *guangxiensis* (Chun ex W. T. Wang) W. T. Wang --- *A. guangxiensis* Chun ex W. T. Wang

植物名 广西芒毛苣苔《广西药录》

地方名 广西:下山虎(上林), 小叶石仙桃(天等)。

功效 全株:用于咳嗽, 坐骨神经痛。外用于关节炎。

#### 7256003

*Aeschynanthus bracteatus* Wall. ex DC.

植物名 显苞芒毛苣苔《中国植志》

药材名 荷花藤(云南河口)

地方名 云南:对节生(西畴), 水积病药。

功效 全草:清热利湿。用于黄疸, 根:用于水积病。

#### 7256004

*Aeschynanthus buxifolius* Hemsl. ex Dunn

植物名 黄杨叶芒毛苣苔《高植图鉴》

地方名 上树蜈蚣(广西、云南)。

功效 全草:用于蛇虫咬伤。

#### 7256005

*Ancylostemon humilis* W. T. Wang

植物名 矮直瓣苣苔《中国植志》

文献名 小直瓣苣苔《神农架药录》

地方名 湖北:岩腊菜(神农架)。

功效 全草:止血, 祛风湿。

#### 7256006

*Ancylostemon notochlaena* (Levl. et Vant.) Craib

植物名 贵州直瓣苣苔《中国植志》

药材名 贵州直瓣苣苔《贵州药录》

功效 全草:清热解毒, 补虚止血。用于白带, 血崩, 咳嗽, 牙周炎, 痢疮。

#### 7256007

*Anna ophiorrhizoides* (Hemsl.) Burtt et Davidson ---

*Didissandra sinoophiorrhizoides* W. T. Wang ---

*Lysionotus ophiorrhizoides* Hemsl. --- *Didymocarpus cavaleriei* Levl.

植物名 白花大苞苣苔《中国植志》

文献名 漏斗苣苔《汇编》

地方名 四川:乌云爪(峨眉山); 贵州:青竹标; 云南:小粘头, 岩参(思茅), 石莲花、[半边莲](昭通), 吊苣苔(红河), 石豇豆。

功效 根:止血, 止咳, 利湿, 镇痛。用于咳血, 风湿疼痛。

#### 7256008

*Beccarinda tonkinensis* (Pellegrin) Burtt

植物名 横蒴苣苔《高植图鉴》

药材名 横蒴苣苔《广西药录》

功效 全草:用于水肿, 咳嗽。

#### 7256009

*Boea clarkeana* Hemsl.

植物名 大花旋蒴苣苔《中国植志》

药材名 牛耳散血草(陕西)

文献名 旋蒴苣苔《高植图鉴》

地方名 陕西:散血草; 浙江:歇壁蝴蝶(云和); 湖北:岩板还阳(神农架)。

功效 全草:止血, 散血, 消肿。外用于外伤出血, 跌打损伤, 小儿慢惊风。

#### 7256010

*Boea hygrometrica* (Bunge) R. Brown

植物名 旋蒴苣苔《中国植志》

药材名 牛耳草《名实图考》、《汇编》

文献名 翻魂草《名实图考》, 蝴蝶草《全展选编·传染病》, 八宝茶《高植图鉴》

地方名 猫儿朵(陕西、湖北、广西、云南、贵州); 山西:大发汗草、石毛襄(太行山); 陕西:石花子、石崖壁(山阳), [岩白菜](柞水), 猪耳朵(旬阳), 石莲苔, 白绒草, 崖青叶, 绵还阳草, 棕蒲团; 浙江:三白菜(天目山), 菜蝴蝶(宁波), 猫爪三七(临安), 猫耳草; 福建:水苣菜, 白石葫; 湖北:岩生还阳、猫儿还阳(神农架); 云南:地虎皮, 地青药, 还魂草; 四川:牛耳风; 其他:验合花。

功效 全草:散瘀止血, 解毒。用于创伤出血, 跌打损伤, 肠炎, 中耳炎。

#### 7256011

*Boeica porosa* Clarke --- *B. tonkinensis* (Kraenzl.) Burtt

植物名 孔药短筒苣苔《中国植志》

文献名 短筒苣苔《广西药录》

地方名 广西:大黄叶(平南)。

功效 叶:外用于疮疖。

#### 7256012

*Briggsia chienii* Chun --- *B. chingii* (Merr.) Chun

植物名 浙皖粗筒苣苔《高植图鉴》

药材名 佛肚花《浙江民药》

地方名 浙江:石燕三七(临安), [金丝草](临海), 虎皮(仙居、温州), 岩青菜(龙泉); 其他:小苣草, 华东佛, 肚苣苔, 岩白菜。

功效 根及全草:解表, 祛风, 活血, 消肿毒。用于小儿惊风, 感冒, 劳损, 筋骨酸痛。外用于痈疖, 无名肿毒, 外耳渗出性湿疹。

#### 7256013

*Briggsia longipes* (Hemsl.) Craib --- *Didissandra longipes*

Hemsl. ex Oliv.

植物名 盾叶粗筒苣苔《高植图鉴》

地方名 贵州:锈草。

功效 全草:舒筋壮骨, 止咳止血。用于骨折, 跌打损伤, 咯血, 癆伤咳嗽。

## 7256014

*Briggsia macrosiphon* (Hance) Chun

植物名 大嘴肥肚苣苔《广西植志》  
 药材名 大嘴佛肚苣苔《广西药录》  
 地方名 广西:石毛射(岑溪)。  
 功效 全株:清热,消肿。

## 7256015

*Briggsia mihieri* (Franch.) Craib

植物名 革叶粗筒苣苔《高植图鉴》  
 药材名 革叶粗筒苣苔《广西药录》  
 文献名 锈草《高植图鉴》  
 地方名 贵州:罐罐花,岩萼苣。  
 功效 全草:外用于跌打肿痛。

## 7256016

*Briggsia speciosa* (Hemsl.) Craib

植物名 鄂西粗筒苣苔《高植图鉴》  
 药材名 清水还阳《神农架药录》  
 地方名 湖北:雅头还羊。  
 功效 全草:活血散瘀。用于劳伤。

## 7256017

*Calcareoboea coccinea* C. Y. Wu ex H. W. Li

植物名 朱红苣苔《中国植志》  
 地方名 广西:山艾(乐业)。  
 功效 全草:用于咳嗽,吐血。

## 7256018

*Chirita eburnea* Hance --- *Didymocarpus eburneus* (Hance) Levl.

植物名 牛耳朵《中国植志》  
 药材名 牛耳岩白菜《汇编》  
 文献名 呆白菜、矮白菜《名实图考》  
 地方名 岩花、猫耳朵(四川、贵州),岩白菜(四川、广西、贵州);湖北:野烟(神农架),岩青菜;湖南:山金兜菜,爬面虎;广西:石三七(贵县),石虎耳(柳州),凌玄参、老虎耳(桂林),牛耳草,凌人参,凌云土人参;四川:毛白菜、金山岩白菜(南川)。

功效 根茎或全草:补虚,止咳,止血,除湿。用于阴虚咳嗽,肺结核咳血,红崩,白带。外用于外伤出血,痈疮。

## 7256019

*Chirita fimbrispala* Hand.-Mazz. --- *Didymocarpus fimbrispalus* (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz.

植物名 蚂蟥七(江西)、《中国植志》  
 药材名 蚂蟥七《汇编》  
 文献名 穗萼长蒴苣苔《广西药录》  
 地方名 江西:石蜈蚣(泰和),石琪;湖南:岩蚂蟥,岩蜈蚣;广西:石螃蟹,红蚂蟥七(兴安)。

功效 根茎:健脾消食,清热利湿,活血止痛。用于小儿疳疾,胃痛,肝炎,痢疾,肺结核咳血。外用于刀伤出血,无名肿毒,跌打损伤。

## 7256020

*Chirita fimbrispala* Hand.-Mazz. var. *mollis* W. T. Wang

植物名 密毛蚂蟥七《中国植志》  
 药材名 密毛蚂蟥七《广西药录》  
 地方名 广西:石蚂蟥(上思)。  
 功效 根茎:用于哮喘。

## 7256021

*Chirita guelinensis* W. T. Wang

植物名 桂林唇柱苣苔《中国植志》  
 地方名 广西:山蚂蟥(桂平),蚂蟥七(临桂)。  
 功效 根茎、叶:用于咳嗽。外用于跌打损伤。

## 7256022

*Chirita hamosa* R. Br.

植物名 钩序唇柱苣苔《中国植志》  
 文献名 叶序唇柱苣苔《广西药录》  
 地方名 广西:半边叶、肺叶(天等)。  
 功效 全草:用于蛇咬伤,小便不利。

## 7256023

*Chirita hedyotideae* (Chun) W. T. Wang --- *Didymocarpus hedyotideus* Chun

植物名 肥牛草《中国植志》  
 药材名 红接骨草《汇编》  
 文献名 耳草长蒴苣苔《广西药录》  
 地方名 广西:石上莲(南宁),矮脚甘松,〔胡黄连〕。  
 功效 全草:凉血散瘀,消肿止痛。用于瘀伤咳嗽,跌打损伤,骨折,痈疮疔肿。

## 7256024

*Chirita heterotricha* Merr.

植物名 烟叶唇柱苣苔《中国植志》  
 文献名 异毛唇柱苣苔、岩白菜《汇编》,烟叶长蒴苣苔《海南植志》  
 地方名 四川:崖白菜。  
 功效 根茎或全草:补虚,止咳,止血,除湿。

## 7256025

*Chirita linearifolia* W. T. Wang

植物名 线叶唇柱苣苔《中国植志》  
 地方名 广西:红接骨(隆安),石上莲(南宁)。  
 功效 根茎:用于瘀伤咳嗽。外用于骨折,跌打肿痛,疔疮。

## 7256026

*Chirita longgangensis* W. T. Wang

植物名 崙岗唇柱苣苔《中国植志》  
 文献名 崙岗唇柱苣苔《广西药录》  
 功效 根茎:用于跌打损伤,风湿骨痛。

## 7256027

*Chirita longgangensis* W. T. Wang var. *hongyao* S. Z. Huang

植物名 红药《中国植志》  
 药材名 红药《广西药录》  
 功效 全草:温补养血。用于贫血。

## 7256028

*Chirita medica* D. Fang ex W. T. Wang

植物名 药用唇柱苣苔《中国植志》  
 药材名 药用唇柱苣苔《广西药录》

地方名 广西:牛耳朵(平乐)。

功效 根茎:用于痢疾。

#### 7256029

*Chirita minutimaculata* D. Fang et W. T. Wang

植物名 微斑唇柱苣苔《中国植志》

地方名 广西:石上蚂蟥(天等)。

功效 根茎:用于疮疡肿毒。

#### 7256030 见 7256023

#### 7256031

*Chirita ophiopogoides* D. Fang et W. T. Wang

植物名 条叶唇柱苣苔《中国植志》

地方名 广西:耳羊(扶绥)。

功效 根茎:用于风湿骨痛,跌打损伤,骨折,癆伤咳嗽。

#### 7256032

*Chirita parvifolia* W. T. Wang

植物名 小叶唇柱苣苔《中国植志》

药材名 小叶唇柱苣苔《广西药录》

功效 根茎:用于小儿疳积。

#### 7256033

*Chirita pinnatifida* (Hand.-Mazz.) Burtt --- *Didymocarpus pinnatifidus* Hand.-Mazz. --- *Chirita quercifolia* Wood

植物名 羽裂唇柱苣苔《中国植志》

药材名 浅裂长蒴苣苔《广西药录》

文献名 浅裂唇柱苣苔《植分学报》

地方名 广西:石岩菜(钟山),破血丹。

功效 全草:用于痢疾,跌打损伤。外用于消肿毒。

#### 7256034

*Chirita pseudoeburnea* D. Fang et W. T. Wang

植物名 紫纹唇柱苣苔《中国植志》

文献名 岩白菜《广西药园药录》

功效 根:化痰止咳。用于哮喘。

#### 7256035

*Chirita pumila* D. Don

植物名 斑叶唇柱苣苔《高植图鉴》

药材名 虎须草《元江哈尼族药》

地方名 贵州:岩葛苣;云南:“哈拉美雌甲啊”(元江哈尼语)。

功效 全草:舒筋活血,消肿止痛。用于跌打损伤,瘀血肿痛。

#### 7256036

*Chirita sinensis* Lindl. --- *Didymocarpus sinensis* (Lindl.) Levl.

植物名 唇柱苣苔《中国植志》

文献名 华长蒴苣苔《广西植录》

地方名 广西:石蚂蟥(罗城)。

功效 全株:用于无名肿毒。

#### 7256037

*Chirita spinulosa* D. Fang et W. T. Wang

植物名 刺齿唇柱苣苔《中国植志》

地方名 广西:山芭蕉(扶绥)。

功效 根茎:用于风湿骨痛,跌打损伤,骨折,癆伤咳嗽。

#### 7256038

*Chirita swinglei* (Merr.) W. T. Wang

植物名 钟冠唇柱苣苔《中国植志》

地方名 广西:白芨药(武鸣)。

功效 全草:用于疮疡肿毒。

#### 7256039

*Chirita tenuifolia* W. T. Wang

植物名 薄叶唇柱苣苔《中国植志》

药材名 薄叶唇柱苣苔《广西药录》

功效 全草:用于跌打损伤。

#### 7256040

*Chiritopsis bipinnatifida* W. T. Wang

植物名 羽裂小花苣苔《中国植志》

地方名 广西:白疔芋(临桂)。

功效 全草:外用于疮疡肿毒。

#### 7256041

*Chiritopsis cordifolia* D. Fang et W. T. Wang

植物名 心叶小花苣苔《中国植志》

药材名 心叶小花苣苔《广西药录》

功效 全草:用于外伤,烫伤,疮疖。

#### 7256042

*Chiritopsis repanda* W. T. Wang

植物名 小花苣苔《中国植志》

药材名 小花苣苔《广西药录》

地方名 广西:水滴(上林),阴山泽(桂林)。

功效 全草:用于肺结核。

#### 7256043

*Conandron ramondiioides* Sieb. et Zucc. --- *C. ramondiioides* var. *taiwanensis* Masamune

植物名 苦苣苔《中国植志》

药材名 苦苣苔《安徽中草药》

地方名 浙江:一张白(温州),岩菜(泰顺),锯齿三七(临安);安徽:江边一碗水,红水珠,红拐芥菜;江西:水繁草;其他:闹骨草。

功效 全草:清热解毒。用于胃热呕逆,痔疮肿痛,尿血,疔疮痈疽初起,跌打损伤。外用于毒蛇咬伤。

#### 7256044

*Corallodiscus cordatulus* (Craib) Burtt --- *Didissandra cordatula* Craib

植物名 珊瑚苣苔《高植图鉴》

药材名 滴滴花《汇编》

文献名 翻魂草、牛耳草《名实图考》

地方名 九倒生、还魂草、虎耳还魂草(四川、贵州);湖北:马耳还阳、猪耳还阳(神农架);湖南:打不死;云南:小心叶石花,岩白菜。

功效 全草:健脾,止血,化痰。用于小儿疳积,跌打损伤及刀伤。

#### 7256045

*Corallodiscus flabellatus* (Craib) Burtt --- *Didissandra*

*flabellata* Craib

植物名 石胆草《中国植志》

药材名 石胆草《滇南本草》、《汇编》

文献名 牛耳草《名实图考》

地方名 [石花] (陕西、云南、西藏); 云南: [生扯拢] (昭通), [石莲花]、岩指甲 (昆明), 镇心草 (保山), 石荷叶, 石蝴蝶, 虎耳还魂草, 扁叶珊瑚盘; 其他: 地蒲团, 银子药

功效 全草: 有小毒。活血, 祛湿, 止血生肌, 止痛。用于月经不调, 白带过多, 心悸, 心口痛, 湿热痹症, 小儿疳积。外用于外伤出血, 疖肿, 咽喉肿痛。

#### 7256046

*Coralodiscus flabellatus* var. *sericeus* (Craib) K. Y. Pan --- *C. sericeus* (Craib) Burt. --- *Didissandra sericeus* Craib

植物名 绢毛石花《中国植志》

药材名 石芮《云南药录》

文献名 绢毛石胆草《云南种录》

地方名 云南: [石莲花] (丽江)。

功效 全草: 清热解毒, 强肾, 止血。用于热性腹泻, 阳痿早泄, 月经不调, 白带过多。

#### 7256047

*Coralodiscus kinginus* (Craib) Burt. --- *C. grandis* (Craib) Burt.

植物名 卷丝苣苔《高植图鉴》

药材名 卷丝苦苣苔《西藏中草》

文献名 卷丝珊瑚苣苔《中药大辞典》

地方名 西藏: “渣加哈格” (藏名)。

功效 全草: 清热解毒, 强肾, 止血。用于野菜、肉类、乌头中毒, 热性腹泻, 阳痿早泄, 月经不调, 白带过多。

#### 7256048

*Deinocheilos sichuanense* W. T. Wang

植物名 全唇苣苔《中国植志》

地方名 四川: 金丝还魂草 (巫溪)。

功效 全草: 用于跌打损伤, 风湿病。

#### 7256049

*Didissandra begonifolia* Levl.

植物名 大苞漏斗苣苔《中国植志》

功效 全草: 清热解毒, 止咳止血。用于跌打损伤, 癆伤咳嗽, 咯血, 吐血。

#### 7256050

*Didissandra macrosiphon* (Hance) W. T. Wang

植物名 长筒漏斗苣苔《中国植志》

地方名 广西: 老虎耳 (陆川)。

功效 全草: 清热消肿。用于疮疡肿毒。

#### 7256051

*Didissandra sesquifolia* Clarke --- *Didymocarpus sesquifolia* (Clarke) Levl.

植物名 大叶锣《中国植志》

药材名 大一面锣《四川中药志》

地方名 四川: 大一面绿、白毛草 (峨边), 一面锣 (峨

眉山)。

功效 全草: 益气, 补肾, 固精。用于心脏衰弱, 红崩白带, 梦遗滑精, 小便淋漓; 根: 化痰止咳。

#### 7256052

*Didissandra sinica* (Chun) W. T. Wang --- *Raphiocarpus sinicus* Chun

植物名 无毛漏斗苣苔《中国植志》

药材名 绵阳岩白菜《汇编》

地方名 广西: 接骨草 (上思); 四川: 岩白菜。

功效 全草: 养阴清热, 活血止痛。用于癆伤咯血, 血崩, 跌打损伤, 痛经。

#### 7256053

*Didymocarpus hancei* Hemsl.

植物名 东南长蒴苣苔《高植图鉴》

药材名 石茶《汇编》

文献名 石麻婆子草、石芥菜《汇编》

功效 全草: 清凉解毒。用于上呼吸道感染疾患

#### 7256054

*Didymocarpus niveolanosus* D. Fang et W. T. Wang

植物名 绵毛长蒴苣苔《中国植志》

药材名 绵毛长蒴苣苔《广西药录》

功效 全草: 用于跌打损伤。

#### 7256055

*Didymocarpus sinoprimum* W. T. Wang --- *D. primulinus* W. T. Wang

植物名 报春长蒴苣苔《中国植志》

功效 全草: 消炎。

#### 7256056

*Didymocarpus stenanthos* Clarke --- *Oreocharis micrantha* Levl.

植物名 狭冠长蒴苣苔《中国植志》

文献名 狭冠苣苔《峨眉药植资源》, 狭花长蒴苣苔《广西植录》

功效 全草: 祛风除湿。用于跌打损伤; 根: 用于蛇咬伤。

#### 7256057

*Didymocarpus yuenlingensis* W. T. Wang

植物名 沅陵长蒴苣苔《中国植志》

药材名 沅陵长蒴苣苔《湖南药物志》

地方名 湖南: 飞蛾娘菜。

功效 全草: 用于跌打肿痛, 外伤出血。

#### 7256058

*Didymocarpus yunnanensis* (Franch.) W. W. Smith

植物名 云南长蒴苣苔《中国植志》

药材名 象耳朵叶《元江哈尼族药》

地方名 云南: “亚麻罗布” (哈尼语), “思诺祁” (彝名), 新香草, 新地生, 石上莲。

功效 全草: 有毒。消疳积, 消肿止痛, 止血, 促进伤口愈合。用于小儿疳积, 癆伤腰痛, 瘀血肿痛, 刀枪伤, 跌打肿痛。

#### 7256059

*Epithema carnosum* (G. Don) Benth. --- *Arkinia carnos*

G. Don

植物名 盾座苣苔《中国植志》

地方名 贵州:青竹标。

功效 全草:止咳,止血,镇痛。用于咳嗽,跌打损伤。

**7256060***Gyrocheilos chorisepalum* W. T. Wang --- *Didymocarpus floribundus* Chun et W. T. Wang

植物名 圆唇苣苔《中国植志》

药材名 圆唇苣苔《广西药录》

地方名 广西:蚂蟥七(上林)。

功效 全草:外用于疮疡肿毒。

**7256061***Gyrocheilos chorisepalum* W. T. Wang var. *synsepalum* W. T. Wang --- *Didymocarpus hemsleyanus* Levl.

植物名 北流圆唇苣苔《中国植志》

药材名 白天葵《广西药录》

功效 根、叶:外用于头疮。

**7256062***Gyrocheilos retrotrichum* W. T. Wang - *Didymocarpus floribundus* Chun var. *retrotrichus* Chun ex W. T. Wang

植物名 折毛圆唇苣苔《中国植志》

药材名 蚂蟥七《湖南侗族医药研究》

功效 全草:清热解毒,消积。用于疳耳风,小儿疳积。

**7256063***Hemiboea cavaleriei* Levl.

植物名 贵州半蒴苣苔《中国植志》

药材名 贵州半蒴苣苔《湖南药物志》

地方名 福建:软黄花金魁;江西:野蓝;湖南:称杆草;广西:水松萝(贵县),翠子菜,山金花菜,石山凤仙;四川:铁杆水草。

功效 全草:清热解毒,利尿除湿。用于烫伤,跌打损伤,疔疮,蛇咬伤,腹水,咳血。

**7256064***Hemiboea cavaleriei* Levl. var. *paucinervis* W. T. Wang et Z. Y. Li --- *H. flava* C. Y. Wu ex H. W. Li

植物名 疏脉半蒴苣苔《中国植志》

地方名 广西:尿猴草(靖西),尿泡草(凤山),岩莴苣;贵州:岩蓝靛;云南:水泡菜。

功效 叶:用于泡疹,湿疹。

**7256065***Hemiboea follicularis* Clarke --- *H. esquirolii* Levl.

植物名 华南半蒴苣苔《中国植志》

药材名 大降龙草《湖南侗族医药研究》

文献名 蕲菜半蒴苣苔《广西药录》

地方名 广西:山竭(融安),尿猴草(靖西),水桐。

功效 全草:用于咳嗽,肺炎,骨折;叶:外用于化脓性疾病,毒蛇咬伤。

**7256066***Hemiboea henryi* Clarke --- *H. subcapitata* auct. non Clarke

植物名 半蒴苣苔《中国植志》

药材名 半蒴苣苔《广西药录》

文献名 大日降龙草《汇编》

地方名 山白菜(浙江、贵州);陕西:蒲公英、麻及木;浙江:石菖菜(淳安),牛蹄草,牛舌头,白观音扇,石塔青;安徽:石花,[降龙草];江西:石杓麦;福建:乌梗子;湖北:岩茄子,岩苣菜,降蛇草;湖南:牛耳菜;广西:[半边莲](富川),尿桶草(全州),蚂拐菜,大蚂拐菜;四川:麻脚杆,岩莴苣,石莴苣。

功效 全草:清热利湿。用于湿热黄疸,中暑,麻疹,喉痛,外伤肿毒,毒蛇咬伤,烧烫伤。

各考 《江苏南部种册》(1959)学名误订为 *Hemiboea subcapitata* Clarke.**7256067***Hemiboea omeiensis* W. T. Wang

植物名 峨眉半蒴苣苔《中国植志》

地方名 四川:[金沸草]。

功效 全草:用于痢。

**7256068***Hemiboea strigosa* Chun ex W. T. Wang

植物名 腺毛半蒴苣苔《中国植志》

药材名 肉肉菜《湖南侗族医药研究》

功效 全草:消食,生津,补血,壮骨。用于小儿软骨病。

**7256069***Hemiboea subacaulis* Hand. -Mazz. --- *Chiita subacaulis* (Hand. -Mazz.) Burtt

植物名 短茎半蒴苣苔《中国植志》

药材名 蚌蛇草《湖南药物志》

文献名 蚌蛇菜《湖南侗族医药研究》

地方名 降龙草(湖北、湖南);湖北:水泡草、降蛇草(神农架);湖南:小梁药(吉首),冷水草(永顺、古丈),秤杆蛇药(麻阳),浸骨头(大庸);贵州:天青地花,四台花,虎山叶。

功效 全草:清热解毒。用于过敏性皮炎,漆疮。

**7256070***Hemiboea subcapitata* Clarke --- *H. marmorata* Levl.

植物名 降龙草《中国植志》

药材名 降龙草《湖南药物志》

文献名 冷水草《中药大辞典》

地方名 浙江:白雌雄草,山兰(丽水);湖北:降蛇草;湖南:秤杆蛇药;广西:马拐,牛耳朵;四川:四台花;贵州:散血毒莲,雪江菜;云南:水泡菜,水泡菜叶(西畴)。

功效 全草:有毒。解毒。用于蛇咬伤,疮疖。

**7256071***Hemiboea subcapitata* Clarke var. *denticulata* W. T. Wang ex Z. Y. Li

植物名 密齿降龙草《中国植志》

药材名 密齿降龙草《广西药录》

地方名 广西:白四门(花)(凌云)。

功效 花:凉血,止咳;全草:用于咳嗽。

## 7256072

*Isometrum lancifolium* (Franch.) K. Y. Pan --- *Didissandra lancifolia* Franch. --- *Ancylostemon purpureus* Burtt et Dadidson --- *Ancylostemon lancifolius* (Franch.) Burtt

植物名 紫花金盏苣苔《中国植志》

文献名 紫花青瓣苣苔《高植图鉴》

地方名 四川:岩白菜(峨眉山)。

功效 全草:祛风除湿,养阴,润肺止咳。

## 7256073

*Toxostigma griffithii* (Wight) Clarke

植物名 紫花苣苔《高植图鉴》

药材名 岩参《云南药录》

文献名 滇桂斜瓣苣苔《广西植志》,山紫花苣苔《云南药录》

地方名 四川:毛叶花;云南:石参、石豇豆、斜柱苣苔(红河),“叭妮”(楚雄彝名),小苦参。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛,健脾燥湿。用于跌打损伤,骨折,消化不良,腹泻,菌痢,预防流行性感胃,流行性乙型脑炎,咳血,风湿疼痛,支气管炎,哮喘,疟疾,贫血,胃溃疡。

## 7256074

*Lysionotus aeschynanthoides* W. T. Wang

植物名 桂黔吊石苣苔《中国植志》

地方名 广西:山接风(上林),〔五加皮〕(靖西)。

功效 根皮:用于风湿骨痛。

## 7256075

*Lysionotus carnosus* Hemsl.

植物名 蒙自吊石苣苔《中国植志》

药材名 岩豇豆《贵州草药》

文献名 吊石苣苔《汇编》,肉叶吊石苣苔《中药大辞典》

地方名 岩泽兰(广西、贵州);广西:石吊兰。

功效 全草:止咳,祛痰,平喘,消炎。用于咳嗽,支气管炎,痢疾,钩端螺旋体病,风湿疼痛,跌打损伤,月经不调,白带。

## 7256076

*Lysionotus pauciflorus* Maxim.

植物名 吊石苣苔《中国植志》

药材名 石吊兰《名实图考》、《药典》

文献名 石豇豆《草木便方》,大姜豆、小泽兰、石泽兰《分类草药性》,石彩兰、赶三九《中草药学》,少花石吊兰《陕西中草药》,少花吊石苣苔《广西植志》,石吊苣苔《海南植志》

地方名 石三七(陕西、安徽、江西、广西),四大金剛、艾石兰(湖南、广西),岩泽兰(江西、湖南、湖北、贵州),岩豇豆(安徽、贵州);陕西:石虎(镇坪);浙江:岩头三七(宁波、奉化、仙居、乐清),岩头杨梅(温州、文成),岩条子(温州、乐清),石杨梅;安徽:石苦参;江西:赶山羌;福建:竹勿刺、〔南天竹〕(尤溪、南平、建瓯、沙县),拉里尾(尤溪),地枇杷(宁德);湖北:豆瓣还阳、铁栏杆(神农架);湖南:吊树兰(衡山),巴岩草,瓜子草,〔石花〕,水罗汉,岩罗汉,岩石兰,肺红草,黑梁青,蜂子

花;广西:山泽兰(南丹),千锤打(罗城),产后茶(北流),西米秧(全州),白樗头,瓜子菜,月风药(壮族),接骨生(临桂),水藤藤,吊红藤;贵州:岩金豆(布衣族),岩茶;云南:石姜豆(昭通),岩参(思茅、红河),石参(红河),小粘头,石吊花,〔石莲花〕,〔半边莲〕,吊苣苔。

功效 全株:清热利湿,祛痰止咳,活血调经。用于咳嗽,支气管炎,痢疾,钩端螺旋体病,风湿疼痛,跌打损伤,月经不调,白带。

## 7256077

*Lysionotus pauciflorus* Maxim. var. *lancifolius* W. T. Wang

植物名 披针叶吊石苣苔《中国植志》

药材名 披针吊石苣苔《广西药录》

功效 全株:用于疮疡肿毒。

## 7256078

*Lysionotus pauciflorus* Maxim. var. *latifolius* W. T. Wang

植物名 宽叶吊石苣苔《中国植志》

药材名 宽叶吊石苣苔《广西药录》

地方名 广西:岩泽兰(龙州、德保、那坡、隆林)。

功效 全株:用于骨折,产褥热,慢性支气管炎,蜂窝组织炎。

## 7256079

*Lysionotus pauciflorus* Maxim. var. *linearis* Rehd. --- *L. cavaleriei* Levl.

植物名 条叶吊石苣苔《中国植志》

药材名 条叶吊石苣苔《贵州药录》

文献名 石豇豆《汇编》

功效 全草:清热解毒,润肺止咳。用于咳血,喘咳,肺结核,风湿痛。

## 7256080

*Lysionotus serratus* D. Don

植物名 齿叶吊石苣苔《高植图鉴》

药材名 石光棍《汇编》

文献名 青竹标《中药大辞典》,吊石苣苔《红河中草药》

地方名 贵州:青竹标根,岩豇豆;云南:小粘头(思茅),石参(文山),苏叶草(河口),苦浆苔(景东),岩参。

功效 全株:清热利湿,祛痰止咳,活血调经。

## 7256081

*Lysionotus wilsonii* Rehd.

植物名 川西吊石苣苔《高植图鉴》

药材名 川西石吊兰《峨眉药植资源》

地方名 四川:大石泽兰(峨眉山),石豇豆(彝良)。

功效 全草:止咳,化痰,祛风除湿,通经活络。

## 7256082

*Oreocharis auricula* (S. Moore) Clarke --- *Didymocarpus auricula* S. Moore

植物名 长瓣马铃苣苔《中国植志》

药材名 石白菜《湖南药物志》

文献名 岩白菜《名实图考》,耳状苣苔《广西植志》

地方名 江西:岩桐草;广西:皱皮草(全州)。

**功效** 全草:清热解毒,凉血,止血。用于跌打损伤,痈疽疮疖肿痛,各种出血,湿热白带。

## 7256083

*Oreocharis benthamii* Clarke --- *Didymocarpus oreocharis* Hance

**植物名** 大叶石上莲《中国植志》

**药材名** 大叶石上莲《广西药录》

**地方名** 广西:牛屎发(博白),白蚂蟥七(陆川、平南),毛耳草、毛板草(鹿寨),晒不死(贺县)。

**功效** 全草:用于跌打损伤,咳嗽,刀伤。

## 7256084

*Oreocharis benthamii* Clarke var. *reticulata* Owen

**植物名** 石上莲《中国植志》

**药材名** 石上莲《广西药录》

**文献名** 网脉石上莲《广西植志》

**地方名** 广西:火艾(靖西),白蚂蟥七(陆川),老虎利(玉林)。

**功效** 全株:止血。用于刀伤出血;叶:外用干湿疹。

## 7256085

*Oreocharis flavida* Merr.

**植物名** 黄花马铃苣苔《海南植志》

**药材名** 小岩白菜《四川中药志》

**文献名** 黄毛岩白菜《中药大辞典》

**地方名** 四川:软叶黄毛岩白菜(成都)。

**功效** 全株:润肺益气。用于肺虚久咳。

## 7256086

*Oreocharis forrestii* (Diels) Skan -- *Roettlera forrestii* Diels

**植物名** 丽江马铃苣苔《中国植志》

**文献名** 马铃苣苔《云南药录》

**地方名** 云南:(石韦)(丽江)。

**功效** 根:用于腹泻。

## 7256087

*Oreocharis henryana* Oliv. -- *O. squamigera* Levl.

**植物名** 川滇马铃苣苔《中国植志》

**药材名** 黄毛岩白菜《汇编》

**地方名** 四川:岩白菜(峨眉山)。

**功效** 全草:清肺止咳,平喘,止血。用于劳伤咳嗽,哮喘,吐血。

## 7256088

*Ornithoboea wildeana* Craib --- *Brachistemon macrocalyx* Hand. -Mazz.

**植物名** 滇桂喜鹊苣苔《中国植志》

**药材名** 滇桂喜鹊苣苔《广西植志》

**功效** 全草:外用干骨髓炎。

## 7256089

*Paraboea crassifolia* (Hemsl.) Burtt --- *Doroceras crassifolium* (Hemsl.) Schlechter --- *Boea crassifolia* Hemsl

**植物名** 厚叶珠毛苣苔《中国植志》

**文献名** 厚叶旋蒴苣苔《汇编》。岩白菜《中药大辞典》

**地方名** 河南:黑马皮、癞毒皮(南阳);贵州:石灰草;其他:厚叶牛耳草。

**功效** 全草:滋补强壮,止血,止咳。用于肝脾虚弱,瘀伤吐血,内伤咯血,肺病咳嗽,白带,无名肿毒。

## 7256090

*Paraboea dictyonura* (Hance) Burtt --- *Boea bartoviana* Craib --- *Boea dictyonura* Hance

**植物名** 网脉珠毛苣苔《高植图鉴》

**文献名** 网脉旋蒴苣苔《广西药录》

**地方名** 广西:[一口血](南丹),白棉(桂平),鸡艾(武鸣);其他:大还魂,山枇杷,吊气还魂。

**功效** 全草:活血散瘀,消肿止痛。用于跌打肿痛,骨折。

## 7256091

*Paraboea rufescens* (Franch.) B. L. Burtt --- *Boea rufescens* Franch.

**植物名** 锈色蛛毛苣苔《中国植志》

**文献名** 锈毛旋蒴苣苔《高植图鉴》,蛛毛苣苔,红旋蒴苣苔《广西药录》,红毛旋蒴苣苔《云南种录》

**地方名** 广西:回生草(东兰),风香(上林),白背风(龙州),粘叶子菜(凌云);贵州:岩葛苣(兴仁),岩枇杷(贵阳),消毒草(兴义),黄毛岩白菜;云南:"咯嘛那啦哈"(元江哈尼语),山白菜(元江)。

**功效** 全草:止咳,解毒,镇痛,生肌,固脱。用于咳嗽,子宫脱垂。外用于痈疮红肿,骨折。

## 7256092

*Paraboea sinensis* (Oliv.) Burtt --- *Chlamydoboea sinensis* (Oliv.) Stapf

**植物名** 蛛毛苣苔《中国植志》

**药材名** 石青菜《云南中草药》

**文献名** 宽萼苣苔《高植图鉴》,中华被萼苣苔《广西植志》,宽萼蛛毛苣苔《广西药录》

**地方名** 湖北:岩枇杷(神农架);广西:"门听"(壮语),六百斤(凤山);云南:华萼苣苣苔(红河),厚脸皮(文山),石头菜。

**功效** 全草:清热利湿,止咳平喘。用于黄疸型肝炎,咳嗽,支气管炎,哮喘,痢疾。外用于荨麻疹。

## 7256093

*Paraboea swinhoi* (Hance) Burtt --- *Boea swinhoi* Hance

**植物名** 锥序蛛毛苣苔《中国植志》

**文献名** 火艾《植物名汇》,台湾旋蒴苣苔《广西植志》,锥序旋蒴苣苔《高植图鉴》

**地方名** 广西:牙硝(靖西),生死药(龙川)。

**功效** 全株:用于小儿疳积,子宫脱垂,骨折。

## 7256094

*Petrocodon dealbatus* Hance --- *P. longistylus* Kraenzl

**植物名** 石山苣苔《高植图鉴》

**地方名** 贵州:岩波菜(荔波)。

**功效** 全草:清热解毒,润肺止咳。用于哮喘,风湿咳嗽,吐血,无名肿毒。

## 7256095

*Petrocosmea minor* Hemsl. --- *P. henryi* Craib



植物名 小石蝴蝶《中国植志》

药材名 石头花《云南中草药》

地方名 云南:石花(红河)。

功效 全草:清热解表,健脾和胃。用于感冒,小儿疳积。

#### 7256096

*Petrocosmea sinensis* Oliv.

植物名 中华石蝴蝶《高植图鉴》

药材名 石头花《云南药录》

地方名 云南:〔石花〕。

功效 全草:清热解表,健脾和胃。用于感冒,小儿疳积。

#### 7256097

*Pseudochirita guangxiensis* (S. Z. Huang) W. T. Wang ---

*Chirita guangxiensis* S. Z. Huang

植物名 异裂苣荬《中国植志》

药材名 异裂苣荬《广西药录》

文献名 广西唇柱苣荬《云南植物研究》

地方名 广西:两面绸(融水)。

功效 叶:外用干跌打肿痛。

#### 7256098

*Pterocodon denticulatus* W. T. Wang

植物名 齿缘石山苣荬《贵州药录》

功效 全草:清热解毒,润肺止咳。用于哮喘,风湿咳嗽,吐血,无名肿毒。

#### 7256099

*Rhynchoglossum obliquum* Blume

植物名 尖舌苣荬《中国植志》

药材名 大脖子药《贵州民间药物》

文献名 歪冠苣荬《广西植录》,歪冠苦苣荬《中药大辞典》

地方名 广西:一串珍珠;其他:半边脸。

功效 根:软坚。用于甲状腺肿大。

#### 7256100

*Rhynchoglossum obliquum* Blume var. *hologlossum* (Hayata) W. T. Wang --- *R. hologlossum* Hayata

植物名 全唇尖舌苣荬《中国植志》

地方名 贵州:大脖子药(兴义)。

功效 根:用于甲状腺肿大。

#### 7256101

*Rhynchotechum obovatum* (Griff.) Burt --- *R. latifolium* Hook f. et Thoms. ex C. B. Clarke --- *Chiliandra obovata* Griff.

植物名 线柱苣荬《中国植志》

药材名 线柱苣荬《广西药录》

文献名 阔叶线柱苣荬《广西植录》

地方名 广西:山枇杷(上林),白饭公(苍梧),矮脚白凤(北流);云南:大叶猪食(屏边),“胡鲁八哈”(河口瑶语)。

功效 全株:清肝,解毒。用于疥疮;叶、花:用于咳嗽,烧烫伤。

#### 7256102 见 7256001

### 7257 紫葳科 Bignoniaceae

#### 7257001

*Campsis grandiflora* (Thunb.) Loisel. ex K. Schum. --- *C. chinensis* (Lam.) Voss. --- *Tecoma grandiflora* Loisel.

植物名 凌霄《唐本草》、《中国植志》

药材名 凌霄花《唐本草》、《药典》

文献名 莕《诗经》,黄花蓼、白花尖《尔雅》,紫葳《本经》,紫葳、芟华、武威 猥麦、陵居腹、鬼目《吴普本草》,紫葳茎叶、陵苕、芟华、陵时《别录》,女葳《药性论》,紫葳根《日华子本草》,花蓼、白花芙《证类本草》,猥陵《纲目》,傍墙花《淮安府志》,凌霄花根《圣济总录》,堕胎花《名实图考》,藤罗草、追罗《分类草药性》,〔藤罗花〕《天宝本草》,武威花《华北观赏植物》,吊墙花《汇编》

地方名 红花倒水莲(江西、湖南、广东、广西),〔倒挂金钟〕(江苏、浙江、安徽、江西),紫葳花(安徽、湖北),九重藤(广东、广西);山东:〔洛阳花〕(泰山),武夷花,洛阳花;江苏:〔五爪龙〕(新海连),杜灵肖花,驳骨软丝莲,〔望江南〕(邳县),穿骨龙,倒挂金钩;浙江:木枫藤,〔闹羊花〕,猪母花,紫霄花,〔喇叭花〕;安徽:九龙过海,龙骨藤花,追风藤,钟形花;江西:九爪龙,〔打碗花〕(奉和),九龙下海(婺源、景德镇),万丈深根,上树龙,钻天龙 钻地龙(德兴),钻地蜈蚣;湖南:马花、追风箭(常德),凌霄藤(衡山);广东:〔大木通〕,凌霄吊墙风;广西:大茶旺(平南),千大捶(贺县),飞天蜈蚣、爬墙风(苍梧),吊水莲(昭平),白狗肠(桂林),钻天蜈蚣(全州),上树蜈蚣,飞天雷公,钻天雷公,狗肠子,金缺子,碎骨风;四川:搜骨风,〔藤萝〕;贵州:〔藤五加〕;云南(紫藤)(大理);其他:女葳花。

功效 花:行血祛瘀,凉血祛风。用于经闭瘕瘕,产后乳肿,风疹发红,皮肤瘙痒,瘰疬。

#### 7257002

*Campsis radicans* (L.) Seem. --- *Tecoma radicans* Juss.

植物名 美洲凌霄《药典》

药材名 凌霄花《药典》

文献名 洋凌霄《鉴别手册》,美凌霄《中草药学》,厚萼凌霄《中国植志》,美国凌霄《树分》,美洲凌霄花《华北树木志》

地方名 杜凌霄(江苏、湖南);广西:飞天蜈蚣(临桂),白狗肠。

功效 花:行血祛瘀,凉血祛风。用于经闭瘕瘕,产后乳肿,风疹发红,皮红瘙痒,瘰疬。

#### 7257003

*Catalpa bungei* C. A. Mey.

植物名 楸树《高植图鉴》

药材名 楸白皮《千金方》、《中药大辞典》

文献名 楸、楸叶、楸木皮《本草拾遗》,木王《埤雅》,楸《纲目》,楸木皮《纲目拾遗》,角楸,楸椅《植物名汇》,梓《本草新注》,梓白皮《和汉药物理学》

地方名 陕西:早楸藤荬;山东:乌楸(昆嵛山),紫楸(蒙山);河南:金丝楸,梓树;湖南:水桐树(衡山),木角豆、花椒、河楸(常德);其他:梓桐。

**功效** 树皮、根皮：清热解毒，散瘀消肿。外用于跌打损伤，骨折，痈疮肿毒；叶：消肿拔毒，排脓生肌。用于肿疡，发背，瘰癧，白秃；果实：清热利尿。用于尿路结石，尿路感染。

## 7257004

*Catalpa fargesii* Bureau

植物名 灰楸《中国植志》

药材名 灰楸《广西药录》

文献名 川楸《云南植志》

地方名 四川：树姜豆，楸树、豇豆树（峨眉山）。

**功效** 树皮：清热，止痛，消肿。用于风湿潮热，肢体困痛，关节炎，浮肿，热毒，疥疮；根皮：用于皮肤病；果实：利尿。

## 7257005

*Catalpa fargesii* Bureau f. *duclouxii* (Dode) Gilmour - *C. duclouxii* Dode - *C. sutchuenensis* Dode

植物名 滇楸《中国植志》

药材名 滇楸根（拟）

文献名 光灰楸《高植图鉴》

地方名 云南：楸木，紫花楸，紫楸。

**功效** 根、叶、花：消炎止痛，生肌。用于耳底痛，胃痛，风湿痛，咳嗽。

## 7257006

*Catalpa ovata* G. Don - *C. kaempferi* Sieb. et Zucc.

植物名 梓树《高植图鉴》

药材名 梓白皮《本经》、《中药大辞典》

文献名 椅梓《尔雅》，梓《说文》，木王《埤雅》，杆《集韵》，梓叶、梓木《纲目》，楸树、角梓《满蒙植汇》，木王实、楸豇豆子《满州植录》，老鸛嘴、假梧桐木《满鲜植汇》，楸线、木豇豆《诗草木今释》，河楸《华北树木志》

地方名 梓实（东北、河北、甘肃），木角豆（河北、浙江、河南、湖南），水桐（河南、湖南），臭梧桐（东北、河北、甘肃、湖南、云南）；吉林：“该傲洞纳木”（朝名）；河北：臭梧桐角；内蒙古：“朝鲁麻盖-扎嘎日图-毛都”（蒙名）；山东：火楸（艾山）；上海：英国梧桐；浙江：青桐（泰顺）；安徽：大叶梧桐；河南：花楸；湖北：水荷叶（鄂西）；湖南：〔上杜仲〕，水桐楸，水桐树；四川：树姜豆（峨眉山），豇豆树，豇豆梧桐，梓根白皮；云南：黄花楸；其他：雷电木（日名）。

**功效** 根皮或树皮的韧皮部（梓白皮）：清热，解毒，杀虫。用于时病发热，黄疸，反胃，皮肤瘙痒，疥疮；叶：用于手脚火烂疮。外用于小儿壮热，一切疥疮，皮肤瘙痒；果实：利尿。用于浮肿，慢性肾炎，蛋白尿；木材：用于手足痛风。

## 7257007

*Incarvillea arguta* (Royle) Royle - *Amphicome arguta* (Royle) Lindl.

植物名 两头毛《中国植志》

药材名 喇叭花《汇编》

文献名 毛子草《高植图鉴》，岩豇豆、肝炎草《中草药》

地方名 炮仗花（四川、贵州）；四川：马桶花，“瓦布

友”（彝药名），黄鸡尾，蜜糖花：贵州：羊尾草；云南：燕山红（昭通），〔马尾莲〕，羊奶子，大花药，破碗花（丽江），大九加、羊胡子草、岩喇叭花、鼓手花、城墙花、麻叶子（曲靖），石岗豆（富民），千把刀（宁浪、永胜），〔朝天贯〕（楚雄），金鸡豇豆，炮仗筒，撒拉花。

**功效** 根茎或全草：祛风除湿，消炎止痛，健脾理气，活血散瘀。用于风湿骨痛，月经不调，泄泻，痢疾，胃痛，胁痛。外用于疮疖，痈肿，骨折。

## 7257008

*Incarvillea compacta* Maxim. - *I. bonvalotii* Bur. et Franch.

植物名 密生波罗花《中国植志》

药材名 密花角蒿《西藏药图》

文献名 全缘角蒿《高植图鉴》，密生角蒿、“欧切”（藏名）《西藏药图》

地方名 野萝卜（青海、西藏）。

**功效** 花、种子、根：消食、调经，利肺，降血压。用于胃病，黄疸，消化不良，耳流脓，耳聋，月经不调，高血压病，肺出血等症。

## 7257009

*Incarvillea delavayi* Bur. et Franch.

植物名 红波罗花《中国植志》

药材名 红花鸡肉参（拟）

地方名 云南：鸡肉参、土地黄、波罗花、红花角蒿（丽江）。

**功效** 根：滋补强壮。用于产后少乳，体虚，久病虚弱，头晕，贫血。

## 7257010

*Incarvillea forrestii* Fletcher.

植物名 单叶波罗花《云南植志》

药材名 波罗花《迪庆藏药》

**功效** 花：消肿胀，敛黄水。用于黄水病，膨胀，气滞，消化不良；种子：消炎，利耳。用于中耳炎，耳痛，耳脓；根：滋补，益脉，止咳。用于虚弱，头晕，胸闷，腹胀，咳嗽，月经不调；叶：用于咳嗽。

## 7257011

*Incarvillea lutea* Bur. et Franch.

植物名 黄波罗花《中国植志》

文献名 黄花角蒿《高植图鉴》

地方名 云南：上生地，圆麻参（丽江）。

**功效** 根：滋补，用于病后体虚。

## 7257012

*Incarvillea mairei* (Levl.) Grierson - *Tecoma mairei* Levl. - *Incarvillea grandiflora* Bur. et Franch. var. *brevipipes* Sprague

植物名 鸡肉参《中国植志》

药材名 鸡肉参《云南中草药选》

文献名 滇川角蒿《高植图鉴》，红波罗花《云南植志》

地方名 云南：土地黄、红花角蒿、波罗花（丽江），上生地，山羊参，矩柄菠萝花，鸡蛋参，角蒿；西藏：多花角蒿。

功 效 根:滋补强壮,补养气血。用于产后少乳,病后体虚,贫血头痛。

## 7257013

*Incarvillea mairei* (Levl.) Grierson var. *grandiflora* (Wehrhahn) Grierson - *I. grandiflora* Bur. et Franch.

植物名 大花鸡肉参《中国植志》

药材名 鸡肉参《云南药录》

地方名 四川:“本曲”(若尔盖藏名),角蒿;云南:土生地(丽江),菠萝花,野生地(玉龙山),山羊参。

功 效 根(生用):凉血生津;根(干用):和血;根(熟用):补血,调经。用于产后少乳,久病虚弱,头晕,贫血,骨折肿痛。

## 7257014

*Incarvillea sinensis* Lam. - *I. sinensis* Lam. ssp. *variabilis* (Batal.) Grierson

植物名 角蒿《唐本草》、《中国植志》

药材名 羊角透骨草《品种论述》

文献名 马先蒿、马矢蒿、马屎蒿《本经》,烂石草、练石草《别录》,马新蒿《唐本草》,猪牙菜、我蒿、萝蒿、廖蒿《救荒本草》,虎麻《纲目》,羊牻角棵《北方中草药》,角蒿透骨草《中药大辞典》,丛枝角蒿《高植图鉴》,红花角蒿《西藏植志》

地方名 羊角草(东北、河北、内蒙古、河南),羊角蒿(东北),鸡嘴儿(陕西、甘肃、宁夏),透骨草(吉林、山东);辽宁:正右草、正骨草(大连);河北:利马锤(怀柔);内蒙古:“乌兰陶拉麻”(蒙名),羊犄角,角草,“蒙高勒参巴嘎”(蒙名);陕西:老各刀(眉县),[大一文蒿](延安);甘肃:苦甘草(文县),舌尖草,响炮子;河南:大力草,老鹤嘴棵,独角虎,野芝麻,憋肚草;四川:冰糖花、冰糖草(大金)。

功 效 全草:用于口疮,齿龈溃烂,耳疮,湿疹,疥癣,阴道滴虫病。

备 考 “马先蒿”一般指玄参科 *Pedicularis* (马先蒿属)植物,而《纲目》之马先蒿《本经》中品则非。掌禹锡谓“二月始生,七月开花,花似胡麻而紫赤,八月生角似小豆角,锐而长”当即指本种而言。

7257015 见 7257014

## 7257016

*Incarvillea younghusbandii* Sprague

植物名 藏波罗花《中国植志》

药材名 西藏角蒿《汇编》

文献名 藏角蒿《中药大辞典》,藏波罗花《西藏植志》

地方名 西藏:“乌确玛尔甲”、“乌确玛子布”(藏名),角蒿。

功 效 根及种子:补养气血,滋补强壮。用于产后乳少,久病虚弱,头晕,贫血。

## 7257017

*Kigelia africana* (Lam.) Benth. --- *Bignonia africana* Lam. --- *Kegilia pinnata* DC. --- *K. aethiopica* (Fenzl) Decne.

植物名 吊灯树《中国植志》

药材名 吊灯树皮(拟)

文献名 腊肠树《台湾木本植物志》

功 效 树皮:用于皮肤病。

## 7257018

*Mayodendron igneum* (Kurz) Kurz - *Spathodea igneum* Kurz - *Radermachera ignea* (Kurz) Van Steenis

植物名 火烧花《中国植志》

药材名 火烧花《西双版纳傣药志》

文献名 炮仗花《元江哈尼族药》

地方名 广西:火花树,緬木,緬木花;云南:“啊茨麻哈能”(元江哈尼语),“埋糯比”(西双版纳傣语)。

功 效 树皮:止泻止痢。用于痢疾;根皮或茎叶:用于产后体虚,恶露淋漓不净,牙齿痛,疲乏无力

## 7257019

*Millingtonia hortensis* L. f.

植物名 老鸦烟筒花《中国植志》

药材名 烟筒花《汇编》

地方名 云南:姊妹树(思茅),“戛刹拢”(傣名),铜罗汉(临沧)。

功 效 树皮、叶:祛风止痒,驱虫解毒,祛痰止咳。用于荨麻疹,湿疹及各种皮肤过敏症,蛔虫,咳嗽痰喘;花:通经利尿。

## 7257020

*Oroxylum indicum* (L.) Vent.

植物名 木蝴蝶《中国植志》

药材名 木蝴蝶《纲目拾遗》、《药典》

文献名 千张纸,兜铃千张纸《滇南本草》,玉蝴蝶《张聿奇医案》,洋故纸《和汉药植》,云故纸《兽医常用中药》,破固子《中药通报》,木蝴蝶树皮《中药大辞典》

地方名 上黄柏(广东、广西),千层纸(广东、广西、云南),破故纸(四川、云南),朝筒(广东、广西、贵州);广东:千纸肉,千张纸树皮,神仙剑;海南:刀板豆树,白玉纸,白纸玉,牛脚筒;广西:白千层,纸肉,故纸,鸭船层纸,[上大黄],“棵黄价”(壮语),朝筒木(陆川),秤星根(上林),满天飞,狼家豹,抓龙船;四川:千层故纸,毛鸭船,老鸭船,海船皮;云南:破布子(红河),“哥嫩嘎”(西双版纳傣语),海船果(西双版纳、思茅),海船果心(西双版纳),大刀树,白故子,白故纸,猪腰子,云故子。

功 效 种子:清肺利咽,疏肝和胃。用于肺热咳嗽,喉痹,音哑,肝胃气痛;树皮:清热利湿。用于传染性肝炎,膀胱炎。

备 考 《四川中药志》(1960)称:四川地区在二百年前开始以木蝴蝶当“补骨脂”。因为据各家本草记载,补骨脂又叫“破故脂”,木蝴蝶又名“破故纸”,两者字音相同,故混为一谈。至今尚有大部分地区仍用木蝴蝶作补骨脂用。两者功效不同,不能互相代用,应注意鉴别。

## 7257021

*Pyrostegia venusta* (Ker) Miers --- *Pyrostegia ignea* (Vell.) Presl

植物名 炮仗花《中国植志》

药材名 炮仗花《云南药录》

地方名 云南:黄鳞藤(新平)。

功效 花:润肺止咳;茎、叶:清热,利咽喉。用于肺结核,咳嗽,咽喉肿痛,肝炎,支气管炎。

#### 7257022

*Radermachera hainanensis* Merr.

植物名 海南菜豆树《中国植志》

地方名 海南:大叶牛尾连,牛尾林,大叶牛尾林。

功效 根、叶、花果:凉血消肿。用于跌打损伤。

#### 7257023

*Radermachera pentandra* Hemsl.

植物名 豇豆树《中国植志》

药材名 豇豆树皮(云南西畴)

功效 树皮:云南西畴地区供药用。

#### 7257024

*Radermachera sinica* (Hance) Hemsl. --- *Stereospermum sinicum* Hance

植物名 菜豆树《中国植志》

药材名 菜豆树《广西中草药》

地方名 红花树(华南),豆角木、豆角树、大朝阳、大郎伞、接骨凉伞(广东、广西),苦苓舅(台湾、广西);台湾:山菜豆;广东:森木朗伞(广州),蛇树(英德);广西:小思树(忻城),槐花树(富川),森本凉伞,朝阳花,牛尾木,牛尾豆,蛇仔豆,鸡豆木,大草羊,思树;云南:豇豆树(富宁),辣椒树(河口)。

功效 根、叶或果实:清热解毒,散瘀止痛。用于伤暑发热。外用于跌打骨折,毒蛇咬伤,痢肿。

#### 7257025

*Radermachera yunnanensis* C. Y. Wu et W. C. Yin

植物名 滇菜豆树《中国植志》

药材名 滇菜豆树皮(拟)

地方名 云南:蛇尾树(景东),豇豆树(麻栗坡),[土厚朴]。

功效 叶、根、果:用于高热痛,胃痛,跌打扭挫伤,骨折,痢疾,毒蛇咬伤;树皮:用于痉挛性腹痛,下痢,呕吐,腹胀,喘咳。

#### 7257026

*Stereospermum tetragonum* (Wall.) DC. --- *S. personatum* (Hassk.) Chatterjee

植物名 羽叶楸《高植图鉴》

药材名 四角夹子树《云南药录》

地方名 云南:铁刀木(西双版纳)。

功效 全株:用于感冒,精神病,蝎蝎伤。

#### 7257027

*Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach

植物名 硬骨凌霄《云南植志》

药材名 硬骨凌霄《汇编》

地方名 广东:洋凌霄、[凌霄花](广州);云南:竹林标(思茅);其他:驳骨软丝莲,红花倒水莲。

功效 根、茎、叶:散瘀消肿。用于肺结核,肺炎,支气管炎,哮喘,咽喉肿痛;花:通经利尿。

## 7258 胡麻科 Pedaliaceae

### 7258001

*Sesamum indicum* L. --- *Sesamum orientale* L.

植物名 芝麻《中国植志》

药材名 黑芝麻《三元延寿书》、《药典》,麻油《本草经集注》、《药典》

文献名 巨胜、胡麻、青囊(叶)《本经》,方金、狗虱《吴普本草》,方茎、鸿臑、胡麻油《别录》,胡麻叶《本草经集注》,油麻《食疗本草》,乌麻、乌麻子、麻油滓、乌麻花、胡麻花《千金·食治》,乌麻油《外台秘要》,脂麻油、白油麻《近效方》,香油《苏氏《物类相感志》》,麻枯饼、芝麻芽、胡麻苗《寿亲养老新书》,脂麻枯《摘元方》,父麻《大业拾遗录》,脂麻、生油、白脂麻《本草衍义》,清油《岭南卫生方》,油子苗《救荒本草》,巨胜子《品汇精要》,白胡麻、麻滓、麻枯、麻藤、麻疹、黑油麻、黑脂麻《纲目》,麻腐《药镜》,芝麻壳《纲目拾遗》,芝麻油《新纲》,北巨胜子《药物别名录》,蔴子《朝鲜植汇》,蔴宏《经植手册》,芝麻菱《中国医学大辞典》

地方名 芝麻花、机麻(东北);上海:芝麻梗;江西:麻子;福建:油麻稿;台湾:白麻;湖南:小油麻;海南:白叶麻(儋县);云南:“哥额”(西双版纳傣语)。

功效 种子:补肝肾,益精血,润肠燥。用于头晕眼花,耳鸣耳聩,须发早白,病后脱发,肠燥便秘;麻油:润滑剂及赋形剂。内服可润肠润肺;果壳:用于半身不遂,烫伤;茎:用于哮喘,浮肿,耳中出脓;麻渣:用于痢症溃烂,亦可固齿;种子含绿豆加工品(麻腐):“利肠胃,解热毒,益益精髓,最利老人”;叶:用于风寒湿痹,崩中,吐血,阴部湿痒;花:用于秃发,冻疮。

## 7259 爵床科 Acanthaceae

### 7259001

*Acanthus ebraacteatus* Vahl

植物名 小花老鼠簕《海洋药物》

功效 果实:外用于疔疔。

### 7259002

*Acanthus ilicifolius* L.

植物名 老鼠簕《高植图鉴》

药材名 老鼠簕《生草药性备要》、《汇编》

文献名 老鼠怕《生草药性备要》,莫芳花《植物名汇》,老鸦伞《指示植物》,蚰瓜簕《高植图鉴》

地方名 广东:软骨牡丹(广州),木老鼠簕,水老鼠簕,猫之簕(惠阳);广西:翻鬼芝西、狗骨木、八角刺(河池)。

功效 全株或根:清热解毒,消肿散结,止咳平喘。用于淋巴肿大,急、慢性肝炎,肝脾肿大,胃痛,咳嗽,哮喘。

### 7259003

*Acanthus montanus* T. Anders.

植物名 八角簕《峨眉药植资源》

地方名 四川:金蝉脱壳(峨眉)。

功效 全草:清热利湿,滋阴润肺。用于癆伤吐

血。

#### 7259004

*Adhatoda vasica* Ness --- *Justicia adhatoda* L.

植物名 鸭嘴花《高植图鉴》

药材名 鸭嘴花《汇编》

文献名 “哇夏嘎”、“曲西哇”、“饶札哇”、“贝嘎夏”、“巴达巴夏”(藏名)《晶珠本草》, 鸭子花《名实图考》, 大驳骨《广西中药志》, 野靛叶《高植图鉴》

地方名 江苏: 牛舌蓝; 广东: 蚌蝶花(阳山、连县), 大叶驳骨兰、假咽叶(曲江), 大叶樟保仔(英德), 驳骨茶(佛冈), 大叶驳骨莲(南雄), 大还魂(广州); 广西: 龙头草(临桂), 大驳骨消, 大驳骨丹, 大骨风, 大骨碎, 大骨节草, 大接骨, [接骨木], 黑叶爵床(北海), 硬罗汉(合浦); 云南: 阔扎, “么哈菴”(傣名)。

功效 全株: 祛风活血, 散瘀止痛, 接骨。用于风湿关节痛, 腰痛, 骨折, 扭伤。

#### 7259005

*Aechmanthera tomentosa* (Wall.) Nees

植物名 尖药花《高植图鉴》

文献名 尖蕊花《广西药录》, 尖药草(拉汉英种称)

地方名 广西: 蓝花草(凤山); 贵州: 大毛叶。

功效 全草: 祛瘀生新, 补虚止痛。用于头目眩晕, 体弱气虚, 跌打损伤, 骨折; 叶: 用于蛇咬伤, 口腔炎。

#### 7259006

*Andrographis laxiflora* (Blume) Lindau --- *A. tenera* (Nees) O. Ktze.

植物名 疏花穿心莲《高植图鉴》

药材名 白花穿心莲《广西药录》

文献名 须药草《云南种录》

地方名 穿心莲(海南、云南); 广西: 野槐核莲(天峨)。

功效 全草: 用于感冒, 肺炎, 胃肠炎。

#### 7259007

*Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees

植物名 穿心莲《高植图鉴》

药材名 穿心莲《药典》

文献名 春莲秋柳《岭南采药录》, 槐核莲《湖南药物志》, 一见喜《福建药物志》, 草黄连《药学报》, 竹节黄《生草药手册》, 圆锥须药草《中药大辞典》

地方名 印度草(湖南、江西、广东), 苦草(福建、广东), 苦胆草(广东、湖南、四川); 福建: 万病仙草(永春、安溪), 百病草(泉州), 苦赛黄连(同安), 热痛草(安溪); 广东: 斩龙剑, 斩蛇剑(新会), 蛇针草(汕头), 日行千里、百胜柳(惠阳), 金香草(潮阳), 金鲤里草、牛母草、血压草(同安), 事事备(揭阳), 金耳钩、夜蛇草(潮安), 蛇草(阳春), 四方莲(罗定); 海南: 雄胆草(文昌)。

功效 地上部分: 清热解毒, 凉血, 消肿。用于感冒发热, 咽喉肿痛, 口舌生疮, 顿咳痰嗽, 泄泻痢疾, 热淋涩痛, 痈肿疮疡, 毒蛇咬伤。

#### 7259008

*Asystasia chelonoides* Nees

植物名 十万错《高植图鉴》

药材名 十万错《广西药录》

地方名 广西: 盗偷草(马山、上思), 跌打草(平果)。

功效 全草: 用于跌打损伤, 骨折。

#### 7259009

*Asystasia coromandelinus* Nees --- *A. gangetica* (L.) Anders.

植物名 跌打草《广西本草选编》

文献名 细穗爵床《广西本草选编》, 盗偷草《广西药录》

地方名 云南: 十万错(文山)。

功效 茎、叶: 散瘀消肿, 止血接骨; 叶: 外用于外伤出血; 枝、叶: 外用于跌打肿痛, 骨折。

#### 7259010

*Asystasiella chinensis* (S. Moore) E. Hossain --- *Asystasiella chinensis* S. Moore --- *Asystasiella neesiana* auct. non (Wall.) Lindau

植物名 白接骨《高植图鉴》

药材名 白接骨《浙江民药》

文献名 玉龙盘、无骨苎麻、玉梗半支莲《百草镜》, 玉接骨、玉钱草、(血见愁)、麒麟草、玉连环《纲目拾遗》

地方名 浙江: 接骨丹(余杭、临海、平阳), 接骨草(长兴、衢县), 猢猻节根、(金不换), 猢猻接根(绍兴、黄岩), 小阿西达, [白牛膝](安吉); 江西: 橡皮草; 湖南: 水泽兰。

功效 全草或根状茎: 清热解毒, 散瘀止血, 利尿。用于肺结核, 咽喉肿痛, 糖尿病, 腹水。外用于外伤出血, 扭伤, 疖肿。

备考 《云南种录》(1984)称: 有的文献学名误订为 *Asystasiella neesiana* (Wall.) Lindau

#### 7259011

*Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek. - *Strobilanthes cusia* (Nees) O. Ktze. - *S. flaccidifolia* Nees --- *Goldfussia cusia* Nees

植物名 马蓝《高植图鉴》

药材名 青黛《药性论》、《药典》, 马蓝《图经》、《汇编》

文献名 藏《尔雅》, 大叶冬蓝《尔雅》郭璞注, 大青《别录》, 大青叶《唐本草》, 蓝淀《本草拾遗》, 大蓝《刘禹锡《传信方》》, 青蓝《履巉岩本草》, 青靛《普济方》, 靛青《邓子禹家抄方》, 靛花《简便单方》, 蓝靛、青蛤粉《纲目》, 青缸花《外科正宗》, 蓝露、淀花《手板发蒙》, 马蓝根《本草便读》, 琉球蓝《新纲》, 靛沫花《形色鉴别》, 板蓝《海南植志》

地方名 板蓝根(天津、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南), 蓝靛叶(广东、四川), 南板蓝根(浙江、广西); 浙江: 土板蓝根, 马蓝叶, 靛青根(浙南); 福建: 山蓝, 菁叶, 建青黛; 湖南: 蓝龙根, 土龙根; 广西: 地蓝、山蓝靛(龙州), 山大蓝(北流), 大叶狗肝菜, 大蓝靛, 山驳骨(鹿寨); 四川: 蓝靛根(成都); 贵州: (威灵仙); 云南: 土靛, 野靛, 靛叶、小野靛(红河), “皇慢”(傣名), 靛, 靛根。

**功效** 茎、叶加工制得的粉末或团块(青黛):清热解暑,凉血,定惊。用于温毒发斑,血热吐衄,胸痛咳血,口疮,疥癩,喉痹,小儿惊痫;叶(大青叶):清热解毒,凉血,消斑;根茎及根(板蓝根):清热解毒,凉血利咽;制造青黛时的沉淀物(蓝靛):清热,解毒。用于时行热毒,疔疮痈肿,丹毒,疳蚀,天疱疮。

## 7259012

*Barleria cristata* L.

植物名 假杜鹃《高植图鉴》

药材名 紫靛《汇编》

地方名 地狗胆(广东、四川);广东:蓝花草、吐红草、[青藤](惠阳),茗花,洋杜鹃(广州);广西:家杜鹃(凌云),假红蓝(田林);四川:[刺牛膝], [白牛膝](西昌),地丁草;贵州:刺血红。

**功效** 全株:清肺化痰,止血截疟。用于祛风除湿,消肿止痛,消疹止痒。

## 7259013

*Barleria lupulina* Lindl.

植物名 花叶假杜鹃《中药大辞典》

药材名 刺血红《汇编》

地方名 广东:七星剑(潮安),血路草(饶平);云南:"比朵喃"(西双版纳傣名)。

**功效** 全株:通经活络,解毒消肿。用于毒蛇咬伤,犬咬伤,跌打损伤,痈肿,外伤出血。

## 7259014

*Barleria prionitis* L.

植物名 黄花假杜鹃《高植图鉴》

地方名 云南:"比朵郎"(西双版纳傣语)。

**功效** 根:解毒,消肿,止咳。用于牙痛,咳嗽。外用于痔疮;叶:用于跌打瘀肿,续筋接骨,拔刺。

7259015 见 7259018a

## 7259016

*Calophanoides chinensis* (Benth.) C. Y. Wu et H. S. Lo

--- *Justicia championi* T. Anders.

植物名 圆苞杜根藤《云南种录》

文献名 [杜根藤]《浙江药植志》

**功效** 全草:清热解毒,化瘀止痛。

## 7259017

*Calophanoides kwangsiensis* H. S. Lo

植物名 广西杜根藤(拟)

文献名 广西赛爵床《广西药录》

地方名 广西:[白马骨](钟山)。

**功效** 全株:用于流行性感胃,子宫脱垂。

## 7259018

*Calophanoides quadrifaria* (Wall.) Ridl. --- *Justicia*

*quadrifaria* Wall. --- *Gendarussa quadrifaria* Nees ---

*Adhatoda quadrifaria* Nees

植物名 杜根藤《云南种录》

药材名 杜根藤《名实图考》、《汇编》

地方名 浙江:大青草。

**功效** 全草:清热解毒。用于口舌生疮,时行热毒,丹毒,黄疸。

## 7259018a

*Calophanoides salicifolia* (T. Aders.) Bremek.

植物名 柳叶杜根藤(拟)

文献名 柳叶赛爵床《广西药录》

**功效** 全草:用于毒蛇咬伤,跌打损伤,急性关节炎。

## 7259019

*Championella japonica* (Thunb.) Brem. --- *Strobilanthes*

*japonicus* (Thunb.) Miq.

植物名 日本梭果爵床(拟)

药材名 红泽兰《汇编》

文献名 垂序马蓝《四川中药志》,日本马蓝《高植图鉴》

地方名 四川:[泽兰],山泽兰(蓬溪)。

**功效** 全草:活血通经,祛瘀止痛。用于痛经,盆腔炎,产后腹痛,跌打损伤,风湿骨痛。

## 7259020

*Championella oligantha* (Miq.) Bremek. --- *Strobilanthes*

*oliganthus* Miq.

植物名 紫云菜《浙江药植志》

药材名 麻衣接骨《纲目拾遗》

文献名 少花马蓝《高植图鉴》,紫云英马兰《汇编》

地方名 浙江:铃虫花;湖南:刀枪药;四川:板蓝根。

**功效** 全草:清热凉血。用于高热发狂,感冒高热。外用于外伤出血。

## 7259021

*Championella sarcorrhiza* C. Ling

植物名 菜头肾《植分学报》

药材名 菜头肾《浙南本草新编》

文献名 肉根马蓝《浙江药植志》

地方名 浙江:土太子参,乐清大荆。

**功效** 根:养阴补肾。用于肾虚腰痛,阴虚牙痛,迁延型或慢性肝炎,肾炎,肾孟炎;茎、叶:清热解毒。用于急性传染性肝炎。外用于疔疮疖肿,肌腱扭伤。

## 7259022

*Clinacanthus nutans* (Burm. f.) Lindau

植物名 扭序花《高植图鉴》

药材名 扭序花《汇编》

文献名 柔刺草《中药大辞典》,竹节黄《西双版纳傣药志》,罂咀花《海南植志》,竹节王《广西本草选编》

地方名 广东:软枝接骨草(阳春),竹叶青、青竹蛇、青竹枝、青榜(惠阳);广西:小接骨、竹黄、薊黄(陆川),竹枝黄(北流),拔弹藤,鸡骨草,青箭(宁明、博白);云南:"雅配牙约"(西双版纳傣语)。

**功效** 全草:清热除湿,消肿止痛,散瘀拔毒。用于黄疸,月经不调,跌打损伤,骨折,风湿疼痛,刀伤,弹片入肉。

## 7259023

*Codonacanthus pauciflorus* (Nees) Nees

植物名 钟花草《高植图鉴》

药材名 钟花草《广西药录》

地方名 广西:青木香草(鹿寨)。

功效 全草：用于跌打损伤，风湿病，口腔溃疡。

#### 7259024

*Cystacanthus yunnanensis* W. W. Smith

植物名 滇鳢冠花《云南种录》

药材名 蓝叶棵《汇编》

地方名 云南：云南鳢刺草，野蓝子。

功效 茎、叶、根：清热解毒，消炎止咳。用于咳嗽，崩漏。

#### 7259025

*Dicliptera chinensis* (L.) Nees

植物名 狗肝菜《高植图鉴》

药材名 狗肝菜《岭南采药录》、《汇编》

文献名 青蛇仔《岭南采药录》，金龙棒、金龙纳《植物名汇》，九头狮子草《种称》，中华狗肝菜《云南药录》

地方名 猪肝菜、路边青、假红蓝、土羚羊（广东、广西），天青茶（广东、福建），小青（福建、广西）；福建：野青仔、六角英（泉州、厦门），野青头（仙游），[大青]（漳浦），观音坐莲、乌疗草、过冬青、开咽草（泉州），青仔草、六角草、六角金、六角参、野头青、阴青草、金钗草、紫花草；广东：狗官菜（增城、乐昌、兴宁），狗肝（增城、罗定、乐昌、电白），梨根青（阳春），野辣椒（新会、曲江），九十菜、乌面草（潮汕），乌面礼（潮州、潮安、潮阳、汕头），厝缸鸟、厝缸青（潮安、潮州），蚶壳茶（海丰），细叶青蛇，细叶辣椒，丝线草，天青娘（潮阳），双托叶、尖尾青（广州）；海南：臭草仔，鱼鳞草，九曲草；广西：羊肝菜（阳朔），假米针，紫燕草，金龙棒靴，蛇头草，辣椒风，草羚羊，篱下青，青蛇、路边棒（陆川）；云南：[半枝莲]（通海），灯台草（澄江）。

功效 全草：清热解毒，凉血利尿。用于感冒高热，斑疹发热，流行性乙型脑炎，风湿性关节炎，眼结膜炎，小便不利。外用于带状疱疹，疖肿。

#### 7259026

*Dicliptera elegans* Smith

植物名 优雅狗肝菜《高植图鉴》

文献名 金江狗肝菜《云南种录》，宽叶九头狮子草《南充中草药》

功效 全草：发汗解表，清热解毒。

#### 7259027

*Dipteracanthus repens* (L.) Hassk. --- *Ruellia repens* L.

植物名 红楠草《广州植志》

药材名 芦莉草叶《中药大辞典》

文献名 小苞爵床《广西植志》，匍匐消《高植图鉴》

地方名 海南：楠草（澄迈）；四川：线南花。

功效 叶：用于疮痍，溃疮，刀伤，牙痛及腹痛。

#### 7259028

*Drejerella guttata* (Brand) Bremek. --- *Calliaspidia guttata* (Brand) Bremek. --- *Beloperone guttata* Brand

植物名 虾衣草《高植图鉴》

药材名 虾衣草《广西药园药录》

文献名 虾衣花《广西药录》

地方名 广西：麒麟塔（南宁），麒麟吐珠，青丝线。

功效 茎、叶：散瘀，消肿。用于跌打瘀肿。

#### 7259029

*Eranthemum austrosinense* H. S. Lo

植物名 华南可爱花《拉汉英种称》

药材名 华南可爱花《广西药录》

地方名 广西：对节茶（来宾）。

功效 根：用于风湿骨痛。

#### 7259030

*Eranthemum nervosum* (T. Anders.) R. Br. ex Boem. et Schult. --- *Eranthemum pulchellum* Andrews

植物名 喜花草《高植图鉴》

药材名 可爱花《广西药录》

文献名 美丽可爱花《广西药录》

地方名 广西：牛七，对节茶（来宾）。

功效 叶：用于跌打损伤；根：用于风湿骨痛。

#### 7259031

*Gendarussa ventricosa* (Wall.) Nees --- *Justicia ventricosa* Wall. --- *Adhatoda ventricosa* (Wall.) Nees

植物名 大驳骨《高植图鉴》

药材名 大驳骨丹《岭南采药录》、《中药大辞典》

文献名 鸭仔草、逼迫树《本草求真》，大还魂《岭南采药录》，大叶驳骨草《中药大辞典》，偏肿鸭嘴花《广西药录》，黑叶接骨草《海南植志》，黑叶爵床《广州植志》，黑叶小驳骨《云南种录》

地方名 大骨节草（广东、广西）；广东：鸭公青，十月青，白鹤脚，大驳骨消，大样驳骨消，大接骨丹，青龙舌；广西：大驳节（陆川），大接骨草，救命王，大接骨（来宾、贵县、桂平），大骨节、大蓝（玉林），大牛药（苍梧），大接骨木。

功效 全株：活血散瘀，祛风除湿。用于骨折，跌打损伤，风湿性关节炎，腰腿痛，外伤出血。

#### 7259032

*Gendarussa vulgaris* Nees --- *Justicia gendarussa* L. f.

植物名 小驳骨《高植图鉴》

药材名 驳骨丹《生草药性备要》、《汇编》

文献名 接骨草、四季花《群芳谱》，小还魂《岭南采药录》，裹篱樵《广州植志》

地方名 驳骨草、小驳骨消（广东、广西），小接骨（广东、广西、云南），骨节草（华南）；台湾：[泽兰]，尖尾峰；广东：百节芒（茂名），细骨风，小驳骨丹，小接骨丹（广州），篱笆竹、果园竹（五化），臭黄藤、接骨筒、观音柳（潮阳），细叶驳骨兰、细叶樟保仔（清远），[接骨木]、乌骨黄藤（潮安），老苦茶、牛参、乌骨铁枣树（饶平）；广西：小叶金不换（藤县、梧州、平南、桂平、北流），小接骨草（南宁），驳骨消（宁明），骨碎草（苍梧），大力王（北流），长生木（隆林、开城），长生草，小骨节（玉林）；云南：鸭咀花，“莫哈哪”（西双版纳傣名），白菖草，“爬滩良”（傣名）。

功效 全株：续筋接骨，消肿止痛。用于骨折，扭挫伤，风湿性关节炎；树皮：催吐；叶：杀虫。

#### 7259033

*Goldfussia pentstemonoides* (Wall.) Nees --- *Ruellia capitata* Buch.-Ham. ex D. Don --- *R. pentstemonoides*

Wall. --- *Strobilanthes pentstemonoides* Nees --- *S. marchandii* Levl. --- *S. chaffanjonii* Levl.

植物名 球花曲蕊马蓝(拟)

药材名 温大青《中药志》

文献名 球花马蓝《高植图鉴》, 圆苞金足草《云南种录》, 头花金足草《广西药录》

地方名 大青叶(浙江、四川); 浙江: 大青草(浙南); 湖北: 味牛膝、土牛膝(神农架); 四川: 板蓝根(灌县), 野板蓝(峨眉山); 贵州: 野蓝靛。

功效 地上部分: 清热解毒, 凉血, 定惊。用于温毒发斑, 血热吐衄, 胸膈咳血, 口疮, 疔疮, 喉痹, 小儿惊痛; 根茎及根: 清热解毒, 凉血。

#### 7259034

*Goldfussia psilostachys* (Clarke ex W. W. Smith) Bremek.

植物名 细穗曲蕊马蓝《广西药录》

药材名 六月青《汇编》

文献名 细穗金足草《云南种录》

地方名 广西: 汗斑草, 红石蓝(凤山)。

功效 茎叶: 解毒消肿, 行血散瘀。用于毒蛇咬伤, 跌打肿痛, 疮疖肿痛; 叶: 外用于骨折; 根、根茎: 用于风热感冒, 咽喉肿胀, 流行性乙型脑炎, 肝炎, 腮腺炎。

#### 7259035

*Gutzlaffia aprica* Hance --- *Strobilanthes apricus* (Hance) T. Anders.

植物名 山-笼鸡《高植图鉴》

药材名 山-笼鸡《贵州草药》

文献名 野格拉非《广西植录》, 野古蓝《广西药录》

地方名 广西: 白背草、一炉香(富川); 贵州: 熟麻。

功效 根或全草: 发汗解表, 清肺止咳。用于感冒发热, 咳嗽。

#### 7259036

*Gutzlaffia henryi* (Hemsl.) C. B. Clarke ex S. Moore

植物名 多枝山-笼鸡《高植图鉴》

药材名 多枝山-笼鸡《贵州药录》

地方名 贵州: 岩威灵仙。

功效 全草: 祛风解表, 消肿止咳。用于感冒发热, 肺热咳嗽, 肝炎。

#### 7259037

*Gymnostachyum kwangsiense* H. S. Lo

植物名 广西裸实花《广西药录》

功效 全草: 用于跌打损伤, 风湿骨痛。

#### 7259038

*Gymnostachyum leptostachyum* Nees --- *Justicia leptostachya* Wall. ex Nees

植物名 细穗裸实花(拟)

文献名 细穗爵床《广西中药志》

地方名 广西: 盗偷草(马山), 四柱关草(忻城)。

功效 全草: 散瘀, 止痛, 止血, 驳骨。用于跌打损伤, 骨折。

#### 7259039

*Hemigraphis procumbens* (Lour.) Merr.

植物名 半柱花《广州植志》

药材名 半柱花《广西本草选编》

地方名 广西: 出泡草, 白泡草, 白瓢草(北流), 水黄, 毛虫药, 三尖母头(博白), 还魂草, 青松子(玉林), 狗泡草(陆川), 疳积草(平南)。

功效 全草: 凉血解毒, 消肿止痛。用于痢疾, 跌打肿痛, 疮疡溃烂, 湿疹, 皮肤瘙痒。

#### 7259040

*Hygrophila lencea* Miq.

植物名 剑叶水蓑衣《汇编》

文献名 [大药]《新中医药》

功效 全草: 清热解毒。

#### 7259041

*Hygrophila megalantha* Merr.

植物名 大花水蓑衣《广州植志》

药材名 南天仙子(中西医结合杂志)

地方名 广东: [天仙子], 进口天仙子。

功效 种子: 配合外科手术, 用粘石法可治疗多发性肾结石。

备考 《新华本草纲要》南天仙子原植物为毛水蓑衣 *H. phlomoides* Nees。

#### 7259042

*Hygrophila salicifolia* (Vahl.) Nees

植物名 水蓑衣《高植图鉴》

药材名 水蓑衣《救荒本草》、《汇编》

文献名 水煎草《中草药学》

地方名 大青草(江苏、浙江), 水箭草、相积药、墨菜(广东、广西); 江苏: 伤草头, 水柳草(常熟); 广东: 六角英(潮阳), 冰汀药(英德), 鲫鱼胆(增城、乐昌、罗定、电白), 鱼骨草(罗定、高鹤、新兴、五华), 细叶鲫鱼胆(从化), 水剑草(乐昌), 毫卜菜(潮安), 水胆草(化州); 海南: 细样墨菜(儋县); 广西: 节上花、方箭草(陆川), 水骨节、节节同(玉林), 节节花(平南、玉林), 锁药(宁明); 四川: 泽兰(峨眉山), 青泽兰、化痰清(成都); 贵州: 接骨草, 九节花。

功效 全草: 清热解毒, 化瘀止痛。用于咽喉炎, 乳腺炎, 吐血, 衄血, 百日咳。外用于骨折, 跌打损伤, 毒蛇咬伤, 无名肿毒。

备考 过去文献常将本品的种子误认为是进口天仙子, 其实本品不作天仙子用, 实系鉴定上的错误。

#### 7259043

*Hygrophila saxatilis* Ridl.

植物名 岩水蓑衣《汇编》

功效 种子: 镇痉止痛。用于癫狂, 抽搐, 哮喘, 胃痛。外用于痢肿, 恶疮。

#### 7259044

*Hypoestes poilanei* R. Benoist.

植物名 枪花药《中药大辞典》

地方名 贵州: 野辣子。

功效 全草: 生肌, 止血。

#### 7259045



*Hypoestes purpurea* (L.) Soland.

植物名 枪刀药《高植图鉴》

药材名 枪刀药《汇编》

文献名 [红丝线]《广州植志》

地方名 台湾:鲫鱼胆,六角英,红药蟛蜞菊;广东:红蓝叶、刀枪药(广州),丝线草(潮安),十二两,青丝线。

功效 全草:消炎,散瘀,止血,止咳。用于肺结核咳血,支气管炎,糖尿病。

备考 《海南植志》(三)载称:广州和港澳一带生草药铺所售“红丝线”为 *Peristrophe roxburghiana* (Schult.) Bremek. (山蓝),非本种。

#### 7259046

*Hypoestes triflora* Roem. ex Schult.

植物名 三花枪刀药《高植图鉴》

文献名 小九头《汇编》

地方名 四川:大青草(西昌)。

功效 全草:清热解毒,止咳化痰,止血生肌。

#### 7259047

*Lepidagathis incurva* Buch.-Ham. ex D. Don -- *L. hyalina* Nees

植物名 鳞花草《高植图鉴》

药材名 鳞花草《汇编》

地方名 广东:牛膝豚、[飞扬草](惠阳);海南:红四季草(澄迈、东方、昌江);广西:朱红花(田林),蛇毛衣(北流),大蛇疮药、蛇疮草(玉林);其他:野凉粉草藤(香港)。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于蛇疮,口唇糜烂。

#### 7259048

*Leptosiphonium venustum* (Hance) E. Hossain

植物名 拟地皮消《高植图鉴》

药材名 飞来蓝《广西药录》

功效 全草:用于白喉,感冒发热,咽喉肿痛。

#### 7259049

*Mananthes vasculosa* (Nees) Bremek.

植物名 龙州野旋梗《广西药录》

地方名 广西:假走马胎(龙州)。

功效 全草:用于跌打损伤。

#### 7259050

*Pararuellia delavayana* (Baill.) E. Hossain -- *Hemigraphis drymophila* Diels -- *Ruellia drymophila* (Diels) Hand. -Mazz. -- *Aporuellia scaposa* C. B. Clarke

植物名 地皮消《高植图鉴》

药材名 红头翁(云南元江)、《汇编》

文献名 喜栎小苞爵床《云南药录》,红寒药《汇编》

地方名 云南:“那安安得勒”(元江哈尼语),灯台草(通海),地皮胶、地皮硝(昆明),一扫光,芦莉草,岩威灵仙,刀口药,蛆药。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于急性扁桃体炎,腮腺炎,支气管炎,肺炎,淋巴结结核。外用于骨折,刀伤感染,疮毒脓肿。

#### 7259051

*Perilepta dyerianus* (Mast.) Bremek. -- *Strobilanthes dyerianus* Mast.

植物名 红背草《广西植录》

药材名 红背草《广西药园药录》

功效 全草:用于跌打损伤。

#### 7259052

*Peristrophe baphica* (Spreng.) Bremek. -- *Justicia tinctoria* Roxb. -- *Peristrophe tinctoria* (Roxb.) Nees -- *Justicia roxburghiana* (Schult.) Bremek. -- *Peristrophe bivalvis* (L.) Merr.

植物名 山蓝《海南植志》

药材名 红蓝《广西本草选编》

文献名 观音草《名实图考》,红丝线《岭南采药录》,青红线《中草彩图》,野靛青《浙江民药》,染色九头狮子草《高植图鉴》

地方名 白牛膝(浙江、湖南);陕西:辣子草、小灵丹(镇坪),围苞草,辣子七;上海:小苣;浙江:项开口,绿骨大青,[大青],九头狮子草,高山辣椒,大叶辣椒草,黄丁苦草,对叶接骨草;福建:红丝线草、四川草(厦门);湖南:兰茶,[川牛膝],九节风,小泽兰,水牛膝,盖漆草,上莼茶,[麻牛膝],蓝英奇(湘西);广东:刀枪药;广西:茶兰(三江)。

功效 全草:清肺止咳,散瘀止血。用于肺结核咯血,肺炎,糖尿病,跌打肿痛。

#### 7259053

*Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek. -- *Dicliptera crinita* (Thunb.) Nees -- *D. japonica* (Thunb.) Makino

植物名 九头狮子草《高植图鉴》

药材名 九头狮子草《名实图考》、《汇编》

文献名 [接骨草]、[上细辛]《名实图考》,[万年青]、铁焊椒、绿豆苣、王灵仁《分类草药性》,观音草《植物名汇》,化痰青《鉴别手册》

地方名 晕病药(江西、贵州),九节篱(湖南、广东),尖惊药、尖经药(湖南、贵州);江苏:小苣(无锡);浙江:项开口,蛇舌草;江西:狮子草(丰城、南丰);福建:天青菜、金钗草(闽南),红丝线草,野青仔,肺榜草(同安),青射草(大田),红管草、咳嗽草(漳州);湖南:筷子牛膝(衡山),川白牛膝(长沙),辣椒七(溆浦);广西:路边青,土红蓝(忻城);四川:[四季青],三面青,菜豆青,铁脚万年青,焯椒七,青泽兰(峨眉山);贵州:辣叶青药,咳风尘,克风巛(遵义),十万错(玉屏),青药(都匀),青砂药;其他:竹叶青,白喉草,蝴蝶开口。

功效 全草:发汗解表,解毒清热。用于感冒,咽喉肿痛,小儿高热。外用于痈疽肿毒,毒蛇咬伤。

#### 7259054

*Phlogacanthus curviflorus* (Wall.) Nees

植物名 火焰花《高植图鉴》

药材名 火焰花《西双版纳傣药志》

文献名 焰爵床《汇编》,弯花焰爵床《云南药录》

地方名 云南:“禾木张”、“皇文”、“哈姆掌”(西双版纳傣名),大旋叶(傣名意译)。

功效 根及全草:清热解毒。用于疟疾,头竿头

痛,胸腹痞满。

#### 7259055

*Phlogacanthus pubinervius* T. Anders.

植物名 毛脉火焰花《高植图鉴》

地方名 贵州;野靛叶。

功效 根;清热解毒。

#### 7259056

*Phlogacanthus vitellinus* (Roxb.) T. Anders. --- *Phlogacanthus asperulus* Nees

植物名 糙叶火焰花《云南种录》

文献名 蛋黄焰爵床《广西药录》

地方名 广西;黄尿草、地蓝(龙州)。

功效 茎、叶;用于黄尿;根;用于风湿病,骨折。

#### 7259057

*Physochlaina macrophylla* Bonati

植物名 大叶泡囊草(拉汉英种称)

地方名 四川;泡囊草(峨眉山)。

功效 根;镇痛,活血祛瘀。

#### 7259058

*Pseuderanthemum palatiferum* (Nees) Radlk.

植物名 钩粉草《广西植录》

药材名 山驳骨《广西药录》

文献名 小驳骨《广西药录》,山壳骨《高植图鉴》

地方名 广西;〔牛七〕。

功效 根;止血。

#### 7259059

*Pseuderanthemum polyanthum* (Clarke) Merr.

植物名 多花钩粉草《广西药录》

功效 根;用于骨折;全株;用于崩漏。外用用于跌打损伤。

#### 7259060

*Pteracanthus alatus* (Wall. ex Nees) Bremek.

植物名 翅柄马蓝《云南种录》

药材名 对节叶《贵州草药》

地方名 贵州;“阿上格”(苗名)。

功效 叶;清热解毒。外用无名肿毒;根;活血止痛。用于劳伤疼痛。

#### 7259061

*Pteracanthus forrestii* (Diels) C. Y. Wu --- *Strobilanthes forrestii* Diels --- *S. panbienkiensis* Levl.

植物名 腺毛马蓝《云南种录》

药材名 味牛膝(湖北)

文献名 腐牛膝《鉴别手册》

地方名 黑龙江;〔川牛膝〕;贵州;毛叶草。

功效 根;行瘀血,消肿痛,强筋骨。用于经闭癥瘕,淋痛难产,腰膝痹痛。

#### 7259062

*Pteropterychia dalzielii* (W. W. Smith) H. S. Lo --- *Strobilanthes dalzielii* (W. W. Smith) R. Benoist

植物名 曲枝假蓝《海南植志》

药材名 山蓝(广东);《汇编》

地方名 广东;〔板蓝根〕(恩平),〔大青叶〕;广西;蓝

靛(藤县)。

功效 根、叶;清热解毒,活血止痛;全草;用于蛇咬伤。

#### 7259063

*Rhinacanthus nasutus* (L.) Kurz

植物名 白鹤灵芝《高植图鉴》

药材名 白鹤灵芝(广东、广西);《汇编》

文献名 灵芝草(海南、云南)

地方名 癣草(广东、广西);广东:仙鹤灵芝草、灵枝草、白鹤灵芝草、大叶灵芝(广州);广西:假红蓝(钦州)。

功效 枝或叶;清肺止咳,利湿止痒。用于肺结核早期 外用用于体癣,湿疹。

#### 7259064

*Rostellularia linearifolia* Bremek. ssp. *liangkwanensis* H. S. Lo

植物名 两广线叶爵床《广西药录》

地方名 广西;人面草(象州)。

功效 全草;用于风湿病,蛇咬伤。

#### 7259065

*Rostellularia procumbens* (L.) Nees --- *Justicia procumbens* L.

植物名 爵床《高植图鉴》

药材名 爵床《本经》、《汇编》

文献名 爵卿《吴普本草》,赤眼老母草《唐本草》,鲫鱼鳞《救荒本草》,赤眼《品汇精要》,小青草《百草镜》,蜻蜓草、苍蝇翅《纲目拾遗》,六棱草《中草药学》,孩儿草《简明中医辞典》

地方名 六角英(安徽、湖北、湖南、广东、广西、云南),鼠尾癭(福建、台湾),鼠尾红(台湾、广西),节节草(安徽、云南),节节红(湖南、广西),疳积草(上海、安徽、江西、浙江、湖北、湖南),毛泽兰、小青(福建、四川),〔接骨草〕(江西、广西),辣椒草(浙江、广西),大鸭草(江苏、广东);江苏:五果草,阴牛郎;上海:蛇食草,水竹笋,五罗草;浙江:〔四季青〕,蚱蜢腿,奶疳草(兰溪),小叶青,小青儿(温州、平阳、乐清);江西:观音草,肝火草,倒花草,六方疳积草,野川椒(婺源),青蛇子(泰和);福建:六角仙草,屈胶仔,麦穗红,麦穗癭(闽南),六角仙(寿宁、福安、宁德、连江),小号夏枯草(闽清、永春),番椒草(邵武、寿宁),生葡子菜,九头狮,野辣椒树,蒙心草,辣椒子草,风寒草,山蟪螂草,六角金、白夏枯草、薤椒草(寿宁);台湾:凤尾癭,鼠筋癭;湖北:蛇含草,断克膝;湖南:状元草,〔鸡骨香〕(长沙);广东:山白甲草,甲由草,狐狸尾、假麦枯草(潮安),黄蜂草,蓝色草;广西:焦梅寸(西林),六轴草(玉林),细路边青(昭平),狗尾草(平南),节节红花(贵县),细路边青(玉林、北流),黑节草、轮草、土麦枯草、细叶狗肝菜(梧州),大蛇花草(临群);四川:瓦子草、野万年青、拐子草(峨眉山),伤寒草(西昌),二季花(筠连),化痰膏,青泽兰;贵州:山苏麻,巴骨癭,野辣子叶,小夏枯草(贵阳),棒头草(都匀);云南:隐定草,节节寒;其他:四角仔叶,〔鼠尾草〕,虎尾草,鸡啄草,白穗红,白穗莲。

**功效** 全草:清热解毒,利尿消肿。用于感冒发热,疟疾,咽喉肿痛,小儿疳积,痢疾,肠炎,肝炎,肾炎,水肿,泌尿系感染,乳糜尿。外用于疳疮疖肿,跌打损伤。

## 7259066

*Rungia cantonensis* How

植物名 广东孩儿草(拟)

药材名 六角英(汇编)

地方名 广东:积药草(翁源);广西:黑节头。

**功效** 全草:平肝清热,消积导滞。用于小儿疳积,急性结膜炎,肝炎,感冒,喉痛,颈淋巴结结核,乳疮,疖肿。

## 7259067

*Rungia chinensis* Benth.

植物名 中华孩儿草(高植图鉴)

文献名 明萼草(广西植录)

**功效** 全草:清热解毒,消疳积。

## 7259068

*Rungia pectinata* (L.) Nees

植物名 孩儿草(高植图鉴)

药材名 孩儿草(岭南采药录)、《中药大辞典》

文献名 疳积草(汇编),明萼草(种称)

地方名 上夏枯草(广东、广西);台湾:鼠尾黄;海南:节节红;广东:蓝色草(崖县),黄蜂草,积药草,由甲草(广州);广西:了哥利,细鼻王,鱼尾草,细路边青(北流),火炭草(梧州),四方梗(平南),甲由草(隆林)。

**功效** 全草:清热利湿,消积导滞。用于小儿疳积,消化不良,肝炎,肠炎,感冒,喉痛,眼结膜炎,颈淋巴结结核,疖肿。

## 7259069

*Rungia steionifera* C. B. Clarke

植物名 毛叶孩儿草(贵州药录)

地方名 贵州:毛叶鱼鳅串。

**功效** 全草:疏风清热,凉血止血。用于风热感冒,吐血,刀伤出血,肝炎,肠炎。

## 7259070

*Sericocalyx chinensis* (Nees) Bremek. --- *Hemigraphis chinensis* (Nees) T. Anders.

植物名 黄球花(海南植志)

药材名 狗泡草(陆川本草)

文献名 半柱花(《中药大辞典》)

地方名 广西:白泡草,毛虫药,毛虫包、火漂藤(陆川)。

**功效** 全株:利尿,解毒,消炎。用于小儿皮肤泡疮,痢疾。

## 7259071

*Strobilanthes aenobarbus* W. W. Smith

植物名 铜毛紫云菜(云南种录)

药材名 十三年花(红河中草药)

文献名 铜色毛紫云菜(红河中草药)

**功效** 根、叶:活血调经,清肝热。用于眼结膜炎,月经不调,产后腹痛,黄疸型肝炎,疟疾,心悸,哮喘。

## 7259072

*Strobilanthes dimorphotrichus* Hance

植物名 异毛紫云菜(广西药录)

地方名 广西:石大骨(邕宁)。

**功效** 全株:消肿,散血。用于跌打损伤。

## 7259073

*Strobilanthes divaricatus* (Nees) T. Anders. --- *Difflugosa divaricata* (Nees) Bremek.

植物名 疏花马蓝(高植图鉴)

文献名 叉开紫云菜(广西药录)

地方名 广西:清沙草(大瑶山),大蓝。

**功效** 全株:用于疮肿,跌打损伤。

## 7259074

*Strobilanthes lofoensis* Levl.

植物名 接骨马蓝(拟)

文献名 接骨草(广西药园药录)

**功效** 全草:接骨,消肿。用于骨折。

## 7259075

*Strobilanthes maclurei* Merr. --- *Championella maclurei* (Merr.) C. Y. Wu et H. S. Lo

植物名 汗斑草(广西植录)

文献名 马氏紫云菜(广西药录)

**功效** 全株:用于疥疮,汗斑。

## 7259076

*Strobilanthes nemorosus* R. Ben. --- *Strobilanthes grossus* C. B. Clarke

植物名 未膝马蓝(《中药志》)

药材名 味牛膝(品种论述)

文献名 大紫云菜(云南种录)

地方名 未夕、未膝(湖北、四川);湖北:野牛夕(长阳),野牛膝;四川:金山升麻(南川);其他:尾膝,窝牛膝,土牛膝。

**功效** 根:行瘀血,消肿痛,强筋骨。用于经闭瘕瘕,淋痛难产,腰膝痹痛。

## 7259077

*Strobilanthes tetraspermus* (Champ. ex Benth.) Druce --- *S. radicans* T. Anders. ex Benth.

植物名 四子马蓝(高植图鉴)

药材名 绿豆青(湖南药物志)

地方名 湖北:碎骨青(神农架);四川:红泽兰(峨眉山)。

**功效** 全草:清热,解表。用于风热感冒,疮疖肿毒。

## 7259078

*Strobilanthes triflorus* Y. C. Tang

植物名 三花马蓝(高植图鉴)

地方名 贵州:对节叶。

**功效** 根、叶:清热解毒,凉血,散瘀消肿,截疟杀虫。

## 7259079

*Tarphochlamys affinis* (Griff.) Bremek. --- *Strobilanthes affinis* (Griff.) Y. C. Tang

植物名 顶头草《广西药录》

文献名 顶头马蓝《高植图鉴》

地方名 贵州: 瘰药。

功效 全草: 清热解毒, 消肿止痛。用于风湿痛, 高热, 白带, 痢疾, 水肿。外用于无名肿毒, 疥癣, 汗斑, 蛇咬伤。

7259080 见 7259083a

7259081

*Thunbergia adenophora* W. W. Smith

植物名 巢脉山牵牛《高植图鉴》

功效 叶: 用于跌打损伤。

7259082

*Thunbergia alata* Bojer

植物名 翼叶山牵牛《高植图鉴》

文献名 翼叶老鸦嘴《广西药园药录》

功效 全株: 消肿止痛。

7259083

*Thunbergia fragrans* Roxb.

植物名 碗花草《名实图考》、《高植图鉴》

文献名 山牵牛《种称》, 铁贯藤、老鸦嘴《高植图鉴》, 斑鸠嘴《元江哈尼族药》

地方名 贵州: 金线吊葫芦; 云南: “哈回美拖药思”(元江哈尼语)。

功效 根: 清热, 除湿, 利胆, 平喘。用于疮疡红肿, 皮肤瘙痒, 湿热黄疸, 哮喘; 全株: 消食, 健胃, 消炎, 解毒。用于腹胀。

7259083a

*Thunbergia grandiflora* (Roxb. ex Rottl.) Roxb.

植物名 大花山牵牛《高植图鉴》

药材名 老鸦嘴《汇编》

文献名 大花老鸦嘴《广州植志》, 山牵牛《云南种录》

地方名 广东: [大青](阳春), 老鸦杓(新丰); 海南: 拙杓藤、老鸱嘴(琼州); 广西: 白狗肠, 土玄参(陆川), 土牛七, [土牛膝](容县), 通骨消(南宁), 强过头(龙州), 地藕(邕宁), 群党(北流), 鸭嘴参。

功效 根皮: 用于跌打损伤, 骨折; 茎、叶: 用于蛇咬伤, 疮疖; 叶: 用于胃痛。

7259084

*Thunbergia lacei* Gamble

植物名 刚毛山牵牛《云南种录》

药材名 黄毛山牵牛《西双版纳傣药志》

地方名 云南: “嘿农业”(西双版纳傣语)。

功效 根: 用于耳鸣, 耳聋, 食欲不振。

7259085

*Thunbergia laurifolia* Lindl.

植物名 桂叶老鸦嘴《广州植志》

功效 叶: 用于月经过多。外用于刀伤, 痄肿。

## 7261 苦槛蓝科 Myoporaceae

7261001

*Myoporum bontioides* (Sieb. et Zucc.) A. Gray

植物名 苦槛蓝《高植图鉴》

药材名 苦槛蓝《广西药录》

文献名 甜槛蓝《台湾中药材图鉴》

地方名 滨沈丁(中南); 台湾: 苦槛蓝, 甜林盘, 甜仔盘, 叉蓝盘, 苦槛兰, 苦蓝盘。

功效 根: 用于肺病, 风湿病。

## 7263 马鞭草科 Verbenaceae

7263001

*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.

植物名 海榄雌《中国植志》

药材名 海榄雌《广西药录》

文献名 白骨壤《海洋药物》, 白骨浪《海南植志》

地方名 广东: 咸水矮让木; 海南: 海豆; 广西: 海榄钱(防城)。

功效 树皮胶: 可作避孕药; 叶: 外用于脓肿; 果实: 用于痢疾。

7263002

*Callicarpa arborea* Roxb.

植物名 乔木紫珠《汇编》

文献名 木紫珠《中国植志》, 南洋紫珠《高植图鉴》, 树紫珠《广西植录》, 大叶紫珠《西双版纳傣药志》

地方名 马踏皮(广西、云南); 云南: 紫珠, 大紫珠, 大树紫珠, 豆种, 白叶子树(思茅), 白叶木树(西双版纳), 豆豉树(河口), “美弄”、“梅罗”(河口依族语), “梅发破”(思茅傣语), “冬瓜渡”、“刀瓜渡”(屏边瑶族语), “皮卡马”、“皮哈麻”(屏边少数民族语); 其他: 紫珠树。

功效 根、叶: 凉血, 止血。用于外伤出血, 消化道出血, 衄血, 妇女崩漏。

7263003

*Callicarpa bodinieri* Levl. --- *C. giraldiana* Hesse var. *subcanescens* Rehd.

植物名 紫珠《中国植志》

药材名 紫珠(陕西、贵州、江西)

文献名 珍珠风、珍珠柳《草木便方》, 鱼胆《中国药植志》, 珍珠枫、米筛子、里筛子、菊盘花《高植图鉴》, 大叶斑鸠木《广西植录》

地方名 毛老鸦糊(广西、云南); 浙江: 鲤鱼下子, 博士紫珠; 安徽: 爆竹柴; 江西: 老鸦糊, 鸦雀饭(泰和), 大叶鸦雀饭, 止血草; 湖南: [水杨梅], 白眼草, 细米树, 珠子树, 肺部草, 爆竹树; 广西: 大腿七(全州); 四川: 鱼子, 扁蓑草, 漆大白; 贵州: 白木姜。

功效 根或枝叶: 活血通经, 祛风胜湿。用于月经不调, 崩漏带下, 产后瘀血腹痛, 外感风寒, 风湿疼痛; 种子: 儿科伤寒发表药。

7263004

*Callicarpa bodinieri* Levl. var. *rosthornii* (Diels) Rehd.

植物名 南川紫珠《中国植志》

文献名 罗桑氏紫珠《广西药录》, 川桂老鸦糊《广西植录》

地方名 广西: 小风叶(龙州), 斑鸠米(隆林)。

功效 叶: 用于疥疮, 跌打损伤。

**7263005**

*Callicarpa brevipes* (Benth.) Hance --- *C. longifolia* Lamk. var. *brevipes* Benth. --- *C. brevipes* Hance var. *obovata* H. T. Chang

植物名 短柄紫珠(中国植志)

药材名 短柄紫珠(广西药录)

地方名 广西:红米碎木(玉林)。

功效 全草:祛风除湿,化痰止咳。用于风湿性关节炎,支气管炎;根、叶:用于外伤出血。

**7263006**

*Callicarpa candicans* (Burm. f.) Hochr. --- *C. cana* L. --- *C. sinensis* Hort. ex Steud.

植物名 白毛紫珠(中国植志)

功效 根、叶、树皮:据文献记载,印度和东南亚地区用水煎液治皮肤病或作箭毒。

**7263007**

*Callicarpa cathayana* H. T. Chang

植物名 华紫珠(中国植志)

药材名 华紫珠(广西本草选编)

文献名 米筛子(高植图鉴),鱼显子(云南植志)

地方名 鲤鱼显子、鲤鱼献子(江苏、浙江);江苏:珍珠风,止血草,创伤草,紫珠;浙江:鱼泻子(临安、龙泉、云和),爆竹子(杭州),小叶珍珠枫(衢县),野蛙蟆双子,珍珠莲,珍珠草,小叶珍珠风,小号散风柴;江西:鸡鹊饭;贵州:紫红鞭(兴义)。

功效 叶、嫩茎、根:止血,散瘀,消炎。用于衄血,咯血,胃肠出血,子宫出血,上呼吸道感染,扁桃体炎,肺炎,支气管炎,疖痈,走马疳。外用用于外伤出血,烧伤。

**7263008**

*Callicarpa dichotoma* (Lour.) K. Koch

植物名 小叶鸦鹊饭(高植图鉴)

药材名 紫珠(江苏、浙江、安徽、福建、河南)

文献名 细亚锡饭(名实图考),白棠子(浙江药植志),白棠子树(中国植志)

地方名 山指甲(山东、广东);山东:小紫珠,小米干饭;安徽:珍珠风,黑泡子,绿英柴;江西:止血柴,紫珠草;福建:粗糠柴、白中柴、白毛柴、白奶雪柴(福安),贼仔草,创伤草,大叶毛将军;河南:小叶紫珠;湖南:红六月雪;广东:细叶老蟹目(惠阳),月中风,米仔天红,细叶鸦鹊饭,紫珠风;广西:水薄荷(苍梧),毛毛茶(南宁),大掌根,红斑鸠米(桂平),兰花梅(贵县),小泡树,梅灯狗散(三江);其他:止血草。

功效 根、茎、叶:散瘀,止血,消炎。用于衄血,咯血,胃肠出血,子宫出血,上呼吸道感染,扁桃体炎,支气管炎。外用用于外伤出血,烧伤。

备考 《新华本草纲要》称:《救荒本草》的“白棠子树”,图、文均非本种,而是胡颓子科植物。

**7263009**

*Callicarpa formosana* Rolfe --- *Callicarpa pedunculata* Lam. et Bakh.

植物名 杜虹花(中国植志)

药材名 紫珠(浙江、福建)

文献名 粗糠子、鸦鹊饭(树分),种红花(云南种录),白粗糠(台湾中药材图鉴)

地方名 紫珠草(福建、广东);福建:螃蟹目、雅目草(闽南),白毛柴、白奶雪草(闽东),止血草,节节草(南平),创伤草,贼仔草,力拔似,田蟹目,斧头疮,螃蟹目草,螃蟹眼睛草,鲫鱼草,粗糠柴,毛蟹草,鸦目草,鸦鹊饭树,大走马;台湾:粗糠打,山埔姜,毛将军,大丁痲;广东:鸡济木叶,大叶米仔碎,小叶橡皮毛,贼佬钻,老蟹眼;广西:贼佬药(南宁);其他:白粗糠子。

功效 叶、根:止血,散瘀,消肿。用于创伤出血,咳血,鼻衄,胃出血,拔牙出血。

备考 《新华本草纲要》称:“《中药大辞典》以本种为《本草拾遗》之‘紫珠’,似不确,图亦不类。”

**7263010**

*Callicarpa giraldii* Hesse ex Rehd. --- *C. giraldiana* Hesse --- *C. bodinieri* Levl. var. *giraldii* (Hesse) Rehd.

植物名 老鸦糊(中国植志)

药材名 老鸦糊(福建民间草药)

文献名 珍珠枫(经济植物学),鱼胆(树分)

地方名 紫珠(陕西、云南);浙江:鲤鱼下子,爆竹子,路伞子,白子爆,米筛花,米筛子,大叶鲤鱼泻子,毛风;福建:牛舌痲,猴草,粗糠草,粥香;湖北:狗骨常山;广西:廉鱼风(岑溪),大叶斑鸠米;四川:珍珠风,漆大白,鱼子;贵州:大麻雀米,鸡米树,棠子木,红泡果,珍珠子;云南:细米油珠,斑鸠站,紫珠草,小米团花。

功效 根、茎、叶、果实:祛风除湿,散瘀解毒。用于风湿性关节痛,跌打损伤,崩漏,外伤出血,尿血,截疟。

**7263011**

*Callicarpa integerrima* Champ.

植物名 全缘叶紫珠(中国植志)

文献名 鸦鹊饭(高植图鉴),全缘紫珠(浙江药植志)

地方名 湖南:“风冤呀”(瑶名);广西:月中风(容县),{王不留行}(苍梧)。

功效 根、叶、茎:止血,散瘀,消炎;叶:用于风湿骨痛,急性肝炎。

**7263012**

*Callicarpa japonica* Thunb.

植物名 日本紫珠(中国植志)

文献名 紫珠(高植图鉴),山紫珠(东北木本图志)

地方名 山东:鸡丁棍(昆崙山),水晶桃(蒙山);浙江:鲤鱼仙子(天目山)。

功效 根、叶、茎:止血,散瘀,消炎。

**7263013**

*Callicarpa japonica* Thunb. var. *angustata* Rehd.

植物名 窄叶紫珠(中国植志)

药材名 窄叶紫珠(神农架药录)

地方名 湖北:紫珠(神农架)。

功效 叶:止血。用于动脉出血。

**7263014**

*Callicarpa kochiana* Makino --- *C. loureiri* Hook. et Arn.

植物名 枇杷叶紫珠《中国植志》

药材名 牛舌癭(闽南)

文献名 野枇杷《中国药植图鉴》, 长叶紫珠《树分》, 黄毛紫珠《中药大辞典》

地方名 浙江: 毛紫珠; 江西: 黄紫珠; 福建: 山枇杷; 广西: 刀伤药。

功效 根、叶: 散瘀止血, 消肿止痛; 叶: 用于吐血, 咯血, 衄血, 便血。外用于外伤出血; 根: 用于跌打肿痛, 风湿骨痛。

#### 7263015

*Callicarpa kwangtungensis* Chun

植物名 广东紫珠《中国植志》

药材名 金刀菜《湖南药物志》

地方名 江西: 老鸦饭; 湖南: 珍珠风, 表药, 小金刀, 臭常山, 金刀树, 大叶珍珠, 金刀柴, 止血柴。

功效 茎、叶: 止痛, 止血。用于胃痛, 胸痛, 吐血, 偏头风, 外伤出血。

#### 7263016

*Callicarpa lingii* Merr.

植物名 光叶紫珠《中国植志》

文献名 江西紫珠《浙江药植志》, 林氏紫珠《浙南本草新编》

地方名 浙江: 无柄紫珠; 安徽: 绿英柴。

功效 根、叶、茎: 止血, 散瘀, 消炎。

#### 7263017

*Callicarpa lobo-apiculata* Metc.

植物名 尖萼紫珠《中国植志》

地方名 广西: 野黄花树(大苗山)。

功效 叶: 外用于体癣。

#### 7263018

*Callicarpa longifolia* Lamk.

植物名 长叶紫珠《中国植志》

药材名 长叶紫珠《云南药录》

地方名 海南: 老哈眼; 云南: 紫珠。

功效 根、茎皮: 消炎杀菌。用于梅毒, 鹅口疮, 疝气。

#### 7263019

*Callicarpa longifolia* Lamk. var. *floccosa* Schauer

植物名 白毛长叶紫珠《中国植志》

药材名 白毛长叶紫珠《广西药录》

地方名 广西: 大枫木、大风木叶(阳朔)。

功效 叶: 用于头晕, 风湿痛。外用于中耳炎。

#### 7263020

*Callicarpa longissima* (Hemsl.) Merr.

植物名 尖尾枫《中国植志》

药材名 尖尾风《本草求原》, 《中药大辞典》

文献名 赶风晒、赶风叶《本草求原》, 尖尾峰、起痕晒《生草药性备要》, 赤药子《名实图考》, 赶风柴《岭南采药录》, 芳来氏紫珠、野枇杷根《中国药植图鉴》, 大样尖尾枫《高植图鉴》

地方名 江西: 粘手枫; 福建: 雪突(福州), 牛舌癭

(泉州、龙海、漳州), 鸭屎槌(宁化), 风草(永安), 老君桥(南平); 广东: 拿手枫(阳春); 广西: 大风药, 黑节风、握手风、稔草风(平南), 拈捌风(容县), 穿骨风(玉林), 大风叶(上林), 廉鱼风(岑溪、南宁), 枫叶, 粘手风(岑溪), 穿骨枫。

功效 叶: 祛风散寒, 活血消肿。用于风湿骨痛, 风寒咳嗽, 寒积腹痛, 无名肿毒, 跌打损伤; 根: 祛风活血。用于风湿痹痛, 跌打损伤。

#### 7263021

*Callicarpa longissima* (Hemsl.) Merr. f. *subglabra* Pei

植物名 秃尖尾枫《中国植志》

药材名 秃尖尾风《广西药录》

地方名 广西: 山猪泡(桂平), 大风叶(上林)。

功效 叶: 用于刀伤出血, 痧气, 肚胀。

#### 7263022

*Callicarpa luteopunctata* H. T. Chang

植物名 黄腺紫珠《中国植志》

功效 根: 四川、云南民间用根煎水洗治风湿病, 内服治痧气。

#### 7263023

*Callicarpa macrophylla* Vahl

植物名 大叶紫珠《中国植志》

药材名 大叶紫珠《汇编》

文献名 紫珠《本草拾遗》, 大叶鸭鹊饭《高植图鉴》, 紫珠草《中草药学》

地方名 赶风柴(湖南、广西), 止血草(福建、云南), 山枇杷(福建、广东); 福建: 台湾紫珠, 大叶珍珠子柴, 紫珠子草(清流), 枪刀草、木本毛将军(大田), 布鹁饭、金枇杷(三明), 野枇杷; 湖南: 紫粒粒树、大走马(衡山); 广东: 乌纹桃、老蟹目(五华), 贼佬叶, 假大艾; 广西: 白骨风, 大风叶, 白饭木(玉林), 白背木叶(贵县), 细朴木(藤县), (白狗肠)(昭平), 假大叶(北海), 大蚂蚁(西林), 暖叶, 月中风, “郎陆”(壮族语); 云南: 狗耳朵叶, 小米团花, 羊耳朵树(金平), 豆丝叶, 豆树、山蜂蜜(河口), 红大伯, [漆大伯]。

功效 根、叶: 散瘀止血, 消肿止痛; 叶: 用于吐血, 咯血, 衄血, 便血。外用于外伤出血; 根: 用于跌打肿痛, 风湿骨痛。

#### 7263024

*Callicarpa nudiflora* Hook. et Arn.

植物名 裸花紫珠《中国植志》

药材名 赶风柴《中药大辞典》

文献名 紫珠草《中草药学》, 老蟹眼《高植图鉴》

地方名 广东: 猪糠木、贼佬叶(阳春), 大贼叶, 贼公叶, 贼仔叶, 老贼骨, 捍风散, 白花茶; 海南: 大叶鸭鹊饭, 老蟹目, 驳骨团; 广西: 节节红, 饭汤叶(宁明), 亚寨凡、鸭鹊饭(北流), 大斑鸡米(岑溪), 贼佬药、大叶紫珠(南宁); 其他: 假大艾, 大走马, 三托斗叶, 止血草。

功效 叶: 消炎, 解毒, 收敛, 止血。用于化脓性炎症、急性传染性肝炎。外用于烧烫伤、外伤出血。

#### 7263025

*Callicarpa peichieniana* Chun et S. L. Chen

植物名 钩毛紫珠《中国植志》  
 药材名 钩毛紫珠《广西药录》  
 地方名 广西:红斑鸠米(昭平)。  
 功效 叶:用于感冒,外伤出血。

## 7263026

*Callicarpa peii* H. T. Chang

植物名 藤紫珠《中国植志》  
 药材名 藤紫珠《广西药录》  
 文献名 裴氏紫珠《植分学报》  
 地方名 广西:三爪风(龙胜)。  
 功效 全株:用于腹泻,感冒发热,风湿病。

## 7263027

*Callicarpa pilosissima* Maxim.

植物名 长毛紫珠《中国植志》  
 文献名 细叶紫珠《元江哈尼族药》  
 地方名 云南:康坡(元江哈尼语)。  
 功效 根、叶:收敛,止血。用于水火烫伤,月经过多,鼻衄。

## 7263028

*Callicarpa rubella* Lindl. --- *C. rubella* Lindl. var. *hemsleyana* Diels

植物名 红紫珠《中国植志》  
 药材名 红紫珠《广西药录》  
 文献名 山槟榔《植物名汇》,红叶紫珠《云南中草药选》

地方名 江西:老鸦棚;湖南:白金子风;广东:老蟹眼(乐昌);广西:野蓝靛,尖叶毛射香,小斑鸠米,贼仔药,山霸王(平果);四川:珍珠花,珍珠枫,漆大白(南川),空壳树,铁沙草(屏山),空壳铁砂子;贵州:复生药,对节树;云南:小红米果,小红米果根,细米油珠(思茅),对节子树(绥江)。

功效 根:清热,止血。用于月经不调,吐血,尿血,痔疮出血;叶:接骨。用于跌打损伤;叶、果:外用于角膜炎。

## 7263029

*Callicarpa rubella* Lindl. f. *angustata* Pei

植物名 狭叶红紫珠《中国植志》  
 药材名 狭叶红紫珠《广西药录》  
 地方名 广西:佟阿纺(藤县),节节风(桂平),节节花(桂平、玉林),斑鸠米(南宁),白斑鸠米(藤县、平南),纸灰木(玉林),米碎木(蒙山、昭平),“冒勒巴”(广西壮族语);四川:白花叶(盐边),水金花(屏山);云南:斑鸠钻(红河),小灰果,细米珠,小叶紫珠,紫珠,细米油珠、螃蟹蛋(思茅),[漆大白](西畴、文山),细米果(西双版纳),紫珠草(临沧),狗脑花(景东),小鸡碎米果(屏边),“阿取”(河口瑶语),“为作时杆”(潞西、遮放景颇族语),黄香米,使十节,碎米果。

功效 根:发汗退热,消肿,截疟;叶:止痒,消瘀,去腐,生肌。

## 7263030

*Callicarpa rubella* Lindl. f. *crenata* Pei

植物名 钝齿红紫珠《中国植志》

药材名 钝齿红紫珠《广西药录》

地方名 广东:珍珠树;广西:斑鸠米(平南),红斑鸠米(桂平),小斑鸠米(岑溪),白斑鸠米(藤县、昭平),大刀伤、毛跌打(苍梧),沙药草(大苗山);云南:斑鸠钻,小灰果,细米珠,小叶紫珠,紫珠,狭叶红紫珠。

功效 根、叶:用于肝炎,痢疾,外伤出血。

## 7263031

*Callicarpa yunnanensis* W. Z. Fang --- *C. cricoides* C. Y. Wu

植物名 云南紫珠《中国植志》  
 文献名 绵毛紫珠《云南植志》,滇南紫珠《汇编》  
 功效 根、叶:清热解毒,散瘀止血,消肿止痛。

## 7263032

*Caryopteris aureoglandulosa* (Vant.) C. Y. Wu

植物名 金腺蕨《中国植志》  
 药材名 金腺蕨《广西药录》  
 地方名 广西:跌打接骨菜(西林);贵州:八瓜金(瓮安)。  
 功效 叶:外用于骨折。

## 7263033

*Caryopteris forrestii* Diels

植物名 灰毛蕨《中国植志》  
 文献名 蝴蝶茴香《峨山彝族药》,白叶蕨《高植图鉴》

地方名 云南:“木黑突”(彝名),白巴子(鹤庆),白巴胡子(大理),白坝子。

功效 全株:健脾消食,补中益气。用于急、慢性胃炎,小儿疳积。

## 7263034

*Caryopteris incana* (Thunb.) Miq. --- *Caryopteris mastacanthus* Schau.

植物名 兰香草《中国植志》  
 药材名 兰香草《名实图考》,《汇编》  
 文献名 石将军、紫罗球《纲目拾遗》,婆罗花《名实图考》,独脚求、石母草《岭南采药录》,卵叶蕨《江苏植录》,蕨(种称),马蒿《中国植物图鉴》

地方名 山薄荷(江西、福建、广东),走马天风、猴子草(广东、广西),七层楼、山荆芥、酒药草(江西、湖南);陕西:白鸡婆捐,小六月寒,血汗草,秤杆升麻(凤县),老汉臭、臭需(蓝田);浙江:地罗珠、野仙草、子附莲、对对花(余姚),避蛇虫,香避力,野金花,石仙草,岩薄荷,六盘花(嵊县),石薄荷;江西:兰花草(吉安),流民草(南昌),杀虫药,野酒饭草,石马;福建:黄鸡柴,九层塔(莆田、安溪、南安、仙游),假仙草(龙岩),黄鸡草(政和),猪草(晋江),[山姜],山梗仔,白花九层塔,鸡爪癩;湖北:连衣包(神农架);湖南:石黄荆(衡山),蓝花草,糠头花(新宁);广东:段菊,独角球,猴子抱膝,石兰香,石武草(广州),石上香、石射香、割鸡草(惠阳),金石香、七盘香(阳春),山卜可,福州马尾;广西:野薄荷,节节花(富川、玉林),伤寒草(梧州),山薑香,杨梅根,九层楼(邕宁);四川:“阿格几”(藏名)。

功效 全草或根:疏风解表,祛痰止咳,散瘀止痛。

用于上呼吸道感染、百日咳、支气管炎、风湿关节痛、胃肠炎、跌打肿痛、产后瘀血腹痛、毒蛇咬伤、湿疹、皮肤瘙痒。

## 7263035

*Caryopteris mongholica* Bunge

植物名 蒙古莢《中国植志》

药材名 白沙蒿(陕西)

文献名 蓝花茶、饿死鬼、吃不饱草《沙漠药植》, 蒙莢《高植图鉴》

地方名 内蒙古: “依曼-额布热”、“阿格鲁-沙乌克”、“苏尔吉尔”(蒙名), [白蒿], 山茶, 蒙古鞭菊, 灰脖子, 蓝花菜; 宁夏: 山狼毒。

功效 全株: 消食理气, 祛风湿, 活血止痛。用于消化不良, 腹胀, 风湿性关节炎。

## 7263036

*Caryopteris nepetaefolia* (Benth.) Maxim.

植物名 单花莢《中国植志》

药材名 莢《本草拾遗》、《新华本草纲要》

文献名 短柄单花莢《云南植志》, 边兰《中药大辞典》, 荆芥叶莢《汇编》

地方名 安徽: 瘡积草, 去瘡草, 对着钱; 浙江: [方便金钱草](德清), 倒挂金钟, [半枝莲], [野苋菜]。

功效 全株: 祛暑解表, 利尿解毒。用于中暑, 感冒, 尿路感染, 白带, 外伤出血。

## 7263037

*Caryopteris odorata* (D. Don) B. L. Rob.

植物名 香莢《中国植志》

文献名 斑鸠钻《云南药录》

功效 根、果实: 用于感冒。

## 7263038

*Caryopteris paniculata* C. B. Clarke

植物名 锥花莢《中国植志》

文献名 密花莢《高植图鉴》, 圆锥花莢《广西植录》

地方名 贵州: 紫红鞭(兴义)。

功效 根: 清热止痛。

## 7263039

*Caryopteris tangutica* Maxim.

植物名 光果莢《中国植志》

药材名 小六月寒《陕西中草药》

文献名 六月寒、西北莢《汇编》, 莢《陕西中草药》

地方名 陕西: 白鸡婆梢。

功效 全草、根: 调经活血, 祛湿。用于崩漏, 白带, 月经不调。

## 7263040

*Caryopteris terniflora* Maxim.

植物名 三花莢《中国植志》

药材名 六月寒《天宝本草》、《汇编》

地方名 山卷莲(陕西、甘肃), 风寒草(甘肃、四川);

陕西: 路边梢, 化骨丹(眉县), 野芝麻(眉县、太白、宝鸡、平利), 血汗草, 黄刺沧, 野荆芥, 黄刺泡, 气草; 江西: 流氓草、流氓草、兰花草(会昌); 四川: 老寒草、波丝草、风子草(成都), 红花野芝麻, 大风寒草, 蜂子草, 金

线风, 野薄荷。

功效 全株: 发表散寒, 宣肺止咳, 活血调经。用于感冒咳嗽, 慢性支气管炎, 百日咳, 痛经, 产后腹痛。外用于刀伤, 烧、烫伤, 毒蛇咬伤。

## 7263041

*Caryopteris trichosphaera* W. W. Sm.

植物名 毛球莢《中国植志》

文献名 毛莢《西藏药图》

地方名 青海: “普尔察”(藏名); 四川: [香蒿](炉霍)。

功效 花、叶: 用于头痛, 游走性关节疼痛。

## 7263042

*Clerodendrum bungei* Steud. --- *Clerodendron foetidum* Bunge -- *Clerodendrum yunnanense* auct. non Hu ex Hand. - Mazz.

植物名 臭牡丹《名实图考》、《中国植志》

药材名 臭牡丹《滇南本草》、《汇编》

文献名 [乌药]《滇南本草》, 大红袍、臭八宝、臭枫根《名实图考》, [八仙花]《植物名汇》, 矮重子《分类草药性》, [牡丹花]《中国药志》

地方名 大红花(湖北、湖南、贵州), 臭梧桐(江苏、浙江、安徽、湖南、广西), 红臭牡丹(广西、云南), 矮桐子(江西、福建、湖北、四川), 臭芙蓉(福建、山东、江西、湖北), 臭茉莉(四川、云南), 矮桐(江西、福建、四川); 山东: 臭八仙; 浙江: 臭树, 臭草, 鸡虱草, 紫子花(临安), 臭红花(建德), 臭虫药(淳安), 白蚊花(兰溪、武义、衢县), 臭桶盘(天台、仙居、瑞安); 安徽: 牛屎花, 野牡丹花; 福建: 野朱桐, 臭枫草, 臭珠桐, 臭风, 臭枫叶根, 臭头风(宁化), 荷包花(清流), 小号臭夹(明溪), 赤葛、臭枫(三明), 赤拐(永安), 臭屎茉莉(厦门), 番茉莉花(泉州), 龙般花(福鼎), 野珠桐、野梧桐、小梧桐、梧桐仔、假真珠、洋大花、臭灯桐(闽东), 假真珠梧桐, 狗屎花; 湖北: 百日红, 地桐子; 湖南: 逢仙草(通道), 老虫消(洞口), 大风草(宜章); 广东: 大头风、大风叶、大髻婆、大风把、大风丹、臭耳顶、风毒草(潮安), 矮梧桐(潮阳); 贵州: 矮脚桐; 云南: 紫牡丹(红河), 红牡丹, 蚂蚁花裸, 四棱臭草“吸吃基”(楚雄彝名)。

功效 根、叶: 祛风除湿, 解毒散瘀; 根: 用于风湿关节痛, 跌打损伤, 高血压病, 头晕头痛, 肺脓疡; 叶: 外用于疔疮疮疡, 痔疮发炎, 湿疹, 灭蛆; 花: 用于疔疮, 疝气。

备考 《滇南本草》整理本 1: 445, 1975 注: 《滇南本草》之乌药(*Clerodendrum bungei* Steud.)原整理本学名误订为 *C. yunnanense* Hu ex Hand. - Mazz.

## 7263043

*Clerodendrum canescens* Wall.

植物名 灰毛大青《中国植志》

文献名 灰毛臭茉莉《云南植志》, 毛人瘦木《指示植物》, 毛棘桐《高植图鉴》, 粘毛棘桐《海南植志》

地方名 江西: 九连灯(大余); 广东: 六灯笼(封川), 大叶白花鬼点火、大叶白花灯笼(惠阳), 白花鬼灯笼, 白棘桐; 广西: 狮子球, 人瘦木, 山茉莉(南宁), 白蜻蜓



(武鸣), 山大红(平南), 红顶风(桂平), 红将军(龙州), 白龙船, 白花龙船(邕宁); 云南: “买黑熬”(楚雄彝名), 蚂蚁菜。

功效 根: 养阴清热, 宣肺化痰, 凉血止血。用于肺结核咳血, 感冒高热, 红白痢。

## 7263044

*Clerodendrum colebrookianum* Walp.

植物名 腺茉莉《中国植志》

药材名 腺茉莉《广西药录》

地方名 广西: 过墙风(平南); 云南: 臭牡丹。

功效 根: 用于风湿骨痛, 咳嗽, 消肿。

## 7263045

*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.

植物名 大青《别录》、《中国植志》

药材名 大青叶(江西、台湾)

文献名 淡婆婆《名实图考》, 大青木、木本大青《汇编》, 路边草《简明中医辞典》, [山漆]《中国药植志》

地方名 臭叶树(湖北、湖南), 土地骨皮(浙江、江西、福建、广西、四川), 野靛青(浙江、四川), 猪屎青(海南、广西), [土常山](安徽、江西), [地骨皮](福建、广西), 山皇后(福建、四川), 鸭公青(江西、广西), 青草心(浙江、湖南、广西), 臭青(安徽、湖南), 牛舌枫(江西、广东), 山靛青(江苏、浙江), 臭冲柴(江西、福建、湖南), 山尾花(福建、湖南); 江苏: 牛耳青; 浙江: 土骨皮(丽水、云和、泰顺), 长叶臭梧桐、尖叶臭梧桐(嵊), 红秋风吹、红地骨皮(温州、瑞安、永嘉、乐清), 木大青(泰顺), 青心草; 安徽: 臭草柴, 野芝麻叶; 江西: 大叶青(婺源), 牛换青(丰城), 臭叶(莲花), 牛皮青, 牛角柴; 福建: 臭根, 野地骨, 山靛(浦城), 大青臭(龙海、南靖), 大叶地骨皮(永定), 臭婆根(建瓯), 土地骨(福安、厦门、宁德、周宁), 伤筋草(闽南), 地骨(福安), 鸡骨柴、臭树青、大参柴、鸡脚带(闽东), 臭树, 大蓝, 小叶臭甲, 牛脑远, 木远, 浦大汉, 青叶, 鸡骨达, 臭尼樵, 鸭屎樵, 臭柴, 山尾草; 台湾: 埔草样, 鸡脚胎; 湖北: 大青木叶, 牛舌头; 湖南: 臭皮柴、鸭屎树、臭枝柴(衡阳), 淡婆婆娘、婆婆根(邵东), 菜生紫(安仁), 大百解(通道), 淡亲家(新化), 绿豆青(新邵、新宁), 臭叶叶树(新宁), 苦菜叶(零陵), 淡亲家婆叶(长沙), 臭大青(永兴); 广东: 白花鬼灯笼、鸭屎青(阳春), 长刀叶(乳源); 海南: 摇子菜; 广西: 白灯笼(苍梧), 红羊古木(贵县), 羊尾青(桂平), 牛屎青(大瑶山), 鬼点灯(昭平), 野鬼点灯(平南), 臭菜叶子(全州), 羊咪青(百色、陆川), 羊精, 鸡屎菜, 鸡屎木, 鸡屎青, 白野鬼大把, 一盘花, 狗屎木, 青草, 臭菜叶; 云南: 石蚌跌打(思茅); 其他: 三冬青, 大只根(根), 真烟筒, 柴头菜, 假青根。

功效 根、叶: 清热利湿, 凉血解毒。用于防治流行性脑脊髓膜炎, 流行性乙型脑炎, 感冒头痛, 麻疹并发肺炎, 流行性腮腺炎, 扁桃体炎, 传染性肝炎, 痢疾, 尿路感染。

## 7263046

*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz. var. *kwangsiense* S. L. Chen et T. D. Zhuang

植物名 广西大青《中国植志》

药材名 广西大青《广西药录》

地方名 广西: [地骨皮](贵县)。

功效 根皮: 用于骨蒸劳热。

## 7263047

*Clerodendrum fortunatum* L.

植物名 白灯笼《中国植志》

药材名 白灯笼《汇编》

文献名 鬼灯笼、虎灯笼、白灯笼《生草药性备要》, 苦灯笼、灯笼草《岭南采药录》, 白花鬼灯笼《中草药通讯》

地方名 江苏: 尖萼常山; 广东: 白花鬼点灯(粤北), 白花山独伞(潮安), 白苦灯笼(郁南), 白花苦灯笼, 坟头青, 岗灯笼, 罗定地骨皮, 鬼点火; 广西: 土骨皮、红灯笼、红羊米青(陆川), 红花路边青, 夜鬼灯笼, 土羚羊, [地骨皮](平南、博白、桂平), [苦丁茶]、香花清(苍梧), 老虎须(陆川), 小红花(藤县), 野鬼点灯(平南、藤县), 苦灯茶鬼点灯, 野鬼灯笼。

功效 根或全株: 清热解毒, 止咳定痛。用于感冒发热, 咽喉炎, 支气管炎, 肺结核潮热, 胃痛, 疝痛; 鲜根或叶: 外用于跌打损伤, 疔疮疖肿。

## 7263048

*Clerodendrum hainanense* Hand. Mazz.

植物名 海南蕲桐《中国植志》

药材名 海南蕲桐《广西药录》

功效 全株: 用于肺结核。

## 7263049

*Clerodendrum henryi* P'ei

植物名 南垂茉莉《中国植志》

文献名 南垂臭茉莉《云南种录》, 滇桂臭茉莉《广西植录》

地方名 云南: “哈沙皮虎”(西双版纳傣语)。

功效 根: 健胃, 开胃。

## 7263050

*Clerodendrum indicum* (L.) O. Ktze.

植物名 长管大青《中国植志》

文献名 长管假茉莉《云南药录》

地方名 云南: “牙英转干亮”、“牙林砖”(思茅傣语), 疟疾草(傣语意译)。

功效 全株: 消炎利尿, 活血消肿, 祛风除湿。用于尿路感染, 膀胱炎, 跌打损伤, 风湿骨痛, 疟疾。

## 7263051

*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn. --- *Clerodendron nerifolium* Wall.

植物名 苦郎树《中国植志》

药材名 苦郎树《汇编》

文献名 水胡满、蟾蜍盖、蟾蜍盖、虎狼草《生草药性备要》, 臭苦郎、臭矢茉莉《岭南采药录》, 苦蓝盘(树分), 枯那搬、臭栗生、游树《中国药植志》

地方名 台湾: 白花苦蓝盘, 苦蓝盘; 广东: 猪鬃怕, 缸瓦杯, 假茉莉, 水瓜网、相公担屎桶、水芙蓉(广州), 苦杯三、苦卡(新会), 黄藤, 黄藤根(潮阳、揭阳), 臭黄

藤(潮安), 拦棚枝(阳江), 吊气还魂、猪鬃挺、虎卡、臭藤(惠阳), 苦椰子; 海南: 苦朗; 广西: 见水生(北流), 水泡木(平南), 鲫鱼胆, 海常山; 其他: 鸡公尾, 九里答, 草郎。

**功效** 根、茎、叶: 有小毒。清热解毒, 祛风除湿, 散瘀活络。用于风湿性关节炎, 腰腿痛, 坐骨神经痛, 胃痛, 感冒发热, 疟疾, 肝炎, 肝脾肿大。外用于皮肤湿疹, 跌打肿痛, 外伤出血。

#### 7263052

*Clerodendrum japonicum* (Thunb.) Sweet --- *Clerodendron kaempferi* (Jacq.) Sieb.

植物名 赧桐《南方草木状》、《中国植志》

药材名 赧桐《名实图考》、《汇编》

文献名 赧桐花、贞桐花《南方草木状》, 洋海棠《名实图考》, 台包花《草木便方》, 红苕蕖《岭南采药录》, 红虫木《中药大辞典》

地方名 状元红、龙船花(广东、广西), 荷包花(广东、四川), 朱桐(福建、广西); 浙江: [秋海棠], [丁香花]; 江西: 臭头丰, 默面雷公; 福建: 真珠花, 真珠梧桐(福安), 轮胎叶(龙溪), 百日红; 湖南: 红花倒血莲, 大叶红花倒水莲, 木通莲; 广东: 红苕(广州), 龙舟花(新会), 雌雄树(惠阳), 水壶筒, 红菱根, 红棱蕖, 白菱根, 大丹, 竹蟻树, 红脐蕖; 广西: 红龙船花(南宁、马山), 大红花(苍梧), 红池木(陆川), 大将军(德保), 过墙风(玉林), 野壮花(河池), 龙船叶, 红顶风, 红蜻蜓叶, 龙须花, 红帽顶, 臭茉莉(北海), 过山虎, 女青年首, 红花蜻蜓; 四川: 抽须红(成都), 香盏花, 香带花, 香斗花, 赤桐, 唐桐; 云南: 急心花(谿西), [臭牡丹](景洪), 红花臭牡丹(蒙自), 红花野牡丹、红牡丹(河口), “宾亮”(西双版纳傣名), 野红牡丹。

**功效** 根: 祛风除湿, 散瘀消肿。用于风湿骨痛, 腰肌劳损, 跌打损伤, 肺结核咳嗽, 咯血; 叶: 解毒排脓。外用于疔疮疖肿。

#### 7263053

*Clerodendrum kaichianum* Hsu

植物名 浙江大青《中国植志》

文献名 黄山大青《中药材科技》, 恺基大青《黄山植物研究》

**功效** 叶: 清热凉血。

#### 7263054

*Clerodendrum kwangtungense* Hand.-Mazz.

植物名 广东赧桐《高植图鉴》

文献名 广东臭牡丹《广西药录》, 广东臭茉莉《云南种录》, 广东大青《中国植志》, 白紫树《高植图鉴》

地方名 广西: 红花鬼点灯、红花鬼灯笼(贺县), 大叶菜(大苗山); 云南: 野靛, “老国墨肥”(元江哈尼语)。

**功效** 根: 收涩止泻。用于腹泻, 咳嗽, 风湿病。

#### 7263055

*Clerodendrum lindleyi* Decne. ex Planch. --- *Clerodendron fragrans* auct. non Vent.

植物名 尖齿臭茉莉《中国植志》

文献名 臭茉莉《树分》, 臭牡丹《海南植志》

地方名 江西: 大枫叶, 臭黄根, 鬼点火; 广西: 过墙风(藤县)。

**功效** 根、叶: 有小毒。祛风除湿, 解毒散瘀。用于风湿骨痛, 偏头痛, 高血压, 白带, 湿疹, 疔疮溃疡, 中耳炎

**备考** 《中国植志》(1982)称: 《树分》(1937)、《高植图鉴》(1974)、《海南植志》(1977)将本种学名误订为 *Clerodendron fragrans* Vent.

#### 7263056

*Clerodendrum mandarinorum* Diels

植物名 海通《中国植志》

药材名 海通《中国药植志》

文献名 满大青《云南植志》

地方名 江西: 臭梧桐; 湖南: 桐木树, 木瓜树, 线桐树, 鞋头树; 广西: 白灯笼, 木常山, 水桐木(全州); 贵州: 铁枪桐; 云南: 小花泡桐、牡丹树(屏边), 泡桐树(广南)。

**功效** 枝、叶: 用于半边风瘫, 高血压病; 根、树皮: 用于水肿, 小儿麻痹症。

#### 7263057

*Clerodendrum paniculatum* L.

植物名 圆锥大青《中国植志》

药材名 台湾龙船花根(拟)

文献名 龙船花根《台湾中药材图鉴》, 龙船花《台湾植志》

**功效** 根: 用于淋病, 月经不调, 肺病, 赤白带等。

#### 7263058

*Clerodendrum philippinum* Schau. --- *Clerodendron fragrans* var. *plumiflorum* Schau. --- *C. fragrans* Hort. ex Vent.

植物名 重瓣臭茉莉《中国植志》

文献名 大髻婆《云南植志》, 臭牡丹《元江哈尼族药》

地方名 广西: 走马风(陆川); 云南: “坡努努补”(元江哈尼语)。

**功效** 根、叶、花: 止咳, 行气, 调经, 消肿。用于小儿咳嗽, 脘腹胀痛, 月经不调, 痛经, 子宫脱垂, 附件炎, 风湿病。

#### 7263059

*Clerodendrum philippinum* Schauer var. *simplex* Moldenke --- *Clerodendron philippinum* Schauer var. *simplex* C. Y. Wu et R. C. Fang

植物名 臭茉莉《中国植志》

药材名 臭茉莉《生草药性备要》、《汇编》

文献名 臭矢茉莉《岭南采药录》, 山茉莉《树分》, 单瓣臭茉莉《彝药志》

地方名 臭牡丹(福建、贵州、云南), 臭屎茉莉(海南、广西), 鬼点草(广东、广西), 臭梧桐(江苏、福建); 江苏: 八角梧桐; 浙江: 本臭桐影; 福建: 狗屎茉莉(厦门、同安), 假真珠梧桐(寿宁), 臭朱桐(厦门、龙岩、南宁、福州、松溪、政和), 臭赧桐(周宁、宁德、福安); 广东: 茉莉头、大髻婆根(广州、新会), 臭屎茉莉头、臭屎

茉莉根(广州),臭花(阳春),红花茉莉,马兜风、鸡头风(惠阳),大风草(潮安);广西:白臭牡丹,过墙风,老虎草,小将军,蜻蜓叶,白龙船花,臭芙蓉,“朋必”(壮语);云南:臭叶子,臭树,红臭牡丹,子母丹(红河),白花臭牡丹(河口),“咪宾”、“宾叫”(傣语),“兵蒿”(西双版纳傣语);其他:东花草,臭风头。

功效 根、叶:祛风利湿,化痰止咳,活血消肿。用于风湿性关节炎,脚气水肿,白带,支气管炎;叶:外用干湿疹,皮肤瘙痒。

#### 7263060

*Clerodendrum serratum* (L.) Moon

植物名 三对节《中国植志》

药材名 三对节《汇编》

地方名 大常山(广西、云南);广西:大罗伞(龙州),山利桐(天等),三多(靖西、凤山),[贯仲](大新),大散、六伞(龙州),臭牡丹,三合叶;贵州:[三百棒],山枇杷;云南:三台花(澜沧、文山),四平头,绿子暗消,小常山,三皮柳、八棱马(临沧),锅肉臭牡丹、对节黄(河口),对节生(文山),“光三哈”(西双版纳傣语),八棱麻(沧源、双江),“慢养”(孟连傣语),大山麻(澜沧),小树皮山药(红河),“盘着着夺”、“盘嘴嘴读”、“杀期努恰”(红河州哈尼语),三台大药、大暗消、野反背绿(建水),二块瓦(屏边);其他:大叶土常山。

功效 全株或根、叶:有小毒。清热解毒,截疟,接骨,祛风除湿。用于扁桃体炎,咽喉炎,风湿骨痛,疟疾,肝炎。外用干痈疽肿毒,骨折,跌打损伤。

#### 7263061

*Clerodendrum serratum* (L.) Moon var. *amplexifolium* Moldenke

植物名 三台花《中国植志》

药材名 三台红花《云南中草药选》

文献名 抱茎三对节《中药大辞典》,无柄三对节《广西药录》

地方名 三对节(广西、云南);广西:红旧(巴马);贵州:[三百棒]、山枇杷(兴义);云南:三台高,大麻暗消(红河),三叶暗消(金平),大山麻(普洱),太毒剂(双江),火山麻,三台,三火麻(思茅),三台树(易武),三匹柳、[八棱麻](临沧),对节黄(西畴),三叉叶、野牡丹(屏边),“慢养”(勐海傣语),“杀期努恰”(红河州哈尼语),“岩甩”(耿马傣语),“光三卡”(思茅傣语),“哈叶叶哈”(金平哈尼语);其他:对节生,大叶土常山。

功效 根、茎皮:有小毒。清热解毒,截疟,接骨,祛风除湿。用于疟疾,避孕,胃痛,急性胃肠炎,重感冒,头痛,跌打损伤,风湿病,肝炎。

#### 7263062

*Clerodendrum serratum* (L.) Moon var. *herbaceum* (Roxb.) C. Y. Wu

植物名 草本三对节《中国植志》

地方名 广西:大罗伞(龙州);云南:[八棱麻](耿马),大山麻(澜沧),四拐麻黄(石屏),对节黄(麻栗坡),对节生(文山)。

功效 根、茎皮:有小毒。清热解毒,截疟,接骨,

祛风除湿。用于胃痛,急性胃肠炎,重感冒,头痛,风湿骨痛,疟疾,避孕,肝炎。外用干痈疽肿毒,骨折,跌打损伤。

#### 7263063

*Clerodendrum serratum* (L.) Moon var. *wallichii* C. B. Clarke --- *Clerodendron divaricatum* Jacq

植物名 大序二对节《中国植志》

文献名 齿叶棘桐《广西植录》

功效 根、茎皮:有小毒。清热解毒,截疟,接骨,祛风除湿。用于胃痛,急性胃肠炎,风湿骨痛,疟疾,肝炎。外用干痈疽肿毒,骨折,跌打损伤。

#### 7263064

*Clerodendrum subscaposum* Hemsl.

植物名 抽葶大青《中国植志》

文献名 抽葶棘桐《云南植志》

功效 根:养阴清热,凉血止血。用于感冒,肺结核,咯血,红白痢。

#### 7263065

*Clerodendrum thomsonae* Balf.

植物名 龙吐珠《中国植志》

药材名 九龙吐珠《汇编》

文献名 白萼棘桐《海南植志》

功效 叶:解毒。用于慢性中耳炎。

#### 7263066

*Clerodendrum trichotomum* Thunb. --- *C. trichotomum* Thunb. var. *fargesii* (Dode) Rehd.

植物名 海州常山《中国植志》

药材名 海州常山《图经》、《汇编》

文献名 海桐《群芳谱》,臭桐《广群芳谱》,臭芙蓉《百草镜》,地梧桐《养生经验合集》,臭梧桐、秋叶、八角梧桐(汪连仕《采药书》),芙蓉根《纲目拾遗》,凤眼子《质问本草》,楸叶常山《现代实用中药》,岩桐子《中国药植志》,泡花桐、臭木(树分),百日白《满蒙野卉》,光叶海州常山《云南植志》

地方名 后庭花(江苏、福建),臭牡丹(安徽、湖北、四川),矮桐子(四川),臭老汉(陕西、四川);甘肃:狐臭菜;山东:太粘苍(费县),六月雪(章丘),臭枝子(荣成),楸茶叶(海阳),河楸叶(临朐),香楸(五莲),山梧桐、香大姐、山把门子(威海);江苏:臭树,臭楸,追骨风,野臭蒲,臭梧;浙江:臭桐柴(淳安),苦骨皮(杭州),大叶山梔(天目山),臭梧桐花,白牡丹,红牡丹,梧桐花,白丁香(温州),臭树叶(洞头);福建:龙船花(泉州),百日红(永泰、古田);台湾:山猪枷,山猪茄;安徽:山麻粘;河南:山知麻;湖北:臭牡丹树(神农架);四川:大臭牡丹,泡花桐,白矮桐子(峨眉山)。

功效 嫩枝及叶:祛风湿,降血压。用于风湿痹痛,半身不遂,高血压病,偏头痛,疟疾,痢疾,痔疮,痈疽疥疮;果实或带宿萼的果实:祛风湿,平喘。用于气喘及风湿痛;花:用于头风,痢疾,疝气;根:用于疟疾,风湿痹痛,高血压,食积饱胀,小儿疳积,跌打损伤;根皮捣取的液汁凝块(土阿魏):宽筋活血,化痞消瘕。

#### 7263067

*Clerodendrum yunnanense* Hu ex Handl.-Mazz.

植物名 滇常山《名实图考》、《中国植志》

药材名 滇常山《汇编》

地方名 四川:矮桐子(米易),大臭牡丹;云南:臭茉莉、臭马缨(双柏),“羞死”(禄劝彝语),“木米泽泽”(丽江纳西语),臭牡丹《云南药录》。

功效 根:用于风湿性关节炎,腰腿痛,高血压;叶:外用于痔疮,脱肛;花:用于妇人红崩。

#### 7263068

*Duranta repens* L.

植物名 假连翘《中国植志》

药材名 假连翘《福建中草药》

地方名 福建:番仔刺(莆田、福州),篱笆树(福安、宁德),洋刺(福州),花墙刺(福清),桐青(泉州),假连翘;海南:莲莽;广西:白解(临桂)。

功效 叶、果:有小毒。散热透邪,行血祛瘀,止痛杀虫,消肿解毒。用于疟疾,跌打,胸痛,痈肿初起,脚底脓肿。

#### 7263069

*Gmelina asiatica* L.

植物名 亚洲石梓《中国植志》

文献名 亚洲苦梓《广西药录》,滇石梓《云南种录》

地方名 广西:假石榴(南宁),蛇头花;云南:“老可嫂”(普洱傣语)。

功效 根:止痛。用于风湿。

#### 7263070

*Gmelina chinensis* Benth.

植物名 石梓《中国植志》

药材名 石梓《汇编》

地方名 广东:笛箭、狗脚迹、鼻血箭(惠阳)。

功效 根:有小毒。活血祛瘀,去湿止痛。用于闭经,风湿。

#### 7263071

*Gmelina delavayana* P. Dop --- *G. montana* W. W. Smith

植物名 小叶石梓《中国植志》

文献名 西南石梓《汇编》

地方名 四川:矮子常山,木质山海螺。

功效 根:健胃消食,理气镇痛,化痞截疟。用于食欲不振,食积腹胀,胃气痛,久疟。

#### 7263072

*Lantana camara* L.

植物名 马缨丹《名实图考》、《中国植志》

药材名 马缨丹《广西本草选编》

文献名 五色梅、山大丹、大红秀球、珊瑚球《南越笔记》,龙船花《名实图考》,臭金凤、昏花、如意花《岭南采药录》,五色茉莉《上海植录》,广叶美人樱《中国植物图鉴》,如意花根《广西中药志》

地方名 七姊妹(福建、广东),七变花(华北、四川),[如意草](北京、福建、广东、广西),土红花(福建、广西),头晕花、臭花、五色花(广东、广西),臭草(福建、广东、广西);台湾:五龙兰;江西:野眼菜,烂草;福建:毛神花(闽南),五彩花(福州),红花刺(厦门、龙海),婆姐

花(漳州),红花仔刺(厦门),乞食婆花;湖南:天兰草;广东:五代同堂、五色梅花、臭花草(广州),刺苏、红花刺苏、臭番仔(潮阳),如意花头,猪屎花(潮安),臭花菊、臭花蕹(兴宁);广西:[臭牡丹],杀虫花,臭冷风,五雷箭,穿墙风,梅季花(贵县),三色花、对生花(德保),蛇牙风(苍梧),草英根(百色),[臭茉莉]、红花鸡屎木(平南),[双飞蝴蝶](昭平),江边哭(北海),小臭牡丹,臭花根,小臭茉莉,五雷丹。

功效 根:清热解毒,散结止痛。用于感冒高热,久热不退,颈淋巴结核,风湿骨痛,胃痛,跌打损伤;枝、叶:有小毒。祛风止痒,解毒消肿。外用于湿疹,皮炎,皮肤瘙痒,疖肿,跌打损伤;花:清凉解毒,活血止血。用于肺病吐血,伤暑头痛,腹痛吐泻,阴痒,湿疹,跌打损伤。

#### 7263073

*Lantana montevidensis* Briq.

植物名 蔓马缨丹《中国植志》

药材名 蔓马缨丹《广西《园林药录》》

功效 全株:清热祛湿。用于感冒风热,风湿痛;叶:外用于湿疹,皮肤搔痒。

#### 7263074

*Phyla nodiflora* (L.) Greene --- *Lippia nodiflora* (L.) Rich.

植物名 过江藤《中国植志》

药材名 过江藤《汇编》

文献名 石苋《图经》

地方名 苦舌草(海南、广西),鸭脚板、铜锤草(四川、云南);福建:蓬莱草、凤梨草、旺梨草(泉州),雷公锤草(莆田),王菜渍、凤梨渍(厦门、同安、诏安、东山、晋江、泉州),鬼及藤;台湾:鸭舌渍,定经草,鸭嘴蓖黄,鸭嘴英,蜆壳刺;湖南:野千年锤;广东:番梨仔草、铁扁担、步步钉、仲藤鲫鱼草、烧罗藤(潮阳),梨仔草、落地菠萝(普宁),番梨草、铁拳头(潮安),水由甲草;广西:薊根(上林),杨梅草(西林),水瓜子(天等),假菠萝(平南),鱼鳞根,满天星;四川:大二郎箭,虾子草,水黄芹(南川),过江龙;云南:“怕崩扁湿”(西双版纳傣语),水马齿苋(禄劝)。

功效 全草:清热解毒,散瘀消肿。用于痢疾,急性扁桃腺炎,颈淋巴结核,咳嗽咯血,跌打损伤。外用于痈疽疔毒,带状疱疹,慢性湿疹。

#### 7263075

*Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *sarmentosa* --- *Lippia nodiflora* Rich. var. *sarmentosa* Schou.

植物名 大二郎箭《中药大辞典》

药材名 大二郎箭《民药汇编》

文献名 岩垂草《牧野日图》

地方名 四川:虾子草、太子草、铜锤草(成都),过江龙、狮子草(南充),过江藤。

功效 全草:破瘀生新。用于白淋,小便出血,吐血,咳嗽,血淋,跌打损伤。

#### 7263076

*Premna confinis* Pei et S. L. Chen ex C. Y. Wu

植物名 滇桂豆腐柴《中国植志》

文献名 近邻腐婢《广西药录》, 近邻豆腐木《广西植志》

地方名 广西: 太阳木(那坡)。

功效 叶: 外用于关节肿

#### 7263077

*Premna corymbosa* (Burma. f.) Rotl. et Willd. --- *P. integrifolia* L.

植物名 伞序臭黄荆《中国植志》

药材名 臭豆腐木《广西植志》

地方名 广西: 臭娘子; 四川: {鬼见愁}(成都)。

功效 全株: 用于风湿痛。

#### 7263078

*Premna crassa* Hand.-Mazz. var. *yui* Moldenke

植物名 石山豆腐柴《中国植志》

地方名 云南: {黄皮树}(西畴)。

功效 全株: 用于风湿痛; 叶: 用于拔脓。

#### 7263079

*Premna fulva* Craib --- *P. longipila* Pei

植物名 黄毛豆腐柴《中国植志》

药材名 黄毛豆腐柴《云南植志》

文献名 长毛腐婢《广西药录》, 长毛豆腐木、黄毛豆腐木《广西植志》, 斑鸠占《汇编》

地方名 广西: 接筋藤(隆林), 土霸王, 穿云箭, 战骨(扶绥); 贵州: 神仙豆腐柴(铜仁、绥阳), 狐臭柴(贵阳)。

功效 根、叶: 清湿热, 解毒, 调经。用于风湿关节痛、水肿疮毒; 茎: 用于风湿骨痛, 肥大性脊椎炎, 肩周炎。

#### 7263080

*Premna henryana* (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu

植物名 蒙自豆腐柴《中国植志》

药材名 黄香根《云南文山》

地方名 云南: 筋骨散(红河)。

功效 根: 用于风湿筋骨痛。

#### 7263081

*Premna ligustroides* Hemsl.

植物名 臭黄荆《中国植志》

药材名 臭黄荆《汇编》

文献名 短柄腐婢、女贞叶腐婢《四川中药志》, 女贞腐婢《广西药录》, 女贞豆腐木《广西植志》

地方名 四川: 斑鸠站, 斑鸽子, 臭黄荆子, 臭豆腐干。

功效 根: 清热利湿, 解毒。用于痢疾, 疟疾, 风热头痛, 肾炎水肿, 痔疮, 脱肛; 叶: 解毒消肿。外用于疮疡肿毒, 对口疮; 种子: 消头面风。用于头痛。

#### 7263082

*Premna microphylla* Turcz.

植物名 豆腐柴《中国植志》

药材名 豆腐柴《中草药学》

文献名 腐婢、小豆华《别录》

地方名 六月冻(浙江、江西、福建、湖南), 豆腐木

(江西、广西), 观音柴(浙江、江西), 臭黄荆(浙江、江西、福建、四川), 凉粉叶(安徽、湖南); 江苏: 止血草; 浙江: 山麻樗(临安、遂昌、龙泉、丽水), 糯米糊(兰溪), 捏捏糊(绍兴), 救命柴(乐清), 山水景(平阳、洞头), 土黄芪; 安徽: 豆腐草, 观音草; 江西: 冷水耳(临川), 老鸦乌(德兴), 落水溶(太和), 旱禾树子; 福建: 臭茶(泰宁), 臭娘子, 土常山(松溪、政和), 乌炭子树(龙岩), 虱麻柴、虱麻樗(宁化), 布篱仔(古田), 野仙草, 软骨子樗、风梅樗(清流); 湖北: 二月杆, {臭牡丹}, {小青}, 小青树(咸宁); 湖南: 铁箍散、公水莽藤(常德), 黑毛列, 臭常山、妹子菜(长沙), 臭朕胆(零陵), 追风散(来阳), 墨子树叶, 大寿砂; 广东: 山膏药、山凉水、火炭树(惠阳); 广西: 雀儿子木, {满山香}, 小退赤, 知时水, 旱禾柴, 小白解, 凉粉木, 臭辣树, 鸡屎泡, 墨子稔(宜山); 四川: 一年青; 其他: 糊拌子, 滇臭木, 臭梁子, 狐臭树。

功效 茎、叶: 清热, 消肿。用于疟疾、泻痢, 疔, 肿毒, 创伤出血; 根: 清热解毒。用于疟疾, 跌打损伤, 风火牙痛, 毒蛇咬伤, 烧伤。

#### 7263083

*Premna puberula* Pamp.

植物名 狐臭柴《中国植志》

药材名 狐臭柴(云南)

文献名 长柄臭黄荆、长柄豆腐柴《高植图鉴》, 微毛豆腐木《广西植志》, 斑鸠叶豆腐、小青树《中草药资料》

地方名 斑鸠占(广西、贵州); 广西: 蒙麻(那坡), 斑鸠叶(乐业), 黄花木荆(凌云), 跌打王(横县); 四川: 水白腊(屏山); 贵州: 神仙豆腐柴, 臭树(毕节), 臭黄荆。

功效 根、叶: 清湿热, 调经解毒。用于月经不调(经期推后), 风湿关节炎, 水肿, 无名肿毒。

#### 7263084

*Premna puberula* Pamp. var. *bodinieri* (Levl.) C. Y. Wu et S. Y. Pao

植物名 毛狐臭柴《中国植志》

药材名 毛狐臭柴《广西药录》

地方名 广西: 臭叶草(天峨)。

功效 全株: 用于咳嗽, 水肿, 功能性子宫出血, 月经不调; 叶: 外用于角膜白斑。

#### 7263085

*Premna sonyiensis* Pei

植物名 塘虱角《中国植志》

药材名 塘虱角《广西药录》

文献名 信宜腐婢《广西药录》, 信宜豆腐木《广西植志》

地方名 广东: 大蛇药, 牛尾乌; 广西: 黑喉草(北流)。

功效 全株: 清热解毒。用于热症。

#### 7263086

*Premna szemaensis* Pei

植物名 思茅豆腐柴《中国植志》

文献名 思茅腐婢《云南药录》, 接骨树《高植图鉴》

地方名 云南: “梅芍秒”(傣名), 绿泽兰, 类梧桐, 蚂蚁鼓堆树、戳皮树、大洋兰(思茅)。

**功效** 根皮或茎皮：舒筋活络，接骨镇痛，止血生肌。用于风湿骨痛，跌打损伤，骨折，外伤出血。

#### 7263087

*Premna urticifolia* Rehd.

**植物名** 麻叶豆腐柴《中国植志》

**药材名** 筋骨散《汇编》

**文献名** 荨麻叶臭黄荆《高植图鉴》，荨麻叶腐婢《红河中草药》

**功效** 根：祛风湿，强筋骨，止痛。用于脉管炎，风湿性关节炎，筋骨疼痛，腰痛，胃痛，吐血。

#### 7263088

*Pygmaeopremna herbacea* (Roxb.) Moldenke --- *Premna herbacea* Roxb.

**植物名** 千解草《中国植志》

**药材名** 千解草《云南临沧》

**文献名** 小腐婢《广西药录》，草臭黄荆《海南植志》

**地方名** 广西：小豆腐木，地拈（宁明），土巴戟（扶绥）；云南：细三对节（景谷），细八棱马、小八棱马（双江），小常山（耿马），灰树叶、“泡拍”（元江哈尼语）。

**功效** 根：清热凉血，消肿散结。用于血淋，血尿，疮疡红肿，截疟，解各种药物中毒。

#### 7263089

*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl - *Verbenna jamaicensis* L.

**植物名** 假马鞭《中国植志》

**药材名** 玉龙鞭《汇编》

**文献名** 假败酱《海南植志》

**地方名** 蓝花蛇尾草（福建、广东）；广东：大种马鞭草（宝安），大种铁马鞭（惠阳），狮鞭草、蓝花狮鞭草（潮安），倒扣藤（湛江），万灵草、万能草、山白菜、白菜（潮阳），蛇尾草（汕头），马鞭草（粤西），牛马鞭（广州），倒困蛇；海南：铁索草（海口），马鞭（乐东），猫尾草（琼中），铁马鞭，牛鞭草，大蓝草（儋县）；广西：玉郎鞭（扶绥）。

**功效** 全草或根：清热解毒，利水通淋。用于尿路感染，尿路结石，风湿筋骨痛，喉炎，急性结膜炎。外用治痈疽肿毒。

#### 7263090

*Tectona grandis* L. f.

**植物名** 柚木《中国植志》

**药材名** 柚木《广西药录》

**文献名** 麻栗《树分》

**地方名** 云南：“埋桑”（西双版纳傣语），脂树，紫柚木，紫油木；其他：乌楠。

**功效** 茎、叶：用于恶心，呕吐，过敏性皮疹；花、种子：利尿。

#### 7263091

*Verbena hybrida* Voss

**植物名** 美女樱《中国植志》

**文献名** 铺地马鞭草《广西《园林药录》》

**地方名** 铺地锦《广东、广西》。

**功效** 全草：清热，凉血，止血。用于咽喉炎，乳腺

炎

#### 7263092

*Verbena officinalis* L.

**植物名** 马鞭草《中国植志》

**药材名** 马鞭草《别录》，《药典》

**文献名** 衡州马鞭草《大观本草》，马鞭梢《滇南本草》，风颈草、龙牙草《纲目》，紫顶龙牙《纲目拾遗》，铁马鞭《草木便方》，雁须草《中国药植志》，马折《新纲》

**地方名** 铁扫帚（浙江、江西、福建），铁筵帚（浙江、江西），顺律草（福建、广东、广西），狗咬草（华南、福建），狗牙草（河北、海南），蜻蜓饭（浙江、福建、广东），白马鞭（广西、云南），疟疾草（江苏、安徽），顺拐草、粘身蓝被（广东、广西），土荆芥、野荆芥（浙江、福建），透骨草（江苏、安徽），铁钩竿（福建、台湾）；北京：狗咬药；河北：狗鞭子；江苏：兔子草，兔子丝，蛤蟆棵（连云港、铜山）；上海：红藤草；浙江：山荆芥（淳安、云和）；安徽：兔骨草，官司草，大曲草；江西：狗尾巴（赣州），五枝香（丰城），铁扫把（景德镇），刀口草，酒药草，（指积草），曲草（德兴），旱莲草，酒饼草，马咬草（会昌）；福建：田鸟草（南平），铁扫手，犬咬草（清流），铁骨柳（宁化），耳把草，亲家头、蜻蜓头（周宁），亲家叶（寿宁），饿虱腿，茶米草，刮鼻草，蜚草，犬脚草，草蜢仆头；湖南：退血草，铁马莲，翁木柄（通道），铁马线（凤凰），散血草（黔阳）；广东：疟马鞭，马板草，鸭脚艾（揭阳），上马鞭（广州），牛大毒草，九节鞭（永嘉），疟子鞭，风须草；广西：鹤膝风，苦练草，蜻蜓草（南宁），燕子尾（忻城），蓝花艾（凭祥），顺勒草（田东），燕尾草（西林），“过熟烟”（百色壮语），顺刺草（田阳）；四川：小铁马鞭（南川），七星兰，龙牙凤颈，大铁马鞭梢；云南：“牙顶燕”（西双版纳傣名），大仙钨草（大理），银顶龙芽草（红河），马鞭痧、六杆草（玉溪），“阿洛俄纪”（红河哈尼语），救苦神灵草，“磨卖施”（楚雄彝名）。

**功效** 地上部分：活血散瘀，截疟，解毒，利水消肿。用于瘀血积聚，经闭痛经，疟疾，喉痹，痈肿，水肿，热淋。

#### 7263093

*Vitex agnus-castus* L.

**植物名** 穗花牡荊《中国植志》

**功效** 全草：实验表明有抑制大鼠情期的作用，增大剂量可使之不育。

#### 7263094

*Vitex canescens* Kurz

**植物名** 灰毛牡荊《中国植志》

**文献名** 灰白黄荆《汇编》，灰布荆《云南植志》，灰牡荊《海南植志》

**地方名** 云南：毛椿（河口），薄姜木（河口、蒙自）。

**功效** 果实：祛风，除痰，行气，止痛；叶：解表清热，利湿解毒；枝：祛风解表，消肿解毒；根：解表，祛风湿，理气止痛，截疟，驱风。

#### 7263095

*Vitex negundo* L. --- *V. arborea* Desf.

**植物名** 黄荆《中国植志》

药材名 黄荆《图经》、《汇编》

文献名 臭小荆实、荆子《救荒本草》，山荆、玉环志，山黄荆、黄荆条《纲目拾遗》，布荆子《本草求真》，蚊枝叶，五指柑《生草药性备要》，黄荆根《草木便方》，黄荆树《中国药植志》，白背叶《岭南采药录》

地方名 土常山(江苏、湖北、湖南)，荆条(东北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、河南)，埔姜(福建、台湾、广东、广西)，黄荆柴(江西、湖南、广东、广西)，茴香(福建、云南)，布荆(广东、广西、四川)，黄荆木(河南、广西)，牡荆(广东、四川)，五指风(广西、云南)，蚊子柴(广西、贵州)；陕西：黄荆子；甘肃：荆梢；江苏：黄金条，葛荆条，看山老(邳县)，金条条，荆条棵(邳县、连云港)；浙江：黄金子；福建：埔姜养，埔江条；台湾：埔姜根，薄姜仔，不惊茶，不惊经；河南：黑荆条，吴荆；湖北：略荆，见敢消，黄金条子、金棒木(神农架)；湖南：姜荆叶，姜子叶，荆巴柴，薺草(古丈)，马藤(麻阳)，荆柴树(永兴)，黄荆刺；广东：埔姜叶，布荆叶，黄荆子叶，蚊蜚叶(广州)，山埔羌(潮汕)，五叶埔羌(汕头、普宁)，五爪埔羌(海丰)，土蔓荆子(潮安)，五叶荆、荆子柴、荆木柴(阳春)；海南：白布惊树，五指枫，子荆木，五指布荆，白背荆，五指荆，血见愁，紫鸟(黎族)，鸡脚风(苗族)；广西：黄京、蚊子根(南京)，黄京子(桂林)，山大锯(鹿寨)，五爪风(北流)，心惊木(富川)，柴荆草，圣荆木，蚊烟柴(防城)，蚊仔木，土柴胡，紫荆，柴荆木；云南：铁扫把(富宁)，绿黄金条(禄劝)，家麻(瑶族)；其他：蚊孳草。

功效 叶及挥发油：祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎；果：止咳平喘，理气止痛；茎汁：除风热，化痰涎，通经络，行气血；根：解表，祛风湿，理气止痛，截疟，驱虫。

#### 7263096

*Vitex negundo* L. var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. --- *V. cannabifolia* Sieb. et Zucc. --- *V. negundo* L. f. *intermedia* Pei

植物名 牡荆《别录》、《中国植志》

药材名 牡荆叶、牡荆油《药典》

文献名 小荆实《本经》，楚《诗经》，荆《广雅》，牡荆实、荆叶《别录》，牡荆沥《本草拾遗》，梦子《石药尔雅》，小荆《纲目》，中型牡荆《秦岭植志》，中间黄荆《云南种录》

地方名 黄荆条(安徽、湖北、广西、四川)，黄荆子(江苏、浙江)，[土常山](福建、湖南)，五指柑(福建、广东)；山东：荆子(淄博、吕滩)，荆条(青岛、烟台、济南)，荆棵(临沂)，黄荆；江苏：牡荆子、黄金子(苏州)，荆条果(云台山)，荆条棵(云台山、连云港)，黄金条(宜兴)；浙江：黄荆柴，黄荆树，黄金树，黄金柴花，甜茶，龙钟；安徽：牡荆条；江西：七叶黄荆，黄荆棒(临川)，荆柴(吉安)，文尚柴(景德镇)；福建：埔香，埔香，午时草(福州、永安)，蚊香草(武平、清流、福州、宁化)，洋公柴(三明、明溪)，白步香，埔香柴(福安、宁德、霞浦)，[土木香]，黄荆樵，裤脚樵，蛇惊樵、洋姜、箭姜、皮香埔荆、支荆、步香、步樟、步昌、步樟柴(福安)，小土荆芥，蒲姜，杨姜

柴；河南：白荆茶；湖北：黄荆棵子(神农架)；湖南：奶疳(沅江)，[常山](会同)，野牛藤(汝桂)；广东：布荆、假青麻、蚊蜚叶(阳春)；广西：小黄荆柴，七叶荆条，蚊子柴，山京木，沙京木。

功效 鲜叶及挥发油：解毒祛痰，止咳平喘。用于咳嗽，慢性支气管炎；根、茎：清热止咳，化痰截疟；茎汁(牡荆沥)：除风热，化痰涎，通经络，行气血；果：止咳平喘，理气止痛。

#### 7263097

*Vitex negundo* L. var. *heterophylla* (Franch.) Rehd. --- *V. chinensis* Mill. --- *V. negundo* L. var. *incisa* (Lamk.) C. B. Clarke

植物名 荆条《中国植志》

药材名 黄荆子(山东、河北、北京、山西、江苏)

文献名 黄荆条《中国药植志》，刻叶黄荆《汇编》

地方名 荆棵(河北、山东)，荆梢子、黑谷子(辽宁、河北、陕西)，七枝箭(河北、陕西)；北京：黄荆(京郊)；甘肃：荆梢(文县)；山东：荆子(昌乐、昌潍)，山荆子(益都)，荆柴(泰山)；江苏：黄金条(宜兴)，荆条棵(云台山)；其他：白荆子。

功效 叶及挥发油：祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎；果：止咳平喘，理气止痛；茎汁：除风热，化痰涎，通经络，行气血；根：解表，祛风湿，理气止痛，截疟，驱虫。

#### 7263098

*Vitex negundo* L. f. *laxipaniculata* Pei

植物名 疏序黄荆《中国植志》

功效 叶：祛痰，止咳，平喘；果：止咳平喘，理气止痛。

#### 7263099

*Vitex negundo* L. var. *microphylla* Hand.-Mazz. --- *V. microphylla* (Hand.-Mazz.) Pei ex C. Y. Wu --- *Vitex canescens* auct. non Kurz

植物名 小叶荆《中国植志》

药材名 小叶荆《云南植志》

地方名 西藏：“拔卡卜尔”(藏语)，黄荆子。

功效 果：用于寒咳哮喘，呃逆胃病；根：用于外感风寒，疟疾，蛲虫等；枝叶：用于风寒，泄泻，中暑。外用：于皮肤瘙痒。

备考 《西藏中草药》将本种学名误订为 *Vitex canescens* Kurz

#### 7263100

*Vitex peduncularis* Wall.

植物名 长序荆《中国植志》

功效 叶及果：用于眼病。

#### 7263101

*Vitex quinata* (Lour.) Will.

植物名 山牡荆《中国植志》

药材名 山牡荆《汇编》

文献名 布惊、薄姜木《树分》，山蚊荆、布荆《汇编》，五叶牡荆《海南植志》

地方名 埔姜(华南)；台湾：埔姜根，山埔姜，麻仔，

乌甜菜, 乌甜, 乌甜仔, 布姜, 蒲荆; 广东: 山蚊惊、山布惊、鸭屎青(惠阳); 海南: 莺歌、莺歌公; 广西: 五指风(陆川)、山紫荆(苍梧、北流)、善藤(北流)、五指柑(平南、桂平), 五一风(博白), 沙荆木(平南); 云南: “埋借些”(西双版纳傣语), “梅哈忍”(傣名)。

功效 根或树干心材: 止咳定喘, 镇静退热。用于急慢性气管炎, 喘咳, 气促, 小儿发热烦躁不安; 叶: 用于小儿疳积。

## 7263102

*Vitex quinata* (Lour.) Will. var. *puberula* (Lam.) Moldenke

植物名 微毛布惊(中国植志)

药材名 微毛布惊(云南植志)

地方名 云南: 走胆药(思茅), “梅哈忍”(傣语)。

功效 根及树干髓部: 止咳, 定喘, 镇静, 退热。

## 7263103

*Vitex sampsoni* Hance

植物名 广东杜荆(中国植志)

文献名 小叶布荆(广西植录)

功效 叶及挥发油: 祛痰, 止咳, 平喘; 果: 止咳平喘, 理气止痛

## 7263104

*Vitex trifolia* L.

植物名 三叶蔓荆(云南植志)

药材名 蔓荆子(本草经集注)、《药典》

文献名 蔓荆(中国植志), 白背木耳(岭南采药录), 小荆、大荆子、僧法实、陆续丸(新纲)

地方名 白背杨、水稔子(广东、广西、云南); 福建: 番仔埔姜; 广东: 白布荆(增城), 白木耳(新会), 苏白背(茂名), 倒埋树(罗浮山), 万京子、京子(广州), 倒插树、圆叶布惊(惠阳), 白背布惊(新丰、佛冈), 白布惊(东莞), 山布惊(五华、惠阳); 海南: 白叶(海口), 海风柳; 广西: 白粘木、白窍木(玉林), 单边救主(桂平), 白背草, 白背药(十万大山); 云南: “官底”(西双版纳傣语), 云生麻(临沧), “碗底”(傣语), “拍闷嘿”(景洪傣语); 其他: 小刀豆藤, 白背风, 万金。

功效 果实: 疏风散热, 清利头目。用于风热感冒头痛, 齿龈肿痛, 目赤多泪, 目暗不明, 头晕目眩。

## 7263105

*Vitex trifolia* L. var. *simplicifolia* Cham. --- *V. rotundifolia* L. f.

植物名 单叶蔓荆(中国植志)

药材名 蔓荆子(本草经集注)、《药典》

文献名 蔓荆实(本经), 荆子(本草经集注), 白背叶(岭南采药录)

地方名 蚊戟叶(华南、广东), 万京子(台湾、广东), 京子(江苏、广东); 山东: 荆条子(莱阳、威海), 沙荆(蓬莱), 荆条、芥条、沙荆子、灰枣(烟台); 江苏: 蔓金子, 万金子, 蔓青子; 浙江: 万荆子; 福建: 晕草(罗源); 台湾: 海埔姜, 白埔姜, 山申藤, 埔荆; 广东: 白背木耳(广州), 白布荆(增城、东莞、罗定、乐昌), 白木耳(新会、台山), 苏白背(茂名), 倒埋树(罗浮山); 海南: 白叶; 广西: 白

木耳叶, 白背药(十万大山); 其他: 白背杨, 水稔子, 刺湿梭, 僧法实。

功效 果实: 疏风散热, 清利头目。用于风热感冒头痛, 齿龈肿痛, 目赤多泪, 目暗不明, 头晕目眩。

备考 据考证, 本草所载之“蔓荆子”之正品应为本种。

## 7263106

*Vitex trifolia* L. var. *subtriseeta* (O. Kuntze) Moldenke

植物名 异叶蔓荆(中国植志)

地方名 广西: 白背杨(北流), 白窍木(玉林); 云南: 蔓荆子(临沧)

功效 成熟果实: 疏散风热, 清利头目; 叶: 外用跌打损伤。

## 7263a 毒蛆草科 Phrymataceae

## 7263a01

*Phryma leptostachya* L. var. *asiatica* Hara P. *leptostachya* L. var. *oblongifolia* (Koidz.) Honda

植物名 毒蛆草(中国土农药志)

药材名 毒蛆草(山西)、《品种论述》

文献名 透骨草(纲目拾遗)

地方名 一打光(安徽、湖南、贵州、云南), 粘人裙(江苏、四川), 蝇毒草(吉林、河南); 黑龙江: 龙须草; 北京: 麻荆芥; 山西: 药蛆草; 陕西: 一马光; 山东: 接生草; 江苏: 蜈蚣草、疥疮根(连云港); 浙江: 剪草(临安、丽水), 山箭草(乐清), 疥草; 安徽: [倒扣草]; 广西: 野倒钩草(田林); 四川: 老婆子针线、接骨草、一摸光草(峨眉); 贵州: 一抹光, (小青); 云南: 大一打光、小蛆药、小肥猪(曲靖), 仙人一把遮(中甸), 神砂一把抓, 爪地龙, “紫柏”(楚雄彝名), “诺突”、“鸡租”(峨山彝名)。

功效 全草: 杀灭蚊蝇幼虫。

备考 本品在植物文献中虽有透骨草之名, 但中药并不作透骨草用, 更非正品透骨草, 因此以该科名为“透骨草科”, 实属欠妥, 故改称为“毒蛆草科”(Phrymataceae)。

## 7263a02

*Phryma leptostachya* L. f. *melanostachya* (Kitag.) Kitag. --- *P. leptostachya* L. var. *melanostachya* Kitag.

植物名 黑子毒蛆草(拟)

文献名 黑子透骨草(东北药用植物)

功效 全草、叶或根: 杀虫。外用于黄水疮, 疥疮, 虫疮, 湿疹, 疮毒感染发热。

## 7264 唇形科 Labiatae

## 7264001

*Acrocephalus indicus* (Burm. f.) O. Ktze.

植物名 尖头花(中国植志)

药材名 水薄荷(元江哈尼族药)

地方名 贵州: 鱼香草; 云南: “啊疋啊之”(元江哈尼语), 水薄荷(元江)。

功效 全草: 疏风散寒, 利水消肿。用于风寒感冒, 营养不良性水肿, 口腔糜烂。



## 7264002

*Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.) O. Ktze. ---  
*Lophanthus rugosus* Fisch. et Mey.

植物名 藿香《中国植志》

药材名 藿香《汇编》

文献名 七藿香《滇南本草》,排草香、霍去病、玲珑霍去病《新纲》,排香草《江苏植录》,排草《和汉药标本目录》

地方名 野霍香(山东、江苏、浙江、云南),〔薄荷〕(辽宁、江西、广西),合香(陕西、湖北),〔野薄荷〕(江苏、浙江),苏藿香(四川、贵州、浙江);吉林:猫把、八藿(饶河);辽宁:猫把蒿,把蒿,猫巴虎,猫尾巴香,山猫巴(本溪、北镇),仁丹草,野苏子(庄河),拉拉香(新宾);河北:山茴香、山灰香、红花小茴香、(家茴香)(内邱),〔香薷〕(蔚县),香荆芥花;山西:银纳(太行山);陕西:苍告(丹凤);山东:山藿香(蒙山);江苏:藿香片(苏州),大藿香、大火香(南通);浙江:大叶薄荷(临安、丽水、龙泉、云和),山薄荷(临安);江西:白荷(虔南);台湾:节节红,尖尾风;湖北:小薄荷(均县),鱼子苏(平江);湖南:杏仁花;广西:青茎薄荷(凌云);四川:川藿香,叶藿香,大薄荷,银马鞭、鸡苏(重庆),白薄荷(峨眉),鱼香(米易),〔紫苏草〕(康定),水麻叶(茂汶)。

功效 地上部分:祛暑解表,化湿和胃。用于暑湿感冒,胸闷,腹痛吐泻。

## 7264003

*Agastache rugosa* (Fisch. & Mey.) O. Kuntze f. *hypoleuca* (Maxim.) Hara --- *Lophanthus rugosus* Fisch. & Mey. var. *hypoleucus* Maxim. ex Herder -- *Agastache rugosa* (Fisch. & Mey.) O. Kuntze var. *hypoleuca* (Maxim.) Kudo

植物名 毛叶藿香《东北药用植物》

功效 全草:芳香健胃,清凉解暑,化湿,和胃止呕。用于中暑发热,外感风寒,寒热头痛,胸闷腹胀,恶心,呕吐,泄泻,脾胃气滞,食欲不振,脘腹胀痛,疟疾,痢疾,口臭等。外用干手、足癣。

## 7264004

*Ajuga bracteosa* Wall. ex Benth.

植物名 九味一枝蒿《中国植志》

药材名 大苞筋骨草《品种论述》

文献名 小筋骨草《云南中草药》

地方名 台湾:散血草,筋骨草;云南:大叶抓地虎(玉溪),“赛西林”(曲靖、嵩明、杨林),〔夏枯草〕(昆明),〔地胆草〕(大理),痢止蒿(丽江)。

功效 全草:清热解毒,止痛。用于各种炎症,小儿高热。

## 7264005

*Ajuga campylantha* Diels

植物名 弯花筋骨草《中国植志》

地方名 云南:止痢蒿(丽江)。

功效 全草:用于痢疾。

## 7264006

*Ajuga ciliata* Bunge

植物名 筋骨草《中国植志》

药材名 缘毛筋骨草《汇编》

文献名 毛缘筋骨草《中药大辞典》

地方名 山东:透筋草。

功效 全草:清热,凉血,消肿。用于肺热咯血、扁桃体炎、咽炎、喉炎。外用于跌打损伤

## 7264007

*Ajuga decumbens* Thunb.

植物名 金疮小草《中国植志》

药材名 金疮小草《本草拾遗》、《汇编》

文献名 白毛夏枯草、雪里青、土犀角《纲目拾遗》,筋骨草、见血青、白头翁、石灰菜、破血丹《名实图考》,退血草、散血草《分类草药性》,〔血见愁〕、猪屎草、云燕蜜、鸢尾蜜、四斗斗草、〔夏枯草〕《新纲》,伏地筋骨草《江苏植录》

地方名 青鱼胆、青鱼胆草(广西、湖南),苦草(浙江、安徽、江西、福建),苦地胆(湖南、广西),四季春草(福建、广西),金创小草(安徽、江西);江苏:白夏枯草;浙江:白毛苦菜(温州、瑞安、永嘉),白头枯(乐清、云和),白毛冬青(吴兴),天芥菜(温州、平阳、乐清、永嘉),苦地胆、苦令丁(瑞安);安徽:山毛小,脚筋草,疔疮草,白毛菜;江西:野元参(丰城),野生地(吉水);福建:散血丹,白喉草,白调羹(霞浦),白毛串(福州),白花苦草(福安),白袍将,小将军,七层宝塔、土龙胆草(南平),金疮草,四时春(莆田),大叶刀,嫩草,大嘴花(安溪),和胶毒草(福安、周宁、闽东),四季春(莆田、漳州、泉州、德化、龙溪),喉草(大田),发癰草(平潭),猪胆草(龙岩、三明、永安),海胆菜(三明),鸭蹄瘤(诏安),石蟹草(仙游),苦根(宁化),苦胆(明溪);台湾:〔蛇含草〕;河南:猪头癞花;湖南:雪里开花,青石藤,明花,一盏灯,野鹿衔草,天青地红,叶下红(溆浦),爬爬草(吉首);广东:通骨消;广西:透骨消,苦的母,苦胆草,蜜蜂草(桂林),白毛草,刀欣草,地娘娘,下草;四川:地龙胆(峨眉山),活血草,西筒草(成都);贵州:乃东草,水红藤,腰痛草,毛盖绿;云南:九味草,金夏枯,“屋波诺”(楚雄彝名),白花夏枯草。

功效 全草:清热解毒,止咳祛痰,养筋和血。用于急慢性支气管炎,咽炎,扁桃体炎,关节疼痛。外用于外伤出血。

## 7264008

*Ajuga forrestii* Diels

植物名 痢止蒿《中国植志》

药材名 痢止蒿《云南中草药》

文献名 痢止草《汇编》

地方名 云南:白龙须、止痢蒿(丽江),无名草(大理),散瘀草,散血草(昆明)。

功效 全草或根:清热消炎,利尿通淋,散瘀镇痛。用于痢疾,肾炎,咽喉肿痛,肺热咳嗽,跌打损伤,脉管炎。

## 7264009

*Ajuga lupulina* Maxim.

植物名 白苞筋骨草《中国植志》

药材名 白苞筋骨草《汇编》

文献名 忽布筋骨草《植分学报》, 轮花筋骨草《高原中草》, 白毛夏枯草《西藏中草》

地方名 “生斗尔尔摸”(四川、西藏藏语); 山西: 甜格缩缩草(宁武); 甘肃: 黄脉筋骨草; 青海: “冈尔尔”(藏名)。

功效 全草: 清热解毒, 活血消肿。用于癆伤咳嗽, 吐血气痛, 跌损瘀凝, 面神经麻痹, 梅毒炭疽。

#### 7264010

*Ajuga lupulina* Maxim. var. *major* Diels

植物名 齿苞筋骨草《云南植志》

药材名 齿苞筋骨草《新华本草纲要》

地方名 云南: “森地尔摸”(藏语)。

功效 全草: 用于急性热病, 流脑。

#### 7264011

*Ajuga lupulina* Maxim. f. *humilis* Sun ex C. H. Hu

植物名 矮小白苞筋骨草《迪庆藏药》

药材名 齿苞筋骨草《迪庆藏药》

功效 全草: 清热解毒, 解痉。用于热性病, 癫痫, 肺炎, 炭疽, 疔疮痢道。

#### 7264012

*Ajuga macrosperma* Wall. ex Benth.

植物名 大籽筋骨草《中国植志》

文献名 筋骨草《西双版纳傣药志》

地方名 贵州: 散血草(瓮安); 云南: “牙音龙”(西双版纳傣语), 拔毒草(傣语意译)。

功效 全草: 散血。

#### 7264013

*Ajuga multiflora* Bunge

植物名 多花筋骨草《中国植志》

药材名 多花筋骨草《江西草药》

文献名 花夏枯草《中国植志》。

功效 全草: 清热, 凉血, 消肿。

#### 7264014

*Ajuga nipponensis* Makino --- *Ajuga genevensis* auct. non L. --- *Ajuga decumbens* auct. non Thunb.

植物名 紫背金盘《中国植志》

药材名 紫背金盘《名实图考》、《汇编》

文献名 散瘀草《汇编》, 九味草《云南中草药》

地方名 [白头翁]、白头枯、苦草(浙江、江西), 散血丹(福建、四川、云南), 白毛夏枯草(江苏、浙江、江西、云南), 红夏枯草(江西、湖南), 石灰菜(江西、四川), 苦地胆(广东、广西), 筋骨草(江西、西藏); 江西: 见血膏; 福建: 白毛串; 四川: 地龙胆, [龙胆草](成都); 云南: 白毛筋骨草, 大叶抓地虎, 散血草, [夏枯草](昆明), 退血草(昭通)。

功效 全草: 消炎, 凉血, 接骨。用于支气管炎, 扁桃腺炎, 肺热咳血, 疮疖, 乳腺炎, 脱肛, 痔疮, 肿瘤, 外伤出血, 烧烫伤, 骨折。

备考 《云南植志》(1977)称: 本种常被误订为 *A. decumbens* Thunb. (金疮小草)及欧洲产的 *A. genevensis* L.。本种以植株直立, 茎基部通常无基生

叶, 叶为广椭圆形, 顶生花序较长, 苞片大等特征与上述两种相区别。

#### 7264015

*Ajuga nipponensis* Makino var. *pallidescens* (Maxim.) C. Y. Wu et C. Chen

植物名 矮紫背金盘《云南植志》

功效 全草: 镇痛散血。用于各种血症, 炎症。

#### 7264016

*Ajuga pentantha* Hand. - Mazz.

植物名 散瘀草《中国植志》

药材名 山苦草(云南)、《汇编》

地方名 云南: 苦草、胆草(曲靖), 散血草(曲靖、昭通)。

功效 全草: 清热平肝, 消炎解毒。用于慢性肝炎, 尿路感染, 口腔炎。外用于疮疡肿毒, 黄水疮, 骨折。

#### 7264017

*Amethystea caerulea* L.

植物名 水棘针《救荒本草》、《中国植志》

文献名 山油子《救荒本草》

地方名 [土荆芥](四川、云南); 辽宁: 细叶山紫苏(抚顺)。

功效 全草、花穗、果穗: 发表散风。

#### 7264018

*Anisochilus carnosus* (L.) Wall.

植物名 排草香《桂海虞衡志》、《中国植志》

药材名 排草香《纲目》

文献名 肉质异唇花《广西药录》

地方名 广东: 耙草(广州); 广西: 排草(南宁)。

功效 根、茎: 利尿, 辟臭。用于水肿, 浮肿。

#### 7264019

*Betonica officinalis* L. --- *Stachys officinalis* (L.) Trev.

植物名 药水苏《中国植志》

药材名 药水苏《新华本草纲要》

功效 根茎、根: 供药用。

#### 7264020

*Bostrychanthura deflexa* Benth.

植物名 毛药花《中国植志》

文献名 环药花《中药通报》, 垂花铃子香《植分学报》

地方名 湖南: 斑麻(蓝山县瑶名)。

功效 茎、叶: 发表。用于感冒。

#### 7264021

*Ceratanthus calcaratus* (Hemsl.) G. Taylor

植物名 角花《中国植志》

文献名 癩子药《元江哈尼族药》

地方名 云南: “给那雌”(元江哈尼语)。

功效 全草: 化痰散结, 驱风止痒。用于原因不明的肝脾肿大, 疥癣, 皮肤瘙痒。

#### 7264022

*Chelonopsis chekiangensis* C. Y. Wu

植物名 浙江铃子香《中国植志》

药材名 浙江铃子香《汇编》

地方名 浙江:铃子三七(临安)。

功效 全草、根:散风寒 通经络 用于外感风寒,咳嗽,食积,筋骨酸痛。

#### 7264023

*Chelonopsis soulieri* (Bonati) Merr.

植物名 轮叶铃子香《中国植志》

地方名 青海:“兴地嘎保”(藏名)

功效 花、叶:消炎。用于角膜炎。

#### 7264024

*Clerodendranthus spicatus* (Thunb.) C. Y. Wu ex H. W. Li --- *Clerodendron spicatus* Thunb. --- *Orthosiphon aristatus* (Blume) Miq. --- *Orthosiphon spirale* (Lour.) Merr.

植物名 肾茶《中国植志》

药材名 猫须草《汇编》

文献名 肾茶《高植图鉴》

地方名 台湾:化石草;广东:猫须公;云南:“牙努砂”(西双版纳傣语)。

功效 茎、叶:清热祛湿,排石利尿。用于急、慢性肾炎,膀胱炎,尿路结石,胆结石,风湿性关节炎。

#### 7264025

*Clinopodium chinense* (Benth.) O. Kuntze var. *grandiflora* (Maxim.) Kitag. --- *Calamintha chinensis* Benth. var. *grandiflora* Maxim. --- *Calamintha clinopodium* Benth. var. *urticifolia* Hance --- *Calamintha coreana* Leveille --- *Calamintha urticifolia* (Hance) Haud. -Mazz. --- *Clinopodium chinense* (Benth.) O. Kuntze ssp. *grandiflorum* (Maxim.) Hara --- *C. urticifolium* (Hance) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li

植物名 大花风轮菜《东北药用植物》

地方名 黑龙江:风车草(伊春);河北:〔紫苏〕(龙关)。

功效 全草:疏风解表,清热解毒,抗菌消炎,止痛,活血止血。用于感冒,中暑,急性胆囊炎,肠炎,腮腺炎,乳腺炎,痢疾,肝炎,急性结膜炎,疔疮肿毒,过敏性皮炎,皮肤瘙痒,妇科各种出血,血尿,外伤出血等。

#### 7264026

*Clinopodium chinense* (Benth.) O. Ktze. --- *Calamintha chinensis* Benth.

植物名 风轮菜《救荒本草》、《中国植志》

药材名 断血流《药典》

文献名 华风轮《广西药录》

地方名 九层塔(广东、广西),〔野薄荷〕(福建、广东),虾姑草(华南);浙江:落地梅花(长兴),九塔草,小叶苏(临安),红九塔花(东阳),野青草(温州);江西:山薄荷(寻鄚);湖南:大扫毒王、青风草(衡山);广东:熊胆草,〔龙胆草〕〔苦地胆〕(汕头),山血丹(惠阳),鲫鱼胆草,苦草;广西:野凉粉草(桂林),苦刀草(阳朔),华风轮菜,夜偏头草,野鱼腥草,“美发宁”(罗城仫佬语),“黑地兰”(龙州壮语);贵州:蜂窝草(湄潭),〔节节草〕(清镇)。

功效 地上部分:止血 用于崩漏,子宫肌瘤出血,尿血,鼻衄,牙龈出血,创伤出血。

#### 7264027

*Clinopodium confine* (Hance) O. Ktze. --- *Calamintha confinis* Hance

植物名 邻近风轮菜《中国植志》

药材名 光风轮菜《汇编》

文献名 剪刀草《饮片新参》,塔花《植物学大辞典》

地方名 〔野薄荷〕(江西、福建),光风轮(江苏、江西、湖南);江苏:玉如意;浙江:节节花,野香草,野菜苳,鲤鱼草,四季青,四季秋,泛红草,铁箍散,红董草,叶底红,野仙草;江西:野仙人草,小叶仙人草,苦草,瘦风轮菜;福建:山薄荷,土薄荷;湖南:迴文草(岳麓山);四川:四季草(筠连);贵州:灯笼草,节节草,蜂窝草。

功效 全草:清热解毒,止血 外用于痈疖,乳腺炎,无名肿毒,刀伤,荨麻疹,过敏性皮炎

#### 7264028

*Clinopodium gracile* (Benth.) Matsum. --- *Calamintha gracilis* Benth.

植物名 细风轮菜《中国植志》

药材名 瘦风轮《汇编》

文献名 剪刀草《饮片新参》,玉如意草《中草药学》

地方名 玉如意(江苏、上海),塔花(上海、江苏、福建、广西),〔野薄荷〕(江西、福建、湖南);江苏:剪草(上海),箭头草;浙江:四季青(天台),四季抽(乐清),野香草(丽水),鲤鱼草(温州、永嘉、乐清),野菜苳(泰顺),节节花;江西:野仙人草(赣州),苦草(婺源),小叶仙人草;福建:假仙菜(汀源),土薄荷,有骨消,四角草,鸡苏,七层宝塔(福清);湖南:抹掉婆草,星花草,小蛤蟆草,石花菜,风轮菜;广东:细密草(龙头山),野凉粉草(从化),假蚌信草(南海),臭草(塔城);广西:花花王根草(隆林),宝塔菜;四川:九层塔。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。用于白喉,咽喉肿痛,肠炎,痢疾,乳腺炎,雷公藤中毒。外用于过敏性皮炎。

#### 7264029

*Clinopodium megalanthum* (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li --- *Calamintha megalanthum* (Diels) Hand. -Mazz.

植物名 寸金草《中国植志》

药材名 寸金草《昆明民药》

地方名 四川:盐烟苏(会东),风轮草(峨眉山);云南:麻布草,山夏枯草(昆明),灯笼花(维西),蛇床子,上白芷,莲台夏枯草(曲靖)。

功效 全草:消肿活血,清热平肝 用于牙痛,小儿疳积,风湿跌打,退烧;籽:壮阳。

#### 7264030

*Clinopodium omeiense* C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li

植物名 峨眉风轮菜《中国植志》

药材名 峨眉风轮菜《峨眉药植研究》

功效 全草:清热解毒,健脾软坚。

#### 7264031

*Clinopodium polycephalum* (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan  
ex Hsuan --- *Calamintha polycephalum* Vaniot

植物名 多头风轮菜《中药志》

药材名 断血流《药典》

文献名 大叶香薷《名实图考》，荫风轮《贵州草药》，  
多头花塔草《广西植录》，灯笼草《中国植志》

地方名 山藿香(贵州、云南)；江苏：〔上荆芥〕；安徽：止血丹；福建：九层塔(平潭、莆田)，野薄荷、田螺菜(沙县、南平、上杭)，蒙锄草(崇安)，节节花(莆田)；湖南：大铺地香，刀口药；广西：野鱼腥草(龙胜)；四川：节节菜(南川)，风轮草(峨眉)；贵州：蜂窝草(湄潭)，节节草(清镇)；云南：漫胆草、小益母草(大理)，走马灯笼草、走马灯草(保山)，〔夏枯草〕、土防风、绣球草(曲靖)，楼台草(通海)，风轮菜，脚癬草。

功效 地上部分：止血。用于崩漏，子宫肌瘤出血，尿血，鼻衄，牙龈出血，创伤出血。

#### 7264032

*Colebrookea oppositifolia* Smith

植物名 羽萼木《中国植志》

药材名 羽萼《汇编》

地方名 云南：马跨皮，野山茶，黑羊巴巴(昌宁)，  
“害水顿”(西双版纳傣名)。

功效 叶：消炎，止血。用于鼻衄，咳血。外用于  
外伤出血，皮炎，癣。

#### 7264033

*Coleus carnosifolius* (Hemsl.) Dunn

植物名 肉叶鞘蕊花《中国植志》

文献名 小洋紫苏《广西药录》

地方名 广东：假回菜；广西：双飞蝴蝶(平南)，桂花  
疮、水花疮(贵县)。

功效 全株：用于疥疮，蛇咬伤。

#### 7264034

*Coleus esquirolii* (Levl.) Dunn

植物名 毛萼鞘蕊花《中国植志》

文献名 岩紫苏《云南药录》

地方名 云南：红靛，白花紫苏(文山)。

功效 全草：散寒解表，祛痰止咳。用于感冒，肺  
结核咳嗽，咯血，肺脓疡，神经衰弱。

#### 7264035

*Coleus forskohlii* (Willd.) Briq.

植物名 毛喉鞘蕊花《中国植志》

备考 巴西学者研究，有抗癌成分。

#### 7264036

*Coleus scutellarioides* (L.) Benth. --- *Coleus blumei*  
Benth.

植物名 五彩苏《中国植志》

文献名 彩紫苏《广西药录》，锦紫苏《种称》

地方名 广东：洋紫苏(广州)；广西：彩叶紫苏。

功效 全株：清热消肿。用于疥疮，蛇咬伤。

#### 7264037

*Coleus scutellarioides* (L.) Benth. var. *crispipilus*  
(Merr.) H. Keng --- *Coleus pumilus* Blanco --- *C. for-*

*mosanus* Hayata

植物名 小五彩苏《中国植志》

文献名 小彩叶紫苏《中药大辞典》。

地方名 广东：洋紫苏、苛留香(阳江)；海南：五色草  
(澄迈)，假紫苏(儋县)；广西：〔金耳环〕(梧州)，小洋紫  
苏，盆上金耳环，小叶洋紫苏，金钱炮。

功效 全草：清凉解毒。用于疮疡。

#### 7264038

*Colquhounia coccinea* Wall. var. *mollis* (Schlecht.)

Prain

植物名 火把花《中国植志》

文献名 炮仗花《植分学报》

地方名 云南：〔密蒙花〕、羊巴巴花(大理)，细羊巴  
巴花。

功效 花：云南大理以之入药充代密蒙花。

#### 7264039

*Colquhounia elegans* Wall. var. *tenuiflora* (Hook. f.)

Prain

植物名 细花秀丽火把花(拟)

文献名 细花火把花《云南植志》

地方名 云南：细棉花(永德)。

功效 根：用于跌打损伤，止血，止痢；叶、嫩枝：用  
于骨折。

#### 7264040

*Comanthosphace ningpoensis* (Hemsl.) Hand. -Mazz.

植物名 绵穗苏《中国植志》

药材名 半边苏《汇编》

地方名 贵州：野鱼香、野苏(兴义)，火胡麻(绥阳)。

功效 全草：驱风发汗，清热止血，解毒。用于感  
冒畏寒头痛，瘫痪，疮毒。

#### 7264041

*Dracocephalum calophyllum* Hand. -Mazz.

植物名 美叶青兰《中国植志》

药材名 美叶青兰《迪庆藏药》

文献名 青兰《迪庆藏药》

功效 地上全草：清热，止血，愈疮，干黄水。用于  
肝炎，头晕，神疲，胃热，口病，黄水病，便血，尿血，疮口  
不合；幼苗：利水。用于水肿，腹水。

#### 7264042

*Dracocephalum coerulescens* (Maxim.) Dum.

植物名 蓝花青兰《青藏药图》

地方名 青海：“冬那端迟”(藏名)。

功效 全草：消炎，止血，排脓，杀菌。

#### 7264043

*Dracocephalum forrestii* W. W. Smith

植物名 松叶青兰《中国植志》

药材名 松叶青兰《迪庆藏药》

文献名 傅氏青兰《植分学报》，藏药青兰《迪庆藏  
药》

功效 地上全草：清热，止血，愈疮，干黄水。用于  
肝炎，头晕，神疲，胃热，口病，黄水病，便血，尿血，疮口  
不合；幼苗：利水。用于水肿，腹水。

## 7264044

*Dracocephalum heterophyllum* Benth.

植物名 异叶青兰《兰州植物志》

药材名 白花甜蜜蜜《汇编》

文献名 白花枝子花《中国植物志》,戈壁青兰《沙漠药植》

地方名 甘肃:白花蜜蜜,白甜蜜蜜草;青海:白甜蜜蜜,“奥孕”(藏名),〔白花夏枯草〕;新疆:“马尔赞居西”、“祖帕尔”(维吾尔),蜜罐罐。

功效 全草:清肝火,散郁结,止咳,平喘。用于支气管炎,高血压病,甲状腺肿大,淋巴结结核,淋巴结炎。外用于口腔溃疡。

## 7264045

*Dracocephalum integrifolium* Bunge

植物名 全缘叶青兰《中国植物志》

药材名 全叶青兰《汇编》

地方名 新疆:“马尔赞居西”、“祖帕尔”(维吾尔),天山青兰。

功效 全草:止咳,祛痰,平喘。用于咳嗽,痰喘,老年慢性支气管炎。

## 7264046

*Dracocephalum isabellae* Forrest ex W. W. Smith

植物名 白萼青兰《中国植物志》

药材名 白萼青兰《迪庆藏药》

文献名 藏药青兰《迪庆藏药》

功效 地上全草:清热,止血,愈疮,干黄水。用于肝炎,头晕,神疲,胃热,口疮,黄水病,便血,尿血,疮口不合;幼苗:利水。用于水肿,腹水。

## 7264047

*Dracocephalum moldavica* L.

植物名 香青兰《中国植物志》

药材名 香青兰《汇编》

文献名 山青兰《东医》,炒面花、山香《沙漠药植》

地方名 臭仙欢、臭蒿、臭青兰(内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏),青兰、青蓝(山西、陕西、甘肃),枝子花(河北、北京、内蒙古、新疆);吉林:山薄荷,紫藻;辽宁:摩眼籽(建昌),摩眼子;河北:蓝秋花,玉米草,香花子;山西:磨苯;内蒙古:“昂凯鲁莫勒-毕日阳古”(蒙名),小兰花,香花子,臭兰香,“白赖洋古”(蒙名);陕西:野青兰;新疆:“巴德兰古”(维吾尔)。

功效 全草:泻肝火,清胃热,止痛,止血。用于气管炎,感冒,头痛,咽痛,黄疸,吐血,衄血。

## 7264048

*Dracocephalum nodulosum* Rupr.

植物名 多节青兰《中国植物志》

备考 据《新华本草纲要》称:地上部分含数种黄酮化合物,总量4.9%~5%,药理试验有降压作用。

## 7264049

*Dracocephalum nutans* L.

植物名 垂花青兰《中国植物志》

药材名 垂花青兰《新华本草纲要》

功效 全草:用于慢性支气管炎。

## 7264050

*Dracocephalum rupestre* Hance

植物名 毛建草《中国植物志》

药材名 岩青兰《汇编》

地方名 “那乌黄乃”(四川、西藏藏名),毛尖、毛尖茶(河北、山西);内蒙古:“哈敦-毕日阳古”(蒙名);青海:岩青蓝。

功效 全草:解热消炎,凉血,止血。用于外感风热,头痛寒热,喉痛咳嗽,黄疸型肝炎,吐血,衄血,痢疾。

## 7264051

*Dracocephalum rupestre* Hance var. *albiflorum* Schischk.

植物名 白花岩青兰《汇编》

地方名 四川:“那红连”(藏名)。

功效 全草:发散风热,凉血降压。用于感冒发热,高血压病,腹胀满。

## 7264052

*Dracocephalum ruyschiana* L.

植物名 青兰《中国植物志》

药材名 青兰《长白山植物志》

功效 全草:用于头痛,咽喉痛。

## 7264053

*Dracocephalum tanguticum* Maxim.

植物名 甘青青兰《中国植物志》

药材名 甘青青兰《汇编》

文献名 唐古特青兰《植物学报》,陇塞青兰《中国植物志》

地方名 西藏:“知羊故”、“知羊哥”、“则羊古”、“智洋顾”(藏名),杂毕样。

功效 带根全草:和胃疏肝,清热利水,止咳化痰。用于肝炎,慢性胃炎,腹水,浮肿,咳嗽痰多,便血,疮口不愈。

## 7264054

*Dysophylla stellata* (Lour.) Benth. --- *Dysophylla benthamiana* Hance

植物名 水虎尾《中国植物志》

药材名 水虎尾(湖南岳麓山)

文献名 边氏水珍珠菜《广州植物志》,水老虎、野香芹、水芙蓉、方茎水芙蓉《汇编》

地方名 广西:水箭草(上林)。

功效 全草:有小毒。行气止痛,散瘀消肿。用于毒蛇咬伤,疮痈肿毒,湿疹,跌打瘀肿。

## 7264055

*Dysophylla stellata* (Lour.) Benth. var. *intermedia* (C. Y. Wu et Hsuan) C. Y. Wu et H. W. Li

植物名 中间水虎尾(拟)

地方名 广西:三姐妹(恭城)。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。

## 7264056

*Elsholtzia blanda* Benth.

植物名 四方蒿《中国植物志》

药材名 四方蒿《汇编》

文献名 鸡肝散《滇南本草》, 白香薷《中国经植志》, 滇香薷《广西植录》

地方名 广西: 半边香(凌云); 四川: 大香薷(南川); 贵州: 沙虫药(黔西), 鸡骨柴(水城), 野薄荷(兴义); 云南: 黑头草(思茅), 四棱蒿、四楞蒿(龙陵、思茅), 细野菰子, “杂牙忧麻”(西双版纳傣语), 马尿草, “岩合合罗”(红河哈尼族语), 扫把茶、铁扫把(景东), 蔓坝(腾冲), 野苏(屏边), [荆芥](双江), 豹子草, 大狗屎香, 野把子。

功效 花或全草: 发汗解表, 利湿止痒。用于感冒, 肠炎, 痢疾, 肾炎, 肾盂肾炎。外用于湿疹, 脚癣。

#### 7264057

*Elsholtzia bodinieri* Vaniot

植物名 东紫苏《名实图考》、《中国植志》

药材名 牙刷草《云南药录》

地方名 云南: 凤尾茶、野山茶、铁线夏枯草(昆明), 香苏茶、半边红花(曲靖), 云松茶(玉溪), 小香茶、小松毛茶、小山茶、锈山茶(曲靖), 小茶叶(通海), 鸭子草(双柏), 土茶(贡山), [山茶], 山茶叶, [苦丁茶], 小香薷。

功效 全草: 发散解表, 清热利湿。用于感冒, 扁桃腺炎, 小儿口腔炎, 头痛, 牙痛, 咽喉痛, 眼结膜炎, 肝炎, 消化不良。

#### 7264058

*Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyland. --- *Elsholtzia cristata* Willd. --- *Elsholtzia patrinii* (Lepech.) Garcke

植物名 香薷《别录》、《中国植志》

药材名 土香薷《汇编》

文献名 香薷、香戎、茂药、石解、山翁《新纲》, 臭薷香《汇编》

地方名 香菇(内蒙古、河北), 香草(山东、福建、四川), 野紫苏(湖南、四川), 香菇草(福建、四川), 蜜蜂草(辽宁、河北、甘肃、福建), 水荆芥、臭香麻(辽宁、甘肃、河北), 水苏子(黑龙江、吉林、河北、山西、福建), 小苏子(东北、河北、山西、福建), 野苏(贵州、云南), [荆芥](吉林、辽宁、河北、甘肃), 半边苏(浙江、云南、贵州); 黑龙江: 青龙刀香薷; 吉林: 把蒿; 辽宁: 拉拉香, 小叶苏子, 小荆芥, 北香薷; 河北: 水晶芥, 黄薷; 内蒙古: “希拉-吉茹格”(蒙名), 臭兰香; 陕西: 偏芥; 山东: 偏头草(泰山); 浙江: 香草头(长兴), 偏枝花(兰溪), 边枝花, 天香油(天台); 安徽: 牙刷草, 笔头花; 福建: 香叶, 香菇仔(周宁), 香茸、土岩茹(松政), 小香菇(罗源、宁德); 河南: 野香薷, 半脸荆芥, 偏脸荆芥, 偏荆芥; 湖南: [土荆芥], 苏麻, 野荆芥, 野麻油树, 野油麻, 野薷香, 大叶香薷; 广西: 假紫苏(博白), 细薄荷(平南), [排香草], 石艾、独行千里(陆川), 酒饼叶(阳朔); 四川: 臭香薷, 鼃睡草, 痲子草, 鱼香草、铜草(南川), 德昌香薷, 鸡冠香薷, 相思香; 贵州: 野鱼香, 火胡麻; 云南: 蚂蝗痧(文山), 坝子菜(峨山), 巴子菜, 鬼米香条(玉溪), 假香薷, 野香苏(澄江), 野芝麻(镇雄), 野芭子(保山), 野坝蒿(易门); 西藏: “疾尔色尔布”(藏语)。

功效 全草: 发汗, 解暑, 利尿。用于感冒发热无

汗, 中暑, 急性胃肠炎, 胸闷, 口臭, 小便不利。

#### 7264059

*Elsholtzia communia* (Coll. et Hemsl.) Diels

植物名 吉龙草《中国植志》

药材名 吉笼草《汇编》

文献名 野香薷花《广西药录》

地方名 陕西: 偏芥; 云南: 家苏(昆明), “英肯”(西双版纳傣语), 暹罗香菜; 其他: 鱼香菜, 木姜花。

功效 叶: 清热解毒, 解表。用于伤风感冒, 疔疮, 鼻渊, 扁桃腺炎。

#### 7264060

*Elsholtzia cypriani* (Pavol.) S. Chow ex Hsu --- *Pogostemon cypriani* Pamp.

植物名 野草香《中国植志》

药材名 野草香《名实图考》、《湖南药物志》

文献名 野香薷《中国经植志》

地方名 野苏麻(湖南、四川), [野薄荷](河南、湖南); 河南: [牛膝](南召); 四川: 野白木香(盐边), [满山香], 小滴香(米易), 木槲花(叙永); 贵州: 鱼香菜(都匀), 木姜花(贵阳); 云南: 野香苏, 野狗芝麻、狗尾巴草、狗屎香、粪水药(保山), 狗尾巴叶, [常山](思茅), “古克多”(丽江纳西语)。

功效 叶: 清热, 解毒, 解表。用于感冒疔疮, 鼻渊, 喉蛾。

#### 7264061

*Elsholtzia densa* Benth. --- *E. densa* Benth. var. *ianthina* (Maxim. et Kanitz) C. Y. Wu et S. C. Huang

植物名 密花香薷《云南种录》

文献名 东北香薷《东检》, 细穗香薷《东北草本植志》, 细穗密花香薷《拉汉英种称》

地方名 四川: 咳嗽草(峨眉), 野紫苏(马尔康), 臭香薷, 臭香菇(洪源), 蟋蟀巴(甘孜), “息肉巴”(甘孜藏语); 西藏: 密香薷。

功效 全草: 发汗解暑, 利湿行水。用于伤暑感冒, 肾炎。外用于脓疮, 皮肤病。

#### 7264062

*Elsholtzia densa* Benth. var. *calycocarpa* (Diels) C. Y. Wu et S. C. Huang --- *E. calycocarpa* Diels

植物名 矮密花香薷《云南种录》

文献名 尊果香薷《新疆中草药手册》

地方名 臭薷香(山西、甘肃、陕西); 甘肃: [泽兰]; 青海: “息肉巴”(藏名); 新疆: 香薷; 西藏: 土香薷。

功效 全草: 发汗, 解暑, 利湿, 行水。用于伤暑感冒, 肾炎。

#### 7264063

*Elsholtzia eriostachya* Benth.

植物名 毛穗香薷《中国植志》

文献名 黄花香薷《青藏药图》

地方名 青海: “切柔赛保”(藏名)。

功效 地上部分: 健胃。外用于皮肤痒疹。

#### 7264064

*Elsholtzia feddei* Levl.

植物名 高原香薷《中国植志》

地方名 四川:野木香叶(马尔康);云南:小红苏(昭通),香薷。

功效 全草:发汗解表,祛暑化湿。用于中暑感冒,发热头痛,腹痛,腹泻,水肿。

#### 7264065

*Elsholtzia feddei* Levl. f. *remotibracteata* C. Y. Wu ex S. C. Huang

植物名 疏苞高原香薷《云南植志》

功效 全草:用于感冒。

#### 7264066

*Elsholtzia flava* (Benth.) Benth.

植物名 黄花香薷《高植图鉴》

文献名 野苏子《中国植志》

地方名 云南:修仙果(禄劝),大叶拔艾,大野坝艾(漾濞),大叶香芝麻(玉溪),大叶香薷(临沧),大叶紫苏,大叶香芝麻叶,野苏,野紫苏,“科爬爬麻”(元江哈尼语)。

功效 全草:清热解毒,疏散风热。用于疔疮未溃,风热感冒。

#### 7264067

*Elsholtzia fruticosa* (D. Don) Rehd.

植物名 鸡骨柴《中国植志》

药材名 鸡骨柴《汇编》

地方名 青海:“普尔芒拉冈”(藏名);贵州:酒药花,沙虫药,灌木香薷;云南:双翎草、老妈妈棵、瘦狗还阳草(昆明),大柴胡(维西),香芝麻叶(玉溪),山野坝子(武定),紫油苏(彝良),小花香科,小花香棵,扫地茶。

功效 根:温经通络,祛风除湿。用于风湿关节疼痛;叶:用于烂脚丫,白壳癩,疥疮。

#### 7264068

*Elsholtzia heterophylla* Diels

植物名 异叶香薷《中国植志》

地方名 云南:凤尾茶,野山茶,松茶。

功效 全草:用于发汗,镇咳,健胃,利尿,镇痛,解热。

#### 7264069

*Elsholtzia longidentata* Sumner

植物名 紫香薷《中国经植志》

文献名 香薷《高原中草》

地方名 浙江:土薄荷,野苏;四川:“泻肉翁波”(若尔盖藏名)。

功效 全草:发汗清暑,消肿利尿,健胃止呕。用于暑热感冒,水肿腹痛。

#### 7264070

*Elsholtzia luteola* Diels

植物名 淡黄香薷《中国植志》

药材名 黄香薷《泉州本草》

文献名 香薷、寸薷《中药大辞典》

功效 全草:清暑热,利小便,除胸满,理烦渴。用于中暑下痢,发热口渴,心烦胸痛,口臭,舌出血。

#### 7264071

*Elsholtzia myosurus* Dunn

植物名 鼠尾香薷《中国植志》

文献名 香紫苏《云南药录》

地方名 云南:密花香薷(镇康),大香花棵(昭通),大香芝麻棵,上蕙香,四楞蒿,疳积散,野苏,理肺散。

功效 全株:清热消炎,止咳,解表。用于感冒,百日咳,支气管炎,肾盂肾炎,小儿疳积。外用于骨髓炎。

#### 7264072

*Elsholtzia penduliflora* W. W. Smith

植物名 大黄药《中国植志》

药材名 大黄药《红河中草药》

文献名 垂花香薷《汇编》

地方名 云南:黄药、大黑头草(思茅),一号黄药,吊吊黄,小香薷(红河),野紫苏、野苏子、野芝麻、野苏子棵(西畴),“板插多”(苗名)。

功效 地上部分:清热解毒,止咳。用于流感,肺炎,支气管炎,咳嗽,扁扁桃体炎,乳腺炎,尿路感染,外伤感染,痈疖,炭疽病。

#### 7264073

*Elsholtzia pseudo-cristata* Levl. et Vant. --- *Elsholtzia splendens* Nakai ex F. Maekawa --- *Elsholtzia loeseneri* Hand. -Mazz. --- *Elsholtzia hachowensis* Sun ex C. H. Hu

植物名 海州香薷《东北草本植志》

药材名 香薷《别录》、《药典》

文献名 香薷《本草经集注》,香薷《千金方》,香戎《食疗本草》,香茸《图经》,紫花香薷《履巇岩本草》,蜜蜂草《纲目》,窄叶香薷、西香薷、白花香薷《鉴别手册》,香草《简明中医辞典》,山苏子、臭荆芥、水荆芥《中草药学》,狭叶香薷《湖北中草药志》

地方名 吉林:把蒿;浙江:土荜草(临安);湖北:止痢草。

功效 地上部分:发汗解表,和中利湿。用于暑湿感冒,热寒发热,头痛无汗,腹痛吐泻,小便不利。

#### 7264074

*Elsholtzia rugulosa* Hemsl.

植物名 野拔子《中国植志》

药材名 香苏草(云南)、《汇编》

文献名 细皱香薷《中药大辞典》

地方名 野坝蒿(四川、云南);广西:崩疮药;四川:臭香薷;贵州:灌木香薷;云南:狗尾巴香(红河),狗巴子,香芝麻,香芝麻蒿,小苏苏棵,小野拔子,小铁苏,小山苏,小香芝麻,小小苏,小紫苏、把子草(屏边),野香薷,野荆芥(玉龙山),野巴子,野巴蒿(保山),野坝草、野苏、野香苏(昆明),野苏子(玉溪),野蕙香,半边花,半辨花,半边香,山香,草拔子,白背蒿,青牛膝,地檀香,矮香薷,保保茶(普洱),扫把茶(思茅),“腊悠麻”(思茅傣语),蒿巴巴棵(楚雄),“松花”(丽江纳西语),坝子花,鬼米香条,铁苏苏,铁苏棵。

功效 全草:疏风解表,利湿。用于感冒,头痛,消化不良,急性胃肠炎,痢疾。

#### 7264075

*Elsholtzia saxatilis* (Komarov) Nakai

植物名 岩生香薷《中国植志》  
 药材名 岩生香薷《贵州药录》  
 地方名 贵州:土香薷(独山)。  
 功效 全草:清热解暑,祛风解表。用于感冒、风湿痛。

## 7264076

*Elsholtzia souliei* Levl.

植物名 川滇香薷《中国植志》  
 地方名 四川:木姜菜(道孚),金花香薷。  
 功效 全草:用于小儿惊风。

## 7264077

*Elsholtzia stauntoni* Benth.

植物名 木香薷《中国植志》  
 药材名 木香薷《甘肃中草》  
 文献名 紫花鸡骨柴《甘肃中草》,木木香薷《华北树木志》

地方名 甘肃:[土木香];北京:柴荆芥(昌平);河北:香荆芥、山菁芥、山荆芥(小五台山),[荆芥](赞皇),臭荆芥;河南:野荆芥(洛阳)。

备考 甘肃以其根混充土木香入药。

## 7264078

*Elsholtzia strobilifera* Benth.

植物名 球穗香薷《中国植志》  
 地方名 四川:臭苏麻(峨眉),野苏麻(凉山)。  
 功效 全草:发汗解表。

## 7264079

*Elsholtzia winitiana* Craib

植物名 白香薷《中国植志》  
 地方名 云南:四方蒿(潞西、芒市),香薷(耿马),“麻永牙”(傣语)。  
 功效 全草:清热解毒,疏散风热。

## 7264080

*Epimeredi indica* (L.) Rothm. --- *Anisomeles indica* (L.) Kuntze --- *A. ovata* R. Brown

植物名 广防风《中国植志》  
 药材名 防风草《南宁药志》  
 文献名 落马衣、假紫苏、马衣草《生草药性备要》,稀荬草、土防风《岭南采药录》,马衣叶《种称》,苗蕨《科属词典》

地方名 野苏(四川、云南),稗草、臭稗草、臭草(广东、广西),[稀荬](福建、广西),土藿香(江西、广东、贵州、云南),马衣生、不剪花、火香(华南);江西:福草;福建:臭苏,大本有骨梢(龙海、诏安、南靖、泉州、晋江),大叶薄荷(松溪、政和),野薄荷,猪麻草;台湾:臭天黄,金剑草,菜草头,虱母草,鱼针草,本稀荬草;广东:排风草,抹草,大密草,[荆芥],[薄荷](阳山),白艾花(广州),旺草(大鱼山);海南:蜜草(海口、儋县),嗅草(澄迈);广西:四方茎,大蔑草,大羊古茎,大畏草(贺县),假甘草、畏草(藤县),[藿香](博白、昭平),臭紫苏(玉林),燥羊古、荏花假紫苏(桂林),鸭儿蔑,假藿香、九层楼、七草(信都);四川:野紫苏(布施);贵州:野苏麻(兴义);云南:野芝麻(保山),癞蛤蟆(河口)。

功效 全草:祛风,除湿,解毒。用于感冒身热,呕吐,腹痛,筋骨疼痛,疮疡,湿疹,痔疾。

## 7264081

*Eriophyton wallichii* Benth.

植物名 绵参《中国植志》  
 药材名 绵参《云南中草药》  
 文献名 毛草《中国植志》,光杆琼《汇编》  
 地方名 青海:“邦参布柔”,“榜参布茹”(藏名)。  
 功效 全草:清热解毒。用于肺炎,痢疾,水草中毒,食物中毒。

## 7264082

*Eurysolen gracilis* Prain

植物名 宽管花《高植图鉴》  
 药材名 宽管花《元江哈尼族药》  
 地方名 云南:“努哈那衣”(元江哈尼语)。  
 功效 根:行气通经。用于月经不调,闭经。

## 7264083

*Galeobdolon chinense* (Benth.) C. Y. Wu

植物名 小野芝麻《中国植志》  
 药材名 地绵绵《汇编》  
 文献名 假野芝麻《植分学报》,蜘蛛草《汇编》  
 功效 块根:用于外伤止血。

## 7264084

*Galeopsis bifida* Boenn. --- *G. tetrahit* L. var. *bitida* Kudo

植物名 瓣瓣花《中国植志》  
 文献名 瓣瓣花《高原中草》  
 地方名 黑龙江:黑苏子;四川:野芝麻,“泻乳洼”(若尔盖藏名);贵州:壶瓶花,引子香,十二槐花,金槐。  
 功效 全草:解毒抗菌。用于梅毒,痢疾,解肉中毒。

## 7264085

*Glechoma biondiana* (Diels) C. Y. Wu et C. Chen --- *Dra-cocephalum biondianum* Diels --- *Meehaniaopsis biondianum* (Diels) Kudo

植物名 白透骨消《中国植志》  
 药材名 白透骨消《陕西草药》  
 文献名 长管活血丹《新华本草纲要》  
 地方名 陕西:假活血丹,见肿消;贵州:小毛铜钱草(榕江)。

功效 全草:活血消肿。用于筋骨痛,消肿。

## 7264086

*Glechoma biondiana* (Diels) C. Y. Wu et C. Chen var. *glabrescens* C. Y. Wu et C. Chen

植物名 无毛白透骨消《秦岭植志》  
 文献名 假美汉花《植分学报》  
 地方名 陕西:见肿消(佛坪);甘肃:刀剪药、六月蜜(天水),透骨消;河南:补血丹(嵩县)。  
 功效 全草:消肿。

## 7264087

*Glechoma grandis* (A. Gray) Kupr. --- *G. hederacea* L. var. *grandis* (A. Gray) Kudo

植物名 日本活血丹《中国植志》



药材名 金钱薄荷《台湾中药材图鉴》  
 地方名 台湾：白花仔草，虎咬痕，茶匙痕。  
 功效 全草：解热，利尿，行血，用于肿毒，疔疮。

## 7264088

*Glechoma hederacea* L.

植物名 欧活血丹《中国植志》  
 药材名 欧连钱草《汇编》  
 文献名 连钱草《中国植物图鉴》  
 功效 全草：新疆作活血丹用。

## 7264089

*Glechoma longituba* (Nakai) Kupr. --- *G. hederacea* L.  
 var. *longituba* Nakai --- *Nepeta glechoma* Benth. var. *hirsuta* Debeaux --- *Glechoma brevītuba* Kupr.

植物名 活血丹《名实图考》、《中国植志》  
 药材名 连钱草《徐仪药草图》、《药典》  
 文献名 积雪草《本草》，地钱草《唐本草》，胡薄荷、新罗薄荷《图经》，遍地香《祝穆试效方》，地钱儿《救荒野谱》，铍儿草《救生苦海》，铜钱草《慈航活人书》，佛耳草《百草镜》，白耳草、乳香藤、〔九里香〕、半池莲、千年冷、遍地金钱、金钱草《纲目拾遗》，金钱艾《本草求原》，马蹄草、透骨消《名实图考》，透骨风、过墙风、巡骨风《分类草药性》，蜜子草《天宝本草》，海苏、钱葛《新纲》，长筒连钱草《吉野》，短筒活血丹《植分学报》，长筒活血丹《东北药植志》，一串钱《民药汇编》，佛草《秦岭植志》，满地金钱《中国新医药》，江苏金钱草《品种论述》

地方名 团经药（广西、贵州），驳骨消（广东、广西），大叶金钱草（浙江、江西），破铜钱（陕西、湖北、四川），肺风草（福建、湖南），〔透骨草〕（陕西、江西、福建、广东），金钱薄荷（浙江、福建），十八缺（浙江、贵州），满天星（甘肃、湖南），四方消（广东、湖南）；陕西：罗金钱，金钱菊（太白），大鸡肠子（略阳）；山东：灯笼草（莱阳）；江苏：黄痘草（昆山），缸爬藤草（苏州），膝盖风草（宜兴）；上海：蛇壳草，臭草，野金锁草，腥气草，肚连子草，爬藤草；浙江：十八鞭（温州、青田），疽草（吴兴），蟹壳草，破金钱，对叶金钱草，胎济草；江西：方便金钱草，野薄荷，连金钱，大金钱草，甯地香，铜钱玉带；福建：落地金钱（永安），穿藤薄荷（三明），大号肺风草，十八缺草，入骨箭、牛骨箭（松政）；湖北：小铜钱草，〔赶山鞭〕；湖南：疳取草，鱼杂子草（长沙），穿墙草（常德、衡山），节节生（大庸），星子草（花垣），〔满山香〕（永兴），马脚草（凤凰），满荆草（会同），夏皮草（黔阳），〔半边莲〕（衡南），西川草，强盗草（东安），穿花铜钱草；广东：串骨消（汕头、揭阳），有骨消、积骨消（潮安），痛骨消（普宁），三寸莲，沿地风，豆口烧；广西：川钱草（临桂），挫骨消（大苗山），驳骨樵（柳江），〔钻地风〕（贵县、南宁、隆林），四方雷公根（陆川、博白），钱凿草、钱凿王（陆川），风灯盏，接骨消；四川：哈木叶，马踏筋骨草，咳嗽药，过桥风，文骨文，云风草，蜜婆草，碗碗草，碗子草，闻墙风，晕病药（万县），透骨香，野荆芥，小过桥风；贵州：退骨草，退骨消，“特况消”（剑河侗语），风草，小毛铜钱草（榕江）。

功效 全草：利尿通淋，清热解毒，散瘀消肿。用于热淋，石淋，湿热黄疸，痈疮肿毒，跌扑损伤。

7264090 见 7264096

## 7264091

*Glechoma sinogranda* C. Y. Wu

植物名 大花活血丹《中国植志》  
 地方名 云南：“大筋草”（龙陵），透骨消。  
 功效 全草：用于小儿支气管炎，骨折。

## 7264092

*Glechoma wallichii* Prain

植物名 顶序锥花《云南种录》  
 功效 全草：用于膀胱或尿路结石

## 7264093

*Gomphostemma chinense* Oliv.

植物名 中华锥花《中国植志》  
 药材名 棒丝花《广西药录》  
 地方名 广西：山继谷（桂平），棒红花，老虎耳（上林），白腊锁  
 功效 叶：用于刀伤出血，断指，口疮。

## 7264094

*Gomphostemma latifolium* C. Y. Wu

植物名 宽叶锥花《中国植志》  
 药材名 宽叶锥花《广西药园药录》  
 功效 叶：用于外伤出血，湿疹。

## 7264095

*Gomphostemma leptodon* Dunn

植物名 细齿锥花《中国植志》  
 地方名 广西：假走马胎（龙津）。  
 功效 全株：用于水火烫伤。

## 7264096

*Gomphostemma microdon* Dunn

植物名 小齿锥花《中国植志》  
 药材名 木锥花《云南药录》  
 地方名 云南：“描暖刀”（西双版纳傣语），“细郎刀”（思茅傣语）。

功效 根：清热解毒，止咳化痰，消炎利尿。用于肺炎，气管炎、支气管炎，咳嗽痰多，尿路感染，肾炎水肿，尿路结石。

## 7264097

*Gomphostemma sulcatum* C. Y. Wu

植物名 槽茎锥花《中国植志》  
 功效 根、叶：用于跌打损伤，刀伤出血。

## 7264098

*Hanceola sinensis* (Hemsl.) Kudo

植物名 四轮香《中国植志》  
 药材名 四轮香《峨眉药植》  
 文献名 汉史草《植分学报》  
 地方名 四川：野藿香（峨眉）。  
 功效 全草：清热，消炎，止痢，止痛。

## 7264099

*Heterolamium debile* (Hemsl.) C. Y. Wu var. *cardiophyllum* (Hemsl.) C. Y. Wu

植物名 细齿异野芝麻《云南种录》  
 地方名 湖北：〔紫草〕（宣恩）。

功 效 全草:清热解暑。

#### 7264100

*Hyptis capitata* Jacq.

植物名 有骨消《台湾中药材图鉴》

功 效 茎叶:用于外伤,疟疾,感冒,肺病,淋病。

#### 7264101

*Hyptis rhomboidea* Mart. et Gal. --- *Hyptis decurrens* (Blanco) Epling

植物名 吊球草(海南)、《中国植志》

地方名 假走马风(海南、广西);海南:四方骨,四伶草(儋县),螭蛸蒴(临高),石柳(澄迈)。

功 效 全草:用于肝炎。

#### 7264102

*Hyptis suaveolens* (L.) Poit.

植物名 山香《中国植志》

药材名 山香《汇编》

文献名 狗骨消《广州植志》

地方名 毛老虎(广东、广西);福建:山薄荷(厦门);广东:假藿香,五雷火、假九层塔(广州),有骨;海南:臭草(儋县、澄迈);广西:黄黄草(南宁、桂平),大还魂(桂平),〔霍香〕(北流),毛射香、蛇百子(百色、陆川),遍死蛇(陆川)。

功 效 全草:疏风利湿,行气散瘀。用于感冒头痛,胃肠炎,痢疾,腹胀。外用于跌打肿痛,创伤出血,痈肿疮毒,虫蛇咬伤,湿疹皮炎。

#### 7264103

*Hyssopus cuspidatus* Boriss.

植物名 硬尖神香草《中国植志》

药材名 神香草《新疆中草药》

功 效 全草:镇咳祛痰,清热利湿,杀菌消炎。用于气管炎,咳嗽,感冒发烧。

#### 7264104

*Keiskea elsholtzioides* Merr.

植物名 香薷状香简草《中国植志》

文献名 香薷状霜柱《高植图鉴》

地方名 湖南:散血王(蓝山县瑶名);广西:山紫苏(苍梧)。

功 效 全草:活血散瘀。

#### 7264105

*Kinostemon ornatum* (Hemsl.) Kudo

植物名 动蕊花《中国植志》

地方名 四川:红荆芥(峨眉);贵州:野藿香。

功 效 全草:清热,凉血,杀虫。用于头痛,发热。

#### 7264106

*Lagochilus pulcher* Knorr.

植物名 兔唇花《新疆中草药》

药材名 兔唇花《新疆中草药》

功 效 地上部分:消炎止血,镇静。用于各种出血,神经衰弱,失眠。

#### 7264107

*Lagopsis supina* (Steph.) Ik-Gal. ex Knorr. --- *Marrubium incisum* Benth. --- *M. supinum* (Willd.) Hu

ex Pei

植物名 夏至草《中国植志》

药材名 夏至草《陕西中草药》

文献名 郁臭苗《本草拾遗》,苦低草《图经》,〔夏枯草〕、白花夏枯《滇南本草》,〔白花益母〕《名实图考》,小益母草《沙漠药植》

地方名 〔白花益母草〕(甘肃、青海、四川);河北:风车草;陕西:风轮草;青海:“兴托里杂保”(藏名),假芫蕬;江苏:灯笼棵(邳县),〔坤草〕(丰县),野益母草(射阳);云南:白花夏枯草;其他:假益母草,白花佛座,整药。

功 效 全草:有小毒。活血调经。用于贫血性头晕,半身不遂,月经不调。

#### 7264108

*Lamiophlomis rotata* (Benth.) Kudo --- *Phlomis rotata* Benth. et Hook. f.

植物名 独一味《中国植志》

药材名 独一味《四川中药志》

地方名 青海:“打布巴”(藏语);四川:野秦艽(会理);西藏:“大巴”(藏语)。

功 效 根、根茎:有小毒。活血祛瘀,消肿止痛。用于跌打损伤,骨折,腰部扭伤;全草:用于浮肿后流黄水,关节积黄水,骨松质发炎。

#### 7264109

*Lamium album* L. --- *Lamium barbatum* auct. non Sieb. et Zucc.

植物名 野芝麻《东北草本植志》

药材名 野芝麻《名实图考》,〔东北〕

文献名 绛州续断《证类本草》,白花益母草、白益母草《名实图考》,〔续断〕《江苏植录》,短柄野芝麻《中国植志》,〔龙脑薄荷〕、地蚤《高植图鉴》

地方名 山芝麻(东北);吉林:〔白花菜〕,“得儿吉子”(朝名);辽宁:白菜菜;内蒙古:“倒的勒”(蒙名);浙江:〔续断子〕,〔胡麻〕(杭州),白酒药,三棱草;四川:白花野芝麻,山麦胡;贵州:包团草、泡花草(兴义);其他:上续断。

功 效 花冠:用于子宫、泌尿系统疾患,白带,月经不调。

备 考 古代的花益母草指本种。《东北草本植志》(1981)载称:《高植图鉴》(1974)、《中国植志》(1977)将本种学名误订为 *Lamium barbatum* Sieb. et Zucc. (粉花野芝麻,花的颜色为粉红色而非白色)。

#### 7264110

*Lamium album* L. var. *barbatum* (Sieb. et Zucc.) Franch. et Sav. --- *Lamium barbatum* Sieb. et Zucc.

植物名 粉花野芝麻《东北草本植志》

药材名 野芝麻《名实图考》、《汇编》

文献名 野脂麻《名实图考》

地方名 辽宁:山苏子(草河口);江苏:续断;浙江:糯米饭草、吸吸草(杭州、德清、镇海、上虞),白麻草(宁波),胃痛草(嘉善);湖南:野油麻,上蚕子(衡山);四川:地蚤(青川),野藿香(平武),山麦胡(南江);贵州:

包圍草, 泡花草。

**功效** 花或全草: 散瘀, 消积, 调经, 利湿。用于跌打损伤, 小儿疳积, 白带, 痛经, 月经不调, 肾炎, 膀胱炎; 花: 调经, 利湿。用于月经不调, 白带, 子宫颈炎, 小便不利。

#### 7264111

*Lamium amplexicaule* L.

植物名 宝盖草《中国植志》

药材名 宝盖草《名实图考》、《汇编》

文献名 接骨草、连台夏枯草、毛叶夏枯、灯笼草《滇南本草》, 珍珠莲《名实图考》, 佛座《植物学大辞典》

地方名 佛座草(江苏、云南); 甘肃: 陀螺草, 陀螺菜; 青海: “扎西个则”(藏语); 江苏: 蜡烛杆草; 浙江: 蜡烛台; 福建: 五塔草, 红帽草, 红虎仔花; 广西: 风盏, [连钱草], 大铜钱七, [益母草], 益母艾; 云南: 楼台接骨草, 灯笼花(丽江), 连台接骨草(昆明), 楼台夏枯草(玉溪); 西藏: “赞木噶”(藏语)。

**功效** 全草: 清热利湿, 活血祛风, 消肿解毒。用于黄疽型肝炎, 淋巴结核, 高血压, 面神经麻痹, 半身不遂。外用于跌打损伤, 骨折, 黄水疮。

#### 7264112

*Lamium formosanum* Nakai

植物名 台湾野芝麻(拟)

文献名 [泽兰]《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾: 鸡脚草。

**备考** 全草:《台湾中药材图鉴》称: 在台湾称泽兰, 是否同效, 待研究。

#### 7264113

*Leonurus glaucescens* Bunge

植物名 灰白益母草《中国植志》

文献名 粉绿益母草《汇编》

地方名 新疆: 新疆益母草, 益母蒿, 灰益母草。

**功效** 全草: 活血调经, 祛瘀生新。

#### 7264114

*Leonurus japonicus* Houtt. --- *Leonurus artemisia* (Lour.) S. Y. Hu --- *L. heterophyllus* Sweet

植物名 益母草《东北草本植志》

药材名 益母草《图经》、《药典》, 茺蔚子《本经》、《药典》

文献名 菴《诗经》, 菴《尔雅》, 臭秽《尔雅》刘敞注), 茺蔚、大札、益母、益明《本经》, 贞蔚《别录》, 苦低草、天麻草《千金方》, 郁臭草《本草拾遗》, 夏苦草、土质汗《近效方》, 野天麻、火杖、负担《经效产宝》, 辣母藤《履巉岩本草》, 夏枯草、益母夏枯《滇南本草》, 郁臭苗《救荒本草》, 猪麻《纲目》, 益母艾《生草药性备要》, 地母草、灯笼草、野麻《名实图考》, 蕺、千层塔、天芝麻、返魂丹、[透骨草]、目比也叱、牛颞、益母子、夏枯草子《新纲》, 扒骨风《分类草药性》, 红花艾《岭南采药录》, 枯草《药材资料汇编》, 红花益母草、四棱草《中药志》, 异叶益母草《东检》, 三角胡麻《汇编》

地方名 坤草(东北、河北、青海、江苏、江西、福建、湖北、四川、云南), 益母蒿(东北、华北、山东、云南), 益

母花(华东), 臭艾(江西、广东、广西), 野艾(陕西、广东), 茺玉子(河北、江苏), 旋风草(陕西、青海), 灯笼棵(江苏、安徽), 鸡母草(甘肃、福建), 落地艾(广东、广西); 河北: 四棱蒿, 四楞子棵, 风葫芦草, 车轱辘蒿, 风轱辘草, 玉米草, 红梗玉米膏, 黄木草; 内蒙古: “希木梯克布如”(蒙名); 甘肃: 全风赶(岷县), 转转草; 青海: 猫儿根, 骨节草; 山东: 山麻(莱阳), 田麻棵(平邑、沂水、滕县), 紫花益母草(泰山), 四楞蒿、老鼠粮(烟台), 风车儿草; 江苏: 田脂麻(徐州), 田芝麻棵(徐州、睢宁), 苦草子, 苦草(无锡、南通), 益母草子, 益母草花(常熟), 小暑草(宜兴), 天天开, 九重楼, 甜芝麻棵, 贮麻, 童子益母草, 小胡麻(清江、南通、镇江、泰州), 田芝麻棵种子、坤草种子(徐州); 浙江: 野黄麻, 六角天麻, 白气麻(象山), 溪麻, 九塔花, 铁麻干, 野芝麻; 安徽: 野火麻, 对月草; 江西: 爱母草(景德镇), 三角小胡麻, 臭草; 福建: 田芝麻(泉州), 鸭母草(厦门), 野故草, 油草, 野牧草, 益子草, 云母草; 台湾: 坤花; 湖北: 茺蔚草, 野芝麻根; 湖南: 油耙菜, 野油麻; 广东: 山青麻(潮汕), 山生麻(潮州), 红头艾(阳江), 大叶艾(增城、高鹤、阳春), 堕落艾(阳春), 棚头艾(兴宁), 婆乐艾、铎落艾、鸡鳃艾、当落尾(从化), 白花茶(连平), 白花条、假麦枯草(五华), 假青麻(海丰、陆丰、五华), 假夏枯草(惠来), 地肤子、六味草(饶平); 海南: 红花外一丹草、红艾(白沙), 艾草(澄迈), 假青麻草(临高), 蜂窝草(澄迈、琼海); 广西: 陀螺艾, 燕艾(田东), 柴乐艾(平南), 益母菜, 地落艾(陆川); 四川: 月母草, “虎马”(藏名), [青蒿], 玉米子草, 血母草; 云南: “芽米龙”(西双版纳傣语), 大臭草(傣语意译); 西藏: “森蒂”(藏语)。

**功效** 地上部分: 活血调经, 利尿消肿。用于月经不调, 痛经, 经闭, 恶露不尽, 急性肾炎水肿; 果实: 活血调经, 清肝明目。用于月经不调, 经闭, 痛经, 目赤翳障, 头晕胀痛。

#### 7264115

*Leonurus japonicus* Houtt. var. *albiflorus* --- *Leonurus artemisia* (Lour.) S. Y. Hu var. *albiflorus* (Migo) S. Y. Hu --- *L. sibiricus* L. var. *albiflorus* Migo

植物名 白花益母草《中国植志》

药材名 白花益母草(福建)

地方名 广西: 野毛草、油麻松(阳朔)。

**功效** 全草: 活血调经, 祛瘀生新。

#### 7264116

*Leonurus macranthus* Maxim.

植物名 大花繁缕《汇编》

药材名 大花繁缕《汇编》

文献名 大花益母草《中国植志》

地方名 白花益母草(河北、河南、江苏); 河南: 风筝棵。

**功效** 全草: 破瘀, 调经, 利尿。

#### 7264117

*Leonurus mongolicus* V. Kreczet. et Kupr.

植物名 蒙古益母草《东北药用植物》

药材名 益母草、茺蔚子(东北)

**功效** 带花全草地上部分或嫩苗: 活血调经, 祛瘀

生新,利尿消肿,降压。用于月经不调,闭经,痛经,产后出血过多,恶露不尽,产后瘀血腹痛,产后子宫收缩不全,胎动不安,胎漏难产,胎衣不下,子宫脱垂,赤白带下,崩中漏下。外用于牙龈肿痛,乳腺炎,丹毒,疖肿疔疮;果实(老蔚子):活血调经,清肝明目,疏风清热,利尿。用于目赤肿痛,目翳障,高血压病,月经不调,崩中带下,子宫脱垂,肾炎水肿。

**7264118**

*Leonurus pseudomacranthus* Kitagawa --- *Leonurus macranthus* auct. non Maxim. --- *Leonurus heterophyllus* auct. non Sweet

植物名 藜菜《中国植志》

药材名 藜菜《本草拾遗》、《汇编》

文献名 楼台草、玉容草《滇南本草》,白花益母草《名实图考》山玉米《高植图鉴》

地方名 河北:山玉米草;陕西:益母草。

功效 全草:破瘀,调经,利尿。用于产后腹痛,痛经,月经不调,肾炎水肿。

备考 过去有些文献曾将本种学名误订为 *Leonurus macranthus* Maxim. 或 *L. heterophyllus* Sweet。

**7264119**

*Leonurus pseudomacranthus* Kitagawa f. *leucanthus* Kitag. --- *L. heterophyllus* Sweet f. *leucanthus* (Kitag.)

植物名 白花藜菜(拟)

功效 全草:用于产后腹痛。

**7264120**

*Leonurus sibiricus* L. --- *L. manshuricus* Yabe

植物名 细叶益母草《中国植志》

药材名 益母草《汇编》

文献名 蕤《诗经》,蕤《尔雅》,大札、益母、益明《本草经》,贞蔚《别录》,郁臭草、苦低草《图经》,狭叶益母草《沙漠药植》,大花益母草《汇编》

地方名 坤草(东北、内蒙古、青海),益母蒿(吉林、东北、内蒙古);山西:风车草;内蒙古:“都日布勒吉·乌布斯”(蒙名),红龙昌菜,四美草,风葫芦草;陕西:石麻;其他:细裂叶益母草。

功效 地上部分:活血调经,利尿消肿。用于月经不调,痛经,经闭,恶露不尽,急性肾炎水肿;果实:活血调经,清肝明目。用于月经不调,经闭,痛经,目赤翳障,头昏胀痛。

备考 本种分布仅限于内蒙古以东,长城南北及东北地区。主流益母草仍为 *Leonurus japonicus* Houtt.

**7264121**

*Leonurus sibiricus* L. f. *albiflorus* (Nakai & Kitagawa) C. Y. Wu et H. W. Li --- *L. manshuricus* Yabe f. *albiflorus* Nakai & Kitagawa

植物名 白花细叶益母草《品种论述》

功效 全草:活血调经,利尿消肿。

**7264122**

*Leonurus tararicus* L.

植物名 兴安益母草《中国植志》

文献名 三裂益母草《吉野》

功效 全草:活血调经,利尿消肿。

**7264123**

*Leonurus turkestanicus* V. Krecz. et Kupr.

植物名 突厥益母草《中国植志》

药材名 新疆益母草《新疆药植志》

文献名 土耳其益母草《中药大辞典》

地方名 新疆:益母草。

功效 全草:活血调经,利尿消肿。

**7264124**

*Leucas aspera* (Willd.) Link

植物名 蜂巢草《中国植志》

药材名 蜂巢草《新华本草纲要》

地方名 海南:蜂窠草。

功效 全草:发散风寒,化痰止咳。用于百日咳,风寒咳嗽,上感发热,风火牙痛,咽喉炎,蜂窠疮。

**7264125**

*Leucas ciliata* Benth.

植物名 绣球防风《中国植志》

药材名 绣球防风《滇南本草》、《汇编》

文献名 白元参《玉龙山药植》

地方名 四川:蜂窠花,“灵红六”(会东彝语);贵州:抱团草,泡花草(兴义);云南:绣球草(楚雄、腾冲、镇康、保山),蜜蜂草(腾冲、保山),紫药(红河),蜂窠草(保山),“牙冬卖蒿”(西双版纳傣语),阿土,小萝卜,月亮花(屏边),疙瘩草(腾冲),抛团(镇康),“克服拿朴”(红河),拂风草。

功效 全草及根:祛风散寒,健胃消食。用于风寒感冒,风湿关节痛疼,食欲不振,小儿疳积。外用于疮疡肿毒。

**7264126**

*Leucas martinicensis* R. Br.

植物名 卵叶白绒草《中国植志》

功效 全草:用于瘰病。

**7264127**

*Leucas mollissima* Wall.

植物名 白绒草《中国植志》

药材名 白绒草《云南中草药》

文献名 毛绣球防风《广西药录》,白风轮菜《汇编》

地方名 台湾:金线薄荷,白花草,鼠尾蕨;广东:节节花(澄海),老虎花(揭阳),白花仔(潮安),白骨九苏(饶平),白花茶匙红(潮汕),白花塔仔草(南澳);四川:野芝麻,猫耳朵草,一包针;云南:银针七(临沧),灯笼草(楼台夏枯草)、北风草(红河),银叶七(临沧、永德),灯笼花(麻栗坡)。

功效 全草:清肺止咳,解毒。用于肺热咳嗽,咯血,感冒发热,百日咳,支气管炎,小儿疳积,骨折,跌打瘀肿,肾虚,遗精,阳痿。外用于疖肿,乳腺炎。

**7264128**

*Leucas mollissima* Wall. var. *chinensis* Benth.

植物名 疏毛白绒草《高植图鉴》

文献名 疏毛银针七《云南植志》，疏毛银叶七《云南种录》

地方名 台湾：白花仔草，金钱薄荷，鼠尾癭；海南：引生草（临高），皱面草（文昌）；四川：节节香（峨眉山），野芝麻（江津）；其他：白芥穗。

功效 全草：驱寒发表。用于驱寒发表。外用于洗疮毒。

#### 7264129

*Lucas zeylanica* (L.) R. Br.

植物名 绞面草《中国植志》

药材名 蜂窠草《云南药录》

文献名 锡兰绣球防风《广西药录》，顶序绣球防风《广西植录》

地方名 广东：蜂巢草，打毒金；海南：半夜花（儋县）；广西：大头陈（龙州）；云南：绣球防风。

功效 全草：疏风散寒，化痰止咳。用于感冒，头痛，牙痛，咳嗽，咽喉炎，百日咳，支气管哮喘。

#### 7264130

*Leucoscepturn canum* Smith

植物名 米团花《中国植志》

文献名 白杖木《科属词典》

地方名 云南：蜂蜜树、蜂糖树、大灰果、山蜂蜜（红河），渍糖花，蜜蜂树花，明堂花，渍糖树（屏边），羊巴巴（保山）。

功效 叶、皮：清热解毒，利湿消肿，止血。用于皮肤溃瘍，外伤出血，无名肿毒，骨折，骨髓炎，肌炎，高热无汗无涕，肺结核等症。

#### 7264131

*Lycopus coreanus* Levl.

植物名 小叶地笋《中国植志》

文献名 朝鲜地瓜儿苗《中药大辞典》

功效 茎、叶：活血化癥，行水消肿。

#### 7264132

*Lycopus europaeus* L.

植物名 欧地笋《中国植志》

文献名 羽裂地笋《汇编》，小地瓜儿苗《中国植物图鉴》，欧地瓜儿苗《中药大辞典》

地方名 河北：地瓜儿苗，地笋；新疆：泽兰。

功效 茎、叶：活血化癥，行水消肿。

#### 7264133

*Lycopus lucidus* Turcz.

植物名 地笋《嘉祐本草》、《中国植志》

药材名 泽兰《图经》、《汇编》

文献名 小泽兰《雷公炮炙论》，地瓜儿苗、地瓜儿、地瓜《救荒本草》，红梗草《滇南本草》，地笋子、地蚕子《草木便方》，地藕《分类草药性》，接古草《植物名汇》，玉环菜《满鲜植汇》，甘露秧《中药材手册》，〔水三七〕、野三七《民药汇编》，方梗泽兰《简明中医辞典》

地方名 地环（内蒙古、山东、东北），地环秧、地溜秧（东北、河北），地参（上海、云南），银条菜（河北、云南），接骨草、螺丝钻（东北）；河北：地瓜拉，地溜根，地叭啦，旱藕，土泽兰，提葵；内蒙古：“给拉嘎尔-都日布勒吉-

乌布斯”，“出来默刀各”（蒙名），地梨：陕西：草泽兰；甘肃：地占牛；青海：扒牛草；山东：地瘤子根（郯城、费县、蒙山），山地苗（栖霞），甘露（泰山），山地萎、白花四棱蒿（烟台），野甘露秧；浙江：水地蚕（天目山）；四川：旱藕，小升麻，地筒子，地源子，别甲藕；贵州：麻泽兰（兴义），〔土人参〕。

功效 茎、叶：活血化癥，行水消肿。用于月经不调，经闭，产后瘀血腹痛，水肿。

#### 7264134

*Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel --- *L. lucidus* Turcz. var. *formosanus* Hayata

植物名 毛叶地笋《中草药学》

药材名 泽兰《图经》，《药典》

文献名 小泽兰《雷公炮炙论》，地笋《嘉祐本草》，地瓜儿苗、地瓜儿、地瓜《救荒本草》，红梗草《滇南本草》，毛叶地瓜儿苗《药典》，硬毛地瓜儿苗《高植图鉴》，台湾地瓜儿苗《中药大辞典》，毛地笋《汇编》

地方名 地环（河北、山东、东北），地藕（广东、四川），旱藕（广东、四川），方梗草、竹节草、〔土人参〕、地人参（江苏、上海），地筒子、地源子、别甲藕（江苏、四川）；吉林：矮地瓜苗；河北：地喇叭；山西：地罗子；内蒙古：野麻花；陕西：地瘤，地环子，地石蚕；山东：地瘤子根（郯城、费县、蒙山），山地苗（栖霞），甘露（泰山），野甘露秧、白花四棱蒿、山地萎（烟台）；江苏：地藕秧子（清江），泽兰叶（苏州、清江、睢宁、泰县），甘萎棵子（邳县），大安叶（云台山），白母（无锡），田瓜苗，水香；浙江：水蚕子（临安）；安徽：甘露子，香炉子，蚕蛹子；江西：观音笋，田螺菜；福建：野生地；湖北：洋参，地牛七、冷草（利川），山螺丝（鹤峰）；湖南：银条菜；广东：假油麻，扎兰，接古草，蛇王草；广西：〔蛇总管〕（昭平）；四川：地笋子，野地藕；贵州：麻泽兰。

功效 茎、叶：活血化癥，行水消肿。用于月经不调，经闭，产后瘀血腹痛，水肿。

#### 7264135

*Lycopus lucidus* Turcz. var. *maackianus* Maxim. ex Herd. --- *L. maackianus* (Maxim.) Makino --- *L. angustus* Makino

植物名 异叶地笋（拟）

文献名 狭叶地瓜儿苗《中药大辞典》，马氏地瓜苗《吉野》，异叶地瓜苗《东北草本植志》，矮地笋《东北植药图志》

地方名 泽兰（吉林、黑龙江）。

功效 茎、叶：活血化癥，行水消肿。

#### 7264136

*Lycopus parviflorus* Maxim.

植物名 小花地笋《中国植志》

文献名 小花地瓜苗《东检》，小花地瓜儿苗《中药大辞典》，地瓜儿苗《牧野日图》

功效 茎、叶：活血化癥，行水消肿。

备考 泽兰（吉林）。

#### 7264137

*Marrubium vulgare* L.

- 植物名 欧夏至草《中国植志》  
功效 全草：用于呼吸器官的慢性病。
- 7264138**  
*Meehania fargesii* (Levl.) C. Y. Wu  
植物名 华西龙头草《中国植志》  
文献名 华西美汉花《植分学报》  
地方名 四川：水升麻(米易)，铁板青(峨眉)；贵州：野油麻。  
功效 全草：清热，解毒，消炎。用于感冒，白喉。
- 7264139**  
*Meehania fargesii* (Levl.) C. Y. Wu var. *pedunculata* (Hemsl.) C. Y. Wu  
植物名 梗花华西龙头草《新华本草纲要》  
文献名 具梗美汉花《广西药录》，疏麻菜《广西植录》，梗花龙头草《云南植志》  
地方名 广西：发口菜(隆林)；四川：山苏麻(叙永)，苏麻菜。  
功效 根叶：用于牙痛；全草：用于腹泻。
- 7264140**  
*Meehania fargesii* (Levl.) C. Y. Wu var. *radicans* (Vaniot) C. Y. Wu  
植物名 走茎华西龙头草《贵州药录》  
文献名 走茎龙头草《云南植志》  
地方名 江西：木樨臭(婺源)；贵州：红紫苏(梵净山)。  
功效 全草：用于风寒感冒，蛇咬伤。
- 7264141**  
*Meehania henryi* (Hemsl.) Sun ex C. Y. Wu  
植物名 龙头草《中国植志》  
文献名 长穗美汉花《植分学报》  
地方名 湖北：鲤鱼草(巴东)。  
功效 叶：外用于蛇咬伤；根：补血。
- 7264142**  
*Meehania henryi* (Hemsl.) Sun ex C. Y. Wu var. *kaitcheensis* (Levl.) C. Y. Wu  
植物名 长叶龙头草《贵州药录》  
功效 全草：发散风寒，理气止痛。用于感冒，白喉。
- 7264143**  
*Meehania urtioifolia* (Miq.) Makino  
植物名 蕁麻叶龙头草《中国植志》  
文献名 美汉花《植分学报》，芝麻花《高植图鉴》  
地方名 四川：龙头草(峨眉山)。  
功效 全草：清热，解毒，消肿止痛。
- 7264144**  
*Melissa axillaris* (Benth.) Bakh.f.  
植物名 蜜蜂花《中国植志》  
药材名 鼻血草《四川中草药》  
文献名 [土荆芥]《名实图考》，滇荆芥《种称》  
地方名 广西：水风轮(钟山)；四川：红活美(峨眉)，小薄荷(米易)，麻杆草(酉阳)，野合香(夹江)；贵州：红薄荷；云南：小方杆草(文山)，野薄荷。

- 功效 全草：清热，解毒，止血。用于吐血，鼻出血，麻风，皮肤瘙痒，疥疮。
- 7264145**  
*Melissa officinalis* L.  
植物名 香蜂花《中国植志》  
功效 叶：镇静，解痉。
- 7264146**  
*Mentha arvensis* L. var. *malinvaudi* (Levl.) C. Y. Wu et H. W. Li  
植物名 龙脑薄荷(汇编)  
药材名 龙脑薄荷(本草衍义)、(汇编)  
文献名 龙脑薄荷(汇编)  
地方名 薄荷(江苏、广西)。  
功效 地上部分：散风热，清头目。
- 7264147**  
*Mentha cordifolia* Opiz ex Fresen. --- *Mentha citrata* auct. non Ehrh.  
植物名 心叶留兰香《药学报》  
地方名 浙江：留兰香(杭州)。  
功效 地上部分：祛风解表。  
备考 《中国植志》(1977)将本种误订为 *M. citrata* Ehrh. (柠檬留兰香)。
- 7264148**  
*Mentha crispata* Schrad. ex Willd.  
植物名 皱叶留兰香《中国植志》  
地方名 贵州：土薄荷(贵阳)。  
功效 全草：清表散热，祛风消肿。用于感冒，火眼，衄血，小儿疳疮。  
备考 原产欧洲。上海、南京、北京、杭州等地习见栽培。
- 7264149**  
*Mentha dahurica* Fisch. ex Benth.  
植物名 兴安薄荷《中国植志》  
地方名 野薄荷(东北)。  
功效 地上部分：散风热，清头目。
- 7264150**  
*Mentha gentilis* L.  
植物名 光叶薄荷《药学报》  
功效 地上部分：有抗病毒作用。  
备考 产欧洲、原苏联及北美洲。我国上海有栽培。
- 7264151**  
*Mentha gracilis* Sm.  
植物名 纤细留兰香《药学报》  
功效 留兰香油：祛风解表。  
备考 上海发现在薄荷商品中混杂有本品。
- 7264152**  
*Mentha canadensis* L. - *M. haplocalyx* Briq. --- *Mentha arvensis* L. var. *haplocalyx* Briq.  
植物名 薄荷(名实图考)、《中国植志》(外文版)  
药材名 薄荷《雷公炮炙论》、《药典》  
文献名 芡苦《千金方》，蕃荷、蕃荷菜《千金·食治》，

薄荷、旱薄荷《食性本草》，南薄荷《本草衍义》，猫儿薄荷《瀛嶠岩本草》，野薄荷《滇南本草》，薄荷《品汇精要》，藜薄荷《本草蒙筌》，薄荷露《纲目拾遗》，薄荷油《重庆堂随笔》，夜息花《植物名汇》，人丹草、薄荷草《药材学》。

地方名 土薄荷(江苏、浙江、安徽、四川)，水薄荷(广东、四川、云南)，山薄荷(山东、广东)；内蒙古：“古茹戈巴”、“吉日各巴”(蒙名)；山东：紫薄荷(牙山)，眼药草(烟台)，夜息香；江苏：苏薄荷(苏州)，仁丹草(云台山、盱眙)，野仁丹草，苏荷，见肿消；上海：苏苏叶；安徽：小薄荷；江西：香薄荷、家薄荷(德兴)；福建：蕃荷叶(周宁)；湖北：凉喉草，臭香草(恩施)；广东：金不换，番桔仔(惠来)，白薄荷(汕头)，香花草(五华)，生薄荷，龙头薄荷(潮阳)；四川：“陆姆”(藏名)，不荷；云南：水益母，升阳菜、[接骨草](昆明)，“荒嫩”(西双版纳傣语)，楚薄荷；西藏：“古尔蒂”(藏语)。

功效 地上部分：宣散风热，清头目，透疹。用于风热感冒，风温初起，头痛，目赤，喉痹，口疮，风疹，麻疹，胸胁胀闷；薄荷油及薄荷脑：芳香药，调味药及驱风药、用于皮肤或粘膜，产生清凉感以减轻不适及疼痛。

#### 7264153

*Mentha haplocalyx* Briq. var. *haplocalyxoides* K. M. Dai  
--- *Mentha haplocalyxoides* K. M. Tai

植物名 平叶留兰香《中药志》

功效 留兰香油：祛风解表。

备考 在上海发现在薄荷商品中混杂有本种。

#### 7264154

*Mentha piperita* L.

植物名 辣薄荷《中国植志》

药材名 辣薄荷《中草药学》

文献名 欧薄荷《汇编》

地方名 江苏：胡椒薄荷。

功效 地上部分：有抗腺病毒作用。

#### 7264155

*Mentha piperita* L. var. *citriodora* G. F. Meyer

植物名 柠檬辣薄荷《药学报》

功效 地上部分：有抗病毒作用。

#### 7264156

*Mentha piperita* L. f. *pallens* Camus

植物名 白辣薄荷《药学报》

功效 地上部分：有抗病毒作用。

#### 7264157

*Mentha piperita* L. f. *rubescens* Camus

植物名 黑辣薄荷《药学报》

功效 地上部分：有抗病毒作用。

#### 7264158

*Mentha pulegium* L.

植物名 唇萼薄荷《中国植志》

功效 地上部分：有抗病毒作用。

#### 7264159

*Mentha rotundifolia* (L.) Huds.

植物名 圆叶留兰香《药学报》

药材名 鱼香草《分类草药性》、《四川中药志》

文献名 鱼香根《分类草药性》，留兰香《四川中药志》，圆叶薄荷《中国植志》

地方名 四川：土薄荷，鱼香；贵州：血香菜，狗肉香，狗薄荷。

功效 茎叶或嫩枝头：散风热，消肿毒。用于伤风感冒，胃气痛，鼻衄，目赤，疔疮热疖。

备考 《药学报》(1981)称：本品含藏茴香酮(Carvone)，故其原植物应称为“圆叶留兰香”，而非圆叶薄荷。

#### 7264160

*Mentha sachalinensis* (Briq.) Kudo f. *arguta* (Kitagawa)

Y. C. Chu --- *Mentha sachalinensis* (Briq.) Kudo var. *arguta* Kitagawa

植物名 狭叶野薄荷《东北药用植物》

药材名 野薄荷(东北)

功效 全草：驱风散热，清利头目，解表，通窍，疏肝，利胆，清咽，辟秽，解毒。用于风热感冒，头痛，目赤，鼻塞流涕，咽喉肿痛，牙痛，食滞气胀，胸闷肋痛，恶心呕吐，肝气不舒，口疮，疮疥，瘾疹，皮肤瘙痒。

#### 7264161

*Mentha spicata* L. --- *Mentha viridis* L.

植物名 留兰香《中国植志》

药材名 留兰香《汇编》

文献名 南薄荷、升阳菜《滇南本草》，香花菜《生草药性备要》，绿薄荷《药材学》

地方名 上薄荷(贵州、云南)，青薄荷(广东、贵州)，狗肉香(广西、贵州)，皱叶薄荷(广西、云南)；广东：香薄荷；广西：狗肉香菜(百色)，假薄荷(德保)；四川：鱼香，鱼香草；贵州：血香菜(毕节)，鱼香菜(独山)；云南：滇南薄荷。

功效 地上部分：祛风散寒，止咳，消肿解毒。用于感冒咳嗽，胃痛，腹胀，神经性头痛。外用于跌打肿痛，眼结膜炎，小儿疮疖。

#### 7264162

*Mentha spicata* L. var. *spadana* (Briq.) K. M. Tai

植物名 小叶留兰香《药学报》

功效 地上部分：祛风散表。

#### 7264163

*Mesona chinensis* Benth. --- *Mesona procumbens* Hemsl.

植物名 凉粉草《中国植志》

药材名 凉粉草《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 仙人草《职典方》，仙人冻《纲目拾遗》

地方名 仙草(浙江、台湾、广东、广西)；浙江：山苏(云和)；广东：草棵草(潮安)，仙人拌，仙牛拌[加工品](梅县)，凉粉(广州)。

功效 全草：清热利湿，凉血解暑。用于急性风湿性关节炎，高血压，中暑，感冒，黄疸，急性肾炎，糖尿病。

#### 7264164

*Micromeria barosma* (W. W. Smith) Hand. - Mazz.

植物名 小香薷(云南)、《中国植志》

药材名 小香薷《汇编》

文献名 姜味草、小香草、小姜草《汇编》

功效 全草：祛风解表，温中除湿。用于感冒咳嗽，胃痛，急性肠胃炎，消化不良，腹胀，腹痛，疝气痛，预防痢疾。

#### 7264165

*Microtoena biflora* (Buch.-Ham ex D. Don) Benth.

植物名 姜味草《中国植志》

药材名 姜味草《滇南本草》、《新华本草纲要》

地方名 云南：地生姜、小姜草、小香草（昆明、红河、曲靖、富源），香草、小香薷（丽江），灵芝草（子甸），柏枝草、胡椒草（曲靖），桂子香（富源）。

功效 全草：温中理气，止痛。用于吐逆，噎膈，胃病，腹痛，寒疝疼痛。

#### 7264166

*Microtoena delavayi* Prain

植物名 云南冠唇花《中国植志》

文献名 西南冠唇花《汇编》，野香薷《云南药录》

地方名 四川：野大麻（峨眉）。

功效 全草：用于腹痛，风湿痛。

#### 7264167

*Microtoena insuavia* (Hance) Prain ex Dunn

植物名 冠唇花《中国植志》

地方名 广藿香（海南、云南）；云南：“牙皮湾”、“牙虹泵”（西双版纳傣语），“班草刚”（潯西景颇族语），野藿香（思茅）。

功效 全草：芳香健胃，温中理气。用于感冒风寒，咳嗽气急，消化不良，气胀腹痛，肠炎，痢疾。

#### 7264168

*Microtoena omeiensis* C. Y. Wu et Hsuan

植物名 峨眉冠唇花《中国植志》

文献名 麻叶冠唇花《植分学报》

地方名 四川：四菱香、大叶紫苏、野大麻（峨眉）。

功效 全草：用于外感风寒。

#### 7264169

*Microtoena patchouli* (C. B. Clarke) C. Y. Wu et Hsuan

植物名 滇南冠唇花《中国植志》

药材名 野土藿香《云南药录》

文献名 野香薷《高植图鉴》

地方名 云南：[藿香]（景东、龙陵），[香薷]（耿马、梁河），野藿香、土藿香（梁河），“班草刚”（潯西景颇语），“牙皮湾”（西双版纳傣语）。

功效 全草：用于感冒风寒，喘咳气急，消化不良，气胀腹痛，肠炎痢疾，小儿腹泻。

#### 7264170

*Microtoena pauciflora* C. Y. Wu et Hsuan

植物名 少花冠唇花《中国植志》

文献名 疏花藿香《云南药录》

地方名 云南：[藿香]（腾冲）。

功效 全草：止痛。用于感冒头痛，腹痛。

#### 7264171

*Microtoena vanchingshanensis* C. Y. Wu et Hsuan

植物名 梵净山冠唇花《中国植志》

药材名 梵净山冠唇花《贵州药录》

功效 全草：发表散寒，温中理气。用于感冒，胃气不舒，消化不良。

#### 7264172

*Mosla cavaleriei* Levl. --- *Orthodon cavaleriei* (Levl.) Kudo

植物名 小花荠苎《中国植志》

药材名 细叶七星剑《岭南草药志》

文献名 小叶不红、假芥兰、早色草《生草药性备要》，独行千里《本草求原》，小花薄荷《植分学报》，小叶荠苎《广西药录》

地方名 广东：野香薷，细种独行千里（新会），兰花草，矮麻脚，香薷、石辣草、花药儿、[土细辛]（南雄、始兴、连南），[荆芥]；广西：土荆芥（平南），薄荷，酒饼叶；贵州：排子草（正安）。

功效 全草：发汗解暑，健脾利湿，止痒，解蛇毒。用于感冒，中暑，急性胃肠炎，消化不良，水肿。外用：于湿疹，疮疖肿毒，跌打肿痛，毒蛇咬伤。

#### 7264173

*Mosla chinensis* Maxim. --- *Orthodon chinensis* (Maxim.) Kudo -- *Mosla fordii* Maxim. --- *Orthodon fordii* (Maxim.) Hand. -Mazz.

植物名 石香薷《开宝本草》、《中国植志》

药材名 香薷（浙江、江西）、《汇编》

文献名 石香薷《四声本草》，石香菜、石苏《开宝本草》，细叶荠苎《广西植录》，蚊子香、华香薷《现代实用中药》，华荆芥《广西中药志》

地方名 细叶香薷（江西、湖北、湖南、广西），青香薷、华荠苎（广西、湖南），香薷草（安徽、福建、湖南、广西），小香薷（江西、贵州），土香薷、[土荆芥]（浙江、广西），七星剑（广东、广西），[荆芥]（江苏、广西），野荆芥（浙江、安徽、湖北），排子草（安徽、江西），蓼刀竹、小叶香薷（江西、福建、广东、广西、四川）；江苏：臭荆芥、雨芥、闹芥（云台山）；浙江：五香草、痧药草（平湖、海盐），山茵陈，野紫苏，香芥；江西：荠苎，香草（宜黄），[满山香]（吉安），小茴香（定南），广香薷，中华石荠苎，无花香薷，香草子、痧草子（泰和），江香薷，铜草；福建：香薷仔，石花子草（宁化）；湖北：小荆芥（来凤）；广东：野香薷，细叶七星剑，凉粉草，仙人冻、石辣子（惠阳），还魂草（罗浮山）；广西：石艾（桂平、陆川、苍梧），独行千里，土香草（马山），神曲草（北流），细心草（罗城），香芋（隆林、柳州、苍梧），香茹草、沙药（临桂），大痧药，痧药儿，神芥、凉芥（桂林），小叶荠苎，大叶七星剑（钟山）；贵州：辣辣草、[土黄莲]（正安）。

功效 全草：发汗解表，和中利湿。用于暑湿感冒，恶寒发热无汗，腹痛，吐泻。

#### 7264173a

*Mosla chinensis* Maxim. cv. Jiangxianru

植物名 江香薷《云南植物研究》

药材名 江香薷《药材资料汇编》

地方名 江西：香薷。



**功效** 全草：发汗解表，和中利湿。用于暑湿感冒，恶寒发热无汗，腹痛，吐泻。

#### 7264174

*Mosla dianthera* (Buch.-Ham.) Maxim. --- *Orthodon diantherus* (Buch.-Ham.) Hand.-Mazz. --- *Mosla remotiflora* Sun

**植物名** 小鱼仙草《中国植志》

**药材名** 小鱼仙草《名实图考》、《汇编》

**文献名** 小仙草《滇南本草》，石荠苎《名实图考》，姬紫苏《和汉药植》，双花石荠苎、臭苏、青白苏《和汉药标本目录》，疏花荠苎《种称》

**地方名** 痲子草(江西、福建、四川)，热痲草(广东、广西)，[荆芥](江苏、湖北、广西)，[土荆芥](湖南、广东、广西)，野荆芥(江西、广西)；江苏：山荆芥(新海连)；浙江：黑紫子(淳安)；江西：大叶香薷，野香薷；福建：四方草(福安)，臭草、小本土荆芥(福州)；湖北：止血草；湖南：大叶香薷(衡山)；广东：月味草(乐昌、惠阳、大埔)，红花月味草，姜芥，干汗草，假鱼香，香花草；广西：细薄荷(桂平)，荆芥草(昭平)，假荆芥；贵州：水菟菜(独山)，山苏麻。

**功效** 全草：祛风发表，利湿止痒。用于感冒头痛，扁桃体炎，中暑，溃疡病，痢疾。外用于湿疹，痱子，皮肤瘙痒，疮疖，蜈蚣咬伤。

**备考** 《新华本草纲要》(1988)称：《名实图考》载云：石荠苎“滇南呼为小鱼仙草”。观其图应为本种，而所引《本草拾遗》的文字描述，则应为同属植物石荠苎 *Mosla scabra* (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li.

#### 7264175

*Mosla formosana* Maxim.

**植物名** 台湾荠苎《中国植志》

**药材名** 台湾香薷《品种论述》

**地方名** 台湾：上牛七，[土牛膝]，一枝香，铁木棍。

**功效** 全草：祛风发表。

#### 7264176

*Mosla grosseserrata* Maxim. --- *Orthodon grosseserratum* (Maxim.) Kudo

**植物名** 荠苎《中国植志》

**药材名** 荠苎《唐本草》、《汇编》

**文献名** 臭苏、青白苏《日华子本草》，粗齿荠苎《浙江药植志》

**地方名** 贵州：水菟菜。

**功效** 根：宣肺平喘。用于哮喘。

#### 7264177

*Mosla hangchowensis* Matsuda --- *Orthodon hangchowensis* (Matsuda) C. Y. Wu

**植物名** 杭州石荠苎《中国植志》

**文献名** 杭州荠苎《浙江药植志》

**功效** 全草：发汗解表，和中利湿。

#### 7264178

*Mosla longibractea* (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li

**植物名** 长苞荠苎《中国植志》

**药材名** 长苞荠苎《贵州药录》

**地方名** 贵州：荠苎(湄潭)。

**功效** 全草：清热解暑，祛风解暑。用于风寒感冒，中暑腹痛，呕吐，腹泻，咳嗽

#### 7264179

*Mosla scabra* (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li --- *Orthodon scaber* (Thunb.) Hand. Mazz. --- *Mosla lanceolata* (Benth.) Maxim. *Mosla punctata* (Thunb.) Maxim. --- *Orthodon lanceolatus* (Benth.) Kudo --- *Orthodon punctulatum* (J. F. Gmelin) Ohwi

**植物名** 石荠苎《中国植志》

**药材名** 石荠苎《本草拾遗》、《汇编》

**文献名** 鬼香油《纲目拾遗》，香茹草、痲子草《分类草药性》，斑点石荠苎《拉汉种称》，毛荠苎《东检》，天香油《民间药与验方》，粗糙荠苎《中药大辞典》，斑点荠苎《种称》，狭叶荠苎《广西本草选编》

**地方名** 野升麻(浙江、四川)，野荆芥(湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州)，野薄荷(湖北、福建)，土荆芥(江西、福建、湖南、广东、广西)，热痲草(浙江、广东)，沙虫药(广西、贵州)，红痲子草(江苏、四川、贵州)；陕西：荆苏麻；江苏：紫花草，叶进根(江宁)，水芥；浙江：香草，野芥菜，白鹤草；江西：北风头上一枝香(景德镇)，小苏金(宜黄)，野苏叶，野香薷，干汗草；福建：野棉花(建瓯)，野香茹，土芥穗(泉州)，蜻蜓花(南平)，月斑草(宁化)；河南：母鸡窝(南昭)；湖北：止血草；湖南：大叶香薷(衡阳)；广东：假鱼香(从化、增城、罗定)，香花草、多花草(顺德)，红花热痲草(饶平、五华)，红花热味草；广西：假紫苏(平南)，大荆芥；四川：土香薷草(重庆)；贵州：水苏麻(贵阳)，水菟菜(独山)。

**功效** 全草：疏风清暑，行气理血，利湿止痒。用于感冒头痛，咽喉肿痛，中暑，急性胃肠炎，痢疾，小便不利，肾炎水肿，白带；全草炒炭：用于便血，子宫出血。外用于跌打损伤，外伤出血，痱子，皮炎，湿疹，脚癣，多发性疖肿，毒蛇咬伤。

#### 7264180

*Mosla soochowensis* Matsuda --- *Orthodon soochowensis* (Matsuda) C. Y. Wu

**植物名** 苏州荠苎《中国植志》

**药材名** 五香草《浙江民药》

**地方名** 浙江：土香薷，土荆芥、天香油(台州)，香草(龙泉)，粉药草，小叶香薷，小叶天香油，野香草。

**功效** 全草：解表，理气止痛。用于中暑，感冒，胃痛，扁桃体炎。外用于蜈蚣咬伤。

#### 7264181

*Nepeta angustifolia* C. Y. Wu

**植物名** 藏荆芥《中国植志》

**地方名** 西藏：“丢丢那博”(藏语)。

**功效** 花、叶：用于抽风症。

#### 7264182

*Nepeta cataria* L.

**植物名** 心叶荆芥《汇编》

**药材名** 心叶荆芥《汇编》

**文献名** 荆芥《中国植志》，锐萼薄荷《牧野日图》，白

花荆芥《科裁》,假荆芥《中药大辞典》,拟荆芥《云南种录》

地方名 薄荷(陕西、四川),上荆芥(四川、西藏);甘肃:[香薷];湖北:山薷香,假苏,小荆芥;广西:樟脑草(南宁);四川:凉薄荷(南川),[大茴香],小薄荷(青川),巴毛(奉节)。

功效 全草:祛风发汗,解热透疹,散瘀消肿,止血止痛。用于伤风感冒,头痛发热,跌打损伤,吐血,衄血,外伤出血,毒蛇咬伤,疔疮疖肿。

#### 7264183

*Nepeta laevigata* (D. Don) Hand.-Mazz.

植物名 穗花荆芥《中国植志》

地方名 云南:荆芥(曲靖、昭通)。

功效 全草:用于解表。

#### 7264184

*Nosema cochinchinensis* (Lour.) Merr.

植物名 龙船草《中国植志》

药材名 龙船草(海南)

文献名 全缘萼《植分学报》,印支龙船草《品种论述》

地方名 海南:假麦枯草,狗尾射草(儋县、临高),青缸草、红色草(澄迈),露水草(临高);广西:[夏枯草](博白),假夏枯草。

功效 花:清肝火,散郁结。用于痈肿疮毒,目赤肿痛,瘰癧。

#### 7264185

*Ocimum americanum* L.

植物名 灰罗勒《中国植志》

功效 叶:外用于皮肤病。

#### 7264186

*Ocimum basilicum* L.

植物名 罗勒《中国植志》

药材名 罗勒《博物志》、《广西中药志》

文献名 西王母菜《本草经集注》,兰香《齐民要术》,兰香子《海上名方》,香菜《嘉祐本草》,翳子草《纲目》,香草《纲目拾遗》,零陵香《名实图考》,薰香花草《植物名汇》,光明子《饮片新参》,千层塔、九层塔、香花子《岭南采药录》,矮糠《种称》,鸭舌草《广西药录》,鸭香草《广西植录》,野金砂《中国药植图鉴》,醒头香《药学报》

地方名 家佩兰(江苏、江西、福建),[佩兰](江苏、山东),省头草(江苏、江西、福建、湖北),鸭香(广东、广西),九重塔(湖南、广东),[荆芥](江西、河南、湖北),蒿里(河南、云南),蒿黑(四川);辽宁:[霍香],火香(营口);北京:薰草,薰草零陵香;新疆:缠头花椒;山东:香佩兰;江苏:小兰花,僧官帽、红芍药(无锡、泰州),家薄荷、针针菜(江宁),樟脑草,菜荆芥(句容);上海:倍兰(上名);浙江:奶甜草、洋佩兰(嘉兴),香头草;江西:香叶草;台湾:蔡板草;河南:香荆芥;湖北:大叶香,[见血愁];广东:鱼生菜(潮安),豆腐香(阳春),鱼香草、薄荷罗勒(惠阳),香菜里、饼花(五华),[金不换](潮阳),金骨蒜、香菜纸、高层塔(光宁),鱼香,茹香;海南:薄荷

树;广西:小叶薄荷(河池),五香草,紫苏薄荷,[苏薄荷](梧州),洋烟米(桂平),丁香(大瑶山),一串兰(武鸣),云芳香草。

功效 全草:疏风解表,消肿止痛;茎叶:用于外感风热,跌打损伤,胸闷不舒,胃脘气胀,痉挛,闭经;种子:用于目赤肿痛。

#### 7264187

*Ocimum basilicum* L. var. *pilosum* (Willd.) Benth.

植物名 毛罗勒《高植图鉴》

药材名 罗勒《名实图考》、《汇编》

文献名 [假苏]、[荆芥]、姜芥、稳齿菜《滇南本草》,光明子《饮片新参》,疏柔毛罗勒《云南植志》

地方名 香草(山东、浙江、湖北、湖南、北京、福建、云南),九层塔(台湾、湖北、福建、广东、广西),[家佩兰](江西、福建),省头草(江苏、江西、福建);北京:香菜,翳子草,矮糠,薰草;新疆:缠头花椒;山东:山东佩兰,[佩兰],香佩兰;江苏:药佩兰(泰兴),[家薄荷],光明子结;浙江:香头草;江西:香叶草;福建:兰香;湖北:醒头香,省头香,胡椒菜,[土荆芥];湖南:滚龙珠;广西:鸭香,小叶薄荷;四川:筋骨钻,蒿黑(会理);云南:"牙广哥"(西双版纳傣语),芳香草。

功效 全草:发汗解表,祛风利湿,散瘀止痛。用于风寒感冒,头痛,胃腹胀满,消化不良,胃痛,肠炎腹泻,跌打肿痛,风湿关节痛。外用于蛇咬伤,湿疹,皮炎。

备考 佩兰为菊科植物。山东、江苏等个别地区误以本种为佩兰,应注意鉴别。

#### 7264188

*Ocimum gratissimum* L.

植物名 丁香罗勒《中国植志》

药材名 丁香罗勒油《药典》

文献名 大叶零陵香《云南植志》

地方名 海南:臭草。

功效 挥发油:局部镇痛,防腐药。用于龋齿等。

#### 7264189

*Ocimum gratissimum* L. var. *suave* (Willd.) Hook. f.

植物名 毛叶丁香罗勒《云南植志》

文献名 丁香罗勒、[丁香]《高植图鉴》

地方名 海南:臭草;广西:青香罗勒(平南),丁香草(灵山)。

功效 全草:祛风湿,健胃,镇痛。

#### 7264190

*Ocimum sanctum* L.

植物名 圣罗勒《中国植志》

药材名 零陵香《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 熏草《山海经》,蕙草《别录》,燕草《南越志》,铃铃香、铃子香《梦溪笔谈》,香草《开宝本草》,黄零草《庚辛玉册》,熏香《本草求真》,九层塔、蔡板草《植物名汇》,陵草《中药材手册》,薰草零陵香《江苏中医》,平南香、满山香《中药大辞典》

功效 全草:祛风寒,辟秽浊。用于伤寒,感冒头痛,胸腹胀满,下痢,遗精,鼻塞,牙痛。

## 7264191

*Origanum dictamnus* L.

植物名 白藜牛至《品种论述》

地方名 广东:[防风]、[广防风](部分地区)。

备考 全草:广东部分地区混充防风用。

## 7264192

*Origanum vulgare* L. - *Origanum vulgare* L. var. *formosanum* Hayata

植物名 牛至《中国植志》

药材名 牛至《汇编》

文献名 江宁府茵陈《证类本草》, [香薷]《滇南本草》, 小叶薄荷《名实图考》, 滇香薷、清香薷《云南植志》, 野薄荷《种分讲义》, 山薄荷《科种》, 香肠草、普通香肠草(叶《生药》), 止痢草《中草药》, 北茵陈《台湾中药材图鉴》

地方名 土香薷、川香薷(四川、贵州、云南), 土茵陈(福建、湖南、广东、广西), 白花香薷(西南), 白花茵陈(江西、湖南、云南), [茵陈](江西、福建、广西), 暑草、五香草(陕西、云南), [满山香](湖南、云南), 满坡香(湖南、贵州), 野荆芥(江苏、贵州); 陕西: 对叶接骨丹, 黑接骨丹; 江苏: 随经草; 浙江: 草茵陈; 江西: 香草, 糯米条; 湖南: 银薄荷, [荆芥], 白花土荆芥, 野鱼腥草, [排香草]; 广东: 广东荆芥; 四川: 香炉草, 接骨草, 香薷草; 贵州: 小田草, 地藿香(瓮安); 云南: 蛇药、乳香草、香茹(曲靖), 琦香、香茹草(昆明), 苏子草, 香乳, 满天星, 玉兰至, 罗罗香; 西藏: 小甜草, 滚堆尖。

功效 全草: 清暑解表, 利水消肿。用于中暑, 感冒, 头痛身重, 急性胃肠炎, 腹痛吐泻, 水肿。

## 7264193

*Orthosiphon marmoritis* (Hance) Dunn

植物名 石生鸡脚参《中国植志》

文献名 杂纹直管草《广西药录》, 两广直管花《广西植录》

地方名 广西: 当芽(龙州、全县), 山薄荷, 蛇头花, 熊尾草(天等)。

功效 全株: 用于各种蛇咬伤。

## 7264194

*Orthosiphon rubicundus* (D. Don) Benth. var. *hainanensis* Sun ex C. Y. Wu

植物名 海南深红鸡脚参(拟)

文献名 海南猫须草《汇编》, 海南深红直管花《海南植志》, 披针叶直管草《植分学报》

地方名 广西: 小种龙狗尾(宁明)。

功效 根: 解热。用于贫血; 全草: 清热除湿, 排石利尿。

## 7264195

*Orthosiphon wulfenioides* (Diels) Hand. -Mazz.

植物名 鸡脚参《中国植志》

药材名 鸡脚参《汇编》

地方名 地葫芦(四川、云南); 四川: 山青菜(米易); 贵州: 普渡(兴仁); 云南: 山萝卜(玉溪), 直管花、化虫消、化积药(红河), 山槟榔(曲靖), 土地黄(楚雄), 红根

草(富宁), 山鸡腿、白花黄芩(昆明), 打虫药(玉龙山)。

功效 根: 祛风利尿, 镇痛化积, 接骨生肌。用于食积, 脉管炎, 肾炎, 膀胱炎, 尿路结石, 风湿痛, 蛲虫。外用于跌打损伤, 骨折。

## 7264196

*Orthosiphon wulfenioides* (Diels) Hand. -Mazz. var. *foliosus* Stieb.

植物名 茎叶鸡脚参《云南植志》

药材名 鸡肝花《云南药录》

功效 根: 用于积食, 风湿痛, 虚汗, 咳嗽, 脉管炎, 骨折; 叶: 用于眼病。

## 7264197

*Panzeria alaschanica* Kupr. --- *Leonurus lanatus* Hand. -Mazz.

植物名 脓疮草《中国植志》

药材名 白龙穿彩《汇编》

文献名 扁花草《中国经植志》, [大花益母草]、盘泽草《沙漠药植》

地方名 白脓疮草(西北), 白龙串彩(内蒙古、陕西); 内蒙古: “膀胱嘎尔”、“加隆-塔瓦格”、“姆黑乌布苏”(蒙名), [白花益母草]; 甘肃: 野芝麻(平罗); 其他: 白龙昌菜。

功效 全草: 调经活血, 清热利水。用于产后腹痛, 月经不调, 急性肾炎, 子宫出血, 乳腺炎, 丹毒, 疔肿。外用于洗疥疮, 脓疮。

## 7264198

*Panzeria alaschanica* Kupr. var. *minor* C. Y. Wu et H. W. Li

植物名 小花脓疮草(拟)

药材名 白脓疮菜(内蒙古)

文献名 白龙穿彩、白龙串彩《品种论述》, 白龙昌菜《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古: “木盖查干-乌布斯”(蒙名), [白花益母草], 脓疮草。

功效 全草: 用于疥疮。

## 7264199

*Paraphlomis albiflora* (Hemsl.) Hand. -Mazz. --- *Phlomis albiflora* Hemsl.

植物名 白花假糙苏《中国植志》

药材名 四轮麻(四川忠县)

地方名 湖南: 红野紫苏(蓝山县瑶名)。

功效 茎、叶: 散寒止咳。用于风寒咳嗽。

## 7264200

*Paraphlomis gracilis* Kudo --- *Phlomis gracilis* Hemsl.

植物名 纤细假糙苏《中国植志》

地方名 贵州: 水禾麻、假糙苏(锦屏)。

功效 全草: 润肺止咳, 补血调经。用于癆咳, 月经不调。

## 7264201

*Paraphlomis javanica* (Blume) Prain --- *P. rugosa* (Benth.) Prain

植物名 假糙苏《中国植志》

文献名 筠叶假糙苏《云南药录》

功效 叶、茎：清肝火，发表。用于感冒发热，肾炎。

#### 7264202

*Paraphlomis javanica* (Blume) Prain var. *angustifolia* (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li

植物名 狭叶假糙苏《贵州药录》

地方名 海南：鬼灯笼树；四川：土结香（峨眉）；贵州：祖师棍（镇远）。

功效 全草：润肺止咳，补血调经。用于癆咳，月经不调。

#### 7264203

*Paraphlomis javanica* (Blume) Prain var. *coronata* (Vaniot) C. Y. Wu et H. W. Li --- *P. rugosa* (Benth.)

Prain var. *coronata* (Vaniot) C. Y. Wu

植物名 小叶假糙苏《广西植录》

药材名 金槐《贵州草药》

地方名 广西：土九楼花、玫瑰花（忻城）；贵州：十二槐花（兴义），壶瓶花、荏子香（惠水）。

功效 全草：滋阴润燥，止咳，调经。用于虚癆咳嗽，月经不调。

#### 7264204

*Perilla frutescens* (L.) Britt. --- *P. frutescens* (L.) Britt. var. *typica* Makino

植物名 白苏《汇编》

药材名 白苏《图经》、《汇编》

文献名 荏《吴普本草》，荏子、荏叶《别录》，白苏叶《图经》，南苏《滇南本草》，白紫苏、假紫苏《生草药性备要》，白苏子《饮片新参》，山鱼苏、白鱼苏《新纲》，白苏梗《形性鉴别》，苏头《四川中药志》，玉苏子《中药志》，苏梗《汇编》

地方名 野苏麻（湖北、四川、云南），野苏（湖南、江西、四川、云南），苏麻（湖北、四川）；江苏：老苏梗（无锡），干老苏梗（苏州）；浙江：青苏；湖北：水升麻，〔薄荷〕；广东：聋耳麻；四川：野藿香；云南：野藿麻。

功效 叶：散寒解表，理气宽中；主茎（苏梗）：胸闷不舒，气滞腹胀，妊娠呕吐，胎动不安；果实：降气定喘，化痰止咳，利膈润肠。

备考 紫苏与白苏自古至今，从本草记载到中药店商品历来分为两种，从未混淆。两者功效基本相同而白苏药效稍逊。原植物形态上，我国古书称叶全绿者为白苏，称叶两面紫色或面青背紫的为紫苏，白苏花通常白色，紫苏花常为粉红至紫红色，白苏被毛通常稍密，果萼稍大，香气稍逊于紫苏。果实区别更大。作者认为这些特征是可以作为植物种以下分类依据的。从中药当前用药和历史传统来考虑，应当将白苏与紫苏分别为二药，以减少用药、生产中不必要的混乱。其学名，白苏野生宜用原种 *P. frutescens* (L.) Britt. 紫苏栽培较多，学名用变种。

#### 7264205

*Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *purpurascens* (Hayata) H. W. Li --- *P. frutescens* var. *acuta* (Thunb.) Kudo ---

*P. ocymoides* L. var. *purpurascens* Hayata

植物名 野生紫苏《云南植物研究》

药材名 紫苏子、紫苏叶《药性论》、《中药大辞典》，紫苏梗《本草蒙筌》、《中药大辞典》

文献名 苏叶、苏子《滇南本草》，野苏、荏目、紫苏苞（宿萼）《本经逢原》，苏、赤苏、香苏、桂苏、山鱼苏、水状元《新纲》，苏头《四川中药志》，紫苏草《海南植物志》，尖紫苏《中药大辞典》

地方名 紫苏（江苏、江西、广西、四川），野紫苏（江西、广西、广东）；江苏：苏梗（徐州），干紫苏（无锡），小苏子（清江），黑苏子（苏州、清江、无锡、镇江、泰州），野麻子、杜苏子（苏州），赤苏子、铁苏子、青苏子（南通）；浙江：青叶紫苏；江西：鸡苏（吉水），苏青；福建：野猪蔬，臭苏（福州、泉州、华安、同安、永安、邵武、寿宁），犬屎苏（福安、福鼎、宁德），野苏叶（尤溪、南平、建瓯、上杭）；湖北：苏麻；广东：真紫苏（从化、花县），紫苏树（广州），红美苏（惠阳），香荏（梅县）；海南：白丝草，红香丝菜，蚊草（保亭），蛤树（澄迈），紫禾草（儋县）；广西：假紫苏（博白、富川），臭草，香丝菜，野香丝；四川：紫苏兜；云南：苏兜。

功效 果实（紫苏子）：降气消痰，平喘，润肠。用于痰壅气逆，咳嗽气喘，肠燥便秘；叶（紫苏叶）：解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒；茎（紫苏梗）：理气宽中，止痛，安胎。用于胸膈痞闷，胃脘疼痛，暖气呕吐，胎动不安；根或根头（苏头）：除风散寒，祛痰降气。用于咳逆上气，胸膈痰饮，头身痛，鼻塞流涕；宿萼（紫苏苞）：用于血虚，感冒。

#### 7264206

*Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *arguta* (Benth.) Hand. -Mazz. --- *P. arguta* Benth.

植物名 紫苏《食疗本草》、《汇编》

药材名 紫苏子、紫苏叶《药性论》、《药典》，紫苏梗《本草蒙筌》、《药典》

文献名 桂苏《尔雅》，苏《别录》，苏叶《本草经集注》，赤苏《补缺肘后方》，紫苏茎《雷公炮炙论》，苏梗《药品化义》，紫苏苞（宿萼）《本经逢原》，黑苏子《饮片新参》，苏头〔根头〕《四川中药志》，铁苏子《江苏植药志》，皱紫苏《汇编》

地方名 红苏、红紫苏（河北、江苏、福建、广东、广西、四川），鸡苏（湖南、江西、福建），香苏（东北、河北、广东）；北京：家苏；江苏：野麻子，小苏子，黑苏，杜苏子；福建：香苏子，臭草子，膨苏（龙岩），草苏叶籽，勺苏，鱼苏；湖北：大紫苏；湖南：紫苏杆，红砂药（通道），草头子、祖师草（麻阳）；广东：红勾苏（潮安），田螺香、香荏（梅县），红美苏（惠阳）；广西：“马蛇炸”（三江侗语），“妈啊”（环江毛难语），“工呼召”（金秀瑶语），“取做”（天峨壮语）；四川：全紫苏，老紫苏；贵州：水苏，水状元；云南：桂味紫苏，“甲阿娘”（西双版纳傣语），斑纹皱紫苏；西藏：“兴帕夏噶”（藏名）。

功效 果实（紫苏子）：降气消痰，平喘，润肠。用于痰壅气逆，咳嗽气喘，肠燥便秘；叶（紫苏叶）：解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼

蟹中毒;葶(紫苏梗):理气宽中,止痛,安胎。用于胸膈痞闷,胃脘疼痛,暖气呕吐,胎动不安;根或根头(苏头):除风散寒,祛痰降气。用于咳逆上气,胸膈痰饮,头晕身痛,鼻塞流涕;宿萼(紫苏苞):用于血虚,感冒。

## 7264207

*Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *crispa* (Benth.) H. W. Li --- *P. frutescens* (L.) Britt. var. *crispa* (Thumb.) Deene.

植物名 回回苏《中国植志》  
药材名 回回苏《食疗本草》  
文献名 花紫苏《纲目》, 缝边皱紫苏《汇编》  
地方名 紫苏、鸡冠紫苏(湖北、四川、贵州);其他:黑苏子、红苏叶。

功效 叶:散寒解表,理气宽中;果实:降气定喘,化痰止咳,利膈润肠。

## 7264208

*Phlomis betonicoides* Diels

植物名 假秦艽《中国植志》  
药材名 辛参(云南丽江)  
地方名 四川:白玄参(盐源);云南:“粗弓”(丽江纳西族语),土甘草,[甘草]、雪山甘草、白洋参、白元参(丽江)。

功效 块根:清热解毒,理气健脾。用于消化不良,腹胀,咽喉疼痛。

## 7264209

*Phlomis hetonicoides* Diels f. *alba* C. Y. Wu

植物名 白花假秦艽《云南植志》  
功效 块根:用于消化不良,腹胀,咽喉疼痛,跌打损伤,肺炎,并解药物中毒。

## 7264210

*Phlomis dentosa* Franch.

植物名 尖齿糙苏《北京植志》  
地方名 河北:毛尖(涞源)。  
功效 全草:清热解毒。

## 7264211

*Phlomis jeholensis* Nakai et Kitagawa

植物名 口外糙苏《中国植志》  
文献名 热河糙苏《内蒙古中草药》  
功效 根:用于无名肿毒。

## 7264212

*Phlomis maximowiczii* Regel

植物名 大叶糙苏《中国植志》  
地方名 辽宁:山苏子(营口、丹东、庄河、建昌),丁黄草(庄河、丹东),大丁黄(新金),苏木帐子(庄河),野苏子。  
功效 根:用于无名肿毒。

## 7264213

*Phlomis megalantha* Diels

植物名 大花糙苏《中国植志》  
文献名 老鼠刺《陕西中草药》  
地方名 陕西:续断。  
功效 全草:祛风,清热解毒。用于麻风,痈肿。

## 7264214

*Phlomis melanantha* Diels

植物名 黑花糙苏《中国植志》  
地方名 云南:野苏子(昆明),香苏[稀荬草],稀仙草。

功效 全草、根:有小毒。祛风除湿。用于半身不遂,口眼歪斜,风痰壅盛,痿痹不仁,白癫风,眉发脱落,白带。

备考 《滇南本草》(1977)之稀荬草可能为本种。

## 7264215

*Phlomis mongolica* Turcz.

植物名 串铃草《中国植志》  
文献名 蒙古糙苏《内蒙古中草药》,萝卜秦艽《陕甘宁植志》  
地方名 河北:毛尖茶(张北);甘肃:野洋芋(盐池)。  
功效 根:用于无名肿毒。

## 7264216

*Phlomis tuberosa* L.

植物名 块根糙苏《中国植志》  
文献名 块茎糙苏《东检》,野山药《高原中草药》  
功效 全草或根:有小毒。解毒。用于月经失调,梅毒,化脓性创伤。

## 7264217

*Phlomis umbrosa* Turcz.

植物名 糙苏《中国植志》  
药材名 糙苏《汇编》  
文献名 大叶糙苏《内蒙古中草药》,苘麻续断《品种论述》

地方名 (续断)(甘肃、宁夏、陕西、河南、四川);辽宁:山芝麻(旅顺);北京:白茎(昌平);河北:[常山](兴隆);山西:小兰花烟(宁武);内蒙古:山苏子,“查干·乌嘎拉锦·图古日埃”(蒙名);甘肃:土续断(文县),玄参;四川:柴续断;云南:[稀荬草](昆明)。

功效 地上部分:散风,解毒,止咳,祛痰。用于防治感冒,慢性支气管炎,疖肿。

## 7264218

*Phlomis umbrosa* Turcz. var. *australis* Hemsl.

植物名 南方糙苏《中药志》  
药材名 牛王肺筋草《云南植志》  
地方名 云南:灯笼大秦艽、[稀荬草](曲靖),白升麻(富源),大黑理肺散(富民),土玄参(玉溪),山甘草(丽江)。

功效 全草:用于肠胃炎,肺炎,咳嗽,感冒。

## 7264219

*Phlomis younghusbandii* Mukerjee --- *P. kawaguchii* Murata

植物名 螃蟹甲《中国植志》  
药材名 螃蟹甲《西藏中草药》  
文献名 藏糙苏《药典》  
地方名 西藏:“路木”、“露木尔”(藏名);青海:“罗莫尔”(藏名)。

功效 块根:祛风清热,止咳化痰,生肌敛疮。用

于感冒咳嗽, 支气管炎, 疮疡久不愈合。

# 7264220

*Phyllophyton complanatum* (Dunn) Kudo

植物名 扭连钱《中国植志》

功效 全草: 用于胃病。

# 7264221

*Phyllophyton decolorans* (Hemsl.) Kudo --- *Nepeta decolorans* Hemsl. --- *Glechoma decolorans* (Hemsl.) Turrrill --- *Pseudophanthus decolorans* (Hemsl.) Levin

植物名 褪色扭连钱《中国植志》

药材名 扭连钱《迪庆藏药》

功效 全草: 清热, 消炎, 杀虫, 止痛。用于炎症, 乳蛾, 虫病, 胸痛。

# 7264222

*Phyllophyton tibeticum* (Jacquem.) G. Y. Wu

植物名 西藏扭连钱《中国植志》

文献名 “邦参布柔”(藏名)《青藏药图》

功效 全草: 清热解毒。用于肺炎, 痢疾, 水草中毒, 食物中毒。

# 7264223

*Pogostemon auricularius* (L.) Hassk. --- *Dysophylla auricularia* (L.) Blume

植物名 水珍珠菜《中国植志》

药材名 毛射草(海南、广西)

文献名 毛水珍珠菜《广州植志》

地方名 广东: 水毛射、毛倒草、狗仔尾、狐狸尾(惠阳); 海南: 牛触臭(文昌); 广西: 蛇尾草(苍梧), 毛射(平南), 山凉粉(贵县), 臭龙; 云南: 水蜡烛。

功效 全草: 清热化湿, 消肿止痛。用于感冒发热, 湿疹。

# 7264224

*Pogostemon brevicorollus* Sun ex C. H. Hu

植物名 短冠刺蕊草《中国植志》

地方名 广西: 水大靛(苍梧); 云南: 马鹿菜(龙陵)。

功效 叶: 用于疥疮, 无名肿毒。

# 7264225

*Pogostemon cablin* (Blanco) Benth.

植物名 广藿香《中国植志》

药材名 广藿香《药典》

文献名 藿草、薰草《南方草木状》, 藿香、蒙州藿香《图经》, 印度百秋里(叶《生药》), 排草香、排草、香草《和汉药名汇》, 百秋李《药学报》, 石牌广藿香、海南广藿香《药典》

地方名 广东: 枝香, 火香, 派超力, 刺蕊草; 海南: 海藿香; 云南: “沙勐拉”(西双版纳傣语)。

功效 地上部分: 芳香化浊, 开胃止呕, 发表解暑。用于湿浊中阻, 脘痞呕吐, 暑湿倦怠, 胸闷不舒, 寒湿闭暑, 腹痛吐泻, 鼻渊头痛。

# 7264226

*Pogostemon esquirolii* (Levl.) C. Y. Wu et Y. C. Huang

植物名 膜叶刺蕊草《中国植志》

地方名 广西: 野蓝靛(田林); 云南: 鸡骨头菜(麻栗

坡), “爬努阿帕”(红河哈尼语)。

功效 枝叶: 用于子宫脱垂。

# 7264227

*Pogostemon glaber* Benth.

植物名 刺蕊草《中国植志》

药材名 鸡排骨草《汇编》

文献名 光刺蕊草《广西植录》

地方名 广东: 高脚流民草、牛虱麻(惠阳); 广西: 走马胎(宁明); 云南: 野靛(景东), “牙盖供”(西双版纳傣语)。

功效 全草: 清热解毒, 凉血止血。用于肺结核咳血, 闭经, 月经不调, 急性胃肠炎。

# 7264228

*Pogostemon nigrescens* Dunn

植物名 黑刺蕊草《中国植志》

药材名 紫花一柱香(云南龙陵)

文献名 臭野芝麻《元江哈尼族药》

地方名 云南: “努哈哈让”(元江哈尼语)。

功效 全草: 清热解毒, 理气止痛。用于风热感冒, 口腔糜烂, 脘腹胀痛。

# 7264229

*Prunella asiatica* Nakai --- *P. vulgaris* L. var. *lilacina* Nakai

植物名 长冠夏枯草《品种论述》

药材名 夏枯草《云南中草药》

文献名 麦穗夏枯草、铁线夏枯草、麦夏枯《滇南本草》, 山菠菜《中国植志》

地方名 山东: 夏枯头, 野菠菜(烟台、昆崙山、栖霞、牙山)。

功效 全草: 清肝火, 散郁结, 降血压。用于高血压, 结合膜炎, 急性膀胱炎, 肝炎, 胆囊炎, 黄疸型肝炎, 小儿惊风, 乳腺炎, 小便淋痛, 淋巴结核, 筋骨痛, 半身不遂, 面神经麻痹, 脾肿大。

# 7264230

*Prunella asiatica* Nakai var. *albiflora* (Koidz.) Nakai --- *P. vulgaris* L. var. *albiflora* Koidz.

植物名 白花长冠夏枯草《品种论述》

功效 花序与果序: 清肝火, 散郁结, 降血压。

# 7264231

*Prunella hispida* Benth.

植物名 硬毛夏枯草《中国植志》

药材名 粗毛夏枯草《汇编》

文献名 刚毛夏枯草《中药大辞典》

地方名 夏枯草(云南、西藏); 四川: 白毛夏枯草(西昌); 西藏: 棒槌草, 枯草穗。

功效 花序、果序: 清肝火, 散郁结, 降血压。

# 7264232

*Prunella vulgaris* L.

植物名 夏枯草《中国植志》

药材名 夏枯草《本经》、《药典》

文献名 夕句、乃东《本经》, 燕面《别录》, 麦穗夏枯草、麦夏枯、铁线夏枯草《滇南本草》, 铁色草《纲目》, 潞

州夏枯草《大明一统志》, 夏枯花《四川中药志》

地方名 棒槌草(陕西、江苏、安徽、云南), 灯笼头(江苏、上海), 灯笼草(江苏、湖南、四川), 夏枯球(江西、湖北、广东、广西), 夏枯头(河北、山东), 蜂窝草(江西、福建), [血见愁](青海、四川), 牯牛草(江西、湖南); 河北: 猪屎草; 内蒙古: “也尔嘎木沙”(蒙名); 陕西: 干叶叶、芒锤草、假公草、大头草(宝鸡); 青海: 蜜罐罐; 山东: 胀饱草、野菠菜、山菠菜(烟台); 江苏: 羊肠菜(睢宁)、榔头草(镇江)、京枯草、炮杖草、棒杆头草(常熟), 灯笼草头(泰州), 羊胡草、棒头草; 上海: 野夏枯草, 茶浪头, 茶叶草, 牛奶头; 浙江: 大头花、地风蒲(杭州、遂昌), 九重楼(云和、丽水), 松蒲草(金华), 牛端蒲草(嵊县), 兰枯草、风花草(杭州), 花鼓槌, 蜈蚣草头, 四层楼, 地蜈蚣; 安徽: 牛郎头(滁县), 蜂房草, 狗争架; 江西: 箭刺草, 南夏枯草(南昌), 矮子打伞(瑞昌); 福建: 六月干(周宁), 棒头柱(松溪), 椗椗花(泰宁), 倒花伞、公公陀伞(宁化), 椗椗花(邵武), 虾姑草(厦门), 倒花伞花(清宁), 虾钳草、节节草(福州), 丹参草(建阳), 蒙退草(南平), 蒙重草(漳州), 蜜蜂罐(光泽), 夏枯、拳头母; 河南: 牛低头(西峡、商城), 牛抵头棵, 牛鼻卷, 牛接菜; 湖南: 锣锤草(长沙), 牛牯草, 地牯牛(保靖), 艾谷草(黔阳), 泥鳅串草, 茶盘菜(溆浦), 绿豆菜(常德), 东风(道县), 广谷草(汝桂); 广东: 枯草花, 倒扣草(从化、花县、博罗、增城、东莞), 倒刺草(广宁、四会、德庆、怀集), 倒钩草(新会), 倒梗草(广州), 牛膝头(河源), 大膝头(增城), 癩倒草、癩络草(广州), 白花鸡撮鼻、鸡撮鼻、[上牛膝]、土三七(潮汕), 方骨相思(潮安、潮州、南天), 丝线吊铜钟; 广西: 紫花草(梧州、隆林), 夏火草, 棒柱头花(北海), 毛虫药(龙胜), 小本蛇药草(融水); 四川: 九重花、万重楼、牛牛草、滚子花、地滚子、土枇杷(荣阳), 羊蹄尖(广元), 古牛草(屏山); 云南: 顶头蓝花、团花草、枯草穗(文山), [荆芥](思茅); 西藏: “夏库菜”(藏名)。

功效 带花果穗: 清火, 明目, 散结, 消肿。用于目赤肿痛, 目珠夜痛, 头痛眩晕, 瘰癧, 瘰癧, 乳癌肿痛, 甲状腺肿大, 淋巴结结核, 乳腺增生症, 高血压症。

#### 7264233

*Prunella vulgaris* L. var. *lanceolata* (Barton) Fernald

植物名 狭叶夏枯草《品种论述》

功效 花序或果序: 清火, 明目, 散结, 消肿。

#### 7264234

*Prunella vulgaris* L. var. *leucantha* Schur

植物名 白花夏枯草《浙南本草新编》

地方名 河北: 棒头花, 白花草。

功效 花序、果穗: 清火, 明目, 散结, 消肿。

#### 7264235

*Rabdosia adenantha* (Diels) Hara --- *Plectranthus adenanthus* Diels --- *Isodon adenanthus* (Diels) Kudo

植物名 腺花香茶菜《中国植志》

文献名 皱薄荷《广西植志》

地方名 广西: 南薄荷; 贵州: 食疙瘩、铁石元(威宁), 水龙胆草(兴文); 云南: 路边金(下关), 大钮子七

(丽江), 疳积药(昆明)。

功效 根: 健脾利湿, 镇吐理气。用于上吐下泻, 食积饱胀, 痢疾, 疯狗咬伤; 全草: 清热解毒。用于无名肿毒, 大头瘟。

#### 7264236

*Rabdosia amethystoides* (Benth.) Hara --- *Plectranthus amethystoides* Benth.

植物名 香茶菜《中国植志》

药材名 香茶菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 石蛤蚧《纲目拾遗》, 小叶蛇总管《广西中药志》

地方名 蛇总管、蛇通管、小蛇总管(广东、广西、湖南); 浙江: 棱角三七、四棱角(临安), 铁棱角、铁菱角(杭州、兰溪、衢县、温州、乐清), 铁角棱(丽水、天台), 铁丁角(龙泉), 铁龙角、铁钉头(平阳), 铁秤锤(乐清), 铁生姜(诸暨); 安徽: 王枣子; 福建: 痒子草(龙溪); 广西: 伤寒头(岑溪), 土茵陈(蒙山); 贵州: 毛毛菜; 云南: 母猪花头, 盘龙七。

功效 全草或根: 清热解毒, 散瘀散肿。用于毒蛇咬伤, 跌打肿痛, 筋骨酸痛, 疮疡。

#### 7264237

*Rabdosia angustifolia* (Dunn) Hara

植物名 狭叶香茶菜《中国植志》

药材名 狭叶香茶菜《新华本草纲要》

地方名 云南: 治克二号。

功效 根: 用于克山病, 消化不良。

#### 7264238

*Rabdosia coetsa* (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara --- *Isodon coetsa* (Buch.-Ham. ex D. Don) Kudo

植物名 细锥香茶菜《中国植志》

地方名 广西: 地疳(贵县); 四川: 六棱麻(叙永); 贵州: 野苏麻、碎米花(兴义); 云南: 癩克巴草(文山); 其他: 野藿香。

功效 根: 行血, 止痛。用于跌打损伤; 全草: 解表散寒, 除风湿。用于风寒感冒, 呕吐, 腹泻, 风湿麻木, 疮痒, 刀伤。

#### 7264239

*Rabdosia coetsoides* C. Y. Wu

植物名 假细锥香茶菜《中国植志》

地方名 云南: 野坝子(龙陵)。

功效 全草: 用于头痛。

#### 7264240

*Rabdosia enanderiana* (Hand.-Mazz.) Hara --- *Plectranthus enanderianus* Hand.-Mazz. --- *Isodon enanderiana* (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu et Hsuan

植物名 紫毛香茶菜《中国植志》

文献名 小毛叶子草《元江哈尼族药》

地方名 云南: “抛洒沙让”(元江哈尼语), 黑头草, “唠嫩底阿拔”(红河哈尼语)。

功效 茎、叶: 清热解毒, 驱风止痒。用于口腔糜烂, 脚气, 小儿风疹, 湿疹。

#### 7264241

*Rabdosia eriocalyx* (Dunn) Hara --- *Isodon eriocalyx* (Dunn) Kudo

植物名 毛萼香茶菜《中国植志》

药材名 沙虫草(贵州兴义)

地方名 黑头草(四川、云南); 贵州: 沙虫草, 水苏麻; 云南: 虎尾草(丽江), 荷麻根、火麻根(楚雄), 四棱蒿、火把花(红河), 大马鞭梢。

功效 全草: 祛风除湿, 舒筋活络。用于感冒头痛, 风湿关节痛, 刀伤, 牙痛, 痢疾, 无名肿毒, 脚湿气。

#### 7264242

*Rabdosia excisa* (Maxim.) Hara --- *Plectranthus excisus* Maxim. --- *Isodon excisus* (Maxim.) Kudo

植物名 尾叶香茶菜《中国植志》

药材名 龟叶草《汇编》

文献名 小叶香茶菜、尾叶香茶菜《中国经植志》

地方名 吉林: 野苏子(九台); 辽宁: 狗日草、高丽花(阜新)。

功效 全草: 有一定的抗肿瘤作用。

#### 7264243

*Rabdosia excisoides* (Sun ex C. H. Hu) C. Y. Wu et H. W. Li --- *Plectranthus excisoides* Sun ex C. H. Hu

植物名 拟缺香茶菜《中国植志》

地方名 四川: 野紫苏。

功效 全草: 清热解毒。用于蛇咬伤。

#### 7264244

*Rabdosia henryi* (Hemsl.) Hara --- *Isodon henryi* (Hemsl.) Kudo

植物名 鄂西香茶菜《中国植志》

药材名 鄂西香茶菜《湖南药物志》

地方名 湖南: 四方麻、苦痧药。

功效 全草: 清热利湿, 消滞理气。用于中暑昏倒, 菌痢, 肠炎。

#### 7264245

*Rabdosia hispida* (Benth.) Hara --- *Isodon hispidus* (Benth.) Murata

植物名 刚毛香茶菜《中国植志》

地方名 云南: 烂脚丫巴草(保山)。

功效 根、茎: 用于跌打损伤。

#### 7264246

*Rabdosia incanus* (Link) Hara

植物名 灰毛香茶菜《汇编》

功效 叶及花枝: 清热利湿, 抗菌。

#### 7264247

*Rabdosia inflexa* (Thunb.) Hara --- *Plectranthus inflexus* (Thunb.) Vahl --- *Isodon inflexus* (Thunb.) Kudo

植物名 内折香茶菜《北京植志》

文献名 山薄荷《植物学大辞典》, 山薄荷香茶菜《东检》

功效 全草: 用于急性胆囊炎。

#### 7264248

*Rabdosia irrorata* (Forrest ex Diels) Hara --- *Plectranthus irroratus* Forrest ex Diels --- *Isodon irroratus* (Forrest ex

Diels) Kudo

植物名 露珠香茶菜《中国植志》

文献名 紫萼香茶菜《汇编》

地方名 贵州: 水龙胆草(兴义)。

功效 全草、根: 清热解毒。用于颜面丹毒(大头瘟), 无名肿毒。

#### 7264249

*Rabdosia japonica* (Burm. f.) Hara

植物名 毛叶香茶菜《中国植志》

文献名 日本香茶菜《江苏植志》

地方名 河南: 四棱杆, 山苏子, 猛一撒。

功效 叶: 抗菌消炎。

#### 7264250

*Rabdosia japonica* (Burm. f.) Hara var. *glauco-calyx* (Maxim.) Hara --- *Plectranthus glauco-calyx* Maxim. --- *Isodon glauco-calyx* (Maxim.) Kudo

植物名 蓝萼香茶《高植图鉴》

药材名 蓝萼香茶菜《汇编》

文献名 回菜花、香茶菜、《中国经植志》, 山薄荷《种分讲义》

地方名 真夕、山牛夕、野苏子(东北), 山苏子(东北、河北), 倒根野苏(东北、内蒙古); 吉林: 日本水棘花; 内蒙古: “乎格·都克梯·其其格”(蒙名)。

功效 全草: 清热解毒, 活血化痰。用于感冒, 咽喉肿痛, 扁桃体炎, 胃炎, 肝炎, 乳腺炎, 肿瘤, 闭经, 跌打损伤, 关节痛, 蛇虫咬伤。

#### 7264251

*Rabdosia longituba* (Miq.) Hara --- *Plectranthus longitubus* Miq. --- *Isodon longitubus* (Miq.) Kudo

植物名 长管香茶菜《中国植志》

药材名 长管香茶菜《汇编》

文献名 香茶菜《中国植物图鉴》, 铁菱角、四角薄荷、溪薄荷、铁拳头《汇编》

功效 全草: 清热解毒, 凉血止血, 消痈止痛。用于中暑腹痛, 尿路感染, 筋骨酸痛, 蕲蛇咬伤, 乳腺炎。

#### 7264252

*Rabdosia lophanthoides* (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara --- *Isodon striatus* (Benth.) Kudo --- *Plectranthus striatus* Benth.

植物名 线纹香茶菜《中国植志》

药材名 溪黄草《汇编》

文献名 四方蒿《全展选编·传染病》

地方名 熊胆草(广东、广西); 江西: 香茶菜; 广东: 风血草, 因陈草(怀集), [黄药仔], 水边黄, 溪沟草, 山羊面, 台湾延胡索; 广西: [土黄连](苍梧), 溪黑草(瑶语); 四川: 小疙瘩(峨眉山); 贵州: 碎米花(兴义); 云南: 涩疙瘩、黑疙瘩(富源), 草三七, 小癞疙瘩, [黑节草]; 其他: 山熊胆, 黄汁草。

功效 全草: 清热利湿, 凉血散瘀。用于急性黄疸型肝炎, 急性胆囊炎, 肠炎, 痢疾, 跌打肿痛。

#### 7264253

*Rabdosia lophanthoides* (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara



var. *gerardiana* (Benth.) Hara

植物名 狭基线纹香茶菜《云南植志》

地方名 广东:熊胆草,风血草;四川:野苏麻(会理),猪屎把(峨眉山);云南:石疙瘩(镇康),沙虫叶、白线草(腾冲),沙虫草,粪虫叶(盈江)。

功效 根或全草:用于急性黄疸型肝炎,急性胆囊炎,驱蛔虫。

#### 7264254

*Rabdosia macrocalyx* (Dunn) Hara

植物名 大萼香茶菜《中国植志》

功效 茎叶:抗菌消炎。

#### 7264255

*Rabdosia macrophylla* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li ---

*Isodon macrophyllus* (Migo) C. Y. Wu et Hsuan

植物名 歧伞香茶菜《中国植志》

文献名 大叶香茶菜《药学报》

功效 叶:清热解毒。

#### 7264256

*Rabdosia megathyrsa* (Diels) Hara

植物名 大锥香茶菜《中国植志》

地方名 云南:豆秆沙(丽江),香茶菜,小疙瘩,四棱草,九头狮子草,血剑草。

功效 根:止血理气;全草:发表透疹,活血散瘀,解毒。用于感冒,麻疹,黄水疮,跌打损伤,风湿骨痛,经闭,毒蛇咬伤,偏瘫,淋巴结核。

#### 7264257

*Rabdosia nervosa* (Hemsl.) C. Y. Wu et H. W. Li ---

*Plectranthus nervosus* Hemsl. --- *Isodon nervosus* (Hemsl.) Kudo

植物名 显脉香茶菜《中国植志》

药材名 大叶蛇总管《广西中草药》

文献名 脉叶香茶菜《广西药录》,〔藿香〕、脉纹香茶菜《南京民间药草》

地方名 蓝花柴胡(湖南、广西、贵州);河北:野藿香;浙江:山薄荷,铁菱角;湖北:雪花草;广西:小水薄荷(岑溪),大驴尾草,蛇总管。

功效 全草:清热,利湿,解毒。用于急性黄疸型肝炎,毒蛇咬伤。外用于烧烫伤,毒蛇咬伤,脓疱疮,湿疹,皮肤瘙痒。

#### 7264258

*Rabdosia oresbia* (W. W. Smith) Hara --- *Isodon oresbius* (W. W. Smith) Kudo

植物名 山地香茶菜《中国植志》

地方名 四川:朴荀儿(甘孜)。

功效 全草:用于内脏肿块出血。

#### 7264259

*Rabdosia phyllostachys* (Diels) Hara --- *Plectranthus phyllostachys* Diels --- *Isodon phyllostachys* (Diels) Kudo

植物名 叶穗香茶菜《中国植志》

药材名 虎尾草《云南药录》

地方名 云南:斑鸠钻。

功效 根:清热,收敛,止血。用于腹泻,痢疾,胃

寒痛。

#### 7264260

*Rabdosia pseudo-irrorata* C. Y. Wu

植物名 川藏香茶菜《中国植志》

地方名 西藏:“兴木蒂那布”(藏语)。

功效 叶、花:驱蛔虫,去翳。

#### 7264261

*Rabdosia rosthornii* (Diels) Hara --- *Isodon rosthornii* (Diels) Kudo

植物名 瘦花香茶菜《中国植志》

地方名 野苏(四川、贵州);四川:野香茹、野紫苏、野藿香、白野紫苏(峨眉),〔紫苏〕(巫溪)。

功效 全草:解表,散寒,疏风,止咳。用于散寒发表,清热化痰,消肿。

#### 7264262

*Rabdosia rubescens* (Hemsl.) Hara --- *Isodon rubescens* (Hemsl.) C. Y. Wu et Hsuan --- *Plectranthus rubescens* Hemsl.

植物名 碎米粳《中国植志》

药材名 冬凌草(河南),〔汇编〕

文献名 冰凌花《中药志》

地方名 河南:冰凌草,山薄荷,香茶菜,六月凌,六月令,山伴;湖北:野藿香花(房县);四川:破血丹(巴县),明镜草、彩花草、胡椒草(巫溪);贵州:山香草(凤岗),雪花草(瓮安),野藿香(贵阳)。

功效 地上部分:清热解毒,活血止痛。用于咽喉肿痛,扁桃体炎,蛇虫咬伤,感冒头痛,肝炎,风湿筋骨痛。用于食道癌。

#### 7264263

*Rabdosia rubescens* Hara f. *lushanensis* Gao et Li

植物名 鲁山冬凌草《云南植物研究》

功效 全草:清热解毒,活血止痛。用于食管癌。

#### 7264264

*Rabdosia sculponeata* (Vaniot) Hara --- *Isodon sculponeatus* (Vaniot) Kudo

植物名 黄花香茶菜《中国植志》

药材名 白沙虫药《贵州草药》

地方名 贵州:痢药(兴仁);云南:臭蒿子(峨山),方茎紫苏、鸡苏、假荨麻(昆明),烂脚草(永平),小白根(西畴),土苏子,野藿香。

功效 全草:利湿,解毒。用于痢疾。外用于烂脚丫。

#### 7264265

*Rabdosia serra* (Maxim.) Hara --- *Plectranthus serra* Maxim. --- *Isodon serra* (Maxim.) Kudo

植物名 溪黄草《中国植志》

药材名 溪黄草(广东)

文献名 毛果香茶菜《东北草本植志》,蓝花柴胡《中草药》

地方名 广东:溪沟草,山羊面,台湾延胡索;广西:大叶蛇总管,土茵陈(钟山);四川:白升麻(峨眉)。

功效 全草:利湿,解毒,消炎。用于急性肝炎,急

性胆囊炎,跌打瘀肿。

#### 7264266

*Rabdosia stracheyi* (Benth. ex Hook. f.) Hara --- *Isodon stracheyi* (Benth. ex Hook. f.) Kudo

植物名 长叶香茶菜《中国植志》

地方名 海南:溪黄草,海南香茶菜;广西:四方草,四方茎,蛇总管(龙胜、上思、东兴、苍梧、岑溪)。

功效 全草:清热消炎,退黄去湿,祛瘀止痛。用于急性黄疸型肝炎,急性胆囊炎,湿热水肿,中暑,腹痛,跌打损伤,咯血,乳疮,蛇伤。

#### 7264267

*Rabdosia ternifolia* (D. Don) Hara --- *Plectranthus ternifolius* D. Don --- *Isodon ternifolius* (D. Don) Kudo

植物名 牛尾草《中国植志》

药材名 牛尾草(云南)

文献名 细叶香茶菜《广西药录》,轮叶香茶菜《汇编》,三叶香茶菜《中药大辞典》,痧麻菜草《中药通报》

地方名 广东:月风草、阴阳草(惠阳);广西:三叉金(平南),三托艾、红托莲(桂平),三姐妹(龙州、苍梧),伤寒头(邕宁),老人风(岑溪),[刘寄奴](南宁、邕宁、凌云),大箭根(玉林),大夫根(藤县),伤寒草(博白);贵州:虫牙药;云南:牛尾巴蒿、三叶扫把、常沙(思茅),马鹿尾(镇康、龙陵),四楞草、[龙胆草](广南),鸭边窝(莲山),扫帚草(耿马)。

功效 全草:清热利湿,解毒。用于感冒,支气管炎,扁桃腺炎,咽喉炎,牙痛,肠炎,痢疾,黄疸型肝炎,急性肾炎,膀胱炎。外用于蛇咬伤。

#### 7264268

*Rabdosia yunnanensis* (Hand.-Mazz.) Hara --- *Plectranthus yunnanensis* Hand.-Mazz. --- *Isodon yunnanensis* (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu et Hsuan

植物名 不育红《中国植志》

药材名 狮子草《滇南本草》

文献名 九头狮子草《滇南本草》,滇香茶菜《云南中草药》

地方名 云南:血疙瘩,小铁牛(维西),小疙瘩、四棱草、血剑草(红河),地龙园。

功效 全草:发表透疹,活血散瘀,解毒。用于感冒,麻疹,黄水疮,跌打损伤,风湿骨痛,闭经;根:用于毒蛇咬伤,偏瘫,淋巴结核,止痢,妇女不孕症。

#### 7264269

*Rosmarinus officinalis* L.

植物名 迷迭香《中国植志》

药材名 迷迭香《本草拾遗》、《中药大辞典》

功效 全草:活血散瘀,消肿止痛。经期代茶饮可避孕。

#### 7264270

*Salvia aerea* Levl.

植物名 橙色鼠尾草《中国植志》

文献名 铜色鼠尾草《汇编》,松林丹参《云南药录》

地方名 四川:红丹参、紫丹参、大木帮、红秦艽(西昌地区);云南:马蹄叶红仙茅(丽江、华坪)。

功效 根:清热凉血,活血调经。用于红崩,月经不调,吐血,便血。

#### 7264271

*Salvia bifidocalyx* C. Y. Wu et Y. C. Huang

植物名 开萼鼠尾草《中国植志》

药材名 黄花鼠尾草《迪庆藏药》

文献名 开萼鼠尾《高植图鉴》

功效 根:用于肝炎,牙痛。

#### 7264272

*Salvia bowleyana* Dunn

植物名 南丹参《中国植志》

药材名 丹参《中药志》

文献名 劲枝丹参《名实图考》

地方名 赤参、紫丹参(江西、福建、湖南),红萝卜(江西、福建);江西:八莲麻(吉水);福建:七里麻,七黑蕉(南平),紫根(永泰),木羊乳;湖南:红根,奔马草;广东:鼠尾草。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264273

*Salvia bulleyana* Diels

植物名 戟叶鼠尾草《中国植志》

文献名 戟叶鼠尾《高植图鉴》

地方名 云南:紫丹参(大理花甸)。

备考 本品在云南大理花甸混叫紫丹参。但根不含丹参酮Ⅱ-A,不宜作丹参入药。

#### 7264274

*Salvia campanulata* Wall. var. *codonantha* (Strib.) Strib. --- *Salvia codonantha* Strib.

植物名 截萼鼠尾草(拟)

药材名 黄花紫丹参(云南)、《新华本草纲要》

功效 根:用于月经不调,体弱。

#### 7264275

*Salvia castanea* Diels

植物名 栗色鼠尾草《中国植志》

药材名 栗色鼠尾草《新华本草纲要》

文献名 栗色鼠尾《高植图鉴》

功效 根、根茎:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264276

*Salvia castanea* Diels f. *glabrescens* Strib.

植物名 光叶栗色鼠尾草(拟)

功效 根、根茎:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264277

*Salvia castanea* Diels f. *pubescens* Strib.

植物名 柔毛栗色鼠尾草(拟)

文献名 毛叶栗色鼠尾《云南种录》

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264278

*Salvia castanea* Diels f. *tomentosa* Strib.

植物名 绒毛栗色鼠尾草(拟)

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264279

*Salvia cavaleriei* Levl.

植物名 贵州鼠尾草《中国植志》

文献名 贵州鼠尾《云南植志》

地方名 叶下红、硃砂草(湖南、贵州);广西:含菜(隆林),气草(龙胜);贵州:红青菜,反背红,血盆草;其他:破锣子,红肺筋,铺地虎。

功效 全草:凉血解毒,散瘀止血。用于肺结核咯血,痢疾。外用于跌打损伤,疖肿。

#### 7264280

*Salvia cavaleriei* Levl. var. *erythrophylla* (Hemsl.) Strib.

植物名 紫背贵州鼠尾草《贵州药录》

药材名 女菀《本经》、《新华本草纲要》

文献名 白菀、织女菀《别录》

地方名 贵州:反背红(梵净山)。

功效 全草:凉血,止血。用于吐血,咳血,鼻血,刀伤出血,血崩。

#### 7264281

*Salvia cavaleriei* Levl. var. *simplicifolia* Strib.

植物名 血盆草《中国植志》

药材名 血盆草《汇编》

文献名 小丹参《名实图考》、破锣子《峨眉药植》,单叶血盆草《四川中药志》

地方名 朱砂草、反背红、叶下红(湖南、贵州);广西:野丹参(隆林);四川:红肺筋,红五匹,红薄落(屏山),罗汉草、破落子、破罗子、单叶波罗子、波罗子、波罗机(峨眉),翻背红、四棱草(南川),翻红草,鼠雀菜、退节草(忠县),气喘药(叙永);贵州:红青菜(剑河)。

功效 全草:止血,清湿热。用于咳嗽吐血,血崩,血痢,创伤出血。

#### 7264282

*Salvia chinensis* Benth.

植物名 华鼠尾草《中国植志》

药材名 石见穿《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 小丹参、五凤花《名实图考》,华鼠尾《中草药学》

地方名 紫参(江苏、浙江、江西、四川);江苏:月下红,石见川(苏州),石打穿;浙江:山缝拿(临安),紫丹花(乐清);安徽:红根参;江西:半枝莲;广东:田芹菜;广西:野沙参,乌沙草,黑面风,大发汗,大乌痧草(全州);四川:活血草(江津);其他:小红参。

功效 地上部分:清热解毒,活血,利气,止痛。用于腕胁胀痛,噎膈,痰喘,肝炎,赤白带下,瘰癧,痢肿。

#### 7264283

*Salvia coccinea* L.

植物名 朱唇《中国植志》

药材名 朱唇《汇编》

地方名 福建:三叶青;广西:(香茶菜)(邕宁),〔蛇总管〕(马山);云南:小红花(蒙自),〔丹参〕(文山)。

功效 全草:凉血,止血,清热利湿。用于血崩,高热,腹痛不适。

#### 7264284

*Salvia cynica* Dunn

植物名 犬形鼠尾草《中国植志》

文献名 犬形鼠尾《高植图鉴》

地方名 四川:狗尾草(峨眉山),山雀香。

功效 全草:清热解毒。

#### 7264285

*Salvia deserti* Schang

植物名 新疆鼠尾草《中国植志》

文献名 新疆鼠尾《高植图鉴》

功效 根:清热解毒。

#### 7264286

*Salvia digitaloides* Diels

植物名 毛地黄鼠尾草《中国植志》

药材名 白背丹参《汇编》

文献名 丹参《玉龙山药植》

地方名 云南:银紫丹参、白元参(丽江),“玉名喇叭”(丽江纳西语),紫丹参。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经。

#### 7264287

*Salvia evansiana* Hand.-Mazz.

植物名 雪山鼠尾草《中国植志》

文献名 雪山鼠尾《云南植志》,埃望鼠尾《中国植物学杂志》

地方名 云南:紫花丹参(丽江)。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经。

#### 7264288

*Salvia flava* Forrest ex Diels

植物名 黄花鼠尾草《中国植志》

文献名 黄花鼠尾《云南植志》

地方名 云南:黄花丹参、丹参(丽江)。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经。

#### 7264289

*Salvia glutinosa* L.

植物名 胶质鼠尾草《中国植志》

文献名 粘毛鼠尾草《青藏药图》,胶粘鼠尾《高植图鉴》

地方名 青海:“吉子莫保”(藏名)。

功效 根:用于胃出血,肺癆咯血。

#### 7264290

*Salvia honania* L. H. Bailey

植物名 河南鼠尾草《中国植志》

文献名 河南鼠尾《高植图鉴》

地方名 河南:丹参(信阳)。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经。

#### 7264291

*Salvia japonica* Thunb.

植物名 鼠尾草《中国植志》

药材名 鼠尾草《浙江药植志》

文献名 荔《尔雅》,鼠尾、山陵翘《吴普本草》,陵翘《别录》,鸟草、水青《纲目拾遗》,水菊《新纲》

地方名 浙江:坑苏(泰顺),紫花丹(乐清),秋丹参(天目山);湖南:霸王鞭;广西:龙牙大戟(凌云),〔红芽大戟〕(容县),紫参,消炎草(桂林)。

功效 地上部分:祛瘀止痛,活血调经。

**7264292***Salvia kiaometiensis* Levl.

植物名 荞麦地鼠尾草《中国植志》

文献名 荞麦地鼠尾《云南植志》

地方名 云南:丹参、红根(巧家)。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经。

**7264293***Salvia kiaometiensis* Levl. f. *pubescens* Stib.

植物名 柔毛荞麦地鼠尾草(拟)

药材名 土丹参(四川盐源)、《汇编》

文献名 地鼠尾《汇编》,毛叶荞麦地鼠尾《云南植志》

功效 根:祛瘀止痛,活血调经。

**7264294***Salvia lankongensis* C. Y. Wu

植物名 洱源鼠尾草《中国植志》

药材名 紫丹参(云南大理)、《新华本草纲要》

地方名 云南:“红须须”(大理白族语)。

功效 根:活血调经,行瘀止痛。

**7264295***Salvia liguliloba* Sun

植物名 舌瓣鼠尾草《中国植志》

文献名 长叶丹参《浙江药植志》,舌瓣鼠尾《高植图鉴》

地方名 浙江:对口元宝草(临安)。

功效 全草:活血通络。用于关节酸痛,妇女月经不调。

**7264296***Salvia mairei* Levl.

植物名 东川鼠尾草《中国植志》

文献名 东川鼠尾《高植图鉴》

功效 根、根茎:祛瘀止痛,活血调经,养心除烦。

**7264297***Salvia maximowicziana* Hemsl.

植物名 鄂西鼠尾草《中国植志》

文献名 秦岭鼠尾《高植图鉴》

地方名 四川:〔红秦艽〕〔茂汶〕。

备考 根:不含丹参酮Ⅱ-A,也不含次甲丹参酮及丹参酮Ⅰ。但在四川混作红秦艽用。

**7264298***Salvia mekongensis* Stib.

植物名 湄公鼠尾草《中国植志》

功效 根:有抗金黄色葡萄球菌作用。

**7264299***Salvia miltiorrhiza* Bunge

植物名 丹参《中国植志》

药材名 丹参《本经》、《药典》

文献名 鄮蟬草《本经》,赤参、木羊乳《吴普本草》,逐马《本草经集注》,山参《日华子本草》,濂州紫参《大观本草》,奔马草《纲目》,紫花丹参《中草药》,长鼠尾草《广西兽药》,红根《中国药植志》

地方名 紫丹参(河北、山东、江苏、浙江、安徽、江

西、湖北、广东、广西、四川),紫参(北京、甘肃、浙江),紫丹根(湖南、广东),红丹参(浙江、湖北、广西),红参、赤丹参(江苏、浙江),红萝卜(浙江、江西),血参(江苏、河南、湖北),靠山红(山东、江苏、安徽),野苏子根(辽宁、河北、北京),山苏子(河北、陕西),血参根、烧酒壶根、山苏子根(东北);北京:野苏子秧;河北:大红袍、血丹参、状元红、壬参;陕西:蜂糖罐;山东:蜜罐头(莒县、沂源、昌乐、五莲),红娘子棵(平邑),扎扎菜(莱阳、牙山、海阳、掖县),扎扎蒿(崂山),蚕连花(益都),紫花地宁子(章丘),红苏子(莱芜),血山根(泰山、蒙山),朵朵红根;江苏:紫党参,大叶活血丹,红根红参,活血根(无锡);浙江:山红萝卜,土丹参(嵊县),四方梗;安徽:红骨参,山丹参(滁县);江西:八莲麻(吉水),夏丹参;河南:红暖药,麻大姐;湖南:山紫草,接骨风,四方蓝花草,麦参;四川:红根赤参,川丹参。

功效 根、根茎:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。用于月经不调,经闭痛经,癥瘕积聚,胸腹刺痛,热痹疼痛,疮疡肿毒,心烦不眠,肝脾肿大,心绞痛。

**7264300** 见 7264301a**7264301***Salvia miltiorrhiza* Bunge f. *alba* C. Y. Wu et H. W. Li

植物名 白花丹参《植分学报》

药材名 白花丹参《汇编》

地方名 山东:丹参。

功效 根:用于血栓闭塞性脉管炎。

**7264301a***Salvia miltiorrhiza* Bunge var. *charbonnelii* (Levl.) C. Y. Wu --- *S. charbonnelii* Levl.

植物名 单叶丹参《秦岭植志》

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

**7264302***Salvia nanchuanensis* Sun var. *pteridifolia* Sun

植物名 蕨叶南川鼠尾草《贵州药录》

地方名 贵州:反背红(梵净山)。

功效 全草:凉血、止血。用于吐血、咳血、鼻血,刀伤出血,血崩。

**7264303***Salvia officinalis* L.

植物名 撒尔维亚《中国植志》

药材名 洋苏叶(叶《生药》)

文献名 撒尔维亚叶(叶《生药》)

地方名 云南:香草(丽江);其他:洋鼠尾草。

功效 叶:用于咽喉炎(含漱剂)。

**7264304***Salvia omeiana* Stib.

植物名 峨眉鼠尾草《中国植志》

文献名 峨眉鼠尾《高植图鉴》

地方名 四川:南茄草、白生麻、白气草(峨眉),野苏麻(冕宁)。

功效 全草:祛风除湿,舒筋活血。

**7264305***Salvia paramiltiorrhiza* H. W. Li et X. L. Huang

植物名 皖鄂丹参《植分学报》

文献名 拟丹参《中国植志》

地方名 安徽:丹参(中部、南部地区)。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264306

*Salvia paramiltiorrhiza* H. W. Li et X. L. Huang f. *purpureo-rubra* H. W. Li

植物名 紫花皖鄂丹参《植分学报》

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264307

*Salvia plebeia* R. Br.

植物名 荔枝草《中国植志》

药材名 荔枝草《纲目》、《汇编》

文献名 荠苎《本草拾遗》,水羊耳《生草药性备要》,过冬青、天明精《经验广集》,凤眼草、赖师草、隔冬青(汪连仕《采药书》),雪里青《慈航活人书》,皱皮葱《纲目拾遗》,癩子草、野芝麻、野薄荷、癩客蚂草《草木便方》,癩吓蟆《分类草药性》,假苏荆芥、吓蟆草《药物图考》,膨胀草、沟香薷《中国植物图鉴》,麻麻草《民药汇编》,皱面鼠尾草、(鹤虱)《祁州药志》,小花鼠尾草《东北草本植志》,假荆芥《云南药录》,灯盏窝《陕西中草药》

地方名 癩头草(江苏、上海),癩蛤蟆草(江苏、上海、江西、湖南、四川),癩格宝草、癩疙宝草(四川、贵州),癩肚皮棵(江苏、河南),皱皮草(江苏、上海、江西、湖南、四川),蛤蟆草(山东、江苏、台湾、湖南、广东),[土荆芥](陕西、台湾、云南),雪见草(陕西、江苏、浙江、江西、湖北、广东、贵州),野猪菜(江苏、上海),野芥菜(江苏、江西、浙江、广西),赖断头草(江苏、台湾);陕西:蚌肚草;山东:疥巴子草、蛤蟆皮(烟台);江苏:黑紫苏;浙江:白根野芥菜(衢县),麦积草,天芥菜、牛不吃(温州、永嘉),水荆芥(泰顺),过冬草;安徽:癩猴棵子,芝麻草;江西:小活血,麻鸡婆,内红消,土活血(吉安),猪婆草(丰城),麻鸡婆草(新建),毛芥菜(贵溪),毛苦菜;福建:金蜘蛛(泉州),百层草(厦门),半红白田乌草,野白苏,绿玉簪;台湾:七层塔,假苏;河南:癩蛤蟆棵,砂锅片,野辣菜;湖北:旋涛草;湖南:野青菜,见肿消;广东:鱼味草,臭草,[荆芥];广西:大塔花,劫细,消炎草,麻婆菜;四川:癩肚子苗,皱皮大菜,波罗子,青蛙草(峨眉山);贵州:癩疙包草,野茄子(安龙),[山茴香](瓮安);云南:猴臂草(永平),野荆芥,猴背草。

功效 地上部分:清热,解毒,凉血,利尿。用于咽喉肿痛,支气管炎,肾炎水肿,痈疮肿毒,咳血,吐血。外用于乳腺炎,痔疮肿痛,出血,跌打损伤,蛇犬咬伤。

#### 7264308

*Salvia plectranthoides* Griff. --- *Salvia japonica* Thunb. var. *parvifoliola* Hemsl.

植物名 长冠鼠尾草《中国植志》

药材名 红骨参《陕西中草药》

文献名 紫参《滇南本草》,劲枝丹参《名实图考》,小丹参《中药志》,四花菜叶丹参《中药大辞典》

地方名 陕西:毛丹参;广西:[山胡椒]、山萝卜(隆林);四川:活血草、散血草(青川);贵州:串皮猫药(罗

甸),野藿香(贵阳);云南:丹参(大理),山槟榔、紫丹参(昆明),沙槟榔,赤参。

功效 根:活血强筋,活经暖络。用于风寒湿痹,手足麻木,软战摇动,筋骨疼痛,半身不遂,痿软流涎,补虚调经。

备考 据《新华本草纲要》(1988)称:《名实图考》(卷七)之紫参,滇南山中有产,其所附图之外形与叶形,与《图经本草》之潯州紫参图相似,应为本种。《名实图考》(卷十)之劲枝丹参亦应为本种。而卷二十蔓草类的另一紫参,又名滇紫参,则为茜草科小红参 *Rubia yunnanensis* Diels.

#### 7264309

*Salvia prionitis* Hance

植物名 红根草《中国植志》

药材名 关公须(江西)

文献名 叶下红《名实图考》,黄埔鼠尾草《药典》,假鼠尾草《广西植录》,江西鼠尾《江西药录》

地方名 雪见草、根下红、小活血(江西、福建);浙江:黄埔鼠尾;江西:红根子,吉活血、土活血(吉安),小丹参(莲塘),关羽须、关爷须(奉新),扑地红、落地红(占水、景德镇),扑地消,猪婆草,鸡婆草,麻鸡婆,野芥菜,毛芥菜;广西:红地胆(桂林)。

功效 全草:清热解毒,抗菌消炎。用于急性扁桃腺炎,咽喉炎,支气管炎,肠炎,细菌性痢疾,肾炎等。

#### 7264310

*Salvia przewalskii* Maxim.

植物名 甘西鼠尾草《中国植志》

药材名 甘肃丹参《汇编》

文献名 甘西鼠尾《高植图鉴》,紫花鼠尾草《药学报》,高原丹参《青藏药图》

地方名 丹参(甘肃、宁夏、青海、云南);青海:“占子恩保”(藏名);四川:[红秦艽](灌县,峨眉山);云南:紫丹参(丽江),华西党参;西藏:“疾恣蕃布”(藏名)。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦;花:用于慢性咳嗽,肝炎。

#### 7264311

*Salvia przewalskii* Maxim. var. *alba* A. L. Huang

植物名 白花甘西鼠尾草《植分学报》

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264312

*Salvia przewalskii* Maxim. var. *glabrescens* Stib.

植物名 少毛甘西鼠尾草《植分学报》

文献名 少毛甘西鼠尾《高植图鉴》,少毛鼠尾草《西藏植志》

地方名 四川:红秦艽(茂汶),灵兰香(康定)。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264313

*Salvia przewalskii* Maxim. var. *mandarinorum* (Diels) Stib.

植物名 褐毛甘西鼠尾草《植分学报》

药材名 大紫丹参《中药品种理论研究》

文献名 褐毛甘西鼠尾、褐毛甘肃丹参《中药志》

地方名 丹参(甘肃、宁夏、青海、云南);四川:红秦艽;云南:大丹参、紫丹参。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264314

*Salvia roborowskii* Maxim.

植物名 粘毛鼠尾草(中国植志)

文献名 黄花鼠尾草(青藏药图),粘毛鼠尾(高植图鉴)

地方名 甘肃:野芝麻;青海:“吉子嘎保”(藏名)。

功效 全草:用于肝炎,牙痛。

#### 7264315

*Salvia scapiformis* Hance

植物名 地埂鼠尾草(中国植志)

文献名 花茎状丹参(广西药录),紫花丹参、小红参(玉龙山药植),地埂鼠尾(高植图鉴),花梗鼠尾(中药大辞典)

地方名 福建:山字止;湖南:泡骨丹;广东:田芹菜;广西:翻天雷公(兴安);四川:血盆草,红博落,气喘药,破落子,破萝卜(峨眉山);贵州:白补药。

功效 全草:强筋壮骨,补虚益损。用于肺病咳嗽,虚弱干瘦,头晕目眩。

#### 7264316

*Salvia scapiformis* Hance var. *hirsuta* Stib.

植物名 硬毛地埂鼠尾草(贵州药录)

地方名 贵州:白补药(雷公山)。

功效 全草:用于劳伤疼痛,虚弱干瘦。

#### 7264317

*Salvia schizochila* Stib.

植物名 裂瓣鼠尾草(中国植志)

文献名 裂瓣鼠尾(高植图鉴)

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264318

*Salvia sinica* Migo

植物名 浙皖丹参(植分学报)

地方名 安徽:丹参。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264319

*Salvia sinica* Migo f. *purpurea* H. W. Li

植物名 紫花浙皖丹参(植分学报)

地方名 安徽:黑根丹参(青阳)。

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264320

*Salvia smithii* Stib.

植物名 橙香鼠尾草(中国植志)

文献名 橙色鼠尾草(峨眉药植资源),橙色鼠尾(高植图鉴)

地方名 四川:鼠尾草(峨眉山)。

功效 全草:用于咳嗽,痢疾,牙痛。

#### 7264321

*Salvia splendens* Ker-Gawl.

植物名 一串红(中国植志)

文献名 西洋红(高植图鉴)

地方名 象牙红(广东、广西);北京:墙下红;福建:炮仔花;云南:象牙海棠。

功效 全草:清热凉血,消肿。外用于疮痍肿毒,跌打脱臼肿痛。

#### 7264322

*Salvia subpalmatinervis* Stib.

植物名 近掌脉鼠尾草(中国植志)

文献名 近掌脉鼠尾(高植图鉴)

功效 根:祛瘀止痛,活血调经,清心除烦。

#### 7264323

*Salvia substolonifera* Stib.

植物名 佛光草(中国植志)

药材名 湖广草(汇编)

文献名 蔓茎鼠尾(高植图鉴),走茎丹参(广西药录)

地方名 浙江:荔枝肾(温州);湖南:九龙草;广西:乌痧草(全州);四川:圆圆荔枝草,小灯台草,小铜钱草(平安),癞疙宝耳朵;贵州:盐咳药(绥阳),小退火草(正安)。

功效 全草:清热利湿,平喘止咳,调经止血。用于风湿咳嗽,痰多气喘,吐血,白带,小便频数,腰痛,月经过多。

#### 7264324

*Salvia tricuspis* Franch.

植物名 黄鼠狼花(中国植志)

文献名 三角鼠尾(秦岭植志)

功效 根:祛瘀止痛,活血调经。

#### 7264325

*Salvia trijuga* Diels

植物名 三叶鼠尾草(中国植志)

药材名 小红参(汇编)

文献名 三叶鼠尾(云南植志),三对叶丹参(云南药录)

地方名 小红丹参、紫参(四川、云南);四川:红根根药、猫儿搬倒甑(木里);云南:丹参、紫丹参(丽江、中甸)。

功效 根:调经活血,祛瘀生新。用于月经不调,痛经,血虚经闭,肾虚腰痛,神经衰弱,失眠。

#### 7264326

*Salvia umbratica* Hance

植物名 荫生鼠尾草(北京植志)

地方名 河北:山苏子,山椒子。

功效 全草:用于咽炎。

#### 7264327

*Salvia yunnanensis* C. H. Wright

植物名 云南鼠尾草(中国植志)

药材名 云南丹参(汇编)

文献名 丹参(滇南本草),小丹参(名实图考),云南鼠尾(云南植志),滇丹参(高植图鉴)

地方名 云南:石山丹参,红青菜,紫丹参(昆明、曲靖、大理、丽江、洱源),山槟榔(昆明、曲靖、思茅),沙槟榔,小红参、小红丹参(丽江),小红草乌、红丹参、红草

乌(红河), 小檗柳、紫参(昆明), 奔马草(安宁), 尖砂理肺散(富民), 紫丹根。

功效 根: 活血调经, 行瘀止痛。用于月经不调, 闭经, 痛经, 产后腹痛, 跌打损伤, 关节疼痛, 疝痛, 腰痛, 疳疔肿毒。

#### 7264328

*Schizonepeta multifida* (L.) Briq.

植物名 多裂叶荆芥《中国植志》

药材名 大穗荆芥《拉汉种称》

文献名 大叶荆芥《东北药植志》, 东北裂叶荆芥《东检》

地方名 荆芥(东北、河北、江苏、贵州)。

功效 全草: 发表, 祛风, 理气, 止血。用于感冒发热, 中风口噤, 吐血, 衄血, 便血, 崩漏, 痈肿疮疔。

#### 7264329

*Schizonepeta tenuifolia* (Benth.) Briq. --- *Nepta tenuifolia* Benth.

植物名 荆芥《汇编》

药材名 荆芥《吴普本草》、《药典》

文献名 假苏、鼠蕒《本经》, 鼠实、姜芥《吴普本草》, 丘州假苏、成州假苏《大观本草》, 荆芥穗《滇南本草》, 京芥、郑芥、一稔金、再生丹、如圣散、独行散、举卿古拜散《新纲》, 假芥《满洲植录》, 静风尾《沈阳县志》, 裂叶荆芥《中国植志》

地方名 香荆芥(河北、北京), 线芥(江西、湖南); 河北: 四棱杆蒿; 内蒙古: “哈日-吉菇格”(蒙名); 湖北: 麻荆芥; 湖南: 山薄荷, 土荆芥; 四川: 小茴香(夹江)。

功效 地上部分: 解表散风, 透疹。用于感冒, 头痛, 麻疹, 风疹, 疮疡初起; 炒炭: 用于便血, 崩漏, 产后血晕。

#### 7264330

*Schnabelia oligophylla* Hand.-Mazz.

植物名 四棱草《中国植志》

药材名 四棱筋骨草《四川中药志》

文献名 筋骨莲《草木便方》, 筋骨草《中国药植志》, 活血草《中药通报》, 假马鞭草《中国植物图鉴》

地方名 江西: 山半边莲, 野山禾; 广西: 四方草(贵县), 四能草(桂林), “蔑奄郎”(壮语); 四川: 箭羽筋骨草(南川), 箭羽舒筋草, 箭羽草, 舒筋箭羽草, 四楞筋骨草, 方筋骨草。

功效 全草: 祛风除湿, 舒筋活络。用于风湿筋骨疼痛, 腰痛, 四肢麻木, 跌打肿痛。

#### 7264331

*Schnabelia oligophylla* Hand.-Mazz. var. *oblongifolia* C. Y. Wu et C. Chen

植物名 长叶四棱草《云南植志》

药材名 长叶四棱筋骨草(拟)。

地方名 四川: [万年青]、四棱筋骨草(宜宾); 云南: 牛奶藤(绥江)。

功效 全草: 祛风除湿。用于风湿筋骨疼痛。

#### 7264332

*Schnabelia tetradonta* (Sum) C. Y. Wu et C. Chen

植物名 四齿四棱草《中国植志》

文献名 四齿筋骨草《中国植志》

地方名 贵州: 筋骨草

功效 全草: 祛风通络, 散瘀止痛。用于风湿痹痛, 四肢麻木, 跌打损伤, 经闭。

#### 7264333

*Scutellaria amoena* C. H. Wright

植物名 滇黄芩《中国植志》

药材名 西南黄芩《汇编》

文献名 黄芩《滇南本草》, 昆明黄芩《科种》

地方名 条芩、子芩、枯芩(四川、云南); 甘肃: 川黄芩; 四川: 魁芩; 贵州: 土黄芩; 云南: 雅致黄芩, 美黄芩(红河), 小黄芩(曲靖), 三叶草。

功效 根: 清湿热, 泻火, 解毒, 安胎。用于温病发热, 肺热咳嗽, 咯血, 黄疸, 痢疾, 胎动不安, 痈肿疮疔。

#### 7264334

*Scutellaria amoena* C. H. Wright var. *cinerea* Hand.-Mazz.

植物名 灰毛滇黄芩《云南种录》

地方名 云南: 黄芩。

功效 根: 清湿热, 泻火, 解毒。

#### 7264335

*Scutellaria baicalensis* Georgi

植物名 黄芩《中国植志》

药材名 黄芩《本经》、《药典》

文献名 腐肠《本经》, 黄文、妒妇、虹胜、经芩、印头、内虚《吴普本草》, 空肠《别录》, 子芩、宿芩《本草经集注》, 蕤芩《广雅》, 独尾芩《唐本草》, 条芩《纲目》, 芩、北芩、片芩、枯芩、里腐草、里朽草、杠谷树、里朽斤草、苦芩、片芩腐肠《新纲》, 元芩《和汉药标本目录》, 苦督郎、鼠尾芩《中国药植志》, 枯黄芩《中药大辞典》

地方名 黄金茶(河北、陕西、山东), 黄芩茶(山西、内蒙古、东北), 黄芩茶根(东北、北京), 土金茶根、野树豆花根(东北), 山茶根子、黄金茶根(黑龙江、辽宁、河北、内蒙古、山东); 辽宁: 山茶根(铁岭), 薰黄芩(洮南、喇嘛甸子); 北京: 山茶叶根, 枯芩, 黄芩瓣; 河北: 烂心草, 空心草(张家口); 内蒙古: 香水水草(商都), “浩俄钦”、“洪林贡”、“古奈-胡洪”、“巴宝色尔散”(蒙名); 陕西: 烂心黄(延安), 九龙茶(梁山九龙泉)。

功效 根: 清热燥湿, 泻火解毒, 止血, 安胎。用于湿温、暑温胸闷呕恶, 湿热痞满, 泻痢, 黄疸, 肺热咳嗽, 高热烦渴, 血热吐衄, 痈肿疮毒, 胎动不安。

#### 7264336

*Scutellaria baicalensis* Georgi var. *albiflora* K. Onuma

植物名 白花黄芩《品种论述》

功效 根: 清热燥湿, 泻火解毒, 止血, 安胎。

#### 7264337

*Scutellaria bambusetorum* C. Y. Wu

植物名 竹林黄芩《中国植志》

功效 根: 清湿热, 泻火, 解毒, 安胎。

#### 7264338

*Scutellaria barbata* D. Don --- *S. rivularis* Wall.

植物名 半枝莲《中国植志》

药材名 半枝莲《滇南本草》、《药典》

文献名 青牛膝、紫花草、半边莲、半朵莲、半枝花、一枝莲《滇南本草》，狭叶韩信草《广州植志》，溪边黄芩《四川中药志》，狭叶黄芩《海南植志》，半支莲《汇编》

地方名 挖耳草（江苏、湖南、广西、四川），耳挖草（福建、广西），并头草（陕西、江苏、上海、浙江、江西、湖北、广东、广西），牙刷草（江苏、上海、浙江、安徽、湖北、湖南、广东、四川），望江青（江苏、江西、湖南），四方草（浙江、福建），四方马兰（福建、浙江、湖南），水黄芩（陕西、江苏），瘦黄芩（陕西、四川），通经草（江苏、湖南），耙子草（福建、湖南），江苏：紫莲草（南京），田基草（宜兴）；浙江：野夏枯草，方草儿，半向花（乐清），半面花，偏头草（永嘉），四棱草（遂昌），四方梗（东阳），烫斗草（瑞安）；安徽：对叶草，小蓝花，茶叶草；江西：金挖耳，小叶望江青；福建：小号向天盏，虎咬红（泉州、晋江、南安），再生草（武平），狭叶向天盏，向天盏（闽南），四方杆（宁化），夜明珠（福清），倘天草（漳州），萝卜草、见天红、向天匙、赤肉草（松政）；河南：茶勺，勺草，勺儿茶；湖南：哪吒托枪，岩泽兰，大样女儿红，苦炒药，钉耙草；广东：碗畔花、单片花（潮阳），耳耙草（兴宁），铁棍草（潮安），四季春，细叶红背草；广西：小韩信草，小耳挖草，小韩信（南宁），韩信草，水韩信，“骂辣耙”（三江侗语）；四川：赶山鞭；贵州：水荆芥，鼻尖草；云南：小黄芩。

功效 全草：清热解毒，化瘀利尿。用于疔疮肿毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，跌扑伤痛，水肿，黄疸。

#### 7264339

*Scutellaria caudifolia* Sun ex C. H. Hu var. *obliquifolia* C. Y. Wu et S. Chow

植物名 斜叶尾叶黄芩（拟）

地方名 四川：野鸡黄（兴文）。

功效 全草：用于虚劳内伤。

#### 7264340

*Scutellaria chungtienensis* C. Y. Wu

植物名 中甸黄芩《中国植志》

地方名 云南：黄芩（丽江中甸）。

功效 根：清湿热，泻火。

#### 7264341

*Scutellaria coleifolia* Levl.

植物名 紫苏叶黄芩《中国植志》

药材名 反叶红《元江哈尼族药》

地方名 云南：“背单紫苏苏让”（元江哈尼语），山小紫苏（哈尼语意译）。

功效 全草：清热解表，止泻止痢。用于感冒发热，腹泻，痢疾。

#### 7264342

*Scutellaria discolor* Wall. ex Benth.

植物名 异色黄芩《中国植志》

药材名 紫背黄芩《汇编》

文献名 退色黄芩《广西药录》

地方名 广西：四天红、追天花根、红背菜（隆林）；贵

州：土黄芩（兴义）；云南：夜行草、野行草（潞西），挖耳草、一支箭（思茅、红河），紫背草（红河），熊胆草（临沧），一支蒿。

功效 全草：解表退热，消炎解毒。用于感冒高热，胃肠炎，咽喉肿痛，疮疖疔毒。

#### 7264343

*Scutellaria discolor* Wall. ex Benth. var. *hirta* Hand. -Mazz.

植物名 地盆草《名实图考》、《中国植志》

文献名 偏花黄芩《汇编》

地方名 贵州：土黄芩；云南：结筋草（富民）。

功效 根：清热燥湿。用于咳嗽，吐血，白痢；全草：用于筋结。

#### 7264344

*Scutellaria forrestii* Diels

植物名 灰岩黄芩《中国植志》

功效 根：清湿热，泻火，解毒，安胎。

#### 7264345

*Scutellaria franchetiana* Levl

植物名 岩藿香《中国植志》

文献名 方茎犁头草《汇编》

地方名 贵州：[犁头草]（榕江）。

功效 全草：清热凉血，化瘀，消肿，止咳。用于风湿咳嗽，跌打红肿。

#### 7264346

*Scutellaria hypericifolia* Levl. --- *Scutellaria amoena* auct. non C. H. Wright

植物名 连翘叶黄芩《中国植志》

药材名 川黄芩《中药志》

文献名 草地黄芩《汇编》

地方名 四川：“尼不兹”（藏名），黄芩，魁芩，条芩，子芩，上大芩。

功效 根：清热止咳，利湿解毒。用于风热咳嗽，湿热黄疸，高热头痛，目赤肿痛，泻痢腹痛，尿路感染，胎动不安，痈疖疔疮。

备考 《新华本草纲要》（1988）称：《四川中药志》（1960）将本种学名误订为 *Scutellaria amoena* C. H. Wright

#### 7264347

*Scutellaria indica* L.

植物名 韩信草《生草药性备要》、《中国植志》

药材名 向天盏（浙江、福建）、《汇编》

文献名 大力草、耳挖草《生草药性备要》，金茶匙《本草求原》，[紫花地丁]《植物名汇》，立浪草《牧野日图》，印度黄芩《中国植物图鉴》，挖耳草《四川中药志》，疔疮草《浙江药植志》

地方名 金汤匙（浙江、福建），金挖耳（江西、四川）；江苏：烟管草；江西：野婆婆（定南），大挖耳草，石灯盏，内红消，铁钉台，铁灯盏，铁灯柱；浙江：合耳花（临安），油灯盏（杭州），龙游香草（鄞县），木勺草，偏向花，半支莲（吴兴），小叶山紫苏（天目山），疔药（温州），红疔草（平阳）；福建：虎咬痕（晋江、泉州、福州），向天匙，狗咬



癩(厦门),消草,虎咬草,向天汤匙,金匙羹,银匙羹,蜜草,山泽兰,占虫草,大本向天盏,皱面癩;河南:三合香(商城);湖南:调羹草、红叶犁头兴(永兴);广东:蓝花茶匙红、红花茶匙红(潮阳);海南:小金牛;广西:大韩信草(南宁),大叶半枝莲,笑花草(柳江),蓝花蛇舌草,向东花,钩头线(桂平);四川:小挖耳;贵州:顺经草,顺筋草,地苏麻;其他:金锁匙,蓝花茶匙癩,地百根草。

功效 全草:清热解毒,活血,疏肝。用于胸胁闷痛,肺脓疡,痢疾,肠炎,白带。外用于痈疮,疔疮,蛇咬伤。

## 7264348

*Scutellaria indica* L. var. *elliptica* Sun ex C. H. Hu

植物名 长毛韩信草《贵州药录》

功效 全草:祛风,活血,解毒,止痛。用于跌打损伤,吐血,痈肿,疔毒,喉风,牙痛。

## 7264349

*Scutellaria indica* L. var. *humilis* Makino

植物名 元元草《中药大辞典》

药材名 圆圆草(四川)

地方名 四川:圆圆荔枝草、润肺草(成都)。

功效 全草:清热解毒。用于咳嗽,耳边黄水疮,拔疗去毒。

## 7264350

*Scutellaria indica* L. var. *parvifolia* (Makino) Makino

植物名 小叶韩信草(拟)

功效 全草:用于毒蛇咬伤。

## 7264351

*Scutellaria indica* L. var. *subcaulis* (Sun ex C. H. Hu) C. Y. Wu et C. Chen

植物名 缩茎韩信草《贵州药录》

地方名 福建:金耳挖(福安),天田盏(南靖);广西:小金疮草(钟山)。

功效 全草:清热解毒,消肿止痛。

## 7264352

*Scutellaria likiangensis* Diels

植物名 丽江黄芩《中国植志》

药材名 丽江黄芩《汇编》

地方名 云南:白花黄芩(玉龙山),黄芩,小黄芩(丽江)。

功效 根:清热凉血,安胎。用于更年期红崩,内热胎动不安,热病发烧,肺热咳嗽,肠炎,痢疾,吐血,衄血,便血,热淋。

## 7264353

*Scutellaria macrodonta* Hand. -Mazz.

植物名 大齿黄芩《北京植志》

功效 全草:用于急性肠炎。

## 7264354

*Scutellaria moniliorrhiza* Komarov

植物名 念珠根茎黄芩《中国植志》

药材名 串珠黄芩《高植图鉴》

文献名 念珠根黄芩《长白山植药志》

功效 根:清热解毒,止血,安胎。

## 7264355

*Scutellaria obtusifolia* Hemsl.

植物名 钝叶黄芩《中国植志》

地方名 广西:蛇头花(隆林);贵州:上黄芩(赤水)。

功效 全草:清热解毒,平肝解郁。用于肝脾肿大,高烧不退,痢疾,咳嗽。

## 7264356

*Scutellaria obtusifolia* Hemsl. var. *trinervata* (Vant.) C. Y. Wu et H. W. Li

植物名 三脉钝叶黄芩《贵州药录》

地方名 广西:大叶耳挖草(昭平);贵州:黄芩,三脉黄芩。

功效 全草:清热解毒,平肝解郁。用于肝脾肿大,高烧不退,痢疾,喘咳,蛇虫咬伤,痈疮肿毒。

## 7264357

*Scutellaria omeiensis* C. Y. Wu

植物名 峨眉黄芩《中国植志》

地方名 四川:白合香、白藿香(峨眉)。

功效 全草:清热散风,除湿。

## 7264358

*Scutellaria orthocalyx* Hand. -Mazz.

植物名 直萼黄芩《中国植志》

药材名 屏风草(云南曲靖)、《汇编》

地方名 云南:半枝莲、滇紫花地丁(曲靖、红河),蓝花地丁(曲靖),〔紫花地丁〕(红河、曲靖、玉溪),小黄芩(昆明)。

功效 全草:消炎退热,解毒消肿。用于急慢性胃炎,痢疽肿毒,疥疮,体癣,手足癣,小儿走马疳。

## 7264359

*Scutellaria pekinensis* Maxim. var. *ussuriensis* (Regel) Hand. -Mazz. --- *S. ussuriensis* (Regel) Kudo

植物名 黑龙江黄芩(拟)

药材名 胡草芩(长白山)

文献名 乌苏里黄芩《长白山植药志》

地方名 吉林:黄底芩、小黄芩(长白山)。

功效 根:清热解毒,止血,安胎。

## 7264360

*Scutellaria pingbienensis* C. Y. Wu et H. W. Li

植物名 屏边黄芩《中国植志》

功效 根:清湿热,泻火。

## 7264361

*Scutellaria purpureocardia* C. Y. Wu

植物名 紫心黄芩《中国植志》

文献名 连线草《元江哈尼族药》

地方名 云南:“然姑武舌舌时那雌”(元江哈尼语),小儿伤风药(哈尼语意译)。

功效 全草:疏散风热。用于风热感冒。

## 7264362

*Scutellaria quadrilobulata* Sun ex C. H. Hu

植物名 四裂花黄芩《中国植志》

药材名 四香花《峨眉药植资源》

文献名 硬毛黄芩《贵州药录》

地方名 四川:白合香、上薄荷(峨眉)。

功效 全草:祛风,散寒,安神。

#### 7264363

*Scutellaria quadrilobulata* Sun ex C. H. Hu var. *pilosa* C. Y. Wu et S. Chow

植物名 硬毛四裂花黄芩(拟)

文献名 偏花黄芩《贵州药录》

地方名 贵州:上黄芩。

功效 根:用于热咳,吐血,血痢。

#### 7264364

*Scutellaria regeliana* Nakai

植物名 狭叶黄芩《中国植志》

文献名 薄叶黄芩《长白山植药志》

功效 根:清湿热,泻火。

#### 7264365

*Scutellaria regeliana* Nakai var. *ikonnikovii* (Juz.) C. Y. Wu et H. W. Li --- *S. ikonnikovii* Juz.

植物名 塔头狭叶黄芩(拟)

文献名 薄叶黄芩《汇编》,野黄芩《沙漠药植》,塔头黄芩、上黄芩《品种论述》,黄芩《中药大辞典》

地方名 内蒙古:香水水草。

功效 全草:清热解毒。用于牙痛,齿槽炎,脓肿,疮疖。

#### 7264366

*Scutellaria rehderiana* Diels

植物名 甘肃黄芩《中国植志》

药材名 黄芩(西北)、《中药大辞典》

功效 根:清湿热,泻火。

#### 7264367

*Scutellaria scordifolia* Fisch. ex Schrank

植物名 并头黄芩《中国植志》

药材名 头巾草《汇编》

文献名 头巾黄芩《江苏植录》

地方名 山西:山麻子(霍县);内蒙古:“敖格图那其其格”(蒙名);江苏:半支莲,牙刷草,田鸡杆,产妇草;四川:并头草。

功效 全草:清热解毒,利尿。用于肝炎,阑尾炎,跌打损伤,蛇咬伤。

#### 7264368

*Scutellaria scordifolia* Fisch. ex Schrank var. *wulingshanensis* (Nakai et Kitag.) C. Y. Wu et W. T. Wang --- *S. wulingshanensis* Nakai et Kitag.

植物名 雾灵黄芩《北京植志》

功效 根茎:用于上呼吸道感染,急性肠胃炎。

#### 7264369

*Scutellaria sessilifolia* Hemsl.

植物名 石蜈蚣草《中国植志》

药材名 胡豆草《四川中药志》

文献名 无柄黄芩《中药大辞典》

地方名 四川:地马桑(峨眉山),吊鱼杆(宜宾)。

功效 全草:清热解毒,活血散瘀。用于目赤肿痛,跌打损伤。

#### 7264370

*Scutellaria shweliensis* W. W. Smith

植物名 瑞丽黄芩《中国植志》

地方名 云南:挖耳草(耿马)。

功效 根:清湿热,泻火。

#### 7264371

*Scutellaria tayloriana* Dunn

植物名 偏花黄芩《中国植志》

地方名 贵州:上黄芩(兴义)。

功效 根:用于热咳,吐血及血痢。

备考 本品根细瘦,和中药黄芩有别。

#### 7264372

*Scutellaria tenax* W. W. Smith var. *patentipilosa* (Hand. - Mazz.) C. Y. Wu

植物名 展毛韧黄芩《云南植志》

药材名 大黄芩《中药志》

功效 根:清湿热,泻火。

#### 7264373

*Scutellaria viscidula* Bunge

植物名 粘毛黄芩《中国植志》

药材名 黄芩(山西)、《中药大辞典》

文献名 腺毛黄芩《药学报》,黄花黄芩《东检》

地方名 鸽子花(东北);内蒙古:下巴子(固阳);其他:粘腺黄芩。

功效 根:清湿热,泻火。

#### 7264374

*Scutellaria yunnanensis* Levl.

植物名 红茎黄芩《中国植志》

药材名 红茎黄芩《四川中药志》

地方名 四川:多子草(江北),红黄芩(峨眉),碗花。

功效 全草:清热解毒,凉血。用于痢疮肿毒,疔疖,肺热咳血。

#### 7264375

*Scutellaria yunnanensis* Levl. var. *salicifolia* Sun ex C. H. Hu

植物名 柳叶红茎黄芩《贵州药录》

地方名 四川:血沟丹(江津),土黄芩(合川);贵州:一麻消(赤水)。

功效 全草:清热解毒,平肝解郁。用于肝脾肿大,高热不退,痢疾,咳喘。

#### 7264376

*Siphocranion macranthum* (Hook. f.) C. Y. Wu

植物名 筒冠花《中国植志》

文献名 大花筒冠花《植分学报》

地方名 四川:草藤乌(峨眉)。

功效 全草:外用于敷疮毒。

#### 7264377

*Skapanthus oreophilus* (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li

植物名 子宫草(云南)、《中国植志》

文献名 葶花《云南种录》

地方名 云南:龙老根(丽江)。

功效 根:活血调经。用于月经不调。

## 7264378

*Skapanthus oreophilus* (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li f. *albus* C. Y. Wu

植物名 白花子宫草(拟)

文献名 白花葶花《云南种录》

地方名 云南:龙老根、子宫草(丽江)。

功效 根:活血调经。用于月经不调。

## 7264379

*Skapanthus oreophilus* (Diels) C. Y. Wu et H. W. Li var. *elongatus* (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu et H. W. Li

植物名 茎叶子宫草(拟)

文献名 茎叶葶花《云南种录》

地方名 云南:子宫草、龙老根(丽江)。

功效 根:活血调经。用于月经不调。

## 7264380

*Stachys arrecta* L. H. Bailey

植物名 蜗儿菜(江苏泰县)、《中国植志》

地方名 安徽:宝塔菜(九华山)。

功效 全草:用于跌打损伤、疮毒、祛风毒。

## 7264381

*Stachys baicalensis* Fisch. ex Benth.

植物名 毛水苏《中国植志》

药材名 毛水苏《汇编》

文献名 水苏《本经》,鸡苏《吴普本草》,劳祖、芥苴、瓜苴、道华《别录》,香苏《补缺肘后方》,龙脑薄荷《日用本草》,狗胡麻《牧野日图》,贝加尔水苏《内蒙古中草药》

地方名 水鸡苏(江西、湖南);内蒙古:水苏草,“好姆亨”(蒙名);湖南:野紫苏,山升麻,乌雷公,朋头草,陈痧草;四川:“谢葱杂鲁”(若尔盖藏名)。

功效 全草:祛风解毒,止血。用于感冒,咽喉肿痛,吐血,衄血,崩漏,胃酸过多。外用于疮疖肿毒。

## 7264382

*Stachys baicalensis* Fisch. ex Benth. var. *hispidula* (Regel) Nakai

植物名 小刚毛水苏(拟)

文献名 水苏、鸡苏、香苏《满蒙产药植》

地方名 内蒙古:紫丁香。

功效 全草:祛风解毒,止血。

## 7264383

*Stachys chinensis* Bunge ex Benth.

植物名 华水苏《中国植志》

文献名 水苏《东检》

功效 全草:祛风解毒,止血。

## 7264384

*Stachys geobombicis* C. Y. Wu

植物名 地蚕《中国植志》

药材名 地蚕《广西本草选编》

文献名 白虫草、肺癆草《汇编》

地方名 江西:野麻子(泰语);广西:土虫草(南宁),土冬虫草、(冬虫夏草)(桂平),白冬虫草(武鸣、陆川、桂平、苍梧),五眼草,土石蚕(南宁),冬虫草(北流、苍梧),“妈奔”(罗城仫佬语),水苏。

功效 块茎:益肾润肺,清热除烦。用于肺结核咳嗽,肺虚气喘,吐血,盗汗,贫血,小儿疳积;全草:用于跌打损伤,疮毒,祛风毒。

## 7264385

*Stachys geobombicis* C. Y. Wu var. *alba* C. Y. Wu et H. W. Li

植物名 白花地蚕《广西植志》

功效 块茎:清热补虚。用于肺病久咳。

## 7264386

*Stachys japonica* Miq.

植物名 水苏《中国植志》

药材名 水苏《本经》、《汇编》

文献名 鸡苏《吴普本草》,劳祖、芥苴、瓜苴、道华《别录》,香苏《肘后方》,〔龙脑薄荷〕《日用本草》,天芝麻《百草镜》,望江青、银脚鹭鹭、还精草、玉星草、〔血见愁〕、九节金丝草《纲目拾遗》,宽叶水苏《东检》

地方名 筋骨草(西北);甘肃:〔藿香〕(榆中);河北:〔银条菜〕;江苏:〔元宝草〕(南京),芝麻草(阜宁);浙江:白马兰(温州、青田),白根草(嘉兴),白绒线(永嘉),光叶水苏、泥灯心、方草鸟草、野地蚕(丽水);江西:水鸡苏。

功效 全草:清热解毒,祛痰止咳。用于咽喉炎,扁桃腺炎,百日咳,痔疮,带状疱疹。

## 7264387

*Stachys kouyangensis* (Vaniot) Dunn

植物名 西南水苏《中国植志》

药材名 破布草《云南中草药》

文献名 野甘露《中药大辞典》

地方名 四川:猫猫菜(叙永),山波萝卜(雷波);贵州:水苏麻;云南:麻布草(曲靖),铁骡子(楚雄),白根药(文山)。

功效 全草:消炎解毒,排脓。用于疮疖,骨髓炎。

## 7264388

*Stachys oblongifolia* Benth.

植物名 针筒菜《中国植志》

药材名 野油麻《贵州草药》

文献名 长圆叶水苏《植分学报》

地方名 河南:千密灌(卢氏);四川:水茴香;贵州:地参(剑河)。

功效 全草或根:补中益气,止血生肌。用于久痢,病后虚弱,外伤出血。

## 7264389

*Stachys oblongifolia* Benth. var. *leptopoda* (Hayata) C. Y. Wu --- *S. leptopoda* Hayata

植物名 细柄针筒菜(拟)

功效 全草:用于小儿疳积,肺结核咳嗽。

## 7264390

*Stachys palustris* L.

植物名 沼生水苏《中国植志》

文献名 望江青、天芝麻《李氏草秘》,银脚鹭鹭《纲目拾遗》,光叶水苏《中药大辞典》

地方名 浙江:白马兰,泥灯心,野地蚕,白根草,方

根鸟草儿,水蚕子。

功效 根或全草:清热化痰,抗菌消炎。用于风热咳嗽,咽喉肿痛,百日咳,痢疾,带状疱疹。

#### 7264391

*Stachys sieboldi* Miq.

植物名 甘露子《中国植志》

药材名 甘露子《食物本草》、《汇编》

文献名 地蚕《日用本草》,滴露《饮膳正要》,甘露儿《救荒本草》,土蛹《尔冬录》,草石蚕《本草会编》,露水果、地果《高邮州志》,海螺蛸《上海植录》,甘露《经济植物学》

地方名 土人参、地牯牛(四川、贵州),螺蛸菜(辽宁、江苏、湖南),螺丝菜(江苏、浙江);江苏:蜗儿菜(泰县),宝塔菜(东台);河南:米累累(卢氏);湖北:旱螺蛸(鹤峰);湖南:土蕊子(新化),毛菜(宜章),地蚕子,风子草;广西:土虫草(陆川),土冬虫草;四川:地母、地蕊(茂汶),地苟子;贵州:地钮,猫耳朵,地牯牛草;云南:罗汉菜(丽江)。

功效 全草或块茎:祛风利湿,活血散瘀。用于黄疸,尿路感染,风热感冒肺结核。外用于疮毒肿痛,蛇虫咬伤。

#### 7264392

*Teucrium anlungense* C. Y. Wu et S. Chow

植物名 安龙香科科《中国植志》

地方名 云南:野苏子。

功效 全草:用于小儿消化不良,腹胀痛。

#### 7264393

*Teucrium bidentatum* Hemsl.

植物名 二齿香科科《中国植志》

药材名 香科科(四川)

文献名 白花石蚕《高植图鉴》,香柯柯《四川中药志》

地方名 四川:红荆芥,野藿香(峨眉),泡草(西昌);贵州:细沙虫草(兴仁、长义)。

功效 根:用于痢疾,白斑。

#### 7264394

*Teucrium japonicum* Willd.

植物名 穗花香科科《中国植志》

文献名 石蚕《江苏南部种册》,野藿香《植物名汇》

地方名 江西:毛秀才;四川:四棱香(叙永),水藿香(成都),水合香(峨眉)。

功效 全草:发散风寒。用于风寒感冒,头痛,身痛。

#### 7264395

*Teucrium labiosum* C. Y. Wu et S. Chow

植物名 大唇香科科《中国植志》

地方名 贵州:野薄荷、山苏麻(贵阳)。

功效 全草:清热解毒,发表散寒。用于风寒感冒,肺病,痢疾。

#### 7264396

*Teucrium pernyi* Franch.

植物名 庐山香科科《中国植志》

药材名 细沙虫草《贵州草药》

文献名 白花石蚕《中药大辞典》

功效 根:健脾利湿,解毒。用于痢疾。

#### 7264397

*Teucrium pilosum* (Pamp.) C. Y. Wu et S. Chow

植物名 长毛香科科《中国植志》

地方名 四川:铁马鞭(巫溪),毛薄荷;贵州:石蚕(贵阳)。

功效 根茎:用于痧症;全草:清热解毒,祛风,止痒。用于炸腮,漆疮,湿疹,风疹瘙痒。

#### 7264398

*Teucrium quadrifarium* Buch.-Ham.

植物名 铁轴草《中国植志》

药材名 铁轴草《湖南药物志》

文献名 四裂石蚕《广西药录》

地方名 红痧药(湖南、广西);江西:牛尾草,毕刺;湖南:红毛将军(资兴),红油麻;广西:伤寒头、[刘寄奴]、假霜香(南宁),毛射香(苍梧),黄毛石蚕,红沙药,山薄荷,“梁欧”(三江侗语),“杀列使”(金秀瑶语);贵州:凤凰草(兴义);云南:〔绣球防风〕(马关),黄香科(文山),红蒿(澜沧),小紫苏(普洱),红杆一棵蒿(保山),花山蒿枝(红河),黑头草(富宁),小裂石蚕。

功效 全草:用于劳伤水肿;根:用于腹胀,泻痢;叶:止血。用于刀枪伤。

#### 7264399

*Teucrium scordioides* Schreb.

植物名 沼泽香科科《中国植志》

功效 全草:清热解毒。

#### 7264400

*Teucrium scordium* L.

植物名 蒜味香科科《中国植志》

功效 全草:能促进胃液分泌,加速肠的运动,解痉,降压。国外文献报道,自古入药,用于防腐,强壮,驱虫,防鼠疫,疗肺病。

#### 7264401

*Teucrium simplex* Vaniot

植物名 香科科《名实图考》、《中国植志》

功效 全草:清热解毒。

#### 7264402

*Teucrium viscidum* Blume --- *T. stoloniferum* Blume

植物名 血见愁《生草药性备要》、《中国植志》

药材名 山藿香《汇编》

文献名 血芙蓉《生草药性备要》

地方名 土藿香(福建、广西),假紫苏(广东、广西、四川),望江青(华南);浙江:漆药(乐清);福建:肺形草(福州、仙游、莆田、德化),土红苏(政和),皱面风(永春、安溪),犬屎苏(福鼎),杰草(莆田),布地锦,飞丝草,血草;湖南:冲天泡(临武),大薄荷;广东:皱面草(惠阳、兴宁),皱面苦草(汕头),方枝苦草(普宁),方骨苦草,肺纹草(兴宁),四方枝苦草(潮阳),狗苏草(陆丰),苦婆(阳山),苦斋公(新丰);海南:皱面金花苦草(澄海),假紫苏草;广西:野石蚕,仁沙草,苦药菜,杆抗

拢(上林),贼子草,野藿香;四川:水苏麻、山黄荆、四棱香(叙永);云南:野苏麻、蛇药(红河),假香菜,粘毛石蚕。

功效 全草:凉血止血,散瘀消肿,解毒止痛。用于吐血,衄血,便血,痛经,产后瘀血腹痛。外用于跌打损伤,瘀血肿痛,外伤出血,痈肿疔疮,毒蛇咬伤,风湿性关节炎。

#### 7264403

*Teucrium viscidum* var. *nepetoides* (Levl.) C. Y. Wu

植物名 微毛血见愁《中国植志》

药材名 微毛血见愁《贵州药录》

功效 全草:用于跌打损伤,风湿关节炎。

#### 7264404

*Thymus altaicus* Klok. et Shost. --- *Thymus serpyllum* auct. non L.

植物名 阿尔泰百里香《中国植志》

药材名 地腊香《纲目拾遗》、《新华本草纲要》

地方名 新疆:地椒。

功效 全草:有小毒。消肿通淋,止咳化痰,解表,杀虫。

备考 《新疆中草药》(1975)将本种学名误订为 *Thymus serpyllum* L.。

#### 7264405

*Thymus amurensis* Klovov

植物名 黑龙江百里香《中国植志》

药材名 黑龙江百里香《东北药用植物》

功效 全草:有小毒。祛风解表,温中散寒,行气止痛,止咳,降压。用于感冒,咳嗽,头痛,牙痛,遍身疼痛,腹胀冷痛,咽喉肿痛,消化不良,急性胃肠炎,吐逆,食少痞胀,高血压病。外用于皮肤瘙痒。

#### 7264406

*Thymus disjunctus* Klovov

植物名 长齿百里香《中国植志》

药材名 地椒(东北)

功效 全草:有小毒。祛风解表,温中散寒,行气止痛,止咳,降压。用于感冒,咳嗽,头痛,牙痛,遍身疼痛,腹胀冷痛,咽喉肿痛,消化不良,急性胃肠炎,吐逆,食少痞胀,高血压病。外用于皮肤瘙痒。

#### 7264407

*Thymus komarovii* Sergievskaja

植物名 兴安百里香《东北药用植物》

功效 全草:有小毒。祛风解表,温中散寒,行气止痛,止咳,降压。用于感冒,咳嗽,头痛,牙痛,遍身疼痛,腹胀冷痛,咽喉肿痛,消化不良,急性胃肠炎,吐逆,食少痞胀,高血压病。外用于皮肤瘙痒。

#### 7264408

*Thymus mongolicus* Ronn. --- *T. serpyllum* L. var. *mongolicus* Ronn.

植物名 百里香《中国植志》

药材名 地椒《嘉祐本草》、《中药志》

文献名 地花椒《海上名方》,山椒《中国药植图鉴》,蒙古百里香《东北木本图志》,野百里香《中国经植志》,

野麝香草《叶(生药)》

地方名 山胡椒(东北),千里香(山西、甘肃、陕西),地姜(甘肃、山西);河北:地娇花,地椒花,地角花;山西:狗地草,臭坡草;内蒙古:“刚嘎-乌布斯”、“加薄”、“扎汤”、“干加哈格得”(蒙名),《闹羊花》;陕西:地椒叶(靖边、安塞、子州);山东:蚊子草(烟台);其他:地椒嘴子,狗蹄草。

功效 地上部分:有小毒。祛风解表,行气止痛。用于感冒,头痛,牙痛,遍身疼痛,腹胀冷痛。

#### 7264409

*Thymus quinquecostatus* Celak.

植物名 五脉地椒《汇编》

药材名 地椒《嘉祐本草》、《中药志》

文献名 百里香《植物学大辞典》,麝香草《综合英汉大辞典》,烟台百里香《江苏植志》,五肋百里香《中草药》

地方名 山胡椒(河北、山东);辽宁:山花椒(辽西);内蒙古:花椒堆(赤峰)、“扎汤”(蒙名);山东:蚊子草,蚊子蒿(莱芜),五香茶(莱阳、牙山),香草(胶南、五莲),山椒子(五莲),穿地香(威海),石薄荷,五肋地椒。

功效 地上部分:祛风解表,行气止痛。用于感冒,牙痛,遍身疼痛,腹胀冷痛。

#### 7264410

*Thymus quinquecostatus* Celak. var. *przewalskii* (Korn.) Ronn. --- *Thymus przewalskii* Nakai

植物名 展毛地椒《秦岭植志》

药材名 地椒《嘉祐本草》、《中药志》

文献名 山胡椒、石薄荷《满蒙产药植》,马蹄草、香蔬《满鲜植汇》,百里香《汇编》,兴凯百里香《药典》

功效 地上部分:有小毒。祛风解表,行气止痛。用于感冒,头痛,牙痛,遍身疼痛,腹胀冷痛。

#### 7264411

*Thymus quinquecostatus* Celak. var. *asiaticus* (Kitag.) Kitam. --- *T. kitagawianus* Tscherneva --- *T. serpyllum* L. var. *asiaticus* Kitag. --- *T. asiaticus* Kitag.

植物名 砂地百里香《东北药用植物》

药材名 地椒(东北)

功效 全草地上部分:有小毒。祛风解表,温中散寒,行气止痛,止咳,降压。用于感冒,咳嗽,头痛,牙痛,遍身疼痛,腹胀冷痛,咽喉肿痛,消化不良,急性胃肠炎,吐逆,食少痞胀,高血压。外用于皮肤瘙痒。

#### 7264412

*Ziziphora bungeana* Juz.

植物名 新塔花《中国植志》

药材名 新塔花《汇编》

地方名 新疆:小叶薄荷,“绦则”(维名)。

功效 全草:安神强壮。用于失眠,心慌,软骨病,阳痿。

#### 7264413

*Ziziphora clinopodioides* Lam.

植物名 小叶薄荷《新疆药植志》

药材名 唇香草《汇编》

地方名 新疆:风轮新塔花,“续则”(维名)。

功效 全株:用于高血压,冠心病。

## (二) 单子叶植物

### Monocotyledoneae

#### 7266 水鳖科 Hydrocharitaceae

##### 7266001

*Hydrilla verticillata* (L.f.) Royle

植物名 黑藻《高植图鉴》

药材名 黑藻《广西药录》

文献名 蜈蚣萍《纲目拾遗》,轮叶黑藻、轮叶水草《高植图鉴》

地方名 水王孙(河北、广西);广西:水底茜(北流);云南:水草。

功效 全草:清凉,解毒。用于疥疮,无名肿毒。

##### 7266002

*Hydrocharis dubia* (Blume) Backer --- *Hydrocharis asiatica* Miq.

植物名 水鳖《高植图鉴》

药材名 水鳖《纲目》、《中药大辞典》

文献名 马尿花、水旋覆《滇南本草》,秋千草、猪婆草、大木桐、水蓬草《田间的杂草》

地方名 四川:天泡草(峨眉山);云南:油灼灼,白苹,水膏药(江川)。

功效 全草:解毒,收敛。用于妇人赤白带下,天泡疮。

##### 7266003

*Ottelia acuminata* (Gagnep.) Dandy

植物名 海菜花《广西药录》

文献名 海菜《名实图考》

功效 叶:用于甲状腺肿大。

##### 7266004

*Ottelia alismoides* (L.) Pers.

植物名 龙舌草《植分学报》

药材名 龙舌草《纲目》、《汇编》

文献名 海菜、龙爪菜《名实图考》,龙舌《华东水植》,水柏枝《贵州方药》,水车前《高植图鉴》

地方名 水白菜(贵州、湖南),水芥菜(广西、广东);江苏:牛耳朵草(宝应);湖南:蛾子草;广东:塘底菜、潭底菜、水车前草、水厚合(潮阳);贵州:水莴苣,龙爪草,瓢羹菜,山窝鸡,白车前草;其他:虾蟆草。

功效 全草:清热化痰,解毒利尿。用于肺热咳嗽,肺结核,咳血,哮喘,水肿,小便不利。外用于痈肿,烧、烫伤。

##### 7266005

*Ottelia esquirolii* (Levl. et Vant.) Dandy

植物名 大叶海菜花《高植图鉴》

药材名 大叶海菜花《贵州药录》

地方名 贵州:水白菜(贵阳)。

功效 全草:清热止咳,益气固脱。用于尿血,淋症,水肿,风热咳嗽,子宫脱垂。

##### 7266006

*Vallisneria denseserrulata* (Makino) Makino

植物名 密齿苦草《广西植物》

药材名 苦草《广西植物》

功效 全草:理气破瘀。

##### 7266007

*Vallisneria natans* (Lour.) Hara --- *Vallisneria spiraloidea* Roxb. --- *V. asiatica* Miki

植物名 苦草《群芳谱》、《云南种录》

药材名 苦草《纲目》、《中药大辞典》

文献名 亚洲苦草《广西植物》

地方名 带子扎、脚带小草(华北);广西:水茜,扁草,韭菜草,面条草;其他:海菜。

功效 全草:理气破瘀。用于夜尿,白带,产后恶露。

##### 7266008

*Vallisneria spinulosa* Yan

植物名 刺苦草《广西植物》

药材名 苦草《广西植物》

功效 全草:理气破瘀。

#### 7267 泽泻科 Alismataceae

##### 7267001

*Alisma canaliculatum* A. Braun et Bouche

植物名 窄叶泽泻《高植图鉴》

药材名 大箭《四川中草》

文献名 狭叶泽泻《中国植物图鉴》

地方名 浙江:汗枪箭(临安);贵州:水泽泻(绥阳);其他:薹草。

功效 全草:清热,散毒。用于皮肤疱疹,小便不通,水肿,蛇咬伤。

7267002 见 7267003a

##### 7267003

*Alisma plantago-aquatica* L. var. *orientale* Sam. --- *A. plantago-aquatica* L. ssp. *orientale* (Sam.) Sam. --- *A. orientale* (Sam.) Juzepcz.

植物名 泽泻《高植图鉴》

药材名 泽泻《本经》、《药典》

文献名 葵《诗经》,薹《尔雅》,水泻、芒芋、鹄泻《本经》,泽芝《典术》,及泻、泽泻叶、泽泻实《别录》,水香菜《救荒本草》,禹孙《纲目》,茆《植物名汇》,一枝花《中国药植图鉴》,天鹅蛋、天秃《药材资料汇编》,野慈菇《广西本草选编》,东方泽泻《秦岭植志》,“亚瓦克西米尔”《沙漠药植》

地方名 水泽、如意菜(陕西、甘肃),川泽泻、建泽泻(四川、福建),水白菜(云南、吉林);吉林:“外贵那木儿”(朝名);河北:车古草;山西:车苦菜;安徽:石小,牛耳朵棵,油饼菜,〔肺经草〕;台湾:泽舍,台泻;广西:鸭舌菜(南丹);四川:建泄,大蜈蚣叶,宅夕,水泽泻。

功效 块茎:利小便,清湿热。用于小便不利,水肿胀满,泄泻尿少,痰饮眩暈,热淋湿痛,高血脂症;叶:用于慢性气管炎,乳汁不通;果实:主风痹,消渴,益肾

气, 强阴, 补不足, 除邪湿。

#### 7267003a

*Alisma plantago-aquatica* L. var. *parviflorum* Torr

植物名 小花泽泻(拟)

药材名 泽泻(台湾中药材图鉴)

地方名 台湾: 泽舍, 鲜泻(商品名)。

功效 块茎: 利小便, 清湿热。

#### 7267004

*Caldesia parnassifolia* (Bassi ex L.) Parl. --- *Caldesia reniformis* (D. Don) Makino --- *Alisma parnassifolia* Bassi ex L. --- *A. reniformis* D. Don

植物名 泽苔草(云南种录)

文献名 圆叶泽泻(中药通报)

地方名 湖南: “呼令”(蓝山县瑶语)。

功效 根: 用于湿疹。

#### 7267005

*Lophocarpus guyanensis* (H. B. K.) J. G. Smith ---

*Sagittaria guyanensis* H. B. K.

植物名 冠果草(高植图鉴)

药材名 冠果草(南宁药志)

地方名 广西: 水菱角(岑溪), 土紫菀, 假菱角。

功效 全草: 清热利尿。用于肺炎咳嗽, 痢疾。外用于痢肿初起。

#### 7267006

*Sagittaria aginashi* Makino

植物名 长叶泽泻(中药大辞典)

药材名 水慈姑(贵阳民间药草)

文献名 长叶慈姑(贵州药录)

地方名 四川: 细叶慈姑; 贵州: 剪刀草, 姑妈菜, 小茨菇。

功效 全草: 清热解毒, 活血止痛。用于火眼, 呕血, 痞积, 带下, 脱肛, 骨节疼痛, 无名毒疮, 血崩, 痔漏, 丹毒, 产后血气痛, 毒蛇咬伤。

#### 7267007

*Sagittaria pygmaea* Miq.

植物名 矮慈姑(高植图鉴)

药材名 鸭舌草(汇编)

文献名 瓜皮草(中国植物图鉴), 棉条草、五头钉、蒲潭草、篦节草、泥鳅尾巴(田间的杂草)

地方名 江苏: 鸭石子(江浦); 四川: 水冬冬, 小箭; 贵州: 鸭舌子, 鸭舌条, 鸭舌头, 水充草, 粉条菜(铜仁)。

功效 全草: 有小毒。清热解毒, 行血。用于无名肿毒, 蛇咬伤, 小便秘痛, 烫、伤等。

#### 7267008

*Sagittaria trifolia* L. var. *edulis* (Sieb. ex Miq.) Ohwi --- *S. trifolia* var. *sinensis* (Sims) Makino --- *S. sagittifolia* var. *edulis* Sieb. ex Miq.

植物名 慈姑(名实图考)、(云南种录)

药材名 慈菇(纲目)、(汇编)

文献名 茨菇(药性论), 槎牙(唐本草), 燕尾草(日华子本草), 河鳧茨、剪刀草、白地栗(图经), 水慈菰、剪刀草(救荒本草), 慈姑叶(纲目), 乌芋(名实图考), 慈

菰、此菇(植物名汇), 槎丫草、河鳧茨(本草新注), 华夏慈菇(华东水植)

地方名 水慈姑(陕西、四川、广西、贵州、浙江), 野慈姑(湖南、四川); 陕西: 磨架子草(镇坪); 山东: 水荸荠(蒙山), 慈菇蛋子(微山); 湖南: 白茨姑草, 剪刀夹、箭头草(衡山); 广西: [犁头草](防城); 四川: 慈姑苗, 毛慈菇, 白慈姑(成都); 贵州: 剪刀菜。

功效 球茎及全草: 清热止血, 解毒消肿, 散结。用于咯血, 吐血, 难产, 产后胞衣不下, 崩漏带下, 尿路结石, 小儿丹毒。外用于痈肿疮毒, 毒蛇咬伤。

#### 7267009

*Sagittaria trifolia* L. var. *angustifolia* (Sieb.) Kitag.

植物名 野慈姑(云南种录)

药材名 野慈姑(东医宝鉴)

文献名 剪刀草、密州剪刀草(图经)

地方名 四川: 水慈姑, 慈姑苗; 贵州: 燕尾草。

功效 全草: 有小毒。用于黄疸, 瘰癧, 蛇咬伤。

#### 7267010

*Sagittaria trifolia* L. var. *longiloba* (Turcz.) Kitag. ---

*S. sagittifolia* L. var. *longiloba* Turcz.

植物名 狭叶慈姑(东检)

药材名 狭叶慈姑(东北药用植物)

功效 球茎及全草: 清热, 止血, 解毒, 消肿散结。用于咯血, 吐血, 黄疸, 难产, 产后胞衣不下, 崩漏, 带下, 尿路结石, 小儿丹毒。外用于痈肿疮毒, 瘰癧, 蛇伤。

### 7271 水麦冬科 Juncaginaceae

#### 7271001

*Triglochin maritimum* L.

植物名 圆果水麦冬(中药大辞典)

文献名 芝菜(中国植物图鉴), 海韭菜(高植图鉴)

地方名 三尖草(西北), “那冷门”(西藏、四川藏名); 河北: 水麦冬, 三尖叶, 羊胡子草; 内蒙古: “马日查-西乐-额布苏”(蒙名); 青海: “那任木”(藏名); 西藏: “那热”(藏名)。

功效 全草: 清热养阴, 生津止渴。用于阴虚潮热, 胃热烦渴, 口舌干燥。

#### 7271002

*Triglochin palustre* L.

植物名 水麦冬(高植图鉴)

药材名 水麦冬(汇编)

文献名 牛毛草(指示植物)

地方名 三尖草(西北); 内蒙古: “西乐-额布苏”(蒙名); 青海: “贝治牙扎”(藏名)。

功效 全草: 清热, 利湿, 消炎, 消肿; 果: 消炎, 止泻。

### 7276 眼子菜科 Potamogetonaceae

#### 7276001

*Phyllospadix scouleri* Hook.

植物名 海韭菜(中国经济海藻志)

药材名 海韭菜(品种论述)

地方名 山东:海带草(登州)。

功效 全藻:软坚,化痰,利水,泄热。

#### 7276002

*Potamogeton crispus* L.

植物名 菹草《高植图鉴》

药材名 菹草《救荒本草》、《江西药录》

文献名 柳叶菹、水藻《救荒本草》、《马藻《纲目》、虾草《李《药植》》、札草、虾藻《高植图鉴》、杂草《云南植志》

地方名 内蒙古:“乌日其格日 奥存-呼日西”(蒙名);江苏:猪草(苏北)。

功效 全草:清热明目,渗湿利水,通淋,镇痛,消肿。

#### 7276003

*Potamogeton cristatus* Regel et Maack

植物名 小叶眼子菜《高植图鉴》

药材名 水案板《四川中药志》

文献名 突果眼子菜《高植图鉴》、瓣叶眼子菜《四川中药志》

地方名 广西:水猪菜、鸭子草;四川:水板凳、弹木叶、扎水板、金梳子草、水竹叶、案板草、案板叶;贵州:小叶水案板。

功效 全草:清热解毒,消食健脾,止泻。

#### 7276004

*Potamogeton heterophyllus* Schreb. --- *P. delavayi* A. Benn.

植物名 异叶眼子菜《云南植志》

药材名 水案板《云南药录》

文献名 滇鸭子草《云南药录》、牙齿菜《汇编》

地方名 云南:牙齿草,牙拾草。

功效 全草:清热解毒,消食健脾,止泻。用于赤痢,慢性胆囊炎,食积,胃痛,痔疮,大肠下血。

#### 7276005

*Potamogeton malainus* Miq. --- *P. gaudichaudii* Cham. et Schl.

植物名 竹叶眼子菜《高植图鉴》

文献名 簕叶藻《高植图鉴》、马来眼子菜《汇编》

地方名 眼子菜(广西、宁夏);内蒙古:“马来音-奥存-呼晒”(蒙名)。

功效 全草:清热解毒,利尿,消积。

#### 7276006

*Potamogeton natans* L. --- *P. morongii* A. Bennett

植物名 浮叶眼子菜《东北药用植物》

药材名 眼子菜(东北)

功效 全草或嫩根:清热解毒,利尿,止血,消肿,消积,驱蛔。用于急性结膜炎,痢疾,黄疸,水肿,淋病,白带,血崩,痔血,小儿疳积,蛔虫病。外用于疮疖肿毒。

#### 7276007

*Potamogeton pectinatus* L.

植物名 篦齿眼子菜《高植图鉴》

药材名 龙须眼子菜《青藏药图》

文献名 线形眼子菜、眼子菜《沙漠药植》、红线儿苗《高植图鉴》、红线草《云南植志》、篦叶眼子菜《沙漠植志》

地方名 内蒙古:“萨门 奥存 呼日西”、乌森呼日亚(蒙名);青海:“息象尔毛”(藏名);江苏:水草(苏北);四川:龙须草(成都);云南:马尾巴草(昆明、澄江),松毛草(大理、洱源)。

功效 全草:清热解毒。用于肺炎,外用于疮疖。

#### 7276008

*Potamogeton perfoliatus* L.

植物名 穿叶眼子菜《高植图鉴》

文献名 眼子菜、抱茎眼子菜《沙漠药植》、酸水草《汇编》

地方名 内蒙古:“奥格拉日存-奥存-呼日西”(蒙名)。

功效 全草:渗湿解表。用于湿疹,皮肤瘙痒。

#### 7276009

*Potamogeton tepperi* A. Benn. --- *Potamogeton distinctus* A. Benn. --- *P. franchetii* Baegoe ex A. Benn.

植物名 牙齿草《名实图考》、《云南植志》

药材名 眼子菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 眼子草《救荒野谱》、牙拾草《滇南本草》、水案板《分类草药性》、小竹藻、蛇藻《新纲》、鸭吃草《种称》、浮叶眼子草、鸭子草、《高植图鉴》、地黄瓜、压水草《汇编》

地方名 内蒙古:“奥存-呼日西”(蒙名);陕西:案板菜、案板芽、水黄连;江苏:毛芋菜、过河柳、鸭香头草;浙江:竹叶草(临安),龙舌;江西:螳螂草;湖南:滑油丹、塘茅草、绸兰草、油婆草、兔耳风;四川:水板凳、弹麻叶、弹木叶、弹木板、檀木叶、扎水板、水岸板、浮水板、案板草、金梳子草;贵州:钉耙七(嫩根名)(贵阳)。

功效 全草:清热解毒,利尿,消积。用于急性结膜炎,黄疸,水肿,白带,小儿疳积,蛔虫病。外用于痢症肿毒。

备考 《云南植志》载:本种由于沉水叶片多于花期前渐次腐烂,残留叶柄,往往被误认此叶即为沉水叶片而定为 *P. natans* L. 例如《高植图鉴》和《秦岭植志》中的浮叶子菜就是此种性质的问题。国内各家定的 *P. natans* L. 与本种 *P. tepperi* A. Benn 应是同名异物。

#### 7276010

*Zostera marina* L.

植物名 大叶藻《高植图鉴》

药材名 大叶藻《本草拾遗》、《品种论述》

文献名 海带《嘉祐本草》、温藻《植物名汇》、海马藻、海草《东北药植志》

地方名 山东:海带草。

功效 全藻:软坚化痰,利水泄热。用于瘰疬,结核,疝瘕,水肿,脚气。

### 7280 鸭跖草科 Commelinaceae

#### 7280001

*Amischotolype hispida* (Less. et A. Rich.) Hong ---



*Forrestia chinensis* N. E. Brown - *F. hispida* Less. et A. Rich.

植物名 穿鞘花《高植图鉴》

药材名 穿鞘草《广西药录》

地方名 广西：假山虎，纳闹红《龙州》，独竹草《北流》。

功效 全草：用于风湿，跌打，尿路感染，毒蛇咬伤。

#### 7280002

*Commelina bengalensis* L.

植物名 饭包草《高植图鉴》

药材名 饭包草《汇编》

文献名 火炭头《种称》，〔鸭跖草〕《中药通报》，卵叶鸭跖草《云南植志》，千日菜《汇编》

地方名 竹叶菜《江苏、广西》；江苏：火柴头；浙江：粉节草、大叶兰花草《乐清》，百日晒《瑞安》；福建：竹菜、竹仔菜、竹竹菜、千日晒《古田》，大叶兰花竹仔草、大号日头舅《福安、福鼎、霞浦、宁德、政和》；台湾：唐石松；湖北：大鸭跖草《神农架》；湖南：水竹菜；广西：牛粥草《玉林》；贵州：马耳草。

功效 全草：清热解毒，利水消肿。用于小便短赤涩痛，赤痢，疔疮。

#### 7280003

*Commelina communis* L. --- *C. communis* L. var. *angustifolia* Nakai

植物名 鸭跖草《高植图鉴》

药材名 鸭跖草《本草拾遗》、《汇编》

文献名 鸡舌草、鼻斫草、鸭舌草、碧竹子、簕竹叶《本草拾遗》，碧竹草《图经》，青耳环花、碧蟾蜍、竹叶草《竹谱详录》，耳环草《世医得效方》，地地藕《滇南本草》，竹节菜《救荒本草》，蓝姑草、淡竹叶菜《活动全书》，竹鸡草《濒湖集简方》，竹叶菜、碧蟾花《纲目》，水竹子、竹叶青、翠峨眉《名实图考》，冬鸡舌草《和汉药标本目录》，蓝石竹《植物名汇》，达克该比《朝植多名》，露草、帽子花《植物学大辞典》

地方名 三角菜《辽宁、山东、黑龙江》，三茺子菜《东北》，蓝花菜《吉林、黑龙江》，翠蝴蝶《广西、河南》，水竹叶《安徽、四川》，蓝花草《江苏、浙江》，竹节草《江西、江苏》，晒不死《浙江、湖南》，竹仔草、竹仔菜《广东、福建》，竹夹菜《广西、福建》，〔淡竹叶〕《江苏、浙江、陕西》，竹菜《广东、广西》，竹叶兰《陕西、贵州》；吉林：喜鹊花；辽宁：牛耳朵草、鸭食草、水浮草、鸭子菜、菱角伞；陕西：蓝天鹅；山东：三节子草《蒙山》，气死日头《崂山》，菱角草《烟台》，三甲子草；江苏：鸡冠菜、蓝花姑娘、鸭爪菜；上海：竹叶水草、水竹叶草、竹叶青菜、鸭脚板草；浙江：野靛青、野靛、靛青花、鸭脚青、挂蓝青《淳安、临安、天台》，鸭雀草、蓝紫草《乐清》，哥哥啼草、鸡咯咯叫《嵊县》，福菜、挂梁青、鸭鹊草、管蓝青、萤火虫草《平阳》，日头黄《泰顺》，鸡蛋包草《洞头》，竹叶活血丹、百日晒《龙泉、云和》；安徽：蝴蝶花、歪歪花、蓝翠蛾、蓝靛草、小蓝草；江西：竹鸡菜、竹管草、竹笋草、鸭脚草、蓝花竹叶草《泰和》，淡菜；福建：鸭仔草、水竹《闽

漳》，蓝花仔、日头舅《松溪、政和》，挂亮青、金调羹、绿蝴蝶；河南：蓝蓝花；湖北：竹叶七、竹结巴菜《神农架》；湖南：挂竹草《古丈》，蓝花竹叶《长沙》，蓝花水竹草《衡阳》；广东：碧蟾蛇、水竹草、竹草《潮汕》，细竹草《潮安、潮州》，蛇竹菜《汕头、惠来、普宁》，尖叶竹草《南澳、惠来》，竹鸽菜《惠来》，水竹菜《海丰、陆丰》，白竹菜《海丰》，竹骨草、水益菜、茅镰草、竹草母《揭阳》，竹菜菇、大竹草；广西：鹅儿菜、竹壳菜、竹高菜、竹竹菜、竹子菜、竹叶蓝、竹箕菜；四川：竹根菜、竹叶花、凤眼灵芝、凤眼草；云南：鸭跖草。

功效 全草：行水，清热，凉血，解毒。用于水肿，脚气，小便不利，感冒，丹毒，腮腺炎，黄疸肝炎，热痢，疟疾，鼻衄，尿血，血崩，白带，咽喉肿痛，痈疽疔疮。

备考 《本草纲目》将淡竹叶和鸭跖草分立为两条，但在鸭跖草释名项下又有淡竹叶之名，说明淡竹叶在明代就有异物同名品存在，淡竹叶只是鸭跖草的一个别名，并非药用淡竹叶的正品。现时商品仍有此情况，应注意分辨。

#### 7280004

*Commelina diffusa* Burm. f.

植物名 竹节草《植分学报》

药材名 竹节草《生草药性备要》、《汇编》

文献名 竹节菜、翠蝴蝶、翠峨眉、簕竹花、倭青草《救荒本草》，竹菜、〔鸭跖草〕《岭南采药录》，岛鸭跖草《小泉《药植》），竹筋草《中药大辞典》

地方名 竹节花《广东、广西》；台湾：白竹仔菜、竹仔菜、竹仔叶；广东：潺竹菜、牛呃菜、大竹草；广西：竹蒿草《北海》，黄花草《北流》；贵州：竹叶草《安龙》；云南：地地藕。

功效 全草：清热解毒，利尿消肿，止血。用于急性咽喉炎、痢疾、疮疖，小便不利。外用于外伤出血。

#### 7280005

*Commelina maculata* Edgew.

植物名 地地藕《云南植志》

药材名 地地藕《滇南本草》

功效 全草：补养气血。用于妇女白带红崩，生新血，止尿血，鼻衄血，血淋。

备考 《滇南本草》整理本以鸭跖草为地地藕。

#### 7280006

*Commelina paludosa* Blume

植物名 大苞鸭跖草《高植图鉴》

药材名 大苞鸭跖草《广西药录》

文献名 大苞地地藕《云南种录》

地方名 竹叶菜《广西、云南》；广西：七节风；云南：竹叶草、竹节菜、斜叶鸭跖草。

功效 全草：用于痈疮肿毒。

#### 7280007

*Commelina undulata* R. Brown

植物名 波缘鸭跖草《植分学报》

药材名 竹仔菜《台湾中药材图鉴》

文献名 波叶鸭跖草《汇编》

地方名 台湾：红竹仔菜、竹仔叶。

功效 地上部分:清热解毒,利水消肿。

## 7280008

*Cyanotis arachnoides* Clarke --- *C. bodinieri* Levl. et Van.

植物名 蛛丝毛蓝耳草《植分学报》

药材名 露水草《云南药录》

文献名 蛛毛蓝耳草《广西药录》

地方名 台湾:〔龙舌癭〕(台北);广西:鸭脚菜(上林);贵州:竹叶草,〔贝母〕,鸡爪参;云南:鸡冠参、蓝耳草(昆明),大蓝耳草,老来红,珍珠露水草(曲靖),〔知母〕(蒙自)。

功效 根:祛风活络,利湿消肿,退虚热。用于风湿性关节炎,腰腿痛,肾炎水肿,虚热不退。外用用于湿疹,脚癣,刀伤。

## 7280009

*Cyanotis cristata* (L.) D. Don --- *Commelina cristata* L. --- *Tradescantia cristata* L.

植物名 四孔草《云南种录》

文献名 蓝耳草《广西药录》,鸡冠蓝耳草《广西植录》

地方名 广西:鸡冠草,竹叶菜、鸭菜(上林)

功效 全草:用于刀伤出血,痈疮肿毒。

## 7280010

*Cyanotis vaga* (Lour.) Roem. et Schult. --- *Tradescantia vaga* Lour. --- *Cyanotis barbata* D. Don --- *C. bulbosa* Levl. --- *C. nocilis* Hassk.

植物名 蓝耳草《高植图鉴》

药材名 蓝耳草《中药大辞典》

文献名 勾蛋贝、假苍山贝《云南药录》

地方名 贵州:尖贝母(威宁);云南:鸡冠参、鸡心贝母、露水草(昆明),背鹿衔,苍山贝母(大理)。

功效 全草、根:补虚,除湿,舒筋活络。用于虚热不退,肾炎水肿,风湿性关节炎疼痛,湿疹。

## 7280011

*Floscopa scandens* Lour.

植物名 聚花草《高植图鉴》

药材名 聚花草《广西药录》

地方名 湖南:大竹叶草,竹叶草,水竹菜,水打不死,水竹叶草,“罢莽脱”(侗语);广西:竹叶藤,有日散(金秀),塘壳菜(岑溪),过江竹(贵县)。

功效 全草:清热解毒,利水消肿,活血。用于疮疖肿毒,淋巴结肿大,急性肾炎。

## 7280012

*Murdannia bracteata* (Clarke) O. Kuntze ex J. K. Morton --- *Aneilema nudiflorum* R. Br. var. *bracteatum* Clarke --- *A. bracteatum* (Clarke) O. Kuntze

植物名 大苞水竹叶《植分学报》

药材名 痰火草《汇编》

地方名 广东:围夹草,癌草;广西:青鸭跖草、青竹壳菜(梧州)。

功效 全草:化痰散结。用于淋巴结核。

## 7280013

*Murdannia divergens* (Clarke) Bruckn.

植物名 紫背鹿衔草《名实图考》、《高植图鉴》

药材名 花竹叶菜《云南药录》

文献名 竹叶参《广西药录》,竹叶兰《贵州药录》

地方名 黄竹参(云南、贵州);贵州:竹叶草;云南:绕昼兰(红河),水竹参,土三七(丽江),糯米饭草(大姚),〔仙茅〕(腾冲)。

功效 根、全株:解毒,清肺热,补肺肾,镇咳,健胃止血。用于气虚头晕,耳鸣虚咳,病后食欲不振,吐血。

备考 《滇南本草》谓“鹿衔草,紫背者好。”按:非指本品而言。

## 7280014

*Murdannia edulis* (Stokes) Faden.

植物名 葶花水竹叶《广西药录》

地方名 广西:猪母乳(博白)。

功效 根:润肺止咳。用于咳嗽。

## 7280015

*Murdannia japonica* (Thunb.) Foden --- *Murdannia elata* (Vahl) Bruckn. --- *Commelina japonica* Thunb. --- *C. elata* Vahl --- *C. herbacea* Roxb.

植物名 宽叶水竹叶《植分学报》

文献名 竹叶参《云南植志》

功效 根:滋补。

## 7280016

*Murdannia loriformis* (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy --- *Aneilema angustifolium* N. E. Brown --- *Murdannia angustifolia* (N. E. Brown) Hara

植物名 牛鞭草《植分学报》

药材名 狭叶水竹叶《四川中药志》

地方名 广西:喜草,〔土牛膝〕(宁明);四川:地蓝花、红茅草(峨眉)。

功效 全草:清热解毒,利尿。用于肺热咳嗽,目赤肿痛,疮疖肿毒,热淋,小便不利。

## 7280017

*Murdannia loureirii* (Hance) Rolla Rao et Kammathy --- *Aneilema loureirii* Hance

植物名 腺毛水竹叶《高植图鉴》

文献名 〔麦门冬〕《品种论述》

功效 全草:利水,止咳。

## 7280018

*Murdannia macrocarpa* Hong

植物名 大果水竹叶《高植图鉴》

地方名 贵州:胖柳(兴仁)。

功效 根:补虚弱。

## 7280019

*Murdannia nudiflora* (L.) Brenan --- *Aneilema malabaricum* (L.) Merr. --- *Commelina nudiflora* L. --- *Tradescantia malabarica* L.

植物名 裸花水竹叶《高植图鉴》

药材名 红毛草《四川中药志》

文献名 地韭菜《天宝本草》,裸花水竹草《汇编》,狭叶水竹叶《四川中药志》

地方名 浙江:节节烂,野靛青(泰顺),挑簪草(丽

水);江西:竹叶草(上饶、铅山),水竹草;福建:天竺针;广西:百日晒,肉草,血见仇,细竹壳菜,红竹壳菜(平南);四川:地蓝花(峨眉),鸭舌头,地潭花,山海带,红茅草;贵州:竹叶兰;云南:山韭菜(盐津)。

**功效** 全草:清肺止咳,凉血止血。用于肺热咳嗽,咳血,扁桃体炎,咽喉炎,急性肠炎。外用于疮疖红肿。

#### 7280020

*Murdannia scapiflora* (Roxb.) Royle --- *Aneilema scapiflorum* (Roxb.) Wight --- *A. scapiflorum* Wight var. *latifolium* N. E. Br.

**植物名** 葶叶水竹叶《品种论述》

**文献名** 大叶水竹叶、阔叶水竹叶《品种论述》

**地方名** 海南:土麦冬。

**备考** 海南以此植物的块根为土麦冬,应注意鉴别。

#### 7280021

*Murdannia simplex* (Vahl) Brenan --- *Commelina simplex* Vahl --- *Aneilema simplex* (Vahl) Kunth --- *A. sinicum* Ker-Gawl. --- *A. longifolium* Hook.

**植物名** 细竹蒿草《高植图鉴》

**药材名** 细竹蒿草《广西药录》

**地方名** 广西:斑茅胆草,十二妹,云茅草,红韭菜(陆川),十二娘,土牛膝,土牛七,血见愁(昭平);贵州:土洋参。

**功效** 全草:凉血,止血。用于热症,小儿惊风;根:滋阴清热。用于自汗,盗汗,热症。

#### 7280022

*Murdannia triquetra* (Wall.) Bruckn. --- *Aneilema triquetrum* Wall.

**植物名** 水竹叶《高植图鉴》

**药材名** 水竹叶《本草拾遗》、《中药大辞典》

**地方名** 江苏:三角菜(东海);浙江:小叶挂蓝青,小叶鸭雀草(临安),鸭脚草(宁波),水金钗(云和),断节草(龙泉),分节草(乐清);福建:鸡舌草、鸡舌癭(泉州);广西:肉草;贵州:竹叶草,水竹叶草,水竹叶菜。

**功效** 全草:有小毒。清热,利尿,消肿,解毒。用于肺热喘咳,赤白下痢,小便不利,咽喉肿痛,痈疖疗肿。

#### 7280023

*Polia hasskarlii* Rolla Rao --- *P. aclisia* Hassk.

**植物名** 粗柄竹叶花(拟)

**文献名** 粗柄杜若、大杜若《植分学报》,疏花杜若《广西药录》

**地方名** 云南:竹节兰,“占点领”(傣名),黑珍珠(屏边),七喜草(临沧),大剑叶木(思茅)。

**功效** 根:补虚,祛风湿,通经。用于风湿性关节炎,腰腿痛,阳痿,膀胱炎,产后大流血。

#### 7280024

*Polia japonica* Thunb.

**植物名** 竹叶花《植分学报》

**药材名** 竹叶莲《湖南药物志》

**文献名** 鸭嘴草《雷公炮炙论》,杜若《高植图鉴》,白叶菜《广西药录》

**地方名** 浙江:莲花姜(临安);湖南:地藕,水楠竹;广西:水芭蕉,山竹壳菜(融安),石竹(全州);四川:竹叶菜(峨眉山);贵州:包谷七,阿金够。

**功效** 全草、根:理气止痛,疏风消肿。用于胸胁气痛,胃痛,腰痛,头面痛,流泪。外用于毒蛇咬伤。

**备考** 杜若始出《本经》,一名杜衡。梁·陶弘景云:“杜若,今处处有之,叶似姜而有文理,根似高良姜而细,味辛香而绝似旋覆根。殆欲相乱,叶小异尔。”据此,杜若应是姜科植物而不是鸭跖草科植物。又《本草图经》杜若图,其所绘花序是顶生,且花成对排列,这与姜科山姜属植物的花序相似。相反,鸭跖草科的竹叶花是聚伞花序,呈蝎尾状成轮地集成圆锥花序,明显与杜若最早的附图不同。这充分说明杜若不是鸭跖草科植物。又需按云:“凡使勿用鸭嘴草根,真相似,只是味效不同”看来古代亦确有以鸭跖草科植物混充杜若使用的情况,应注意鉴别。又杜衡应是马兜铃科植物 *Asarum forbesii* Maxim. 非此。《本经》以杜衡为杜若之异名,当是异物同名。

#### 7280025

*Polia omeiensis* Hong

**植物名** 川竹叶花(拟)

**文献名** 川杜若《高植图鉴》

**功效** 全草:散寒,祛湿,益精明目,温中。

#### 7280026

*Rhoeo discolor* (L'Her.) Hance

**植物名** 紫万年青《汇编》

**药材名** 蚌花《广西本草选编》

**文献名** 蚌兰花《岭南采药录》,蚌兰叶《广东中药》,紫蓝、紫兰、红面将军、血见愁《中药大辞典》

**地方名** 福建:天青地红(泉州);台湾:红三七草;广东:红蚌兰叶,红蚌兰花,红竹叶(汕头),蚌兰、红蚌兰(广州),菱角花,螃蟹,包子莲,如意兰(潮州、汕头),青红兰(潮安),蚌花(海丰),海蚌含珠(南澳),荷包兰(汕头);广西:荷包花。

**功效** 花、叶:清热化痰,凉血止痢。用于肺燥咳嗽,咯血,百日咳,淋巴结核,便血。

#### 7280027

*Spatholirion longifolium* (Gagnep.) Dunn --- *S. scandens*

Dunn --- *Streptolirion longifolium* Gagnep. --- *Polia dieisii* Levl.

**植物名** 竹叶吉祥草《高植图鉴》

**药材名** 竹叶吉祥草《名实图考》、《汇编》

**文献名** 竹叶红参《名实图考》,竹叶菜《广西植录》,珊瑚草《云南中草药》,缠百合《中药大辞典》

**地方名** 广西:竹叶风(龙胜);四川:秦归、猪叶菜(兴文),土百部(宁南);贵州:竹叶细辛,梭罗藤;云南:马耳朵草(昆明),白龙须(潞西),百部。

**功效** 花序:调经,止痛。用于月经不调,神经性头痛。

#### 7280028

*Streptolirion volubile* Edgew. --- *S. cordifolium* (Griff.) O. Kuntze --- *S. duclouxii* Levl. et Vant. --- *S. mairei* Levl.

植物名 竹叶草《高植图鉴》

药材名 笋壳菜《四川中药志》

文献名 竹叶草《四川中药志》

地方名 陕西:猪耳草(秦岭);湖北:母猪皮(神农架);广西:水百步还魂(南丹);四川:酸猪草(米易),小竹叶菜;贵州:猪鼻孔。

功效 全草:清热利尿,解毒。用于感冒发热,口渴心烦,热淋,小便不利,痢疾,肿毒,咽喉肿痛。

#### 7280029

*Streptolirion volubile* Edgew. subsp. *khasianum* (Clarke) Hong --- *Streptolirion volubile* Edgew. var. *khasiana* Clarke

植物名 红毛竹叶草《高植图鉴》

药材名 猪肚子叶《元江哈尼族药》

地方名 云南:硬竹叶草,“磨堆堆寒”(元江哈尼语)。

功效 茎、叶:去腐生肌,收湿止血。用于疮疡溃烂,外伤出血。

#### 7280030

*Tradescantia virginiana* L.

植物名 紫鸭跖草《广西中药志》

文献名 紫露草《中药大辞典》

地方名 福建:鸭舌草、本山金线连、鸭舌黄(泉州),紫花鸭跖草,狭叶水竹叶,鹤舌草;广西:[血见愁]。

功效 全草:有毒。活血,止血,解蛇毒。用于蛇泡疮,疮疡,毒蛇咬伤,跌打、风湿。

#### 7280031

*Zebrina pendula* Schnizl.

植物名 吊竹梅《云南植志》

药材名 吊竹梅《汇编》

文献名 花叶竹夹菜《广西民药》,红竹壳菜《广西本草选编》,斜叶鸭趾草《云南药录》

地方名 水竹草(广东、广西、云南),红鸭跖草(福建、云南);上海:[淡竹叶];福建:金瓢羹,金调羹(福州),金匙羹,红竹草,红骨竹仔菜(诏安),红舌草,红竹仔草,白带草,鸡舌黄,鸭舌红,管菜(三明、宁化),紫鸭跖草,紫金竹,龙眼草;广西:吊竹菜、[紫背金牛]、[血见愁](南宁),二打不死,百毒散,紫背鸭跖草,竹叶草;云南:[凤眼草],花竹叶草,银白凤眼草。

功效 全草:清热解毒,凉血,利尿。用于肺结核咳嗽咯血,咽喉肿痛,急性结膜炎,细菌性痢疾,肾炎水肿,尿路感染,白带,痈疽,毒蛇咬伤。

### 7281 须叶藤科 Flagellariaceae

#### 7281001

*Flagellaria indica* L.

植物名 须叶藤《高植图鉴》

文献名 山藤《高植图鉴》

功效 茎、根茎:利尿;叶:用于创伤性收敛。

### 7283 黄眼草科 Xyridaceae

#### 7283001

*Xyris pauciflora* Willd.

植物名 葱草《高植图鉴》

文献名 少花黄谷精《广西药录》,少花黄眼草《广西植录》

地方名 广东:黄谷精;广西:红头草(北流),交剪草(玉林)。

功效 全草:外用于癣疥。

### 7285 谷精草科 Eriocaulaceae

#### 7285001

*Eriocaulon australe* R. Br.

植物名 毛谷精草《高植图鉴》

药材名 毛谷精草《中药志》

地方名 谷精草(东北、四川、云南、福建);福建:戴星草(厦门);广东:谷精,谷精珠,洋谷精,雷公锤,谷贞子;云南:牛毛草。

功效 花序:清肝明目,止痛。用于目赤肿痛,角膜云翳,咽喉肿痛,牙痛。外用于疮疥。

#### 7285002

*Eriocaulon buergerianum* Koern

植物名 谷精草《高植图鉴》

药材名 谷精草《开宝本草》、《药典》

文献名 戴星草《开宝本草》,文星草、流星草《纲目》,鼓槌草、戴精草、巴斯草、《新纲》,移星草《现代实用中药》,波氏谷精草《中国经植志》,衣钮草《汇编》

地方名 谷精珠(浙江、安徽、江苏),佛顶珠(四川、安徽);江苏:珍珠草、癞痢头草(无锡);浙江:耳朵刷子,挖耳朵草;湖南:翳子草,羊壳珠,金箍棒;安徽:米米芯;四川:灌耳草;云南:牛毛针。

功效 带花葶的头状花序:疏散风热,明目,退翳。用于风热目赤,肿痛羞明,眼生翳膜,风热头痛。

#### 7285003

*Eriocaulon decemflorum* Maxim.

植物名 长苞谷精草《高植图鉴》

药材名 长苞谷精草《浙江药植志》

功效 带花葶的头状花序:疏散风热,明目,退翳。

#### 7285004

*Eriocaulon luzulifolium* Mart.

植物名 小谷精草《高植图鉴》

药材名 小谷精草《广西药录》

地方名 广西:谷精草(马山、融安、三江)。

功效 全草:清热。用于目赤肿痛。

#### 7285005

*Eriocaulon nepalense* Presc. ex Bong.

植物名 舟萼谷精草《西藏植志》

药材名 谷精草(西藏)

功效 全草:清肝散热,祛风明目。各种类型眼疾,感冒头痛,牙痛,喉痹。

#### 7285006

*Eriocaulon nudicuspe* Maxim.

植物名 白珠谷精草《中药大辞典》

地方名 广西:鱼眼草,天星草,鼓锤草;四川:谷精草,佛顶珠(成都、重庆),灌耳草(米易)。

功效 全草:清肝泄热,祛风明目。用于目生翳膜,喉头痛,头风及齿痛;带花茎的头状花序:疏散风热,明目,退翳。

7285007

*Eriocaulon robustius* (Maxim.) Makino

植物名 宽叶谷精草《高植图鉴》

功效 全草:清肝泄热,祛风明目。

7285008

*Eriocaulon schochianum* Hand.-Mazz.

植物名 滇谷精草《云南种录》

药材名 滇谷精草《云南药录》

文献名 谷精草《滇南本草》

地方名 云南:毛谷精草,牛毛针。

功效 全草:疏风,明目,消炎。用于角膜云翳,目赤肿痛。

7285009

*Eriocaulon sexangulare* L. --- *E. wallichianum* Mart.

植物名 华南谷精草《高植图鉴》

药材名 谷精珠(广东、广西)、《汇编》

文献名 九死还魂草《植物名汇》,大叶谷精草(拉汉英种称),谷精草《广西本草选编》

地方名 谷精(台湾、广东);广东:谷丁草(陆丰),铜鼓钟(东莞、增城),驳子草(高州),乌耳草(宝安),珍珠草(大埔),白草(茂名);海南:衣钮草(琼中),顶子草(儋县、乐东),田川(海口、定安、屯昌),水精子(文昌),谷精子,簪子草(澄迈),田桑(澄迈、琼海);贵州:流星草;云南:牛毛草、六角谷精(曲靖)。

功效 全草:清肝明目,消炎退翳;带花茎的头状花序:疏散风热,明目,退翳。

7285010

*Eriocaulon sieboldianum* Sieb. et Zucc. ex Steud. --- *E. cinereum* R. Br.

植物名 白药谷精草《高植图鉴》

药材名 白药谷精草《中草药学》

文献名 谷精草《开宝本草》,戴星草《纲目》,戴精草《新纲》,赛谷精草、流星草《汇编》

地方名 浙江:雷步草(平阳),挖耳朵草(龙泉、泰顺);福建:白谷精草(泉州);湖南:满田星(常德);四川:佛顶珠(成都、重庆),灌耳草(米易);云南:谷精珠,文星草;其他:谷精,谷精子,吃眼睛草,移星草。

功效 带花茎的头状花序:疏散风热,明目,退翳。

7285011

*Eriocaulon truncatum* Buch.-Ham. ex Mart.

植物名 平头谷精草(拉汉英种称)

药材名 平头谷精草《广西药录》

文献名 珍珠草《高植图鉴》

功效 花序:清肝明目。用于目赤肿痛。

7285012

*Eriocaulon yaoshanense* Ruhl.

植物名 瑶山谷精草《广西药录》

地方名 广西:小谷精草。

功效 全草:清热利尿。用于目赤肿痛。

## 7286 凤梨科 Bromeliaceae

7286001

*Ananas comosus* (L.) Merr. --- *A. sativus* Schult. f.

植物名 凤梨《高植图鉴》

药材名 凤梨《广西药录》

文献名 (露兜子)《名实图考》,黄来、黄梨、地菠萝、菠萝果《植物名汇》,菠萝《海南植志》,菠萝蜜《中国植物图鉴》

地方名 广西:草菠萝,地菠萝;云南:打锣锤。

功效 果皮:用于痢疾;叶:清凉散毒,消肿排脓。外用于痈疮肿毒,脓疡。

7286002

*Ananas pyramidalis* Lindl.

植物名 红苞凤梨《中药大辞典》

药材名 水塔花《广西药录》

地方名 广西:香水塔花,水星菠萝(梧州)。

功效 叶:消肿排脓。用于痈疮肿毒。

## 7287 芭蕉科 Musaceae

7287001

*Ensete glaucum* (Roxb.) E. E. Cheesman

植物名 象腿蕉《高植图鉴》

药材名 象腿蕉《西双版纳傣药志》

文献名 象腿芭蕉、康光、挂丁掌《高植图鉴》

地方名 云南:“贵吻”(西双版纳傣语),芭蕉王(傣语意译)。

功效 根:外用于全身发肿,孕妇发肿,腿部肿痛。

7287002

*Musa balbisiana* Colla --- *M. paradisiaca* L. ssp. *seminifera* (Lour.) Baker

植物名 野蕉《中国植志》

药材名 山芭蕉子《南宁药志》

地方名 山芭蕉(广东、广西);云南:伦阿蕉(景颇语)。

功效 种子:有小毒。破瘀血,通大便。用于跌打骨折而致大便秘结。

7287003

*Musa basjoo* Sieb. & Zucc.

植物名 芭蕉《中国植志》

药材名 芭蕉《食疗本草》、《汇编》

文献名 巴且《汉书》,天蕉((《史记》徐广注),芭蕉花、芭蕉油、芭蕉根《日华子本草》,芭蕉叶《纲目》,绿天、扇仙《群芳谱》,芭蕉头《分类草药性》,芭蕉汁《卫生杂兴》,板蕉、牙蕉、胆瓶蕉、无耳闻雪《新纲》,芭蕉树水《中级医刊》,香蕉、甘露树《中药大辞典》

地方名 浙江:金蕉(平阳);安徽:甘露,水芭蕉;江西:大叶芭蕉;广东:粉蕉,大蕉;四川:大芭蕉头,大头芭

蕉。

功效 假茎、花蕾、叶、液汁：清热解毒，利尿消肿，凉血，止痛。用于感冒咳嗽，头痛，高血压病，胃痛，腹痛，肝炎，痢疾，崩漏，胎动不安，尿路感染，水肿。外用于中耳炎，创伤出血，痈疽肿毒。

#### 7287004

*Musa coccinea* Andr. --- *M. uranoscopus* Lour.

植物名 红蕉《中国植志》

药材名 指天蕉《汇编》

地方名 四川：小芭蕉、美人蕉、麒麟花（南川）；云南：芭蕉红（金平）；其他：野蕉。

功效 根茎：补虚弱。用于虚弱头晕，虚肿，血崩，白带；花：止鼻血。

#### 7287005

*Musa nana* Lour. --- *M. cavendishii* Lamb. --- *M. sinensis* Sagot ex Bak

植物名 香蕉《中国植志》

药材名 香蕉（广东、广西）

文献名 中国矮蕉《中国植志》

地方名 福建：龙溪蕉、天宝蕉；广东：芎蕉（潮汕），中脚盾地雷，油蕉，高把蕉，高脚牙蕉，梅花蕉，矮把蕉，矮脚盾地雷；云南：开远香蕉（芒市），高脚香蕉、西贡香蕉（河口），“桂母息”（德宏傣语），“桂衣店”、“桂尖”（西双版纳傣语），矮脚香蕉（河口、德宏、西双版纳）。

功效 全草：清热解毒，利尿消肿，安胎。

备考 《中国植志》16卷（二）载称：本种为一栽培种，品系及品种繁多，变异也很大。在国内栽培品中有大蕉（鼓锤蕉），龙牙蕉（过山香、沙香），粉蕉（糯米蕉、牛奶蕉、灰蕉），暹罗蕉、西贡蕉（粉芭蕉、灰芭蕉、西贡芭蕉、普通芭蕉、高脚芭蕉），牛角芭蕉、酸芭蕉（甜芭蕉、饭芭蕉），大芭蕉（缅甸大芭蕉）以及美蕉等。

#### 7287006

*Musa sapientum* L. --- *M. paradisiaca* L. ssp. *sapientum* (L.) O. Ktze.

植物名 大蕉《中国植志》

药材名 大蕉（广东）

文献名 蕉子《桂海虞衡志》，蕉果《本草求原》，红蕉、甘露《秘传花镜》，香芽蕉《南越笔记》，香蕉、甘蕉《中药大辞典》

地方名 芎蕉（福建、台湾），芭蕉（广西、云南）；福建：花骆蕉（泉州）；台湾：北蕉；广东：蕉花，蕉蕾；云南：粉芭蕉，西贡芭蕉（河口），普通芭蕉、高脚芭蕉、灰芭蕉（西双版纳），指天芭蕉（德宏），“桂末仑”（西双版纳傣语），“桂息普”、“桂柳姆朗”（德宏傣语）；其他：鼓槌蕉。

功效 全草：清热解毒，利尿消肿，安胎。用于流行性乙型脑炎，白带，胎动不安。外用于痈疽肿毒，丹毒，中耳炎；香蕉皮及果柄：用于高血压病，中耳炎。

#### 7287007

*Musa wilsonii* Tutch. --- *Ensete wilsonii* (Tutch.) Cheesm.

植物名 树头芭蕉《中国植志》

药材名 野芭蕉（云南）

地方名 云南：大树头芭蕉，“轨吞”、“桂吞”（傣语），“若阿泡若阿窝”（哈尼语）。

功效 全株：清热截疟。用于疟疾。

#### 7287008

*Musella lasiocarpa* (Franch.) C. Y. Wu ex H. W. Li. --- *Ensete lasiocarpum* (Franch.) Cheesm.

植物名 地涌金莲《中国植志》

药材名 地涌金莲《滇南本草》、《汇编》

地方名 云南：地金莲、地涌莲、地母金莲（昆明）。

功效 花：收敛止血。用于红崩，白带，便血；茎汁：用于解酒醉及草乌中毒。

### 7289 兰花蕉科 Lowiaceae

#### 7289001

*Orchidantha chinensis* T. L. Wu

植物名 兰花蕉《高植图鉴》

药材名 兰花蕉《广西药录》

功效 根茎：用于斑疹不退，烦热，咽喉肿痛。

### 7290 姜科 Zingiberaceae

#### 7290001

*Achasma yunnanense* T. L. Wu & Senjen

植物名 茴香砂仁《中国植志》

药材名 茴香砂仁《西双版纳傣药志》

地方名 云南：“麻亮布”、“麻亮不”（傣语）。

功效 根茎：用于不思饮食，胸腹痞痛，暑食夹杂，周身麻木，行动困难。

#### 7290002

*Alpinia bambusifolia* C. F. Liang & D. Fang

植物名 竹叶山姜《中国植志》

药材名 竹叶山姜《贵州药录》

地方名 贵州：山姜（罗甸）。

功效 根、种子：祛风除湿，理气止痛。用于风湿痹症，呕吐，咳嗽，胃痛。

#### 7290003

*Alpinia blepharocalyx* K. Schum.

植物名 云南草蔻《中国植志》

药材名 云南草蔻《中药志》

文献名 云南野砂仁《汇编》

地方名 四川：大箭杆风（沐川）；云南：小草蔻，草蔻，滇草蔻，草豆蔻。

功效 种子：燥湿，祛寒，暖胃，健胃。用于心腹冷痛，痞满吐酸，噎膈，反胃，寒湿吐泻。

#### 7290004

*Alpinia blepharocalyx* K. Schum. var. *glabrior* (Hand. -Mazz.) T. L. Wu

植物名 光叶云南草蔻《中国植志》

地方名 土香蔻（广东、广西、云南）；广西：小白蔻（德保）；云南：草豆蔻。

功效 果实：化湿消痞，行气温中，开胃消食。

备考 果实在两广、云南以土香蔻之名作白豆蔻入药。

## 7290005

*Alpinia brevis* T. L. Wu et Senjen

植物名 小花山姜《中国植志》

功效 根茎:除风湿,解疮毒、瘀血。

## 7290006

*Alpinia calcarata* Rosc.

植物名 距花山姜《中国植志》

药材名 距花山姜《广西药录》

地方名 广西:小良姜(钟山)。

功效 根茎:用于脘腹冷痛,胃寒呕吐。

## 7290007

*Alpinia chinensis* (Retz.) Rosc.

植物名 华山姜《中国植志》

药材名 廉姜《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 杜若、〔杜衡〕《本经》,杜莲、白芩、白连、若芝《别录》,菱《广雅》,姜汇《吴都赋》,山姜、华良姜《本草拾遗》,〔杜衡〕、楚蕲、獐子姜《纲目》

地方名 山羌(广东、广西、四川),箭杆风、见赶风(广西、四川),〔土砂仁〕(福建、广东),九姜莲(广东、广西),野姜(广东、四川);江西:〔高良姜〕;广东:野山姜;广西:山姜黄,小良姜(融安、上林);四川:见杆风,良姜,姜活,小箭杆风(沐川、洪雅、夹江);贵州:大杆,姜叶,剑杆,座杆,〔淫羊藿〕,〔砂仁〕,姜叶淫羊藿。

功效 根茎:温胃散寒,消食止痛。用于胃痛胀闷,噎膈吐逆,腹痛泄泻,风湿关节冷痛。

## 7290008

*Alpinia conchigera* Griff.

植物名 节鞭山姜《中国植志》

地方名 云南:〔红豆蔻〕(西双版纳、沧源)。

功效 根茎:用于蛇咬伤及作香料;果:芳香健胃,驱风。

## 7290009

*Alpinia coriandriodora* D. Fang

植物名 香姜《中国植志》

功效 根茎:驱风行气。

## 7290010

*Alpinia formosana* K. Schum.

植物名 美山姜《中国植志》

药材名 美山姜《广西药录》

地方名 广西:土蔻。

功效 果实:行气。

## 7290011

*Alpinia galanga* (L.) Willd. --- *Amomum medium* Lour.

植物名 红豆蔻《中国植志》

药材名 红豆蔻《海药本草》、《药典》,大良姜〔根茎〕《广西中药志》

文献名 红豆蔻花《桂海虞衡志》,红蔻《本草述钩元》,良姜《植物名汇》,比目连理花、埋光乌药、蜜姜、高良姜《新纲》,大高良姜《广州植志》

地方名 山姜(广西、云南),山羌子、山姜子(广东、广西),红叩(华南);台湾:南姜;广西:红扣,红豆扣,良姜子,草果;云南:“野哈”(西双版纳傣语)。

功效 果实(红豆蔻):燥湿散寒,醒脾消食。用于脘腹冷痛,食积胀满,呕吐泄泻,饮酒过多;根茎(大良姜):温肾,散寒,止痛。用于心胃气痛,胃寒,伤食吐泻。

## 7290012

*Alpinia galanga* Willd. var. *appendiculata* Y. H. Chen, ined.

植物名 附尖红豆蔻《中药材科技》

文献名 尖红豆蔻《新华本草纲要》

地方名 广西:红豆蔻。

功效 果实:燥湿散寒,醒脾消食。

## 7290013

*Alpinia galanga* Willd. var. *pyramidata* (Blume) K. Schum.

植物名 有毛红豆蔻《中药材科技》

文献名 毛红豆蔻《新华本草纲要》

地方名 广西:红豆蔻。

功效 果实:燥湿散寒,醒脾消食。

## 7290014

*Alpinia globosa* Horan. --- *Amomum globosum* Lour.

植物名 脆果山姜《中国植志》

文献名 草蔻、草豆蔻、草豆扣《药材学》

地方名 土豆蔻、土香蔻(海南、云南);海南:白豆蔻,豆蔻。

功效 果实、种子:燥湿祛寒,除痰截疟,健脾暖胃。用于心腹冷痛,胸痞胀满,寒疟,痰食积滞,呕吐,寒湿泻利等。

## 7290015

*Alpinia graminifolia* D. Fang & G. Y. Lo

植物名 狭叶山姜《中国植志》

功效 根茎:行气。

## 7290016

*Alpinia henryi* K. Schum.

植物名 小草蔻《中国植志》

药材名 小草蔻(海南)、《中药志》

文献名 直德山姜《海南植志》

功效 果实:用于胃寒腹痛胀满等。

## 7290017

*Alpinia intermedia* Gagnep.

植物名 光叶山姜《中国植志》

药材名 光叶山姜《新华本草纲要》

功效 根茎、果实:用于脘腹胀气,消食。

## 7290018

*Alpinia japonica* (Thunb.) Miq.

植物名 山姜《中国植志》

药材名 山姜《本草经集注》、《汇编》

文献名 杜若《本经》,姜草《本草经集注》,山姜花《日华子本草》,箭杆风《草木便方》,伊豆缩砂《和汉药物学》,福建土砂仁《中药志》,和山姜《中药大辞典》

地方名 九龙盘(江西、贵州),〔土砂仁〕(浙江、福建、湖南、江西、广西、四川),小杆子(湖北、湖南);浙江:山姜仁;江西:鸡爪莲(婺源);福建:建砂仁,建砂;湖北:元荷,扬红姜;湖南:土良姜,山良姜,山里箭杆

风,竹叶伸筋,良姜,洋薑七,胡椒七,茅头茶,管竹风,箭骨风;广西:小发散,白寒果(金秀);四川:小箭杆风(乐山、沐川、洪雅、夹江),山姜妈仔、血姜黄、羊薑、地黄花(松政),九节莲(峨眉山),九姜连;贵州:行杆。

**功效** 根茎:祛风通络,理气止痛。用于风湿性关节炎,跌打损伤,牙痛,胃痛;果实和种子:芳香健胃,行气调中。用于痞胀腹痛,呕吐腹泻;花:调中下气,消食,解酒。

## 7290019

*Alpinia katsumadai* Hayata

植物名 草豆蔻《中国植志》

药材名 草豆蔻《雷公炮炙论》、《药典》

文献名 豆蔻《别录》,漏蔻《南方异物志》,草蔻花《南方草木状》,草果《通志》,广州白豆蔻《图经》,草蔻《本草从新》,大草蔻《药材资料汇编》,假麻树《汇编》

地方名 海南:弯子,草蔻仁,扣仁,飞雷子,草仁,偶子;广西:“高架”(壮语),大红扣,大果砂仁,草扣,草豆扣,野姜,邓卡麻(北流)。

**功效** 种子:燥湿健脾,温胃止呕。用于寒湿内阻,脘腹胀满冷痛,暖气呃逆,不思饮食。

## 7290020

*Alpinia kwangsiensis* T. L. Wu et Senjen

植物名 长柄山姜《中国植志》

药材名 长柄山姜《广西药录》

地方名 广西:大豆蔻(武鸣)。

**功效** 根茎:用于脘腹冷痛,胃寒呕吐;种子:用于脘腹冷痛,呃逆,寒湿吐泻。

## 7290021

*Alpinia maclurei* Merr. --- *Languas maclurei* (Merr.) Merr.

植物名 假益智《中国植志》

地方名 海南:山姜,红扣;广西:假草果(那坡),藤角姜(容县)。

**功效** 根茎、果实:行气,止呕。用于腹胀呕吐。

## 7290022

*Alpinia malaccensis* (Burm.) Rose.

植物名 毛瓣山姜《中国植志》

药材名 玉蔻《广西药录》

**功效** 种子:用于胸腹满闷,反胃呕吐,宿食不消。

## 7290023

*Alpinia mutica* Roxb. --- *Catimbiium mutica* Holtt.

植物名 南山姜《新华本草纲要》

**功效** 果实:据称作豆蔻应用。

## 7290024

*Alpinia nigra* (Gaertn.) Burtt. --- *Zingiber nigrum* Gaertn.

植物名 黑果山姜《中国植志》

**功效** 根茎:行气,解毒。用于腹胀,呕吐等。

## 7290025

*Alpinia officinarum* Hance

植物名 高良姜《中国植志》

药材名 高良姜《药典》

文献名 杜若《本经》雷州高良姜《证类本草》,良姜《滇南本草》,小高良姜《中药志》,比目连理花《中国药植图鉴》,海良姜《药材学》

地方名 小良姜(广东、广西、云南),山姜(福建、云南);海南:风姜,卓仁;云南:“贺哈”(傣名),“草子真寒”(哈尼语),红豆蔻。

**功效** 根茎:温胃散寒,消食止痛。用于脘腹冷痛,胃寒呕吐,暖气吞酸。

**备考** 古代的杜若应是今日之高良姜,古代的高良姜应是今日的大高良姜和《花镜》的杜若。

## 7290026

*Alpinia oxyphylla* Miq.

植物名 益智《南方草木状》、《中国植志》

药材名 益智《药典》

文献名 益智子《开宝本草》,益智仁《得配本草》,益智子《和汉药物学》

地方名 广西:小良姜(陆川);海南:摘芋子

**功效** 果实:温脾止泻摄唾,暖肾固精缩尿。用于脾寒泄泻,腹中冷痛,口多唾涎,肾虚遗尿,小便频数,遗精白浊。

## 7290027

*Alpinia pinnanensis* T. L. Wu et Senjen

植物名 柱穗山姜《中国植志》

地方名 广西:土白蔻(上林)。

**功效** 种子:用于胸腹满闷,反胃呕吐,宿食不消。

## 7290028

*Alpinia polyantha* D. Fang

植物名 多花山姜《中国植志》

地方名 广西:[白蔻](龙州、邕宁),[高良姜](天等),土白蔻(龙州)。

**功效** 根茎、果实:行气消积。用于胸腹满闷,反胃呕吐,宿食不消,咳嗽。

## 7290029

*Alpinia psilogyna* D. Fang

植物名 矮山姜《中国植志》

地方名 广西:产后姜(龙胜)。

**功效** 根茎、果实:用于驱风,产后脾胃虚弱。

## 7290030

*Alpinia pumila* Hook. f.

植物名 花叶山姜《中国植志》

文献名 矮山姜《广西药录》

地方名 广东:野姜黄;广西:山姜,竹节风,假砂仁,箭杆风;贵州:行杆、砂仁(剑河)。

**功效** 根茎:除湿消肿,行气止痛,温脾止泻。用于风湿痹痛,脾虚气滞,胃痛,泄泻,妊娠恶阻,跌打损伤。

## 7290031

*Alpinia stachyoides* Hance

植物名 箭杆风《中国植志》

药材名 箭杆风(广东、四川)

地方名 四川:土砂仁(乐山),一枝箭。

**功效** 根茎:用于风湿痹痛。



## 7290032

*Alpinia strobiliformis* T. L. Wu et Senjen

植物名 球穗山姜《中国植志》

药材名 球穗山姜《广西药录》

地方名 广西:野姜(那坡)。

功效 种子:用于感冒。

## 7290033

*Alpinia subulatum* Roxb.

植物名 印度砂仁《中药材科技》

文献名 香豆蔻《中药材科技》

备考 主产尼泊尔、孟加拉、印度,作高级香料调味用。近年个别省市进口充作砂仁用,应注意鉴别。

## 7290034 见 7290053

## 7290035

*Alpinia tonkinensis* Gagnep.

植物名 滑叶山姜《中国植志》

药材名 滑叶山姜《广西药录》

地方名 广西:白蔻(宁明、崇左)。

功效 果实、种子:开胃,行气。用于胸腹满闷,反胃呕吐,宿食不消;根茎:外用于风湿痹痛。

## 7290036

*Alpinia zerumbet* (Pers.) Burt. & Smith --- *Alpinia speciosa* (Wendl.) K. Schum. --- *Zerumbet speciosa* Wendl.

植物名 艳山姜《中国植志》

药材名 川砂仁(四川)

文献名 玉桃《名实图考》

地方名 草豆蔻、大草蔻、草蔻(广东、广西),月桃(台湾、广西、云南),土砂仁(四川、贵州、福建);福建:山蜜桃;台湾:虎子花,月桃子;广西:假砂仁,邓茹;其他:鸡脚花;鹤兰花,白手伊豆缩砂。

功效 种子:燥湿祛寒,除痰止咳,健脾暖胃。用于心腹冷痛,胸腹胀满,痰湿积滞,消化不良,呕吐腹泻。

## 7290037

*Amomum aurantiacum* H. T. Tsai & S. W. Zhao

植物名 红壳砂仁《中国植志》

药材名 红壳砂仁《中药志》

文献名 红砂仁《中草药》,红壳砂《中药志》

功效 果实:行气宽中,健胃,消食,安胎。

## 7290038

*Amomum austrosinense* D. Fang

植物名 三叶豆蔻《广西药录》

地方名 广西:土砂仁(贺县),公天维(富川)。

功效 果实:用于脘腹胀痛,食欲不振,恶心呕吐,胎动不安。

## 7290039

*Amomum chinense* Chun ex T. L. Wu

植物名 海南假砂仁《中国植志》

文献名 [海南砂仁]《中药材科技》

地方名 [砂仁](海南、广西);海南:土荔枝。

功效 果实:民间作砂仁用。

## 7290040

*Amomum compactum* Soland ex Maton

植物名 爪哇白豆蔻《中国植志》

药材名 豆蔻《药典》

文献名 印尼白蔻《药典》,白豆蔻《新华本草纲要》

功效 果实:化湿消痞,行气温中,开胃消食。用于湿浊中阻,不思饮食,湿温初起,胸闷不饥,寒湿呕逆,胸腹胀痛,食积不消。

备考 本品原进口,现已引种成功。

## 7290041

*Amomum dolichanthum* D. Fang

植物名 长花豆蔻《中国植志》

地方名 广西:哥卡(龙州)。

功效 根茎:外用于脚外伤。

## 7290042

*Amomum guixiense* D. Fang

植物名 广西草果《广西药录》

地方名 广西:白草果,麻吼(那坡)。

功效 果实:用于脘腹胀满冷痛,反胃,呕吐,食积,痰饮,疟疾。

## 7290043

*Amomum koenigii* J. F. Gmelin

植物名 野草果《中国植志》

药材名 野草果《广西药录》

功效 果实:驱风,行气。

备考 果实:广西百色和那坡,曾有人误作草果用。

## 7290044

*Amomum kravanh* Pierre ex Gagnep. --- *A. cardamomum*

auct. non L. --- *A. repens* auct. non Sonner

植物名 白豆蔻《本草拾遗》、《中国植志》

药材名 豆蔻《别录》、《药典》

文献名 多骨《开宝本草》,白蔻《本草经辨》,壳蔻《本经逢原》,白豆蔻壳《药性切用》,豆蔻花《饮片新参》,圆豆蔻、扣米《中草药学》,白蔻仁《简明中医辞典》,原豆蔻《药典》

地方名 北京:紫蔻,紫叩,白叩。

功效 果实:化湿消痞,行气温中,开胃消食。用于湿浊中阻,不思饮食,湿温初起,胸闷不饥,寒湿呕逆,胸腹胀痛,食积不消;壳与花:功效较果实稍弱。

备考 过去有些文献曾将本种学名误订为 *Amomum cardamomum* L. 或 *A. repens* Sonner(此为小豆蔻之异名)。

## 7290045

*Amomum kwangsiense* D. Fang et X. X. Chen

植物名 广西豆蔻《中国植志》

药材名 广西砂仁《新华本草纲要》

地方名 广西:砂仁(龙州),土草果(天峨),土砂仁;贵州:囊荷、洋荷(册亨)。

功效 果实:理气开胃,消食,安胎。用于脘腹胀痛,食欲不振,恶心呕吐,胎动不安。

## 7290046

*Amomum longiligulare* T. L. Wu

植物名 海南砂仁《中国植志》

药材名 砂仁《药典》

文献名 海南砂《药典》

地方名 海南;海南壳砂仁,长舌砂,土砂仁。

功效 果实:化湿开胃,温脾止泻,理气安胎。用于湿浊中阻,脘痞不饥,脾胃虚寒,呕吐泄泻,妊娠恶阻,胎动不安。

#### 7290047

*Amomum longipetiolatum* Merr.

植物名 长柄豆蔻《中国植志》

药材名 长柄豆蔻《广西药录》

功效 果实:用于脘腹胀痛,食欲不振,恶心呕吐,胎动不安。

#### 7290048

*Amomum maximum* Roxb.

植物名 九翅豆蔻《中国植志》

文献名 九翅砂仁《云南植物研究》

地方名 广西:“邓嘎”(凭祥);云南:“哥姑”(西双版纳傣名)。

功效 果实:理气,开胃,消食,安胎。用于脘腹胀痛,食欲不振,恶心呕吐,胎动不安。

#### 7290049

*Amomum microcarpum* C. F. Liang et D. Fang

植物名 细砂仁《中国植志》

地方名 广西:砂仁。

功效 果实:用于脘腹胀痛,食欲不振,恶心呕吐,胎动不安。

#### 7290050

*Amomum muricarpum* Elm.

植物名 疣果豆蔻《中国植志》

文献名 疣果砂仁《海南植志》

地方名 广东:牛牯缩砂(阳春),土砂仁,波罗砂;广西:大砂仁(龙州)。

功效 果实:开胃消食,行气和中,止痛安胎。用于脘腹胀痛,食欲不振,恶心呕吐,胎动不安。

#### 7290051

*Amomum odontocarpum* D. Fang

植物名 波翅豆蔻《中国植志》

地方名 广西:阪姜(隆林),野稻荷(西林)。

功效 根茎:用于蛇咬伤;成熟果实:用于脘腹胀痛。

#### 7290052

*Amomum subulatum* Roxb.

植物名 香豆蔻《中国植志》

药材名 尼泊尔豆蔻《新华本草纲要》

地方名 西藏:“嘎哥拉”(藏名)。

功效 种子:驱风,消肿,止痛。用于胃肠气胀,食滞,咽喉肿痛,咳嗽,肺结核等。

#### 7290053

*Amomum thyrsoideum* Gagnep.

植物名 长序砂仁《中国植志》

药材名 长序砂仁《广西药录》

地方名 广西:土砂仁(宁明),土山姜(隆安),砂仁。

功效 根茎:用于疟疾;果实:用于脘腹胀,食欲不振,恶心呕吐,胎动不安。

#### 7290054

*Amomum tsao-ko* Crevost et Lemarie --- *A. hongtsaoko* C. F. Liang & D. Fang

植物名 草果《中国植志》

药材名 草果《品汇精要》、《药典》

文献名 草果仁《传信适用方》,草果子《小儿卫生总微论方》

地方名 广西:老蔻(都安),红草果(那坡);贵州:智之子,土草果。

功效 果实:燥湿温中,除痰截疟。用于寒湿内阻,脘腹胀痛,痞满呕吐,疟疾寒热。

#### 7290055

*Amomum villosum* Lour. --- *A. echinosphaerum* K. Schum.

植物名 阳春砂《汇编》

药材名 砂仁《本草原始》、《药典》

文献名 春砂花、砂壳《饮片新参》,土密砂《增订伪药条辨》,砂仁壳《中药志》,砂仁花《中国医学大辞典》

地方名 广东:阳春砂仁,春砂仁,连壳砂;云南:砂果(文山);其他:广砂(产于广西者),春砂壳,春砂。

功效 果实:化湿开胃,温脾止泻,理气安胎。用于湿浊中阻,脘痞不饥,脾胃虚寒,呕吐泄泻,妊娠恶阻,胎动不安。

#### 7290056

*Amomum villosum* Lour. var. *nanum* H. T. Tsai et S. W. Zhao

植物名 矮砂仁《中国植志》

地方名 云南:砂仁(富宁)。

功效 果实:化湿开胃,温脾止泻,理气安胎。

#### 7290057

*Amomum villosum* Lour. var. *xanthioides* (Wall. ex Bak.) T. L. Wu & Senjen --- *A. xanthioides* Wall. ex Bak.

植物名 缩砂密《中国植志》

药材名 砂仁《药典》

文献名 缩砂蜜、缩砂仁《药性论》,缩砂、缩砂蜜《海药本草》,西砂仁《饮片新参》,赛桂香、风味团头《新纲》,野豆蔻(叶《生药》),进口砂仁《中药大辞典》,砂头王、原砂仁、砂米《中药材科技》,绿壳砂《药典》

地方名 广西:绿壳砂仁;云南:“麻娘”(西双版纳傣语),勐腊砂仁,砂果,净砂仁。

功效 果实:化湿开胃,温脾止泻,理气安胎。用于湿浊中阻,脘痞不饥,脾胃虚寒,呕吐泄泻,妊娠恶阻,胎动不安。

#### 7290058

*Caulokaempferia coenobialis* (Hance) K. Larsen --- *Monolophus coenobialis* Hance - *Kaempferia coenobialis* (Hance) C. H. Wright

植物名 黄花大苞姜《中国植志》

地方名 广西:岩山姜,水马鞭(武鸣),岩竹叶,土山禁,黄花山奈,石竹花(上林)。

功效 全草:用于蛇伤,风湿。

#### 7290059

*Caulokaempferia yunnanensis* (Gagnep.) R. M. Smith --- *Monolophus yunnanensis* (Gagnep.) T. L. Wu & Senjen --- *Camptandra yunnanensis* (Gagnep.) K. Schum.

植物名 大苞姜《中国植志》

药材名 滇姜三七《汇编》

文献名 姜三七《云南中草药》,曲蕊姜《汇编》

功效 球茎:止血消肿。用于跌打损伤,骨折,吐血,衄血,功能性子宫出血,外伤出血。

#### 7290060

*Costus lacerus* Gagnep. --- *C. chinensis* T. L. Wu & Senjen

植物名 莪笋花(云南)、《中国植志》

药材名 莪笋花《新华本草纲要》

功效 根茎:利水,消肿,拔毒。

#### 7290061

*Costus speciosus* (Koen.) Smith

植物名 闭鞘姜《中国植志》

药材名 樟柳头《生草药性备要》、《中药大辞典》

文献名 白石笋《岭南采药录》,水蕉花《海南植志》

地方名 广东商陆(广东、广西);福建:金光笋;广东:雷公笋(阳江),猴姜(曲江),假沙仁(连山),土当归(南雄),鹤头笋(佛冈),杨桃笋、刀公草(始兴),雷公棍(阳春),〔商陆〕,路羌猫;海南:苛施他草,广商陆,陆羌猫;广西:山冬笋、羌商陆、缩沙头(梧州),亚公棒,九龙盘,台头笋,盘龙姜,鬼姜(龙州);云南:老妈妈拐棍(思茅),牛尾巴茶(红河),“硬倒”(傣名),大接骨叶,毛姜,石笋,象甘蔗。

功效 根茎:有小毒。利水,消肿,拔毒。用于百日咳,肾炎水肿,尿路感染,肝硬化腹水,小便不利。外用于荨麻疹,疮疖肿毒,中耳炎。

#### 7290062

*Costus tonkinensis* Gagnep.

植物名 光叶闭鞘姜《中国植志》

药材名 樟柳头《云南药录》

地方名 云南:牛尾巴茶。

功效 根茎:利尿消肿。用于肝硬化腹水,尿路感染,肌肉肿痛,阴囊肿痛,肾炎水肿,无名肿毒,荨麻疹。

#### 7290063

*Curcuma aeruginosa* Roxb.

植物名 莪术《中国植志》

药材名 莪术〔根茎〕《中药志》

功效 块根(郁金):行气化瘀,清心解郁,利胆退黄。用于经闭痛经,胸腹胀痛,刺痛,热病神昏,癫痫发狂,黄疸尿赤。根茎(莪术):行气破瘀,消积止痛。用于癥瘕痞块,瘀血经闭,食积腹胀,早期宫颈癌。

备考 过去我国文献和标本上定名为 *Curcuma zedoaria* Rosc. 的实为本种。

#### 7290064

*Curcuma angustifolia* Roxb.

植物名 狭叶莪术《药学报》

功效 根茎:行气破血,消积止痛。

#### 7290065

*Curcuma aromatica* Salisb.

植物名 郁金《中国植志》

药材名 郁金〔块根〕《中药志》

文献名 毛郁金《药学报》

功效 块根:行气化瘀,清心解郁,利胆退黄。用于经闭痛经,胸腹胀痛,刺痛,热病神昏,癫痫发狂,黄疸尿赤。

备考 过去文献多以本品为郁金之原植物,近年来研究报道,国内尚未发现野生种,本品东南亚国家有产。

#### 7290066

*Curcuma caesia* Roxb.

植物名 黑心姜《广西本草选编》

药材名 黑心姜《汇编》

地方名 广西:蓝姜。

功效 根茎:祛风除湿,消肿止痛。

#### 7290067

*Curcuma elata* Roxb.

植物名 大莪术《广西药录》

功效 根茎:用于腹部肿块,积滞腹胀,血瘀经闭,跌打损伤。

#### 7290068

*Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang

植物名 广西莪术《中国植志》

药材名 莪术〔根茎〕《开宝本草》,郁金〔块根〕《药性论》、《药典》

文献名 蓬莪蔑《药性论》,端州蓬莪蔑,宜州姜黄《图经》,广术《本经逢原》,广西姜黄《云南种录》,桂莪术《中药志》

地方名 广西:毛莪术,莪苓。

功效 根茎(莪术):行气破血,消积止痛。用于癥瘕痞块,瘀血经闭,食积腹胀,早期宫颈癌;块根(郁金):行气化瘀,清心解郁,利胆退黄。用于经闭痛经,胸腹胀痛、刺痛,热病神昏,癫痫发狂,黄疸尿赤。

#### 7290069

*Curcuma kwangsiensis* S. Lee et C. F. Liang var. *puberula* Y. H. Chen

植物名 毛莪术《新华本草纲要》

药材名 桂莪术〔主根茎〕、莪苓〔块根〕(广西)

地方名 广西:莪术。

功效 主根茎(桂莪术):行气破血,消积止痛;块根:行气化瘀,清心解郁,利胆退黄。

#### 7290070

*Curcuma longa* L. --- *C. domestica* Val.

植物名 姜黄《中国植志》

药材名 姜黄〔根茎〕《名实图考》、《药典》,郁金〔块根〕《药性论》、《药典》

文献名 马迷《唐本草》,宜州姜黄《图经》,宝鼎香《纲目》,姜姜《生草药性备要》,金母蛭《新纲》,炮黄《和

汉药标本目录》，黄玉金、川姜黄、建姜黄《药材学》，广玉金、黄郁金《中药大辞典》，黄丝郁金《药典》

地方名 四川：玉金、川玉金、川郁金，子姜黄，色姜黄；云南：“毫命”（傣名），刺猪头。

功效 根茎：（姜黄）：破血行气，通经止痛。用于胸胁刺痛，经闭，癥瘕，风湿肩臂疼痛，跌扑肿痛；块根（郁金）：行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭，痛经，胸腹胀痛、刺痛，热病神昏，癫病发狂，黄疸尿赤。

#### 7290071

*Curcuma phaeocaulis* Veleton

植物名 蓬莪术《药性论》、《药典》

药材名 莪术〔根茎〕、郁金〔块根〕《药典》

文献名 蓬莪术《药性论》，马蓬、蓬莪《唐本草》，蓬莪《本草拾遗》，蓬莪莪《日华子本草》，广莪《珍珠囊》，蓬术《普济方》，蓬莪《本经逢原》，莪莪《本草备要》，姜七《生草药性备要》，广术《本草求真》，广莪术、穗花山姜、莪莪《汉药写真集成》，莪莪、青姜、破关符《新纲》，南七《中草药》，绿丝郁金《中药志》

地方名 蓝心姜、黑心姜、乌姜（广东、广西），蓝姜、黑姜（广东、广西、云南），绿姜（广东、广西、四川、云南），〔土三七〕（台湾、广东）；台湾：三七姜；广东：蓝肉姜，血母姜，臭屎姜（广州），〔乌肉三七〕（潮阳）；海南：乌心姜，风姜；广西：母猪花头，芦花根，翻身棕；四川：文术（峨眉山），土文术，土莪术；云南：黑良心；其他：玉金，芋儿七。

功效 根茎（莪术）：行气破血，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，食积胀痛，早期宫颈癌；块根（郁金）：行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭、痛经，胸腹胀痛、刺痛，热病神昏，癫病发狂，黄疸尿赤。

#### 7290072

*Curcuma sichuanensis* X. X. Chen

植物名 川郁金（广西植物）

药材名 川郁金〔块根〕、川莪术〔根茎〕《中药志》

文献名 土文术《药学报》，莪术、郁金、白丝郁金《中药志》

地方名 四川：文莪，姜黄。

功效 主根茎（川莪术）：行气破血，消积止痛；块根（川郁金）：行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。

备考 本品主产四川，为川郁金品种之一，但商品往往误称“广郁金”。

#### 7290073

*Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling --- *C. aromatica* Salisb. cv. *Wenyujin*

植物名 温郁金《中药志》

药材名 温郁金〔块根〕、温莪术〔主根茎〕《中药志》，片姜黄〔根茎切片〕《临证指南》、《药典》

文献名 郁金《药性论》，温州蓬莪莪《图经》，姜黄芹〔根茎新头〕《浙南本草新编》

地方名 浙江：片子姜黄（老根茎纵切片）。

功效 块根（郁金）：行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛、刺痛，热病神昏，癫病发狂，黄疸尿赤；根茎切片（片姜黄）：破血行气，通经止痛。用于血滞经闭，行经腹痛，胸胁刺痛，风湿痹痛，肩

臂疼痛。跌扑损伤；主根茎（莪术）：行气破血，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，食积腹胀，早期宫颈癌。

备考 本品的块根，主产浙江，但商品往往误称“川郁金”。

#### 7290074

*Curcuma zedoaria* (Christm.) Rosc.

植物名 黄莪术《中药志》

药材名 莪术〔根茎〕《中药志》

文献名 山姜黄《广州植志》

地方名 广东：臭屎姜（广州）。

功效 主根茎：行气破血，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，食积腹胀，早期宫颈癌。

备考 国产莪术非此种。本品东南亚国家有产，若为进口莪术，就有本种存在之可能。

#### 7290075

*Elettaria cardamomum* Maton. --- *Amomum repens* auct. non Sonner

植物名 小豆蔻《中药志》

药材名 小豆蔻《中药志》

文献名 三角蔻、印度豆蔻《中药志》，贡蔻〔大粒〕、拣蔻、顶紫蔻〔颗粒最小〕、蔻球、蔻王〔已去壳〕、蔻米〔去壳碎粒〕、枫蔻、小豆蔻〔带壳瘪瘦小粒〕《药材学》

地方名 浙江：西藏豆蔻（杭州）。

功效 种子：理气宽中，暖胃消食，化湿止呕，解酒；果壳、花：功用与种子相同，但温性略低，药力亦较弱。

备考 有些文献曾将本品学名误订为 *Amomum repens* Sonner.

#### 7290076

*Elettaria major* Smith

植物名 印度豆蔻《中药志》

文献名 三角蔻、小豆蔻《中药志》

功效 果实：消食驱风，芳香矫味。

#### 7290077

*Globba emeiensis* Z. Y. Zhu

植物名 峨眉舞花姜《云南植物研究》

地方名 四川：望秋子（沐川）。

功效 全株：发汗解表，止痛，通经。

#### 7290078

*Globba racemosa* Smith --- *G. bulbosa* Gagnep.

植物名 舞花姜《中国植志》

地方名 湖南：“罗锅崩”（瑶名）；广西：包谷姜，加罗姜，假山姜，山姜，山包谷，竹叶草（全州）；云南：云南小草蔻。

功效 地下茎取汁：用于癣；根：用于风湿骨痛，胃寒疼痛；果：健胃。

#### 7290079

*Globba schomburgkii* Hook. f. --- *G. chinensis* K. Schum.

植物名 双翅舞花姜《中国植志》

地方名 云南：舞女花，小草扣。

功效 果实：健胃。用于胃炎，消化不良。

#### 7290080

*Hedychium brevicaulis* D. Fang

植物名 矮姜花《中国植志》  
 文献名 那坡姜花《植分学报》  
 地方名 广西:野山姜(那坡)。  
 功效 根茎:止痛。用于支气管哮喘。

## 7290081

*Hedychium coronarium* Koen.

植物名 姜花《中国植志》  
 药材名 路边姜《汇编》  
 文献名 白草果《名实图考》,山羌活《分类草药性》,白姜花《中国经植志》  
 地方名 广东:蝴蝶花(梅县);四川:[土砂仁](蓬溪),羌花,羌壳(南川),山姜活、连姜巴、廉姜(夹江),土羌活,姜花根,凉姜(峨眉山);贵州:夜寒苏,夜寒舒,野洋荷;云南:“傣哼”(西双版纳傣语),花姜,[白豆蔻];其他:立茂。

功效 根茎:祛风除湿,温中散寒。用于感冒,头痛身痛,风湿筋骨疼痛,跌打损伤,寒暑白带;果:用于胃脘胀满,消化不良,寒滞作呕,胃腹微痛。

## 7290082

*Hedychium densiflorum* Wall.

植物名 密花姜花《中国植志》  
 文献名 [高良姜]《西藏中草》  
 地方名 西藏:“噶玛尔”(藏名)。  
 功效 根茎:温中散寒,止痛消食。用于消化不良,胃脘气胀,呕吐,噎膈,霍乱等。

## 7290083

*Hedychium emeiense* Z. Y. Zhu

植物名 峨眉姜花《云南植物研究》  
 地方名 四川:香花洋姜(峨眉)。  
 功效 根茎:解表散寒,利湿,消肿;果实:温胃,止呕,消食,健脾。

## 7290084

*Hedychium flavum* Roxb.

植物名 黄姜花《中国植志》  
 药材名 黄姜花《广西药录》  
 地方名 广西:月家草(天峨)。  
 功效 根茎:用于咳嗽;花(挥发油):芳香健胃。

## 7290085

*Hedychium forrestii* Diels

植物名 圆瓣姜花《中国植志》  
 药材名 大头姜《广西药录》  
 功效 根茎:用于崩漏,月经不调。

## 7290086

*Hedychium kwangsiense* T. L. Wu et Senjen

植物名 广西姜花《中国植志》  
 药材名 广西姜花《广西药录》  
 地方名 广西:卡现(龙州)。  
 功效 根茎:外用于疮疡肿毒。

## 7290087

*Hedychium panzhum* Z. Y. Zhu

植物名 盘珠姜花《云南植物研究》  
 地方名 四川:洋姜笋(峨眉)。

功效 根茎:解表散寒,利湿,消肿;果实:温胃,止呕,消食,健脾。

## 7290088

*Hedychium spicatum* Ham. ex Smith

植物名 草果药《滇南本草》、《中国植志》  
 药材名 上良姜《汇编》  
 文献名 [豆蔻]、[草果]《滇南本草》,良姜花《滇南本草图谱》,〔三奈〕《种称》,〔山奈〕《汉药写真集成》,三藏、山辣《新纲》,长穗姜花《中药志》,疏穗姜花《高植图鉴》  
 地方名 四川:三乃子,野草果;云南:野姜(楚雄),四合红(曲靖),独叶台,白草果,良姜,四合和。  
 功效 根茎、果实:温中散寒,理气止痛。用于胃寒痛,呕吐,消化不良,寒疝气痛。外用于膝关节痛。

## 7290089

*Hedychium tienlinense* D. Fang

植物名 田林姜花《中国植志》  
 地方名 广西:三百棒(田林)。  
 备考 《新华本草纲要》称:本品根茎,兽医用于马病。

## 7290090

*Hedychium venustum* Wight

植物名 短蕊姜花《(药典)附录》  
 药材名 野姜《(药典)附录》  
 功效 根茎:祛风除湿,温中散寒。

## 7290091

*Hedychium villosum* Wall.

植物名 毛姜花《中国植志》  
 地方名 广西:野山姜(那坡);云南:毛花姜。  
 功效 根茎:祛风止咳。

## 7290092

*Hornstedtia hainanensis* T. L. Wu & Senjen

植物名 大豆蔻《中国植志》  
 药材名 大豆蔻《广西药录》  
 地方名 广西:烂头包(防城)。  
 功效 全草:用于水肿,小便不利。

## 7290093

*Hornstedtia tibetica* T. L. Wu et Senjen

植物名 西藏大豆蔻《中国植志》  
 药材名 西藏大豆蔻《迪庆藏药》  
 文献名 门隅豆蔻《迪庆藏药》  
 功效 果:温肾,温胃。用于肾病,肾寒,寒性病,胃病。

## 7290094

*Kaempferia galanga* L.

植物名 山奈《中国植志》  
 药材名 山奈《纲目》、《药典》  
 文献名 三奈子《海上方》,三赖、三奈、山辣《纲目》,三藏《南越笔记》,三奈、舌香、三乃子、山奈《新纲》,沙姜《岭南采药录》  
 地方名 砂姜、砂姜姜(华南);云南:香奈子、土磨香(红河)、“万烘”(西双版纳傣语)。  
 功效 根茎:行气温中,消食,止痛。用于胸膈胀满,脘腹冷痛,饮食不消。

备考 《本草汇精要》虽有“三鞭”之名,但就其所附彩图观之,似非本种。

## 7290095

*Kaempferia galanga* L. var. *latifolia* Dunn --- *K. latifolia* (Dunn) Y. H. Chen

植物名 大叶山柰《中国植志》

地方名 云南:山柰,土麝香。

备考 《药学报》19(7):529,1984 报道:云南部分地区栽培作山柰用,经薄层层析,化学成分与山柰不同。

## 7290096

*Kaempferia marginata* Carey

植物名 苦山柰《药学报》

地方名 云南:苦山柰。

功效 根茎:为“伤湿止痛膏”成分之一

## 7290097

*Kaempferia marginata* Carey f. *alba* Y. H. Chen

植物名 白山柰《药学报》

地方名 云南:山柰,山余。

功效 根茎:云南产地作山柰收购入药。

## 7290098

*Kaempferia rotunda* L.

植物名 海南三七《中国植志》

文献名 圆山柰《云南种录》

地方名 广西:山田七(龙州)。

功效 根茎:有小毒。用于跌打损伤,胃痛,四肢水肿等。

## 7290099

*Plagiostachys austrosinensis* T. L. Wu et Senjen

植物名 偏穗姜《中国植志》

药材名 偏穗姜《广西药录》

地方名 广西:山姜(金秀)。

功效 根茎:用于风湿骨痛,胃脘痛。

## 7290100

*Rhynchanthus beesianus* W. W. Smith

植物名 喙花姜《中国植志》

文献名 滇高良姜《新华本草纲要》

功效 根茎:芳香健胃。

## 7290101

*Roscoeia alpina* Royle

植物名 高山象牙参《西藏植志》

功效 根:温中散寒,止痛消食。

## 7290102

*Roscoeia auriculata* K. Schum. --- *R. purpurea* Smith var. *auriculata* (K. Schum.) Hara

植物名 耳叶象牙参《西藏植志》

功效 根:温中散寒,止痛消食。

## 7290103

*Roscoeia capitata* Smith

植物名 头花象牙参《西藏植志》

功效 根:温中散寒,止痛消食。

## 7290104

*Roscoeia purpurea* Smith

植物名 象牙参《中国植志》

药材名 紫象牙参《西藏植志》

功效 根:温中散寒,止痛消食。

## 7290105

*Roscoeia purpurea* Smith var. *gigantea* Wall. --- *Roscoeia purpurea* Smith var. *procea* Wall. ex Baker

植物名 大象牙参《西藏植志》

功效 根:温中散寒,止痛消食。

## 7290106

*Roscoeia tibetica* Bat. --- *R. intermedia* Gagnep.

植物名 藏象牙参《中国植志》

药材名 象牙参《汇编》

文献名 土中闻《名实图考》

地方名 云南:鸡脚参,鸡脚玉兰。

功效 根:清肺定喘。用于咳嗽,哮喘。

## 7290107

*Roscoeia yunnanensis* Loes.

植物名 滇象牙参《中国植志》

药材名 云南象牙参《云南药录》

文献名 象牙参《云南中草药》

地方名 云南:五兄弟。

功效 根:滋肾润肺。用于虚寒咳嗽,虚性水肿,病后体虚。

## 7290108

*Stahlianthus involucratus* (King ex Bak.) Craib --- *Kaempferia hainanensis* Hayata --- *K. involucratus* King ex Bak. --- *Stahlianthus thorelii* Gagnep.

植物名 姜三七《汇编》

药材名 姜三七《汇编》

文献名 土田七《中国植志》,姜叶三七、姜七、内消子、打不死《中药大辞典》

地方名 广西:三七姜,姜田七,红三七,红沙姜,竹叶三七。

功效 根茎:活血散瘀,消肿止痛。用于跌打损伤,风湿骨痛,吐血衄血,月经过多。外用于虫蛇咬伤,外伤出血。

## 7290109

*Zingiber atrorubens* Gagnep.

植物名 川东姜《中国植志》

药材名 川东姜《广西药录》

功效 根茎:用于风湿,跌打损伤。

## 7290110

*Zingiber cammuner* Roxb.

植物名 野姜《西双版纳傣药志》

地方名 云南:“补累”(傣名)。

功效 根茎:用于积食胀满,肝脾肿大,食滞发呃。

## 7290111

*Zingiber cochleariforme* D. Fang

植物名 匙苞姜《中国植志》

地方名 广西:野姜(田林),野阳荷(乐业、田林)。

功效 根茎:解热。用于风寒感冒,小儿惊风。外

用于风湿骨痛。

#### 7290112

*Zingiber corallinum* Hance

植物名 珊瑚姜《中国植志》

药材名 珊瑚姜《广西药录》

地方名 海南：红山姜；广西：臭姜（那坡），野姜（龙州）。

功效 根茎：消肿，解毒。用于传染性肝炎，风湿骨痛。外用于骨折。

#### 7290113

*Zingiber emeiense* Z. Y. Zhu

植物名 峨眉姜《云南植物研究》

地方名 四川：地莲花（峨眉）。

功效 果序：补血，养心，止咳，镇静。用于心劳，心跳，咳嗽，安神等。

#### 7290114

*Zingiber letorrhizum* D. Fang

植物名 细根姜《广西药录》

地方名 广西：软姜（贺县）。

功效 全草：驱风，行气。

#### 7290115

*Zingiber lingyunense* D. Fang

植物名 乌姜《中国植志》

药材名 乌姜《广西药录》

功效 根茎：用于风湿骨痛。

#### 7290116

*Zingiber mioga* (Thunb.) Rosc.

植物名 藎荷《中国植志》

药材名 藎荷《图经》、《汇编》

文献名 嘉草《周礼》，猗且《史记》，藎菹《说文》，芋渠《后汉书》，藎草《别录》，地藕《太仓州志》，藎荷子《纲目》，茗荷（小泉《药植》），日本姜（徐：《生药》）

地方名 土里开花（浙江、安徽、江西），羊藎姜（陕西、安徽），阳荷（四川、贵州），阳藎（广西、四川），野生姜（浙江、安徽、江西），野姜（浙江、江西、广西）；浙江：山姜，山麻雀、观音花（杭州），野老姜（长兴），莲花姜（临安）；安徽：棉花姜；江西：小良姜（景德镇），土里谢（占水）；四川：洋荷（峨眉山）；湖北：洋藎（神农架）；其他：九叶芸香，韭叶芸香。

功效 根茎：温中理气，祛风止痛，止咳平喘。用于感冒咳嗽，气管炎，哮喘，风寒牙痛，脘腹冷痛，跌打损伤，腰腿痛，遗尿，月经错后、经闭，白带。外用于皮肤风疹，淋巴结结核；花穗：用于咳嗽，小儿百日咳；叶：用于温疟寒热，声嘶邪气；果实：用于胃痛。

#### 7290117

*Zingiber nudicarpum* D. Fang

植物名 光果姜《广西药录》

地方名 广西：野姜（龙州）。

功效 根茎：用于风湿痹痛。

#### 7290118

*Zingiber officinale* Rosc.

植物名 姜《吕氏春秋》、《中国植志》

药材名 生姜、干姜《本经》、《药典》

文献名 姜皮《图经》，生姜皮《食疗本草》，白姜、均姜、干生姜、姜叶《纲目》，川姜、姜露、生姜曲《纲目拾遗》，姜根、勾枚指、因地辛、炎凉小子《新纲》，百辣云《和汉药物学》

地方名 老姜（江苏、浙江、四川），鲜姜（山东、江苏）；江苏：生姜衣；浙江：台干姜、台均姜、白干姜（台州），姜衣；广西：辣姜（北海），火姜，大肉姜；四川：“甲尔尔”（藏名），都姜（川西），筠姜（川南）；云南：“布雷”（傣语）；西藏：“嘎假”（藏名）。

功效 干燥根茎（干姜）：温中散寒，回阳通脉，燥湿消痰。用于脘腹冷痛，呕吐泻泄，肢冷脉微，痰饮喘咳；根茎烫制品（炮姜）：温中散寒，温经止血。用于脾胃虚寒，腹痛吐泻，吐衄崩漏，阳虚失血；新鲜根茎（生姜）：解表散寒，温中止呕，化痰止咳。用于风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽；根茎外皮（姜皮）：行水消肿。用于水肿；鲜根茎的蒸馏液（姜露）：辟寒，驱瘴，消食化痰。

备考 《常用中药名辨》称：“均姜”也有指姜科植物郁金的根茎，只四川等少数地区代作“干姜”入药。

#### 7290119

*Zingiber roseum* (Roxb.) Rosc.

植物名 红冠姜《中国植志》

药材名 红冠姜《广西药录》

地方名 广西：野阳荷（乐业）。

功效 根茎：用于胃痛；叶：外用于胎动不安。

#### 7290120

*Zingiber striolatum* Diels

植物名 阳荷《中国植志》

文献名 阴藎《名实图考》，野狼猴草《植物名汇》，野姜《中国植志》

地方名 云南：野良姜。

功效 根茎：温中理气，祛风止痛，止咳平喘；花穗：止咳；叶：用于温疟寒热，酸嘶邪气；果实：用于胃痛。

#### 7290121

*Zingiber tuanjuan* Z. Y. Zhu

植物名 团聚姜《云南植物研究》

地方名 四川：艳荷苞（峨眉）。

功效 花序：用于咳嗽。

#### 7290122

*Zingiber zerumbet* (L.) Smith

植物名 红球姜《中国植志》

药材名 红球姜《广西药录》

文献名 球姜油《中国经植志》，球姜《广西植录》

地方名 江西：球子姜；广西：山姜，风姜（容县）。

功效 根茎：祛风解毒，助消化。用于脘腹胀满，消化不良，腹泻，跌打肿痛。

### 7291 美人蕉科 Cannaceae

#### 7291001

*Canna edulis* Ker

植物名 蕉芋《中国植志》

药材名 蕉芋《贵州药录》

文献名 芭蕉芋《广西药园药录》

地方名 蕉藕、藕芋(浙江、安徽、福建);广东:姜芋;其他:伪天麻。

功效 根茎、花:清热润燥,止血利湿;根茎:用于血崩,带下,黄疸肝炎;花:用于心烦失眠,刀伤出血。

#### 7291002

*Canna flaccida* Salisb.

植物名 柔瓣美人蕉《中国植志》

文献名 黄花美人蕉《广西药园药录》

功效 根茎:清热利湿。用于急性黄疸型肝炎,久痢,胃痛,子宫脱垂;花:用于外伤出血。

#### 7291003

*Canna generalis* Bailey

植物名 大花美人蕉《中国植志》

药材名 大花美人蕉《浙江药植志》

地方名 上海:美人蕉

功效 根茎、花:清热利湿。用于急性黄疸型肝炎,子宫出血,白带过多。外用于疮疡肿毒,外伤出血。

#### 7291004

*Canna indica* L. --- *C. chinensis* Willd.

植物名 美人蕉《枫窗小牋》、《中国植志》

药材名 美人蕉《汇编》

文献名 兰蕉《家圃六书》,水蕉《生草药性备要》,莲蕉《台湾府志》,晏花《药圃回春》,红蕉、白芭蕉《中药大辞典》

地方名 凤尾花(四川、云南),破血红(江西、湖南),小芭蕉、山姜、水芭蕉、水蕉花、莲招花、黄水蕉、麒麟花(华南);福建:稗叶;台湾:虎头蕉;湖南:土羊鬃(常德),洋芭蕉;海南:假蕉;广西:观音姜,红花蕉;四川:白状元红、状元红(峨眉山),小芭蕉头;贵州:红玉簪花;云南:五筋草,吹天子,“戈络短马”(傣语)。

功效 根状茎和花:清热利湿,安神降压。用于黄疸型急性肝炎,神经官能症,高血压病,红崩,白带。外用于跌打损伤,疮疡肿毒;花:止血。用于金疮及其他外伤出血。

#### 7291005

*Canna orchoides* Bailey

植物名 兰花美人蕉《中国植志》

药材名 兰花美人蕉《广西药园药录》

文献名 黄花美人蕉《华北经济志要》

功效 根茎:清热利湿。用于急性黄疸型肝炎,久痢,胃痛,子宫脱垂;花:用于外伤出血。

#### 7291006

*Canna patens* Rosc.

植物名 和兰昙华《峨眉药植研究》

地方名 四川:小芭蕉头、白状元(峨眉山)。

功效 根状茎:健脾益气,补肾,解毒,止带。

#### 7291007

*Canna warscewiczii* A. Dietr.

植物名 紫叶美人蕉《中国植志》

文献名 绯红美人蕉《峨眉药植研究》

地方名 湖南:“乌七舍”(瑶名);四川:状元红、红状元(峨眉山)。

功效 根茎:消积健脾,行瘀,活血。用于红崩,跌打损伤。

### 7292 竹芋科 Marantaceae

#### 7292001

*Donax canniiformis* (Forst.) K. Schum.

植物名 竹叶蕉《中国植志》

药材名 竹叶蕉《汇编》

地方名 云南:“戈燕”(傣语)。

功效 块根或茎:清热解毒,止咳定喘,消炎杀菌。用于肺结核,气管炎,支气管炎,哮喘,高热,小儿麻疹合并肺炎,感冒,发热,各种皮肤病。

#### 7292002

*Maranta arundinacea* L.

植物名 竹芋《中国植志》

药材名 竹芋《广西药录》

文献名 林蕉、葛郁金《中国植物图鉴》

地方名 广西:山百合,结粉。

功效 块茎:清肺,利尿。用于肺热咳嗽,小便赤痛。

#### 7292003

*Maranta bicolor* Ker.

植物名 花叶竹芋《中国植志》

药材名 花叶竹芋《汇编》

文献名 竹芋《中国植物图鉴》

功效 根状茎:有小毒。清热消肿。

#### 7292004

*Phrynium capitatum* Willd.

植物名 柃叶《南越笔记》、《中国植志》

药材名 棕粑叶《汇编》

文献名 柃叶《南方草木状》

地方名 广西:棕叶。

功效 全草:清热解毒,凉血止血,利尿。用于感冒高热,痢疾,吐血,衄血,血崩,口腔溃烂,酒醉;叶:用于小便不利,音哑。

#### 7292005

*Phrynium placenterium* (Lour.) Merr.

植物名 尖苞柃叶《中国植志》

药材名 尖苞柃叶《贵州药录》

文献名 小花柃叶《科属词典》

功效 根:清热利尿。用于口腔溃烂,小便不利。

### 7293 百合科 Liliaceae

#### 7293001

*Alettris glabra* Bur. et Franch. --- *A. formosana* (Hayata)

Makino et Nemoto

植物名 无毛粉条儿菜《中国植志》

药材名 无毛肺筋草(拟)

文献名 光肺筋草《陕西中草药》,台湾肺筋草《中草



药)

地方名 陕西:小肺筋;湖北:蛆儿草、发汗草(神农架)。

功效 全草、根:润肺止咳,调经,杀虫。用于咳嗽、咳血,月经不调,小儿蛔虫,风火牙痛,流行性腮腺炎。

#### 7293002

*Aletris pauciflora* (Klotz.) Franch. var.  *khasiana* (Hook. f.) Wang et Tang --- *A. lanuginosa* Bur. et Franch.

植物名 穗花粉条儿菜《中国植志》

药材名 百味参《滇南本草》、《汇编》

文献名 虎须草《滇南本草》,绵毛脉筋草(《滇南本草》整理本),白花痢疾草《玉龙山药植》

地方名 云南:鹿子草,盗汗草,鹿吃草,小棕皮,夏生草,母复生,偏竹参,扁竹兰、一柱香(昆明)。

功效 全草:补虚敛汗,止血。用于体虚多汗,神经衰弱,肺结核咯血,盗汗。

#### 7293003

*Aletris scopulorum* Dunn

植物名 短柄粉条儿菜《中国植志》

药材名 短柄粉条儿菜《广西药录》

地方名 浙江:铁卵子。

功效 根:消肿解毒。

#### 7293004

*Aletris spicata* (Thunb.) Franch.

植物名 粉条儿菜《中国植志》

药材名 粉条儿菜《救荒本草》、《汇编》

文献名 肺筋草《救荒本草》,小肺金草《草木便方》,土靛麦《分类草药性》,千粒老鼠屎《中草药学》

地方名 蛆儿草(安徽、四川),一窝蛆(安徽、湖北、四川),金线吊白米(浙江、安徽、河南、湖北、湖南),〔瞿麦〕(甘肃、贵州),山韭菜(四川、云南);陕西:蛆芽草,银针草,青龙胆(平利),青龙须;浙江:鼠牙草(临安),野韭菜(兰溪);安徽:疔疮草;江西:无灯草;福建:谷穗草;河南:麦花草,饥子草;湖北:蛆根草,狮子草(神农架);湖南:蛆子草(衡阳),蛆婆草,肺风草,肺痢草,蛆叶(新宁),麻里草(酃县),曲折草、四季花(桑植),肺经草,金线吊玉米(花垣),牙虫草(新邵);广西:蛆虫草,阴花,甘虫;四川:肺癆草,小肺筋草,一柱香(峨眉山),毬子草,护心草(成都),小味草,光棍草(峨眉);贵州:化食草(黔阳),瞿麦草;云南:鸡心草、驱蛔草(红河),百味参、〔韭菜麦冬〕(昆明),绿翠草(曲靖);其他:羊胡子草。

功效 全草:润肺止咳,养心安神,消积驱蛔。用于支气管炎,百日咳,神经官能症,小儿疳积,蛔虫症,腮腺炎。

#### 7293005

*Aletris stenoloba* Franch.

植物名 狭瓣粉条儿菜《中国植志》

药材名 粉条儿菜(四川)

文献名 多瓣粉条儿菜《四川中药志》,狭叶粉条儿

菜《云南种录》

地方名 湖北:肺经草、一窝蛆(神农架)。

功效 全草:润肺止咳,养心安神,消积驱蛔。

#### 7293006

*Allium anisopodium* Ledeb.

植物名 矮韭《中国植志》

药材名 矮韭《北京植志》

功效 鳞茎:抗菌消炎。

#### 7293007

*Allium anisopodium* Ledeb. var.  *zimmermannianum* (Gilg) Wang et Tang --- *A. zimmermannianum* Gilg

植物名 糙荳韭《中国植志》

药材名 糙荳韭《北京植志》

功效 鳞茎:抗菌消炎。

#### 7293008

*Allium ascalonicum* L.

植物名 火葱《中国植志》

药材名 香葱《汇编》

文献名 绵葱《本草正义》,细香葱、四季葱《汇编》,分葱、科葱《中国蔬菜》

地方名 四川:葱花耳。

功效 鳞茎或全草:发汗解表,通阳,利尿;葱汁:散瘀,解毒,驱虫;葱实:温肾,明目,宣肺散寒,和胃解毒。

#### 7293009

*Allium bidentatum* Fisch. ex Prokh. --- *A. salsum* Skv. et Bar.

植物名 砂韭《中国植志》

药材名 砂韭《北京植志》

功效 鳞茎:发汗,散寒。

#### 7293010

*Allium bulleyanum* Diels --- *A. wallichii* Kunth

植物名 山韭菜《云南种录》

文献名 黑花野韭《云南药录》

功效 全草:散瘀止痛。用于跌打损伤,刀、枪伤。

#### 7293011

*Allium bulleyanum* Diels var.  *tchongchanense* (Levl.) Airy-Shaw

植物名 苍山野韭《云南种录》

药材名 黑花韭《汇编》

文献名 山韭菜、长生草、不死草、野韭菜、野麦冬、书带草《滇南本草》,长山草《名实图考》,苍山黑花野韭《云南药录》

地方名 云南:山韭,野薤白(红河),黑花野韭。

功效 全草:散瘀止痛,拔异物,止痒。用于跌打损伤,刀枪伤,异物入肉,漆疮,荨麻疹,疟疾,牛皮癣。

#### 7293012

*Allium caeruleum* Pall.

植物名 棱叶韭《中国植志》

药材名 蓝花山蒜《汇编》

文献名 天蓝小根蒜《中药大辞典》

地方名 新疆:新疆薤白。

功效 鳞茎:理气,宽胸。用于胸痛,胸闷,咳嗽,痢疾。

## 7293013

*Allium cepa* L.

植物名 洋葱《中国植志》

药材名 洋葱头(北京)

文献名 葫葱《孙真人食忌》,胡葱《唐本草》,回回葱《饮膳正要》,蒜葱《纲目》,玉葱《植物学大辞典》,浑提葱《云南种录》

地方名 北京:葱头;广西:球葱;其他:洋葱锤。

功效 鲜茎:散寒理气,解毒杀虫。外用用于创伤,溃疡,阴道滴虫病,便秘。

## 7293014

*Allium chinense* G. Don --- *A. bakeri* Regel

植物名 菹头《中国植志》

药材名 菹头《纲目》、《广西药录》

文献名 薤《本经》,薤韭、石韭《救荒本草》,芥葱、菹子、菹子、火葱、鸿苍《纲目》,野薤《种称》,华薤白《中草药学》,九白头《药材学》,也白头、南薤白《常用中药名辨》

地方名 薤白(东北、江苏、广东),薤白头(河北、江苏),野葱(陕西、甘肃、宁夏、上海),芥头、芥菜(广东、广西),野蒜(江苏、福建、云南),小蒜头(江苏、安徽);江苏:野大蒜,野大蒜头、小独蒜、野白头(苏州),韭里蒜,苦蒜,小蒜、熟也白头(无锡);安徽:野小蒜,贼蒜,小白头,小鬼头;福建:芦菹(泉州);台湾:久白;湖南:胡葱(长沙),野葱;广东:芥子,酸芥头;广西:野薤白(平南);贵州:苦薤,团葱;云南:小毒蒜,野菹头;其他:扣子草,独蒜,野菹头子。

功效 鳞茎:温中通阳,行气散结。用于胸腹胀满刺痛,肋间神经痛,慢性胃炎,湿滞泻痢,心绞痛,毒蛇咬伤;全草:用于跌打损伤,疮疖。

## 7293015

*Allium chrysanthum* Regel

植物名 黄花韭《高植图鉴》

药材名 黄花韭《神农架药录》

文献名 野葱《中国植志》

地方名 湖北:天葱、野韭菜(神农架)。

功效 全草:发汗,通阳,健胃。

## 7293016

*Allium cyaneum* Regel

植物名 天蓝韭《中国植志》

药材名 蓝花葱《汇编》

文献名 白狼葱《高植图鉴》

地方名 青海:野葱;湖北:野韭菜(神农架)。

功效 全草:发散风寒,通阳,健胃。用于风寒腹痛,肢冷脉微,跌打损伤。

## 7293017

*Allium fistulosum* L.

植物名 葱《本经》、《中国植志》

药材名 葱实《本经》,葱汁、葱白《别录》,葱须《食疗本草》,葱花《图经》、《中药大辞典》

文献名 葱根《别录》,葱苳《本草经集注》,葱涕《千金·食治》,空亭液《石药尔雅》,葱涎《百一选方》,葱了《日华子本草》,胡葱《图经》,葱茎白、葱、葱白、葱胎、汉葱、木葱《纲目》,葱白头《药品化义》,和事草《清异录》,葱油《现代实用中药》

地方名 大葱(青海、江苏、四川);贵州:葱头。

功效 鳞茎或全草:发汗解表,通阳,利尿。用于感冒头痛,鼻塞。外用用于小便不利,痈疽肿毒;叶:祛风发汗,解毒消肿。用于感冒风寒,头痛鼻塞,身热无汗,中风,面目浮肿,疮疡肿毒,跌打创伤;葱汁:散瘀,解毒,驱虫。用于头痛,衄血,尿血,虫积,痈肿,跌打损伤;葱花:用于脾心痛,痛则腹胀如锥刀刺者;葱实:温肾,明目。用于阳痿,目眩。

## 7293018

*Allium funkiaefolium* Hand. -Mazz.

植物名 玉簪叶韭《中国植志》

药材名 鹿耳韭《汇编》

文献名 天韭《陕西中草药》,天蒜《汇编》,玉簪叶葱葱《新华本草纲要》

功效 全草:散瘀止痛,祛风止血。用于跌打损伤,瘀血肿痛,衄血,漆疮。

## 7293019

*Allium hookeri* Thwaites --- *A. tsoobgii* Wang et Tang

植物名 宽叶韭《中国植志》

药材名 宽叶韭《峨眉药植研究》

地方名 四川:韭菜(峨眉山)。

功效 全草:活血通经,祛瘀消肿,止痛。

## 7293020

*Allium longistylum* Baker --- *A. hopeiense* Nakai

植物名 长柱韭《中国植志》

药材名 长柱韭《北京植志》

功效 鳞茎:抗菌消炎。

## 7293021

*Allium macrostemon* Bunge --- *A. grayi* Regel --- *A. nipponicum* Franch. et Sav. --- *A. macrostemon* var. *uratense* (Franch.) Airy-Shaw

植物名 小根蒜《汇编》

药材名 薤白《图经》、《药典》

文献名 菹《尔雅》,薤《本经》,菜芝《别录》,薤根《肘后方》,泽蒜、山蒜《本草拾遗》,野薤、天薤《王桢农书》,小蒜《救荒本草》,菹子、泽韭《纲目》,样谷菜《铁岭县志》,小独蒜《形性鉴别》,薤白头、大薤白《药材学》,密花小根蒜《汇编》,也白头、南薤白《常用中药名辨》

地方名 小根菜(东北),子根蒜(东北、山东),野蒜(河北、陕西、甘肃、青海);辽宁:(石蒜);北京:小野蒜;河北:宅蒜,山择蒜,薤子;内蒙古:“陶克达苏”(蒙名);甘肃:野小蒜,夕白;新疆:大头菜子;山东:鲜也白(章丘、荣成),山韭菜(海阳),山泽仁;上海:野地葱,地葱,野葱头,野大蒜,鬼蒜,鬼大蒜,小蒜头;浙江:野白头;湖北:野韭菜,酒母子(神农架);广西:大菹葱;四川:圆菹头、圆叫头(蓬溪),苦薤,苦菹,野薤子(峨眉山);贵州:苦蒜果,野葱果,野蒜果,苦蒜;其他:野薤。

功效 鳞茎:通阳散结,行气导滞。用于胸痹疼痛,痰饮咳嗽,泻痢后重。

## 7293022

*Allium mairei* Levl.

植物名 滇韭《中国植志》

地方名 云南:山韭菜(元江),“尼哈姑雌”(元江哈尼语)。

功效 叶:祛风除疹。用于风疹搔痒;籽:温肾壮阳。用于肾虚阳痿。

## 7293023

*Allium neriniflorum* (Herb.) Baker --- *Caloscordum neriniflorum* Herb.

植物名 长梗薤《中国植志》

药材名 长梗薤白《中药大辞典》

文献名 白花长梗韭《沈阳学报》,长梗韭《中国植志》

地方名 河北:薤白。

功效 鳞茎:通阳散结,行气导滞。

## 7293024

*Allium ovalifolium* Hand. - Mazz.

植物名 卵叶韭《中国植志》

药材名 卵叶韭《峨眉药植研究》

文献名 卵叶薤葱《新华本草纲要》

地方名 湖北:天葱、天蒜(神农架);四川:鹿耳韭(峨眉山)。

功效 全草:消肿散瘀,止血,祛风。

## 7293025

*Allium paepalanthoides* Airy-Shaw --- *A. albostellarianum* Wang et Tang

植物名 天蒜《中国植志》

药材名 天蒜《神农架药录》

地方名 湖北:野葱(神农架)。

功效 全草:发表散寒,通阳。

## 7293026

*Allium plurifoliatum* Rendle

植物名 多叶韭《中国植志》

药材名 多叶韭、分韭子《神农架药录》

地方名 湖北:分韭(神农架)。

功效 全草:发表散寒;种子:补肝肾,壮阳固精。

## 7293027

*Allium prattii* C. H. Wright ex Forb. et Hemsl.

植物名 太白韭《中国植志》

文献名 野葱《西藏中草》,太白山葱《云南种录》,野蒜、“谷巴柔巴”(藏名)《青藏药图》

地方名 湖北:岩韭菜(神农架);西藏:日葱。

功效 全草:发汗,散寒,消肿,健胃。用于伤风感冒,头痛发烧,腹部冷痛,消化不良。外用于骨折。

## 7293028

*Allium sativum* L.

植物名 蒜《中国植志》

药材名 大蒜《本草经集注》、《药典》

文献名 胡蒜《崔豹古今注》,葫《别录》,独蒜《普

济方》,独头蒜《补缺肘后方》,青蒜《滇南本草》,小蒜、茆蒜、茆蒜《纲目》,蒜梗《纲目拾遗》

地方名 上海:大蒜头;湖南:茆菜;广东:蒜头;广西:蒜米;四川:“各花”(若尔盖藏名),老蒜杆;云南:蒜苗,“喝荒”(西双版纳傣语)。

功效 鳞茎:抗菌消炎。用于防治感冒,菌痢,肠炎,阿米巴痢疾,痢疮疮疡,霉菌感染;花茎:用于疮肿凝毒;叶:醒脾气,消谷食。

## 7293029

*Allium schoenoprasum* L.

植物名 北葱《中国植志》

功效 全草或鳞茎:通气发汗,除寒解表。用于风寒感冒头痛。外用于敷寒湿,红肿,痛风疮疡。

## 7293030

*Allium senescens* L.

植物名 山韭《中国植志》

药材名 山韭《北京植志》

功效 鳞茎:抗菌消炎。

## 7293031

*Allium tenuissimum* L.

植物名 细叶韭《中国植志》

药材名 细叶韭《北京植志》

文献名 细丝韭《高植图鉴》

功效 鳞茎:抗菌消炎。

## 7293032

*Allium thunbergii* G. Don --- *A. sacculiferum* Maxim. ---

*A. japonicum* Regel

植物名 球序韭《中国植志》

药材名 山韭《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 藿《尔雅》,藿菜《寿亲养老新书》

功效 全草:宜肾,主大小便数,去烦热。用于老人脾胃气弱,饮食不多,羸乏。

## 7293033

*Allium tuberosum* Rottl. ex Spreng.

植物名 韭《诗经》、《中国植志》

药材名 韭菜子《滇南本草》、《药典》

文献名 丰本《礼记》,韭子《本草经集注》,草钟乳《本草拾遗》,起阳草(侯宁极《药谱》),懒人草《尔雅翼》,长生韭《王桢农书》,韭菜《滇南本草》,韭黄、韭根《纲目》,壮阳草《本草述》,韭菜仁《岭南采药录》,个人菜《新纲》

地方名 扁菜(广东、广西);江苏:野韭菜(新海连),野韭;广东:韭菜根;四川:细韭菜(峨眉山);云南:“慈阿白”(楚雄彝名),小韭菜;其他:臭菜。

功效 种子:湿补肝肾,壮阳固精。用于阳痿遗精,腰膝酸痛,遗尿尿频,白浊带下;全草:健胃,提神,止汗固涩。用于噎膈反胃,自汗盗汗。外用于跌打损伤,瘀血肿痛,外伤出血;根:温中,行气,散瘀。用于胸痹,食积腹胀,赤白带下,吐血,衄血,癰疮,跌打损伤。

## 7293034

*Allium victorialis* L.

植物名 薤葱《中国植志》

药材名 苍葱《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 苍山葱《尔雅》，格葱《千金·食治》，山葱《唐本草》，隔葱、鹿耳葱《救荒本草》，苍韭《纲目》，天蒜、崖蒜《植物名汇》，天韭《汇编》

地方名 内蒙古：“哈丽业”（蒙名），鹿耳韭；湖北：岩蒜（神农架）。

功效 鳞茎：除瘴气恶毒；全草：散瘀，止血，镇痛。用于衄血，瘀血，跌打损伤；种子：用于泄精。

#### 7293035

*Allium victorialis* L. var. *platyphyllum* (Hult.) Makino  
--- *A. victorialis* L. ssp. *platyphyllum* Hult. --- *A. latissimum* Prokh.

植物名 东北苍葱（拟）

药材名 苍葱《东北药用植物》

地方名 寒葱、旱葱（黑龙江、吉林）。

功效 全草：止血，散瘀，化痰，镇痛。用于衄血，跌打损伤，瘀血肿痛，气管炎咳嗽，高血压，结膜炎；种子：用于泄精。

备考 国外文献报导，全草用于抗坏血酸缺乏症，高血压，动脉粥样硬化，咳嗽，气管炎，发汗，驱虫，全身强壮剂；叶用于眼部炎症。

7293036 见 7293038a

#### 7293037

*Aloe arborescens* Mill.

植物名 鹿角芦荟《中草药学》

功效 叶汁：用于结核性皮肤溃疡，面部狼疮，支气管喘息等。

备考 原产苏联，我国有栽培。

#### 7293038

*Aloe arborescens* Mill. var. *natalensis* Berg.

植物名 大芦荟《中国植志》

功效 叶汁：泻火，通经，杀虫，解毒。

#### 7293038a

*Aloe aristata* Schult.

植物名 点纹芦荟《广西药录》

地方名 广西：芝麻掌。

功效 全草：凉血化瘀，拔毒止痒。用于咳嗽，尿路感染，便秘，湿疹，痈疮肿毒，烧烫伤。

#### 7293038b

*Aloe barbadensis* Miller. --- *A. vara* L.

植物名 库拉索芦荟《药典》

药材名 芦荟《开宝本草》、《药典》

文献名 卢会《药性论》，诃会《本草拾遗》，象胆、奴会《开宝本草》，劳伟《生草药性备要》，芦荟叶《岭南采药录》，芦荟胶、萝葱《植物名汇》，鬼丹《新纲》，羊角掌、花叶芦荟《科裁》，库拉索芦荟草《药材学》，老芦荟、肝色芦荟《中药大辞典》，翠叶芦荟《中草药学》。

地方名 四川：油葱，铁脚板，玉边兰、金边兰、观音兰（成都）。

功效 叶的液汁浓缩干燥物：清肝热，通便。用于便秘，小儿疳积，惊风。外用于湿癣。

备考 原产非洲，系进口药材，四川各地有栽培。

#### 7293039

*Aloe ferox* Mill.

植物名 好望角芦荟《药典》

药材名 芦荟《开宝本草》、《药典》

文献名 好望角芦荟草《药材学》，新芦荟、透明芦荟《中药大辞典》，青鳄芦荟《中草药学》

功效 叶的液汁浓缩干燥物：清肝热，通便。用于便秘，小儿疳积，惊风。外用于湿癣。

备考 原产非洲，系进口药材。

#### 7293040

*Aloe pernyi* Baker

植物名 索哥德拉芦荟草《药材学》

药材名 芦荟《开宝本草》、《药材学》

文献名 老芦荟、洋芦荟《药材学》

功效 叶汁的干浸膏：作芦荟入药。

7293041 见 7293038b

#### 7293042

*Aloe vera* L. var. *chinensis* (Haw.) Berg. --- *A. chinensis* (Haw.) Baker

植物名 芦荟《中国植志》

药材名 芦荟《开宝本草》、《汇编》

文献名 [海葱]《岭南杂记》，象鼻草《纲目拾遗》，象鼻莲、罗纬草、罗纬花《名实图考》，芦荟叶、芦荟花《岭南采药录》，斑纹芦荟、龙蔑草、蔑草《中药大辞典》，斑叶芦荟《汇编》，华芦荟《华北经植志要》，芦荟根《南方毒植》

地方名 乌七、象胆（广东、广西），油葱（广东、广西、云南）；福建：龙角，番醋；广东：奴会，草芦荟，罗苇，水芳投（潮安）；云南：火炼金丹（红河），“雅郎”（西双版纳傣语），通火丹，逼火丹。

功效 叶或叶的干浸膏：用于肝经实热头晕、头痛、耳鸣、烦躁、便秘，小儿惊痫，疳积；叶：外用于龋齿，疔痈肿毒，烧烫伤，湿癣；花：用于咳血，吐血，尿血。

#### 7293043

*Anemarrhena asphodeloides* Bunge

植物名 知母《中国植志》

药材名 知母《本经》、《药典》

文献名 蜆母、连母、野蓼、地参、水参、水没、货母、蜆母《本经》，茺母《广雅》，提母《吴普本草》，蓼母《玉篇》，女雷、女理、儿草、鹿列、韭逢、儿踵草、东根、水须、沈播《别录》，昌支《唐本草》，老梗、纸母、香母《新纲》，毛知母、知母肉《商品名》《药典》

地方名 肥知母（北京、安徽），京知母（辽宁、北京、河北），蒜辫子草（辽宁、河北），倒根草（黑龙江、辽宁）；吉林：木梳草；辽宁：大芦水（朝阳），刘小脚（昌图），竹连花、兔子油草根（绥中），稻根草；北京：京母，光知母，羊胡子草（京郊）；河北：羊胡子根，妈妈草，羊须子草、大脚板子（张家口）；山西：马马草；内蒙古：老娘娘脚后跟，“洛贡玛”、“莫呼里-亚玛”、“莫呼里-莫格杜斯”（乌审旗蒙名），“陶来-音-芒给日”（蒙名）；甘肃：老婆婆脚后跟，老娘娘板根；山东：山韭菜（莒南），穿地龙（招远）；四川：淮知母（成都）。

**功效** 根茎:清热泻火,生津润燥。用于外感热病,高热烦渴,肺热燥咳,骨蒸潮热,内热消渴,肠燥便秘。

## 7293044

*Asparagus acicularis* Wang et S. C. Chen

植物名 山文竹《中国植志》

药材名 山文竹《广西药录》

地方名 湖南:刺百部,〔百部〕,老龙根。

**功效** 根:润肺止咳。用于咳嗽。

## 7293045

*Asparagus brachyphyllus* Turcz. --- *A. trichophyllus*

Bunge var. *trachyphyllus* Kunth

植物名 攀援天门冬《中国植志》

药材名 抓地龙《新乡中草》

文献名 海滨天门冬《东检》,短叶石刀柏《秦岭植志》,山文竹《中草药学》,糙叶天冬、毛叶天冬、霸王王《沙漠药植》,“聂象”《藏名》《青藏药图》

地方名 甘肃:寄马桩;宁夏:短叶天门冬(六盘山);河南:糙叶石刀柏,〔天门冬〕(新乡);广西:小百部。

**功效** 根:滋补,抗老,祛风除湿。用于瘡痒性,渗出性皮肤病,各种疮疖红肿,风湿性腰腿痛,局部性浮肿。

## 7293046

*Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr. --- *A. lucidus* Lindl.

植物名 天门冬《中国植志》

药材名 天门冬《本经》、《药典》

文献名 天簋冬、髦《尔雅》,颠勒《本经》,大当门根《石药尔雅》,万岁藤、婆罗树《救荒本草》,天棘、门冬、颠棘、筵门冬、萱松、无不愈《纲目》,天冬《药品化义》,洗草、满冬、地门冬《花镜》,白罗杉《名实图考》,天门冬草《植物名汇》,金华、商棘、墙藤、天文冬《新编》

地方名 明天冬(山西、山东、广西、四川、贵州),小叶青(江西、福建),干条蜈蚣、赶条蛇、狮子草(安徽、江西);甘肃:土百部(文县);山东:吊竹;浙江:碎叶门冬(临安),山萝卜;江西:飞天蜈蚣(德兴),老条蛇;福建:天门、山安慈(厦门),乳薯、破布肮脏槐,山薯(泉州);湖北:百罗酒;湖南:儿多母苦,三百棒、千家萝卜(黔阳),九子十弟,小三百棒,十爹崽,七姊妹;广东:石薯子(翁源),〔土人參〕(南雄),山杉(佛冈),山北簋(连山);海南:丝冬;广西:多仔婆,寸金,多母母,十姐妹;四川:明冬,倪铃,九十九条根,刺萝卜;贵州:多儿母;云南:十二弟兄(文山);其他:八百崽。

**功效** 块根:养阴生津,润肺清心。用于肺燥干咳,虚劳咳嗽,津伤口渴,心烦失眠,内热消渴,肠燥便秘,白喉。

## 7293047

*Asparagus dauricus* Fisch. ex Link --- *A. gibbus* Bunge

植物名 兴安天冬《沙漠植志》

**功效** 果实:用于心脏病。

## 7293048

*Asparagus filicinus* Ham. ex D. Don

植物名 羊齿天门冬《中国植志》

药材名 羊齿天冬《汇编》

文献名 峡州百部《大观本草》,〔百部〕《滇南本草》,蕨叶天门冬《陕西中草药》

地方名 〔天门冬〕(湖南、四川、云南),〔天冬〕(四川、贵州、云南);陕西:〔千年老鼠屎〕(太白);宁夏:〔麦冬〕(泾源);江西:假天冬,〔飞天蜈蚣〕,干条蜈蚣赶条蛇;湖南:〔人參〕、铁松、岩鸡(黔阳),〔七姊妹〕;广西:九斤子,山天冬;四川:千锤打,上寸冬,干朵莲,上白部;云南:滇百部,小百部,滇天冬,“儿龙乃”(西双版纳傣语),月牙一枝蒿,儿多母苦,一窝鸡(中通),一窝羊,一窝蛆,小天冬,山百部(昆明);其他:广麦冬,九重根。

**功效** 块根:润肺止咳 用于肺结核久咳,肺脓疡,百日咳,咯痰带血,支气管哮喘;枝、叶:功效同块根并胜于其根。

## 7293049

*Asparagus gobicus* Ivan. ex Grubov

植物名 戈壁天门冬《中国植志》

药材名 寄马桩《宁夏中草》

地方名 内蒙古:“赫勒尼·努得”(蒙名);甘肃:戈壁天冬;宁夏:鸡麻抓。

**功效** 带根全草:祛风,杀虫,止痒。外用于神经性皮炎,牛皮癣,疮疖肿疔。

## 7293050

*Asparagus kansuensis* Wang et Tang

植物名 甘肃天门冬《中国植志》

**功效** 块根:养阴生津,润肺清心。

## 7293051

*Asparagus longiflorus* Franch.

植物名 长花龙须菜《中国植志》

地方名 〔白前〕(山西、河南);河南:白马鬃。

备考 山西、河南个别地区以根误作白前使用。

## 7293052

*Asparagus lycopodiineus* Wall. ex Baker --- *A. filicinus* var. *brevipes* Baker

植物名 短梗天门冬《中国植志》

药材名 一窝鸡《汇编》

文献名 羊齿天门冬《鉴别手册》,羊齿天冬《高原中草》

地方名 山百部(湖南、四川、云南);宁夏:〔麦冬〕(泾源等);广西:十姐妹、黑门冬(凤山);四川:土百部,乌小天冬,乌麦冬,〔三百棒〕(峨眉山);云南:石松状天门冬,山扫帚,月牙一枝蒿,小百部,山漏芦(昆明);其他:小天冬,铁扫把,滇百部。

**功效** 块根:止咳化痰,平喘。用于咳嗽、痰多气逆,小儿疳积,疥癣。

## 7293053

*Asparagus mairei* Levl.

植物名 昆明天门冬《中国植志》

备考 云南昆明地区群众混称此种为百部。

## 7293054

*Asparagus meiolados* Levl.

植物名 密齿天门冬《中国植志》

药材名 小天冬《汇编》

文献名 天门冬、地龙松、天冬草、天冬《滇南本草》，土百部《中药大辞典》

地方名 云南：门冬，连枝草，小茎叶天冬，〔百部〕（腾冲）。

功效 块根；滋阴，润肺，止咳。用于肺癆久咳，潮热咯血，支气管炎，水肿，疝气，催乳。

备考 《滇南本草》称“其枝叶之功，胜于其根十倍”。

#### 7293055

*Asparagus myriacanthus* Wang et S. C. Chen --- *A. spinosissimus* Wang et S. C. Chen

植物名 多刺天门冬《中国植志》

地方名 西藏：天冬。

功效 块根；养阴润燥，清肺生津。

#### 7293056

*Asparagus officinalis* L. --- *A. officinalis* L. var. *altilis* L.

植物名 石刁柏《中国植志》

药材名 芦笋（通称）

文献名 龙须菜《植称补编》，肥厚石刁柏《品种论述》

地方名 露笋（广东、广西），〔白前〕（华中），小百部（湖南、广西）；河北：〔白薇〕（邢台）；湖北：〔大百部〕，湖北大白部；广西：门冬薯（南宁），山文竹；其他：细叶百部，索罗罗，食用龙须菜。

功效 块根；行气，止痛，活血，散瘀。用于跌打损伤，风湿麻木，筋骨痛，癆伤吐血，经闭，癰肿，腹胀；嫩笋：抗癌。

#### 7293057

*Asparagus oligoclonos* Maxim.

植物名 南玉带《中国植志》

文献名 南龙须菜《药学报》

地方名 辽宁：〔白前〕，〔白薇〕（旅大）。

备考 有的地区以此当白前，旅大以此当白薇。

#### 7293058

*Asparagus pseudofilicinus* Wang et Tang

植物名 小天门冬《药典》

药材名 小百部《药典》

地方名 云南：天冬、〔白前〕（红河），月牙一枝蒿、小天冬（玉溪），寸冬（保山），〔百部〕（昆明），土百部，丽江百部。

功效 根：滋阴润肺，止咳化痰。用于肺结核咳嗽，产后贫血，跌打损伤，风湿骨痛。

#### 7293059

*Asparagus schoberioides* Kunth

植物名 龙须菜《中国植志》

文献名 雉隐天冬《东检》，耐冬草《种称》，玉带天门冬《长白山植药志》

地方名 河南：〔白前〕（林县），白马鬃。

功效 块根：止血，利尿。

备考 河南林县以其根部误作白前使用。

#### 7293060

*Asparagus setaceus* (Kunth) Jessop --- *A. plumosus* Baker

植物名 文竹《中国植志》

药材名 文竹《福建民间草药》

地方名 福建：蓬莱竹；广西：小百部。

功效 块根“润肺止咳”。用于肺结核咳嗽，急性气管炎，阿米巴痢疾；全草：凉血，解毒，利尿通淋。用于郁热咯血，小便淋沥。

#### 7293061

*Asparagus subscandens* Wang et S. C. Chen

植物名 滇南天门冬《中国植志》

药材名 滇南天冬（拟）

地方名 云南：天门冬，土天冬，小茎叶天冬

功效 块根：滋阴润肺，止咳化痰。

#### 7293062

*Asparagus trichoclados* (Wang et Tang) Wang et S. C. Chen

植物名 细枝天门冬《中国植志》

药材名 细枝天冬（拟）

地方名 云南：儿多母苦，“背当哈嗦嗦麻”（元江哈尼语）。

功效 块根：滋阴养血，润肺止咳。用于久病血虚，体弱无力，肺热咳嗽。

#### 7293063

*Asparagus trichophyllus* Bunge

植物名 曲枝天门冬《中国植志》

药材名 曲枝天冬《汇编》

地方名 甘肃：毛叶石刁柏；其他：毛叶天冬，霸王，抓地龙，糙叶天冬，〔白前〕。

功效 根：祛风除湿。用于风湿性腰腿痛，局部性浮肿。外用于瘙痒性、渗出性皮肤病，各种疮疖红肿。

#### 7293064

*Aspidistra dolichanthera* X. X. Chen

植物名 长药蜘蛛抱蛋《广西药录》

功效 根茎：用于骨折，跌打损伤。

#### 7293065

*Aspidistra elatior* Blume

植物名 蜘蛛抱蛋《名实图考》、《中国植志》

药材名 蜘蛛抱蛋《汇编》

文献名 一叶《琉球国志略》，一帆青《质问本草》，〔飞天蜈蚣〕、哈萨喇《名实图考》

地方名 竹叶盘（四川、贵州），〔九龙盘〕（湖南、贵州），〔蜈蚣草〕（湖南、云南），〔赶山鞭〕（福建、贵州）；福建：上里蜈蚣，狸角叶，单枝白叶；湖南：一寸十八节，九节龙，〔大伸筋〕，牛尾伸筋，龙骨草，甘心蜈蚣，〔竹根七〕，竹叶伸筋（衡山），白蜈蚣七，地蜈蚣，扁担伸筋（长沙），铁马鞭，蓼叶伸筋，摇边竹；广西：山蜈蚣，入地蜈蚣（北流）；四川：大叶兰，叶兰，漂叶，〔棕巴叶〕，〔棕杷叶〕（峨眉山），漂叶伸筋，〔蜘蛛香〕，青蛇莲，贵州：大九龙盘，地雷公；云南：“躲罗姐”（楚雄彝名），〔蛇退草〕。

**功 效** 根茎:活血通络,泄热利尿。用于跌打损伤,腰痛,经闭、腹痛,头痛,牙痛,热咳伤暑,泄泻,砂淋。

**7293066**

*Aspidistra flaviflora* K. Y. Lang et Z. Y. Zhu

植物名 黄花蜘蛛抱蛋《植分学报》

地方名 四川:素梅花(沐川)。

**功 效** 根茎:活血祛瘀,除湿。用于跌打损伤,风湿性关节炎,赤白痢疾,肠炎。

**7293067**

*Aspidistra longipedunculata* D. Fang

植物名 长梗蜘蛛抱蛋《广西药录》

**功 效** 全草:用于风湿痹痛。

**7293068**

*Aspidistra longipetala* S. Z. Huang

植物名 长瓣蜘蛛抱蛋《广西植物》

地方名 广西:入地蜈蚣(武鸣)。

**功 效** 根茎:用于咳嗽。

**7293069**

*Aspidistra lurida* Ker-Gawl. --- *A. musaensis* Hayata

植物名 九龙盘《中国植志》

药材名 九龙盘《汇编》

文献名 穆沙蜘蛛抱蛋《中草药》,褐黄蜘蛛抱蛋《中药大辞典》

地方名 老色莲(西南),蜈蚣草(湖南、四川),〔赶山鞭〕(江西、湖南、贵州),蜘蛛抱蛋(四川、云南);浙江:竹叶根;湖南:地蜈蚣;广西:爬地蜈蚣,俞莲,千年竹;四川:竹叶盘,青蛇莲、蛇莲、〔接骨丹〕(成都),盘龙七、走马、寸八节、地蒙叶(重庆);贵州:小尤龙盘;云南:〔蛇退〕。

**功 效** 根茎:健胃止痛,续骨生肌。用于小儿消化不良,胃及十二指肠溃疡,风湿骨痛,肾虚腰痛,跌打损伤,骨折,刀枪伤。

**7293070**

*Aspidistra minutiflora* Stapf

植物名 小花蜘蛛抱蛋《中国植志》

地方名 广西:〔毛知母〕(武鸣),入石蜈蚣(金秀);贵州:白根。

**功 效** 根茎:化瘀止痛,祛风解毒。用于腰痛,骨折,风湿痛。

**7293071**

*Aspidistra muricata* How ex K. Y. Lang

植物名 糙果蜘蛛抱蛋《广西药录》

**功 效** 根茎:清热,止咳。

**7293072**

*Aspidistra omeiensis* Z. Y. Zhu et J. L. Zhang

植物名 峨眉蜘蛛抱蛋《植分学报》

药材名 峨眉蜘蛛抱蛋《峨眉药植资源》

地方名 四川:〔赶山鞭〕(峨眉山)。

**功 效** 根状茎:活血祛瘀,祛风除湿,化痰消积,解毒。用于跌打损伤,风湿麻木,劳伤咳嗽,顽痰不化,瘰疬等。

**7293073**

*Aspidistra retusa* K. Y. Lang et S. Z. Huang

植物名 广西蜘蛛抱蛋《广西药录》

**功 效** 根茎:用于跌打损伤。

**7293074**

*Aspidistra sichuanensis* K. Y. Lang et Z. Y. Zhu

植物名 四川蜘蛛抱蛋《云南植物研究》

**功 效** 根茎:用于风湿,跌打。

**7293075**

*Aspidistra typica* Baill.

植物名 卵叶蜘蛛抱蛋《中国植志》

文献名 棕巴叶《云南药录》

地方名 云南:蜘蛛抱蛋。

**功 效** 根茎:活血散瘀,接骨,止痛,清热解毒。用于痢疾,疟疾,风湿痹痛,肾虚腰痛,跌打扭伤,骨折,蛇咬伤。

**7293076**

*Aspidistra zongbayi* K. Y. Lang et Z. Y. Zhu

植物名 棕巴叶《植分学报》

药材名 棕巴叶《峨眉药植研究》

地方名 四川:粽子叶(峨眉山)。

**功 效** 根茎:祛风除湿,活血。用于风湿麻木,腰臂作痛。

**7293077**

*Cardiocrinum cathayanum* (Wilson) Stearn --- *Lilium cathayanum* Wils.

植物名 荞麦叶大百合《中国植志》

药材名 水百合《贵州民间药物》

文献名 八仙贺寿草、〔蕤荷〕《名实图考》,中国荞麦叶贝母《拉汉种称》,大叶百合《科种》,荞麦叶贝母《江苏植志》

地方名 浙江:洋兜铃(淳安),土兜铃(临安、宁波),山南芋(临海),山芋芳(临安);江西:洋百合;广西:苦百合,荞麦叶百合;四川:喇叭(峨眉);贵州:八瓣花;其他:广兜铃。

**功 效** 鳞茎:凉血消肿。用于感冒,肺结核,咯血,鼻渊,中耳炎。

**7293078**

*Cardiocrinum giganteum* (Wall.) Makino --- *Cardiocrinum giganteum* (Wall.) Makino var. *yunnanense* (Leichtlin ex Elwes) Stearn --- *Lilium giganteum* var. *yunnanense* Leichtlin ex Elwes --- *Lilium giganteum* Wall.

植物名 大百合《中国植志》

药材名 云南水百合(拟)

文献名 〔蕤荷〕《名实图考》,山丹草《植物名汇》,母猪白《陕甘宁青中草药选》,荞麦叶大百合《西藏本草》,心叶百合、心叶大百合、云南心叶百合《汇编》,云南大百合《云南种录》

地方名 白娃娃、娃娃粉(陕西、湖北),荞麦叶贝母(湖南、四川、云南);陕西:水百合(秦岭、太白),白娃娃(陕南大巴山);湖北:百瓦、百合七(巴东),号杆(利

川),白挖(神农架);湖南:观音莲,百合莲,〔土贝母〕;四川:菠萝头,土兜铃(峨眉);贵州:百合,山丹;云南:啦叭淀粉,〔马兜铃〕、山芋头(玉溪),杜兜铃,云南马兜铃,兜铃子,山菠萝根;西藏:假百合,其他:大叶百合。

功效 鳞茎:清热,润肺止咳,解毒。用于小儿高烧,肺结核咯血,鼻窦炎,中耳炎;种子:清肺,平喘,止咳。用于咳嗽,气喘,肺结核咯血。

## 7293079

*Chionographis chinensis* Krause --- *Siraitos chinensis* (Krause) Wang et Tang

植物名 中国白丝草《中国植志》

药材名 白丝草《广西植录》

地方名 广西:白花菜(灵川)。

功效 全株:消肿止痛。用于烧、烫伤。

## 7293080

*Chlorophytum comosum* (Thunb.) Baker --- *Anthericum comosum* Thunb.

植物名 吊兰《中国植志》

药材名 吊兰《峨眉药植研究》

文献名 催生兰《纲目拾遗》,折鹤兰《中国植物图鉴》,挂兰《福建民间草药》

地方名 福建:匍匐兰;广东:土洋参(惠阳);广西:金边兰(北海),银边吊兰,金边吊兰,银边兰,匍匐兰,钓兰,八叶兰;云南:树蕉瓜,丛毛吊兰。

功效 全草:止咳化痰,消肿解毒,活血接骨。用于气管炎咳嗽痰多,声音嘶哑,痈肿疔疮,痔疮肿痛,骨折,烧伤。

备考 除本种外,有的文献称 *C. capense* (L.) Druce 为吊兰,区别点是后者花葶通常直立,具多分枝的圆锥花序,花序末端不具叶簇或幼小植株。

## 7293081

*Chlorophytum elatum* R.Br. var. *medio-pictum* Hort.

植物名 金心吊兰《广西园林药录》

地方名 广西:斑心宽叶吊兰。

功效 全草:清热止咳,凉血止血。用于热咳,肺结核咯血,咽喉炎。外用于跌打肿痛

## 7293082

*Chlorophytum laxum* R.Br.

植物名 小花吊兰《中国植志》

药材名 小花吊兰《广西药录》

文献名 疏花吊兰《汇编》

地方名 三角草、〔山韭菜〕(广东、广西);广东:〔土麦冬〕(万宁)。

功效 全草:有毒。清热解毒,消肿止痛。用于毒蛇咬伤,跌打肿痛。

## 7293083

*Clintonia udensis* Trautv. et Mey. --- *C. alpine* (Royle) Kunth

植物名 七筋姑《中国植志》

药材名 七筋姑《陕西中草药》

地方名 陕西:雷公七;湖北:竹叶七、剪刀七(神农架);四川:七仙姑;西藏:搜山虎;其他:对口剪。

功效 全株:祛风,败毒,散瘀,止痛。用于跌打损伤,劳伤。

## 7293084

*Convallaria majalis* L. - *C. kiesekei* Miq.

植物名 铃兰《中国植志》

药材名 铃兰《汇编》

文献名 草玉铃《中国植物图鉴》

地方名 藜芦花(黑龙江、吉林、河北),鹿铃草(黑龙江、吉林),小芦荟、香水花、铃铛花(东北、内蒙古);黑龙江:香草(大兴安岭);吉林:“思邦文吉尔”(朝名);辽宁:糜子菜,扫帚糜子,草玉笋,小芦铃;内蒙古:“洪呼烈其其格”(蒙名);陕西:草寸香;山东:秀才塔拉头(五莲);其他:铃铛草,君影草。

功效 带花全草:有毒。强心,利尿。用于充血性心力衰竭,心房纤颤,由于高血压病及肾炎引起的左心衰竭。

## 7293085

*Dianella ensifolia* (L.) DC.

植物名 山菅《中国植志》

药材名 山菅兰《汇编》

文献名 磬磬草《质问本草》,山猫儿《生草药性备要》,桔梗兰《中国植物图鉴》

地方名 浙江:石兰花;江西:兰花草;福建:老鼠砒,土连,家鼠草,毒鼠草,蓝花兰(泉州);广东:交剪草;广西:山交剪,山扁竹,山大箭兰,天蒜,白较剪痕,假射干,家鼠怕,铁沙根,较剪兰,较剪草,较剪痕,较剪王(陆川),蛇干修,剪刀夹;云南:老鼠生,扁竹兰,扁竹根,扁脚兰,野扁竹,野扁竹;其他:山石将,绞剪草。

功效 全草或根茎:有大毒。拔毒消肿。外用于痈疮脓肿,癰淋巴结结核,淋巴结炎,灭鼠,灭蚊蝇。

## 7293086

*Disporopsis aspera* (Hua) Engl. ex Krause

植物名 散斑竹根七《中国植志》

药材名 散斑竹根七《广西药录》

文献名 散斑假万寿竹《高植图鉴》

地方名 湖北:黄金七、黄箭七(神农架);广西:马鞭七(龙胜),〔玉竹〕(全州);四川:大玉竹(峨眉山)。

功效 根茎:养阴润燥,凉血,去毒。

备考 根茎在川西、川北充作玉竹用。

## 7293087

*Disporopsis fuscopicta* Hance

植物名 竹根七《中国植志》

药材名 竹根七《广西药录》

文献名 滇玉竹《名实图考》,石竹子《峨眉药植》,假万寿竹《高植图鉴》

地方名 广西:〔玉竹〕(钟山),〔黄精〕(那坡、东兰),大叶黄精;贵州:阿青果,黄脚鸡,十样错。

功效 根茎:清热润肺,祛痰止咳。用于咳嗽,跌打损伤。

## 7293087a

*Disporopsis jinfushanensis* Z. Y. Liu



植物名 金佛山竹根七《植分学报》

功效 根茎:益气补肾,润肺止咳。

#### 7293088

*Disporopsis longifolia* Craib

植物名 长叶竹根七《中国植志》

药材名 长叶竹根七《广西药录》

文献名 长叶万寿竹《高植图鉴》,长叶假万寿竹《广西本草选编》

地方名 广西:〔黄精〕(龙州、宁明、天等、大新、田阳、靖西);云南:三子果。

功效 根茎:润肺。

备考 在广西龙州、宁明、天等、大新等地误将此种根茎充黄精入药。

#### 7293089

*Disporopsis pernyi* (Hua) Diels --- *D. arisanensis* Hay. ---

*Polygonatum ensifolium* Levl.

植物名 深裂竹根七《中国植志》

药材名 黄脚鸡《贵州草药》

文献名 万根假万寿竹《峨眉药植研究》,竹根假万寿竹《云南种录》,剑叶假万寿竹《广西药录》,竹叶芪《川黔药植》

地方名 大玉竹、竹叶七(西南),〔玉竹〕(广西、贵州);湖南:〔竹节参〕,竹叶三七,黄蜡七,黄三七;贵州:十样错,竹根七;云南:〔黄精〕(西畴、马蹄寨公社)。

功效 根茎:养阴,润肺。用于虚咳多汗,产后虚弱,月经不调。

#### 7293090

*Disporum bodinieri* (Levl. et Vant.) Wang et Tang ---

*Tovaria bodinieri* Levl. et Vant.

植物名 长蕊万寿竹《中国植志》

药材名 竹凌霄《汇编》

地方名 陕西:小伸筋草,石竹根,百尾笋,宝铎草,倒竹散;四川:〔白薇〕。

功效 根:清肺化痰,止咳,健脾消食,舒筋活血。用于肺结核咳嗽,食欲不振,胸腹胀满,筋骨疼痛,腰腿痛。外用于烧烫伤,骨折。

#### 7293091

*Disporum brachystemon* Wang et Tang --- *D. pullum*

Salisb. var. *ovalifolium* Levl.

植物名 短蕊万寿竹《中国植志》

药材名 短蕊万寿竹《贵州药录》

功效 根:清热解暑,补虚止咳。用于病后虚弱,跌打,劳伤无力,无名肿毒。

#### 7293092

*Disporum calcaratum* D. Don

植物名 距花万寿竹《中国植志》

药材名 狗尾巴参《云南药录》

文献名 距花宝铎草《中药大辞典》

地方名 广西:天竹花,竹根七;云南:倒竹散,“文当嗨”(西双版纳傣语),狗尾巴花。

功效 根茎:养阴益气,润肺生津。用于阴虚潮

热,盗汗,肺热咳嗽,腰膝酸软,涕浊白带。

#### 7293093

*Disporum cantoniense* (Lour.) Merr.

植物名 万寿竹《中国植志》

药材名 万寿竹《云南药录》

文献名 竹山七、石竹根草《植物名汇》,竹脊《川黔药植》,万寿草《广西本草选编》,广东万寿竹《中药大辞典》

地方名 竹叶七(西北、云南),〔竹节参〕(贵州、云南),山竹花(甘肃、江西、广西),〔白薇〕、石竹根、竹根七(四川、贵州);陕西:小伸筋草(镇坪),白毛七,白龙须,鸡爪七(太白),鸡爪参,驻猪七;甘肃:草竹叶;江西:一线香(景德镇),大叶胡椒,竹节草(婺源);四川:上玉竹,竹林霄,竹林消(峨眉山),倒竹伞(叙永),慈竹根;贵州:百尾笋,倒牵牛,白味参,铁竹子;云南:小竹根(保山),白子草(曲靖),白根药(文山),玉竹草(玉溪),老虎姜(昭通),竹叶草、竹叶散(昆明、红河),竹节节,倒竹散(红河),迎风不动草、叶上花、龙风自动草(昆明);其他:鸡公七。

功效 根及根茎:清热解毒,舒筋活血。用于高热不退,虚劳骨蒸潮热,风湿痹痛,腰腿疼痛,痛经,月经过多,癰疽疮疖,跌打损伤,骨折。

#### 7293094

*Disporum leschenaultianum* D. Don

植物名 阔叶万寿竹《广西植录》

文献名 阔叶宝铎草《广西药园药录》

功效 根:祛风解毒。用于跌打,疮疖。

#### 7293095

*Disporum megalanthum* Wang et Tang

植物名 大花万寿竹《中国植志》

药材名 大花万寿竹《神农架药录》

地方名 湖北:逍遥竹(神农架)。

功效 根及根茎:祛风胜湿,止痛。

#### 7293096

*Disporum sessile* D. Don --- *D. flavens* Kitag --- *D. ses-*

*sile* D. Don var. *flavens* (Kitag.) Y. C. Tang

植物名 宝铎草《中国植志》

药材名 宝铎草《四川中药志》

文献名 石竹根《草木便方》,竹林消、万花梢《分类草药性》

地方名 竹林霄(甘肃、四川),淡竹花(浙江、湖南),竹叶七(西北),〔白薇〕(四川、贵州);江苏:〔玉竹〕(溧阳、戴埠);浙江:山梗黄(临安);福建:百部叶(泉州);湖北:通竹消、老龙须(神农架);湖南:水瑶边竹,白龙须,竹叶青,淡竹草,筋斗草,摇边竹;广西:遍地姜(龙胜);四川:慈竹根(成都、峨眉),倒毒散、倒竹散(峨眉山);贵州:〔白前〕(贵阳),百尾笋,黄牛尾巴,乌骨鸡,野三七,竹叶三七,牛尾笋;其他:笑子含笑。

功效 根茎及根:润肺止咳,健脾消积,舒筋活血。用于肺结核咳嗽,食欲不振,胸腹胀满,筋骨疼痛,腰腿痛。外用于烧烫伤,骨折。

#### 7293097

*Disporum sessile* D. Don var. *pachyrrhizum* Hand.

Mazz

植物名 粗根宝铎草(拟)

地方名 [太子参]、[孩儿参](湖北、湖南)。

功效 根:润肺止咳。

备考 《中国植志》(15卷)将本品列为 *D. sessile* D. Don 的异名。作者在湖北咸宁采到此植物,根粗壮,在当地伪充太子参用,认为与宝铎草之根细长显然不同,不宜合并,仍以独立为变种为宜。

7293098

*Disporum viridescens* (Maxim.) Nakai

植物名 宝珠草《中国植志》

文献名 绿宝铎草《长白山植药志》

功效 根及根茎:润肺止咳,健脾消积,舒筋活血。

7293099 见 7293087a

7293100

*Diurathera major* Hemsl.

植物名 鹭鸶草《中国植志》

药材名 鹭鸶兰《名实图考》、《汇编》

地方名 四川:土洋参;云南:尼拉(马关),山韭菜。

功效 根:消炎,止血。用于跌打损伤,外伤出血。

7293101

*Diurathera minor* (C. H. Wright) Hemsl.

植物名 小鹭鸶草《中国植志》

药材名 小鹭鸶兰《云南种录》

地方名 云南:大兰花参,山韭菜,天生草,〔小漏芦〕,〔漏芦〕(昆明),白千针万线草,蛇咬药(丽江),野韭菜。

功效 根:清热解毒,健脾利湿。用于风湿病,小儿疳积,乳腺炎,毒蛇咬伤。

7293102

*Erythronium japonicum* Decne.

植物名 猪牙花《中国植志》

文献名 车前叶山慈姑《中国经植志》,母猪牙《中国植志》

地方名 辽宁:山芋头。

功效 鳞茎:缓泻剂及片剂的赋型剂。

7293103 见 7293115a

7293104 见 7293137a

7293105

*Fritillaria anhuiensis* S. C. Chen et S. F. Yin

植物名 安徽贝母《中药通报》

药材名 皖贝《中药通报》

地方名 湖北:大别山贝母(罗田)。

功效 鳞茎:润肺散结,止嗽化痰。

7293106

*Fritillaria anhuiensis* S. C. Chen et S. F. Yin var. *albiflora* S. C. Chen et S. F. Yin

植物名 白花贝母《云南植物研究》

药材名 白花皖贝(拟)

功效 鳞茎:润肺散结,止嗽化痰。

7293107

*Fritillaria cirrhosa* D. Don --- *Fritillaria roylei* auct. non Hook.

植物名 川贝母《中国植志》

药材名 川贝母滇南本草、《药典》

文献名 川贝《纲目拾遗》,黄花贝母《西藏本草》,卷叶贝母《高植图鉴》

地方名 四川:贝母、尖贝母(若尔盖);云南:鸡心贝(丽江、东川),尖贝(东川),小贝。

功效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。用于肺热咳嗽,干咳少痰,阴虚劳嗽,咯痰带血。

备考 1.《中国植志》(1980)载称:本种是药材“川贝”的主要来源之一。《四川中药志》(1960)、《西藏常用中草药》(1973)等著作将本种黄绿花类型定为 *F. roylei* Hook. 是不正确的。2.《本草备要》贝母项下,谓川产开瓣者良,当包括本品在内。

7293108

*Fritillaria cirrhosa* D. Don var. *ecirrhosa* Franch.

植物名 康定贝母《中国植志》

药材名 川贝(四川)

地方名 四川:贝母(康定)。

功效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

7293109

*Fritillaria crassicaulis* S. C. Chen

植物名 粗茎贝母《中国植志》

功效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

7293110

*Fritillaria davidii* Franch.

植物名 米贝母《中国植志》

文献名 土贝母《鉴别手册》

地方名 四川:土知母,米合贝、米百合(宝兴)。

备考 鳞茎:四川彭县解放前后曾误作贝母入药,已纠正。

7293111

*Fritillaria delavayi* Franch.

植物名 梭砂贝母《中药志》

药材名 炉贝《药典》

文献名 梭砂贝《中国经植志》,川贝母《药典》,白炉贝、黄炉贝、虎皮贝《中药志》,梭砂贝母《中国植志》

地方名 川贝(西南),雪山贝(青海、云南);青海:高山贝;四川:德氏贝母,〔知母〕(康定);云南:贝母(德钦);西藏:阿皮卡;其他:知贝。

功效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。用于肺热咳嗽,干咳少痰,阴虚劳嗽,咯痰带血。

7293112

*Fritillaria ebeiensis* G. D. Yu et G. Q. Ji

植物名 鄂北贝母《南药学报》

地方名 湖北:贝母(随县)。

功效 鳞茎:湖北随县已栽培成功,作贝母入药。

7293113

*Fritillaria ebeiensis* G. D. Yu et G. Q. Ji var. *purpurea* G. D. Yu et P. Li

植物名 紫花鄂北贝母《南药学报》

备 考 鳞茎:与鄂北贝母混同收购,作贝母入药。

## 7293114

*Fritillaria ferganensis* A. Los.

植物名 乌恰贝母《中国植志》

药材名 乌恰贝母《新疆药植志》

文献名 新疆贝母《汇编》,天山贝母《高植图鉴》

地方名 新疆:贝母。

功 效 鳞茎:润肺散结,止咳化痰。

备 考 商品常混杂作伊贝母用。

## 7293115

*Fritillaria fusca* Turill

植物名 高山贝母《中国植志》

功 效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

## 7293115a

*Fritillaria gansuensis* S. C. Chen et G. D. Yu

植物名 陇南贝母《南药学报》

地方名 甘肃:川贝。

功 效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

## 7293116

*Fritillaria halabulanica* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 哈拉布拉贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功 效 鳞茎:清肺,化痰,散结。用于肺热咳嗽,胸闷痰粘,癰癤,痈肿。

备 考 据《植分学报》(1987)称:新疆产的贝母干鳞茎,归于伊贝名下,供内销和出口药用。

## 7293117

*Fritillaria heboksarensis* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 和丰贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功 效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293118

*Fritillaria hupehensis* Hsiao et K. C. Hsia

植物名 湖北贝母《中国植志》

药材名 湖北贝母《中草药》

文献名 峡州贝母《图经》

地方名 贝母(湖北、四川);湖北:平贝,板贝,窑贝(恩施)。

功 效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

## 7293119

*Fritillaria karelinii* (Fisch.) Baker --- *Rhinopetalum karelinii* Fisch.

植物名 砂贝母《中国植志》

药材名 滩贝母《新疆药植志》

文献名 伊贝《植分学报》,沙贝母《高植图鉴》

地方名 新疆:贝母,卡斯滩贝母。

功 效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

备 考 鳞茎亦混杂作伊贝母入药

## 7293120

*Fritillaria karelinii* (Fisch.) Baker var. *albiflora* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 白花砂贝母《植分学报》

功 效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293121

*Fritillaria lichuanensis* P. Li et C. P. Yang

植物名 利川贝母《南药学报》

地方名 湖北:野贝母(恩施)。

功 效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

备 考 有时鳞茎混同湖北贝母出售。

## 7293122

*Fritillaria maximowiczii* Freyn

植物名 轮叶贝母《中国植志》

文献名 一轮贝母《汇编》,北贝《中药大辞典》

地方名 [贝母](黑龙江、河北、内蒙古),土贝母(东北);广西:线叶贝母(兴安)。

备 考 鳞茎:东北、华北地区常以此混充川贝母。本品质量低劣,不能代川贝使用。

## 7293123

*Fritillaria meleagris* L.

植物名 阿尔泰贝母《中国植志》

药材名 阿尔泰贝母《新疆药植志》

文献名 贝母《新疆药植志》

功 效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293124

*Fritillaria meleagroides* Patr. ex Schult. f.

植物名 额敏贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功 效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293125

*Fritillaria meleagroides* Patr. ex Schult. f. var. *flavovirens* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 黄绿花贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功 效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293126

*Fritillaria meleagroides* Patr. ex Schultes var. *plena* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 重瓣额敏贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功 效 鳞茎:清肺,化痰,散结。用于肺热咳嗽,胸闷痰粘,癰癤,痈肿。

## 7293127

*Fritillaria meleagroides* Patr. ex Schultes var. *rhodantha* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 红花额敏贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功 效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293128

*Fritillaria monantha* Migo

植物名 天目贝母《中国植志》

药材名 彭泽贝母(江西)

地方名 江西:贝母。

功 效 鳞茎:清热化痰,开郁散结。

## 7293129

*Fritillaria monantha* Migo var. *tonglingensis*

植物名 铜陵黄花贝母《中药通报》  
 药材名 皖贝《中药通报》  
 功效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

## 7293130

*Fritillaria ningguoensis* S. C. Chen et S. F. Yin

植物名 宁国贝母《云南植物研究》  
 药材名 皖坪贝(安徽)  
 地方名 安徽:小贝母(宁国)。  
 功效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

## 7293131

*Fritillaria olgae* Vved.

植物名 直花贝母《新疆药植志》  
 药材名 贝母《新疆药植志》  
 功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293132

*Fritillaria omeiensis* S. C. Chen

植物名 峨眉贝母《中国植志》  
 药材名 峨眉贝母《峨眉药植资源》  
 地方名 四川:贝母(峨眉山)。  
 功效 鳞茎:润肺散结,止咳化痰,排脓。

## 7293133

*Fritillaria pallidiflora* Schrenk

植物名 伊贝母《中国植志》  
 药材名 伊贝母《药典》  
 文献名 伊犁贝母《药典》,伊贝《植分学报》,生贝、西贝母《中药大辞典》  
 地方名 新疆:贝母  
 功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。用于肺热咳嗽,胸闷痰粘,瘰癧,痈肿。

## 7293134

*Fritillaria pallidiflora* Schrenk var. *plena* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 重瓣伊贝母《植分学报》  
 药材名 伊贝母(新疆)  
 功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。用于肺热咳嗽,胸闷痰粘,瘰癧,痈肿。

## 7293135

*Fritillaria parvialbiflora* X. Z. Duan et X. J. Zheng var. *viridicaulinus* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 绿茎小白花贝母《植分学报》  
 药材名 伊贝母(新疆)  
 功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293136

*Fritillaria przewalskii* Maxim. ex Batal.

植物名 甘肃贝母《中国植志》  
 药材名 岷贝(甘肃)、《汇编》  
 文献名 西北贝母《汇编》,川贝母《药典》  
 地方名 贝母(甘肃、青海);青海:“聂哇”(藏名),波氏贝母。  
 功效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。用于肺热燥咳,干咳少痰,阴虚劳嗽,咯痰带血。

## 7293137

*Fritillaria pugiensis* G. D. Yu et G. Y. Chen

植物名 蒲圻贝母《南药学报》  
 地方名 湖北:蒲贝、灯笼花(蒲圻地区)。  
 功效 鳞茎:清热润肺,止咳化痰,散结。

## 7293137a

*Fritillaria tachenggensis* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 塔城贝母《植分学报》  
 药材名 伊贝母(新疆)  
 功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293138

*Fritillaria taipaiensis* P. Y. Li

植物名 太白贝母《中国植志》  
 药材名 太贝《陕西中草药》  
 文献名 〔松贝〕、青贝《植分学报》,秦贝《鉴别手册》  
 地方名 宁夏:盘贝(六盘山);湖北:尖贝(五峰),川贝(神农架)。  
 功效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

## 7293139

*Fritillaria thunbergii* Miq. --- *F. verticillata* Willd. var. *thunbergii* (Miq.) Baker

植物名 浙贝母《中国植志》  
 药材名 浙贝母《纲目拾遗》、《药典》  
 文献名 土贝母《本草正》,象贝《经验广集》,浙贝、象贝母《百草镜》,大贝《本草正义》,珠贝、浙贝片《药典》,家贝《药材学》  
 地方名 元宝贝(浙江、安徽);江苏:苏贝母(镇江);浙江:元贝,东贝,野贝,菱贝,肉贝;湖南:野浙贝,〔龙须菜〕。

功效 鳞茎:清热化痰,开郁散结。用于风热,燥热,痰火咳嗽,肺痈,乳痈,瘰癧疮毒,心胸郁闷。

## 7293140

*Fritillaria thunbergii* Miq. var. *chekiangensis* Hsiao et K. C. Hsia

植物名 东贝母《中国植志》  
 药材名 东贝(浙江)  
 地方名 浙江:浙贝母;广东:〔川贝母〕。  
 功效 鳞茎:清热化痰,开郁散结。

## 7293141

*Fritillaria tortifolia* X. Z. Duan et X. J. Zheng --- *F. olgae* auct. non Vved.

植物名 托里贝母《新疆药植志》  
 药材名 伊贝母(新疆)  
 功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293142

*Fritillaria tortifolia* X. Z. Duan et X. J. Zheng var. *albiflora* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 白花托里贝母《植分学报》  
 药材名 伊贝母(新疆)  
 功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

## 7293143

*Fritillaria tortifolia* X. Z. Duan et X. J. Zheng var. *bar-*

likensis X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 巴尔里克贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

#### 7293144

*Fritillaria tortifolia* X. Z. Duan et X. J. Zheng var. *citrina*  
X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 黄花托里贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

#### 7293145

*Fritillaria tortifolia* X. Z. Duan et X. J. Zheng var.  
*parviflora* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 小花托里贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

#### 7293146

*Fritillaria tortifolia* X. Z. Duan et X. J. Zheng var. *plena*  
X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 重瓣托里贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

#### 7293147

*Fritillaria tortifolia* X. Z. Duan et X. J. Zheng var.  
*wusunica* X. Z. Duan et X. J. Zheng

植物名 乌苏贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

#### 7293148

*Fritillaria unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia

植物名 暗紫贝母《中国植志》

药材名 川贝母《滇南本草》、《药典》

文献名 川贝《纲目拾遗》,贝母《中药志》,乌花贝母  
《四川中药志》

地方名 尖贝(四川、青海);四川:松贝母,松贝,正  
松贝。

功效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。用于肺热燥  
咳,干咳少痰,阴虚劳嗽,咳痰带血。

#### 7293149

*Fritillaria ussuriensis* Maxim.

植物名 平贝母《中国植志》

药材名 平贝母《药典》

文献名 贝母、平贝《东北药植志》,坪贝《药材学》

地方名 吉林:“拍猫”(朝名);内蒙古:“尼西瓦”(蒙  
名)。

功效 鳞茎:清热润肺,止咳,化痰。用于肺热咳  
嗽,咯痰带血,痰粘胸闷。

#### 7293150

*Fritillaria verticillata* Willd.

植物名 黄花贝母《中国植志》

药材名 贝母《新疆药植志》

文献名 轮叶贝母《新疆药植志》

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

#### 7293151

*Fritillaria verticillata* Willd. var. *jimunaica* X. Z. Duan et  
X. J. Zheng

植物名 吉木乃贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

#### 7293152

*Fritillaria walujewii* Regel

植物名 新疆贝母《中国植志》

药材名 伊贝母《药典》

文献名 伊贝《植分学报》,贝母《新疆药植志》,生  
贝、天山贝母《鉴别手册》

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。用于肺热咳嗽,胸  
闷痰粘,瘰癧,痈肿。

备考 本品从新疆调往内地一些地区,以体形小  
者作川贝母使用。

#### 7293153

*Fritillaria walujewii* Regel var. *plena* X. Z. Duan et X. J.  
Zheng

植物名 重瓣新疆贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

#### 7293154

*Fritillaria walujewii* Regel var. *shawanensis* X. Z. Duan et  
X. J. Zheng

植物名 沙湾贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。用于肺热咳嗽,胸  
闷痰粘,瘰癧,痈肿。

#### 7293155

*Fritillaria yuminensis* X. Z. Duan

植物名 裕民贝母《中药通报》

功效 鳞茎:作贝母入药。

备考 《中药通报》(1985)称:本品为1981年发表  
的新种,目前已作为中药材收购入药。总生物碱含量  
低于浙贝、东贝、川贝中的板贝、伊贝,高于平贝及新疆  
塔城的黄花贝母、砂贝母等。

#### 7293156

*Fritillaria yuminensis* X. Z. Duan var. *albiflora* X. Z. Duan  
et X. J. Zheng

植物名 白花裕民贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

#### 7293157

*Fritillaria yuminensis* X. Z. Duan var. *roseoflora* X. Z.  
Duan et X. J. Zheng

植物名 粉红花裕民贝母《植分学报》

药材名 伊贝母(新疆)

功效 鳞茎:清肺,化痰,散结。

#### 7293158

*Fritillaria yuzhongensis* G. D. Yu et Y. S. Zhou

植物名 榆中贝母《南药学报》

地方名 甘肃:川贝。

功效 鳞茎:清热润肺,化痰止咳。

#### 7293159

*Gagea hiensis* Pasch.

植物名 小顶冰花《中国植志》

药材名 小顶冰花《长白山植药志》

功效 鳞茎:长白山民间用以治疗心脏病,个别地区用药时出现中毒现象,应慎用。

#### 7293160

*Gagea lutea* (L.) Ker Gawl. var. *nakaiana* (Kitag.) Q. S. Sun -- *G. nakaiana* Kitag.

植物名 朝鲜顶冰花《沈药学报》

功效 鳞茎:用于心脏病。

备考 长白山个别地区用药时出现中毒现象,应慎用。

#### 7293161

*Gloriosa superba* L.

植物名 嘉兰《中国植志》

药材名 嘉兰《汇编》

文献名 马拉巴嘉兰《中药通报》

地方名 云南:舒筋散,“何发来”(勐海傣语),“哪另”(西双版纳傣语)。

功效 根茎:有大毒。为提取秋水仙碱的原料;根:用于堕胎,消化不良;块茎:用于半边瘫痪,周身关节疼痛,高热抽搐,周身肿胀。

#### 7293162

*Hemerocallis citrina* Baroni

植物名 黄花菜《纲目》、《中国植志》

药材名 柠檬萱草根(拟)

文献名 黄花《华北经济植物志要》,黄金萱、磨香萱、黄花菜根《药材学》,柠檬萱草《汇编》

地方名 [金针菜](山东、上海),黄花萱草(山东、浙江),[蘼芦](江苏、安徽、福建),野金针菜、萱草根(山东、江苏、浙江、安徽);山东:黄花苗;四川:金针花,金针花根,金萱;其他:野黄花菜。

功效 根:清热利尿,凉血止血。用于腮腺炎,黄疸,膀胱炎,尿血,小便不利,乳汁缺乏,月经不调,衄血,便血。外用于乳腺炎;花蕾、嫩苗:利湿热,宽胸膈。

#### 7293163

*Hemerocallis coreana* Nakai

植物名 朝鲜萱草《吉野》

地方名 黄花菜(东北)。

功效 根及根茎:有小毒。利尿消肿。

#### 7293164

*Hemerocallis dumortieri* Morr.

植物名 小萱草《中国植志》

药材名 小萱草根(拟)

文献名 长白萱草《东北植药图志》

地方名 吉林:萱草根。

功效 根及根茎:清热利湿,凉血止血。

#### 7293165

*Hemerocallis fulva* (L.) L.

植物名 萱草《吴普本草》、《中国植志》

药材名 萱草根《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 谖草《诗经》,丹棘、忘忧草(崔豹《古今注》),妓女《吴普本草》,宜男(周处《风土记》),鹿葱(嘉祐本草),鹿剑(土宿本草),川草花、萱草花《救荒本草》,[漏芦]、芦葱、[漏芦根果]、宜男花《滇南本草》,疗愁、鹿葱花《纲目》,萱萼《随息居饮食谱》,益男草《本草原始》,绿葱茶《植物名汇》,地人参《分类草药性》,橙花萱草《济南植录》,野金针菜根《药材学》,大萱草根《中药志》

地方名 [百部](西南);陕西:十姊妹(宝鸡);浙江:大红花(兰溪),野金针花、野金针菜(建德、鄞县、金华),水鹿葱(余姚),天鹅孵蛋(杭州);湖南:绿葱兜,水大蒜(古丈),皮蒜(会同),地冬(通道),红花金针草(临湘),野黄花草(衡阳);广东:玉葱花根;广西:[竹叶麦冬](凌云);四川:土金针花(成都),土黄花,土金针;贵州:玉金子,绿春菜,多儿母,[红孩儿],爬地龙;云南:条参,提心吊胆,绿葱根,镇心丹,昆明漏芦,栽秧花。

功效 根:利水,凉血。用于水肿,小便不利,淋浊,带下,黄疸,衄血,便血,崩漏,乳痈;嫩苗:利湿热,宽胸,消食。用于胸膈烦热,黄疸,小便赤涩。

#### 7293166

*Hemerocallis fulva* (L.) L. var. *disticha* (Donn) Baker -- *H. disticha* Donn

植物名 长管萱草《中国植志》

文献名 忘萱草《吉野》

功效 根及根茎:清热利尿,凉血止血。

#### 7293167

*Hemerocallis fulva* (L.) L. var. *kwanso* Regel

植物名 重瓣萱草《中国植志》

文献名 千叶萱草《花镜》

功效 根:利尿消肿。

#### 7293168

*Hemerocallis lilio-asphodelus* L. -- *H. flava* (L.) L.

植物名 北黄花菜《中国植志》

药材名 北萱草根(拟)

文献名 萱草花、川草花《救荒本草》,金针菜《滇南本草》,黄花菜、鹿葱花《纲目》,萱萼《随息居饮食谱》,黄花萱草《内蒙古中草药》,忘萱草《东检》,棒根萱草《东北药物志》,黄花、鹿葱、野金针菜《中国药植志》,野黄花菜《秦岭植志》

地方名 萱草(山东、江苏);河北:扇子草;内蒙古:金针;山东:黄花苗(荣成、五莲、平邑);河南:野金针,盖狗帽,山金针;其他:玉葱,野萱草。

功效 根:清热利尿,凉血止血。用于腮腺炎,黄疸,膀胱炎,尿血,小便不利,乳汁缺乏,月经不调,衄血,便血。外用于乳腺炎;花蕾、嫩苗:利湿热,宽胸膈。

#### 7293169

*Hemerocallis middendorffii* Trautv. et Mey.

植物名 大苞萱草《中国植志》

药材名 大苞萱草根(拟)

文献名 金萱、黄花、萱草《满洲植录》，金萱草《食用植物图说》，大花萱草《东检》

功效 根：清热利尿，凉血止血。

#### 7293170

*Hemerocallis minor* Mill.

植物名 小黄花菜《中国植志》

药材名 小萱草根《中药志》

文献名 蜜萱《名实图考》

地方名 金针菜(东北、山东)，金盏花、萱草根(东北)，凤尾七(华中)，黄花菜(东北、内蒙古)，金针(内蒙古、四川)，黄花(四川、贵州)，萱草(吉林、河北、云南)，小萱草(吉林、河北)；吉林：“文出里”(朝名)；河北：萱草叶；内蒙古：“义德跟-希拉-其其格”、“色尔哈布察瓦”、“阿尔坦-阻拉”(蒙名)；山东：黄花菜根，黄花苗(历城、莒南、莒县、聊城、长清等)，山黄花(蒙山)；湖北：野黄花(神农架)；广西：[藜芦]；四川：金针黄花、红萱草、雷皮葱根(广元)；贵州：[百部]，多鬼母，金针花；云南：[漏芦]，细叶萱草。

功效 根、根茎：有小毒。利尿消肿。用于小便不利，浮肿，淋病，乳瘤肿痛等。

#### 7293171

*Hemerocallis plicata* Stapf

植物名 折叶萱草《中国植志》

药材名 折叶萱草根(拟)

文献名 褶叶萱草《高植图鉴》，黄花菜《昆明民药》

地方名 云南：连珠炮、下奶药(昆明)，一条参，绿葱根，镇心丹，金针菜，野皮菜，真金花，小提药、鸡药葛根(保山)，凤尾一枝蒿、萱草(楚雄)，真金菜、尖刀菜、玉筋散、鸡脚参(红河)，鸭脚参，绿葱，提心吊胆，鹿葱，芦葱，“光阴史性”(楚雄彝名)，小百部，光阴草，[漏芦]。

功效 根：清热利尿，凉血止血。

#### 7293172

*Heterosmilax japonica* Kunth --- *H. gaudichaudiana* Norton

植物名 肖菝葜《中国植志》

药材名 白土茯苓《湖南药物志》

文献名 冷饭团、硬饭、山地栗、土苓《和汉药标本目录》，山牛、硬磁、山归来、冷饭块、地茯苓、过山龙、导河橘、木猪苓、黄牛根、过冈龙、茱萸、大猪腰子、奇粮、奇良、歧良、冷饭、山猪粪、山奇粮、土草藤、仙遗粮、刺猪苓、草禹余粮、革禹余粮《新纲》

地方名 白草藤(台湾、四川)；台湾：草藤，土茯苓；湖南：冷饭垂(衡山)；四川：白土苓。

功效 根茎、茎：清热，除湿，解毒。用于疮疖肿毒，阳痿，汞中毒。

#### 7293173

*Heterosmilax japonica* Kunth var. *gaudichaudiana* (Kunth) Wang et Tang --- *Smilax gaudichaudiana* Kunth --- *Heterosmilax gaudichaudiana* (Kunth) Maxim. var. *hongkongensis* A. DC.

植物名 合丝肖菝葜《中国植志》

文献名 土草藤《桂林市药物志》，肖菝葜《广西本草

选编》

地方名 土茯苓(广西、云南)；广西：千斤力，九牛力。

功效 根茎：清热利湿，壮筋骨。用于腹泻，月经不调，腰膝痹痛，小便混浊，白带。

#### 7293174

*Heterosmilax yunnanensis* Gagnep. --- *Smilax septemnervia* Wang et Tang

植物名 短柱肖菝葜《中国植志》

药材名 短柱肖菝葜《峨眉药植资源》

文献名 七脉肖菝葜、七脉土茯苓《广西植录》

地方名 湖北：山土茯苓(神农架)；广西：草藤(田阳)；四川：土茯苓(峨眉山)。

功效 根茎：利湿，解毒，利筋骨。用于头痛，腰痛。

#### 7293175

*Hosta ensata* F. Maekawa --- *H. clause* Nakai var. *normalis* F. Maekawa

植物名 东北玉簪《中国植志》

药材名 东北紫萼(拟)

文献名 紫萼、剑叶玉簪《吉野》

地方名 吉林：玉簪，“抽克扎姆”(朝名)。

功效 全草：镇痛，解毒。用于咽喉肿痛。

#### 7293176

*Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers.

植物名 玉簪《纲目》、《中国植志》

药材名 平簪花《品汇精要》、《中药大辞典》

文献名 内消花《海上方》，白鹤花、玉簪花根《品汇精要》，白鹤仙、玉簪叶《纲目》，白萼《群芳谱》，白玉簪、小芭蕉《分类草药性》

地方名 白玉簪花(华中)，玉泡茶(广东、四川)，玉簪棒(东北)；北京：玉春棒；河北：白玉针，玉针棒；江苏：白鹤草；上海：金销草；浙江：玉簪三七；江西：化骨莲；福建：银净花；湖南：芭蕉三七(常德)，田螺七、大田螺七(黔阳)；广西：白花玉簪，玉叶老虎耳(南丹)；四川：鱼鳔花(峨眉山)；云南：香珠果根，吉祥草，竹节草；其他：棒玉簪，天簪花，玉寸棒。

功效 花：用于咽喉肿痛，小便不通，疮毒，烧伤；根：有毒。消肿，解毒，止血。用于痢疾，瘰癧，咽肿，吐血，骨鲠；叶：用于痢症，疔疮，蛇虫伤。

#### 7293177

*Hosta ventricosa* (Salisb.) Stearn

植物名 紫萼《汝南圃史》、《中国植志》

药材名 紫玉簪《品汇精要》、《汇编》

文献名 紫萼《品汇精要》，鸡骨头《名实图考》，红玉簪《分类草药性》

地方名 玉簪花(贵州、云南)；浙江：水紫草(开化)，青玉簪、水玉簪(临安)；江西：梭子草(丰城)，耳叶七(景德镇)，化骨莲(吉水)，玉簪；福建：银净花(松政)；湖北：紫花玉簪(神农架)；湖南：老虎耳朵，玉盏花，罗虾草；广西：紫萼玉簪；四川：红玉簪花头，玉簪花根，大鱼鳔花，红鱼鳔花(峨眉山)；贵州：石玉簪(惠水)，山玉

簪(缓阳),小芭蕉。

**功效** 全草:散瘀止痛,解毒。用于胃痛,跌打损伤,鱼骨鲠喉。外用于蛇虫咬伤,痈疮疔毒;叶:用于崩漏带下,溃瘍;根茎:用于咽喉肿痛,牙痛,胃痛,血崩,带下,痢疽,瘰癧;花:用于遗精,吐血,气肿,白帶,咽喉肿痛。

#### 7293178

*Iphigenia indica* Kunth

**植物名** 丽江山慈菇(汇编)

**药材名** 丽江山慈菇(汇编)

**文献名** 山慈菇(滇南本草),益辟坚(科属词典)

**地方名** [土贝母],光姑子(西南);四川:苦子,光苦子;云南:光慈姑,[草贝母],闹狗药,山茨菇,假贝母,闹狗菜。

**功效** 鳞茎:有毒。平喘,止咳,镇痛,抗癌。用于支气管炎,哮喘,乳癌,鼻咽癌。

**备考** 有以本品伪充川贝母入药,应注意鉴别。

#### 7293179

*Lilium bakerianum* Coll. et Hemsl.

**植物名** 滇百合(中国植志)

**文献名** 红百合(名实图考),红花百合(云南药录)

**地方名** 云南:百合。

**功效** 鳞茎:强壮,镇咳,补虚,清热润肺,平火。用于肺结核咳嗽。

#### 7293180

*Lilium bakerianum* Coll. et Hemsl. var. *delavayi* (Franch.) Wilson --- *L. delavayi* Franch.

**植物名** 黄绿花滇百合(中国植志)

**药材名** 山百合(名实图考)、(中药大辞典)

**文献名** 绿百合(名实图考),直瓣红花百合(云南药录),苍山红百合(云南种录)

**地方名** 云南:百合。

**功效** 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

#### 7293181

*Lilium brownii* F. E. Brown ex Mieliez

**植物名** 野百合(中国植志)

**药材名** 百合(本经)、(中药志)

**文献名** 淡紫百合(广西植录),白花百合(新华本草纲要)

**地方名** 广西:三破血(全州);贵州:山丹,岩百合。

**功效** 鳞茎:养阴润肺,清心安神。用于阴虚久咳,痰中带血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。

#### 7293182

*Lilium brownii* F. E. Brown ex Mieliez var. *viridulum* Baker --- *L. brownii* var. *colchesteri* (Van Houtte) Wilson ex Elwes

**植物名** 百合(中国植志)

**药材名** 百合(本经)、(药典)

**文献名** 播(南都赋),重迈、中庭、重医(吴普本草),重箱、摩罗、强瞿、中逢花(别录),强仇(本草经集注),百合蒜(玉篇),白百合(日华子本草),百合子、蒜脑菹(纲目),夜合花(本草崇原),白花百合(救生苦海),夜

合、摩罗春(花镜),途花、麻罗、鬼蒜、疆仇、野百合、麻罗春、犬伊日根(新纲)

**地方名** 山大蒜(安徽、江西),山百合(浙江、湖南),药百合(湖北、湖南),家百合(湖北、四川、贵州),米百合(湖南、四川);安徽:岩百合;江西:百花(乐平),山蒜头,喇叭筒;福建:山蒜,野百合花;湖北:菜百合;湖南:竹叶百合;广东:百公花;四川:大百合,小百合;云南:大白花百合(红河),苦蒜;其他:杜百合,南百合,宣百合。

**功效** 鳞茎及果实:养阴润肺,清心安神。用于阴虚久咳,痰中带血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。

#### 7293183

*Lilium callosum* Sieb. et Zucc.

**植物名** 东北野百合(拟)

**药材名** 野百合(东北药用植物)

**地方名** 内蒙古:“蔞日良”(蒙名)。

**功效** 鳞茎:润肺止咳,宁心安神。用于阴虚久咳,肺结核咳嗽,痰中带血,热病后余热未清,神经衰弱,虚烦惊悸,心神不安,脚气浮肿;花:用于经闭。

**备考** 苏联用鳞茎治疗骨折,捣碎外敷治冻伤,花用于治疗高血压。

#### 7293184

*Lilium cernuum* Komar.

**植物名** 垂花百合(中国植志)

**文献名** 松叶百合(中药大辞典)

**功效** 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

#### 7293185

*Lilium concolor* Salisb. --- *L. concolor* Salisb. var. *buschianum* Baker --- *L. concolor* Salisb. var. *partheneion* Baker

**植物名** 渥丹(中国植志)

**药材名** 百合(东北、湖北)

**文献名** 山丹(食疗本草),红百合、连珠(日华子本草),川强瞿(通志),红花菜、山丹花(纲目),红花百合(随息居饮食谱),重迈(花镜),赛渥丹(中药大辞典)

**地方名** 野百合(东北、山东);山东:小山斗子、山百合(昆崙山、威海、莱阳),山蛋子(苍山、邹县、沂源),山瓣子花(莱阳),小山墩子(崂山),山豆子花、山豆瓣(五莲);湖北:米百合、小百合(神农架);贵州:雷百合。

**功效** 鳞茎:养阴润肺,清心安神;花蕊:活血。外用于疔疮恶肿。

#### 7293186

*Lilium concolor* Salisb. var. *pulchellum* (Fisch.) Regel --- *L. pulchellum* Fisch.

**植物名** 有斑百合(中国植志)

**药材名** 百合(拟)

**功效** 鳞茎:润肺化痰。

#### 7293187

*Lilium dahuricum* Ker-Gawl.

**植物名** 毛百合(中国植志)

**药材名** 卷莲百合(东北药志)

**文献名** 卷莲花(汇编)



地方名 黑龙江:百合,卷莲。  
功效 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

## 7293188

*Lilium davidii* Ducharttre

植物名 川百合《中国植志》

药材名 川百合《中药志》

文献名 百合花《滇南本草》,大卫百合《药材学》,高原百合《云南药录》,西北百合《汇编》,高原卷丹《中药大辞典》

地方名 百合(西北、西南);云南:野百合。

功效 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

## 7293189

*Lilium distichum* Nakai

植物名 东北百合《中国植志》

文献名 轮叶百合《吉野》,闪浪花《汇编》

地方名 辽宁:山梗米,山梗子,花姑朵,狗蛋饭。

功效 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

## 7293190

*Lilium duchartrei* Franch. --- *L. lankongense* Franch.

植物名 宝兴百合《中国植志》

药材名 澜江百合《西藏中草》

文献名 高原百合《秦岭植志》,洱源百合《中药大辞典》,野百合《鉴别手册》

地方名 [马兜铃](湖北、湖南、江西、西南);西藏:百合,“察区大丝美多”(藏名)。

功效 鳞茎:润肺止咳,清热安神。用于肺结核,久咳吐血,慢性支气管炎,恍惚不寐等。

## 7293191

*Lilium fargesii* Franch.

植物名 绿花百合《中国植志》

药材名 绿花百合《湖北中草药志》

文献名 绿百合《高植图鉴》

地方名 湖北:山百合、条叶百合(神农架)。

功效 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

## 7293192

*Lilium formosanum* Wallace

植物名 台湾百合《中国植志》

药材名 百合《台湾中药材图鉴》

文献名 菲岛百合《中国植物图鉴》,高沙百合《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾:[马兜铃][种子],[紫苑][根],山蒜头。

功效 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

## 7293193

*Lilium henryi* Baker

植物名 湖北百合《中国植志》

药材名 湖北百合《神农架药录》

地方名 湖北:大百合(神农架)。

功效 鳞茎:清热解毒,润肺止咳。用于毒疮,肺癰,中耳炎。

## 7293194

*Lilium lancifolium* Thunb. --- *L. tigrinum* Ker-Gawl.

植物名 卷丹《中国植志》

药材名 百合《本经》、《药典》

文献名 回头见子《花镜》,家百合、番山丹《满蒙野卉》

地方名 倒垂莲、虎皮百合(华北);陕西:药百合;山东:山斗子、红合(崑崙山),柳叶山丹(蒙山),山百合;湖北:野百合(神农架);西藏:卷丹百合。

功效 鳞茎:养阴润肺,清心安神。用于阴虚久咳,痰中带血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。

## 7293195

*Lilium leucanthum* (Baker) Baker --- *Lilium brownii* F. E. Brown var. *leucanthum* Bak.

植物名 宜昌百合《中国植志》

药材名 白花百合《神农架药录》

地方名 湖北:百合(神农架)。

功效 鳞茎:润肺止咳,清心安神。

## 7293196

*Lilium longiflorum* Thunb.

植物名 麝香百合《中国植志》

药材名 百合《中药大辞典》

文献名 卷丹《拉汉种称》,岩百合《鉴别手册》,红岩百合《中药大辞典》

地方名 广东:伯公花(曲江),百郎头(南雄);四川:老鸱花(峨眉山);贵州:野百合、红岩(贵阳),[马兜铃]。

功效 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

备考 贵州历来以百合果充马兜铃用,省内外均销。百合果中主要为本种。

## 7293197

*Lilium lophophorum* (Bur. et Franch.) Franch.

植物名 尖被百合《中国植志》

文献名 冠状百合《云南药录》

地方名 云南:百合(大理、丽江)。

功效 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

## 7293198

*Lilium nepalense* D. Don var. *ochraceum* (Franch.)

Liang --- *L. ochraceum* Franch.

植物名 披针叶百合《中国植志》

药材名 山百合《名实图考》

文献名 黄花百合《云南药录》

地方名 云南:百合。

功效 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

## 7293199

*Lilium papilliferum* Franch.

植物名 乳头百合《中国植志》

文献名 乳头百合《云南药录》

地方名 湖北:细叶百合(神农架);云南:百合(丽江、迪庆、怒江)。

功效 鳞茎:养阴润肺,清心安神。

## 7293200

*Lilium pumilum* DC. --- *L. tenuifolium* Fisch.

植物名 山丹《食疗本草》、《中国植志》

药材名 百合《本经》、《药典》

文献名 散丹花《植物名汇》, 山丹丹《中药通报》, 细叶百合《药材学》, 线叶百合《东北药植志》

地方名 药百合(华北), 野百合(华北、云南), 山丹花(内蒙古、青海); 黑龙江: 卷莲花、散莲花、散莲伞(绥化), 灯伞花; 河北: 伞子花; 内蒙古: “沙日冷”、“沙日讨鲁盖”、“查干-突梅斯”、“隆拉那”(蒙名), “沙楞讨鲁盖”(锡盟蒙名); 青海: “阿勃卡”(藏名); 湖南: 红百合; 四川: 辘坡子; 云南: 白花百合, 香韭百合, 拔拔蒜。

功效 鳞茎: 养阴润肺, 清心安神。用于阴虚久咳, 痰中带血, 虚烦惊悸, 失眠多梦, 精神恍惚。

#### 7293201

*Lilium rosthornii* Diels

植物名 南川百合《中国植志》

文献名 百合《贵州药录》

功效 鳞茎: 清热解毒, 润肺止咳。用于毒疮, 肺癰, 中耳炎。

#### 7293202

*Lilium speciosum* Thunb. var. *gloriosoides* Baker

植物名 药百合《中国植志》

文献名 鹿子百合《浙江药植志》

功效 鳞茎: 养阴润肺, 清心安神。

#### 7293203

*Lilium sulphureum* Baker ex Hook. f.

植物名 淡黄花百合《中国植志》

药材名 淡黄花百合《贵州药录》

文献名 疏色百合《云南种录》

功效 鳞茎: 清热解毒, 润肺止咳。用于咯血, 虚劳咳嗽, 无名肿毒。

#### 7293204

*Lilium taliense* Franch.

植物名 大理百合《中国植志》

药材名 大理百合《贵州药录》

地方名 湖北: 药百合(神农架)。

功效 鳞茎: 清热解毒, 润肺止咳。用于咯血, 虚劳咳嗽, 无名肿毒。

#### 7293205

*Lilium tsingtauense* Gilg

植物名 青岛百合《中国植志》

文献名 崂山百合《山东经植》

地方名 山东: 山百合、节巴子花(海阳)。

功效 鳞茎: 养阴润肺, 清心安神。

#### 7293206

*Lilium wardii* Stapf ex Stearn

植物名 卓巴百合《中国植志》

药材名 卓巴百合《西藏中草》

地方名 青海: “达色美多”(藏名), 百合。

功效 鳞茎: 养阴润肺, 清心安神。

#### 7293207

*Liriope graminifolia* (L.) Baker

植物名 禾叶土麦冬《高植图鉴》

药材名 土麦冬(浙江、海南)

文献名 禾叶山麦冬《中国植志》

地方名 湖北: 寸冬(神农架)。

功效 块根: 养阴, 生津, 润肺, 止咳。

#### 7293208

*Liriope kansuensis* (Batal.) C. H. Wright --- *Ophiopogon kansuensis* Batal.

植物名 甘肃土麦冬《高植图鉴》

药材名 土麦冬(甘肃)

文献名 甘肃山麦冬《中国植志》, 甘肃麦冬《中药大辞典》

地方名 四川: 麦粽子、麦葱子(峨眉山)。

功效 块根: 养阴生津, 润肺清心。

#### 7293209

*Liriope longipedicellata* Wang et Tang

植物名 长梗土麦冬《高植图鉴》

文献名 长梗山麦冬《中国植志》

地方名 湖北: 麦冬(神农架)。

功效 根茎: 清心润肺, 养胃生津。

#### 7293210

*Liriope minor* (Maxim.) Makino

植物名 矮小土麦冬《高植图鉴》

药材名 小麦冬(甘肃、浙江)

文献名 小麦门冬《中国植物图鉴》, 矮小麦冬《植分学报》, 矮小山麦冬《中国植志》

地方名 浙江: 土麦冬; 贵州: 麦冬, 麦门冬, 地门冬, 羊胡子; 其他: 瓜黄, 寸冬, 苏冬, 忍凌, 不死草, 禹韭。

功效 块根: 养阴生津, 润肺清心。

#### 7293211

*Liriope muscari* (Decne.) Bailey

植物名 短葶土麦冬(拟)

药材名 福建土麦冬(拟)

文献名 短葶山麦冬《南药学报》

地方名 福建: 麦冬, 土麦冬(泉州)。

功效 块根: 养阴生津, 润肺清心。

#### 7293212

*Liriope platyphylla* Wang et Tang --- *L. muscari* (Decne.) Bailey var. *communis* (Maxim.) Hsu et L. C. Li

植物名 阔叶土麦冬《高植图鉴》

药材名 大叶麦冬《中药通报》

文献名 阔叶山麦冬《中国植志》, 阔叶麦冬《广西本草选编》, 阔叶麦门冬、短葶山麦冬《植分学报》, 大叶麦门冬《中药通报》

地方名 大麦冬(江苏、安徽、湖北); 山东: 常春草(五莲), 麦冬; 浙江: 山冬、兰花冬(天台); 安徽: 大寸冬, 寸冬, 鼠叶麦冬; 湖北: 土麦冬(神农架); 广西: 山韭菜(那坡); 四川: 麦粽子(峨眉山); 贵州: 石夹草; 其他: 野麦冬。

功效 块根: 养阴生津, 润肺清心。

#### 7293213

*Liriope spicata* (Thunb.) Lour.

植物名 土麦冬《高植图鉴》  
 药材名 土麦冬(江苏、浙江)、《中草药学》  
 文献名 麦门冬《本经》,川冬、禹韭、仆韭、羊韭、马韭、爱韭、随脂《纲目》,阶前草、忍冬《花镜》,松寿兰《名实图考》,忍凌、绿草、羊韭、禹韭、猫儿眼睛《植物名汇》,门冬、大叶白《指示植物》,大叶麦门冬《陕西中草药》,山麦冬《中国植志》

地方名 猫眼珠(西南),洋附子颗颗、野韭菜(华中),大麦冬(浙江、四川、云南),麦冬(河北、安徽、湖北、湖南、广西、云南),小麦冬(安徽、云南);北京:鱼子兰;山东:[兰草](费县);江苏:野韭菜(泰州),麦冬苗子;上海:野麦冬,街沿草;浙江:蓝花麦冬、非叶麦冬(天台),兰花麦冬;安徽:不死草;湖北:寸冬(神农架);湖南:韭菜麦冬、大寸冬(新邵),大羊胡子草(凤凰);广西:假麦冬;四川:笔炮子;云南:沿阶草,鸡爪参;其他:野兰草,草兰。

功效 块根:养阴,生津,润肺,止咳。

## 7293214

*Liriope spicata* (Thunb.) Lour. var. *prolifera* Y. T. Ma

植物名 湖北土麦冬(拟)  
 药材名 湖北麦冬《南药学报》  
 文献名 湖北山麦冬《南药学报》  
 地方名 湖北:麦冬(襄阳、谷城)。  
 功效 块根:养阴生津,润肺清心。

## 7293215

*Lloydia serotina* (L.) Rehb.

植物名 洼瓣花《中国植志》  
 文献名 迟熟萝蒂《青藏药图》  
 地方名 青海:“扎阿哇曼巴”(藏名)。  
 功效 地上部分:用于跌打损伤,沙眼。

## 7293216

*Lloydia tibetica* Baker ex Oliver

植物名 西藏洼瓣花《中国植志》  
 药材名 高山萝蒂《汇编》  
 文献名 胡莲《中药大辞典》  
 地方名 陕西:[光慈菇]、[尖贝母]、[太白山]、太白尖贝、[尖贝]、[贝母]、[太贝]、狗牙贝(太白),高山萝蒂;湖北:酒母七(神农架)。

功效 鳞茎:祛痰止咳。外用于痈肿疮毒及外伤出血。

## 7293217

*Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt

植物名 舞鹤草《中国植志》  
 药材名 舞鹤草《神农架药录》  
 文献名 二叶舞鹤草《东检》  
 功效 全草:凉血,止血。用于尿血,吐血,月经过多。外用于外伤出血。

## 7293218

*Notholirion bulbuliferum* (Lingelsh.) Stearn — *N. hyacinthinum* (Wilson) Stapf

植物名 太白米《秦岭植志》  
 药材名 太白米《陕西中草药》

文献名 太白菜《汇编》,假百合《中国植志》

地方名 云南:九子。

功效 小鳞茎:宽胸理气,止咳止痛。用于心胃气痛,胸闷,咳嗽,呕吐。

## 7293219

*Notholirion macrophyllum* (D. Don) Boiss.

植物名 大叶假百合《中国植志》

药材名 九子《云南中草药》

地方名 云南:太白米。

功效 全草:有毒。祛瘀消肿,接筋止痛,止血消炎。用于跌打损伤,骨折,外伤出血。

## 7293220

*Ophiopogon amblyphyllus* Wang et Dai

植物名 钝叶沿阶草《中国植志》

药材名 钝叶沿阶草《贵州药录》

功效 全草:清热解毒,理气止痛。用于喉炎,肠痈。

## 7293221

*Ophiopogon bockianus* Diels

植物名 连药沿阶草《中国植志》

药材名 巨龙麦冬(拟)

文献名 兰花七、蒜苗七《植物名汇》,南川沿阶草《广西植志》

地方名 广西:山姜草;四川:六月花、野麦冬(峨眉山);云南:[麦冬](玉龙山)。

功效 全草、块根:润肺养阴,生津止咳,清热。

## 7293222

*Ophiopogon bockianus* Diels var. *angustifolius* Wang et Tang

植物名 短药沿阶草《中国植志》

药材名 短药沿阶草《神农架药录》

地方名 湖北:土麦冬(神农架);四川:野麦冬(峨眉山)。

功效 全草:润肺养阴,生津止咳,清热。

## 7293223

*Ophiopogon bodinieri* Levl. — *O. formosana* Ohwi

植物名 沿阶草《中国植志》

药材名 野麦门冬(云南、广西)

文献名 云南书带草《品种论述》

地方名 麦冬(湖北、云南),野麦冬(云南、广西);湖北:羊胡子草(神农架);广西:小麦冬(全州);云南:寸冬,土麦冬。

功效 块根:养阴生津,润肺清心。

## 7293224

*Ophiopogon chingii* Wang et Tang

植物名 长茎沿阶草《中国植志》

药材名 长茎沿阶草《广西药录》

地方名 广西:[韭叶柴胡](武鸣);四川:铁丝草,野麦冬(峨眉山)。

功效 根:清热。用于肺结核。外用于脓疱疮。

## 7293225

*Ophiopogon chingii* Wang et Tang var. *glaucifolius* Wang

et Dai

植物名 粉叶沿阶草《中国植志》

药材名 粉叶沿阶草《广西药录》

地方名 广东:剪刀蕉。

功效 全草:用于外感发热,肝炎,胆囊炎,尿道炎。

## 7293226

*Ophiopogon clavatus* C. H. Wright

植物名 棒叶沿阶草《中国植志》

药材名 竹叶莲(四川峨眉)

地方名 四川:沿阶草(峨眉山)。

功效 块根:清肺热,生津止咳。

## 7293227

*Ophiopogon dracaenoides* (Baker) Hook. f.

植物名 褐鞘沿阶草《中国植志》

药材名 八宝镇心丹《云南药录》

文献名 宽叶沿阶草《广西药录》,大叶沿阶草《中药大辞典》

地方名 广西:高脚沿阶草,竹叶青(金秀),止咳竹,〔万年青〕(鹿寨)。

功效 块根:定心安神,止咳化痰。用于心悸,风湿性心脏病,肺结核,慢性支气管炎。

## 7293228

*Ophiopogon intermedius* D. Don --- *O. wallichianus* (Kunth) Hook. f.

植物名 间型沿阶草《中国植志》

药材名 间型麦冬《品种论述》

文献名 中间型沿阶草《汇编》,中型沿阶草《广西药录》,长萼沿阶草《海南植志》,沿阶草《青藏药图》,紫花沿阶草《云南种录》

地方名 青海:“扎朱”(藏名);湖北:寸冬(神农架);广西:蜈蚣七;四川:韭菜黄(峨眉);西藏:麦门冬。

功效 块根:养阴生津,润肺,止咳。

## 7293229

*Ophiopogon japonicus* (L. f.) Ker-Gawl. --- *O. chekiangensis* K. Kimura

植物名 麦冬《中国植志》

药材名 麦冬《本草拾遗》、《药典》

文献名 门冬《尔雅》,麦门冬《本经》,羊韭、〔乌韭〕、马韭、爱韭、禹韭、门火冬、〔忍冬〕、忍凌、不死药、禹馀粮、仆韭、随脂(吴普本草),羊韭、禹馀《别录》,阶前草《纲目》,书带草、秀嫩草《群芳谱》,麦文、麦门、山菅、雉骨木、不死叶、雉乌老草、沙草秀根、冬儿沙里、安神队枝《新纲》,阶前草根、家边草根《药材学》,细叶麦冬《中国经植志》,麦冬沿阶草《秦岭植志》,笕麦冬、浙麦冬《中药大辞典》,去心麦冬、大麦冬、寸麦冬、杭寸冬、笕寸冬、朱麦冬、连心麦冬《常用中药名辨》

地方名 寸冬(江苏、浙江、湖北、广西),小叶麦冬(陕西、浙江),小叶麦门冬、土麦冬(浙江、福建、广西),山麦冬(山东、福建、广西),山韭菜(福建、云南),〔沿阶草〕(河北、江苏、浙江、湖北、四川、云南),草绿珠、不忍草、猫儿眼(西南),韭菜麦冬(浙江、江西、广西),野韭(湖南、云南),野韭菜(浙江、福建);江苏:家边草(苏

州);浙江:麦门冬草、小麦冬、杭麦冬(杭州),滴水草(天台),马鬃草(临海);福建:韭仔麦冬(秦宁);湖南:羊屎草、兰花草(黔阳),小羊胡子草(凤凰),韭子草(东安),岩门冬;广东:羊胡子草,蒲草,马粪草,长命草;广西:韭菜草;四川:绿珠子草(南川),川麦冬(重庆),地麦冬;其他:瓜黄,苏冬,洋附子颗颗,韭叶麦冬。

功效 块根:养阴生津,润肺清心。用于肺燥干咳,虚劳咳嗽,津伤口渴,心烦失眠,内热消渴,肠燥便秘,白喉。

## 7293230

*Ophiopogon latifolius* Rodrig.

植物名 大叶沿阶草《中国植志》

地方名 云南:“牙母西”(西双版纳傣语)。

功效 根:用于乏力,食欲不振,湿疹痒痒,疥疮。

## 7293231

*Ophiopogon mairei* Levi.

植物名 西南沿阶草《中国植志》

药材名 西南沿阶草《神农架药录》

地方名 湖北:麦冬(神农架)。

功效 块根:滋阴润肺,养胃生津。

## 7293232

*Ophiopogon pierrei* Rodr.

植物名 韭叶沿阶草《广西药园药录》

地方名 广西:山韭菜,韭叶柴胡。

功效 全草:化痰止咳,解热。

## 7293233

*Ophiopogon platyphyllus* Merr. et Chun

植物名 宽叶沿阶草《中国植志》

文献名 阔叶沿阶草《广西植录》

功效 根茎:补虚,止痛。

## 7293234

*Ophiopogon sparsiflorus* Wang et Dai

植物名 疏花沿阶草《中国植志》

药材名 疏花沿阶草《广西药录》

地方名 广西:山韭菜(融水)。

功效 全草:清热。

## 7293235

*Ophiopogon stenophyllus* (Merr.) Rodrig. --- *Peliosanthes stenophylla* Merr.

植物名 狭叶沿阶草《中国植志》

药材名 狭叶沿阶草《广西药录》

功效 全草:用于肺燥咳嗽,阴虚足痿。

## 7293236

*Ophiopogon tonkinensis* Rodrig.

植物名 多花沿阶草《中国植志》

药材名 红河大叶麦冬(拟)

文献名 越南沿阶草《云南中草药》,多叶沿阶草《汇编》

地方名 云南:假麦冬、糯米条、糯米香、糯米草、竹叶茶、屏边沿阶草、大叶麦冬(红河),大麦冬。

功效 块根:润肺生津,止咳化痰。用于百日咳,尿道炎,肺结核咳嗽,咯血,支气管炎。

## 7293237

*Ophiopogon tsaii* Wang et Tang

植物名 簇叶沿阶草《中国植志》

地方名 云南:大麦冬,屏边沿阶草,假麦冬,糯米条,糯米香。

功效 全草:养阴柔肝,润肺止咳。用于百日咳,肝炎,肺结核,小儿疳积,产后腹痛,气管炎。

## 7293238

*Ophiopogon zingiberaceus* Wang et Dai

植物名 姜状沿阶草《中国植志》

功效 根茎:药用。

## 7293239

*Paris axialis* H. Li

植物名 五指莲重楼《云南植物研究》

地方名 四川:小重楼(荣经),九道箍(江津),铁灯台(峨眉);云南:五指莲、五子莲(彝良、绥江),滇重楼。

功效 根茎:清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

## 7293240

*Paris bashanensis* Wang et Tang

植物名 巴山重楼《中国植志》

药材名 巴山重楼《南药学报》

地方名 湖北:露水一颗珠、露水珠、清水珠(神农架);四川:七叶一枝花。

功效 根茎:清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

## 7293241

*Paris croquistii* (Takht.) H. Li

植物名 凌云重楼《南药学报》

地方名 广西:七叶一枝花,重楼。

功效 根茎:清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

## 7293242

*Paris dunniana* Levl.

植物名 海南重楼《南药学报》

地方名 七叶一枝花(海南、广西)。

功效 根茎:用于外伤出血,骨折,毒蛇咬伤。

## 7293243

*Paris fargesii* Franch. --- *P. petiolata* Baker var. *membranacea* C. H. Wright

植物名 球药隔重楼《中国植志》

药材名 球药隔重楼《汇编》

文献名 短药重楼《广西药录》,长梗重楼《广西植志》

地方名 重楼(四川、云南),独脚莲(广西、贵州);湖北:灯台七(神农架);四川:金线重楼(峨眉)。

功效 根茎:清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

## 7293244

*Paris fargesii* Franch. var. *petiolata* (Baker ex C. H. Wright) Wang et Tang --- *Paris petiolata* Baker ex C. H. Wright

植物名 具柄重楼《中国植志》

药材名 具柄重楼《广西药录》

文献名 具柄王孙《中国药植志》,柄叶重楼《秦岭植志》,长柄重楼《汇编》

地方名 重楼(四川、云南);四川:王孙(峨眉);云南:九重楼,胶质重楼,五子莲。

功效 根茎:清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

## 7293245

*Paris forrestii* (Takht.) H. Li

植物名 长柱重楼《南药学报》

地方名 云南:七叶一枝花。

功效 根茎:清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

## 7293246

*Paris luqannensis* H. Li

植物名 禄劝花叶重楼《南药学报》

地方名 云南:七叶一枝花。

功效 根茎:清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

## 7293246a

*Paris marmorata* Stearn --- *P. violacea* auct. non Levl.

植物名 花叶重楼《南药学报》

地方名 云南:七叶一枝花。

功效 根茎:有小毒。清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

## 7293247

*Paris polyphylla* Smith --- *P. vaniotii* Levl.

植物名 七叶一枝花《本草蒙筌》、《中国植志》

药材名 重楼《唐本草》、《中药志》

文献名 蚤休、蚩休《本经》,重台、草甘遂《唐本草》,蚤休《日华子本草》,〔紫河车〕、重楼金线《图经》,滁州蚤休《大观本草》,白甘遂《小儿药证直诀》,重台草《圣惠方》,三层草《纲目》,草河车《名实图考》,九道箍、铁灯盏、七叶一盏灯、鸳鸯虫、从六根《分类草药性》,平伐重楼《南药学报》

地方名 七子莲(江西、广西),七叶一枝香(安徽、江西),七叶莲(安徽、江西、湖南、广东),白河东(浙江、广西),金线重楼(安徽、福建、广东),铁灯台(湖北、湖南、广西),枝花头、七枝莲(广东、广西),重楼草(华中),海螺七(陕西、湖北);陕西:〔山海螺〕〔太白〕,灯台七、螺丝七;浙江:七叶遮花,双台,金盘托珠,金盘托荔(龙泉),金丝两重楼,金线竹,独立一枝花(嵊县),铁雨伞;江西:七子叶(泰和),七支莲(定南);福建:七层塔(宁化),双层楼,草紫河车(福安),孩儿掏伞;湖北:一枝梅,海罗七(宜昌、秭归);湖南:一支箭,一把伞,九龙盘、铁灯头(黔阳),双喜草,金丝重楼,螺陀三七;广东:七指莲(连平),七托莲(阳春),仙人托伞(乳源),鸡爪莲(乐昌);广西:九层楼,白重楼;云南:七叶一枝蒿(思茅),“牙赶壮”(傣语),虫萎(大理、丽江)。

功效 根茎:有小毒。清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。用于疔疮痈肿,咽喉肿痛,毒蛇咬伤,跌扑伤痛,惊风抽搐。

## 7293248

*Paris polyphylla* Sm. var. *appendiculata* Hara --- *P. delavayi* Franch. --- *P. bockiana* Diels

植物名 短梗重楼《中国植志》

药材名 短梗重楼《汇编》

文献名 滇王孙《中国药植志》,短瓣重楼《广西药

录》,金沙重楼《云南药录》,铁灯台《汇编》

地方名 金线重楼(广西、四川),重楼(四川、云南);湖北:海螺七(神农架)。

功效 根茎:有小毒。清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

#### 7293249

*Paris polyphylla* Sm. var. *chinensis* (Franch.) Hara --- *P. chinensis* Franch. --- *P. formosana* Hayata --- *P. hainanensis* Merr.

植物名 华重楼《中国植志》

药材名 重楼《唐本草》、《药典》

文献名 蚤休、蚤休《本经》,重楼金线、重台、草甘遂《唐本草》,螫休《日华子本草》,〔紫河车〕《图经》,七叶一枝花《本草蒙笙》,草河车、重楼一枝箭、虫篓《名实图考》,九道箍、铁灯盏、七叶一茎灯、蝎蝎虫《分类草药性》,滁洲蚤休《大观本草》,海南重楼《海南植志》

地方名 金线重楼(江西、福建),灯台七、铁灯台(陕西、江西、湖南、广东、广西、四川),枝花头(四川、广西),七叶莲(福建、江西、台湾、广东、广西),独脚莲(广东、广西、云南);陕西:罗汉七(安康),海螺七(平利、镇坪、白河、太白山),螺丝七;浙江:金盆托荔枝(龙泉、江山),金盆托珠(遂昌),金丝两重楼(鄞县、黄岩),白河车(杭州);台湾:七厘莲、(青木香);湖南:〔九龙盘〕;云南:虫楼,两把伞。

功效 根茎:有小毒。清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。用于疔疮痈肿,咽喉肿痛,毒蛇咬伤,跌扑伤痛,惊风抽搐。

备考 据报导,本品男用可杀精抗生育。

#### 7293250

*Paris polyphylla* Sm. var. *stenophylla* Franch.

植物名 狭叶重楼《中国植志》

药材名 狭叶重楼《汇编》

文献名 金子莲《植物名汇》,狭叶蚤休《中国药植志》

地方名 湖北:细叶海螺七(神农架);湖南:六子含花、七叶一枝花;四川:重楼、小重楼、小叶子重楼、白重楼、顶棚伞(峨眉山),金线重楼(南川);贵州:〔独角莲〕;云南:海螺七,铜灯台。

功效 根茎:有小毒。清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

#### 7293251

*Paris polyphylla* Sm. var. *thibetica* (Franch.) Hara --- *P. thibetica* Franch.

植物名 长药隔重楼《中国植志》

药材名 长药隔重楼《汇编》

地方名 湖北:海螺七(神农架);四川:重楼(峨眉山)。

功效 根茎:有小毒。清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

#### 7293252

*Paris polyphylla* Sm. var. *yunnanensis* (Franch.) Hand. -Mazz. --- *P. yunnanensis* Franch. --- *P.*

*polyphylla* Sm. var. *platypetala* Franch.

植物名 宽瓣重楼《中国植志》

药材名 重楼《滇南本草》、《药典》

文献名 紫河车、独脚莲《滇南本草》,重楼一枝箭《名实图考》,阔瓣蚤休《中国药植志》,滇重楼《云南植物研究》,阔瓣重楼《广西药录》,金盆托荔枝《中草药学》,云南重楼《云南中草药选》

地方名 七叶一枝花(西南);湖北:宽叶海螺七(神农架);广西:枝头花;四川:九道箍、麻波波(凉山普格);云南:糯米香根、虫萎、一枝箭、两把伞、“牙赶壮”(傣语),石龙参,草河车,草紫河车,重台,蚤休。

功效 根茎:有小毒,清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。用于疔疮痈肿,咽喉肿痛,毒蛇咬伤,跌扑伤痛,惊风抽搐。

备考 《云南植物研究》3(1):89,1981 载称:本种根茎近年广为民间用作抗癌药物。

#### 7293253

*Paris pubescens* (Hand. Mazz.) Wang et Tang --- *P. polyphylla* Sm. var. *pubescens* Hand. -Mazz. --- *P. mairei* Levl. --- *P. violacea* Levl.

植物名 毛重楼《中国植志》

药材名 毛叶重楼《云南药录》

文献名 毛脉蚤休《中国药植志》

地方名 重楼(广东、四川、云南);广东:七叶一枝花(增城、东莞),七叶枝花(阳江、阳春、罗定),七叶莲(电白、茂名),七枝莲(电白),七指莲(连平),鸡爪莲(乐昌),枝花头、金线重楼(广州),重楼草;四川:九道箍。

功效 根茎:消炎止痛,消肿。用于无名肿毒,疮癤。

#### 7293254

*Paris quadrifolia* L.

植物名 四叶重楼《中国植志》

药材名 王孙《本经》、《中药大辞典》

文献名 白功草、长孙、黄孙、黄昏、海孙、蔓延《别录》,牡蒙《本草经集注》,早藕《本草拾遗》,百节藕《名实图考》,山秘草《植物名汇》,四叶王孙《中药大辞典》

地方名 〔独脚莲〕(华北、贵州);四川:铁灯台(峨眉山);贵州:九道箍。

功效 根茎:用于痹症四肢酸痛,赤白痢疾。

备考 《中药大辞典》(1977)学名为 *Paris tetraphylla* A. Gray

7293255 见 7293247

#### 7293256

*Paris verticillata* M. Bieb. --- *P. obovata* Ledeb.

植物名 北重楼《中国植志》

药材名 轮叶王孙(黑龙江、内蒙古)、《汇编》

文献名 王孙、上天梯《汇编》

地方名 七叶一枝花(吉林、内蒙古、浙江);内蒙古:“阿拉坦·阿斯尔-其其格”(蒙名);陕西:灯台七(柞水),定风船(洵阳),铜楔子(眉县);四川:“朵的儿”(若尔盖藏名)。

功效 根茎:有小毒。清热解毒,散瘀消肿。用于

高热抽搐,咽喉肿痛,痈疽肿毒,毒蛇咬伤。

# 7293257

*Paris vietnamensis* (Takht.) H. Li

植物名 南重楼《南药学报》

地方名 广西:七叶一枝花,重楼、

功效 根茎:有小毒。清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。

7293258 见 7293246a

# 7293259

*Peliosanthes sinica* Wang et Tang

植物名 匍匐球子草《中国植志》

药材名 匍匐球子草《广西药录》

地方名 广西:老鼠竹(德保)。

功效 全草:疏风,清热。

# 7293260

*Peliosanthes teta* Andr. --- *P. minor* Yamamoto

植物名 簇花球子草《中国植志》

药材名 山百足《汇编》

文献名 小球子草、长叶球子草《海南植志》

地方名 广东:入地蜈蚣,过界蜈蚣,石蜈蚣,过岭蜈蚣,上山蜈蚣;广西:小叶球子草。

功效 根茎及根:祛痰止咳,舒肝止痛。用于咳嗽痰稠,胸痛,跌打胸肋痛。

# 7293261

*Peliosanthes teta* Andr. ssp. *humilis* (Andr.) Jessop ---

*Peliosanthes macrophylla* Wall. ex Baker

植物名 大叶球子草《海南植志》

药材名 蜘蛛草(广西)、《汇编》

文献名 大叶入地蜈蚣《汇编》

功效 根茎及根:祛痰止咳,舒肝止痛。用于咳嗽痰稠,胸痛,跌打胸肋痛,小儿疳积。

# 7293262

*Polygonatum acuminatifolium* Kom. --- *P. quinquefolium* Kitag.

植物名 五叶玉竹(拟)

药材名 五叶玉竹(拟)

文献名 五叶黄精《中国植志》

功效 根茎:养阴润燥,生津止渴。

# 7293263

*Polygonatum alte-lobatum* Hayata

植物名 短筒黄精《中国植志》

药材名 短筒黄精《中草药》

功效 根茎:用于眼病。台湾民间作补血滋养药。

# 7293264

*Polygonatum alternicirrhosum* Hand. -Mazz.

植物名 互卷黄精《中国植志》

药材名 互卷黄精《峨眉药植资源》

地方名 四川:黄精(峨眉山)。

功效 根茎:养阴润肺,补气健脾。

# 7293265

*Polygonatum cathcartii* Barker

植物名 棒丝黄精《中国植志》

药材名 对叶黄精《中药志》

地方名 西藏:黄精。

功效 根茎:养阴润燥,生津止渴。

# 7293266

*Polygonatum cirrhifolium* (Wall.) Royle --- *P. souliei*

Hua --- *P. fuscum* Hua

植物名 卷叶黄精《中国植志》

药材名 老虎姜《陕西中草药》

文献名 滇钩吻《名实图考》,钩叶黄精《汇编》

地方名 姜形黄精(甘肃、湖北、四川、云南);陕西:盘龙七,算盘七,鸡头参,(山姜);宁夏:(白药子),白鸡,(白及)(泾源);湖北:鸡头黄精,龙头七、倒吊和尚(神农架);湖南:小叶黄精;广西:竹叶黄精;四川:甜黄精,大叶黄精,大川七子;贵州:大白芩,东北黄精;云南:黄精;西藏:“惹涅”(藏名);其他:褐花黄精。

功效 根茎:本品有苦甜之分,甜者可作黄精入药,功能润肺养阴,健脾益气,祛痰止血,消肿解毒。

# 7293267

*Polygonatum curvistylum* Hua

植物名 垂叶黄精《中国植志》

文献名 弯花柱黄精《中药大辞典》

地方名 宁夏:(黄精);云南:(玉竹)(罗平山)。

备考 根茎味苦,不宜作黄精、玉竹入药。

# 7293268

*Polygonatum cyrtoneura* Hua --- *P. brachyneura* Hand. -Mazz. --- *P. multiflorum* All. var. *longifolium* Merr.

植物名 多花黄精《中国植志》

药材名 黄精《别录》、《药典》

文献名 重楼、菟竹、鸡格、救穷、鹿竹《别录》,永康军黄精《图经》,黄精草《汉药写真集成》,长叶黄精《中国药植志》,城口黄精《秦岭植志》,囊丝黄精《汇编》,姜形黄精《药典》

地方名 南黄精(江西、广东、广西),〔山姜〕(江西、福建、湖南、广东),野生姜(浙江、福建、湖北),九蒸姜(浙江、福建),老虎姜(四川、贵州);浙江:山捣白(鄞县),九蒸头(衢县),白芩黄精;安徽:山包米,山白及;福建:黄精姜,救荒草、黄兰、山姜妈(闽东);湖北:冰盘七(神农架);湖南:黄姜,野姜,〔良姜〕,九龙环,羊乳肠,服皮姜,〔黄三七〕,瓜括厚、洋姜(黔阳);广东:竹姜,山羌,狗羌;四川:甜黄精(峨眉山)。

功效 根茎:补气养阴,健脾,润肺,益肾。用于脾胃虚弱,体倦乏力,口干食少,肺虚燥咳,精血不足,内热消渴。

# 7293269

*Polygonatum desoulayi* Kom.

植物名 长苞玉竹(拟)

药材名 玉竹(北京)

文献名 长苞黄精《北京植志》

功效 根茎:养阴润燥,生津止渴。

# 7293270

*Polygonatum filipes* Merr.

植物名 长梗黄精《中国植志》

药材名 广黄精(广东、广西)  
文献名 细梗黄精(广西药录)  
地方名 浙江:千金润(龙泉)。  
功效 根茎:补气养阴,健脾,润肺,益肾。

## 7293271

*Polygonatum formosanum* (Hayata) Masamune et Simada f.

植物名 台湾大黄精(台湾中药材图鉴)  
地方名 台湾:本黄精。  
功效 根茎:补气养阴,健脾,润肺,益肾。

## 7293272

*Polygonatum franchetii* Hua

植物名 距药黄精(中国植志)  
药材名 距药黄精(神农架药录)  
功效 根茎:味甜。补气养阴,健脾,润肺,益肾。

## 7293273

*Polygonatum graminifolium* Hook.

植物名 禾叶黄精(青藏药图)  
地方名 青海:“罗尼”(藏名)。  
功效 根茎:滋补健胃。用于消化不良,营养不良性水肿。

## 7293274

*Polygonatum hirtellum* Hand.-Mazz.

植物名 粗毛黄精(中国植志)  
药材名 粗毛黄精(中药通报)  
文献名 黄精(中药通报)  
功效 根茎:补气养阴,健脾,润肺,益肾。

## 7293275

*Polygonatum hookeri* Baker

植物名 独花黄精(中国植志)  
药材名 独花黄精(神农架药录)  
地方名 湖北:太阳草(神农架)。  
功效 根茎:补中益气,镇静安神。

## 7293276

*Polygonatum humile* Fisch. ex Maxim. --- *P. officinale* All. var. *humile* (Fisch. ex Maxim.) Baker

植物名 小玉竹(中国植志)  
药材名 小玉竹(中药志)  
文献名 矮萎蕤(兴安植群),小黄精(吉野)  
地方名 萎蕤(东北);吉林:玉竹。  
功效 根茎:养阴润燥,生津止咳。

## 7293277

*Polygonatum inflatum* Korn.

植物名 毛筒玉竹(中国植志)  
药材名 毛筒玉竹(中药大辞典)  
地方名 玉竹(东北);黑龙江:东北玉竹,绿瓔珞。  
功效 根茎:养阴润燥,生津止渴。

## 7293278

*Polygonatum involucreatum* (Franch. et Sav.) Maxim.

植物名 二苞玉竹(汇编)  
药材名 小玉竹(河北)、(汇编)  
文献名 双苞黄精(东北植药图志),玉竹(汇编),二

苞黄精(中国植志)

功效 根茎:养阴润燥,生津止渴。

## 7293279

*Polygonatum kingianum* Coll. et Hemsl. --- *P. agglutinatum* Hua

植物名 滇黄精(名实图考)、(中国植志)  
药材名 黄精(药典)  
文献名 鹿竹、兔竹、救穷草(滇南本草),金氏黄精(中药志),西南黄精(汇编),德保黄精(广西中药志),大黄精、姜形黄精(药典)  
地方名 老虎姜(四川、云南);广西:靖西黄精,轮叶黄精;贵州:转珠莲;云南:片尾参(东川),节节高(红河),糯米杆,仙人饭。

功效 根茎:补气养阴,健脾,润肺,益肾。用于脾胃虚弱,体倦乏力,口干食少,肺虚燥咳,精血不足,内热消渴。

## 7293280

*Polygonatum macropodium* Turcz.

植物名 热河黄精(中国植志)  
药材名 大玉竹(汇编)  
文献名 多花玉竹(东北植药图志),多花黄精(东检),长柄黄精(山东经植),长梗玉竹(汇编)  
地方名 玉竹(东北、华北、山东);辽宁:黄精(辽西);河北:小叶珠;山东:地管子(莱芜),黄蔓菁(崂山);其他:句稳草。  
功效 根茎:补脾润肺,益气养阴。

## 7293281

*Polygonatum nodosum* Hua

植物名 节根黄精(中国植志)  
药材名 杯子七(神农架药录)  
地方名 湖北:夜乐分筋(神农架)。  
功效 根茎:活血祛瘀,止痛,杀虫;全草:补血,补虚。

## 7293282

*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce --- *P. officinale* All. --- *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *pluriflorum* auct. non (Miq.) Ohwi

植物名 玉竹(中国植志)  
药材名 玉竹(别录)、(药典)  
文献名 茨、委萎(尔雅),女萎(本经),萎蕤、地节、马薹(别录),萎蕤(说文解字),青粘、黄芝(三国志),女草、娃草、丽草(酉阳杂俎),滁州萎蕤(大观本草),萎香、[白及](纲目),小笔管菜(盛京通志),乌女、威绥、委蛇、豆应仇罗(新纲),山尾参(药材学)

地方名 马儿花、山玉竹、山包米、山铃子草、灯笼菜、狗铃当(东北),铃当菜(东北、安徽、湖北),[山姜](安徽、湖北),毛管菜(东北、河北、山东),玉参(湖北、湖南),玉竹参(陕西、湖北、贵州、云南),竹叶三七(江苏、湖南),[竹根七](陕西、江西、湖南、贵州),尾参(湖北、湖南、广西、贵州),明玉竹(河南、云南),铃铛菜(东北、河北);黑龙江:大芦藜,芦莉花,山苞米(庄河);北京:甜草根、靠山竹(京郊),小玉竹;河北:小叶芦、白豆



子(承德),黄鸡蛋饭(张家口),白鸡,津竹,海竹,地管子;内蒙古:“查干-温都尔”、“木呼尔-查干”、“查干-浩尔”(蒙名);甘肃:棒棒锤天花(文县),鸟儿眼;青海:人参草;山东:老鸭子瓣(蒙山),黄半节(崂山),鬼蔓菁(沂水、泰山),笙笛(莱阳),毛管草(海阳);江苏:黄满精(云台山);福建:金玉参;湖北:肉竹,北箭七(神农架);广东:连竹,西竹;四川:“假洼”(藏名);贵州:十样错,百解药,竹七根,竹节黄,黄脚鸡;云南:竹叶参(昆明),竹叶黄根,对叶生(曲靖),老鸡啄,泡肿药,麻三七。

**功效** 根茎:养阴润燥,生津止渴。用于肺胃阴伤,燥热咳嗽,咽干口渴,内热消渴。

**备考** 过去许多药学和植物学文献,曾将本种学名订为 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi

#### 7293283

*Polygonatum prattii* Baker --- *P. delavayi* Hua

**植物名** 康定玉竹《中国植志》

**药材名** 康定玉竹《中药志》

**文献名** 大理玉竹、大叶黄精《云南药录》

**地方名** 小玉竹(四川、云南);贵州:小鸡仔;云南:黄精。

**功效** 根茎:养阴润燥,生津止渴。

**备考** 《中药通报》(1985)称:本品气香味甜,为川产玉竹的一个主要来源。

#### 7293284

*Polygonatum punctatum* Royle ex Kunth --- *P. marmoratum* Levl. --- *P. anomalum* Hua --- *P. mengtzensis* Wang et Tang

**植物名** 点花黄精《中国植志》

**药材名** 树刁《四川中药志》

**文献名** 蕨参、玉术《滇南本草》,滇钩吻(《名实图考》附图一),斑茎黄精《广西药录》,蒙自黄精《云南药录》

**地方名** 树吊(四川、云南);海南:海南黄精;四川:生扯龙;云南:玉竹,蕨蕨,竹叶黄根,〔竹节参〕。

**功效** 根茎或全草:解毒消肿,止血。外用于外伤出血,痈疽疔毒,疥疮,头癣。

#### 7293285

*Polygonatum roseum* (Ledeb.) Kunth

**植物名** 新疆黄精《中国植志》

**药材名** 新疆玉竹(拟)

**文献名** 羊角参《陕西中草药》,紫花黄精《新疆药植志》,玫瑰红黄精《中药大辞典》

**地方名** 新疆:玉竹,黄精。

**功效** 根茎:滋补肝肾,养阴生津。

#### 7293286

*Polygonatum sibiricum* Delar. ex Redoute

**植物名** 黄精《中国植志》

**药材名** 黄精《别录》、《药典》

**文献名** 龙街《广雅》,菟竹、鸡格、救穷、鹿竹、〔重楼〕《别录》,太阳草(张华《博物志》),〔白及〕、兔竹、垂珠《抱朴子》,苟格、马箭、笔菜《图经》,黄芝《灵芝瑞草

经》,笔管菜《救荒本草》,野生姜《本草蒙筌》,山生姜《本草备要》,白芨黄精《本草从新》,阳雀蕨《辰溪志》,山捣白《岭南采药录》,戊己芝《五符经》,黄衣、飞英、卑菜、米铺、竹大根、沙田随《新纲》,西伯利亚老虎姜《华北经济志要》,鸡头黄精《中药志》,轮叶黄精《药材学》,西伯利亚黄精《青海中草》,东北黄精《吉野》,黄精根、熟黄精、乌黄精《常用中药名辨》

**地方名** 鸡头参(山西、陕西、甘肃),黄鸡菜(东北、河北),肉罗汉、羊省菟老壳、〔九龙盘〕、眼眨虫(华中),〔白药〕、鸡爪参(山西、甘肃);黑龙江:山苞米;吉林:“冬占烈”(朝名);河北:黄鸡,山白薯,黄羊皮,黄金梁,黄鸡蛋饭,甜草根;内蒙古:“查干-胡日”、“木呼尔-查干”、“查干-浩尔”、“尼兴”(蒙名);陕西:太白黄精(白河、太白山、柞水),乌鸦七(镇坪),鸡头七,爪子参;青海:山白及;山东:鬼蔓菁(沂源),地管子(莱阳);河南:鸡头根;湖北:黄精肉(神农架);其他:黄姜,北黄精,冰糖渣,猪尾巴,盘龙七,山姜花。

**功效** 根茎:补气养阴,健脾,润肺,益肾。用于脾胃虚弱,体倦乏力,口干食少,肺虚燥咳,精血不足,内热消渴。

#### 7293287

*Polygonatum stenophyllum* Maxim.

**植物名** 狭叶黄精《中国植志》

**功效** 根茎:补气养阴,健脾,润肺,益肾。

#### 7293288

*Polygonatum tessellatum* Wang et Tang

**植物名** 络脉黄精《中国植志》

**药材名** 滇竹根七《汇编》

**地方名** 云南:竹根七,金不换,黄精。

**功效** 根茎:舒筋络,祛风湿,补虚。用于虚弱头昏,风湿关节痛,跌打损伤。

#### 7293289

*Polygonatum uncinatum* Diels

**植物名** 小黄精《中国植志》

**药材名** 小黄精《云南药录》

**功效** 根茎:润肺,滋补强壮,除风湿,坚筋骨。用于虚弱,劳伤,虚癆咳嗽,热病伤,心烦口渴。

#### 7293290

*Polygonatum verticillatum* (L.) All. --- *P. kansuense* Maxim. --- *P. erythrocarpum* Hua

**植物名** 轮叶黄精《中国植志》

**药材名** 羊角参《陕西中草药》

**文献名** 黄草《满蒙野卉》,仙人碗、笔管菜《满鲜植汇》,甘肃黄精《汇编》,红果黄精《中药志》

**地方名** 〔黄精〕(青海、甘肃、湖北),鸡爪参、〔北黄精〕(西北);陕西:臭儿参;甘肃:〔白药〕(兰州);青海:〔白芨〕,野白芨,“拉尼”(藏名);四川:地吊;贵州:老虎姜。

**功效** 根茎:滋补肝肾,养阴生津。用于补经衰弱,高血压病,头痛,咽喉痛,消渴,口干舌燥。

#### 7293291

*Polygonatum zanlanscianense* Pamp.

植物名 湖北黄精《中国植志》

药材名 老虎七《神农架药录》

地方名 山姜花(华南);浙江;红百合(宁波);湖北:虎其尾,野山姜;广西;竹叶黄精(全州);四川:苦黄精。

功效 根茎:杀虫。

备考 四川产湖北黄精味苦,是玉竹、黄精的掺伪品,四川根本不用。在西南地区特别是四川,苦黄精大多来源此种。本种根茎味苦者不宜入药,不可不辨。

#### 7293292

*Reineckia carnea* (Andr.) Kuntz --- *R. yunnanensis* W. W. Sm.

植物名 吉祥草《中国植志》

药材名 吉祥草《本草拾遗》、《汇编》

文献名 洋吉祥草《类证活人书》,解晕草、广东万年青《纲目拾遗》,松寿兰、结实兰、七厘麻《名实图考》,竹叶草《分类草药性》,佛顶珠《中国药植志》,滇吉祥草《汇编》,云南吉祥草《中草药学》

地方名 紫袍玉带草、玉带草(四川、云南),观音草(安徽、四川、云南),小叶万年青(安徽、广东),[竹根七](陕西、湖北、湖南、广西),竹叶青(安徽、广西、四川),小青胆(湖南、广东);陕西:竹叶七,小竹根七(平利、镇坪),打食草、土金钗(洵阳),米腊参;浙江:中叶麦冬;安徽:小青草;湖北:蛇尾七,三步两道桥,竹节七、一步三道桥、铁扁担(神农架);湖南:千里马,见国凤,宝金草,小青鱼胆、节节青、铁板钻(常德),李国卿、龙骨草(城步苗族),竹节伤,软筋藤;广东:水兰,长春草,西边兰,细叶万年青;广西:观音兰(乐业),长寿草;四川:九节莲(米易),兰花七,竹节花,鸡婆草(成都);贵州:小九龙盘;云南:千道节,分筋草(曲靖),兰花草,竹节草(丽江),[竹节参]、急心解药、散药(红河),串连草,扬风竹,竹根连,走马苔,鸡爪龙,舒筋草(西畴),伸筋散(保山),舒筋(东川),脱节草(思茅),接心解草,铜锤换玉带、铜锤玉带草(昆明),[地苦胆](大理),地蜈蚣、九节灵、两头参、淋病药(玉龙山)。

功效 全草:润肺止咳,祛风,接骨。用于肺结核,咳嗽咯血,慢性支气管炎,哮喘,风湿性关节炎。外用于跌打损伤,骨折。

#### 7293293

*Rohdea japonica* (Thunb.) Roth

植物名 万年青《中国植志》

药材名 万年青《本草新编》、《汇编》

文献名 千年润《履巇岩本草》,葹《花镜》,屋周《质问本草》,冬不凋草(汪连仕《采药书》),乌木毒《琉球志略》,万年青根《药性考》,万年青花《纲目拾遗》,开口剑、斩蛇剑《名实图考》,牛尾七、冲天七《草木便方》

地方名 白河车(江苏、浙江),[四季青]、野郁蕉(福建、湖南),九节莲(安徽、四川),包谷七(湖南、四川),[竹根七](陕西、湖南),铁扁担(安徽、江西);上海:牛尾七根,千年运,千年蕴;浙江:白重楼(开化、兰溪),铁棕桐(天台),万年青子;福建:水蕉(武平),壮元红;湖北:开喉箭(神农架);湖南:开口莲,开喉剑,牛大黄,包谷漆,苞谷七(溆浦),斩龙剑(常德),青鱼胆,金世代,

海带七,海参七,鹅不吃,蜈蚣七,海带青;四川:明阳合,太平山,山苞谷,九石马,老蛇莲(峨眉山);贵州:冬不凋,青龙胆,诸总管;云南:万年歇(文山)。

功效 根茎或全草;有小毒。清热解毒,强心利尿。用于防治白喉引起的心肌炎,咽喉肿痛,狂犬咬伤,细菌性痢疾,风湿性心脏病,心力衰竭。外用于跌打损伤、毒蛇咬伤,烧烫伤,乳腺炎,痈疽肿毒;花:用于肾虚腰痛,跌打损伤。

备考 据报导,根茎民间用于抗早孕。

#### 7293294

*Rohdea japonica* (Thunb.) Roth var. *variegata* Hort.

植物名 金边万年青《浙江药植志》

功效 根茎、叶、花或全草;有小毒。清热解毒,强心利尿。

#### 7293295

*Ruscus aculeata* L.

植物名 假叶树《中国植志》

药材名 假叶树(广西《园林药录》)

功效 全株:清热散瘀。用于感冒。外用跌打。

#### 7293296

*Scilla scilloides* (Lindl.) Druce --- *S. sinensis* (Lour.)

Merr. --- *S. thunbergii* Miyabe et Kudo

植物名 绵枣儿《中国植志》

药材名 绵枣儿《救荒本草》、《汇编》

文献名 石枣儿《救荒本草》,天蒜《本草药性备要》,老稚蒜《植物名汇》,地兰《岭南采药录》,聚铃花《科种》

地方名 地枣(东北、山东),催生草、独叶芹(东北);陕西:石枣(华山);山东:地溜子(莒南、费县、郯城、平邑、莱阳等),山蒜(长清、益都),毒蒜头(泰山),山湖蒜、乌兔蛋(五莲),八步紫(蒙山),山枣、山地枣(胶东),药狗蒜(诸城);江苏:(薤白),[鲜薤白](清江),山大蒜、双芽、屁股锥子(新海连、云台山),独叶一枝枪,[野白头](镇江),鲜白头,鲜也白野白,鲜野白头(南通),果果,果儿;浙江:老鸦蒜(嵊县),老鸦葱,一支花(温州),[石蒜](宁波),[小叶石蒜](建德),韭菜蒜(临安);广西:散血草(全州)。

功效 鳞茎或带根全草;有小毒。强心利尿,消肿止痛,解毒。用于跌打损伤,腰腿疼痛,筋骨痛,牙痛,心脏病水肿,催生。外用于干痂,乳腺炎,毒蛇咬伤。

#### 7293297

*Smilacina dahurica* Turcz. ex Fisch. et Mey.

植物名 兴安鹿药《中国植志》

药材名 兴安鹿药《长白山植药志》

地方名 吉林:鹿药(长白山)。

功效 根茎:祛风止痛,活血消肿。

#### 7293298

*Smilacina henryi* (Baker) Wang et Tang

植物名 管花鹿药《中国植志》

药材名 螃蟹七《汇编》

文献名 少穗花《秦岭植志》,鄂西鹿药《陕西中草药》

地方名 湖北:鞭杆七(神农架);四川:重药,假黄精

(峨眉山)。

功效 根茎和根:温阳补肾,祛风除湿,活血祛瘀。用于阳痿,跌打损伤,风湿关节疼痛,偏正头痛。

#### 7293299

*Smilacina japonica* A. Gray

植物名 鹿药《中国植志》

药材名 鹿药《千金·食治》、《汇编》

地方名 山麋子(东北),偏头七、狮子七(陕西、河南);黑龙江:山栗子;陕西:白窝儿七、偏头草(太白),螃蟹七;山东:雪花菜、黄蝎子根(昆嵛山),糖精(威海);湖北:铁梳子、鞭杆七(神农架);四川:土飞七、地刁、竹叶菜、重药、麻脚杆、假黄精(峨眉);贵州:九层楼(惠水),盘龙七(梵净山)。

功效 根茎和根:祛风止痛,活血消肿。用于风湿骨痛,神经性头痛。外用于乳腺炎,疖疔肿毒,跌打损伤。

#### 7293300

*Smilacina lichiangensis* (W. W. Smith) W. W. Smith

植物名 丽江鹿药《中国植志》

药材名 丽江鹿药《神农架药录》

地方名 湖北:黄精七。

功效 根及根茎:补肾益气。用于肾虚腰痛。

#### 7293301

*Smilacina oleracea* (Baker) Hook. f. et Thoms. --- *S. mientienensis* Wang et Tang

植物名 长柱鹿药《中国植志》

药材名 长柱鹿药《贵州药录》

功效 根、根茎:祛风止痛,强筋壮骨。用于头痛,劳伤,风湿,背疽,乳痈。

#### 7293302

*Smilacina paniculata* (Baker) Wang et Tang

植物名 窄瓣鹿药《中国植志》

药材名 窄瓣鹿药《峨眉药植研究》

地方名 广西:野黄姜(资源);四川:假黄精(峨眉山)。

功效 根茎:祛风除湿,壮肾阳。用于跌打损伤,疖疮肿毒。

#### 7293303

*Smilacina purpurea* Wall.

植物名 紫花鹿药《中国植志》

药材名 紫鹿药《汇编》

地方名 四川:重药。

功效 根茎和根:温阳补肾,祛风除湿,活血去瘀。

#### 7293304

*Smilax aberrans* Gagnep. --- *S. tsaii* Wang

植物名 弯梗菝葜《中国植志》

药材名 弯梗菝葜《广西药录》

文献名 凸脉菝葜《广西植录》

地方名 广西:螃蟹刺。

功效 根茎:祛风除湿。用于风湿痹痛。

#### 7293305

*Smilax aspericaulis* Wall. ex A. DC.

植物名 疣枝菝葜《中国植志》

文献名 草薺《云南药录》

地方名 云南:白草薺(昆明)。

功效 根茎:祛风,解热毒。用于感冒,风湿热。

#### 7293306

*Smilax bockii* Warb.

植物名 西南菝葜《中国植志》

文献名 金刚藤《西藏中草》,菝葜、藏金刚藤《汇编》

功效 根茎:祛风,活血,解毒。用于风湿腰痛,跌打损伤,瘰癧。

#### 7293307

*Smilax bracteata* Presl --- *S. stenopetala* A. Gray --- *S. lyi* Levl.

植物名 圆锥菝葜《中国植志》

药材名 圆锥菝葜《广西药录》

地方名 广西:白金刚(博白)。

功效 根茎:祛风除湿,消肿止痛。用于风湿痹痛,跌打损伤。

#### 7293308

*Smilax chapaensis* Gagnep.

植物名 密疣菝葜《中国植志》

药材名 密疣菝葜《贵州药录》

功效 根:清热解毒,消肿散结。用于筋骨酸痛,皮肤瘙痒,白癜风,风湿脚气,血崩,血尿,乳糜尿,梅毒,带下。

#### 7293309

*Smilax china* L. --- *S. japonica* A. Gray

植物名 菝葜《中国植志》

药材名 菝葜《别录》、《汇编》

文献名 金刚根、王瓜草《日华子本草》,金刚骨《儒门事亲》,金刚藤《履巉岩本草》,山犁儿、金刚树、铁刷子《救荒本草》,铁菱角《纲目》,金剛刺《医林纂要》,金剛头、假草薺、山菱角、霸王引《岭南采药录》,拔谷、金剛拙、荆岗沙、和山归来《新纲》,山归来《小泉药植》,净光子、野白茹《土农药志》,红灯果《简明中医辞典》

地方名 〔白土茯苓〕、〔白土苓〕(江苏、浙江、广东、四川、贵州),〔草薺〕、〔红草薺〕(陕西、四川、云南),〔土茯苓〕(江苏、台湾、广东),蜚壳刺(福建),筋骨柱子(江苏、安徽),马鞍宫(江西、广东),马加勒、狗骨头(安徽、江西),普帖(福建、广东);山东:大青草筋(威海),串地灵、串地铃(青岛),青草筋(烟台),金剛果(崂山);江苏:沟谷刺(镇江);上海:红刺根;浙江:韦陀鞭,白合刺,白眼刺,红根刺,刺根(温州、永嘉),铁棱壳,蒲鞋刺;江西:马加筋兜,〔飞天蜈蚣〕(婺源),巴巴芳兜(吉安);福建:马加辣(宁化),马夹棘、马古棘(清流),马克刺、斑树尾(永安),仙灵膏药、大甲霞菝葜(三明),猴首刺、子刺(大田),木蟹刺(松政),狗骨刺(厦门),铁孩儿(泉州),豺狗刺,犬骨刺头,马卡刺,白棘刺,光饼刺,木来葵,马革草,地龙骨,刺宜;台湾:蜚壳藤;湖北:金巴斗,金巴兜;湖南:龙山虎,坐山虎,小叶金刚,金刚连,金刚摇,天梭角,鲇鱼须,铜藤,蚂蟥藤,螃蟹藤,钉耙脑(常德),螃蟹刺兜(溆浦);广东:马甲,马甲筋,马甲藤,

马甲头、车夹箭头、铁刺苓、狗尾天雄(潮阳),冷饭头,硬饭头;广西:九牛力(乐业),土太,鸡肝根,路边刷,红金刚藤(岑溪),金刚力(资源);四川:乌鱼刺,冷饭巴,饭巴沱,饭巴泽,金刚藤头;贵州:龙爪菜,铁罗汉。

**功效** 根茎:祛风利湿,解毒消肿。用于风湿关节痛,跌打损伤,胃肠炎,痢疾,消化不良,糖尿病,乳糜尿,白带,癌症;叶:外用于癰疽疔疮,烫伤。

## 7293310

*Smilax chingii* Wang et Tang

**植物名** 柔毛菝葜《中国植志》

**药材名** 柔毛菝葜《贵州药录》

**功效** 根:清热解暑,消肿散结。用于筋骨酸痛,皮肤瘙痒,白癜风,风湿脚气,血崩,血尿,乳糜尿,梅毒,带下。

## 7293311

*Smilax cocculoides* Warb.

**植物名** 银叶菝葜《中国植志》

**药材名** 银叶菝葜《峨眉药植资源》

**文献名** 鲢鱼须《名实图考》

**地方名** 湖北:土茯苓(恩施),钉耙菝(神农架);四川:金刚藤(峨眉山),[草薷]。

**功效** 块茎:清热解暑,利湿。

## 7293312

*Smilax corbularia* Kunth

**植物名** 筐条菝葜《中国植志》

**药材名** 筐条菝葜《广西药录》

**文献名** 粉叶菝葜《广西植志》

**地方名** 云南:仙遗粮,土茯苓,冷饭团。

**功效** 块茎:用于风湿,跌打损伤;全株:外用于癰疽疮肿毒。

## 7293313

*Smilax corbularia* Kunth var. *woodii* (Merr.) T. Koyama  
--- *S. amaurophlebia* Merr.

**植物名** 光叶菝葜《中国植志》

**文献名** 细枝菝葜《海南植志》,金刚《中草药》

**功效** 根瘤:抗菌。

## 7293314

*Smilax cyclophylla* Warb.

**植物名** 合蕊菝葜《中国植志》

**药材名** 合蕊菝葜《峨眉药植研究》

**文献名** 白茯苓藤、竹节、药刺藤《植物名汇》

**地方名** 四川:金刚藤(峨眉山),[草薷]。

**功效** 块茎:清热解暑,利湿。

## 7293315

*Smilax davidiana* A. DC.

**植物名** 小果菝葜《中国植志》

**文献名** 小菝葜《浙江药植志》

**地方名** 浙江:小叶金刚刺(龙泉)。

**功效** 根茎及叶:祛风利湿,解毒消肿。

## 7293316

*Smilax discotis* Warb.

**植物名** 托柄菝葜《中国植志》

**药材名** 托柄菝葜《汇编》

**文献名** 短柄菝葜《中药大辞典》

**地方名** 湖北:丁耙刺(神农架);广东:金刚须;四川:金刚藤(峨眉山),[草薷];贵州:土茯苓;云南:菝葜(昆明);其他:金刚豆藤。

**功效** 根茎:清热利湿,补虚益损,活血,止血。用于风湿骨痛,痿弱干瘦,血崩,血尿。

## 7293317

*Smilax ferox* Wall. ex Kunth --- *S. megalantha* C. H. Wright

**植物名** 长托菝葜《中国植志》

**药材名** 刺草薷《汇编》

**文献名** 刺菝葜《红河中草药》,大花菝葜《广西植志》

**地方名** 湖北:小金钢刺(神农架);四川:大菝葜;贵州:土茯苓;云南:红草薷(昆明),芦须叶,美人扇,草薷。

**功效** 根茎:祛风利湿,解疮毒。用于风湿筋骨疼痛,跌打损伤,小便浑浊,糜烂,皮肤过敏,湿疹。

## 7293318

*Smilax glabra* Roxb. --- *S. trigona* Warb. --- *S. calophylla* Wall. var. *concolor* C. H. Wright

**植物名** 土茯苓《中国植志》

**药材名** 土茯苓《纲目》、《药典》

**文献名** 禹余粮、白余粮《本草经集注》,草禹余粮《本草拾遗》,刺猪苓《图经》,过山龙、硬饭(朱氏集验医方),冷饭团《卫生杂兴》,山猪糞、山地栗、过冈龙、仙余粮《纲目》,山牛《本经逢原》,冷饭头《生草药性备要》,山归来《有用植物图说》,公茯苓藤《植物名汇》,红草薷、川草薷《中药材手册》,光叶菝葜《广州植志》,蓝果土茯苓《广西植志》,光菝葜《滇南本草》整理本)

**地方名** 山遗粮(浙江、安徽、江西、广东、广西),狗哨茹(华南),山奇良、山奇根、奇良、奇根、仙奇良、羊舌藤(浙江、江西),地茯苓(湖南、广西),狗朗头(湖南、广东、广西),久老薯(湖南、广东、广西),[仙遗粮](福建、湖南、广西),硬饭头(江西、广东);江苏:鲜土苓;浙江:山硬硬,白葵,连饭;江西:狗卵子(德兴),烂饭头,鲜奇良;福建:山加刀尺(大田),山洋(三明),山猪仔、毛尾薯、铁孩儿(泉州),山尾薯(周宁),硬饭藤(宁化、清流、安溪),硬饭藤子(宁化),猪屎团、解毒散(光泽),猪屎堂郎串、糯饭子(清流);湖南:十八陀,仙人换,冷饭陀,进山虎;广东:马甲箭,尖尾叶,狗朗薯,绵鼻子藤,尖光头;海南:山骨藤;广西:狗老薯,硬饭头薯,狗佬薯,地胡苓,见风消;四川:土苓,红土苓,红土茯苓(南充);贵州:金刚豆藤;云南:九牛力,千斤力、龙须菜(文山),三股筋(昆明),花草薷(玉溪),花藤(红河),草薷藤(曲靖);其他:“比都独”(苗语),山猪肥。

**功效** 根茎:除湿,解毒,通利关节。用于湿热淋浊,带下,痼肿,瘰癧,疥癣,梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛,筋骨疼痛。

## 7293319

*Smilax glauco-china* Warb.

植物名 黑果菝葜《中国植志》  
 药材名 粉菝葜《汇编》  
 文献名 龙须草、鲑鱼须《救荒本草》，金刚藤《简易草药》

地方名 江苏：后娘藤；湖北：铁泥巴果、铁篱巴果、寡母子（鹤峰），鲑鱼须，小金钢藤（神农架）；四川：冷饭巴、饭巴坨，铁菱角，金刚藤头，卑藤（峨眉山）；贵州：草蕨，金刚豆。

功效 根茎、嫩叶：清热，除风毒；根茎：清热利尿，解毒除湿。用于崩带，血淋，瘰癧，跌打损伤；嫩叶：外用于瘰癧，疮疖。

## 7293320

*Smilax hypoglauca* Benth.

植物名 粉背菝葜《中国植志》

药材名 粉背菝葜《广西药录》

功效 根茎：清热，除湿，解毒，散结。用于跌打损伤，风湿痹痛。

## 7293321

*Smilax kwangsiensis* Wang et Tang

植物名 缘毛菝葜《中国植志》

药材名 缘毛菝葜《广西药录》

功效 根茎：用于风湿骨痛。

## 7293322

*Smilax lanceifolia* Roxb. --- *S. micropoda* A. DC.

植物名 马甲菝葜《中国植志》

药材名 马甲菝葜《贵州药录》

地方名 贵州：白茯苓。

功效 根：清热解暑，消肿止痛。用于皮肤瘙痒，梅毒，小便不利。

## 7293323

*Smilax lanceifolia* Roxb. var. *opaca* A. DC. --- *S. opaca* (A. DC.) Norton

植物名 暗色菝葜《中国植志》

药材名 白土苓（四川南充）

文献名 暗色土茯苓、白茯苓《汇编》

地方名 广西：长叶菝葜，金刚刺；四川：土苓，土茯苓（南充），白土茯苓。

功效 根茎：解毒，除湿，通利关节。用于梅毒恶疮，拘挛骨痛，湿热痒疹，解汞中毒。

## 7293324

*Smilax lanceifolia* Roxb. var. *elongata* (Warb.) Wang et Tang

植物名 折枝菝葜《中国植志》

药材名 折枝菝葜《广西药录》

功效 根茎：解毒，除湿。用于风湿痹痛。

## 7293325

*Smilax lanceifolia* Roxb. var. *impressinervia* (Wang et Tang) T. Koyama --- *S. impressinervia* Wang et Tang

植物名 凹脉菝葜《中国植志》

药材名 凹脉菝葜《广西药录》

功效 根茎：解毒，除湿。用于风湿痹痛。

## 7293326

*Smilax lebrunii* Levl. --- *S. megalantha* C. H. Wright var. *asperata* Wang

植物名 粗糙菝葜《中国植志》

药材名 粗糙菝葜《广西药录》

功效 根茎：消肿止痛，祛风除湿。用于跌打损伤，风湿痹痛。

## 7293327

*Smilax lunglingensis* Wang et Tang --- *S. siderophylla* Hand. - Mazz.

植物名 马钱叶菝葜《中国植志》

药材名 白草蕨《汇编》

文献名 白菝葜《日华子本草》，草蕨《滇南本草》，铁叶菝葜《汇编》

地方名 云南：刺草蕨，金刚藤，花草蕨，滑杆白草蕨；其他：铁丝根。

功效 根茎：祛风除湿，清热利尿。用于风湿筋骨疼痛，肠炎，痢疾，膀胱炎，小便不利。

## 7293328

*Smilax mairei* Levl.

植物名 无刺菝葜《中国植志》

药材名 红草蕨（云南）、《汇编》

文献名 小红草蕨、滇红草蕨《名实图考》，滇红菝葜《汇编》

地方名 草蕨（云南、四川）；云南：小草蕨，土茯苓，花花藤、花草蕨、金刚藤（红河），羊奶头，打不死；西藏：“八渣罗玛查瓦”（藏名）。

功效 根茎：祛风除湿，调经，利尿。用于风湿性关节炎，泌尿系感染，肾炎水肿，慢性胃炎，月经不调。

## 7293329

*Smilax menispermoides* A. DC.

植物名 防己叶菝葜《中国植志》

药材名 防己叶菝葜《青藏药图》

地方名 青海：“折尔牛”（藏名）；湖北：金扒莢（神农架）；云南：草蕨；西藏：土茯苓。

功效 根：用于气管炎，咳嗽。

## 7293330

*Smilax microphylla* C. H. Wright

植物名 小叶菝葜《中国植志》

药材名 乌鱼刺《汇编》

地方名 四川：地茯苓藤

功效 块茎：清热解暑，祛湿消肿。用于红崩，白带，颈淋巴结结核，疮疖，跌打损伤。

## 7293331

*Smilax nana* Wang

植物名 矮菝葜《中国植志》

药材名 刺瓜米草（贵州贵阳）

地方名 贵州：刺梭罗（铜仁）

功效 根：清热，利尿，驱风。用于风湿性关节炎，发烧，小便赤。

## 7293332

*Smilax nigrescens* Wang et Tang ex P. Y. Li

植物名 黑叶菝葜《中国植志》

地方名 陕西:威灵仙;其他:铁丝灵仙、铁丝威灵仙(个别地区)。

功效 根茎及根:祛风湿,通经络。

#### 7293333

*Smilax nipponica* Miq.

植物名 白背牛尾菜《中国植志》

药材名 大伸筋《中药志》

文献名 马尾伸筋《江西草药》,长叶牛尾菜《中药大辞典》,粗梗牛尾菜《浙南本草新编》

地方名 湖南:大叶伸筋,水摇竹,水球花,牛尾节,牛尾卷,牛尾蕨,牛尾伸筋,龙须草,白部伸筋,〔伸筋草〕,软叶菝葜,鱼尾蕨、金刚摇、穿边竹(衡阳),瑶山竹藤(衡山);贵州:竹根七。

功效 根茎及根:舒筋活血,通络止痛。用于腰腿筋骨疼痛。

#### 7293334

*Smilax ocreata* A. DC.

植物名 抱茎菝葜《中国植志》

药材名 抱茎菝葜《广西药录》

地方名 广西:大金刚(乐业)。

功效 全株:外用于疮疡肿毒;根茎:祛风湿,强筋骨。用于跌打损伤,风湿痹痛。

#### 7293335

*Smilax perfoliata* Lour.

植物名 穿鞘菝葜《中国植志》

文献名 大托菝葜《广西植录》,穿耳菝葜《高植图鉴》,翅柄菝葜《海南植志》,穿叶菝葜《西双版纳傣药志》

地方名 广西:九牛力;云南:“嘿啷猫”(西双版纳傣语);其他:川太,大托叶菝葜。

功效 根茎:健脾益胃,强筋壮骨。用于风湿腰痛,胃腹胀痛,气虚耳鸣。

#### 7293336

*Smilax rigida* Wall. ex Kunth

植物名 劲直菝葜《中国植志》

功效 根茎:祛风湿,活血脉,消炎镇痛。

#### 7293337

*Smilax riparia* A. DC. --- *S. herbacea* L. var. *angusta* C. H. Wright

植物名 牛尾菜《中国植志》

药材名 牛尾菜《救荒本草》、《汇编》

地方名 白须公(浙江、广西),牛尾结(福建、广东),草菝葜(陕西、福建),老龙须(江西、湖北);陕西:大伸筋草,背梁骨(周至);山东:米儿菜(昆崙山),马虎铃铛(崂山);浙江:牛舌菜(临安),〔千层塔〕(开化),狗骨头刺(平阳),鲤须(金华);江西:马尾伸根(吉安),山豇豆;福建:七层楼(三明),大通筋(长汀、同安、上杭、厦门、南平、闽侯),辣藤(大田),糯米饭(永安);湖北:大伸筋,大分筋,龙骨伸筋(恩施),青牛藤,尖叶牛尾菜;湖南:山竹花,摇边竹;广东:土春根;广西:多须公,牛尾蕨(凌云),软叶菝葜;四川:刺瓜米草,草薺(峨眉山);贵州:金刚豆藤;其他:马尾伸筋。

功效 根及根茎:祛风活络,祛痰止咳。用于风湿性关节炎,筋骨疼痛,跌打损伤,腰肌劳损,支气管炎,肺结核咳嗽咯血。

#### 7293338

*Smilax riparia* A. DC. var. *acuminata* (C. H. Wright) Wang et Tang --- *S. herbacea* L. var. *acuminata* C. H. Wright

植物名 尖叶牛尾菜《中国植志》

药材名 尖叶牛尾菜《神农架药录》

地方名 湖北:独角分筋、龙骨分筋、黄龙须、连鱼须(神农架)。

功效 根茎:祛风除湿,舒筋活络。

#### 7293339

*Smilax scobinicaulis* C. H. Wright

植物名 短梗菝葜《中国植志》

药材名 铁丝灵仙《汇编》

文献名 黑刺菝葜《秦岭植志》,粘鱼须菝葜《鉴别手册》,铁丝威灵仙《中药志》

地方名 金刚刺(陕西、甘肃),威灵仙(河北、陕西、河南);陕西:金刚藤;湖北:金钗刺(神农架);其他:铁丝根,铁灵仙,铁杆威灵仙,铁脚威灵仙

功效 根茎及根:祛风湿,通经络。用于风湿性关节炎,关节不利。

#### 7293340

*Smilax sieboldii* Miq.

植物名 华东菝葜《中国植志》

药材名 铁丝灵仙《汇编》

文献名 粘鱼须草(王安卿《采药志》),粘鱼须《高植图鉴》,铁丝根《简明中医辞典》,铁丝威灵仙《中药志》

地方名 倒钩刺(陕西、甘肃),铁脚威灵仙(河北、山东);河北:威灵仙,铁灵仙;山西:粘鱼须菝葜;山东:老虎杆(莱阳),贞草筋(昆崙山、海阳),东风藤(牙山),金蛤蟆蔓(崂山),雀儿筋(蓬莱)。

功效 根及根茎:祛风湿,通经络。用于风湿性关节炎,关节不利。

#### 7293341

*Smilax stans* Maxim. --- *S. pekingensis* A. DC. --- *S. vaginata* Decne. var. *stans* (Maxim.) T. Koyama

植物名 鞘柄菝葜《中国植志》

药材名 铁丝灵仙(西北)

文献名 鞘叶菝葜《中国经植志》,北京菝葜《汇编》

地方名 〔威灵仙〕(甘肃、河南);甘肃:鞘菝葜;湖北:丁巴莨(神农架);四川:萆薢(峨眉山);其他:倒拉车。

功效 根茎及根:祛风除湿,通络止痛。用于风湿性关节炎,关节不利。

#### 7293342

*Smilax tetraptera* Gagnep.

植物名 四翅菝葜《中国植志》

药材名 四翅菝葜《广西药录》

地方名 广西:花金刚(龙州)。

功效 全株:祛风除湿。用于风湿痹痛。

## 7293343

*Smilax trachypoda* Norton

植物名 糙柄菝葜《中国植志》

文献名 毛柄菝葜《秦岭植志》

地方名 湖北:金钢刺根(神农架);四川:菝葜(峨眉  
山),白芥花。

功效 块茎:清热解毒,利湿。

## 7293344

*Speirantha gardenii* (Hook.) Baill.

植物名 白穗花《中国植志》

文献名 白穗草《江西药录》

地方名 浙江:[白河车](天目山);江西:苍竹。

功效 根茎:凉血解毒,活血祛瘀。用于劳伤乏  
力,感冒头痛,鼻塞。

## 7293345

*Streptopus obtusatus* Fassett --- *S. geniculatus* Wang et  
Tang

植物名 扭柄花《中国植志》

药材名 扭柄花《神农架药录》

地方名 湖北:竹林消(神农架)。

功效 根茎:健脾消食,利湿。

## 7293346

*Streptopus parviflorus* Franch.

植物名 小花扭柄花《中国植志》

药材名 小花算盘七(云南)

地方名 四川:高山竹林消。

功效 根:消食健脾,利湿。

## 7293347

*Streptopus simplex* D. Don

植物名 腋花扭柄花《中国植志》

药材名 算盘七《汇编》

文献名 单茎算盘七《中药大辞典》,竹林消《西藏中  
草》,算盘七《云南种录》地方名 陕西:鸡爪参,野参须;四川:黄瓜菜(峨  
眉);西藏:“女植”(藏名)。功效 根:清肺止咳,健脾和胃。用于肺热咳嗽,  
脾胃不和,心慌气短,筋骨疼痛。

## 7293348

*Thysanotus chinensis* Benth.

植物名 异蕊草《中国植志》

药材名 异蕊草《广西药录》

地方名 广西:化骨龙(钦州)。

功效 全草:用于骨鲛喉。

## 7293349

*Tofieldia divergens* Bur. et Franch. --- *T. yunnanensis*  
Franch.

植物名 叉柱岩菖蒲《中国植志》

药材名 小扁草《彝药志》

文献名 云南岩菖蒲《云南种录》,九节莲《高植图  
鉴》地方名 云南:“苦鼻麻热诺起”(楚雄彝名),化药,  
金星凤尾草,扁竹兰,扁竹参,复生草,消疳草。功效 全草:利尿,调经,滋阴补虚。用于水肿,头  
晕,耳鸣,小儿营养不良,月经不调,胃痛,小儿腹泻。

## 7293350

*Tofieldia tibetica* Franch. --- *T. setchuenensis* Franch.

植物名 岩菖蒲《中国植志》

药材名 岩菖蒲《峨眉药植资源》

文献名 四川岩菖蒲、[石菖蒲]《峨眉药植资源》,石  
竹根《高植图鉴》地方名 四川:岩知母、六月籍、山知母(峨眉),阴阳  
番(武隆),岩飘子。功效 块茎:行气止痛,开窍,散寒;全草:解毒。  
用于疯狗咬伤。

## 7293351

*Tricyrtis formosana* Baker

植物名 台湾油点草《中国植志》

药材名 溪樵《台湾中药材图鉴》

功效 全草:外用于眼病。

## 7293352

*Tricyrtis macropoda* Miq.

植物名 油点草《中国植志》

药材名 油点草《广西药录》

文献名 粗轴油点草、红酸七《汇编》,粗柄油点草  
《浙江药植志》地方名 浙江:水杨罗(临安),红梗七(天目山);四  
川:烙铁草,黑点草;贵州:白七(雷山),牛尾参(惠水)。功效 全草及根:补虚止咳,消积止痛。用于肺结  
核咳嗽,暑热腹痛,痞块。

## 7293353

*Tricyrtis maculata* (D. Don) Machride --- *T. pilosa*  
Wall. --- *T. bakerii* Koidz.

植物名 黄点油点草《中国植志》

药材名 黑点草《汇编》

文献名 疏毛油点草《广西植录》,柔毛油点草《四川  
中药志》地方名 黄瓜菜(陕西、四川);陕西:大黄瓜香,瓜米  
菜;湖北:黄瓜香(神农架);四川:山黄瓜(峨眉、南川),  
立竹根。功效 全草及根:安神除烦,活血消肿;全草:用于  
口渴,烦躁不安,跌打损伤,风疹搔痒;根:用于肺结核  
咳嗽,暑热腹痛,痞块。

## 7293354

*Trillium govanianum* Wall. ex Royle

植物名 西藏延龄草《中国植志》

药材名 藏延龄草《汇编》

功效 根茎及根:有小毒。镇静止痛,止血,解毒。

## 7293355

*Trillium kamtschaticum* Pall. ex Pursh

植物名 吉林延龄草《中国植志》

药材名 头顶一棵珠《汇编》

文献名 白花延龄草《中国药植志》,大花延龄草《牧  
野日图》,头顶珠《汇编》

功效 根茎及根:有小毒。镇静止痛,止血,解毒。

用于眩晕头痛,高血压,神经衰弱,跌打损伤,腰腿疼痛,月经不调,崩漏。外用于疔疮。

## 7293356

*Trillium tschonoskii* Maxim.

植物名 延龄草《中国植志》

药材名 头顶一棵珠《汇编》

文献名 华延龄草《浙江药植志》

地方名 三角七(陕西、四川),黄花三七(浙江、安徽);陕西:芋儿七(眉县),鱼儿七(凤县),狮子七、尸儿七(太白);浙江:烂屁股三七(临安);湖北:地珠(根),天珠(果实),头顶珠(神农架);四川:玉儿七,头上一颗珠,佛手七,三叶一枝花(峨眉山);云南:“入河”(纳西语)。

功效 根茎、根:有小毒。镇静止痛,止血,解毒。用于眩晕头痛,高血压病,神经衰弱,跌打损伤,腰腿疼痛,月经不调,崩漏。外用于疔疮;果实:用于失眠。

## 7293357

*Tulipa edulis* (Miq.) Baker

植物名 老鸦瓣《名实图考》、《中国植志》

药材名 光慈菇《品种论述》

文献名 山慈姑、金灯《纲目》,山慈菰《花镜》,老鸦头、棉花包《名实图考》,朱姑、无义草、老鸦蒜《中国药植志》,茅山菰《新修东洋县志》

地方名 光慈(浙江、江西、福建、广东),山慈菇(山西、浙江、江西、福建、广东),毛姑(江苏、湖南);吉林:尖茨菇、[尖贝](通化);山西:山蛋,[贝母];甘肃:小慈姑(兰州);江苏:[毛慈姑],毛地栗,毛地梨;浙江:[土贝母](寿昌);安徽:双鸭子、双椅子(滁县琅琊山);福建:田苏(厦门);湖南:山茨菇,野薤子;其他:毛勃荪,双姑。

功效 鳞茎:有小毒。消肿散结,解毒。用于淋巴结核,痈肿;花:通淋,止血。用于血淋涩痛。

## 7293358

*Tulipa gesneriana* L.

植物名 郁金香《中国植志》

药材名 郁金香《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 郁香《太平御览》,[红蓝花]、紫述香《纲目》,茶矩摩、草麝香《本草新注》

地方名 北京:洋荷花。

功效 花:“主一切臭,除心腹间恶气鬼疰,入诸香药用之”;鳞茎:镇静。用于脏躁症。

## 7293359

*Tulipa iliensis* Regel

植物名 伊犁郁金香《中国植志》

药材名 伊犁光慈菇《汇编》

文献名 新疆山慈姑《鉴别手册》,光慈菇《沙漠药植》,伊犁山慈姑《中药大辞典》

地方名 新疆:山慈菇,老鸦瓣,“克尔克孜”(维名)。

功效 鳞茎:有小毒。清热解毒,消肿散结。

## 7293360

*Tupistra aurantiaca* Wall. ex Baker

植物名 橙花开口箭《中国植志》

文献名 黄花开口箭《汇编》

地方名 云南:大心不干(马关),心不甘。

功效 根茎:强心,消肿;根:用于胃痛。

## 7293361

*Tupistra chinensis* Baker - *Campylandra kwangtungensis* Dandy

植物名 开口箭《中国植志》

药材名 开口箭《名实图考》、《汇编》

文献名 斩蛇剑《名实图考》,广东扁竹枝《广西植志》,台湾开口箭《高植图鉴》

地方名 牛尾七(湖北、四川、陕西);陕西:竹根参,竹节七,大竹根七(镇坪、平利),竹根七(秦岭);湖北:虎尾七(神农架);湖南:化骨莲,苞谷三七;广西:万年青,开口剑,开喉箭,巴林麻,老蛇莲,晒不干(百色),斩蛇剑;四川:万年把,山萝卜,山苞谷,凤尾七,凤尾漆,冲天七,刺漆;贵州:青龙胆;云南:心不干,石风丹,岩七。

功效 根茎:有毒。清热解毒,散瘀止痛。用于白喉,风湿关节痛,腰腿痛,跌打损伤,狂犬咬伤,毒蛇咬伤。外用于痈疮肿毒。

## 7293362

*Tupistra delavayi* Franch.

植物名 筒花开口箭《中国植志》

药材名 筒花开口箭《贵州药录》

地方名 湖北:开口箭、[万年青](神农架);贵州:万年把,猪管道。

功效 根茎:清热泻火,强心利尿。用于骨蒸劳热,咽喉痛,月经不调,浮肿,风湿性心脏病。

## 7293363

*Tupistra ensifolia* Wang et Tang

植物名 剑叶开口箭《中国植志》

药材名 岩七《汇编》

文献名 搜山虎《中药大辞典》

地方名 云南:小万年青,竹节七。

功效 根茎:有毒。清热解毒,利尿消肿,活血止痛。用于喉炎,扁桃体炎,肾炎水肿。外用于骨折肿痛,疮疖,跌打损伤,腰痛。

## 7293364

*Tupistra fimbriata* Hand. - Mazz.

植物名 齿瓣开口箭《中国植志》

药材名 流苏开口箭《汇编》

文献名 云南铁扁担《汇编》,须瓣开口箭《高植图鉴》

地方名 云南:大心不甘;其他:竹根七,万年青,心不甘。

功效 根茎、全草:有小毒。清热解毒,强心利尿,舒筋活血。用于心脏性水肿,毒蛇咬伤,跌打损伤,风湿痛,胃痛,外伤出血。

## 7293365

*Tupistra fungilliformis* Wang et S. Y. Liang

植物名 伞柱开口箭《中国植志》

药材名 伞柱开口箭《广西药录》



功效 根茎:有毒。用于跌打损伤,骨折。

#### 7293366

*Tupistra grandistigma* Wang et S. Y. Liang

植物名 长柱开口箭《中国植志》

药材名 长柱开口箭《广西药录》

功效 根茎:用于跌打损伤,骨折。

#### 7293367

*Tupistra jinshanensis* Z. L. Yang et X. G. Luo

植物名 金山开口箭《云南植物研究》

药材名 细叶牛尾七《四川南川》

功效 根茎:强心利尿,舒筋活血。

#### 7293368

*Tupistra liangshanensis* Z. Y. Zhu

植物名 凉山开口箭《植分学报》

地方名 四川:蜡烛棒。

功效 根茎:活血祛瘀,祛风除湿,益气,解毒。用于咳血,吐血,肺癆咳嗽,痰涎壅塞,肾虚腰痛,风湿麻木,跌打损伤,蛇虫咬伤,红肿疮毒。

#### 7293369

*Tupistra tui* (Wang et Tang) Wang et Liang --- *Rohdea tui* Wang et Tang

植物名 磷花开口箭《中国植志》

药材名 磷花开口箭《峨眉药植研究》

地方名 四川:小赶山鞭《峨眉山》。

功效 全草:益气,活血,解毒,清肺热。

#### 7293370

*Tupistra verruculosa* Q. H. Chen

植物名 疣点开口箭《植分学报》

功效 根茎:滋补。用于水肿。

#### 7293371

*Tupistra wattii* (C. B. Clarke) Hook. f. --- *Campylandra cauliflora* Chun

植物名 弯蕊开口箭《中国植志》

药材名 见血封口《汇编》

文献名 茎花扁竹枝《广西植录》,柄叶开口箭《汇编》,扁竹兰《云南中草药》

地方名 广西:老蛇莲(凌云、德保),山万年青;贵州:牛尾七;云南:小内哨(西畴),心不干(红河),白跌打(大理),见血封喉,〔石南藤〕;其他:竹叶兰,岩七,石枫丹,柄叶竹根七。

功效 根茎或全草:有毒。清热解毒,散瘀止痛。用于感冒,咽喉炎,扁桃体炎,支气管炎,牙痛,胃痛,胃出血,膀胱炎。外用于跌打损伤,骨折,外伤出血。

#### 7293372

*Veratrum dahuricum* (Turcz.) Loes. f. --- *V. album* L. var. *dahuricum* Turcz.

植物名 兴安藜芦《中国植志》

药材名 兴安藜芦《汇编》

文献名 毛叶藜芦《东北药植志》

功效 根部或带根全草:有毒。祛痰,催吐,杀虫;根:对妊娠毒血症有良好效果。

#### 7293373

*Veratrum grandiflorum* (Maxim.) Loes. f. --- *V. puberulum* Loes. f.

植物名 毛叶藜芦《中国植志》

药材名 毛叶藜芦《峨眉药植研究》

文献名 东云草《和汉药标本目录》,蒜藜芦《中药大辞典》,大花藜芦《云南种录》

地方名 藜芦(湖南、四川);四川:人头发(峨眉山),棕包头,毒药草,翻天印;其他:小棕,岩棕。

功效 根部或带根全草:有毒。祛痰,催吐,杀虫。

#### 7293374

*Veratrum japonicum* (Baker) Loes. f. --- *V. atrovio-laceum* Loes. f. --- *V. nigrum* L. var. *japonicum* Baker

植物名 黑紫藜芦《中国植志》

药材名 黑紫藜芦《中药志》

文献名 藜芦《和汉药标本目录》,日本藜芦《广西植录》

地方名 七厘丹(福建、广西);浙江:纤维藜芦;台湾:山蒜头;广西:人头发,棕榈草。

功效 根茎:接骨止血,散瘀活血,催吐。用于骨折,截瘫,癫痫,跌打。外用于外伤出血,疥癣。

#### 7293375

*Veratrum maackii* Regel

植物名 毛穗藜芦《中国植志》

药材名 毛穗藜芦《汇编》

文献名 马氏藜芦《中国药植志》,旱葱、毒药草、七厘丹《简明中医辞典》

地方名 吉林:蒜藜芦。

功效 根部或带根全草:有毒。祛痰,催吐,杀虫。

#### 7293376

*Veratrum mengtzeanum* Loes. f.

植物名 蒙自藜芦《中国植志》

药材名 小棕包《汇编》

文献名 小天蒜《云南经植》,老鸦蒜《玉龙山药植》,小棕苞《云南种录》

地方名 贵州:岩棕;云南:小毒蒜、小藜芦、披麻草、细毒蒜、牛挣药、绿蒜、绿葱、绿葱花(红河),千层皮、倒药(文山),小兰草,棕包头,黄龙须,翻天印,藜芦。

功效 根、全草:有毒。活血散瘀,止血镇痛,催吐利水。用于跌打损伤,骨折,水肿。外用于外伤出血;根:用于狂躁型精神病。

#### 7293377

*Veratrum nigrum* L. --- *V. oblongum* Loes. f. --- *V. nigrum* L. var. *ussuriense* Loes. f.

植物名 藜芦《中国植志》

药材名 藜芦《本经》、《汇编》

文献名 葱苒《本经》,葱葵、山葱、丰芦、葱葵、公苒《吴普本草》,葱葵《别录》,梨芦《本草经集注》,葱白藜芦《图经》,葱葱《儒门事亲》,葱芦、丰芦、葱管藜芦《纲目》,喷嚏草《满鲜植汇》,山棕、乌藜、朴草、朴乌伊、日本兰、鼠葵、藜芦《新纲》,长叶藜芦《神农架药录》

地方名 大藜芦(东北),人头发(江西、四川),七厘丹(浙江、江西),〔翻天印〕(贵州、四川、湖北、浙江);吉

林;老旱葱,“把克塞”(朝名);辽宁:山白菜,山苞米,芦莲,药蝇子草;河北:大叶藜,鹿苏,鹿葵;内蒙古:“阿格西日嘎”(蒙名),黑藜芦;陕西:搜山虎(秦岭);甘肃:一马光(文县);山东:旱葱(泰山),苍蝇草(烟台),寒葱;浙江:黑假藜芦(湖州),观音带(杭州),铁扁担,棕毛根,棕榈三七,山棕榈;安徽:仙人带;江西:千年棕,棕山兜,棕包脚;四川:毒药草,棕包头(南川);贵州:小棕,岩棕,小棕根;其他:大叶藜芦,小棕榈,大芦林,地棕,里香,金丹,棕榈草。

功效 根部或带根全草;有毒。祛痰,催吐,杀虫。用于中风痰壅,癫痫,疟疾,骨折。外用于疥癣,秃疮,火蝇蛆。

## 7293378

*Veratrum omeiensis* Wang et Tang

植物名 峨眉藜芦《峨眉药植资源》

药材名 峨眉藜芦(四川)

地方名 四川:藜芦、人头发(峨眉山)。

功效 鳞茎及根:祛风,行瘀,消肿,催吐,祛痰。

## 7293379

*Veratrum oxyssepalum* Turcz. --- *V. dolichopetalum* Loes. f. --- *V. patulum* Loes. f.

植物名 尖被藜芦《中国植志》

文献名 白藜芦《和汉药标本目录》,山藜芦《和汉药植》,白蒜藜芦《杀虫植物》,蒜藜芦《中国植物图鉴》,绿花藜芦、光脉藜芦《东北药植志》,毛脉藜芦《吉野》,光纵脉藜芦《东北植药图志》

地方名 藜芦(东北)。

功效 不带根全草;有毒。祛痰,催吐,杀虫。

## 7293380

*Veratrum schindleri* Loes. f. --- *V. maximowiczii* C. H. Wright

植物名 牯岭藜芦《中国植志》

药材名 牯岭藜芦《湖南药物志》

文献名 邢氏藜芦《中国药植志》,天目藜芦《中药志》,闽浙藜芦《高植图鉴》

地方名 山东:青柳草,马氏藜芦,山葱(崂山、牙山),苍蝇草(牙山),旱葱(海阳),穆草(海阳、威海),酣草(荣成);安徽:翻天印;江西:棕包头(新建);湖南:一苑棕,藜芦;广西:铁扁担;其他:大白芫花。

功效 根、根茎:有毒。祛痰,催吐,杀虫。

## 7293381

*Veratrum stenophyllum* Diels --- *V. yunnanense* Loes. f.

植物名 狭叶藜芦《中国植志》

药材名 小棕包《云南药录》

文献名 藜芦、千张纸《名实图考》,七仙草《高植图鉴》,云南藜芦《云南种录》

地方名 人头发(四川、云南);四川:蛆药;云南:天蒜(保山),大力王(东川),披麻草,七仙丹。

功效 全草;有大毒。内服催吐,接骨,祛瘀。外用于止血,止痛,通窍,疥癣,恶疮。

## 7293382

*Veratrum taliense* Loes. f.

植物名 大理藜芦《中国植志》

药材名 披麻草《昆明民药》

地方名 云南:藜芦,七仙草,小藜芦,千张纸,小棕包,翻天印,人头发,小蛆药。

功效 全草;有毒。内服催吐,接骨,祛瘀。外用于止血,止痛,通窍;根:剧毒。散瘀消肿,镇痛止血,祛瘀,开窍。用于跌打损伤,骨折,截瘫,癫痫,风湿疼痛,创伤出血。

## 7293383

*Ypsilandra thibetica* Franch

植物名 丫蕊花《中国植志》

药材名 峨眉石风丹(四川)、《中药大辞典》

文献名 小飘儿菜《高植图鉴》

地方名 福建:虎头秋、虎头蕉(闽侯);广西:一枝花;四川:〔石风丹〕、小鱼鳔花、循环草(峨眉山)。

功效 全草:消炎利湿,清热解毒。用于瘰癧,肾炎。

## 7293384

*Ypsilandra thibetica* Franch. var. *latifolia* Vant.

植物名 阔叶丫蕊花(拟)

药材名 石风丹《峨眉药植资源》

地方名 四川:随身丹(峨眉山)。

功效 全草:清热解毒。用于跌打损伤。

## 7296 雨久花科 Pontederiaceae

## 7296001

*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms

植物名 凤眼莲《高植图鉴》

药材名 凤眼兰《汇编》

文献名 洋雨久花《中国植物图鉴》,革命草《科裁》,凤眼蓝《高植图鉴》

地方名 水葫芦(山东、云南、四川),大水萍(广东、广西、台湾),水浮莲(广东、广西、云南);江苏:水花生(南通);浙江:水荷花(黄岩),野荷花;台湾:布袋莲;湖南:水鸭婆,野水仙花,水绣花;广东:洋水仙,日本水仙(广州);广西:凤眼蓝;四川:水莲花(成都);其他:水晶莲。

功效 全草:清热解暑,利尿消肿。用于中暑烦渴,肾炎水肿,小便不利。

## 7296002

*Monochoria hastata* (L.) Solms --- *M. hastataefolia* Presl

植物名 箭叶雨久花《高植图鉴》

药材名 箭叶雨久花《广西药录》

文献名 青茨菇花、禹韭《纲目拾遗》,〔山芋〕《高植图鉴》,〔慈姑〕《云南种录》

功效 全草:清热解毒,消肿拔脓。用于痢疾,胃肠炎,牙龈肿痛,急性扁桃腺炎,咽喉炎,疮疖,毒蛇咬伤。

## 7296003

*Monochoria korsakowii* Regel et Maack --- *M. vaginalis* Presl var. *korsakowii* Solms

植物名 雨久花《花镜》、《高植图鉴》

药材名 雨久花《汇编》

文献名 浮薺《救荒野谱》,青茨菇花《汪连仕《采药书》》,雨韭《纲目拾遗》,蓝鸟花《植物名汇》,野慈姑《田间的杂草》,水白菜《汇编》,水葫芦、洋水仙、风眼莲《花镜》伊钦恒注)

地方名 吉林:“木尔奥克札姆”(朝名);其他:鸭舌草,水葵,菜葱,猪耳朵草,烙铁草。

功效 全草:清热解毒。用于高热咳嗽,小儿丹毒。

#### 7296004

*Monochoria vaginalis* (Burm. f.) Presl ex Kunth --- *M. chinensis* Gdgr. --- *M. vaginalis* var. *pauciflora* (Blume) Merr. --- *Monochoria vaginalis* var. *plantaginea* (Roxb.) Solms

植物名 鸭舌草《高植图鉴》

药材名 鸭舌草《名实图考》、《汇编》

文献名 蕺菜、薺菜、薺草《唐本草》,鸭儿嘴《名实图考》,接水葱《七卷食经》,小野慈姑、恶芹、香蕉头、鸭舌头草、斛子草、野瓜棵、发发草、熟笃草《田间的杂草》,窄叶鸭舌草、少花鸭舌草《汇编》,水锦葵《高植图鉴》

地方名 鸭仔菜(广西、福建、广东),水玉簪(陕西、安徽),肥猪草(江西、广东),雨久花(广东、广西);江苏:香头草,猪耳菜,马皮瓜,鸭嘴菜、马皮草(宝应);浙江:钱子草,亩田包(临安),福菜,鸭鹊草(龙泉);安徽:肺心草;福建:黑菜,合菜(宁德、霞浦、福安、福鼎、龙岩),鹅仔菜,湖菜、潘莲(永安),田卧草(宁化),佛菜、肥菜(三明),伏菜、伏草(清流);台湾:《甜菜》;湖北:野水葫芦(神农架);湖南:烙铁草(衡山);广东:鸭刷草(广州);广西:鸭儿菜;四川:《猪鼻孔》(米易),水芋荷;其他:猪耳朵,滑菜。

功效 全草:清热解毒。用于肠炎,痢疾,咽喉肿痛,牙龈脓肿。外用于蛇虫咬伤,疮疖。

### 7302 天南星科 Araceae

#### 7302001

*Acorus calamus* L.

植物名 菖蒲《本经》、《中国植志》

药材名 水菖蒲《滇南本草》、《汇编》

文献名 昌阳《本经》,尧韭《吴普本草》,白昌、水昌、水宿、荃蒲《别录》,泥昌《雷公炮炙论》,臭蒲《唐本草》,地心《石药尔雅》,苍蒲、尧羔《救荒本草》,水剑草、泥菖蒲《纲目》,蒲剑《草木便方》,白蒲、菖歆、松衣介、望见消、阳春雪、绿剑真人、荃、昌本、昌羊、宅护、泥蒲、紫耳、蔞蒲、水剑、石上草《新纲》,藏菖蒲《药典》

地方名 白菖蒲(河北、内蒙古、山西、青海、江苏、福建、河南、湖北、广东、贵州、云南、西南),〔香蒲〕(上海、浙江、福建、广西),臭蒲子根(东北、河南),臭蒲根(河北、山东、安徽),大菖蒲、剑菖蒲(陕西、湖北),家菖蒲(广西、云南);北京:水蒲根子;河北:臭蒲棒根子;山西:臭蒲草;内蒙古:“乌莫黑、哲格苏”、“苏达嘎拉步”(蒙名),白菖;陕西:臭马蒲(眉县);甘肃:臭蒲根子;山东:臭蒲子(烟台),臭姑子(昆崙山);上海:臭菖蒲;浙

江:野菖蒲;福建:溪菖蒲,凌水档,卜香和;广西:水八解,水见消;四川:大叶菖蒲,土菖蒲,建菖蒲,剑叶菖蒲(南川)。

功效 根茎:开窍,化痰,健脾,利湿,辟秽,杀虫。用于癫痫,惊悸健忘,神志不清,湿滞痞胀,泄泻痢疾,风湿疼痛,痈肿疮疖。

#### 7302002

*Acorus calamus* L. var. *verus* L.

植物名 细根菖蒲《中国植志》

药材名 云南细根菖蒲(拟)

功效 根茎:开窍,化痰,健脾,利湿,辟秽,杀虫。

#### 7302003

*Acorus gramineus* Soland. --- *A. gramineus* Soland. var. *pusillus* (Sieb.) Engl. - *A. pusillus* Sieb.

植物名 金钱蒲《名实图考》、《中国植志》

药材名 钱蒲《纲目》

文献名 菖蒲、石菖蒲《纲目》,鲜石菖蒲《常用中药名辨》

地方名 广西:水菖蒲(那坡),水蜈蚣(上思、罗城);四川:小随手香;贵州:随手香。

功效 根茎:化湿开胃,开窍豁痰,醒神益智。用于脱痞不饥,噤口下痢,神昏癫痫,健忘耳聋。

#### 7302004

*Acorus macrospadiceus* (Yamamoto) F. N. Wei et Y. K. Li

植物名 茴香菖蒲《广西植物》

药材名 茴香菖蒲《广西植物》

功效 根茎:化湿,和胃。

备考 在广西、湖南一些地区经常将本品与石菖蒲混用。茴香菖蒲个大,有八角茴香气味,可资与石菖蒲相区别。

#### 7302005

*Acorus rumphianus* S. Y. Hu

植物名 长苞菖蒲《中国植志》

功效 根茎:开窍,化痰,辟秽,杀虫。

#### 7302006

*Acorus tatarinowii* Schott

植物名 石菖蒲《中国植志》

药材名 石菖蒲《纲目》、《药典》

文献名 九节菖蒲《滇南本草》,苦菖蒲《生草药性备要》

地方名 水剑草(江西、湖南、广东、云南),菖蒲(江苏、云南),石蜈蚣(陕西、湖北、广东、广西),水蜈蚣(陕西、湖北、湖南、广西),水菖蒲(安徽、江西、湖南),鲜菖蒲(江苏、江西),药菖蒲(广西、贵州),菖蒲根(江苏、四川),山菖蒲(江苏、江西),随手香(广西、四川);江苏:山菖蒲根(苏州);浙江:山龙蒲(乐清),金钱菖蒲,鲜肠草(云和);安徽:野菖蒲,扇股草,金菖蒲;湖南:韭菜菖蒲,十花代,菖扬,韭菜香,阴草,剑菖蒲,球子草,铁金花;广东:薄菖蒲,紫耳,岩菖蒲,臭菖;广西:石香蒲(南丹),水见消(隆林);四川:夜晚香(金城山),剑叶菖蒲,建菖蒲,小石菖蒲(南江、合川),带手香、洗手香(南

川),回手香;贵州:剑草;云南:石扁兰;其他:菖蒲叶、香菖蒲,石上草,石上菖蒲,大石菖蒲,香蒲。

**功效** 根茎:化湿开胃,开窍豁痰,醒神益智。用于脘痞不饥,噤口下痢,神昏癫痫,健忘耳聋;花:调经行血;叶:外用于疥。

**备考** 溪荪《本草经集注》为其变种短苞菖蒲 *Acorus tatarinowii* Schott var. *brevispathus* K. M. Liu

## 7302007

*Aglaonema modestum* Schott ex Engl.

植物名 广东万年青《中国植志》

药材名 广东万年青《汇编》

文献名 亮丝草《高植图鉴》,粤万年青《海南植志》

地方名 [万年青](广东、福建、广西);广东:大叶万年青,日夜闭(新会),井干草(潮安、潮州),万年青草。

**功效** 全草或叶和根:有小毒。清热解毒,消肿止痛。用于狗咬伤,蛇咬伤,咽喉肿痛,尿道炎,肠炎,肺热咳嗽。外用于痈疮肿毒。

## 7302008

*Aglaonema tenuipes* Engl. --- *A. pierreanum* Engl.

植物名 越南万年青《中国植志》

药材名 越南万年青《广西药录》

地方名 云南:[万年青],观音莲(河口),“哦因”(西双版纳傣语)。

**功效** 全草:清热解毒。用于疮疡肿毒。

## 7302009

*Alocasia cucullata* (Lour.) Schott

植物名 尖尾芋《中国植志》

药材名 尖尾芋《汇编》

文献名 尖尾凤《南方毒植》,假海芋《海南植志》,尖尾草《高植图鉴》

地方名 [狼毒](广东、广西),老虎芋(广西、贵州、云南),卜芥(浙江、广西);福建:姑婆芋,狗神芋(永泰);广东:尖尾痕芋头,尖尾峰,野芋头,广狼毒;广西:老虎耳,小虫芋,虎耳芋(桂林),化骨丹(阳朔),大虫耳(梧州),蛇芋(都安),大虫芋(富钟);四川:[独脚莲],[观音莲],[山芋],四川独脚莲,独足莲,独管豆(合江);云南:[大附子](通海),大麻芋,猪不拱(峨山、元江),老虎掌芋(峨山)。

**功效** 根茎:有大毒。清热解毒,消肿散结。用于流行性感冒,钩端螺旋体病,慢性支气管炎,毒蛇咬伤,瘰疬,疮疡肿毒。

## 7302010

*Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott --- *A. odora* (Roxb.) C. Koch

植物名 海芋《纲目》、《中国植志》

药材名 海芋《纲目》、《汇编》

文献名 天荷《本草拾遗》,羞花草《庚辛玉册》,隔河仙,观音莲《纲目》,一瓣莲、观音芋《花镜》,狼毒头《生草药性备要》,青芋《纲目拾遗》,[独脚莲]《分类草药性》,野芋、野芋实、木芋头《岭南采药录》,大叶野芋头、小叶野芋头《中国植物图鉴》,痕芋头花《生草药手册》,大根芋《汇编》

地方名 [狼毒](福建、台湾、湖南、广东、广西),老虎芋(广西、贵州、云南),姑婆芋(福建、台湾),[土狼毒](台湾、广东),大虫芋、痕芋头(广东、广西),野芋头(广东、广西、云南);福建:天芋,天芋蛋,足烂疔,水芋,狗咬草;湖南:附子(益阳),上塘(凤凰),天河芋(凤凰、古丈),天皂(溆浦);广东:广东狼毒,[广狼毒],埔芋(潮安),饭焦芋、坑芋、军芋、大叶芋头、野埔芋(潮阳),痕芋狼(英德),小狼毒、尖尾野芋头(广州);海南:野山芋;广西:老虎蒙、大朴薯、三角风(南宁),大叶狼毒(北海),大狼毒、伤寒芋(梧州),大叶芋,大虫楼、朴芋头(苍梧),烛芋,卜茹根(玉林),天蒙;四川:独脚芋(峨眉山);贵州:虎芋;云南:麻芋头、岩芋(红河),“麻哈拉”(红河哈尼语),大麻芋(思茅),大黑附子(景洪),滴水芋(元江),黑附子(富民),天合芋(文山),“坡扣”(傣语)。

**功效** 根茎:有毒。清热解毒,消肿散结。用于热病高热,疟疾,流行性感冒,肠伤寒。外用于疔疮肿毒。

## 7302011

*Amorphophallus dunnii* Tutchener

植物名 南蛇棒《中国植志》

药材名 南蛇棒《广西药录》

文献名 大头芋《海南植志》

地方名 广西:南蛇棍,蛇枪头。

**功效** 块茎:有毒。消肿散结。

## 7302012

*Amorphophallus mairei* Levl.

植物名 东川磨芋《中国植志》

**功效** 块茎:有毒,消肿散结。

## 7302013

*Amorphophallus mellii* Engl.

植物名 蛇枪头《中国植志》

药材名 蛇枪头《广西药录》

地方名 广东:蛇春头,蛇蒜头;广西:土南星(武鸣),七角莲(金秀)。

**功效** 块茎:有毒。清热解毒。外用于疮疡肿毒,毒蛇咬伤。

## 7302014

*Amorphophallus rivieri* Durieu --- *A. konjac* K. Koch --- *Arisaema konjac* Sieb. ex K. Koch

植物名 魔芋《中国植志》

药材名 魔芋《汇编》

文献名 由跋《本草拾遗》,蒟蒻、蒟头《开宝本草》,白蒟蒻、鬼芋《图经》,鬼头《纲目》,麻芋《植物名汇》

地方名 野魔芋(云南、江西),花杆南星(江西、安徽),蛇头草(上海、安徽),花杆莲(四川、江苏、陕西),花伞把(安徽、江西),[天南星],[南星](江苏、浙江、广西、四川),鬼蜡烛(浙江、上海、安徽);陕西:麻芋子(周至),驴肾草(镇巴);上海:蛇包谷;福建:山鬼(松政),[狼毒](南平),独脚莲、青龙把柱、点点青、土南星头、白龙造柱(泉州);浙江:蛇六谷,蛇头子,雷星,独叶一枝花,花梗天南星,天六谷,星芋,独立一枝枪;江西:花梗莲(新建),虎掌(万年),土南星,蛇头草根(丰城);湖

北:蛇苞谷(神农架);广西:蛇棒棍(昭平);四川:黑芋头,雪磨芋(加工品);云南:花麻蛇(思茅),魔芋花,小灰叶(楚雄)。

**功效** 块茎:化痰散积,行瘀消肿。用于痰嗽,积滞,疟疾,经闭,跌打损伤,痈肿,疔疮,丹毒,烫火伤,癌肿。

## 7302015

*Amorphophallus sinensis* Belval

**植物名** 疏毛磨芋《中国植志》

**药材名** 华东磨芋《浙江药植志》

**文献名** 白蒟蒻、鬼芋《图经》,华东蒟蒻《中药大辞典》,蛇头草《汇编》

**地方名** 上海:蛇六谷,鬼蜡烛,魔芋;浙江:土半夏(龙泉),伍花莲(江浦)。

**功效** 块茎及茎叶:有毒。消肿散结,解毒,止痛,化痰。用于痈疽肿毒,毒蛇咬伤,颈淋巴结结核,丹毒,跌打损伤。

## 7302016

*Amorphophallus variabilis* Blume

**植物名** 野磨芋(江西大余)、《中国植志》

**地方名** 江西:土南星(大余)。

**功效** 块茎:化痰散积,行瘀消肿。

## 7302017

*Amorphophallus virosus* N. E. Brown

**植物名** 疣柄磨芋《中国植志》

**地方名** 广东:南星头(宝安),鸡爪芋(开平),鞋板芋(罗冈),南芋(阳江)。

**功效** 块茎:化痰散积,行瘀消肿。

## 7302018

*Amorphophallus yunnanensis* Engl.

**植物名** 滇磨芋《中国植志》

**药材名** 滇磨芋《广西药录》

**地方名** 贵州:岩芋(罗甸)。

**功效** 块茎:外用于疮疡肿毒。

## 7302019

*Amydrium hainanense* (Ting et T. L. Wu ex H. Li) H. Li

**植物名** 穿心藤《中国植志》

**药材名** 穿心藤《广西药录》

**地方名** 广西:穿孔藤、九十九隆(金秀),穿心风(贺县)。

**功效** 全株:清热,祛风止痛。用于胃炎,胃溃疡,胆囊炎,肝炎,风湿痹痛。外用于跌打损伤。

## 7302020

*Arisaema amurense* Maxim. --- *A. amurense* var. *violaceum* Engl.

**植物名** 东北南星《中国植志》

**药材名** 天南星(河北、山东、东北)、《药典》

**文献名** 东北天南星、紫苞天南星《东北药植志》,野芋头《简明中医辞典》

**地方名** 南星(山东、河北、宁夏),绿象头花、大头参(东北),山苞米(吉林、辽宁);吉林:长虫草,大参(延边);辽宁:羹匙菜,长虫苞米,〔狼毒〕(千山);河北:药

狗丹,大药狗丹;内蒙古:“达匪瓦”(蒙名);山东:天落星(招远、莱阳、蒙山),大天落星(烟台);四川:“夺娃”(藏名)。

**功效** 块茎:有毒。燥湿化痰,祛风止痉,散结消肿。用于顽痰咳嗽,风疾眩晕,中风痰壅,口眼歪斜,半身不遂,癫痫,惊风,破伤风;生品:外用于痈肿,蛇虫咬伤。

## 7302021

*Arisaema amurense* Maxim. var. *serratum* Nakai

**植物名** 齿叶东北南星《中国植志》

**药材名** 齿叶东北南星《中药志》

**文献名** 齿叶天南星《卢野》,东北齿叶南星《中药通报》

**地方名** 天南星(东北、河北、山东)。

**功效** 块茎:有毒。祛风定惊,化痰,散结。

## 7302022

*Arisaema amurense* Maxim. f. *purpureum* (Nakai) Kitag. --- *A. amurense* Maxim. var. *violaceum* Engler f. *purpureum* (Nakai) Kitag.

**植物名** 齿缘紫苞天南星《东北药用植物》

**文献名** 紫苞东北天南星《中药通报》

**功效** 块茎:有毒。燥湿化痰,祛风定惊,解毒医疮,消肿散结。用于面神经麻痹,中风痰壅,口眼喎斜,半身不遂,寒痰咳嗽,小儿惊风,破伤风,癫痫,风痰眩晕,喉痹。外用于疔疮肿毒,瘰癧,痈肿,跌打损伤,毒蛇咬伤。

## 7302023

*Arisaema angustatum* Franch. et Sav. var. *peninsulae* (Nakai) Nakai --- *A. peninsulae* Nakai

**植物名** 朝鲜南星《中国植志》

**药材名** 朝鲜南星《中药志》

**文献名** 天南星、南星《满洲植志》,朝鲜天南星《东北植药图志》

**地方名** 山苞米、大参(东北)。

**功效** 块茎:有毒。祛风定惊,化痰,散结。

## 7302024

*Arisaema aridum* H. Li

**植物名** 旱生南星《云南种录》

**药材名** 天南星《迪庆藏药》

**功效** 块茎:祛胃风,消瘤块,去恶肉,杀虫。用于胃痛,惊风,鼻息肉,骨刺,骨瘤,疮疖;果:破毒结;花:用于胎病,开产门;水煎膏配驱虫药:用于肠虫病。外用于皮肤病。

## 7302025

*Arisaema asperatum* N. E. Brown

**植物名** 刺柄南星《中国植志》

**药材名** 刺柄南星《汇编》

**文献名** 刺梗天南星《秦岭植志》

**地方名** 天南星(陕西、甘肃、湖北);陕西:山苞谷(太白山);湖北:绿南星,白南星,南星七,螃蟹七,蛇芋头,三角莲、南星(巴东);四川:〔三步跳〕(叙永)。

**功效** 块茎:有毒。用于祛痰止咳,镇痛,劳伤,痹

疽。外用于疥癬瘡疽。

### 7302026

*Arisaema bathycoleum* Hand. -Mazz.

植物名 银南星《中国植志》

药材名 银南星《中药志》

文献名 高鞘南星《高植图鉴》

地方名 [半夏](云南、四川);四川:麻芋子(会东);

云南:银半夏(丽江)。

功效 块茎:在云南、四川个别地区作半夏入药。

### 7302027

*Arisaema brevipes* Engl.

植物名 短柄南星《中国植志》

药材名 短柄南星《中药志》

文献名 短柄天南星《秦岭植志》

功效 块茎:有毒。祛风定惊,化痰,散结。

### 7302028

*Arisaema calcareum* H. Li

植物名 红根南星《中国植志》

药材名 红根(云南)、《汇编》

地方名 云南:山半夏、长虫包谷、小独脚莲、见血飞(文山),山磨芋、野磨芋(西畴)。

功效 根茎:有剧毒。解毒,消肿止痛。外用于疔疮肿毒,乳腺炎,腮腺炎,毒蛇咬伤。

### 7302029

*Arisaema candidissimum* W. W. Sm.

植物名 白苞南星《中国植志》

文献名 极白南星《高植图鉴》

地方名 四川:由跋(峨眉山)。

功效 块茎:消肿,散结。

### 7302030

*Arisaema clavatum* Buchet

植物名 棒头南星《中国植志》

地方名 湖北:七寸胆(利川);四川:蛇包谷(重庆),麻芋子(峨眉),虎掌、南星(南川)。

功效 块茎:消肿,散结。

### 7302031

*Arisaema costatum* (Wall.) Mart.

植物名 多脉南星《中国植志》

药材名 长尾天南星《青藏药图》

地方名 青海:“大羔”(藏名)。

功效 块茎:微毒。消炎解毒。用于鼻息肉,鼻肿痛。

### 7302032

*Arisaema decipiens* Schott

植物名 奇异南星《中国植志》

地方名 广西:铁灯台,青脚莲;云南:蛇饭(腾冲)。

功效 块茎:解毒消炎。用于无名肿毒,乳腺炎,痢疽,毒蛇咬伤,蜂蝎螫伤,蜘蛛及鼠咬伤。

### 7302033

*Arisaema dilatatum* Buchet

植物名 粗序南星《中国植志》

地方名 四川:南星(石棉)。

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

### 7302034

*Arisaema du-bois-reymondiae* Engl.

植物名 云台南星《中国植志》

药材名 江苏南星《高植图鉴》

地方名 天南星(江苏、安徽、江西);江苏:虎掌,虎掌天南星。

功效 块茎:用于无名肿毒初起,面神经麻痹,毒蛇咬伤,神经性皮炎。

### 7302035

*Arisaema elephas* Buchet

植物名 象南星《中国植志》

药材名 象鼻南星《高植图鉴》

文献名 象天南星《中药大辞典》

地方名 天南星(陕西、甘肃、四川);陕西:山苞谷;四川:麻芋子(南江),虎掌(雷波),黑南星(峨眉、普格、雷波),半节烂(凉山),三步跳(叙永);贵州:水包谷(威宁),南星,老蛇包谷;云南:银半夏,大半夏(丽江),大麻芋子(巧家);西藏:象鼻子(林芝)。

功效 块茎:剧毒。消肿,散结。

### 7302036

*Arisaema erubescens* (Wall.) Schott --- *A. fratennum* Schott --- *A. consanguineum* Schott

植物名 一把伞南星《中国植志》

药材名 天南星《本草拾遗》、《药典》

文献名 半夏精(侯宁极《药谱》),蛇头天南星(《峨嵋岩本草》,南星《纲目》),蛇芋(《名实图考》),蛇木芋(《南方毒植》),猪包谷(《中国药植图鉴》),麻芋(《峨眉药植》),蛇头草根(《新纲》),山棒子(《高植图鉴》),近缘天南星(《汇编》)

地方名 山苞米(辽宁、河北、河南、湖北),山磨芋(江西、四川),蛇苞谷(甘肃、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南),[独角莲](陕西、浙江、江西、湖北),野芋头(江苏、安徽),野磨芋(浙江、广西、云南),一把伞(江西、湖北、广西、云南),天星一把伞(陕西、浙江),白南星(湖北、四川),打蛇棒(江西、福建);河北:药狗丹,大罗星;陕西:大半夏(眉县);甘肃:野包谷,野包米(榆中);青海:刀剪草;山东:大扁老鸦芋头;江苏:铁脚莲;浙江:蛇六谷,黄狗卵;安徽:独脚莲;江西:坐拿(泰和);湖北:铁骨伞(鹤峰),粉南星,蛇舌草(恩施);湖南:蛇芋头;广东:山薯芋(从化);广西:斑杖(南宁),七托莲(北流),土南星(临桂);四川:麻芋子(小金),血南星,独足莲,“夺娃”(藏名),独足伞(合川);云南:麻蛇饭(嵩明),麻芋杆(曲靖),刀口药、闹狗药(通海),法夏(昆明),山包谷,蛇子麦(曲靖),“都士不礼”(彝语),轮生南星(文山)。

功效 块茎:有毒。燥湿化痰,祛风止痉,散结消痰。用于顽痰咳嗽,风疾眩晕,中风痰壅,口眼歪斜,半身不遂,癫痫,惊风,破伤风;块茎生品:外用于疔肿,蛇虫咬伤。

### 7302037

*Arisaema fargesii* Buchet

植物名 螃蟹七《中国植志》

药材名 螃蟹七《中药志》

文献名 城口南星《植分学报》

地方名 虎掌南星(湖北、甘肃);湖北:白南星(巴东),天南星(利川),刺螃蟹七(神农架);四川:红南星(巫溪),〔狼毒〕(云阳)。

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

#### 7302038

*Arisaema flavum* (Forsk.) Schott

植物名 黄苞南星《中国植志》

药材名 黄苞南星《中药志》

文献名 黄苞天南星《汇编》,黄花南星《高植图鉴》

地方名 西藏:黄天南星,天南星(拉萨),“达果”(藏名)。

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

#### 7302039

*Arisaema franchetianum* Engl. --- *A. purpureogaleatum* Engl.

植物名 象头花《名实图考》、《中国植志》

药材名 象头花《汇编》

文献名 紫盔南星《高植图鉴》,紫盔天南星《秦岭植志》

地方名 〔半夏〕(广西、四川、云南),狗爪半夏、南星(四川、云南),狗爪南星(四川、贵州),象鼻花(广西、云南),虎掌南星(甘肃、四川);湖北:螃蟹七(神农架);广西:(三不跳),三步跳(那坡),三步莲,野磨芋(凌乐);四川:虎掌(洪溪),黑南星;贵州:岩半夏;云南:老母猪半夏(昆明、峨山),母猪半夏、岩芋、小独角莲、独叶半夏(昆明),野芋头(昭通),红南星、红半夏、大半夏(曲靖、昆明、富源、西畴)。

功效 块茎:有大毒。散瘀解毒,消肿止痛。用于胃痛,乳腺炎,疮疖肿毒,瘰癧,毒蛇咬伤。

#### 7302040

*Arisaema griffithii* Schott var. *verrucosum* (Schott) Hara --- *A. verrucosum* Schott

植物名 疣柄翼檐南星《中国植志》

药材名 疣柄南星《云南种录》

地方名 四川:南星,天南星,黑南星。

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

#### 7302041

*Arisaema heterophyllum* Blume --- *A. ambiguum* Engl. --- *A. kwangtungense* Merr.

植物名 天南星《中国植志》

药材名 天南星《图经》、《药典》

文献名 虎骨、鬼菊《本草新注》,野磨芋、蛇芋《土农药志》,异叶天南星《中药志》,广东南星《广西植录》,野芋头《简明中医辞典》

地方名 南星(江苏、浙江、湖北、广东、四川),土南星(江西、福建、广东、广西),独脚莲(陕西、江苏、浙江、江西),蛇包谷(浙江、湖南),独叶一枝枪(浙江、广东),山磨芋(浙江、四川);辽宁:天老星,小苞米;青海:刀剪草;山东:大扁,老鸦芋头,大天落星(烟台);江苏:大野芋头(泰县);浙江:蛇六谷(临安、宁波),宵杆独叶一枝

枪(杭州),蛇棒头(遂昌、临安),天凉伞(开化),狗苞玉,狗药;江西:打蛇棒(景德镇、婺源),马面毒(宜春);福建:蛇枕头(宁化),山菜头(清流);湖北:锁喉莲,蛇草头(英德);广东:生南星,蛇头蒜(英德),蛇铅头,蛇菱头,蛇簪头,花伞柄(惠阳);广西:双隆芋,逢人不见面,不求人,七角莲,羽叶南星;四川:狗爪南星,狗爪半夏(马边),母子半夏,虎掌半夏(合江),麻芋子(峨眉),大半夏(剑阁),〔半边莲〕,白南星,螃蟹七(万县),虎掌(金成),虎掌南星;贵州:老蛇包谷。

功效 块茎:有毒。燥湿化痰,祛风止痉,散结消肿。用于顽痰咳嗽,风疾眩暈,中风痰壅,口眼歪斜,半身不遂,瘰癧,惊风,破伤风;块茎生品:外用于痈肿,蛇虫咬伤。

#### 7302042

*Arisaema hunanense* Hand. -Mazz.

植物名 湘南星《中国植志》

药材名 湘南星《广西药录》

功效 块茎:消肿止痛。外用于疮疡肿毒。

#### 7302043

*Arisaema inkiangense* H. Li

植物名 三匹箭《中国植志》

药材名 三匹箭(云南孟腊)

文献名 盈江南星《云南种录》

地方名 云南:〔三叶半夏〕(瑞丽)。

功效 根茎:用于跌打损伤,风湿关节痛。

备考 本品根茎圆柱形,淡黄色,剖面紫色至青紫色,长6—7厘米,粗2.5厘米具节。外形与半夏大不相同,故药材不可能与南星或半夏相混。瑞丽名三叶半夏,指地上部分叶三全裂而言。《云南种录》盈江南星是从拉丁学名翻译而来。

#### 7302044

*Arisaema inkiangense* H. Li var. *maculatum* H. Li

植物名 斑叶三匹箭《中国植志》

文献名 斑叶盈江南星《云南种录》

功效 根茎:用于跌打损伤,风湿关节痛。

#### 7302045

*Arisaema intermedium* Blume

植物名 高原南星《中国植志》

药材名 高原南星《中药志》

文献名 中南星《汇编》

地方名 西藏:“达瓦威巴”(藏名),土半夏(察隅、波密)。

功效 块根:有毒。燥湿化痰,和胃健脾,降逆止呕。用于胃炎,胃溃疡呕吐,咳嗽,痰多,妊娠呕吐。

#### 7302046

*Arisaema japonicum* Blume

植物名 蛇头草《中国植志》

药材名 蛇头草南星(拟)

文献名 鬼蒺藜《中药大辞典》,日本南星《植分学报》,日本天南星《中草药学》,蛇芋头《中国经植志》

地方名 半夏精(浙江、安徽);山东:大扁老鸦芋头;浙江:蛇六谷,蛇玉米,蛇苞芦;安徽:蛇头根草;湖南:

蛇包果,五不跳、三不跳罢(苗族语),野磨;四川:白南星,南星。

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

## 7302047

*Arisaema lichiangense* W. W. Sm.

植物名 丽江南星《中国植志》

药材名 丽江南星(云南)

功效 块茎:止咳化痰。

## 7302048

*Arisaema lingyunense* H. Li

植物名 凌云南星《中国植志》

地方名 广西:三步跳(凌云)。

功效 块茎:用于毒蛇咬伤。

## 7302049

*Arisaema lobatum* Engl. -- *A. lobatum* Engl. var. *rosthornianum* Engl.

植物名 花南星《中国植志》

药材名 花杆南星(拟)

文献名 偏叶天南星《秦岭植志》,浅裂南星《高植图鉴》

地方名 天南星(陕西、湖北、四川),黑南星、血理箭(四川、贵州),绿南星、蛇芋头(湖北、四川);湖北:[狼毒](鹤峰),蛇磨芋(均县、利川、恩施),南星七、白南星、(半边莲)、虎爪南星、狗爪南星(巴东),半截烂(神农架);广西:独脚莲(龙胜),野魔芋;四川:大半夏、芋儿南星(北川),小天南星(广元),虎掌(洪溪),狗爪半夏(黑水),蛇包谷(南川),麻芋子(天全),蛇杵棒(宝兴),红包谷,烂屁股、大麻芋子、花苞谷(峨眉山);贵州:虎芋,由拔;云南:金半夏(腾冲)。

功效 块茎:有毒。消肿,散结。外用于毒蛇咬伤、疟疾。

## 7302050

*Arisaema multisectum* Engl.

植物名 多裂南星《中国植志》

药材名 多裂南星《中药志》

文献名 多裂天南星《秦岭植志》

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

## 7302051

*Arisaema nepenthoides* (Wall.) Mart.

植物名 猪笼南星《中国植志》

文献名 猪笼草状南星《高植图鉴》

功效 块茎:用于局部麻醉。

## 7302052

*Arisaema penicillatum* N. E. Brown

植物名 画笔南星《中国植志》

药材名 蛇钻头(广东)

文献名 三叶天南星《海南植志》,顶刷南星《高植图鉴》,广东土南星《汇编》

地方名 广东:土南星,花伞柄,蛇姜头,蛇纂头,蛇香头。

功效 根茎:有毒。止痛,消肿拔毒。用于无名肿毒,毒蛇咬伤。

备考 本品根茎长2~3厘米,粗约1厘米,外形与天南星有别。

## 7302053

*Arisaema peninsulae* Nakai f. *atropurpureum* Y. C. Chu et D. C. Wu

植物名 紫苞朝鲜天南星《东北药用植物》

功效 块茎:有毒。燥湿化痰,祛风定惊,解毒医疮,消肿散结。用于面神经麻痹,中风痰壅,口眼喎斜,半身不遂,寒痰咳嗽,小儿惊风,破伤风,癰疽,风痰眩晕,喉痹。外用于疮肿毒,瘰癧,痈肿,跌打损伤,毒蛇咬伤。

## 7302054

*Arisaema prazeri* Hook. f.

植物名 河谷南星《中国植志》

地方名 云南:[半夏](个旧)。

备考 块茎:混作半夏入药。

## 7302055

*Arisaema rhizomatum* C. E. C. Fischer

植物名 雪里见《中国植志》

药材名 雪里见(贵州仁怀)、《汇编》

地方名 半截烂、躲雷草(贵州、云南);湖南:半节烂、花脸铁灯台(新宁);广西:[独角莲]、麻醉药、大麻药(龙胜);四川:蛇包谷(雷波),烂屁股(峨眉山);贵州:野包谷;云南:大半夏(腾冲)。

功效 根茎:有毒。解毒止痛,祛风,除湿。用于无名肿毒,风湿麻木,毒蛇咬伤,结核性溃疡。

## 7302056

*Arisaema rhizomatum* C. E. C. Fischer var. *nudum* C. E. C. Fischer

植物名 绥阳雪里见《中国植志》

地方名 贵州:雪里见(绥阳)。

功效 根茎:有毒。解毒止痛,驱风除湿。用于无名肿毒,劳伤疼痛,风湿麻木。

## 7302057

*Arisaema rhombiforme* Buchet

植物名 黑南星《中国植志》

药材名 黑南星(四川雷波)、《中药志》

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

## 7302058

*Arisaema ringens* (Thunb.) Schott -- *A. ringens* var. *praecox* (de Vriese) Engl.

植物名 普陀南星《中国植志》

文献名 小南星、小天南星《名实图考》,开口南星《高植图鉴》

地方名 天南星(陕西、河南);浙江:衢南星(衢州);四川:狗爪南星,母子半夏,虎掌半夏,虎掌南星,狗爪半夏,黑南星(峨眉山)。

功效 块茎:有毒。用于毒肿结热。

## 7302059

*Arisaema saxatile* Buchet

植物名 岩生南星《中国植志》

药材名 岩生南星《中药材》



地方名 四川:“布什都扎”、“布什扎”(凉山彝名)。

功效 块茎:有毒。用于跌打损伤,风湿疼痛,毒蛇咬伤,外伤出血等。

#### 7302060

*Arisaema serratum* (Thunb.) Schott

植物名 细齿南星《中国植志》

药材名 斑杖《汇编》

文献名 攀倒甑、接骨《本草新注》,细齿天南星《汇编》

地方名 陕西:天南星;浙江:蛤蟆竹、蛇竹(黄岩)。

功效 块茎:解毒。用于毒蛇咬伤。

#### 7302061

*Arisaema sikokianum* Franch. et Sav.

植物名 全缘灯台莲《中国植志》

药材名 全缘灯台莲《中药志》

文献名 细齿灯台莲《浙江药志》

地方名 天南星(湖北、湖南等地)。

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

#### 7302062

*Arisaema sikokianum* Franch. et Sav. var. *henryanum* (Engl.) H. Li

植物名 七叶灯台莲《中国植志》

药材名 七叶灯台莲《中药志》

地方名 天南星(湖北、湖南)。

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

#### 7302063

*Arisaema sikokianum* Franch. et Sav. var. *serratum* (Makino) Hand. -Mazz. --- *A. engleri* Pamp. --- *A. sazensoo* var. *serrato-dentatum* Engl.

植物名 灯台莲《中国植志》

药材名 灯台莲(湖北宜昌)、《中药志》

文献名 粗齿灯台莲《浙江药志》,齿叶天南星《湖南药物志》,齿叶南星《广西植志》,具齿灯台莲《神农架药志》

地方名 天南星、蛇芋头(湖南、湖北),蛇苞谷(湖南、贵州);浙江:欢喜草(杭州);江西:大叶天南星、路边黄(安福),五三(修水);河南:山苞米;湖北:绿南星(恩施),〔半边莲〕、狗爪南星(巴东),蛇磨芋、蝎壳南星、南星(来凤);广西:蛇根头(全州);贵州:老蛇包谷。

功效 块茎:有大毒。清热解毒,消肿,散结。外用于毒蛇咬伤。

#### 7302064

*Arisaema sinii* Krause

植物名 瑞山南星《中国植志》

药材名 瑞山南星《广西药志》

地方名 广西:独角莲(龙胜);贵州:三角条(洛江)。

功效 块茎:外用于毒蛇咬伤。

#### 7302065

*Arisaema wilsonii* Engl.

植物名 川中南星《中国植志》

药材名 川南星《中药通报》

地方名 四川:天南星。

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

#### 7302066

*Arisaema yunnanense* Buchet --- *A. taliense* Engl.

植物名 山珠南星《中国植志》

药材名 滇南星《汇编》

文献名 小南星《名实图考》,山珠半夏《云南省药品标准》,大理半夏、小三叶南星《云南药志》

地方名 四川:黑南星;云南:小半夏(昆明),滇半夏,半夏、刀口药、山包米、狗闹子(通海),蛇饭果(景东),长虫磨芋(广南)。

功效 块茎:有毒。消肿,散结。

备考 《中国植志》(1979)注:本种正异学名植株的块茎个体大小差异很大,是因生境不同而非种间差异。

#### 7302067

*Caladium bicolor* (Ait.) Vent.

植物名 五彩芋《中国植志》

药材名 红水芋(云南红河)、《汇编》

文献名 花叶杯芋《中药大辞典》,花叶芋《汇编》

地方名 云南:红半夏,石芋头、独角芋、红芋头、珍珠莫玉散(红河)。

功效 块茎:有毒。解毒消肿,散瘀止痛,接骨,止血。用于风湿疼痛,跌打肿痛,胃痛。外用于无名肿毒,腮腺炎,痈疮疔肿,蛇虫咬伤,癣,湿疹,全身瘙痒,牙痛,刀枪伤等。

#### 7302068

*Calla palustris* L.

植物名 水芋《中国植志》

药材名 水芋《长白山植志》

地方名 黑龙江:水葫芦,水浮莲(尚志)。

功效 叶:用于骨髓炎;全草:用于风湿痛。

#### 7302069

*Colocasia antiquorum* Schott --- *C. esculentum* var. *antiquorum* (Schott) Hubbard et Rehder

植物名 野芋《中国植志》

药材名 野芋《本草经集注》、《汇编》

文献名 老芋《本草经集注》,土堇、紫芋、连禅芋、青芋《救荒本草》,野芋芳《纲目拾遗》

地方名 山东:白芋(青岛);江西:野芋荷,野山芋(吉水),红芋荷(赣州),红芋,野芋子,水芋头;四川:野芋头(峨眉);贵州:红广菜(榕江、剑河、镇远);云南:小毒芋,泉七。

功效 全草及块茎:有小毒。解毒,消肿止痛。用于痈疽肿毒,急性颈淋巴结炎,指头疔,创伤出血,虫蛇咬伤。

#### 7302070

*Colocasia esculenta* (L.) Schott --- *C. antiquorum* var. *esculenta* (L.) Schott --- *Arum esculenta* L.

植物名 芋《中国植志》

药材名 芋《别录》、《汇编》

文献名 蹲鸱《史记》,芋魁《汉书》,芋根(《汉书》颜师古注),土芝《别录》,百子芋、魁芋《齐民要术》,芋叶

《日华子本草》，芋头、芋梗《本草衍义》，芋荷《医林纂要》，芋苗《青囊杂纂》，芋奶《种芋法》，芋头花《生草药性备要》，芋芳《中国医学大辞典》，芋荷杆《民药汇编》，毛芋《中国药植图鉴》，番芋《满蒙植汇》，里芋（小泉《药植》）

地方名 福建：毛芋；湖北：芋禾〔叶柄〕，芋头梗；湖南：芋茎；广东：九爪芋，旱芋仔，芋菜，旱芋，食芋；海南：水芋；云南：青皮叶、接骨草、独皮叶（滇南）；其他：芋头子。

功效 块茎：消癆散结。用于癆癆，肿毒，腹中癖块，牛皮癬，烫火伤；叶：止泻，敛汗，消肿毒。用于泄泻，自汗，盗汗，痈疽肿毒；梗：用于泻痢，肿毒；花：用于胃痛，吐血，子宫脱垂，痔疮，脱肛。

## 7302071

*Colocasia gigantea* (Blume) Hook. f.

植物名 大野芋《中国植志》

药材名 大野芋《广西药录》

地方名 浙江：象耳芋（杭州）；广东：山野芋；海南：水芋；广西：拍板七、拍板蕉（全县）；云南：滴水芋（勐腊）。

功效 根茎：解毒消肿，祛痰镇痉。

## 7302072

*Colocasia tonoiima* Nakai

植物名 紫芋《中国植志》

药材名 紫芋《贵州药录》

地方名 贵州：水芋，野芋子，东南芋，东南菜、广菜（威宁），老虎广草（剑河）；云南：芋头花。

功效 全草：消肿解毒，止血散结。用于无名肿毒。

## 7302073

*Cryptocoryne sinensis* Merr.

植物名 隐棒花《中国植志》

药材名 隐棒花《广西药录》

文献名 发冷草、沙洲草《高植图鉴》

地方名 广西：沙滩草，岩槐（融安）；云南：八仙过海（思茅）。

功效 全草：舒筋活络，祛风除湿，活血止痛。用于肾结石，尿路结石，化脓性骨髓炎，疟疾。

## 7302074

*Cryptocoryne yunnanensis* H. Li

植物名 八仙过海《中国植志》

药材名 八仙过海《云南思茅》

功效 全草：用于跌打损伤，风湿关节炎，痧症，急性肠胃炎。

## 7302075

*Dieffenbachia picta* (Lodd.) Schott

植物名 花叶万年青《中国植志》

药材名 花叶万年青《广西《园林药录》》

功效 根茎：有小毒。清热。外用于痈疮肿毒，蛇伤，脱肛。

## 7302076

*Epipremnopsis sinensis* (Engl.) H. Li --- *Amydrium*

*sinense* (Engl.) H. Li

植物名 雷公连《中国植志》

药材名 雷公药《贵州》

地方名 软筋藤（贵州、四川）；湖南：〔青藤〕（辰溪），下山虎（通道），“叫四门”、“叫恩妈”（侗语）；四川：青巴岩香（叙永）；贵州：大匹药、风湿药（罗甸），大软筋藤（剑河、兴仁），野红苕（榕江），九龙上吊（剑河）。

功效 茎、叶：用于风湿，跌打，心绞痛。

## 7302077

*Epipremnum aureum* (Linden et Amdre) Bunting ---

*Scindapsus aureus* (Lind. et Andre) Engl. et Krause

植物名 绿萝《中国植志》

功效 全株：有毒。消肿散瘀。

## 7302078

*Epipremnum pinnatum* (L.) Engl. --- *Rhaphidophora*

*pinnata* Schott

植物名 麒麟叶《中国植志》

药材名 色背竹《高植图鉴》

文献名 麒麟尾《岭南采药录》，蓬莱蕉《广州植志》，羽叶藤、过山标《广西药录》

功效 根、茎、叶：清热润肺，舒筋活络，散瘀止痛。

## 7302079

*Gonatanthus pumilus* (D. Don) Engl. et Krause

植物名 曲苞芋《中国植志》

药材名 野芋花《药学学报》

地方名 云南：野木鱼（屏边），岩芋（中甸），小野芋（富宁）。

功效 花：用于哮喘，荨麻疹，癰痛。

## 7302080

*Homalomena gigantea* Engl.

植物名 大千年健《云南植志》

药材名 大平丝芋《云南药录》

文献名 大黑附子《云南药录》

地方名 云南：大黑麻芋、坡扣（思茅）。

功效 根茎：润肺止咳，退热，祛风湿，止血。用于肺结核，咳血，支气管炎，流感，感冒，风湿性心脏病，风湿骨痛，疮痈疔肿。

## 7302081

*Homalomena occulta* (Lour.) Schott --- *H. tonkinensis*

Engl. --- *H. cochinchinensis* Engl.

植物名 千年健《中国植志》

药材名 千年健《纲目拾遗》、《药典》

文献名 千年见《药材资料汇编》，平丝草《海南植志》，绞丝线《中药志》

地方名 广东：美人姜、美兰香（惠阳）；海南：假芳芋；广西：一包针（金秀），山藕（百色）；云南：千颗针、丝梭线、越南平丝芋（红河），香芋、团芋（思茅），“蜜荒”（西双版纳傣语），“湾洪”（傣语）。

功效 根茎：祛风湿，健筋骨。用于风寒湿痹，腰膝冷痛，下肢拘挛麻木。

备考 《名实图考》、《纲目拾遗》之“千年健”为藤本，非此种。

## 7302082

*Lasia spinosa* (L.) Thwait.

植物名 刺芋《中国植志》

药材名 刺芋《汇编》

文献名 笏慈菇、天河芋《岭南采药录》, 刺芋《广州植志》

地方名 广东: 大枪、树鸡屎藤、粗叶树、粗叶木、木鸡屎藤(阳春), 野箭芋、笏水菇; 广西: 水笏钩、水箭芋、水茨菇(博白), 勒蒙、箭藕(南宁), 蒙古筋(邕宁), 箭慈菇, 有箭慈菇(蒙山), 有刺慈菇(平南、北流), 箭菜薯(陆川), 箭地菇(玉林), 天策菜, 刺茨菇(合浦), 山连藕(龙津), 巧南(龙州), 山慈姑(贵县); 云南: 刺过江(永德), 早茨菇、金茨菇(梁河), 野茨菇, 山茨菇(华宁), “怕南”、“派克那”、“泊格南”(傣语)。

功效 根茎: 消炎, 止痛, 消食, 健胃。用于慢性胃炎, 消化不良, 风湿性关节炎。外用用于毒蛇咬伤, 淋巴腺炎, 淋巴结核。

## 7302083

*Pinellia cordata* N. E. Brown

植物名 滴水珠《中国植志》

药材名 滴水珠(浙江)、《汇编》

文献名 全叶半夏《医药世界》, 心叶半夏《中国经植志》

地方名 一粒珠、水半夏(陕西、浙江、安徽、江西、广东)、独叶一支花(陕西、浙江、安徽、江西)、岩珠、岩芋、蛇珠(浙江、安徽)、石半夏(浙江、安徽、江西)、〔半夏〕(浙江、江西); 浙江: 红岩芋(文成)、斑叶滴水珠、天灵芋(泰顺)、独龙珠(衢县); 安徽: 单叶半夏、石芋子(太和); 江西: 石里开、一滴珠、水滴珠; 湖南: 岩九子、岩隙子、岩朝子、麻口珠、滴水生(常德)、地金莲、夏无影; 广西: 野慈菇、地鸬鹚、〔独角莲〕, 山半夏; 云南: “被嘎”(楚雄彝名), 制蛇子; 其他: 石蜘蛛。

功效 块茎: 有小毒。解毒止痛, 散结消肿。

## 7302084

*Pinellia integrifolia* N. E. Brown

植物名 石蜘蛛《中国植志》

药材名 石蜘蛛(四川叙永)

地方名 四川: 一面锣、白铃子(叙永)。

功效 全株: 有小毒。解毒散结, 止痛通窍。用于跌打损伤, 淋浊。

## 7302085

*Pinellia pedatisecta* Schott

植物名 虎掌《中国植志》

药材名 虎掌《本经》、《中草药学》

文献名 由跋《别录》, 鸟足叶半夏《秦岭植志》, 掌叶半夏《高植图鉴》, 鸟足半夏《中草药学》

地方名 虎掌南星(江苏、河南、四川), 狗爪半夏(湖北、四川、云南), 天南星(河北、山东、河南、江苏), 半夏(山东、河北), 南星(山东、四川); 河北: 绿芋子; 江苏: 独角莲、独脚莲; 河南: 禹南星; 湖南: 大三步跳(大庸); 广西: 真半夏; 四川: 麻芋子、半夏子、独败家子(青川); 贵州: 麻芋果(瓮安)。

功效 块茎: 祛风燥湿, 化痰散结。用于中风, 癰疽, 小儿惊风, 风湿痛, 无名肿毒初起, 毒蛇咬伤, 拔牙痛和牙脓肿切开, 宫颈癌及癌前期病变。

## 7302086

*Pinellia peltata* Pei

植物名 盾叶半夏《中国植志》

药材名 盾叶半夏《浙江药植志》

文献名 半夏《华北药志》

地方名 浙江: 白岩芋, 白滴水珠。

功效 块茎: 有小毒。解毒止痛, 散结消肿。

## 7302087

*Pinellia polyphylla* S. L. Hu

植物名 大半夏《药学报》

地方名 四川: 半夏〔小块茎〕, 白南星〔大块茎〕, 岩半夏。

功效 块茎: 消肿散结。

## 7302088

*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.

植物名 半夏《中国植志》

药材名 半夏《本经》、《药典》

文献名 地文、水玉《本经》, 和姑《吴普本草》, 守田、示姑《别录》, 羊眼半夏《唐本草》, 蝎子草《名实图考》, 痰宫劈历、白傍儿子、半下、雄毛色、雄毛奴色《新纲》, 地雷公、老瓜蒜、狗芋头《中药志》, 羊眼《中国药植志》, 半月莲《高植图鉴》, 京半夏《四川中药志》, 饭石子、生半夏、姜半夏、清半夏、法半夏《药典》

地方名 三叶半夏(山西、河南、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南), 麻芋子(陕西、山东、湖北、四川), 尖叶半夏(湖南、广西), 土半夏(江西、广西), 地慈姑(湖南、广东、广西), 老鸬头(江苏、安徽), 三叶老、后娘喂饭(北京、河北), 扣子莲(安徽、江西), 小天老星(东北), 药狗丹(东北、华北), 野半夏(江西、广西); 辽宁: 裂刀菜, 死不要脸(岫岩、庄河); 北京: 后脑勺, 驴不食草(京郊); 河北: 挺嘴豆子, 唾嘴豆子, 地巴豆, 药狗旦子; 甘肃: 三兴草, 三片叶, 三开花, 三角草, 海巴子; 山东: 无心菜根, 无心菜(历城、长清), 天落星, 天里星(莱芜), 老鸡芋头(淄博), 老鸡眼(五莲), 老鸬芋头, 田里心, 老鸬眼; 江苏: 老黄嘴、老和尚头(徐州), 地星, 野芋头(无锡、镇江、南通、泰州); 上海: 三叶头草; 浙江: 独叶一枝花; 安徽: 老鸡头, 老鸬头, 麻草子, 狗药子; 江西: 鸭脚板(德兴); 福建: 白鞋子, 洋犁头; 河南: 老鸬蒜; 湖北: 三步跳; 湖南: 三板跳, 三毛兔, 法下, 泛石子; 广东: 三脚猫、昂天海螺(惠阳); 广西: 地鸬鹚, 鸬鹚米, 燕子尾; 四川: 三步魂; 贵州: 麻芋果, 麻玉果; 云南: 地珠半夏(昆明), 滇半夏(红河); 其他: 珍珠半夏, 天鹅蛋。

功效 块茎: 有毒。燥湿化痰, 降逆止呕, 消痞散结。用于痰多咳嗽, 痰饮眩悸, 风痰眩晕, 痰厥头痛, 呕吐反胃, 胸脘痞闷, 梅核气症; 块茎生品: 外用用于痈肿痰核。

## 7302089

*Pistia stratiotes* L.

植物名 大藻《中国植志》

药材名 大藻《纲目》、《汇编》

文献名 大浮萍《生草药性备要》,猪鬃莲、水浮莲《岭南采药录》,猪莲《鉴别手册》,大萍、水莲、大萍草《植物名汇》,水葫芦《高植图鉴》。

地方名 水浮萍(广东、广西),水荷莲(浙江、江西、云南);安徽:肥猪草(滁县);广东:大浦藻,大番萍(汕头),大风萍(南粤),猪母莲(广州),水萍、水泡淋(潮阳),番萍(潮安),番浮萍、绿浮萍(潮州);广西:浮萍,莲花藻,浮藻(南宁);四川:水白菜;云南:“卡过”(傣语);其他:大浮飘。

功效 叶:祛风发汗,利尿解毒。用于感冒,水肿,小便不利,风湿痛,皮肤瘙痒,荨麻疹,麻疹不透。外用于汗斑,湿疹。

#### 7302090

*Pothos cathartii* Schott

植物名 紫苞石柑《中国植志》

药材名 石柑子《汇编》

地方名 四川:石气柑,〔黄草〕,〔大黄草〕,〔小黄草〕。

功效 全草:祛风除湿,活血散瘀,消积,止咳。

#### 7302091

*Pothos chinensis* (Raf.) Merr. var. *seemanni* Schott

植物名 石柑子《中国植志》

药材名 石柑子《四川中药志》

文献名 石气柑、柑子茵芋《分类草药性》,石蒲藤《高植图鉴》,石柑《植分学报》

地方名 石葫芦(广东、广西);广东:石蜈蚣、山甲由、上壁蜈蚣(惠阳),背带藤,石山桔,水橘碌,猛药(英德);广西:巴岩香、青葫芦茶(苍梧),爬崖香,爬石蜈蚣(兴安),爬山虎(南宁),石上蟾蜍草(昭平),石菖藤,石葫芦茶(天等),上石葫芦,〔满天星〕,竹节草(上思),上树葫芦、风瘫药、毒蛇上树(金秀),六扑风(北流),〔马连鞍〕(宁明),百步藤(田阳),大疮花、葫芦草(玉林),千年青(靖西),落山葫芦(凌云、苍梧),藤桔(柳江);四川:〔黄草〕,〔小黄草〕,〔大黄草〕,石柑儿(合江);贵州:铁斑鸠、巴岩姜(兴义),小毛铜钱菜(榕江),伸筋草、青竹标、岩石焦(荔波);云南:铁板草(沧源),关刀草(峨山)。

功效 全草:祛风除湿,活血散瘀,消积,止咳。用于癫狂,跌打损伤,肝硬化腹水,毒蛇咬伤,风湿骨痛。

#### 7302092

*Pothos chinensis* (Raf.) Merr. var. *lotienensis* C. Y. Wu et H. Li

植物名 长柄石柑《中国植志》

功效 茎叶:祛风解暑,消食止咳,镇痛。用于风湿麻木,跌打损伤,骨折,咳嗽,气痛,小儿疳积。

#### 7302093

*Pothos kerrii* Buchet ex Gagn.

植物名 长梗石柑《中国植志》

药材名 长梗石柑《广西药录》

功效 全株:祛风湿,消肿止痛。用于跌打损伤,风湿骨痛。

#### 7302094

*Pothos pilulifer* Buchet ex Gagn.

植物名 地柑《中国植志》

药材名 地柑《广西药录》

文献名 石蚌寄生《元江哈尼族药》

地方名 广西:葫芦藤(龙州);云南:“咯麻尼铺”(元江哈尼语)。

功效 全株:清心,泻热,解毒,接骨舒筋。用于乳痈,跌打损伤,骨折,癫狂。

#### 7302095

*Pothos repens* (Lour.) Druce

植物名 百足藤《中国植志》

药材名 细叶藤柑《汇编》

文献名 蜈蚣藤《高植图鉴》

地方名 蜈蚣草(广东、广西),小叶石蒲藤(广东、海南);海南:鸭子草(保亭),雄鸡尾;广西:〔神仙对坐草〕、石上蜈蚣、石蜈蚣、落地蜈蚣、百足草(陆川),细叶石柑,细蜈蚣草,大飞天蜈蚣,大蜈蚣,姜藤(龙州),下山蜈蚣(博白),倒葫芦;贵州:铁斑鸠,巴岩姜。

功效 全草:除湿凉血,止痛接骨。用于劳伤,跌打,骨折。

#### 7302096

*Pothos scandens* L.

植物名 螳螂跌打《中国植志》

药材名 螳螂跌打《云南药录》

文献名 石柑子《广西药录》

地方名 广西:上树蜈蚣;四川:细黄草,脚板连;云南:“歪拧”、“歪琳”(西双版纳傣语),石柑,硬骨头,硬骨散(思茅)。

功效 茎、叶:接骨舒筋,散瘀消肿,祛风湿。用于跌打损伤,骨折,风湿骨痛,腰腿痛。

#### 7302097

*Remusatia vivipara* (Lodd.) Schott

植物名 岩芋《中国植志》

药材名 岩芋《云南中草药》

文献名 野木芋、零餘芋《高植图鉴》

地方名 云南:红岩芋(保山、思茅),红芋(思茅),红天椒(富宁),红芋头(马关),红半夏(思茅),“哈怕都姆”(傣语)。

功效 块茎或全株:有大毒。消肿杀虫,麻醉止痛。用于急性乳腺炎,跌打瘀肿,痈疮疖肿,癣疥。

#### 7302098

*Rhaphidophora decursiva* (Roxb.) Schott

植物名 爬树龙《中国植志》

药材名 爬树龙《思茅本草》

文献名 下延崖角藤《云南中草药》,裂叶崖角藤《高植图鉴》

地方名 广东:石蛇(惠阳);广西:〔过岗龙〕〔融水〕,过山标(鹿寨),上木蜈蚣(金秀),石莲藕(武鸣),当年见(靖西);贵州:万丈深(水城),山包谷(罗甸),蛇包谷;云南:过山龙、大过江龙、大芦子、大青龙、老蛇藤、青竹标(红河),大过山龙(元江、玉溪),大青竹标(通

海、澄江),大青蛇、大魅毒、麒麟尾(曲靖),麒麟叶,过江龙、爬山虎(元江),金草箍(文山)。

功效 茎、根:接骨消肿,清热解毒,止血,止痛,镇咳。用于跌打损伤,骨折,蛇咬伤,痈疮疔肿,小儿百日咳,咽喉肿痛。

## 7302099

*Rhaphidophora hongkongensis* Schott

植物名 狮子尾《中国植志》

药材名 狮子尾《广西药录》

文献名 岩角藤《汇编》,崖角藤《高植图鉴》,爬墙蜈蚣《广西植录》,密脉崖角藤《海南植志》

地方名 广东:水底蜈蚣、水底龙(清远),石壁枫(茂名),大青蛇、大青龙(高要),大蛇翁(新兴);海南:厚叶藤(保亭);广西:水蜈蚣,青竹标,石上蜈蚣(鹿寨);石风、上木蜈蚣(田林),百足草、小上石百足(玉林);贵州:大软筋藤,九龙上调;云南:过山龙(河口)。

功效 全株:有毒。活血散瘀,清热解毒,止咳,止痛。用于跌打损伤,骨痛,腹痛,支气管炎,百日咳。外用于骨折,蜂虫刺咬,毒蛇咬伤,烧、烫伤。

## 7302100

*Rhaphidophora hookeri* Schott

植物名 毛过山龙《中国植志》

药材名 爬岩龙《云南药录》

文献名 大叶崖角藤《高植图鉴》

地方名 广西:爬树龙(防城);四川:大岩藤(盐边);云南:过山龙(西双版纳),大百步还阳、龙嘴草、龙嘴(保山),大南苏。

功效 全草:清热,消炎,润肺,接骨。用于上呼吸道感染,支气管炎,哮喘,咽喉肿痛,心绞痛,跌打损伤,筋骨疼痛,骨折。

## 7302101

*Rhaphidophora peepia* (Roxb.) Schott

植物名 大叶南苏《中国植志》

药材名 青竹标《云南中草药》

文献名 高山岩角藤《云南中草药》

地方名 四川:软筋藤;云南:爬树龙(元江、思茅),大青竹标、小南苏、爬山虎、爬地龙(玉溪),小过山龙(元江、文山),岩角藤,金竹标(红河),小石芝藤(曲靖),万年青(江川),过江藤,过江龙(临沧)。

功效 全株:舒筋活络,润肺止咳。用于上呼吸道感染,支气管炎,百日咳,跌打损伤,风湿关节痛,痈肿恶疮,骨折,咽喉,心绞痛。

## 7302102

*Schismatoglottis calyptata* (Roxb.) Zoll. et Mor.

植物名 广西落檐《中国植志》

药材名 广西落檐《广西药录》

地方名 广西:过山龙(隆林)。

功效 茎:用于风湿痹痛。

## 7302103

*Steudnera colocasiaefolia* C. Koch --- *S. henryana* Engl.

植物名 泉七《中国植志》

药材名 香芋《云南药录》

地方名 云南:小毒芋(思茅),团芋,“湾洪”(傣名),史徒芋。

功效 块茎:有毒。舒筋络,祛风湿,止痛,消炎散肿。用于跌打损伤,骨折,外伤出血,风湿性腿痛,类风湿性关节炎,胃痛,胃肠炎,痧症。

## 7302104

*Symplocarpus renifolius* Schott

植物名 臭崧《长白山植志》

功效 根:发汗,解热,利尿,缓泻;叶:外用于风湿症。

## 7302105

*Typhonium albidinervum* C. Z. Tang et H. Li

植物名 白脉犁头尖《中国植志》

功效 块茎或全草:有毒。解毒消肿,散结止血。

## 7302106

*Typhonium blumei* Nicholson et Sivadasan

植物名 犁头尖《新华本草纲要》

药材名 犁头尖《本草求真》

文献名 芋头草、小野芋《生草药性备要》,犁头草《本草求真》

地方名 土半夏(广东、广西、福建、云南),大叶半夏(湖南、广西),山半夏、独脚莲(广东、云南),〔半夏〕(广东、台湾),犁头七(广西、云南),老鼠尾(广东、广西、四川),独角莲(四川、江西、山西);江西:七步标(于都),三角标、三步标(全南);福建:观音芋(三明、永春),小芋草(建瓯),野芋蛋、野芋荷(宁化),旗仔草(泉州),土田七(南平),犁壁草,地雷炮;湖南:地金莲(郴县);广东:三角青(龙门),土巴豆,地巴豆,药狗丹,硫球半夏(潮安),生半夏、野荷里(五华),三角草,三角蛇(翁源),野慈姑;海南:坡芋;广西:〔山慈姑〕(邕宁),番鬼莲,假芋头,假慈姑,田间半夏,芋叶半夏,〔山茨菇〕(梧州),犁头半夏(百色),小野芋头;四川:耗子尾巴,鼠尾巴,白附子;云南:金半夏(保山),野附子(楚雄),野七、犁头尖麻芋、犁头芋、独麻芋(红河),狗半夏,充半夏,打麻刺,小独角莲,百步还原、茨菇七(思茅),芋头七;其他:小白附子。

功效 块茎或全株:有毒。解毒消肿,散结止血。用于支气管炎。外用于毒蛇咬伤,疮疡肿毒,淋巴结核,跌打损伤,外伤出血。

## 7302107

*Typhonium flagelliforme* (Lodd.) Blume --- *Heterostalis flagelliformis* Schott

植物名 鞭檐犁头尖《中国植志》

药材名 水半夏《广西本草选编》

文献名 白苞犁头尖《高植图鉴》,戟叶半夏《广西本草选编》,鞭檐犁头尖《广西植录》,戟叶犁头尖、戟叶半夏《汇编》

地方名 广西:半夏(马山、龙州),土半夏,田三七(贵县),疯狗薯(宁明)。

功效 块茎:有毒。燥湿,化痰,止咳。用于咳嗽痰多,支气管炎。外用于无名肿毒,毒虫咬伤,外伤出血。

## 7302108

*Typhonium giganteum* Engl.

植物名 独角莲《中国植志》

药材名 白附子《本草原始》、《药典》

文献名 鸡心白附子、南星附子、竹节白附《药材学》, 大犁头尖《种分》, 禹白附《药典》

地方名 牛奶白附(湖北、江西、华南、河北), 疔毒豆(东北), 红南星、麻芋子、大半夏(陕西、甘肃), 鸡心白附(上海、西藏); 河北: 太子莲; 陕西: 麻芋(陕南), 狼毒; 甘肃: 毛半夏, 唐拌子(天水); 江西: 野半夏; 福建: 犁头尖、剪刀草、玉如意、野慈姑、副本一粒红(泉州), 山野莲; 湖北: 野芋头, 野芋(均县), 滴水参、天南星(鹤峰); 广西: 野磨芋、芋叶半夏(临桂), 三步跳; 四川: 老虎芋; 西藏: “达瓦罗玛吉节洞”(藏名); 其他: 独脚一枝莲, 独叶一枝花。

功效 块茎: 有毒。祛风痰, 定惊搐, 解毒、散结、止痛。用于中风痰壅, 口眼歪斜, 语言涩滞, 痰厥头痛, 偏正头痛, 喉痹咽痛, 破伤风症。外用于瘰癧痰核, 毒蛇咬伤。

## 7302109

*Typhonium hongyanense* Z. Y. Zhu

植物名 洪雅犁头尖《云南植物研究》

地方名 四川: 团圆子(洪雅)。

功效 块茎: 解毒, 祛瘀。用于蛇虫咬伤, 顽癣, 跌打, 扭伤。

## 7302110

*Typhonium omeiense* H. Li

植物名 西南犁头尖《中国植志》

药材名 西南犁头尖《贵州药录》

地方名 广西: 野水芋(融水); 四川: 半夏、鸡包谷(峨眉), 红南星(沐川); 贵州: 天南星, 野磨芋。

功效 块茎或全草: 解毒, 消肿, 散瘀, 止血。用于毒蛇咬伤, 乳痈, 疔疮, 瘰癧, 跌打损伤, 外伤出血。

## 7302111

*Typhonium roxburgii* Schott

植物名 金慈姑(云南腾冲)、《中国植志》

功效 块茎: 用于风湿关节炎。

## 7302112

*Typhonium trifoliatum* Wang et Lo ex H. Li et al.

植物名 三叶犁头尖《中国植志》

地方名 山西: 范半夏(太谷范村), 代半夏(代县)。

功效 块茎: 有毒。燥湿化痰, 止呕。

## 7302113

*Typhonium trilobatum* (L.) Schott

植物名 马蹄犁头尖《中国植志》

药材名 马蹄犁头尖《广西药录》

文献名 裂叶犁头尖《广西植录》, 三裂叶犁头尖《高植图鉴》, 山半夏《云南植志》

地方名 广西: 三裂半夏; 云南: 野半夏、“碰三那”(西双版纳傣语), 马蹄跌打(景洪), 小黑牛(莲山)。

功效 块茎: 有毒。祛风寒, 消肿, 止痛。用于乳腺炎, 毒蛇咬伤, 痈疽肿毒, 血管瘤, 淋巴结结核, 跌打

损伤, 外伤出血。

备考 云南个别地区作半夏入药。本品有毒, 与半夏功效不同, 不宜代用。

## 7302114

*Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng.

植物名 马蹄莲《中国植志》

药材名 马蹄莲(广西)

文献名 一瓣莲《花镜》, 野芋(广西《园林药录》)

地方名 〔海芋〕、水芋、观音莲(华北); 上海: 花芋, 慈姑花。

功效 块茎: 有毒。清热解毒。用于预防破伤风。外用于烫火伤。

## 7303 浮萍科 Lemnaceae

## 7303001

*Lemna minor* L.

植物名 浮萍《中国植志》

药材名 浮萍《唐本草》、《汇编》

文献名 水萍、水花《本经》, 水廉《吴普本草》, 水白、水苏《别录》, 浮萍子《本草经集注》, 水上浮萍《唐本草》, 小萍子《本草拾遗》, 青萍《世医得效方》, 小浮萍《纲目》, 水中芥子草、水衣、蛙食、鱼食、池星、鸭褥、九子萍《新纲》, 绿背浮萍《中药志》。

地方名 浮萍草(天津、山东、浙江、江西), 田萍(天津、福建), 水萍草(河北、江苏、江西); 吉林: 青苔, “布平亨”(朝名); 内蒙古: “乌纳干·图茹”、“出如各”(蒙名); 山东: 水面草(烟台); 江苏: 水肥草, 水浮萍; 广西: 浮飘; 四川: 青浮萍; 其他: 小青萍, 小浮子, 水上漂, 无根草。

功效 全草: 宣散风热, 透疹, 利尿。

## 7303002

*Lemna perpusilla* Torr. --- *Lemna paucicostata* Hegelm.

植物名 稀脉浮萍《中国植志》

药材名 稀脉萍《江苏植志》

文献名 水萍、青萍《中国植物图鉴》, 浮萍、红萍《台湾中药材图鉴》

功效 全草: 散风, 透疹, 利尿。用于麻疹不透, 风疹瘙痒, 水肿尿少。

## 7303003

*Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid.

植物名 紫萍《纲目》、《中国植志》

药材名 浮萍《唐本草》、《药典》

文献名 萍《尔雅》, 水萍、水花《本经》, 水廉《吴普本草》, 水白、水苏《别录》, 藻《尔雅》郭璞注, 萍子草《补缺肘后方》, 小萍子《本草拾遗》, 浮萍草《图经》, 紫背浮萍《圣济总录》, 紫浮萍《世医得效方》, 水鲜《品汇精要》, 九子萍《群芳谱》, 水衣、蛙食、鱼食、池星、浮藻、椰水帘、水中萍子草《新纲》, 草元根、水浮漂《天宝本草》, 水漂《中草药学》, 多根萍《兴安植群》

地方名 浮飘草(上海、四川), 萍(甘肃、福建), 红萍(浙江、福建、广西), 水萍草(河北、浙江、江西); 北京: 鸭子草; 陕西: 湖飘(宝鸡); 上海: 浮瓜叶, 余头蕴草; 浙

江;红漂(临安),鸭儿漂(平阳);福建:紫背萍(泉州);台湾:水遍地绵;四川:红浮漂,无根草,四开花;广西:水草,细漂(苍梧),红浮萍;云南:伏平草(昆明)。

功效 全草:宜散风热,透疹,利尿。用于麻疹不透,风疹搔痒,水肿尿少。

### 7304 黑三棱科 Sparganiaceae

#### 7304001

*Sparganium simplex* Hudson

植物名 小黑三棱《高植图鉴》

药材名 单枝三棱(拟)

文献名 单头黑三棱《兴安植群》,单枝黑三棱《秦岭植志》,单歧黑三棱《内蒙古植志》,京三棱、去皮三棱《鉴别手册》,山棱《常用中药名辨》

地方名 荆三棱(东北);内蒙古:“吉吉格-哈日-吉日巴拉吉”(蒙名);山东:水三棱,湖三棱;安徽:铁三棱;云南:三棱。

功效 块茎:破血,行气,消积,止痛。

#### 7304002

*Sparganium stenophyllum* Maxim.

植物名 狭叶黑三棱《高植图鉴》

药材名 狭叶三棱(拟)

文献名 细叶黑三棱《汇编》,三棱《中药大辞典》,京三棱、去皮三棱《鉴别手册》,山棱、荆三棱《常用中药名辨》

地方名 黑三棱(东北)。

功效 块茎:破血,行气,消积,止痛。

#### 7304003

*Sparganium stoloniferum* (Graebn.) Buch.-Ham.

植物名 黑三棱《救荒本草》、《高植图鉴》

药材名 三棱《药典》

文献名 京三棱《开宝本草》,红蒲根《图经》,半天丹乙、割坚都尉《新纲》,沙母认《朝植乡名》,荆三棱《中草药学》,光三棱《药材资料汇编》

地方名 去皮三棱(东北、内蒙古);内蒙古:“高日布勒吉-乌布斯”、“哈日-吉日巴拉吉”、“丹布各尔”、“顿卜戈拉”(蒙名);安徽:三棱关子;湖北:牙舌草(神农架);四川:毛三棱;云南:“格多诺起”(楚雄彝名),三棱子草,魔子草;其他:山棱。

功效 块茎:破血行气,消积止痛。用于癥瘕痞块,瘀血经闭,食积胀满。

备考 唐·陈藏器《本草拾遗》云:“《本经》无传,三棱总有三、四种,但取根似乌梅,有须,相连蔓如延,作紫色……”,其谓根似乌梅者,是指莎草科三棱而言,但三、四种之内,是否也包括本种,难以断言。考三棱的名称,最先是由茎三棱形的特点而命名的,莎草科三棱符合这个特征。

### 7305 香蒲科 Typhaceae

#### 7305001

*Typha angustata* Bory et Chaub.

植物名 长苞香蒲《高植图鉴》

药材名 蒲黄《本经》、《中药大辞典》

文献名 蒲《诗经》,睡、香蒲《本经》,醯、醢石《吴普本草》,甘蒲《唐本草》,蒲黄草《经效产宝》,鬼蜡烛《类证活人书》,蒲黄滓《日华子本草》,蒲槌、蒲厘《图经》,蒲棒、蒲槌《本草衍义》,蒲黄根《产乳集验方》,蒲笋《日用本草》,蒲儿根《野菜谱》,蒲蒻《纲目》,水蜡烛、水蜡烛实《广东新语》,蒲草、板枝《汪连仕《采药书》》,蒲包草《纲目拾遗》,毛蜡烛《天宝本草》,蒲草黄《药材学》,鼎萆《中国经植志》,水烛《中药志》,金萆草《现代实用中药》,蒲萆《中药大辞典》

地方名 新疆:蒲棒花粉;江苏:蒲花;福建:芦烛、芦烛油(闽东);湖南:大八毛,南花草,子忙槌。

功效 花粉(蒲黄):止血,化瘀,通淋。用于吐血,衄血,咯血,崩漏,外伤出血,经闭痛经,脱腹刺痛,跌扑肿痛,血淋涩痛;全草(香蒲):用于小便不利,乳痈;果穗(蒲棒):用于外伤出血;根茎(蒲蒻):清热凉血,利水消肿。用于孕妇劳热,胎动下血,消渴,口疮,热淋,淋病,白带,水肿,瘰癧;蒲滓(筛取蒲黄后残滓):涩肠,用于泻血,血痢。

#### 7305002

*Typha angustifolia* L.

植物名 水烛香蒲《药典》

药材名 蒲黄《本经》、《药典》

文献名 蒲《诗经》,睡、香蒲《本经》,醯、醢石《吴普本草》,蒲厘《本草经集注》,甘蒲《唐本草》,蒲黄草《经效产宝》,鬼蜡烛《类证活人书》,蒲黄滓《日华子本草》,蒲槌《图经》,蒲棒、蒲槌《本草衍义》,蒲黄根《产乳集验方》,蒲笋《日用本草》,蒲儿根《野菜谱》,蒲蒻《纲目》,水蜡烛、水蜡烛实《广东新语》,水烛《漳州府志》,蒲草、板枝《汪连仕《采药书》》,蒲包草《纲目拾遗》,毛蜡烛《天宝本草》,中央粉《新纲》,狭叶香蒲《东检》,蒲草黄、蒲棒头花、水蜡烛花粉、蒲葶、蒲萆《药材学》,水烛蒲黄《常用中药名辨》,生蒲黄、蒲黄炭《药典》

地方名 内蒙古:“敖德勒”、“毛日音-哲格斯”(蒙名);陕西:水蒲;新疆:蒲棒花粉;山东:蒲子(无棣、聊城),蒲花粉,蒲棒粉,蒲子花,蒲棒头;江苏:蒲花(南通),草蒲黄(苏州、南通),料蒲;上海:蒲包草根,蒲绒草,蒲草卵子;浙江:野蜡烛(临安);福建:水雪草,金锁草,坑归(福安),芦烛、芦油烛(闽东);河南:卜黄、蒲草毛(新乡);四川:水蜡,毛蜡(成都)。

功效 花粉(蒲黄):止血,化瘀,通淋。用于吐血,衄血,咯血,崩漏,外伤出血,经闭痛经,脱腹刺痛,跌扑肿痛,血淋涩痛;全草(香蒲):用于小便不利,乳痈;果穗(蒲棒):用于外伤出血;根茎(蒲蒻):清热凉血,利水消肿。用于孕妇劳热,胎动下血,消渴,口疮,热淋,淋病,白带,水肿,瘰癧;蒲滓(筛取蒲黄后残滓):用于泻血及血痢,涩肠。

#### 7305003

*Typha davidiana* Hand. -Mazz.

植物名 蒙古香蒲《内蒙古植志》

药材名 蒲黄《汇编》

文献名 线叶香蒲《中药大辞典》,达氏香蒲《中药

志》，达香蒲《沙漠药植》

地方名 香蒲(东北)；内蒙古：“咱格麻”、“哲格斯”(蒙名)；青海：毛腊，毛腊黄；陕西：蒲草。

功效 花粉：止血，化瘀，通淋。

#### 7305004

*Typha elephantina* Roxb.

植物名 象蒲《云南种录》

药材名 蒲黄(云南)

功效 花粉：止血，化瘀，通淋。

#### 7305005

*Typha latifolia* L.

植物名 宽叶香蒲《高植图鉴》

药材名 蒲黄《本经》、《中药大辞典》

文献名 蒲《诗经》，畦、香蒲《本经》，醯、醢石《吴普本草》，甘蒲《唐本草》，蒲黄草《经效产宝》，鬼蜡烛《类证活人书》，蒲黄滓《日华子本草》，蒲梗、蒲厘《图经》，蒲棒、蒲槌《本草衍义》，蒲黄根《产乳集验方》，蒲笋《日用本草》，雷蒲、畦醢《救荒本草》，蒲儿根《野菜谱》，蒲菹《纲目》，蒲灰《和汉药物学》，阔叶香蒲《种分讲义》，会蒲《中国蔬菜》，蒲菜《经济植物学》

地方名 卜黄(东北)，水蜡烛(湖南、河北)；吉林：卜东麦；内蒙古：“乌日根、哲格斯”、“苏色尔默得哥”(蒙名)；河南：蒲草，蜡棒；湖南：大八毛，毛蜡，盐包草；四川：水蜡烛根，水蜡烛花粉。

功效 花粉：止血，化瘀，通淋；全草：用于小便不利，乳痈；果穗：用于外伤出血；根茎：清热凉血，利水消肿；蒲滓：用于泻血及血痢。

#### 7305006

*Typha minima* Funk-Hoppe

植物名 小香蒲《沙漠植志》

药材名 蒲黄《新疆药植志》

文献名 火烛《兰志》

地方名 内蒙古：“道日那音、哲格斯”(蒙名)；青海：毛腊烛。

功效 花粉：止血，化瘀，通淋。

#### 7305007

*Typha orientalis* Presl

植物名 东方香蒲《高植图鉴》

药材名 蒲黄《本经》、《药典》

文献名 蒲《诗经》，畦、香蒲《本经》，醯、醢石《吴普本草》，甘蒲《唐本草》，蒲黄滓《日华子本草》，蒲棒、蒲槌《本草衍义》，蒲菹《纲目》，中央粉《新纲》，蒲白《诗草木今释》，会蒲《中国蔬菜》，金管草《现代实用中药》，东香蒲《东北药植志》，小香蒲《经济植物学》，生蒲黄、蒲黄炭《药典》

地方名 卜黄、香蒲棒(东北)；北京：蒲子面(京郊)；湖北：水蜡烛(神农架)；贵州：毛蜡烛。

功效 花粉(蒲黄)：止血，化瘀，通淋。用于吐血，衄血，咯血，崩漏，外伤出血，经闭痛经，脘腹刺痛，跌扑肿痛，血淋涩痛；全草(香蒲)：用于小便不利，乳痈；果穗：用于外伤出血；根茎：清热凉血，利水消肿。用于孕妇劳热，胎动下血，消渴，口疮，热痢，淋病，白带，水肿，

瘰癧；滓(筛取蒲黄后残滓)：止泻血及血痢。

### 7306 石蒜科 Amaryllidaceae

#### 7306001

*Crinum asiaticum* L. var. *sinicum* (Roxb. ex Herb.) Baker

植物名 文殊兰《南越笔记》、《中国植志》

药材名 文殊兰《汇编》

文献名 [万年青]《生草药性备要》，罗裙带《纲目拾遗》，秦琼剑、牛黄伞、千层喜、文兰树《名实图考》，扁担草《分类草药性》，海蕉《南方毒植》

地方名 腰带七、九筋草(湖南、江西)，十八学士(广东、广西)；江西：千层皮(吉水)；福建：郁蕉，引水蕉、乙莲叶(泉州)；湖南：海带七(长沙、新邵)，玉带风，韭叶蕉，开喉箭(衡阳)，扁担七(长沙)，马尾(通道)，斩蛇剑(衡南)，破龙刀(郴县)，金武剑(永兴)；广东：朱兰叶(广州)，文兰(琼州)，化骨龙、没骨容(惠阳)；广西：水蕉(陆川、梧州、北海)，水笑草，裙带草，围带草(桂林)，七星剑(梧州)，[白花石蒜](柳州)，金腰带(凌云)；四川：郁金叶，裹脚叶，裹脚莲，扁担叶，蛇带草，大开喉箭(南充)；云南：绿带子、石大蒜(文山)，“里噜”(西双版纳傣语)；其他：百宝丹。

功效 叶、鳞茎：有小毒。行血散瘀，消肿止痛。用于咽喉炎，跌打损伤，痈疽肿毒，蛇咬伤；果实：用于闪筋肿大。

#### 7306002

*Crinum latifolium* L.

植物名 西南文殊兰《中国植志》

文献名 西南文殊兰《高植图鉴》

地方名 贵州：扁担叶。

功效 叶、鳞茎：有小毒。行血散瘀，消肿止痛。

#### 7306003

*Curculigo breviscapa* S. C. Chen

植物名 短茎仙茅《中国植志》

文献名 大莎草《广西药园药录》

地方名 广西：大莎草(邕宁)。

功效 根茎：用于水肿。

#### 7306004

*Curculigo capitulata* (Lour.) O. Kuntze --- *C. recurvata* (Dryand) O. Kuntze

植物名 大叶仙茅《中国植志》

药材名 大叶仙茅《汇编》

文献名 乳羊、独茅、茅爪子、河轮勒伦、婆罗门参《新纲》，大地棕根《四川中药志》，岩棕、竹灵芝《中药大辞典》，猴子包头《汇编》

地方名 福建：山棕，土七厘丹，棕参；海南：假槟榔树；广西：野棕，攢地风，大白茛，松兰，撑船草(金秀)，独脚莲(桂平)；四川：耙叶根，大地棕，阔叶仙茅，耙叶(峨眉山)；贵州：小棕根；云南：头花仙茅，大仙茅，“帕借依俄”，“爬借玉娃”(西双版纳傣语)，猴子背巾。

功效 根、根茎：润肺化痰，止咳平喘，镇静健脾，补肾固精。用于肾虚咳嗽，腰膝酸痛，白带，遗精。



## 7306005

*Curculigo crassifolia* (Baker) Hook. f.

植物名 绒叶仙茅《中国植志》

文献名 地棕《中草药通讯》

功效 根、花蕾：润肺化痰，止咳镇静。用于慢性气管炎。

## 7306006

*Curculigo orchoides* Gaertn.

植物名 仙茅《中国植志》

药材名 仙茅《海药本草》、《药典》

文献名 独茅、茅瓜子、婆罗门参《开宝本草》，独脚仙茅、蟠龙草《生草药性备要》，风台草、冷饭草《质问本草》，小地棕根《草木便方》，地棕根《分类草药性》，乳羊、河轮勒伦《新纲》，金梅苣《种称》

地方名 七厘丹、口七里(中南)，地棕(四川、贵州、湖南、广东)，千年棕(云南、湖南、江西、福建、安徽)，棕包脚(湖南、江西、广东)，棕参(福建、湖南)，独脚黄茅(广西、广东)，独脚丝茅(江西、湖南)；陕西：茅参、笔筒消(宝鸡)；浙江：山棕桐(温州、文城、乐清)；江西：千里棕(德兴、婺源)，野藜芦(翻天印)(泰和)，千青棕(景德镇)，[蛇参](南丰)；福建：天棕，山棕(厦门)，盘棕，山兰花，土白芍，土仙茅根，肾梭葛，平肝薯，棕靴子，独杆丝茅，矮棕树(宁化)，山粽子，山党参；参湾；天仙茅；湖南：丝茅根，丝茅七(黔阳、溆浦)，竹子草，[冬虫草]，野棕树，兰草花，棕包参，矮脚棕，大雷公，[小人参]，松谷草，走根草，毛瓜子；广东：独脚苏茅(五华)，仙人草(新会、睦州)，黄花草(乳源)，山棕仔，[土人参](潮阳)，黄茅(高要)，鹧鸪茶(潮安)；海南：坡葱(澄迈)，坡蒜(乐东)，坡参(保亭)，海南参(白沙)；广西：黄茅参，独行千里，盘龙草，鸪鹑草(龙州)；四川：独足绿茅根，独脚丝毛，仙茅根，独毛，一枝笔；贵州：生仙茅，小棕根；云南：野棕根、小地棕、小野棕、地吃蚤、尖刀草(红河)，仙茅参(东川)，[土虫草](昆明、保山)，山棕皮(昆明)，假虫草，似虫草。

功效 根茎：有毒。补肾阳，强筋骨，祛寒湿。用于阳痿精冷，筋骨痿软，腰膝冷痹，阳虚冷泻。

## 7306007

*Haemanthus multiflorus* Martyn.

植物名 网球花《中国植志》

药材名 网球花《广西药园药录》

文献名 虎耳兰《新华本草纲要》

功效 鳞茎：外用于无名肿毒。

## 7306008

*Hippeastrum vittatum* (L'Her) Herb. --- *Amaryllis vittata* L.

植物名 花朱顶红《中国植志》

文献名 朱顶兰《广州植志》，百枝莲《华北经植志要》，绕带蒜《上海植录》，朱顶红《新华本草纲要》

地方名 广西：独蒜，[如意草]。

功效 鳞茎：有毒。散瘀活血，解毒消肿。外用于疔疮肿毒，跌打肿痛。

## 7306009

*Hymenocallis littoralis* (Jacq.) Salisb. --- *H. americana* Roem.

植物名 水鬼蕉《中国植志》

文献名 引水蕉、郁蕉《汇编》

地方名 广西：水蕉。

功效 叶：舒筋活血。用于风湿关节痛。外用于跌打损伤，扭伤肿痛，痈肿初期。

## 7306010

*Hypoxis aurea* Lour.

植物名 小金梅草《中国植志》

药材名 小金梅草《汇编》

文献名 金梅苣《中国植物图鉴》，山非菜、龙肾子《汇编》

地方名 广西：鹧鸪菜，独脚仙茅(永福)；贵州：小仙茅，野鸡草(榕江)；云南：细毒蒜(西畴)，“啊的嘞嘎”(楚雄彝名)，[黄花地丁]，蛇头草，银香草，山萼芥，小金锁梅。

功效 全草：温肾壮阳，补气。用于病后阳虚，肾虚腰痛，疝气痛。

## 7306011

*Lycoris aurea* (L'Her) Herb. --- *Amaryllis aurea* L'Her.

植物名 忽地笑《汝猷圃史》、《中国植志》

药材名 铁色箭《纲目》、《中药大辞典》

文献名 大一枝箭《滇南本草》，鹿葱《群芳谱》，黄老鸦蒜《峨眉药植》

地方名 老雅蒜(广西、湖南、贵州、云南)，黄花石蒜(湖北、广东)；湖北：老娃蒜(神农架)；广东：独脚蒜头；广西：大野蒜(临桂)，山独蒜(桂林)；四川：岩大蒜(峨眉山)，黄龙爪；云南：独蒜(玉溪)，野独辣蒜(保山)，大毒蒜、金灯花(红河)，螃蟹花，[千张纸]，新米夜晚花。

功效 鳞茎：润肺，止咳，消肿。用于烫、火伤，疮疖癣疥，瘡块，无名肿毒。

## 7306012

*Lycoris chinensis* Traub

植物名 中国石蒜《中国植志》

功效 鳞茎：消肿，杀虫。

## 7306013

*Lycoris longituba* Y. Hsu et Q. J. Fan

植物名 长筒石蒜《中国植志》

功效 鳞茎：为提取加兰他敏的药源植物

## 7306014

*Lycoris radiata* (L'Her) Herb. --- *Amaryllis radiata* L'Her.

植物名 石蒜《中国植志》

药材名 石蒜《图经》、《汇编》

文献名 水麻《图经》，老鸦蒜、酸头草《世医得效方》，乌蒜、蒜头草、婆婆酸、一枝箭《纲目》，银锁匙、蟬螂花《纲目拾遗》，花叶不相见《八闽通志》，石垂、艾纳、天蒜、重阳花、脱红换锦、曼珠沙华《新纲》，红老鸦蒜《峨眉药植》

地方名 龙爪花(江苏、上海、安徽、湖北、陕西)，野蒜(江西、湖北、四川、安徽)，野独蒜(广西、湖南、福

建),独蒜(贵州、广西),山蒜(四川、福建);陕西:乌头蒜(宝鸡);山东:山乌毒,乌毒;江苏:新米夜晚花,毛蟹花,野水仙;上海:龙爪草头;浙江:三十六桶(绍兴、建德、淳安、乐清、丽水),头痛槌;安徽:千层剥;江西:义八花,月月红(丰城),秃蒜;福建:九层蒜,鬼蒜(福州、永泰、福安、霞浦、宁德等),鬼蒜,鬼葱,鬼仔蒜,溪蒜(仙游),独粒蒜(南靖),螃蟹花(福州、福清),山薤头,猪母薤,山落巧(藜芦)、藜芦干(厦门);台湾:兔耳草;湖北:石百合,山独蒜,避蛇生(神农架);湖南:毒大蒜,净依子,青风剑,独脚伞,野鬼蒜,野大蒜,臭大蒜,岩大蒜,背蛇蒜(常德),石大蒜;广西:毒蒜,真武剑,红花石蒜(贺县);四川:天鸽玉;贵州:鼻血花;其他:岩蒜,老娃蒜,头痛蒜,头痛薯,无义草。

**功效** 鳞茎:有毒。祛痰,消肿,杀虫。外用于淋巴结核,疔疮疖肿,风湿关节痛,水肿,小便不利,咳嗽痰喘,食物中毒,蛇咬伤,也可灭蛆,消水肿。

### 7306015

*Lycoris sprengeri* Comes ex Baker

**植物名** 换锦花《中国植志》  
**药材名** 换锦花《名实图考》、《中药志》  
**文献名** 脱红换锦、脱绿换锦《南越笔记》  
**功效** 鳞茎:有毒。祛痰,消肿,杀虫。  
**备考** 《江苏植志》误为“换棉花”。

### 7306016

*Lycoris squamigera* Maxim.

**植物名** 鹿葱《群芳谱》、《中国植志》  
**药材名** 鹿葱《中药志》  
**文献名** 金钹、金灯草《遵生八笺》,夏水仙《江苏南部种册》,落叶花台《科裁》,紫花石蒜《药学报》  
**地方名** 江苏:〔藜芦〕、老和尚头、石蒜(连云港)。  
**功效** 鳞茎:有毒。祛痰,消肿,杀虫。

### 7306017

*Narcissus poeticus* L.

**植物名** 红口水仙《中国植志》  
**文献名** 诗人水仙、兔子水仙《药学报》  
**功效** 鳞茎:具某种抗癌效能。

### 7306018

*Narcissus tazetta* L. var. *chinensis* Roem.

**植物名** 水仙《中国植志》  
**药材名** 水仙《本草会编》、《汇编》  
**文献名** 金盏银台《洛阳花木记》,仙兰《三余帖》,女史花、姚女儿《内观日疏》,奈祇《酉阳杂俎》,雅蒜《长物志》,天葱《南阳诗注》,玉玲珑《花镜》,雅客、凌波客、凌波仙子、水仙蓓《满鲜植汇》,厦门水仙、崇明水仙、漳州水仙、中国水仙《药学报》,水仙花《中药大辞典》  
**地方名** 四川:水仙头,水仙根。  
**功效** 鳞茎:有小毒。清热解毒,散结消肿。用于腮腺炎,痢疖肿毒初起红肿热痛;花:祛风除热,活血调经。

### 7306019

*Zephyranthes candida* (Lindl.) Herb. - *Amayllis candida* Lindl.

**植物名** 葱莲《中国植志》  
**药材名** 葱莲《中药药学》  
**文献名** 白菖蒲莲《华北经植志要》,白花菖蒲莲《科裁》,白菖蒲《中国植物图鉴》,玉帘〔日名〕《中国植志》  
**地方名** 葱兰(华北、江苏、浙江、安徽、广西);福建:肝风草(福州),惊风草;广西:白花独蒜(南宁)。  
**功效** 全草:有毒。平肝熄风,镇痉解痛。用于小儿急惊风,疳热,癫痫,破伤风。外用于疮疡肿毒。

### 7306020

*Zephyranthes grandiflora* Lindl. - *Z. carinata* Herb.

**植物名** 韭莲《中国植志》  
**药材名** 韭菜莲《汇编》  
**文献名** 茵草花《满州植录》,菖蒲莲、红玉帘《华北经植志要》,红菖蒲《中国植物图鉴》,红花菖蒲莲《科裁》,风雨草《广西药录》,韭兰《浙江药植志》,红菖蒲莲《云南种录》  
**地方名** 赛番红花(广西、贵州),风雨花(华北、广东、广西、浙江、贵州);广西:独蒜(昭平);四川:老鸦蒜(成都);贵州:旱水仙,空心韭菜。  
**功效** 全草及鳞茎:散热解毒,凉血补血。用于吐血,血崩。外用痈疮红肿,跌打损伤,毒蛇咬伤。

## 7307 鸢尾科 Iridaceae

### 7307001

*Belamcanda chinensis* (L.) DC.

**植物名** 射干《中国植志》  
**药材名** 射干《本经》、《药典》  
**文献名** 乌扇、乌蒲《本经》,黄远《吴普本草》,乌薤《广雅》,乌翼、乌吹、草姜《别录》,夜干《本草经集注》,鬼扇《补缺肘后方》,风翼《本草拾遗》,〔仙人掌〕、〔紫金牛〕《土宿本草》,野萱花、扁竹《纲目》,地篇竹《镇江府志》,较剪草、黄花扁蓐《生草药性备要》,秋蝴蝶、蝴蝶花《花镜》,马蝗花《名实图考》,开喉箭、黄知母《分类草药性》,玉燕、扁筑、鬼前、麝乾《新纲》,扁竹兰《形性鉴别》  
**地方名** 山蒲扇(东北、陕西、甘肃、湖北),冷水丹(江苏、江西),铁扁担(江苏、江西、湖南、福建),凤翼花、扁兰(陕西、甘肃、宁夏),老鸦扇(陕西、河南),老君扇(湖南、贵州),〔金盏花〕(东北),金钥匙(江西、安徽),金蝴蝶、金丝蝴蝶(浙江、福建),寸干、寸甘(四川、湖北),射干苗(广东、广西、安徽),扁蓐、较剪兰、交剪兰、扁蓐片、剪刀桔(广东、广西);吉林:“勃姆布菜”(朝名);河北:草蒲扇;山西:马扁;内蒙古:“卜西勒色”(蒙名);甘肃:扇把子,大扇把子,大马蒿,透山龙;山东:老婆扇子(昆崙山、莱阳、威海、海阳、五莲),皮狐扇子(莱芜),马尾扇子,老虎扇子(五莲),燕尾(郯城),山大刀;江苏:紫良姜、鬼蒲扇(南云台山),黄姜(苏州),冰水花,冷水花(南京),姜黄根;浙江:金绞剪(泰顺、温州、洞头),土较剪;安徽:金扁担;江西:单边、扁担草(婺源);福建:扁竹花(尤溪),蝴蝶花根(闽东),鬼子扇;台湾:尾蝶花,红尾蝶花;河南:扁竹梁;湖北:老君丹,扇子草;湖南:高搜山(麻阳、凤凰),凤凰草(涟源),野鬼

扇(江华),野姜(凤凰),雨面子(新宁),一扇风(郴县、淑浦),七山虎(永顺),偏山虎(黔阳);广东:绞剪七(英德),绞剪叉,剪刀绞,剪刀草,野剪刀花,鬼绞剪;广西:六甲花,鱼翅草,紫蝴蝶、剪刀夹(北海),扇把草,开口箭,跑马攀鞍,鲤鱼尾,交剪王;贵州:上搜山虎,扁竹黄,知母,铜锤打天门;云南:金鞭(昆明),“牙竹号”(西双版纳傣语)。

功效 根茎:清热解毒,消痰,利咽。用于热毒痰火郁结,咽喉肿痛,痰涎壅盛,咳嗽气喘。

#### 7307002

*Crocasmia crocosmiflora* (Nichols.) N. E. Br. --- *Tritonia crocosmiflora* Nichols.

植物名 雄黄兰(四川)、《中国植志》

药材名 雄黄兰《湖南药物志》

文献名 观音兰《云南药录》

地方名 湖南: [山慈姑], 搜山虎; 贵州: 搜山黄; 云南: 标竿花, 倒挂金钩, 黄大蒜, 扭子药, 火焰兰。

功效 球茎: 散瘀止痛, 消炎, 止血, 生肌。用于跌打损伤, 外伤出血, 疮疖肿毒, 腮腺炎。

#### 7307003

*Crocus alata* Regal et Sem.

植物名 白番红花《中国植志》

功效 球茎: 有毒。维吾尔族医生代马钱子药用。

#### 7307004

*Crocus sativus* L.

植物名 番红花《品汇精要》、《中国植志》

药材名 西红花《药典》

文献名 撒法泊夫兰《饮膳正要》, 撒馥兰《品汇精要》, 藏红花《纲目拾遗》, 撒法即《医林集要》, 秋番红花《华北经济植志要》

地方名 天津: 印度红花; 西藏: “卡辣哭贡”(藏名)。

功效 柱头: 活血化瘀, 凉血解毒, 解郁安神。用于经闭癥瘕, 产后瘀阻, 温毒发斑, 忧郁痞闷, 惊悸发狂。

#### 7307005

*Eleutherine americana* Merr. et Heyne

植物名 小红葱《云南种录》

药材名 红葱头(广西)

文献名 小红蒜(拉汉英种称), 红葱(广西本草选编)

功效 全草、鳞茎: 清热解毒, 散瘀消肿, 止血。用于吐血, 咯血, 痢疾, 闭经腹痛。外用于风湿性关节炎, 跌打肿痛。

#### 7307006

*Eleutherine plicata* Herb.

植物名 红葱《中国植志》

药材名 红葱《云南中草药选》

文献名 具褶香雪兰《云南药录》, 红蒜(拉汉英种称)

地方名 云南: 小红葱, 小红蒜(思茅、西双版纳), “喝剖娘”(西双版纳傣语), “怕波亮”(傣语), 百步还阳(耿马)。

功效 鳞茎: 用于刀伤, 癰疽抽搐, 关节疼痛, 头晕, 心慌, 胸闷呕吐, 全身疲乏无力。

#### 7307007

*Freesia refracta* Klatt

植物名 香雪兰《中国植志》

药材名 香雪兰《峨眉药植资源》

文献名 小菖兰《种称》

地方名 江苏: 小苍兰; 湖北: 菖蒲兰(武汉); 四川: 蛇药(峨眉山), 小鸢尾。

功效 球茎: 用于蛇伤。

#### 7307008

*Gladiolus gandavensis* Van Houtte

植物名 唐菖蒲《中国植志》

药材名 标杆花《云南药录》

文献名 八百锤、千锤打、铜锤《汇编》

地方名 芋芽莲(东北、云南), 剑兰(广东、广西、北京); 北京: 十样锦, 十样景; 湖北: 菖兰(武汉); 湖南: 田三果; 四川: 蒜苗七, 十三太保(峨眉山); 贵州: 菖蒲花(贵阳), 搜山黄, 搜山虎; 云南: 谷穗花(曲靖)。

功效 球茎: 有毒。解毒散瘀, 消肿止痛。用于跌打损伤, 咽喉肿痛。外用于腮腺炎, 疮毒, 淋巴结炎。

7307009 见 7307021a

#### 7307010

*Iris anguifuga* Y. T. Zhao ex X. J. Xue

植物名 单苞鸢尾《中国植志》

地方名 浙江: 蛇不见, 秋里青(建德、淳安); 江西: [夏无踪]; 湖北: [避蛇参], 春不见; 广西: 仇人不见面。

功效 根茎: 消肿解毒, 泻下通便。用于毒蛇咬伤, 毒蜂螫伤, 癰疽疮毒。

#### 7307011

*Iris bulleyana* Dykes f. *alba* Y. T. Zhao

植物名 白花西南鸢尾《中国植志》

药材名 白花西南鸢尾《迪庆藏药》

文献名 鸢尾《迪庆藏药》

功效 种子: 解毒, 止痛, 杀虫, 生肌。用于“培根”病, “木保”病, 中毒病, 胃肠寒热往来, 肠绞痛, 胀闷, 胸部壅塞, 黄疸, 虫病, 疮口死肉, 烫伤; 花(研调油): 外用于烫伤。

#### 7307012

*Iris colletii* Hook. f.

植物名 高原鸢尾《中国植志》

药材名 小棕皮头(云南昆明)

文献名 小棕包《高植图鉴》

功效 根、根上叶基及叶: 有大毒。祛瘀, 止血, 止痛, 通窍。用于跌打内伤, 鼻塞不通, 神经性牙痛, 外伤出血。

#### 7307013

*Iris confusa* Sealy

植物名 扁竹兰《中国植志》

药材名 扁竹兰(云南)

文献名 都拉鸢尾《汇编》, 蓝花扁竹《云南中草药选》

地方名 扁竹根、扁竹(云南、四川); 云南: 都拉。

功效 全草: 清热解毒。用于急性扁桃腺炎, 急性

咽喉炎,解马头、草类、食物中毒。

### 7307014

*Iris decora* Wall. --- *I. nepalensis* D. Don --- *I. yunnanensis* Levl. - *Junopsis decora* (Wall.) W. Schulze

植物名 尼泊尔鸢尾《中国植志》

地方名 云南:小兰花。

功效 根:轻泻,利尿。外用于疔疮,伤肿。

### 7307015

*Iris delavayi* Mich.

植物名 长草鸢尾《中国植志》

药材名 长草鸢尾《迪庆藏药》

文献名 高草鸢尾《云南种录》

功效 种子:解毒,止痛,杀虫,生肌。用于“培根”病,“木保”病,中毒病,胃肠寒热往来,肠绞痛,胀闷,胸部壅塞,黄疸,虫病,疮口死肉,烫伤;花(研调油):外用,烫伤。

### 7307016

*Iris dichotoma* Pall.

植物名 野鸢尾《中国植志》

药材名 白花射干《名实图考》、《中药大辞典》

文献名 冷水丹《名实图考》,搜山虎、扁竹兰《清州植录》,二歧鸢尾《中国植物学杂志》,鸢尾花《科裁》,歧花鸢尾《内蒙古中草药》,白射干《华北经植志要》

地方名 扁蒲扇(陕西、吉林),〔射干〕(陕西、宁夏、河北),不三草花、金盏子花(东北),山马兰、山马兰(河北、北京);河北:扇子草,〔萱草〕(承德);内蒙古:“海齐-乌布斯”(蒙名),射干鸢尾,扇扇草,芭蕉扇;山西:老鸹扇;陕西:土射干(西安、商洛),搜山狗(华山);江苏:〔白前〕(连云港、灌云),〔白薇〕(徐州),羊角草。

功效 全草及根:有小毒。清热解暑,活血消肿。用于咽喉肿痛,扁桃体炎,肝炎,肝肿大,胃痛,乳腺炎。

### 7307017

*Iris ensata* Thunb. --- *I. kaempferi* Sieb. ex Lem. --- *I. ensata* Thunb. var. *hortensis* Makino et Nemoto

植物名 玉蝉花《中国植志》

文献名 花萼蒲《高植图鉴》,紫花鸢尾(东检),东北鸢尾《庐山栽植》

地方名 吉林:玉蝉花籽;四川:蒲巴扇根(广元)。

功效 根茎:有小毒。清热消食,开胸消胀。用于食积饱胀,胃痛及气胀水肿。

### 7307018

*Iris halophila* Pall. --- *I. spuria* L. var. *halophila* (Pall.) Dykes

植物名 喜盐鸢尾《中国植志》

文献名 碱地马兰《汇编》

地方名 新疆:马兰,新疆马兰子,黄花射干,厚叶马兰。

功效 种子或根:用于急性咽喉炎,黄疸型传染性肝炎;花、种子:用于月经过多。

### 7307019

*Iris japonica* Thunb. --- *I. sanguinea* auct. non Donn ex Horn.

植物名 蝴蝶花《秘传花镜》、《中国植志》

药材名 扁竹根《分类草药性》、《汇编》

文献名 日本鸢尾《中国植物学杂志》,花萼蒲、〔射干〕《鉴别手册》

地方名 铁扁担(浙江、安徽、上海、湖北),豆豉叶、豆豉叶根、豆豉草、上知母(四川、贵州);浙江:燕子花,紫燕,蓝花铰剪(乐清、温州、平阳、泰顺、龙泉);安徽:金扁担,蝴蝶花根;台湾:白尾蝶花;湖北:扁担根、榴草(神农架);湖南:开喉剑,过山虎,搜山虎,六角草,知母,告剪草,剑刀草,兰花草,扁竹,扁担三七(常德);四川:鬼扇,鸭儿花(南川),扁竹叶《峨眉山》,扁担叶;贵州:鸭儿参,下搜山(贵阳),下搜山虎,铁豆柴。

功效 根茎、全草:清热解毒,消肿止痛,通便杀虫。用于肝炎,肝肿大,肝区痛,胃痛,食积胀满,咽喉肿痛,跌打损伤;根茎:泻下通便。用于便秘。

备考 本种有时误订为 *Iris sanguinea* Donn ex Horn.

### 7307020

*Iris kemaonensis* D. Don ex Royle --- *I. kamanensis* Wall. --- *I. kingiana* Foster

植物名 库门鸢尾《中国植志》

药材名 库门鸢尾《迪庆藏药》

功效 种子:解毒,止痛,杀虫,生肌。用于“培根”病,“木保”病,中毒病,胃肠寒热往来,肠绞痛,胀闷,胸部壅塞,黄疸,虫病,疮口死肉,烫伤;花(研调油):外用于烫伤。

### 7307021

*Iris lactea* Pall.

植物名 白花马兰《中国植志》

文献名 圆果马兰《西藏中草》

地方名 西藏:马兰,马兰子,马兰。

功效 花、种子、根:清热解毒,利尿,止血。用于急性咽喉炎,黄疸型传染性肝炎,痢肿疮疖,吐血,衄血,外伤出血等症。

### 7307021a

*Iris lactea* Pall. var. *chinensis* (Fisch.) Koidz. --- *I. ensata* Thunb. var. *chinensis* Maxim.

植物名 马兰《图经》、《中国植志》

药材名 马兰子《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 马帚《尔雅》,旱蒲《礼记》,马薹《礼记》郑玄注),薹实、剧草、三茎、豕首《本经》,剧荔华《吴普本草》,荔实《别录》,荔《说文》,马棘子、薹草花《图经》,马莲《释草小记》,薹草、马薹叶、马薹花、马薹根《纲目》,马棘花《水东日记》,马棘、铁扫帚《新纲》,华马兰《青海中草》

地方名 马莲子(西北、河北、内蒙古、福建),马帚子(福建、湖南),〔马兰〕(华北、西北、东北、山东、湖北),〔薹草子〕(华北);河北:铁扫帚子;内蒙古:“查黑勒德格”、“立米枚独克”(蒙名);陕西:马莲草;甘肃:〔百部〕;青海:“玛能择玛”、“哲玛”(藏名);山东:马兰草(海阳);江苏:旱蒲花;浙江:山必博;安徽:紫雪草,蓝花草;福建:马管子,铁扫手;湖南:箭杆风;四川:漂叶

花(成都);西藏:“泼者”(藏名);其他:马兰花,马兰子,羊胡子草,马棘木。

功效 种子:清热,利湿,止血,解毒。用于黄疸,泻痢,吐血,衄血,血崩,白带,喉痹,痈肿;花:清热,解毒,止血,利尿。用于喉痹,吐血,衄血,小便不通,淋病,疝气,痈疽;叶:用于喉痹,痈疽,淋病;根:清热解毒。用于喉痹,痈疽,风湿痹痛。

## 7307022

*Iris leptophylla* Lingelsheim

植物名 薄叶鸢尾《中国植志》

地方名 四川:茅基蒿。

功效 根茎:泻下。

## 7307023

*Iris potaninii* Maxim.

植物名 卷鞘鸢尾《中国植志》

文献名 高原鸢尾《青藏药图》

地方名 青海:“玛能择玛”(藏名)。

功效 果实:退烧,解毒,驱虫。用于阑尾炎,蛔虫,蛲虫病。

## 7307024

*Iris ruthenica* Ker-Gawl. var. *nana* Maxim.

植物名 矮紫苞鸢尾《中国植志》

药材名 矮紫苞鸢尾《迪庆藏药》

功效 种子:解毒,止痛,杀虫,生肌。用于“培根”病,“木保”病,中毒病,胃肠寒热往来,肠绞痛,胀闷,胸部壅塞,黄疸,虫病,疮口死肉,烫伤;花(研调油):外用于烫伤。

## 7307025

*Iris sanguinea* Donn ex Horn.

植物名 溪荪《中国植志》

药材名 溪荪《纲目》

文献名 红眼兰《满州植录》,东方鸢尾《中国植物学杂志》

功效 根茎及根:消积行水。用于胃痛,腹痛。

## 7307026

*Iris scariosa* Willd. ex Link

植物名 膜苞鸢尾《中国植志》

文献名 镰叶马蔺《新疆中草药》

功效 根:用于咽喉肿痛,音哑。

## 7307027

*Iris setosa* Pall. ex Link

植物名 山鸢尾《中国植志》

药材名 山鸢尾《长白山植药志》

功效 根茎、花:外用于疥疮,牙痛,脓肿。

## 7307028

*Iris speculatrix* Hance --- *I. grijsi* Maxim.

植物名 小花鸢尾《中国植志》

药材名 小花鸢尾《汇编》

文献名 亮紫鸢尾《中国植物学杂志》,华鸢尾《高植图鉴》

地方名 湖北:野兰花(神农架);广西:仇人不见面,龙阳胆草;四川:六棱麻,八棱麻,九节地菖蒲,九节箭

菖蒲;贵州:六轮茅,菖蒲。

功效 根、根茎:有小毒。活血,镇痛。用于跌打损伤,闪腰岔气,狂犬咬伤,风湿,风寒骨痛。

## 7307029

*Iris tectorum* Maxim.

植物名 鸢尾《中国植志》

药材名 鸢尾《本经》、《汇编》

文献名 乌园《别录》,乌鸢、鸢头《纲目》,扁竹(名实图考),屋顶鸢尾《中国植物学杂志》,土黄姜《上农药志》

地方名 [射干](西北、西南),蓝蝴蝶(广东、广西、浙江、湖南、湖北),蝴蝶花(安徽、浙江、广西),蝴蝶兰(河北、广东),铁扁担(江苏、安徽),冷水汁(安徽、江西、湖北),土知母(湖北、四川、贵州),蛤蟆七(陕西、湖北),搜山虎(湖南、湖北、云南),中搜山(湖南、贵州);陕西:青蛙七(眉县、汉中),蟆马七(汉中、眉县、石泉、紫阳、平利),克马七,土射干(长安、商洛),搜山狗(山阳、柞水),老鸦扇(柞水),扁竹花,扁竹叶(汉中),紫蝴蝶;浙江:野三七;江西:蛤蟆跳缺,金蛤蟆跳缺;湖北:大救驾,冷水七(神农架);湖南:金针,扁把草,下搜山,下山虎,兰七,天蜈蚣,摇痕七,偏地草,勒马回阳,蒲扇风,乌仔花,老鹰尾,老君扇,扇柄草;广西:赤利麻,一枝箭,开口箭,乌七,土田七(金秀);四川:扁竹根,豆豉叶,算巴根,充射干(广元),蛇头知母;贵州:鹅参,鹅参七,豆豉草,鸭儿参,鸭屁股,中搜山虎;云南:扁雀,百样解、大白解、金鸭子(保山),扁竹兰(昆明),九把刀(昭通),蜘蛛螭(临沧),兰花矮托(思茅)、燕子花;其他:扁把子,水兰。

功效 根茎:有小毒。消积,破瘀,行水,解毒,消积。用于跌打损伤,风湿疼痛,咽喉肿痛,食积腹胀,疟疾。外用疳疔肿毒,外伤出血。

## 7307030

*Iris tenuifolia* Pall.

植物名 细叶鸢尾《中国植志》

药材名 老牛搯《汇编》

文献名 丝叶鸢尾《吉野》,安胎灵《沙漠药植》,桑牛牛朴《汇编》

地方名 老牛拽、细叶马蔺(东北);内蒙古:“楚尔布尔-乌布斯”、“塔赫-乌布斯”(蒙名)。

功效 根、种子:安胎养血。用于胎动血崩;种子:清热,利湿,止血,解毒。

## 7307031

*Iris rigridia* Bunge

植物名 粗根鸢尾《中国植志》

药材名 粗根马莲(东北)

文献名 拟虎鸢尾《中国植物学杂志》

地方名 湖南:蛇不见面(蓝山县瑶族名)。

功效 根:用于毒蛇咬伤,跌打损伤,瘀血肿痛。

## 7307032

*Iris typhifolia* Kitagawa

植物名 北陵鸢尾《中国植志》

文献名 香蒲叶鸢尾《东检》

地方名 四川：“直玛”(若尔盖藏名)。

功效 根、种子：有小毒。解热抗菌，泻下催吐，外伤感染。

## 7307033

*Iris uniflora* Pail. ex Link

植物名 单花鸢尾《中国植志》

地方名 四川：“则马扛鸡”(若尔盖藏名)。

功效 种子、根：清热解毒。用于咽喉肿痛，黄疸肝炎；根：泻下，逐腹水。

## 7307034

*Iris wattii* Baker

植物名 扇形鸢尾《中国植志》

药材名 大扁竹兰(云南)

文献名 扇形鸢尾《云南种录》

地方名 云南：蓝花扁竹、扁竹鸢尾、扁竹、都拉(红河)，(射干)，蝴蝶花，铁扇子，老君扇。

功效 根茎：凉血消炎。用于急性扁桃体炎，急性咽喉炎，急性支气管炎，食物中毒。

## 7310 百部科 Stemonaceae

## 7310001

*Croonia japonica* Miq. --- *C. kiushiana* Makino

植物名 金刚大《高植图鉴》

药材名 黄精叶钩吻《汇编》

功效 根茎及根：有毒。清散内热，解蛇毒。用于咽喉肿痛，银环蛇咬伤，跌打损伤。

## 7310002

*Stemona japonica* (Blume) Miq. --- *Stemona ovata* Nakai

植物名 蔓生百部《药典》

药材名 百部《本草经集注》、《药典》

文献名 百部根《别录》，百部草《抱朴子》，嗽药《本草经集注》，婆妇草《日华子本草》，百条根、野天门冬、百奶《杨氏经验方》，九丛根《草木便方》，九虫根《分类草药性》，婆律香、王富《新纲》，九十九条根、多子母《土农药志》，山百根《中药志》，蔓草百部、卵叶百部《中国药植志》

地方名 江苏：一窝虎；浙江：牛虱根，土百部，山萝卜(嵊县)，牛虱股(泰顺)，牛虱众(文成)，野天冬；安徽：长头草，肥百部，子母；福建：牛虱鬼(闽东)；河南：药虱药；湖北：八棒头，闹虱药；湖南：多崽婆，儿多母苦；广西：大叶百部；其他：鱼目油，百部带。

功效 块根：润肺下气止咳，杀虫。用于新久咳嗽，肺劳咳嗽，百日咳。外用于头虱，体虱，蛲虫病，阴痒症；密百部：润肺止咳。用于阴虚劳嗽。

## 7310003

*Stemona japonica* (Blume) Miq. var. *multiflora* Z. W. Xie

植物名 多花百部《品种论述》

药材名 百部(江西)、《品种论述》

功效 块根：有毒。润肺下气止咳，杀虫。

## 7310004

*Stemona mairei* (Levl.) Krause --- *S. vagula* W. W. Smith --- *S. wardii* W. W. Smith --- *S. stenophylla* Diels --- *S. filifolia* Schltr.

植物名 云南百部《高植图鉴》

药材名 云南百部《中药志》

文献名 狭叶百部《中国药植志》，线叶百部《云南药录》

地方名 云南：百部(丽江)，丽江百部。

功效 块根：有毒。润肺下气止咳，杀虫，止痒。

## 7310005

*Stemona parviflora* C. H. Wright

植物名 细花百部《高植图鉴》

药材名 细花百部《汇编》

文献名 披针叶百部《高植图鉴》，小花百部《海南植志》

地方名 海南：大百部，百部莎。

功效 块根：用于气管炎，支气管炎，咽喉炎。

## 7310006

*Stemona sessilifolia* (Miq.) Franch. et Sav. --- *S. erecta* C. H. Wright

植物名 直立百部《高植图鉴》

药材名 百部《本草经集注》、《药典》

文献名 百部根《别录》，滁州百部《大观本草》，婆妇草《中国植物图鉴》，肥百部《药材学》，虱药《鉴别手册》，嗽药、百条根、药虱药《简明中医辞典》，百部奶《品种论述》

地方名 百部袋(江苏、山东)；山东：百部子；江苏：一窝虎(云台山)；浙江：百部草；安徽：山百部，白布袋，药萝卜，虱枯，百部带(滁县)，水萝卜；河南：百奶(新乡)。

功效 块根：润肺下气止咳，杀虫。用于新久咳嗽，肺劳咳嗽，百日咳。外用于头虱，体虱，蛲虫病，阴痒症；密百部：润肺止咳。用于阴虚劳嗽。

## 7310007

*Stemona tuberosa* Lour. --- *S. gloriosoides* Voigt --- *S. acuta* C. H. Wright

植物名 对叶百部《药典》

药材名 百部《本草经集注》、《药典》

文献名 百部根《别录》，衡州百部《图经》，白蕪《中国药植志》，块根百部《值分讲义》，大百部《高植图鉴》，嗽药、药虱药《简明中医辞典》

地方名 野天门冬根、九重根(四川、云南、贵州)，土百部(四川、云南)，大叶百部(广西、广东、四川)，山百根(湖南、四川)；江西：虱药、天门通(德兴)，山薯(石城)；福建：穿山薯，虱蚤草；湖北：十耳根(鹤峰)，八棒头、八磅头、十弟花(巴东)；湖南：山百部，三百棒，牛百部，马附子、百条根、孙仔满堂(衡山)；广东：大春根药(梅县)，猫古令(新丰)；广西：牛虱薯(梧州)，龙蒙薯，杨骂茄(百色)；四川：九十九条根、九丛根、牛虱苦(峨眉)；贵州：八百崽；云南：儿多母苦，拖儿带女，九十股，“牙浪光”(西双版纳傣语)，九

股牛,牛虱子药、三八腊(文山),九古牛,百乃赛,小灵丹草。

功效 块根:润肺下气止咳,杀虫。用于新久咳嗽,肺劳咳嗽,百日咳。外用于头虱,体虱,蛲虫病,阴痒症;蜜百部:润肺止咳。用于阴虚劳嗽。

### 7311 薯蓣科 Dioscoreaceae

#### 7311001

*Dioscorea alata* L.

植物名 参薯(临安志)、《中国植志》

药材名 脚板薯(名实图考)

文献名 薯(图经),佛手山药(湖州府志),山薯(农政全书),南康薯蓣(名实图考),毛薯(南宁药志),腾冲山药(中药志)

地方名 大薯(广东、浙江),佛掌薯(华南);浙江:白薯、火棍薯(瑞安),白苕,白脚板薯,红薯,红脚板薯,草鞋薯;福建:落子薯,扫帚薯;台湾:淮山、罐薯(嘉义、南投),田薯;广东:黎洞薯、薯子(广州);广西:鸡窝薯(南宁),红毛薯;四川:方山药、方山(加工品),脚板苕;云南:青山药(耿马),四楞薯、四楞山药(景洪、小勐养),云饼山药(腾冲)。

功效 块茎:补脾肺,湿精气,消肿,止痛,能促进溃疡的肉芽生长,收水生肌使疮面结疤。用于脾胃虚弱,食少泄泻,糖尿病,遗精。外用于烫火伤及面部烂疮。

#### 7311002

*Dioscorea althaeoides* R. Knuth

植物名 蜀葵叶薯蓣(中国植志)

药材名 穿地龙(汇编)

文献名 蜀葵状薯蓣(中国经植志)

地方名 贵州:龙骨七;云南:穿山龙、细山药(武定),“生塔”(中甸藏语)。

功效 块茎:舒筋活络,祛风除湿。用于风湿麻木,跌打损伤,积食饱胀,消化不良。

#### 7311003

*Dioscorea benthamii* Prain et Burkill

植物名 大青薯(中国植志)

药材名 小叶薯蓣(广西药录)

地方名 广西:红孩儿。

功效 块茎:活血,止血。用于跌打损伤,月经不调,半身麻木,外伤出血,子宫出血等。

#### 7311004

*Dioscorea bulbifera* L.

植物名 黄独(唐本草)、《中国植志》

药材名 黄药子(本草原始)、《汇编》

文献名 土芋(本草拾遗),土卵(唐本草),黄药根(开宝本草),木药子、大苦(纲目),香芋(纲目拾遗),[山慈姑]、金线吊眼(名实图考),黄独零余子(中国药植志),零余薯(海南植志),黄药脂(中草药学),黄虾蟆、板薯、淮山薯、草茛薯(中药大辞典)

地方名 雷公薯、金丝吊蛋、薯瓜乳藤(广西、广东),铁秤陀(浙江、湖南),毛卵陀(湖南、广东、云南),首乌

(福建、贵州),棕包薯(华中);江苏:[山药](常熟);浙江:[川草薢](天目山),金丝卵蛋(慈溪),金线蛤蟆,天雷星(温州),老鼠芋(平阳);江西:毛卵子(吉安),黄座方(吉水),鬼脚板(景德镇),野薯蓣(泰和);安徽:珠芽薯蓣;福建:狗嗽子,狗嗽(福州、闽侯、福清),上首乌(惠安、同安、厦门),野尿藤(宁化、上杭),金线吊葫芦(德化、大田),山药薯,黄金藤,山淮,山薯,心薯;河南:老头蛋,毛狗蛋;湖北:[山乌龟];湖南:狗卵陀(溆浦),狗卵子、毛肾子(凤凰、长沙),毛茛子,毛翠丸(怀化),麻雀蛋(凤凰),毛十二(黔阳),牛卵子(长沙),野面薯(永兴),野脚板薯(邵阳),棕板茹;广东:大叶狗卵藤,山塘肚,双降子,山大薯、天生薯、头痛子、头风子(潮安),圆头薯,狗头薯(惠东);海南:山藤;广西:假大薯(梧州);四川:红药子,草茛苕(南川);贵州:毛黄,毛大黄,苕叶黄,毛狗卵;云南:黄狗头(文山、罗平、西畴),黄金子(楚雄),黄金山药(车里),黄腊头、毛拳头、棕包山药、蓑衣包果(文山),蓑衣包(蒙自、西畴),蓑衣草(新平),牛衣包果、毛卵薯、野山药(红河),毛薯(罗平、保山、凤庆、文山),黑衣包(西畴),苦茅薯,“苦卡拉”、“曼喃”(傣语)。

功效 块茎:有小毒。解毒消肿,化痰散结,凉血止血。用于甲状腺肿大,淋巴结结核,咽喉肿痛,吐血,咯血,百日咳,癌肿。外用于疮疖。

#### 7311005

*Dioscorea chingii* Prain et Burkill

植物名 山葛薯(中国植志)

文献名 蛤叶薯(广西植录)

地方名 广西:[三百棒](都安)。

功效 块茎:消肿止痛。用于跌打。

#### 7311006

*Dioscorea cirrhosa* Lour.

植物名 曹苣(中国植志)

药材名 薯蓣(南越笔记)、《汇编》

文献名 精魁(梦溪笔谈)、薯良(纲目拾遗)

地方名 朱砂莲(湖南、贵州),山猪薯(湖南、广西、广东),红孩儿(浙江、江西、广西),山羊头(湖南、云南);浙江:余粮,苣苣;江西:孩儿血(井冈山),土蕃茄(德兴);福建:茄榔,薯郎;台湾:薯榔,泥良;湖南:血泡、血球、铁秤陀(黔阳),血葫芦,血三七、雄黄七、牛血莲(长沙),牛血藤(花垣),朱砂七,恶边(吉苗),秤陀七、假珍珠散(龙山),红药子;广东:硬饭头(连平);海南:交手椅,猪番薯;广西:染布薯(邕宁);贵州:鸡血莲,血母,血当根,避血雷,元良,血当归;云南:金花果(永平、红河),血蛙(曲靖),羊头(金屏、屏边),羊头芋,“抱勒”(西双版纳傣语)。

功效 块茎:有毒。止血,活血,养血,理气,止痛。用于功能性子宫出血,生产出血,咯血,吐血,便血,尿血,腹泻。外用于烧伤。

#### 7311007

*Dioscorea colletii* Hook. f. --- *D. nigrescens* R. Kunth

植物名 叉蕊薯蓣(中国植志)

药材名 川草薢(本草原始)

文献名 白粉背薯蓣、黑叶薯蓣《药学报》, 棉草藓《中药大辞典》

地方名 黄山药(四川、云南); 上海: 川贝也, 粉贝也; 湖北: 土草藓(神农架); 四川: 饭沙子(峨眉山); 贵州: 蛇头草; 云南: 黄姑狸(罗平), 白山药、次黄山药(昆明), 九子不离母(玉溪), 大山药(武定), 黏沾沾, 黄姜。

功效 根茎: 祛风除湿, 止痒, 止痛。用于风湿性关节炎, 过敏性皮炎, 坐骨神经痛, 跌打损伤。

备考 《常用中药名辨》(1982)称: 上海方言将“草藓”称为“贝也”而有“川贝也”、“粉贝也”之名。

### 7311008

*Dioscorea colletii* Hook. f. var. *hypoglauca* (Palibin) Pei et C. T. Ting --- *D. hypoglauca* Palibin

植物名 粉背薯蓣《中国植志》

药材名 粉草藓《本草从新》、《药典》

文献名 草藓《本经》, 白节《吴普本草》, 竹木《雷公炮炙论》

地方名 黄草藓(浙江、福建), 黄姜(浙江、湖南、广西), 黄山药(四川、贵州、云南), 山草藓(湖北、湖南); 浙江: 上黄连(绍兴、宁波、台州), 山黄姜(奉化), 黄姜(杭州、金华、嘉兴), 黄薯(温州), 黄肠, 野猪薯(丽水); 福建: 山田薯、土薯(泉州); 广东: 麻甲头。

功效 根茎: 利湿去浊, 祛风除痹。用于膏淋, 白浊, 白带过多, 风湿痹痛, 关节不利, 腰膝疼痛。

### 7311009

*Dioscorea deltoidea* Wall.

植物名 三角叶薯蓣《中国植志》

文献名 正三角叶薯蓣《药学报》

地方名 四川: 黄山药(峨眉山); 西藏: 山药。

功效 根茎: 祛风除湿。用于胃病, 大骨节病, 风湿性心脏病, 下肢肌肉痉挛, 疲劳过度。

### 7311010

*Dioscorea deltoidea* Wall. var. *orbiculata* Prain et Burk.

植物名 圆果三角叶薯蓣《中国植志》

文献名 防己状薯蓣《药学报》

地方名 黄山药(四川、云南); 四川: 风车草(阿坝), 母猪藤(小金)。

功效 根茎: 祛风除湿。用于关节炎, 心脏病; 果实(风车子); 用于耳鸣。

### 7311011

*Dioscorea esculenta* (Lour.) Burk.

植物名 甘薯《中国植志》

药材名 甘薯《纲目》、《中药大辞典》

文献名 山薯《农政全书》

地方名 甜薯(海南、广西、云南); 云南: “马旺”(傣语)。

功效 块茎: 补虚乏, 益气力, 健脾胃, 壮肾阳。

### 7311012

*Dioscorea esquirolii* Prain et Burk.

植物名 七叶薯蓣《中国植志》

药材名 七叶薯(广西)

文献名 褐毛薯蓣《云南植志》

地方名 广西: 血参, 补血薯, 七爪金龙, 盘参, 白参(龙州)。

功效 块茎: 凉血止血, 消肿止痛。用于产后腹痛, 痛经, 肺结核, 咳血, 跌打损伤。

### 7311013

*Dioscorea fordii* Prain et Burk. --- *D. hainanensis* Prain et Burk.

植物名 山薯《中国植志》

药材名 山薯《品种论述》

功效 块茎: 广东某些地区作“淮山”或“土淮山”入药。

### 7311014

*Dioscorea futschauensis* Uline ex R. Knuth

植物名 福州薯蓣《中国植志》

药材名 绵草藓《药典》

文献名 福建绵草藓《汇编》

地方名 浙江: 猴子薯(平阳), 福草藓; 福建: 草藓(厦门), 猴骨草(福安); 湖南: 小草藓, 三脚灵。

功效 根茎: 利湿去浊, 祛风通痹。用于淋病白浊, 白带过多, 湿热疮毒, 腰膝痹痛。

### 7311015

*Dioscorea glabra* Roxb.

植物名 光叶薯蓣《中国植志》

药材名 光叶野山药《云南药录》

文献名 心叶薯《中药通报》

地方名 江西: 黑淮山(安福); 广西: 蒙自山药, 海南薯蓣, 野薯蓣, 良菇(龙津), 盘薯(天等), 山药(防城); 云南: 红孩儿, 红山药, 野红薯, 土淮山药(元江), “哈遮野尼”(元江哈尼语), 苦山药(勐腊、景洪), 羊角山药(勐养), 草巴山药(潞西)。

功效 块根: 通经活络, 止血止痛。用于功能性子宫出血, 月经不调, 腰肌劳损, 外伤出血。

### 7311016

*Dioscorea gracillima* Miq.

植物名 纤细薯蓣《中国植志》

药材名 草藓《本经》、《中药大辞典》

文献名 癞蛤蟆《名实图考》, 白姜、白薯、棉草藓《中药大辞典》

地方名 黄生姜(浙江、江西); 浙江: 癞蛤蟆(开化、淳安、临安), 粉草藓, 白草藓, 白连(宁海、天台), 钉薯(黄岩、仙居), 山草藓、蝴蝶柴根、铁蜈蚣(天台山), 野杆芷(遂昌), 年须吉(龙泉), 川草藓(昌化); 安徽: 金线吊蛤蟆, 马齿甲(歙县), 苦药(青阳)。

功效 根茎: 利湿去浊, 祛风除痹。

### 7311017

*Dioscorea hemsleyi* Prain et Burk.

植物名 粘山药《中国植志》

药材名 粘山药《贵州药录》

地方名 贵州: 粘狗苔; 云南: 粘黏黏。

功效 块茎: 清热解毒, 软坚散结。用于鼻衄, 肤裂, 毒疮。

### 7311018



*Dioscorea hispida* Dennst. --- *D. daemona* Roxb. --- *D. triphylla* L. var. *reticulata* Prain et Burk.

植物名 白薯蕷《中国植志》

药材名 白薯蕷《生草药性备要》、《汇编》

文献名 粗硬毛山药《云南药录》

地方名 山薯(福建、广东);广东:山仆薯、板薯(广州),白茨蕷(惠阳),白薯郎(潮安),榜蔴,那亚、榜花薯、薯莪头(潮阳);海南:榜莠,叶板茨,山葛,野葛藤,黄加姜(乐东),白饭薯藤(儋县),榜薯(保亭);广西:黄药,野葛薯,白米茹娘(陆川);云南:大力毛,地遍,白山药,〔穿山龙〕,土百部,三叶黄姜,〔三叶木通〕,细叶木通,独龙,网脉三叶薯。

功效 块茎:有毒。散热,解毒消肿,去瘀止血。外用于疮痈肿毒,跌打损伤,外伤出血。

### 7311019

*Dioscorea japonica* Thunb.

植物名 日本薯蕷《中国植志》

药材名 野山药《汇编》

文献名 狂风藤《名实图考》,野薯、诸薯《植物名汇》,自然生《和汉药名汇》,薯蕷《经济植物学》,黄哈吗,零余子《中国药学杂志》,尖叶薯《中药通报》,风车儿(果实)《中医药实验研究》,土山药《中药大辞典》

地方名 风车子(江西、四川),干担苕(四川、贵州),土淮山(福建、广东),山薯(福建、广西);浙江:山蝴蝶、千斤拔(天目山);台湾:山药薯,山芋;湖南:竹根茹,野面薯,野白姑(南岳),芒薯;广东:尖叶淮山;广西:黄药,肥儿薯(昭平),光山药(三江);四川:风连草;贵州:野白苕,粘狗苕,小粘狗苕,淮山药;云南:牛尾薯,山药。

功效 根茎:补脾养胃,生津益肺,补肾涩精;果实(风车子):用于耳鸣。

### 7311020

*Dioscorea kamoonsensis* Kunth --- *D. fargesii* Franch. --- *D. subfusca* R. Knuth --- *D. kamoonsensis* Kunth var. *straminea* Prain et Burk. --- *D. kamoonsensis* Kunth var. *fargesii* (Franch.) Prain et Burk.

植物名 毛芋头薯蕷《中国植志》

药材名 滇白药子《名实图考》

文献名 白药子《滇南本草》,过沟藤《名实图考》,暗色薯蕷《云南药录》,复叶薯蕷《秦岭植志》,高山薯蕷《云南植志》,马蹄细辛《汇编》,巴山薯蕷《神农架药录》

地方名 毛芋头(湖北、四川);湖北:老虎卵子(神农架);四川:毛狗苕(南充、峨眉山);云南:防风党参(西畴、丽江),毛芋子,单黄。

功效 块根:解毒消肿,补脾益肾。用于身体虚弱,遗精,慢性肠炎,夜尿,盗汗,糖尿病,毒蛇咬伤。

### 7311021

*Dioscorea melanophyma* Prain et Burk.

植物名 黑珠芽薯蕷《中国植志》

文献名 粘黏黏《云南植志》

地方名 贵州:野胭脂;云南:粉渣渣、白药子(昆明),黑弹子。

功效 块茎:云南部分地区作“白药子”用。

### 7311022

*Dioscorea nipponica* Makino

植物名 穿龙薯蕷《中国植志》

药材名 穿山龙(东北)、《药典》

文献名 草薢《别录》,川龙骨《药草满州》,因扇薯蕷《中药通报》,老常山《汇编》

地方名 穿地龙、串地龙(东北、华北、陕西、山东、湖北),穿龙骨(东北、山东、广西),穿山骨、土龙骨、鞭梢菜(东北、山西),串山龙、土申姜(东北),地龙骨(吉林、辽宁、北京、河北、内蒙古),金刚骨(内蒙古、山西、河北、北京),鸡骨头(河北、甘肃、山东),〔鸡骨常山〕(北京、山东),山常山(山西、山东、河南),〔常山〕(山西、山东、陕西、甘肃、河南),上常山、山草薢、过山龙(陕西、河南),野山药(东北、河北、安徽、河南),爬山虎(东北、河北),黄姜(浙江、安徽),黄姜子(安徽、陕西);黑龙江:山地龙;吉林:“布菜马”(朝名);辽宁:山虎(辽阳);河北:狗山药,山花啦,穿山薯蕷;山西:金钢不倒,穷火腿,山龙;内蒙古:“乌合日·乌日阳古”(蒙名);陕西:火藤根,铁火藤根(旬阳、白河),狗头山药(华县),黄姜子(周至),铁火藤;浙江:竹根薯(临海、仙居),铁根薯,雄姜,黄鞭,鞭薯(缙云),龙草薢,粉草薢;安徽:土山薯(黄山),蝴蝶菜;河南:山姜;湖北:狗骨头(神农架);四川:柴黄姜。

功效 根茎:祛风湿,止痛,舒筋活血,止咳平喘祛痰。用于风湿性关节炎,腰腿疼痛,麻木,大骨节病,跌扑损伤,闪腰岔气,慢性支气管炎,咳嗽气喘,降血压,抗变态反应。

7311023 见 7311024a

### 7311024

*Dioscorea nipponica* Makino f. *jamesii* (Prain & Burk.)

Kitag

植物名 光叶穿龙薯蕷《东北药用植物》

功效 根茎:舒筋活络,祛风止痛。止咳平喘,祛痰,消食,利水,截疟。用于风湿热,风湿性关节炎,腰腿疼痛。筋骨麻木,大骨节病,跌打损伤,闪腰岔气,慢性支气管炎,咳嗽气喘,消化不良,疟疾,痢肿。

### 7311024a

*Dioscorea nipponica* ssp. *rosthornii* (Prain et Burk.) C.

T. Ting

植物名 柴黄姜《中国植志》

药材名 穿山龙《中药志》

地方名 黄姜子(湖北、甘肃、四川),草薢(湖北、湖南);浙江:龙草薢;湖北:狗骨头、穿地龙(神农架);四川:老虎姜;贵州:龙骨七,黄山药。

功效 根茎:祛风湿,止痛,舒筋活血,止咳平喘祛痰。用于风湿性关节炎,腰腿疼痛,麻木,大骨节病,跌扑损伤,闪腰岔气,慢性支气管炎,咳嗽气喘。

### 7311025

*Dioscorea opoosita* Thunb. --- *D. batatas* Decne. --- *D. doryophora* Hance

植物名 薯蓣《本经》、《中国植志》

药材名 山药(侯宁极《药谱》)、《药典》,零余子〔叶

液间珠芽)《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 薯蓣《山海经》, 薯蓣、山芋《本经》, 诸薯、玉延、山羊、修脆、儿草《吴普本草》, 薯蓣、土落《别录》, 土薯《药性论》, 薯蓣子《本草拾遗》, 薯、山薯、山薯《图经》, 延草《兼名苑》, 王芋《杂要诀》, 薯药《本草衍义》, 淮山药《饮片新参》, 山蕲、玉蕲、余子、落粮、银条德里《新纲》, 山药豆《华北药寮》, 光山药《药典》

地方名 山药藤(上海、江苏), 怀山药(浙江、广西、安徽、河南), 淮山(广西、江西、广东、台湾、贵州), 野山药(江苏、山东、上海、湖北), 鲜山药(河南、江苏), 白山药(西北、江苏、安徽、河北), 白薯(山西、湖南), 竹篙薯(湖南、广东), 毛山药(四川、湖北); 河北: 山山菜, 架山药, 线山药(保定); 山西: 长山药; 陕西: 野山芋, 山苕药; 甘肃: 面山药(徽县); 山东: 山药豆根(青岛); 江苏: 野山豆(睢宁), 山药果; 浙江: 蛇芋, 白药子(杭州); 安徽: 避蛇珠, 野山珠; 江西: 薯蓣果, 薯子, 野淮山(九江), 野春菇(德兴), 野竹篙薯(泰和); 台湾: 田薯; 河南: 菜山药, 白皮山药, 扇子薯; 湖南: 九黄姜, 野白薯, 山药薯, 山角薯, 竹根薯, 毛面薯; 广东: 野薯, 山白薯, 山菇; 广西: 山板薯, 小山药(隆林); 四川: 白苕, 野牛尾苕; 云南: 淮药, 理毛条(弥渡); 其他: 铁棍山药, 小绒毛, 正超, 副超, 大超, 小超, 魁山, 榧山, 鸡骨山, 笔山, 大寸山, 小寸山, 料山, 秃面西超, 西正超, 西副超, 大断山, 山药片, 西山。

功效 根茎: 补脾养胃, 生津益肺, 补肾涩精。用于脾虚食少, 久泻不止, 肺虚喘咳, 肾虚遗精, 带下, 尿频, 虚热消渴; 炒山药: 补脾健胃。用于脾虚食少, 泄泻便溏, 白带过多; 叶腋间珠芽(零余子): 补虚, 强腰脚。用于病后耳聋; 茎藤: 外用于皮肤湿疹, 丹毒。

#### 7311026

*Dioscorea owenii* Prain et Burk.

植物名 真薯《浙南本草新编》

功效 地下部分: 华东地区作山药入药。

#### 7311027

*Dioscorea panthaica* Prain et Burk. --- *D. biserialis* Prain et Burk.

植物名 黄山药《中国植志》

药材名 黄山药(西南)、《汇编》

文献名 姜黄草《名实图考》, 黄姜薯蓣《中国药植志》, 滇白药子《鉴别手册》

地方名 黄姜、老虎姜(四川、云南); 四川: 山药(凉山); 贵州: 猴节莲; 云南: 白药子。

功效 块茎: 解毒消肿, 止痛。用于胃痛, 跌打损伤。外用于淋巴结结核。

#### 7311028

*Dioscorea parviflora* C. T. Ting

植物名 小花盾叶薯蓣《中国植志》

文献名 小花薯蓣《云南植志》

地方名 云南: 苦良姜(永仁、元谋、永胜), 老虎姜(禄劝)。

功效 根茎: 解毒消肿。用于早期未破溃的痈疖, 皮肤急性化脓性感染, 软组织损伤, 蜂螫虫咬。

#### 7311029

*Dioscorea pentaphylla* L.

植物名 五叶薯蓣《中国植志》

文献名 五叶薯《广州植志》

地方名 广西: 血参(博白); 贵州: 朱砂莲; 云南: 毛团子(瑞丽), “苦卡拉”(傣语), 蓑衣包(景洪)。

功效 块茎: 解毒消肿, 补脾益肾。用于无名肿毒, 脾虚腹泻, 乳汁稀少, 肾虚遗精, 瘰癧。

#### 7311030

*Dioscorea persimilis* Prain et Burk.

植物名 褐苞薯蓣《中国植志》

药材名 大薯《温州府志》、《中药通报》

文献名 极似薯蓣《高植图鉴》, 湘薯《中药通报》

地方名 淮山(广西、福建), 山药、土淮山(华南), 山薯(海南、广西); 云南: 黏粘粘(元江), “背当挨美”(元江哈尼语)。

功效 块根: 健脾益肾。用于脾胃虚寒, 肾阳亏损。

#### 7311031

*Dioscorea scortechinii* Prain et Burk. var. *parviflora* Prain et Burk.

植物名 小花刺薯蓣《中国植志》

药材名 芳薯(广西)

地方名 广西: 酿酒薯, 大果薯蓣。

功效 块茎: 舒筋活络。

#### 7311032

*Dioscorea simulans* Prain et Burk.

植物名 马肠薯蓣《中国植志》

药材名 三叶薯《广西植录》

地方名 广西: 野红薯, 野山薯, 夜牵牛, 夜车牛。

功效 根茎: 有毒。含皂甙, 为提取甾体激素药物的原料。

#### 7311033

*Dioscorea spongiosa* J. Q. Xi, M. Mizuno et W. J. Zhao

植物名 绵草蓣《植分学报》

药材名 绵草蓣(浙江)

文献名 草蓣《本经》

地方名 大草蓣(福建、湖南), 山番箕(浙江、江西); 浙江: 番箕斗(桐庐), 山薯、狗粪棵(平阳); 福建: 猴骨草。

功效 根茎: 利湿去浊, 祛风通痹。用于淋病白浊, 白带过多, 湿热疮毒, 腰膝痠痛。

备考 过去文献多以 *Dioscorea septemloba* Thunb. 为绵草蓣的原植物, 据奚镜清等研究, 该植物产于日本, 非中药绵草蓣。

#### 7311034

*Dioscorea subcalva* Prain et Burk.

植物名 毛胶薯蓣《中国植志》

药材名 粘山药《云南药录》

文献名 牛尾参《滇南本草》, 近光薯蓣《西双版纳植物名录》

地方名 贵州: 粘狗苕, 粘狗薯, 粘芋; 云南: 黏粘粘,

黏山药,野山药(文山),黄山药(元江)。

功效 块茎:健脾祛湿,补肺益肾。用于肺结核病,脾虚食少泄泻,消渴。外用跌打损伤。

#### 7311035

*Dioscorea tenuipes* Franch. et Sav.

植物名 细柄薯蓣《中国植志》

地方名 浙江:小黄连(嵊县),野生姜、高鼻头(镇海、鄞县),[粉草薹]。

功效 根茎:祛风湿,止痛,舒筋活血,止咳平喘祛痰。

#### 7311036

*Dioscorea tokoro* Makino

植物名 山草薹《中国植志》

药材名 山草薹《药材学》

文献名 草薹《名实图考》,粉草薹、赤节、百枝、竹木《中草药学》

地方名 江苏:[土黄连](溧阳);浙江:铁蜈蚣(富阳、临安),竹根薯(临海),软薯(黄岩),风车斗(云和、龙泉),山薯(天台),粉草薹,细草薹;福建:草薹,山田薯、土薯蓣(泉州);湖北:狗骨头(神农架);湖南:土黄姜(常德),岩姜黄(汉寿),小草薹(平江)。

功效 根茎:祛风利湿。用于风湿痛,湿热淋症,带下,湿热疮毒。

#### 7311037

*Dioscorea zingiberensis* C. H. Wright

植物名 盾叶薯蓣《中国植志》

药材名 盾叶薯蓣《中国药植志》

文献名 姜黄草薯蓣《药学报》,黄连参、地黄姜、野洋姜《全展选编·外科》

地方名 黄姜(四川、湖北、湖南、云南),火头根(四川、湖北);陕西:火藤根(陕南);湖北:枕头根,葫芒根(神农架);湖南:木苕儿,土黄姜;四川:黄根子,水黄姜(南江);云南:黄山药(玉溪、丽江),苦良姜(永仁、元谋),[老虎姜](禄劝)。

功效 根茎:解毒消肿。用于疮疖早期未破溃,皮肤急性化脓性感染,软组织损伤,蜂螫虫咬。

### 7313 龙舌兰科 Agavaceae

#### 7313001

*Agave americana* L.

植物名 龙舌兰《中国植志》

药材名 龙舌兰《汇编》

文献名 世纪树《种称》

地方名 番花、番麻(广东、云南);山东:剑兰;浙江:麻剑;湖北:洋棕;广东:百年兰;贵州:石莲花;云南:菠萝麻。

功效 叶:有毒。止血消炎,拔脓,解毒,杀虫。用于子宫出血,盆腔炎,皮肤疥癣。外用于顽固性溃疡,足底脓肿。

#### 7313002

*Agave americana* L. var. *marginata* Trel. --- *A. americana* L. var. *variegata* Nichols.

植物名 金边龙舌兰《云南种录》

药材名 金边龙舌兰《南宁药志》

文献名 黄边龙舌兰《高植图鉴》,金边假菠萝《南宁药志》,黄缘龙舌兰《四川中药志》

地方名 广西:金边菠萝(南宁);四川:金边莲,金边兰,割舌兰,龙舌兰。

功效 鲜叶:润肺,止咳,平喘,透疹,去瘀生新。用于肺燥咳嗽,阴虚喘咳,麻疹不透,疮毒。

#### 7313003

*Agave angustifolia* Haw. --- *A. rigida* Mill.

植物名 狭叶龙舌兰《中国植志》

药材名 狭叶龙舌兰《甾体激素药原植物》

地方名 广东:短叶龙舌兰麻,假菠萝麻。

功效 全草:该植物由于替告皂甙元含量高,是我国目前合成蛋白同化激素药物的重要原料植物。

#### 7313004

*Agave cantala* Roxb.

植物名 马盖麻(福建)、《中国植志》

文献名 亚洲马盖麻《广西植录》,菲律宾马盖《中国植志》

地方名 福建:狭叶龙舌兰麻;其他:仙人掌龙舌兰。

功效 全草:用于避孕及避孕药原料。并为甾体激素药源植物。

#### 7313005

*Agave sisalana* Perr. ex Engelm.

植物名 剑麻《中国植志》

药材名 剑麻《广西药录》

地方名 海南:菠萝麻。

功效 叶:清热散毒,排脓。外用于痈肿疮疡。

备考 其甾体皂甙可用于合成激素类药物。

#### 7313006

*Cordyline fruticosa* (L.) A. Cheval. --- *C. terminalis* (L.) Kunth

植物名 朱蕉《南越笔记》、《中国植志》

药材名 铁树叶、铁树花《药性考》、《中药大辞典》

文献名 铁树《岭南杂志》,朱竹《南越笔记》,铁连草《家宝真传》,红竹叶《台湾中药材图鉴》

地方名 台湾:观音竹;广西:红叶铁树,红铁树(南宁),大叶铁树(北海);云南:假槟榔树,“牙竹麻”(西双版纳傣语)。

功效 叶:清热,止血,散瘀。用于痢疾,吐血,便血,胃痛,尿血,月经过多,跌打肿痛;花:止血,下痰。用于痰火。

#### 7313007

*Cordyline stricta* Endl.

植物名 剑叶朱蕉《云南种录》

药材名 剑叶铁树叶《广西民药》

地方名 广西:剑叶铁树,小叶铁树,剑叶万年青。

功效 叶:理跌打。用于咳嗽,吐血,鼻衄血,大小便出血,外伤出血,小儿疳积,哮喘,痢疾。

#### 7313008

*Dracaena angustifolia* Roxb. --- *Pleomele angustifolia*

(Roxb.) N. E. Brown

植物名 狭叶龙血树(拟)

文献名 龙血树《海南植志》, 长花龙血树《中国植志》, 狭叶剑叶木《广西药录》

地方名 广东: 马骝蔗树; 海南: 槟榔青; 广西: 竹木参, 山竹蔗。

功效 块根: 肺病止咳, 清热凉血。用于慢性肝炎, 百日咳, 支气管炎, 肺结核, 咯血, 吐血, 慢性扁桃体炎, 咽喉炎, 热病后余热未清。

#### 7313009

*Dracaena cambodiana* Pierre ex Gagnep. --- *Pleomele cambodiana* (Gagnep.) Merr. et Chun

植物名 小花龙血树《海南植志》

药材名 血竭(海南、云南)

文献名 海南龙血树《中国植志》, 山铁树叶《广西中草药》

地方名 海南: 山海带(崖县), 海南血竭, 柬埔寨龙血树; 广西: 山铁树, 剑叶木, 乌猿蔗, 南木, 小龙血树, 狗猫麻; 云南: 龙血木、木血竭、国产血竭、云南血竭。

功效 叶: 散瘀止血, 止咳平喘。用于咳血、吐血, 衄血, 大小便出血, 哮喘, 痢疾, 小儿疳疾, 跌打外伤出血; 树脂: 活血祛瘀, 消肿止痛, 收敛止血。

#### 7313010

*Dracaena cochinchinensis* (Lour.) S. C. Chen --- *D. loureiri* Gagnep. --- *Pleomele cochinchinensis* (Lour.) Merr. et Gagnep.

植物名 剑叶龙血树《中国植志》

药材名 血竭(广西)

文献名 木血竭《滇南本草》, [柬埔寨龙血树]《云南省药品标准》, 麒麟血《植物学报》, 岩棕《中草药学》

地方名 广西: 血竭, 血竭树, 龙血树, 剑叶木; 云南: 龙血木, 老鸡树, “埋嘎筛”(西双版纳傣语); 其他: 云南血竭、广西血竭、国产血竭。

功效 树脂: 活血祛瘀, 消肿止痛, 收敛止血。用于外伤出血, 跌打损伤之瘀血作痛, 疮疡久不收口等。

备考 血竭自古以来为进口中药, 本种为近年来在云南、广西发现的血竭新资源, 经作者考证, 即《滇南本草》之木血竭。

#### 7313011

*Dracaena draco* L. --- *D. ombet* Kotschy et Peyr

植物名 龙血树《汇编》

药材名 血竭《雷公炮炙论》、《汇编》

文献名 麒麟竭《雷公炮炙论》, 渴留《唐本草》, 海蜡(侯宁极《药谱》), 麒麟血《圣惠方》, 索可脱拉血竭《药材学》, 桑给巴尔血竭《中药材》, 麒麟竭《药典》附录

功效 茎干树脂: 活血行瘀止痛, 外用止血敛疮生肌。用于跌打损伤, 瘀血作痛, 外伤出血, 疮疡久不收口。

备考 1. 本种产于东非洲, 我国不产, 是我国药用血竭进口历史最久的品种, 我国古本草所载“血竭”、“麒麟竭”当为本种。2. 国际市场上商品血竭的植物来源除棕榈科黄藤属(*Daemonorops*)及龙舌兰科龙血树

属(*Dracaena*)以外, 还有豆科的 *Pterocarpus draco* L. (龙血紫檀), 大戟科的 *Croton draco* Schlecht. (龙血巴豆树), *Croton hibiscifolius* Kunth (木槿叶巴豆树), *Croton gossypifolius* Vahl --- *C. sanguifolius* H. B. et K. (流脂巴豆树), 以上四类血竭在中国市场上以棕榈科、龙舌兰科两类血竭为主流商品。

#### 7313012

*Dracaena terniflora* Roxb. --- *Pleomele terniflora* (Roxb.) Merr.

植物名 矮龙血树《中国植志》

药材名 大剑叶木《汇编》

地方名 云南: 竹节兰, “点点领”(傣语)

功效 根: 祛风除湿, 通经活络, 补肾壮阳。用于风湿性关节炎, 腰腿痛, 阳痿, 膀胱炎, 产后大流血。

#### 7313013

*Polianthes tuberosa* L.

植物名 晚香玉《名实图考》、《中国植志》

文献名 月下香《高植图鉴》

功效 根: 清热消肿。

#### 7313014

*Sansevieria trifasciata* Prain

植物名 虎尾兰《中国植志》

药材名 虎尾兰《汇编》

地方名 海南: 弓弦麻; 广西: 老虎尾(陆川), 蛇总管; 云南: 花蛇草, “万蛾来”(西双版纳傣语)。

功效 叶: 清热解毒, 去腐生肌。用于感冒咳嗽, 支气管炎, 跌打损伤, 痈疮肿毒, 毒蛇咬伤; 根、叶: 外用于瘰癧。

#### 7313015

*Sansevieria trifasciata* Prain var. *laurentii* (De Wildem.) N. E. Brown

植物名 金边虎尾兰《中国植志》

药材名 金边虎尾兰《汇编》

地方名 虎尾麻(华南); 广西: 蛇总管。

功效 叶: 清热解毒, 去腐生肌。外用于瘰癧, 烧、烫伤。

#### 7313016

*Yucca gloriosa* L.

植物名 凤尾丝兰《中国植志》

药材名 凤尾丝兰《浙江药植志》

地方名 浙江: 凤尾兰, 波罗花, 剑麻, 白棕(舟山地区); 云南: 雀芭蕉, “哈之纳思”(元江哈尼语)。

功效 根、叶: 清热解毒, 接骨止血。用于疮疡肿毒, 外伤出血; 花: 用于支气管哮喘。

#### 7313017

*Yucca smalliana* Fern.

植物名 丝兰《中国植志》

药材名 丝兰《药学报》

地方名 浙江: 洋波萝花。

功效 提出的吉脱皂甙元: 为合成甾体药物的原料。

## 7314 棕榈科 Palmae

## 7314001

*Archontophoenix alexandrae* (F. Muell.) H. Wendl. et Drude

植物名 假槟榔《中国植志》

药材名 假槟榔《广西《园林药录》》

功效 叶鞘(煨炭):收敛止血。用于咳血,月经过多。

## 7314002

*Areca catechu* L.

植物名 槟榔《南方草木状》、《中国植志》

药材名 槟榔《别录》、《药典》,大腹皮《药典》

文献名 仁频《上林赋》,宾门(李当之《药录》),宾门药钱《南方草木状》,白槟榔《药性论》,橄榄子《食疗本草》,槟榔仁《外台秘要》,洗瘰丹(侯宁极《药谱》),大腹子《岭表录异》,大腹槟榔《图经》,槟榔子《纲目》,马金南《花镜》,大腹毛《医林纂要》,茯毛《会药医镜》,枣儿槟榔《随息居饮食谱》,枣槟榔《饮片新参》,槟榔花、榔干、槟榔玉、榔玉、槟榔干《中药志》,槟榔衣《药材资料汇编》,大腹绒、枣儿槟、壳槟榔、大白槟、花槟榔、台槟、吕宋槟《药材学》,槟楠、尖槟《汇编》,槟榔片、鸡心槟榔、尖槟榔、海南槟榔、海子、大白片、鲜槟榔、槟榔皮《常用中药名辨》,榔干干、榔硬干〔果实商品名〕《中药大辞典》

地方名 台湾:青仔;云南:“戈吗”、“国马”(傣语);西藏:“开玛沽幼”、“果玉”、“若由”(藏名);其他:鸡心槟、螺果、连皮槟、仁槟、仁榔、槟榔孙、海南槟、广大白、枫白槟、槟药、腹皮、腹毛、硬腹毛、槟榔儿茶、枣玉、白槟。

功效 果皮(大腹皮):下气宽中,行水消肿。用于湿阻气滞,脘腹胀闷,大便不爽,水肿胀满,脚气浮肿,小便不利;种子(槟榔子):消积,驱虫,降气,行水,截疟。用于食积腹胀,绦虫病,姜片虫病,蛔虫病,里急后重,水肿,脚气,疟疾:未熟果实(枣槟榔):消食醒酒,宽胸腹,止呕恶,消炎止咳。用于胸膈闷滞,呕吐,通经,收敛;雄花蕾(槟榔花):芳香健胃,清凉止渴。用于咳嗽。

## 7314003

*Areca dicksonii* Roxb.

植物名 大腹槟榔《中药志》

药材名 大腹皮(侯宁极《药谱》)、《中药志》

文献名 腹皮、草东床、大腹子、大伏子、猪槟榔、槟榔子、仁频、仁榔、洗瘰、宾门、洗瘰丹、槟榔孙《新纲》

功效 果皮:下气宽中,行水消肿;种子:消积,驱虫,降气,行水,截疟。

## 7314004

*Arenga pinnata* (Wurmb.) Merr.

植物名 桄榔《南方草木状》、《中国植志》

药材名 桄榔子《开宝本草》、《中药大辞典》

文献名 桄榔木、桄榔面《本草拾遗》,姑榔木《临海异物志》,面木《洛阳伽蓝记》,铁木、榿木《纲目》,董棕

《鸛言》,糖树《两般秋雨庵随笔》,糖棕《广西药录》

地方名 海南:山椰子;广西:砂糖椰子;其他:南椰。

功效 果实:有毒。破宿食、积血。用于妇人产后儿枕血瘀诸疼及心胃寒疼;树干髓部淀粉(桄榔面):补益虚羸乏损,腰脚无力。

备考 《中国植志》13(1):112,1991注称:古籍所称之桄榔,应是泛指 *Arenga* 和 *Carayota* 属若干种植物的总称,非原产东南亚的砂糖椰子 *Arenga saccharifera* Labill.

## 7314005

*Calamus henryanum* Becc.

植物名 滇南省藤《中国植志》

文献名 山省藤《广西药录》

地方名 广西:白藤(金秀)。

功效 幼苗:用于跌打损伤。

## 7314006

*Calamus macrorrhynchus* Burret

植物名 大喙省藤《高植图鉴》

文献名 喙尖黄藤《云南种录》

功效 果实:去腐生新。

## 7314007 见 7314008a

## 7314008

*Calamus rhabdocladus* Burret

植物名 杖藤《中国植志》

文献名 华南省藤、棕藤《高植图鉴》

地方名 广东:手杖藤;海南:弹弓藤,弓藤,木藤;广西:白藤。

功效 幼苗:用于跌打。

## 7314008a

*Calamus simplicifolius* C. F. Wei --- *C. platyacanthoides* Merr.

植物名 单叶省藤《中国植志》

文献名 省藤《高植图鉴》

功效 全株:解毒。

## 7314009

*Calamus tetradactylus* Hance

植物名 白省藤(拉汉英种称)

文献名 黄藤《中国经植志》

地方名 海南:白藤,鸡藤;广西:白甘蔗(富川瑶名)、“勾歪”、“扣外鸡”(壮语),鸡藤藤。

功效 全株:解毒。

## 7314010

*Caryota mitis* Lour.

植物名 短穗鱼尾葵《中国植志》

药材名 董棕《他郎厅志》、《民族药志》

文献名 酒椰子《种称》,董棕粉《他郎厅志》

地方名 云南:“阿莱皮”(独龙族语),小黄棕。

功效 茎髓部的淀粉:健脾胃,收敛止泻。用于小儿腹泻,消化不良,腹痛,赤白痢。

## 7314011

*Caryota monostachya* Becc.

植物名 单穗鱼尾葵《广西药录》、《中国植志》

功效 根：用于高热抽搐。

## 7314012

*Caryota ochlandra* Hance

植物名 鱼尾葵《中国植志》

药材名 鱼尾葵《广西药录》

文献名 长穗鱼尾葵《广西本草选编》，董棕、鸡榔《汇编》

地方名 广东：假桃榔；广西：棕木（龙州）；云南：青棕。

功效 叶鞘纤维（煅炭）：收敛止血。用于吐血，咳血，便血，血崩；根：强筋骨。用于肝肾虚，筋骨痿软；茎中淀粉：健脾胃，收敛止泻。用于小儿腹泻，消化不良，腹痛，赤白痢。

## 7314013

*Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl.

植物名 散尾葵《中国植志》

药材名 散尾葵《广西《园林药录》》

文献名 黄本椰子《植物学大辞典》

功效 叶鞘（煅炭）：收敛止血。用于咳血，吐血。外用于外伤出血。

## 7314014

*Cocos nucifera* L.

植物名 椰子《交州记》、《高植图鉴》

药材名 椰子《海药本草》、《汇编》

文献名 胥余《史记》，胥耶《汉书》，越王头《南方草木状》，椰酒《南越笔记》，椰子浆《海药本草》，椰子皮《开宝本草》，椰子瓢《本草衍义》，椰子壳《纲目》，椰子油《纲目拾遗》，古占椰子（小泉《药植》），椰果、椰栗《岭南草药志》，可可椰子《主要经济树木》，椰树、椰馏油《药典》

地方名 海南：椰子树。

功效 果壳干馏所得的油（椰馏油）：抗霉菌。用于神经性皮炎，脚癣，慢性湿疹；根皮：止血，止痛。用于鼻衄，胃痛，吐泻；椰子壳：用于杨梅疮，筋骨痛；椰子油（胚乳榨油）：用于疥癣冻疮；椰子浆（胚乳中的浆液）：消渴，吐血，水肿，去风热；椰子瓢：益气，去风。用于疳积白虫，小儿青瘦。

## 7314015

*Corypha umbraculifera* L.

植物名 贝叶棕《云南种录》

药材名 贝叶棕《西双版纳傣药志》

地方名 云南：“哥榄”（西双版纳傣语）。

功效 叶：外用于头晕，头痛，发热，咳嗽；根液汁：用于腹泻；幼株：用于风热感冒。

## 7314016

*Daemonorops draco* Blume --- *Calamus draco* Willd.

植物名 麒麟血藤《树分》

药材名 血竭《汇编》

文献名 藤竭《明史》，爪儿血、血结《新纲》，朱结《植物名汇》，骊竭《树分》，龙血省藤《种分讲义》，麒麟血竭《汇编》，[麒麟竭]《中药大辞典》

功效 树脂：活血行瘀止痛，外用止血敛疮生肌。

用于跌打损伤，瘀血止痛，外伤出血，疮疡久不收口。

备考 我国古本草如《雷公炮炙论》、《唐本草》、《图经本草》、《本草纲目》等所称“血竭”或“骊骊竭”，出自阿拉伯地区各国的木本植物龙血树属树干的树脂，而现在中药材血竭的主流品种为本种藤本植物果实的树脂。本种进口作血竭使用，始自明代。

## 7314017

*Daemonorops margaritae* (Hance) Becc. --- *Calamus margaritae* Hance

植物名 黄藤《纲目》、《高植图鉴》

药材名 省藤《本草拾遗》、《汇编》

文献名 [紫藤]《南方草木状》，红藤、赤藤《汇编》

地方名 浙江：白藤、溪藤；台湾：土藤，黄藤根，藤根。

功效 茎：驱虫，利尿，驱风镇痛。用于蛔虫，蛲虫，绦虫，小便热淋涩痛，齿痛。

## 7314018

*Didymosperma caudatum* (Lour.) H. Wendl. et Drude

植物名 双籽棕《高植图鉴》

药材名 双籽棕《汇编》

文献名 鸡罗、短葵《汇编》，双籽藤《中药大辞典》，双籽棕《云南种录》

地方名 海南：大辐棕；云南：“中项”（西双版纳傣语），假棕树，山棕，野棕（思茅）。

功效 根：止血清热，通经收敛。用于月经过多，血崩，子宫下垂，肺结核咯血。

## 7314019

*Elaeis guineensis* Jacq.

植物名 油棕《高植图鉴》

药材名 油棕《广西药园药录》

地方名 广东：油子。

功效 根：用于远年积瘀。

## 7314020

*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br.

植物名 蒲葵《高植图鉴》

药材名 蒲葵《纲目》、《汇编》

地方名 广东：扇叶葵；广西：蓬扇树，葵扇叶，葵扇木，扁叶葵，余蒲葵（罗城仫佬名）。

功效 种子：有小毒。抗癌，凉血止血，止痛。用于肿瘤，白血病，慢性肝炎；根：止痛，止喘。用于各种疼痛，哮喘；叶：用于难产，胎盘不下，功能性子宫出血；叶烧炭：用于止盗汗，妇女血崩，月经不断。

## 7314021

*Metroxylon sagu* Rottb.

植物名 西谷椰子《中药大辞典》

药材名 莎木面《海药本草》、《中药大辞典》

文献名 莎木《本草拾遗》，莎面《海药本草》，沙孤米、沙孤《东西洋考》，西国米《通雅》，西谷米、沙吾米、沙吾棕榈、沙吾椰子《和汉药考》，番国米《新纲》，西米树《植物名汇》，沙吾椰子（小泉《药植》），西米棕《种分讲义》，无刺西米椰子《主要经济树木》，西米椰子《造林学》，真珠西谷《中药大辞典》

功 效 木髓部提出的淀粉:温中健脾。用于脾胃虚弱。消化不良。

## 7314022

*Phoenix dactylifera* L.

植物名 海枣(云南种录)

药材名 海枣《南方草木状》、《中药大辞典》

文献名 无漏子、波斯枣《本草拾遗》,藏枣、窟莽树《酉阳杂俎》,番枣、海棕木《岭表录异》,金果、苦鲁麻枣、万年枣《辍耕录》,千年枣《开宝本草》,万岁枣《大明统志》,紫京《南越笔记》,海棕、凤尾蕉《纲目》,无漏果《纲目拾遗》,枣椰子《树分》,战捷木《中国植物图鉴》

地方名 北京:伊拉克枣,伊拉克蜜枣;云南:仙枣(元谋);其他:西藏枣,枣椰,椰枣。

功 效 果实:温中益气,除痰嗽,补虚损。用于消食,止咳。

## 7314023

*Phoenix roebelenii* O. Brien

植物名 软叶刺葵《高植图鉴》

文献名 江边刺葵《中国植志》,软叶针葵《广西《园林药录》)

地方名 广西:细叶棕椰竹。

功 效 叶鞘(煅炭):收敛止血。用于月经过多,吐血,咯血。

## 7314024

*Rhapis excelsa* (Thunb.) Henry ex Rehd. --- *Rhapis flabelliformis* Ait.

植物名 棕竹《中国植志》

药材名 棕竹《广西药录》

文献名 筋头竹《秘传花镜》

地方名 广西:竹叶棕(凌云),小松花(乐业),“美三”(那坡壮语),棕树,观音竹,小棕榈;贵州:棕竹叶。

功 效 根:用于劳伤;叶鞘纤维(煅炭):用于鼻衄,咯血,产后血崩;幼苗:壮阳;须根:接骨,截疟。

## 7314025

*Rhapis humilis* Blume

植物名 矮棕竹《中国植志》

文献名 棕榈竹《名实图考》

地方名 广西:棕竹(南宁);四川:竹棕。

功 效 叶鞘(煅炭):收敛止血。用于吐血,咯血,月经过多。

## 7314026

*Rhapis robusta* Burret

植物名 粗棕竹《高植图鉴》

文献名 龙州棕竹《广西植录》

功 效 须根:接骨。

## 7314027

*Trachycarpus fortunei* (Hook. f.) H. Wendl. --- *T. excelsa* (Thunb.) Wendl.

植物名 棕榈《嘉祐本草》、《高植图鉴》

药材名 棕板《药典》,棕榈子《本草拾遗》、《药材学》

文献名 棕《山海经》,拼榈木皮《本草拾遗》,棕毛《普济方》,棕皮《本草求真》,拼榈子、败棕子、陈棕炭

《药材学》,棕板炭《陕西中草药》,棕树果《简明中医辞典》

地方名 棕树(广西、四川、浙江、贵州、云南、陕西),棕衣树(云南、四川、广西),棕骨(北京、台湾);天津:[菴蒭子];河北:稀码棕;江苏:陈棕,棕结;浙江:家麋尿(平阳),千斤拔(泰顺);江西:老虎脚(吉水);福建:棕楔(闽东),棕楔心,棕栏,拼榈;河南:棕树子;台湾:棕子;湖南:棕巴掌(通道),定海针(麻阳);广西:山棕,百叶草,棕桐竹,百页草,棕葵花,“葵送”(三江侗语),“都烧”(融水苗语),“根必”、“松档”、“棕亮”(瑶语),裸棕、下扫把(壮语);四川:棕树根,陈棕皮;云南:大棕,小棕根。

功 效 叶柄及鞘片(煅炭):收涩止血。用于吐血,衄血,尿血,便血,崩漏下血;根:利尿通淋,止血。用于血崩淋症,小便不利;果实、花:用于泻痢,肠风,崩中带下;茎髓:用于心悸,头晕,崩漏。

## 7314028

*Trachycarpus nana* Becc. --- *T. dracocephalus* R. C. Ching et Y. C. Hsu

植物名 龙棕《高植图鉴》

药材名 龙棕《新华本草纲要》

地方名 云南:[倒提壶],地棕花(楚雄、华坪)。

功 效 根:用于月经过多,子宫脱垂。

## 7314029

*Trachycarpus wagnerianus* Becc.

植物名 棕树《汇编》

药材名 棕榈子《本草拾遗》,棕树根《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 棕《山海经》,拼榈木皮《本草拾遗》,棕榈皮《日华子本草》,棕毛《普济方》,棕子《滇南本草》,拼榈(杨孚《异物志》),棕皮《本草求真》,棕榈心《贵州民间方药集》,棕榈叶、棕榈花《现代实用中药》,败棕子《药材学》,棕榈《中国经植志》,棕树果《云南中草药》,棕骨、陈棕、陈棕皮《中药大辞典》,棕榈炭、棕皮炭、陈棕炭、棕骨炭、棕板炭《常用中药名辨》

地方名 安徽:老虎脚;四川:棕衣,棕板;其他:棕衣树,百页草,定海针。

功 效 棕树根:止血,祛湿,消肿解毒。用于吐血,便血,血淋,血崩,带下,痢疾,关节痛,水肿,瘰癧,流注,跌打损伤;棕榈子:涩肠,止痢疾,肠风,崩中,带下,养血,降血压,多梦遗精;叶:用于吐血,劳伤,虚弱;叶鞘纤维(棕榈皮):收涩止血。用于吐血,衄血,便血,血淋,尿血,下痢,血崩,带下,金疮,疥癣;花:用于泻痢,肠风,血崩,带下,瘰癧。

## 7315 露兜树科 Pandanaceae

## 7315001

*Pandanus furcatus* Roxb.

植物名 分叉露兜《高植图鉴》

药材名 分叉露兜《广西药录》

文献名 分叉露兜树《中国经植志》,钢叉露兜《高植图鉴》,假菠萝《汇编》

地方名 云南:帕梯、帕梯果、野菠萝、露兜(思茅),山菠萝(红河),“罗金堆”(傣语)。

功效 根茎、果:清热解毒,利尿消肿。用于感冒高热,咳嗽,肝炎,睾丸炎,肾炎水肿,风湿痛,痢疾,胃痛。

## 7315002

*Pandanus gressitii* B. C. Stone

植物名 小露兜《高植图鉴》

功效 果:用于小肠疝气。

## 7315003

*Pandanus tectorius* Soland.

植物名 露兜树《高植图鉴》

药材名 露兜筋《岭南草药志》

文献名 筋苦子《纲目》,路兜勒《生草药性备要》,露花、露花粉《纲目拾遗》,露兜子《岭外代答》,笏波罗、笏角、芦剑、荣兰《岭南采药录》,龙般笏、朗古、露兜笏强、露兜笏心《本草求原》,假菠萝《生草药手册》,露兜笏花《南宁药志》,筋角蕨《岭南草药志》,林投、绿股《中药大辞典》

地方名 台湾:林茶;广东:水稻锯、猪麻髻(五华),刺膀投(潮安),膀投根(潮阳),刺拉兜、假番梨(饶平),老锯筋(从化),老锯头、花勒头(番禺),勒古(高州),蛇朗古、荫果根(新会),水隆古(新兴、高鹤),龙古勒(高要),猪母锯(河源),猪鸪锯(惠阳),路兜筋、荫古、筋波萝(阳春),猪麻锯,蒲锯筋,婆锯筋,亚婆锯,筋霸王,雷分锯,水拖髻,水波萝,勒角蕨,山荫古,野菠萝,路兜树;海南:金佳刺、芦刺(乐东、琼中),老老姜(澄迈),菱树;广西:笏露,勒路、三路针(平果),鲁古(北海),路头花(南宁),雷古根,温够,勒鲁,筋鲁,假地菠萝(那坡);云南:露兜根(思茅)。

功效 根:用于感冒发热,肾炎水肿,泌尿系感染,尿路结石,肝炎,肝硬化腹水,小儿夏季热,眼结膜炎;果:用于痢疾,咳嗽;果核:用于睾丸炎,痔疮;花序:清热利水,去湿热,止热泻。用于淋浊。小便不通,疝气,对口疮;叶芽:清热,凉血,解毒。用于麻疹,发斑,丹毒,暑热症,牙龈出血,恶疮,烂脚。

## 7321 药蕨薯科 Taccaceae

## 7321001

*Schizocapsa plantaginea* Hance --- *Tacca plantaginea* (Hance) Drenth

植物名 裂果薯《中国植志》

药材名 水田七(广西)、《汇编》

文献名 猴子脑、水光狗《中草药通讯》

地方名 水萝卜、屈头鸡(广西、湖南),水虾公、马老头(广西、广东、湖南),水鸡仔(广西、江西、湖南);江西:回头鸭(定南);湖南:田螺七,小田螺七,猴子三七(常德),水狗仔、水土狗、水狗、水射干(衡阳);广东:剌头鸡,剌头鸡仔草;广西:水鸡,水鸡头(南宁),[水梭榔],水屈头鸡、药蕨薯(百色);贵州:水三七,客妈七,客妈连。

功效 块茎:有毒。清热解毒,散瘀消肿,理气止

痛,截疟。用于咽喉肿痛,急性胃肠炎,泌尿道感染,牙痛,慢性胃炎,胃、十二指肠溃疡,风湿性关节炎,月经不调,疟疾,跌打损伤。外用疮疡肿毒,外伤出血。

## 7321002

*Tacca chantrieri* Andre --- *T. esquirolii* (Levl.) Rehd. --- *T. paxiana* Limpr.

植物名 箭根薯《中国植志》

药材名 老虎须《汇编》

文献名 药蕨薯、老虎花《高植图鉴》,大叶屈头鸡《广西植录》,长须果《海南植志》

地方名 广西:扭头鸡薯,屈头鸡,水茨菇,〔水半夏〕,水鸬鹚,〔水蜈蚣〕,水狗仔,水萝卜,大叶水萝卜,大水田七(那坡);云南:“咪火蛙”(西双版纳傣语),〔山大黄〕(红河),碧石雷,黑柞叶,冬叶七。

功效 根茎、叶:有毒。清热解毒,理气止痛,截疟。用于疟疾,胃及十二指肠溃疡,慢性胃炎,咽喉肿痛,肺炎,腮腺炎。外用于疮疡肿毒,烧、烫伤。

## 7322 田葱科 Philydraceae

## 7322001

*Philydrum lanuginosum* Banks

植物名 田葱《高植图鉴》

药材名 田葱《岭南采药录》、《中药大辞典》

文献名 中葱《生草药性备要》,扇合草《高植图鉴》

地方名 福建:水芦荟(莆田),〔水葱〕(同安),白根子草(龙岩);广西:水较剪、剪刀较(博白)。

功效 全草:外用于洗烂脚,癣。同铁锡粉炒,用于蠹。

## 7323 水玉簪科 Burmanniaceae

## 7323001

*Burmannia coelestis* D. Don --- *B. chinensis* Gandog

植物名 三品一枝花《中国植志》

药材名 三品一枝花《汇编》

文献名 少花水玉簪《中国植志》

地方名 广西:蓝花水玉簪,疳积草(防城);贵州:地沙,米洋参。

功效 根:健胃,消积。用于小儿疳积。

## 7323002

*Burmannia disticha* L.

植物名 水玉簪《中国植志》

药材名 水玉簪《广西药录》

地方名 苍山贝母(广西、云南);广西:青竹(上林),草莲(德保)。

功效 全草或根,止咳。用于气管炎。

## 7326 兰科 Orchidaceae

## 7326001

*Acampe multiflora* Lindl. --- *Acampe rigida* (Buch. - Ham. ex J. E. Smith) P. F. Hunt

植物名 多花脆兰《高植图鉴》

药材名 多花脆兰《广西药录》



地方名 台湾:蕉兰;广西:大叶兰,脆兰花,乌猿蕉、黑山蕉(龙州)。

功效 根、叶:用于跌打损伤,骨折。

### 7326002

*Aerides falcatum* Lindl.

植物名 镰形指甲兰《云南种录》

功效 全草:婴儿用药。

### 7326003

*Amitostigma gracile* (Blume) Schltr. --- *Amitostigma chinensis* (Rolfe) Schltr.

植物名 细茎无柱兰《高植图鉴》

药材名 独叶一枝枪(浙江、江西)、《中药大辞典》

文献名 细茎无柱兰《江苏植志》,无柱兰《浙江药植志》,华无柱兰《安徽中草药》,雏兰《江西药录》

地方名 浙江:独叶珠(临安),独叶一枝花(德清、上虞、奉化、天台、金华);江西:竹叶一枝枪;四川:猪獠参;其他:独叶金枪。

功效 全草及根茎:解毒,消肿,止血。用于毒蛇咬伤,无名肿毒,跌打损伤,吐血。

### 7326004

*Anoectochilus formosanus* Hayata

植物名 金线兰《中国经植志》

药材名 金线莲(福建)

文献名 虎头蕉《草宝》,唇兰《中草药》,金线草《台湾中药材图鉴》

地方名 福建:鸟人参,〔金不换〕,金石松,什鸡单、金线蕨龙、金线虎头椒、金线屈腰(闽东),金蚕。

功效 全草:有小毒。清热凉血,除湿解毒。用于肺结核咯血,糖尿病,肾炎,膀胱炎,重症肌无力,风湿及类风湿性关节炎,毒蛇咬伤。

### 7326005

*Anoectochilus roxburghii* (Wall.) Lindl.

植物名 花叶开唇兰《高植图鉴》

药材名 花叶开唇兰《广西药录》

文献名 金线莲、金蚕、金石松、树草莲、鸟人参、金线虎头蕉、金线入骨消《汇编》

地方名 海南:金钱枫;广西:小叶金耳环(贺县),金丝线(桂平),麻叶菜(鹿寨);四川:蛇皮兰(峨眉山)。

功效 全草:用于肺热咳嗽,头痛,蛇伤,跌打损伤。

### 7326006

*Apostasia angustillicata* Thorel.

植物名 假兰树《广西药录》

地方名 广西:千年竹(龙州)。

功效 全株:清热降火。

### 7326007

*Arundina graminifolia* (D. Don) Hochr. --- *A. chinensis* Blume

植物名 禾叶竹叶兰《高植图鉴》

药材名 竹叶兰《云南药录》

地方名 竹兰(浙江、广东、广西、云南);浙江:山萼芥(温州);福建:土白芨、解萼药、紫兰(泉州),过山芦

狄;湖南:龙头花;广东:大叶寮刁竹(广州);海南:幽洞兰;广西:石毛、竹七、胡连(博白),草姜(金秀、桂平),〔胆草〕(藤县),黄天草(德保),土白及(贵县),土石斛(桂平),观音竹(陆川),〔胡黄连〕(钟山),过山锣迪(金秀、昭平),过界锣迪(苍梧);云南:“文尚海”、“文哈海”(傣名),〔山姜〕、扁竹兰(红河),长杆兰,竹叶七,旱谷花,笔竹。

功效 全草或根茎:清热解毒,祛风利湿,散瘀止痛。用于肝炎,跌打损伤,风湿疼痛,胃痛,尿路感染。

### 7326008

*Bletilla formosana* (Hayata) Schltr. --- *B. yunnanensis* Schlecht. ex Limpr.

植物名 台湾白芨《云南种录》

药材名 小白及《中药志》

文献名 小白芨《高植图鉴》

地方名 四川:白及(峨眉山)。

功效 块茎:化瘀止血,补肺抗癆,消肿生肌。用于肺癆,胃出血,咯血,刀伤出血,手足皸裂,疮疡肿毒。

### 7326009

*Bletilla ochracea* Schltr.

植物名 黄花白芨《高植图鉴》

药材名 狭叶白及《汇编》

文献名 白及《图经》,黄白及《科种》,猫儿姜《高植图鉴》

地方名 广西:黄术(三江);四川:白鸡儿,白鸡婆;云南:小白及。

功效 假鳞茎:化瘀止血,补肺抗癆,消肿生肌。用于肺癆,胃出血,咯血,刀伤出血,手足皸裂,疮疡肿毒。

备考 宋《本草图经》中所用汉州产白及,即为本品。

### 7326010

*Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f.

植物名 白及《高植图鉴》

药材名 白及《本经》、《药典》

文献名 甘根、连及草《本经》,白给《别录》,白根、白根《吴普本草》,白芨《滇南本草》,簪兰、朱兰《花镜》,雪如来、竹粟胶、紫蕙根、紫兰根《新纲》,双肾草、西牛角、呼良姜《高植图鉴》,紫兰、百笠《中药大辞典》,千年棕桐《中草药学》

地方名 刀口药(湖南、四川),小白及、小白芨(甘肃、云南),白鸡儿(江西、湖南、四川),白鸟儿头(江苏、云南),白及子(陕西、四川),白鸡娃(四川、贵州),利知子、一兜棕、千年棕、君球子、鞞口药(江西、湖南);江苏:白鸡儿头(南通);浙江:山田鸡;安徽:山萼芥,连节草;江西:血根(泰和);福建:山浮瓜;台湾:牙参;湖南:羊角七(溆浦),地螺丝(永顺、黔阳),鞞药子(宁乡、凤凰、新邵),扣子漆;广东:石萼芥,兰花头,根桔,鞞笋,紫茅兰;广西:“猴根”(壮语),白鸡果;四川:猫儿姜(蓬溪),山白芨,白鸡婆;贵州:白鸡;云南:鱼眼兰,大白芨,棕叶白芨;其他:肥白及。

功效 假鳞茎:收敛止血,消肿生肌。用于咳血吐

血, 外伤出血, 疮疡肿毒, 皮肤皲裂, 肺结核咳血, 溃疡病出血。

## 7326011

*Brachycorythus galeandra* (Reichb. f.) Summerh.

植物名 短距苞叶兰《高植图鉴》

地方名 广西: 狗蹄草(桂平), 肾草(隆林)。

功效 块茎: 用于蛇伤。

## 7326012

*Bulbophyllum calodictyon* Schlecht.

植物名 小绿石豆兰《云南种录》

药材名 石串莲《汇编》

文献名 [小石斛]、石链子、石寸连《汇编》, 美网石豆兰《云南药录》

地方名 云南: 小绿菱(玉溪), 小果上叶(昆明), 果上叶(曲靖), 石连子、(石枣子)(红河)。

功效 假鳞茎: 润肺止咳, 消炎止痛, 接骨。用于咳嗽。外用于乳腺炎, 骨折, 扭伤, 疮疖, 脓肿。

## 7326013

*Bulbophyllum inconspicuum* Maxim.

植物名 麦斛《汇编》

药材名 麦斛《唐本草》、《汇编》

文献名 石豆《名实图考》, 青兰《中国药植图鉴》

地方名 一挂鱼、羊奶草(广东、贵州), 小扣子兰(湖南、广东), 小号石橄榄(福建、广东), [石仙桃](安徽、江西、湖南), 果上叶(广东、广西、贵州), 岩珠(浙江、江西), 根上子(江西、湖南), 黄豆鞭、楼上楼(安徽、江西); 浙江: 石头兰、岩板植(嵊县); 福建: 石枣、珍珠双花(霞浦), 石莢, 石豆兰, 单叶石枣; 安徽: 一串鱼; 江西: 石蚊虫(婺源), 石莲子, 石豆子; 湖北: 金石豆(神农架); 湖南: 子上叶, 瓜子莲, 瓜子藤, 七仙桃, 石龙石尾; 广东: 山石斛、石米(潮阳), 小米石橄榄(潮安), 石上莲、串珠莲、百日晒(兴宁), 石橄榄子(普宁), 石橄榄、麦斛兰(揭阳); 广西: 石上虾; 贵州: 万年桃, [石枣子], 石杨梅, 灵芝角, 鸭雀嘴, [透骨草]。

功效 全草: 清热化痰, 生津养胃。用于肺燥咳嗽, 肺结核咯血, 热病烦渴, 扁桃体炎。

## 7326014

*Bulbophyllum kwangtungense* Schltr.

植物名 广东石豆兰《高植图鉴》

药材名 广石豆兰《汇编》

地方名 浙江: 单叶岩珠(浙南), 岩枣(平阳); 广西: 扣子兰(恭城); 四川: 肥石枣(峨眉山)。

功效 假鳞茎: 用于风热咽痛, 肺热咳嗽, 风湿关节疼痛, 跌打损伤。

## 7326014a

*Bulbophyllum levinei* Schltr.

植物名 齿瓣石豆兰《高植图鉴》

地方名 浙江: 独叶岩珠(温州、乐清), 石枣(平阳), 岩豆(景宁), 鸭舌兰(临安), 密珠(浙南)。

功效 全草: 滋阴降火, 清热消肿。用于急性咽喉炎, 扁桃体炎, 口腔炎, 热性病, 高热口渴。

## 7326015

*Bulbophyllum odoratissimum* Lindl.

植物名 密花石豆兰《高植图鉴》

药材名 果上叶《汇编》

文献名 极香石豆兰《汇编》

地方名 湖北: 石豆子(神农架); 广西: 万年桃(上思), 香石豆兰; 四川: 石鸭子(峨眉山), 一匹草; 云南: 小果上叶、石串莲(昆明), 羊奶果。

功效 全草: 润肺化痰, 舒筋活络, 消炎。用于肺结核咯血, 慢性气管炎, 慢性咽炎, 风湿筋骨疼痛, 疝气疼痛, 月经不调, 骨折, 跌打挫伤, 刀伤。

## 7326016

*Bulbophyllum pectinatum* Finet

植物名 长足石豆兰《高植图鉴》

地方名 湖南: 石仙桃(蓝山县端名)。

功效 全草: 润肺止咳。用于肺癆咳嗽。

7326017 见 7326014a

## 7326018

*Bulbophyllum radiatum* Lindl.

植物名 石豆兰《秦岭植志》

药材名 石豆兰《浙南本草新编》

文献名 辐射石豆兰《汇编》, 独叶岩珠《浙江民药》

地方名 石米(山西、陕西); 陕西: 石枣子、豆豆金钗(陕南), 石枣, 金枣, 环子金钗; 浙江: 石豆、岩豆(金华), 鸭舌兰; 广西: 石虾(容县), 上石虾; 四川: 小石鸭子(峨眉山)。

功效 全草: 祛风除湿, 消肿止痛, 凉血活血。用于肺癆咳嗽, 咽喉肿痛, 消化不良, 食欲不振, 风湿疼痛, 跌打损伤。

## 7326019

*Bulbophyllum reptans* Lindl.

植物名 伏生石豆兰《云南种录》

文献名 麦斛、葡萄石豆兰《云南药录》

地方名 云南: 小绿菱, 牛虱子, 石链子, 果上叶。

功效 全草: 滋阴润肺, 止咳化痰, 续筋骨。用于支气管炎, 咳嗽, 肺结核咳嗽, 咯血, 慢性咽痛, 慢性胃炎, 食欲不振。外用于跌打损伤, 骨折。

## 7326020

*Bulbophyllum shweliense* W. W. Sm.

植物名 伞花石豆兰《高植图鉴》

地方名 贵州: 果上叶, 石上叶, 一挂鱼。

功效 全株: 清热润燥, 化痰止咳, 活血祛瘀。用于咯血, 癆咳, 慢性支气管炎, 肺炎, 胃炎, 白喉, 咽喉肿痛, 刀伤, 阴虚盗汗。

## 7326021

*Calanthe alismifolia* Lindl.

植物名 泽泻虾脊兰《高植图鉴》

地方名 四川: 八仙草(峨眉山)。

功效 根茎、全草: 解毒, 活血, 祛风。

## 7326022

*Calanthe davidii* Franch. --- *C. ensifolia* Rolfe

植物名 剑叶虾脊兰《高植图鉴》

药材名 马牙七《汇编》

地方名 湖北:铁梳子(神农架);四川:九子连环草(峨眉山)。

功效 假鳞茎及根:有小毒。清热解毒,散瘀止痛。用于胃溃疡,急性胃扩张,慢性肝炎,腰痛,腹痛,颈淋巴结结核,慢性咽炎,牙痛,砂淋,闭经,关节痛,蛇咬伤,跌打损伤。

#### 7326023

*Calanthe discolor* Lindl.

植物名 虾脊兰《高植图鉴》

药材名 九子连环草《分类草药性》、《四川中药志》

文献名 白如棕《名实图考》,硬九头狮子草《民药汇编》,硬九子连环草《汇编》

地方名 浙江:连珠三七(临安),野节兰(龙泉);四川:连环草(重庆),肉连环;贵州:一串钮子,九节虫,串白鸡,夜白鸡,珠串珠,铜锤草,斑葱;云南:连珠白芨,异色虾脊兰。

功效 全草或假鳞茎:散结,解毒,活血,舒筋。用于瘰癧,扁桃腺炎,痔疮,跌打损伤。

#### 7326024

*Calanthe disticha* Tang et Wang

植物名 两列虾脊兰《高植图鉴》

药材名 两列虾脊兰《贵州药录》

功效 根茎:清热利湿,解毒软坚。用于颈淋巴结结核,脱肛,咽喉肿痛,白喉,痔疮出血。

#### 7326025

*Calanthe fimbriata* Franch.

植物名 流苏虾脊兰《高植图鉴》

药材名 马牙七《汇编》

地方名 陕西:九子连(太白);湖北:铁梳子(神农架);广西:大仙茅;四川:九子连环草(峨眉山),肉连环,铁连环,硬九子连。

功效 假鳞茎及根:有小毒。清热解毒,散瘀止痛。用于胃溃疡,急性胃扩张,慢性肝炎,腰痛,腹痛,颈淋巴结结核,慢性咽炎,牙痛,砂淋,闭经,关节痛,蛇咬伤,跌打损伤。

#### 7326026

*Calanthe hamata* Hand.-Mazz. --- *Calanthe graciliflora* Hayata

植物名 钩距虾脊兰《高植图鉴》

地方名 湖北:铁扣子、铁袖子(神农架);湖南:千斤桩,四里麻;广西:小黄金(兴安);贵州:小九子联环。

功效 全草和假鳞茎:活血化瘀,消痈散结。用于风湿筋骨痛,痔血,脱肛,淋巴结结核,扁桃腺炎,跌打损伤。外用于疮疖。

#### 7326026a

*Calanthe lamellosa* Rolfe --- *C. yunnanensis* Rolfe

植物名 肾唇虾脊兰《高植图鉴》

地方名 四川:九子连环草(峨眉山)。

功效 根茎、全草:清热解毒,镇痛,祛风,散瘀。

#### 7326027

*Calanthe lancifolia*

植物名 铁岩板《峨眉药植资源》

地方名 四川:岩铁板(峨眉山)。

功效 全草:清热解毒,消癰疔等。

#### 7326028

*Calanthe mannii* Hook. f.

植物名 细花虾脊兰《高植图鉴》

药材名 九子连环草《四川中药志》

文献名 马里虾脊兰《四川中药志》

地方名 四川:连环草(峨眉山),肉连环,铁连环,硬九子连。

功效 根茎:软坚散结,清热解毒。用于痰咳瘰癧,疮疖痈肿,痔疮,咽喉肿痛。

#### 7326029

*Calanthe odora* Griff.

植物名 香花虾脊兰《高植图鉴》

药材名 香花虾脊兰《广西药录》

地方名 广西:大仙茅(乐业)。

功效 根:用于小儿疳积。

#### 7326030

*Calanthe puberula* Lindl.

植物名 镰萼虾脊兰《高植图鉴》

药材名 镰萼虾脊兰《湖南药物志》

文献名 柔毛虾脊兰《广西药录》,反瓣虾脊兰《峨眉药植资源》,镰叶虾脊兰《云南种录》

地方名 湖南:九子莲(瑶名),山刀莲,石三七,蛇肠珠,镇腰带;四川:九子连环草(峨眉山)。

功效 全草:解毒消肿,活血散结。用于跌打损伤,腰、肋痛,瘰癧,痔疮,脱肛,毒蛇咬伤。

#### 7326031

*Calanthe reflexa* Maxim.

植物名 反瓣虾脊兰《高植图鉴》

药材名 反瓣虾脊兰《浙江药植志》

地方名 广西:饭食草(贺县)。

功效 全草和假鳞茎:活血化瘀,消痈散结。

#### 7326032

*Calanthe similis* Schlecht.

植物名 相似虾脊兰《云南种录》

文献名 假虾脊兰《广西植录》

功效 全草:用于疮疥、淋巴结核。

#### 7326034

*Calanthe tricarinata* Lindl. - *C. megalapha* Franch.

植物名 三棱虾脊兰《高植图鉴》

药材名 肉连环《汇编》

文献名 九子连环草《分类草药性》,三肋虾脊兰《秦岭植志》,虾脊兰《云南药录》

地方名 四川:铁连环(峨眉山);云南:竹叶石风丹。

功效 全草或根茎:解毒软坚,利湿固脱,舒筋活络,祛风止痛。用于风湿性关节炎,类风湿性关节炎,腰肌劳损,跌打损伤,胃痛,瘰癧,脱肛。

#### 7326035

*Calanthe triplicata* (Willem.) Ames --- *Calanthe veratrifolia* (Willd.) R. Br.

植物名 三褶虾脊兰《高植图鉴》  
文献名 高脚虾脊兰《广西植录》, 藜芦叶虾脊兰《广西药录》  
地方名 广西: 石上雀; 其他: 白花虾脊兰(香港)。  
功效 全草或根茎: 解毒软坚, 利湿固脱。用于瘰癧, 利尿, 脱肛。

## 7326036

*Calanthe yuana* Tang et Wang

植物名 石鸭子(四川峨眉)  
文献名 九子连环草《峨眉药植资源》, 虾脊兰《峨眉药植研究》  
功效 全草: 清热解毒, 消瘰癧。

## 7326037 见 7326026a

## 7326038

*Cephalanthera erecta* (Thunb.) Blume

植物名 银兰《高植图鉴》  
药材名 银兰《浙江药植志》  
地方名 浙江: 鱼头兰花; 湖北: [白薇](郧阳); 四川: 银兰草、白花草(峨眉山)。  
功效 全草: 清热利尿。用于高热不退, 口干, 小便不通。

## 7326039

*Cephalanthera falcata* (Thunb.) Lindl. --- *C. japonica* A. Gray

植物名 金兰《高植图鉴》  
药材名 金兰《汇编》  
文献名 镰叶头蕊兰《广西药录》, 头蕊兰《浙江药植志》  
地方名 浙江: 桤雀兰(临安); 四川: 金兰草、黄花草(峨眉山)。  
功效 全草: 清热泻火。用于喉痛, 牙痛, 毒蛇咬伤。

## 7326040

*Changnienia amoena* Chien

植物名 独花兰《高植图鉴》  
药材名 独花兰《汇编》  
文献名 长年兰《浙江药植志》  
地方名 浙江: 带血独叶一枝枪(临安)。  
功效 全草、假球茎: 清热, 凉血, 解毒。用于咳嗽, 痰中带血, 热疖疔疮。

## 7326041

*Cheirostylis yunnanensis* Rolfe

植物名 云南叉柱兰《高植图鉴》  
药材名 石头虾《广西药录》  
功效 全草: 用于慢性溃疡。

## 7326042 见 7326044a

## 7326043

*Cirrhopetalum andersonii* Hook. f. --- *C. henryi* Rolfe  
--- *Bulbophyllum andersonii* (Hook. f.) J. J. Smith

植物名 梳帽卷瓣兰《高植图鉴》  
药材名 一匹草《汇编》  
文献名 卷瓣兰《中药大辞典》, 一匹叶《民药汇编》, 橙红卷瓣兰《云南种录》

地方名 广西: 果上叶(东兰); 四川: 石鸭子(峨眉山); 贵州: 岩瓢, 马串铃。

功效 全草: 清热润燥, 化痰止咳, 活血祛瘀。用于咯血, 劳咳, 慢性支气管炎, 肺炎, 胃炎, 白喉, 咽喉肿痛, 刀伤, 阴虚盗汗。

## 7326044 见 7326043

## 7326044a

*Cirrhopetalum miniatum* Rolfe

植物名 斑唇卷瓣兰《高植图鉴》  
地方名 广西: 石上桃(金秀)。  
功效 全草: 用于肺结核, 肝炎。

## 7326045

*Cleisostoma paniculatum* (Ker-Gawl.) Garay ---

*Sarcanthus paniculatus* (Ker-Gawl.) Lindl.

植物名 大序隔距兰《高植图鉴》  
地方名 广西: 石吊兰(钟山), 山吊兰(上思)。  
功效 全草: 生津。

## 7326046

*Cleisostoma rostratum* (Lindl.) Garay --- *Sarcanthus rostratus* Lindl.

植物名 尖喙隔距兰《高植图鉴》  
地方名 广西: 蜈蚣草(大新)。  
功效 全草: 用于跌打损伤, 骨折。

## 7326047

*Cleisostoma scolopendrifolium* (Makino) Garay --- *Sarcanthus scolopendrifolius* Makino

植物名 蜈蚣兰《高植图鉴》  
药材名 蜈蚣兰《汇编》  
地方名 浙江: 飞天蜈蚣(临安), 石蜈蚣、金百脚(长兴), 岩角(新昌), 百脚蜈蚣、柏子兰、蜈蚣草(温州、乐清), 齿牙半枝莲、狗牙半支(金华)。  
功效 全草: 清热解毒, 润肺止血。用于气管炎, 咯血, 胆囊炎, 咽喉炎, 急性扁桃体炎, 慢性副鼻窦炎, 肾盂肾炎, 小儿惊风。

## 7326048

*Cleisostoma williamsonii* (Reichb. f.) Garay

植物名 红花隔距兰《广西药录》  
地方名 广西: 马尾吊兰(田林), [光棍草](凤山), [鹿角草](龙州)。  
功效 全草: 用于风湿痹痛, 小儿麻疹症, 小儿疳积, 阳痿。

## 7326049

*Coeloglossum viride* (L.) Hartm. --- *Coeloglossum viride* var. *bracteatum* (Willd.) Richter

植物名 凹舌兰《高植图鉴》  
药材名 凹舌兰《中药志》  
文献名 长苞凹舌兰《中药志》, 窝舌兰《中国植物图鉴》  
地方名 陕西: 手儿参(秦岭); 青海: “汪拉曼巴”(藏名), 羊泡旦; 河南: 掌参。  
功效 块根: 补血益气, 生津, 止血。用于久病体虚, 安神镇惊, 阳痿等。

**7326050** 见 7326051a

**7326051**

*Coelogyne corymbosa* Lindl.

植物名 伞房贝母兰《云南种录》

药材名 小绿苳《全展选编·外科》

文献名 贝母兰《云南中草药选》

地方名 云南:小白苳、止血果(文山),〔贝母〕,果上叶。

功效 假鳞茎或全草:清热止咳,止血定痛,接骨。用于支气管炎,感冒,骨折,软组织挫伤。

备考 《新华本草纲要》3:583,1990 学名为 *C. leucantha* W. W. Smith

**7326051a**

*Coelogyne esquirolii* Schlechter

植物名 大果上叶《汇编》

药材名 鸡大腿《云南药录》

地方名 云南:贝母兰。

功效 假鳞茎:润肺止咳,消炎,消肿,接骨。用于气管炎,肺结核,咳嗽,咳血,骨折,外伤瘀血,急性关节炎。

**7326052**

*Coelogyne fimbriata* Lindl.

植物名 流苏贝母兰《高植图鉴》

药材名 流苏贝母兰《广西药录》

地方名 广西:〔石仙桃〕(容县)。

功效 假鳞茎、叶:用于咳嗽。

**7326053**

*Coelogyne flaccida* Lindl.

植物名 栗鳞贝母兰《高植图鉴》

药材名 栗鳞贝母兰《贵州药录》

地方名 贵州:果上叶。

功效 全草:清热润燥,生津止渴,化痰,止咳。用于肺热咳嗽,燥烦口渴,咯血,咳血,咽炎。

**7326054**

*Coelogyne occultata* Hook. f.

植物名 卵叶贝母兰《云南种录》

药材名 卵叶贝母兰《汇编》

地方名 西藏:“卜谢恣罗玛切瓦”(藏名),〔有瓜石斛〕。

功效 全草:滋阴益肾,养胃生津。用于热病伤津,潮热盗汗,遗精,腰酸无力,慢性胃炎,胃酸缺乏,食欲不振。

**7326055**

*Coelogyne punctulata* Lindl. --- *C. nitida* Lindl. ex Wall.

植物名 斑唇贝母兰《高植图鉴》

药材名 小绿苳《中草药学》

地方名 云南:石巴蕉,对叶果,果上叶。

功效 假鳞茎或全草:清热止咳,接骨。用于骨折,软组织挫伤,支气管炎,感冒。

**7326056**

*Coelogyne viscosa* Reichb. f.

植物名 禾叶贝母兰《广西药录》

地方名 广西:石莲草(德保),石仙桃(东兰)。

功效 假鳞茎:用于感冒,肺炎,胃脘痛。

**7326057**

*Collabium chinensis* (Rolfe) Tang et Wang

植物名 吻兰《高植图鉴》

药材名 吻兰《广西药录》

功效 假鳞茎、叶:外用于疮疡肿毒。

**7326058**

*Cremastra appendiculata* (D. Don) Makino ---

*Cremastra variabilis* (Blume) Nakai

植物名 杜鹃兰《高植图鉴》

药材名 山慈菇《本草拾遗》、《药典》

文献名 山茨菰《百一选方》,朱姑《纲目》,毛姑《本草从新》,处姑、白地栗、白毛姑《药材学》,毛慈菇《药典》

地方名 浙江:毛慈姑(临安),彩配兰;湖北:活血珠;湖南:土田七,竹叶三七,竹叶贝母,连珠七,芥米三七,独大蒜,独蒜兰,蛇藏珠,算盘七;广西:龙头草(金秀);四川:泥宾子,泥冰子,泥皱子(峨眉山);贵州:三道圈,三道箍,朝天一柱香,十三九子不离母;其他:斩龙剑。

功效 假鳞茎:清热解毒,化痰散结,用于痈肿疔毒,瘰癧痰核,淋巴结结核,蛇虫咬伤;叶:用于乳痈,便毒;花:用于小便淋涩痛。

**7326059**

*Cymbidium ensifolium* (L.) Sw.

植物名 建兰《高植图鉴》

药材名 建兰《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 燕草《本草经集注》,秋兰《本草衍义》,〔土续断〕《续古今考》,兰根《五杂俎》,幽兰《物理小识》,建兰花、建兰叶、建兰根、草兰《纲目拾遗》,八月兰、兰花根《分类草药性》,甌兰《名实图考》,玉叶兰、兰蕙花、报春兰、青兰《植物名汇》,九节兰《中国植物图鉴》,蕙花《中国经植志》,官兰《中药大辞典》

地方名 兰花(江苏、浙江、福建、广西);广西:剑兰;四川:六月兰,兰草根,蕙兰,夏兰;台湾:焦尼兰;其他:四季兰、晕心兰(香港)。

功效 根或全草:清热解毒,滋阴清肺,化痰止咳。用于百日咳,肺结核咳嗽,咯血,神经衰弱,头晕腰疼,尿路感染,白带,骨折,毒蛇咬伤。

**7326060**

*Cymbidium faberi* Rolfe

植物名 蕙兰《高植图鉴》

药材名 蕙兰《汇编》

文献名 九子兰、九节兰《植分学报》,线兰《秦岭植志》

地方名 陕西:土百部(秦岭),化气兰(镇坪);台湾:一茎九华,一茎九花,九华兰,九花兰;四川:兰草(峨眉山)。

功效 根皮:有小毒。润肺止咳,杀虫。用于常年咳嗽,蛔虫症,头虱。

**7326061**

*Cymbidium floribundum* Lindl.

植物名 多花兰《高植图鉴》

药材名 多花兰《汇编》

文献名 兰草、蕙、夏兰、六月兰《汇编》

地方名 湖北：牛角七（神农架）；湖南：[地笋]（新晃），牛角三七，羊角七，鹿角七；广西：石羊果（灌阳），九头兰；贵州：岩韭菜，山慈菇，流苏贝母兰。

功效 根或全草：滋阴清肺，化痰止咳。用于百日咳，肺结核咳嗽，咯血，神经衰弱，头晕腰疼，尿路感染，白带。

#### 7326062

*Cymbidium goeringii* (Reichb. f.) Reichb. f. --- *Cymbidium virescens* Lindl. --- *C. forrestii* Rolfe --- *C. yunnanense* Schltr. --- *C. pseudovirens* Schltr. --- *C. uniflorum* Yen --- *C. formosanum* Hayata

植物名 春兰《高植图鉴》

药材名 春兰《汇编》

文献名 朵朵香、双飞燕、草兰《名实图考》，报春花《植物名汇》，兰花《经济植物学》

地方名 四川：土百部（西南地区），兰草百部（会理），兰草根，山兰；贵州：兰草。

功效 根或全草：滋阴清肺，化痰止咳。用于百日咳，肺结核咳嗽，咯血，神经衰弱，头晕腰疼，尿路感染，白带。

备考 春兰系俗名，但本种非《植物名实图考》之春兰。

#### 7326063

*Cymbidium hookerianum* Reichb. f. --- *Cymbidium grandiflorum* Griff.

植物名 虎头兰《云南种录》

药材名 虎头兰《名实图考》、《云南药录》

地方名 四川：青蜂（成都）。

功效 根茎、果实：止咳化痰，散瘀消肿，止血消炎。用于肺结核，肺炎，气管炎，喘咳。

#### 7326064

*Cymbidium kanran* Makino

植物名 寒兰《高植图鉴》

药材名 寒兰《湖南药物志》

地方名 湖南：“送吾他”（侗语），香花草，兰花草。

功效 根：驱热，驱蛔。用于急性胃肠炎，蛔虫病。

#### 7326065

*Cymbidium lancifolium* Hook.

植物名 兔耳兰《高植图鉴》

药材名 兔耳兰《广西药录》

文献名 宽叶兰《广西植录》，宽叶兰草《峨眉药植研究》

地方名 台湾：竹柏兰；广西：续筋草（忻城）；四川：搜山虎（峨眉山）。

功效 全草：润肺，续筋。

#### 7326066

*Cymbidium longifolium* D. Don --- *Cyperorchis longifolium* (D. Don) Schlecht.

植物名 莎草兰《云南种录》

药材名 雪兰《名实图考》

文献名 兰花草《滇南本草》，长叶兰《高植图鉴》

地方名 台湾：香莎草兰；云南：草兰花。

功效 全草：用于五淋便浊，利小便，除湿热，妇人赤白带。

#### 7326067

*Cymbidium pendulum* (Roxb.) Sw.

植物名 硬叶吊兰《高植图鉴》

药材名 硬叶吊兰《汇编》

文献名 剑兰《高植图鉴》，硬叶兰《植分学报》

地方名 [吊兰]（广东、云南）；广东：吊兰子（广州）；广西：[石吊兰]（邕宁）；云南：大凉药、大甩头、卧吊兰、倒吊兰（红河），虎头兰、树茭瓜、树茭瓜果（思茅），牛屎别草（临沧），野芭蕉；其他：垂花蕙兰（香港）。

功效 全草、种子、根：润肺止咳，止血消炎，散瘀，调经。用于肺结核咳血，支气管炎，肺炎，喘咳，咽喉炎，月经不调，白带。

#### 7326068

*Cymbidium sinense* (Andr.) Willd.

植物名 墨兰《高植图鉴》

药材名 墨兰《纲目拾遗》、《广西药录》

文献名 丰岁兰《高植图鉴》

地方名 台湾：拜岁兰（台北）；广西：春兰，报春兰；其他：报岁兰。

功效 根：清心润肺，止咳平喘。

#### 7326069

*Cypripedium calceolus* L.

植物名 黄囊杓兰《汇编》

文献名 杓兰《高植图鉴》

地方名 四川：“客心扎”（若尔盖藏名）。

功效 根：强心利尿，活血调经。用于心力衰竭，月经不调。

#### 7326070

*Cypripedium corrugatum* Franch.

植物名 绉杓兰《云南种录》

药材名 兜兰《汇编》

地方名 云南：绉杓兰，敦咸草。

功效 根：调经活血，消炎止痛。用于月经不调，痛经，闭经，附件炎，膀胱炎，疝气等。

#### 7326071

*Cypripedium debile* Rehb. f.

植物名 对叶杓兰《峨眉药植研究》

地方名 四川：二叶兰。

功效 全草：活血祛瘀，消肿，止痛。

#### 7326072

*Cypripedium fasciolatum* Franch.

植物名 大叶杓兰《高植图鉴》

药材名 大叶杓兰《中药大辞典》

地方名 四川:荷花花、敦盛草(峨眉山)。  
功效 根茎和花:有小毒。利尿消肿,活血祛瘀,祛风镇痛。

## 7326073

*Cypripedium flavum* Hunt et Summerh. --- *C. luteum* Franch.

植物名 黄花杓兰《高植图鉴》  
药材名 黄花杓兰《神农架药录》  
地方名 湖北:扫帚七、夜壶花(神农架)。  
功效 根茎:用于劳伤,跌打损伤。

## 7326074

*Cypripedium formosanum* Hayata

植物名 台湾杓兰(拟)  
地方名 台湾:一点红。  
功效 叶、根茎:用于吐血。

## 7326075

*Cypripedium franchetii* Wils.

植物名 毛杓兰《高植图鉴》  
药材名 牌楼七《汇编》  
功效 根:理气,止咳,止痛。用于气滞咳嗽,胸肋疼痛。

## 7326076

*Cypripedium guttatum* Sw.

植物名 紫点杓兰《高植图鉴》  
药材名 斑花杓兰《长白山植药志》  
地方名 吉林:小口袋花。  
功效 花:镇静。用于神经、精神障碍,癫痫,小儿高烧惊厥;茎、花:用于胃痛,癌症。

## 7326077

*Cypripedium henryi* Rolfe

植物名 绿花杓兰《高植图鉴》  
药材名 龙舌箭《陕西中草药》  
地方名 陕西:金龙七(平利);湖北:扫帚七(神农架);四川:龙舌剑、敦盛草(峨眉山)。  
功效 根:理气行血,消肿止痛。用于胃寒腹痛,腰腿疼痛,跌打损伤。

## 7326078

*Cypripedium japonicum* Thunb.

植物名 扇脉杓兰《高植图鉴》  
药材名 扇子七《陕西中草药》  
文献名 扇叶杓兰《秦岭植志》,蓝花双叶草《陕西中草药》,菊花双叶草、一把伞《高植图鉴》  
地方名 阴阳扇(陕西、浙江);陕西:[半边莲](洋县),斗风七(南郑),黑驴蛋;安徽:老虎七;湖北:扇子还阳、对口狮子草、九头狮子草(神农架);贵州:肾叶兰。  
功效 根、带根全草:有毒。活血调经,祛风镇痛,截疟。用于月经不调,跌打损伤疼痛,间日疟,皮肤瘙痒症。

## 7326079

*Cypripedium macranthum* Sw.

植物名 大花杓兰《高植图鉴》

药材名 蜈蚣七《陕西中草药》

文献名 杓兰《陕西中草药》,大花囊兰、大口袋花《高植图鉴》

地方名 陕西:黑驴蛋(周至),牌楼七(洵阳);甘肃:鸡嗓子花;湖北:凤凰抢蛋、独龙抢宝(巴东)。

功效 根茎和花:有小毒。利尿消肿,活血祛瘀,祛风镇痛。用于全身浮肿,下肢水肿,小便不利,白带,风湿腿痛,跌打损伤。

## 7326080

*Cypripedium margaritaceum* Franch.

植物名 斑叶杓兰《高植图鉴》  
药材名 兰花双叶草《滇南本草》、《汇编》  
地方名 云南:花叶两块瓦(昆明)。

功效 全草:有小毒。补肝肾,和气血,明目,利尿,消肿。用于角膜云翳,夜盲,水肿,气肿,血肿。

## 7326080a

*Cypripedium tibeticum* King et Rolfe

植物名 西藏杓兰《新华本草纲要》  
文献名 敦盛草《西藏中草药》  
地方名 西藏:“敦朴江区”(藏名)。  
功效 根:有小毒。利尿,消肿,止痛,活血。用于风湿腿痛,下肢水肿,跌打损伤,淋病,白带。

## 7326081

*Dendrobium acinaciforme* Roxb.

植物名 剑叶石斛《高植图鉴》  
药材名 剑叶石斛《广西药录》  
地方名 竹槿草(广西、贵州);广西:人字草(桂林),石斛。  
功效 茎:养阴益胃,生津止渴;叶:用于胃阴不足。

## 7326082

*Dendrobium aduncum* Wall. ex Lindl. --- *Dendrobium aduncum* Wall. ex Lindl. var. *faulhaberianum* (Schltr.) Tang et Wang --- *Dendrobium faulhaberianum* Schltr.

植物名 钩状石斛《高植图鉴》  
药材名 钩状石斛《品种论述》  
文献名 钩石斛《海南植志》,白花钩石斛《品种论述》,两广钩状石斛《广西药录》,天使鱼石斛《云南种录》  
地方名 黄草、鲜石斛(广东、广西),红兰草(广西、贵州);广西:水兰(蒙山),紫皮兰(永福、乐业),三级枫斗,大黄草,石金钗草,红吊兰,铁皮兰,石斛,黄草石斛,紫皮枫斗;贵州:藤兰草,水棒草;云南:重唇石斛;其他:海南钩石斛。

功效 全草:滋阴养胃,清热生津。用于热病伤阴,口干燥渴,胃痛干呕,病后虚热。

## 7326083

*Dendrobium aduncum* Wall. ex Lindl. var. *affine* W. L. Sha et G. Y. Lo

植物名 相似石斛《品种论述》  
功效 全草:养阴清热,健脾胃。

## 7326084

*Dendrobium aphyllum* (Roxb.) C. E. C. Fischer

植物名 兜唇石斛《植分学报》  
 药材名 黄草石斛《植分学报》  
 文献名 无叶石斛《云南种录》  
 地方名 广西:金耳环、黄草(隆林),吊兰花。  
 功效 茎:养阴益胃,生津止渴。用于惊风,食物中毒。

## 7326085

*Dendrobium bellatulum* Rolfe

植物名 矮石斛《高植图鉴》  
 药材名 耳环石斛《中药大辞典》  
 文献名 石斛《本经》,小美石斛《中药志》,黄草石斛、云南枫斗、西枫斗、圆枫斗《中药大辞典》  
 地方名 云南:黑节草。  
 功效 茎:滋阴养胃,生津止渴。

## 7326086

*Dendrobium candidum* Wall. ex Lindl. --- *Dendrobium officinale* Kimura et Migo

植物名 铁皮石斛《药典》  
 药材名 石斛《本经》、《药典》  
 文献名 林兰《本经》,禁生、杜兰、石薹《别录》,黄草(李《药植》),耳环石斛《药典》,风斗、无芦枫斗、顶上枫斗、中枫斗、老枫斗、长面铁皮、铁皮、铁皮斗、铁皮斛《和汉药名汇》,环草、枫斗《药学报》,环草石斛《植分学报》,霍山石斛《中草药学》,黄草石斛、西枫斗、圆枫斗、结子斗、直条枫斗、葫芦斗、生川斗、广霍斗《中药大辞典》  
 地方名 大黄草(湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州),黑节草(浙江、广西、贵州、云南);陕西:细黄草;浙江:玉兰、仙斗、(吊兰),岩竹、铁吊兰、鲜石斛;湖北:金石斛(光化);广西:铁皮兰、铁皮枫斗(桂林);贵州:马鞭草、水草;云南:云南铁皮。

功效 茎:益胃生津,滋阴清热。用于阴伤津亏,口干烦渴,食少干呕,病后虚热,目暗不明。

## 7326087

*Dendrobium chrysanthum* Wall. ex Lindl.

植物名 束花石斛《高植图鉴》  
 药材名 黄草石斛《药典》  
 文献名 金兰《滇南本草》,石斛《药典》,鲜石斛《植分学报》  
 地方名 黄草(四川、云南),大黄草(广西、贵州);宁夏:金环石斛;广西:大马鞭,马鞭石斛(桂林),〔马鞭草〕;贵州:水马棒(罗甸),水打棒,旱马棒;云南:岩竹,紫斑石斛。

功效 茎:益胃生津,滋阴清热。用于阴伤津亏,口干烦渴,食少干呕,病后虚热,目暗不明。

功效 茎:益胃生津,滋阴清热。用于阴伤津亏,口干烦渴,食少干呕,病后虚热,目暗不明。

## 7326088

*Dendrobium crepidatum* Lindl. et Paxt.

植物名 玫瑰石斛《植分学报》  
 药材名 大黄草石斛(拟)  
 文献名 靴底石斛《云南种录》,黄草《药学报》,黄草石斛《植分学报》  
 地方名 贵州:大黄草,水打棒,马棒草。

功效 茎:益胃生津,滋阴清热。用于胃中虚热,胃病干呕,腰膝痠痛,咽喉干痒。

## 7326089

*Dendrobium crumenatum* Sw. --- *D. kwashotense* Hayata

植物名 木石斛《植分学报》  
 药材名 木斛(台湾)、《品种论述》  
 文献名 石斛《台湾中药材图鉴》  
 功效 茎:益胃生津,滋阴清热。

## 7326090

*Dendrobium denneanum* Kerr --- *D. clavatum* Wall. ex Lindl. --- *D. clavatum* Wall. ex Lindl. var. *aurantiacum* (Rehb. f.) Tang et Wang --- *D. flaviflorum* Hayata

植物名 迭鞘石斛《高植图鉴》  
 药材名 大黄草(广西、贵州)、《品种论述》  
 文献名 金兰《名实图考》,黄花棍棒石斛、棍棒石斛《汇编》,木斛《台湾中药材图鉴》,紫斑金兰《云南种录》,紫斑石斛《云南药录》,黄草石斛《植分学报》  
 地方名 马鞭石斛(广西、四川、贵州、云南),石斛(四川、贵州、云南),黄草(四川、云南);广西:大马鞭草(乐业),大马鞭,马鞭草,金花石斛,黄草节;四川:黄花石斛;贵州:马鞭杆,中黄草,旱马棒;云南:金石斛,岩竹;其他:金钗石斛。

功效 全草:养阴清热。用于胃热呕吐,肺结核,毒血症,脱水;茎:益胃生津,滋阴清热。

功效 全草:养阴清热。用于胃热呕吐,肺结核,毒血症,脱水;茎:益胃生津,滋阴清热。

## 7326091

*Dendrobium densiflorum* Lindl. ex Wall.

植物名 密花石斛《高植图鉴》  
 药材名 粗黄草(云南)、《汇编》  
 地方名 江苏:石斛;广西:铁吊兰;云南:大黄草(玉溪),黄草。  
 功效 茎:益胃生津,滋阴清热。

## 7326092

*Dendrobium devonianum* Paxt.

植物名 齿瓣石斛《高植图鉴》  
 药材名 中黄草《品种论述》  
 文献名 黄草《药学报》,黄草石斛《植分学报》  
 地方名 贵州:大黄草,水打棒,旱马棒。  
 功效 茎:益胃生津,滋阴清热。

## 7326093

*Dendrobium falconeri* Hook.

植物名 串珠石斛《高植图鉴》  
 文献名 小环草《药学报》,环草石斛《植分学报》,红鹇石斛《台湾兰科植物》,新竹石斛《台湾植志》  
 地方名 广西:水兰。  
 功效 茎:益胃生津,滋阴清热。

## 7326094

*Dendrobium fimbriatum* Hook. --- *D. fimbriatum* Hook. var. *oculatum* Hook.

植物名 流苏石斛《高植图鉴》  
 药材名 马鞭石斛《药典》  
 文献名 单斑石斛《广西药录》



地方名 [马鞭草] (广西、贵州); 石斛 (宁夏、新疆、江苏、湖北、四川、贵州); 大黄草 (安徽、贵州); 陕西: 草石斛; 江苏: 川石斛 (南京); 上海: 黄草片; 广西: 黄草节; 四川: 马棒草、黄草 (重庆); 贵州: 马鞭杆, 旱马棒, 小黄草, 旱马鞭。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。用于阴伤津亏, 口干烦渴, 食少干呕, 病后虚热, 目暗不明。

## 7326095

*Dendrobium hainanense* Rolfe

植物名 海南石斛《高植图鉴》

药材名 海南石斛《南药学报》

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326096

*Dendrobium hancockii* Rolfe

植物名 细叶石斛《高植图鉴》

药材名 细叶石斛《汇编》

文献名 石斛《本经》, 黄草石斛《植分学报》, 马鞭石斛《药学报》, 小黄草石斛、耳环石斛、枫斗、西枫斗《中药大辞典》

地方名 [马鞭草] (广西、贵州); 陕西: [石竹] (洵阳); 甘肃: 草石斛, 黄草; 湖北: 竹节金钗 (神农架); 广西: 大馬鞭草 (隆林), 大黃草, 黄草节; 四川: 金钗花; 贵州: 中黄草, 黑竹草, 竹丫草。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326097

*Dendrobium henryi* Schltr.

植物名 疏花石斛《高植图鉴》

药材名 黄草石斛 (四川、贵州、云南)

文献名 黄草《药学报》

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326098

*Dendrobium hercoglossum* Reichb. f. --- *Dendrobium wangii* Tso

植物名 重唇石斛《高植图鉴》

药材名 环草石斛 (广西、贵州)

文献名 石斛《本经》, 爪兰斗、爪兰、冲铁皮《和汉药名汇》, 王氏石斛《中药志》, 金钗斛《药材学》, 网脉唇石斛《汇编》, 网脉聚石斛《广西药园药录》, 黄草石斛《植分学报》, 圆石斛《药学报》

地方名 小黄草 (广西、贵州), 小金钗 (广东、广西), 环草 (广西、四川、贵州、云南), 鸡爪兰、细霍斗 (上海、浙江); 湖北: 伪品石斛 (光化); 广西: 吊黄兰、鸡爪枫斗, 细黄草, 金石斛, 圆钗石斛, 铜皮兰, 铜黄草; 四川: 黄草 (成都); 贵州: 中黄草 (册亨), 毫猪尖。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326099

*Dendrobium huoshanense* G. Z. Tang et S. J. Cheng

植物名 霍山石斛《百花镜》、《中草药》

药材名 霍山石斛《品种论述》

地方名 安徽: 霍石斛、石斛 (霍山)。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326100

*Dendrobium jenkinsii* Wall. ex Lindl. - *Dendrobium ag. gregatum* Roxb.

植物名 聚石斛《高植图鉴》

药材名 金黄泽《中药志》

文献名 木虾公、虾脊石斛《汇编》, 鸡背石斛《海南植志》, 多花石斛《种分讲义》

地方名 上树虾 (广东、广西、云南); 湖南: 鸭舌斛、鸭钗石斛 (长沙); 广东: 上杆虾公; 广西: 大黃草, 石斛, 紫皮兰枫斗、蟹爪石斛; 云南: 小黄花石斛。

功效 全草: 润肺化痰, 止咳平喘。用于肺热咳嗽, 哮喘。

## 7326101

*Dendrobium linawianum* Reichb. f.

植物名 短唇石斛《高植图鉴》

药材名 金石斛《汇编》

文献名 石斛《本经》, 长爪石斛《中药大辞典》, 鲜石斛、金钗石斛《植分学报》, 金丝石斛《台湾中药材图鉴》

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326102

*Dendrobium linguolla* Rehb. f.

植物名 红兰草《品种论述》

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326102a

*Dendrobium loddigesii* Rolfe --- *D. loddigesii* Rolfe var. *album* Tang et Wang

植物名 美花石斛《高植图鉴》

药材名 环草石斛《药典》

文献名 石斛《本经》, 粉花石斛《云南药录》, 细黄草《汇编》, 小黄草石斛《中药大辞典》

地方名 小黄草 (湖北、贵州), 黄草 (广西、云南); 湖北: 金钗、枫斗 (光化); 广东: 环钗; 广西: 小环草, 环草; 贵州: 黄草石斛; 云南: 石蚌腿, 大黃草 (红河)。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。用于阴伤津亏, 口干烦渴, 食少干呕, 病后虚热, 目暗不明。

## 7326103

*Dendrobium lohonense* Tang et Wang

植物名 罗河石斛《高植图鉴》

药材名 环草石斛 (拟)

文献名 黄花石斛、细黄草、细环草《汇编》, 石斛《中药大辞典》, 黄草石斛《植分学报》

地方名 黄草 (广西、贵州); 广东: 中环草; 广西: 小黄草 (柳州), 小黄花, 小马鞭、马鞭石斛 (桂林), 出芽草, 竹业草; 贵州: 中黄草, 竹皮草 (罗甸), 黄竹丫, [马鞭草], 藤兰, 竹丫草。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326104

*Dendrobium longicorum* Lindl.

植物名 长距石斛《高植图鉴》

文献名 长角石斛《滇南本草》整理本)

地方名 云南: 石斛。

功效 茎: 滋阴清热, 益胃生津。

## 7326105

*Dendrobium moniliforme* (L.) Sweet --- *Dendrobium crispulum* Kimura et Migo

植物名 细茎石斛《高植图鉴》

药材名 环草石斛《植分学报》

文献名 石斛、林兰《本经》, 禁生、石薺、杜兰《别录》, 霍山石斛《百草镜》, 霍石斛、甜石斛、米心石斛《纲目拾遗》, 罗浮山石兰《植物名汇》, 东斗、日本石斛、铁皮石斛《华北药志》, 西石斛、铜皮斗、鲜石斗、鲜东斗《和汉药名汇》, 武康铜皮石斛《中国植物图鉴》, 黄草石斛、耳环石斛、枫斗、西枫斗、铜皮枫斗《中药大辞典》

地方名 小黄草(贵州、云南), 细黄草(广西、云南), 黄草(广西、四川), 金钗石斛(台湾、湖南); 浙江: 仙斗, 竹兰, 鲜斗, 铜皮石斛; 台湾: 金丝石斛, 接骨草; 湖北: 金石斛(光化); 湖南: 血斛竹, 金棍银脚; 广东: 小环钗, 环钗; 广西: 小石斛, 小金钗, 金钗草, 耳环草细草, 细环草, 环草, 吊兰, 鸡爪兰, 铜皮兰(桂林), 竹叶钗斛, 紫皮兰; 云南: 西风斗, 金耳环。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326106

*Dendrobium nobile* Lindl.

植物名 金钗石斛《本草衍义》、《药典》

药材名 石斛《本经》、《药典》

文献名 林兰《本经》, 禁生、杜兰、石薺《别录》, 千年润、金钗花《纲目》, 悬竹、千年竹《名实图考》, 黄草《药物出产辨》, 吊兰、雅斗、吊花、素雅斗《植物名汇》, 鲜金钗、鲜金石斛《和汉药名汇》, 石斛草、百丈须、长生草《新纲》, 石斗、扁斗、归金斗、广金钗、无芦金斗、木斗《药材学》, 鲜石斛《中药大辞典》, 石斛露《中国医学大辞典》

地方名 巨石斛(湖北、四川), 金石斛(浙江、云南), 吊兰花(四川、贵州、云南); 江苏: 川石斛(南京); 湖北: 金钗(神农架); 广西: 木斛, 金钗兰, 扁金钗, 扁钗石斛, 黄草兰, 扁茎石斛; 四川: 金钗草(成都), 趟水花、栽秧花、取丝花(峨眉山); 贵州: 扁草, 扁黄草, 中黄草。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。用于阴伤津亏, 口干烦渴, 食少干呕, 病后虚热, 目暗不明; 鲜茎熬糖液(石斛露): 养胃阴, 平胃逆, 除虚热, 安神志。

## 7326107

*Dendrobium tosaense* Makino

植物名 黄花石斛《台湾植志》

药材名 霍石斛《品种论述》

文献名 黄草、金钗石斛《品种论述》, 鲜石斛《药学报》

地方名 甘肃: 金石斛(武都); 台湾: 黄石斛。

功效 鲜茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326108

*Dendrobium williamsonii* Day et Reichb. f.

植物名 黑毛石斛《高植图鉴》

药材名 圆石斛《药学报》

地方名 广西: 毛石斛(凌云), 鸡爪兰(隆林); 贵州: 小黄草。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热; 全草: 用于风湿病。

## 7326109

*Dendrobium wilsonii* Rolfe --- *Dendrobium kwangtungense* Tso

植物名 广东石斛《高植图鉴》

药材名 环草石斛《品种论述》

文献名 石斛《本经》, 白花铜皮石斛《药材学》, 黄草石斛《中药大辞典》, 环草《药学报》, 金钗石斛、吊兰《简明中医辞典》, 圆石斛、黑毛石斛、广东钗斛《品种论述》

地方名 湖南: 黄草; 广东: 铜皮石斛; 广西: 纤细石斛, 铜皮兰(桂林), 紫皮兰(桂林)。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326110

*Diploprora championi* (Lindl.) Hook. f. --- *Stauroopsis championi* (Lindl.)

植物名 蛇舌兰《高植图鉴》

文献名 船唇兰《广西植录》

功效 全草: 用于跌打损伤。

## 7326111

*Ephemerantha bifida* (Ridley) Hunt et Summerh.

植物名 二裂金石斛《品种论述》

药材名 有瓜石斛(广西)、《品种论述》

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326112

*Ephemerantha comata* (Blume) Hunt et Summerh. ---

*Dendrobium fimbriata* (Blume) Hunt et Summerh.

植物名 流苏金石斛《高植图鉴》

药材名 有瓜木斛(台湾)

文献名 金石斛《原色和汉药图鉴》

地方名 海南: 有瓜石斛。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326113

*Ephemerantha lonchophylla* (Hook. f.) P. F. Hunt et Summerh.

植物名 戟叶金石斛《植分学报》

药材名 有瓜石斛(广西、贵州、云南)、《品种论述》

文献名 石斛草《药学报》, 戟叶石斛《南药学报》, 矛叶金石斛《品种论述》, 紫皮兰枫斗《中草药》, 金石斛《云南种录》

地方名 石斛(宁夏、新疆、江苏、上海、河南、广东、广西、四川); 安徽: 大黄草(霍山); 广西: 流苏金石斛(桂林); 贵州: 响铃草(册亨)。

功效 茎: 益胃生津, 滋阴清热。

## 7326114

*Epigeneium amplum* (Lindl.) Summerh.

植物名 宽叶厚唇兰《高植图鉴》

地方名 贵州: 果上叶。

功效 全草: 滋阴润燥, 止咳, 活血。用于喉炎, 咳嗽, 跌打损伤。

## 7326115

*Epigeneium fargesii* (Finet) Gagnep. --- *Liparis fargesii* Finet

植物名 单叶厚唇兰《高植图鉴》

药材名 石米《汇编》

文献名 小羊耳蒜《高植图鉴》，腊石斛《台湾兰科植物》

地方名 甘肃：小石枣子；湖北：米金钗、老鼠屎、石豆、瓜子金钗、瓜米还阳（神农架）；贵州：麦斛。

功效 全草：清热，润肺止咳。用于肺结核咳嗽，风热咳嗽，百日咳。

#### 7326116

*Epipactis helleborine* (L.) Crantz.

植物名 小花火烧兰《高植图鉴》

药材名 膀胱七《汇编》

地方名 陕西：〔龙胆草〕（山阳）；湖北：扫帚七（神农架）；贵州：鸡嗓子花、牛舌片；云南：野竹兰（昆明）。

功效 全株：补中益气，舒郁和中。用于腹泻，胃气不舒，日赤，肝胃不和，胸胁满闷。

#### 7326117

*Epipactis mairei* Schltr.

植物名 大叶火烧兰《高植图鉴》

药材名 兰竹参《云南药录》

文献名 小紫含笑、青竹兰《名实图考》，鸡嗓子花《汇编》，火烧兰《陕西中草药》

地方名 陕西：黑搜山虎、牌楼七、牌骨七（旬阳、白河）；湖北：散血丹（神农架）；四川：山烛花（峨眉山）；贵州：牛舌片；云南：小鸟纱。

功效 根、根茎：理气活血，祛瘀解毒。用于咳嗽，胸痛，疮疡肿毒，跌打损伤；全株：补中益气，舒郁和中。

#### 7326118

*Epipactis papillosa* Franch.

植物名 细毛火烧兰《中药大辞典》

药材名 鸡嗓子花《贵州草药》

文献名 牛舌片《中药大辞典》

功效 全草：补中益气，舒郁，和中。用于病后虚弱，吐泻，疝气。

#### 7326119

*Eria corneri* Reichb. f.

植物名 半柱毛兰《高植图鉴》

药材名 半柱毛兰《广西药录》

文献名 石上桃《广西植录》

地方名 台湾：黄绒兰；广西：石壁风（博白），老虎牙（阳朔），蜆蚌兰（昭平）；其他：方头兰（香港）。

功效 假鳞茎：清热解暑，润肺，消肿。用于小儿哮喘。外用于瘰癧，疮疡肿毒。

#### 7326120

*Eria graminifolia* Lindl.

植物名 禾叶毛兰《高植图鉴》

药材名 禾叶毛兰《汇编》

文献名 禾叶墨斛《西藏中草药》

功效 全草：滋阴，益胃，生津。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，胃酸缺乏。

#### 7326121

*Eria pannea* Lindl.

植物名 指叶毛兰《高植图鉴》

药材名 树葱《汇编》

文献名 毛兰《云南中草药选》

地方名 云南：“阿拢舌波”（红河），石葱（曲靖、文山），〔蜈蚣草〕（楚雄），岩葱（思茅），“罗多”（楚雄彝名）。

功效 全草：活血散瘀，解毒消肿。用于跌打损伤，骨折，痈疮疖肿，烧、烫伤，荨麻疹，药物中毒（水马桑、蕈类、一支蒿、草乌、断肠草、磷化锌等中毒）。

#### 7326122

*Galeola faberi* Rolfe

植物名 山珊瑚《高植图鉴》

药材名 珊瑚兰《峨眉药植资源》

地方名 四川：山海椒、公天麻（峨眉山）。

功效 全草：祛风除湿，利水通淋。

#### 7326123

*Galeola lindleyana* (Hook. f. et Thoms.) Reichb. f. --- *G. lindleyana* (Hook. f. et Thoms.) Reichb. f. var. *unicolor* Hand. -Mazz.

植物名 毛萼山珊瑚《高植图鉴》

文献名 毛萼珊瑚兰《峨眉药植资源》，毛萼山珊瑚兰（拉汉英种称），单色珊瑚兰《云南种录》

地方名 湖南：“获表”（瑶名）；四川：〔木通〕（峨眉）。

功效 全草：祛风除湿，利水通淋。用于风湿关节痛，偏正头痛。

#### 7326124

*Gastrochilus formosanus* (Hayata) Schltr.

植物名 台湾盆距兰《神农架药录》

药材名 蜈蚣还阳《神农架药录》

地方名 湖北：蜈蚣瓣子、蜈蚣金钗（神农架）。

功效 全草：清热生津，滋阴，养胃。

#### 7326125

*Gastrodia angusta* S. Chow et S. C. Chen

植物名 原天麻《云南植物研究》

备考 球茎：含镇静催眠的有效成分天麻素及其他酚性成分两种。

#### 7326126

*Gastrodia elata* Blume --- *Gastrodia mairei* Schltr.

植物名 天麻《高植图鉴》

药材名 天麻《雷公炮炙论》、《药典》

文献名 赤箭、鬼督邮、离母《本经》，神草《吴普本草》，独摇芝《抱朴子》，赤箭脂、定风草《药性论》，合离《酉阳杂俎》，天麻子《本草拾遗》，合离草、独摇《图经》，白龙皮、赤箭芝、还简子《纲目》，冲天麻《本草汇言》，明天麻《临证指南医案》，石箭、郅芝、离草、分离草、龙皮、御风草、都罗木、独摇草《新纲》，春麻、冬麻、荔枝天麻《华北药志》，老天麻、正西明天麻《和汉药标本目录》，赤天箭《高植图鉴》，滇东天麻《云南药录》，定风草根、川天麻、特麻、麻王、贡麻、杆麻、脚麻、西天麻、汉中天麻、什路天麻（湖北、贵州产）《药材学》

地方名 山上豆(东北),明麻(湖北、四川);吉林:“书扎海早恩”(朝名);河南:回龙子;湖北:赤麻;湖南:自动草;四川:天芋,马尿苕,名麻;贵州:山萝卜,鹦哥嘴;云南:木浦,水洋芋;西藏:“冬彭”(藏名);其他:仙人脚,红天麻(产区土名)。

功效 块茎:平肝息风止痉。用于头痛眩晕,肢体麻木,小儿惊风,癫痫抽搐,高血压,破伤风症。

## 7326127

*Gastrodia elata* Blume f. *glauca* S. Chow

植物名 乌天麻(云南、贵州)、《云南植物研究》

备考 球茎:含镇静催眠的有效成分天麻素及其他八种酚性成分,是驯化栽培的优良品种。

## 7326128

*Gastrodia elata* Blume f. *pallens* (Kitag.) Tuyama

植物名 白花天麻(东北药植志)

功效 块茎:平肝息风止痉。

## 7326129

*Gastrodia elata* Blume f. *viridis* Makino---*G. elata* Blume var. *viridis* Makino---*G. viridis* Makino

植物名 绿天麻(云南植物研究)

备考 本品为我国西南、东北驯化栽培之珍稀品种,常与乌天麻混生。

## 7326130

*Gastrodia tuberculata* F. Y. Liu et S. C. Chen

植物名 疣天麻(云南植物研究)

备考 球茎:含镇静催眠有效成分天麻素及其他四种酚性成分。

## 7326131

*Geodorum nutans* (Presl) Ames

植物名 地宝兰(高植图鉴)

药材名 地宝兰(广西药录)

地方名 广西:双管(田东),连罗(玉林)。

功效 块茎:外用于疮疖。

## 7326132

*Geodorum semicristatum* Lindl.

植物名 半冠状地宝兰(广西药录)

功效 块茎:用于跌打损伤,疮疖。

## 7326133

*Goodyera biflora* (Lindl.) Hook. f.---*G. macrantha* Maxim.

植物名 大花斑叶兰(高植图鉴)

文献名 二花斑叶兰(云南种录)

地方名 四川:花鹿含(峨眉山)。

功效 全草:润肺止咳,解毒消肿,活血止痛。

## 7326134

*Goodyera brachystegia* Hand.-Mazz.

植物名 短苞斑叶兰(云南种录)

药材名 双肾参(云南药录)

地方名 云南:岩蒜,〔石花〕。

功效 全草:舒筋活血,补中益气,补腰肾。用于跌打损伤,肾虚腰痛,头晕耳鸣,睾丸炎。

## 7326135

*Goodyera henryi* Rolfe

植物名 光萼斑叶兰(高植图鉴)

药材名 光萼斑叶兰(峨眉药植资源)

地方名 四川:花鹿含(峨眉山)。

功效 全草:清热解毒。用于蛇伤。

## 7326136

*Goodyera kwangtungensis* Tso

植物名 金边莲(广西药录)

文献名 广东斑叶兰(广西药录)

地方名 广东:金小莲(佛冈),金线风(清远)。

功效 全草:润肺化痰。用于肺结核病,肺热咳嗽。

## 7326137

*Goodyera procera* (Ker-Gawl.) Hook.

植物名 高斑叶兰(高植图鉴)

药材名 石凤丹(名实图考)、《汇编》

文献名 碎米兰(云南种录),大班叶兰(峨眉药植资源),高大斑叶兰(云南药录)

地方名 广西:观音竹(宁明),追风草(柳江);四川:兰花草(成都);云南:小芭蕉(红河)。

功效 全草:祛风除湿,止咳平喘。用于风湿骨痛,跌打损伤,气管炎,哮喘。

## 7326138

*Goodyera repens* (L.) R. Brown

植物名 小斑叶兰(高植图鉴)

药材名 小斑叶兰(汇编)

文献名 斑叶兰、斑叶兰根(贵州民间药物)

地方名 湖北:一枝香(神农架);四川:石风丹,蛇皮兰,小钓鱼竿

功效 全草:清热解毒,活血止痛,软坚散结。用于气管炎,关节疼痛,跌打损伤,瘰疬,痢疮疮疖。

## 7326139

*Goodyera schlechtendaliana* Reichb. f.---*G. secundiflora* Griff.---*G. melinostale* Schlecht.

植物名 大班叶兰(高植图鉴)

药材名 斑叶兰(汇编)

文献名 活鹿草、〔鹿衔草〕(植物名汇拾遗),〔石蚕〕(汇编),银丝盆(高植图鉴),偏花斑叶兰(海南植志)

地方名 小叶青(浙江、安徽、广西),野洋参(江西、贵州),银线莲(福建、湖南),蕲蛇药(浙江、安徽);浙江:小将军,小青,麻叶青,竹叶青,尖叶山蝴蝶,竹叶小青,肺角草;江西:〔滴水珠〕;湖南:一支红,〔肺形草〕;广西:小青菜(恭城),银耳环(上林),古铜钱,盘蛇莲;四川:乌云斑,银线盆、蛇皮兰(峨眉);贵州:九层盖(黎平),斑叶兰根;云南:石上藕。

功效 全草:清肺止咳,解毒消肿,活血止痛,软坚散结。用于肺结核、咳嗽、百日咳,支气管炎,瘰疬。外用于毒蛇咬伤,痢疮疮疖。

## 7326140

*Goodyera velutina* Maxim.

植物名 绒叶斑叶兰(高植图鉴)

药材名 绒叶斑叶兰(浙江药植志)

文献名 绒毛斑叶兰(云南种录),毡毛斑叶兰(广西

药录》

地方名 四川:金钱盘。

功效 全草:清肺止咳,补虚,软坚散结,活血止痛。

7326141

*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.

植物名 手参《高植图鉴》

药材名 手参《中药志》

文献名 虎掌参《纲目拾遗》,手掌参《东北药植志》,穗花羽蝶兰《中国植物图鉴》

地方名 手儿参(陕西、西南),佛手参(北京、甘肃、宁夏、西南),佛掌参(四川、云南),掌参(黑龙江、宁夏);吉林:阴阳草,“爱给逊”(朝名);内蒙古:“额日台坦-乃-嘎日”、“拉哈拉嘎”、“子大旺拉格”(蒙名);四川:“喔翁纳花”(藏名);西藏:“旺拉”、“旺拉曼巴”(藏名)。

功效 块根:滋养,生津,止血。用于久病体虚,肺虚咳嗽,失血,久泻,阳痿。

备考 我国藏族最早的医药书《四部医典》和《晶珠本草》对本品有载。

7326142

*Gymnadenia crassinervis* Finet

植物名 粗脉手参《中药志》

药材名 手掌参《东北药植志》

文献名 短距手参《植分学报》

功效 块根:滋养,生津,止血。用于久病体虚,肺虚咳嗽,失血,久泻,阳痿。

7326143

*Gymnadenia delavayi* Schltr.

植物名 滇手掌参《云南种录》

药材名 双肾参《云南药录》

文献名 德氏手兰《红河中草药》,鹅毛玉凤花《云南药录》

地方名 云南:老母鸡抱蛋,金鹅抱蛋,双环参,肾经草,二仙对座草,羊肾参,金刚如意草。

功效 块根:补肺肾,利尿。用于肾虚腰痛,病后体虚,肾虚阳痿,疝气痛,胃痛,肺结核,咳嗽,睾丸炎,尿路感染。

7326144

*Gymnadenia omeiensis* K. Y. Lang

植物名 峨眉手参《植分学报》

药材名 手掌参《四川峨眉》

功效 块根:补血,益气,生津止渴。

7326145

*Gymnadenia orchidis* Lindl.

植物名 西南手参《高植图鉴》

药材名 手掌参《四川峨眉》

地方名 四川:佛掌参《峨眉山》。

功效 块根:补血,益气,生津止渴。

7326146

*Habenaria buchneroides* Schlecht.

植物名 鬼箭玉凤花《云南种录》

文献名 狭穗鹭兰《汇编》,鬼箭状阔叶兰《云南药录》

地方名 云南:“倒杆草”(傣名)。

功效 块根:补虚,健胃益脾。用于体虚,小儿消化不良,腹泻,风湿关节痛。

7326147

*Habenaria ciliolaris* (L.) Kranzl.

植物名 毛萼玉凤花《高植图鉴》

药材名 毛萼玉凤花《湖南药物志》

文献名 丝裂玉凤花《广西药录》

地方名 台湾:玉峰兰;湖南:七天麻,肾经草;广西:宽鸡草(龙州);四川:竹青槐,双肾草(峨眉山);贵州:银兰;其他:隰毛兰(香港)。

功效 块根、全草:清热生津,滋阴补肾。用于肾虚遗精,肾炎,阳痿早泄,疮疥肿毒

7326148

*Habenaria davidii* Franch.

植物名 长距玉凤花《高植图鉴》

文献名 鸡肾草《峨眉药植资源》,长距鸭头兰《云南种录》

地方名 四川:双肾草(峨眉山);云南:对对参,鸡肾参,肾阳草。

功效 块根:壮腰补肾。

7326149

*Habenaria delavayi* Finet

植物名 厚瓣玉凤花《高植图鉴》

药材名 鸡肾参《滇南本草》、《汇编》

地方名 对对参(贵州、云南);云南:昆明三叶兰。

功效 块根:补肾益气。用于肾虚腰痛,肾炎,疝气、神经官能症。

7326150

*Habenaria densa* Wall.

植物名 鸡肾草《西藏中草》

地方名 湖北:鸡肾子、双仁、肾经草、腰子草(荆州)。

功效 全草:补肾壮阳。用于阳痿,疝气。

7326151

*Habenaria dentata* (Sw.) Schltr. --- *H. miersiana* Champ.

植物名 鹅毛玉凤花《高植图鉴》

药材名 双肾参《汇编》

文献名 鹅毛玉凤兰《浙江药植志》,齿片鹭兰、齿状玉凤花《广西药录》,玉凤花《种称》

地方名 浙江:吊阳草(龙泉);江西:天鹅抱蛋(南丰),玉凤花根;广西:鸡卵参(宁明);四川:白参草;贵州:山象牙;云南:对对参、白花草(昆明),老母鸡抱蛋,金鹅抱蛋,仙鹅抱蛋,双环参、肾经草、二仙对座草、羊肾参、金刚如意草、对肾参(红河),双黄参,对人参,双肾子。

功效 块根:补肺肾,利尿。用于肾虚腰痛,病后体虚,阳痿,疝气痛,胃痛,肺结核咳嗽,睾丸炎,尿路感染。

## 7326152

*Habenaria diphylla* Dalz.

- 植物名 二叶玉凤兰《民族药志》  
 文献名 二叶鹭兰《青藏药图》  
 地方名 青海：“汪拉曼巴”（藏名）。  
 功效 块根：大补元气，安神益智。用于阳痿不举。

## 7326153

*Habenaria fordii* Rolfe

- 植物名 长距阔蕊兰《云南种录》  
 文献名 长距玉凤花《广西药录》  
 地方名 广西：一根葱（凌云）。  
 功效 块根：用于小儿疳积。

## 7326154

*Habenaria glaucifolia* Bur. et Franch

- 植物名 粉叶玉凤花《高植图鉴》  
 文献名 双叶兰《高植图鉴》  
 地方名 四川：一窝油、双肾草（峨眉山）。  
 功效 块根：壮腰，补肾。

## 7326155

*Habenaria linguella* Lindl.

- 植物名 小舌玉凤花《海南植志》  
 药材名 坡参《广西药录》  
 文献名 线叶玉凤花《江苏植志》，玲姬玉凤花《云南种录》  
 地方名 广西：土沙参、猪儿参（南宁），山沙姜（宜山），山坡参；四川：大贝母（峨眉山）。  
 功效 块茎：滋阴润燥，强筋壮骨。用于阳痿，劳伤腰痛，疝气，肺热咳嗽，无名肿毒

## 7326156

*Habenaria rhodocheila* Hance

- 植物名 橙黄玉凤花《高植图鉴》  
 药材名 南充鸡肾草（拟）  
 文献名 红玉凤花《广西植录》，红唇玉凤花《海南植志》  
 地方名 广西：双春兰，飞花羊（全州），鸡母虫药（容县）；四川：鸡肾草（南充、峨眉山）。  
 功效 块根：用于指头疮；全草：补肾壮阳，纳气止喘。用于阳痿早泄，肾虚喘咳，疝气腹痛。

## 7326157

*Habenaria tentaculata* Reichb. f.

- 植物名 触须玉凤花《广西药录》  
 药材名 鸡卵草《汇编》  
 文献名 卷须玉凤花《广西药录》  
 地方名 广西：鸡卵参。  
 功效 块根：止痛，消炎，生肌，止血，行气，补肾。

## 7326158

*Habenaria viridiflora* (Sw.) R. Br. var. *dalzellii* Hook. f.

- 植物名 长距绿花玉凤花《广西药录》  
 地方名 广西：一支枪（临桂）。  
 功效 全草：散毒。用于疮疖。

## 7326159

*Hemipilia flabellata* Bur. et Franch.

- 植物名 扇唇舌喙兰《高植图鉴》  
 药材名 独叶一枝花《滇南本草》、《中药大辞典》  
 文献名 单肾草《汇编》，扇叶舌喙兰《云南药录》  
 地方名 甘肃：〔一支箭〕（文县），无柄叶兰（武都）；湖北：鸡蛋参（神农架）；四川：鸡肾参、独叶参、一面锣（木里、盐源）；贵州：雨流星草，肾子草；云南：无柄一叶兰（昆明），牛胆参、独叶一枝花（丽江），老母鸡抱蛋（玉溪），独叶子（红河）。

功效 全草：滋阴润肺，补虚益损。用于肺燥咳、吐腥痰，虚热，疝气，肾虚腰痛，小便脓血。外用于中耳炎，外伤出血。

## 7326160

*Hemipilia henryi* Rolfe

- 植物名 裂唇舌喙兰《高植图鉴》  
 药材名 落地还阳《神农架药录》  
 功效 块茎：活血散瘀，止痛，补虚。

## 7326161

*Hemipilia limprichtii* Schltr. ex Limpr.

- 植物名 短距舌喙兰《高植图鉴》  
 地方名 贵州：肾子草。  
 功效 全草：滋阴润肺，补虚益损。用于肺热咳嗽，肾虚腰痛，疝气，阴虚盗汗，神衰，癆咳。

## 7326162

*Herminium bulleyi* (Rolfe) Tang et Wang

- 植物名 条叶角盘兰《高植图鉴》  
 地方名 湖南：奔猪觅（蓝山县瑶名）。  
 功效 全草：用于腰膝酸痛，阳痿遗精。

## 7326163

*Herminium lanceum* (Thunb.) Vuijk --- *H. angustifolium* var. *longicruris* Makino --- *H. longicruris* (C. H. Wright) Tang et Wang

- 植物名 叉唇角盘兰《高植图鉴》  
 药材名 双肾草《湖北中草药志》  
 文献名 狭叶角盘兰《南充中草》，长茎角盘兰《峨眉药植研究》

地方名 湖北：腰子草，肾囊草，秤砣草。  
 功效 全草：补肾壮阳，理气止带。用于阳痿，遗精，睾丸肿痛，小腹痛，白浊，白带，小儿遗尿等症。

## 7326164

*Herminium monorchis* (L.) R. Br.

- 植物名 角盘兰《高植图鉴》  
 药材名 角盘兰《汇编》  
 地方名 陕西：〔开口箭〕（镇坪），人参果、人头七（秦岭）。

功效 带根全草：滋阴补肾，养胃，调经。用于神经衰弱，头晕失眠，烦躁口渴，食欲不振，须发早白，月经不调。

## 7326165

*Holcoglossum quasipinifolium* (Hayata) Schltr.

- 植物名 多序槽舌兰《峨眉药植研究》

地方名 四川:叶绿冬青(峨眉山)。  
功效 全草:祛风除湿,利尿。用于关节痛。

## 7326165a

*Ischnogyne mandarinanum* (Kranzl.) Schltr.

植物名 瘦房兰《高植图鉴》  
药材名 瘦房兰(神农架药录)  
地方名 湖北:赶山鞭(神农架)。  
功效 全草:滋阴清热,养胃生津。

## 7326166

*Liparis bootanensis* Griff. --- *L. plicata* Franch. et Sav.

植物名 镰翅羊耳蒜《高植图鉴》  
药材名 九莲灯《广西药录》  
文献名 一叶羊耳兰《云南种录》  
地方名 台湾:折叠羊耳兰;湖南:石山桃(瑶名);广西:石虾,石莲草(北流),石胡芦(贺县),退弹草(河池),石梅,石杨梅,石仙桃,七仙桃,鬼子头,穿线草,疳肿药,烂疮草,老鼠抱羊;四川:一匹草、石海椒、新书儿(峨眉山)。

功效 全草:清凉解毒。用于淋浊,肺结核,瘰癧,小儿疳积,腹泻,疮疡肿毒,跌打损伤。

## 7326167

*Liparis distans* C. B. Clarke

植物名 云南羊耳蒜《高植图鉴》  
文献名 大花羊耳蒜《云南种录》,云南羊耳兰《广西植录》  
地方名 台湾:虎石头;广西:石泥鳅(贵县),虾仔兰(大新),草斛(桂平)。  
功效 全草:用于肺炎,肺热咳嗽,解酒毒。

## 7326168

*Liparis dunzii* Rolfe --- *Liparis cucullata* Chien

植物名 大唇羊耳蒜《高植图鉴》  
文献名 大唇羊耳兰《浙江药植志》,风帽羊耳兰《中药大辞典》  
地方名 浙江:双叶金枪。  
功效 全草:凉血止血,清热解毒。

## 7326169

*Liparis japonica* (Miq.) Maxim.

植物名 羊耳蒜《高植图鉴》  
药材名 羊耳蒜《陕西中草药》  
地方名 黑龙江:〔灵芝草〕(尚志);陕西:借母怀胎(镇坪),鸡心七(旬阳),算盘七(太白),见风煽(凤县),珍珠七(柞水);湖北:金扣子(神农架)。  
功效 带假鳞茎的全草:活血调经,止血止痛,强心,镇静。用于崩漏,白带,产后腹痛,外伤。

## 7326170

*Liparis macrantha* Rolfe

植物名 紫花羊耳蒜《广西药录》  
地方名 广西:石裂风(乐业)。  
功效 全草:用于风湿痹痛,皮炎。

## 7326171

*Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl. --- *Liparis odorata* (Willd.) Lindl. --- *Bletia bicallosa* D. Don

植物名 见血清《云南种录》

药材名 见血清《汇编》

文献名 羊耳蒜《名实图考》,见血青、香花羊耳蒜《高植图鉴》,野猪胆草、见血莲、铁爬树、羊耳兰《汇编》,脉羊耳兰《中药大辞典》,香羊耳兰、紫星羊耳蒜《云南种录》

地方名 浙江:岩芋(龙泉);广东:马料草,山葱,白石笋,野猪胆(惠阳);广西:石虾公(博白),半边兰(南宁);四川:黑兰、矮胖儿(南川),肉螃蟹,铁耙梳,矮儿胖,立地好(成都);贵州:肉龙箭,走子草,倒岩提;云南:二仙桃(景洪),绿叶绿花。

功效 全草:清热,凉血,止血,泻火,消肿止痛。用于肺热咯血,吐血,血崩。外用于创伤出血,疮疖肿毒。

备考 《云南种录》(1984)植名原称“见血青”,而《植分学报》称“见血清”据清血热等功效,以统一用“见血清”之名为宜。

## 7326172

*Liparis olivacea* Lindl.

植物名 倒苞羊耳蒜《高植图鉴》  
药材名 倒苞羊耳蒜《峨眉药植研究》  
功效 全草:清热解毒,收敛止带。

## 7326173

*Liparis petiolata* (D. Don) Hunt et Summerh.

植物名 柄叶羊耳蒜《高植图鉴》  
药材名 柄叶羊耳蒜《广西药录》  
功效 全草:润肺。

## 7326174

*Liparis pleistantha* Schltr.

植物名 聚花羊耳蒜《云南种录》  
药材名 二仙桃《云南药录》  
地方名 云南:羊耳蒜(景洪)。  
功效 假鳞茎:用于疝气。

## 7326175

*Liparis stricklandiana* Rehb. f. --- *L. maleiformis* W. W. Sm.

植物名 扇唇羊耳蒜《高植图鉴》  
文献名 青毛帚羊耳兰《云南种录》,绿花羊耳兰《广西植录》  
地方名 广西:连珠兰(龙州)。  
功效 全株:去腐生新。

## 7326176

*Liparis tschangii* Schltr.

植物名 滇羊耳蒜《云南种录》  
药材名 滇藏羊耳蒜(拟)  
文献名 西藏羊耳兰《汇编》  
功效 假鳞茎:活血,止血。用于崩漏,月经过多。

## 7326177

*Liparis viridiflora* (Blume) Lindl.

植物名 长茎羊耳蒜《高植图鉴》  
药材名 长茎羊耳蒜《贵州药录》  
文献名 长柄羊耳兰《广西植录》,长茎羊耳兰、长脚羊耳兰《云南种录》

地方名 广西:石蒜头(容县);贵州:羊耳蒜。

功效 带假鳞茎全草:清热解毒,活血调经。用于血崩,白带,月经不调,风湿肿痛,劳伤,疝气,无名肿毒。

## 7326178

*Listera grandiflora* Rolfe

植物名 大花对叶兰《高植图鉴》

药材名 大花对叶兰《贵州药录》

地方名 湖北:小叶对口狮子草(神农架);贵州:对叶兰。

功效 全草:补肾滋阴,化痰止咳。用于阴虚,多汗,咳嗽。

## 7326179

*Ludisia discolor* (Ker-Gawl.) A. Rich. --- *Haemaria discolor* (Ker-Gawl.) Lindl. --- *Goodyera discolor* Ker-Gawl.

植物名 血叶兰《高植图鉴》

药材名 石上藕《汇编》

地方名 广东:真金草,石面莲;其他:[草石蚕],[石蚕](香港)。

功效 全草:滋阴润肺,清热凉血。用于肺结核咯血,神经衰弱。

## 7326180

*Luisia hancockii* Rolfe

植物名 纤叶钗子股《高植图鉴》

药材名 纤叶钗子股《浙江药植志》

文献名 钗子股《汇编》

地方名 浙江:岩吊兰(天台、乐清),树兰、寄生兰(温州),鹿角草、吊竹(乐清),樟兰(宁波),岩香,牛角树,牛角兰。

功效 全草:散风祛痰,解毒消肿。用于风湿性关节炎,胸胁受伤,痈肿,喉头炎。

## 7326181

*Luisia morsei* Rolfe

植物名 钗子股《高植图鉴》

药材名 钗子股《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 金钗股、三十根《本草拾遗》,虫寄生、松寄生、海斑虎《质问本草》,[龙须草]《实用中草药》

地方名 福建:檀香线,锡腊草,碑竹(闽东);广西:肖羊耳兰,圆柱兰,大羊角(龙州),金环草(乐业),老鼠尾(东兰);贵州:追风草,绿姜。

功效 根或全草:催吐解毒,祛风利湿。用于疟疾,痢疾,风湿痹痛,水肿,小儿麻疹症,疮疖。

## 7326182

*Malaxis monophyllos* (L.) Sw. --- *Microstylis monophyllos* Lindl.

植物名 沼兰《高植图鉴》

药材名 沼兰《峨眉药植资源》

文献名 小柱兰、一叶兰《高植图鉴》

地方名 四川:两片一条枪(峨眉山)。

功效 全草:补肾壮阳。

## 7326183

*Malaxis yunnanensis* (Schltr.) Tang et Wang --- *Microstylis yunnanensis* Schltr.

植物名 云南沼兰《高植图鉴》

文献名 沼兰《峨眉药植研究》

地方名 湖北:露天珠、金扣(神农架);四川:二片一条枪(峨眉山)。

功效 全草:利尿,解毒;块茎:活血祛瘀,消肿止痛。

## 7326184

*Neofinetia falcata* (Thunb.) H. H. Hu --- *Angraecum falcatum* Lindl.

植物名 风兰《植分学报》

药材名 风兰《花镜》

文献名 象牙草《汇编》

地方名 湖北:新风兰。

功效 全草:补肾虚。

## 7326185

*Neottia camtschatea* (L.) Rehb. f.

植物名 堪察加鸟巢兰《北京植志》

功效 根茎:清热。

## 7326186

*Neottianthe cucullata* (L.) Schltr. --- *Gymnadenia cucullata* (L.) Rich.

植物名 二叶兜被兰《高植图鉴》

药材名 百步还阳丹《陕西中草药》

文献名 鸟巢兰《陕西中草药》,兜被兰《中药大辞典》,[佛手参]《中药通报》

功效 带根全草:强心兴奋,活血散瘀。用于外伤性昏迷,跌打损伤,骨折。

## 7326187

*Nervilia aragoana* Gaud.

植物名 芋兰《高植图鉴》

药材名 白铃子《汇编》

文献名 一面锣、小一面锣《汇编》

功效 块茎:用于红崩,淋病,白浊,白带。

## 7326188

*Nervilia fordii* (Hance) Schltr.

植物名 毛唇芋兰《高植图鉴》

药材名 青天葵《岭南采药录》、《汇编》

文献名 芋兰《广西药录》,独脚天葵《品种论述》

地方名 广东:青莲;广西:入地珍珠(昭平),假天麻(天等),独叶莲(陆川),[独脚莲](南宁),马蹄草,天葵,珍珠叶,珍珠草,水肿药;云南:坠千金、铁帽子、山米子(思茅),小胖药、提心吊胆、半边伞(红河)。

功效 全草或块茎:清肺止咳,镇静止痛,清热解毒,散瘀消肿。用于肺结核咳嗽咯血,支气管炎,小儿疳积,小儿肺炎,精神病,跌打肿痛,口腔炎,急性咽喉炎,疮毒。

## 7326189

*Nervilia plicata* (Andr.) Schltr.

植物名 毛叶芋兰《高植图鉴》

药材名 毛叶青天葵(拟)



文献名 芋兰《峨眉药植研究》  
地方名 广东:紫背天葵,红天葵;广西:红毛天葵(来宾);四川:小一面锣(峨眉山),背天葵。

功效 全草或块茎:清肺止咳,镇静止痛,清热解毒,散瘀消肿。

## 7326190

*Oberonia caulescens* Lindl.

植物名 狭叶鳶尾兰《高植图鉴》

药材名 石葱《汇编》

文献名 滇莪白兰《汇编》

功效 全草:清热解毒,散瘀止血。

## 7326191

*Oberonia iridifolia* (Roxb.) Lindl.

植物名 鳶尾兰《云南种录》

文献名 鳶尾扁竹兰《汇编》,鳶尾叶莪白兰《云南药录》

地方名 云南:树扁竹(思茅),树竹、老鼠尾巴草、石扁兰、野扁竹(红河),老鼠尾。

功效 全草:健脾利湿,活血通络,理气消食,清热利尿,止咳止痛。用于消化不良,胃痛,肠炎,尿路感染,咳嗽,支气管炎,哮喘,跌打损伤,骨折,毒蛇咬伤。

## 7326192

*Oberonia myosurus* (Forst. f.) Lindl.

植物名 棒叶鳶尾兰《高植图鉴》

药材名 岩葱《云南中草药》

文献名 鼠尾莪白兰《汇编》

地方名 云南:树葱(红河),石葱(玉溪、红河)。

功效 全草:解毒,清热,接骨。用于锌、野荸荠、菌子、野皂角等中毒,肺炎,支气管炎,尿路感染,中耳炎,骨折,外伤出血,疮痍,疯狗咬伤。

## 7326193

*Odontochilus yunnanensis* Rolfe

植物名 云南齿唇兰《高植图鉴》

药材名 竹叶还阳(湖北)

功效 全草:用于白带淋症,小儿惊风,蛇咬伤。

## 7326194

*Orchis chusua* D. Don

植物名 广布红门兰《高植图鉴》

药材名 珍珠参《云南药录》

文献名 红门兰《云南种录》,库莎红门兰《秦岭植志》,高山红门兰《云南药录》

地方名 四川:肾子草(峨眉山)。

功效 全草:补肾,益气。用于白浊。

## 7326195

*Orchis latifolia* L. --- *Orchis salina* Turcz. ex Lindl.

植物名 宽叶红门兰《高植图鉴》

药材名 红门兰《内蒙古中草药》

文献名 蒙古红门兰《中药大辞典》

地方名 内蒙古:“额日合坦-乃-呼勒”(蒙名);四川:鸡爪参。

功效 全草:强心,补肾,生津,健脾胃。用于烦躁口渴,不思饮食,月经不调,虚癆贫血,头晕,眼花。

## 7326196

*Orchis latifolia* L. var. *angustata* Maxim.

植物名 草甸红门兰《青藏药图》

地方名 青海:“汪拉”(藏名),手参。

功效 块根:补脑壮阳。用于阳痿,遗精。

## 7326197

*Oreorchis fargesii* Finet --- *O. intermedia* Chien

植物名 长叶山兰《高植图鉴》

药材名 葱头七《神农架药录》

功效 根茎:活血祛瘀,消肿止痛。

## 7326198

*Oreorchis foliosa* (Lindl.) Lindl.

植物名 小山兰《高植图鉴》

药材名 独叶山兰《汇编》

文献名 连珠白芨《云南种录》

地方名 西藏:小白及。

功效 假球茎:有小毒。清热解毒,消肿散结;叶:用于乳痈,便毒;花:用于小便血淋涩痛。

## 7326199

*Oreorchis patens* (Lindl.) Lindl.

植物名 山兰《高植图鉴》

药材名 山兰《中药志》

文献名 唇花山兰《云南种录》,冰球子《汇编》

地方名 四川:山慈姑(峨眉山)。

功效 假鳞茎:有小毒。解毒行瘀,杀虫消痈。用于痈疽疮肿,瘰癧,无名肿毒。

## 7326200

*Paphiopedilum barbigerrum* Tang et Wang

植物名 兜兰《广西药录》

地方名 广西:龙头兰(容县)。

功效 全草:用于疮疖。

备考 《云南种录》(1984)“兜兰”的学名为 *Paphiopedilum parishii* (Reichb. f.) Pfitz.

## 7326201

*Paphiopedilum concolor* (Par. et Batem.) Pfitzer

植物名 黄花兜兰《植分学报》

药材名 巴掌草(广西)

文献名 同色兜兰《广西药录》

地方名 广西:老虎须(南宁),狗舌草(马山),狮子尾(武鸣),红草鞋,狮子利。

功效 全草:止咳平喘,祛风止痛,解毒消肿。用于肺结核咳血,支气管炎,哮喘,风湿骨痛,类风湿关节炎,慢性胃痛,肠胃炎,脾肿大,避孕,毒蛇咬伤。

## 7326202

*Paphiopedilum dianthum* Tang et Wang

植物名 长瓣兜兰《高植图鉴》

文献名 双花兜兰《广西植录》

地方名 广西:红兜兰,斗省草。

功效 全草:用于肝脾肿大。

## 7326203

*Paphiopedilum parishii* (Reichb. f.) Pfitz.

植物名 兜兰《云南种录》

药材名 兜兰《云南药录》

地方名 云南:斑叶兰,花叶子,千灵丹、巴掌草、花叶鹿含草(红河)。

功效 全草:清热解毒,养心安神。用于麻疹,肺炎,神经衰弱。

#### 7326204

*Pecteilis susannae* (L.) Raf. --- *Orchis susannae* L.

植物名 龙头兰《高植图鉴》

药材名 白蝶花《名实图考》、《汇编》

文献名 鹅毛白蝶花《海南植志》,鹅毛玉凤花《广西药录》,白蝶兰《拉汉英种称》

地方名 广西:土玉竹(南宁),鸡卵参(上林);贵州:走肾草;云南:和气草、兔耳草(昆明),双合参,双肾草,白花参。

功效 全株、根:补肾壮阳,健脾。用于肾虚腰痛,慢性肾炎,睾丸炎,脾胃虚弱。

#### 7326205

*Peristylus densus* (Lindl.) Santap. et Kapad.

植物名 狭穗阔蕊兰《广西药录》

地方名 广西:土天麻(兴安)。

功效 块茎:用于头晕目眩。

#### 7326206

*Peristylus goodyeroides* (D. Don) Lindl. --- *Habenaria goodyeroides* D. Don

植物名 绿花阔蕊兰《高植图鉴》

文献名 斑叶阔蕊兰《云南种录》,斑叶玉凤花《广西植录》,斑叶玉凤兰《广西药录》

地方名 广西:山砂姜(罗城),珍珠草;其他:黄花阔蕊兰(香港)。

功效 块茎:解毒消肿。

#### 7326207

*Peristylus sampsonii* Hance --- *Habenaria sampsonii* Hance

植物名 小花阔蕊兰《高植图鉴》

地方名 四川:鸡肾草(峨眉山),小盘龙参。

功效 块茎:补肾壮阳,活血。

#### 7326208

*Perularia wangshanensis* Chien

植物名 黄山竹叶兰《云南植物研究》

功效 全草:逐水渗湿,芳香化浊。

#### 7326209

*Phaius flavus* (Blume) Lindl. --- *Phaius woodfordii* (Hook.) Merr.

植物名 斑叶鹤顶兰《高植图鉴》

文献名 小花鹤顶兰《海南植志》

地方名 四川:九子莲(峨眉山)。

功效 假鳞茎:解毒,收敛,生肌,消瘰癧。

#### 7326210

*Phaius tankervilleae* (Aiton) Blume --- *Limodorum tankervilleae* Ait. --- *Phaius grandifolius* Lour. --- *Phaius wallichii* Lindl.

植物名 鹤顶兰《高植图鉴》

药材名 鹤顶兰《广西本草选编》

地方名 广西:大白及(南宁),拐子药(贺县)。

功效 假鳞茎:有小毒。祛痰止咳,活血止血。用于咳嗽多痰,咳血,跌打肿痛,乳腺炎,外伤出血。

#### 7326211

*Phalaenopsis chinensis* Lindl. var. *cylindracea* Tang et Wang

植物名 圆柱石仙桃《云南种录》

文献名 柱茎石仙桃《广西植录》

功效 假鳞茎或全草:清热养阴,化痰止咳。外用于慢性骨髓炎。

#### 7326212

*Phalaenopsis wilsonii* Rolfe

植物名 蝶兰《高植图鉴》

药材名 蝶兰《广西药录》

文献名 华西蝶兰《广西植录》

地方名 广西:金环草(隆林)。

功效 全草:用于头痛,感冒发热,小儿疳积。

#### 7326213

*Pholidota articulata* Lindl.

植物名 节茎石仙桃《植分学报》

药材名 石上仙桃《彝药志》

地方名 云南:“飞都鲁列耳”(彝名),石楞腿,石莲。

功效 全草:养阴,清肺,利湿,消痰。用于月经不调,子宫脱垂,肺虚咳嗽。外用于骨髓炎。

#### 7326214

*Pholidota cantoniensis* Rolfe

植物名 细叶石仙桃《高植图鉴》

药材名 细叶石仙桃《浙江药植志》

文献名 小石仙桃《广西植录》,广东石仙桃《浙南本草新编》

地方名 浙江:双叶岩珠(乐清),岩珠(温州);广西:果上叶(三江)。

功效 假鳞茎及全草:清热,滋阴,润肺,解毒。用于感冒,肺热咳嗽,咳血,急性胃肠炎,慢性骨髓炎,关节肿痛,跌打损伤。

#### 7326215

*Pholidota chinensis* Lindl.

植物名 石仙桃《高植图鉴》

药材名 石仙桃《生草药性备要》、《汇编》

文献名 石山桃《植物名汇》

地方名 大吊兰、上石仙桃、石上莲(湖南、广东、广西),浮石斛(湖南、广西),果上叶(湖南、云南),石橄榄(福建、湖南、广东、广西),上石虾、蚂拐爪(广东、广西);福建:石莼肉(福安),麦斛三(周宁),箴兰(周宁、泉州);湖南:川甲草,马榴根;广东:大号石橄榄(潮阳),双叶石橄榄、薄叶石橄榄(潮安),弓颈葫芦,细颈葫芦,石吊兰,石灵;广西:石川盘(玉林),上树蛤蟆(凌云),石槟榔(北流),上石蒜,石山莲,石穿盘;四川:石枣子(南充);云南:千年矮、小扣子兰(文山),石果、石柱、石芭蕉、叶下果、树白芨(红河),石草果;其他:石上仙桃,石莲。

功效 假鳞茎或全草:清热养阴,化痰止咳。用于

肺热咳嗽,肺结核咳血,淋巴结核,小儿疳积,胃、十二指肠溃疡。外用于慢性骨髓炎。

备考 河南等地已发现调入之石斛,有以本品之假鳞茎冒充者,应注意鉴别。

## 7326216

*Pholidota yunnanensis* Rolfe

植物名 云南石仙桃《高植图鉴》

药材名 石枣子《汇编》

文献名 滇石仙桃《中药大辞典》,石风子、石海椒《高植图鉴》,马鞭兰《广西植录》

地方名 [有瓜石斛](江西、贵州), [石斛](吉林、山西、河南), 果上叶(湖南、云南); 湖北: 鸦雀还阳、六角分筋(神农架); 湖南: 子土叶, 石仙桃; 四川: 石豆兰, 石灵芝, 石爪, 石球花; 贵州: 小瓜石斛, 响铃草; 云南: 石草果, 鸦雀咀。

功效 假鳞茎: 有小毒。祛风除湿, 养阴润肺。用于肺热咳嗽, 痰中带血, 消化不良, 腹痛, 疮疮肿毒, 风湿疼痛。

## 7326217

*Platanthera chlorantha* Cust. ex Reichb.

植物名 二叶舌唇兰《高植图鉴》

地方名 四川: 蛇儿参(峨眉山); 西藏: 土白芨。

功效 块茎: 补肺生肌, 化痰止血。用于肺癆咳血, 吐血, 衄血。外用创伤, 痈肿, 烫伤。

## 7326218

*Platanthera henryi* (Rolfe) Rolfe

植物名 亨氏舌唇兰《云南种录》

药材名 石球花《峨眉药植资源》

功效 全草: 活血, 止血, 解毒。

## 7326219

*Platanthera japonica* (Thunb.) Lindl. --- *Habenaria omeiensis* Rolfe

植物名 舌唇兰《高植图鉴》

药材名 骑马参《汇编》

文献名 观音竹《名实图考》, 长距兰《峨眉药植》, 日本长距兰《峨眉药植资源》, 峨眉玉凤花《峨眉药植研究》, 阔叶长距兰《浙江药植志》

地方名 陕西: [水麦冬](秦岭), 龙爪参; 浙江: 普陀参(岱山); 湖北: 蛤麻参(神农架); 四川: 鸡儿草, 蛇儿参、鸡肾草(峨眉山); 贵州: 走肾草; 其他: 鸭肾子。

功效 带根全草: 益气润肺, 祛痰止咳。用于肺热咳嗽, 喘咳, 阳痿。

## 7326220

*Platanthera mandarinorum* Rehb. f.

植物名 尾瓣舌唇兰《高植图鉴》

文献名 长白长距兰《长白山植药志》

地方名 贵州: 双肾草。

功效 全草: 理气止痛, 补肾止咳。用于热咳, 遗尿。

备考 据国外文献报道: 块茎有解痉、发汗、利尿、降压作用, 作流产、避孕用, 并用于神经、精神障碍。幼小块根: 用于阳痿。种子: 用于癫痫。

## 7326221

*Platanthera minor* (Miq.) Reichb. f.

植物名 小舌唇兰《高植图鉴》

文献名 观音竹《名实图考》, 小长距兰《四川中药志》, 窄叶长距兰《云南种录》

地方名 湖南: “花绞龙”(侗语), 龙头花(通道); 四川: 竹叶参、鸭肾子、鸭肾草(峨眉), 土洋参, 大一枝箭, 蛇蓼子, 猪獠参; 贵州: 肾子草, 走肾草。

功效 全草或带根全草: 养阴润肺, 益气生津。用于咳嗽带血, 咽喉肿痛, 病后体弱, 神经衰弱, 遗精, 肾虚腰痛, 头晕。

## 7326222

*Platanthera stenostachya* Lindl. --- *Habenaria stenostachya* (Lindl.) Benth.

植物名 狭穗舌唇兰《云南种录》

文献名 狭穗玉凤花《中药大辞典》, 狭穗鸢兰《思茅中草药》, 长距阔蕊兰《云南种录》

地方名 云南: 倒杆樟(傣名)。

功效 块茎: 补虚, 健胃, 益脾。用于营养不良, 体虚, 小儿消化不良, 腹泻, 风湿性关节炎。

## 7326223

*Pleione bulbocodioides* (Franch.) Rolfe --- *P. pogonoides* Rolfe --- *P. delavayi* (Rolfe) Rolfe --- *P. henryi* Schlecht.

植物名 独蒜兰《高植图鉴》

药材名 山慈姑《本草拾遗》、《药典》

文献名 山慈姑叶《证类本草》, 山慈姑花《纲目》, 瓶状独蒜兰《汇编》, 朱兰独蒜兰《陕西中草药》, 朱兰状独蒜兰《秦岭植志》, 大独蒜兰《中药材科技》

地方名 冰球子、泥冰子、毛慈姑、茅慈姑(西南); 陕西: 千年棕、桃子金(平利), 石仙桃(眉县); 浙江: 一粒珠(桐庐), 石龙珠(金华), 岩寿桃(温州), 野白及(德清), 岩慈姑; 湖北: 活血珠(神农架); 湖南: 土贝母, 扣子七; 贵州: 光慈姑; 其他: 茅菰, 珍珠七。

功效 假鳞茎: 清热解毒, 化痰散结。用于痈肿疔毒, 瘰癧痰核, 淋巴结核。蛇虫咬伤; 叶: 用于乳痈; 花: 用于尿血, 淋涩痛。

## 7326224

*Pleione grandiflora* Rolfe

植物名 大花独蒜兰《云南种录》

药材名 大花独蒜兰《汇编》

功效 假鳞茎: 有小毒。清热解毒, 消肿散结。

## 7326225

*Pleione hookeriana* (Lindl.) O. Kuntze

植物名 毛唇独蒜兰《高植图鉴》

药材名 南独蒜兰《汇编》

文献名 山慈姑《鉴别手册》

功效 假鳞茎: 有小毒。清热解毒, 消肿散结。

## 7326226

*Pleione scopulorum* W. W. Smith

植物名 二叶独蒜兰《高植图鉴》

药材名 岩石独蒜兰《汇编》

功效 假鳞茎: 有小毒。清热解毒, 消肿散结。

## 7326227

*Pleione yunnanensis* (Rolfe) Rolfe

植物名 云南独蒜兰《高植图鉴》

药材名 山慈菇《药典》

文献名 独叶白芨《云南药录》, 山慈姑、茅慈姑、泥宾子《汇编》, 滇独蒜兰《滇南本草》整理本

地方名 毛慈姑(吉林、辽宁、内蒙古、北京、河北、浙江、上海、江苏、湖北); 贵州: 独菇, 冰球子, 独蒜; 云南: 小白芨(玉溪), [白芨](昆明、东川), 蒜白及(昆明), “资糯区”(楚雄彝名), 黑妈七, 糯白芨。

功效 假鳞茎: 清热解毒, 化痰散结。用于痈肿疔毒, 瘰癧痰核, 淋巴结结核, 蛇虫咬伤。

## 7326228

*Pogonia japonica* Reichb. f.

植物名 朱兰《植分子学报》

药材名 朱兰《广西药录》

地方名 广西: 斩龙剑(全州); 贵州: 双肾草; 云南: 毛朱兰。

功效 全草: 清热解毒。用于无名肿毒, 毒蛇咬伤。

## 7326229

*Renanthera coccinea* Lour.

植物名 火焰兰《高植图鉴》

药材名 火焰兰《广西药录》

地方名 广西: 红珊瑚(扶绥)。

功效 全草: 祛湿毒。用于风湿痹痛, 疮疖。

## 7326230

*Robiquetia succisa* (Lindl.) Tang et Wang

植物名 小叶寄树兰《高植图鉴》

药材名 小叶寄树兰《广西药录》

功效 叶: 止咳润肺。用于肺燥咳嗽。

## 7326231

*Sarcanthus cerinus* (Hance) Rolfe --- *Cleisostoma cerinus* Hance

植物名 隔距兰《广西植录》

功效 全草: 消毒, 接骨。用于跌打, 内伤, 疮疖。

## 7326232

*Sarcanthus elongatus* Lindl.

植物名 长隔距兰《广西本草选编》

文献名 圆叶蜂兰《广西植录》

地方名 广西: 马尾吊兰, 吊兰, 圆叶吊兰, 木不角, 龙角草, 光棍草, 鹿角草, 钗斛。

功效 全草: 舒筋活络, 祛痰止咳。用于乙脑, 小儿麻痹后遗症, 中风瘫痪, 肺结核, 小儿疳积。

## 7326233

*Sarcocylus difformis* (Wall. ex Lindl.) Tang et Wang

植物名 异形狭唇兰《广西植录》

文献名 异型狭唇兰《广西药录》

地方名 广西: 土环草(田阳)。

功效 全草: 用于风湿痹痛, 肺结核。

## 7326234

*Satyrium ciliatum* Lindl.

植物名 缘毛鸟足兰《高植图鉴》

地方名 广西: 假天麻(资源); 贵州: 壮精丹。

功效 块根: 温肾回阴, 壮阳, 缩尿。用于遗尿, 阳痿, 头昏目眩。

## 7326235

*Satyrium nepalense* D. Don --- *S. henryi* Schlecht.

植物名 长距鸟足兰《高植图鉴》

药材名 对对参《云南中草药》

文献名 滇南鸟足兰《红河中草药》, 鸟足兰《植分子报》

地方名 贵州: 壮精丹, 一把扇, 竹节青; 云南: 小鸡腿(红河), 大白及。

功效 块根: 壮腰益肾, 养血安神。用于肾虚腰痛, 慢性肾炎, 面足浮肿, 心脏病, 白带, 阳痿。

## 7326236

*Sedirea subparishii* Tsi

植物名 指甲兰《浙江药植志》

地方名 浙江: 枫兰(临安)。

功效 全草: 用于小儿惊风。

## 7326237

*Spathoglottis pubescens* Lindl.

植物名 苞舌兰《高植图鉴》

药材名 黄花独蒜《名实图考》

文献名 老鸦蒜《名实图考》, 粉口兰《汇编》

地方名 [白及](广西、云南), [白芨](广西、贵州); 广西: 土白芨(凤山), 山白芨, 白根; 云南: 小黄花独蒜; 其他: 牛油杯(香港)。

功效 块茎: 清热解毒, 凉血止血。用于肺热咳嗽, 咯血, 无名肿毒, 毒蚊咬伤。

## 7326238

*Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames --- *S. aristotelia* (Reinsch.) Merr. --- *S. lancea* Backer

植物名 缓草《高植图鉴》

药材名 盘龙参《名实图考》、《汇编》

文献名 鸛《诗经》, 滁州巴戟天《图经》, 一线香《质问本草》, [巴戟天]《本草纲目启蒙》, 猪鞭草、猪腰子《分类草药性》, 猪辽参、龙抱柱《天宝本草》, 青龙抱柱《中草药学》, 扭扭兰《秦岭植志》, 左转草《云南种录》

地方名 盘龙草(东北), 米羊参(陕西、贵州、云南), 金龙抱柱(福建、湖南、云南), 龙缠柱(浙江、福建), 双珊瑚(浙江、湖南、广东), 过水龙(陕西、江西); 吉林: 猪鞭子草; 内蒙古: “敖朗黑布”(蒙名); 陕西: 马牙七(柞水), 红龙缠柱(宝鸡), 盘龙箭, 一支箭; 江苏: 钢剪刀; 浙江: 双蛾草(东阳), 大叶青, 镰刀草; 安徽: 兔儿一枝箭, 走劲草; 江西: 盘龙花、金刚钻(德兴), 黄龙缠树(吉安), 盘龙金柱(婺源), 双湖草(景德镇), 江龙盘棍(新建), 黄龙缠柱(泰和), 红龙盘柱, 反皮索, 蟠龙柱; 福建: 圭舌草, 鲤鱼草; 湖北: 降龙草; 湖南: 红花参、滚龙参(衡山), 滚龙草、滚龙急解索(常德), 土木一枝枪、棘刺树(郴县), 懒蛇上树(麻阳、溆浦), 一枝枪, 一叶一枝花, 海珠草, 蛇崽草; 广东: 左缠龙(阳春); 广西: 扭兰、胜仗草(南宁), 阳萎草(河池), 鸡爪参(昭平), 绞脚疳

(北流),刀伤草(桂平);四川:小猪獠参,猪金草,猪牙参,猪尿参(峨眉山);贵州:九龙蛇,笑天龙,土洋参;云南:猪肾草(昆明),扭筋花(红河);其他:拧劲兰,牛食草,猪獠参。

功效 根或全草:滋阴益气,凉血解毒。用于病后体虚,神经衰弱,肺结核咯血,咽喉肿痛,小儿夏季热,糖尿病,白带。外用于毒蛇咬伤。

## 7326239

*Thunia alba* (Lindl.) Reichb. f.

植物名 笋兰《高植图鉴》

药材名 岩笋《云南中草药选》

文献名 风兰《名实图考》

地方名 云南:石竹子、通兰(大理、红河),岩角、[接骨丹](大理),石笋(思茅),岩竹(思茅),木鸟树、大石竹、石茭、鸡大膀(红河),岩笋笋。

功效 全草:活血,祛瘀,接骨。用于骨折,跌打损伤,创伤。

## 7326240

*Tulotis asiatica* Hara --- *Perularia fuscescens* (L.) Lindl.

植物名 蜻蜓兰《高植图鉴》

药材名 蜻蜓兰《中药大辞典》

文献名 蜻蛉兰《秦岭植志》

地方名 湖南:竹叶兰。

功效 全草:用于烧伤。

## 7326241

*Tulotis ussuriensis* (Regel et Maack) Hara --- *Perularia ussuriensis* (Maxim.) Schltr.

植物名 小花蜻蜓兰《高植图鉴》

药材名 蜻蜓兰《高原中草》

地方名 浙江:龙珠参(临安),山豆芽、虎头蕉(温州),狼扇(文成);江西:半春莲,半层莲(吉水),大叶黄龙缠树(定南),野苞芦(婺源);四川:“王拉”(若尔盖藏名)。

功效 根:解毒消肿。用于鹅口疮。外用痈疖肿毒,跌打损伤。

## 7326242

*Vanda amesiana* Reichb. f.

植物名 雅美万带兰《云南植物研究》

药材名 九爪龙《红河中草药》

文献名 万带兰《云南种录》

地方名 云南:千台楼、心不死、[吊兰]、[接骨草](玉溪),“卡鲁脚”(楚雄彝名),[石吊兰]。

功效 全草:清热消炎,活血散瘀,祛风除湿。用于疟疾,咽炎,扁桃体炎,膀胱炎,尿道炎,跌打损伤,风湿痛,腰痛,骨折,外伤出血,月经不调。

## 7326243

*Vanda concolor* Blume ex Lindl.

植物名 琴唇万带兰《高植图鉴》

文献名 万带兰《峨眉药植资源》

地方名 广西:松兰(靖西);四川:寄生子(峨眉山)。

功效 全草:祛湿毒。用于风湿痹痛,疮疖。

## 7326244

*Vanilla annamica* Gagnep.

植物名 香果兰(拉汉英种称)

药材名 香果兰《广西药录》

地方名 广西:石蚕(鹿寨)。

功效 全草:用于肺热咳嗽。

## 7326245

*Vanilla planifolia* Andr.

植物名 香子兰《云南种录》

药材名 香荚兰(叶《生药学》)

文献名 香草(李《生药》),香荚(徐《生药》),咩呢拉《中国植物图鉴》,香草兰、上树蜈蚣(汇编)

功效 全草:清热解毒。用于蛇咬伤。

## 7326246 见 7326102a

## 7326247 见 7326165a

## 7327 灯心草科 Juncaceae

## 7327001

*Juncus alatus* Franch. et Sav.

植物名 翅茎灯心草《高植图鉴》

地方名 湖北:水灯心(神农架)。

功效 茎髓:清心降火,利尿通淋。

## 7327002

*Juncus amplifolius* A. Camus

植物名 走茎灯心草《高植图鉴》

药材名 草香附《西藏中草》

地方名 西藏:“拉冈”(藏语)。

功效 根茎:理气止痛,调经活血。用于肚郁气滞,胸肋疼痛,月经失调,崩中带下等症。

## 7327002a

*Juncus castaneus* Smith---*J. triceps* Rostk.

植物名 栗花灯心草《新华本草纲要》

文献名 三头灯心草(汇编),栗色灯心草《高植图鉴》

地方名 四川:灯心草(若尔盖)。

功效 全草:清热利尿。用于热病烦渴,喉炎,咳嗽,小儿烦躁,多啼。

## 7327003

*Juncus concinnus* Don---*J. allioides* Franch.

植物名 葱状灯心草《高植图鉴》

地方名 湖北:光棍草、野葱草(神农架)。

功效 全草:清热利尿,通淋。

## 7327004

*Juncus diastrophanthus* Buchen.

植物名 星花灯心草《秦岭植志》

药材名 扁杆灯芯草《中药大辞典》

文献名 螃蟹脚《四川中草》

功效 全草:清热,消食,利尿。用于宿食内停,小便赤热。

## 7327005

*Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buch.---*J. effusus* L.---*J. decipiens* (Buch.) Nakai

植物名 灯心草《高植图鉴》

药材名 灯心草《开宝本草》、《药典》

文献名 虎须草《崔豹古今注》, 赤须《雷公炮炙论》, 灯心草根《开宝本草》, 灯心《圣济总录》, 灯草《珍珠囊》, 碧玉草《纲目》, 水灯心《分类草药性》, 铁灯心《天宝本草》, 老虎须《北方中草》, 席草、虎须、古乙心《新纲》, 草席、草莞《植物名汇》, 野席草《汇编》

地方名 锁子苗(华中), 龙须草(河南、江西、浙江、安徽), 灯芯草(江苏、福建、湖北、四川); 辽宁: (水葱); 甘肃: 菰草; 山东: 窝草(牙山), 羊毛胡子、胡草(五莲); 江苏: 草肉; 安徽: 胡子草, 老猫须子, 老母猪鬃, 油心草, 老牛甩; 福建: 猪矢草, 洋牌洞, 虎酒草, 曲屎草; 湖北: 水灯草; 湖南: 五谷草, 穿阳剑, 野席草(衡阳), 细灯草, 水木通、水灯心草(通道); 广西: 野灯心(桂林); 四川: 点油灯, 水灯芯(成都); 云南: 秧草(昆明); 其他: 清水草。

功效 茎髓: 清心火, 利小便。用于心烦失眠, 尿少涩痛, 口舌生疮。外用于咽炎, 口疮; 根及根茎: 主五淋。

#### 7327006

*Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buch. f. *utilis* Makino

植物名 石龙刍《本经》、《中药大辞典》

文献名 龙须、草续断《本经》, 龙苳、龙多、龙鬓、(续断)、龙木、草毒、龙华、石龙苳、悬菰《吴普本草》, 龙须草、缙云草《崔豹古今注》, 龙修《山海经》郭璞注, 龙珠、悬莞、石龙、方宾《别录》, 晋云叶、西王母簪《纲目》, 席草《本经逢原》, 草龙苳(汪连仕《采药书》), 龙须席草《广西药录》, 石龙刍根《浙江民药》, 灯心《简明中医辞典》

地方名 灯心草(河北、江西); 浙江: 胡须草, 野席草; 江西: 灯心蒿(奉新), 虎须草(临川), 水灯芯(彭泽), 碧玉草(万年)。

功效 全草: 利水, 通淋。用于淋病, 小便不利; 根: 行气, 止痛, 利水, 清凉解毒。用于衄血, 热郁气胀, 腹痛, 小便不利。

#### 7327007

*Juncus inflexus* L. --- *J. glaucus* Ehrh.

植物名 片髓灯心草《高植图鉴》

文献名 野席草《元江哈尼族药》, 灰绿灯心草《云南种录》。

地方名 云南: “加克”(元江哈尼语), 席子草(哈尼语意译)。

功效 全草: 理气, 调经, 止痒。用于胃腹胀疼, 各种内伤出血, 月经过多, 崩漏, 小儿风疹, 湿疹, 身痒。

#### 7327008

*Juncus prismatocarpus* var. *leschenaultii* (Gay) Buch. --- *J. leschenaultii* Gay

植物名 笋石莖《广西植录》

药材名 江南灯心草《中草药学》

文献名 水茅草《中国经植志》, 江南灯心草《高植图鉴》

地方名 湖北: 灯心草(神农架); 广西: 锥果灯心草, 野灯心草, 钩钱草(博白); 其他: 李氏灯心草。

功效 茎髓: 清心火, 利小便。

#### 7327009

*Juncus prismatocarpus* R. Br. var. *leschenaultii* (Gay) Buch. subvar. *unitubulosus* Buch.

植物名 大笋石莖《广西植录》

功效 茎髓: 清心火, 利小便。

#### 7327010

*Juncus setchuensis* Buch. --- *J. setchuensis* Buch. var. *effusoides* Buch.

植物名 野灯心草《高植图鉴》

药材名 野灯心草《广西药录》

文献名 秧根草《滇南本草》, 野席草、野席草根、龙须草《纲目拾遗》, 拟灯芯草《中药大辞典》

地方名 灯心草(江苏、云南、浙江、安徽、贵州、四川), 水灯芯(西北); 江苏: 猪鬃草, 小鬼葱(江浦), 席草(无锡); 上海: 鬼尖头草; 浙江: 马棕根, 野马棕, 野灯草; 湖北: 旱灯草、水灯草(神农架); 广西: 小龙须席草; 四川: 小灯心草, 野灯心(灵川), 铁灯草(峨眉山), 水灯心; 贵州: 仙人针; 云南: 水通草(丽江), 秧草。

功效 全草: 利尿通淋, 泄热安神。用于小便赤涩, 热淋, 肾炎水肿, 头昏, 齿痛, 鼻衄, 咽痛, 心烦失眠, 消渴, 梦遗; 根茎: 清利湿热。用于尿路感染, 小便不利, 心烦失眠, 鼻衄, 目赤, 齿痛, 妇女血崩。

7327011 见 7327002a

#### 7327012

*Luzula capitata* (Miq.) Miq. --- *L. campestris* DC. var. *capitata* Miq.

植物名 地杨梅《本草拾遗》、《中药大辞典》

功效 全草或果实: 用于赤白痢。

#### 7327013

*Luzula effusa* Buchen. --- *L. chinensis* N. E. Brown

植物名 散序地杨梅《高植图鉴》

地方名 湖北: 山高粱(神农架)。

功效 种子: 消臌胀。

#### 7327014

*Luzula multiflora* (Retz.) Lejeune --- *L. campestris* var. *multiflora* (Retz.) C. B. Clarke

植物名 多花地杨梅《高植图鉴》

药材名 多花地杨梅《中药大辞典》

地方名 湖北: 水麦冬、地杨梅(神农架)。

功效 全草或果实: 用于赤白痢。

### 7331 莎草科 Cyperaceae

#### 7331001

*Bulbostylis barbata* (Rottb.) Kunth

植物名 球柱草《云南种录》

药材名 球柱草《江西药录》

地方名 江西: 牛毛草, 土毛草。

功效 全草: 止血。用于吐血, 内脏出血。

#### 7331002

*Bulbostylis densa* (Wall.) Hand. -Mazz.

2 册

44505E

植物名 丝叶球柱草《高植图鉴》

药材名 丝叶球柱草《贵州药录》

地方名 广西:龙须草(贺县),羊胡须(临桂);贵州:山牛毛毡,牛毛毡。

功效 全草:清热解毒,利湿消肿。用于斑疹伤寒,中暑感冒,腹泻,跌打肿痛,尿频。

#### 7331003

*Carex baccans* Nees

植物名 浆果苔草《高植图鉴》

药材名 山稗子《滇南本草》、《汇编》

文献名 山红稗《汇编》,芭茅草《云南种录》

地方名 红野稗(广西、云南),野高粱(四川、云南);广西:山小米(上林),三角草(来宾),红竹鸡米;云南:红稗(保山、红河),野红米、野红米草、乌稗(文山),红米、红果莎、小红米、三楞子草、野稗(红河),水高粱(楚雄),野鸡稗(临沧),土稗子,山高梁;其他:蒨,稗。

功效 全草、根:调经止血。用于鼻衄,便血,月经过多,产后出血;果实、种子:透疹止咳,补中利水。用于麻疹,水痘,百日咳,脱肛,浮肿。

#### 7331004

*Carex brownii* Tuckerm.

植物名 亚大苔草《高植图鉴》

药材名 三方草《汇编》

文献名 海洋苔草《东北草本植志》,亚澳苔草《秦岭植志》

地方名 江苏:白郎台(苏南)。

功效 根:理气止痛,驱风除湿。用于小儿夜啼,风湿骨痛。

#### 7331005

*Carex cruciata* Wahlenb.

植物名 十字苔草《高植图鉴》

药材名 十字苔草《贵州药录》

文献名 十字苔《中国经植志》

地方名 油草(福建、广西);广西:三棱草(灵山),三角草(恭城);贵州:有喙红苞苔。

功效 全草:解表透疹,理气健脾。用于麻疹不出,消化不良,风热感冒。

#### 7331006

*Carex filicina* Nees

植物名 蕨状苔草《高植图鉴》

药材名 蕨状苔草《贵州药录》

功效 根、叶:理气,固脱。用于子宫脱垂,消化不良。

#### 7331007

*Carex gibba* Wahlenb.

植物名 穹隆苔草《高植图鉴》

药材名 哮喘草《湖北中草药志》

文献名 穹隆藁草《东北草本植志》

地方名 基膨苔(江苏、湖北)。

功效 全草:清肺平喘。用于支气管炎,支气管哮喘等症。

#### 7331008

*Carex kobomugi* Ohwi

植物名 砂砧苔草《高植图鉴》

药材名 蒺草《海药本草》、《中药大辞典》

文献名 自然谷、馮余粮(张华《博物志》),师草实、蒺实《本草拾遗》

地方名 山东:砂贡子(威海);江苏:蒺草子。

功效 果实:用于补虚羸乏损,温肠胃,止呕逆,久食健人。

#### 7331009

*Carex lanceolata* Boott

植物名 披针苔草《高植图鉴》

药材名 披针苔草《广西药录》

文献名 大披针苔草《秦岭植志》,大披针苔《山东经植》,披针苔《中药大辞典》,凸脉苔草《广西药录》,阴地苔《吉野》

地方名 羊胡子草、羊毛胡子(山东、江苏);山东:牛毛草(蓬莱),固堤草(益都);江苏:羊胡髭草。

功效 全草:收敛,止痒。用于湿疹,黄水疮,小儿羊须疮。

#### 7331010

*Carex lehmanii* Drejer

植物名 膨囊苔草《高植图鉴》

地方名 湖北:人字草(神农架)。

功效 全草:清热解毒,祛湿。

#### 7331011

*Carex ligulata* Nees ex Wight

植物名 舌叶苔草《高植图鉴》

药材名 舌叶苔草《贵州药录》

地方名 贵州:三方草,三轮草。

功效 全草:解表透疹,理气健脾。用于麻疹不出,消化不良,风热感冒。

#### 7331012

*Carex maubertiana* Boott

植物名 密叶苔草《高植图鉴》

药材名 密叶苔草《贵州药录》

地方名 广西:三角草、山马鞭草(罗城);贵州:三轮草,三棱草。

功效 全草:清热利尿,解表透疹,理气健脾。用于麻疹不出,消化不良,风热感冒,淋症,烧、烫伤。

#### 7331013

*Carex phacota* Spreng. --- *C. shichiseitensis* Hayata

植物名 镜子苔草《高植图鉴》

药材名 镜子苔草《广西药录》

文献名 有喙红苞藁《中药大辞典》

地方名 贵州:三棱草,大三方草,三棱马尾,〔仙鹤草〕,野红稗(毕节)。

功效 全草:解表透疹。用于小儿痧疹不出。

#### 7331014

*Carex scaposa* C. B. Clarke

植物名 花葶苔草《高植图鉴》

药材名 花葶苔草《广西药录》

地方名 湖南:猪珠伸筋(蓝山县瑶名);广西:落地

蜈蚣(陆川),翻天红(北流)。

功效 根:清热解毒,活血散瘀。用于急性胃肠炎;全草:外用于跌打损伤。

#### 7331015

*Carex sendaica* Franch.

植物名 锈鳞苔草《高植图鉴》

药材名 锈鳞苔草《贵州药录》

地方名 贵州:山岩草、三岩草(凤冈)。

功效 根:理气,健脾,活血。用于月经不调,胃病。

#### 7331016

*Carex siderosticta* Hance

植物名 宽叶苔草《高植图鉴》

药材名 崖棕根《图经》、《中药大辞典》

文献名 崖棕《秦岭植志》

地方名 贵州:干经草。

功效 根:用于妇人血气,五劳七伤;全草:活血化瘀,通经活络。用于月经不调,经闭。

#### 7331017

*Carex spitiola* Boott

植物名 石柏苔草《广西药录》

地方名 广西:石扁柏(桂平)。

功效 全草:用于小儿惊风。

#### 7331018

*Carex taliensis* Franch.

植物名 大理苔草《高植图鉴》

药材名 大理苔草《中药通报》

地方名 湖北:羊胡子草(神农架);湖南:翁宠针(蓝山县瑶名)。

功效 全草:清热利湿,消疮止痒。用于大肥疮。

#### 7331019

*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.)

Kukenth --- *C. flabelliformis* Rottb.

植物名 伞莎草《中药大辞典》

药材名 九龙吐珠(泉州本草)

文献名 风车草《高植图鉴》

功效 茎叶:行气活血,退瘀解毒。用于瘀血作痛,蛇虫咬伤。

#### 7331020

*Cyperus compressus* L.

植物名 扁穗莎草《高植图鉴》

药材名 扁穗莎草《广西药录》

地方名 广西:天打捶(平南)。

功效 全草:外用于跌打损伤。

#### 7331021

*Cyperus cuspidatus* Kunth

植物名 长尖莎草《高植图鉴》

药材名 长尖莎草《广西药录》

功效 全草:清热,止咳。

#### 7331022

*Cyperus difformis* L.

植物名 异型莎草《高植图鉴》

药材名 异型莎草《泉州本草》

文献名 球穗莎草《东北草本植志》

地方名 咸草(江苏、福建);福建:王母钗(泉州);广西:五粒关(岑溪)。

功效 带根全草:行气,活血,通淋,利小便。用于热淋,小便不通,跌打损伤,吐血。

#### 7331023

*Cyperus eleusinoides* Kunth

植物名 穆穗莎草《云南种录》

药材名 穆穗莎草《广西药录》

地方名 广西:三角草(那坡),土三棱(大新)。

功效 全草:止血,散血。

#### 7331024

*Cyperus esculentus* L. var. *sativus* Baeck.

植物名 油莎草《新华本草纲要》

地方名 广西:油莎豆。

功效 块根:抗炎,行气,健脾胃。

#### 7331025

*Cyperus fuscus* L.

植物名 褐穗莎草《高植图鉴》

文献名 密穗莎草《东北草本植志》,三棱草《元江哈尼族药》

地方名 云南:“咪咪咪然”(元江哈尼语)。

功效 全草:发散风寒,退热止咳。用于风寒感冒,高热,咳嗽。

#### 7331026

*Cyperus glomeratus* L.

植物名 聚穗莎草《高植图鉴》

药材名 水莎草(河南)、《中药大辞典》

文献名 头穗莎草《东北草本植志》,球形莎草《秦岭植志》

功效 全草:止咳,化痰。用于慢性支气管炎。

#### 7331027

*Cyperus haspan* L.

植物名 畦畔莎草《高植图鉴》

地方名 广西:三棱草(苍梧),鸡屎青(金秀)。

功效 全草:解热。用于婴儿破伤风。

#### 7331028

*Cyperus iria* L.

植物名 碎米莎草《高植图鉴》

药材名 野席草(浙江)、《汇编》

文献名 四方草、三轮草、见骨草《分类草药性》,莎草《植物名汇》,三角草、马王子、凤凰草《田间的杂草》,碎米莎草、(荆三棱)《中国植物图鉴》,细碎三捻草《广西药录》

地方名 河北:蒲草;浙江:孑儿草(临安),三方草;江西:野鞭草;广西:细三棱(南宁),咸水草;四川:三棱子草、小三棱子(南川),三楞草;贵州:水三棱,小三棱草;其他:三棱草,马蔺花。

功效 全草:祛风除湿,调经利尿。用于风湿,筋骨疼痛,跌打损伤,月经不调,痛经,经闭,尿路结石。

#### 7331029



*Cyperus malaccensis* Lam. var. *brevifolius* Bockl.

植物名 短叶荳蔻(高植图鉴)

文献名 席草、汪蒲草(汇编)

地方名 咸水草(广西、四川)。

功效 根、根茎:清热凉血,止血。用于吐血,尿血、风火牙痛,白带;花:用于疮痍,肿毒,睾丸炎。

### 7331030

*Cyperus michelianus* (L.) Link --- *Scirpus michelianus* L.

植物名 旋鳞莎草(高植图鉴)

药材名 护心草(四川中药志)

文献名 附心草(分类草药性),头穗藤草(东北草本植志),白莎草(秦岭植志),旋颖莎草(汇编)

功效 全草:行气调经。用于痛经,经行愆期,或一月2~3次者。

### 7331031

*Cyperus nipponicus* Franch. et Sav.

植物名 白鳞莎草(东北草本植志)

地方名 河南:[谷精草]。

备考 《中药鉴别手册》(1979)载称:全草在河南个别地区误作谷精草用,已纠正。

### 7331032

*Cyperus nutans* Vahl

植物名 垂穗莎草(广西药录)

地方名 广西:十瘰楼(都安)。

功效 根:用于小儿发热。

### 7331033

*Cyperus orthostachyus* Franch.

植物名 三轮草(高植图鉴)

地方名 湖北:三棱草(神农架)。

功效 全草:清热泻火,消炎。

### 7331034

*Cyperus pilosus* Vahl

植物名 毛轴莎草(高植图鉴)

药材名 毛轴莎草(广西药录)

地方名 广东:三合草,三稔草,三棱官;广西:大绉草,三角草(昭平),三棱草(邕宁、融安、岑溪)。

功效 全草:用于跌打损伤,浮肿;花序:用于肾炎。

### 7331035

*Cyperus pilosus* Vahl var. *obliquus* (Nees) C. B. Clarke

植物名 白花毛轴莎草(广西植录)

功效 全草:通经,驱瘀,镇痛。用于产后腹痛。

### 7331036

*Cyperus rotundus* L.

植物名 香附子(唐本草)、(高植图鉴)

药材名 香附(滇南本草)、(药典)

文献名 蒲、侯莎(尔雅),雀头香(江表传),莎草根、缙[实名](别录),地毛(广雅),莎随(大戴礼记),山莎(纂文),草附子、水香棱、水巴戟、莎结、续草根、地蕨根、香棱、水莎、三棱草(图经),月草哆(金光明经),抱灵居士(记事珠),大理府香附(滇南本草),雷公头、蔓、大须、水三棱(纲目),回头青(清异录),香附米(本草求真),雀脑香、鼠莎、莎根、砂香附子、白砂、赤砂(新纲),地韭、韭姜(民间药与验方),光香附、毛香附、金香附、附米、黑香附、白香附(药材学),东香附(山东产者)、南香附(浙江产者)(中药大辞典)

地方名 草头香(福建、广东),香头草(福建、广东、广西),三棱草根(天津、江苏、江西、云南),〔猪鬃草〕(广东、广西);河北:三楞草根,梭草根,地赖根;内蒙古:“拉各”、“拉斯阔”(蒙名);山东:张罗草(平邑),猪定子、沙棱子豆、梭草根(烟台);江苏:小三棱(盱眙),缩缩草(沛县),莎掌棒(云台山),珠米子(泰县),水前,九蓬根,红茅根,猪毛青,蓑衣草;上海:三角草子,地筋草,显婆卵子,旱三棱,野结头;浙江:地韭姜(嵊县),地荸荠,猪荸荠,野韭菜,隔夜抽;江西:三棱草根、猪牯头、猪母须、粪箕子草(德兴),香附草(婺源、彭泽),雷公子(吉安),雷公草(赣州),雷公兜,猪牯须,陀子草,鸡爪三棱;福建:土香草,山芽草,苦虫头,苦羌头,苦姜头,雷公土,猴香蛋;台湾:土香;河南:地三草,莎草疙瘩;湖北:雷公草了;湖南:田头草(宜章),羊根藤子(溆浦),吊马形(黔阳),吊马棕(长沙),怀毛草(麻阳);广东:丁香仔(广州),马钱葱(饶平),土香附、生香附、淡香附、厚香头、厚香头草(潮汕),连头草(南澳),草尾济,过夜青,猪鬃头,猪鬃草头;广西:千年菜(田东),芋头草(北海),宗刀草(乐业),地沟草,地贯草,地糕草,地蒲草,地罩草,地周草子,地垢薯,草鸡头,草地罩草,猪通草,猪通草菇(陆川),铲不尽,雷公头草,钩草头,勃茄毛,辣姜草(玉林);贵州:火炮锤,人人恨,庄家恨,香胡子;云南:三楞草、姑娘草(文山),洒药云香草(曲靖),“牙麻秀母”(西双版纳傣语);其他:回头青果,滨管。

功效 根茎(香附):行气解郁,调经止痛。用于肝郁气滞,胸、胁、脘腹胀痛,消化不良,胸脘痞闷,寒疝腹痛,乳房胀痛,月经不调,经闭痛经;茎叶(莎草):行气,开郁,祛风。用于胸闷不舒,皮肤风痒,痈肿。

### 7331036a

*Cyperus stoloniferus* Retz.

植物名 粗根茎莎草(拉汉英种称)

地方名 咸香附(广东、广西);山东:[香附],〔香附子〕;广东:大香附,咸水香附;海南:海南大香附。

备考 本品在广东、广西地区以其根茎充代香附。

### 7331037

*Eleocharis pellucida* Presl --- *E. congesta* D. Don var. *japonica* (Miq.) T. Koyama

植物名 透明鳞荸荠(高植图鉴)

文献名 穗生苗荸荠(东北草本植志),钝棱荸荠(广西植录),膜苞薹(云南种录)

地方名 广西:谷星草(来宾)。

功效 全草:用于头痛,疮疖。

### 7331038

*Eleocharis tetraquetra* Nees

植物名 龙师草(高植图鉴)

药材名 龙师草《贵州药录》

地方名 贵州:牛毛毡(湄潭)。

功效 全草:清热明目,降火解暑。用于暑热不退,火眼,目翳。

#### 7331039

*Eleocharis tuberosa* (Roxb.) Roem et Schult. --- *E. dulcis* (Burn. f.) Trin. ex Henschel

植物名 荸荠《高植图鉴》

药材名 荸荠《日用本草》、《汇编》

文献名 鳧茨《尔雅》、乌芋、藉姑、水萍《别录》、乌茨《本草经集注》、茈菰、水芋《广雅》、鳧茨《食疗本草》、勃脐《本草衍义》、铁荸荠《救荒本草》、荸荠、地栗《纲目》、地梨《汝南圃史》、野荸荠、野荸荠《尔雅义疏》、荸荠《名实图考》、马蹄《本草求真》、通天草、《饮片新参》、洗药荠《食用植物图说》、地栗粉《药典》、荸荠草、荸荠梗《药材学》

地方名 江苏:荸荠南、地栗梗(苏州)、荸荠头、珍珠草、野地栗苗;浙江:荸荠杆(杭州);福建:马薯(泉州)、田薯仔、尾梨、马荠(厦门);台湾:水灯蕊草、码薯;广西:乌薯;湖南:灯草莓(长沙)、荸荠子(衡山)、卜血子;四川:红慈姑、甜慈姑、慈姑(峨眉山);其他:马蹄粉、桂林马蹄。

功效 球茎:清热止渴,利湿化痰,降血压。用于热病,伤津烦渴,咽喉肿痛,口腔炎,湿热黄疸,高血压病,小便不利,麻疹,肺热咳嗽,痔瘡出血;地上全草:清热利尿。用于呃逆,小便不利。

#### 7331040

*Eleocharis yokoscensis* (Franch. et Savat.) Tang et Wang --- *Scirpus yokoscensis* Franch. et Savat.

植物名 牛毛毡《高植图鉴》

药材名 牛毛毡《分类草药性》、《汇编》

文献名 松毛藨《植物学大辞典》、油麻毡《汇编》

地方名 浙江:地毛;广西:猪毛草。

功效 全草:发表散寒,祛痰平喘。用于感冒咳嗽,痰多气喘,咳嗽失音。

#### 7331041

*Eriophorum comosum* Nees

植物名 丛毛羊胡子草《高植图鉴》

药材名 丛毛羊胡子草《广西药录》

文献名 崖荆草、崖胡子草《植物名汇》、岩梭《汇编》、丛毛绵管《秦岭植志》

地方名 龙须草(广西、贵州);四川:铁脚锁(川北),羊胡子草。

功效 花:平喘止咳。用于喘咳;全草:通经活络。用于风湿骨痛,跌打损伤。

#### 7331042

*Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl --- *Scirpus dichotoma* L.

植物名 两歧飘拂草《高植图鉴》

药材名 飘拂草《名实图考》、《中药大辞典》

地方名 湖南:土甘松;广西:黑节关(岑溪)。

功效 全草:利小便。

#### 7331043

*Fimbristylis dipsacea* (Rottb.) Benth.

植物名 起皱飘拂草《广西药录》

功效 全草:清凉,解热。

#### 7331044

*Fimbristylis rusca* (Nees) C. B. Clarke

植物名 暗褐飘拂草《高植图鉴》

药材名 田高粱《汇编》

文献名 褐穗飘拂草《广州植志》

地方名 广西:片角草;贵州:山牛毛毡,牛毛草,牛毛毡,狗毛草。

功效 全草:解表,清热。用于斑疹伤寒。

#### 7331045

*Fimbristylis mitacea* (L.) Vahl

植物名 水虱草《高植图鉴》

药材名 日照飘拂草《汇编》

文献名 飘拂草《名实图考》、小葉飘拂草《广西药录》、猪毛草、地毛、牛毛草、田岸毛、牛毛毡《汇编》、鹅草《中药大辞典》

地方名 浙江:田岸茅(天台)、笕帚草(嘉兴、嘉善、平湖);台湾:虱屏草、虱筛草;广东:汉草、旱草、球花关;广西:芝麻关草(岑溪)。

功效 全草:祛痰定喘,活血消肿。用于暑热,支气管炎,跌打损伤,小便不利,胃肠炎。

#### 7331046

*Fimbristylis rigidula* Nees

植物名 结壮飘拂草《高植图鉴》

药材名 毛蜂子《汇编》

文献名 硬穗飘拂草《广西药录》、硬飘拂草《贵州草药》、茅草箭《汇编》

地方名 江苏:野韭菜(六合);贵州:透骨风。

功效 根:滋阴润燥,补虚益损。用于肺癆,盗汗,久咳,虚弱头晕。

#### 7331047

*Fimbristylis tetragona* R. Br.

植物名 四棱飘拂草《广西药录》

地方名 广西:箭头草(博白)。

功效 全草:用于跌打损伤。

#### 7331048

*Fuirena umbellata* Rottb.

植物名 伞花毛瓣莎《云南种录》

药材名 芙兰草《广西药录》

文献名 假麻草《广西植录》

地方名 广西:禾花草(邕宁)。

功效 全草:用于小儿风热,疟疾。

#### 7331049

*Gahnia tristis* Nees

植物名 黑莎草《高植图鉴》

药材名 黑莎草《广西药录》

功效 全草:用于子宫脱垂。

#### 7331050

*Juncellus serotinus* (Rottb.) Clarke --- *Cyperus*

*serotinus* Rottb.

植物名 水莎草《高植图鉴》

药材名 水莎草《中草药通讯》

功效 全草：止咳，化痰，用于慢性气管炎。

### 7331051

*Kyllinga brevifolia* Rottb.

植物名 水蜈蚣《高植图鉴》

药材名 水蜈蚣《名实图考》、《汇编》

文献名 球子草、疟疾草、金牛草、三莢草《岭南采药录》，夜夜占、黄狗占《田间的杂草》，短叶水蜈蚣《汇编》，三黄草《中草药学》

地方名 一粒珠(浙江、福建)，三尖草(江西、广东)，三角草(上海、福建、湖南、广东)，三棱草(上海、安徽、广东)，[水杨梅](浙江、江西、福建)，水香附(江苏、四川)，水莎草(河南、湖北)，金钮子(广东、广西、云南)，散寒草(安徽、湖北、四川)，雷公草(江西、福建)，夜摩草(广东、广西)；陕西：三人抬珠，水金钗；上海：一粒子草；浙江：九头香、三角棱草，水竹钵，细竹草，细叶草，杨梅草(泰顺)，寒热头草，苦香子；江西：十字草(德兴)，金钮子草(丰城)，九节莲，三人扛珠，三龙扛珠，三龙抱珠，钢拳头；福建：山蜈蚣、水乌梅、龙吐珠(泉州)，水土香、无头土香、灯蕊草、韭菜草、香附子草、香露草、雪玄珠(厦门)，无头香附(泉州、厦门)，耙齿痕(厦门、漳州、同安)，一粒雪，土柴胡，金钮草，三箭草，落地杨梅，红筋仔，耙虫痕，半天雷，白齿痕，湿香，耙齿草，三角珠，光头草，三胶草，兔丝草，墙苏仔，芒括草，三伏子；台湾：白香附；河南：干根草；湖北：顶天珠，遍地香；湖南：水香草(麻阳、黔阳)；广东：顶棍草、三星草、金钮痕、无豆香、土豆香、水葱(广州)，来巴齿草、梳子草(惠阳)，无头厚香(潮安)，三稔藟、空壳早、面包草(潮阳)，一枝珠、夜抹草(粤北)，贼佬命，入地蜈蚣，假马芥葱，辣子草，发汗草；广西：一箭球(马山)，一粒关(南宁)，关草(容县)；四川：姜芽草(蓬溪)，寒筋草(南川)，燕含珠(重庆)，水仙草，四轮草，寒雪草，路边浆，寒气草(成都)；贵州：姜虫草，露水草，水牛草，三步跳，水回头青，连根草，草含珠；云南：白顶草、银钮草(玉溪)，火马蛇(昆明)，顶绣草，小火马草，蜜蜂草，蜈蚣草，野韭菜；其他：无头香，旱三棱草。

功效 全草：疏风解表，清热利湿，止咳化痰，祛瘀消肿。用于支气管炎，百日咳，痢疾，肝炎，乳糜尿，跌打损伤，风湿性关节炎。外用蛇咬伤，皮肤瘙痒，疖肿。

### 7331052

*Kyllinga brevifolia* Rottb. var. *leiolepis* (Franch. et Sav.)

Hara --- *K. gracillima* Miq.

植物名 光颖水蜈蚣《东北草本植志》

文献名 光鳞水蜈蚣《陕西中草药》

地方名 湖北：水蜈蚣(神农架)。

功效 带根全草：截疟，止咳，化痰，祛风利湿。

### 7331053

*Kyllinga cororata* (L.) Druce --- *K. monocephala* Rottb.

植物名 单穗水蜈蚣《拉汉英种称》

药材名 一箭球《汇编》

文献名 单穗益花水蜈蚣《广西民药》

地方名 水蜈蚣(广西、云南)，猴子草(广东、海南、广西)；福建：一粒雪(福安)；广东：白花草；广西：三角草，水百足，金钮草，三叶珠，散寒草，水香附，燕含珠，姜牙草，单打捶，衫扣草，小关草，夜摸草，小贼老屎，公芋头草；云南：火马蛇，白顶草，谷精草，顶蛛草，银钮草，蜈蚣草。

功效 全草：清热化痰，活血消肿，截疟。用于疟疾，百日咳。外用跌打损伤，蛇咬伤。

### 7331054

*Kyllinga triceps* Rottb.

植物名 三头水蜈蚣《海南植志》

药材名 金钮子《广西民药》

地方名 广西：护心草，五粒关草(岑溪)。

功效 全草：用于妇女月经痛，刀伤出血，气滞肚痛，风湿骨痛，小儿惊风。

### 7331055

*Lipocarpha microcephala* (R. Br.) Kunth --- *L. chinensis* auct. non Kern

植物名 湖瓜草《高植图鉴》

药材名 湖瓜草《名实图考》、《广西药录》

地方名 广东：野葱草；广西：钮草(防城)，七子关(岑溪)。

功效 全草：外用于小儿惊风。

备考 过去有的文献将本种误定为 *Lipocarpha chinensis* Kern

### 7331056

*Mariscus compactus* (Retz.) Druce

植物名 密穗砖子苗《高植图鉴》

药材名 密穗砖子苗《汇编》

文献名 砖子苗《西藏中草》

地方名 西藏：“玛玛机机”(藏名)。

功效 全草：止咳化痰，宣肺解表。用于风寒感冒，咳嗽痰多。

### 7331057

*Mariscus sumatrensis* (Retz.) T. Koyama --- *M. cyperoides* (L.) Urban --- *M. sieberianus* Nees --- *M. umbellatus* Vahl p. p.

植物名 砖子苗《高植图鉴》

药材名 砖子苗《救荒本草》、《湖南药物志》

文献名 山荸荠、野荸荠《纲目拾遗》，假香附、伞形长序穿鱼草《云南药录》，伞序三棱草《汇编》

地方名 三棱草(广西、云南)；浙江：球头三棱；湖南：三棱；广西：耕田草，野穆子草，三角草(那坡)；贵州：大香附子；云南：(香附)。

功效 地下球茎：调经，止痛，行气解表。用于感冒，月经不调，慢性子宫内膜炎，产后腹痛，跌打损伤，风湿性关节炎；全草：祛风止痒，解郁调经。用于皮肤瘙痒，月经不调，血崩。

备考 本品生山地，地下有球茎，人每以此为《救

荒本草》的砖子苗, 实误。

### 7331058

*Pycnus sanguinolentus* (Vahl) Nees

植物名 红鳞扁莎《高植图鉴》

药材名 红鳞扁莎《广西药录》

地方名 广西: 水底竹(北流)。

功效 全草: 清热解毒。

### 7331059

*Rhynchospora rubra* (Lour.) Makino

植物名 刺子莞《高植图鉴》

药材名 刺子莞《汇编》

地方名 一包刺(广东、广西); 广西: 一包针, 捻串草, 眼圈草, 大一箭球(邕宁); 贵州: 龙须草, 绣球草。

功效 全草: 清热利湿。用于淋浊。

### 7331060

*Schoenoplectus fohaiensis* (Wang et Tang) C. Y. Wu ---

*Scirpus fohaiensis* Tang et Wang

植物名 勐海萤蔺《云南种录》

药材名 换锅米(湖南蓝山县瑶名)、《中药通报》

文献名 佛海蔺草《中药通报》

功效 根: 清热泻火。

### 7331061

*Schoenoplectus grossus* (L. f.) Palla --- *S. wallichii* Hees

植物名 猪毛草《高植图鉴》

药材名 猪毛草《广西药录》

地方名 广西: 假灯草(邕宁)。

功效 全草: 清热利尿。用于肺热咳嗽, 尿路感染。

### 7331062

*Schoenoplectus juncoides* (Roxb.) Palla --- *Scirpus juncoides* Roxb.

植物名 萤蔺《云南种录》

药材名 野马蹄草《汇编》

地方名 山东: 三棱草(微山); 江苏: 三角棱, 水毛花, 圆关草; 湖北: 水灯草; 广东: 灯心草; 海南: 牛毛草(澄迈); 广西: 关草(北流), 土灯草(贵县), 水箭草(岑溪), 直立席草; 贵州: 千子草。

功效 全草: 清热解毒, 凉血利水。用于肺癆咳血, 风火牙痛, 目赤肿痛, 尿路感染。

7331063 见 7331071a

### 7331064

*Schoenoplectus tabernaemontani* (C. C. Gmel.) Palla ---

*Scirpus tabernaemontani* C. C. Gmel. --- *S. validus* Vahl

--- *S. lacustris* L. var. *tabernaemontani* Doll

植物名 水葱《云南种录》

药材名 水葱《盛京通志》、《汇编》

文献名 莞《诗经》, 苕菰《尔雅》, 莞蒲《尔雅注》, 夫离《说文》, 夫离《楚辞注》, 小蒲《诗笺》, 葱蒲《汉书注》, 白蒲《尔雅义疏》, 翠管《丹铅总录》, 水文葱《药材学》, 翠管草《满洲植录》, 太菰《食用植物图说》, 水葱蔺草《东检》

地方名 吉林: 莞草; 北京: 冲天草; 内蒙古: “乌森—松根”(蒙名), 水葱子; 其他: 席子草。

功效 地上全草: 除湿利尿。用于水肿胀满, 小便不利。

### 7331065

*Schoenoplectus triquetus* (L.) Palla --- *Scirpus triquetus* L.

植物名 蔺草《高植图鉴》

药材名 蔺草《纲目》、《汇编》

文献名 蓍荇、荇《尔雅》, 大蔺草《纲目》, 荇草《满洲植录》, 三棱蔺草《东检》, 野荸荠、光棍草、光棍子《汇编》

地方名 席草(甘肃、台湾); 江苏: 丝草(苏北), 三角荇; 广西: 三棱草, 饭篙草; 其他: 大甲蔺(日本)。

功效 全草: 开胃。用于食积气滞, 呃逆饱胀。

### 7331066

*Scirpus juncoides* Roxb. var. *hotarui* (Ohwi) Ohwi

植物名 细杆萤蔺《广西药录》

地方名 广西: 假马蹄(环江), 灯草根(柳江), 滑关草(北流)。

功效 全草: 清热, 利尿。用于黄疸, 肾结石。

### 7331067

*Scirpus lushanensis* Ohwi --- *S. asiaticus* Beetle

植物名 庐山蔺草《高植图鉴》

地方名 湖北: 野椒子(神农架); 广西: 马尾草(天等)。

功效 全草: 舒筋活络, 行气。

7331068 见 7331071a

### 7331069

*Scirpus planiculmis* Fr. Schmidt --- *Bolboschoenus planiculmis* (Fr. Schmidt) Egor.

植物名 扁杆蔺草《高植图鉴》

药材名 扁杆荆三棱《汇编》

文献名 紧穗三棱草《东北草本志》, 水莎草、三棱草《汇编》, 泡三棱《品种论述》

地方名 吉林: 野荆三棱; 北京: 地梨(郊区); 甘肃: 三棱, 黑三棱。

功效 块茎: 止咳, 破血, 通经, 行气, 消积, 止痛。用于慢性气管炎, 癥瘕积聚, 产后瘀阻腹痛, 消化不良, 闭经及一切气血瘀滞, 胸腹肋疼痛。

### 7331070

*Scirpus rosthornii* Diels

植物名 百球蔺草《高植图鉴》

文献名 百球荆三棱《云南种录》

地方名 云南: 三角草, “蛇卡得”(彝药名)。

功效 全草: 清热解毒, 凉血, 利水, 消食理气。用于毒蛇咬伤。

### 7331071

*Scirpus subcapitatus* Thw.

植物名 类头状花序蔺草《高植图鉴》

药材名 龙须莞《汇编》

文献名 球花藨草《广西植录》, 龙须草《浙江药植志》

地方名 浙江: 马胡须(临安), [灯心草](建德), 野席草(宁波)。

功效 全草、根: 利尿通淋, 清热安神。用于尿路感染, 糖尿病, 失眠, 目赤肿痛。

#### 7331071a

*Scirpus triangulatus* Roxb. --- *S. mucronatus* Diels --- *Schenoplectus mucronatus* (L.) Palla

植物名 水毛花《名实图考》、《新华本草纲要》

文献名 水三棱草、三棱观《中国经植志》, 北水毛花《广西药录》

地方名 三角草(江苏、广西); 湖南: 丝毛草; 四川: 蒲草, 茫草, 蓆草根, 大灯芯; 其他: 千子草。

功效 全草: 清热解表。用于利尿, 外感风寒, 牙疼, 淋症, 白带, 咳嗽。

#### 7331072

*Scirpus yagara* Ohwi --- *S. fluvialis* (Torrey) A. Gray var. *yagara* (Ohwi) T. Koyana --- *S. maritimus* C. B. Clarke

植物名 荆三棱《开宝本草》、《高植图鉴》

药材名 泡三棱《品种论述》

文献名 萆根《抱朴子》, 萆草《字林》, 三棱草《千金翼方》, 三棱《本草拾遗》, 黑三棱《开宝本草》, 白三棱《药材学》, 带皮三棱《沙漠药植》, 菜三棱《品种论述》

地方名 菱草(辽宁、河南); 辽宁: 菱衣草; 山东: 草三棱(文登、乳山、牟平); 江苏: 京三棱, 湖三棱(苏北), 野荸荠; 安徽: 二棱果, 铁荸荠, 老母拐子; 云南: 砖子苗; 其他: 日本荆三棱。

功效 块茎: 破血行气, 消积止痛。用于癥瘕痞块, 瘀血经闭, 食积腹痛。

#### 7331073

*Scleria hookeriana* Bockl.

植物名 黑鳞珍珠茅《高植图鉴》

药材名 黑鳞珍珠茅《贵州药录》

地方名 湖南: “别射”(蓝山县瑶名); 贵州: 三轮草。

功效 根: 祛风除湿, 舒通经络。用于痛经, 风湿疼痛, 跌打损伤, 痢疾, 咳嗽, 劳伤疼痛。

#### 7331074

*Scleria levis* Retz. --- *S. hebecarpa* Nees

植物名 毛果珍珠茅《高植图鉴》

药材名 三角草《汇编》

地方名 珍珠茅(海南、广西); 广东: 割鸡刀(乐昌、连昌), 三稔草(曲江); 广西: 早三棱, 翅白珠, 千三棱, 三面锋(南宁), 三棱草(那坡、三江)。

功效 根: 消肿解毒。用于毒蛇咬伤, 小儿单纯性消化不良, 痢疾, 咳嗽, 咽喉沙哑。

#### 7331075

*Scleria terrestris* (L.) Fassett --- *S. elata* Thw.

植物名 高秆珍珠茅《高植图鉴》

药材名 三楞筋骨草《四川中草》

地方名 广西: 草三棱, 三角草(上林、永福), 珍珠草

(凤山)。

功效 全草: 除风湿, 通经络。用于风湿筋骨痛, 瘫痪, 跌打损伤。

### 7332 禾本科 Gramineae

#### 7332001

*Achnatherum inebrians* (Hance) Keng

植物名 醉马草《中国植志》

药材名 药老《沙漠药植》

文献名 药草《兰州植志》, 醉针茅、米米蒿《沙漠药植》

地方名 内蒙古: “德日存·好日”、“德里松·霍尔”、“德里斯·霍尔”、“阿尔善”(蒙名)。

功效 根、全草: 有毒。解毒消肿。用于化脓肿毒(未破), 腮腺炎, 关节疼痛。

#### 7332002

*Achnatherum splendens* (Trin.) Nevski

植物名 芨芨草《中国植志》

药材名 芨芨草《内蒙古中草药》

地方名 河北: 枳机草, 席箕草; 内蒙古: 枳芨草, “德勒苏”、“德里斯”、“滴里刺”(蒙名); 新疆: 席箕。

功效 茎基部及花: 利尿清热, 止血。用于尿道炎, 初生儿小便不利, 止血。

#### 7332003

*Aeluropus pungens* (M. Bieb.) C. Koch --- *Poa pungens* M. Bieb. --- *Aeluropus littoralis* subsp. *pungens* (M. Bieb.) Tzvel. --- *Aeluropus littoralis* Parl.

植物名 小獐毛《中国植志》

药材名 马绊草《沙漠药植》

功效 全草: 清热, 利尿。用于黄疸性肝炎, 胆囊炎, 肝硬变腹水等。

#### 7332004

*Aeluropus sinensis* (Debeaux) Tzvel. --- *Aeluropus littoralis* var. *sinensis* Debeaux

植物名 獐茅《中国植志》

药材名 马绊草《汇编》

文献名 獐毛、马牙头、小叶芦《禾本科图说》

地方名 内蒙古: “其都日·乌布斯”、“阿查麻格”(蒙名)。

功效 全草: 清热利尿。用于黄疸型肝炎, 胆囊炎, 肝硬变腹水等。

#### 7332005

*Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. --- *Bromus cristatum* L.

植物名 冰草《中国植志》

药材名 冰草根(拟)

文献名 大麦草《华北经植志要》, 麦穗草、山麦草《禾本科图说》

地方名 吉林: 野麦子, 大麦子(长春); 内蒙古: “优日呼格”、“油日呼格”(蒙名)。

功效 根: 止血, 利尿。用于尿血, 肾炎, 功能性子宫出血, 月经不调, 咯血, 吐血, 外伤出血。

## 7332006

*Agropyron desertorum* (Fisch.) Schult.

植物名 沙生冰草《中国植志》

药材名 沙生冰草根(拟)

地方名 内蒙古:“楚乐音-优日呼格”、“额乐森-油日呼格”(蒙名)。

功效 根:止血,利尿。用于尿血,肾盂肾炎,功能性子宫出血,月经不调,咯血,吐血,外伤出血。

## 7332007

*Agropyron mongolicum* Keng

植物名 沙芦草《中国植志》

药材名 沙芦草根(拟)

地方名 内蒙古:“额乐存乃-优日呼格”、“蒙高勒-油日呼格”(蒙名)。

功效 根:止血,利尿。

## 7332008

*Alopecurus aequalis* Sobol.

植物名 看麦娘《中国植志》

药材名 看麦娘《救荒本草》、《汇编》

地方名 内蒙古:“乌纳根-苏乐”(蒙名);山东:水草(崂山),道旁谷(烟台);浙江:油草(台州、温州);江西:葱公草;湖南:牛头猛(长沙),山高粱(麻阳);贵州:麦娘。

功效 全草:利水消肿,解毒。用于水肿,水痘。外用洗脚、治小儿腹泻,消化不良;种子:外用于蛇咬伤。

## 7332009

*Apluda mutica* L.

植物名 水蔗草《广州植志》

药材名 水蔗草《中药大辞典》

文献名 水蔗《高植图鉴》

地方名 [糯米草](台湾、广西);福建:雀麦、竹麦(泉州);台湾:秣米草,丝线草(台北);广西:竹子草,牙签草,假雀麦,崩疮草(平南),野香草(桂林)。

功效 根:外用于毒蛇咬伤;茎叶:外用于脚部糜烂;全草:用于阳痿,毒蛇咬伤。

## 7332010

*Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino

植物名 苘草《高植图鉴》

药材名 苘草《本草》、《中药大辞典》

文献名 蓐竹《诗经》,王刍《毛诗传》,蓐草《说文》,黄草《吴普本草》,蓐、蓐、鹑脚莎《尔雅》郭璞注,蓐草《汉书》晋灼注,蓐草《唐本草》,细叶莠竹、[毛竹]《广州植志》

地方名 马耳草(东北),马耳朵草(河北、云南);内蒙古:“希日-宝都格-额布苏”(蒙名);贵州:苘竹。

功效 全草:止咳定喘,杀虫洗疮。

## 7332011

*Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino var. *centr-asiaticus* Honda

植物名 中亚苘草《高植图鉴》

药材名 苘草《汇编》

地方名 内蒙古:“希拉-包都嘎-乌布斯”(蒙名)。

功效 全草:止咳平喘,解毒。

## 7332012

*Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino var. *cryptanthus* (Hack.) Honda

植物名 匿芒苘草《高植图鉴》

药材名 匿芒苘草《广西药录》

地方名 广西:捉克坝(罗城)。

功效 全草:用于肺结核。

## 7332013

*Arundo donax* L.

植物名 芦竹《高植图鉴》

药材名 芦竹《四川中药志》

文献名 获芦竹《本草汇言》,芦获头《岭南采药录》,绿竹《分类草药性》,冬密草《广州植志》,获《中国植物图鉴》

地方名 芦竹根(四川、浙江);广东:水芦强;广西:芦获竹(南宁),芦获、孝竹(永福);四川:楼梯杆、蓐竹笋、芦竹笋(重庆);贵州:芦猫竹;云南:芦蒿笋,泡芦柴。

功效 根茎及嫩笋芽:清热泻火。用于热病烦渴,风火牙痛,小便不利。

## 7332014

*Avena chinensis* (Fisch. ex Roem. et Schult.) Metzg. ---

*Avena nuda* auct. non L.

植物名 莠麦《名实图考》、《中国植志》

药材名 青稞《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 青稞麦《齐民要术》,油麦《山西志》,裸燕麦《云南种录》

地方名 内蒙古:尤麦。

功效 种仁:下气宽中,壮筋益力,除湿发汗,止泄。

备考 有些文献将学名误订为 *A. nuda* L.

## 7332015

*Avena fatua* L.

植物名 野燕麦《中国植志》

药材名 燕麦草《四川中药志》

文献名 青稞麦《名实图考》,乌麦《植物学大辞典》,燕麦草《种称》

地方名 [浮小麦]、野麦(湖南、广西),野麦草(广西、四川);内蒙古:“哲日力格-胡西古-布达”(蒙名);青海:燕麦;湖南:野麦根,野麦蓐,野浮麦,野小麦,野麦蒿,浮麦;云南:[瞿麦]。

功效 全草:收敛止血,固表止汗。用于崩漏,自汗,盗汗。

## 7332016

*Avena fatua* L. var. *glabrata* Peterm.

植物名 光稃野燕麦《中国植志》

药材名 野燕麦《云南药录》

文献名 光野燕麦《云南种录》

地方名 云南:[瞿麦](丽江、昭通)。

功效 带花植株:利尿,通经。用于水肿,淋病。

## 7332017

*Avena fatua* L. var. *mollis* Keng

植物名 光轴野燕麦《神农架药录》

药材名 野卡麦《神农架药录》

功效 种子:补虚,止汗。

### 7332018

*Avena sativa* L.

植物名 燕麦《中国植志》

药材名 燕麦《救荒本草》、《汇编》

文献名 雀麦《唐本草》,乌麦《中国植物图鉴》,香麦、铃当麦《禾本科图说》

地方名 [浮小麦](广西、福建),大麦(东北);内蒙古:“胡西古—布达”(蒙名);福建:鬼麦(宁德、福安);湖南:观音麦;其他:麦片(加工品),牛皇草,杜姥草。

功效 果实:除湿止汗,益气。

### 7332019

*Bambusa disseminator* McClure

植物名 坭刺竹《高植图鉴》

药材名 簕竹(广东、广西)、《广西药录》

文献名 坭簕竹《禾本科图说》

地方名 广东:坭竹,猪鬃脯;广西:车筒竹,刺竹,泥竹。

功效 根:用于狂犬病;竹茹:用于胃热呕吐。

### 7332020

*Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch.

植物名 凤凰竹《纲目》、《高植图鉴》

文献名 孝顺竹、孝子竹《树分》,观音竹《中国竹类植物志略》,凤尾竹、孝行竹、土用竹《禾本科图说》,罗汉竹《华北树木志》,扫把竹《云南种录》

地方名 江西:扎蔑竹,月月竹;台湾:蓬菜竹。

功效 全株:清热利水,除烦。用于尿路感染,热病心烦。

### 7332021

*Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch. f. *alphonsookarii* (Mittf.) Sasaki

植物名 花凤尾竹《高植图鉴》

文献名 花孝顺竹、东方竹《禾本科图说》,黄金间碧玉竹《云南种录》

地方名 四川:花竹,线竹。

功效 全株:清热利水,除烦。

### 7332022

*Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch. var. *nana* (Roxb.) Keng f.

植物名 凤尾竹《高植图鉴》

文献名 观音竹《广州经植》,凤凰竹《禾本科图说》

功效 全株:清热利水,除烦。

### 7332023

*Bambusa oldhami* Munro—*Sinocalamus oldhami* (Munro) McClure

植物名 绿竹《竹谱详录》、《植分学报》

药材名 绿笋片《中药大辞典》

文献名 绿笋干《竹谱详录》,玉版笋《纲目》,绿蓉片、草鞋底、蝴蝶尖《纲目拾遗》

地方名 台湾:乌药竹、长枝竹、效脚绿、竹茹;广东:坭竹、[石竹]、毛绿竹。

功效 苗(新笋)的制成品:用于寒喘,消痰;竹茹:解热。

### 7332024

*Bambusa omeiensis* Chia et H. L. Fung—*Sinocalamus affinis* (Rendle) McClure

植物名 慈竹《竹谱详录》、《植分学报》

药材名 慈竹《纲目》、《汇编》

文献名 子母竹《任昉《述异记》》,义竹、孝竹《李衍《竹谱详录》》,慈竹沥、慈箬《纲目》,慈竹笋《分类草药性》,慈竹叶、慈竹气笋《草木便方》

地方名 丛竹(四川、贵州);四川:阴笋子、阴慈竹笋子(受病害之嫩笋)、竹叶心、竹茹、甜慈、酒慈、钓鱼慈。

功效 嫩叶:清热,利尿。用于头昏,热病心烦,小便短赤;未出上病笋苗:清热,解毒,止血。用于消渴,小便热痛,脱肛,小儿头身热疮,刀伤;笋壳:用于吐血、犬咬伤;根:下乳;花:用于瘡伤吐血;竹沥:疗热风。用于中风口禁,产后中风等。

### 7332025

*Bambusa pervariabilis* McClure

植物名 撑篙竹《广州植志》

药材名 撑篙竹《广西药录》

地方名 广东:油竹、白眉竹、花眉竹(广州)

功效 未张开的嫩叶:清热除烦。用于小儿烦躁不眠,热病烦渴。

### 7332026

*Bambusa sinospinosa* McClure

植物名 车角竹《高植图鉴》

药材名 簕竹《汇编》

文献名 笏竹、籐竹、答黎竹、糯竹、莒竹《竹谱详录》,刺竹笋《纲目》,刺竹《赞宁《笋谱》》,笏竹笋《岭南采药录》,刺楠竹《中国竹类植物志略》

地方名 车筒竹、大竹、大籐麻竹、水籐竹(广东、广西);广东:麻竹(茂名);广西:刺竹。

功效 竹叶:凉血止痢,清热生津。用于小儿高热,感冒风热,尿路感染,鼻衄;竹笋:用于消化不良,痢疾;竹茹:清热利尿。用于胃热呕吐,呃逆。

### 7332027

*Bambusa textilis* McClure

植物名 青皮竹《广州植志》

药材名 天竺黄《开宝本草》、《药典》

文献名 竹青《开宝本草》,天竹黄《本草衍义》,竹黄《纲目》,竹糖《伪药条辨》

地方名 广东:山青竹,地青竹;广西:小青竹。

功效 秆内的分泌液干燥后块状物:清热豁痰,凉心定惊。用于热病神昏,中风痰迷,小儿痰热惊痫、抽搐、夜啼。

### 7332028

*Bambusa tuldoidea* Munro

植物名 青秆竹《药典》

药材名 竹茹《本草经集注》、《药典》

文献名 水竹《广州植志》,竹皮、竹二青、〔淡竹茹〕《简明中医辞典》

功效 茎的干燥中间层;清热化痰,除烦止呕。用于痰热咳嗽,胆火挟痰烦热呕吐,惊悸失眠,中风痰迷,舌强不语,胃热呕吐,妊娠恶阻,胎动不安。

## 7332029

*Bambusa ventricosa* McClure

植物名 佛竹《高植图鉴》

药材名 佛竹叶心(拟)

文献名 佛肚竹《广州植志》

地方名 广西;凸肚竹。

功效 嫩叶;清热除烦。用于热病心烦,小儿夜啼。

## 7332030

*Bambusa vulgaris* Schrad. ex Wendl. var. *striata* Gamble

植物名 黄间碧竹《成都古今记》、《广州植志》

文献名 挂绿竹《拉汉英种称》

地方名 青丝金竹(广东、广西)。

功效 嫩叶;清热。

## 7332031

*Beckmannia syzigachne* (Spreng.) Fernald

植物名 茜草《中国植志》

药材名 茜草《本草拾遗》

文献名 皇、守田、守气《尔雅》,蔞米《尔雅翼》,水稗子《满州植录》,蔞草《江苏植志》

地方名 内蒙古:“没乐黑音—萨木白”(蒙名)。

功效 种子及全草;去热,利胃肠,益气力。

## 7332032

*Brachiaria villosa* (Lam.) A. Camus --- *Panicum villosum* Lam. --- *Panicum grossarium* Roxb. --- *Panicum coecospermum* Steud.

植物名 毛臂形草《中国植志》

药材名 毛臂形草《广西药录》

功效 全草;清热利尿。用于小便赤涩,大便秘结。

## 7332033

*Brachystachyum densiflorum* (Rendle) Keng

植物名 短穗竹《高植图鉴》

药材名 竹沥《中药通报》

地方名 苦竹(江苏、浙江);江西;油竹。

功效 竹沥;疗热风。

## 7332034

*Bromus japonicus* Thunb.

植物名 雀麦《高植图鉴》

药材名 雀麦〔全草〕《唐本草》、《中药大辞典》,雀麦米〔种子〕《纲目》、《中药大辞典》

文献名 萧《尔雅》,爵麦《说文》,燕麦《尔雅》郭璞注,杜姥草《千金方》,杜姥草《广济方》,牛星草《纲目》,野梅蒿《植物名汇》

地方名 〔浮小麦〕(浙江、湖南);内蒙古:“抑高布日”(蒙名);山东:山大麦,瞌睡草,山稷子;江苏:韭麦。

功效 全草;止汗、滑肠。用于汗出不止;种子:滑

肠,益肝和脾。

## 7332035

*Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv.

植物名 沿沟草《高植图鉴》

药材名 沿沟草《青藏药图》

地方名 内蒙古:“那古日干纳”(蒙名);青海:“冬布嘎拉”(藏名)

功效 全草;清热凉血,生津养液。

## 7332036

*Chrysopogon aciculatus* (Retz.) Trin.

植物名 鸡谷草《广西本草选编》

药材名 鸡谷草《广西本草选编》

文献名 紫穗茅草、竹节茅草《岭南科学杂志》

地方名 粘人草、粘身草、蜈蚣草(广东、广西);广东:草蟋草(惠阳),过路蜈蚣(南投);海南:草子花;广西:竹节草,鬼谷草,鸡谷子,鸡谷根,鸡谷草根,公菌草,粘身子草,草子,草谷子(北流),草纸根(北海)。

功效 全草;清热利水,解毒止痛。用于感冒发热,暑热腹痛泻泄,小便赤涩,金创肿痛。

## 7332037

*Coix lacryma-jobi* L. --- *C. agrestis* Lour.

植物名 川谷《救荒本草》、《汇编》

药材名 川谷根《汇编》

文献名 薏珠子《图经》,草珠子、菩提子、薏珠、西番蜀秫《救荒本草》,必提珠、必提珠根、鼻涕珠根《滇南本草》,念珠《纲目》,草菩提、打碗子根《草木便方》,五谷根《分类草药性》,草珠子、大碗子《植物名汇》,葡芦《新纲》,六谷米《形性鉴别》,六谷子《中药志》

地方名 野米仁(安徽、江西),野薏米(广东、贵州、云南、湖南、甘肃),野薏仁(云南、四川),草珠子米(东北、山东),谷实(东北),庭珠子(江西、湖南),尿珠子(湖南、四川、云南),念佛珠(江苏、浙江),菩提珠(江苏、河北),六谷(江苏、湖北);甘肃:薯担子,鸦球;山东:野珠珠(历城),草珠珠(潍坊),草珠子仁,铁玉米(费县),铁玉蜀黍(烟台);江苏:玉节;浙江:介狗珠;安徽:铁芦秫,玉米珠子,玉豆子;江西:数珠子、凉帽珠(德兴);台湾:野母珠;湖北:草子;湖南:尿珠子(长沙、黔阳),尿桐子树(黔阳),藪珠根(长沙),秀珠子(常德),土苡仁、催生子(古丈),山苡米、桂珠黍(酃县),便婆菊(道县),蓼茶子(永兴),六角米(溆浦);广西:老鸦珠,穿谷,鸟谷(那坡),野串台(天峨),鬼珠子(桂林),尿塘珠;四川:尿珠根(成都),五谷子根,尿珠子根,尿当珠,打碗子;贵州:珠珠米,铁谷子,五谷子,野五谷;云南:素珠果,野玉米、阿者(红河),野绿米,“麻垒牛”(傣语);其他:菩素珠,六谷珠,鬼珠箭,尿塘草,水珠,佛珠子。

功效 根;清热,利湿,杀虫。用于尿路感染,尿路结石,水肿,脚气,蛔虫病,白带过多等。

## 7332038

*Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* (Roman.) Stapf --- *C. lacryma-jobi* L. var. *frumentacea* Makino

植物名 薏苡《药典》



药材名 慈苡仁《别录》、《药典》

文献名 慈苡人、慈苡子、解蠡《本经》, 屋美、起实、糠《别录》, 糯米、梗米《雷公炮炙论》, 感米《千金·食治》, 玉秫《杨氏经验方》, 芭实《纲目》, 苡米《药品化义》, 米仁《本草崇原》, 苡仁《本草新编》, 苡仁《临证指南》, 苡米《本草求真》, 苡仁米、苡苡米《植物名汇》, 玉珠、米珠、起目、苡黍、卓鱼目、苡米仁、珠子米《新编》, 药玉米、水玉米、沟子米《东北药植志》

地方名 内蒙古: “图布壮—陶布其”(蒙名); 江苏: 苡苡仁(盱眙、云台山); 江西: 米仁粟(泰和); 福建: 胶念珠、益米(闽东), 罗米珠子(宁化); 四川: 软壳苡苡; 贵州: 珠珠米; 其他: 回回米。

功效 种仁: 健脾渗湿, 除痹止泻, 清热排脓。用于水肿, 脚气, 小便不利, 湿痹拘挛, 脾虚泄泻, 肺病, 肠痈, 扁平疣。

### 7332039

*Cymbopogon caesius* (Nees) Stapf

植物名 青香茅《高植图鉴》

药材名 青香茅《广西药录》

地方名 广西: 桔香草(凤山), 香花草(忻城)。

功效 全草: 用于阳痿。

### 7332040

*Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf

植物名 香茅《高植图鉴》

药材名 香茅《岭南采药录》、《汇编》

文献名 大风茅《岭南采药录》, 柠檬茅《种称》, 柠檬香茅《中药通报》, 茅香草《广州植志》, 香茅草《中草药学》

地方名 枫茅(广东、广西); 广东: 柠檬草(广州), 风茅草, 风茅(翁源), 辣芒(惠阳); 广西: 青茅、白茅、牛腿芒(北流); 四川: 姜草, 香巴茅, 香草; 贵州: 茅草茶, 姜巴茅, 姜巴草(望谟); 云南: “沙海”(西双版纳傣语)。

功效 全草: 祛风除湿, 消肿止痛。用于风湿疼痛, 头痛, 胃痛, 腹痛, 腹泻, 月经不调, 产后水肿, 跌打瘀血肿痛, 化脓性中耳炎。

### 7332041

*Cymbopogon distans* (Nees) A. Camus -- *Andropogon distans* Nees, ex Steud.

植物名 芸香草《云南通志》、《高植图鉴》

药材名 芸香草《四川中药志》

文献名 非叶芸香草、非叶云香草《滇南本草》, 诸葛草《种称》, 芸香茅《中国经植志》, 芸香草油《药典》

地方名 陕西: 筋骨草(陕南); 四川: 臭茅草, 臭草(南川), 山臭草(蓬溪), 牛不吃草, 小香茅草, 香茅筋骨草, 茅草筋骨(重庆); 云南: 石灰草(昆明), 山茅草, 香茅草, 星秀草(红河), 香草, 细叶茅草, 麝香草(丽江、大理), 野芸香草(大理)。

功效 地上部分: 散寒渗湿, 止咳平喘, 行气宽中。用于风寒感冒, 喘咳, 风湿痹痛, 胸腹胀痛; 挥发油: 平喘, 松弛支气管平滑肌。用于慢性支气管炎, 支气管哮喘等。

备考 《云南通志》卷六十九引《一统志》: “芸香

草, 出昆明, 有二种: 一名五叶芸香, 能治疮毒, ……一名非叶芸香, 能治瘰疬。”按后者即指本品而言, 与《滇南本草》非叶芸香草相符。

### 7332042

*Cymbopogon goeringii* (Steud.) A. Camus -- *Andropogon goeringii* Steud.

植物名 橘草《高植图鉴》

药材名 橘草《广西药录》

文献名 桔草《拉汉英种称》

地方名 山东: 茅草(日照); 江西: 野香茅(庐山); 广西: 五香草(上林); 贵州: 臭草。

功效 全草: 用于慢性气管炎; 根: 用于阳痿。

### 7332043

*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle --- *Andropogon nardus* L.

植物名 枫茅《高植图鉴》

药材名 香水茅(台湾)

文献名 亚香茅《广西药录》

地方名 香茅(台湾、广西); 广西: 风茅。

功效 秆叶: 提取香茅油, 又名金橘油。用于祛风除湿, 消肿止痛。

### 7332044

*Cymbopogon tortilis* (Presl) A. Camus --- *Anulustiria tortilis* Presl

植物名 扭鞘香茅《高植图鉴》

药材名 扭鞘香茅《广西药录》

文献名 野香茅《广州植志》, 芸香草《形性鉴别》

地方名 茅香草、臭草(云南、贵州); 广东: 括花草; 广西: 生姜草(宁明), 细香草(罗城)。

功效 全草: 用于疟疾, 疮毒, 驱蚊、蠓。

### 7332045

*Cynodon dactylon* (L.) Pers.

植物名 狗牙根《中国植志》

药材名 铁线草《滇南本草》、《汇编》

文献名 绊根草、蟹头草《名实图考》, 马挽手《分类草药性》, 行仪芝《中国植物图鉴》

地方名 巴根草(华东); 浙江: 铜丝草(瑞安); 湖北: 狗牙筋(神农架); 湖南: 牛马根, 马根子草, 动地虎、蟋蟀草(麻阳、新邵), 绊草根(衡山); 广西: 鸡肠草(北流); 贵州: 铁丝堆; 云南: 铺地草(昆明), 红杆铁线草(红河), “牙片”(西双版纳傣语); 其他: 铁心草, 疙疸皮, 疙疸草, 锅巴草, 铁巴皮, 牛筋草, 草皮子。

功效 全草及根茎: 清热利尿, 散瘀止血, 舒筋活络。用于上呼吸道感染, 肝炎, 痢疾, 泌尿系感染, 鼻衄, 咯血, 便血, 脚气水肿, 风湿骨痛, 荨麻疹, 半身不遂, 手脚麻木, 跌打损伤。外用于外伤出血, 骨折, 疮痈, 小腿溃疡。

### 7332046

*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv. --- *Dactyloctenium aegyptiacum* (L.) Willd. --- *Cynosurus aegyptius* L.

植物名 龙爪茅《中国植志》

地方名 广西: 油草, 风车草, 野茅草(南宁)。

功效 全草;补气。

## 7332047

*Dendrocalamus giganteus* Munro --- *Sinocalamus giganteus* (Wall.) Keng f.

植物名 龙竹《植分学报》

药材名 天竹黄《汇编》

文献名 竹黄《开宝本草》,印度麻竹《树分》,苏麻竹《种称》,大麻竹《高植图鉴》,天竺竹黄、竹膏《中草药学》,“瓦波”(缅甸语)《禾本科图说》

地方名 云南:“梅和”(傣语),天竺草。

功效 茎秆内的分泌液干燥后的块状物;清热豁痰,宁心定惊。用于热病神昏,小儿惊风抽搐,中风痰迷不语。

## 7332048

*Dendrocalamus strictus* (Roxb.) Nees

植物名 牡竹《高植图鉴》

药材名 牡竹《广西药录》

文献名 “梅茵瓦”(缅甸语)《云南种录》

地方名 广西:竹米子(北流)。

功效 花:清热,利尿。

## 7332049

*Diarrhena manshurica* Maxim.

植物名 龙常草《高植图鉴》

药材名 龙常草《别录》

文献名 棕心草《新华本草纲要》

功效 全草:主轻身,益阴气。用于痹寒湿。

## 7332050

*Digitaria ciliaris* (Retz.) Koel. --- *D. adscendens* (H. B. K.) Henrard

植物名 升马唐《中国植志》

功效 全草;止血。

## 7332051

*Digitaria ischaemum* (Schreb.) Schreb. ex Muhl. --- *Panicum ischaemum* Schreb.

植物名 止血马唐《中国植志》

药材名 止血马唐《庐山中草药》

地方名 内蒙古:“哈日-西巴棍-塔布格”(蒙名);甘肃:叉子草;江苏:抓秧草(邳县)。

功效 全草;止血。用于内外出血。

## 7332052

*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. --- *Panicum sanguinale* L.

植物名 马唐《中国植志》

药材名 马唐《别录》,《中药大辞典》

文献名 羊麻、羊粟《别录》,马饭《本草拾遗》,莠草、马饭、莠子、秆子《纲目》,红水草《经济植物学》,乱子草《指示植物》,假马唐《岭南科学杂志》

地方名 俭草(东北);山东:秫秸秧(日照);江苏:板地筋,铺地草;四川:细鸡爪;云南:马鹿草,“牙勇”(西双版纳傣语)。

功效 全草;止血。

## 7332053

*Digitaria violascens* Link

植物名 紫马唐《中国植志》

文献名 五指草《广州植志》

地方名 江苏:莠草。

功效 全草;止血。

## 7332054

*Echinochloa caudata* Roshev. --- *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. var. *caudata* (Roshev.) Kitag.

植物名 长芒稗《中国植志》

文献名 旱稗《九谷考》

地方名 内蒙古:“搔日特-奥存-好努格”(蒙名),长芒野稗。

功效 根及幼苗;止血。用于创伤出血不止。

## 7332055

*Echinochloa colonum* (L.) Link --- *E. crusgalli* var. *ze-layensis* (H. B. K.) Hitchc.

植物名 光头稗《名实图考》,《中国植志》

药材名 光头稗子《浙江药植志》

文献名 芒稗《禾本科图说》

地方名 江苏:稗草;湖北:稗子(神农架);广东:扒草。

功效 根;利尿,止血。用于水肿,腹水,咯血。

## 7332056

*Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. --- *Panicum crusgalli* L. --- *Pennisetum crusgalli* (L.) Baumg.

植物名 稗《中国植志》

药材名 稗《纲目》,《中药大辞典》

文献名 稗子《救荒本草》,稗米《滇南本草》

地方名 京铤(东北),水稗(吉林、河南);吉林:水稗草;北京:旱稗,草子;内蒙古:“奥存-好努格”(蒙名),野稗;山东:稗子草(历城),野稗子(沂源、泰山),稗子草(无棣),水稗子(崂山);江苏:侧草,扁扁草,稗草(宜兴);湖北:水稗子(神农架);广西:水高粱(龙州);贵州:毛稗;其他:光豆稗,乌禾,竹耳朵草。

功效 根、苗叶:外用于金疮及损伤出血不止;稗米:益气健脾。

## 7332057

*Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. var. *mitis* (Pursh) Peterm.

植物名 无芒稗《中国植志》

地方名 内蒙古:“搔日归-奥存-好努格”(蒙名),落地稗。

功效 根、幼苗;止血。用于创伤出血不止。

## 7332058

*Echinochloa frumentacea* (Roxb.) Link --- *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. var. *frumentacea* (Roxb.) W. F. Wight

植物名 湖南稗子《名实图考》,《中国植志》

药材名 稗子《救荒本草》

功效 种仁:补中益气,透疹,消食。

## 7332059

*Echinochloa hispidula* (Retz.) Nees --- *Echinochloa crus-*

*gelli* (L.) Beauv. var. *hispidula* (Retz.) Honda

植物名 旱稗《九谷考》、《中国植志》

地方名 内蒙古：“乌日特-奥存-好努格”(蒙名)，水田稗；湖南：“每控”、“困”(侗语)。

功效 根、幼苗：止血。用于创伤出血不止，感冒发烧，呕吐。

### 7332060

*Eleusine coracana* (L.) Gaertn.

植物名 稗《中国植志》

药材名 龙爪粟《纲目》、《中药大辞典》

文献名 龙爪稗《授时通考》，鸭爪稗《纲目》，鸭爪粟《品汇精要续集》，鸡爪粟、云南稗《医林纂要》，雁爪稗《三岐志》，稗子《禾本科图说》

地方名 山东：草种子(日照)；湖南：副粟，“狗山”(侗语)；广东：鸭距粟(广州)；广西：野铲粟(南宁)，鸭脚粟，铲稗；贵州：红稗。

功效 种仁：补中益气，透疹，消食。用于麻疹未透，小儿消化不良。

备考 《云南种录》(1984)认为本种为龙爪稗，有些文献以本种为《救荒本草》之“稗子”是误订。

### 7332061

*Eleusine indica* (L.) Gaertn.

植物名 牛筋草《中国植志》

药材名 牛筋草《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 牛骨草《滇南本草》，千金草《纲目拾遗》，蟋蟀草《嘉兴府志》

地方名 千人踏(福建、广西)，千斤草(浙江、上海、广西)，[千斤拔](浙江、福建)，鸭脚草(福建、广东)，黍仔草、牛鞭草(福建、台湾)，将军草(云南、广西)；山东：蹲倒驴(莒县)；上海：油葫芦草，尺盆草；江苏：老驴蹄；浙江：牛粪草(杭州)，牛蒡金娘草(余姚)；安徽：炮竹草；江西：扁草，水枯草；福建：粟仔越、野鸡爪、粟牛茄草(闽东)，粟子草(大田)，稗仔草(永春)，牛古草(武平)，牛皮草(龙岩)，牛弓草，牛弓墩，鼠尾草，野鸭姆梯(周宁)，鱼人参(宁化)，韧鼻草(清流)，马筋草(明溪)；湖北：牛尿蟋蟀草(武汉)；湖南：路边草，吊牛桩、牛对扣、露水草、稳牙草(长沙)，踩不死(通道)，野铲子(新邵、麻阳、永兴)；广东：百夜草、润躬草(潮阳)，假粟草；广西：稗子草，[乌饭草](北海)，假稗，野鸭脚粟、鹅掌草(凤山)，硬筋草(北流)；贵州：打鸡草；云南：“牙怕怀”(西双版纳傣语)。

功效 全草：清热解毒，祛风利湿，散瘀止血。用于防治流行性乙型脑炎，流行性脑脊髓膜炎，风湿性关节炎，黄疸型肝炎，小儿消化不良，肠炎，痢疾，尿道炎。外用于跌打损伤，外伤出血，狗咬伤。

### 7332062

*Eragrostis atrovirens* (Desf.) Trin. --- *Eragrostis chariis* (Schult.) Hitchc.

植物名 鼠妇草《中国植志》

地方名 广东：鱼串草(潮阳)；广西：串鱼草(北流)。

功效 全草：清热利湿。用于暑热病，尿赤，痢疾。

### 7332063

*Eragrostis ciliaris* (All.) Vignolo-Lutati

植物名 大画眉草《中国植志》

药材名 星星草《汇编》

文献名 西连画眉草《秦岭植志》

地方名 内蒙古：“套木—呼日嘎拉吉”(蒙名)；河南：画眉草、小画眉草(新乡)。

功效 全草：疏风清热，利尿。用于膀胱结石，肾结石，肾炎等；花序：解毒，止痒。用于黄水疮。

### 7332064

*Eragrostis ferruginea* (Thunb.) Beauv.

植物名 知风草《大明一统志》、《中国植志》

药材名 知风草《汇编》

地方名 山东：[香草](莒县)；湖北：露水草(神农架)；贵州：程咬金(贵阳)。

功效 根：活血散瘀。用于跌打损伤。

### 7332065

*Eragrostis japonica* (Thunb.) Trin.

植物名 乱草《中国植志》

地方名 江西：碎米知风草；广东：[旱田草](广州)；贵州：香榧草，须须草。

功效 全草：清热凉血。用于咳血，吐血，高血压。

### 7332066

*Eragrostis minor* Host --- *Eragrostis poaeoides* Beauv.

植物名 小画眉草《中国植志》

药材名 星星草《汇编》

文献名 蚊蚊草《指示植物》

地方名 内蒙古：“胡日嘎拉吉”(蒙名)。

功效 全草：疏风清热，利尿。用于膀胱结石，肾结石，肾炎等；花序：解毒，止痒。用于黄水疮。

### 7332067

*Eragrostis nevinii* Hance

植物名 华南画眉草《中国植志》

文献名 广东画眉草《高植图鉴》，尼氏画眉草《广州植志》，清远画眉草《广西植录》

地方名 广西：石骨儿(岑溪)。

功效 叶：止血。

### 7332068

*Eragrostis nigra* Nees ex Steud.

植物名 黑穗画眉草《中国植志》

药材名 露水草《贵州草药》

地方名 贵州：牛草。

功效 全草或根：清热，止咳，镇痛。用于百日咳，急慢性腹痛。

### 7332069

*Eragrostis perennans* Keng

植物名 宿根画眉草《中国植志》

地方名 广西：串鱼草(北流)。

功效 全草：用于痢疾。

### 7332070

*Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.

植物名 画眉草《名实图考》、《中国植志》

药材名 星星草《汇编》

文献名 榧子草《名实图考》，蚊子草《种称》  
地方名 内蒙古：蚊蚊草、香花草（包头），“呼日嘎拉吉”（蒙名）；山东：狗尾巴草（费县）。

功效 全草：疏风清热，利尿。用于膀胱结石，肾结石，肾炎等；花序：解毒，止痒。用于黄水疮。

## 7332071

*Eragrostis pilosa* (L.) Beauv. var. *imberbis* Franch.

植物名 无毛画眉草《中国植志》

地方名 内蒙古：“给鲁给日—呼日嘎拉吉”（蒙名）。

功效 全草：疏风清热，利尿；花序：解毒，止痒。

## 7332072

*Eragrostis tenella* (L.) Beauv. ex Roem. et Schult. --- *Eragrostis amabilis* (L.) Wight

植物名 鲫鱼草《中国植志》

药材名 乱草《汇编》

文献名 碎米知风草《植物学大辞典》，须须草《汇编》

地方名 广西：南部知风草，小画眉草；贵州：香榧草。

功效 全草：清热凉血。用于咳血，吐血。

## 7332073

*Eulalia speciosa* (Debeaux) Kuntze

植物名 金茅《高植图鉴》

功效 根、茎：行气破血。用于妇女病，干潮热，止血。

## 7332074

*Eulaliopsis binata* (Retz.) C. E. Hubb.

植物名 拟金茅《高植图鉴》

药材名 衰草《四川中药志》

地方名 衰衣草（河南、四川、云南），龙须草（陕西、广西、云南）；广西：羊茅、撻烟草；云南：羊草，山草，山草根，山茅草。

功效 全草：止血散瘀，清热利尿。用于衄血，尿血，血滞经行不畅，热淋，小便不利。

## 7332075

*Fargesia spathacea* Franch.

植物名 拐棍竹《高植图鉴》

药材名 拐棍竹《汇编》

文献名 华桔竹《种称》，华桔草《植物名词汇编》

地方名 青海：竹叶，淡竹叶；湖北：龙头竹、山竹（神农架）。

功效 叶：清热除烦，解渴利尿。用于发热烦躁，口渴，小便短少，色黄。

## 7332076

*Festuca ovina* L.

植物名 羊茅《秦岭植志》

药材名 羊茅《纲目》

文献名 酥油草《种录》

地方名 内蒙古：“宝体乌乐”（蒙名），细草。

功效 全草捣汁：用于喉痹肿痛。

## 7332077

*Hackelochloa granularis* (L.) O. Kuntze

植物名 球穗草《高植图鉴》

文献名 亥氏草《禾本科图说》，球颖草《鼎湖山植物手册》

地方名 湖北：瘪米（蓝山县瑶名）。

功效 全草：用于淋症，小儿发热。

## 7332078

*Hemarthria compressa* (L.f.) R. Br.

植物名 扁穗牛鞭草《高植图鉴》

文献名 马铃薯《广州植志》，牛鞭草《鼎湖山植物手册》

地方名 湖南：“马愿草”（侗语）；广东：牛仔草，牛草，鞭草。

功效 全草：用于感冒发烧。

备考 《中国植物图鉴》和《广州植志》之牛鞭草，为其变种 *var. fasciculata* (Lam.) Keng. 《拉英汉种称》以 *H. altissima* (Poir.) Stapf et C. E. Hubb. 为牛鞭草。

## 7332079

*Heteropogon contortus* (L.) P. Beauv.

植物名 黄茅《高植图鉴》

药材名 黄茅《纲目》、《汇编》

文献名 地筋、管根、土筋《别录》，黄菅茅《纲目》，山草、荒草《名实图考》，扭黄茅《广州植志》

地方名 广西：茅刺草（北流），老虎须；贵州：毛针子草，风气药（铜仁），毛锥子（安龙）。

功效 根茎：凉血止血，清热利尿。用于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，黄疸，水肿，热淋涩痛，急性肾炎水肿。

## 7332080

*Hierochloa glabra* Trin.

植物名 光稃茅香《高植图鉴》

文献名 光稃香草《种称》

备考 根茎：在陕西混作白茅用。

## 7332081

*Hierochloa odorata* (L.) Beauv. --- *Holcus odoratus* L.

植物名 茅香《高植图鉴》

药材名 茅香《本草拾遗》、《汇编》

文献名 茅香花《开宝本草》，香麻《图经》，香茅《纲目》，香草《种称》

地方名 内蒙古：“搔日乃”（蒙名）。

功效 根茎：凉血，止血，清热利尿。用于吐血，尿血，急慢性肾炎浮肿，热淋；花序：温胃，止呕。用于心腹冷痛。

备考 长沙马王堆一号汉墓出土药物中之茅香为本品。李时珍云：茅香凡有二，此是一种香茅也。其白茅香则是南番一种香草。（《纲目》卷十四）。又陕西省神木县以茅香的根茎代白茅根入药是错误的。

## 7332082

*Hierochloa odorata* (L.) Beauv. var. *pubescens* Kryl.

植物名 毛鞘茅香《高植图鉴》

药材名 毛鞘茅香《汇编》

功 效 根茎:凉血,止血,清热利尿;花序:温胃,止呕。

### 7332083

*Hordeum vulgare* L.

植物名 大麦《别录》、《高植图鉴》

药材名 麦芽《纲目》、《药典》

文献名 彝《广雅》,大麦蘖《药性论》,麦蘖《日华子本草》,大麦毛、大麦芽《滇南本草》,牟麦《纲目》,饭麦、赤膊麦《医林纂要》

地方名 山西:草大麦;内蒙古:“阿日白”(蒙名);青海:黑大麦;四川:谷麦。

功 效 果实经发芽干燥:行气消食,健脾开胃,退乳消胀。用于食积不消,脘腹胀痛,脾虚食少,乳汁郁积,乳房胀痛,妇女断乳;生麦芽:健脾和胃通乳。用于脾虚食少,乳汁郁积;炒麦芽:行气消食回乳。用于食积不消,妇女断乳;焦麦芽:消食化滞。用于食积不消,脘腹胀痛;果实:和胃,宽肠,利水。用于食滞泄泻,小便淋痛,水肿,烫火伤;幼苗汁:用于诸黄,小便不利;麦杆:消肿,利湿,理气。

### 7332084

*Hordeum vulgare* L. var. *nudum* Hook. f.

植物名 裸麦《名实图考》、《高植图鉴》

药材名 矿麦蘖《别录》、《中药大辞典》

文献名 稊麦《别录》,麦芽《纲目》,青稞《高植图鉴》,绿青稞《中草药通讯》,青稞《植分学报》

地方名 山西:草麦。

功 效 发芽颖果:消食,和中;种子:轻身,除热,健行。

### 7332085

*Hymenachne assamica* (Hook. f.) Hitchc.

植物名 弊草《高植图鉴》

药材名 弊草《广西药录》

功 效 全草:用于肺结核。

### 7332086

*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) C. E. Hubb. --- *I. cylindrica* (L.) Beauv. var. *koenigii* (Retz) Durand et Schinz

植物名 白茅《高植图鉴》

药材名 白茅根《药典》

文献名 茅根、兰根、茹根《本经》,地菅、地筋、兼杜《别录》,白茅菅《本草经集注》,菅花《唐本草》,白茅针、茅针、茅笋《本草拾遗》,白茅花、白茅花根《日华子本草》,茅芽根《救荒本草》,茅锥《刘禹锡《传信方》》,丝茅《纲目》,茅蜜《医林纂要》,茅萸、茅根《名实图考》,茅芽《医学衷中参西录》,甜草《尔雅义疏》,大风茅《岭南采药录》,毛节白茅《东北药植志》,蓝根《药材学》,大白茅《云南种录》

地方名 白茅草、地筋根(江苏、广西),茅花(安徽、云南),丝茅草(四川、湖南、湖北、江西、陕西、广东),万根草(辽宁、河北、福建),茅针花(江苏、山东、浙江、云南),茅草根(江苏、安徽、浙江、台湾、河北、湖北、陕西、四川),黄茅草、

毛草、黄茅(湖南、广东、广西),甜草根(河北、陕西),甜根草(山东、河南),丝茅根、丝毛根(湖北、江西、湖南);辽宁:毛草根(彰武);北京:万根子草;河北:坚草根,尖草根;内蒙古:“乌拉休吉”(蒙名);青海:地节根;山东:〔地龙〕;江苏:茅盏花(云台山),茅草花(泰州),毛针花(镇江、无锡、苏州);上海:茅柴根;浙江:红茅(淳安),茅草金针(乐清);江西:芭茅根(德兴),女茅(宜黄);福建:寒草根、贤草根、旱蔗根(闽东),茅蔗根(建阳),含草根(泉州),禾蓉根(福州、闽侯),茅蓉根、圆草根(福安),草草皮,茅尖;台湾:茅仔草;湖南:霜根草、野芦花(长沙),穿山甲、穿山虎(古丈),〔过山龙〕,〔穿山龙〕(麻阳),钻地龙(浏阳),钻地虎(黔阳),〔赶山鞭〕(怀化),土麻根(会同);广东:茅根草(从化、花县、南海、番禺),茅根须(增城、东莞),茅根花(广州),黄茅根(南海、番禺),苏茅(惠阳),独脚丝茅(增城);四川:丝毛草根,茅草叶(重庆);云南:尖刀草;其他:黄狗毛,干茅,毛黄草,毛子草,茅,茅仔,茅花芽,尖叶草,白尖草根,针根,狗衣点,野菅根,贱草,茅子草根

功 效 根茎:清热利尿。用于血热吐血,衄血,尿血,热病烦渴,黄疸,水肿,热病湿痛,急性肾炎水肿。

### 7332087

*Indocalamus latifolius* (Keng) McClure

植物名 阔叶箬竹《高植图鉴》

药材名 阔叶箬竹《浙江药植志》

文献名 东坡竹《伊阳县志》,箬竹《种称》,箬竹《经济植物学》,实竹《华北树木志》

地方名 江苏:〔淡竹叶〕;浙江:粽箬,竹箬(龙泉);其他:粽叶。

功 效 叶及叶柄:清热解毒,止血。用于喉痹,失音;果:妇女血崩。

### 7332088

*Indocalamus tessellatus* (Munro) Keng f.

植物名 箬竹《高植图鉴》

药材名 箬叶《纲目》、《中药大辞典》,箬蒂〔叶基部〕《本经逢原》、《中药大辞典》

文献名 箬、辽叶《纲目》,箬竹《植物学大辞典》

地方名 贵州:粽巴叶。

功 效 叶:清热止血,解毒消肿。用于吐血,衄血,下血,小便不利,喉痹,痈肿;叶基部:用于胃热呃逆。

### 7332089

*Indosasa crassiflora* McClure

植物名 大节竹《高植图鉴》

药材名 天竹黄《汇编》

功 效 茎秆内伤液自然干燥后结成的块片状物:清热豁痰,宁心定惊。用于热病神昏谵语,中风痰壅,小儿惊风抽搐。

### 7332090

*Isachne miliacea* Roth ex Roem. et Schult. --- *I. geniculata* Griff. --- *Isachne globosa* auct. non (Thunb.) Kuntze

植物名 类黍柳叶箬《中国植志》

药材名 柳叶箬《庐山中草药》

文献名 百珠筱、细叶筱《禾本科图说》

地方名 福建:观音竹(厦门)。

功效 全草:用于退潮热。

备考 有些文献将本种误订为 *I. globosa* (Thunb.)

Kuntze

### 7332091

*Leersia hexandra* Swartz

植物名 六蕊假稻《高植图鉴》

药材名 游草《四川中药志》

文献名 莠草《尔雅》,田中游草《分类草药性》,李氏禾《种称》,蓍草《广州植志》,西游草《民药汇编》

地方名 四川:牛黄,游丝草(蓬溪),水游草,过江草(南充)。

功效 全草:疏风解表,清热利湿,活络止痛。用于感冒,风湿筋骨疼痛,疟疾,尿道炎。

### 7332092

*Leersia hexandra* Swartz var. *japonica* (Makino) Keng f. --- *Leersia japonica* Makino

植物名 假稻《高植图鉴》

药材名 假稻《贵州草药》

地方名 浙江:批壳草;湖南:水关门,关门草,“娘鸡帕”(侗语);贵州:水游草。

功效 全草:除湿利水。用于风湿麻痹,下肢浮肿。

### 7332093

*Leersia oryzoides* (L.) Swartz var. *japonica* Hack

植物名 批壳草《高植图鉴》

文献名 批谷草《江苏植志》,假稻、批颖草《汇编》

地方名 湖北:假稻谷(神农架)。

功效 全草:清热,解表。用于感冒,疟疾,目赤肿痛。

### 7332094

*Leptochloa chinensis* (L.) Nees --- *Poa chinensis* L.

植物名 油草《云南种录》

药材名 油草《湖南药物志》

文献名 畔茅《禾本科图说》,〔千金子〕《广西药录》

地方名 湖南:油麻。

功效 全草:行水破瘀,攻积聚,散痰饮。用于癥瘕,久热不退。

### 7332095

*Leymus secalinus* (Georgi) Tzvel. --- *Aneurolepidium dasystachys* (Trin.) Nevski

植物名 赖草《中国植志》

药材名 赖草《汇编》

文献名 厚穗碱草、蓼草《禾本科图说》,冰草、厚穗冰草《沙漠药植》,宾草《高植图鉴》,冰草白穗《中药大辞典》

地方名 老披碱(山西、吉林);内蒙古:“乌伦—黑雅嘎”、“通克”(蒙名);青海:厚穗赖草;其他:滨草。

功效 根茎、全草:清热利湿,止血。用于淋病,赤

白带下,哮喘,痰中带血。

### 7332096

*Lingnania chungii* (McClure) McClure - *Bambusa chungii* McClure

植物名 粉单竹《高植图鉴》

药材名 粉单竹《中药大辞典》

地方名 广东:单竹、白粉单竹,乌节单竹,吴节单竹,猪蹄竹,双眉单竹,生竹心,竹卷心,竹叶卷心,竹针,竹必,竹笔老。

功效 叶芽:用于感冒发热,皮疹,小便不利等。

### 7332097

*Lophatherum gracile* Brongn.

植物名 淡竹叶《高植图鉴》

药材名 淡竹叶《纲目》、《药典》,碎骨子(根茎及块根)《纲目》、《中药大辞典》

文献名 竹叶门冬青《分类草药性》,竹叶麦冬《中国药植志》,淡竹米《药材学》,米身草《中药通报》

地方名 山鸡米(广东、广西、江西),山鸡谷,迷身草(广东、广西),野麦冬(江苏、广西),簕草、麻布丁(华南),山麦冬(浙江、福建);江苏:长竹叶(苏州),阴竹梢,草淡竹;浙江:枕竹叶,淡竹麦冬(金华、衢县),野门冬(江山);安徽:水竹子;福建:〔麦冬〕(上杭),山麦冬叶(龙岩),土麦冬(罗源、周宁、闽东),草子山麦冬,林下竹、竹下卵、竹叶粘(闽东),杜园竹(泉州);湖南:竹叶草(长沙),水竹叶(凤凰、溆浦);广东:淡竹(普宁、陆丰、潮阳、潮安、五华等),生鸡米(连平、惠阳、儋县),生鸡谷、红鸡谷、白鸡谷(化县),山鸡屎(阳春),竹鸡米,虱婆草,碎骨草(鼎湖山);海南:小竹草(海口、定安、屯昌、乐东);广西:金竹叶,山冬,山鸡壳,地竹;云南:〔竹叶〕;其他:金鸡米。

功效 茎叶:清热除烦,利尿。用于热病烦渴,小便赤涩淋痛,口舌生疮;根茎、块根:清热利尿,滑胎。用于堕胎催生,咽喉肿痛。

### 7332098

*Lophatherum sinense* Rendle

植物名 中华淡竹叶《高植图鉴》

文献名 淡竹叶《华北药察》

功效 地上部分:清热除烦,利尿。

### 7332099

*Melica scabrosa* Trin.

植物名 臭草《高植图鉴》

药材名 猫毛草《沙漠药植》

文献名 肥马草、枪草《种称》,〔金丝草〕《沙漠药植》

地方名 内蒙古:“少格书日嘎”(蒙名)。

功效 全草:利水通淋,清热。用于尿路感染,肾炎水肿,感冒发烧,黄疸性肝炎,糖尿病。

### 7332100

*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb ex Schum. et Lauterb.

植物名 五节芒《高植图鉴》

药材名 苦芦骨《汇编》

文献名 芭茅《纲目》,芭茅根《分类草药性》,芭仔

## 《台湾植志》

地方名 江苏:立荻,大碟子草;浙江:芒秆;湖北:丝毛草(神农架);广东:葫芦骨(潮阳);贵州:巴茅果(惠水),马儿杆,牛草果,大巴茅。

功效 幼茎内虫瘿:发表,理气,调经。用于小儿疹出不透,小儿疝气,月经不调,胃寒作痛,筋骨扭伤,淋病;根茎:利尿,止渴。用于热病口渴,小便不利;花序:活血,通经。用于月经不调。

## 7332101

*Miscanthus nepalensis* (Trin.) Hack.

植物名 尼泊尔芒《高植图鉴》

药材名 巴尔生《四川中药志》

地方名 四川:马儿杆,铁巴茅。

功效 根茎及其枯芽:清胃热,生津,止呕。用于胃热口渴,呕恶,妊娠呕吐。

## 7332102

*Miscanthus sacchariflorus* (Maxim.) Benth. et Hook. f.

植物名 荻《纲目》、《高植图鉴》

药材名 巴茅根《汇编》

文献名 荻《诗经》,乱、狼尾草《尔雅》,蓬、莠《玉篇》,雉《释言》,荻《说文》,荻芒、马尾《诗毛氏传疏》

地方名 狼尾巴花(东北);黑龙江:卷毛红;内蒙古:“乌也图一查干”(蒙名);其他:大茅根。

功效 根茎:清热活血。用于妇女干血癆,潮热,产妇产后口渴,牙痛。

## 7332103

*Miscanthus sinensis* Anderss.

植物名 芒《高植图鉴》

药材名 芒《本草拾遗》、《汇编》

文献名 杜荣、荻、《尔雅》,芭芒《太平寰宇记》,芭茅《纲目》,芭茅根《分类草药性》,荻《经植手册》,大巴尔生、马二杆《汇编》

地方名 冬茅草、芭茅草(湖南、湖北、四川);辽宁:剑高草,白尖草;河南:芭芒;湖北:巴茅(神农架);广西:芒花草(恭城);四川:芭茅(峨眉山);贵州:小巴茅;其他:家芒,芦芒,八月芒,莽稗杆,度芒,苦房草,八王草,鸡爪。

功效 花序:活血通经。用于月经不调,半身不遂;根茎:利尿,止渴。用于小便不利,热病口渴;气笋子(幼茎内有寄生虫):调气,补肾,生津。用于妊娠呕吐,精枯阳痿。

## 7332104

*Miscanthus sinensis* Anderss. var. *purpurascens* (Anderss.) Matsum. --- *M. purpurascens* Anderss.

植物名 紫芒《高植图鉴》

功效 根茎、花穗:解毒利尿,活血。

## 7332105

*Neyraudia reynaudiana* (Kunth.) Keng

植物名 类芦《高植图鉴》

文献名 聊箭杆子、石珍茅、望冬草《广州植志》,假芦《禾本科图说》

地方名 广西:飞竹叶,篱笆竹(南宁、马山),石芒草

(武鸣)。

功效 嫩苗、竹沥:清热解毒,止血利尿。用于毒蛇咬伤,尿路感染。

## 7332106

*Oryza sativa* L.

植物名 稻《高植图鉴》

药材名 稻芽《纲目》、《药典》,陈仓米《食性本草》、《汇编》

文献名 稌《诗经》,嘉蔬《礼记》,粳、秣《广雅》,占稻、早稻《纲目》;果实发芽:糜米《别录》,谷粳《澹寮方》,谷芽、稻芽《纲目》;久储色变之粳米:陈廩米《别录》,陈米《百一选方》,旧禾《普济方》,火米、老米《纲目》;种仁:粳米《别录》,粳粟米、大米《滇南本草》,粳米《本草蒙筌》,硬米《本草求真》;种皮:舂杵头细糠《别录》,谷白皮《千金翼方》,细糠《圣惠方》,杵头糠《圣济总录》,米泔《汪颖《食物本草》》,米皮糠《纲目》,米糠《验方新编》;稻谷或米之蒸馏液:米露、米油《纲目拾遗》,粥油《重庆堂随笔》;米泔:渐二泔《戴原礼《证治要诀》》,梗米泔《外台秘要》,米泔《纲目》,梗米泔《本草从新》;禾梗:稻草、稻草节《滇南本草》,禾秆《纲目》,怀胎草《分类草药性》,再生稻《民药汇编》;谷芒:稻穗《日华子本草》,稻谷芒《本草拾遗》,谷颖《纲目》;炒米粉:米麦炒《唐本草》,稷(刘熙《释名》),粳《本草拾遗》;锅巴(王站桂《不药良方》),锅焦、黄金粉《纲目拾遗》,焦锅巴《汇编》;饴糖、胶饴《本草经集注》,饴《方言》,饴糖《补缺肘后方》,饴糖《食疗本草》,软糖《蜀本草》,糖饴《正字通》;病糖:梗谷奴《纲目》

地方名 禾(广东、广西),水稻、稻米(华东、西南、中南);内蒙古:“道图日嘎”(蒙名);广西:翻莞禾;四川:抱孙谷;其他:陆稻。

功效 稻芽:消食和中,健脾开胃。用于食积不消,腹胀口臭,脾胃虚弱,不饥食少;久储色变之粳米(陈仓米):养胃,渗湿,除烦;梗米:补中益气,健脾和胃,除烦渴,止泻痢;粳米:温中健脾,益卫养荣,长肌肤,调脏腑;种皮(米糠):用于噎膈,脚气;米露(新米或稻谷之蒸馏液):和中纳食,清肺开胃;米油(煮米粥时上浮稠液):滋阴长力,肥五脏百窍,利小便通淋;米泔水:清热凉血,利小便;茎叶:宽中下气,消食积;谷芒:用于黄病,解蛊毒;炒米粉:解烦热,止泄,止渴;焦锅巴:补气,运脾,消食,止泄泻;饴糖(加工品):缓中,补虚,生津,润燥;梗谷奴(水稻感染稻曲拟黑粉菌后之果穗):用于走马喉痹。

## 7332107

*Oryza sativa* L. var. *glutinosa* Matsum

植物名 糯稻《中药志》

药材名 糯稻根《本草求真》、《汇编》,糯米《千金·食治》、《汇编》,糯米泔《外台秘要》、《中药大辞典》

文献名 根:糯稻根须《本草再新》;种仁:糯米《别录》,江米《本草原始》,元米《随息居饮食谱》;米泔水:粘米泔水《本草述》;禾梗:稻糠《肘后

方), 稻蕒《崔氏纂要方》, 稻秆(刘禹锡《传信方》), 糯谷草《滇南本草》

地方名 江苏: 稻根须(靖江), 粘稻, 稻根枝; 湖北: 糯谷(神农架); 四川: 糯谷草根须, 酒谷(峨眉山)。

功效 根茎及根: 益胃生津, 退虚热, 止盗汗; 种仁: 补中益气。用于消渴瘦多, 自汗, 便泄; 米泔水: 益气, 止烦渴, 解毒; 禾梗: 用于黄病; 草灰: 用于跌打损伤, 消渴, 烫火伤疮, 解毒等。

#### 7332108

*Panicum miliaceum* L.

植物名 稷《纲目》、《中国植志》

药材名 稷米、黍米《别录》、《中药大辞典》

文献名 黍《诗经》, 粟米、稷米、黍稷《补缺肘后方》, 糜子米《饮膳正要》, 黍茎《食疗本草》, 糜糠《广济方》, 黍根《纲目》, 糜《中国植志》

地方名 米子(东北); 北京: 红谷芽; 内蒙古: “蒙古乐一阿木”、“囊给一阿木”(蒙名), 黄米; 湖北: 粟谷(神农架); 云南: 谷子, 禾; 其他: 鸭蹄黍, 黏米, 黏黍米。

功效 种子: 益气补中。用于泻痢, 烦渴, 吐逆, 咳嗽, 胃痛, 小儿鹅口疮, 烫伤; 茎、根: 有小毒。用于妊娠尿血, 利小便, 水肿等。

备考 粘者为黍, 不粘者为稷, 《别录》、《纲目》将黍、稷别为二种。近代植物学文献则多合而为一, 民间又将粘的称黍, 不粘的称糜。

#### 7332109

*Panicum notatum* Retz. --- *P. cordatum* Buse

植物名 心叶稷《中国植志》

地方名 广西: 土淡竹叶(陆川、苍梧)。

功效 全株: 清热生津。

#### 7332110

*Panicum repens* L.

植物名 铺地黍《中国植志》

药材名 铺地黍《汇编》

地方名 硬骨草(福建、广西); 福建: 马铃降(福州), 马鞭条(古田), 马鞭节(南平), 风台草(晋江、同安、厦门), 苦露草(晋江), 大广草; 广东: 海螺角、枯骨草(阳春); 广西: 田基姜, 竹蒿草头, 藤竹草(武鸣)。

功效 根茎及全草: 清热平肝, 利湿解毒。用于高血病, 鼻窦炎, 鼻出血, 湿热带下, 尿路感染, 肋间神经痛, 黄疸型肝炎, 跌打损伤, 毒蛇咬伤, 疮疖, 外伤出血。

#### 7332111

*Paspalum paspaloides* (Michx.) Scribn. --- *Paspalum distichum* L.

植物名 双穗雀稗《中国植志》

药材名 铜钱草《滇南本草》

功效 全草: 活血, 生血, 养血。用于跌打损伤, 骨碎筋断, 筋骨疼痛, 除湿祛风, 解热。

#### 7332112

*Paspalum scrobiculatum* L. --- *P. orbiculare* G. Forst. --- *Paspalum longifolium* Roxb.

植物名 鸭跖草《中国植志》

文献名 约稗雀稗《云南种录》, 雀稗《广州植志》, 圆果雀稗《广州经植》, 长叶雀稗《华南经济禾草植物》

地方名 广西: 稗子。

功效 全草: 清热利尿, 驱蚊。

#### 7332113

*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.

植物名 狼尾草《高植图鉴》

药材名 狼尾草《本草拾遗》、《汇编》

文献名 狼《诗经》, 童粱《毛诗传》, 孟、狼尾《尔雅》, 藁郎《说文》, 宿田翁、守田(陆玕《诗疏》), 狼茅《本草拾遗》, 莠草、小芒草《名实图考》, 狗尾草《分类草药性》

地方名 油包草、苋草(江苏、湖北), 油草(山东、辽宁), 老鼠狼、狗仔尾(湖南、广东), 大狗尾草(广西、四川); 山东: 韧丝草(昆嵛山、莱阳、荣成), 拐头草(费县、莒南、临朐), 拐草, 山箭子草; 浙江: 累步草(宁波), 雷耳蒲(温州), 乌犬尾(丽水); 湖南: 光明草(长沙); 广东: 老鼠根(广州); 四川: 黑狗尾草; 贵州: 大光明草。

功效 根茎及全草: 清肺止咳, 凉血明目。用于肺热咳嗽, 咯血, 目赤肿痛, 痈疮肿毒。

#### 7332114

*Pennisetum centrasiaticum* Tzvel. --- *Pennisetum flaccidum* Griseb.

植物名 白草《中国植志》

药材名 白草根《汇编》

地方名 [白茅根](辽宁、宁夏、青海、陕西); 内蒙古: “昭巴拉格”(蒙名); 青海: “都尔哇”(藏名), 倒生草; 四川: 白花草。

功效 根茎: 清热凉血, 利尿。用于急性肾炎尿血, 鼻衄, 肺热咳嗽, 胃热烦渴等。

#### 7332115

*Phaenosperma globosa* Munro ex Benth.

植物名 显子草《中国植志》

药材名 显子草《贵州草药》

文献名 乌珠茅《禾本科图说》

地方名 江西: 大子草; 湖北: 竹叶草(神农架); 贵州: 岩高粱, 岩高粮。

功效 全草: 补虚, 健脾, 活血, 调经。用于经闭、病后体虚。

#### 7332116

*Phalaris arundinacea* L.

植物名 蔺草《中国植志》

药材名 五色草《汇编》

文献名 蔺《尔雅》, 草芦《植物学大辞典》, 马羊草、笋竹《汇编》

地方名 内蒙古: “宝拉格—额布苏”(蒙名),

功效 全草: 用于妇女红、白带, 月经不调。



## 7332117

*Phleum paniculatum* Huds.

植物名 蜡烛草《高植图鉴》

文献名 假看麦娘、鬼蜡烛《禾本科图说》

地方名 四川：霸王鞭（南充）。

功效 全草：活血止痛，祛风除湿 用于跌打损伤，风湿关节痛等。

## 7332118

*Phragmites communis* (L.) Trin. --- *P. australis* (Cav.) Trin. --- *P. longivalvis* Steudel

植物名 芦苇《高植图鉴》

药材名 芦根《本草经集注》、《药典》，芦茎、芦花、芦叶《唐本草》、《中药大辞典》，芦笋《图经》、《中药大辞典》

文献名 苇、葭《诗经》，芦《别录》，芦竹箨、[芦竹]《药对》，蒲苇《圣济总录》，苇子草《救荒本草》；根茎：芦茅根《会约医镜》，苇根《温病条辨》，芦茹根《草木便方》，顺江龙《天宝本草》，水芦菰《岭南采药录》，芦根《新纲》，芦头《中国药植志》，活芦根、活水芦根、鲜芦根《药材学》；茎：苇茎《千金方》，嫩芦梗《现代实用中药》；花：葭花《尔雅》，芦蓬草《小品方》，蓬荻《唐本草》，蓬草《图经》；叶：芦箬《本经逢原》；箬叶：芦荻外皮《圣惠方》；苗：荻《尔雅》，芦尖《要药分剂》

地方名 苇子（江苏、山东、安徽、河北、东北），苇芦子（东北），芦子（河北、江苏），芦柴（浙江、江苏、安徽），芦柴根（江苏、上海），芦根片（江苏、浙江），芦草根（河北、内蒙古），芦竹根（湖北、湖南），芦荻竹（广东、广西），水芦竹根（四川、台湾）；河北：苇子根；内蒙古：“胡鲁森-乌布斯”、“呼勒斯-好鲁苏”、“达木沙”（蒙名），芦子根；山东：芦茅根，芦棒子（平邑），大芦苇（广饶）；江苏：芦通（云台山），芦茅根片（南通），芦青；上海：芦头根；浙江：芦杆（温州）；河南：芦草，山芦草，芦山草；湖南：芦毛根（衡阳）；广东：芦根头，芦荻笋，水竹根；广西：禾杂竹，[过江龙]（桂林），大青龙，孝棒竹，水芦荻（南宁、永福）；四川：甜梗子，芦苇根；云南：芦柴杆、芦苇草（文山）；其他：草芦根。

功效 根茎：清热生津，除烦，止呕，利尿。用于热病烦渴，胃热呕逆，肺热咳嗽，肺痈吐脓，热淋涩痛；嫩茎：用于肺痈烦热；花：止血解毒；叶：用于止吐下泻，吐血，衄血，肺痈，发背；箬叶：用于金疮；笋：用于热病口渴，淋病，小便不利。

## 7332119

*Phragmites karka* (Retz.) Trin. ex Steud. --- *P. roxburghii* Steud.

植物名 大芦《高植图鉴》

药材名 水芦荻根《南宁药志》

文献名 卡开芦《广州植志》

地方名 海南：水竹；广西：水芦荻、山芦荻竹（南宁），芦荻竹（横县），[过江龙]，过江芦荻；其

他：芦柴，抛芦子根。

功效 根茎：清热，利尿。用于大热症发狂，热泻，肾炎水肿。

## 7332120

*Phyllostachys aurea* Carr. ex A. et C. Riviere --- *Phyllostachys formosana* Hayata - - *P. bambusoides* var. *aurea* (Carr. ex Riv.) Makino

植物名 罗汉竹《光山县志》、《植分学报》

药材名 人面竹《本草汇言》、《台湾中药材图鉴》

文献名 吴竹、五二竹、布袋竹、八面竹、多般竹、鹤膝竹、虎撑竹《坪井竹类图谱》，寿星竹《华北树木志》

功效 竿皮中层：作竹茹用。

## 7332121

*Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc. --- *P. reticulata* (Rupr.) C. Koch

植物名 刚竹《竹谱详录》、《高植图鉴》

药材名 刚竹《汇编》

文献名 台竹、鬼角竹、钢铁头竹《竹谱详录》，箭竹《纲目》，般竹、斑竹根《草木便方》，苦竹、桂竹《植物名汇》，竹实、竹米《本草新注》，光竹、皂角竹《树分》，网苦竹《江苏植录》，苦竹叶、苦竹茹《中国药植图鉴》，斑竹壳《民药汇编》，斑竹衣、花壳竹、[文竹]、瘦竹《中药大辞典》，金竹、黄竹《华北树木志》

地方名 江苏：石竹，烂头桂（江浦、宜兴）；上海：五月季（崇明）；浙江：五月季竹（安吉）；江西：麻竹；湖南：毛竹，竹子；广西：根竹。

功效 根茎及根：祛风热，通经络，止血。用于风热咳嗽，气喘，四肢顽痹，筋骨疼痛，妇女血崩；笋壳（箬）：清血热，透斑疹；花：用于猩红热；中层茎皮、茎汁、茎内片状物等：作竹茹、竹沥、竹黄入药。

## 7332122

*Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc. f. *tanakae* Makino ex Tsuboi --- *P. reticulata* f. *tanakae* Nakai

植物名 斑竹（浙江、河南、四川等）、《植分学报》

文献名 湘妃竹《商城县志》

功效 根、根茎：祛风热，通经络，止血。

## 7332123

*Phyllostachys glauca* McClure

植物名 粉绿竹《高植图鉴》

药材名 鲜竹沥《药典》

文献名 金竹、竹衣《纲目拾遗》，淡竹《浙江药植志》

地方名 洛宁淡竹（河南、山东），麻壳淡竹（浙江、山东）；江苏：蔑竹（靖江）；浙江：竹茹，淡竹茹，竹沥，霉竹，红淡竹。

功效 鲜竿加热后流出的液汁：清热化痰。用于肺热咳嗽痰多，气喘胸闷，中风舌强，痰涎壅盛，小儿痰热惊风。

## 7332124

*Phyllostachys glauca* McClure f. *yunzhu* J. L. Lu

植物名 筠竹《植分学报》

药材名 竹茹《新乡中草药》

文献名 斑竹、湘妃竹《光山县续志》，花斑竹《植分学报》

地方名 河南：二青竹茹（新乡）。

功效 中层竿皮（竹茹）：清热止呕，化痰。用于痰热烦闷，呕吐秽逆。

## 7332125

*Phyllostachys heteroclada* Oliver --- *P. congesta* Rendl. --- *P. purpurata* McClure

植物名 水竹《高植图鉴》

药材名 竹沥《中药通报》

地方名 江西：甜竹（峡江），尖尾竹（鹿岗大茅山）；广西：烟竹。

功效 中层秆皮：清热凉血，化痰止呕；竹沥：清热豁痰。

## 7332126

*Phyllostachys heteroclada* Oliver f. *solida* (S. L. Chen) C. P. Wang et Z. H. Yu

植物名 木竹（浙江）、《植分学报》

药材名 竹沥《中药通报》

地方名 实竹（山东、江西），实心竹（湖南、山东）。

功效 竹沥：清热豁痰。

## 7332127

*Phyllostachys iridescens* C. Y. Yao et S. Y. Chen

植物名 红哺鸡竹（浙江）、《植分学报》

药材名 竹沥《中药通报》

地方名 浙江：红壳竹（安吉）。

功效 竹沥：清热豁痰。

## 7332128

*Phyllostachys lithophila* Hayata

植物名 台湾石竹（拟）

药材名 竹茹（台湾）

文献名 [石竹]《台湾中药材图鉴》

功效 秆皮中层（竹茹）：清热化痰，除烦止呕。

## 7332129

*Phyllostachys makinoi* Hayata

植物名 台湾桂竹《植分学报》

药材名 箬笋（汪颖《食物本草》）、《中药大辞典》

文献名 箬竹《唐本草》，桂竹《图经》

地方名 浙江：麻壳竹；福建：棉竹，簕竹；台湾：桂仔竹，竹茹。

功效 笋苗：用于小儿痘疹不出；秆皮中层（竹茹）：清热化痰，除烦止呕。

## 7332130

*Phyllostachys meyeri* McClure

植物名 毛环竹《植分学报》

药材名 竹沥（浙江）

文献名 浙江淡竹《中草药》，小金竹《云南种录》

地方名 浙江：麻壳竹，淡竹。

功效 竹沥：清热豁痰。

## 7332131

*Phyllostachys nidularia* Munro

植物名 簕竹（浙江、江苏）、《高植图鉴》

文献名 花竹《中国竹类植物志略》，水竹《禾本科图说》

地方名 山东：篙竹，箬竹；浙江：枪刀竹；安徽：红壳莲；湖北：山竹（神农架）；广东：笔笋竹；广西：大节竹（武鸣）。

功效 花：清热，利尿；叶：清心热。

## 7332132

*Phyllostachys nigra* (Lodd.) ex Lindl.

植物名 紫竹《竹谱详录》、《高植图鉴》

药材名 紫竹根《草木便方》、《中药大辞典》

文献名 乌竹《汝南圃史》，黑竹《草木便方》，箬、水竹子《植物名汇》

地方名 墨竹（陕西、湖北）；湖南：油竹；四川：黑竹子根。

功效 根茎：祛风，破瘀，解毒，利尿。用于风湿痹痛，经闭，癥瘕，狂犬咬伤。

## 7332133

*Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro var. *henonis* (Mitf.) Stapf ex Rendle

植物名 淡竹《图经》、《高植图鉴》

药材名 竹茹《本草经集注》、《药典》，竹沥《本草经集注》，竹叶《本经》，竹卷心〔幼叶〕《生草药性备要》，淡竹根、仙人杖〔枯幼竹秆〕《本草拾遗》，淡竹笋〔汪颖《食物本草》〕，淡竹壳〔箬叶〕《纲目拾遗》，虫笋《新中医药》

文献名 茎皮中层：竹皮《金匱要略》，青竹茹《本草经集注》，淡竹茹《食疗本草》，麻巴《草木便方》，竹子青、竹二青《中草药学》；竹汁《本经》；叶：淡竹叶《别录》，青竹叶《滇南本草》；幼叶：竹针《生草药性备要》，竹心《本草再新》；根茎：恒生骨《石药尔雅》；枯幼竹秆：退秧竹《岭南采药录》，穗竹《药材资料汇编》；笋：中母笋（孟诜）；颖果：竹米《本草别录》；植名：水竹《纲目》，甘竹《群芳谱》，金竹花《植物名汇》，花苦竹、钓鱼竹、白夹竹、平竹《禾本科图说》，冬瓜皮竹、毛金竹《植分学报》，荆竹、罗汉竹《中药大辞典》

地方名 金竹（浙江、安徽、江西、福建、湖北、云南）；陕西：〔墨竹〕（秦岭）；江苏：杜园竹（苏州），白竹；浙江：金毛竹；安徽：竹叶心，竹叶卷心；江西：春花小竹；河南：线冬瓜皮竹，紫冬瓜皮竹；广西：〔紫竹〕，光苦竹，斑真竹；四川：水竹子，水竹沥，水竹油，百夹竹；云南：金竹叶；其他：淡竹油，草竹，火泉，天竹黄，如金竹。

功效 茎皮中层（竹茹）：清热化痰，除烦止呕。用于痰热咳嗽，胆火挟痰烦热呕吐，惊悸失眠，中风痰迷，舌强不语，胃热呕吐，妊娠恶阻，胎动不安；鲜茎火烤流出的液汁（竹沥）：清热化痰。用于肺热咳嗽痰多，气喘

胸闷, 中风舌强, 痰涎壅盛, 小儿痰热惊风; 叶: 清热除烦, 生津利尿。用于热病烦渴, 小儿惊痫, 咳逆吐衄, 面赤, 小便短赤, 口糜舌疮; 幼叶(竹卷心): 清心除烦, 消暑止渴; 根茎(淡竹根): 除烦热; 枯幼竹竿(仙人掌): 用于反胃, 吐乳, 水肿, 脚气, 疟疾, 痔疮; 笋(苗): 消痰, 除热狂; 箨叶(淡竹壳): 去目翳; 颖果: 益气, 下积; 虫笋(带虫笋干): 利水消肿。

## 7332134

*Phyllostachys nigripes* Hayata

植物名 乌竹《台湾中药材图鉴》

药材名 竹茹(台湾)

功效 竿皮中层: 清热化痰, 除烦止呕。

## 7332135

*Phyllostachys nuda* McClure

植物名 净竹《高植图鉴》

药材名 鲜竹沥《药典》

地方名 江苏: 灰竹; 浙江: [石竹]。

功效 竹沥: 清热化痰。用于肺热咳嗽痰多, 气喘胸闷, 中风舌强, 痰涎壅盛, 小儿痰热惊风。

## 7332136

*Phyllostachys parvifolia*

植物名 安吉金竹《植分学报》

药材名 竹沥《中药通报》

地方名 浙江: 金竹(安吉); 安徽: 红壳竹。

功效 竹沥: 清热化痰。

## 7332137

*Phyllostachys praecox* C. D. Chu et C. S. Chao

植物名 早竹《植分学报》

药材名 竹沥《本草经集注》、《中草药》

地方名 山东: 早园竹; 福建: 雷竹。

功效 竹茹、竹沥: 清热化痰, 除烦止呕。

## 7332138

*Phyllostachys praecox* C. D. Chu et C. S. Chao f. *notata* S. Y. Chen et C. Y. Yao

植物名 黄条早竹《植分学报》

功效 竹茹、竹沥: 清热化痰, 除烦止呕。

## 7332139

*Phyllostachys praecox* C. D. Chu et C. S. Chao f. *prevernalis* S. Y. Chen et C. Y. Yao

植物名 雷竹《植分学报》

功效 竹茹、竹沥: 清热化痰, 除烦止呕。

## 7332140

*Phyllostachys pubescens* Mazel ex H. de Lehaie --- *P. pubescens* var. *heterocycla* (Carr.) Mazel ex H. de Lehaie

植物名 毛竹《高植图鉴》

药材名 毛笋《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 茅竹笋《赞宁《笋谱》》, 猫头竹《新安志》, 江南竹《汝南圃史》, 猫竹、茅竹《群芳谱》, 猫儿头(箨叶)、边笋、鞭笋[笋之旁出者]、处笋片[毛笋微腌汤煮熏干]、绿笋片、玉版笋、草鞋底、蝴蝶尖、玉版、泥里黄[毛笋淡煮晒干]《纲目拾遗》, 孟宗竹《坪井竹类图谱》, 南竹、狸头竹《树分》, 茅茹竹《台湾植志》, 楠竹《植分学

报》, 龟甲竹《新华本草纲要》

地方名 湖南: 竹子, 黄竹, 水竹, 水竹叶, 野水竹; 广东: 大竹。

功效 叶、根茎(竹鞭)、笋: 清热, 利尿, 活血, 祛风, 消痰。

备考 《植分学报》(1980)称: H. de Lehaie 于 1907 年曾将 *P. pubescens* 作为 *P. edulis* 之异名, 因之过去许多学者均采用 *P. edulis* 作为毛竹之学名。但后来 McClure 等人认为 *P. edulis* 之基名为 *Bambusa edulis*, 非刚竹属植物, H. de Lehaie 的组合是错误的, 故又采用 *P. pubescens* 为毛竹之学名。

## 7332140a

*Phyllostachys stimulosa* H. R. Zhao et A. T. Liu

植物名 漫竹《植分学报》

药材名 竹沥《中药通报》

地方名 江西: 花竹(永丰)。

功效 竹沥: 清热化痰。

## 7332141

*Phyllostachys sulphurea* (Carr.) Riviere

植物名 金竹《竹谱详录》、《高植图鉴》

药材名 竹衣《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 金竹衣《景岳全书》, 黄金竹、黄竹、黄皮竹、黄竿《坪井竹类图谱》, 黄苦竹《中药大辞典》

功效 竿内衣服: 用于喉哑劳嗽; 竹沥: 清热豁痰。

## 7332142

*Phyllostachys viridis* (Young) McClure

植物名 胖竹《高植图鉴》

文献名 刚竹《竹谱详录》, 焦皮竹《华北树木志》

地方名 浙江: 光竹。

功效 竹茹、竹沥: 清热化痰, 除烦止呕。

## 7332143

*Phyllostachys viridis* (Young) McClure f. *houzeauana* C. D. Chu et C. S. Chao --- *P. viridis* (Young) McClure cv. Houzeau

植物名 绿皮黄筋竹《高植图鉴》

文献名 槽里黄刚竹《拉汉英种称》

功效 竹茹、竹沥: 清热化痰, 除烦止呕。

## 7332144

*Phyllostachys viridis* (Young) McClure f. *youngii* C. D. Chu et C. S. Chao --- *P. viridis* (Young) McClure cv. Robert

植物名 黄皮绿筋竹《植分学报》

文献名 金竹《高植图鉴》, 黄皮刚竹《山东树木志》

功效 竹茹、竹沥: 清热化痰, 除烦止呕。

## 7332145

*Phyllostachys vivax* McClure

植物名 乌哺鸡竹(浙江)、《植分学报》

药材名 竹沥《中药通报》

文献名 凤竹《华北树木志》

地方名 江苏: 雅竹; 上海: 三大头, 哺鸡头。

功效 竹沥: 清热豁痰。

## 7332146 见 7332140a

## 7332147

*Pleiblastus actinotrichus* (Merr. et Chun) Keng f.

植物名 流苏苦竹《高植图鉴》

文献名 射毛苦竹《禾本科图说》

地方名 广西:小竹(德保),萌竹(全竹);

功效 全株:祛风热。

## 7332148

*Pleiblastus amarus* (Keng) Keng f.

植物名 苦竹《本草经集注》、《高植图鉴》

药材名 苦竹叶、苦竹沥《别录》,苦竹茹、苦竹根《食疗本草》,苦竹笋、仙人杖(枯幼竹竿)《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 苦笋《食疗本草》,退秧竹《岭南采药录》,穗竹《药材资料汇编》,伞柄竹《树分》,〔石竹〕《华北树木志》

地方名 山东:乌云竹梢;安徽:竹叶心,竹叶卷心。

功效 嫩竹叶:清热,明目,利尿,解毒,杀虫。用于消渴,烦热不眠,咽痛,口疮,失音,烫火伤;竹沥:清火消痰,明目利尿;竹茹:下热壅,止尿血;竹根:下心肺五脏热毒;竹笋:清热,除湿,利尿,明目。用于消渴,面目黄,明目,脚气;枯幼竹竿:用于反胃,吐奶,水肿,脚气。

## 7332149

*Poa pratensis* L.

植物名 草地早熟禾《高植图鉴》

地方名 内蒙古:“塔拉音-伯页力格-额布苏”(蒙名)。

功效 根茎:在吉林长白山民间入药,有降血糖和尿糖作用。

## 7332150

*Poa sphondyliodes* Trin. ex Bunge

植物名 硬质早熟禾《高植图鉴》

药材名 龙须草《内蒙古中草药》

地方名 内蒙古:“毕日格-乌布斯”、“疏如棍-伯页力格-额布苏”(蒙名)。

功效 地上全草:清热解毒,利尿,止痛。用于小便淋涩,黄水疮。

## 7332151

*Pogonatherum crinitum* (Thunb.) Kunth

植物名 金丝草《高植图鉴》

药材名 金丝草《汇编》

文献名 金丝茅《禾本科图说》,金发草《拉汉英种称》

地方名 猫毛草(广东、广西、云南),黄毛草(广东、广西、湖南),牛尾草、墙头竹、猴毛草(广东、福建),笔仔草(福建、台湾),笔毛草(浙江、福建);浙江:簇毛草(泰顺);福建:猫仔草,眉毛草、金黄草、胡毛草(闽东),牛毛草,竹叶草,金杆真(福州、福清、泉州、晋江、闽北),云母(宁德),狮子草(泉州),园外舅(福安),拉屎草(永安),松毛草(宁化),油草(三明),〔金牛草〕,土帝公须;台湾:必子草,红毛草,笔尾草,笔须草,金甘精;广东:竹稿草(广州),猫尾草(增城、东莞、徐闻、海康、

廉江等),金花草(连平),搭壁竹(潮安、潮州、南澳、澄海),后坎草(揭阳、南溪、澄海),狐狸尾(潮安、潮州),笔修草(饶平),马尾丝(揭阳);广西:羊须草,牙莫草,毛毛草(上思),吉祥草;贵州:兔茅草(威宁);云南:马鞭草、细竹叶草、理纹草、鹧鸪草(红河),猪茅草。

功效 全草:清热解暑,利尿。用于感冒高热,中暑,尿路感染,肾炎水肿,黄疸型肝炎,糖尿病,小儿久热不退。

备考 《本草纲目》卷十三之“金丝草”,李时珍曰:“金丝草出庆阳(陕西)山谷,苗状当俟访问。”因此,本品是否即《纲目》之金丝草,有待进一步考证。

## 7332152

*Pogonatherum paniceum* (Lamk.) Hack.

植物名 金发草《高植图鉴》

药材名 金发草《广西药录》

文献名 竹稿草《禾本科图说》

地方名 广西:笔须,龙奶草(靖西),〔吉祥草〕(东兰)。

功效 全草:用于消化不良,小儿疳积。

## 7332153

*Pseudosasa japonica* (Sieb. et Zucc.) Nakai

植物名 矢竹《高植图鉴》

药材名 竹沥《中药通报》

文献名 箭竹、筱竹《禾本科图说》

地方名 江西:折竹(洪江)。

功效 竹沥:清热豁痰。

## 7332154

*Roegneria calcicola* Keng

植物名 钙生鹅观草《高植图鉴》

药材名 茅草箭《贵州药录》

地方名 贵州:草灵芝。

功效 全草:清热,凉血,化瘀止痛。用于劳伤咳血,风丹麻疹,劳伤疼痛。

## 7332155

*Roegneria kamoji* Ohwi

植物名 鹅观草《救荒野谱》、《中国植志》

药材名 鹅观草《汇编》

文献名 鹅冠草《救荒本草》,弯穗鹅观草《禾本科图说》,茅草箭、茅灵芝《汇编》

地方名 内蒙古:“黑雅嘎拉吉”(蒙名);山东:野麦草(崂山);浙江:莓串草(宁波);湖北:狗屎燕麦(神农架)。

功效 全草:清热,凉血,镇痛。用于咳嗽痰中带血,风丹,劳伤疼痛。

## 7332156

*Roegneria serotina* Keng ex Keng et S. L. Chen

植物名 秋鹅观草《中国植志》

药材名 茅草箭《贵州民间药物》

地方名 贵州:茅灵芝(印江)。

功效 全草:清热,凉血,镇痛。

## 7332157

*Rottboellia exaltata* L. f.

植物名 筒轴茅《高植图鉴》  
文献名 罗氏草、蛇尾草《种称》，南部俭草《禾本科图说》

功效 全株：用于小便不利。

## 7332158

*Saccharum arundinaceum* Retz.

植物名 斑茅《高植图鉴》

药材名 斑茅《中药大辞典》

文献名 大密《广州植志》

地方名 芒草（湖南、广东），芭茅（贵州、江西）；浙江：大叶芒秆；江西：大水茅；海南：片芒。

功效 根：通窍利水，活血通经。用于跌打损伤，筋骨风痛，妇人经闭，水肿胀；花穗：止血。用于咯血，吐血，衄血，创伤出血。

## 7332159

*Saccharum officinarum* L.

植物名 红甘蔗《云南种录》

药材名 甘蔗《别录》、《四川中药志》

地方名 云南：果蔗。

功效 蔗浆：润燥生津，解热和中。

## 7332160

*Saccharum sinense* Roxb.

植物名 甘蔗《高植图鉴》

药材名 甘蔗《别录》、《汇编》

文献名 薯蔗《南都赋》，干蔗、竿蔗《南方草木状》，竹蔗《食疗本草》，沙糖《唐本草》，白糖《子母秘录》，糖霜《日用本草》，蚰蔗《救荒本草》，甘蔗皮、甘蔗滓、白沙糖、紫沙糖《纲目》，赤沙糖《随息居饮食谱》，黑沙糖《本草原始》，红糖《医林纂要》，片黄糖《本草求真》，白霜糖《本草备要》，扶风蔗、蔗皮《纲目拾遗》，接肠草《重庆堂随笔》，糖梗《国药药理学》，蔗鸡〔节上所生之嫩芽〕《中药大辞典》

地方名 云南：“哒外唧”（西双版纳傣语）。

功效 秆、汁：除热止咳，和中，宽隔，行水。用于发热口干，肺躁咳嗽，咽喉肿痛，心胸烦热，反胃呕吐，妊娠水肿；茎皮：用于小儿口疳，秃疮，坐板疮；茎滓（烧灰存性）：用于秃疮，痈疽，疗肿；赤沙糖：补中缓肝，活血和瘀；节上嫩芽：用于消渴；根：用于痢肿，结热。

## 7332161

*Saccharum spontaneum* L.

植物名 甜根子草《高植图鉴》

地方名 广东：割手密；云南：斑毛花。

功效 根茎：四川南充专区代芦苇根入茶。

## 7332162

*Saccololopis indica* (L.) A. Chase

植物名 囊颖草《中国植志》

文献名 滑草、鼠尾黍《禾本科图说》

地方名 广西：狗尾草《陆川》，英雄草《北流》。

功效 全草：外用于跌打损伤。

## 7332163

*Sasa nubigena* Keng f.

植物名 金佛山赤竹《禾本科图说》

药材名 箬叶竹根《重庆草药》

文献名 箬叶根《分类草药性》，箬叶竹《中药大辞典》

功效 根：用于癆伤吐血，崩症，咳嗽，去风。

## 7332164

*Schizostachyum chinense* Rendle

植物名 华思劳竹《药典》

药材名 天竺黄《开宝本草》、《药典》

文献名 竹黄《开宝本草》，天竹黄《本草衍义》，竹膏《纲目》

功效 竿内分泌液干燥后的块状物：清热豁痰，凉心定惊。用于热病神昏，中风痰迷，小儿痰热惊痫、抽搐、夜啼。

## 7332165

*Schizostachyum dumerorum* (Hance) Munro

植物名 苗竹仔《禾本科图说》

文献名 簕竹、细叶苗竹《禾本科图说》

功效 根茎：入药称簕竹。

## 7332166

*Secale cereale* L.

植物名 黑麦《禾本科图说》

地方名 湖北：黑小麦《神农架》。

功效 种子：养心，益肾，健脾。穗上可寄生麦角。

## 7332167

*Setaria faberii* Herrm.

植物名 大狗尾草《中国植志》

药材名 大狗尾草《江西草药》

文献名 法氏狗尾草《禾本科图说》，谷莠子《华东禾本科植物志》

地方名 江西：狗尾巴，长狗尾，光明草；湖北：狗尾草《神农架》。

功效 全草：清热消痞，杀虫止痒。用于小儿疳积，风疹，龋齿牙痛。

## 7332168

*Setaria geniculata* (Lam.) Beauv.

植物名 莠狗尾草《中国植志》

药材名 莠狗尾草《汇编》

文献名 野粟《滇南本草》

地方名 福建：狗尾草《厦门》。

功效 全草：清热解毒。用于急性结膜炎，阳黄，痢疾；谷粒：补中益气，五劳虚烧。

## 7332169

*Setaria glauca* (L.) Beauv. --- *S. lutescens* (Weigel) F. T. Hubb.

植物名 金色狗尾草《中国植志》

药材名 金色狗尾草《汇编》

文献名 金狗尾草《吉野》，黄狗尾草《广州植志》

地方名 大头莠子（东北）；吉林：毛毛狗；甘肃：猫尾草；山东：莠子草（日照），小莠草（莱

荒); 江西: 光明草; 湖北: 黄毛莠, 金黄狗尾草, 狗尾子草 (神农架); 湖南: 狗尾草, 狗尾巴; 其他: 照鸡草, 金狗草。

功效 全草: 清热, 明目, 止泻。用于目赤肿痛, 眼睑炎, 赤白痢疾。

### 7332170

*Setaria italica* (L.) Beauv.

植物名 粱《中国植志》

药材名 谷芽《药典》, 粟米《别录》、《中药大辞典》

文献名 粟米、白粱米、青粱米、黄粱米《别录》, 白粱粟、粱米《本草经集注》, 粟谷《齐民要术》, 竹根米《千金·食治》, 竹根黄、粟米泔汁《唐本草》, 粟藁《本草衍义》, 小米《本草蒙筌》, 硬粟《医学入门》, 粟芽、粟糖《纲目》, 谷子、寒粟《名实图考》, 粟《中药志》

地方名 黄粟 (浙江、广东、广西), 稞子、稞子 (东北), 糠谷老、枪谷老 (华北), 狗尾粟 (广东、广西); 河北: 糠古老, 看谷老, 老谷穗, 老枪谷, 枪谷; 内蒙古: “那日衣木” (蒙名); 浙江: 狗尾巴粟 (台州), 北秫米; 湖北: 饭谷 (神农架)。

功效 发芽果实 (谷芽): 消食和中, 健脾开胃。用于食积不消, 腹胀口臭, 脾胃虚弱, 不饥食少; 种仁 (粟米): 和中, 益肾, 除热, 解毒。用于脾胃虚热, 反胃呕吐, 消渴, 泄泻; 糠秕谷穗 (糠谷老): 清湿热, 利小便。用于尿路感染, 浮肿, 小便不利。

备考 糠谷老为真菌类禾指梗霉 (粟白发菌) *Sclerospora graminicola* (Sacc.) Schroet. 寄生果穗上而形成的糠秕谷穗。

### 7332171

*Setaria italica* (L.) Beauv. var. *germanica* (Mill.) Schred.

植物名 粟《中国植志》

药材名 谷芽 (华北、东北)

文献名 粟米《别录》, 粟谷《齐民要术》, 粟藁《本草衍义》, 小米《本草蒙筌》, 粟芽、粟糖《纲目》, 谷子、寒粟《名实图考》

地方名 糠谷老 (华北); 河北: 糠古老, 看谷老, 老谷穗, 枪谷老, 老枪谷, 枪谷。

功效 发芽果实 (谷芽): 消食和中, 健脾开胃。用于食积不消, 腹胀口臭, 脾胃虚弱, 不饥少食; 种仁 (粟米): 和中, 益肾, 除热, 解毒。用于脾胃虚热, 反胃呕吐, 消渴, 泄泻; 糠秕谷穗 (糠谷老): 清湿热, 利小便。用于尿路感染, 浮肿, 小便不利。

### 7332172

*Setaria palmifolia* (Koen.) Stapf

植物名 棕叶狗尾草《中国植志》

文献名 荇草 (陆玕《诗疏》), 竹头草《名实图考》, 簕叶荇、棕茅 (禾本科图说), 涩船草《汇编》

地方名 海南: 雏茅; 广西: 棕叶草, 竹叶麦冬, 龙船草; 四川: 竹叶草 (成都); 贵州: 马草。

功效 根: 用于脱肛, 子宫脱垂; 全草: 解毒,

杀虫。用于疥癣, 疮毒。

### 7332173

*Setaria plicata* (Lam.) T. Cooke --- *S. excurrens* (Trin.) Miq.

植物名 皱叶狗尾草《中国植志》

药材名 马草《贵州民间药物》

文献名 毛竹叶、土淡竹叶《滇南本草》

地方名 [淡竹叶] (江苏、江西), 风打草 (福建、广西); 湖南: “两洞代”、“洞代”、“路赖” (侗语); 广西: 胞衣草 (恭城), 扭叶草 (金秀); 四川: 地棕 (南充); 贵州: 烂衣草, 棕巴草。

功效 全草: 解毒杀虫, 驱风。用于铜钱癣, 丹毒; 根: 用于胎动不下; 叶: 用于骨蒸劳热。

### 7332174

*Setaria viridis* (L.) Beauv.

植物名 狗尾草《中国植志》

药材名 狗尾草《纲目》、《汇编》

文献名 莠《诗经》, 光明草、阿罗汉草、莠草《纲目》, 狗尾半支《纲目拾遗》, 谷莠子《植物名汇》

地方名 狗尾巴草 (浙江、湖北); 北京: 莠草子; 河北: 光明子 (张家口); 天津: 撒不倒; 内蒙古: 莠子, 毛莠子, 毛莠莠, “乌热音一苏勒”、“西日一达日” (蒙名); 陕西: 米米毛 (眉县); 山东: 莠子草 (日照), 稗子草 (莒县), 毛谷 (威海); 江苏: 毛姑姑草 (铜山); 福建: 犬尾草 (福鼎、罗源), 犬尾曲, 狗仔虫草 (泉州、清流), 狗路尾 (三明), 狗毛尾 (大田), 大号犬尾露 (霞浦); 湖北: 绿毛莠、绿狗尾草 (武汉); 湖南: 小米草, 狗毛仙, 狗尾巴, 狗尾子; 广西: 金毛狗尾草; 四川: 毛狗草 (成都), “登其尼” (藏名); 贵州: 洗草。

功效 全草: 除热, 去湿, 消肿, 明目。用于风热感冒, 砂眼, 目赤疼痛, 黄疸肝炎, 小便不利。外用于瘰癧。

### 7332175

*Setaria viridis* (L.) Beauv. var. *purpurascens* Maxim.

植物名 紫狗尾草《吉野》

地方名 内蒙古: “宝日-西日-达日” (蒙名)。

功效 全草: 除湿, 去湿, 消肿, 明目。

备考 《中国植志》(第十卷) 将本变种并入原变种中。

### 7332176

*Sinocalamus beecheyanus* (Munro) McClure var. *pubescens* P. F. Li --- *Bambusa beecheyana* Munro var. *pubescens* (P. F. Li) Lin

植物名 大头典竹《高植图鉴》

药材名 竹茹《药典》

文献名 大头甜竹《中国竹类植物志略》, 大头典《植分学报》

地方名 广东: 甜竹 (鼎湖山)。

功效 茎的中间层 (竹茹): 清热化痰, 除烦止呕。用于痰热咳嗽, 胆火挟痰烦热呕吐, 惊悸失眠,

中风痰迷，舌强不语，胃热呕吐，妊娠恶阻，胎动不安。

## 7332177

*Sinocalamus minor* McClure --- *Dendrocalamus minor* (McClure) Chia et H. L. Fung

植物名 吊丝竹《高植图鉴》

功效 全株：用于风湿骨痛。

## 7332178

*Sorghum propinquum* (Kunth) Hitchc.

植物名 拟高粱《高植图鉴》

药材名 高粱七《汇编》

文献名 大茅根《汇编》

地方名 湖南：高粱三七，山高梁，水高粱；贵州：高粮七，水高粮，野高粮。

功效 根茎：清肺热，益气血。用于癆伤咳嗽，吐血。

## 7332179

*Sorghum vulgare* Pers.

植物名 高粱《高植图鉴》

药材名 高粱《纲目》、《汇编》

文献名 木稷、获粱《广雅》，蜀黍（张华《博物志》），芦穄《食物本草》，秣米《滇南本草》，蜀秣、蜀黍米、蜀黍根、高粱根、芦粟《纲目》，番黍《随治遗事》，番麦《广群芳谱》，高粱米糠《中草药学》

地方名 稻黍（陕西、甘肃、宁夏）；北京：北秣米，高粱米；内蒙古：“西喜”（蒙名）；台湾：芦黍；湖北：红苞谷（神农架）；四川：高粱子；贵州：高粱七〔根〕；云南：弯高粱。

功效 种子：燥湿祛痰，宁心安神。用于湿痰咳嗽，胃痞不舒，失眠梦多，食积；根：平喘，利尿，止血。用于咳嗽喘满，胃气疼痛，血崩，产后出血；高粱佛稻包（病穗）：清热，止血。用于一切失血之症；细糠：用于小儿消化不良。

## 7332180

*Sorghum vulgare* Pers. var. *saccharatum* Koern.

植物名 甜芦粟（江苏）

药材名 芦粟《滇南本草》

文献名 甜高粱《种称》

地方名 江苏：甜芦黍（苏北）。

功效 谷粒：温中，涩肠胃，止霍乱；根：用于利小便，止喘嗽，横胎难产，包衣不下。

## 7332181

*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.

植物名 鼠刺《台湾植物总目录》

文献名 老鼠笋《禾本科图说》，腊刺《高植图鉴》，猫鼠刺《海南植志》

地方名 海南：坡次草；广西：老鼠筋，老鼠枪。

功效 叶：用于刀伤。

## 7332182

*Spodiopogon cotulifera* (Thunb.) Hack. --- *Eccolopos cotulifera* (Thunb.) A. Camus

植物名 油芒《高植图鉴》

药材名 山高梁《湖南药物志》

文献名 秧草《新华本草纲要》

地方名 广西：红蓝草（凤山）。

功效 全草：清热解表，活血通经。用于风热感冒，闭经。

## 7332183

*Spodiopogon sagittifolius* Rendle

植物名 箭叶大油芒《禾本科图说》

药材名 茨菇草《云南中草药》

地方名 云南：催生草、灵芝草（红河），燕尾草，“阿的利诗”（彝族名）。

功效 全草：止血，催产，清热解表。用于难产，月经过多，胸膈气胀，阳痿，感冒，喉痛，小儿高热，蛇咬伤。

## 7332184

*Spodiopogon sibiricus* Trin.

植物名 大油芒《高植图鉴》

地方名 红毛公（东北）；黑龙江：红眼巴；辽宁：大白草；河北：大荻；内蒙古：“阿古拉音-乌拉乐吉”（蒙名），山黄菅；江苏：小鸭苗子。

功效 全草：止血，催产。用于月经过多，难产，胸闷，气胀。

## 7332185

*Sporobolus diander* (Retz.) Beauv.

植物名 双蕊鼠尾粟《中国植志》

地方名 广西：狗屎草（武鸣）。

功效 花：用于头晕，泄泻。

## 7332186

*Sporobolus fertilis* (Steud.) W. D. Clayt. --- *S. indicus* (L.) R. Br. var. *purpurea-suffusus* (Ohwi) T. Koyama --- *S. elongatus* auct. non R. Br.

植物名 鼠尾粟《中国植志》

药材名 鼠尾粟《福建中草药》

文献名 钩耜草《禾本科图说》

地方名 福建：线香草（三明），老鼠尾、铁射香（漳州），螃蟹草（莆田），鼠尾、牛顿草（漳州、龙海、厦门、同安、福清等）；广西：鼠尾草，牛尾草（东兰），狗屎草（蒙山）。

功效 全草：清热，凉血，解毒，利尿。用于流脑，乙脑高热神昏，传染性肝炎，赤白痢疾，热淋，尿血；根：用于经闭。

备考 有的文献将本种学名误订为 *S. elongatus* R. Br.

## 7332187

*Stenotaphrum helferi* Munro ex Hook. f.

植物名 钝叶草《中国植志》

地方名 广东：苡米草；广西：鸭口草（龙州）。

功效 全草：用于骨鲛喉，胃下垂，子宫脱垂，习惯性流产。

## 7332188

*Themeda caudata* (Nees) A. Camus --- *T. gigantea* (Cav.) Hack. var. *caudata* (Nees) Keng

植物名 苞苳草《高植图鉴》  
地方名 广西:老虎须(武鸣)。  
功效 芒:用于阳痿。

## 7332189

*Themeda triandra* Forsk. var. *japonica* Makino

植物名 黄背草《高植图鉴》  
药材名 黄背草《汇编》  
文献名 黄菅《本草新注》,黄米草、黄茅、金麦《满洲植录》,黄背茅《禾本科图说》,黄背菅草《拉汉英种称》,进肌草、糖草《汇编》  
地方名 河北:黄秆草、红须草;陕西:黄菅草;山东:黄草(长清、莱芜、苍山、泰山、即墨),白草(蓬莱、牙山),山杆子草(五莲),山草(崂山),仙草;江苏:红尾草;浙江:金丝茅(吴兴、余杭);河南:黄白草;湖北:毛针草、红草(神农架);广西:屈针草(融安、桂林)。

功效 全草:活血调经,驱风除湿。用于经闭,风湿疼痛;根:用于习惯性流产。

## 7332190

*Themeda villosa* (Poir.) A. Camus---*T. gigantea* (Cav.) Hack. var. *villosa* (Poir.) Keng

植物名 菅《诗经》、《高植图鉴》  
药材名 菅茅根《纲目》、《中药大辞典》  
文献名 野菅《尔雅》,菱草《名实图考》  
地方名 菅草(湖南、广西);湖南:山芦根;广西:扁巴芒(忻城),大板青(平南),牛腿芒(北流);贵州:蚂蚱草根,蚂蚱草(兴仁),接骨草、大响铃草(兴义)。

功效 根茎:散寒解表,接骨,利水。用于风寒感冒,风湿麻木,骨折,水肿。

## 7332191

*Thysanolaena maxima* (Roxb.) O. Kuntze

植物名 棕叶芦《高植图鉴》  
药材名 棕叶芦《汇编》  
文献名 棕叶芦《种称》,〔莽草〕《华南经济本草》  
地方名 云南:棕叶草,扫把草,“哥香入”(西双版纳傣语)。  
功效 根、笋:清热解暑,生津止咳。用于疟疾。

## 7332192

*Triticum aestivum* L.

植物名 小麦《高植图鉴》  
药材名 小麦《别录》、《汇编》,浮小麦《卫生宝鉴》、《汇编》  
文献名 秣《广雅》,秣《说文》,麦种《吴普本草》,小麦粉《食疗本草》,小麦麸、小麦苗、麦苗《本草拾遗》,浮小麦、麸皮《本草蒙筌》,浮麦、麦麸、麦粉(麦淀粉)、陈小麦、面筋、麦炒、麦秆《纲目》,毛蜡烛《满蒙植汇》,淮小麦、陈小麦、浮小面《常用中药名辨》

地方名 内蒙古:“宝古代”(蒙名);山东:麦子,秕麦子、麦余子(烟台)。

功效 干瘪果实(浮小麦):止虚汗,养心安神。用于体虚汗多,脏躁症;种子:养心,益肾,除热,止渴。用于脏躁,烦热,消渴,泄利,痈肿,外伤出血,烫伤;陈小麦粉(隔年淀粉):外用子疳疮肿,蜂窝组织炎,流

行性腮腺炎,带状疱疹,急性乳腺炎,丹毒,外伤感染等。

## 7332193

*Zea mays* L.

植物名 玉蜀黍《高植图鉴》  
药材名 玉蜀黍《纲目》、《中药大辞典》,玉米须《四川中药志》  
文献名 包谷、陆谷、玉黍《齐民要术》,玉麦须《滇南本草》,玉高粱《纲目》,番麦、御麦《留青日札》,西番麦《学圃杂疏》,玉米、玉麦、玉蜀秫《农政全书》,戎菽《广群芳谱》,红须麦《蒙化府志》,薏米包《医林纂要》,珍珠芦粟、苞芦、鹿角黍、御米《双溪物产疏》,西天麦《平凉县志》,玉露秫秫《名实图考》,纡粟《随息居饮食谱》,珍珠米《尔雅谷名考》,粟米、包粟《岭南采药录》,包麦米《中国药植志》,玉蜀黍蕊《现代实用中药》,蜀黍须、包谷须《药材学》,玉米轴、罐黍子《民药汇编》

地方名 番麦须(上海、台湾),金稻黍(陕西、甘肃、宁夏);河北:棒子毛;内蒙古:“额尔敦尼—西喜”(蒙名);山西:老玉米、玉茭(太行山);山东:棒子;江苏:棒头,棒棒头;上海:苞米须,珍珠玉须,百珠米须,大米绒,六谷须;浙江:包芦粟;福建:麦穗(厦门);广东:粟米须;广西:苞米,粟包(北海);四川:包谷心(重庆),〔穗轴〕;贵州:抓地虎〔根〕;云南:“尖号聿”(西双版纳傣语)。

功效 花柱(玉米须):利尿,泄热,平肝,利胆。用于肾炎水肿,脚气,黄疸肝炎,高血压,胆囊炎,胆结石,糖尿病,吐血衄血,鼻渊,乳痈;种子:调中开胃,穗轴:健脾利湿。用于小便不利,水肿,脚气,泄泻;根、叶:利尿,去瘀。用于砂淋,吐血。

## 7332194

*Zizania caduciflora* (Turcz. ex Trin.) Hand.-Mazz.---*Zizania latifolia* Turcz.

植物名 菰《禾本科图说》  
药材名 菰根《别录》,菰米〔果实〕《本草经集注》,茭白(花茎菌痿)《图经》、《中药大辞典》

文献名 蒋草、茭草《说文》,菰蒋草(陶弘景);果实:雁膳《管子》,菰粱《楚辞》,安胡《枚乘七发》,将实《楚辞》王逸注),茭米《文选》,黑米《杜工部集》,雕胡米《图经》,雕菰《纲目》,菰米《药材学》;根及根茎:菰封《淮南子》,菰蒋根《补缺时后方》,菰蒋节《于母秘录》,菰蒋草根《广济方》;花茎菌痿:出隧、蓬菰《尔雅》,绿节《西京杂记》,菰菜、茭苳《食疗本草》,菰苳《本草拾遗》,菰笋、菰干、茭笋《图经》,茭瓜《滇南本草》,茭杞《纲目》,茭耳菜《名实图考》,茭儿菜《救荒野谱》,茭茎《鉴别手册》,菌菰笋《中国蔬裁》

地方名 茭白子(江苏、浙江);吉林:菰实;内蒙古:“奥存—查干—苏牙”(蒙名);山东:苦姜草(微山湖);江苏:高瓜,野茭白子;台湾:茭白笋,白脚笋,白茭笋;湖北:高笋(神农架);四川:水芦竹(成都)。

功效 果实(菰实):清热除烦,生津止渴。用



于心烦,口渴,大便不通,小便不利;根、根茎:清 | 除烦,止渴,通乳,利二便。用于热病烦渴,酒精中  
热解毒。用于消渴,烫伤;花茎菌瘿(茭白):清热 | 毒,二便不利,乳汁不通。

## 八、动物类

### (一)原生动物门 Protozoa

#### 81001 草履虫科 Parameciidae

##### 8100101

*Paramecium caudatum* Ehrenberg

动物名 草履虫(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 大草履虫(山东药用动物)

文献名 尾草履虫(拉汉原生动物名称)

功效 虫体(水溶性提取液):用于皮试,诊断消化系统癌及女性生殖系统癌有一定价值。

### (二)海绵动物门 Spongia

#### 82002 简骨海绵科 Haploscleridae

##### 8200201

*Ephydatia muelleri japonica* (Hilgendorf)

动物名 刻盘淡水海绵(汇编)

药材名 紫梢花(汇编)

功效 群体:补肾,益精,壮阳。用于肾虚阳痿,遗精,带下。

##### 8200202

*Spongilis fragilis* Leidy

动物名 脆针海绵(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 紫梢花(图经)、(汇编)

文献名 脆弱骨针淡水海绵(汇编),脆弱针骨淡水海绵(中国动物药),淡水海绵(中国药用动物志),紫霄花(中药志)

功效 群体:补肾,益精,助阳。用于阳痿遗精,小便失禁,白带。

##### 8200203

*Spongills lacustris* (L.)

动物名 湖针海绵(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 紫梢花(中药名汇)

文献名 紫肖花(中药名汇)

功效 群体:补肾益精,助阳。

### (三)腔肠动物门 Coelenterata

#### 83003 海槿虫科 Plumularidae

##### 8300301

*Plumularia setacea* Ellis

动物名 刚毛海槿虫(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 刚毛海槿虫(中国药用动物名录)

功效 提取物:用作神经镇静药。

#### 83004 僧帽水母科 Physalidae

##### 8300401

*Physalia physalis utriculus* Lamartiniere

动物名 僧帽水母(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 僧帽水母(中国药用动物名录)

功效 刺丝囊提取物:对心血管与神经肌肉有作用。

#### 83005 洋须水母科 Ulmaridae

##### 8300501

*Aurelia aurita* Lamarck

动物名 海月水母(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 海月水母(中药材科技)

功效 刺丝囊提取物:对中枢神经系统有作用。

#### 83006 霞水母科 Cyaneidae

##### 8300601

*Cyanea capillata* (L.)

动物名 长须霞水母(海洋药物)

功效 提取物:可作为神经组织的活性物质和组织胺释放剂。

#### 83007 根口水母科 Rhizostomatidae

##### 8300701

*Rhopilema esculenta* Kishinouye

动物名 海蜇(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 海蜇(食物本草会纂)、(汇编)

文献名 石镜(异苑),水母(广韵),蜡、橈蒲鱼(本草拾遗),海蛇(纲目),水母鲜(蟪史),白皮子(柑园小识),白皮纸、秋风子、海蜇皮(纲目拾遗),蛇皮(医林纂要),沙海蜇(拉汉海洋生物名称),罗皮(动物学大辞典),蚌(海洋药物民间应用),海蜇皮、海蜇头(汇编)

功效 全体:化痰热,散结,降压。用于肺热咳嗽痰多,热病痰多神昏,中风痰涎壅盛,原发性高血压,瘰疬,丹毒。

##### 8300702

*Rhopilema hispidum* Vanhoffen

动物名 黄斑海蜇(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 白海蜇(汇编)

文献名 海蜇、荔枝蛰、柚皮蛰、花蜇(中国药用动物志)

地方名 湖北:海蛇、蛇、海捞、水母(神农架)。

功效 全体:化痰清热,散结,降压。用于肺热咳嗽痰多,热病痰多神昏,中风痰涎壅盛,原发性高血压,瘰癧,丹毒。

### 83008 海葵科 Actiniidae

#### 8300801

*Anemonia sulcata* (Pennant)

动物名 蛇卷海葵《海洋药物》

功效 提取液:用于心力衰竭。

#### 8300802

*Anthopleura elegantissima* (Brandt)

动物名 华丽黄海葵《海洋药物》

功效 提取物:具有强心、抗癌活性,对慢性心力衰竭患者有疗效。

#### 8300803 见 8300805a

#### 8300804

*Anthopleura pacifica* Uchida

动物名 太平洋侧花海葵《海洋药物》

药材名 海筒琪《中国海洋药物》

文献名 太平洋黄海葵《中国海洋药物》

地方名 浙江:泥筒琪,石奶,海菊花;其他:海艇根。

功效 全体:清肺解热。用于乳汁不下,子宫脱垂。外用于痔疮,脱肛。

备考 动物实验表明,有一定的降压作用,血压下降较缓慢,降至最低值后,持续时间较长,后慢慢回升,在血压变化过程中,呼吸出现起伏大,短促,还使心率加快,对心搏力影响不大。

#### 8300805

*Anthopleura stell* (Verrill)

动物名 绿海葵《中国药用动物志》

功效 全体:有毒。外用于痔疮,体癣。

#### 8300805a

*Anthopleura xanthogrammica* (Berkly)

动物名 黄海葵《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 海筒琪(浙江)

文献名 海菊花、沙筒、海艇根《中国药用动物志》,绿海葵《拉汉海洋生物名称》,砂栖海葵《海洋药物》

地方名 浙江:泥筒琪,石奶。

功效 全体:收敛固涩,燥湿杀虫。用于痔疮,脱肛,白带,蛲虫,体癣。

备考 据报导,本品有化痰,降压作用。

#### 8300806

*Condylactis aurantiaca* (Delle Chiaje)

动物名 瓜突海葵《海洋药物》

功效 提取物:有降压作用。

#### 8300807

*Palythoa capensis* Hadd et Shachl

动物名 好望角沙群海葵《海洋药物》

功效 提取物:有抗癌,镇痛,强心方面的活性。

#### 8300808

*Palythoa haddon* Haddon

动物名 哈登沙群海葵《海洋药物》

功效 提取物:有强心作用。

#### 8300809

*Palythoa nelli* Pax

动物名 海燕沙群海葵《海洋药物》

功效 提取物:有抗癌,镇痛,强心方面的活性。

### 83009 银冠海葵科 Diadumenidae

#### 8300901

*Haliplanella luciae* (Verrill)

动物名 纵条肌海葵《中国药用动物志》

药材名 海筒琪《海洋药物》

文献名 海菊花《中药材科技》

地方名 浙江:西瓜海葵,泥筒琪,石奶。

功效 全体:收敛固涩,燥湿杀虫。用于痔疮,脱肛,白带过多,蛲虫,体癣。

备考 本品民间用于滋阴,壮阳,通乳。

### 83010 海仙人掌科 Veretillidae

#### 8301001

*Cavernularia habercr* Moroff

动物名 海仙人掌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 海仙人掌《海洋药物》

地方名 浙江:刺棒。

功效 全体:滋阴降火。用于腮腺炎。

### 83011 丛柳珊瑚科 Plexauridae

#### 8301101

*Hicksonella guishanensis* Zou

动物名 桂山厚丛柳珊瑚《中国海洋药物》

药材名 柳珊瑚(浙江)

功效 全体:安神镇惊,清热止血。用于吐血,惊痫。

### 83012 枇杷珊瑚科 Oculinidae

#### 8301201

*Galaxea aspera* Quelch

动物名 粗糙盔形珊瑚《拉汉海洋生物名称》

药材名 海白石《中国药用动物志》

文献名 鹅管石《中国药用动物志》

功效 石灰质骨骼:清热解毒,化痰止咳。用于气管炎,痢疾,瘰癧。

#### 8301202

*Galaxea fascicularis* (L.)

动物名 丛生盔形珊瑚《拉汉海洋生物名称》

药材名 珊瑚鹅管石《广西药用动物》

文献名 鹅管石《广西药用动物》

功效 石灰质骨骼:补肺,定喘,壮阳,通乳。用于肺结核,咳嗽,气喘,吐血,阳痿,腰膝无力,乳汁不通。

### 83013 浜珊瑚科 Poripidae

#### 8301301

*Porites nigrescens* Dana

- 动物名 灰黑滨珊瑚《拉汉海洋生物名称》  
 药材名 浮海石《中国药用动物名录》  
 文献名 黑滨珊瑚《中国药用动物名录》  
 功效 骨骼(浮海石):清肺化痰。用于肺热咳嗽,老痰积聚,癭瘤。

### 83014 笙珊瑚科 Tubiporidae

8301401

*Tubipora musica* L.

- 动物名 笙珊瑚《拉汉无脊椎动物名称》  
 药材名 笙珊瑚鹅管石(拟)  
 文献名 鹅管石、管石《中药名汇》  
 功效 商品:作鹅管石用。  
 备考 我国华南地区出售之鹅管石为矿物细管状的钟乳石,与此为异物同名。

### 83015 海底柏科 Melitodidae

8301501

*Melitodes ochracea* (L.)

- 动物名 赭色海底柏《南海海洋药用生物》  
 功效 全部群体:止呕,止泻。用于霍乱。

8301502

*Melitodes squanata* Nutting

- 动物名 鳞海底柏《拉汉无脊椎动物名称》  
 药材名 玳花《南海海洋药用生物》  
 功效 全部群体:止血,镇静。用于吐血,小儿惊风。

### 83016 玳花科 Gorgonidae

8301601

*Corallium rubrum* (L.)

- 动物名 红珊瑚《珊瑚的生药学研究》  
 药材名 珊瑚《唐本草》  
 功效 石灰质骨骼:镇静安神,明目。用于惊风,痲痛,角膜云翳,肺郁热吐衄。  
 备考 过去文献将日本红珊瑚 *Corallium japonicum* Kishinouye 误作《唐本草》的珊瑚。

8301602

*Gorgonia flabellum* L.

- 动物名 柳珊瑚《中药大辞典》  
 药材名 石帆《本草拾遗》、《中药大辞典》  
 文献名 海团扇《动物学大辞典》  
 功效 石灰质骨骼:用于石淋,血瘀闭经。

## (四)环节动物门 Annelida

### 84017 沙蚕科 Nereidae

8401701

*Neanthes japonica* (Izuka)

- 动物名 日本刺沙蚕《拉汉海洋生物名称》  
 药材名 海蚯蚓《中国海洋药物》

文献名 禾虫《纲目拾遗》

地方名 浙江:沙蚕。

功效 全体:补气,降压。

8401702

*Nereis japonica* Izuka

- 动物名 日本沙蚕《中药材科技》  
 药材名 海蜈蚣《中药材科技》  
 功效 肉:用于脚气病。  
 备考 沙蚕毒素为神经毒剂。可作高效农药。

8401703

*Tylorrhynchus heterochaetus* Quatrefages

- 动物名 疣吻沙蚕《拉汉无脊椎动物名称》  
 药材名 禾虫《纲目拾遗》、《中药大辞典》  
 文献名 沙虫、沙蚕、海蚯蚓《中国药用动物志》  
 功效 全体:补脾益胃,补血养血,利水消肿。用于脾胃虚弱,贫血,肢体肿胀。

### 84018 矾沙蚕科 Eunicidae

8401801

*Lumbriconeris heteropoda* Marenzeller

- 动物名 异足索沙蚕《拉汉无脊椎动物名称》  
 文献名 禾虫《海洋药物》  
 地方名 浙江:沙蚕。  
 功效 全体:补脾健胃,生血,利湿,行小便。用于疥疮,脚气。

### 84019 吻沙蚕科 Glyceridae

8401901

*Glycera chirori* Izuka

- 动物名 长吻沙蚕《拉汉无脊椎动物名称》  
 药材名 长吻沙蚕《中国海洋药物》  
 文献名 禾虫《海洋药物》  
 地方名 浙江:海蜈蚣,沙蚕。  
 功效 全体:用于疥疮,脚气。

### 84020 沙蠋科 Arenicolidae

8402001

*Arenicola cristata* Stimpson

- 动物名 鸡冠沙蠋《拉汉海洋生物名称》  
 药材名 沙蠋《山东药用动物》  
 文献名 海蚯蚓《中国药用动物志》  
 功效 全体:清热解毒。外用于痈疮肿毒。

### 84021 巨蚓科 Megascolecidae

8402101

*Pheretima aspergillum* (E. Perrier)

- 动物名 参环毛蚓《药典》  
 药材名 地龙《图经》、《药典》  
 文献名 蠮螬、豎蚕《尔雅》,丘蟥《淮南子》,蠮螬《淮南子》高诱注,蚯蚓《本经》,附蚓、寒蠮、寒蚓《吴普本草》,白颈蚯蚓、土龙《别录》,蜿蠮、引无《广雅》,曲蟮《崔豹古今注》,曲蟮《小品方》,地龙子《药性论》,

胸臆、土蟪《纲目》，蚓蛄、鸣砌、歌女、却行、寒蟪、寒欣《新纲》，广地龙《药典》，参状环毛蚓《拉汉无脊椎动物名称》，环毛蚯蚓《广西药用动物》，参蚓、虫蟥、寒蟪子、蟪、蟪蟪、地蟪、蛰蚕、呼罗、蚊蚓、蟪蟪、蛰蟪、白头、千人踏、大丘蚓、典蛇、蛤烙虫《中药名汇》

**功效** 虫体：清热定惊，通络，平喘，利尿。用于高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，尿少水肿，高血压症。

**备考** 同属动物威廉环毛蚓 *P. guillelmi* 与通俗环毛蚓 *P. vulgaris* 亦同供药用。

#### 8402102

*Pheretima carnosus* (Goto et Hatui)---*Pheretima pingi* Stephenson

**动物名** 秉氏环毛蚓《拉汉无脊椎动物名称》

**药材名** 地龙《中国药用动物志》

**文献名** 曲蟥、寒蚓、附蚓、呼罗《中草药》

**功效** 全体：利尿通淋，清热解毒，活血通经，平喘，定惊，降压。用于热结，尿闭，慢性肾炎，高热烦躁，抽搐，疹毒内攻，经闭，半身不遂，咳嗽喘急，小儿急慢惊风，癫痫，口眼歪斜，高血压，痹症。外用于烫火伤，疮毒。

#### 8402103

*Pheretima hupeensis* (Michaelsen)

**动物名** 湖北环毛蚓《拉汉无脊椎动物名称》

**药材名** 地龙(四川)

**文献名** 湖北环毛蚯蚓《南充中草》

**地方名** 四川：蚯蚓、曲蟥(南充)。

**功效** 干燥虫体：清热镇惊，活络利尿，平喘降压。用于热性病，高血压，支气管哮喘，风湿关节疼痛，肢体屈伸不利，脑血管意外所致半身不遂，热病小便不利，龟头肿胀。

#### 8402104

*Pheretima pectinifera* Michaelsen

**动物名** 栉盲环毛蚓《拉汉无脊椎动物名称》

**药材名** 地龙《南充中草》

**文献名** 异唇蚓《南充中草》

**地方名** 四川：蚯蚓、曲蟥(南充)。

**功效** 干燥虫体：清热镇惊，活络利尿，平喘降压。用于热性病，高血压，支气管哮喘，风湿关节疼痛，肢体屈伸不利，脑血管意外所致半身不遂，热病小便不利，龟头肿胀。

#### 8402105

*Pheretima posthuma* (L. Vaill.)

**动物名** 蚯蚓(《滇南本草》整理本)

**药材名** 地龙《滇南本草》

**文献名** 蟪蟪、蚯蚓粪《滇南本草》

**功效** 全体：祛风。用于小儿瘰疬惊风，口眼歪斜，强筋，痿软。

#### 8402106

*Pheretima praepinguis* Gates

**动物名** 秉前环毛蚓《拉汉无脊椎动物名称》

**药材名** 地龙(四川)

**功效** 全体：利尿通淋，清热解毒，活血通经，平喘，定惊，降压。用于热结，尿闭，慢性肾炎，高热烦躁，抽搐，疹毒内攻，经闭，半身不遂，咳嗽喘急，小儿急慢惊风，癫痫，口眼歪斜，高血压，痹症。外用于烫火伤，疮毒。

#### 8402107

*Pheretima tachiliensis* (Michaelsen) --- *Pheretima asiatica* Michaels

**动物名** 直隶环毛蚓《拉汉无脊椎动物名称》

**药材名** 地龙《中国药用动物志》

**文献名** 环毛蚓、曲蟥、参环毛蚓《中国药用动物志》，寒蚓、附蚓、呼罗、亚洲环毛蚓《中草药》

**功效** 全体：利尿通淋，清热解毒，活血通经，平喘，定惊，降压。用于热结，尿闭，慢性肾炎，高热烦躁，抽搐，疹毒内攻，经闭，半身不遂，咳嗽喘急，小儿急慢惊风，癫痫，口眼歪斜，高血压，痹症。外用于烫火伤，疮毒。

### 84022 正蚓科 Lumbricidae

#### 8402201

*Allolobophora caliginosa trapezoides* (Duges)

**动物名** 背暗异唇蚓《拉汉无脊椎动物名称》

**药材名** 地龙《图经》、《药典》

**文献名** 蚯蚓《本经》，缙蚯蚓、参环毛蚓《图经》，蚓蛄、胸臆、土蟪、蛰蚕、鸣砌、歌女、却行、曲蟥、寒蟪、寒欣《新纲》，土地龙《中药大辞典》，寒蚓、附蚓、呼罗《中草药》

**地方名** 曲蟥(山西、青海、山东、河南)；内蒙古：“其格音—乌兰—好如亥”(蒙名)；青海：土龙；湖北：蟪善子(神农架)。

**功效** 虫体：清热定惊，通络，平喘，利尿。用于高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，尿少水肿，高血压症。

#### 8402202

*Eisenia foetida* (Savigny)

**动物名** 赤子爱胜蚓《拉汉无脊椎动物名称》

**药材名** 地龙《中草药》

**文献名** 曲蟥、寒蚓、附蚓、呼罗《中草药》

**功效** 全体：清热定惊，通络，平喘，利尿。用于高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，尿少水肿，高血压症。

### 84023 医蛭科 Hirudinidae

#### 8402301

*Hirudo nipponica* (Whitman)

**动物名** 日本医蛭《拉汉无脊椎动物名称》

**药材名** 水蛭《本经》、《药典》

**文献名** 蛭蟥、蚘(尔雅)，蛟、至掌(别录)，马蜉《本草经集注》，马蛭《唐本草》，蜉、马蟪《图经》，马蜉《本草衍义》，红蛭《济生方》，蚂蟥蜉《医林纂要》，黄蛭《本草求真》，沙塔干、肉钻子《中药材手册》，医用蛭、线蚂蟥《中国药用动物志》

地方名 吉林：“门尔哥蚂里”(朝名)；河北：水麻贴；内蒙古：“哈纳内日一好如亥”(蒙名)，皮条；湖北：旱蚂蟥；其他：蚂蟥。

功效 全体：有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌打损伤。

#### 8402302

*Hirudo purchra* Song

动物名 丽医蛭《中国药用动物名录》

药材名 水蛭(浙江)

功效 全体：有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌打损伤。

#### 8402303

*Whitmania acranulata* Whitman

动物名 柳叶蚂蟥《药典》

药材名 水蛭《本经》、《药典》

文献名 蛟、至掌《别录》，尖细金线蛭《中国药用动物志》，茶色蛭、牛鳖、长条水蛭《中药大辞典》

功效 全体：有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌打损伤。

#### 8402304

*Whitmania edentula* (Whitman)

动物名 细齿蚂蟥《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 水蛭《南充本草》

文献名 细齿金线蛭《中药大辞典》

地方名 四川：金边蚂蟥、水蚂蟥(南充)。

功效 全体：有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌打损伤。

#### 8402305

*Whitmania gracilis* (Moore)

动物名 秀丽金线蛭《中国药用动物名录》

药材名 水蛭(浙江)

功效 全体：有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌打损伤。

#### 8402306

*Whitmania laevis* (Baird)

动物名 光滑蚂蟥《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 水蛭《中国药用动物志》

文献名 光滑金线蛭《中国药用动物志》

地方名 河北：蚂蟥；其他：马鳖，至掌，至蛭，马蜞，蛟，肉钻子，金线蛭，吸血虫，蚂蟥干，沙塔干，水麻贴，蚂别，麻匹。

功效 全体：有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌打损伤。

#### 8402307

*Whitmania pigra* Whitman

动物名 宽体蚂蟥《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 水蛭《本经》、《药典》

文献名 蛟、至掌《别录》，宽水蛭《中药大辞典》，宽体金线蛭《中国药用动物志》，蚂蟥《药典》

地方名 马鳖(山东、广西)；山东：马匹，马条；广西：肉钻子，水麻贴；湖北：水蚂蟥(神农架)。

功效 全体：有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕

痞块，血瘀经闭，跌打损伤。

### 84024 山蛭科 Haemadipsidae

#### 8402401

*Haemadipsa japonica* Whitman

动物名 日本山蛭《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 日本山蛭《山东药用动物》

功效 全体：破瘀消肿，通经破积。用于经闭，癥瘕，瘀痛，痢肿。

### 84025 星虫科 Sipunculidae

#### 8402501

*Phascolosoma esculenta* (Chen et Yeh)

动物名 可口草囊星虫《中国海洋药物》

地方名 浙江：泥蒜，沙蒜，海冬虫夏草。

功效 全体：益气补血，滋阴降火，催奶。用于妇女产后气血不足，缺乳。

#### 8402502

*Physcosoma esculenta* Chen et Yeh

动物名 泥蒜土钉虫《拉汉海洋生物名称》

药材名 泥蒜《海洋药物》

地方名 浙江：沙蒜、海冬虫夏草(温州)。

功效 全体：滋阴降火。为民间一种滋补食品。

#### 8402503

*Physcosoma similis* Chen et Yeh

动物名 土钉虫《中国海洋药物》

地方名 浙江：海涂虫。

功效 全体：益气，活血，通乳。用于妇女产后奶水不足。

#### 8402504

*Sipunculus nudus* L.

动物名 光裸星虫《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 星虫《中国药用动物志》

文献名 裸体方格星虫《拉汉海洋生物名称》，方格星虫、沙虫、沙肠子《南海海洋药用生物》，海肠子《中国药用动物志》

功效 全体：清肺，滋阴降火，健脾。用于骨蒸潮热，阴虚盗汗，肺癆咳嗽，胸闷痰多，夜尿症，牙肿痛。

备考 有些地区用来代替冬虫夏草使用。

### (五)软体动物门 Mollusca

### 85026 隐板石鳖科 Cryptoplacidae

#### 8502601

*Acanthochiton rubrolineatus* (Lischke)

动物名 红条毛肤石鳖《动物图谱·软体》

药材名 海石鳖(浙江)、《中国动物药》

地方名 山东：海八节毛；浙江：石鳖，八节毛。

功效 全体：软坚散结，活血止痛，清热解毒。用于淋巴结结核，麻疯病等。

**85027 铤石鳖科 Ischnochitonidae****8502701***Ischnochiton boninensis* Bergenhayn

动物名 小笠原铤石鳖(拉汉无脊椎动物名称)

文献名 海石鳖《海洋药物》

功效 全体:软坚散结。用于淋巴结核。并有清肺化痰,止咳平喘作用。

**8502702***Ischnochiton comptus* (Gould)

动物名 花斑铤石鳖(动物图谱·软体)

文献名 海石鳖《海洋药物》

功效 全体:软坚散结。用于淋巴结核。

**8502703***Ischnochiton hakodadensis* Pilsbry

动物名 函馆铤石鳖(动物图谱·软体)

药材名 八节毛《中国药用动物志》

文献名 石鳖《中国药用动物志》,海石鳖《海洋药物》

功效 全体:清肺化痰,止咳平喘。用于慢性气管炎。

**8502704***Lepidozona coreanica* (Adams et Reeve)

动物名 朝鲜鳞带石鳖(动物图谱·软体)

药材名 海石鳖(浙江)、《中国海洋药物》

功效 全体:软坚散结,活血祛瘀,消炎解毒,清肺化痰,止咳平喘。用于颈淋巴结核。

**85028 鲍科 Haliotidae****8502801***Haliotis asinina* L.

动物名 耳鲍(动物图谱·软体)

药材名 石决明《药典》

文献名 鲍鱼《南海海洋药用生物》

功效 贝壳:平肝潜阳,清肝明目。用于头痛眩晕,目赤翳障,视物昏花,青盲雀目。

**8502802***Haliotis clathrata* Reeve

动物名 格鲍(拉汉海洋生物名称)

药材名 格鲍《海洋药物》

功效 贝壳:平肝潜阳,熄风明目;肉:滋阴清热,益精明目。

**8502803***Haliotis corrugata* Gray

动物名 褶鲍《中药通报》

药材名 石决明《中药通报》

功效 贝壳:市售商品作石决明用。是否可代用,有待进一步研究。

**8502804***Haliotis discus hannai* Ino.

动物名 皱纹盘鲍(拉汉海洋生物名称)

药材名 石决明《药典》

文献名 关海决《中药材科技》,盘大鲍、毛底海决《海洋药物》

地方名 浙江:鲍鱼。

功效 贝壳:平肝潜阳,清肝明目。用于头痛眩晕,目赤翳障,视物昏花,青盲雀目;肉:滋阴清热,益精明目。

**8502805***Haliotis diversicolor* Reeve

动物名 杂色鲍(动物图谱·软体)

药材名 石决明《别录》、《药典》

文献名 鲍鱼《素问》,真珠母《雷公炮炙论》,鳃鱼、鳃鱼甲《本草经集注》,九孔螺《日华子本草》,石决明肉《本草衍义》,千里光《纲目》,镜面鱼、明目鱼《医林纂要》,光底海决、耳片壳、海决明、海南决、九孔鲍《中药大辞典》,光底石决明《药典》,鲍鱼壳《简明中医辞典》,九孔石决、九孔决明《常用中药名辨》,鲍螺《常见药用动物》

地方名 山东:鲍鱼皮,金蛤蛎皮。

功效 贝壳:平肝潜阳,清肝明目。用于头痛眩晕,目赤翳障,视物昏花,青盲雀目;肉:滋阴清热,益精明目。用于劳热骨蒸,咳嗽,崩漏,带下,淋病,青盲内障。

**8502806***Haliotis gigantea discus* Reeve

动物名 盘大鲍(动物图谱·软体)

药材名 石决明《别录》、《中药大辞典》

文献名 鳃鱼《本草经集注》,石决明肉《本草衍义》,毛底海决、关海决《中药大辞典》,鲍鱼壳《简明中医辞典》

地方名 山东:鲍鱼;其他:毛底石决明,海决,鲍贝,洋海决,朱子房,海决明,海蚌壳,海蚌壳,九孔石决明,生杵石决明,怀奇令史,真海决石决,黑鲍壳,常节,鳃鱼甲,千里光。

功效 贝壳:平肝潜阳,除热,明目。用于风阳上扰,头痛眩晕,骨蒸劳热,青盲内障;肉:滋阴清热,益精明目。用于劳热骨蒸,咳嗽,崩漏,带下,淋病,青盲内障。

**8502807***Haliotis laevigata* (Donovan)

动物名 白鲍《药典》

药材名 石决明《药典》

功效 贝壳:平肝潜阳,清肝明目。用于头痛眩晕,目赤翳障,视物昏花,青盲雀目。

**8502807a***Haliotis midae* L.

动物名 美德鲍《中药通报》

药材名 石决明《中药通报》

功效 贝壳:商品作石决明用。可否代用,有待进一步研究。

**8502808***Haliotis ovina* Gmelin

动物名 羊鲍(动物图谱·软体)

药材名 石决明《药典》

文献名 毛底石决明《药典》,鲍鱼《南海海洋药用生

物)

功效 贝壳:平肝潜阳,清肝明目。用于头痛眩晕,目赤翳障,视物昏花,青盲雀目。

#### 8502809

*Haliotis planata* Sowerby

动物名 平鲍《拉汉海洋生物名称》

药材名 石决明(广东)

功效 贝壳:平肝潜阳,熄风明目;肉:滋阴清热,益精明目,补心肝肾。

#### 8502810

*Haliotis ruber* (Leach)

动物名 澳洲鲍《药典》

药材名 石决明《药典》

文献名 大石决明《中药通报》

功效 贝壳:平肝潜阳,清肝明目。用于头痛眩晕,目赤翳障,视物昏花,青盲雀目。

#### 8502811

*Haliotis semistriata* Reeve

动物名 半纹鲍《动物图谱·软体》

药材名 石决明《中国动物药》

功效 贝壳:平肝潜阳,熄风镇静,明目,通淋,止血。用于头目眩晕,骨蒸劳热,青盲内障,胃酸过多,淋病,吐血,失眠,小儿疳积,消化不良。

#### 8502812

*Haliotis varia* L.

动物名 多变鲍《拉汉海洋生物名称》

药材名 石决明(广东、广西)

文献名 鲍鱼、半纹鲍《海洋药物》

功效 贝壳:平肝潜阳,熄风明目;肉:滋阴清热,益精明目,补心肝肾。

8502813 见 8502807a

### 85029 帽贝科 Patellidae

#### 8502901

*Cellana toreuma* (Reeve)

动物名 嫁蟻《动物图谱·软体》

药材名 帽贝《海洋药物》

地方名 浙江:笠贝。

功效 贝壳:化痰止咳,软坚散结,明目退翳。用于小儿惊风。

### 85030 马蹄螺科 Trochidae

#### 8503001

*Chlorostoma nigerrima* (Gmelin)

动物名 黑凹螺《动物图谱·软体》

药材名 海决明《中国药用海洋生物》

文献名 马蹄子《中国药用动物志》

功效 壳:平肝潜阳。用于高血压,慢性肝炎。

#### 8503002

*Chlorostoma rusticum* (Gmelin)

动物名 锈凹螺《动物图谱·软体》

药材名 海决明《广西药用动物》

文献名 高腰螺《拉汉海洋生物名称》,马蹄螺《中国药用动物志》

功效 壳:平肝潜阳。用于高血压,头晕,头痛,慢性肝炎。

### 85031 螺螺科 Turbinidae

#### 8503101

*Lunella coronata granulata* (Gmelin)

动物名 粒冠小月螺《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 粒花冠小月螺、粒螺螺《海洋药物》

功效 厝:和气清神。用于肠风痔瘕,心腹满痛,降压止痢,催产。

#### 8503102

*Turbo argyrostomus* L.

动物名 银口螺螺《海洋药物》

药材名 甲香(西沙群岛)

文献名 螺螺《海洋药物》

功效 厝(甲香):和气清神,止痢。用于心腹满痛,下淋痔瘕,疥癣,头疮,甲疽,催产。

#### 8503103

*Turbo articulatus* Reeve

动物名 节螺螺《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 甲香[厝]《中国药用动物志》

文献名 云母石、文武石、郎君子《南海海洋药用生物》,水云母《海洋药物》

地方名 狗眼睛螺(浙江、广西)。

功效 厝:清湿热,解疮毒,止泻痢。用于脘腹疼痛,肠风痔疾,疥癣,头疮,小便淋漓涩痛等。

#### 8503104

*Turbo chrysostomus* L.

动物名 金口螺螺《动物图谱·软体》

药材名 甲香[厝]《中国药用动物志》

文献名 狗眼睛螺《中国药用动物志》

功效 厝:清湿热,解疮毒,止泻痢。用于脘腹疼痛,肠风痔疾,疥癣,头疮,小便淋漓涩痛等。

#### 8503105

*Turbo cornutus* Solander

动物名 螺螺《动物图谱·软体》

药材名 甲香《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 流螺《图经》,水云母、海月、催生子《中药志》,郎君子、醋鳖《海洋药物》

功效 厝(甲香):清湿热,解疮毒,止泻痢,和气清神。用于脘腹疼痛,肠风痔瘕,疥癣,头疮,小便淋漓涩痛,止痢,降压,催产。

#### 8503106

*Turbo marmoratus* L.

动物名 夜光螺螺《动物图谱·软体》

药材名 甲香《中国药用动物志》

功效 厝:清湿热,解疮毒,止泻痢。用于脘腹疼痛,肠风痔疾,疥癣,头疮,小便淋漓涩痛。

#### 8503107

*Turbo petholatus* L.

动物名 带螺螺《动物图谱·软体》

药材名 甲香《中国药用动物志》

功效 辟：清湿热，解疮毒，止渴痢。用于脘腹疼痛，肠风痔疾，疥癣，头疮，小便淋瀝涩痛。

### 85032 滨螺科 Littorinidae

#### 8503201

*Litorina brevicula* (Philippi)

动物名 短滨螺《拉汉海洋生物名称》

药材名 鼓钉螺《海洋药物民间应用》

功效 螺厣：平肝清热。用于目生星翳。

### 85033 环口螺科 Cyclophoridae

#### 8503301

*Cyclophorus martusinus* Moellendorff

动物名 褐带环口螺《动物图谱·软体》

药材名 褐带环口螺《中国药用动物名录》

功效 鲜体：用于小儿夜尿，尿频，红白痢。

### 85034 田螺科 Viviparidae

#### 8503401

*Angulyagra polyzonata* (Frauenfeld)

动物名 多棱角螺《动物图谱·软体》

药材名 白螺粉《滇南本草》

地方名 云南：白螺。

功效 贝壳：清热化痰，软坚散结，制酸止痛，生肌敛疮。用于痞积，肚腹冷痛，噎膈，饭食不下。

#### 8503402

*Bellamya aeruginosa* (Reeve)

动物名 铜锈环棱螺《动物图谱·软体》

药材名 白螺蛳壳《中国药用动物志》

文献名 豆螺、湖螺、白石螺、石螺《中国药用动物志》

功效 贝壳：清热化痰，软坚散结，制酸止痛，生肌敛疮。用于热痰咳嗽，反胃，胃痛吐酸，瘰癧，溃疡，脱肛，烫伤。

#### 8503403

*Bellamya purificata* (Heude)

动物名 梨形环棱螺《动物图谱·软体》

药材名 白螺蛳壳《中国药用动物志》

文献名 白螺粉《滇南本草》整理本，螺蛳、豆螺蛳、石螺、湖螺、蜗螺牛《中国药用动物志》

功效 贝壳：清热化痰，软坚散结，制酸止痛，生肌敛疮。用于热痰咳嗽，噎膈，反胃，胃痛吐酸，瘰癧，溃疡，脱肛，烫伤。

#### 8503404

*Bellamya quadrata* (Benson)

动物名 方形环棱螺《动物图谱·软体》

药材名 螺蛳《纲目》，《中药大辞典》

文献名 蜗离《别录》，师螺《本草拾遗》，白螺壳《肘后方》，蜗羸、白螺蛳壳《纲目》，方环棱螺《拉汉无脊椎动物名称》，金螺、石螺、湖螺、豆田螺、蜗螺牛《中国药

用动物志》

地方名 湖北：螺丝钉；其他：方田螺。

功效 贝壳：清热化痰，软坚散结，制酸止痛，生肌敛疮。用于热痰咳嗽，反胃，胃痛吐酸，瘰癧，溃疡，脱肛，烫伤。

#### 8503405

*Cipangopaludina cathayensis* (Heude)

动物名 中华圆田螺《动物图谱·软体》

药材名 田螺《中国药用动物志》

文献名 圆田螺《拉汉无脊椎动物名称》

地方名 四川：水螺蛳。

功效 全体：清热利尿。用于小便赤涩，浮肿，痔疮，中耳炎。

#### 8503406

*Cipangopaludina chinensis* (Gray)

动物名 中国圆田螺《动物图谱·软体》

药材名 田螺《药性论》、《中药大辞典》

文献名 田螺壳《别录》，田中螺《本草经集注》，田螺厣《本草求真》，黄螺《医林纂要》

地方名 山东：大田螺，螺蛳；云南：田螺丝；其他：臭田螺。

功效 全体：清热，利水。用于热结小便不通，黄疸，脚气，水肿，消渴，痔疮，便血，目赤肿痛，疔疮肿毒；壳：和胃，止泻，止血，化痰。用于反胃吐食，胃脘疼痛，泄泻，便血，小儿惊风，脓水湿疮；厣（煅存性）：去目翳。

#### 8503407

*Cipangopaludina longispira* (Heude)

动物名 长螺旋圆田螺《滇南本草》整理本

药材名 田螺（云南）

功效 螺肉：解酒毒，止呕吐恶心反胃。

#### 8503408

*Cipangopaludina ussuriensis* (Gerstfeldt)

动物名 乌苏里圆田螺《动物图谱·软体》

药材名 田螺《中国药用动物志》

功效 全体：清热，利水，止渴。用于小便赤涩，浮肿，痔疮，中耳炎等。

#### 8503409

*Cipangopaludina ventricosa* (Heude)

动物名 胀肚圆田螺《滇南本草》整理本

药材名 田螺（云南）

功效 螺肉：解酒毒，止呕吐恶心反胃。

#### 8503410

*Margarya melanoides* Nevill

动物名 螺蛳《滇南本草》整理本

药材名 南螺《滇南本草》

文献名 蜗羸《纲目》，螺蛳湾《壳》《滇南虞衡志》

地方名 云南：海螺，滇螺，白螺粉《壳粉》。

功效 螺肉：滋阴降火，清理肺气；壳粉：用于消痞积，肚腹冷痛，噎膈，饮食不下。

#### 8503411

*Margarya yangtsunghaiensis* Tchang et Tsi

动物名 阳宗海螺蛳《滇南本草》整理本



药材名 白螺粉〔壳〕、(云南)

功效 壳粉:用于痞积,肚腹冷痛,噎膈,饮食不下;螺肉:滋阴降火,清理肺气。

#### 8503412

*Viviparus chinensis* (Gray)

动物名 大田螺〔汇编〕

药材名 田螺〔汇编〕

功效 外壳、肉:清热,利水,止渴。用于小便赤涩,痔疮,浮肿。

#### 8503413

*Viviparus chui* Yen

动物名 东北田螺〔拉汉无脊椎动物名称〕

药材名 田螺〔中国药用动物志〕

文献名 东北圆田螺、臭田螺〔中国药用动物志〕

功效 外壳、肉:清热,利尿,用于小便赤涩,痔疮,浮肿,中耳炎。

### 85035 锥螺科 Turritellidae

#### 8503501

*Turritella bacillum* Kiener

动物名 棒锥螺〔动物图谱·软体〕

药材名 锥子螺〔中国动物药〕

文献名 笋锥螺〔海洋药物民间应用〕

地方名 浙江:单螺,锥螺,长螺。

功效 壳、厣:清热平肝。用于结膜炎,痔疮。

#### 8503502

*Turritella terebra* (L.)

动物名 笋锥螺〔动物图谱·软体〕

药材名 单螺〔南海海洋药用生物〕

文献名 锥螺〔南海海洋药用生物〕

功效 厣、壳:清肝热。用于结膜炎,痔疮。

### 85036 蟹守螺科 Cerithiidae

#### 8503601

*Cerithidea cingulata* (Gmelin)

动物名 珠带拟蟹守螺〔拉汉海洋生物名称〕

药材名 蟹守螺〔浙江〕、〔中国海洋药物〕

功效 壳、肉:口腔炎,牙龈炎。

### 85037 宝贝科 Cypraeidae

#### 8503701

*Cypraea lynx* (L.)

动物名 山猫眼宝贝〔拉汉无脊椎动物名称〕

药材名 紫贝齿〔唐本草〕、〔中药志〕

文献名 贝子〔本经〕,贝齿〔别录〕,紫贝〔唐本草〕,山猫宝贝〔中药志〕,小猫眼宝贝〔拉汉海洋生物名称〕

功效 贝壳:清心安神,平肝明目。用于惊悸心烦不眠,小儿斑疹,目赤翳膜。

#### 8503702

*Cypraea tigris* L.

动物名 虎斑宝贝〔拉汉无脊椎动物名称〕

药材名 紫贝齿〔海洋药物〕

功效 贝壳:清热安神,平肝明目,利尿。

#### 8503703

*Erosaria caputserpentis* (L.)

动物名 蛇首眼球贝〔动物图谱·软体〕

药材名 紫贝齿〔唐本草〕、〔汇编〕

文献名 贝子〔本经〕,贝齿〔别录〕,紫贝〔唐本草〕,文贝〔南州异物志〕,呀螺〔图经〕

功效 贝壳:清心安神,平肝明目。用于惊悸心烦不眠,小儿斑疹,目赤云翳,高血压症。

#### 8503704

*Erosaria erosa* (L.)

动物名 眼球贝〔动物图谱·软体〕

药材名 紫贝齿〔浙江〕、〔中国海洋药物〕

功效 贝壳:化痰止咳,软坚散结,明目退翳。用于咳嗽痰多,胸满气促,癰瘤瘰癧,结核,癰疽,目赤肿痛,目生翳障。

#### 8503705

*Erosaria helvola* (L.)

动物名 枣红眼球贝〔动物图谱·软体〕

药材名 紫贝齿〔海洋药物〕

文献名 眼球贝〔拉汉海洋生物名称〕,贝齿〔汇编〕

功效 贝壳:清心安神,平肝明目。用于惊悸心烦不眠,小儿斑疹,目赤云翳,高血压症。

#### 8503706

*Erosaria miliaris* (Gmelin)

动物名 黍斑眼球贝〔动物图谱·软体〕

药材名 贝齿〔浙江〕

功效 贝壳:清心安神,平肝明目。用于惊悸心烦不眠,小儿斑疹,目赤云翳,高血压症。

#### 8503707

*Erronea erronea* (L.)

动物名 拟枣贝〔动物图谱·软体〕

药材名 贝齿〔汇编〕

地方名 浙江:白贝齿。

功效 贝壳:清心安神,平肝明目。用于惊悸,心烦不眠,头目眩晕,小儿斑疹,目赤云翳。

#### 8503708

*Erronea pulchella* (Swainson)

动物名 秀丽拟枣贝〔动物图谱·软体〕

药材名 紫贝齿〔海洋药物〕

功效 贝壳:清热安神,平肝明目。

#### 8503709

*Mauritia arabica* (L.)

动物名 阿纹绶贝〔动物图谱·软体〕

药材名 紫贝齿〔唐本草〕、〔汇编〕

文献名 贝子〔本经〕,贝齿〔别录〕,紫贝〔唐本草〕,阿拉伯绶贝〔拉汉无脊椎动物名称〕,贝子〔中国药用动物志〕,惊螺〔海洋药物民间应用〕

地方名 广西:绶贝。

功效 贝壳:清心安神,平肝明目。用于惊悸心烦不眠,小儿斑疹,目赤肿痛,角膜云翳,头眩眩晕。

#### 8503710

*Monetaria annulus* (L.)

动物名 环纹货贝《动物图谱·软体》

药材名 贝齿《别录》、《汇编》

文献名 贝子《本经》, 白贝《日华子本草》, 海蛎《纲目》, 白贝齿《汇编》

功效 贝壳: 清热解毒, 清心安神, 清肝明目, 利尿消肿。用于热痢, 惊悸心烦, 头晕头痛, 热毒目翳, 鼻渊头痛, 小便不利。

8503711

*Monetaria moneta* (L.)

动物名 货贝《纲目》、《动物图谱·软体》

药材名 贝齿《别录》、《汇编》

文献名 贝子《本经》, 白贝《日华子本草》, 海蛎《纲目》, 白海蛎《简便单方》, 白贝齿《药材资料汇编》, 浮贝、惠贝、宝贝、濯贝、碧贝、余泉、螺巴、压惊、压惊螺、管贝子、子安贝、海巴、海巴子、紫贝、文贝、砗螺、紫贝齿《中药名汇》

功效 贝壳: 清热解毒, 清心安神, 清肝明目, 利尿消肿。用于热痢, 惊悸心烦, 头晕头痛, 热毒目翳, 鼻渊头痛, 小便不利。

8503712

*Palmadusta gracilis japonica* Schilder

动物名 日本细焦掌贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 日本细焦掌贝《中国药用动物名录》

功效 贝壳: 清热解毒, 清心安神, 清肝明目, 利尿消肿。

## 85038 骨螺科 Muricidae

8503801

*Murex aduncospinosus* Beck

动物名 钩棘骨螺《动物图谱·软体》

文献名 钩棘骨螺《中国药用海洋生物》

功效 贝壳: 清热解毒, 活血止痛。用于痈肿, 中耳炎, 疔疮, 下肢溃疡。

8503802

*Murex rectirostris* Sowerby

动物名 直吻骨螺《动物图谱·软体》

药材名 骨螺壳(拟)

文献名 直嘴骨螺《拉汉无脊椎动物名称》

功效 贝壳: 清热解毒, 活血止痛。用于痈肿, 中耳炎, 疔疮, 下肢溃疡。

8503803

*Murex ternispina* Lamarck

动物名 三棘骨螺《拉汉海洋生物名称》

药材名 骨螺壳(拟)

功效 贝壳: 清热解毒, 活血止痛。用于痈肿, 中耳炎, 疔疮, 下肢溃疡。

8503804

*Murex trapa* Roding

动物名 浅缝骨螺《动物图谱·软体》

药材名 骨螺壳(拟)

文献名 浅缝合骨螺《海洋药物》

功效 贝壳: 清热解毒, 活血止痛。用于痈肿, 中耳炎, 疔疮, 下肢溃疡。

8503805

*Murex triremis* (Perry)

动物名 栉棘骨螺《拉汉海洋生物名称》

药材名 骨螺《中国药用动物志》

文献名 三列刺骨螺《拉汉无脊椎动物名称》, 蛎螺《南海海洋药用生物》

功效 贝壳: 清热解毒, 活血止痛。用于痈肿, 中耳炎, 疔疮, 下肢溃疡。

8503806

*Rapana bezoar* (L.)

动物名 红螺《动物图谱·软体》

药材名 海螺《中国药用动物志》

文献名 皱红螺《拉汉无脊椎动物名称》

地方名 浙江: 菠螺。

功效 贝壳: 消痰软坚, 熄风镇静, 制酸止痛。用于胃痛, 淋巴结结核, 手足拘挛。

8503807

*Rapana venosa* Valenciennes --- *Rapana thomasiana* Crosse

动物名 脉红螺《动物图谱·软体》

药材名 海螺《本草拾遗》、《汇编》

文献名 假猪螺《交州记》, 红螺《纲目》, 海螺壳《东北本草》, 菠螺拳《中国药用动物志》

地方名 顶头螺、海窝窝(河北、浙江), 菠螺(山东、浙江)。

功效 贝壳: 制酸, 化痰, 软坚, 止痉。用于胃痛, 淋巴结结核, 手足拘挛; 鲜肉: 清热, 明目。用于心腹疼痛, 急性结膜炎; 厝: 清热解毒。用于中耳炎, 顽疮。

8503808

*Thais bronni* Dunker --- *Purpura bronni* Dunker

动物名 瘤荔枝螺《动物图谱·软体》

药材名 瘤荔枝螺壳《海洋药物》

功效 螺壳: 化痰止咳, 软坚散结, 明目退翳。

8503809

*Thais clavigera* Kuster --- *Purpura clavigera* Kuster

动物名 疣荔枝螺《动物图谱·软体》

文献名 荔枝螺《中国药用动物志》, 辣螺《海洋药物》

功效 壳: 清热解毒, 软坚散结。用于淋巴结结核, 疮疡; 肉: 用于胆囊炎, 降血压。

8503810

*Thais gradata* Jonas --- *Purpura gradata* Jonas

动物名 蛎敌荔枝螺《动物图谱·软体》

药材名 辣螺《中国动物药》

地方名 浙江: 三角荔枝螺。

功效 贝壳: 软坚散结, 清热解毒。用于淋巴结结核, 疮疡。

8503811

*Thais luteostoma* (Holten) --- *Purpura luteostoma* (Holten)

动物名 黄口荔枝螺《动物图谱·软体》  
 药材名 辣螺《中国海洋药物》  
 功效 贝壳:化痰止咳,软坚散结,明目退翳。

### 85039 蛾螺科 Buccinidae

#### 8503901

*Babylonia areolata* (Lamarck)

动物名 方斑东风螺《动物图谱·软体》  
 药材名 东风螺(浙江、广西)  
 地方名 浙江:号子螺。  
 功效 壳:清热解毒,制酸止痛。用于胃酸过多、胃及十二指肠溃疡,疮癣疥癩,烫伤;肉:止血,润燥。用于大便燥结,鼻衄。

#### 8503902

*Babylonia lutosa* (Lamarck)

动物名 泥东风螺《动物图谱·软体》  
 文献名 甜螺《海洋药物》,东风螺、南风螺《中国药用动物志》  
 功效 贝壳:清热解毒,制酸止痛。用于胃酸过多、胃及十二指肠溃疡,疮癣疥癩;肉:止血,润燥。用于鼻衄,大便燥结。

#### 8503903

*Napitunea cumingi* Crosse

动物名 香螺《动物图谱·软体》  
 药材名 香螺《海洋药物》  
 功效 壳:解痉,制酸,化痰,软坚;肉:清热明目;庵:清热解毒。

#### 8503904

*Neptunus anguinalentus* (Herbst)

动物名 红星梭子蟹《浙江中医学院学报》  
 药材名 枪蟹《浙江中医学院学报》  
 功效 肉和内脏:清热,散血,滋阴。

### 85040 盔螺科 Galeodidae

#### 8504001

*Hemifusus ternatanus* (Gmelin)

动物名 细角螺《动物图谱·软体》  
 药材名 角螺庵(拟)  
 文献名 天狗角螺、号螺《中国药用动物志》,方螺、海螺、螺蒂《南海海洋药用生物》  
 地方名 浙江:角螺,响螺。  
 功效 庵:燥湿,收敛,解毒。用于白带,头疮,下肢溃疡,中耳炎;肉:滋阴补气。用于阴虚体弱,腰痛。

#### 8504002

*Hemifusus tuba* (Gmelin)

动物名 管角螺《动物图谱·软体》  
 药材名 角螺庵(拟)  
 文献名 号螺《中国药用动物志》  
 地方名 角螺、响螺、海螺(浙江、广西)。  
 功效 庵:燥湿,收敛,解毒。用于白带,头疮,下肢溃疡,中耳炎;肉:滋阴补气。用于阴虚体弱,腰痛。

### 85041 榧螺科 Olividae

#### 8504101

*Oliva miniacea* (Roding) --- *Oliva erythrostoma* (Meuschen)

动物名 红口榧螺《动物图谱·软体》  
 药材名 榧螺壳(拟)  
 文献名 榧子螺《中国药用动物志》  
 功效 壳:平肝潜阳,清燥润肺。用于高血压,头晕,青盲内障,骨蒸劳热。

#### 8504102

*Oliva mustellina* Lamarck

动物名 伶鼬榧螺《动物图谱·软体》  
 药材名 榧螺壳(拟)  
 文献名 马齿螺《中国药用动物志》,榧螺《常见药用动物》  
 功效 壳:平肝潜阳,清燥润肺。用于高血压,头晕,青盲内障,内蒸劳热。

### 85042 涡螺科 Volutidae

#### 8504201

*Cymbium melo* (Solander)

动物名 瓜螺《拉汉无脊椎动物名称》  
 药材名 红螺塔[卵群]《中国药用动物志》  
 地方名 广西:油螺,红螺。  
 功效 卵群:制酸止痛,解热。用于胃痛,发烧;肉:用于头晕。

### 85043 海兔科 Aplysiidae

#### 8504301

*Aplysia dactylomela* Rang

动物名 黑指纹海兔《拉汉海洋生物名称》  
 药材名 海粉(广西)  
 功效 卵群:清热养阴,软坚消痰。用于肺燥咳嗽,瘰疬,瘰癧。

#### 8504302

*Aplysia kurodai* (Baba)

动物名 黑斑海兔《拉汉海洋生物名称》  
 药材名 海粉(台湾)  
 文献名 海兔《海洋药物》  
 功效 卵群:清热,滋阴,软坚,消痰。

#### 8504303

*Aplysia pulmonica* Gould

动物名 网纹海兔《中国海洋药物》  
 药材名 海粉(浙江)  
 地方名 浙江:海兔,海挂面[卵群]。  
 功效 卵群、紫液体:清热,滋阴,消炎,软坚消痰。紫液内有抗癌物质。

#### 8504304

*Notarchus leachii cirrosus* Stimpson --- *Notarchus leachii freeri* (Griffin)

动物名 蓝斑背肛海兔《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 海粉〔卵群〕《医学入门》、《汇编》

文献名 红海粉《纲目拾遗》,海兔《中国药用动物志》,海挂面《海洋药物》,海粉母、海挂面母《海洋药物民间应用》,海兔粉《汇编》

地方名 浙江;海珠,雨虎。

功效 卵群:滋阴清热,软坚散结,解毒止血,润肺止咳。用于淋巴结核,肺燥咳嗽,鼻衄,瘰疬,肺结核。

备考 海兔可食用,但其皮肤含挥发油,对神经系统有麻痹作用,大量食用能引起疼痛。

### 85044 阿地螺科 Atyidae

#### 8504401

*Bullacta exarata* (Philippi)

动物名 吐铁(姚可成《食物本草》)、《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 泥螺肉《中国药用动物志》

文献名 泥螺《纲目》,麦螺、梅螺《闽中海错疏》,土螺《医林纂要》

地方名 浙江;泥极。

功效 软体:补气,润肺,滋阴。用于肺结核,阴虚咳嗽。

### 85045 海牛科 Dorididae

#### 8504501

*Dendrodoris nigra* (Stimpson)

动物名 黑枝螺海牛《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 海牛《海洋药物》

功效 全体:补肾,兴阳,固精。

#### 8504502

*Doris johnstoni* A. & H.

动物名 海牛《动物学大辞典》

药材名 海牛《本草原始》、《中药大辞典》

功效 全体:补肾兴阳。

### 85046 石磺海牛科 Homiodorididae

#### 8504601

*Homiodoris japonica* Bergh

动物名 石磺海牛《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 石磺海牛《海洋药物》

文献名 海牛《中药材科技》

功效 全体:补肾兴阳。

### 85047 侧鳃海牛科 Pleurobranchidae

#### 8504701

*Pleurobranchaea novaezealandiae* Cheeseman

动物名 蓝无壳侧鳃《拉汉海洋生物名称》

文献名 无壳侧鳃、蓝侧鳃海牛《海洋药物》

功效 全体:补肾,兴阳,固精。

### 85048 枝背海牛科 Dendronotidae

#### 8504801

*Dendronotus frondosus* (Ascanius)

动物名 树枝背海牛《拉汉海洋生物名称》

药材名 树枝背海牛《海洋药物》

功效 全体:补肾,兴阳,固精。

### 85049 石磺科 Ocidiidae

#### 8504901

*Onchidium verruculatum* Cuvier

动物名 石磺《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 土海参《中国海洋药物》

功效 全体:滋补强壮。

### 85050 锥实螺科 Lymnaeidae

#### 8505001

*Lymnaea stagnalis* (L.)

动物名 静水椎实螺《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 椎实螺《中国药用动物志》

文献名 水螺《中国药用动物志》

功效 全体:息风镇静,消肿止痛。用于小儿惊风,痔疮,脱肛等。

### 85051 玛瑙螺科 Achatinidae

#### 8505101

*Achatina fulica* (Ferussac)

动物名 褐云玛瑙螺《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 菜螺《中国药用动物志》

文献名 东风螺、非洲蜗牛《中国药用动物志》

功效 螺肉:滋补强壮。用于小儿夜尿,尿频,红白痢,高血压病,冠心病的辅助治疗。

### 85052 肋齿螺科 Pleurodontidae

#### 8505201

*Camaena cicatricosa* (Muller)

动物名 皱坚螺《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 天螺《中草药通讯》

文献名 皱疤坚螺、圆螺《中草药通讯》,皱巴坚螺《中国药用动物志》

功效 贝壳:收敛止血,解毒消疮。外用于阴疮不敛;肉:滋补强壮。

### 85053 巴蜗牛科 Bradybaenidae

#### 8505301

*Bradybaena kiangsiensis* (Martens)

动物名 江西巴蜗牛《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 土牛《中国药用动物志》

文献名 天螺、蜒蚰螺《中国药用动物志》

功效 贝壳或全体:利水消肿,清热解毒。用于小便不利,疔疮肿毒,脱肛,痔疮。外用于流行性腮腺炎。

#### 8505302

*Bradybaena rivida* (Benson) --- *Fruticicola rivida* (Benson)

动物名 灰巴蜗牛《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蜗牛《中国药用动物志》

文献名 灰蜗牛、水牛、蜒蚰螺《中国药用动物志》

功效 贝壳或全体：利水消肿，清热解毒。用于小便不利，疔疮肿毒，脱肛，痔疮。外用于流行性腮腺炎。

#### 8505303

*Bradybaena similaris* (Ferussae) --- *Helix similaris* Ferussae --- *Eulota similaris* Ferussae --- *Eulota peliomphala* Pfeiffer --- *Eulota graminum* (Heude) --- *Helix graminum* Heude

动物名 同型巴蜗牛《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蜗牛《别录》、《中国药用动物志》

文献名 仆累《山海经》，蚶羸、蹄蚶《尔雅》，蜗羸、螺羸《说文》，小牛螺、黄接《三苍》，蠡羸《广雅》，山蜗、瓜牛《本草经集注》，陵螺《崔豹古今注》，蠡牛《药性论》，负壳蜒蚰《日华子本草》，蜗牛壳《图经》，海羊《仙传外科集验方》，早螺、早螺壳《滇南本草》，蜒蚰羸、土牛儿《纲目》，负壳蛞蝓《东医宝鉴》，圆螺虫《生草药手册》

地方名 天螺蛳《陕西、广西、四川》；陕西：挂挂牛；福建：肌母螺《泉州》，无厝螺；湖北：白螺丝；广西：天螺《陆川》，蜗虫，野螺蛳；云南：汉螺，早螺锅锅，蜒蚰螺。

功效 贝壳或全体：利水消肿，清热解毒。用于小便不利，疔疮肿毒，脱肛，痔疮。外用于流行性腮腺炎。

#### 8505304

*Cathaica fasciola* (Draparnaud)

动物名 华蜗牛《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蜗牛《中国药用动物志》

文献名 条华蜗牛《中草药通讯》

功效 贝壳或全体：利水消肿，清热解毒。用于小便不利，疔疮肿毒，脱肛，痔疮。

#### 8505305

*Euhadra moreletiana* Heude

动物名 三带壮蜗牛《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 三带壮蜗牛《中国药用动物名录》

功效 全体：利水消肿，清热解毒。

### 85054 蛞蝓科 Limacidae

#### 8505401

*Agriolimax agrestis* L.

动物名 野蛞蝓《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛞蝓《中国药用动物志》

文献名 蜒蚰《中国药用动物志》

地方名 湖北：鼻涕虫、咸搭虫《神农架》。

功效 全体：清热解毒，消肿平喘，破瘀通经，软坚理疳。用于中风喎僻，筋脉拘挛，惊痫，咽肿，支气管痉挛，脱肛，疝气，疮肿，毒虫螫伤。

#### 8505402

*Limax flavus* L. --- *Limax variegatus* Kaleniczeno ---

*Ktynickillus maculatus* Taylor

动物名 黄蛞蝓《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛞蝓《本经》、《汇编》

文献名 陵蠡《本经》，土蜗、附蜗《别录》，蜒蚰《救急

方》，托胎虫《铁围山丛谈》，蛞蝓《品汇精要》，鼻涕虫《纲目》，无壳蜒蚰螺《中草药通讯》

功效 全体：疏风，镇静，固脱，解毒。用于热疮肿毒，支气管哮喘，脱肛，疝气，痔疮肿毒。

#### 8505403

*Limax maximus* L.

动物名 大蛞蝓《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛞蝓《汇编》

文献名 大鼻涕虫《拉汉无脊椎动物名称》，蜒蚰《虫类药的应用》

功效 全体：疏风，镇静，固脱，解毒。用于热疮肿毒，支气管哮喘，痔疮肿毒，脱肛。

### 85055 粘液蛞蝓科 Philomycidae

#### 8505501

*Philomycus bilineatus* (Benson)

动物名 双线嗜粘液蛞蝓《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛞蝓《汇编》

文献名 双线粘液蛞蝓《汇编》

功效 全体：疏风，镇静，固脱，解毒。用于热疮肿毒，支气管哮喘，痔疮肿毒，脱肛。

#### 8505502

*Philomycus rugulosus* Chen et Kao

动物名 皱纹嗜粘液蛞蝓《浙江中医学院学报》

功效 全体：消肿止痛，平喘，固脱。用于热疮肿痛，支气管炎，哮喘，脱肛。

### 85056 蛞蝓科 Arcidae

#### 8505601

*Arca granosa* L. --- *Anadara granosa* L. --- *Tegilarca granosa* (L.)

动物名 泥蚶《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 瓦楞子《本草备要》、《药典》

文献名 蚶、蚶壳《本草拾遗》，蚶子壳《本草蒙筌》，堇蛤《中国药用动物志》

地方名 山东：蚶子，血蛤，瓦堇蛤，瓦堇蛤皮；浙江：粒蚶，堇蚶；广西：瓦屋子，瓦堇子，瓦弄子；其他：伏贝，灰贝，毛蚶，麻歪歪子，马蚶壳。

功效 贝壳：消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。用于顽痰积结，粘稠难咯，癭瘤，瘰癧，癥瘕痞块，胃痛泛酸。

#### 8505602

*Arca inflata* Reeve --- *Anadara inflata* Reeve

动物名 魁蚶《药典》

药材名 瓦楞子《本草备要》、《药典》

文献名 复累、瓦屋子《说文》，蚶、蚶壳《本草拾遗》，蚶子《岭表录异》，伏老《图经》，瓦堇子《丹溪心法》，蚶子壳《本草蒙筌》

地方名 山东：血蚶，瓦堇蛤皮；浙江：花蚶壳；其他：大蚶子，赤贝，血贝。

功效 贝壳：消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。用于顽痰积结，粘稠难咯，癭瘤，瘰癧，癥瘕痞块，胃痛泛酸。

备考 《中国药用动物名录》之魁蚶学名为 *Scapharca broughtonii* (Schrenck)

## 8505603

*Arca subcrenata* Lischke --- *Anadara subcrenata* Lischke  
--- *Scapharca subcrenata* (Lischke)

动物名 毛蚶《本草求真》、《拉汉海洋生物名称》

药材名 瓦楞子《本草备要》、《药典》

文献名 蚶、蚶壳《本草拾遗》，蚶子壳《本草蒙筌》，瓦垄、瓦蛤《东北动物药》，瓦屋子《中国药用海洋生物》，毛蛤蜊《中国药用动物志》，魁蛤壳《简明中医辞典》

地方名 山东：瓦垄子，瓦垄蛤皮；其他：香蕉贝，角子。

功效 贝壳：消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。用于顽痰积结，粘稠难咯，癭瘤，瘰癧，瘰癧痞块，胃痛泛酸。

85057 贻贝科 *Mytilidae*

## 8505701

*Modiolus metcalferi* Hanley --- *Modiola metcalferi* Hanley

动物名 麦氏偏顶蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 淡菜《浙江中医学院学报》

文献名 角偏顶蛤《海洋药物》，偏顶蛤《浙江中医学院学报》

功效 肉：滋阴补肾，养血调经；壳：平肝潜阳。代石决明用。

## 8505702

*Modiolus modiolus* L. --- *Mytilus modiolus* (L.) --- *Voisella modiolus* (L.)

动物名 偏顶蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 淡菜《汇编》

文献名 扁顶蛤《中国药用动物志》，毛偏顶蛤《海洋药物》

功效 肉：滋阴补血，益精，止痢，消瘿。用于虚劳，阳痿，肾虚腰痛，贫血，久痢，瘵气；壳：平肝潜阳。代石决明用。

## 8505703

*Modiolus philippinarum* Hanley

动物名 菲氏偏顶蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 淡菜《汇编》

文献名 菲律宾扁顶蛤《汇编》

功效 肉：滋阴补血，益精，止痢，消瘿。用于虚劳，阳痿，肾虚腰痛，贫血，久痢，瘵气；壳：平肝潜阳。代石决明用。

## 8505704

*Musculus senhousei* (Benson)

动物名 寻氏肌蛤《拉汉海洋生物名称》

药材名 淡菜《中国药用动物志》

文献名 彩肌蛤《中国药用动物志》，寻氏短齿蛤《海洋药物》，凸壳肌蛤《中国药用动物名录》

功效 肉：滋阴补血，益精，止痢，消瘿。用于虚劳，阳痿，肾虚腰痛，贫血，久痢，瘵气；壳：平肝潜阳；

壳、肉：用于伤口发炎，慢性气管炎，鼻疖，脚生鸡疗等。

## 8505705

*Mytilus crassitesta* Lischke

动物名 厚壳贻贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 淡菜《食疗本草》、《汇编》

文献名 壳菜《嘉祐本草》，海蛭、东海夫人《纲目》，红蛤《东医宝鉴》，珠菜《本草备要》

地方名 浙江：贻贝。

功效 肉：滋阴补血，益精，止痢，消瘿。用于虚劳，阳痿，肾虚腰痛，贫血，久痢，瘵气；壳：平肝潜阳，补阴止血。用于头昏眼花，阳痿早泄，镇静降压，大肠、子宫出血。

备考 《拉汉海洋生物名称》之厚壳贻贝学名为 *Mytilus coruscus* Gould

## 8505706

*Mytilus edulis* L.

动物名 贻贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 淡菜《食疗本草》、《汇编》

文献名 壳菜《嘉祐本草》，海蛭、东海夫人《纲目》，紫贻贝《拉汉海洋生物名称》

地方名 浙江：海红，乌头。

功效 肉：滋阴补血，益精，止痢，消瘿。用于虚劳，阳痿，肾虚腰痛，贫血，久痢，瘵气；壳：平肝潜阳，补阴止血。用于头昏眼花，阳痿早泄，镇静降压，大肠、子宫出血。

## 8505707

*Mytilus grayanus* Dunker

动物名 重贻贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 淡菜《浙江中医学院学报》

文献名 大贻贝《浙江中医学院学报》

功效 肉：补肝肾，调经，降压；壳：平肝潜阳。

## 8505708

*Mytilus viridis* L. --- *Mytilus smaragdinus* Chemnitz --- *Perna viridis* (L.)

动物名 翡翠贻贝《南海海洋药用生物》

药材名 淡菜《汇编》

功效 肉：滋阴补血，益精，止痢，消瘿。用于虚劳，阳痿，肾虚腰痛，贫血，久痢，瘵气；壳：平肝潜阳，补阴止血。用于头昏眼花，阳痿早泄，镇静降压，大肠、子宫出血。

## 8505709

*Vignadula atrata* (Lischke) --- *Modiolus atrata* (Lischke) --- *Voisella atrata* (Lischke)

动物名 黑莽麦蛤《拉汉海洋生物名称》

药材名 乌蛤《浙江》、《中国海洋药物》

地方名 浙江：黑偏顶蛤。

功效 肉：滋阴补血，益精，止痢，消瘿。用于虚劳，阳痿，肾虚腰痛，贫血，久痢，瘵气；壳：平肝潜阳，补阴止血。用于头昏眼花，阳痿早泄，镇静降压，大肠、子宫出血。

**85058 钳蛤科 Isognomonidae****8505801***Malleus malleus* (L.)

动物名 丁蛎《拉汉海洋生物名称》

药材名 丁蛎《中国药用动物名录》

文献名 白丁蛎、螺蛳、丁字贝、海丁子《中国药用动物志》

功效 贝壳:清热解暑。用于湿疮、疖肿。

**85059 珍珠贝科 Pteriidae****8505901***Pinctada anomioides* (Reeve)

动物名 拟金蛤珠母贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠(海南)、《海洋药物》

功效 珍珠:安神定惊,平肝潜阳,明目去翳,清热解暑,收敛生肌;壳内珍珠层:同样可药用。

**8505902***Pinctada chemnitzii* (Philippi)

动物名 长耳珠母贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠(海南)、《海洋药物》

文献名 解氏珠母贝、珍珠贝《海洋药物》

功效 珍珠:安神定惊,平肝潜阳,明目去翳,清热解暑,收敛生肌;壳内珍珠层:同样可药用。

**8505903***Pinctada margaritifera* (L.) --- *Pteria margaritifera* (L.)

动物名 珠母贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠《开宝本草》、《汇编》,珍珠母《饮片新参》、《中药大辞典》

文献名 真珠《本草经集注》,真珠《雷公炮炙论》,蚌珠《南方志》,珠牡、珠母《图经》,珠子《儒门事亲》,濂珠《增订伪药条辨》,走珠、明月、南珠、神胎、麻尼、滑珠、蛟珠、蚌胎、螭珠、蟹珠、西洋珠、北海珠、南海珠、李藏珠、走盘珠、南蕃珠、珍珠儿、恶思佛《新纲》,明珠母《中药志》,珠贝母《汇编》,黑蝶珠母贝、海水珍珠《海洋药物》,珍珠贝《拉汉海洋生物名称》

功效 珍珠:安神定惊,明目消翳,解毒生肌。用于惊悸失眠,惊风癫痫,目生云翳,疮疡不敛;贝壳(珍珠母):平肝潜阳,定惊明目。用于头痛眩晕,烦躁失眠,肝热目赤,肝虚目昏。

**8505904***Pinctada martensii* (Dunker) --- *Pteria martensii* (Dunker)

动物名 马氏珠母贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠《开宝本草》、《药典》,珍珠母《饮片新参》、《药典》

文献名 真珠《本草经集注》,真珠《雷公炮炙论》,蚌珠《南方志》,珠牡、珠母《图经》,珠子《儒门事亲》,濂珠《增订伪药条辨》,明珠母《中药志》,合浦珠母贝《中国药用海洋生物》,珍珠贝壳、海水珍珠、珍珠贝、马氏珍珠贝《海洋药物》,珠贝《常见药用动物》,珍珠层粉、海珠粉《中草药通讯》,真珠、走珠、生珠、滑珠、花珠、南

珠、明月、蛟珠、速不、麻尾、神胎、珠粉、滨珠、濂珠、蟹珠、珍珠儿、恶思佛、中濂珠、北海珠、南海珠、西洋珠、走盘珠、李藏珠、奎濂珠、粗濂珠、细濂珠、湖濂珠、南蕃珠、马价珠、新花珠、老花珠、珠母、明珠母、真珠贝壳《中药名汇》

功效 珍珠:安神定惊,明目消翳,解毒生肌。用于惊悸失眠,惊风癫痫,目生云翳,疮疡不敛;贝壳(珍珠母):平肝潜阳,定惊明目。用于头痛眩晕,烦躁失眠,肝热目赤,肝虚目昏。

**8505905***Pinctada maxima* (Jameson)

动物名 大珠母贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠贝壳《海洋药物》

文献名 珍珠贝、白蝶贝《南海海洋药用生物》,海水珍珠、白蝶珠母贝《海洋药物》

地方名 海南:珍珠。

功效 贝壳及珍珠:清热解暑,去腐生肌,安神镇静。用于溃疡,湿疹,角膜炎,神经衰弱,风湿性心脏病,麻风性溃疡等。

**8505906***Pinctada nigra* (Gould)

动物名 黑珠母贝《拉汉海洋生物名称》

药材名 珍珠贝壳《海洋药物》

功效 贝壳珍珠层粉:清热解暑,去腐生肌,安神镇静。

**8505907***Pteria lata* (Gray)

动物名 宽珍珠贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠《海洋药物》

功效 珍珠:安神定惊,平肝潜阳,明目去翳,清热解暑,收敛生肌。壳的珍珠层同样可药用。

**8505908***Pteria penguin* (Roding)

动物名 企鹅珍珠贝《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠(台湾、广东、广西)

文献名 企鹅贝《海洋药物》

功效 珍珠:安神定惊,平肝潜阳,明目去翳,清热解暑,收敛生肌。壳内珍珠层同样入药。

**85060 江珧科 Pinnidae****8506001***Pinna atropurpurea* Sowerby

动物名 紫色裂江珧《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 干贝《海洋药物》

功效 后闭壳肌(干贝):滋阴补肾,调中。

**8506002***Pinna pectinata* L.

动物名 栉江珧《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 干贝《中药大辞典》

文献名 珧《尔雅》,玉珧《尔雅》郭璞注,马甲柱《闽中海错疏》,江珧柱《本草从新》,角带子《本草求原》,簾箕蛤蜊《中国药用动物志》,江珧《海洋药物》

地方名 浙江:牛角蛭。

功效 后闭壳肌(干贝):滋阴补肾,调中。用于消渴;贝壳:清热解毒,息风镇静。用于湿疹,高血压头痛。

#### 8506003

*Pinna vexillum* Born

动物名 旗江珧(拉汉海洋生物名称)

药材名 干贝(海洋药物)

功效 后闭壳肌(干贝):滋阴补肾,调中。

### 85061 扇贝科 Pectinidae

#### 8506101

*Chlamys farreri* (Jones et Preston)

动物名 栉孔扇贝(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 干贝(海洋药物)

文献名 石岛异耳扇贝(浙江中医学院学报)

地方名 浙江:干贝蛤。

功效 贝壳:清热滋阴,安神,平肝,息风。用于心神不安,心烦失眠,惊风癫痫,溃疡病,胃酸过多,泄泻,遗精,带下,湿疹,内外出血;后闭壳肌(干贝):滋阴补肾,调中。并有抗癌作用。

#### 8506102

*Chlamys niponensis akazara* Kwoda

动物名 日本栉孔扇贝(拉汉海洋生物名称)

药材名 干贝(海洋药物)

文献名 干贝蛤(海洋药物)

功效 后闭壳肌(干贝):滋阴,补肾,调中。近谓扇贝卵巢提取物治疗白血病有效。

#### 8506103

*Chlamys nobilis* (Reeve)

动物名 华贵栉孔扇贝(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 干贝(海洋药物)

功效 后闭壳肌(干贝):滋阴,补肾,调中。近谓扇贝卵巢提取物治疗白血病有效。

#### 8506104

*Chlamys pica* (Reeve)

动物名 花鹊栉孔扇贝(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 扇贝(浙江)、(中国海洋药物)

功效 贝壳:化痰止咳,软坚散结,明目退翳。

### 85062 海菊蛤科 Spondylidae

#### 8506201

*Spondylus fragum* Reeve

动物名 草莓海菊蛤(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 草莓海菊蛤(海洋药物)

功效 壳:清热解毒,止咳化痰,消肿散结。

#### 8506202

*Spondylus imperialis* Chenu

动物名 堂皇海菊蛤(拉汉无脊椎动物名称)

文献名 刺蚶(中国药用动物志),喇蚶(中国药用海洋生物)

功效 贝壳:清热解毒,止咳化痰,消肿散结。用

于痰多咳嗽,中耳炎,瘰结。

#### 8506203

*Spondylus nicobaricus* Chemnitz

动物名 紫斑海菊蛤(拉汉无脊椎动物名称)

文献名 刺蚶、海菊蛤(中国药用动物志)

功效 壳:清热解毒,止咳祛痰,消肿散结。用于痰多咳嗽,中耳炎,瘰结。

### 85063 海月蛤科 Placunidae

#### 8506301

*Placuna placenta* (L.)

动物名 海月(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 海月(本草拾遗)、(中药大辞典),海月亮(本草从新)、(中药大辞典)

文献名 镜鱼(临海异物志),以下鱼(食疗本草),玉珧、江珧、马颊、马甲(纲目),海镜、膏叶盘(岭表录异),蛎镜、明瓦(闽中海错疏),蛎壳片(本草从新),蚌蜆窗(南海海洋药用生物)

地方名 浙江:蚌蜆窗,玻璃镜;广西:窗贝,石镜;其他:蛎壳,灯笼贝,蛤云母,〔云母石〕。

功效 肉:利大小肠,除关格,黄疸,消渴;壳:泻湿热。外用于洗鹤膝风,湿疹。

### 85064 牡蛎科 Ostreidae

#### 8506401

*Ostrea circumpicta* Pilsbry

动物名 花缘牡蛎(拉汉海洋生物名称)

文献名 围褶牡蛎(海洋药物)

功效 壳:滋阴潜阳,镇静敛汗,固精止带,化痰软坚;肉:滋阴养血。

#### 8506402

*Ostrea cucullata* Born

动物名 僧帽牡蛎(拉汉海洋生物名称)

药材名 牡蛎(中药志)

文献名 蠔、蠔山、蠔甫、牡蛤、古贲、左顾、蛎蛤(新纲),蛎黄(浙江中医学院学报)

地方名 广西:海蛎,蛎,大蛎,蛎壳,有利,蛎房,蛎壳。

功效 壳:镇静安神,平肝潜阳,收敛固涩,软坚散结,制酸止痛;肉:滋阴养血,安神。

#### 8506403

*Ostrea denselamellosa* Lischke

动物名 密鳞牡蛎(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 海蛎子(山东、浙江)

文献名 板帆牡蛎、蚝山、蚝甫、牡蛤、古贲、左顾、蛎蛤(新纲),蠔、蠔蛎子(南海海洋药用生物),牡蛎(中国药用动物志)

地方名 浙江:蚝,蚝蛎子,蛎房。

功效 贝壳:潜阳,固涩,软坚,制酸。用于眩晕,心悸失眠,自汗,盗汗,遗精,白带,淋巴结结核,甲状腺肿大,胃酸过多,高血压,脱肛,腹泻不止,消渴,腥红热,眼花;肉:滋阴养血,镇惊。用于烦热失眠,心神不



安, 丹毒, 颈淋巴结结核。

#### 8506404

*Ostrea echinata* Quoy et Gaimard

动物名 棘刺牡蛎(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 棘刺牡蛎(中国药用动物名录)

功效 贝壳: 重镇安神, 潜阳补阴, 软坚散结, 收敛固涩; 肉: 滋阴养血。

#### 8506405

*Ostrea gigas* Thunberg

动物名 长牡蛎(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 牡蛎(本经)、《药典》

文献名 蛎蛤(本经), 牡蛤(别录), 左顾(本草经集注), 古贲(杨孚《异物志》), 蚝(纲目), 蚝山、蚝甫(新纲), 大牡蛎(中国药用动物志), 蚝壳、海蛎子壳、左牡蛎(简明中医辞典)

地方名 浙江: 海蛎子。

功效 贝壳: 重镇安神, 潜阳补阴, 软坚散结, 收敛固涩。用于惊悸失眠, 眩晕耳鸣, 瘰癧痰核, 瘰癧痞块, 自汗盗汗, 遗精崩带, 胃痛泛酸; 煅牡蛎: 收敛固涩。用于自汗盗汗, 遗精崩带, 胃痛吞酸; 肉: 滋阴养血, 镇惊。用于烦热失眠, 心神不宁, 丹毒, 颈淋巴结结核。

#### 8506406

*Ostrea hyotis* L.

动物名 舌骨牡蛎(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 海蛎子(山东、浙江)

地方名 山东: 海蛎子壳; 浙江: 蠔壳。

功效 贝壳: 敛阴, 潜阳, 止汗, 涩精, 化痰, 软坚。用于惊痫, 眩晕, 自汗, 遗精, 淋浊, 崩漏, 带下, 瘰癧, 瘰癧。

#### 8506407

*Ostrea licatula* Gmelin

动物名 褶牡蛎(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 牡蛎(中国药用动物志)

地方名 浙江: 海蛎子, 蛎黄。

功效 贝壳: 重镇安神, 潜阳补阴, 软坚散结, 收敛固涩; 肉: 滋阴养血。

#### 8506408

*Ostrea mordax* Gould

动物名 咬齿牡蛎(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 咬齿牡蛎(中国药用动物名录)

功效 贝壳: 重镇安神, 潜阳补阴, 软坚散结, 收敛固涩; 肉: 滋阴养血。

#### 8506409

*Ostrea rivularis* Gould

动物名 近江牡蛎(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 牡蛎(本经)、《药典》

文献名 蛎蛤(本经), 古贲(杨孚《异物志》), 牡蛤(别录), 左顾牡蛎(补缺肘后方), 牡蛎肉(本草拾遗), 蛎房、蠔莆(图经), 蛎黄(纲目), 左壳(中药志), 蠔(常见药用动物)

地方名 山东: 蠔壳; 浙江: 海蛎子壳, 海蛎子皮, 蛎蛎子, 海蛎子。

功效 贝壳: 重镇安神, 潜阳补阴, 软坚散结, 收敛固涩。用于惊悸失眠, 眩晕耳鸣, 瘰癧痰核, 瘰癧痞块, 自汗盗汗, 遗精崩带, 胃痛泛酸; 煅牡蛎: 收敛固涩。用于自汗盗汗, 遗精崩带, 胃痛吞酸; 肉: 滋阴养血。用于虚烦失眠, 心神不安, 丹毒。

#### 8506410

*Ostrea talienwhanensis* Crosse

动物名 大连湾牡蛎(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 牡蛎(本经)、《药典》

文献名 蛎蛤(本经), 古贲(杨孚《异物志》), 牡蛤(别录), 左顾牡蛎(补缺肘后方), 牡蛎肉(本草拾遗), 蛎房、蠔莆(图经), 蛎黄(纲目), 左壳(中药志), 蚝壳、海蛎子壳、左牡蛎(简明中医辞典), 海蛎子(中药物材料科技)

功效 贝壳: 重镇安神, 潜阳补阴, 软坚散结, 收敛固涩。用于惊悸失眠, 眩晕耳鸣, 瘰癧痰核, 瘰癧痞块, 自汗盗汗, 遗精崩带, 胃痛泛酸; 煅牡蛎: 收敛固涩。用于自汗盗汗, 遗精崩带, 胃痛吞酸; 肉: 滋阴养血。用于烦热失眠, 心神不安, 丹毒。

### 85065 珍珠蚌科 Margaritidae

#### 8506501

*Margaritana dahurica* (Middendorff)

动物名 珠母珍珠蚌(中国药用动物名录)

药材名 珍珠、珍珠母(东北)

功效 珍珠: 安神镇静, 清热明目, 收敛生肌; 贝壳(珍珠母): 平肝熄风, 滋阴潜阳, 定惊止血。

#### 8506502

*Margaritana margaritifera* L.

动物名 珍珠蚌(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 珍珠母(东北动物药)

文献名 河珠母(东北动物药), 珠母贝(中国动物药)

功效 贝壳(珍珠母): 平肝熄风, 益阴潜阳, 定惊止血。用于癫狂惊痫, 头目眩晕, 心悸耳鸣, 头痛失眠, 叶血衄血, 崩漏。

### 85066 蚌科 Unionidae

#### 8506601

*Anodonta arcuiformis* (Heude)

动物名 蚌形无齿蚌(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 珍珠母(中国药用动物志)

文献名 蚌形河蚌(东北动物药), 河蚌、卵形蚌、河蚌子(中国药用动物志)

功效 贝壳: 平肝熄风, 滋阴潜阳, 定惊止血。用于癫狂惊痫, 头目眩晕, 心悸耳鸣, 头痛失眠, 吐血, 衄血, 崩漏, 翳障。

#### 8506602

*Anodonta euscaphys* (Hede)

动物名 舟形无齿蚌(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 珍珠母(东北)、《中国药用动物名录》

功效 贝壳: 平肝熄风, 滋阴潜阳, 定惊止血。

## 8506603

*Anodonta fluminea* (Heude)

- 动物名 淡水无齿蚌(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 珍珠母(华东)  
 文献名 河无齿蚌《中国药用动物名录》  
 功效 贝壳:平肝熄风,滋阴潜阳,定惊止血。

## 8506604

*Anodonta globosula* (Heude)

- 动物名 珠形无齿蚌(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 珍珠母(安徽、江西、湖南)  
 文献名 球形无齿蚌《中国药用动物名录》  
 功效 贝壳:平肝熄风,滋阴潜阳,定惊止血。

## 8506605

*Anodonta pacifica* (Heude)

- 动物名 圆蚌(汇编)  
 药材名 蚌肉《食疗本草》,蚌壳粉《本草述》  
 文献名 蚌《嘉祐本草》  
 地方名 广西:河蚌。  
 功效 肉、贝壳:除湿,明目。用于崩漏,带下,痔疮肿痛;壳:化痰消积。用于反胃呕吐,止白带,涂痢疮。

## 8506606

*Anodonta woodiana* (Lea)

- 动物名 背角无齿蚌《中国药用动物志》  
 药材名 珍珠、珍珠母《中国药用动物志》  
 文献名 蚌蛤灰《千金方》,蚌肉《食疗本草》,蚌粉《日华子本草》,蚌《嘉祐本草》,蜃灰《纲目》,蚌壳粉《本草述》,活蚌水《本经逢原》,蚌泪《纲目拾遗》,河歪《本草再新》,蚌壳灰《中国医学大辞典》,真珠母、明珠母《中药志》,无齿蚌、池蚌、珠蚌、河蚌、背壳无齿蚌(汇编),淡水珍珠《海洋药物》  
 地方名 吉林:河蛤蜊;福建:蚌清水(泉州);其他:蛤蜊。

功效 珍珠:安神定惊,明目消翳,解毒生肌。用于惊悸失眠,惊风癫痫,目生云翳,疮疡不敛;贝壳(珍珠母):平肝潜阳,定惊明目。用于头痛眩晕,烦躁失眠,肝热目赤,肝虚目昏;蚌肉:止渴,除热,解毒,去眼赤;体液(蚌泪):清热,明目,解毒。用于消渴,赤眼。外用于烫伤,痔肿,肿痛;贝壳粉:化痰消积,清热燥湿。用于痰饮咳嗽,胃痛,呕逆,白带,痢肿,湿疮。

备考 《中药材》5:23,1985称:本品因质量低劣,浙江及我国九大城市调查,均无本品作珍珠母用者。

## 8506607

*Arcnaia lanceolata* (Lea)

- 动物名 扭蚌《中国药用动物志》  
 药材名 珍珠母《中国药用动物志》  
 文献名 香蕉贝、角子《中国药用动物志》  
 功效 贝壳(珍珠母):平肝熄风,滋阴潜阳,定惊止血。用于癫狂惊痫,头目眩晕,心悸耳鸣,头痛失眠,吐血,衄血,崩漏,翳障。

## 8506608

*Cristaria plicata* (Leach)

- 动物名 褶纹冠蚌(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 珍珠《药典》,珍珠母《饮片新参》、《药典》

文献名 蚌蛤灰《千金方》,蚌肉《食疗本草》,蚌《嘉祐本草》,蜃灰《纲目》,蚌壳粉《本草述》,活蚌水《本经逢原》,蚌泪《纲目拾遗》,河歪《本草再新》,蚌壳灰《中国医学大辞典》,燕蛤蜊《山东药用动物》

地方名 吉林:河蛤蜊;福建:蚌清水[体液]。

功效 珍珠:安神定惊,明目消翳,解毒生肌。用于惊悸失眠,惊风癫痫,目生云翳,疮疡不敛;贝壳(珍珠母):平肝潜阳,定惊明目。用于头痛眩晕,烦躁失眠,肝热目赤,肝虚目昏;蚌肉:止渴,解毒,去眼赤;体液(蚌泪):清热,明目,解毒。用于消渴,赤眼。外用于烫伤,痔肿,肿痛。

## 8506609

*Cuneopsis capitata* (Heude)

- 动物名 圆头楔蚌(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 珍珠母《中国药用动物志》  
 文献名 巨首楔蚌、老鸱嘴、楔子蚌《中国药用动物志》  
 功效 贝壳:平肝熄风,清热明目,收敛生肌,凉血止血。用于头目眩晕,心悸耳鸣,癫狂惊痫,吐血衄血,崩漏,翳障。

备考 有的地区作蚌壳入药。

## 8506610

*Cuneopsis celtiformis* (Heude)

- 动物名 矛形楔蚌(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 珍珠、珍珠母(江西、湖南)、《中国药用动物名录》  
 功效 珍珠:安神镇静,清热明目,收敛生肌;贝壳(珍珠母):平肝熄风,滋阴潜阳,定惊止血。

## 8506611

*Cuneopsis heudei* (Heude)

- 动物名 阿氏楔蚌(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 珍珠母《中药材》  
 文献名 圆头楔蚌《中国经济动物志》  
 功效 贝壳(珍珠母):平肝潜阳,定惊明目。

## 8506612

*Cuneopsis pisciculus* (Heude)

- 动物名 鱼尾楔蚌(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 珍珠、珍珠母(华东、湖南、湖北)、《中国药用动物名录》  
 功效 珍珠:安神镇静,清热明目,收敛生肌;贝壳(珍珠母):平肝熄风,滋阴潜阳,定惊止血。

## 8506613

*Cuneopsis rufescens* (Heude)

- 动物名 微红楔蚌(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 珍珠、珍珠母(江西、湖南)、《中国药用动物名录》  
 功效 珍珠:安神镇静,清热明目,收敛生肌;贝壳(珍珠母):平肝熄风,滋阴潜阳,定惊止血。

## 8506614

*Hyriopsis cumingii* (Lea)

- 动物名 三角帆蚌(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 珍珠、珍珠母《药典》

文献名 蚌蛤灰《千金方》，蚌肉《食疗本草》，蚌《嘉祐本草》，蚌粉《日华子本草》，蜃灰《纲目》，蚌壳粉《本草述》，活蚌水《本经逢原》，蚌泪《纲目拾遗》，河歪《本草再新》，蚌壳灰《中国医学大辞典》，大燕蛤蜊《中国药用动物志》

功效 珍珠：安神定惊，明目消翳，解毒生肌。用于惊悸失眠，惊风癫痫，日生云翳，疮疡不敛；贝壳（珍珠母）：平肝潜阳，定惊明目。用于头痛眩晕，烦躁失眠，肝热目赤，肝虚目昏；蚌肉：止渴，解毒，去眼赤；体液（蚌泪）：清热，明目，解毒。用于消渴，赤眼。外用于烫伤，痔肿，肿痛。

#### 8506615

*Lamprotula bazini* (Heude)

动物名 贝氏丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 巴氏丽蚌、蛤壳《鉴别手册》

功效 贝壳：有的地区作蛤壳入药。

#### 8506616

*Lamprotula biniaz* (Heude)

动物名 楔形丽蚌《中国经济动物志》

药材名 珍珠母《中国药用动物名录》

功效 贝壳（珍珠母）：平肝熄风，滋阴潜阳，定惊止血。

#### 8506617

*Lamprotula caveata* (Heude)

动物名 洞穴丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中药材》

功效 贝壳珍珠层：平肝，潜阳，定惊。用于头目眩晕，耳鸣心悸失眠，烦躁不安，惊风，衄血。

#### 8506618

*Lamprotula cornuun-lunae* (Heude)

动物名 角月丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 蛤壳《鉴别手册》

功效 贝壳：有的地区作蛤壳入药。

#### 8506619

*Lamprotula firbrosa* (Heude)

动物名 绢丝丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛤壳《中国药用动物名录》

功效 贝壳：有的地区作蛤壳入药。

#### 8506620

*Lamprotula gottschei* (Von Martens)

动物名 椭圆丽蚌《中国经济动物志》

药材名 珍珠母（辽宁）、《中国药用动物名录》

功效 贝壳（珍珠母）：平肝熄风，滋阴潜阳，定惊止血。

#### 8506621

*Lamprotula lei* (Griffith et Pidgeon)

动物名 背瘤丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中国药用动物志》

文献名 麻皮蚌、麻歪歪《中国药用动物志》

地方名 广西：蚌、河蚌、丽蚌。

功效 贝壳：平肝熄风，滋阴潜阳，定惊止血。用于

癫狂惊痫，头目眩晕，心悸耳鸣，吐血衄血，崩漏，翳障。

#### 8506622

*Lamprotula mansuyi* (Dautzenberg et Fischer)

动物名 佛耳丽蚌《中国经济动物志》

药材名 珍珠母（广西）、《中国药用动物名录》

功效 贝壳：平肝熄风，滋阴潜阳，定惊止血。

#### 8506623

*Lamprotula polysticta* (Heude)

动物名 多瘤丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中国药用动物志》

文献名 麻壳歪、直窝《中国药用动物志》

功效 贝壳：平肝息风，清热明目，收敛生肌，凉血止血。用于头目眩晕，心悸耳鸣，癫狂惊痫，吐血衄血，崩漏，翳障。

#### 8506624

*Lamprotula rochechouarti* (Heude)

动物名 猪耳丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中国药用动物志》

文献名 猪耳朵、牛脚板、牛脚蚌、猪耳壳《中国药用动物志》，蛤壳《鉴别手册》

功效 贝壳：平肝息风，清热明目，收敛生肌，凉血止血。用于头目眩晕，心悸耳鸣，癫狂惊痫，吐血衄血，崩漏，翳障。

#### 8506625

*Lamprotula scripta* (Heude)

动物名 刻裂丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母（华东）、《中国药用动物名录》

功效 贝壳：平肝熄风，滋阴潜阳，定惊止血。

备考 据《中药鉴别手册》记载：有的地区将丽蚌属及楔蚌属数种动物的贝壳代蛤壳药用。

#### 8506626

*Lamprotula spuria* (Heude)

动物名 斜丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 拟丽蚌、蛤壳《鉴别手册》

功效 贝壳：有的地区作蛤壳入药。

#### 8506627

*Lamprotula tientsincnsis* (Crosse & Debeaux)

动物名 天津丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中药材》

功效 贝壳珍珠层：平肝熄风，滋阴潜阳，定惊止血。有的地区作蛤壳入药。

#### 8506628

*Lamprotula tortuosa* (Lea)

动物名 失衡丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中国药用动物志》

文献名 老窝子、猪耳蚌《中国药用动物志》

功效 贝壳：平肝息风，清热明目，收敛生肌，凉血止血。用于头目眩晕，心悸耳鸣，癫狂惊痫，吐血衄血，崩漏，翳障。

#### 8506629

*Lamprotula triclavus* (Heude)

动物名 三巨瘤丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中药材》

功效 贝壳珍珠层:平肝,潜阳,定惊。用于头目眩晕,耳鸣,心悸,失眠,烦躁不安,惊风,衄血。

#### 8506630

*Lamprotula zonata* (Heude)

动物名 环带丽蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中药材》

功效 贝壳珍珠层:平肝,潜阳,定惊。用于头目眩晕,耳鸣,心悸,失眠,烦躁不安,惊风,衄血。

#### 8506631

*Lanceolaria gladiola* (Heude)

动物名 剑状矛蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《华东》

功效 贝壳(珍珠母):平肝熄风,滋阴潜阳,定惊止血。

#### 8506632

*Lanceolaria grayana* (Lea)

动物名 短褶矛蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中药材》

功效 贝壳珍珠层:平肝,潜阳,定惊,用于头目眩晕,心悸失眠,烦躁不安,惊风,衄血。

#### 8506633

*Lepidodesma languilati* (Heude)

动物名 高顶鳞皮蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中药材》

功效 贝壳珍珠层:平肝,潜阳,定惊。用于头目眩晕,耳鸣,心悸,失眠,烦躁不安,惊风,衄血。

#### 8506634

*Schistodesmus lampreyanus* (Baird et Adams)

动物名 射线裂脊蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《汇编》

文献名 河蚌、无齿蚌、池蚌、珠蚌《汇编》

功效 贝壳:平肝熄风,滋阴潜阳,定惊止血。

#### 8506635

*Unio douglasiae* (Gray)

动物名 圆顶珠蚌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珍珠母《中国药用动物志》

功效 贝壳(珍珠母):平肝熄风,滋阴潜阳,定惊止血。用于癫狂惊痫,头目眩晕,心悸耳鸣,头痛失眠,吐血衄血,崩漏。

### 85067 蛎科 Corbiculidae

#### 8506701

*Corbicula fluminea* (Muller)

动物名 河蚬《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蚬肉《唐本草》、《中药大辞典》,蚬壳《本草经集注》、《汇编》

文献名 扁螺《隋书》,蚬《嘉祐本草》,黄蚬、沙蚬、金蚬、螺蚌、螺仔《中国药用动物志》

功效 肉:清热,利湿,解毒。用于消渴,目黄,湿毒脚气,疔疮痈肿;贝壳:软坚散结,制酸止汗,止咳化痰,生肌敛疮。

#### 8506702

*Corbicula largillierti* (Philippi)

动物名 拉氏蚬《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 刻纹蚬《中国药用动物名录》

功效 肉:清热,利湿,解毒。用于消渴,目黄,湿毒脚气,疔疮痈肿;贝壳:软坚散结,制酸止汗,止咳化痰,生肌敛疮。

#### 8506703

*Corbicula niten* (Philippi)

动物名 闪蚬《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蚬壳《中国药用动物志》

文献名 蚬子《中国药用动物志》

功效 肉:清热解毒,利湿退黄;贝壳:止咳化痰,制酸止痛,生肌敛疮。

### 85068 砵磲科 Tridacnidae

#### 8506801

*Hippopus hippopus* (L.)

动物名 砵磲《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 车螯《嘉祐本草》、《海洋药物》

功效 壳:镇惊,安神,解毒;肉:用于痈疽。

#### 8506802

*Tridacna cookiana* (Iredale)

动物名 库克砵磲《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 砵磲《中药大辞典》

文献名 库氏砵磲《中药大辞典》

功效 壳:镇惊,安神,解毒。

#### 8506803

*Tridacna gigas* (L.)

动物名 大砵磲《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 库克砵磲《海洋药物》

功效 壳:镇惊,安神,解毒。

#### 8506804

*Tridacna maxima* (Roding)

动物名 长砵磲《拉汉海洋生物名称》

药材名 海扇《海药本草》、《中国动物药》

文献名 车渠《海药本草》,蚶筋《南海海洋药用生物》

功效 壳:镇惊,安神,解毒。用于心神不安,虫螫。

#### 8506805

*Tridacna squamosa* Lamarck

动物名 鳞砵磲《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 砵磲《海药本草》、《中药大辞典》

文献名 车渠《海药本草》,海扇《纲目》,蚶筋《南海海洋药用生物》

功效 壳:镇惊,安神,解毒。用于心神不安,虫螫。

### 85069 帘蛤科 Veneridae

#### 8506901

*Callista chinensis* (Holten)

动物名 中国仙女蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 海蛤壳《海洋药物》

地方名 浙江:仙女蛤。

功 效 壳:清热利湿,化痰软坚;肉:润五脏,止烦渴,开脾胃,软坚散肿。

## 8506902

*Cyclina sinensis* (Gmelin)

动物名 青蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛤壳《本草原始》、《药典》

文献名 海蛤《本经》,海蛤壳《饮片新参》,青蛤壳、河蛤壳《中药志》,蛤蜊皮《简明中医辞典》,墨蜊《海洋药物》,蛤蜊《常见药用动物》

功 效 贝壳:清热化痰,软坚散结,制酸止痛。用于痰火咳嗽,胸肋疼酸,痰中带血,瘰癧瘰癧,胃痛吞酸。外用于湿疹,烫伤;肉:润五脏,止渴,开胃。用于小儿麻疹。

## 8506903

*Dosinia biscocata* (Reeve)

动物名 饼干镜蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛤壳《中国药用动物名录》

功 效 贝壳:清热化痰,软坚散结,制酸止痛。

## 8506904

*Dosinia japonica* (Reeve)

动物名 日本镜蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛤蜊《海洋药物》

文献名 镜蛤《东北动物药》,蛤蜊肉《海洋药物》

功 效 贝壳:清热化痰,软坚散结,制酸止痛;肉:润五脏,止烦渴,开脾胃,软坚散肿。

## 8506905

*Dosinia laminata* (Reeve)

动物名 薄片镜蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛤蜊《中国药用动物志》

地方名 浙江:镜蛤(象山、洞头)。

功 效 贝壳:软坚散结,清热解毒。用于瘰癧,痰多咳嗽。外用于疮肿。

## 8506906

*Gafrarium divaricatum* (Gmelin)

动物名 岐背加夫蛤《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 岐脊加夫蛤《广西药用动物》

功 效 壳:清热利湿,化痰散结;肉:润五脏,止渴,开胃。

## 8506907

*Gomphina veneriformis* (Lamarck) --- *Gomphina aequilata* (Sowerby)

动物名 等边浅蛤《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛤壳《海洋药物》

地方名 浙江:蛤壳,蛤蜊。

功 效 壳:清热利湿,化痰软坚;肉:润五脏,止烦渴,开脾胃,软坚散肿。

## 8506908

*Mercenaria mercenaria* L.

动物名 硬壳蛤《拉汉海洋生物名称》

功 效 含蛤素(Mercenene),据动物实验有抗癌效应。

## 8506909

*Meretrix lamarckii* Deshayes

动物名 斧文蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 海蛤壳《海洋药物》

文献名 海蛤、花蛤、黄蛤、蛤蜊、白利壳《海洋药物》

功 效 壳:清热利湿,化痰软坚;肉:润五脏,止烦渴,开脾胃,软坚散肿。

## 8506910

*Meretrix lusoria* (Rumphius)

动物名 丽文蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛤壳《浙江》

文献名 海蛤、花蛤、黄蛤、蛤蜊、白利壳《中国海洋药物》

功 效 贝壳:清热化痰,软坚散结,制酸止痛;肉:润五脏,止烦渴,开脾胃,软坚散肿。

## 8506911

*Meretrix meretrix* (L.)

动物名 文蛤《本经》、《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛤壳《本草原始》、《药典》

文献名 花蛤《梦溪笔谈》,海蛤壳《饮片新参》,圆蛤《药材资料汇编》,海蛤《中药材科技》,海蛤肉、蛤蜊肉、文蛤肉《汇编》,蛤蜊皮《鉴别手册》

地方名 浙江:黄蛤,蛤蜊,白利壳;其他:斛蛤,海贝,蛤贝,海蛤粉,蛤粉,蛤拉。

功 效 贝壳:清热化痰,软坚散结,制酸止痛。用于痰火咳嗽,胸肋疼酸,痰中带血,瘰癧瘰癧,胃痛吞酸。外用于湿疹,烫伤;肉:润五脏,止烦渴,软坚散肿,利尿。用于项下瘰癧,肺结核,阴虚盗汗。

## 8506912

*Protothaca jedoensis* (Lischke)

动物名 江户布目蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蜆子《中国药用动物志》

文献名 伊豆布目蛤《海洋药物》

功 效 贝壳:清热解毒。外用于臃疮,黄水疮。

## 8506913

*Ruditapes philippinarum* (Adams et Reeve) --- *Venerupis philippinarum* (Adams et Reeve)

动物名 菲律宾蛤仔《拉汉海洋生物名称》

药材名 蛤仔《汇编》

地方名 蛤仔壳(东北);浙江:花蛤,蜆子,蛤拉;其他:蛤子。

功 效 贝壳:清热解毒。外用于臃疮,黄水疮。

## 8506914

*Ruditapes variegata* (Sowerby) --- *Venerupis variegata* (Sowerby)

动物名 杂色蛤子《拉汉海洋生物名称》

文献名 杂色蛤仔、杂色蛤《海洋药物》

地方名 浙江:花蛤。

功 效 贝壳:清热化痰,软坚散结,制酸止痛;肉:润五脏,止烦渴,开脾胃,软坚散肿。

## 8506915

*Saxidomus purpuratus* (Sowerby)

动物名 紫石房蛤《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 天鸡蛋《中药材科技》, 内紫蛤《海洋药物》

功效 贝壳: 清热化痰, 软坚散结, 制酸止痛。

### 85070 蛤蜊科 Mactridae

#### 8507001

*Mactra antiquata* Spengler

动物名 西施舌《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 西施舌《本草从新》、《中药大辞典》

文献名 车蛤《闽部疏》, 土匙、沙蛤《闽中海错疏》

功效 肉: 滋阴养精, 清热凉肝。用于肝肾阴虚, 腰膝痠重, 目赤肿痛, 冠心病, 白带。

#### 8507002

*Mactra chinensis* Philippi --- *Mactra sulcataria*

Deshayes

动物名 中国蛤蜊《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 珂《别录》、《中国海洋药物》

文献名 马珂螺、玳《纲目》, 蛤蜊《中国药用动物志》, 马珂、马鹿贝《中国海洋药物》

功效 壳: 清热化痰, 软坚散结, 制酸止痛。用于痰多咳嗽, 胃及十二指肠溃疡, 崩漏带下, 瘰疬, 烫伤; 肉: 滋阴补血, 利水消肿。用于贫血, 慢性肝炎, 水肿, 小便不利。

#### 8507003

*Mactra inequalis* Reeve

动物名 不等蛤蜊《海洋药物》

功效 贝壳: 化痰止咳, 软坚散结, 明目散翳。

#### 8507004

*Mactra veneriformis* Reeve --- *Mactra quadrangularis* Deshayes

动物名 四角蛤蜊《拉汉海洋生物名称》

药材名 蛤蜊肉《纲目拾遗》, 蛤壳《浙江》

文献名 白蚬子、泥蚬子、布馒头、蛤蜊、白蚬子《中国药用动物志》, 沙蛤《海洋药物民间应用》, 潮吹《中药名汇》

功效 壳: 清热化痰, 软坚散结, 制酸止痛。用于痰多咳嗽, 胃及十二指肠溃疡, 崩漏带下, 瘰疬, 烫伤; 肉: 滋阴补血, 利水消肿。用于贫血, 慢性肝炎, 水肿, 小便不利。

### 85071 斧蛤科 Donacidae

#### 8507101

*Donax dysoni* Deshayes

动物名 狄氏斧蛤《拉汉海洋生物名称》

药材名 斧蛤《海洋药物》

文献名 肉色斧蛤《海洋药物》

功效 肉: 清热退黄。用于肝炎, 尿黄, 尿混浊。

### 85072 樱蛤科 Tellinidae

#### 8507201

*Gastrea yantaiensis* (Crosse et Debeaux)

动物名 烟台腹蛤《海洋药物》

药材名 腹蛤壳《拟》

功效 贝壳: 清热化痰, 软坚散结, 制酸止痛。

#### 8507202

*Macoma incongrua* (Martens)

动物名 异白樱蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 樱蛤壳《拟》

功效 壳: 清热化痰, 软坚散结, 制酸止痛。肉: 润五脏, 止烦渴, 开脾胃, 软坚散结。

#### 8507203

*Moerella rutila* (Dunker)

动物名 红明樱蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 樱蛤壳《拟》

功效 贝壳: 清热化痰, 软坚散结, 制酸止痛。

#### 8507204

*Tellina planissima peitaihoensis* Grabau King

动物名 樱蛤《中药材科技》

药材名 樱蛤壳《拟》

功效 贝壳: 清热化痰, 软坚散结, 制酸止痛。

### 85073 紫云蛤科 Psammobiidae

#### 8507301

*Sanguinolaria diplos* (L.)

动物名 双线血蛤《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 西施舌《浙江》、《中国海洋药物》

文献名 双线紫蛤《拉汉海洋生物名称》

功效 肉: 滋阴养精, 清热凉肝。用于肝肾阴虚, 腰膝痠重, 目赤肿痛。

### 85074 竹蛏科 Solenidae

#### 8507401

*Cultellus attenuatus* Dunker

动物名 小刀蛏《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 小刀蛏《中药材科技》

地方名 浙江: 青子《乐清》。

功效 壳: 消瘰疬, 止带下; 肉: 明目, 除热, 止渴, 解酒。用于妇人劳损下血。

#### 8507402

*Cultellus scalpellum* Sowerby

动物名 剖刀蛏《拉汉海洋生物名称》

药材名 剖刀蛏《海洋药物》

功效 肉: 补虚。用于阴虚, 血虚, 产后病后。

#### 8507403

*Cultellus scalprum* (Gould)

动物名 尖刀蛏《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 尖刀蛏《海洋药物》

功效 壳: 消瘰, 止带; 肉: 明目, 除热, 止渴, 解酒。用于妇人劳损下血。

#### 8507404

*Sinonovacula constricta* (Lamarck)

动物名 缢蛏《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蛏肉《食疗本草》、《中药大辞典》, 蛏壳《纲目拾遗》、《中药大辞典》

文献名 蛏《本草拾遗》, 蛏肠《纲目》, 大蛏、土蛏、竹

## 蛭《海洋药物民间应用》

地方名 蛭子、青子(浙江、广西);广西:沙螺。

功效 肉:补阴,清热,除烦。用于产后虚损,烦热口渴,湿热水肿,痢疾;壳:用于喉风急痹,胃病。

8507405

*Solen gouldii* Conrad

动物名 长竹蛭《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 马刀《本经》、《汇编》

文献名 廌《周礼》,蛭《尔雅》,单蛭《李当之药录》,齐蛤《吴普本草》,马蛤《别录》,蛭岸《本草衍义》,蛭蛭《纲目》,马肉竹蛭《医林纂要》,竹蛭子《汇编》

功效 贝壳:消瘿,止带。用于瘿气,赤白带下;肉:明目,除热,止渴,解酒毒。用于妇人劳损下血。

8507406

*Solen gracilis* Philippi

动物名 细长竹蛭《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 细长竹蛭《海洋药物》

功效 贝壳:消瘿,止带。用于瘿气,赤白带下;肉:明目,除热,止渴,解酒毒。用于妇人劳损下血。

8507407

*Solen grandis* Dunker

动物名 大竹蛭《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 马刀《中国药用动物志》

功效 贝壳:消瘿,止带。用于瘿瘤,妇女赤白带下;肉:除热,明目,止渴,解酒毒。用于妇人劳损下血,瘿气,赤白带下。

## 85075 海螂科 Myidae

8507501

*Mya arenaria japonica* L.

动物名 沙海螂《拉汉海洋生物名称》

文献名 砂海螂《海洋药物》

地方名 浙江:海螂。

功效 提取物:体内试验有抗肿瘤作用。

## 85076 海笋科 Pholadidae

8507601

*Pholas orientalis* Gmelin

动物名 东方海笋《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 东方海笋肉《海洋药物》

功效 肉:含大量乳状汁,为滋补营养品。

## 85077 枪乌贼科 Loliginidae

8507701

*Loligo beka* Sasaki

动物名 火枪乌贼《中国动物志》

文献名 子乌墨鱼仔《海洋药物》

地方名 辽宁:水兔;山东:海兔子;浙江:鬼拱,笔管,鱿鱼子,墨鱼仔;广东:鱿鱼。

功效 肉:用于小儿腹泻,石淋,沙淋,下肢溃疡,预防产后风。

8507702

*Loligo chinensis* Gray --- *Loligo etheridgei* Adam --- *Loligo indica* Hoyle --- *Doryteuthis singalensis* Voss et Wi

动物名 中国枪乌贼《中国动物志》

药材名 鱿鱼《海洋药物》

文献名 柔鱼、台湾枪乌贼《海洋药物》

地方名 福建:本港鱿鱼;台湾:台湾锁管;广东:拖鱿鱼,中国鱿鱼。

功效 提取物:具有抗菌,抗病毒作用;肉:用于腰肌劳损,风湿腰痛,肌肉痉挛,产后体虚,小儿疳积,白带,疮疖。

8507703

*Loligo formosana* Sasaki

动物名 台湾枪乌贼《中国动物志》

药材名 台湾枪乌贼《中国药用动物名录》

功效 肉:用于腰肌劳损,风湿腰疼,产后体弱,小儿疳积,白带,疖肿。

8507704

*Loligo japonica* Hoyle --- *Loligo tetradinamia* Ortmann

动物名 日本枪乌贼《中国动物志》

文献名 笔管蛸《海洋药物》

地方名 墨鱼仔(山东、浙江);山东:子乌,笔管。

功效 提取物:具有抗菌,抗病毒作用;肉:用于腰肌劳损,风湿腰痛,肌肉痉挛,产后体虚,小儿疳积,白带,疮疖。

8507705

*Loligo pealei* Lesueur

动物名 皮氏枪乌贼《拉汉海洋生物名称》

文献名 枪乌贼《中国动物药》

功效 内壳:含有抗菌和抗病毒物质。

## 85078 乌贼科 Sepiidae

8507801

*Sepia aculeata* Orbigny

动物名 目乌贼《中国动物志》

药材名 乌贼骨《新纲》

文献名 刺乌贼、白龙、明鳖、柔骨、乌贼甲、乌贼骨、海螵蛸、墨鱼骨、纛鱼骨、墨乌骨、海若、白事小更《新纲》,乌鱼肉、乌鱼蛋、乌鱼墨《海洋药物》

地方名 台湾:目贼;广东:针墨鱼。

功效 内壳:收敛,止血,制酸,止带;肉:养血滋阴;输卵腺(乌鱼蛋):开胃利水;乌鱼墨汁:止血。

8507802

*Sepia andreana* Steenstrup

动物名 针乌贼《中国动物志》

药材名 海螵蛸《纲目》、《汇编》

文献名 针乌贼《北部海产经济软体动物》,乌贼骨《中国药用动物志》,乌鱼肉、乌鱼蛋、乌鱼墨《海洋药物》

功效 内壳(海螵蛸):收敛,止血,制酸,止带。用于胃、十二指肠溃疡病,胃酸过多,胃出血,肺结核咯血,功能性子宫出血,白带。外用于创伤出血,沙眼;肉:养血滋阴;输卵腺(乌鱼蛋):开胃利水;乌鱼墨:止

血。

### 8507803

*Sepia esculenta* Hoyle

动物名 金乌贼《中国动物志》

药材名 海螵蛸《纲目》、《药典》

文献名 乌贼鱼骨《本经》, 乌贼鱼肉《别录》, 乌贼鱼腹中墨《本草拾遗》, 乌鱼蛋《药性考》, 乌鲗《中药志》, 金乌鲗《中药大辞典》, 鱼古、淡鱼古、乌鲗骨、乌贼骨、墨鱼骨《常用中药名辨》, 目鱼《海洋药物民间应用》

地方名 乌贼(河北、浙江), 墨鱼(山东、浙江); 山东: 乌子、乌鱼; 广东: 针墨鱼; 其他: 乌贼管, 乌贼甲, 乌贼壳, 乌鱼蹠, 白龙, 白事小更, 海蛸, 海蛸, 淡骨, 海若, 纓鱼, 纓鱼骨, 柔骨, 鲞骨, 明鲞, 脯鲞骨, 暴乌乌骨, 墨鱼石。

功效 内壳: 收敛止血, 涩精止带, 制酸, 敛疮。用于溃疡病, 胃酸过多, 吐血衄血, 崩漏便血, 遗精滑精, 赤白带下, 胃痛吞酸。外用于损伤出血, 疮多脓汁; 肉: 养血滋阴; 缠卵腺: 开胃利水; 乌鱼墨: 止血。

### 8507804

*Sepia kobeensis* Hoyle

动物名 神户乌贼《中国动物志》

药材名 乌贼骨《海洋药物》

文献名 乌鱼肉、乌鱼蛋、乌鱼墨《海洋药物》

功效 内壳: 收敛, 止血, 制酸; 肉: 养血滋阴; 缠卵腺(乌鱼蛋): 开胃利水; 乌鱼墨汁: 止血。

### 8507805

*Sepia latimanus* Guoy et Gaimard --- *Sepia hercules* Pilshry

动物名 白斑乌贼《中国动物志》

药材名 海螵蛸《鉴别手册》

文献名 乌贼、墨鱼、乌鱼肉、乌鱼蛋、乌鱼墨《海洋药物》

地方名 广东: 花斑墨。

功效 内壳(海螵蛸): 收敛, 止血, 制酸, 止带; 肉: 养血滋阴; 缠卵腺(乌鱼蛋): 开胃利水; 乌鱼墨汁: 止血。

### 8507806

*Sepia pharaonis* Ehrenberg --- *Sepia tigris* Sasaki

动物名 虎斑乌贼《中国动物志》

药材名 海螵蛸《海洋药物》

文献名 乌鱼蛋、乌鱼墨、乌贼、墨鱼《海洋药物》

地方名 花旗、花西(福建、广东); 广东: 墨姆。

功效 内壳: 收敛, 止血, 制酸; 肉: 养血滋阴; 缠卵腺(乌鱼蛋): 开胃利水; 乌鱼墨: 止血。

### 8507807

*Sepia robsoni* Sasaki

动物名 罗氏乌贼《中国动物志》

药材名 土乌贼《海洋药物》

文献名 乌鱼蛋、乌鱼墨《海洋药物》

功效 内壳: 收敛, 止血, 制酸; 肉: 养血滋阴; 缠卵腺(乌鱼蛋): 开胃利水; 乌鱼墨: 止血。

### 8507808

*Sepia subaculeate* Sasaki

动物名 拟目乌贼《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 乌贼骨(福建、广东)

文献名 花旗、花西、眼墨、海螵蛸、乌鱼蛋、乌鱼墨《海洋药物》, 拟目乌鲗《中国药用动物名录》

功效 内壳: 收敛, 止血, 制酸; 肉: 养血滋阴; 缠卵腺(乌鱼蛋): 开胃利水; 乌鱼墨: 止血。

### 8507809

*Sepiella maindroni* de Rochebrune

动物名 曼氏无针乌贼《拉汉海洋生物名称》

药材名 海螵蛸《纲目》、《药典》

文献名 乌贼鱼骨《本经》, 乌贼鱼肉《别录》, 乌贼鱼腹中墨《本草拾遗》, 乌鱼蛋《药性考》, 无针乌贼《药典》, 青滨无针乌贼《中国药用海洋生物》, 无针乌鲗《中药大辞典》, 鱼古、淡鱼古、乌鲗骨、乌贼骨、墨鱼骨《常用中药名辨》

地方名 墨鱼、花拉子、麻乌贼(山东、浙江); 山东: 乌鱼; 浙江: 目鱼, 乌贼; 福建: 臭屁股; 广东: 疳血乌贼, 血墨。

功效 内壳: 收敛止血, 涩精止带, 制酸, 敛疮。用于溃疡病, 胃酸过多, 吐血衄血, 崩漏便血, 遗精滑精, 赤白带下, 胃痛吞酸。外用于损伤出血, 疮多脓汁; 肉: 养血滋阴。用于血虚经闭, 崩漏, 带下; 缠卵腺: 开胃利水; 乌鱼墨汁: 止血。

## 85079 柔鱼科 Ommastrephidae

### 8507901

*Ommatostrephes sloani pacificus* (Steenstrup)

动物名 太平洋斯氏柔鱼《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 柔鱼《海洋药物》

功效 肉: 用于腰肌劳损, 风湿腰痛, 肌肉痉挛, 小儿疳积, 白带, 疮疖; 本品提取物: 具抗菌, 抗病毒作用。

## 85080 蛸科 Octopodidae

### 8508001

*Octopus ocellatus* Gryn

动物名 短蛸《中国动物志》

药材名 章鱼《中国药用动物志》

文献名 坐蛸、短脚章、短爪章《中国药用海洋生物》, 短脚蛸《常见药用动物》, 八带蛸《中药材科技》

地方名 饭蛸、短腿蛸(山东、浙江); 山东: 小蛸; 浙江: 望潮; 广东: 四眼乌。

功效 肉: 补气养血, 通经下乳。用于产妇乳汁不足, 癰疽。

### 8508002

*Octopus variabilis* (Sasaki)

动物名 长腕蛸《中国动物志》

药材名 章鱼《中国药用动物志》

文献名 长蛸《汇编》

地方名 马蛸、长腿蛸(山东、浙江); 山东: 大蛸; 浙江: 石拒, 章拒, 八带蛸, 长不章, 长拒; 广东: 长爪章, 水鬼。



功效 全体(去内脏):补气养血,通经下乳。用于产妇乳汁不足,痈疽。

## 8508003

*Octopus vulgaris* Cuvier

动物名 真蛸《中国动物志》

药材名 章鱼《纲目》、《中药大辞典》

文献名 鳃鱼《临海异物志》,章举《韩昌黎集》,小八梢鱼、络蹄《东医宝鉴》,蛸《动物学大辞典》

地方名 母猪章(广东、广西);福建:蚌,望潮;广西:八角鱼;浙江:母猪鱼,长脚章。

功效 肉:养血益气,收敛,生肌,催乳。用于气血虚弱,乳汁不足,痈疽肿毒,久疮溃烂。

## (六)节肢动物门 Arthropoda

## 86081 铠苳荷科 Scalpellidae

## 8608101

*Mitella mitella* (L.) --- *Pollicipes mitella* L.

动物名 龟足《动物图谱·甲壳》

药材名 石蛸《纲目》、《中药大辞典》

文献名 紫砧《荀子》,紫蓂、龟脚《纲目》,龟脚蛸《纲目拾遗》,观音掌《药材资料汇编》,岐菊、笔架《海洋药物民间应用》

地方名 浙江:观音手,佛手。

功效 肉:滋补,利尿,消积。用于癖积,肿胀。

## 86082 苳荷科 Lepadidae

## 8608201

*Lepas anatifera* anatifera L.

动物名 苳荷《拉汉海洋生物名称》

药材名 苳荷肉《中国海洋药物》

地方名 浙江:苳荷儿。

功效 肉:补脾健胃,利水消肿。用于脾胃虚弱,肢体浮肿。

## 86083 藤壶科 Balanidae

## 8608301

*Balanus albicostatus* Pilsbry --- *Balanus amphitrite* albicostatus Pilsbry

动物名 白脊藤壶《动物图谱·甲壳》

文献名 白脊纹藤壶《拉汉无脊椎动物名称》,白纹藤壶《浙江中医学院学报》

地方名 浙江:铤,藤壶。

功效 全体或肉(捣烂):外用于烫火伤,小儿头疔,疔疮肿毒;壳:制酸止痛。

## 8608302

*Balanus reticulatus* Utinomi --- *Balanus amphitrite* communis Darwin

动物名 网纹藤壶《动物图谱·甲壳》

文献名 布纹藤壶《中药材科技》

功效 全体(捣烂):外用于烧烫伤。

## 8608303

*Balanus volcano* Pilsbry --- *Balanus tintinnabulum* volcano Pilsbry --- *Megabalanus volcano* Pilsbry

动物名 刺藤壶《动物图谱·甲壳》

药材名 藤壶《海洋药物》

文献名 刺钟藤壶《拉汉无脊椎动物名称》,刺红藤壶《动物图谱·甲壳》,大红藤壶《浙江中医学院学报》,刺巨藤壶《中国海洋药物》

地方名 浙江:铤。

功效 全体:利尿,镇痛解热。

## 86084 笠藤壶科 Tetracitidae

## 8608401

*Tetracita japonica* Pilsbry

动物名 日本笠藤壶《拉汉海洋生物名称》

药材名 藤壶(浙江)、《中国海洋药物》

地方名 浙江:铤。

功效 壳:制酸止痛;肉(捣烂):外用于水火烫伤,小儿头疔,疔疮肿毒。

## 86085 缩头水虱科 Cymothoidae

## 8608501

*Ichthyoxenus geei* Boone

动物名 祁氏鱼怪《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 鱼寄生《汇编》

文献名 鱼鳖、鱼八怪《中药名汇》

地方名 山东:鱼虱子,鱼怪。

功效 幼虫全体:活血祛瘀,止痛。用于食管癌,子宫癌,胃痛,胸腹胀闷。

## 8608502

*Ichthyoxenus japonensis* Richardson

动物名 鱼怪《中国药用动物志》

药材名 鱼寄生《中国药用动物志》

文献名 鱼鳖、鱼寄生、鱼虱《海洋药物民间应用》,鲶怪《常见药用动物》

地方名 湖北:鱼虱子(神农架)。

功效 全体:降逆气,开郁结,止痛。用于噎膈,气逆,胸膈胀痛。

## 8608503

*Ichthyoxenus sinensis* Shen

动物名 中华鱼怪《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 鱼寄生《汇编》

功效 幼虫全体:活血祛瘀,止痛。用于食管癌,子宫癌,胃痛,胸腹胀闷。

## 8608504

*Ichthyoxenus tehangi* Yu

动物名 张氏鱼怪《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 鱼寄生《汇编》

地方名 四川:鱼虱子;其他:鱼鳖。

功效 幼虫全体:活血祛瘀,止痛。用于食管癌,子宫癌,胃痛,胸腹胀闷。

**86086 浪漂水虱科 Cirolanidae****8608601***Tachaea chinensis* Thielemann

动物名 中国急游水虱(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 水虱(浙江)、《中国海洋药物》

功效 全体:降逆气,开郁结,止痛。用于噎膈,气逆,胸前胀痛。

**86087 团水虱科 Sphaeromidae****8608701***Dynoides dentisinus* Shen

动物名 腔齿海底水虱(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 水虱(中国海洋药物)

功效 全体:活血化瘀。用于跌打损伤。

**86088 栉水虱科 Asellidae****8608801***Asellus nipponensis* Nichols

动物名 日本栉水虱(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 水虱(拟)

功效 全体:活血祛瘀。用于跌打损伤。

**86089 平甲虫科 Armadillidae****8608901***Armadillidium vulgare* (Latreille)

动物名 平甲虫(中国药用动物志)

药材名 鼠妇(本经)、《汇编》

文献名 负蟠、蟬蟬(本经),蜚蠊(别录),鼠妇虫(中国药志),地虱婆(汇编),潮虫(常见药用动物),普通卷地鳖(中国药用动物名录)

地方名 山东:潮湿虫,西瓜虫;江苏:豌豆虫。

功效 全体:破瘀血,消瘕瘕,利水。用于经闭,瘕瘕,腹痛,久疟,小便不利,水肿。

**86090 蜡鼠妇科 Porcellionidae****8609001***Porcellio elongata* Shen

动物名 长鼠妇(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 长鼠妇(中国药用动物名录)

功效 全体:破瘀血,消瘕瘕,利水。用于经闭,瘕瘕,腹痛,久疟,小便不利,水肿。

**8609002***Porcellio scaber* Latreille

动物名 鼠妇(汇编)

药材名 鼠妇(汇编)

文献名 地虱、地鸡、负蟠、鼠负、鼠粘、鼠姑、蟬蟬、蜚蠊、飞虫(新纲)

地方名 鼠妇虫(内蒙古、陕西、广西);内蒙古:“其格音·好如亥”(蒙名),潮虫,鞋板虫;陕西:湿湿虫;江苏:豌豆虫;广西:平甲虫,潮虫子,暗板虫,烂扫把,地虱婆,地球虫,西瓜虫;其他:豌豆虫,负蟠子,湿生虫,豌豆

西瓜虫,蒲鞋头虫。

功效 全体:破瘀血,消瘕瘕,利水。用于经闭,瘕瘕,腹痛,久疟,小便不利,水肿。

**86091 潮虫科 Oniscidae****8609101***Philoscia villosa* Jackson

动物名 柔毛喜阴虫(中国药用动物名录)

功效 全体:破瘀血,消瘕瘕,利水。

**86092 海蟑螂科 Ligidae****8609201***Ligia exotica* (Roux)

动物名 海蟑螂(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 海蟑螂(浙江中医学院学报)

文献名 海蛆(拉汉无脊椎动物名称)

地方名 浙江:海岸水虱。

功效 全体:消炎止痛。用于小儿疳积,跌打损伤,痈疽,瘰。

**86093 对虾科 Penaeidae****8609301***Metapenaeus burkenroadi* Kubo

动物名 布氏新对虾(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 布氏新对虾(中国药用动物名录)

功效 雄虾:消炎利尿。用于肾炎,肝炎。

**8609302***Metapenaeus joyneri* (Miers)

动物名 周氏新对虾(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 黄新对虾(拉汉海洋生物名称)

文献名 芝虾(中药材科技)

功效 全体:滋补强壮。

**8609303***Penaeus merguensis* de Man.

动物名 墨吉对虾(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 大明虾(中国药用动物志)

地方名 大虾(浙江、广西);广西:对虾,大红,凤尾虾。

功效 虾肉:补肾壮阳,健胃补气。用于肾虚阳痿,遗精,脾胃虚弱,气虚疮口不敛;海虾壳:用于神经衰弱,秃疮,疥瘡。

**8609304***Penaeus orientalis* Kishinouye

动物名 对虾(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 对虾(纲目)、《汇编》

文献名 大红虾(本草拾遗),海虾(纲目),蜆虾(粤志),海虾壳(本草撮要),大虾(汇编)

地方名 明虾、青虾(山东、浙江);浙江:中国对虾,黄虾,蛭节虾。

功效 肉:补气健胃,暖肾壮阳。用于神经衰弱,手足搐搦,肾虚阳痿,遗精,脾胃虚弱,疮口不敛等;海虾壳:用于神经衰弱,秃疮,疥瘡。

**8609305***Penaeus penicillatus* (Alcock)

动物名 长毛对虾《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 对虾、明虾、大虾《海洋药物民间应用》, 虾《中国药用动物志》

功效 肉: 补肾壮阳, 健胃补气。用于肾虚阳痿, 遗精, 脾胃虚弱, 气虚痞口不斂等; 海虾壳: 用于秃疮, 疥癣。

**8609306***Trachypenaeus curvirostris* (Stimpson)

动物名 鹰爪糙对虾《中国药用动物名录》

药材名 鹰爪虾《山东药用动物》

文献名 立虾《中药材科技》

功效 全体: 滋补强壮。

**86094 长臂虾科 Palaemonidae****8609401***Acetes chinensis* Hansen

动物名 中国毛虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 虾《汇编》

功效 全体: 补肾, 壮阳, 通乳, 解毒。用于阳痿, 乳汁不下, 丹毒, 痈疮, 疔疮。

**8609402***Acetes japonicus* Kishinouye

动物名 日本毛虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 虾《汇编》

功效 全体: 补肾, 壮阳, 通乳, 解毒。用于阳痿, 乳汁不下, 丹毒, 痈疮, 疔疮, 麻疹, 乳痈。

**8609403***Macrobrachium hainanense* (Parisi)

动物名 海南沼虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 沼虾《海南》

功效 全体: 壮阳, 通乳, 透疹。用于阳痿, 乳汁不通, 乳痈, 麻疹。

**8609404***Macrobrachium nipponensis* (de Haan)

动物名 日本沼虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 沼虾《汇编》

文献名 虾《别录》, 青虾《纲目》

地方名 广西: 河虾, 虾公。

功效 肉: 强壮补精, 托里解毒。用于阴疽, 恶核, 寒性脓疡, 骨结核流脓流水久不收口。

**8609405***Macrobrachium rosenbergi* (de Man)

动物名 马来沼虾《拉汉海洋生物名称》

文献名 罗氏沼虾《广西药用动物》

功效 全体: 壮阳, 通乳, 透疹。用于阳痿, 乳汁不通, 乳痈, 麻疹。

**8609406***Macrobrachium superbum* (Heller)

动物名 巨掌沼虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 沼虾《广西》

文献名 细螯沼虾《广西药用动物》

功效 全体: 壮阳, 通乳, 透疹。用于阳痿, 乳汁不通, 乳痈, 麻疹。

**8609407***Palaemon carinicauda* Holthuis

动物名 脊尾长臂虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 脊尾白虾《中药材科技》

功效 全体: 滋补强壮。

**8609408***Palaemon modestus* (Heller)

动物名 秀丽长臂虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 虾《汇编》

文献名 白虾《滇南本草》, 秀丽白虾《汇编》

功效 肉: 强壮补精, 托里解毒。用于阴疽, 恶核, 寒性脓疡, 骨结核流脓流水久不收口。

**8609409***Palaemon serrifer* (Stimpson)

动物名 锯齿长臂虾《拉汉海洋生物名称》

药材名 锯齿长臂虾《中药材科技》

功效 全体: 滋补强壮。

**8609410***Palaemon sinensis* Solland

动物名 中华小长臂虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 虾《汇编》

文献名 花腰虾《汇编》

功效 肉: 强壮补精, 托里解毒。用于豆疮, 下乳, 阴疽, 恶核, 寒性脓疡, 骨结核流脓流水久不收口。

**86095 龙虾科 Palinuridae****8609501***Panulirus homarus* (L.)

动物名 波纹龙虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 龙虾《中国药用海洋生物》

功效 全体、肉: 补肾壮阳, 滋阴, 健胃。用于阳痿, 筋骨疼痛, 手足搐搦, 全身瘙痒, 皮肤溃疡; 壳: 镇静。用于神经衰弱, 头疮, 疥癣。

**8609502***Panulirus japonicus* (de Haan)

动物名 日本龙虾《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 伊氏虾《中国动物药》

功效 全体: 补肾壮阳, 滋阴健胃。

**8609503***Panulirus ornatus* (Fabricius)

动物名 锦绣龙虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 龙虾《浙江》, 《中国药用动物志》

功效 全体、肉: 补肾壮阳, 滋阴健胃, 镇静。用于阳痿, 筋骨疼痛, 手足搐搦, 全身瘙痒, 皮肤溃疡。

**8609504***Panulirus penicillatus* (Olivier)

动物名 密毛龙虾《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 龙虾《中国药用海洋生物》

功效 全体、肉: 补肾壮阳, 滋阴健胃。用于阳痿,

筋骨疼痛,手足搐搦,全身瘙痒,皮肤溃疡;壳:镇静。用于神经衰弱,头疮,疥癣。

**8609505**

*Panulirus stimpsoni* Holthuis

动物名 中国龙虾(拉汉海洋生物名称)

药材名 龙虾《海洋药物民间应用》

文献名 大龙虾《海洋药物民间应用》

功效 全体、肉:补肾壮阳,滋阴健胃。用于阳痿,筋骨疼痛,手足搐搦,全身瘙痒,皮肤溃疡;壳:镇静。用于神经衰弱,头疮,疥癣。

**8609506**

*Panulirus versicolour* (Latreille)

动物名 杂色龙虾(拉汉无脊椎动物名称)

功效 全体:用于阳痿,扁桃腺炎,过敏症。

**86096 河虾科 Astacidae****8609601**

*Cambaroides dauricus* (Pallas)

动物名 东北螯蛄(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 螯蛄石《中国药用动物志》

文献名 螯蛄、东北螯虾《中国动物药》

功效 胃内的磨石:止血,止泻,利尿,壮筋骨。用于外伤出血,小儿软骨症,泻痢。

**8609602**

*Cambaroides schrenskii* (Kessler)

动物名 史氏螯蛄(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 螯蛄石(汇编)

文献名 史氏螯虾《中国动物药》

功效 胃内磨石:止血,止泻,利尿,强筋骨。用于外伤出血,小儿软骨症,泻痢。

**8609603**

*Cambaroides similis* (Koelbel)

动物名 朝鲜螯蛄(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 螯蛄石《中国药用动物志》

文献名 螯蛄(汇编),朝鲜螯虾《中国动物药》

功效 胃内磨石:止血,止泻,利小便,强筋骨。

**86097 螯蛄虾科 Upogebiidae****8609701**

*Upogebia major* (de Haan)

动物名 大螯蛄虾(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 大螯蛄虾《中国药用海洋生物》

文献名 螯蛄虾《中国药用动物志》

功效 全体:通经下乳。用于产妇乳汁不足。

**86098 虾蛄科 Squillidae****8609801**

*Oratosquilla oratoria* (de Haan) --- *Squilla oratoria* de Haan

动物名 口虾蛄《中国海洋药物》

药材名 虾蛄《中国海洋药物》

地方名 浙江:虾爬子,虾不类虫,放尿泡。

功效 全体:用于热痰咳嗽,哮喘,遗尿症。

**8609802**

*Squilla costata* de Haan

动物名 脊条虾蛄(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 脊条虾蛄《中国海洋药物》

文献名 脊条龙虾《中国药用动物名录》

功效 全体:用于遗尿症。

**86099 寄居蟹科 Paguridae****8609901**

*Aniculus aniculus* (Fabricius)

动物名 纹寄居蟹(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 寄居蟹《海洋药物》

文献名 环纹寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳,健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,抑制胆固醇,有益于心血管病的治疗。

**8609902**

*Catapagurus japonicus* Yokoya

动物名 日本低寄居蟹(拉汉海洋生物名称)

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609903**

*Clibanarius enrysternus* Hilgendorf

动物名 真三细螯寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609904**

*Clibanarius infraspinus* Hilgendorf

动物名 下齿细螯寄居蟹(拉汉海洋生物名称)

药材名 寄居蟹《浙江中医学院学报》

文献名 寄居虫、寄生虫《纲目》,螯下齿细螯寄居蟹《海洋药物》

功效 全体(焙干研粉):活血散瘀。用于血瘀腹痛,跌打损伤,头目眩晕,多尿,遗尿,脱肛,痔疮。

**8609905**

*Clibanarius longitarsus* (de Haan)

动物名 长指细螯寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609906**

*Clibanarius pacificus* Stimpson

动物名 太平细螯寄居蟹(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609907**

*Clibanarius polymaculatus*

动物名 多斑细螯寄居蟹(海洋药物)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609908**

*Clibanarius virescens* (Krauss)

动物名 蓝色细螯寄居蟹(拉汉海洋生物名称)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 文献名 蓝绿细螯寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609909**

*Coenobita rugosus* H. Milne-Edwards

动物名 灰白陆寄居蟹(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳,健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,抑制胆固醇,有益于治疗心血管病。

**8609910**

*Dardanus arrosor* de Haan

动物名 鳞片真寄居蟹(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 文献名 鳞纹真寄居蟹(拉汉海洋生物名称)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳,健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609911**

*Dardanus aspersus* (Berthold) Miyake

动物名 红星真寄居蟹(海洋药物)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609912**

*Dardanus hessii* (Miers)

动物名 刺足真寄居蟹(拉汉海洋生物名称)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿

热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609913**

*Dardanus impressus* (de Haan)

动物名 印纹真寄居蟹(拉汉海洋生物名称)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609914**

*Diogenes avarus* Heller

动物名 长螯活寄居蟹(拉汉海洋生物名称)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609915**

*Diogenes deflectomanus* Wang

动物名 弯螯活额寄居蟹(拉汉海洋生物名称)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609916**

*Diogenes edwarasii* (de Haan)

动物名 艾氏活额寄居蟹(拉汉无脊椎动物名称)  
 药材名 寄居蟹(中国药用动物志)  
 文献名 寄居虫、寄居虾(中国药用动物志),活额寄居蟹(海洋药物)  
 功效 去螺壳的全体:活血散瘀。用于瘀血腹痛,眩晕等。

**8609917**

*Diogenes paracristimanus* Wang et Dong

动物名 拟脊活额寄居蟹(拉汉海洋生物名称)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609918**

*Diogenes rectimanus* Miers

动物名 直螯活额寄居蟹(拉汉海洋生物名称)  
 药材名 寄居蟹(海洋药物)  
 功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609919**

*Diogenes tomentosus* Wang

动物名 绒螯活额寄居蟹(拉汉海洋生物名称)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609920**

*Eupagurus bernhardus*

动物名 真寄居蟹(汇编)

药材名 寄居蟹(汇编)

文献名 寄居虫、寄生虫(纲目),寄居蟹(中国动物药),寄生虾、海寄生(汇编)

功效 去螺壳的全体:消炎,活血。用于血瘀腹痛,眩晕,耳鸣。外用于跌打损伤,淋巴结炎。

**8609921**

*Nematopagurus indicus* Alcock

动物名 印度线寄居蟹(海洋药物)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609922**

*Nematopagurus squamichelis* Alcock

动物名 鳞纹线寄居蟹(拉汉海洋生物名称)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609923**

*Paguristes acanthomerus* Ortmann

动物名 尖突长眼寄居蟹(海洋药物)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609924**

*Paguristes kagshimensis*

动物名 鹿儿长眼寄居蟹(海洋药物)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609925**

*Paguristes palythophilus*

动物名 粒螯长眼寄居蟹(海洋药物)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿

热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609926**

*Paguristes pusillus* Henderson

动物名 小长眼寄居蟹(海洋药物)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609927**

*Paguristes sinensis* Tung et Wang

动物名 中华长眼寄居蟹(海洋药物)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609928**

*Paguristes zhejiangensis* Wang et Tung

动物名 浙江小长眼寄居蟹(拟)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609929**

*Pagurus carpofoamatus nephromma* (Alcock)

动物名 斑粒腕寄居蟹(海洋药物)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609930**

*Pagurus dubius* (Ortmann) Myake

动物名 长指寄居蟹(海洋药物)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

**8609931**

*Pagurus geminus* McLaughlin

动物名 宝石形寄居蟹(海洋药物)

药材名 寄居蟹(海洋药物)

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

**8609932**

*Pagurus macardlei* (Alcock)

动物名 多长毛寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效,寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

## 8609933

*Pagurus ochotensis* Brandt

动物名 大寄居蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 寄居蟹《中药材科技》

文献名 方腕寄居蟹《海洋药物》,寄居蟹《中药材科技》

功效 全体:活血散瘀。

## 8609934

*Pagurus pectinatus* (Stimpson)

动物名 海绵寄居蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

文献名 栉螯寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

## 8609935

*Pagurus pilosipes* (Stimpson)

动物名 毛足寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

## 8609936

*Pagurus rubricatus* Henderson

动物名 红足寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂药源。

## 8609937

*Pagurus sagamiensis* Miyake

动物名 相模寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

## 8609938

*Pagurus samuelis* (Stimpson)

动物名 呆寄居蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

文献名 长腕寄居蟹《海洋药物》

地方名 浙江;寄居虫。

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

## 8609939

*Pagurus trigonocheirus* (Stimpson)

动物名 三角掌寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

## 8609940

*Pagurus triserratus* (Ortmann)

动物名 三锯齿寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

## 8609941

*Pagurus zebra* (Henderson)

动物名 斑纹寄居蟹《拉汉海洋生物名称》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

文献名 条斑寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

## 8609942

*Parapagurus arcustus monotrosus* Alcock

动物名 单弓拟寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

## 8609943

*Parapagurus pilosimanus* Smith

动物名 毛螯拟寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,也是抗肿瘤制剂的药源。

## 8609944

*Spiropagurus spiriger* (de Haan) Miyake

动物名 旋刺寄居蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,又有抑制胆固醇

的作用,对心血管病有效。寄居蟹内有抗肿瘤成份,可作为抗肿瘤制剂药源。

## 8609945

*Trizopagurus strigatus* (Herbst)

动物名 扁甲三动寄居蟹《海洋药物》

药材名 寄居蟹《海洋药物》

功效 全体:清热散血,滋阴补肾,壮阳,健胃,除湿热,利小便;壳:破瘀解毒,消积止痛,抑制胆固醇,对心血管病有效。

## 86100 馒头蟹科 Calappidae

## 8610001

*Calappa gallus* (Herbst)

动物名 公鸡馒头蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 馒头蟹(拟)

功效 壳:理气止痛。用于胸痛,避孕;蟹黄:用于脚痹。

## 8610002

*Calappa lophos* (Herbst)

动物名 卷折馒头蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 馒头蟹(浙江)、《中国海洋药物》

功效 壳:理气止痛。用于胸痛,避孕;蟹黄:用于脚痹。

## 8610003

*Calappa philargius* (L.)

动物名 逍遥馒头蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 雷公蟹《中国药用海洋生物》

功效 壳:理气止痛。用于胸痛,避孕;蟹黄:脚痹。

## 8610004

*Matua lunaris* (Forsk.)

动物名 红点黎明蟹《中国海洋药物》

药材名 黎明蟹(浙江)、《中国海洋药物》

功效 全体:抗癌。

## 86101 蜘蛛蟹科 Majidae

## 8610101

*Doclea ovis* (Herbst)

动物名 羊毛绒球蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 坞蟹《海洋药物民间应用》

地方名 浙江:毛蟹、甲指红(舟山)。

功效 全蟹:清热燥湿。用于痢疾,脱肛,痔疮。

## 86102 菱蟹科 Parthenopidae

## 8610201

*Parthenope horrida* (L.)

动物名 糙壳菱蟹《中国药用海洋生物》

文献名 石蟹《海洋药物》

功效 壳、肉:散结化瘀。用于疮疖,高血压。

## 86103 梭子蟹科 Portunidae

## 8610301

*Charybdis japonicus* (A. Milne-Edwards)

动物名 日本蜷《拉汉海洋生物名称》

药材名 赤甲红《中国药用动物志》

文献名 蜷蜷《本草经集注》,蜷蜷《日华子本草》,拔棹子、蜷《图经》,海蜷《闽中海错疏》,石蟹《汇编》,红夹子、鬼脸儿《中国药用动物志》

地方名 浙江:石其角,火蜷。

功效 全体:破血,通乳,消食积。用于血滞经闭,宿食,乳汁不足。

## 8610302

*Portunus pelagicus* (L.)

动物名 远海梭子蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 梭子蟹(福建)

功效 肉、内脏:清热,活血,滋阴;壳:破瘀消积,止痛。用于跌打损伤。

## 8610303

*Portunus sanguinolentus* (Herbst)

动物名 红星梭子蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 梭子蟹(浙江)、《中国海洋药物》

地方名 浙江:枪蟹。

功效 肉、内脏:清热,活血,滋阴;壳:破瘀消积,止痛。用于跌打损伤。

## 8610304

*Portunus trituberculatus* (Miers) --- *Neptunus trituberculatus* (Miers)

动物名 三疣梭子蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 蟹壳《中国药用动物志》

文献名 蟻、海螃蟹《汇编》,帆《山东药用动物》

地方名 浙江:枪蟹,江蟹,梭子蟹。

功效 壳:活血散瘀,消炎解毒。用于跌打损伤,闭塞,乳腺炎,疮毒疖肿,冻伤;肉、内脏:清热活血,滋阴。

## 8610305

*Scylla serrata* (Forsk.)

动物名 锯缘青蟹《拉汉无脊椎动物名称》

文献名 青蟹、朝蟹、羔蟹《中国药用动物志》

地方名 浙江:蟳蜅。

功效 全体:活血化瘀,利水消肿,滋补。用于产后腹痛,水肿,乳汁不足。

## 86104 溪蟹科 Potamonidae

## 8610401

*Paratelphusa paratelphusa chongi* Wu

动物名 束腹蟹《滇南本草》整理本)

药材名 山螃蟹《滇南本草》

文献名 纵横子《腹中子》《滇南本草》

功效 全体:强壮筋骨,催生。用于癥瘕瘀血,块积疼痛,产后儿枕瘀血痛。外用于痔疮。

## 8610402

*Potamon denticulatum* (H. Milne-Edwards)

动物名 锯齿溪蟹《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 方海《药典》附录)



文献名 溪蟹、螃蟹(《药典》附录),石螃蟹(《长春中医药大学学报》)

地方名 陕西:贞虫。

功效 全体:软坚散结,接骨。用于癥瘕积聚,骨折,跌打损伤。

#### 8610403

*Potamon spinescens* (Calman)

动物名 锐齿溪蟹(《滇南本草》整理本)

药材名 蟹(《滇南本草》)

地方名 云南:螃蟹。

功效 全体:有小毒。用于胸中邪气热结痛,咽喉面肿,祛瘀消食,疟疾,黄疸,解鲑鱼毒。外用于漆疮,滴耳聾。

#### 8610404

*Potamon yunnanensis* Kemp

动物名 云南溪蟹(《滇南本草》整理本)

药材名 方海(《药典》附录)

文献名 螃蟹(《药典》附录)

功效 全体:软坚散结,接骨。

#### 8610405

*Somanniathelphusa sinensis* H. Milne-Edwards

动物名 中华束腰蟹(广西药用动物)

药材名 螃蟹(广西)

地方名 广西:河蟹,横行介上。

功效 螃蟹全体:有小毒。通经络,散瘀血,续筋接骨,解漆疮;壳:用于冻疮,积食,血积,血崩,腹痛,儿枕痛;爪:催产下胎。

### 86105 方蟹科 Grapsidae

#### 8610501

*Eriocheir japonicus* de Haan

动物名 日本绒螯蟹(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 方海(《中国药用动物志》)

功效 全体:破血通经,消积,堕胎。用于经闭腹痛,癥瘕积聚,胎死腹中,跌打损伤。

#### 8610502

*Eriocheir sinensis* H. Milne-Edwards

动物名 中华绒螯蟹(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 方海(《中国药用动物志》)

文献名 郭索(《太玄经》),蟹(《本经》),蛸(《说文》),蚶(《广雅》),蟹爪(《别录》),蚶嘴(《玉篇》),蟹壳(《千金·食治》),螃蟹(《蟹谱》),毛蟹、稻蟹(《医林纂要》),埏钳(《陆川本草》),淡水蟹(拉汉无脊椎动物名称),青蟹、真蟹(汇编),中华绒毛蟹(《药典》附录)

地方名 河蟹、清水蟹(浙江、广西);浙江:湖蟹(舟山),毛夹子;湖北:螃蟹夹(神农架);广西:千里马,江蟹,绒蟹,胜芳蟹;其他:毛蟹,津蟹,横行介士,娘蟹,博带,无肠公子。

功效 全体:破血,通经,消积,堕胎。用于经闭腹痛,症瘕积聚,胎死腹中,跌打损伤。

#### 8610503

*Helice tientsinensis* Rathbun

动物名 天津厚蟹(拉汉海洋生物名称)

药材名 天津厚蟹(海洋药物)

功效 全体:用于跌打损伤。

备考 动物实验证明,本动物的水溶部分及醇溶部分均可降低全血粘度,醇溶部分尚可加速红细胞电泳。

#### 8610504

*Sesarma dehaani* H. Milne-Edwards

动物名 尤齿相手蟹(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 螳螂(《本草经集注》、《中药大辞典》)

文献名 螳螂(《集韵》)

功效 肉、内脏、脂肪:有小毒。外用于湿癣,疽疮,解河豚毒。

#### 8610505

*Sesarma haematocheir* (de Haan)

动物名 红螯相手蟹(拉汉无脊椎动物名称)

功效 全体:用于跌打损伤。

备考 动物实验表明本动物之水溶部分及醇溶部分均可降低全血比粘度,但对细胞电泳速度无显著影响。

### 86106 扇蟹科 Xanthidae

#### 8610601

*Galene bispinosa* (Herbst)

动物名 双刺静蟹(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 石蟹(《开宝本草》、《海洋药物》)

功效 活蟹:除热,解结散血,养筋益元。用于高血压,目赤,角膜云翳,漆疮,无名肿痛,尿路感染,解食鲑鱼中毒;化石:清肝明目,消肿解毒。用于目生翳障,喉痹肿痛,赤白带下,肠风痔瘕,湿热淋浊,解一切药毒、虫毒、金石毒;醋磨化石:用于痈肿。

### 86107 石蟹科 Lithodidae

#### 8610701

*Hapalogaster dentata* (de Haan)

动物名 锯足软腹蟹(拉汉无脊椎动物名称)

药材名 石蟹(海洋药物)

功效 蟹肉:用于腹痛,眩晕,耳鸣,淋巴结核;化石:清肝明目,消肿解毒。

#### 8610702

*Isolapotamon obtortum* Dai

动物名 扭肢石蟹(海洋药物)

药材名 石蟹(海洋药物)

功效 石蟹的化石:清肝明目,消肿解毒;生活蟹类:除热,散血解结,养筋益元,通经续筋骨;蟹壳:有抑制胆固醇的作用。

#### 8610703

*Isolapotamon phyalisum* Dai

动物名 僧帽石蟹(海洋药物)

药材名 石蟹(海洋药物)

功效 石蟹的化石:清肝明目,消肿解毒。用于目生翳障,喉痹肿痛,赤白带下,肠风痔瘕,湿热淋浊,解一切药毒、虫毒、金石毒,醋磨消痈肿;生活蟹类:除热,

解结散血,养筋益元,通经续筋骨。用于高血压,目赤,角膜云翳,漆疮,无名肿痛,尿路感染,解食鲭鱼中毒;蟹壳:有抑制胆固醇的作用。

**8610704**

*Lithodes longispina* Sakai

动物名 长刺石蟹《海洋药物》

药材名 石蟹《海洋药物》

功效 蟹肉:用于腹痛,眩晕,耳鸣,淋巴结结核;蟹壳:有抑制胆固醇的作用;化石:清肝明目,消肿解毒。

**8610705**

*Lithodes turrinus* Ortmann

动物名 塔形石蟹《海洋药物》

药材名 石蟹《海洋药物》

功效 蟹肉:用于腹痛,眩晕,耳鸣,淋巴结结核;蟹壳:有抑制胆固醇的作用;化石:清肝明目,消肿解毒。

**8610706**

*Necolithodes nipponensis* Sakai

动物名 日本新石蟹《海洋药物》

药材名 石蟹《海洋药物》

功效 生活蟹类:除热,解结散血,养筋益元;蟹壳:含甲壳质,有抑制胆固醇的作用;化石:清肝明目,消肿解毒。

**8610707**

*Oedignathus inermis* (Stimpson)

动物名 无刺肿颚蟹《海洋药物》

药材名 石蟹《海洋药物》

功效 蟹肉:用于腹痛,眩晕,耳鸣,淋巴结结核;蟹壳:有抑制胆固醇的作用;化石:清肝明目,消肿解毒。

**8610708**

*Paralomis doflein* Balss

动物名 多突仿石蟹《海洋药物》

药材名 石蟹《海洋药物》

功效 蟹肉:用于腹痛,眩晕,耳鸣,淋巴结结核;蟹壳:有抑制胆固醇的作用;化石:清肝明目,消肿解毒。

**8610709**

*Paralomis heterotuberculata* Tung et Wang

动物名 异突仿石蟹《海洋药物》

药材名 石蟹《海洋药物》

功效 蟹肉:用于腹痛,眩晕,耳鸣,淋巴结结核;蟹壳:有抑制胆固醇的作用;化石:清肝明目,消肿解毒。

**8610710**

*Paralomis hystrix* (de Haan)

动物名 栗刺仿石蟹《海洋药物》

药材名 石蟹《海洋药物》

功效 蟹肉:用于腹痛,眩晕,耳鸣,淋巴结结核;蟹壳:有抑制胆固醇的作用;化石:清肝明目,消肿解毒。

**8610711**

*Tennilapotamon inflatum* Dai

动物名 胀肢小石蟹《海洋药物》

药材名 石蟹《海洋药物》

功效 石蟹的化石:清肝明目,消肿解毒;生活蟹类:除热,散血解结,养筋益元,通经续筋骨;蟹壳:有抑制胆固醇的作用。

**8610712**

*Tennilapotamon inflexum* Dai

动物名 弓肢小石蟹《海洋药物》

药材名 石蟹《海洋药物》

功效 石蟹的化石:清肝明目,消肿解毒;生活蟹类:除热,散血解结,养筋益元,通经续筋骨;蟹壳:有抑制胆固醇的作用。

**8610713**

*Tennilapotamon latilum* Dai

动物名 宽腹小石蟹《海洋药物》

药材名 石蟹《海洋药物》

功效 石蟹的化石:清肝明目,消肿解毒;生活蟹类:除热,散血解结,养筋益元,通经续筋骨;蟹壳:有抑制胆固醇的作用。

**86108 鲎科 Tatypleidae****8610801**

*Tachypleus tridentatus* (Leach)

动物名 中国鲎《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 鲎《汇编》

文献名 鲎肉、鲎壳、鲎尾《本草拾遗》,鲎鱼胆《圣济总录》,鲎鱼壳《圣惠方》,鲎胆、鲎鱼《纲目》,东方鲎《中国药用海洋生物》

地方名 福建:鲎甲(泉州);浙江:马蹄蟹,两公婆,鲎蟹,三刺鲎。

功效 鲎尾炭:止血。用于肺结核咳血,胃出血;鲎珠:清热解暑。用于咽喉痛;鲎胆:祛风,杀虫。用于大风癩疾;壳:活血散瘀,解毒。用于跌打损伤,创伤出血,烫火伤,带状疱疹;肉:清热解暑,明目。用于青光眼,白内障,痔疮。

**86109 钳蝎科 Buthidae****8610901**

*Buthus martensii* Karsch

动物名 东亚钳蝎《药典》

药材名 全蝎《纲目》、《药典》

文献名 蛰《诗经》,蜚、蛰昆虫《说文》,杜伯、杜白、蜚《广雅》,主簿虫《酉阳杂俎》,蝎螂《蜀本草》,蝎《开宝本草》,伊祚、渴砂、蝎螂、蝎子《新纲》,全虫、远东全蝎《中药志》,马氏钳蝎《拉汉无脊椎动物名称》,东亚钳蝎《药典》,问荆蝎《汇编》,春蝎、伏蝎、蝎尾、蝎梢《中药大辞典》

地方名 山西:茯背虫;内蒙古:“赫林契图·好如亥”、“地格巴染扎”(蒙名);山东:东全蝎,山蝎;其他:会全虫,淡全虫,淡水全虫,咸全虫,尾虫,蝎尾虫乞食。

**功效** 蝎体:有毒。熄风镇痉,攻毒散结,通络止痛。用于小儿惊风,抽搐痉挛,中风口喎,半身不遂,破伤风症,风湿顽痹,偏正头痛,疮疡,瘰癧。

### 861110 螳螂科 Ctenizidae

#### 8611101

*Latouchia davidi* (Simon)

**动物名** 戴氏拉上蛛(拉汉无脊椎动物名称)

**药材名** 螳螂(《本草拾遗》、《中药大辞典》)

**文献名** 蛛蝎(《尔雅》),螳螂虫(《本草拾遗》),蛛母、土蜘蛛(《纲目》)

**功效** 全虫:有毒。用于疔肿,附骨疽蚀,宿肉赘瘤。

### 861111 圆蛛科 Argiopidae

#### 8611101

*Aranea ventricosa* (L. Koch)

**动物名** 大腹圆蛛(拉汉无脊椎动物名称)

**药材名** 蜘蛛、蜘蛛网(《别录》),蜘蛛蛻壳(《纲目》、《中药大辞典》)

**文献名** 次蜚、蠹蜚(《尔雅》),蜚蜚(《尔雅》郭璞注),螟蛉(《方言》),社公(《方言》郭璞解),网公(《广雅》),蜘蛛膜(《千金方》),蜘蛛壳(《备急方》),蜘蛛丝(《纲目》),大腹圆网蛛(《中药大辞典》),〔草蜘蛛〕(《虫类药的应用》),檐蛛(《常见药用动物》)

**地方名** 吉林:圆蛛,癞蜘蛛,蛛蛛;内蒙古:“到麻”(蒙名);陕西:蜘蛛蛻,扁蛛;广西:网蛛,圆网蛛。

**功效** 全虫:祛风,消炎,解毒。用于中风口喎,小儿慢惊,淋巴结核,慢性睾丸炎,疝气,小儿疳积,疔疮,蜂蝎螫伤,毒蛇咬伤,鼻瘖肉;网丝:用于金创出血,吐血,毒疮,风火喉痛;蛻壳:用于虫牙,牙疳。

#### 8611102

*Argiope amoena* L. Koch

**动物名** 悦目黄金蛛(拉汉无脊椎动物名称)

**文献名** 悦目金珠(《中国药用动物名录》)

**功效** 全体:杀虫,解毒,退黄,生肌。

#### 8611103

*Argiope bruennichii* (Scopoli)

**动物名** 布氏黄金蛛(拉汉无脊椎动物名称)

**药材名** 花蜘蛛(《中国药用动物志》)

**文献名** 横纹金蛛(《中国药用动物志》)

**功效** 全体:解毒。用于瘰癧,疮肿,毒蛇、蝎咬伤。

#### 8611104

*Nephila clavata* (L. Koch)

**动物名** 络新妇(拉汉无脊椎动物名称)

**药材名** 络新妇(《中国药用动物名录》)

**功效** 全体:杀虫,解毒,退黄,生肌。

### 861112 壁钱科 Urocteidae

#### 8611201 见 8611203a

#### 8611202

*Uroctea compactilis* (L. Koch)

**动物名** 华南壁钱(拉汉无脊椎动物名称)

**药材名** 壁钱(《汇编》)

**文献名** 壁钱幕、壁茧(《本草拾遗》),白蟪窠(《海上方》),壁钱窠幕、白蛛窠(《纲目》),墙蜘蛛(《中国药用动物志》),壁钱虫(《汇编》)

**地方名** 湖北:抱虎子(神农架);广西:螭蛸,壁螭,壁虫,壁钱茧,蟥,伏巢蜘蛛,蟥蛛,扁蛛。

**功效** 活个体或卵囊:清热解毒,止血。用于咽喉炎,扁桃体炎,口腔、牙龈溃疡,鼻衄,金疮出血。

#### 8611203

*Uroctea lesserti* Schenkel

**动物名** 华北壁钱(拉汉无脊椎动物名称)

**药材名** 壁钱[虫体]、壁茧[巢](《中药材科技》)

**文献名** 北国壁钱(《东北动物药》)

**功效** 干燥全体及巢:用于鼻衄,咽喉炎,扁桃体炎。

#### 8611203a

*Uroctea limbata* L. Koch

**动物名** 北壁钱(《中国药用动物志》)

**药材名** 壁钱(《中国药用动物志》)

**文献名** 七星蛛(《中国药用动物志》)

**功效** 网巢及虫体:解毒,止血。用于扁桃体炎,口舌糜烂,牙疳,龋齿疼痛,鼻衄,外伤出血。

### 861113 漏斗网蛛科 Agelenidae

#### 8611301

*Agelena labyrinthica* (Clerck)

**动物名** 迷路漏斗网蛛(拉汉无脊椎动物名称)

**药材名** 草蜘蛛(《纲目》、《汇编》)

**文献名** 蛸(《本草拾遗》),花蜘蛛(《小儿卫生总微论方》),草蛛、草蛛蛛、迷路草蛛(《中国药用动物志》),漏斗网蛛(《中国药用动物名录》)

**地方名** 湖北:草折蛛(神农架)。

**功效** 全体:解毒。外用于疔肿恶疮。

#### 8611302

*Tegenus domestica* (Clerck)

**动物名** 家隅蛛(拉汉无脊椎动物名称)

**药材名** 家隅蛛(《中国药用动物名录》)

**功效** 全虫:消肿解毒。

### 861114 跳蛛科 Salticidae

#### 8611401

*Menemerus confusus* (Boes et Str.)

**动物名** 花背跳蛛(《中国药用动物志》)

**药材名** 蝇虎(《纲目拾遗》、《中药大辞典》)

**文献名** 𧈧(《易经》),蝇狐、蝇蝗、蝇豹(崔豹《古今注》)

**功效** 全虫:调血脉。用于跌打损伤。

### 861115 球马陆科 Glomeridae

#### 8611501

*Glomeris nipponica* Kishida

动物名 日本球马陆《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 滚山虫《汇编》

文献名 滚山球马陆《中国动物药》

地方名 湖北:滚连珠、滚龙珠(神农架);云南:滚山珠,地罗汉。

功效 干燥全虫:舒筋活络,接骨止痛。用于跌打损伤,骨折,脱臼。

**861116 圆马陆科 Strongylosomidae****8611601***Kronopolites acuminatus biagrilectus* Hoffman

动物名 尖跗陇带马陆《中国药用动物名录》

功效 全体:解毒,镇痛,和中开胃。用于传染性肝炎,多发性疖肿,扁桃体炎,疱疹,湿疹,胃溃疡。

**8611602***Kronopolites svenhedini* (Verhoeff)

动物名 宽跗陇带马陆《中国药用动物志》

文献名 长跗陇带马陆《浙江中医学院学报》,弹子虫《中国药用动物志》

地方名 湖北:草鞋爬子虫。

功效 全体:解毒,镇痛,和中开胃。用于传染性肝炎,多发性疖肿,扁桃体炎,疱疹,湿疹,胃溃疡。

**8611603***Kronopolites swirhoei* (Pocock)

动物名 窄跗陇带马陆《中国药用动物名录》

功效 全体:解毒,镇痛,和中开胃。用于传染性肝炎,多发性疖肿,扁桃体炎,疱疹,湿疹,胃溃疡。

**8611604***Prospirobolus joannsi* (Brolemann)

动物名 约安巨马陆《中药大辞典》

药材名 马陆《本经》、《中药大辞典》

文献名 蜎、马蜋《尔雅》,蜎《庄子》,百足《本经》,马轴《吴普本草》,蜎《淮南子》,马蜎、蜎螺、马蚰《方言》,马蚰《说文》,秦渠《淮南子》高诱注,飞蜎虫《李当之药录》,蚰、马蜋《尔雅》郭璞注,千足虫《雷公炮炙论》,刀环虫《唐本草》,马蠹《太平御览》,百节虫《圣惠方》,百节《本草衍义》,蜎《纲目》,千脚虫《分类草药性》

地方名 山东:百脚虫,大草脚虫,百草;福建:百脚陆(泉州);四川:大草鞋虫;贵州:篦子虫,锯耳朵。

功效 全体:有毒。破积,解毒。用于腹中癥积,化瘰肉,扁桃体炎。外用于疮毒。

**861117 山蛭科 Spirobolidae****8611701***Spirobolus bungii* (Brandt)

动物名 燕山蛭《中国药用动物志》

药材名 燕山蛭《中医杂志》

功效 全体:破积,解毒。用于腹中癥积痞块,扁桃体炎,一切疮毒。现代药理研究认为,其提取物对癌细胞具有直接损伤破坏作用。

**8611702***Spirobolus walkeri* Pocock

动物名 浙山蛭《中国药用动物名录》

功效 全体:破积,解毒。用于腹中癥积痞块,扁桃体炎,一切疮毒。

**861118 蟠马陆科 Sphaerotheriidae****8611801***Sphaerobelum hirsutum* (Virhoeff)

动物名 毛圆刺马陆《中国药用动物志》

药材名 山苏甲《中国药用动物志》

文献名 滚山虫《中国药用动物志》,毛圆刺蟠马陆《中国药用动物名录》

功效 全体:舒筋活血,消肿散瘀,接骨止痛。用于跌打损伤,骨折,脱臼,瘀痛。

**861119 蜈蚣科 Scolopendridae****8611901***Scolopendra morstitans* L.

动物名 赤蜈蚣《二届药论文集》

药材名 赤蜈蚣《图经》

文献名 蜈蚣、赤头蜈蚣、百脚、百足、土蜈蚣、全蜈蚣、蜈蚣虫、活太升《中药名汇》

功效 全虫:有毒。镇痉,熄风,解毒。用于小儿惊风,破伤风,痉挛抽搐,口噤,角弓反张,面神经麻痹,疮疡肿毒。

**8611902***Scolopendra dehaani* Brandt

动物名 蛤氏蜈蚣《中药材》

药材名 蜈蚣《中药材》

功效 全体:海南岛已作蜈蚣入药,用于临床。

**8611903***Scolopendra subspinipes japonica* L. Koch

动物名 日本棘蜈蚣《中草药》

药材名 蜈蚣(云南)

文献名 黑头蜈蚣《中草药》

功效 全体:湖南省从云南墨江县调入,作蜈蚣入药,习称“黑头蜈蚣”,入药经与红头蜈蚣对比分析,蛋白质含量 65.41%,略低于红头蜈蚣(74.31%)。

**8611904***Scolopendra subspinipes multidens* (Newport)

动物名 多棘蜈蚣《中国药用动物志》

药材名 蜈蚣(广西都安)、《中药材》

文献名 多棘巨蜈蚣《中国药用动物志》

地方名 广西:百足虫,百足,金头蜈蚣。

功效 全体:熄风解痉,消肿解毒。用于小儿惊风,破伤风,抽搐,口眼歪斜,淋巴结结核,肿毒疮疡。

**8611905***Scolopendra subspinipes mutilans* L. Koch

动物名 少棘巨蜈蚣《药典》

药材名 蜈蚣《本经》、《药典》

文献名 蜈蚣《庄子》,吴蚣《本经》,吴公《广雅》,天龙《纲目》,百足虫《新纲》,百足、金蜈蚣、赤足蜈蚣、大

蜈蚣、川蜈蚣、川蛇、川足《常用中药名辨》，万脚、金头蜈蚣《常见药用动物》

地方名 吉林：“噉高姆”（朝名）；江苏：百脚；贵州：草鞋板。

功效 虫体：有毒。息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口喎，半身不遂，破伤风症，风湿顽痹，疮疡，瘰疬，毒蛇咬伤。

## 86120 衣鱼科 Lepismatidae

### 8612001

*Ctenolepisma villosa* (Fabr.)

动物名 毛衣鱼《中国药用动物志》

药材名 衣鱼《中国药用动物志》

文献名 蠹鱼《尔雅翼》

功效 全虫：明目，祛风散结，明目利尿。用于中风，惊痫，疳瘦，目翳，尿血，小便不通。

### 8612002

*Lepisma saccharina* L.

动物名 衣鱼《拉英汉昆虫名称》

药材名 衣鱼《本经》、《中药大辞典》

文献名 白鱼《本经》，衣中白鱼、蟬《吴普本草》，蛭鱼《尔雅》郭璞注，壁鱼《圣惠方》，蠹鱼《尔雅翼》，蟬鱼、虫鱼《中国药用动物志》

地方名 内蒙古：“扎日玛一好如亥”（蒙名）；湖北：则蛭子、书虫（神农架）；广西：铰剪虫（陆川）。

功效 全虫：利尿，通淋，祛风，解毒。用于淋病，小便不利，小儿惊痫，疮疖，目翳，散结，明目，中风，疳瘦，尿血。

## 86121 蜚科 Aeschnidae

### 8612101

*Anax parthenope* Selys

动物名 大蜻蜓《中国药用动物志》

药材名 蜻蜓《中国药用动物志》

文献名 蜻蛉《本草经集注》，马大头《本草衍义》，绿豆蜻蜓《常见药用动物》

地方名 湖北：丁丁（神农架）；广西：“塘美”、“尔怀”（壮语），绿蜻蜓，蜻蜓，蜻蛉。

功效 成虫：补肾益精，解毒，止咳。用于阳痿遗精，咽喉肿痛，百日咳。

### 8612102

*Polycanthagyna melanictera* (Selys) --- *Aeschna melanictera* Selys

动物名 黄绿棘臀蜚《拉英汉昆虫名称》

药材名 蜻蜓《本草经集注》、《中药大辞典》

文献名 虹蜚、负劳《尔雅》，蜚《淮南子》，蜚蛉《方言》，桑根《说文》，胡蝶《崔豹古今注》，蜻蛉《别录》，狐梨《尔雅》郭璞注，诸乘《本草经集注》，蜻蜓、纱羊《纲目》，青娘子《东医宝鉴》

功效 全虫：益肾强阴。用于肾虚遗精，阳痿。

## 86122 蜻科 Libellulidae

### 8612201

*Crocothemis servillia* (Drury)

动物名 赤蜻蛉《中国药用动物志》

文献名 红蜻《中国药用动物志》

功效 全体：补肾益精，解毒消肿，润肺止咳。用于阳痿遗精，咽喉肿痛，百日咳。

### 8612202

*Plantala flavescens* (Fabricius)

动物名 黄衣《中国药用动物志》

药材名 黄衣《中国药用动物志》

文献名 胡梨、蟬蛸、江鸡《纲目》，海蜻蛉《中国药用动物志》

功效 全体：补肾益精，解毒消肿，润肺止咳。用于阳痿遗精，咽喉肿痛，百日咳。

### 8612203

*Sympetrum darwinianum* (Selys)

动物名 夏赤卒《拉英汉昆虫名称》

药材名 赤卒《纲目》

文献名 绛绡、赤衣使者、赤弁丈人《纲目》，夏黄《中国药用动物志》，夏赤足《中国药用动物名录》

地方名 江苏：〔红娘子〕。

功效 全体：补肾益精，解毒消肿，润肺止咳。用于阳痿遗精，咽喉肿痛，百日咳。

### 8612204

*Sympetrum infuscatum* (Selys)

动物名 褐端赤卒《拉英汉昆虫名称》

药材名 褐顶赤卒《中国药用动物志》

文献名 褐顶赤足《中国药用动物名录》

功效 全体：补肾益精，解毒消肿，润肺止咳。用于阳痿遗精，咽喉肿痛，百日咳。

## 86123 蜚蠊科 Blattidae

### 8612301

*Blatta orientalis* L. --- *Periplaneta orientalis* L.

动物名 东方蜚蠊《拉英汉昆虫名称》

药材名 蜚蠊《本经》、《中国药用动物志》

文献名 蜚、蛭蜚《尔雅》，飞蠊《广雅》，负盘《尔雅》郭璞注，蜚廉《本经》，蜚廉虫《吴普本草》，石姜、滑虫《唐本草》，茶婆虫、香娘子《纲目》，蟬螂、蛭郎《纲目拾遗》，偷油婆《分类草药性》，东方蜚蠊、黑蜚蠊、小蜚蠊《中国药用动物志》，黑蜚《拉英汉昆虫名称》，老蟑《常见药用动物》

地方名 广西：黄贼（陆川）；贵州：蜚虫。

功效 虫体：有小毒。活血祛瘀，消痞化积，解毒消肿。用于癥瘕积聚，小儿疳积，疔疮肿毒，喉痹，脚气水肿，蛇咬伤。

### 8612302

*Blattella germanica* L.

动物名 德国蜚蠊《中国药用动物志》

药材名 蜚蠊《中国药用动物志》

文献名 螳螂《中国药用动物志》

功效 虫体：有小毒。活血祛瘀，消痞化积，解毒消肿。用于瘰癧积聚，小儿疳积，疔疮肿毒，喉痹，脚气水肿，蛇咬伤。

#### 8612303

*Periplaneta americana* L.

动物名 美洲大蠊《拉英汉昆虫名称》

药材名 美洲大蠊《四川中药志》

文献名 美洲蜚蠊、蟑螂、大蜚蠊《汇编》、蜚蠊、美洲蠊《东北动物药》、油婆《中国药用动物志》

地方名 四川：偷油婆。

功效 虫体：有小毒。活血祛瘀，消痞化积，解毒消肿。用于瘰癧积聚，小儿疳积，疔疮肿毒，喉痹，脚气水肿，蛇咬伤。

#### 8612304

*Periplaneta australasie* Fabricius

动物名 澳洲大蠊《拉英汉昆虫名称》

药材名 澳洲大蠊《汇编》

文献名 澳洲蜚蠊、红蜚蠊、负盘、蜚盘虫、石姜、滑虫土鳖虫《中国药用动物志》、澳洲蠊《东北动物药》

地方名 偷油婆（广西、四川）；广西：蜚蠊、蟑螂、黄贼、灶马子、香娘子、腩甲。

功效 虫体：有小毒。散瘀消积，解毒利尿。用于咽喉痛，扁桃体炎，小儿疳疾，肝硬化腹水，小便不利。外用于蛇虫咬伤，痈疮肿毒，脚气水肿。

备考 《中草药》（1981）称：民间传说，口服蟑螂可治肝癌。

### 86124 姬蠊科 Pseudomopidae

#### 8612401

*Opisthoplatia orientalis* Burmister

动物名 东方后片蠊《中药志》

药材名 金边土鳖《汇编》

文献名 土虫、臭虫母子、灰鳖虫《中药志》、赤边水虻《汇编》、药用光蠊《中药大辞典》、过街《中国药用动物志》

地方名 〔土鳖虫〕（河北、山西、内蒙古、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广西）；广西：〔地鳖〕、地乌龟、〔地鳖虫〕、〔土元〕、〔土鳖〕、〔土别虫〕、簸箕虫、〔虻虫〕。

功效 雌虫全体：活血祛瘀，消肿止痛，通经下乳。用于跌打损伤，瘀血肿痛，血积癥瘕，月经闭止，乳汁不通，产后血瘀腹痛。

### 86125 鳖蠊科 Corydiidae

#### 8612501

*Eupolyphaga sinensis* (Walker) --- *Polyphaga sinensis* Walker

动物名 中华地鳖《拉英汉昆虫名称》

药材名 土鳖虫《药典》

文献名 虻虫、地鳖《本经》、土鳖《别录》、过街《埤雅》、簸箕虫《本草衍义》、蚬蛭虫《袖珍方》、地婢虫《鲍

氏小儿方》、山蛭螂《本草求真》、地乌龟《分类草药性》

地方名 土元（内蒙古、四川）、地鳖虫（江苏、四川）；吉林：土虫；河北：臭虫母、盖子虫；内蒙古：“陶木鳖斯-好如亥”（蒙名）、蟪虫、土别子；山东：格则母；江苏：苏土元、节节虫、蚂蚁虎；四川：土别；其他：地闭鱼、糠鳖、大土元、观音虫、别虫、地别、地鳖子、灰鳖虫、蚂蚁虎、老婆虫。

功效 雌虫体：有小毒。破瘀血，续筋骨。用于筋骨折伤，瘀血经闭，癥瘕痞块。

备考 1. 另有龙虱科的水鳖虫，又名“东方潜龙虱”，功效与本品各异，不能混同。但江苏部分地区的药铺，凡见处方写“地鳖虫”者，即发该药，如写“虻虫”者，则发给“龙虱”，应予纠正。2. 雄虫体亦可入药。可用于慢性肝炎，肺结核，坐骨神经痛，外伤性、肾性腰痛。外用于外痔。

#### 8612502

*Steleophaga plancyi* (Bol.) --- *Polyphaga plancyi* Bol.

动物名 冀地鳖《药典》

药材名 土鳖虫《药典》

文献名 虻虫《药典》

功效 雌虫干燥体：有小毒。破瘀血，续筋骨。用于筋骨折伤，瘀血经闭，癥瘕痞块。

### 86126 鼻白蚁科 Rhinotermitidae

#### 8612601

*Coptotermes formosanus* Shiraki

动物名 家白蚁《拉英汉昆虫名称》

药材名 家白蚁《中国药用动物志》

文献名 蟻、飞蚁《中国药用动物志》

功效 全体：滋补强壮。用于老年体衰，久病气血虚弱。

### 86127 螳螂科 Mantidae

#### 8612701

*Hierodula patellifera* (Serville)

动物名 拒斧《纲目》、《拉英汉昆虫名称》

药材名 桑螵蛸《本经》、《药典》、螳螂《别录》、《中国药用动物志》

文献名 蚀疣《本经》、桑蛸条、害焦、致《吴普本草》、螳娘子《别录》、刀螂、螳螂《纲目》、致神、婢蛸、螳蛸、螳蛸虫、螳螂巢、遗尿窝、野狐鼻涕《新纲》、黑螳蛸、巨斧螳螂《药典》、拒斧螳螂、二星螳螂、二点螳螂《中药材》、广腹螳螂、天马《中国药用动物志》

功效 卵鞘：益肾固精，缩尿，止浊。用于遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊；全虫：滋补强壮，补肾益精，定惊止搐。用于体虚无力，阳痿遗精，小儿惊风抽搐，遗尿，痔疮，神经衰弱。

#### 8612702

*Hierodula saussurei* Kirby

动物名 索氏螳螂《拉英汉昆虫名称》

药材名 桑螵蛸、螳螂《中国药用动物志》

文献名 拒斧螳螂、二点螳螂《中国药用动物志》

功效 卵鞘:益肾固精,缩尿,止浊。用于遗精滑精,遗尿尿频,小便白浊;全虫:定惊止抽,滋补强壮。

8612703

*Mantis religiosa* L.

动物名 薄翅螳螂(汇编)

药材名 桑螵蛸《本经》、《汇编》、螳螂《中药大辞典》

文献名 致神、蜉蝣、螳螂、螳螂虫、螳螂窠、遗尿窝、野狐鼻涕、当螂、刀娘、羊匕、不过、天马、天螳、髡、夷冒、敷常、蚀疣、拒斧《新纲》,欧洲螳螂《拉英汉昆虫名称》,螳螂子《简明中医辞典》,短螳螂《中药材》,透翅刀螂《中国药用动物志》

功效 卵鞘:益肾,固精,缩尿,止带。用于遗尿,尿频,白带,遗精;成虫:用于惊痫,咽喉肿痛,痔疮。

8612704

*Paratenodera augustipennis* (Saussure)

动物名 华北螳螂《中国药用动物志》

药材名 桑螵蛸、螳螂《中国药用动物志》

文献名 华北刀螂《中药大辞典》

功效 卵鞘:益肾,固精,缩尿,止带。用于尿频,遗精,白带;成虫:滋补强壮,补肾益精,定惊止搐。用于体虚无力,阳痿遗精,小儿惊风,抽搐遗尿,痔疮,神经衰弱。

8612705

*Paratenodera sinensis* Saussure --- *Tenodera sinensis* Saussure

动物名 中华绿螳螂(拉英汉昆虫名称)

药材名 桑螵蛸《本经》、《药典》,螳螂《别录》、《中药大辞典》

文献名 蜉蝣、不过、螳螂、莫貌、蜉《尔雅》,天马《吕氏春秋》高诱注,蚀疣《本经》,髡《方言》,斨父《说文》,蜉蝣、螳螂、石螂《尔雅》郭璞注,訖疣《方言》郭璞解,桑蛸条、害焦、致《吴普本草》,螳螂子《别录》,野狐鼻涕《酉阳杂俎》,胃焦、螳螂《广雅》,敷常、夷冒、刀螂、螳螂《纲目》,斨郎《说文解字注》,桑上螳螂窠《伤寒总病论》,赖尿郎《本草便读》,螳螂虫《新纲》,大刀螂《汇编》,大螳螂、中华刀螂、元螳螂、软螳螂《中国药用动物志》,团螳螂《药典》

地方名 吉林:“机噶那木儿勒”(朝名);河北:刀螂子,老鸱葱脐;内蒙古:持么勒基根;山东:螳螂蛋,尿唧唧;江苏:螳螂壳;广西:怒备,马螂康,老虎哥,螂螳;四川:猴儿包(绵阳),流尿狗、烂尿狗、撒尿果(万县),螳螂窝,刀娘子,刀螂蛋,刀螂窝,刀螂蛋窝,遗尿巢,老鸱脓,猴儿、猴孙(重庆),草猴子,青猴子;其他:髡,刀娘,天螳,羊匕,草猿,考虎歌,当郎,大刀娘,双少,虫教,螳螂桑,螳螂巢,来尿狗。

功效 卵鞘:益肾固精,缩尿,止浊。用于遗精滑精,遗尿尿频,小便白浊;成虫:用于惊痫,咽喉肿痛,痔疮。

8612706

*Statilia maculata* (Thunb.)

动物名 斑小螳螂(拉英汉昆虫名称)

药材名 桑螵蛸《本经》、《药典》,螳螂《别录》、《中药大辞典》

文献名 蚀疣《本经》,桑蛸条、害焦、致《吴普本草》,螳螂子《别录》,拒斧、刀螂、螳螂《纲目》,斑螳螂《中药志》,小刀螂、长螳螂《药典》,硬螳螂《中药大辞典》,螳螂、小螳螂、斑翅螳螂《中国药用动物志》,小螳螂《中药材》,螳螂子《简明中医辞典》

功效 卵鞘:益肾固精,缩尿,止浊。用于遗精滑精,遗尿尿频,小便白浊;成虫:用于惊痫,咽喉肿痛,痔疮。

8612707

*Tenodera oridifolia* Stoll

动物名 二点螳螂《中国药用动物志》

药材名 桑螵蛸、螳螂《中国药用动物志》

文献名 南方螳螂、素叶螳螂、长螳螂《中药材》

功效 卵鞘:益肾,固精,缩尿,止带。用于尿频,遗精,白带;成虫:滋补强壮,补肾益精,定惊止搐。用于体虚无力,阳痿遗精,小儿惊风,抽搐遗尿,痔疮,神经衰弱。

## 86128 蝗科 Acridiidae

8612801

*Acrida cinerea* (Thunberg)

动物名 东亚蚱蜢(拉英汉昆虫名称)

药材名 尖头蚱蜢《中国药用动物志》

文献名 中华蚱蜢、尖头蚂蚱、扁担钩《中国药用动物志》

功效 成虫:止咳平喘,定惊,解毒。用于支气管哮喘,百日咳,小儿惊风。外用于冻伤。

8612802

*Acrida lata* Morsch.

动物名 大剑角蝗《中国动物药》

药材名 尖头蚱蜢(汇编)

文献名 杆担蚂蚱、老扁担、尖担牙子、小尖头蝗、老扁、挂搭扁(汇编),蚱蜢《中国动物药》,稻叶大剑角蝗《东北动物药》,稻叶大剑蝗《中国药用动物名录》

地方名 湖北:大蚂抓(神农架)。

功效 成虫:止咳平喘,滋补强壮,止痉,解毒,透疹。用于百日咳,支气管哮喘,小儿惊风,咽喉肿痛,疹出不畅。外用于中耳炎,冻疮,拔枪弹。

8612803

*Acrida turrita* L. --- *Acrida chinensis* Westw.

动物名 狭背蚱蜢(拉英汉昆虫名称)

药材名 尖头蚱蜢(汇编)

文献名 中华蚱蜢、螳螂《中国药用动物志》

功效 成虫:止咳平喘,滋补强壮,止痉,解毒,透疹。用于百日咳,支气管哮喘,小儿惊风,咽喉肿痛,疹出不畅。外用于中耳炎,冻疮,拔枪弹。

8612804

*Ceracris kiangsu* Tsai

动物名 黄脊竹蝗(拉英汉昆虫名称)

药材名 竹蚂蚱《中国药用动物志》

文献名 竹草蝗《中国药用动物志》

功效 全体:止咳平喘,镇惊止痉,解毒透疹,消肿止痛。用于百日咳,支气管哮喘,小儿惊风,咽喉肿痛,疹出不畅。外用于中耳炎。

#### 8612805

*Locusta migratoria* (L.)

动物名 飞蝗《中国药用动物志》

药材名 蚱蜢《中国药用动物志》

文献名 蝗虫、飞蚤、蝗蝻《汇编》,蚂蚱、扁担钩《常见药用动物》,东亚飞蝗《山东药用动物》

地方名 湖北:黄蚂蚱(神农架)。

功效 全虫:止咳,平喘,定惊,滋补强壮,止痛,解毒,透疹。用于支气管哮喘,百日咳,小儿惊风,咽喉肿痛,疹出不畅。外用于中耳炎;霜打蚂蚱:用于细菌性痢疾,肠炎。

#### 8612806

*Oxya chinensis* (Thunberg) --- *Oxya adentata* Willernse --- *Oxya formosana* Shiraki --- *Oxya manzhurica* Bey-Bienko

动物名 中华稻蝗《拉英汉昆虫名称》

药材名 蚱蜢《纲目》、《汇编》

文献名 蝗虫《诗经》,蝗(尔雅),蜩蝗《滇南本草》,稻蝗《汇编》

地方名 蝗虫(广西、四川);湖北:青蚂蚱(神农架);广西:蜩蚱,蚂蚱,草蜢,竹节蝗;四川:油蚱蜢,蚤蚂(南充)。

功效 虫体:止咳平喘,定惊,消积。用于支气管哮喘,百日咳,小儿惊风,疳积。

#### 8612807

*Oxya intricata* (Stal)

动物名 小稻蝗《中国药用动物志》

功效 全体:止咳平喘,镇惊止抽,解毒透疹,消肿止痛。用于百日咳,支气管哮喘,小儿惊风,咽喉肿痛,疹出不畅。外用于中耳炎。

#### 8612808

*Oxya velox* (Fabricius)

动物名 长翅稻蝗《拉英汉昆虫名称》

药材名 蚱蜢《中国药用动物志》

功效 虫体:补养强壮。用于肺结核,小儿疳积,小儿腺病质,颈淋巴结结核,神经衰弱,失眠,哮喘,百日咳等。

#### 8612809

*Patanga japonica* (I. Bol.)

动物名 日本黄脊蝗《中国药用动物志》

药材名 黄脊蝗《中国药用动物志》

文献名 日本条蝗《中国药用动物志》

功效 全体:止咳平喘,镇惊止抽,解毒透疹,消肿止痛。用于百日咳,支气管哮喘,小儿惊风,咽喉肿痛,疹出不畅。外用于中耳炎。

### 86129 螽斯科 Tettigoniidae

#### 8612901

*Gampsocleis buergeri* de Haan

动物名 布氏螽斯《拉英汉昆虫名称》

药材名 螬螬《汇编》

文献名 螽斯、聒聒儿、郊游子《汇编》

功效 雄虫全体:解毒,行水,止痛。用于中耳炎,水肿,腰腿疼痛。

#### 8612902

*Gampsocleis gratiosa* Brunner Wattenwyl

动物名 聒聒《中国药用动物志》

药材名 螬螬《汇编》

文献名 螽斯、豆聒聒《中国药用动物志》,聒聒儿、叫螬螬、叫游子、郊游子《中药名汇》

功效 雄虫全体:解毒,行水,止痛。用于中耳炎,水肿,腰腿疼痛。

#### 8612903

*Gampsocleis sinensis* Walker

动物名 中华聒聒(拟)

药材名 螬螬《汇编》

功效 雄虫全体:解毒,利水,止痛。用于中耳炎,水肿,腰腿疼痛。

#### 8612904

*Mecopoda elongata* L.

动物名 纺织娘《拉英汉昆虫名称》

药材名 纺织娘(江苏)、《中国药用动物志》

文献名 叫哥哥《虫荟》,叫姑姑《民药汇编》,络纬螽、络丝娘《中国药用动物志》

地方名 江苏:纺纱婆(泰州)。

功效 全虫:熄风镇惊。用于小儿惊风,痉挛抽搐。

### 86130 蟋蟀科 Gryllidae

#### 8613001

*Brachytrupes portentus* (Lichtenstein) --- *Brachytrupes achatinus* Saussure

动物名 花生大蟋《拉英汉昆虫名称》

药材名 花生大蟋蟀《中国药用动物志》

文献名 台湾大蟋蟀、大土狗、大头狗、大头蟋蟀、大臂狗、大肉竹蟋《中国药用动物志》,土猴《中药名汇》

功效 全体:利水消肿,清热解毒。用于水肿,小便不利。外用于红痔疮毒。

#### 8613002

*Gryllodes sigillatus* (Walker)

动物名 灶马《拉英汉昆虫名称》

文献名 细纹油葫芦《东北动物药》

地方名 (蟋蟀)(东北)。

功效 干燥成虫:利水消肿,清热解毒。用于水肿,小便不利,红肿疮毒。

#### 8613003

*Gryllus chinensis* Weber --- *Gryllulus chinensis* Weber --- *Gryllus burdigalensis* Serville

动物名 中华蟋蟀《拉英汉昆虫名称》

药材名 蟋蟀《纲目》、《汇编》



文献名 蜚《尔雅》，蜻蛉、虻孙《方言》，促织《广雅》，吟蛩《崔豹《古今注》》，将军《纲目拾遗》，斗鸡《药材资料汇编》，夜鸣虫《中药志》，将军干《虫类药的应用》

地方名 河北：螻蛄；贵州：叫鸡，唧唧；其他：造织，蜻蛉。

功效 虫体：有毒。利尿，破血。用于小便不通，尿路结石，肝硬化腹水，慢性肾炎水肿，肝肾综合症的腹胀尿少，阵缩无力之难产；去足虫体：用于肾虚阳痿。

#### 8613004

*Gryllus mitratus* Burmeister --- *Gryllulus mitratus* de Saussure

动物名 台湾油葫芦《拉英汉昆虫名称》

药材名 黑油葫芦《中国药用动物名录》

文献名 日本产蟋蟀《东北动物药》

功效 全体：扩张血管，降低血压，利尿，消肿，清热解毒。用于水肿，小便不利。外用子红肿疮毒。

#### 8613005

*Gryllus testaceus* Walker --- *Gryllulus testaceus* Walker

动物名 油葫芦《拉英汉昆虫名称》

药材名 油葫芦《中国药用动物志》

文献名 蟋蟀《中国药用动物志》，毫螳虫、土蚱子、土蚂蚱子《中国农作物病虫图谱》

地方名 广西：大头狗（陆川）；其他：田葫芦。

功效 全体：利水消肿，解毒退热。用于水肿，小便不利。外用子红肿疮毒，流注。

#### 8613006

*Loxoblemmus doenitzi* Stein

动物名 大棺头蟋《拉英汉昆虫名称》

药材名 棺头蟋蟀《中国药用动物志》

文献名 蟋蟀、斗蟋蟀《中国药用动物志》

地方名 贵州：棺材头。

功效 成虫：利水消肿，解毒退热。用于水肿，小便不利。外用子红肿疮毒。

#### 8613007

*Scapsipede aspersus* (Walker) --- *Gryllodes berthellus* Saussure --- *Gryllus conspersus* Schauman --- *Scapsipede mandicularis* Saussure

动物名 长顎蟋《拉英汉昆虫名称》

药材名 蟋蟀《汇编》

地方名 螻蛄（河北、内蒙古、湖北、广西、贵州），夜鸣虫、斗鸡（广西、贵州），将军干（江苏、广西）；内蒙古：“古热勒螻根”（蒙名）；湖北：叫咕子（神农架）；其他：秋虫，将军，蜚，蜻蛉，虻孙，吟蛩，蜻蛉，唧唧。

功效 全体：有毒。利尿，破血。用于水肿，小便不通，尿路结石，肝硬化腹水。

### 86131 螻蛄科 Gryllotalpidae

#### 8613101

*Gryllotalpa africana* Palisot et Beauvois

动物名 非洲螻蛄《拉英汉昆虫名称》

药材名 螻蛄《本经》、《汇编》

文献名 梧鼠《荀子》，螻蛄《吕氏春秋》，螻蛄、天螻、

螻《本经》，螻蛄、螻蛄蛉、杜狗、蛭螻《方言》，炙鼠、津姑、螻蛄《广雅》，硕鼠《崔豹《古今注》》，螻蛄《广志》，土狗《本事方》，地虎、地狗《滇南本草》，拉拉古《广雅疏证》，石鼠、仙姑、砧鼠、土狗、土狗蛄《新纲》，南方螻蛄、水狗、地姑、地螻蛄《中国药用动物志》

地方名 拉姑（内蒙古、山东）；河北：拉拉狗；山东：地老虎；江苏：土土狗；四川：土狗儿，土狗子，土叫花；贵州：土狗崽，地姑牛；其他：金姜古，土狗虫，耙槁虫。

功效 成虫：消肿，解毒。用于水肿，小便不利，石淋，跌打损伤，瘰癧，痈肿恶疮。

#### 8613102

*Gryllotalpa formosana* Shiraki

动物名 台湾螻蛄《拉英汉昆虫名称》

药材名 小螻蛄《中国药用动物志》

功效 全体：利水消肿，解毒消疮。用于水肿，小便不利，石淋，跌打损伤。外用子痈疮肿毒。

#### 8613103

*Gryllotalpa unispina* Saussure

动物名 华北螻蛄《拉英汉昆虫名称》

药材名 螻蛄《本经》、《汇编》

文献名 螻蛄、天螻、螻《本经》，大螻蛄《汇编》，土狗、北方螻蛄、拉拉姑《中国药用动物志》

功效 成虫：消肿，利水，解毒。用于水肿，小便不利，石淋，跌打损伤。

### 86132 蝉科 Cicadidae

#### 8613201

*Cicada flammata* Dist.

动物名 山蝉《中药志》

药材名 金蝉衣《蛻壳》《中药志》

文献名 蝉花《图经》，蝉蛻、金牛儿《纲目》，山蝉蛻、竹蛻《中药志》，虫花《简明中医辞典》

功效 蛻壳（金蝉衣）：疏风散热，利咽，透疹，退翳，止痒；带菌虫体（蝉花）：疏风散热，定惊。

#### 8613202

*Cryptotympana atrata* Fabr.

动物名 黑蚱《汇编》

药材名 蝉蛻《药性论》，蚱蜢《本经》、《中药大辞典》

文献名 鸣蜩《诗经》，螳甲《庄子》，螳、马螳《尔雅》，螳《方言》，蚱蜢壳、伏螳、枯蝉《别录》，鸣蝉《唐本草》，螳螂退皮《本草拾遗》，蝉退壳、秋蝉《圣惠方》，蝉衣《临证指南》，蝉退《眼科龙木论》，螳螂《七修类编》，金牛儿《卫生易简方》，齐女、毛蝉壳、腹螳《纲目》，蚱蜢《中药志》，蝉花《虫类药的应用》，虫衣、净蝉衣、蝉肚《常用中药名辨》

地方名 蝉（山东、广西）；辽宁：热皮；河北：螳螂皮；甘肃：蝉皮，知了皮；山东：唧了皮，唧猴皮，唧唧皮，唧唧猴皮，螳螂；江苏：知了；浙江：土蝉衣；河南：虫退，麻儿鸟皮；贵州：催米虫壳；其他：全退，全蝉，腹蝉，大黑蝉，黑蝉，假牛，假牛壳，秋伏凉，秋凉虫，仙人衣，蝉联子，麻儿鸟衣。

功效 蛻壳：散风除热，利咽，透疹，退翳，解痉。

用于风热感冒,咽痛,音哑,麻疹不透,风疹瘙痒,目赤翳障,惊风抽搐,破伤风;全虫:清热,熄风,镇惊。用于小儿惊风,癫痫,夜啼。

#### 8613203

*Cryptotympana mandrina* Dist.

动物名 黄蚱蝉(拉英汉昆虫名称)

药材名 蝉蜕《中国药用动物志》

文献名 华南蚱蝉《中国药用动物志》

功效 皮壳:散风散热,利咽,透疹,退翳,解痉。用于风热感冒,咽痛,音哑,小儿惊痫抽搐,夜啼不安,破伤风,麻疹不易透发,风疹瘙痒,目赤肿痛,云翳障目。

#### 8613204

*Cryptotympana pustulata* Fabricius

动物名 蚱蝉(拉英汉昆虫名称)

药材名 蝉蜕《药性论》、《药典》,蚱蝉《本经》、《中国药用动物志》

文献名 蚱蝉壳、伏螳、枯蝉《别录》,齐女、腹螳、蝉壳《纲目》,蝉皮《新纲》,黑蚱《药典》,蝉花、蝉、秋凉虫《中国药用动物志》

地方名 河北:黑蝉;山东:螳蛄;江苏:知了;湖北:叭鸟子(神农架);四川:虫退(南充)。

功效 皮壳(蝉蜕):散风除热,利咽透疹,退翳,解痉。用于风热感冒,咽痛,音哑,麻疹不透,风疹瘙痒,目赤翳障,惊风抽搐,破伤风;带菌虫体(蝉花):疏风散热,定惊。用于小儿夜啼,惊痫抽搐;雄蝉:清热解毒,止惊,催乳。用于肠炎,声音嘶哑,小儿惊痫夜啼,乳汁不足。

#### 8613205

*Huechys philamata* (Fabr.)

动物名 褐翅红娘子《中国药用动物志》

药材名 红娘子《汇编》

功效 虫体:有剧毒。破血,攻毒,消积,通瘀。用于血瘀经闭,狂犬咬伤。外用于瘰癧,恶疮,疥癣。

#### 8613206

*Huechys sanguinea* (de Geer)

动物名 黑翅红娘子《中国药用动物志》

药材名 红娘子《图经》、《汇编》

文献名 红娘虫《药材资料汇编》,么姑虫《中药志》,红婢《中国药用动物志》

地方名 红姑娘(广西、四川);广西:红娘;四川:红女;其他:红盖虫,花大鸡,山鸡腰。

功效 虫体:有剧毒。破血,攻毒,消积,通瘀。用于血瘀经闭,狂犬咬伤。外用于瘰癧,恶疮,疥癣。

备考 本品体黑色及朱红色,广布于华南、印度、马来等地。古籍上常误称红娘子为樗鸡。考樗鸡为樗鸡科(Fulgoridae)灰花蛾 *Lycorma delicatula* White,此虫不能鸣,与红娘子迥异。

#### 8613207

*Huechys thoracica* Distant

动物名 短翅红娘子《中国药用动物志》

功效 虫体:有剧毒。破血,攻毒,消积,通瘀。

#### 8613208

*Oncotympana maculaticollis* Motsch.

动物名 昼鸣蝉(拉英汉昆虫名称)

药材名 蝉蜕、蝉花《中国药用动物志》

文献名 明蟬《汇编》,鸣蝉、鸣鸣蝉、昭蝉《中国药用动物志》

功效 皮壳:散风除热,利咽,透疹,退翳,解痉。用于风热感冒,咽痛,音哑,麻疹不透,风疹瘙痒,目赤翳障,惊风抽搐,破伤风;带菌虫体(蝉花):疏风散热,定惊。用于小儿夜啼,惊痫抽搐。

#### 8613209

*Platypleura kaempferi* (Fabr.)

动物名 螳蛄《中国药用动物志》

药材名 蝉蜕、蝉花《中国药用动物志》

文献名 褐斑蝉《中国药用动物志》

功效 皮壳(蝉蜕):散风除热,利咽,透疹,退翳,解痉。用于风热感冒,咽痛,音哑,麻疹不透,风疹瘙痒,目赤翳障,惊风抽搐,破伤风;带菌虫体(蝉花):疏风散热,定惊。用于小儿夜啼,惊痫抽搐。

### 86133 樗鸡科 Fulgoridae

#### 8613301

*Lycorma delicatula* White

动物名 樗鸡《中国药用动物志》

药材名 樗鸡《本经》、《中国药用动物志》

文献名 红娘子《纲目》,椿皮蜡蝉、花娘子、灰蝉、灰花蛾、斑衣《中国药用动物志》,斑衣蜡蝉、斑蜡蝉(拉英汉昆虫名称),蜡蝉《常见药用动物》

功效 成虫:有毒。破瘀散结,通经堕胎,解毒。用于经闭,癥瘕。外用于疥癣,疮毒,淋巴结结核。

备考 本品为本草所载红娘子,效用同现用中药红娘子 *Huechys sanguinea* (de Geer)和褐翅红娘子 *H. philamata* (Fabr.)

### 86134 胶蚧科 Lacciferidae

#### 8613401

*Laccifer lacca* Kerr

动物名 紫胶蚧(拉英汉昆虫名称)

药材名 紫草茸《本经逢原》、《中药大辞典》

文献名 赤胶《别录》,紫矿《唐本草》,紫梗《纲目》,紫胶(蔡邦华《昆虫分类学》),虫胶《中药志》,棒状虫胶《汇编》,紫胶虫《药典》

地方名 广西:胶虫;其他:花没药,胡胭脂,胶质紫草茸。

功效 胶质:凉血,活血,敛疮。用于月经过多,外用于外伤出血,湿疹,溃疡不敛。

备考 (1)紫胶蚧常寄生于桑科的榕属(*Ficus*),豆科的槐属(*Dalbergia*)、合欢属(*Albizia*)、本豆属(*Cajanus*),珙树科的一担柴属(*Colona*),梧桐科的火绳树属(*Erriolaena*)、胡桃科的山核桃属(*Carya*)、黄杞属(*Engelhardtia*)、鼠李科的枣属(*Ziziphus*)等四十余种大型乔木、小乔木和灌木上。可制片胶(shellac)供工艺

用。云南西南部的紫胶,为少数民族重要物产之一。(2)紫草之嫩苗亦称紫草茸,古方用以发痘疮。《活动新书》按:上海中药店处方紫草茸付给紫草,如写明紫草茸,才付给紫草。

### 86135 绵蚜科 Eriosomatidae

#### 8613501

*Floraphis meitanensis* Tsai et Tang

动物名 铁花倍蚜(拉英汉昆虫名称)

药材名 五倍子(湖北、四川、云南)

文献名 铁花蚜《中国药用动物志》

功效 虫瘿(寄生于红肤杨上);收敛止血,敛肺止咳,涩肠止泻,敛汗,解毒。

备考 虫瘿为寄生于红肤杨(*Rhus punjabensis* Stew. var. *sinica* Rehd. et Wils.)上的一种五倍子。

#### 8613502

*Kaburagia ensignalis* Tsai et Tang

动物名 枣铁倍蚜(拉英汉昆虫名称)

药材名 五倍子(湖北、四川、云南)

文献名 枣铁倍蚜《中国药用动物名录》

功效 虫瘿(寄生于红肤杨上);收敛止血,敛肺止咳,涩肠止泻,敛汗,解毒。

#### 8613503

*Kaburagia ovogallis* Tsai et Tang

动物名 蛋铁倍蚜《中国药用动物志》

药材名 五倍子(湖北、四川、云南)

功效 虫瘿(寄生于红肤杨上);收敛止血,敛肺止咳,涩肠止泻,敛汗,解毒。

#### 8613504

*Meitanaphis elongalis* Tsai et Tang

动物名 小铁枣倍蚜(拉英汉昆虫名称)

药材名 五倍子(西南)

文献名 小铁枣蚜《中国药用动物志》

功效 虫瘿(寄生于红肤杨上);收敛止血,敛肺止咳,涩肠止泻,敛汗,解毒。

#### 8613505

*Melaphis chinensis* Bell --- *Schlechtendalia chinensis* (Bell)

动物名 五倍子蚜(拉英汉昆虫名称)

药材名 五倍子《本草拾遗》、《药典》

文献名 文蛤、百虫仓《开宝本草》,五倍子内虫《纲目》,木附子《现代实用中药》,昆虫角倍蚜、菱倍、花倍《中药大辞典》,角倍蚜《中国药用动物志》

地方名 广西:五倍子蚜虫,倍牙,虱虫,蚁虫,蜜虫,盐肤木倍子,角倍。

功效 虫瘿(寄生于盐肤木上):敛肺降火,涩肠止泻,敛汗止血,收湿敛疮。用于肺虚久咳,肺热痰嗽,久泻久痢,盗汗,消渴,便血痔血。外用于出血,痈肿疮毒,皮肤湿烂。

备考 寄生于盐肤木(*Rhus chinensis* Mill)上的一种五倍子。

#### 8613506

*Melaphis paitan* Tsai et Tang

动物名 倍蛋蚜(拉英汉昆虫名称)

药材名 五倍子《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 五倍子内虫《纲目》,倍蛋蚜《中药大辞典》

地方名 四川:肚倍,蛋倍,独角倍。

功效 虫瘿(寄生于盐肤木上):敛肺降火,涩肠止泻,敛汗止血,收湿敛疮。用于肺虚久咳,肺热痰嗽,久泻久痢,盗汗,消渴,便血痔血。外用于出血,痈肿疮毒,皮肤湿烂。

备考 《中国药用动物志》的倍蛋蚜为 *Melaphis sinensis* (Walker)

#### 8613507

*Nurudea rosea* Matsumura

动物名 红仿倍蚜(拉英汉昆虫名称)

药材名 五倍子(西南)

文献名 红信花蚜《中国药用动物志》

功效 虫瘿(寄生于红肤杨上);收敛止血,敛肺止咳,涩肠止泻,敛汗,解毒。

#### 8613508

*Nurudea sinica* Tsai et Tang

动物名 圆角仿倍蚜(拉英汉昆虫名称)

药材名 五倍子(西南)

文献名 圆角倍蚜《中国药用动物志》

地方名 四川:圆角倍。

功效 虫瘿(寄生于盐肤木上);收敛止血,敛肺止咳,涩肠止泻,敛汗,解毒。

#### 8613509

*Nurudeopsis shiraii* (Matsumura) --- *Nurudea shiraii* Matsumura

动物名 倍花蚜《中国药用动物志》

药材名 倍花(西南)

文献名 花冠倍蚜(拉英汉昆虫名称)

功效 虫瘿(寄生于盐肤木上);收敛止血,敛肺止咳,涩肠止泻,敛汗,解毒。

### 86136 蚧科 Coccidae

#### 8613601

*Ericerus pela* Chavannes

动物名 白蜡蚧(拉英汉昆虫名称)

药材名 虫白蜡《本草会编》、《药典》

文献名 虫蜡《本草求真》,木蜡《新纲》,树蜡《中国药学大辞典》,白蜡虫《药典》,蚧虫、壳虫《常见药用动物》

地方名 下河虫(贵州、云南),蜡虫(湖北、广西);广西:水蜡虫;四川:蜡膏,川蜡,白蜡,大山虫(会理、西昌),灌虫(灌县),坝虫(峨眉、青龙场);其他:虫白蜡花,伊保多花,伊保多蜡,米心白蜡,马牙白蜡,牙蜡。

功效 雄虫分泌的蜡:生肌敛疮,止血定痛。用于创伤出血,疮口久溃不敛,出血性下痢。亦可作为赋形剂、制丸、片的润滑剂。

**86137 蟾科 Pentatomidae****8613701**

*Aspongopus chinensis* Dallas *Coridius chinensis* (Dallas)

动物名 九香虫《拉英汉昆虫名称》

药材名 九香虫《纲目》、《药典》

文献名 黑兜虫《纲目》, 瓜黑蟥(蔡邦华《昆虫分类学》), 屁板虫、屁巴虫《中药志》, 臭大姐《常见药用动物》, 椿象《内蒙古药用动物》, 褐黄黑龟虫《南充本草》

地方名 打屁虫(广西、四川), 屁爬虫(湖北、四川); 内蒙古: “乌木黑、好如亥”(蒙名), 臭虫; 广西: 放屁虫, 臭屁虫, 酒香虫; 四川: 屁斑虫、五香虫(合川); 其他: 海蚕沙。

功效 虫体: 理气止痛, 温中助阳。用于胃寒胀痛, 肝胃气痛, 肾虚阳痿, 腰膝酸痛。

**8613702**

*Cyclopelta parva* Distant

动物名 小皱蟥《拉英汉昆虫名称》

文献名 [九香虫]《中国药用动物志》

地方名 山东: 小九香虫(昌潍)。

备考 山东昌潍地区以此充九香虫用。

**8613703**

*Nezara viridula smaragdula* Fabricius --- *Nezara viridula* (L.)

动物名 稻绿蟥《中国药用动物志》

药材名 稻绿蟥《中国药用动物志》

文献名 青鱼龟虫、绿蟥《中国药用动物志》

功效 全体: 活血散瘀, 消肿止痛。用于跌打损伤, 瘀血肿痛。

**8613704**

*Tessaratoma pillosa* Drury

动物名 荔枝蟥《拉英汉昆虫名称》

药材名 荔枝蟥象《中国药用动物志》

文献名 荔枝蟥、甘佩、金背、石柜、臭屁虫、臭屁蛋、狗屁蛋、臭便桶、臭屁甲、臭乌龟《中国药用动物志》

功效 全体: 活血散瘀, 消肿止痛。用于跌打损伤, 瘀血肿痛。

**86138 龟蟥科 Gerridae****8613801**

*Hydrotrechus remigator* Hor.

动物名 水龟《中药大辞典》

药材名 水龟《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 水马《本草拾遗》, 水爬虫《纲目》, 婆子《东医宝鉴》, 水和尚、水豆油(蔡邦华《昆虫分类学》)

功效 全虫: 有毒。用于痔疮。

备考 《中国药用动物名录》水龟的学名为 *Rhagadotarsus kraepelini* Breddin, 用于清热抗疟。

**86139 蚁蛉科 Myrmeleontidae****8613901**

*Euroleon simcus* (Navas)

动物名 中华东蚁蛉《拉英汉昆虫名称》

药材名 地牯牛《汇编》

文献名 蚊狮、砂猴、缩缩、倒退虫《中国药用动物志》, 蚊虎、沙窝子《常见药用动物》

功效 幼虫体: 有毒。平肝熄风, 解热镇痛, 拔毒消肿。用于高血压病, 中风, 小儿高热、惊厥, 疟疾, 泌尿道感染, 竹木刺、异物入肉不出, 骨折。外用于中耳炎, 痔疮, 无名肿毒。

**8613902**

*Hagenomyia micans* Mac Lachlan

动物名 黄足蚁蛉《中国药用动物志》

文献名 砂援子、倒行狗子、蚊地獄《中国药用动物志》

功效 幼虫: 平肝熄风, 清热止痉, 祛瘀散结, 消肿拔毒, 通便泻下, 截疟杀虫。用于小儿高热惊厥, 癫痫, 中风, 跌打损伤, 疟疾, 便秘, 小儿消化不良。外用于疳疮肿毒, 骨髓炎, 中耳炎。

**8613903**

*Myrmeleon formicarius* L.

动物名 蚁蛉《拉英汉昆虫名称》

药材名 蚊狮《中国药用动物志》

文献名 砂援子、倒行狗子、睡虫《本草拾遗》, 蚊蜻蛉《广西药用动物》, 倒退虫、缩缩、砂猴、砂王八《中国药用动物志》

地方名 广西: 沙牛虫, 地沙牛, 地沙虫, 沙钻虫, 地蜘蛛, 沙鸡, 地牯牛, 蚊地獄, 凹窝爬, 倒退牛。

功效 幼虫: 平肝熄风, 清热止痉, 祛瘀散结, 消肿拔毒, 通便泻下, 截疟杀虫。用于小儿高热惊厥, 癫痫, 中风, 跌打损伤, 疟疾, 便秘, 小儿消化不良。外用于疳疮肿毒, 骨髓炎, 中耳炎。

**8613904**

*Myrmeleon micans* Mac Lachlan

动物名 蚊蜻蛉《中药大辞典》

药材名 地牯牛《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 砂援子、倒行狗子、睡虫《本草拾遗》, 沙谷牛《生草药性备要》, 沙牛《本草求真》, 蚊狮《动物学大辞典》, 金沙牛《生草药手册》

地方名 湖北: 地占牛(神农架); 广西: 砂牛虫(陆川); 四川: 地拱; 其他: 名沙牛。

功效 幼虫: 有毒。祛瘀散结, 活血消肿, 平肝熄风, 解热镇痛。用于小儿风痰, 痉挛, 砂淋, 疟疾。外用于疔毒, 瘰癧破烂, 竹木刺, 铁沙入肉不出。

**86140 刺蛾科 Cochliidiidae****8614001**

*Cnidocampa flavescens* (Walker) --- *Monema flavescens* Walker

动物名 黄刺蛾《拉英汉昆虫名称》

药材名 雀瓮《本经》、《中药大辞典》

文献名 躁舍《本经》, 姑蜋房《别录》, 雀儿饭瓮《蜀本草》, 戴毛虫窠《日华子本草》, 棘刚子、天浆子《图

经》, 枣刺蛾、刺毛虫、洋辣子、枣八角《汇编》, 刺毛、毛八角《中国动物药》

地方名 山东: 八角毛、洋刺子、刺蛾; 广西: 雀瓮蛾; 其他: 毛毛虫、毛虫、刺刚子、柿刺蛾、洋辣罐、洋蜡罐、蚝虫窠。

功效 带有石灰质硬茧的蛹: 清热定惊。用于小儿惊风、痢疾、乳蛾、喉痹、脐风、痢疾。

### 86141 螟蛾科 Pyralidae

#### 8614101

*Proceras venosatum* (Walker) --- *Diatraea venosata* (Walker)

动物名 高粱条螟《拉英汉昆虫名称》

药材名 钻秆虫《中国药用动物志》

地方名 山东: 高粱钻心虫; 湖北: 高粱虫(神农架)。

功效 干燥或新鲜幼虫: 凉血解毒。用于便血。

### 86142 野螟科 Pyraustidae

#### 8614201

*Ostrinia nubilalis* (Hubner) --- *Pyrausta nubilalis* (Hubner) --- *Micractis nubilalis* (Hubner)

动物名 玉米螟《拉英汉昆虫名称》

药材名 苍耳蠹虫《纲目》

文献名 麻虫《纲目》, 玉米钻心虫、玉米髓虫、粟野螟、钻秆虫、钻心虫、挖心虫、钻茎虫、箭秆虫《中国药用动物志》

地方名 广西: 疔虫, 苍耳虫, 苍耳蛀心虫, 麻壤。

功效 全体: 凉血止血, 清热解毒。用于便血, 疔肿, 疮毒, 疳积。

备考 苍耳蠹虫的寄主原植物尚有 *Thyestes gebleri* Fald.

### 86143 家蚕蛾科 Bombycidae

#### 8614301

*Bombyx mori* (L.)

动物名 家蚕《拉英汉昆虫名称》

药材名 僵蚕《千金方》、《药典》, 蚕蛹《日华子本草》、《汇编》, 蚕沙《本草经集注》、《中药大辞典》

文献名 白僵蚕《本经》, 蚕衣《说文》, 原蚕蛾、原蚕尿《别录》, 蚕子故纸《千金方》, 绵《本草拾遗》, 小蜂儿、蚕布纸、晚蚕蛾《日华子本草》, 蚕纸《近效方》, 茧黄、蚕蜕纸《圣惠方》, 蚕退纸、蚕退、马鸣退《嘉祐本草》, 原蚕子《证类本草》, 蚕连《本草衍义》, 蚕种《卫生家宝方》, 马明退《儒门事亲》, 蚕蜕皮《本草蒙筌》, 佛退《眼科龙木论》, 晚蚕沙《斗门方》, 蚕连纸、丝棉、蚕蜕、蚕茧、原蚕沙《纲目》, 蚕绵《医林纂要》, 马鸣肝《东医宝鉴》, 晚蚕矢《本草备要》, 蚕沙纸、蚕退皮《本草求真》, 死冰、白甘迷、直僵蚕、蚁僵子《新纲》, 蚕蛾《虫类药的应用》, 天虫、蚕茧壳《药材资料汇编》, 家蚕蛾《中药志》, 僵蛹、白僵蛹《中药大辞典》, 蚕粪、蚕屎《中国药用动物志》, 炒僵蚕《药典》, 蚕砂《药典》附录

地方名 姜虫(江苏、浙江、四川、贵州), 蚕(湖北、广

西); 河北: 僵虫; 山东: 蚕儿衣; 江苏: 二蚕沙; 广西: 桑蚕; 四川: 白僵虫; 其他: 白蚕, 石蚕, 白苟, 白僵, 江旱虫, 姜蚕, 羌虫, 姜蚕, 羌蚕, 瘟蚕, 僵尸鬼, 蚕壳, 白蚕皮, 羌虫皮, 夏蚕粉。

功效 染菌幼虫(僵蚕): 祛风定惊, 化痰散结。用于惊风抽搐, 咽喉肿痛, 颌下淋巴结炎, 面神经麻痹, 皮肤瘙痒; 蚕蛹: 生津止渴, 消食理气。用于消渴, 尿无度膨胀, 肺结核消瘦, 慢性胃炎, 胃下垂; 幼虫粪便(蚕砂): 明日, 祛风燥湿。用于风热目赤, 关节疼痛, 肢体麻木, 瘾疹; 茧壳: 清热止血, 止渴, 缩尿。用于便血, 尿血, 血崩, 消渴, 反胃, 疳疮, 痈肿; 蚕蜕: 用于崩漏, 带下, 痢疾, 吐血, 衄血, 便血, 牙疳, 口疮, 喉风, 目翳; 卵: 子孵化后的卵壳(蚕退纸): 用于吐血, 衄血, 便血, 崩漏, 带下, 喉风, 喉痹, 牙疳, 牙痛, 疔肿, 疮疡; 卵(原蚕子): 用于倒产难生; 雄性成虫(蚕蛾): 补肝益肾, 壮阳涩精。用于阳痿, 遗精, 白浊, 尿血, 创伤, 溃瘍, 烫伤; 僵蛹: 退热, 止咳, 化痰, 镇静镇惊, 消肿, 调节神经系统, 参与脂肪代谢。用于癫痫, 高热惊厥, 流行性腮腺炎, 上呼吸道感染, 慢性气管炎, 遗尿, 荨麻疹, 高脂血症等。此外, 对肾炎血尿, 颈淋巴结炎, 脑炎后遗症, 脑发育不全等, 也有一定疗效。

备考 1. 僵蚕系由白僵菌寄生于蚕之幼虫消化道, 致引起硬化病死后干燥品即为白僵蚕。目前市场的僵蚕时有伪品出现, 一般用未病之蚕, 以开水烫死后以石灰处理冒充, 亟宜注意鉴别。2. 市售之“僵蛹”为蚕蛹经白霉菌发酵的制成品, 功效与僵蚕大致相同。与蚕蛹(家蚕蛾的虫蛹)的功效不同。

### 86144 天蚕蛾科 Saturniidae

#### 8614401

*Antheraea pernyi* Geurin-Meneville

动物名 柞蚕《中国药用动物志》

药材名 柞蚕蛹《中国药用动物志》

文献名 茧蛹《中国药用动物志》, 蚕蛹《汇编》, 大蚕《常见药用动物》

地方名 山东: 山蚕; 湖北: 野蚕(神农架)。

功效 蛹: 生津止渴, 消食理气, 镇痉。用于消渴, 尿多膨胀, 淋疾, 癫痫。

#### 8614402

*Philosamia cynthia ricini* (Donovan)

动物名 蓖麻蚕《拉英汉昆虫名称》

药材名 蓖麻蚕茧(拟)

文献名 木薯蚕《中国药用动物志》

功效 幼虫、茧: 祛风湿, 止痹痛。用于风湿关节炎。

### 86145 粉蝶科 Pieridae

#### 8614501

*Pieris rapae* (L.)

动物名 小菜粉蝶《拉英汉昆虫名称》

药材名 蛱蝶《纲目》

文献名 莲蝶、蝴蝶《纲目》, 白蝴蝶、白粉蝶、粉蝶、

菜白蝶、菜青虫〔幼虫名〕、青菜虫〔中国药用动物志〕

功效 成虫全体：消肿止痛。用于跌打损伤。

备考 李时珍谓：“蛱蝶……其种甚繁，皆四翅，有粉，……《尔雅翼》谓菜虫化蝶”按此种当为《本草纲目》蛱蝶品种之一。

### 86146 凤蝶科 Papilionidae

8614601

*Papilio machaon* L.

动物名 黄凤蝶〔拉英汉昆虫名称〕

药材名 茴香虫〔本草衍义〕、〔汇编〕

文献名 凤蝶、后瞪蝶、美蝶〔常见药用动物〕，茴香凤蝶〔拉英汉昆虫名称〕，胡萝卜凤蝶〔中国药用动物志〕，芹菜金凤蝶〔汇编〕

地方名 山东：花蝴蝶；广西：金凤蝶，茴香虎，茴尺蠖。

功效 幼虫干燥体：理气，止痛，止呃。用于胃气痛，小肠疝气，噎膈。

8614602

*Papilio xuthus* (L.)

动物名 凤蝶〔中国药用动物志〕

药材名 橘狗〔中国药用动物志〕

文献名 柑橘凤蝶、燕尾蝶、凤子蝶〔中国药用动物志〕，花椒凤蝶〔拉英汉昆虫名称〕

功效 幼虫：理气，止痛。用于气滞脘腹作痛。

### 86147 弄蝶科 Hesperidae

8614701

*Erionota thrax* (L.)

动物名 香蕉弄蝶〔拉英汉昆虫名称〕

药材名 香蕉弄蝶〔成虫〕、蕉包虫〔幼虫〕〔中国药用动物志〕

文献名 芭蕉卷叶蛾〔中国药用动物志〕

功效 幼虫、成虫：清热解毒，消肿止痛。外用于化脓性中耳炎。

### 86148 蓑蛾科 Psychidae

8614801

*Canephora asiatica* Staudinger

动物名 桑杆蓑蛾〔拉英汉昆虫名称〕

药材名 蛴螬〔雷公炮炙论〕

文献名 蛴螬虫、木蠹、蛴螬、乳齐、蛴螬、鬼子、蓑蛾、结草虫、蓑衣虫、蓑虫蛾、避债虫〔中药名汇〕

功效 幼虫：用于恶血，血瘀，痹气破折，血在胁下坚满痛，吐血在胸腹不去，产后中寒，下乳汁。

备考 雷教云：“蛴螬须使桑树柏树中者妙”当指此而言。

8614802

*Clania preyeri* Leech.

动物名 蓖麻窠蓑蛾〔拉英汉昆虫名称〕

药材名 袋子虫〔幼虫〕〔中国药用动物志〕

文献名 大避债蛾、皮虫、大蓑蛾、昂吊虫、袋蛾、吊

袋蛾〔中国药用动物志〕

功效 幼虫体液：清热解毒，生肌敛疮，消肿止痛。用于化脓性感染。

### 86149 蝙蝠蛾科 Hepialidae

8614901

*Hepialus armoricanus* Oberthur

动物名 虫草蝙蝠蛾〔中国药用动物志〕

药材名 冬虫夏草〔本草从新〕、〔中国药用动物志〕

文献名 虫草蝙蝠蛾、冬虫夏草蛾、虫草、夏草冬虫、冬虫草〔中国药用动物志〕，蝙蝠蛾〔简明中医辞典〕

地方名 四川：报信草〔幼虫子座〕〔康定〕。

功效 带冬虫夏草菌子座的幼虫：滋补肺肾，止咳化痰，收敛止血，镇静。用于病后衰弱，虚劳咳血，阳痿遗精，神经衰弱，慢性哮喘。

### 86150 灯蛾科 Arctiidae

8615001

*Arctia caja* (L.)

动物名 豹灯蛾〔拉英汉昆虫名称〕

药材名 灯蛾〔纲目拾遗〕、〔中药大辞典〕

文献名 飞蛾、火花、慕光〔崔豹《古今注》〕，扑灯蛾〔祝穆试效方〕

功效 全虫：用于痔疮漏管。

### 86151 石蛾科 Phryganeidae

8615101

*Phryganea japonica* Ml.

动物名 石蛾〔中药大辞典〕

药材名 石蚕〔本经〕、〔中药大辞典〕

文献名 〔沙虱〕〔本经〕，沙蛙〔吴普本草〕，石蚕虫〔别录〕，石下新妇〔本草拾遗〕

功效 幼虫：主五癰，破石淋，堕胎；肉：解结气，利水道，除热。

### 86152 虻科 Tabanidae

8615201

*Atylotus bivittatus* Takahasi --- *Tabanus bivittatus* Matsumura

动物名 双斑黄虻〔拉英汉昆虫名称〕

药材名 虻虫〔本草经集注〕、〔汇编〕

文献名 蜚虻〔本经〕，牛虻〔本草崇原〕，牛蚊子〔形性鉴别〕，瞎蒙〔中药志〕，复带虻〔汇编〕

地方名 河北：瞎虻虫，瞎蚂蜂；内蒙古：“呼和浩特如”（蒙名），瞎虻；青海：绿头猛钻；山东：土虻虫；浙江：牛苍蝇；四川：牛魔蚊。

功效 雌虻成虫：有毒。破瘀散结，通经堕胎。用于血瘀经闭，跌打损伤。外用于肿毒。

8615202

*Atylotus miser* Szilady

动物名 骚状黄虻〔神农架药录〕

地方名 湖北：牛蚊子。

功 效 雌虻成虫:破血通经,消癥散结。

#### 8615203

*Tabanus buddha* Portchinsky --- *Tabanusbuddha auricauda* Philip

动物名 佛光虻《拉英汉昆虫名称》

药材名 虻虫《中国药用动物志》

文献名 金尾佛光虻《神农架药录》

地方名 湖北:麻牛蚊(神农架)。

功 效 雌虻成虫:破瘀散结,通经堕胎。用于血瘀经闭,跌打损伤。外用于肿毒。

#### 8615204

*Tabanus chrysurus* Loew

动物名 鹿虻《汇编》

药材名 虻虫《汇编》

功 效 雌虻成虫:有毒。破瘀散结,通经堕胎。用于血瘀经闭,跌打损伤。外用于肿毒。

#### 8615205

*Tabanus kiangsuensis* Kroker

动物名 江苏虻《中国药用动物志》

药材名 虻虫《中国药用动物志》

地方名 湖北:牛蚊(神农架)。

功 效 雌虻成虫:有毒。破瘀散结,通经堕胎。用于血瘀经闭,跌打损伤。外用于肿毒。

#### 8615206

*Tabanus mandarinus* Schiner

动物名 华虻《拉英汉昆虫名称》

药材名 虻虫《本草经集注》、《中国药用动物志》

文献名 白斑虻《东北动物药》,中华虻、灰虻《中国药用动物志》,牛虻、瞎蝶《简明中医辞典》

地方名 广西:牛苍蝇,牛蚊子,虻;其他:瞎虻虫,瞎眼蒙,牛瞎蒙虫,牛蝇子,牛忙虫,大虻虫,瞎蜉蜂,绿头猛钻,蜚虻,蜚虫。

功 效 雌虻成虫:有毒。逐瘀破积,通经。用于闭经,小腹硬痛,癥瘕积聚,跌扑疼痛。

#### 8615207

*Tabanus omeishanensis* Xu

动物名 峨嵋山虻《中国药用动物志》

药材名 虻虫《中国药用动物志》

功 效 雌虻成虫:破血通经,消癥软坚。用于月经困难,经闭,跌打损伤。外用于肿毒。

#### 8615208

*Tabanus pleskei* Kroker

动物名 雁虻《中国药用动物志》

药材名 虻虫《中国药用动物志》

功 效 雌虻成虫:有毒。破瘀散结,通经堕胎。用于血瘀经闭,跌打损伤。外用于肿毒。

#### 8615209

*Tabanus trigeminus* (Coquillett)

动物名 鸢虻《中国药用动物志》

药材名 虻虫《中国药用动物志》

地方名 贵州:牛虻,牛蚊子,牛蝇。

功 效 雌虻成虫:有毒。破血通经,消癥软坚。用

于月经困难,经闭,跌打损伤。外用于肿毒。

#### 8615210

*Tabanus trigonus* Coq.

动物名 三角牛虻《汇编》

药材名 虻虫(东北)。

功 效 雌虻成虫:有毒。破瘀散结,通经堕胎。

#### 8615211

*Tabanus yao* (Macquart)

动物名 姚虻《中国药用动物志》

药材名 虻虫《中国药用动物志》

功 效 雌虻成虫:破血通经,消癥软坚。用于月经困难,经闭,跌打损伤。外用于肿毒。

### 86153 蝇科 Muscidae

#### 8615301

*Musca domestica vicina* Macquart

动物名 舍蝇《拉英汉昆虫名称》

药材名 五谷虫〔幼虫〕《中药名汇》

文献名 家蝇、苍蝇、蛆、大蛆、粪蛆、屎虫、谷虫、粪虫、尿虫、水仙、水仙子、肉芽、肉蛆《中药名汇》

功 效 幼虫(蛆):清热,消滞。用于疳积腹胀,恶疮。

备 考 药用的五谷虫,用肉蛆比粪蛆好。

### 86154 狂蝇科 Oestridae

#### 8615401

*Eristalis tenax* L. --- *Tubifera tenax* (L.)

动物名 尾蛆蝇《拉英汉昆虫名称》

药材名 鼠尾蛆《中国药用动物志》

文献名 蜂蝇、拟蜂蝇、花虻、食蚜蝇、雄蜂蝇《中国药用动物志》

功 效 幼虫:消食积,健脾胃。用于消化不良,脘腹胀满,体倦无力。

### 86155 丽蝇科 Calliphoridae

#### 8615501

*Chrysomya megacephala* (Fabr.)

动物名 大头金蝇《拉英汉昆虫名称》

药材名 五谷虫《纲目》、《中药大辞典》

文献名 蛆《集韵》,谷虫《本草求真》

地方名 水仙子(广东、广西);广西:大头苍蝇,红头蝇,粪蛆,大蛆,屎虫;其他:大绿蝇。

功 效 干燥幼虫:清热解毒,消积滞。用于温热病,神昏谵语,小儿疳积。

#### 8615502

*Sarcophaga carnaria* L.

动物名 麻蝇《陕西中药名录》

药材名 五谷虫《陕西中药名录》

地方名 陕西:蛆。

功 效 幼虫:清热解毒,消积导滞。

**86156 步甲科 Carabidae****8615601***Pheropsophus jessoensis* (Moraw)

动物名 虎斑步甲《中国药用动物志》

药材名 行夜《别录》、《中药大辞典》

文献名 负盘《别录》, 屁盘、屁蟹虫、气盘虫《本草经集注》, 夜行《本草拾遗》, 气蟹《纲目》, 短鞘步甲、放屁虫《中国药用动物志》

功效 全虫: 活血化瘀, 消积止痛。用于血滞闭腹痛, 癥瘕, 跌打损伤作痛。

**86157 鼓甲科 Gyrinidae****8615701***Gyrinus curtus* Motsch.

动物名 鼓虫《中药大辞典》

药材名 鼓虫《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 鼓母虫《补缺肘后方》

功效 全虫: 有毒。蚀血肉, 敷恶疮。

**86158 萤科 Lampyridae****8615801***Luciola vitticollis* Kies.

动物名 萤火虫《中药大辞典》

药材名 萤火《本经》

文献名 宵行《诗经》, 磷《毛诗传》, 丹鸟、丹良《夏小正》, 夜光《本经》, 夜照、熠耀、[景天]、救火、据火、挟火《吴普本草》, 放光、即照《别录》, 耀夜、宵烛《崔豹古今注》, 磷然、照磷《品汇精要》

功效 全虫: 主明目, 小儿火疮伤热气。用于青盲。

**86159 粉蠹科 Lyctidae****8615901***Lyctus brunneus* Steph.

动物名 竹蠹虫《中药大辞典》

药材名 竹蠹虫《纲目》、《中药大辞典》

文献名 竹蛀屑《圣惠方》, 竹蠹虫蛀末《纲目》

功效 幼虫: 外用于小儿痢痢头疮; 蛀屑: 用于辟耳出脓水, 汤火伤。

**86160 隐翅虫科 Staphilinidae****8616001***Paederus densipennis* Bernh.

动物名 多毛隐翅虫《汇编》

药材名 花蚊虫《汇编》

地方名 贵州: 黄蚂蚁。

功效 全虫: 有毒。解毒, 杀虫, 止痒。外用于神经性皮炎, 癣疮。

**8616002***Paederus idea* Lew.

动物名 黄胸青腰《中国药用动物志》

药材名 青腰虫《本草拾遗》

文献名 多毛隐翅虫、蝼蛄、疯蚂蚁《中国药用动物志》

功效 全体: 解毒, 杀虫, 止痒。用于神经性皮炎, 疥癣, 疮癩等。

**86161 龙虱科 Dytiscidae****8616101***Cybister japonicus* Sharp

动物名 日本吸盘龙虱《拉英汉昆虫名称》

药材名 龙虱《中国药用动物志》

文献名 黄边大龙虱《中国药用动物志》, 日本龙虱《鉴别手册》

功效 干燥成虫: 滋补, 活血, 缩尿。用于小儿疳积, 老人夜溺频繁。

备考 过去有的地区用此动物混充土鳖虫入药, 应注意鉴别。

**8616102***Cybister tripunctatus orientalis* Gschwendtner

动物名 三星龙虱《中国药用动物志》

药材名 龙虱《中国药用动物志》

文献名 东方潜龙虱、水龟子、水老虎《中药志》, 东方龙虱《汇编》

地方名 江苏: 水鳖虫; 广西: 射尿龟、尿缸贼(陆川), 水鳖子; 湖北: 水斑鸠(神农架)。

功效 成虫: 滋补, 活血, 缩尿。用于小儿疳积, 老人夜溺频繁。

备考 江苏、湖南、广东等地过去将龙虱混充麝虫或土鳖虫入药, 应注意鉴别。

**86162 芫菁科 Meloidae****8616201***Epicauta apicipennis* Tan

动物名 长毛芫菁《中国药用动物志》

功效 成虫: 有毒。破瘀血, 消癥瘕, 去腐肌。用于癥瘕积聚, 肿毒瘰疬, 经闭腹痛, 疥癣。

**8616202***Epicauta aptera* (Kaszab)

动物名 豆小翅芫菁《中国药用动物志》

功效 成虫: 有毒。破瘀血, 消癥瘕, 去腐肌。

**8616203***Epicauta chinensis* Laporte

动物名 中华豆芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 豆芫菁《中国药用动物志》

文献名 中华芫菁《中国药用动物志》

功效 成虫: 有剧毒。祛瘀散结, 攻毒。用于癥瘕积聚。外用于疥癣, 恶疮, 淋巴结结核。

**8616204***Epicauta gorhami* (Marseul)

动物名 锯角豆芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 葛上亭长《别录》、《中药大辞典》

文献名 亭长《本草经集注》, 豆斑猫、甲翼虫、晏青、



赤头、龙蛇、蟹螯虫(新纲), 豆芫菁《中药大辞典》, 豆蚝《动物学大辞典》, 豆斑蝥《国药的药理学》, 白条黑芫菁、白条芫菁、豆白条芫菁《中国药用动物志》

地方名 鸡冠虫(四川、广西); 山东: 红头娘; 四川: 红娘; 广西: 芫菁。

功效 全虫: 有毒。破瘀血, 消癥瘕, 去腐肌。用于癥瘕积聚, 肿毒瘰疬, 经闭腹痛, 疥癣。

#### 8616205

*Epicauta hirticornis* Haag-Rutenberg

动物名 毛角豆芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 豆叶芫菁《中国药用动物志》

文献名 葛上亭长《汇编》

功效 全虫: 有毒。破瘀血, 消癥瘕, 去腐肌。用于癥瘕积聚, 肿毒瘰疬, 经闭腹痛, 疥癣。

#### 8616206

*Epicauta impressicornis* Pic.

动物名 沟角芫菁《中国药用动物志》

功效 全虫: 有毒。破瘀血, 消癥瘕, 去腐肌。用于癥瘕积聚, 肿毒瘰疬, 经闭腹痛, 疥癣。

#### 8616207

*Epicauta megaloccephala* Gebler

动物名 黑芫菁《中国药用动物志》

药材名 黑芫菁《中国药用动物志》

文献名 大头豆芫菁《拉英汉昆虫名称》, 大头豆黑芫菁《中国药用动物志》

功效 全虫: 有毒。破瘀血, 消癥瘕, 去腐肌。用于癥瘕积聚, 肿毒瘰疬, 经闭腹痛。

#### 8616208

*Epicauta ruficeps* Ill.

动物名 红头豆芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 葛上亭长《别录》

文献名 毛角芫菁《中国药用动物志》

功效 全虫: 有毒。破瘀血, 消癥瘕, 去腐肌。用于癥瘕积聚, 肿毒瘰疬, 经闭腹痛, 疥癣。

#### 8616209

*Epicauta taishuensis* Lewis --- *Epicauta taishuensis dubia* Fabr.

动物名 黑豆芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 黑豆芫菁《中国动物药》

功效 全体: 有剧毒。祛瘀, 散结, 攻毒。用于瘰疬, 狂犬咬伤。

#### 8616210

*Epicauta tentusi* (Kaszab)

动物名 陷胸芫菁《中国药用动物志》

功效 全虫: 破瘀血, 消癥瘕, 去腐肌。

#### 8616211

*Epicauta tibialis* Wat.

动物名 毛胫豆芫菁《拉英汉昆虫名称》

文献名 胫毛豆芫菁《中国药用动物志》

功效 全虫: 有毒。破瘀血, 消癥瘕, 去腐肌。用于癥瘕积聚, 肿毒瘰疬, 经闭腹痛, 疥癣。

#### 8616212

*Epicauta waterhousei* Haag-Rutenberg

动物名 花生豆芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 花生叶芫菁《中国药用动物志》

功效 全虫: 有毒。破瘀血, 消癥瘕, 去腐肌。用于癥瘕积聚, 肿毒瘰疬, 经闭腹痛, 疥癣。

#### 8616213

*Lytta caragane* Pallas

动物名 绿芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 芫菁《别录》、《中药大辞典》

文献名 芫菁《雷公炮炙论》, 青娘子《纲目》

地方名 江苏: 青娘虫, 相思虫; 贵州: 青虫。

功效 成虫: 剧毒。祛瘀, 散结, 攻毒。用于癥瘕积聚。外用于疥癣, 恶疮, 淋巴结核。

#### 8616214

*Lytta suturella* Motschulsky

动物名 纹缘绿芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 青娘子《中国药用动物志》

文献名 继纹绿芫菁《中国药用动物志》, 北芫菁《东北动物药》

功效 成虫: 剧毒。祛瘀散结, 攻毒。用于癥瘕积聚。外用于疥癣, 恶疮, 淋巴结核。

#### 8616215

*Meloe auriculatus* Mars.

动物名 耳节短翅芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 耳地胆《东北动物药》

文献名 地胆《东北动物药》

功效 成虫: 有剧毒。破血祛瘀, 引赤发泡。

#### 8616216

*Meloe coarctatus* Motschulsky

动物名 地胆《中国药用动物志》

药材名 地胆《本经》、《中药大辞典》

文献名 蛭青《本经》, 元青、杜龙、青虹《吴普本草》, 地腰、青蠹、青蟥《广雅》, 上斑蝥《中国药用动物志》

功效 全虫: 有毒。攻毒, 逐瘀。用于瘰疬。外用于恶疮, 鼻息肉。

#### 8616217

*Meloe corvinus* Marseul

动物名 圆颈短翅芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 圆胸地胆《东北动物药》

文献名 土斑猫《新纲》, 地胆《汇编》

功效 全虫尸体: 剧毒。破血祛瘀, 引赤发泡。用于癥瘕痞块。外用于疥癣, 恶疮, 牛皮癣, 神经性皮炎, 鼻息肉, 瘰疬。

#### 8616218

*Meloe violaceus* (L.)

动物名 长地胆《中国药用动物志》

药材名 地胆《中国药用动物志》

功效 全体: 破血逐瘀。用于癥瘕。外用于疥癣, 恶疮, 神经性皮炎。

#### 8616219

*Mylabris calida* Pallas

动物名 华斑芫菁《拉英汉昆虫名称》

药材名 斑蝥《中国药用动物志》

功效 干燥体;有大毒。破血消癥,攻毒蚀疮,发泡冷灸。用于癰疽癌肿,积年顽癣,瘰癧,赘疣,痈疽不溃,恶疮死肌。

#### 8616220

*Mylabris cichorii* L.

动物名 黄黑小斑蝥《药典》

药材名 斑蝥《本经》、《药典》

文献名 斑苗、龙尾《本经》,斑猫、斑蚝、龙蚝、斑菌、膳发、盘蛰、晏青《吴普本草》,蟹蝥虫《本草拾遗》,黄斑芫青、小斑蝥、花壳虫《中国药用动物志》,眼斑芫青《拉英汉昆虫名称》,中国黄斑蝥《虫类药的应用》

地方名 苦苣斑蝥(山东、四川);湖北:花姑娘(神农架);四川:斑毛;其他:斑尾,花斑蝥,正斑猫,王不留行虫,花螺龟,土龙青红,老虎斑蝥,小豆虫。

功效 干燥虫体;有大毒。破血消癥,攻毒蚀疮,发泡冷灸。用于癰疽癌肿,积年顽癣,瘰癧,赘疣,痈疽不溃,恶疮死肌。

#### 8616221

*Mylabris sidae* Fab. --- *Mylabris phalerata* Pall.

动物名 南方大斑蝥《药典》

药材名 斑蝥《本经》、《药典》

文献名 斑苗、龙尾《本经》,斑猫、斑蚝、龙蚝、斑菌、膳发、盘蛰、晏青《吴普本草》,蟹蝥虫《本草拾遗》,龙苗《药性论》,老虎斑毛、花斑毛、花壳虫、小豆虫、敢屁虫《中药志》,大斑芫青《拉英汉昆虫名称》,大斑蝥、中国斑蝥《虫类药的应用》

地方名 吉林:章瓦;内蒙古:“阿拉格-斑布”(蒙名);广东:花罗虫;广西:羊米虫。

功效 干燥体;有大毒。破血消癥,攻毒蚀疮,发泡冷灸。用于癰疽癌肿,积年顽癣,瘰癧,赘疣,痈疽不溃,恶疮死肌。

#### 8616222

*Mylabris speciosa* Pallas

动物名 丽斑芫青《中国药用动物志》

药材名 斑蝥《中国药用动物志》

文献名 红斑芫青《中国药用动物志》

功效 干燥体;有大毒。破血消癥,攻毒蚀疮,发泡冷灸。

### 86163 叩头虫科 Elateridae

#### 8616301

*Agriotes fuscicollis* Miwa

动物名 细胸叩头虫《拉英汉昆虫名称》

药材名 细胸叩头虫《常见药用动物》

功效 全体;补肝肾,坚筋骨,截疟,止痛。用于小儿发育迟缓,筋骨软弱,行走困难,疟疾。

#### 8616302

*Melanotus caudex* Lewis

动物名 褐纹梳爪叩头虫《拉英汉昆虫名称》

药材名 甘薯金针虫《拉英汉昆虫名称》

文献名 褐纹叩头虫《常见药用动物》

功效 全体;补肝肾,坚筋骨,截疟,止痛。

#### 8616303

*Pleonomus canaliculatus* Faldermann

动物名 沟叩头虫《拉英汉昆虫名称》

药材名 叩头虫《纲目》、《中药大辞典》

文献名 跳百丈《纲目拾遗》,跳搏虫、驱搏虫《中国医学大辞典》,跳米虫、蚪《动物学大辞典》,剥剥跳《系统动物学》,有沟叩头虫《中药大辞典》

地方名 湖北:打卦老、千条虫(神农架)。

功效 全虫;强身健筋骨,除疟。用于疟疾,筋骨酸痛,四肢痿痹。

### 86164 拟步甲科 Tenebrionidae

#### 8616401

*Martianus dermestoides* Chev.

动物名 洋虫《中国药用动物志》

药材名 洋虫《药性考》、《中药大辞典》

文献名 九龙虫《纲目拾遗》,米虫《常见药用动物》

功效 全虫;活血祛瘀,温中理气。用于劳伤咳嗽,吐血,中风瘫痪,跌打损伤,心胃气痛,噎膈反胃。

### 86165 天牛科 Cerambycidae

#### 8616501

*Apriona germari* (Hope) --- *Apriona rugicollis* Chevrolat ---

*Apriona germari japonica* Thomson

动物名 桑天牛《拉英汉昆虫名称》

药材名 桑蠹虫《别录》、《汇编》,天牛《本草拾遗》、《中国药用动物志》

文献名 蜡蛸《诗经》,蝎、桑蠹、蛭蚰、螟、啮桑《尔雅》,啮发《尔雅》郭璞注,桑蝎《千金方》,桑虫《图经》,天水牛《奇效良方》,蛀虫、八角儿《纲目》,桑蚕《景岳全书》,铁炮虫《动物学大辞典》,褐天牛、桑牛、哈牛《汇编》

地方名 湖北:水牛角虫、秋儿娘(神农架)。

功效 蛀孔内幼虫(桑蠹虫);强壮,活血去瘀,镇痉,镇痛。用于闭经,崩漏,赤白带下,乳汁不下,小儿痘疮不出,惊风抽搐,跌伤瘀血,腰背痛,心腹血气坚满疼痛;成虫(天牛);有小毒。熄风镇静,活血祛瘀。用于经闭,崩漏带下,乳汁不下,跌打瘀血,疗肿恶疮,小儿惊风。

#### 8616502

*Batocera horsfieldi* (Hope) --- *Batocera lineolata* Chev.

动物名 云斑天牛《拉英汉昆虫名称》

药材名 天牛《中国药用动物志》

文献名 白条天牛《中国药用动物志》

功效 成虫;熄风镇静,活血祛瘀。用于经闭,崩漏带下,乳汁不下,跌打瘀血,疗肿恶毒,小儿惊风,隐疹不发,痈疽不溃。

#### 8616503

*Nadezhdiella cantori* (Hope)

动物名 桔褐天牛《拉英汉昆虫名称》

药材名 蜡蛸《汇编》

文献名 牵牛虫、老木虫《中国药用动物志》  
地方名 四川:老母虫〔幼虫〕(南充)。  
功效 幼虫:强壮,活血祛瘀,镇痛;成虫:有小毒。熄风镇静,活血祛瘀。

**8616504**

*Thyestilla gebleri* Fald.

动物名 麻天牛〔拉英汉昆虫名称〕  
药材名 苍耳蠹虫《纲目》  
文献名 麻虫《纲目》,麻蠹《动物学大辞典》  
功效 全虫:用于疗肿恶疮。

**86166 沟胫天牛科 Lammiidae****8616601**

*Anoplophora chinensis* (Forster)

动物名 星天牛〔拉英汉昆虫名称〕  
药材名 桑蠹虫《别录》,天牛《本草拾遗》、《中药大辞典》  
文献名 蛴螬《诗经》,蛄、桑蠹、蛄蚰、蠹、啮桑《尔雅》,啮发《尔雅》郭璞注,桑蛄《千金方》,桑虫《图经》,天水牛《奇效良方》,蛀虫、八角儿《纲目》,桑蚕《景岳全书》,铁炮虫《动物学大辞典》,柑橘星天牛、铁牯牛、钻心虫、盘根虫、红兜虫、缘根虫、钻木虫、水牛郎、花生牯牛、锯木虫、脚虫《中国药用动物志》,蠹虫《常见药用动物》  
地方名 山东:老牛,蛤虫;四川:老母虫。  
功效 成虫:有小毒。熄风镇静,活血祛瘀。用于经闭,崩漏带下,乳汁不下,跌打瘀血,疗肿恶疮,小儿惊风等;幼虫:活血,祛瘀,通经。用于劳伤瘀血,血滞经闭,腰脊疼痛,崩漏,带下。

**86167 鳃角金龟科 Melolonthidae****8616701**

*Holotrichia castanea* Waterhouse

动物名 栗色鳃角金龟《东北动物药》  
地方名 蛴螬(东北)。  
功效 干燥幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,瘕瘕,哮喘。

**8616702**

*Holotrichia diomphalia* Bates

动物名 朝鲜黑金龟子《〔药典〕附录》  
药材名 蛴螬《本经》、《汇编》  
文献名 蛴《尔雅》,蛴螬《本经》,应条《吴普本草》,蜚齐、敦齐《别录》,地蚕《尔雅》郭璞注,乳齐《本草经集注》,核桃虫《药材学》,东北大黑鳃金龟《中国动物药》,大黑鳃金龟《东北动物药》,黑色金龟蝼、朝鲜金龟子、大黑金龟子《山东药用动物》,盖盖虫《常见药用动物》  
地方名 土蚕(安徽、广西),老母虫(四川、广西);内蒙古:“乌都格-好日亥”(蒙名);广西:臭屎虫,屎爬牛,蛴螬虫;其他:木螺,鬼子,蓑蛾、蓑衣虫,蓑虫蛾,结草虫,避债虫。

功效 幼虫:有毒。破瘀血,消肿止痛,明目。用

于丹毒,痈肿,痔漏,目翳。

**8616703**

*Holotrichia oblita* (Faldernmann)

动物名 华北大黑鳃金龟《中国药用动物志》  
药材名 蛴螬《本经》、《中国药用动物志》  
文献名 蛴螬《本经》,应条《吴普本草》,蜚齐、敦齐《别录》,白地蚕、白土蚕、大头虫《中国药用动物志》  
功效 幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,瘕瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

**8616704**

*Holotrichia parallela* Mouschulsky --- *Holotrichia morosa* Waterhouse

动物名 暗褐鳃角金龟〔拉英汉昆虫名称〕  
药材名 蛴螬《本经》、《中国药用动物志》  
文献名 蛴螬《本经》,应条《吴普本草》,蜚齐、敦齐《别录》,暗黑鳃金龟,黑金龟甲《中国药用动物志》  
功效 幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,瘕瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

**8616705**

*Holotrichia pilea* Waterhouse

动物名 小黑鳃角金龟《东北动物药》  
药材名 蛴螬(东北)  
功效 干燥幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,瘕瘕,哮喘。

**8616706**

*Holotrichia sauteri* (Moser.)

动物名 华南大黑鳃角金龟〔拉英汉昆虫名称〕  
药材名 蛴螬《中国药用动物志》  
文献名 华南大黑鳃金龟、棕色金龟子《中国药用动物志》  
功效 幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭腹痛,瘕瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

功效 幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭腹痛,瘕瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

**8616707**

*Holotrichia sinensis* Hope

动物名 华脊头鳃角金龟〔拉英汉昆虫名称〕  
药材名 蛴螬《本经》、《中国药用动物志》  
文献名 蛴螬《本经》,应条《吴普本草》,蜚齐、敦齐《别录》,中华褐鳃金龟子、褐鳃金龟子《中国药用动物志》,中华褐毛金龟子《中国药用动物名录》  
功效 幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭腹痛,瘕瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

功效 幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭腹痛,瘕瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

**8616708**

*Holotrichia titanis* Reitter

动物名 棕色鳃角金龟〔拉英汉昆虫名称〕  
药材名 蛴螬《中国药用动物志》  
文献名 棕黑鳃金龟、白地蚕、白土蚕、大头虫《中国药用动物志》  
功效 幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,瘕瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

功效 幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,瘕瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

**86168 金龟子科 Scarabaeidae****8616801***Alissonotum impressicollis* Arrow

动物名 突背蔗金龟《拉英汉昆虫名称》

药材名 蛴螬《中国药用动物志》

文献名 黑色金龟子、蔗龟《中国药用动物志》

功效 幼虫:活血破瘀,消肿止痛,平喘,去翳。用于经闭腹痛,癥瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔疮,目翳。

**8616802***Catharsius molossus* L.

动物名 蜣螂虫《中国药用动物志》

药材名 蜣螂《本经》、《中药大辞典》

文献名 蜣螂、蜣螂《本经》,螂、渠螂《说文》,天杜《广雅》,转丸、弄丸《崔豹古今注》,推丸《本草经集注》,黑甲虫《尔雅》郭璞注,蜣螂《玉篇》,胡蜣螂《蜀本草》,推车客《本事方》,推屎虫《孙天仁集效方》,大乌壳硬虫《普济方》,黑牛儿、铁甲将军、夜游将军《纲目》,屎蜣螂《本草原始》,车屎客、滚屎虫《医林纂要》,屎格螂,粪球虫《中药志》,推车虫《药材资料汇编》,屎壳螂《简明中医辞典》,屎蛴螂《汉拉英动物药名称》

地方名 屎蛴螂(东北、华北),大将军(黑龙江、吉林、辽宁、河北),独角牛(河北、贵州);山西:铁角牛;内蒙古:“巴嘎森·斑布”(蒙名),粪爬牛,屎克螂;江苏:牛屎虫(苏州);湖北:推屎爬(神农架);贵州:推粪虫;其他:矢甲,羌螂,羌虫,侠客螂,偷粪虫,净差郎虫,官官郎,官儿老爷,官儿娘子。

功效 干燥成虫:镇惊,破瘀,止痛,攻毒,通便。用于惊痫癫狂,小儿惊风,二便不通,痢疾等。外用于痔疮,疔疮肿毒。

**8616803***Dicranobia potanini* (Kr.)

动物名 小青花潜《中国动物药》

文献名 川东灵脂米《中草药》

地方名 四川:土灵脂。

备考 幼虫粪便:四川部份地区误作五灵脂入药。

**8616804***Scarabaeus sacer* L.

动物名 神圣金龟《拉英汉昆虫名称》

药材名 蜣螂《中国药用动物志》

文献名 大蜣螂《中国药用动物志》

功效 成虫:安神镇静,破瘀通经,攻毒通便,解毒疗疮。用于惊痫癫狂,小儿惊风,大便秘结,痢疾。外用于痔疮,疔疮肿毒。

**86169 粪金龟科 Geotrupidae****8616901***Geotrupes auratus* (Mots.)

动物名 东北紫蜣螂(拟)

药材名 蜣螂《中国药用动物志》

文献名 紫蜣螂《中国药用动物志》

功效 成虫:镇惊,破瘀,止痛,攻毒,通便。用于惊痫癫狂,小儿惊风,大便秘结,痢疾。外用于痔疮,疔疮肿毒。

**8616902***Geotrupes laevistriatus* Motschulsky

动物名 紫蜣螂《中国药用动物志》

药材名 蜣螂《中国药用动物志》

文献名 粪金龟、大将军《中国动物药》

地方名 湖北:屎壳螂(神农架)。

功效 成虫:镇惊,破瘀,止痛,攻毒,通便。用于惊痫癫狂,小儿惊风,二便不通,痢疾。外用于痔疮,疔疮肿毒。

**86170 丽金龟科 Rutelidae****8617001***Anomala corpulenta* Motschulsky

动物名 铜绿丽金龟《拉英汉昆虫名称》

药材名 蛴螬《本经》、《中国药用动物志》

文献名 铜绿金龟甲、蛴螬虫、地蚕、土蚕《中药志》,青金龟子、白地蚕、白土蚕、大头虫《中国药用动物志》

功效 幼虫:破瘀,止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,癥瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔疮,目翳。

**8617002***Anomala cupripes* Hope -- *Euchlora cupripes* Hope

动物名 红脚绿丽金龟《拉英汉昆虫名称》

药材名 蛴螬《中国药用动物志》

文献名 红脚绿金龟《中国药用动物志》

功效 幼虫:破瘀,止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,癥瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔疮,目翳。

**8617003***Anomala exoleta* Faldermann

动物名 黄褐丽金龟《拉英汉昆虫名称》

药材名 蛴螬《中国药用动物志》

文献名 黄褐金龟子、白地蚕、白土蚕、大头虫《中国药用动物志》

功效 幼虫:破瘀,止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,癥瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔疮,目翳。

**8617004***Anomala rufocuprea* Mots.

动物名 红铜丽金龟《拉英汉昆虫名称》

药材名 蛴螬(东北)

文献名 桃丽金龟《东北动物药》

功效 幼虫:破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,症瘕,哮喘。

**8617005***Mimela costata* Hope --- *Anomala costata* Hope

动物名 柳杉迷丽蜣《拉英汉昆虫名称》

药材名 蛴螬《中国药用动物志》

文献名 大条丽金龟、柳杉金龟子《中国药用动物志》

功效 幼虫:有毒。破瘀,止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,癥瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔疮。

目翳。

#### 8617006

*Mimela luciduia* Hope

动物名 金龟蝼《中国动物药》

药材名 蛴螬《东北动物药》

文献名 金龟甲《动物学杂志》

功效 幼虫;破瘀止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,癥瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

### 86171 犀金龟科 Dynastidae

#### 8617101

*Allomyrina dichotoma* L.

动物名 双叉犀金龟《拉英汉昆虫名称》

药材名 独角蛴螬虫《中国药用动物志》

文献名 独角仙、[蛴螬]《中国药用动物志》、双叉独角仙《中国药用动物志》、紫蛴螬《拉英汉昆虫名称》

地方名 湖北:铁夹子虫(神农架);贵州:独角仙。

功效 全体;定惊,破瘀,通便,攻毒。用于惊风癫狂,小儿惊风,二便不通。外用于痔疮,疔疮肿毒。

#### 8617102

*Pentodon patruelis* Frivaldsky

动物名 阔胸犀金龟《中国药用动物志》

药材名 蛴螬《中国药用动物志》

功效 幼虫;破瘀,止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,癥瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

### 86172 花金龟科 Cetoniidae

#### 8617201

*Liocola brevitarsis* Lewis

动物名 白星花金龟《中国药用动物志》

药材名 蛴螬《中国药用动物志》

文献名 白星花潜《山东药用动物》,蛭虫、鸡粪虫《中国药用动物志》

功效 幼虫;破瘀,止痛,散风平喘,明目去翳。用于经闭,癥瘕,哮喘。外用于丹毒,恶疮,痔瘕,目翳。

#### 8617202

*Oxycetonia jucunda* Fald

动物名 小青花金龟《拉英汉昆虫名称》

文献名 小青花潜《山东药用动物》

功效 干燥幼虫;有毒。解毒,消肿,通便,破血,散结,通乳。用于疮疡肿毒,痔漏,便秘,喉痹,目翳,丹毒,经闭等。

### 86173 象甲科 Curculionidae

#### 8617301

*Cyrtotrachelus longimanus* (Fabr.)

动物名 长足弯颈象《拉英汉昆虫名称》

药材名 竹象鼻虫《中国药用动物志》

文献名 竹象、竹象蝼、笋蠹、笋蛆《中国药用动物志》

功效 成虫;祛风湿,止痹痛。用于风寒腰腿疼痛。

#### 8617302

*Gymnetron miyoshii* Miyoshi

动物名 仙桃草直喙象《药典》

药材名 具瘰仙桃草(拟)

文献名 仙桃草《药典》

功效 带虫瘰的干燥全草;活血消肿,止血,止痛。用于吐血,咯血,衄血,便血,跌扑损伤。

### 86174 吉丁虫科 Buprestidae

#### 8617401

*Chalcophora japonica* Gory

动物名 日本吉丁《拉英汉昆虫名称》

药材名 吉丁虫《本草拾遗》

文献名 日本吉丁虫《中国药用动物志》,日本大吉丁虫《中国药用动物名录》

功效 全体;祛风,杀虫,止痒。用于疥癣,皮肤搔痒,风疹斑块。

### 86175 螺羸蜂科 Eumenidae

#### 8617501

*Eumenes petiolata* (Fabr.)

动物名 螺羸《诗经》、《中国药用动物志》

药材名 螺羸《本经》、《中药大辞典》

文献名 细腰蜂《庄子》,蒲卢《毛诗传》,螺羸《说文》,土蜂《别录》,螭螭《本草经集注》,缸瓦蜂《本草求原》

地方名 湖北:土蜂子、壁蜂子(神农架)。

功效 成虫;有毒。降逆止呕,清肺止咳。用于咳嗽,呕逆,痢肿,蜂螫。

备考 《中药大辞典》螺羸学名为 *Eumenes pomiformis* Fabr.

### 86176 蜜蜂科 Apidae

#### 8617601

*Apis cerana* Fabr. --- *Apis sinensis* Smith

动物名 中华蜜蜂《药典》

药材名 蜂蜜《本经》、《药典》,蜂蜡《药典》,蜂毒《吉林中草药》,蜂王浆《广西药用动物》,蜂胶、蜜蜂房《中国药用动物志》

文献名 蜂子、石蜜、石饴、蜜蜡《本经》,范《礼记》,黄蜡、蜜《金匱要略》,黄占《种福堂公选良方》,白蜡《别录》,蜡《肘后方》,食蜜《伤寒论》,蜜腊、蜜蜂子《本草经集注》,白蜜《药性论》,白沙蜜《本草衍义》,蜜糖《本草蒙笙》,沙蜜、蜂糖、蜡蜂《纲目》,蜜蜂毒素《药材学》,白占《简明中医辞典》,蜂乳、王浆《中药大辞典》,王乳、蜂皇浆、皇浆、蜜蜂巢、蜜脾《中国药用动物志》,蜂房《药典》

地方名 内蒙古:“巴勒图·朱给”(蒙名),蜜蜂;陕西:黄蜜蜡,百花精;广西:中蜂,家蜂;其他:乳浆。

功效 蜂蜜:补中,润燥,止痛,解毒。用于脱腹虚痛,肺燥干咳,肠燥便秘。外用于疮疡不敛,水火烫伤;蜂蜡:收涩,敛疮,生肌,止痛。外用于溃疡不敛,臁疮

糜烂, 创伤, 烧烫伤; 蜂毒(蜂螫刺腺体中的毒液): 强壮, 镇痛, 平喘, 祛风除湿。用于风湿病, 风湿性关节炎; 蜂王浆(工蜂咽腺分泌物): 强壮营养药; 蜜蜂房: 清热解暑, 祛风消肿。用于痈疮肿毒破溃, 疔肿, 刀伤, 烫火伤; 蜜蜂幼虫: 滋补强壮, 下乳, 通经。用于体虚面黄, 腹痛, 带下, 小儿疳积; 蜂胶: 外用于鸡眼, 胼胝, 蹠疣, 寻常疣, 足癣, 甲癣, 黄癣, 痒疹, 疖肿, 化脓性创伤, 烧伤, 乳腺炎。

#### 8617602

*Apis mellifera* L.

动物名 意大利蜜蜂(拉英汉昆虫名称)

药材名 蜂蜡、蜂蜜(药典), 蜂毒(吉林中草药), 蜂王浆、蜂胶、蜜蜂房(中国药用动物志)

文献名 蜜蜂、蜂糖、卉酿、食蜜、百花蕊、百花糖、众口芝、灵雀蜜、桧花蜜、利花蜜、黄连蜜、众口华之、百卉花醴、何首乌蜜、山蜜、石蜜、岩蜜、倒蜜、家蜜(新纲), 意蜂(拉英汉昆虫名称), 王浆、蜜蜂幼虫(中国药用动物志), 蜂乳、蜜蜂子(中国动物药), 意大利蜂(中国药用动物名录), 蜂巢、巢脾(中草药通讯), 采蜜蜂(辞海), 蜡蜂、蜜、白蜜、黄蜜、熟蜜、石怡(中药名汇)

功效 蜂蜜: 补中, 润燥, 止痛, 解毒。用于脘腹虚痛, 肺燥干咳, 肠燥便秘。外用于疮疡不敛, 水火烫伤; 蜂蜡: 收湿, 敛疮, 生肌, 止痛。外用于溃疡不敛, 腿疮糜烂, 创伤, 烧烫伤; 蜂毒(蜂螫刺腺体中的毒液): 强壮, 镇痛, 平喘, 祛风除湿。用于风湿病, 风湿性关节炎; 蜂王浆(工蜂咽腺分泌物): 强壮营养药; 蜜蜂房: 清热解暑, 祛风消肿; 蜜蜂幼虫: 滋补强壮, 下乳, 通经; 蜂胶: 外用于鸡眼, 胼胝, 蹠疣, 寻常疣, 足癣, 甲癣, 黄癣, 痒疹, 疖肿, 化脓性创伤, 烧伤, 乳腺炎。

#### 8617603

*Xylocopa appendiculata* Smith

动物名 黄胸木蜂(中国药用动物志)

功效 全体: 解毒, 消肿, 止痛。外用于疮疖红肿作痛。

#### 8617604

*Xylocopa dissimilis* (Lepel.)

动物名 竹蜂(中国药用动物志)

药材名 竹蜂(本草拾遗)、(汇编)

文献名 笛师(《方言》郭璞解), 留师、留师蜜(本草拾遗), 竹蜜蜂(白孔六帖)

地方名 湖北: 木蜂子(神农架); 广西: 竹筒蜂(陆川), 乌蜂, 熊蜂, 象蜂。

功效 干燥全体: 清热泻火, 祛风。用于齿龋, 口疮, 咽痛, 小儿惊风; 蜜: 用于牙齿龋痛, 口中疮。

#### 8617605

*Xylocopa phalothorax* (Lepel.)

动物名 灰胸木蜂(中国药用动物志)

药材名 小竹筒蜂(汇编)

功效 全体: 清热泻火, 祛风。

#### 8617606

*Xylocopa sinensis* Smith

动物名 中华木蜂(中国药用动物志)

功效 全体: 解毒, 消肿, 止痛。外用于疮疖红肿作痛。

### 86177 胡蜂科 Vespidae

#### 8617701

*Parapolybia varia* Fabr.

动物名 异腹胡蜂(药典)

药材名 蜂房(药典)

功效 巢: 祛风, 攻毒, 杀虫, 止痛。用于龋齿牙痛, 疮疡肿毒, 乳痈, 瘰癧, 皮肤顽癣, 鹅掌风。

#### 8617702

*Polistes shach* Fabr.

动物名 黄蜂(东北动物药)

药材名 蜂房(东北)

功效 干燥蜂巢: 祛风, 杀虫, 解毒。用于小儿惊风抽搐, 关节疼痛, 乳房胀痛, 扁桃体炎。外用于痈疮肿毒, 淋巴结核, 疥癣, 湿疹, 龋齿痛。

#### 8617703

*Polistes chinensis* (Fabr.)

动物名 华马蜂(拉英汉昆虫名称)

药材名 蜂房(中国药用动物志)

文献名 华黄蜂(东北动物药)

地方名 河北: 长脚胡蜂; 内蒙古: “毛仁-朱给”(蒙名), 胡蜂, 大黄蜂。

功效 蜂巢: 祛风, 杀虫, 解毒。用于小儿惊风抽搐, 关节疼痛, 乳房胀痛, 扁桃体炎。外用于痈疮肿毒, 淋巴结核, 疥癣, 湿疹, 龋齿痛, 蛇虫咬伤。

#### 8617704

*Polistes confusa* (Smith)

动物名 褐胡蜂(中国药用动物志)

药材名 露蜂房(中国药用动物志)

功效 蜂巢: 祛风, 杀虫, 解毒。用于小儿惊风抽搐, 关节疼痛, 乳房胀痛, 扁桃体炎。外用于痈疮肿毒, 淋巴结核, 疥癣, 湿疹, 龋齿痛, 蛇虫咬伤。

#### 8617705

*Polistes fadwigae* Dalla Tor.

动物名 胡蜂(广雅)、(广西药用动物)

药材名 露蜂房(广西药用动物)

文献名 壶蜂(方言), 瓢瓢蜂、玄瓢蜂(纲目)

地方名 广西: 黄蜂, 野蜂, 米蜂, 天鲁蜂, 蜂房, 蜂窝, 野蜂窝, 百穿之巢, 黄蜂窝。

功效 蜂巢: 祛风, 消肿, 解毒, 杀虫。用于小儿惊风, 风虫牙痛, 风湿痛。外用于痈疽恶疮, 溃后不敛, 皮肤疥癣, 牙痛。

#### 8617706

*Polistes formosana* Sonan

动物名 台湾黄蜂(中国药用动物志)

药材名 露蜂房(中国药用动物志)

功效 蜂房: 有小毒。祛风, 杀虫, 解毒。用于痛症, 牙痛, 鼻炎, 风湿关节痛, 疮疖, 乳痈, 瘰癧, 瘾疹痒疹, 疥癣。

#### 8617707

*Polistes hebraeus* Fabr.

动物名 亚非马蜂《拉英汉昆虫名称》

药材名 露蜂房《中国药用动物志》

文献名 梨长足黄蜂《中国药用动物志》，长足蜂《南充中草药》

功效 蜂巢：祛风，杀虫，解毒。用于小儿惊痫抽搐，关节疼痛，乳房胀痛，扁桃体炎。外用于痈疮肿毒，淋巴结核，疥癣，湿疹，龋齿痛，蛇虫咬伤。

8617708

*Polistes japonicus* Sauss.

动物名 日本长脚胡蜂《药典》

药材名 蜂房《药典》

文献名 日本黄蜂《东北动物药》

功效 巢：祛风，攻毒，杀虫，止痛。用于龋齿牙痛，疮疡肿毒，乳痈瘰癧，皮肤顽癣，鹅掌风。

8617709

*Polistes mandarinus* Sauss.

动物名 黄星长脚黄蜂《中国药用动物志》

药材名 露蜂房《本经》、《汇编》

文献名 蜂肠、大黄蜂子《本经》，百穿、蜂勑《别录》，革蜂窠《雷公炮炙论》，露蜂房子《备急方》，大黄蜂窠《蜀本草》，紫金沙《圣济总录》，虎头蜂、蜂家、蜜蜂房、草蜂窠、牛蜂家、独蜂窠、石蜂窠、金房、一寸楼台、黄蛰蜂窠《新纲》，虎头蜂房、野蜂房《民药汇编》，蜂巢、野蜂窝、黄蜂窠、百穿之巢《汇编》，马蜂、胡蜂《常见药用动物》

地方名 河北：纸蜂房；山东：长脚蜂，长脚蜂窝，草蜂子，草蜂子窝；河南：马蜂窝；贵州：马蜂包。

功效 巢：有毒。祛风，杀虫，解毒。用于皮肤顽癣，疮疡肿毒，急性乳腺炎，淋巴结核，牙痛，头风痛，百日咳，蜂螫肿痛；幼虫：有小毒。用于胸腹胀痛，干呕。

8617710

*Polistes olivaceus* (Deg.)

动物名 果马蜂《药典》

药材名 蜂房《药典》

文献名 普通长脚胡蜂《药典》

功效 巢：有小毒。祛风，攻毒，杀虫，止痛。用于龋齿牙痛，疮疡肿毒，乳痈，瘰癧，皮肤顽癣，鹅掌风。

8617711

*Polistes yokohamae* Rad.

动物名 长脚黄蜂《中国药用动物志》

药材名 蜂房《中国药用动物志》

文献名 横滨黄蜂《东北动物药》，马蜂、胡蜂、黄蜂《中国药用动物志》

功效 蜂巢：祛风，杀虫，解毒。用于小儿惊痫抽搐，关节疼痛，乳房胀痛，扁桃体炎。外用于痈疮肿毒，淋巴结核，疥癣，湿疹，龋齿痛，蛇虫咬伤。

8617712

*Vespa ducalis* Sm.

动物名 黑尾胡蜂《中国药用动物志》

药材名 蜂房《中国药用动物志》

文献名 热带胡蜂《中国药用动物志》

功效 蜂巢：祛风，杀虫，解毒。用于小儿惊痫抽搐，关节疼痛，乳房胀痛，扁桃体炎。外用于痈疮肿毒，淋巴结核，疥癣，湿疹，龋齿痛，蛇虫咬伤。

8617713

*Vespa magnifica* Sonan

动物名 大胡蜂《中国药用动物志》

药材名 胡蜂酒《药典》

文献名 胡蜂《药典》

功效 虫体酒浸液：祛风除湿。用于急性风湿病，风湿性关节炎；成虫：消肿解毒。用于痈疮肿毒，蜘蛛和蜈蚣咬伤等。

8617714

*Vespa mandarina* Sm.

动物名 金环胡蜂《拉英汉昆虫名称》

药材名 斑胡蜂房《中国药用动物志》

文献名 胡蜂《东北动物药》，斑胡蜂《中国药用动物志》，大胡蜂《中药名汇》

地方名 湖北：七牛牛（神农架）；四川：牛角蜂（南充）；贵州：露蜂房。

功效 蜂巢：祛风，杀虫，解毒。用于小儿惊痫抽搐，关节疼痛，乳房胀痛，扁桃体炎。外用于痈疮肿毒，淋巴结核，疥癣，湿疹，龋齿痛，蛇虫咬伤。

8617715

*Vespa simillima* Smith

动物名 赤翅蜂《中药大辞典》

药材名 赤翅蜂《本草拾遗》、《中药大辞典》

功效 全虫：有小毒。用于蜘蛛咬，疗肿，疽疮。

## 86178 没食子蜂科 Cynipidae

8617801

*Cynips gallae-tinctoriae* Harfig

动物名 没食子蜂《中药大辞典》

药材名 没食子《海药本草》、《中药大辞典》

文献名 墨石子《雷公炮炙论》，无食子《药性论》，没石子《子母秘录》，无石子《酉阳杂俎》，麻蕤泽《方輿志》

功效 虫瘿：固气，涩精，敛肺，止血。用于大肠虚滑，泻痢不止，便血，遗精，阴汗，咳嗽，咯血，齿痛，创伤出血，疮疡久不收口。

备考 本品为没食子蜂寄生于壳斗科没食子树 *Quercus infectoria* Oliv. 上所产生的虫瘿

## 86179 土蜂科 Scoliidae

8617901

*Discolia vittifrons* Sch.

动物名 土蜂《中药大辞典》

药材名 土蜂子《本经》、《中药大辞典》

文献名 蜂子、蜚零《本经》，马蜂、螳《尔雅》郭璞注，螳蜂《图经》，地蜂《常见药用动物》

功效 全虫（烧灰存性）：外用于敷蜘蛛咬伤；幼虫（土蜂子）：有毒。用于痈肿，丹毒，风疹。

备考 苏颂《图经》云：郭璞注尔雅云，今江东呼大

蜂在地中作房者,为土蜂,即马蜂也。荆巴间呼为螽蜂。

## 86180 蚁科 Formicidae

### 8618001

*Formica fusca* L.

动物名 丝光褐林蚁《拉英汉昆虫名称》  
药材名 黑蚂蚁《中药大辞典》  
文献名 黑蚁《五行记》,褐蚁《拉英汉昆虫名称》  
地方名 湖北:蚂蚁、太黑蚂蚁(神农架)。  
功效 全虫:有毒。用于疗毒肿痛,蛇咬伤;卵:补益强壮,催乳。

### 8618002

*Formica sanguinea* Latr. --- *Formica sanguinea rubicunda* Emery

动物名 血蚁《中国动物药》  
药材名 血蚁《中国动物药》  
文献名 血红蚁、血红牧蚁《拉英汉昆虫名称》  
功效 干燥全体:清热解毒。用于疗毒肿痛,蛇咬伤。

### 8618003

*Polyrhachis vicina* Roger

动物名 拟黑多刺蚁《广西药用动物》  
地方名 广西:黑蚂蚁、蚂蚁、被胎蚁、玄驹。  
功效 全体(蚂蚁):消肿解毒。用于蛇咬伤,疗毒肿毒;蚁卵:益气力,催乳汁。用于病后气力不足,产后缺乳。

## (七) 苔藓动物门 Bryozoa

### 87181 胞孔苔虫科 Celleporidae

#### 8718101

*Costazia aculeata* Canu et Bassler

动物名 脊突苔虫《药典》  
药材名 浮海石《汇编》  
文献名 石花《鉴别手册》,浮石、浮水石、海浮石《中药名汇》  
功效 骨骼:清肺化痰,软坚散结。用于肺热咳嗽痰稠,淋巴结核,癭瘤,疮肿目翳。

#### 8718102

*Costazia costazii* Audouin

动物名 瘤苔虫《拉汉无脊椎动物名称》  
药材名 浮海石《汇编》  
文献名 石花《鉴别手册》,浮石、浮水石《中药名汇》  
功效 骨骼:清肺化痰,软坚散结。用于肺热咳嗽,痰稠色黄,咯血,支气管炎,淋巴结核。

## (八) 棘皮动物门 Echinodermata

### 88182 海参科 Holothuriidae

#### 8818201

*Actinopyga echinites* (Jaeger)

动物名 棘辐肛参《动物图谱·棘皮》  
药材名 红鞋参《汇编》  
文献名 红参《汇编》  
功效 内脏(研末):生肌止血。外用于疮疖。  
备考 海参中所含粗海参毒素(holothurin),对小鼠肉瘤180有抑制作用。

#### 8818202

*Actinopyga lacanora* (Jaeger)

动物名 辐肛参《动物图谱·棘皮》  
药材名 石参《汇编》  
文献名 黄瓜参《汇编》  
功效 内脏(研末):生肌止血。外用于疮疖。

#### 8818203

*Actinopyga mauritiana* (Quoy et Gaimard)

动物名 白底辐肛参《动物图谱·棘皮》  
药材名 白底鞋参《汇编》  
文献名 靴海参、红鱼《汇编》,白底靴参、赤瓜参《海洋药物》  
功效 内脏(研末):生肌止血。外用于疮疖。

#### 8818204

*Halodeirna atra* (Jaeger)

动物名 黑怪参《拉汉无脊椎动物名称》  
药材名 黑怪参《广西药用动物》  
文献名 黑狗参、黑参《动物图谱》  
功效 干燥全体:补肾,补血,通肠润燥。用于小便多,痰多,神经衰弱,溃疡。

#### 8818205

*Holothuria atra* Jaeger

动物名 黑海参《拉汉海洋生物名称》  
药材名 黑海参《中国动物药》  
功效 活体和内脏的干制品:止血,止痛,补益。用于外伤出血,妇女产后乳汁不足。

#### 8818206

*Holothuria fuscocinerea* Jaeger

动物名 棕环海参《动物图谱·棘皮》  
药材名 棕环参《汇编》  
功效 内脏:止血,止痛,补益。

#### 8818207

*Holothuria hilla* Lesson --- *Holothuria monacaria* Lesson

动物名 黄疣海参《拉汉海洋生物名称》  
文献名 黄海参《海洋药物》  
备考 本品含海参毒素。

#### 8818208

*Holothuria nobilis* (Selenka) --- *Microthele nobilis* (Selenka)

动物名 黑乳海参《拉汉海洋生物名称》  
药材名 黑乳海参《中国药用动物名录》  
文献名 黑乳参、乳房鱼《海洋药物》,乌圆参、开乌参、乌尼、大乌参《动物图谱》  
地方名 海南:乌尼参。  
功效 全体:补肾壮阳,通乳滋阴。用于通经,产后乳汁不足。



**8818209***Holothuria scabra* Jaeger

动物名 糙海参《动物图谱·棘皮》

药材名 白参《海洋药物》

文献名 糙参《汇编》

地方名 广西:明玉参。

功效 内脏:止血,止痛,补益。

**8818210***Holothuria vagabunda* Selenka

动物名 荡皮海参《动物图谱·棘皮》

药材名 荡皮参《广西药用动物》

文献名 红参《广西药用动物》

功效 全体:补肾,补血,通肠润燥。用于小便多,痰多,神经衰弱,溃疡。

**88183 刺参科 Stichopodidae****8818301***Bohadschia argus* Jaeger

动物名 蛇目布氏参《动物图谱·棘皮》

药材名 蛇目参《海洋药物》

文献名 蛇目白尼参《中国药用海洋生物》,海参《中国动物药》

功效 全参:可作海参入药。补肾益精,壮阳。

**8818302***Bohadschia bivittata* (Mitsukuri)

动物名 二斑布氏参《动物图谱·棘皮》

药材名 二斑白尼参《中国动物药》

文献名 海参《中国动物药》

功效 去内脏全体:补肾益精,壮阳。

**8818303***Bohadschia marmorata* Jaeger

动物名 图纹白尼参《拉汉海洋生物名称》

药材名 图纹白尼参《海洋药物》

文献名 海参《中国动物药》

功效 全参:补肾,益精,壮阳。

**8818304***Stichopus chloronotus* Brandt

动物名 绿刺参《动物图谱·棘皮》

药材名 绿刺参《汇编》

文献名 方柱参《汇编》,方刺参、方参《中国药用动物志》

功效 内脏:生肌止血。外用于疮疖,外伤出血;去内脏的全体:滋补强壮,补肾壮阳。用于肺结核,神经衰弱,阳痿,水肿。

**8818305***Stichopus japonicus* Selenka

动物名 刺参《动物图谱·棘皮》

药材名 海参《本草从新》、《汇编》

文献名 海鼠、海参肠《中药大辞典》,刺海参《山东药用动物》

地方名 山东:沙嘴,海瓜皮。

功效 内脏:生肌止血。外用于疮疖,外伤出血;

去内脏的全体:滋补强壮,补肾壮阳。用于肺结核,神经衰弱,阳痿,水肿。

**8818306***Stichopus variegatus* Semper

动物名 花刺参《动物图谱·棘皮》

药材名 海参《广西药用动物》

文献名 方参、黄肉、白刺参《汇编》

地方名 广西:沙嘴,海鼠。

功效 内脏:生肌止血。外用于疮疖,外伤出血;去内脏的全体:滋补强壮,补肾壮阳。用于肺结核,神经衰弱,阳痿,水肿。

**8818307***Thelenota ananas* (Jaeger)

动物名 梅花参《动物图谱·棘皮》

药材名 梅花参《汇编》

文献名 凤梨参《中国药用动物志》

功效 内脏:生肌止血。外用于疮疖,外伤出血;去内脏的全体:滋补强壮,补肾壮阳。用于肺结核,神经衰弱,阳痿,水肿。

**88184 芋海参科 Molpadiidae****8818401***Acaudina molapadioides* (Semper)

动物名 海地瓜《拉汉海洋生物名称》

药材名 海地瓜《中国海洋药物》

地方名 浙江:海茄子。

功效 全体:滋补强壮,抗衰老等。民间代海参食用。

**88185 槭海星科 Astropectinidae****8818501***Craspidaster hesperus* (Muller et Troschel)

动物名 镶边海星《动物图谱·棘皮》

药材名 镶边海星《中国药用海洋生物》

地方名 浙江:海星,饭瓜花,五角星。

功效 全体:平肝和胃,制酸止痛,清热解毒,镇惊。用于甲状腺肿大。

**88186 砂海星科 Luidiidae****8818601***Luidia quinaria* von Martens

动物名 砂海星《拉汉海洋生物名称》

药材名 砂海星《中国海洋药物》

地方名 浙江:海星。

功效 全体:软坚散结,清热解毒,制酸止痛。用于甲状腺肿大,胃酸过多,胃痛。

**88187 角海星科 Goniasteridae****8818701***Anthenea pentagonula* (Lamarck)

动物名 真五角海星《动物图谱·棘皮》

药材名 真五角海星《中国药用海洋生物》

文献名 五角星、海盘车、海星《海洋药物民间应用》  
 地方名 江西:[海燕]。  
 功效 全体:和胃止痛,制酸,止泻,镇静。用于胃酸过多,胃溃疡,腹泻,癫痫。  
 备考 江西发现以本品伪充海燕入药。

## 8818702

*Rosaster symbolicus* Sladen

动物名 蔷薇海星《动物图谱·棘皮》  
 药材名 蔷薇海星《中国药用海洋生物》  
 功效 全体:和胃止痛,制酸,止泻,镇静。用于胃酸过多,胃溃疡,腹泻,癫痫。

## 8818703

*Stellaster equestris* (Retzius)

动物名 骑士章海星《动物图谱》  
 药材名 五角星《中国药用动物志》  
 功效 全体:和胃止痛,制酸,止泻,镇静,软坚。用于胃酸过多,胃溃疡,腹泻,癫痫,甲状腺肿大。

88188 太阳海星科 *Solasteridae*

## 8818801

*Solaster dawsoni* Verrill

动物名 陶氏太阳海星《动物图谱·棘皮》  
 文献名 太阳鱼《动物图谱·棘皮》  
 功效 全体:平肝,和胃,镇惊,消炎;体壁:提取明胶,可制成代血浆。

备考 在开展海星胶代血浆的研究过程中,发现有显著的降低血清总胆固醇作用,又有缓和的抗凝活性,提示可能有对抗血液红细胞的凝聚,血栓的形成及改变微血管的循环流态等作用。

88189 棘海星科 *Echinasteridae*

## 8818901

*Henricia leviuscula* (Stimpson)

动物名 鸡爪海星《动物图谱·棘皮》  
 药材名 海星《东北动物药》  
 功效 全体:平肝和胃,镇惊消炎。

88190 海燕科 *Asterinidae*

## 8819001

*Asterina limboonkengi* G. A. Smith

动物名 林氏海燕《动物图谱·棘皮》  
 药材名 海燕《中国药用动物志》  
 文献名 闽粤海燕《中国药用海洋生物》  
 功效 全体:补肾壮阳,祛风湿,止痛。用于阳痿,腰腿疼,胃痛。

## 8819002

*Asterina pectinifera* (Muller et Troschel)

动物名 海燕《动物图谱·棘皮》  
 药材名 海燕《纲目》、《汇编》  
 功效 去内脏全体:滋阴,祛风湿。用于腰腿疼痛,阳痿。

88191 海盘车科 *Asteriidae*

## 8819101

*Asterias amurensis* Lutken

动物名 多棘海盘车《动物图谱·棘皮》  
 药材名 海星《中国药用动物志》  
 文献名 海盘车、五角星《中国药用动物志》  
 地方名 江西:[海燕]。  
 功效 全体:和胃止痛,制酸,止泻,镇静,软坚。用于胃酸过多,胃溃疡,腹泻,癫痫,甲状腺肿大。  
 备考 江西发现以本品伪充海燕入药。

## 8819102

*Asterias rollestoni* Bell

动物名 罗氏海盘车《动物图谱·棘皮》  
 药材名 中国海星《海洋药物》  
 文献名 海盘车《汇编》,海星、星鱼《山东药用动物》  
 功效 全体:平肝,和胃,消炎,可提胶。用于胃酸过多,胃溃疡,腹泻,癫痫。外用于中耳炎。

## 8819103

*Asterias versicolor* Sladen

动物名 异色海盘车《拉汉海洋生物名称》  
 药材名 海星《中国海洋药物》  
 地方名 浙江:海盘车,五角星,星鱼。  
 功效 全体:平肝和胃,制酸止痛,清热解毒,镇惊。用于胃及十二指肠溃疡,胃寒作痛,腹泻,甲状腺肿大,中耳炎,癫痫等。

## 8819104

*Asterias vulgaris*

动物名 海星《海洋药物》  
 药材名 海星《海洋药物》  
 功效 海星皂甙:有细胞毒、溶血、抗病毒、抗霉菌及抗肿瘤作用。

## 8819105

*Coscinasterias acutispina* (Stimpson)

动物名 尖棘筛海盘车《拉汉无脊椎动物名称》  
 药材名 尖棘筛海盘车《中国药用动物名录》  
 功效 全体:平肝,和胃,消炎,可提胶。

88192 阳遂足科 *Amphiuridae*

## 8819201

*Amphiura vadicola* Matsumoto

动物名 滩栖阳遂足《拉汉海洋生物名称》  
 文献名 蛇尾《中国海洋药物》  
 功效 全体:用于顽癣。曾试作抗癌药。

88193 刻肋海胆科 *Temnopleuridae*

## 8819301

*Salmacis bicolor rarispina* A. Agassiz

动物名 疏棘角孔海胆《动物图谱·棘皮》  
 药材名 海胆(广东、海南)  
 文献名 疏刺角孔海胆《中国药用动物名录》  
 功效 骨壳:软坚散结,化痰消肿。用于淋巴结结

核, 积痰不化, 胸胁胀满。

#### 8819302

*Temnopleurus hardwickii* (Gray)

动物名 哈氏刻肋海胆《中药志》

药材名 海胆《汇编》

文献名 刻肋海胆《汇编》, 海氏刻肋海胆《中国药用动物志》, 哈氏刻肋海胆《东北动物药》, 北方刻肋海胆《中药材科技》

地方名 浙江: 刺海螺。

功效 石灰质骨壳; 软坚散结, 化痰消肿。用于淋巴结结核, 积痰不化, 哮喘, 胸胁胀痛。

#### 8819303

*Temnopleurus reevesii* (Gray)

动物名 芮氏刻肋海胆《拉汉无脊椎动物名称》

药材名 海胆《中国海洋药物》

文献名 芮氏海胆《浙江中医学院学报》

地方名 浙江: 刺海螺。

功效 石灰质骨壳; 软坚散结, 化痰消肿。用于淋巴结结核, 积痰不化, 哮喘, 胸胁胀痛。

#### 8819304

*Temnopleurus toreumaticus* (Leske)

动物名 细雕刻肋海胆《动物图谱·棘皮》

药材名 海胆《汇编》

地方名 浙江: 刺海螺, 刺锅子。

功效 石灰质骨壳; 软坚散结, 化痰消肿。用于淋巴结结核, 积痰不化, 哮喘, 胸胁胀痛。

#### 8819305

*Temnotrema sculptum* (A. Agassiz)

动物名 刻孔海胆《动物图谱·棘皮》

药材名 海胆(山东)

功效 全体: 软坚散结, 化痰, 消肿, 抗癌。

### 88194 毒棘海胆科 Toxopneustidae

#### 8819401

*Tripneustes gratilla* (L.)

动物名 白棘三列海胆《动物图谱·棘皮》

文献名 海胆虎《动物图谱·棘皮》

功效 石灰质骨壳; 消炎。用于甲沟炎, 胃炎。

### 88195 球海胆科 Strongylocentrotidae

#### 8819501

*Hemicentrotus pulcherrimus* (A. Agassiz)

动物名 马粪海胆《动物图谱·棘皮》

药材名 海胆《汇编》

地方名 海锅、海肚脐(山东、浙江); 山东: 刺海螺, 刺锅子; 浙江: 海底空。

功效 石灰质骨壳; 软坚散结, 化痰消肿。用于淋巴结结核, 痰积不化, 胸胁胀痛。

#### 8819502

*Strongylocentrotus nudus* (A. Agassiz)

动物名 大连紫海胆《动物图谱·棘皮》

药材名 海胆《汇编》

文献名 光棘球海胆《拉汉无脊椎动物名称》, 大连紫胆《常见药用动物》, 黑刺锅子《中药志》

功效 石灰质骨壳; 软坚散结, 化痰。用于淋巴结结核, 痰积不化, 胸胁胀痛。

### 88196 长海胆科 Echinometridae

#### 8819601

*Anthocidaris crassispina* (A. Agassiz)

动物名 紫海胆《动物图谱·棘皮》

药材名 海胆《中药志》

地方名 浙江: 海浆公, 海借公, 海栗, 海底空; 其他: 老虎外肾。

功效 全壳: 软坚散结, 消肿, 化痰, 制酸止痛。用于胃及十二指肠溃疡, 甲沟炎, 瘰癧, 积痰不化, 胸胁胀痛。

#### 8819602

*Heterocentrotus mamillatus* (L.)

动物名 石笔海胆《动物图谱·棘皮》

药材名 石笔海胆《中国药用海洋生物》

文献名 粗棒海胆《中国药用动物志》, 烟嘴海胆、海胆《中国药用海洋生物》

功效 粗大的棘刺: 清热消炎。外用于中耳炎。

### 88197 蛛网海胆科 Arachnoididae

#### 8819701

*Arachnoides placenta* (L.)

动物名 扁平蛛网海胆《动物图谱·棘皮》

功效 石灰质骨壳; 软坚散结, 化痰消肿。用于淋巴结结核, 积痰不化, 哮喘, 胸胁胀痛。

## (九) 脊索动物门 Chordata

### 89198 七鳃鳗科 Petromyzonidae

#### 8919801

*Lampetra japonica* (Martens)

动物名 日本七鳃鳗《动物图谱·鱼》

药材名 七鳃鳗《中国药用动物志》

文献名 七星鳗、七星子肉《中国药用动物志》, 七星鱼《汇编》

地方名 吉林: 七星子鱼, 八目鳗。

功效 全鱼: 滋补强壮。用于口眼歪斜, 夜盲症, 角膜干燥。

#### 8919802

*Lampetra mori* Berg

动物名 东北七鳃鳗《拉汉脊椎动物名称》

药材名 七星子鱼《汇编》

文献名 七星鱼《中国药用动物志》, 森氏七鳃鳗《东北动物药》, 森氏八目鳗《辽宁动物志》, 八目鳗、七鳃鳗《汇编》

地方名 辽宁: 七星子, 七星鳅, 沙鳗[幼鱼]。

功效 全鱼: 滋补强壮。用于口眼歪斜, 夜盲症, 角膜干燥。

## 8919803

*Lampetra reissneri* (Dybowski) --- *Petromyzon reissneri* Dybowski

动物名 赖氏七鳃鳗《拉汉脊椎动物名称》

药材名 七星子鱼《中国药用动物志》

文献名 黑龙江七鳃鳗《中国药用动物志》，雷氏七鳃鳗《东北动物药》，瑞氏八目鳗、溪八目鳗《辽宁动物志》

地方名 辽宁：七星子，七星鳞。

功效 全鱼：滋补强壮。用于口眼歪斜，夜盲症，角膜干燥。

89199 虎鲨科 *Heterodontidae*

## 8919901

*Heterodontus japonicus* (Duneri)

动物名 宽纹虎鲨《拉汉脊椎动物名称》

文献名 老虎鲨《动物图谱·鱼》

地方名 浙江：大猫鲨。

功效 肉、肝：补五脏，消肿去瘀；肝：用于制取鱼肝油。

## 8919902

*Heterodontus zebra* (Gray)

动物名 狭纹虎鲨《动物图谱·鱼》

药材名 狭纹虎鲨《海洋药物》

地方名 浙江：虎鲨，虎皮鲨，虎头鲨。

功效 鱼肝：滋补强壮，明目，壮骨；胆：用于喉闭；鱼鳍（鲛鱼翅）：补肺气，托疮毒，消痰健胃；鰾（鱼白）：益肺，补心，消痰，逐水下行，养精固气，澄清肾水，滋阴补阳；鱼皮：解诸鱼毒，杀虫。用于虚劳。

89200 六鳃鲨科 *Hexanchidae*

## 8920001

*Notorhynchus platycephalus* (Tenore) --- *Squalus platycephalus* Tenore

动物名 扁头哈那鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肝油、鲨鱼肉、鲨鱼翅《中国药用动物志》

文献名 七鳃鳗《中药材科技》

地方名 辽宁：哈那鲨（旅顺）；山东：花七鳃鲨；浙江：花鲨。

功效 脂肪油（鱼肝油）：滋补强壮，明目，壮骨。用于夜盲症，干燥性眼炎，佝偻病，软骨症，营养不良，结核病，病后恢复期，幼儿及产妇的滋养剂；肌肉：健脾利水；鳍（鲨鱼翅）：补肺气，托疮毒，消痰，健胃。用于肺气虚弱，疮毒；鰾（鱼白）：益肺，补心，消痰，逐水下行，养精固气，澄清肾水，滋阴补阳；皮：用于解诸鱼毒，杀虫，愈虚劳。

备考 据报道：美国生物学家对鲨鱼进行了几十年的调查研究后，发现鲨鱼很少得癌症，似乎对癌有天然的免疫力。1978年日本从深海鲨鱼的肝脏中，得到了可用于治疗心脏病、肿瘤和高血压等的活性物质。

89201 须鲨科 *Orectolobidae*

## 8920101

*Chiloscyllium plagiosum* (Bennett)

动物名 条纹斑竹鲨《动物图谱·鱼》

药材名 犬鲨《中国药用动物志》

地方名 广西：狗鲨。

功效 鲜肉：健脾补气。用于虚劳乏力，痔疮；肝：明目。用于夜盲症；脂肪油：清热解毒，消炎止痛。外用于水火烫伤。

89202 鲸鲨科 *Rhincodontidae*

## 8920201

*Rhincodon typus* Smith

动物名 鲸鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肝油《中国动物药》

地方名 浙江：大鲨鱼（洞头、瑞安）。

功效 肝：用于制取鱼肝油；翅：补血，补气，补肾，补肺。用于各种慢性虚劳病症；脊椎骨：祛风湿，止痛。用于风湿性关节炎，头痛；胆汁：清热解毒。外用于疮痍。

89203 锥齿鲨科 *Carchariidae*

## 8920301

*Carcharias owstoni* Garman

动物名 欧氏锥齿鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肝油、鱼翅《海洋药物》

文献名 沙鲛《动物图谱·鱼》，欧氏锯齿鲨《中国药用动物名录》

地方名 浙江：白蒲鲨，白生，锥齿鲨。

功效 鱼翅：滋补强壮；肝、鱼肝油：用于夜盲症，软骨病；肝：制取鱼肝油。

89204 姥鲨科 *Cetorhinidae*

## 8920401

*Cetorhinus maximus* (Gunner)

动物名 姥鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肝油、鲨鱼肉、鲨鱼翅《中国药用动物志》

文献名 姥鲨《动物图谱·鱼》

地方名 浙江：大鲨鱼，猪嘴鲨，老鼠鲨，蒙鲨，昂鲨。

功效 脂肪油（鱼肝油）：滋补强壮，明目，壮骨。用于夜盲症，软骨症，营养不良；肌肉（鲨鱼肉）：健脾利水；鳍（鲨鱼翅）：补肺气，托疮毒，消痰，健胃。用于肺气虚弱，疮毒等。

89205 猫鲨科 *Scyliorhinidae*

## 8920501

*Halaelurus burgeri* (Müller et Henle)

动物名 梅花鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鲨鱼皮《海洋药物》

文献名 梅花鲨鱼《中国药用动物志》

功效 皮：滋补。用于胃病，肺病。

**89206 真鲨科 Carcharhinidae****8920601***Carcharhinus latistomus* Fang et Wang

动物名 阔口真鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肝油、鲨鱼肉、鲨鱼翅《中国药用动物志》

文献名 青鲨《中国药用海洋生物》

地方名 浙江：鲨鱼、真鲨（嵊山、石塘）。

功效 脂肪油（鱼肝油）：滋补强壮，明目，壮骨。用于夜盲症，干燥性眼炎，佝偻病，软骨症，营养不良，结核病；肌肉：健脾利水；鳍（鲨鱼翅）：补肺气，托疮毒，消炎，健胃。用于肺气虚弱，疮毒。

**8920602***Carcharhinus melanopterus* (Quoy et Gaimard)

动物名 乌翅真鲨《拉汉脊椎动物名称》

药材名 乌翅真鲨《中国药用动物志》

功效 骨：止泻。用于腹泻；肉：补益。用于虚损；皮：消食积。用于食鱼成积不消，食鱼中毒；翅、心：健脾胃。用于胃病。

**8920603***Carcharhinus menisorrhoea* (Muller et Henle)

动物名 黑印真鲨《动物图谱·鱼》

药材名 黑印真鲨《中国药用动物志》

地方名 浙江：鲨鱼、真鲨。

功效 骨：止泻。用于腹泻；肉：补益。用于虚损；皮：消食积。用于食鱼成积不消，食鱼中毒；翅、心脏：健脾胃。用于胃病。

**8920604***Carcharhinus pleurotaenia* (Bleeker)

动物名 侧条真鲨《拉汉脊椎动物名称》

药材名 鱼肝油、鲨鱼肉、鲨鱼翅《中国药用动物名录》

地方名 浙江：鲨鱼、青鲨（乐清）。

功效 脂肪油（鱼肝油）：滋补强壮，明目，壮骨。用于夜盲症，干燥性眼炎，佝偻病，软骨症，营养不良，结核病；肌肉：健脾利水；鳍（鲨鱼翅）：补肺气，托疮毒，消炎，健胃。用于肺气虚弱，疮毒。

**8920605***Carcharhinus sorrah* (Muller et Henle)

动物名 沙拉真鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肝油、鲨鱼肉、鲨鱼翅《中国药用动物名录》

地方名 浙江：鲨鱼（嵊泗）。

功效 脂肪油（鱼肝油）：滋补强壮，明目，壮骨。用于夜盲症，干燥性眼炎，佝偻病，软骨症，营养不良，结核病；肌肉：健脾利水；鳍（鲨鱼翅）：补肺气，托疮毒，消炎，健胃。用于肺气虚弱，疮毒。

**8920606***Hypoprion atripinnis* Chu

动物名 黑鳍基齿鲨《拉汉脊椎动物名称》

文献名 明鲨《中国药用动物志》

功效 鱼胎：滋补强壮。用于咳嗽，久病体虚。

**8920607***Scoriodon sorrahkawah* (Cuvier)

动物名 尖头斜齿鲨《中国海洋药物》

地方名 浙江：斜齿鲨，尖头鲨，尖头曲齿鲨。

功效 肉、鳍、皮、骨：益气，健脾。用于病体虚弱。

**89207 皱唇鲨科 Triakidae****8920701***Mustelus griseus* (Peterschmann)

动物名 灰星鲨《动物图谱·鱼》

药材名 灰星鲨《中国药用动物志》

文献名 鲨鱼《中国药用动物志》

地方名 浙江：灰鲨，灰皮鲨，鲛鱼，白布鲨。

功效 肉：滋补强壮。用于促进伤口愈合；胎：滋补。止泻，止痛。用于小儿腹泻，痛经；皮：解诸鱼毒。用于食鱼中毒，食鱼成积不消；翅：益气，开胃，消炎，补虚。用于气虚，血虚，胃虚，肺虚；肝：滋补，明目。用于夜盲，软骨，肺结核；胆：清热解毒。用于喉闭。

**8920702***Mustelus manazo* Bleeker

动物名 白斑星鲨《动物图谱》

药材名 鱼肝油、鲨鱼肉、鲨鱼翅《中国药用动物志》

文献名 鲛鱼、鲛鱼皮、鲛鱼皮《别录》，鲛鱼胆《食疗本草》，鲛鱼、瑰雷鱼《南越志》，沙鱼、鰻鱼《本草拾遗》，溜鱼《纲目》，鲛鲨、鲛鲨翅、鲛鲨白《医林纂要》，沙鱼翅《纲目拾遗》，金丝菜《本草求真》

地方名 白点鲨（辽宁、浙江）；辽宁：星鲨；浙江：鲛鱼肝，鲛鱼胎，鲛鱼油（脂肪油），鲛皮。

功效 脂肪油（鱼肝油）：滋补强壮，明目，壮骨。用于夜盲症，干燥性眼炎，佝偻病，软骨症，营养不良，结核病，病后恢复期，幼儿及产妇的滋养剂；肌肉：健脾利水；鳍（鲨鱼翅）：补肺气，托疮毒，消炎，健胃。用于肺气虚弱，疮毒；鱼白（鰾）：益肺，补心，消炎，逐水下行，养精固气，澄清肾水，滋阴补阳；皮：解诸鱼毒，杀虫，愈虚劳。

**8920703***Triakis scyllum* Muller et Henle

动物名 皱唇鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肝油、鲨鱼肉、鲨鱼翅《中国药用动物志》

地方名 辽宁：九道鞭；浙江：猫头鲨。

功效 脂肪油（鱼肝油）：滋补强壮，明目，壮骨。用于夜盲症，干燥性眼炎，佝偻病，软骨症，营养不良，结核病，病后恢复期，幼儿及产妇的滋养剂；肌肉：健脾利水；鳍（鲨鱼翅）：补肺气，托疮毒，消炎健胃。用于肺气虚弱，疮毒。

**89208 双髻鲨科 Sphyrnidae****8920801***Sphyrna lewini* (Griffith)

动物名 路氏双髻鲨《中国海洋药物》

药材名 鱼肝油、鱼翅《海洋药物》

地方名 浙江：相公鲨（岱山）。

功 效 鱼肝油;滋补强壮,明目,壮骨;鳔、肝;补五脏,壮体力,益气开膈,清痰健胃。

#### 8920802

*Sphyrna zygaena* (L.)

动物名 锤头双髻鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肝油、鲨鱼肉、鲨鱼翅《中国药用动物志》

文献名 双髻鲨《中国药用动物志》

地方名 官鲨、相公帽(辽宁、浙江);浙江:小生鲨,公子鲨,丁字鲨,锤头鲨。

功 效 脂肪油(鱼肝油);滋补强壮,明目,壮骨。用于夜盲症,干燥性眼炎,佝偻病,软骨症,营养不良,结核病,病后恢复期,幼儿及产妇的滋养剂;肌肉:健脾利水;鳔(鲨鱼翅):补肺气,托疮毒,消痰,健胃。用于肺气虚弱,疮毒。

### 89209 角鲨科 Squalidae

#### 8920901

*Squalus acanthias* L. --- *Squalus suckeyi* (Girard)

动物名 白斑角鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肝油、鲨鱼肉、鲨鱼翅《中国药用动物志》

文献名 萨氏角鲨(辽宁动物志),角鲛《中药材科技》

地方名 浙江:鲛鱼,刺鲨,角鲨。

功 效 鱼肝油(肝脏制品);用于夜盲症,角膜炎,软骨症,维生素 A、D 缺乏症,营养不良,疾病恢复期;肌肉:补脾利水;鳔(鲨鱼翅):补肺气,托疮毒,消痰,健胃。用于肺气虚弱,疮毒。

#### 8920902

*Squalus brevirostris* Tanaka --- *Squalus fernandinus* Molina

动物名 短吻角鲨《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肝油、鲨鱼翅《东北动物药》

文献名 法氏角鲨《东北动物药》

地方名 浙江:角鲨。

功 效 鱼肝油;用于夜盲症,角膜炎,软骨症;鳔(鲨鱼翅):消痰,补肺气,健胃。用于肺气虚弱,疮毒。

#### 8920903

*Squalus mitsukurii* Jordan et Fowler

动物名 长吻角鲨《中国海洋药物》

药材名 鱼肝油《海洋药物》

地方名 浙江:角鲨。

功 效 肉、肝、油:滋补强壮,延年益寿。

### 89210 锯鲨科 Pristiophoridae

#### 8921001

*Pristiophorus japonicus* Guenther

动物名 日本锯鲨《中国海洋药物》

药材名 鱼肝油《海洋药物》

地方名 浙江:锯鲨。

功 效 肉、肝:滋补强壮。

### 89211 扁鲨科 Squatinidae

#### 8921101

*Squatina japonica* Bleeker

动物名 日本扁鲨《拉汉海洋生物名称》

药材名 鱼肝油、鲨鱼肉、鲨鱼翅《中国药用动物志》

文献名 扁鲨《东北动物药》,琵琶鱼《中药材科技》

功 效 鱼肝油(肝脏制品):用于夜盲症,角膜炎,软骨症,维生素 A、D 缺乏症,营养不良,疾病恢复期;肌肉:补脾利水;鳔:补肺气,托疮毒,消痰,健胃。用于肺气虚弱,疮毒。

### 89212 锯鳐科 Pristidae

#### 8921201

*Pristis cuspidatus* Latham

动物名 尖齿锯鳐《动物图谱·鱼》

药材名 鱼翅《汇编》,鱼肝油《中国药用动物志》

地方名 浙江:锯鲨,锯齿,锯鱼,齿鳐。

功 效 胆:祛瘀,消炎。用于跌打损伤,风湿性关节炎,胆囊炎。外用于疮疖,皮肤溃疡;卵:止痢。用于痢疾;鱼肝油:补益。用于肺病,胃病;背鳍、胸鳍(鱼翅):补五脏,长腰力,益气开膈,清痰健胃。

### 89213 犁头鳐科 Rhinobatidae

#### 8921301

*Rhinobatos schlegelii* Muller et Henle

动物名 许氏犁头鳐《动物图谱·鱼》

药材名 鱼翅《汇编》

文献名 犁头鳐《辽宁动物志》

地方名 辽宁:老板鱼,犁头;浙江:犁头鲨。

功 效 背鳍、胸鳍:补五脏长腰力,益气开膈,清痰健胃。

#### 8921302

*Scobatus granulatus* (Cuvier)

动物名 颗粒犁头鳐《中国海洋药物》

药材名 鱼翅《海洋药物》

地方名 浙江:犁头鲨。

功 效 鳔:益气,健胃。

### 89214 鳐科 Rajidae

#### 8921401

*Raja hollandi* Jordan et Richardson

动物名 何氏鳐《中国海洋药物》

地方名 浙江:犁头鲨。

功 效 胆:用于风湿性关节炎,跌打肿痛。外用于疮疖溃疡;肝:提制鱼肝油及其制剂。

#### 8921402

*Raja kenoi* Muller et Henle

动物名 斑鳐《拉汉脊椎动物名称》

药材名 鳐鱼《汇编》

地方名 浙江:鳐鱼。

功 效 肝:制鱼肝油。用于慢性病辅助治疗;胆

汁:用于风湿关节痛,跌打肿痛。外用于疮疖溃疡。

#### 8921403

*Raja porosa* Guenther

动物名 孔鲀《动物图谱·鱼》

药材名 鲀鱼《汇编》

文献名 孔鲀《汇编》

地方名 辽宁:老板,劳子;其他:老板甫鱼。

功效 肝:制鱼肝油。用于慢性病辅助治疗;胆汁:用于风湿关节痛,跌打肿痛。外用于疮疖溃疡。

### 89215 鲳科 Daysatidae

#### 8921501

*Actoplatea zonura* Bleeker

动物名 鳐鲳《汇编》

药材名 鲳鱼《汇编》

功效 胆汁:用于风湿性关节炎,跌打肿痛,跌打昏迷。外用于疮疖溃疡。

#### 8921502

*Dasyatis akajei* (Muller et Henle)

动物名 赤鲳《动物图谱·鱼》

药材名 鲳鱼《汇编》

文献名 蕃蹄鱼《魏武食制》,邵阳鱼、石鲈、海鰵鱼、海鰵鱼肉《本草拾遗》,少阳鱼(宁原《食鉴本草》),荷包、鲳鱼、鲳鲃鱼《纲目》,蒲鱼《本草求真》,锅盖鱼《随息居饮食谱》,土鱼、黄鲳《中国有毒和药用鱼类》,铺鱼、龙州红鱼、草帽鱼、盘鱼《常见药用动物》,赤鲳刺《中国药用动物志》,鲳鱼、黄鲳、虎鱼《海洋药物民间应用》

地方名 洋鱼(辽宁、山东、浙江);山东:箭洋鱼;浙江:风鱼,老虎鱼,滑子鱼。

功效 肉:补气,滋阴;尾刺:清热消炎,化结除癥,止痛。用于咽喉炎,乳腺炎,恶疮,无名肿毒,疟疾,并试治肺癌,胃癌,食道癌;肝:用于夜盲症;鱼油:用于小儿疳积。

#### 8921503

*Dasyatis bennetti* (Muller et Henle)

动物名 黄鲳《拉汉脊椎动物名称》

药材名 黄鲳《中国海洋药物》

地方名 浙江:滑子鱼。

功效 肉、胆、尾刺:补气,滋阴,散瘀健胃,清热消炎,止痛。用于胃病,咽喉炎,乳腺炎,小儿疳积,无名肿毒,跌打伤痛,尾刺刺伤剧痛。

#### 8921504

*Dasyatis gerrardi* (Gray)

动物名 齐氏鲳《拉汉脊椎动物名称》

药材名 锦鲳鱼《中国有毒和药用鱼类》

地方名 浙江:黄点鲳。

功效 白皮:滋补强壮;尾刺:有小毒。去热消炎,化结除癥。用于妇女白带病。

#### 8921505

*Dasyatis kuhlii* (Muller et Henle)

动物名 钝吻鲳《拉汉脊椎动物名称》

药材名 钝吻鲳《中国有毒和药用鱼类》

文献名 古氏鲳《拉汉海洋生物名称》

功效 尾刺:有小毒。清热消炎,化结,除癥

#### 8921506

*Dasyatis laevis* Chu

动物名 光鲳《拉汉脊椎动物名称》

药材名 刺鱼《中国海洋药物》

地方名 辽宁:洋鱼;浙江:老虎鱼。

功效 尾刺:清热消炎,化结除癥;肉:滋阴补肾;肝:制鱼肝油。

#### 8921507

*Dasyatis microphthalmus* Chen

动物名 小眼鲳《拉汉脊椎动物名称》

药材名 小眼鲳《中国有毒和药用鱼类》

地方名 浙江:滑鱼。

功效 尾刺:有小毒。清热消炎,化结除癥。

#### 8921508

*Dasyatis navarrae* (Steindachner)

动物名 奈氏鲳《动物图谱·鱼》

药材名 奈氏鲳《中药材科技》

地方名 辽宁:洋鱼;浙江:鲳鱼。

功效 尾刺:清热消炎,化结除癥;肉:滋阴补肾;肝:制鱼肝油。

#### 8921509

*Dasyatis sinensis* (Steindachner)

动物名 中国鲳《拉汉脊椎动物名称》

药材名 中国鲳《中药材科技》

地方名 浙江:老虎鱼,滑子鱼。

功效 尾刺:清热消炎,化结除癥;肉:滋阴补肾;肝:制鱼肝油。

#### 8921510

*Dasyatis uarnak* (Forsk.)

动物名 花点鲳《拉汉脊椎动物名称》

文献名 鲳鱼《中国药用动物志》

地方名 浙江:花鲳,花甫。

功效 胆:散瘀,健胃。用于胃病,跌打损伤,湿热黄疸;尾刺:清热消炎。用于牙痛。

#### 8921511

*Dasyatis zugei* (Muller et Henle)

动物名 尖嘴鲳《动物图谱·鱼》

药材名 尖嘴鲳《中国有毒和药用鱼类》

地方名 浙江:鲳鱼。

功效 尾刺:清热消炎,化结除癥;肉:滋阴补肾;肝:制鱼肝油。

### 89216 燕鲳科 Gymnuridae

#### 8921601

*Gymnura bimaculata* (Normann) --- *Pteroplatea bimaculata* Norman

动物名 双斑燕鲳《中国海洋药物》

药材名 鲳鱼《汇编》

文献名 燕鲳鱼《中国海洋药物》

功 效 肉、肝、胆：用于风湿性关节炎，跌打肿痛，疮疖溃瘍。

#### 8921602

*Gymnura japonica* (Temminck et Schlegel) --- *Pteroplatea japonica* Temminck et Schlegel

动物名 日本燕魮《动物图谱·鱼》

药材名 魮鱼《汇编》

文献名 蝴蝶鱼《中药材科技》，燕魮、燕儿魮《中国海洋药物》

功 效 胆汁：祛风湿消炎。用于风湿性关节炎，跌打肿痛，疮疖溃瘍等；肝：可制鱼肝油。

#### 8921603

*Gymnura poecilura* (Shaw) --- *Pteroplatea poecilura* (Shaw)

动物名 花尾燕魮《拉汉海洋生物名称》

药材名 魮鱼《汇编》

功 效 肝：制鱼肝油。用于慢性病辅助治疗；胆汁：用于风湿关节痛，跌打肿痛。外用于疮疖溃瘍。

### 89217 鰩科 Myliobatidae

#### 8921701

*Myliobatis tobijei* Bleeker

动物名 鳐魮《动物图谱·鱼》

药材名 魮鱼《汇编》

文献名 鳐魮《中国药用动物名录》

地方名 辽宁：狗头洋，洋鱼；浙江：头鱼，菱形鱼。

功 效 肝脏：可提制鱼肝油；胆汁：用于风湿性关节炎痛，跌打肿痛。外用于疮疖溃瘍；尾刺：清热消炎，化结除瘀。

### 89218 蝠鲼科 Mobulidae

#### 8921801

*Manta birostris* (Walbaum) --- *Raja birostris* Walbaum

动物名 前口蝠鲼《动物图谱·鱼》

药材名 魮鱼鳃《中国药用动物志》

文献名 双吻前口蝠鲼《中国药用海洋生物》，角鱼蝠《中国药用动物志》，黑魮、角魮、虾魮《中国有毒和药用鱼类》

地方名 浙江：牛角大鱼，蝠魮，魮鱼，角燕，锅盖鱼，角花鱼；广西：彭鱼。

功 效 鳃：清热解毒，透疹。用于小儿麻疹，疮疖；脑：化瘀。用于跌打损伤。

#### 8921802

*Mobula japonica* (Mullet et Henle) --- *Cephaloptera japonica* Muller et Henle

动物名 日本蝠魮《动物图谱·鱼》

药材名 魮鱼鳃、魮鱼脑《中国药用动物志》

文献名 蝠魮、角魮《中国药用动物志》，虾魮《中药材科技》

地方名 浙江：角鱼，魮鱼，黑魮，角燕，锅盖鱼，角花鱼；广西：彭鱼，彭鱼鳃，鱼燕。

功 效 鳃：清热解毒，化瘀透疹。用于小儿麻疹，

痘毒或并发咽炎，疮疖；脑：化瘀。用于跌打损伤。

### 89219 银鲛科 Chimaeridae

#### 8921901

*Chimaera phantasma* Jordan

动物名 银鲛《动物图谱·鱼》

药材名 鱼翅《汇编》

文献名 黑线银鲛《中国有毒和药用鱼类》，沙翅片《汇编》

地方名 辽宁：海兔子，鳞刀鱼；浙江：银鲛鱼，兔手鱼。

功 效 背鳍、胸鳍：补五脏，长腰力，益气开膈，清痰健胃。

### 89220 鲟科 Acipenseridae

#### 8922001

*Acipenser dabryanus* Dumeril

动物名 达氏鲟《动物图谱·鱼》

药材名 鱼鳔《中国药用动物志》

文献名 长江鲟《中国有毒和药用鱼类》，腊子《中国药用动物志》

功 效 鳔：滋补强壮。用于滑精，阳痿，早泄，咯血，吐血，肠出血，白带，神经衰弱等。

#### 8922002

*Acipenser schrencki* Brandt

动物名 东北鲟《中国有毒和药用鱼类》

药材名 鱼鳔《纲目》、《中国动物药》

文献名 鲟鳃、鳔《本草拾遗》，鱼胶《三因方》，史氏鲟《动物图谱·鱼》，鲟鱼《汇编》，鲟《中国药用动物志》

地方名 七粒浮子（东北）。

功 效 鳔：滋补强壮。用于肾虚遗精，吐血，白带，崩漏，阳痿，肠出血，创伤出血，恶性肿瘤等。

#### 8922003

*Acipenser sinensis* Gray

动物名 中华鲟《拉汉脊椎动物名称》

药材名 鱼鳔《中国动物药》

文献名 鲟《诗经》，鲟鮓、王鮓《尔雅》，鲟、叔鮓《说文》，鲟鱼《本草拾遗》，鲟鮓《上林赋》，尉鱼、仲明鱼《陆机诗疏》，鮓鱼《尔雅》郭璞注，乞里麻鱼《饮膳正要》，鮓鱼、碧鱼《纲目》，鲟《辽宁动物志》，苦腊子《中国药用动物志》，鮓鱼、鮓、〔黄鱼〕《汇编》，鮓鱼、蜡鱼、玉版鱼《中国药用海洋生物》

地方名 浙江：铁甲，龙鲛。

功 效 鳔：滋补强壮。用于肾虚遗精，吐血，白带，滑精，崩漏，创伤出血，痔瘡。

#### 8922004

*Huso dauricus* (Georgi)

动物名 鳊《动物图谱·鱼》

药材名 鳊鱼《宁原食鉴本草》、《中药大辞典》

文献名 鳊《诗经》，含光、蜡鱼《临海异物志》，黄鱼《尔雅》郭璞注，鳊鱼、鳊鱼肝《本草拾遗》，阿八儿忽鱼《饮膳正要》，颊鱼《医学入门》，玉版鱼、鲟鳊鱼《纲



目), 佗氏鳊《东北动物药》

功效 肉: 益气补虚; 肝: 用于恶疮疥癣; 鳃: 滋补强壮。用于白带, 恶性肿瘤, 肾虚遗精。

### 89221 白鲟科 Polyodontidae

#### 8922101

*Psephurus gladius* (Martens)

动物名 白鲟《动物图谱·鱼》

药材名 白鲟《中国药用动物志》

文献名 象鱼、象鼻鱼、柱针鲤《中国药用动物志》

功效 肉: 补肾。用于血淋等。

### 89222 鲱科 Clupeidae

#### 8922201

*Clupanodon punctatus* (Temminck et Schlegel)

动物名 斑鲱《中国海洋药物》

地方名 浙江: 扁鲱, [金耳环], 左眼鱼, 气包子。

功效 全鱼: 清热解毒, 消食。

#### 8922202

*Clupea pallasii* Cuvier et Valenciennes

动物名 太平洋鲱《拉汉脊椎动物名称》

文献名 青鱼、青条鱼《中国有毒和药用鱼类》, 黄海鲱鱼、鲱《辽宁动物药》

功效 肉、卵巢、精巢(鱼白): 用于利水, 肺结核, 心脏瓣膜症, 解芥麦中毒, 脚气病, 气喘。

#### 8922203

*Harengula nymphaea* (Richardson)

动物名 中华青鳞鱼《动物图谱·鱼》

文献名 神仙青鳞鱼《中国药用海洋生物》

地方名 广东: 青鳞; 广西: 青鳞鱼。

功效 全体: 解海蛇毒。外用于海蛇咬伤, 缠腰火丹。

备考 本种有并入小沙丁鱼属者。

#### 8922204

*Harengula ovalis* (Bennett)

动物名 大眼青鳞鱼《拉汉脊椎动物名称》

文献名 青鳞鱼《中国药用动物志》

功效 全体: 解海蛇毒。外用于海蛇咬伤, 缠腰火丹。

#### 8922205

*Harengula zunasi* Bleeker

动物名 青鳞鱼《动物图谱·鱼》

地方名 青皮(河北、山东), 柳叶鱼(辽宁、山东); 辽宁: 青皮鱼, 青鳞, 青皮子; 山东: 柳叶青; 浙江: 狗梗。

功效 肉: 解海蛇毒。外用于海蛇咬伤, 缠腰火丹。

#### 8922206

*Ilisha elongata* (Bennett) --- *Alosa elongata* (Bennett)

动物名 鲈《篇海》、《动物图谱·鱼》

药材名 鲈鱼《纲目》、《中药大辞典》

文献名 鲈鱼《正字通》, 火鳞鱼《黄渤海鱼类调查报告》, 白鱼《中国药用动物志》

地方名 快鱼(辽宁、河北), 力鱼(浙江、广东), 白力鱼(浙江、福建), 白鳞鱼(山东、浙江), 鲈鱼(辽宁、河北、浙江); 浙江: 糟白鱼, 鲈鱼, 鲈; 广东: 鲈鱼。

功效 全鱼: 养心安神, 滋补强壮, 开胃和中, 泻火解毒。用于心悸怔忡, 慢性腹泻, 消化不良; 鳃: 用于疟疾。

备考 民间习惯认为, 鲈鱼有毒, 凡患疮疡肿毒及炎症性疾病者, 均应禁用。

#### 8922207

*Macrura kelee* (Cuvier)

动物名 花点鲷《中国海洋药物》

地方名 浙江: 花鲷。

功效 肉: 滋补, 益气。

#### 8922208

*Macrura reevesii* (Richardson)

动物名 鲷《动物图谱·鱼》

药材名 鲷鱼《食疗本草》、《中药大辞典》

文献名 鲷鱼《纲目》, 鲷鱼鳞《本经逢原》, 三黎《本草求原》, 鲷鱼《中国药用动物志》

地方名 时鱼(江苏、浙江、广西); 浙江: 花占(苍南); 广东: 三来; 广西: 西江时鱼, 三来鱼, 三黎鱼。

功效 肉: 补中益气, 温补脾肺。用于虚劳, 烫火伤, 疔疮, 营养不良, 咳嗽水肿等; 鲷鱼鳞: 用于疔疮, 烫火伤, 腿疮, 下疳。

#### 8922209

*Sardinella allecia* (Rafinesque) --- *Sardinella aurita* Cuvier et Val

动物名 金色小沙丁鱼《动物图谱·鱼》

药材名 沙丁鱼《中国海洋药物》

地方名 鳀鱼、青鳞鱼(浙江、福建)。

功效 肉: 化食利气, 解毒。用于久痢, 咳血, 海蛇咬伤。

#### 8922210

*Sardinella clupeioides* (Bleeker)

动物名 白腹小沙丁鱼《中国海洋药物》

地方名 小沙丁鱼。

功效 肉: 化食利气。

#### 8922211

*Sardinella jussieu* (Lacepede)

动物名 裘氏小沙丁鱼《中国海洋药物》

地方名 小沙丁鱼。

功效 肉: 化食利气。

### 89223 鲹科 Engraulidae

#### 8922301

*Anchoviella chinensis* (Guenther)

动物名 中华小公鱼《中国海洋药物》

地方名 浙江: 白弓。

功效 全鱼: 健脾胃。

#### 8922302

*Anchoviella commersonii* (Lacepede)

动物名 康氏小公鱼《动物图谱·鱼》

药材名 公鱼(广东)

功效 全体腌制品:用于足跟肿痛。

#### 8922303

*Coilia ectenes jordan et Seale*

动物名 刀鲚《动物图谱·鱼》

药材名 鲚鱼《食疗本草》、《中药大辞典》

文献名 鲚、鰧刀《尔雅》, 鲚鱼《山海经》, 刀鱼《说文》, 望鱼《魏武食制》, 鱮鱼《异物志》, 魮鱼《纲目》, 江鲚《本经逢原》, 麻鲚《本草求原》, 子鱼《随息居饮食谱》, 毛花鱼《中国经济动物志》, 靠子鱼《中国药用动物志》, 野毛鱼《动物图谱·鱼》

地方名 凤尾鱼(辽宁、浙江); 浙江: 河刀鱼。

功效 肉: 补气活血, 泻火解毒。用于慢性胃肠功能混乱, 消化不良, 疮疖痈疽; 肉鲚(用盐和红曲腌的鱼): 外用于贴痔瘡。

#### 8922304

*Coilia grayii Richardson*

动物名 七丝鲚《动物图谱·鱼》

文献名 长尾刺、刀刺《海洋药物民间应用》

地方名 凤尾(浙江、广东); 浙江: 鲚鱼, 刺鱼; 广东: 白鼻、马齐。

功效 全体: 补气健脾, 泻火解毒。用于胃肠功能不健, 消化不良。外用于疮疖痈疽, 外痔。

#### 8922305

*Coilia mystu (L.)*

动物名 凤鲚《动物图谱·鱼》

药材名 凤尾刀鱼《中药材科技》

地方名 靠子鱼(山东、江苏、浙江); 辽宁: 刀鲚; 山东: 鲚, 河刀鱼, 凤尾鲚; 浙江: 鲚鱼, 凤尾鱼, 白鲚。

功效 肉: 补气活血, 泻火解毒。

#### 8922306

*Engraulis japonicus Temminck et Schlegel*

动物名 鲱《动物图谱·鱼》

文献名 鲱鱼、鲱温《海洋药物民间应用》

地方名 抽条(辽宁、河北、山东), 海鲱(幼鱼)(辽宁、河北、山东、浙江); 辽宁: 鲛鱼食, 离水烂, 青天烂, 船丁、丁鱼(幼鱼); 山东: 离水烂, 老眼尿; 浙江: 丁香娘, 烂肚吞儿。

功效 腌鲱鱼肠内土: 止泻。用于急性肠炎; 腌鲱鱼卤汁: 清热。用于肺结核。

#### 8922307

*Setipinna taty (Vatenciennes)*

动物名 黄鲫《中国海洋药物》

地方名 浙江: 白连儿, 黄雀, 黄尖子, 薄口, 毛口, 麻口。

功效 肉: 补气活血, 助消化。

#### 8922308

*Thrisa kammalensis (Bleeker)*

动物名 赤鼻棱鲢《中国海洋药物》

地方名 浙江: 赤鲢, 短颈棱鲢, 红鼻鱼, 尖口。

功效 肉: 健脾益胃。

### 89224 鲑科 Salmonidae

#### 8922401

*Oncorhynchus keta (Walb.)*

动物名 大麻哈鱼《动物图谱·鱼》

药材名 大马哈鱼《汇编》

文献名 大发哈、果冬、秋鲑《中国有毒和药用鱼类》, 大马哈《汇编》, 大马哈鱼肉、马哈鱼、果多《中国药用动物志》

功效 鱼肉: 滋补, 利水, 健胃。用于消化不良, 胸腹胀满, 水肿。

### 89225 香鱼科 Plecoglossidae

#### 8922501

*Plecoglossus altivelis Temminck et Schlegel*

动物名 香鱼《中国海洋药物》

地方名 浙江: 海胎鱼, 鲑鱼。

功效 肉、鳃: 补气活血。用于产妇产后发奶。

### 89226 银鱼科 Salangidae

#### 8922601

*Hemisanx prognathus Regan*

动物名 前颌间银鱼《动物图谱·鱼》

药材名 银鱼《纲目》、《中药大辞典》

文献名 王余《尔雅》郭璞注, 鲢残鱼《食鉴本草》, 银条鱼《日用本草》, 王余鱼《纲目》, 大银鱼《鱼类分类学》, 间银鱼《拉汉海洋生物名称》

地方名 浙江: 面鱼, 面条鱼。

功效 全体: 补虚, 健胃, 益肺, 利水。

#### 8922602

*Neosalanx tankankee taihuensis Chen --- Neosalanx tangkahkei (Wu)*

动物名 太湖短吻银鱼《中药大辞典》

药材名 水晶鱼(姚可成《食物本草》)、《中药大辞典》

文献名 鳊鱼(姚可成《食物本草》), 陈氏新银鱼《拉汉脊椎动物名称》

功效 全体: 疏利肠胃, 润肺。

#### 8922603

*Protosalanx hyalocranius (Abbott)*

动物名 大银鱼《动物图谱·鱼》

药材名 大银鱼《中药材科技》

地方名 浙江: 银鱼, 面条鱼。

功效 全体: 补虚, 健胃, 益肺, 利水。

#### 8922604

*Salanx acuticeps Regan*

动物名 尖头银鱼《动物图谱·鱼》

药材名 银鱼《中国药用动物志》

文献名 面条鱼《海洋药物民间应用》

地方名 浙江: 银条鱼, 残鳃鱼; 广东: 流鼻。

功效 全鱼: 补虚, 健胃, 益肺, 利水。用于营养不良, 消化不良, 小儿疳积。

## 8922605

Salanx longianalis (Regan)

- 动物名 长鳍银鱼《拉汉脊椎动物名称》  
 药材名 银鱼《中国药用动物志》  
 文献名 面条鱼、残鲈鱼《中国药用动物志》  
 地方名 山东:小白鱼,黄瓜鱼,燕窝鱼。  
 功效 全鱼:补虚,健胃,益肺,利水。用于营养不良,消化不良,小儿疳积。

## 89227 狗母鱼科 Synodidae

## 8922701

Harpodon nehereus (Hamilton)

- 动物名 龙头鱼《中国海洋药物》  
 地方名 浙江:水潺,细鱼,豆腐鱼,水定。  
 功效 全鱼:健脾益气,滋补肝肾。

## 8922702

Saurida elongata (Temminck et Schlegel)

- 动物名 长蛇鲻《动物图谱·鱼》  
 药材名 长蛇鲻《中国药用海洋生物》  
 文献名 长体蛇鲻《拉汉脊椎动物名称》,大丁仔、奎龙《中国药用动物志》,海鸟、沙梭、神仙梭《中国药用海洋生物》

地方名 九棍(广东、广西),狗棍(浙江、广东、广西),神仙梭(河北、浙江);山东:沙梭,细鳞丁;浙江:丁鱼;广东:大丁,九贫;广西:奎龙鱼。

功效 肉:健脾补肾,固精缩尿。用于小儿麻痹后遗症,遗精,夜尿多;尾:清热消炎。用于扁桃腺炎。

## 8922703

Saurida filamentosa Ogilby

- 动物名 长条蛇鲻《拉汉脊椎动物名称》  
 文献名 多齿蛇鲻《拉汉海洋生物名称》,奎龙鱼、狗棍《中国药用动物志》

地方名 浙江:狗母。

功效 肉:健脾补肾,固精缩尿。用于小儿麻痹后遗症,遗精,夜尿多;尾:清热消炎。用于扁桃腺炎。

## 8922704

Saurida tumbil (Bloch et Schneider)

- 动物名 多齿蛇鲻《动物图谱·鱼》  
 文献名 长条蛇鲻《中国药用海洋生物》,狗棍《中国动物药》,泥狗棍《中国药用动物志》  
 地方名 海鸟、丁鱼(浙江、广东);浙江:粗鳞狗母,奎龙;广东:九棍,九仪。

功效 肉:健脾补肾,固精缩尿。用于小儿麻痹后遗症,遗精,夜尿多;尾:清热消炎。用于扁桃腺炎。

## 8922705

Saurida undosquamis (Richardson)

- 动物名 花斑蛇鲻《拉汉脊椎动物名称》  
 文献名 沙狗棍、泥狗棍、奎龙《中国药用动物志》  
 地方名 浙江:狗棍,沙梭,神仙梭。  
 功效 肉:健脾补肾,固精缩尿。用于小儿麻痹后遗症,遗精,夜尿多;尾:清热消炎。用于扁桃腺炎。

## 8922706

Trachinocephalus myops (Bloch et Schneider)

- 动物名 大头狗母鱼《动物图谱·鱼》  
 文献名 沙狗棍《中国药用海洋生物》,奎龙鱼《中国药用动物志》  
 地方名 浙江:狗棍,狗母鱼;广东:公奎龙。  
 功效 尾:清热消炎。用于扁桃腺炎,小儿喉痛。

## 89228 鲤科 Cyprinidae

## 8922801

Acanthorhodeus elongatus Tegan

- 动物名 长身刺鲃《滇南本草》整理本)  
 药材名 鲃鱼《滇南本草》  
 文献名 刺鲃、鰕鲃《尔雅》  
 地方名 云南:棘片鱼,鲃鲃,鲃鲃鲃,旁皮鱼。  
 功效 肉:添精补髓,能补三焦之火。

## 8922802

Acanthorhodeus guichenoti Bleeker

- 动物名 刺鲃《中药大辞典》  
 药材名 鲃鱼《中药大辞典》  
 功效 肉:益精气,补气血。

## 8922803

Acheilognathus barbatulus Guenther

- 动物名 小须鲃《中药大辞典》  
 药材名 鲃鱼《中药大辞典》  
 功效 鱼肉:益脾胃,解痘毒。

## 8922804

Acrossocheilus monticola (Guenther)

- 动物名 宽口光唇鱼《神农架药录》  
 文献名 乌斑子《神农架药录》。  
 功效 全体(除去内脏及鳞):滋补强壮,泻火,健胃。

## 8922805

Anabarilius alburnops (Regan)

- 动物名 大头白鱼《滇南本草》整理本)  
 药材名 白鱼《滇南本草》  
 地方名 云南:鲃鱼,银白鱼。  
 功效 全体:用于痈疽诸疮,肿毒疥癩。

## 8922806

Anabarilius andersoni (Regan)

- 动物名 小白鱼《滇南本草》整理本)  
 药材名 白鱼(云南)  
 功效 全体:用于痈疽诸疮,肿毒疥癩。

## 8922807

Anabarilius grahmi (Regan)

- 动物名 鱖鱼《动物图谱·鱼》  
 药材名 白鱼(云南)  
 文献名 鱖白鱼、抗浪鱼《滇南本草》整理本),小白鱼《动物图谱·鱼》  
 功效 全体:用于痈疽诸疮,肿毒疥癩。

## 8922808

Anabarilius polylepis (Regan)

- 动物名 多鳞鱖鱼《动物图谱·鱼》

药材名 白鱼(云南)

文献名 桃花白鱼(《滇南本草》整理本), 桃花鱼、多鳞白鱼《动物图谱·鱼》

功效 全体; 用于痢症诸疮, 肿毒疥癩。

#### 8922809

*Aristichthys nobilis* (Richardson)

动物名 鲮《动物图谱·鱼》

药材名 鲮鱼《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 鲮鱼《山海经》, 鲮鱼《上林赋》, 皂包头、皂鲮(姚可成《食物本草》), 黑包头鱼《食物本草会纂》, 鲮头鲮《医林纂要》, 鲮鱼《本草求真》, 包头鱼《随息居饮食谱》, 胖头《动物图谱·兽》, 胖仔《常见药用动物》, 黄鲮、鲮鱼、松鱼、溶鱼、大头鲮《中国药用动物志》

地方名 湖北: 花鲮(神农架); 广西: 大头鲮, 大头鱼, 胖头鱼, 黑鲮。

功效 肉: 暖脾胃, 壮筋骨。用于老年人痰喘, 脾胃虚弱, 消化不良, 四肢肿胀, 腰膝酸痛; 鱼头: 用于风寒头痛, 经闭, 经痛; 鱼胆: 有毒。有短暂降压作用。

#### 8922810

*Barbus sinensis* (Bleeker)

动物名 中华鲃(《滇南本草》整理本)

药材名 青鱼《滇南本草》

功效 肉: 和中养肝明目; 胆: 明目, 化痰。用于恶疮。

#### 8922811

*Carassius auratus* (L.)

动物名 鲫《动物图谱·鱼》

药材名 鲫鱼《唐本草》

文献名 鲋《吕氏春秋》, 鲋《说文》, 鲫鱼头《唐本草》, 鲫鱼子、鲫鱼骨《食疗本草》, 鲋鱼《滇南本草》, 鲋鱼、鲫鱼胆、鲫鱼脑《纲目》, 朱砂鱼、金鱼《纲目拾遗》, 鲫瓜子、鲫壳子、喜头金鱼《动物图谱·鱼》, 鲫鱼肉《中国药用动物志》

地方名 内蒙古: “赫勒特格”(蒙名)。

功效 肉: 温中和胃, 滋补, 利水。用于脾胃虚弱, 胃痛呕吐, 水肿, 走马牙疳, 牙痛; 鱼头: 用于咳嗽, 痢疾, 小儿口疮, 黄水疮; 胆汁: 外用于疳疮, 阴蚀疮, 杀虫止痛; 鱼脑: 用于耳聋; 鳞片: 止血; 鱼鳔: 用于疝气。

#### 8922812

*Carassius cayassius cuvieri* Temminck et Schlegel

动物名 白鲫《神农架药录》

药材名 白鲫《神农架药录》

地方名 湖北: 白鲫鱼(神农架)。

功效 肉: 补脾胃, 壮筋骨。

#### 8922813

*Cirrhinus molitorella* (Cuvier et Valenciennes)

动物名 鲮《动物图谱·鱼》

药材名 鲮鱼(姚可成《食物本草》)、《中药大辞典》

文献名 鲮鱼(姚可成《食物本草》), 雪鲮《纲目拾遗》, 土鲮鱼《本草求真》, 鲮公、土鲮鱼、花鲮、雪鲮《动物图谱·鱼》, 鲮公《中国药用动物志》

功效 肉: 活血行气, 逐水利湿。用于膀胱结热,

黄疸, 水肿, 水臌。

#### 8922814

*Ctenopharyngodon idellus* (Cuvier et Valenciennes)

动物名 草鱼《纲目》、《拉汉脊椎动物名称》

药材名 鲩鱼《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 鲩鱼(《尔雅》郭璞注), 鲩鱼《纲目》, 混子《中国经济动物志》, 鲩、草鲩、白鲩、草青、草根《中国药用动物志》

地方名 江苏: 棍子鱼。

功效 全鱼(去脏、鳞): 平肝, 祛风, 暖胃和中。用于虚劳, 肝风头痛, 久疟, 消化不良, 食后胀饱, 呕吐, 泄泻; 肠、胆: 降压, 明目。用于高血压, 结膜炎。

#### 8922815

*Culter alburnus* Basil.

动物名 鲢《动物图谱·鱼》

药材名 鲢鱼《汇编》

文献名 短尾鲢、巴刀、小白鱼《中国有毒和药用鱼类》, 似鲢《中国动物药》, 黄尾鲢、黄掌皮、红稍子、黄长条《动物图谱·鱼》, 银色白鱼《汇编》

功效 全鱼: 利水, 水肿。用于消瘦浮肿, 产后抽筋。

#### 8922816

*Culter erythropterus* Basilewsky

动物名 红鳍鲢(辽宁动物药)

地方名 辽宁: 麻连, 刀子, 短尾鲢。

功效 全鱼: 利水。用于水肿, 产后抽筋, 浮肿。

#### 8922817

*Cyprinus carpio* L.

动物名 鲤《拉汉脊椎动物名称》

药材名 鲤鱼胆《本经》、《中药大辞典》

文献名 鲤鱼肉、鲤齿《别录》, 赤鲤鱼(《尔雅》郭璞注), 鲤鱼脑《本草经集注》, 鲤鱼皮、鲤鱼血、鲤鱼肠《唐本草》, 鲤鱼脂、鲤鱼鳞、鲤鱼眼睛《食疗本草》, 鲤鱼目《本草拾遗》, 鲙鲤《埤雅》, 大鲤鱼《东北动物药》

地方名 鲤拐子、鲤鱼拐子(内蒙古、辽宁), 鲤子(辽宁、广西); 辽宁: 红毛鲤子; 内蒙古: “莫日占”(蒙名); 广西: 河鲤。

功效 鲤鱼肉: 开胃健脾, 消肿利尿, 止咳平喘, 下乳安胎。用于反胃吐食, 久咳气喘, 乳汁不通, 小便不利; 鲤鱼胆: 消炎解毒。外用于慢性中耳炎, 疮毒; 鲤鱼鳔: 用于疝气; 鲤鱼鳞片: 止血, 用于崩漏, 带下, 鼻衄, 痔疮; 鲤鱼骨: 利湿, 解毒。用于赤白带下, 阴疽; 鲤鱼血: 用于丹毒, 口眼歪斜; 鲤鱼皮: 用于癰疹; 鲤鱼肠: 用于小儿肌疮; 鲤鱼齿: 用于石淋; 鲤鱼脂脑: 用于诸病。

#### 8922818

*Cyprinus carpio chilia* Wu et al.

动物名 杞麓鲤(《滇南本草》整理本)

药材名 鲤鱼(云南)

功效 鲤鱼肉: 开胃健脾, 消肿, 利尿, 止咳平喘, 下乳安胎。用于反胃吐食, 久咳气喘, 乳汁不通, 小便不利; 鲤鱼胆: 消炎解毒。外用于慢性中耳炎, 疮毒。

#### 8922819

*Cyprinus crassilabris* Chen et Hwang

动物名 厚唇鲤(《滇南本草》整理本)

药材名 鲤鱼(云南)

功效 鲤鱼肉:开胃健脾,消肿利尿,止咳平喘,下乳安胎。用于反胃吐食,久咳气喘,乳汁不通,小便不利;鲤鱼胆:消炎解毒。外用于慢性中耳炎,疮毒。

8922820

*Cyprinus micristius* Regan

动物名 小鲤(《滇南本草》整理本)

药材名 鲤鱼(云南)

地方名 云南:中鲤。

功效 鲤鱼肉:开胃健脾,消肿利尿,止咳平喘,下乳安胎。用于反胃吐食,久咳气喘,乳汁不通,小便不利;鲤鱼胆:消炎解毒。外用于慢性中耳炎,疮毒。

8922821

*Cyprinus micristius fuxianensis* Yang et al.

动物名 抚仙小鲤(《滇南本草》整理本)

药材名 鲤鱼(云南)

功效 鲤鱼肉:开胃健脾,消肿利尿,止咳平喘,下乳安胎。用于反胃吐食,久咳气喘,乳汁不通,小便不利;鲤鱼胆:消炎解毒。外用于慢性中耳炎,疮毒;鲤鱼鳔:用于疝气。

8922822

*Cyprinus pellegrini* Tchang

动物名 大头鲤(《动物图谱·鱼》)

药材名 鲤鱼(云南)

文献名 碌鱼(《滇南本草》整理本),大头鱼(《动物图谱·鱼》)

功效 鲤鱼肉:开胃健脾,消肿利尿,止咳平喘,下乳安胎。用于反胃吐食,久咳气喘,乳汁不通,小便不利;鲤鱼胆:消炎解毒。外用于慢性中耳炎,疮毒。

8922823

*Cyprinus yunnanensis* Tchang

动物名 云南鲤(《动物图谱·鱼》)

药材名 鲤鱼(云南),《滇南本草》整理本)

文献名 白鱼、黄尖嘴(《动物图谱·鱼》)

功效 鲤鱼肉:开胃健脾,消肿利尿,止咳平喘,下乳安胎。用于反胃吐食,久咳气喘,乳汁不通,小便不利;鲤鱼胆:消炎解毒。外用于慢性中耳炎,疮毒。

8922824

*Diptychus pachycheilus* (Herzenstein)

动物名 厚唇重唇鱼(《动物图谱·鱼》)

药材名 麻鱼(《中国药用动物志》)

文献名 麻花鱼、麻鱼胆、麻鱼骨、麻鱼肉、重唇花鱼(《中国药用动物志》)

功效 胆:清热,消障翳。用于疮疡热痛,白内障,烧伤;胆汁:外用于擦患处;骨:消肿。用于水肿;肉:祛瘀,排脓,消炎。用于妇女病,肠胃病,疮疖化脓。

8922825

*Discogobio yunnanensis* (Regan)

动物名 云南盘鲃(拉汉脊椎动物名称)

药材名 云南盘鲃(《神农架药录》)

地方名 湖北:油筒子(神农架)。

功效 全体(除去内脏及鳞):补虚,健脾胃,下乳。

8922826

*Elopichthys bambusa* (Richardson)

动物名 鲢(《动物图谱·鱼》)

药材名 鲢鱼(《纲目》、《中药大辞典》)

文献名 黄颡(《山海经》),鲇鱼(《异苑》),生母鱼(《岭表录异》),鲮鱼(《太平御览》),黄颡鱼(《纲目》),竹鱼(《脊椎动物分类学》),竿鱼(《鱼类分类学》),黄鲮(《中国经济动物志》),大口鲢、水老虎(《中国药用动物志》),黄钻、横叉(《动物图谱·鱼》)

地方名 黑龙江:杆条鱼。

功效 鲜肉:暖中,益胃,止呕。用于脾胃虚弱,反胃吐食。

8922827

*Erythroculter ilishaeformis* (Bleeker) --- *Culter ilishaeformis* Bleeker

动物名 翘嘴红鲌(《动物图谱·鱼》)

药材名 白鱼(《食疗本草》、《中药大辞典》)

文献名 鲈鱼(《滇南本草》),鲈鱼(《纲目》),白扁鱼(《本草草原》),翘嘴鲌、翘壳、翘嘴巴、大鲈鱼(《中国药用动物志》)

地方名 辽宁:刀子,大白鱼。

功效 肉:开胃健脾,消食行水。用于胃气不舒,水肿。

8922828

*Gnathopogon herzensteinii* (Guenther)

动物名 嘉陵颌须鲃(拉汉脊椎动物名称)

药材名 麻鱼(《神农架药录》)

功效 全体(除去内脏及鳞):健脾胃,清热泻火,下乳。

8922829

*Gymnocypris eckloni* (Herzenstein)

动物名 花斑裸鲤(拉汉脊椎动物名称)

文献名 大嘴湟鱼(《中国药用动物志》)

功效 胆:清热,消障翳。用于疮疡热痛,白内障,烧伤;胆汁:外用于擦患处;骨:消肿。用于水肿;肉:祛瘀,排脓,消炎。用于妇女病,肠胃病,疮疖化脓。

8922830

*Gymnocypris przewalskii przewalskii* (Kessler)

动物名 青海湖裸鲤(《动物图谱·鱼》)

文献名 湟鱼(《中国药用动物志》),无鳞鱼(《中国有毒和药用鱼类》)

地方名 内蒙古:“呼日和音”、“尼楚棍-扎嘎斯”(蒙名);青海:“赛日尼阿”(藏名)。

功效 肉:祛瘀,排脓,消炎。用于妇女病,肠胃病,疮疖化脓。

8922831

*Hemibarbus labeo* (Pallas) --- *Cyprinus labeo* Pallas

动物名 唇鲮(《动物图谱·鱼》)

药材名 重唇鱼(姚可成(《食物本草》)、《中药大辞典》)

文献名 似鲢鲮鱼《鱼类分类学》,重唇鲮《拉汉脊椎动物名称》,鲢鱼《中药大辞典》,鲮鱼《神农架药录》,重口鱼《中国药用动物志》,土虱鱼《动物图谱·鱼》

地方名 辽宁:重唇,重重。

功效 肉:补益脾胃,祛风湿,强筋骨。用于腰脊疼痛,腿膝酸麻,行动不便。

#### 8922832

*Hemiculter leuciscus* (Basilewsky) --- *Culter leuciscus* Basilewsky

动物名 鲮《动物图谱·鱼》

药材名 鲮鱼《中国药用动物志》

文献名 鲮条《中国动物志》,鲮条鱼《拉汉脊椎动物名称》,鲮、黑鲮、白鲮、参鱼、肉条鱼、鲮鲮、鲮子《中国药用动物志》,鲮子、白条《动物图谱·鱼》

地方名 辽宁:白漂子,青鳞片。

功效 全鱼(除去内脏):暖胃。用于冷泻。

#### 8922833

*Hypophthalmichthys molitrix* (Cuvier et Valenciennes) --- *Leuciscus molitrix* Cuvier et Valenciennes

动物名 鲢《中国动物志》

药材名 鲢鱼《纲目》、《中药大辞典》

文献名 鲢鱼、白鲢《埤雅》,白脚鲢《医林纂要》,白鲢《动物图谱·鱼》,鲢、白叶、鲢鱼、洋胖头《中国药用动物志》

地方名 辽宁:鲢子,洋胖子;湖北:白鲢子鱼(神农架),膘鱼。

功效 肉:温中益气,利水。用于久病体虚,水肿,乳汁不通。

#### 8922834

*Labeo decorus* Peters

动物名 野鲮《拉汉脊椎动物名称》

药材名 竹鱼《纲目》、《中药大辞典》

文献名 足鱼《医林纂要》,野鲮鱼《中国经济动物志》

功效 肉:和中益气,除湿气。

#### 8922835

*Luciobrama macrocephalus* (Lacepede)

动物名 鲸《动物图谱·鱼》

药材名 鲸鱼《食疗本草》、《中药大辞典》

文献名 尖头鲸《鱼类分类学》,马头鲸、鸭嘴鲸、长嘴鲸、喇叭鱼、火筒嘴、吹火筒《中国药用动物志》,鹤嘴鲸《动物图谱·鱼》

功效 肉:补五脏,益筋骨,和脾胃。用于腰膝酸软,脾胃虚弱,食欲不振。

#### 8922836

*Megalobrama amblycephala* Yin

动物名 团头鲂《中国动物志》

药材名 武昌鱼《神农架药录》

文献名 团头鲂、草鲂《动物图谱·鱼》

功效 肉:补虚,调胃气,利五脏。

#### 8922837

*Megalobrama terminalis* (Richardson)

动物名 鲂《动物图谱·鱼》

药材名 鲂鱼《食疗本草》、《中药大辞典》

文献名 鲂《尔雅》,鳊鱼《日用本草》,平胸鳊《脊椎动物分类学》,乌鳊、花边、三角鳊、三角鲂、火烧鳊《中国药用动物志》

地方名 黑龙江:法罗鱼。

功效 肉:调胃健脾。用于消化不良,胸腹胀满。

#### 8922838

*Myolpharyngodon piceus* (Richardson) --- *Leuciscus piceus* Richardson

动物名 青鱼《动物图谱·鱼》

药材名 青鱼《本草经集注》、《中药大辞典》

文献名 鲩《日华子本草》,青鱼枕、青鱼胆《食疗本草》,青鲩、螺蛳青、五侯鲩《中国药用动物志》,黑鲩、乌鲩、溜仔《中国有毒和药用鱼类》,乌鲩、铜青、鲩鱼、青棒、螺蛳青《汇编》

地方名 辽宁:青根;山东:青根鱼;广西:青鱼根,乌青。

功效 青鱼肉:益气化湿,截疟,养肝明目,养胃。用于脚气湿痹,疟疾,血淋;青鱼胆:泻热,明目。用于目赤肿痛,翳障,喉痹,恶疮,白秃;枕骨:用于卒心痛,平水气;鱼鳞胶:止血。用于齿缝出血,鼻衄,紫癜。

#### 8922839

*Opsariichthys biden* Guenther

动物名 马口鱼《动物图谱·鱼》

药材名 马口鱼《神农架药录》

文献名 山鲮、大口扒《动物图谱·鱼》

地方名 湖北:桃花鱼(神农架)。

功效 全体(除去内脏):补虚,壮阳,催乳。

#### 8922840

*Percocypris pingi* (Tchang)

动物名 鲈鲤《动物图谱·鱼》

药材名 花鱼《中药大辞典》

文献名 秉氏鲈鲤《拉汉脊椎动物名称》,青胖《中国经济动物志》,江鲈《动物图谱·鱼》

地方名 湖北:金甲鱼(神农架)。

功效 肉:祛痰,止咳,镇静。用于急、慢性支气管炎,胃溃疡出血,咯血,衄血,子宫出血,癫痫失眠,月经过多,疟疾冷疟。

#### 8922841

*Phoxinus lagowskii variegatus* (Guenther)

动物名 杂色鲌《拉汉脊椎动物名称》

药材名 土鱼《神农架药录》

地方名 湖北:石鱼(神农架)。

功效 全体(除去内脏):祛虚,清热,泻火。

#### 8922842

*Pseudogobio varilanti* (Sauvage)

动物名 似鲃《神农架药录》

地方名 湖北:麻姑嫩子(神农架)。

功效 全体(除去内脏):补虚,清热,催乳。

#### 8922843

*Pseudogyrinocheilus procheilus* (Sauvage et Dabry) ---  
*Semilabeo procheilus* (Sauvage et Dabry)

动物名 泉水鱼《拉汉脊椎动物名称》

药材名 油鱼(姚可成《食物本草》)、《中药大辞典》

文献名 拟圆唇鱼《中药大辞典》

功效 肉:补益元气,和养脏腑。用于泄痢,吐血,女子崩中

#### 8922844

*Rhodeus ocellatus* (Kner) --- *Pseudoperilampus ocellatus* (Kner)

动物名 高体鲮鱼《辽宁动物志》

药材名 鲮鱼《中药大辞典》

文献名 石鲮鱼《中药大辞典》

功效 鱼肉:益脾胃,解毒。用于久病体虚,痘毒。

#### 8922845

*Rhodeus sinensis* (Guenther)

动物名 中华鲮鱼《动物图谱·鱼》

药材名 鲮鱼(姚可成《食物本草》)、《中药大辞典》

文献名 鰮鱼、鰮鱼《尔雅》,婢鰮、青衣鱼(崔豹《古今注》),鰮(《食疗本草》),旁皮鰮(《尔雅翼》),文鰮(《医林纂要》),鲮鱼《中国药用动物名录》,中华鲮鱼《中药大辞典》,鲮鱼《内蒙古药用动物》

地方名 辽宁:葫芦籽;内蒙古:“哈日巴”(蒙名),五彩鱼,葫芦子。

功效 肉:添精补髓,益脾胃,解毒。用于久病体虚,痘毒。

#### 8922846

*Sarcocheilichthys sinensis* Bleeker

动物名 华鲮《动物图谱·鱼》

药材名 石鲮(姚可成《食物本草》)、《中药大辞典》

文献名 鲮、脂鲮、花石鲮、山鲮子《中国药用动物志》

地方名 黑龙江:山鲮鱼,老母猪鱼。

功效 肉:安胃和中,利小便,解热毒。用于水肿胀满,黄疸,疮毒。

#### 8922847

*Schijopygopsis pylzovi* (Kessler)

动物名 黄河裸裂尻鱼(拉汉脊椎动物名称)

文献名 小嘴巴鱼、湟鱼《中国药用动物志》

功效 肉:祛瘀,排脓,消炎。用于妇女病,肠胃病,疮疖化脓。

#### 8922848

*Schizothorax grahami* (Regan)

动物名 昆明裂腹鱼(拉汉脊椎动物名称)

药材名 公鱼(贵州药录)

功效 肉:滋养补虚,益气固中。用于妇女劳损,崩中漏下,小儿丹毒,痰热风痢。

#### 8922849

*Schizothorax prenanti* (Tchang)

动物名 齐口裂腹鱼《动物图谱·鱼》

药材名 洋鱼(神农架药录)

文献名 齐口、齐口细鳞鱼、细甲鱼《动物图谱·鱼》

功效 全体(除去内脏):补益强壮,清热。

#### 8922850

*Schizothorax tariensis* Regan

动物名 大理裂腹鱼《动物图谱·鱼》

药材名 公鱼(云南)、《中药大辞典》

文献名 弓鱼、竿鱼《中国药用动物志》

功效 肉:滋补,止血,解毒。用于妇人劳损,崩漏下血,小儿痰热风痢,丹毒。

#### 8922851

*Schizothorax yunnanensis* (Norman)

动物名 云南裂腹鱼《中国药用动物志》

药材名 公鱼(姚可成《食物本草》)、《中药大辞典》

文献名 弓鱼、工鱼《大理府志》

功效 肉:滋补,止血,解毒。用于妇人劳损,崩漏下血,小儿痰热风痢,丹毒。

#### 8922852

*Similabeo rendahli* (Kimura)

动物名 华鲮《动物图谱·鱼》

药材名 竹鱼肉《中国药用动物志》

文献名 伦氏华鲮(拉汉脊椎动物名称),青龙棒、桃花棒、野鲮鱼《动物图谱·鱼》

功效 肉:益气和中,除湿。用于久病体虚,腰腿疼痛。

#### 8922853

*Sinocyclocheilus grahami* (Regan)

动物名 金线鲃《动物图谱·鱼》

药材名 金线鱼《滇南本草》

文献名 小鲈鲤(《滇南本草》整理本),小洞鱼《动物图谱·鱼》

地方名 云南:洞鱼。

功效 全体:滋阴调元,暖肾添精。用于润五脏,养六腑,通津液于上窍,去胃中之冷痰。

备考 《中药大辞典》、《拉汉脊椎动物名称》的小鲈鲤为 *Percocypris grahami* (Regan)

8922854 见 8922853

#### 8922855

*Sinocyclocheilus grahami tingi* Fang

动物名 抚仙金线鱼(《滇南本草》整理本)

药材名 金线鱼(云南)

功效 全体:滋阴调元,暖肾添精。用于润五脏,养六腑,通津液于上窍,去胃中之冷痰。

#### 8922856

*Sinocyclocheilus grahami yangzongensis* Tsii et Chen

动物名 阳宗金线鱼(《滇南本草》整理本)

药材名 金线鱼(云南)

功效 全体:滋阴调元,暖肾添精。用于润五脏,养六腑,通津液于上窍,去胃中之冷痰。

#### 8922857

*Spinibarbus denticulatus* (Oshima) --- *Barbodes denticulatus* (Oshima)

动物名 倒刺鲃《动物图谱·鱼》

药材名 鲃鱼(姚可成《食物本草》)、《中药大辞典》  
文献名 锯倒刺鲃《拉汉脊椎动物名称》,青竹、竹鱼《动物图谱·鱼》,鲃鱼肉、青鱼、竹鲃、青竹鲤、青鲃鲤《中国药用动物志》

功效 肉:壮阳补中。用于腰膝酸软。

备考 《中药大辞典》、《拉汉脊椎动物名称》  
(1978)锯倒刺鲃的学名为 *Spinibarbus denticulatus* Oshima

#### 8922858

*Squaliobarbus curriculus* (Richardson)

动物名 赤眼鲮《动物图谱·鱼》

药材名 鲮鱼《纲目》、《中药大辞典》

文献名 鲮《尔雅》,赤眼鱼《说文》,鲮鱼《纲目》,红目鲮《脊椎动物分类学》,红眼棒、红眼鱼、野草鱼、醉角眼《中国药用动物志》,马棍、鲮条、马娘鱼、马郎鱼《动物图谱·鱼》

功效 全鱼(去内脏):暖胃和中。用于反胃吐食,脾胃虚寒作泻。

#### 8922859

*Varicorhinus macrolepis* (Bleeker)

动物名 多鳞铲颌鱼《神农架药录》

药材名 钱鱼《神农架药录》

功效 肉:补虚,壮阳,催乳。

#### 8922860

*Varicorhinus simus* (Sauvage et Dabry)

动物名 白甲鱼《拉汉脊椎动物名称》

药材名 白甲鱼《神农架药录》

地方名 湖北:钱鱼。

功效 全体(除去内脏):补益强壮,清热,下乳。

#### 8922861

*Xenocypris davidi* Bleeker

动物名 黄尾鲮《动物图谱·鱼》

药材名 黄鲮鱼《纲目》、《中药大辞典》

文献名 黄姑、黄骨鱼《纲目》,黄尾鲮《中药大辞典》,黄姑子、黄尾刀、黄片、黄板、黄尾《中国药用动物志》,黄板刀《动物图谱·鱼》

功效 肉(白煮汁饮):用于胃寒泄泻。

#### 8922862

*Zacco platypus* (Temminck et Schlegel)

动物名 宽鳍鲮《动物图谱·鱼》

药材名 石鲮鱼《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 宽鳍鲮鱼《中药大辞典》,桃花鱼《脊椎动物分类学》,鳊鱼、双尾鱼《中国药用动物志》,红翅子《动物图谱·鱼》

地方名 湖北:白斑子(神农架)。

功效 全体:有小毒。解毒,杀虫。用于诸疮疥癣。

### 89229 鳅科 Cobitidae

#### 8922901

*Cobitis rarus* Chen

动物名 稀有花鳅《神农架药录》

药材名 花斑子鱼《神农架药录》

功效 全体(除去内脏):补中益气,壮阳,下乳。

#### 8922902

*Cobitis sinensis* Sauvage et Dabry

动物名 中华花鳅《神农架药录》

地方名 湖北:花鱼(神农架)。

功效 全体(除去内脏):补中益气,下乳。

#### 8922903

*Cobitis taenia* (L.)

动物名 花鳅《动物图谱·鱼》

药材名 泥鳅肉《中国药用动物志》

功效 全体:补中益气,清热解毒,消肿解渴。用于温病大热,神昏口渴,水肿黄疸,小便不利。

#### 8922904

*Leptobotia mentaiensis hansuiensis* P. et H.

动物名 汉水扁尾薄鳅《神农架药录》

药材名 红尾巴条子《神农架药录》

功效 全体(除去内脏):补中益气,壮阳。

#### 8922905 见 8922907a

#### 8922906

*Misgurnus anguillicaudatus* (Cantor) --- *Cobitis anguillicaudatus* Cantor

动物名 泥鳅《动物图谱·鱼》

药材名 泥鳅《纲目》、《汇编》

文献名 鳅、鳅《尔雅》,鳅鱼《本草拾遗》,鳅鱼、泥鳅《纲目》,泥鳅滑液《四川中药志》,鳅《中国有毒和药用鱼类》,泥鳅鱼《中国动物药》,泥鳅肉、肉泥鳅《中国药用动物志》

地方名 鱼鳅(广西、贵州);辽宁:泥勒勾子;内蒙古:“毛盖·吉日阿素”(蒙名),蛇博浪;福建:和鳅(泉州);湖北:阴鱼(神农架);其他:土溜。

功效 全体(去内脏):补中益气,清热解毒,消肿止渴。用于温病大热,神昏口渴,水肿黄疸,小便不利。

#### 8922907

*Misgurnus mizolepis* (Guenther)

动物名 细鳞泥鳅《拉汉脊椎动物名称》

文献名 大鳞泥鳅、鱼鳅《中国药用动物志》

功效 全体:补中益气,利小便,解毒。用于消渴,黄疸,温热病,皮肤瘙痒,痔疮下坠,疥疮。

#### 8922907a

*Misgurnus mohoity yunnan* Nichols

动物名 滇泥鳅(《滇南本草》整理本)

药材名 泥鳅《滇南本草》

功效 全体:健胃补脾。用于小儿脾胃虚弱,诸疮百癣。

#### 8922908

*Nemacheilus nigromaculatus* Regan

动物名 黑斑条鳅(《滇南本草》整理本)

药材名 花鱼《滇南本草》

功效 全体:用于补肾添精,养肺,止咳,令人肌肤细腻而解诸疮。烧灰服之,用于疟疾冷症。

备考 《动物图谱·鱼》(1987)黑斑条鳅的学名为



*Nemacheilus strauchi* (Kessler)

#### 8922909

*Nemacheilus pleurotaenia* Regan

动物名 云南条鳅(《滇南本草》整理本)

药材名 花鱼(云南)

功效 全体:用于补肾添精,养肺,止咳嗽,令人肌肤细腻而解诸疮;烧灰眼之;用于疟疾冷症。

#### 8922910

*Paracopterus potanini* (Guenther)

动物名 短体副花鳅(《神农架药录》)

地方名 湖北:红尾巴(神农架)。

功效 全体(除去内脏):补虚弱,清湿热。

#### 8922911

*Paracopterus variegata* (Sauvage et Dabry)

动物名 斑纹副花鳅(《神农架药录》)

地方名 湖北:红尾巴(神农架)。

功效 全体(除去内脏):补虚弱,清湿热。

#### 8922912

*Triphophyse anglei* (Fang)

动物名 安氏高原鳅(《神农架药录》)

药材名 黄锅头(《神农架药录》)

功效 全体(除去内脏):补中气,下乳,泻火。

### 89230 平鳍鳅科 Homalopteridae

#### 8923001

*Metahomaloptera omeiensis* Chang

动物名 后平鳍鳅(拉汉脊椎动物名称)

药材名 巴巴子鱼(《神农架药录》)

文献名 峨眉后平鳅(《神农架药录》)

功效 全体(除去内脏):补虚,催乳,泻火。

#### 8923002

*Paraprotomyzon lungkowensis*

动物名 龙口似原吸鳅(《神农架药录》)

药材名 岩巴子(《神农架药录》)

功效 全体(去内脏):清热,健胃,暖脾。

### 89231 海鲇科 Ariidae

#### 8923101

*Arius sinensis* Lacepede

动物名 中华海鲇(拉汉脊椎动物名称)

药材名 海鲇(《中国海洋药物》)

地方名 浙江:油松。

功效 全体:用于皮肤慢性溃疡,鞘膜积液;肉:健脾胃。

#### 8923102

*Arius thalassinus* (Ruppell)

动物名 海鲇(《动物图谱·鱼》)

药材名 海鲇(《中国海洋药物》)

地方名 浙江:王鱼,赤鱼,青松鱼。

功效 肉、鳃:健脾补虚。

### 89232 鳗鲡科 Plotosidae

#### 8923201

*Plotosus anguillaris* (Bloch)

动物名 鳗鲡(《动物图谱·鱼》)

药材名 鳗鲡(《中国药用动物名录》)

文献名 鳗尾鲇(拉汉脊椎动物名称)

地方名 浙江:毒鲇。

功效 肉:泻火开胃。用于脱发。

### 89233 胡鲇科 Clariidae

#### 8923301

*Clarias fuscus* (Lacepede)

动物名 胡子鲇(拉汉脊椎动物名称)

药材名 塘虱鱼(《本草求真》、《中药大辞典》)

文献名 角鱼、暗钉鱼(《本草求真》),须子鲇(《脊椎动物分类学》),胡子鲇(《鱼类分类学》),土虱、塘角鱼(《中国药用动物志》),过山鳅(《常见药用动物》)

功效 全体或肉:补血,滋肾,调中,助阳。用于腰膝酸痛,久病体虚,小儿疳积,吐血,黄疸,虚火,助伤口愈合。

### 89234 鲇科 Siluridae

#### 8923401

*Parasilurus asotus* (L.)

动物名 鲇(《动物图谱·鱼》)

药材名 鲇鱼(《纲目》、《汇编》)

文献名 𩺰(《诗经》),𩺰白鱼(《尔雅》郭璞注),𩺰鱼(《别录》),𩺰(崔禹锡《食经》),𩺰鱼(《食经》),𩺰鱼涎(《图经》),𩺰鱼目(《政和本草》),𩺰鱼尾(《纲目》),石𩺰、潭虱(《医林纂要》),𩺰(《动物学大辞典》),鲇(《动物图谱·鱼》)

地方名 吉林:粘鱼;内蒙古:“朝勒布古日图”(蒙名);山东:胡子鱼;广西:鲇巴郎,胡子鲇。

功效 全鱼(除去内脏):利水,下乳。用于水肿,乳汁不足;鱼尾:外用于口眼喎斜。

备考 《云南中药资源名录》鲇鱼学名为 *Silurus asotus* (L.)

### 89235 鲢科 Bagridae

#### 8923501

*Leiobagrus marginatus* (Guenther)

动物名 白缘鲢(《神农架药录》)

地方名 湖北:黄角头、石蜂子(《神农架》)。

功效 全体:补虚,清热,催乳。

#### 8923502

*Leiocassis longirostris* Guenther

动物名 长吻鲢(《动物图谱·鱼》)

药材名 鲢鱼(《本草经集注》、《中药大辞典》)

文献名 𩺰、𩺰(《尔雅》),𩺰(《本草拾遗》),𩺰鱼(《图经》),𩺰鱼、𩺰鱼、𩺰鱼(《纲目》),白𩺰鱼(姚可成《食物本草》),𩺰口鱼(《本草求真》),白𩺰(《随息居饮食谱》),江团、肥沱(《动物图谱·鱼》)

功 效 肉:下膀胱水,开胃。

#### 8923503

*Pelteobagrus fulvdraco* (Richardson) --- *Pseudobagrus fulvdraco* (Richardson)

动物名 黄颡鱼《动物图谱·鱼》

药材名 黄颡鱼《食疗本草》、《中药大辞典》

文献名 鲮《诗经》,扬令、黄颡鱼、黄鲮鱼(陆玕《诗疏》),鲮鱼《本草经集注》,黄鱼《医学入门》,黄鲮、黄鲮、黄颡鱼涎、黄颡鱼颊骨《纲目》,鲮丝鱼(姚可成《食物本草》),黄颡《医林纂要》,黄骨鱼《本草求真》,黄刺鱼《随息居饮食谱》,河龙盾鲮《鱼类分类学》,革牙、黄鲮《动物图谱·鱼》,盾鲮、黄鲮角、鲮斯《中国有毒和药用鱼类》

地方名 辽宁:嘎牙子,嘎鱼;广西:黄颡骨,方山头,黄岩,黄亢鱼,黄鲮鱼,鲮丝,黄腊丁。

功 效 肉或全体:利小便,消水肿。外用于瘰癧;皮肤分泌的粘液:用于消渴;颊骨:用于喉痹。

#### 8923504

*Pseudobagrus brevicaudatus* (Wu)

动物名 短尾拟鲮《神农架药录》

地方名 湖北:牛尾巴(神农架)。

功 效 全体(除去内脏及鳞):滋补强壮,健胃。

#### 8923505

*Pseudobagrus medianalis* (Regan)

动物名 中臀黄颡鱼(《滇南本草》整理本)

药材名 湾鲮《滇南本草》

文献名 黄颡、黄鲮《滇南本草》

功 效 全体:温中理气,补虚。用于冷积痞块,气疼。

#### 8923506

*Pseudobagrus pratti* (Guenther)

动物名 细体拟鲮《神农架药录》

地方名 湖北:牛尾条子(神农架)。

功 效 全体(除去内脏及鳞):滋补强壮,健胃。

#### 8923507

*Pseudobagrus pulcher* (Chaudhuri)

动物名 黄花颡鱼(《滇南本草》整理本)

药材名 湾鲮(云南)

功 效 全体:温中理气,补虚。用于冷积痞块,气疼。

#### 8923508

*Pseudobagrus truncatus* (Regan)

动物名 切尾拟鲮《神农架药录》

地方名 湖北:牛尾巴(神农架)。

功 效 全体(去内脏及鳞):补虚,健脾胃。

### 89236 鲮科 Sisoridae

#### 8923601

*Euchiloglanis davidi* (Sauvage)

动物名 青石爬鲮《神农架药录》

药材名 大头鱼《神农架药录》

功 效 全体(除去内脏):补虚,壮阳,下乳。

#### 8923602

*Glyptosternon maculatus* (Regan)

动物名 藏鲮《中国药用动物志》

地方名 西藏:“巴格里”(藏名)。

功 效 鱼胆汁:消炎解毒,明目退翳。用于疮疡热痛,白内障,烧伤;鱼肉:开胃健脾,消肿利水。用于妇女病,肠胃病,疮疖;鱼骨粉:用于水肿。

#### 8923603

*Glyptothorax sinensis* Regan

动物名 中华纹胸鲮《神农架药录》

地方名 湖北:大头鱼(神农架)。

功 效 全体(除去内脏):补虚,壮阳,下乳。

### 89237 鳗鲡科 Anguillidae

#### 8923701

*Anguilla japonica* Temminck et Schlegel

动物名 鳗鲡《拉汉脊椎动物名称》

药材名 鳗鲡《中国药用动物志》

文献名 鳗鲡鱼《别录》,鳗鲡鱼血、鳗鲡鱼骨、鳗鲡鱼膏、白鳝、蛇鱼、风鳗《纲目》,鳗鱼《本经逢原》,淡鳗、溪鳗《海洋药物民间应用》,日本鳗鲡《拉汉脊椎动物名称》,鳗《汇编》

地方名 辽宁:鳝鱼;浙江:白鳗,青鳝;广西:河鳗;其他:鳗干,鳗胆,鳗油。

功 效 去内脏全体:补虚,祛风,杀虫。用于妇女劳损,赤白带下,风湿骨痛,肺结核,淋巴结核,阳痿,恶疮溃瘍,白癣等;血:用于疮疹入眼生翳;骨:用于疳痢,肠风,崩带,烧灰敷恶疮,烧熏痔瘻,杀诸虫;鱼膏(脂肪):用于瘰癧。

#### 8923702

*Anguilla marmorata* Quoy et Gaimard

动物名 花鳗《中国有毒和药用鱼类》

文献名 大鳗、雪鳗、鳝王、刘鳗、鲈鳗《中国有毒和药用鱼类》

功 效 肉、头:滋补强壮。用于头晕,头痛,产妇女体虚。

### 89238 海鳝科 Muraenidae

#### 8923801

*Gymnothorax favagineus* (Bloch et Schneider)

动物名 豆点裸胸鳝《中国药用动物志》

功 效 全鱼:消炎,收敛。用于痔疮,胸痛。外用于无名肿毒;血:止血。外用于外伤出血。

#### 8923802

*Gymnothorax fimbriatus* (Bennett)

动物名 细斑裸胸鳝《中国药用动物志》

功 效 全鱼:消炎,收敛。用于痔疮,胸痛。外用于无名肿毒;血:止血。外用于外伤出血。

#### 8923803 见 8923804

#### 8923804

*Gymnothorax meleagris* (Shaw)

动物名 斑点裸胸鳝《中国药用动物志》

文献名 黑点裸胸鳝《动物图谱·鱼》

功效 全鱼;消炎,收敛。用于痔疮,胸痛。外用于无名肿毒;血;止血。外用于外伤出血。

#### 8923805

*Gymnothorax pictus* Ahl

动物名 花斑裸胸鳝《中国药用动物志》

功效 全鱼;消炎,收敛。用于痔疮,胸痛。外用于无名肿毒;血;止血。外用于外伤出血。

#### 8923806

*Gymnothorax punctatofasciata* Bleeker

动物名 斑条裸胸鳝《中国药用动物志》

功效 全鱼;消炎,收敛。用于痔疮,胸痛。外用于无名肿毒;血;止血。外用于外伤出血。

#### 8923807

*Gymnothorax reevesi* (Richardson)

动物名 吕氏裸胸鳝《中国药用动物志》

文献名 匀斑裸胸鳝《拉汉海洋生物名称》

功效 全鱼;消炎,收敛。用于痔疮,胸痛。外用于无名肿毒;血;止血。外用于外伤出血。

#### 8923808

*Gymnothorax reticularis* Bloch

动物名 网纹裸胸鳝《动物图谱·鱼》

药材名 海黄鳝《中国药用动物志》

地方名 浙江;海蛇鱼,花鳝。

功效 全鱼;消炎,收敛。用于痔疮,胸痛。外用于无名肿毒;血;止血。外用于外伤出血。

#### 8923809

*Gymnothorax richardsoni* (Bleeker)

动物名 异纹裸胸鳝《动物图谱·鱼》

文献名 李氏裸胸鳝《南海海洋药用生物》

功效 全体;清热解毒,凉血止血。

#### 8923810

*Gymnothorax undulatus* (Lacepede)

动物名 波纹裸胸鳝《动物图谱·鱼》

药材名 海黄鳝《中国药用动物志》

功效 全鱼;消炎,收敛。用于痔疮,胸痛。外用于无名肿毒;血;止血。外用于外伤出血。

#### 8923811

*Thyrsoidea macrurus* (Bleeker)

动物名 长体鳝《中国海洋药物》

地方名 浙江;海鳝。

功效 全鱼;清热消炎。

### 89239 海鳝科 Muraenesocidae

#### 8923901

*Muraenesox cinereus* (Forsk.)

动物名 海鳝《动物图谱·鱼》

药材名 海鳝《日华于本草》、《中药大辞典》

文献名 慈鳝、狗鱼、海鳝、狗鱼《日华于本草》,狗头鳝《随息居饮食谱》,即勾、狼牙鳝《黄渤海鱼类调查》,尖嘴鳝、乌皮鳝、九鳝《动物图谱·鱼》

地方名 门鳝、麻鱼(浙江、广西)、狼牙(山东、浙江);浙江:鳃鱼,港鳃,勾鱼,黄鳃;广西:海鳝。

功效 去脏全体;清热解毒。用于皮肤恶疮,疥癣,痔瘡;鳃、头(脑)、卵巢、血、胆;补虚损,祛风明目,活血通络,解毒消炎,补胃润肺,无名肿毒,急性结膜炎,胃病反胃,关节肿痛,颜面神经麻痹。

#### 8923902

*Muraenesox talabonoides* (Bleeker)

动物名 鹤海鳝《动物图谱·鱼》

药材名 鱼肚(鳔)《广西药用动物》

地方名 广西:海鳝,海鳃,门鳝,海鳃,鳃肚,海鳃鳔,海鳃胶。

功效 鳔:补肾固精,消炎,止血。用于神经衰弱,头晕,疮疖,痈肿,乳腺炎。

### 89240 康吉鳝科 Congridae

#### 8924001

*Astroconger myriaster* (Brevoort)

动物名 星鳝《中国海洋药物》

地方名 浙江:鳃鱼。

功效 全鱼;滋补益气。

#### 8924002

*Rhynchocymba ectenura* (Jordan et Richardson)

动物名 细尾吻鳝《中国海洋药物》

地方名 浙江:鳃鱼。

功效 全鱼;滋补益气。

#### 8924003

*Rhynchocymba sivicola* (Matsubara et Ochiai)

动物名 短尾吻鳝《中国海洋药物》

地方名 浙江:鳃鱼。

功效 全鱼;滋补益气。

### 89241 蠕鳝科 Echelidae

#### 8924101

*Muraenichthys gymnopterus* (Bleeker)

动物名 裸鳃虫鳝《中国海洋药物》

地方名 浙江:黄鳝。

功效 全鱼;滋补。

### 89242 蛇鳝科 Ophichthyidae

#### 8924201

*Brachysomophis crocodilinus* (Bennett)

动物名 鳄形短体鳝《动物图谱·鱼》

文献名 蛇形短体鳝《中国药用动物名录》

地方名 浙江:鳃鱼,油鳃;福建:油钻。

功效 全鱼;活血通络。用于风湿性关节炎。

#### 8924202

*Cirrhimuraena chinensis* Kaup

动物名 中华须鳝《动物图谱·鱼》

文献名 软骨鳝、面鳝《中国海洋药物》

功效 全鱼;滋补强壮。用于跌打损伤,骨折,骨湿痛。

**8924203***Ophichthys apicalis* (Bennett)

动物名 尖吻蛇鳗《动物图谱·鱼》

文献名 尖吻蛇鳗《海洋药物》

地方名 浙江:油芯,蛇鳗,黄鳗,硬骨鳗,沙鳗。

功效 全鱼:滋补。用于风湿性关节炎。

**8924204***Pisodonophis cancrivorus* (Richardson)

动物名 食蟹豆齿鳗《动物图谱·鱼》

文献名 豆齿鳗《中国海洋药物》

地方名 浙江:鳗鱼,墨鳗。

功效 全鱼:补气活血。用于腰肌劳损,闽南视为滋补品。

**89243 鰕针鱼科 Belonidae****8924301***Ablennes anastomella* (Cuvier et Valenciennes)

动物名 尖嘴扁鰕针鱼《动物图谱·鱼》

文献名 针鱼、鰕针鱼《中国海洋药物》

功效 肉:健脾胃。

**89244 鳔科 Hemirhamphidae****8924401***Hemirhamphus far* (Forsk.)

动物名 斑鳔《动物图谱·鱼》

药材名 斑鳔《中国药用海洋生物》

功效 肉:滋阴,补气,解毒。用于阴虚内热,盗汗,烦热,疮疡不易收口。

**8924402***Hemirhamphus georgii* Cuvier et Valenciennes

动物名 乔氏鳔《中国海洋药物》

地方名 浙江:针鱼,单针鱼。

功效 肉:滋阴,补气,解毒。用于阴虚内热,盗汗,疮疖溃瘍。

**8924403***Hemirhamphus sajori* (Temminck et Schlegel)

动物名 鳔《拉汉脊椎动物名称》

药材名 鳔鱼《纲目》、《中药大辞典》

文献名 鳔鱼《山海经》,铜蛸鱼《临海异物志》,姜公鱼《纲目》,针工鱼《医林纂要》,单针鱼、针扎鱼《黄渤海鱼类调查报告》,马部鱼、针良鱼、古董鱼《海洋药物》

地方名 辽宁:针鱼,大棒。

功效 肉:滋阴,补气,解毒。用于阴虚内热,盗汗,烦热,疮疡不易收口。

**89245 飞鱼科 Exocoetidae****8924501***Cypselurus agoo* (Temminck et Schlegel) --- *Cypselurus starksi* Abc

动物名 燕鳐鱼《动物图谱·鱼》

药材名 文鳐鱼《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 鳐《吕氏春秋》,飞鱼《本草拾遗》,燕鱼、燕

儿鱼《中国药用动物》,三峰燕鳐《辽宁动物志》,燕鳐《中国海洋药物》

地方名 浙江:燕子鱼。

功效 肉:催产,用于难产,胃痛。外用于乳疮。

**8924502***Cypselurus arcticeps* (Guenther)

动物名 弓头燕鳐鱼《拉汉脊椎动物名称》

文献名 飞鱼、鳐、文鳐鱼、燕鱼《中国药用动物志》,燕鳐、燕儿鱼《常见药用动物》

功效 肉:催产。用于难产,胃痛。外用于乳疮。

**8924503***Cypselurus bahiensis* (Ranzani)

动物名 背斑燕鳐鱼《动物图谱·鱼》

文献名 飞鱼、鳐、文鳐鱼、燕鱼《中国药用动物志》

功效 肉:催产。用于难产,胃痛,外用于乳疮。

**8924504***Cypselurus oligolepis* (Bleeker)

动物名 少鳞鳐鱼《拉汉脊椎动物名称》

文献名 少鳞燕鳐鱼《中国药用海洋生物》,小鳞燕鳐鱼、飞鱼、鳐、文鳐鱼、燕鱼《中国药用动物志》

功效 肉:催产。用于难产,胃痛。外用于乳疮。

**8924505***Cypselurus oxycephalus* (Bleeker)

动物名 尖头燕鳐鱼《拉汉脊椎动物名称》

文献名 尖头燕鳐《中国海洋药物》

地方名 浙江:燕子鱼,飞鱼,文鳐鱼。

功效 肉:催生治疾;煅灰:用于催产,胃痛,痔疾,疝气,乳疮。

**8924506***Cypselurus spiropterus* (Cuvier et Valenciennes)

动物名 点鳍燕鳐鱼《拉汉海洋生物名称》

文献名 飞鱼、鳐、文鳐鱼、燕鱼《中国药用动物志》

功效 肉:催产。用于难产,胃痛。外用于乳疮。

**89246 鳕科 Gadidae****8924601***Gadus macrocephalus* Tilesius

动物名 大头鳕《动物图谱·鱼》

药材名 鳕鱼《中国有毒和药用鱼类》

文献名 鳕、大口、大头鳕、大头鱼《辽宁动物志》

功效 全体:用于跌打损伤。

**8924602***Theragra chalcogramma* (Pallas)

动物名 狭鳕《拉汉脊椎动物名称》

文献名 明太鱼《中药材》

备考 精集:吉林省延吉市有以此伪充哈士蟆油。

**89247 海龙科 Syngnathidae****8924701***Corythoichthys crenulatus* (Weber)

动物名 刺冠海龙《拉汉脊椎动物名称》

文献名 海龙、冠海龙《中国海洋药物》

功 效 全鱼;补肾壮阳,散结消肿,舒筋活络,止血,催产。用于难产,阳痿,遗精,不孕,哮喘,颈淋巴结核,跌打损伤,消炎止痛,疔疮肿毒。

## 8924702

*Corythoichthys fasciatus* (Gray)

动物名 冠海龙《拉汉脊椎动物名称》

文献名 [海龙]《中药材》

备 考 部分地区以本品混称“海龙”入药。

## 8924703

*Corythoichthys tanakae* Jordan et Starks

动物名 海龙《中药名汇》

文献名 蛭海龙、海蛇《中药名汇》

功 效 全体;温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿遗精,癥瘕积聚,瘰癧痰核,跌扑损伤。外用于痈肿疔疮。

## 8924704

*Halicampus koiomatodon* (Bleeker)

动物名 海蠋鱼《中药材》

地方名 湖南:[海龙]。

备 考 湖南省发现药材市场有以此混作海龙。

## 8924705

*Hippocampus coronatus* Temminck et Schlegel

动物名 冠海马《动物图谱·鱼》

药材名 海马《海洋药物》

功 效 全体;补肾壮阳,舒筋活络,催产。

## 8924706

*Hippocampus histrix* Kaup

动物名 刺海马《动物图谱·鱼》

药材名 海马《本草拾遗》、《药典》

文献名 水马、鰐姑、马头鱼《中国药用动物志》

功 效 全体(去皮膜及内脏);温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿,遗尿,肾虚作喘,癥瘕积聚,跌扑损伤。外用于痈肿疔疮。

## 8924707

*Hippocampus japonicus* Kaup

动物名 海马《动物图谱·鱼》

药材名 海马《本草拾遗》、《药典》

文献名 小海马、海蛆《药典》,日本海马《中国药用动物志》

地方名 山东:龙落子;浙江:落龙子;其他:珊瑚海马、龙落子鱼、白海马、对马、马海鱼、水马、水雁、大马、中马、小马、叨马、潮马、直海马、小海狗、海狗子。

功 效 全鱼;温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿,遗尿,肾虚作喘,癥瘕积聚,跌扑损伤。外用于痈肿疔疮。

## 8924708

*Hippocampus kelloggi* Jordan et Snyder

动物名 克氏海马《动物图谱·鱼》

药材名 海马《本草拾遗》、《药典》

文献名 水马《抱朴子》,鰐姑《海南介语》,龙落子、马头鱼《动物学大辞典》,海蛆、小海狗、小海马《中国药用动物志》,大海马《中药通报》,线纹海马《药典》

地方名 浙江:琉球海马。

功 效 全鱼;温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿,遗

尿,肾虚作喘,癥瘕积聚,跌扑损伤。外用于痈肿疔疮。

## 8924709

*Hippocampus kuda* Bleeker

动物名 大海马《拉汉脊椎动物名称》

药材名 海马《本草拾遗》、《药典》

文献名 海马鱼、水马《中国海洋药物》,马头鱼《简明中医辞典》

功 效 全鱼(去皮膜及内脏);温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿,遗尿,肾虚作喘,癥瘕积聚,跌扑损伤。外用于痈肿疔疮。

## 8924710

*Hippocampus trimaculatus* Leach

动物名 三斑海马《动物图谱·鱼》

药材名 海马《本草拾遗》、《药典》

文献名 斑海马、水雁《中国药用动物志》

地方名 浙江:水马,海狗子;广西:龙落子,马头鱼;其他:刺海马,大海马。

功 效 全鱼;温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿,遗尿,肾虚作喘,癥瘕积聚,跌扑损伤。外用于痈肿疔疮。

## 8924711

*Solenognathus hardwickii* (Gray)

动物名 刀海龙《拉汉脊椎动物名称》

药材名 海龙《纲目拾遗》、《药典》

文献名 水雁《现代实用中药》,海蛇《药材资料汇编》

地方名 广西:杨枝鱼,钱串子,海钻。

功 效 全体(去皮膜及内脏);温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿遗精,癥瘕积聚,瘰癧痰核,跌扑损伤。外用于痈肿疔疮。

## 8924712

*Syngnathoides biaculeatus* (Bloch)

动物名 拟海龙《拉汉海洋生物名称》

药材名 海龙《纲目拾遗》、《药典》

文献名 水雁、海蛇《简明中医辞典》,海钻《鉴别手册》

功 效 全体(去皮膜及内脏);温肾壮阳,散结消肿,催产。用于阳痿遗精,癥瘕积聚,瘰癧痰核,跌扑损伤。外用于痈肿疔疮。

## 8924713

*Syngnathus acus* L.

动物名 尖海龙《动物图谱·鱼》

药材名 海龙《纲目拾遗》、《药典》

文献名 小海龙《鉴别手册》

地方名 杨枝鱼(东北、浙江);浙江:钱串子,竹鱼,鞋底索。

功 效 全体(去皮膜及内脏);温肾壮阳,散结消肿,催产。用于阳痿遗精,癥瘕积聚,瘰癧痰核,跌扑损伤,难产。外用于痈肿疔疮。

## 8924714

*Syngnathus cyanospilus* Bleeker

动物名 蓝海龙《拉汉脊椎动物名称》

药材名 海龙《中国海洋药物》

地方名 浙江:钱串子。

功效 全鱼:补肾壮阳,散结消肿,舒筋活络,止血,催产。用于难产,颈淋巴结结核,跌打损伤,消炎止痛,疔疮肿毒。

8924715

*Syngnathus djarong* Bleeker

动物名 低海龙《拉汉脊椎动物名称》

药材名 海龙《中国海洋药物》

地方名 浙江:钱串子。

功效 全鱼:补肾壮阳,散结消肿,舒筋活络,止血,催产。用于难产,颈淋巴结结核,跌打损伤,消炎止痛,疔疮肿毒。

备考 湖南省发现有以此混入尖海龙中,注意鉴别。

8924716

*Syngnathus schlegelii* Kaup

动物名 舒氏海龙《拉汉脊椎动物名称》

药材名 海龙《纲目拾遗》

文献名 舒海龙《中国有毒和药用鱼类》,许氏海龙《中国药用动物名录》

地方名 浙江:钱串子。

功效 全鱼:补肾壮阳,散结消肿,舒筋活络,止血,催产。用于难产,颈淋巴结结核,跌打损伤,消炎止痛,疔疮肿毒。

8924717

*Trachyrhamphus serratus* (Temminck & Schlegel)

动物名 粗吻海龙《中国药用动物志》

药材名 海龙《中国药用动物志》

文献名 海蛇《鉴别手册》

地方名 浙江:海钻子,海龙鱼。

功效 全体:温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿遗精,瘰癧积聚,瘰癧痰核,跌打损伤。外用于脓肿疔疮。

## 89248 烟管鱼科 *Fistulariidae*

8924801

*Fistularia petimba* Lacepede

动物名 烟管鱼《动物图谱·鱼》

药材名 马鞭鱼《中国有毒和药用鱼类》

文献名 鳞烟管鱼《中国有毒和药用鱼类》,火筒《动物图谱·鱼》

地方名 浙江:海灯芯,灯笼鱼,火管,竹鱼。

功效 全鱼:用于肾脏炎,食道癌。

## 89249 鲟科 *Sphyracnidae*

8924901

*Sphyracna pingus* Guenther

动物名 油鲟《动物图谱·鱼》

药材名 油鲟《中国海洋药物》

地方名 浙江:油鱼,香梭。

功效 肉:益胃健脾。

## 89250 鲻科 *Mugilidae*

8925001

*Mugil carinatus* Cuvier et Valenciennes

动物名 梭鲻《拉汉脊椎动物名称》

药材名 梭鲻《中国药用动物志》

文献名 梭鱼《中药材科技》,犬鱼、良背、际鱼、尖头西《中国药用动物志》

功效 肉:健脾益气,消食导滞。

8925002

*Mugil cephalus* L. --- *Mugil oer* Jordan et Starks

动物名 鲻《动物图谱·鱼》

药材名 鲻鱼《开宝本草》、《中药大辞典》

文献名 子鱼《纲目》,白眼《黄渤海鱼类调查报告》,梭鱼《脊椎动物分类学》,白眼梭鱼《动物图谱·鱼》,乌鲻、黑耳鲻、乌仔鱼、鲻鱼、犬鱼、乌头鱼《中国药用动物志》,只鱼《海洋药物民间应用》

地方名 浙江:知鱼,脂鱼,〔乌头〕。

功效 肉:健脾益气,消食导滞。用于脾虚泄泻,消化不良,小儿疳积及贫血。

8925003

*Mugil engeli* (Bleeker)

动物名 英氏鲻《拉汉脊椎动物名称》

药材名 英氏鲻《海洋药物》

功效 全体:用于扭伤疼痛。

8925004

*Mugil soiuy* Basilewsky

动物名 梭鲻《中国药用动物志》

文献名 赤眼梭、梭、红眼、赤眼鲻、肉棍子《中国药用动物志》

功效 肉:健脾益气,消食导滞。用于脾虚泄泻,消化不良,小儿疳积及贫血。

8925005

*Mugil vaigiensis* Quoy et Gaimard

动物名 截尾鲻《拉汉脊椎动物名称》

文献名 黄鲻、黄鸡鲛《中国药用动物志》

功效 肉:健脾益气,消食导滞。用于脾虚泄泻,消化不良,小儿疳积及贫血。

## 89251 马鲛科 *Polynemidae*

8925101

*Eleutheronema tetradactylus* (Shaw) --- *Polynemus tetradactylus* Shaw

动物名 四指马鲛《动物图谱·鱼》

文献名 鲤后《动物图谱·鱼》

地方名 四鳃鲈(辽宁、浙江);浙江:午鱼,马鲛鱼,马鲛,燕鱼。

功效 全体:用于消化不良,百日咳,扁桃体炎。

8925102

*Polynemus sextarius* Bloch et Schneider

动物名 六指马鲛《动物图谱·鱼》

药材名 六指马鲛《中国海洋药物》

地方名 浙江:马友鱼。

功效 全体:用于消化不良,百日咳,扁桃体炎。

**89252 鱧科 Ophiocephalidae****8925201***Channa asiaticus* (L.)

动物名 月鱧《动物图谱·鱼》

药材名 张公鱼《陆川本草》

文献名 七星鱼《薛德娟《系统动物学》》, 花鲢鱼《动物图谱·鱼》

地方名 广西: 花鲤鱼(陆川), 山斑鱼, 山花鱼, 点秤鱼, 天星鱼, 花星鱼, 朝北鱼。

功效 肉: 滋阴, 壮筋骨。用于阴虚, 四肢无力。

**8925202***Ophiocephalus argus* Cantor

动物名 乌鱧《医林纂要》、《动物图谱·鱼》

药材名 乌鱼《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 蠡鱼、鲩鱼、鰻、蠡鱼肠《别录》, 鰻、鲩《广雅》, 鰻鱼胆《日华子本草》, 黑鰻鱼《图经》, 玄鰻、文鱼《埤雅》, 七星鱼、乌喙、黑鱼《滇南本草》, 黑火柴头鱼《医林纂要》, 蛇皮鱼《医林纂要》, 鰻鱼血《本草再新》, 山生鱼、山椒鱼、高山源黑鱼《新纲》, 活头、财鱼《动物图谱·鱼》, 生鱼《汇编》, 斑鱼、蛇头鱼、父鱼《中国有毒和药用鱼类》, 黑鱼棒子《辽宁动物志》

地方名 四川: 乌棒、蛇鱼(南充)。

功效 鱼肉: 消肿, 清热, 祛风。用于小便不利, 风湿水肿, 肠风下血; 鱼头: 通经活血。用于月经错后, 经闭; 鱼胆: 泻火。用于喉痹, 目翳, 白疮疣。

**8925203***Ophiocephalus maculatus* (Lacepede)

动物名 斑乌鱧《动物图谱·鱼》

药材名 斑鰻《广西药用动物》

文献名 乌鱼、蛇头鱼、生鱼《中国有毒和药用鱼类》, 乌鰻、鰻鱼《动物图谱·鱼》

地方名 广西: 花鱼, 斑鱼。

功效 全鱼(去内脏): 消肿, 利尿, 清热, 补虚。用于湿痹, 面目浮肿, 大小便不利, 肠痔下血, 腰酸背痛, 明目清凉, 关节炎, 肾炎, 预防小儿麻疹。

**89253 合鳃鰻科 Symbranchidae****8925301***Monopterus albus* (Zuiew) --- *Mula alba* (Zuiew)

动物名 黄鳝《动物图谱·鱼》

药材名 鳝鱼《雷公炮炙论》、《汇编》

文献名 𩚑《山海经》, 𩚑鱼、乾鳝头《别录》, 黄𩚑《异苑》, 𩚑鱼《千金·食治》, 鳝鱼血《本草拾遗》, 鳝鱼皮《纲目》, 鳝鱼骨《本经逢原》, 鳝骨《医林纂要》, 鳝鱼肉《中国药用动物志》, 老鳝《海洋药物民间应用》

地方名 黑龙江: 海蛇; 广东: 黄鳝; 江苏: 长鱼; 广西: 𩚑, 黄鳝鱼; 其他: 田鳝。

功效 鳝鱼血: 祛风通络, 解毒, 明目。用于口眼歪斜, 跌打损伤, 疔疮, 口腔炎, 目翳; 鳝鱼肉: 滋阴补血。用于虚劳咳嗽, 小儿疳积, 神经性头痛; 鳝鱼头: 用于消渴, 痢疾, 消化不良; 鳝鱼骨: 用于疳疔; 鳝鱼皮: 用

于妇人乳结硬, 疼痛。

**89254 鲭科 Serranidae****8925401***Epinephelus amblycephalus* (Bleeker)

动物名 镶点石斑鱼《中国海洋药物》

地方名 浙江: 石斑鱼。

功效 肉: 健脾, 益气。

**8925402***Epinephelus awoara* (Temminck et Schlegel)

动物名 青石斑鱼《中国海洋药物》

地方名 浙江: 鲈鱼, 石斑鱼, 青斑, 青鲷。

功效 肉: 健脾, 益气。

**8925403***Epinephelus fario* (Thunberg)

动物名 鲈点石斑鱼(拉汉脊椎动物名称)

药材名 鲈点石斑鱼《海洋药物》

功效 全体: 用于神经衰弱, 头晕。

**8925404***Epinephelus malabaricus* (Bloch et Schneider)

动物名 点带石斑鱼《中国海洋药物》

文献名 石斑《动物图谱·鱼》

地方名 浙江: 带石斑, 过鱼。

功效 肉: 健脾, 益气。

**8925405***Epinephelus megachir* (Richardson)

动物名 指形石斑鱼《中国海洋药物》

地方名 浙江: 石斑鱼。

功效 肉: 健脾, 益气。多供妇女产后服用。

**8925406***Lateolabrax japonicus* (Cuvier et Valenciennes) ---*Labrax japonicus* Cuvier et Valenciennes

动物名 花鲈《动物图谱·鱼》

药材名 鲈鱼《食疗本草》、《中药大辞典》

文献名 真鲈、鲈鱼肉《中国药用动物志》, 蓼花《中药材科技》, 鲈鸡《海洋药物民间应用》

地方名 鲈、鲈子鱼、鲈板(辽宁、浙江); 辽宁: 鲈渣子[幼鱼]; 浙江: 鲈甲, 花寨。

功效 肌肉: 温胃, 祛寒, 止泻, 补气。用于脾胃虚寒作泻, 胎动不安, 产后无乳, 痢疾溃后久不愈合; 鲈鱼鳃: 止咳化痰。用于小儿百日咳。

**8925407***Siniperca chuatsi* (Basil.)

动物名 鳊《动物图谱·鱼》

药材名 鳊鱼《开宝本草》、《汇编》

文献名 鳊豚、水豚《日华子本草》, 石桂鱼《开宝本草》, 鰻鱼《纲目》, 锦鳞鱼《东医宝鉴》, 桂鱼《本草求真》, 鳊花、济花鱼、烟嘴鳊鱼《汇编》, 鳊鱼肉、鳊花鱼《中国药用动物志》, 白桂、季花鱼、胖鳊《中国有毒和药用鱼类》, 鳊花鱼、母猪壳《动物图谱·鱼》

地方名 辽宁: 熬花, 花鲫鱼; 山东: 季鱼。

功效 肉: 补气, 健脾。用于虚劳损伤, 肠风下血。

## 8925408

*Siniperca scherzeri* (Stein.)

- 动物名 斑鳊《动物图谱·鱼》  
 药材名 斑鳊《神农架药录》  
 文献名 桂花鱼、菊花鱼《动物图谱·鱼》  
 地方名 湖北：鱼鳊。  
 功效 肉：补中益气。健脾开胃。

## 89255 大眼鲷科 Priacanthidae

## 8925501

*Priacanthus macracanthus* Cuvier et Valenciennes

- 动物名 短尾大眼鲷《动物图谱·鱼》  
 地方名 浙江：大眼鱼，大目，大眼鸡，大木连。  
 功效 肉：消食利水。

## 89256 鳓科 Sillagrinidae

## 8925601

*Sillago japonica* Temminck et Schlegel

- 动物名 少鳞鳓《中国海洋药物》  
 地方名 浙江：鳓，沙钻。  
 功效 肉：利水消肿。

## 8925602

*Sillago sihama* (Forsk.)

- 动物名 鳓《动物图谱·鱼》  
 文献名 多鳞鳓《中国海洋药物》  
 地方名 浙江：麦穗，船丁鱼，沙钻。  
 功效 肉：利水消肿。

## 89257 方头鱼科 Branchiostegidae

## 8925701

*Branchiostegus japonicus* (Houttuyn)

- 动物名 方头鱼《动物图谱·鱼》  
 文献名 日本方头鱼《中国海洋药物》  
 地方名 浙江：马头鱼，日本加吉。  
 功效 肉：清热解毒。

## 89258 鲈科 Garangidae

## 8925801

*Decapterus maruadsi* (Temminck et Schlegel)

- 动物名 蓝圆鲈《动物图谱·鱼》  
 药材名 棍子鱼(浙江)  
 文献名 马鲛棍《动物图谱·鱼》  
 地方名 浙江：圆鲈，棍子，黄尾，巴浪。  
 功效 腌制的幼鱼：利气化痰。用于久痢，咳血。

## 8925802

*Trachurus japonicus* (Temminck et Schlegel)

- 动物名 竹荚鱼《动物图谱·鱼》  
 药材名 竹荚鱼《中国海洋药物》  
 文献名 池鱼姑、山台鱼、刺鲅《动物图谱·鱼》  
 地方名 浙江：大眼棍，池鱼，巴浪。  
 功效 肉：促使疮疖排脓。

## 89259 乌鲳科 Formionidae

## 8925901

*Formio niger* (Bloch)

- 动物名 乌鲳《动物图谱·鱼》  
 药材名 乌鲳《中国海洋药物》  
 文献名 乌仓、黑昌《动物图谱·鱼》  
 地方名 浙江：乌鳞鲳，墨鲳，铁板鲳，黑鲳。  
 功效 全鱼：益气健脾。

## 89260 鲷科 Leiognathidae

## 8926001

*Leiognathus bindus* (Cuvier et Valenciennes)

- 动物名 黄斑鲷《拉汉脊椎动物名称》  
 药材名 黄斑鲷《中国药用动物志》  
 文献名 金仔花《中国动物药》  
 功效 肉：健脾益气。用于小儿消化不良，肝炎恢复期。

## 8926002

*Leiognathus elongatus* (Guenther)

- 动物名 长体鲷《动物图谱·鱼》  
 药材名 长鲷《中国海洋药物》  
 文献名 长腰更、更仔《动物图谱·鱼》  
 地方名 浙江：花令仔。  
 功效 肉：健脾益气。用于小儿消化不良。

## 8926003

*Leiognathus fasciatus* Lacepede

- 动物名 长棘鲷《动物图谱·鱼》  
 药材名 长棘鲷《中国药用动物志》  
 文献名 花鲷、更仔、游箭《动物图谱·鱼》  
 功效 肉：健脾益气。用于小儿消化不良，肝炎恢复期。

## 8926004

*Leiognathus insidiator* (Bloch)

- 动物名 静鲷《拉汉脊椎动物名称》  
 药材名 静鲷《中国有毒和药用鱼类》  
 功效 肉：健脾利气。用于小儿消化不良，肝炎恢复期。

## 89261 石鲈科 Pomadasyidae

## 8926101

*Hapalogenys kishinouyei* Smith et Pope

- 动物名 纵带髯鲈《拉汉脊椎动物名称》  
 药材名 纵带髯鲈《中国有毒和药用鱼类》  
 功效 熟鱼鲮：补气活血；鲜鱼鲮：清热消炎。外用于腮腺炎。

## 8926102

*Hapalogenys mucronatus* (Eydoux et Souleyet)

- 动物名 条纹髯鲈《动物图谱·鱼》  
 文献名 横带髯鲈、打铁皮、海猴、铜盆鱼、金鼓《中国药用动物志》，海鲈《辽宁动物志》  
 功效 鱼鲮：清热消炎。用于腮腺炎。



## 8926103

Hapalogenys nigripinnis (Temminck et Schlegel)

- 动物名 黑鳍髭鲷《动物图谱·鱼》  
文献名 鳍鳍、唇唇《中国药用动物志》  
功效 鳔:清热消炎。用于腮腺炎。

## 8926104

Hapalogenys nitens Richardson

- 动物名 斜带髭鲷《拉汉脊椎动物名称》  
文献名 海猴《中国动物药》,黑鳍髭鲷《辽宁动物志》  
地方名 辽宁:黑加吉,唇唇;浙江:髭鲷,打铁鱼。  
功效 鳔:清热解毒。用于腮腺炎。

## 89262 石首鱼科 Sciaenidae

## 8926201

Argyrosomus argentatus (Houttuyn)

- 动物名 白姑鱼《动物图谱·鱼》  
药材名 白姑鱼《中国海洋药物》  
地方名 浙江:米鱼龟,白梅。  
功效 全鱼、鳔、耳石:补肾益气,养血活血,利水消肿。用于产后腹痛,肾炎浮肿,肾虚遗精。

## 8926202

Atrobucca nibe (Jordan et Thompson)

- 动物名 黑姑鱼《中国海洋药物》  
地方名 浙江:黑梅。  
功效 全鱼、鳔、耳石:补肾益气,养血活血,利水消肿。用于产后腹痛,肾炎浮肿,肾虚遗精。

## 8926203

Bahaba flavolabiata (Lin)

- 动物名 黄唇鱼《拉汉脊椎动物名称》  
药材名 黄唇鱼《中国药用动物志》  
文献名 金钱鲢《中国药用动物志》  
地方名 浙江:黄柑,黄鱼。  
功效 鳔:滋补肝肾。用于肝、肾虚损;鳃:活血调经。用于血崩;心脏:用于胸痛;肝(制成鱼肝油):用于神经衰弱,视力不佳,肺结核等;耳石:利尿,通淋。用于尿路结石,鼻炎。

## 8926204

Collichthys lucidus (Richardson)

- 动物名 棘头梅童鱼《动物图谱·鱼》  
药材名 梅童鱼《中国海洋药物》  
地方名 浙江:朱梅鱼,梅子,梅子鱼。  
功效 全鱼:滋补强壮,健脾开胃。用于小儿夜尿,贫血,消化不良。

## 8926205

Collichthys niveatus Jordan et Starks

- 动物名 黑鳃梅童鱼《中国海洋药物》  
药材名 梅童鱼《中国海洋药物》  
地方名 浙江:梅子鱼。  
功效 全鱼:滋补强壮,健脾开胃。用于小儿夜尿,贫血,消化不良。

## 8926206

Johnius belengeri (Cuvier et Valenciennes)

- 动物名 叫姑鱼《动物图谱·鱼》  
药材名 叫姑鱼《中国海洋药物》  
文献名 皮氏叫姑鱼《中国海洋药物》  
地方名 浙江:气昆鱼,沙鲷。  
功效 肉、鳔:消食,利水。

## 8926207

Müchthys minuy (Basilewsky) --- Sciaena minuy Basilewsky

- 动物名 鲩《动物图谱·鱼》  
药材名 鲩鱼鳔《中国药用动物志》  
文献名 鲩鱼《拉汉海洋生物名称》,鲩鱼、鲩鱼《海洋药物民间应用》,鲩《汇编》  
地方名 敏子(辽宁、山东、浙江);浙江:米鱼,敏鱼。  
功效 鱼鳔:补虚止血,补肾固精。用于肾虚滑精,吐血。

## 8926208

Nibea albiflora (Richardson) --- Corvina albiflora Richardson

- 动物名 黄姑鱼《动物图谱·鱼》  
药材名 铜罗鳔《中国药用动物志》  
文献名 铜鱼《中药材科技》,春只、花鲷《中国有毒和药用鱼类》  
地方名 辽宁:铜罗鱼;浙江:山头黄鱼,黄姑子,黄婆鸡,皮鲷。  
功效 鳔:利尿消肿,补肾。用于慢性肾炎,浮肿,产后腹痛,肾虚遗精。

## 8926209

Pseudosciaena crocea (Richardson)

- 动物名 大黄鱼《动物图谱·鱼》  
药材名 鱼脑石《汇编》  
文献名 黄花鱼《临海异物志》,石头鱼《岭表录异》,鲷鲷《齐民要术》,鳔《医心方》,石首鱼头石《千金方》,石首鱼鲞《食疗本草》,鲷鲷、鱼白、鳔《本草拾遗》,石首鱼《食性本草》,石首鱼脑石《日华子本草》,白鲞《尔雅翼》,鱼胶《三因方》,白鳔《普济方》,鲞鱼、鱼脬、鲷胶、鱼鳔、石首鳔、鳔胶《纲目》,石首鱼鲃《濒湖集简方》,石首骨《本草汇言》,黄鱼《本草述》,海鱼、黄瓜鱼、鱼肚《医林纂要》,鱼首石《简明中医辞典》,黄花《中药材科技》,鱼枕骨《中国药用动物志》  
地方名 大鲜(山东、浙江);山东:大黄花鱼;浙江:黄鱼脑石,桂花黄鱼;其他:鱼耳石,脑石,鼓浪石,石青鱼子。

功效 耳石(鱼脑石):利尿,通淋。用于尿路结石,鼻炎;全体(去内脏):开胃消食,止痢。用于食欲不振,消化不良,泄泻;鳔:用于乳痈初起;精巢:提取鱼精蛋白,用作某些抗菌素和激素的延效剂;鳔:补肾益精,滋养筋脉,止血散瘀,消肿。用于肾虚滑精,产后风痉,破伤风,吐血,血崩,创伤出血,痔疮。

## 8926210

Pseudosciaena polyactis Bleeker

- 动物名 小黄鱼《动物图谱·鱼》

药材名 鱼脑石《汇编》

文献名 黄花鱼《临海异物志》, 石头鱼《岭表录异》, 鲢鱼《齐民要术》, 鲢《医心方》, 石首鱼头石《千金方》, 石首鱼鲞《食疗本草》, 鲢鱼、鱼白、鲢《本草拾遗》, 石首鱼《食性本草》, 石首鱼脑中枕《日华子本草》, 白鲞《尔雅翼》, 鱼胶《三因方》, 白鲢《普济方》, 鲞鱼、鱼脬、鲞胶、鱼鲞《纲目》, 石首鱼鲞《濒湖集简方》, 石首骨《本草汇言》, 黄鱼《本草述》, 海鱼、黄瓜鱼、鱼肚《医林纂要》, 花鱼、小黄花鱼、古鱼、大眼《中药志》, 鱼鲞、鱼首石、鱼枕骨《中国药用动物志》

地方名 浙江: 叫叫儿, 小鲜。

功效 耳石(鱼脑石): 利尿, 通淋。用于尿路结石, 鼻炎; 全体(去内脏): 开胃消食, 止痢。用于食欲不振, 消化不良, 泄泻; 鳍: 用于乳痈初起; 精巢: 提取鱼精蛋白, 用作某些抗菌素和激素的延效剂; 鳔: 用于肾虚滑精, 产后风痉, 破伤风, 吐血, 血崩, 创伤出血, 痔疮。

### 89263 鲷科 Sparidae

#### 8926301

*Pagrosomus major* (Temminck et Schlegel)

动物名 真鲷《动物图谱·鱼》

文献名 加级鱼、红加级、红鲷《动物图谱·鱼》, 加拉鱼、王山鱼、红加吉《中国海洋药物》

功效 肉: 补肾益气, 活血养血。

#### 8926302

*Sparus latus* Houttuyn

动物名 黄鳍鲷《动物图谱·鱼》

文献名 黄脚鲷、交鲷《动物图谱·鱼》, 黄翅《海洋药物民间应用》

地方名 浙江: 黄脚立。

功效 全体: 健脾利水。用于脾虚水肿, 小儿脾胃不健, 消化不良, 病后气血虚弱。

#### 8926303

*Sparus macrocephalus* (Basilewsky)

动物名 黑鲷《动物图谱·鱼》

文献名 海鲷、黑鲷《动物图谱·鱼》, 岩雀、黑立、黑加吉《中国海洋药物》

功效 肉: 补胃健脾, 益气。

#### 8926304

*Taia tumifrons* (Temminck et Schlegel)

动物名 黄鲷《动物图谱·鱼》

文献名 赤宗、鲷、黄加拉《动物图谱·鱼》, 黄加立、波立、板鱼《中国海洋药物》

功效 全鱼: 滋补益气, 养血。

### 89264 金钱鱼科 Scatophagidae

#### 8926401

*Scatophagus argus* (L.)

动物名 金钱鱼《动物图谱·鱼》

药材名 金钱鱼《中国药用动物志》

文献名 金鼓、金鼓鱼《中国药用海洋生物》, 铺铁《海洋药物民间应用》。

功效 胆: 平肝镇惊。用于小儿惊风, 退热止痢。

### 89265 隆头鱼科 Labridae

#### 8926501

*Choerodon azurio* (Jordon et Snyder)

动物名 蓝猪齿鱼《动物图谱·鱼》

药材名 蓝猪齿鱼《中国海洋药物》

地方名 浙江: 鸚鵡鱼。

功效 肉: 健脾胃。

### 89266 鰐科 Uranoscopidae

#### 8926601

*Gnathagnus elongatus* (Temminck et Schlegel)

动物名 青鰐《动物图谱·鱼》

药材名 鰐鱼《中国海洋药物》

功效 肉: 清热解毒。

#### 8926602

*Uranoscopus japonicus* Houttuyn

动物名 网纹鰐《动物图谱·鱼》

文献名 日本鰐《中国海洋药物》

地方名 浙江: 金刚脚趾头, 铜锣槌。

功效 肉: 健脾胃, 助消化。

#### 8926603

*Uranoscopus oligolepis* Bleeker

动物名 少鳞鰐《拉汉海洋生物名称》

药材名 少鳞鰐《中国海洋药物》

地方名 浙江: 大头翁, 铜锣锤, 纹颈鰐。

功效 肉: 清热解毒。

### 89267 绵鳎科 Zoarcidae

#### 8926701

*Zoarces elongatus* Kner --- *Enchelyopus elongatus* (Kner)

动物名 绵鳎《动物图谱·鱼》

文献名 长绵鳎《中国海洋药物》

地方名 浙江: 光鱼。

功效 全鱼: 滋补强壮。

### 89268 篮子鱼科 Siganidae

#### 8926801

*Siganus fuscescens* (Houttuyn)

动物名 褐篮子鱼《动物图谱·鱼》

药材名 篮子鱼《中国海洋药物》

文献名 褐斑篮子鱼《中国药用海洋生物》, 黎猛、泥猛《中国药用动物志》, 黄啼《动物图谱·鱼》

功效 胆: 清热解毒。用于中耳炎。

#### 8926802

*Siganus guttatus* (Bloch)

动物名 点篮子鱼《拉汉脊椎动物名称》

药材名 曲石鱼《中国有毒和药用鱼类》

功效 胆: 清热解毒。外用于中耳炎。

#### 8926803

*Siganus javus* (L.)

动物名 爪哇篮子鱼《拉汉脊椎动物名称》  
文献名 蠕纹篮子鱼《中国有毒和药用鱼类》  
功效 胆:清热解毒。外用于中耳炎。

## 8926804

*Siganus oramin* (Bloch et Schneider)

动物名 黄斑篮子鱼《动物图谱·鱼》  
药材名 篮子鱼《中国海洋药物》  
地方名 浙江:亮鱼,黎猛,莹斑篮子鱼。  
功效 胆:清热解毒。外用于中耳炎。

## 8926805

*Siganus virgatus* (Cuvier et Valenciennes)

动物名 带篮子鱼《中国有毒和药用鱼类》  
功效 胆:清热解毒。外用于中耳炎。

## 89269 带鱼科 Trichiuridae

8926901 见 8926903a

## 8926902

*Trichiurus haumela* (Forsk.)

动物名 带鱼《动物图谱·鱼》  
药材名 带鱼《本草从新》、《中药大辞典》  
文献名 鞭鱼《医林纂要》,带柳《福清县志》,裙带鱼《柑园小识》,海刀鱼、鳞刀鱼《黄渤海鱼类调查报告》,刀鱼、牙带、白带《中国有毒和药用鱼类》  
功效 肌肉:滋补养肝。用于慢性肝炎,病后虚弱;头:和中,开胃,祛风杀虫。用于呃逆;鱼鳞:止血。用于外伤出血。

## 8926903

*Trichiurus multicus* Gray

动物名 小带鱼《动物图谱·鱼》  
药材名 带鱼《中国药用动物志》  
文献名 刀带、白带鱼、牙带、小金叉《中国药用动物志》,骨带、小带《动物图谱·鱼》  
地方名 辽宁:带鱼条子,鳞刀梢;浙江:刀鱼,小牙带。  
功效 肌肉:滋补养肝。用于慢性肝炎,病后虚弱;头:和中,开胃,祛风杀虫。用于呃逆;鱼鳞:止血。外用于外伤出血。

## 8926903a

*Trichiurus savala* (Cuvier et Valenciennes)

动物名 沙带鱼《动物图谱·鱼》  
药材名 带鱼《中国药用动物志》  
文献名 青宗带《动物图谱·鱼》  
地方名 浙江:刀鱼,白带。  
功效 肌肉:滋补养肝。用于慢性肝炎,病后虚弱;头:和中,开胃,祛风杀虫。用于呃逆;鱼鳞:止血。用于外伤出血。

## 89270 鲭科 Scombridae

## 8927001

*Pneumatophorus japonicus* (Houttuyn)

动物名 鲈鱼《动物图谱·鱼》  
药材名 鲈鱼《中国药用动物志》

文献名 油桐鱼、鲭鲱《中国药用海洋生物》,鲈巴鱼《中国动物药》,青花鱼、鲭《中国药用动物志》,台巴鱼、油筒鱼、花池、交池《动物图谱·鱼》

地方名 辽宁:鲈;浙江:青川,青占,油筒,花鲮。

功效 肉:滋补强壮。用于慢性胃肠道疾病,肺癆虚损,神经衰弱。

## 89271 鲛科 Cybiidae

## 8927101

*Sawara niphonia* (Cuvier et Valenciennes) --- *Scomberomorus niphonius* (Cuvier et Valenciennes)

动物名 蓝点鲛《动物图谱·鱼》  
药材名 鲛鱼鳃《中国药用动物志》  
文献名 日本马鲛《拉汉脊椎动物名称》,蓝点马鲛、马鲛鱼《中国药用动物志》,马加、尖头马加《海洋药物民间应用》

地方名 辽宁:蓝点无鳔鱼,鲛鱼,燕鱼。

功效 鳃:补气,平喘。用于体弱咳嗽;肉:滋补强壮。可提取细胞色素 C。

## 8927102

*Scomberomorus guttatus* (Bloch et Schneider)

动物名 斑点马鲛《拉汉海洋生物名称》  
药材名 马鲛鱼《中国海洋药物》  
地方名 浙江:马交鱼,马鲛。  
功效 肉、鳃:健胃,补气,平喘。用于体弱咳嗽,小儿麻疹。

## 8927103

*Scomberomorus koreanus* (Kishinouye)

动物名 朝鲜马鲛《拉汉脊椎动物名称》  
药材名 马鲛鱼《中国海洋药物》  
文献名 扁鲛、朝鲜鲛、朝鲜无鳔鲛《辽宁动物志》  
地方名 浙江:马鲛。  
功效 肉、鳃:滋补强壮,补气,平喘。用于体弱咳嗽;肉:可提取细胞色素 C。

## 89272 鲳科 Stromateidae

## 8927201

*Psenopsis anomala* (Temminck et Schlegel)

动物名 刺鲳《动物图谱·鱼》  
药材名 刺鲳《中国海洋药物》  
文献名 鲛鱼、燕鱼《动物图谱·鱼》  
地方名 浙江:昌鱼,沙鲳,南鲳,瓜核。  
功效 全鱼:益气养血,健胃,柔筋利骨。用于消化不良,脾虚泄泻,贫血,筋骨酸痛,四肢麻木。

## 8927202

*Stromateoides argenteus* (Euphrasen)

动物名 银鲳《动物图谱·鱼》  
药材名 鲳鱼《本草拾遗》、《中药大辞典》  
文献名 鲳鱼《临海异物志》,昌侯鱼、昌鼠《本草拾遗》,狗瞠睡鱼《岭表录异》,鲳鲷《医林纂要》,镜鱼、平鱼《黄渤海鱼类调查报告》,白昌《动物图谱·鱼》,白鲳《中国药用动物志》,鲳板《海洋药物

## 民间应用)

地方名 叉片鱼(江苏、浙江);浙江:车片鱼。

功效 肉:补胃,益气,养血,柔筋。用于消化不良,脾虚泄泻,贫血,筋骨酸痛,四肢麻木。

## 8927203

*Stromateoides nozawae* Ishikawa

动物名 燕尾鲷(拉汉脊椎动物名称)

药材名 鲷鱼(中国药用动物志)

地方名 浙江:扁鲷,燕儿鲷。

功效 肉:补胃,益气,养血,柔筋。用于消化不良,脾虚泄泻,贫血,筋骨酸痛,四肢麻木。

## 8927204

*Stromateoides sinensis* (Euphrasen)

动物名 中国鲷(动物图谱·鱼)

药材名 鲷鱼(中国药用动物志)

文献名 斗底昌,仓鱼(动物图谱·鱼)

地方名 浙江:吕鱼,平鱼。

功效 肉:补胃,益气,养血,柔筋。用于消化不良,脾虚泄泻,贫血,筋骨酸痛,四肢麻木。

## 89273 金枪鱼科 Thunnidae

## 8927301

*Auxis tapeinosoma* (Bleeker)

动物名 圆鳐(拉汉海洋生物名称)

文献名 鳐(中药材科技),圆鳐(中国药用动物名录)

功效 胰脏:可提取胰岛素。

## 89274 攀鲈科 Anabantidae

## 8927401

*Macropodus opercularis* (L.)

动物名 叉尾斗鱼(动物图谱·鱼)

药材名 菩藻鱼(陆川本草)

文献名 斗鱼、花蝶鱼(薛德煊《系统动物学》),钱斗鱼(脊椎动物分类学),蝴蝶鱼、火烧板(动物图谱·鱼),歧尾斗鱼(中药大辞典)

功效 肉:解疮毒,消炎。用于眼角膜疮痍。

## 89275 塘鳢科 Eleotridae

## 8927501

*Bostrichthys sinensis* (Lacepede)

动物名 乌塘鳢(动物图谱·鱼)

药材名 乌塘鳢鱼(中国海洋药物)

文献名 汶鱼(动物图谱·鱼)

地方名 浙江:乌鳢,涂鱼。

功效 全鱼:滋补强壮,健脾,益气。

## 8927502

*Odontobutis obscura* (Temminck et Schlegel)

动物名 沙塘鳢(动物图谱·鱼)

药材名 塘鳢鱼(中药大辞典)

文献名 土部、鲈鳢、荡部、荡鱼(演繁露),吐哺(三才藻异),土鳢鱼(姚可成《食物本草》),土

附、土附子(纲目拾遗),菜花鱼(嘉兴县志),鲈鱼(湖州府志),土鳢、土哺(钱塘县志),土鲈(随息居饮食谱),暗色鲈鱼(拉汉海洋生物名称),塘鳢、沙乌鳢、蒲鱼、土婆鱼、土布鱼(动物图谱·鱼),暗色杜父鱼、暗色土布鱼、沙鳢(辽宁动物志)

功效 全体:补脾胃,益元气,养荣血。用于噎膈,水肿湿气,疮疥;卵:助相火,暖腰肾。

## 89276 鰕虎鱼科 Gobiidae

## 8927601

*Acanthogobius flavimanus* (Temminck et Schlegel)---*Gobius flavimanus* Temminck et Schlegel

动物名 刺鰕虎鱼(拉汉脊椎动物名称)

药材名 鰕虎鱼(姚可成《食物本草》)、《中药大辞典》

文献名 鲞、蛇(尔雅),吹沙(临海异物志),沙沟鱼、沙鳢、呵浪鱼(纲目),沙竹(医林纂要),沙吻鱼、沙鲷(中国药用动物志),鲞鱼(长春中医学院学报),黄鳍刺鰕虎鱼(中国海洋药物)

地方名 光鱼、油光鱼(辽宁、浙江)。

功效 肉:暖中益气,补肾壮阳。用于虚寒腹痛,胃痛,痞积,消化不良,阳痿,遗精,早泄,小便淋沥。

备考 《脊椎动物分类学》刺鰕虎鱼学名为 *Acanthogobius ommaturatus* (Richardson)

## 8927602

*Chaeturichthys stigmatias* Richardson

动物名 矛尾鰕虎鱼(动物图谱·鱼)

药材名 鰕虎鱼(中国海洋药物)

地方名 浙江:光鱼。

功效 全鱼:补肾壮阳,暖中益气。

## 8927603

*Ctenogobius shennongensis* Yang et Xie

动物名 神农栉鰕虎(神农架药录)

药材名 翅鱼(神农架药录)

功效 除去内脏全体:补虚,清热,滋阴。

## 8927604

*Ctenotryparchen microcephalus* (Bleeker)

动物名 小头栉孔鰕虎鱼(拉汉脊椎动物名称)

地方名 辽宁:红虫,高粱叶,钢条。

功效 全体:补脾利湿。用于黄汗,小儿夜尿症,盗汗。

## 8927605

*Odontamblyopus rubicondus* (Hamilton)

动物名 红狼牙鰕虎鱼(中国药用动物名录)

文献名 狼鱼、狼条、乃鱼、赤乃、红头鳢、狼鰕虎鱼(动物图谱·鱼)

功效 全体:用于鼻衄。

备考 《脊椎动物分类学》狼鰕虎鱼学名为 *Taenioides abbotti* Jordan et Starks (拟鰕虎鱼科 *Gobioididae*)

## 8927606

*Trypauchen vagina* (Bloch et Schneider)

动物名 孔鰻虎鱼《动物图谱·鱼》  
 药材名 孔鰻虎鱼《中国药用动物名录》  
 文献名 木乃、红条、银珠笔《动物图谱·鱼》，赤鲨  
 《脊椎动物分类学》  
 功效 全体：用于鼻衄。

### 89277 弹涂鱼科 Periophthalmidae

#### 8927701

*Boleophthalmus pectinirostris* (L.)  
 动物名 大弹涂鱼《动物图谱·鱼》  
 药材名 跳跳鱼《海洋药物民间应用》  
 文献名 弹泥《海洋药物民间应用》  
 地方名 浙江：花跳跳。  
 功效 全体：补肾壮腰，活血止痛，解毒。用于肾虚腰痛，扭伤，坐骨神经痛，耳鸣，耳聋，头晕，老年眼流泪，盗汗，阳痿，小儿夜尿。

#### 8927702

*Periophthalmus cantonensis* (Osbeck)  
 动物名 弹涂鱼《动物图谱·鱼》  
 药材名 跳跳鱼《中药材科技》  
 文献名 海兔《动物图谱·鱼》  
 地方名 辽宁：蹦蹦狗鱼；浙江：跳跳鱼，泥猴，沙粗，蓝河狗。  
 功效 全体：滋补益气。用于耳鸣及重听，腰酸，肾虚，阳痿。

#### 8927703

*Scartelaos gigas* Chu et Wu  
 动物名 大青弹涂鱼《拉汉海洋生物名称》  
 药材名 跳跳鱼《中国海洋药物》  
 功效 全体：滋补益气。

#### 8927704

*Scartelaos viridis* (Hamilton)  
 动物名 青弹涂鱼《动物图谱·鱼》  
 药材名 跳跳鱼《中国海洋药物》  
 功效 全体：滋补益气。

### 89278 鲈科 Scorpaenidae

#### 8927801

*Hoplosebastes armatus* (Cuvier et Valenciennes)  
 动物名 棘鲈《拉汉海洋生物名称》  
 药材名 鲈鱼《中国海洋药物》  
 功效 肉：清热解毒，消肿止痛。

#### 8927802

*Scorpaena izuensis* Jordan et Starks  
 动物名 裸胸鲈《动物图谱·鱼》  
 药材名 裸胸鲈《中国海洋药物》  
 文献名 鲈《脊椎动物分类学》  
 地方名 浙江：伊豆鲈，笠子。  
 功效 肉：暖中开胃。

#### 8927803

*Scorpaena neglecta* Temminck et Schlegel  
 动物名 斑鳍鲈《拉汉海洋生物名称》

药材名 斑鳍鲈《中国海洋药物》  
 地方名 浙江：常鲈，红虎，石狗。  
 功效 肉：暖中开胃。

#### 8927804

*Sebastes innerrnis* Cuvier et Valenciennes  
 动物名 无备平鲈《中国海洋药物》  
 药材名 黑石鲈《中国海洋药物》  
 功效 肉：健脾开胃。

#### 8927805

*Sebastiscus marmoratus* (Cuvier et Valenciennes)  
 动物名 褐菖鲈《拉汉海洋生物名称》  
 药材名 石头鲈《中国海洋药物》  
 地方名 浙江：石狗子，过狗虎。  
 功效 肉：健脾益气。

### 89279 毒鲈科 Synanceiidae

#### 8927901

*Inimicus japonicus* (Cuvier et Valenciennes) --- *Pelor japonicus* Cuvier et Valenciennes  
 动物名 鬼鲈《动物图谱·鱼》  
 药材名 鱼虎《本草拾遗》  
 文献名 上奴鱼《纲目》，日本鬼鲈《拉汉脊椎动物名称》，鬼鲈肉《中国药用动物志》，虎鱼《中国海洋药物》  
 地方名 山东：蝎子鱼；浙江：海老虎，老虎鱼，海蝎子。  
 功效 肌肉：滋补肝肾。用于肾虚腰痛，慢性肝炎。

备考 棘基毒腺有剧毒。

#### 8927902

*Minou monodactylus* (Bloch et Schneider)  
 动物名 虎鲈《动物图谱·鱼》  
 药材名 老虎鱼《中国海洋药物》  
 文献名 单指虎鲈《拉汉海洋生物名称》  
 地方名 浙江：软鱼，虎鱼。  
 功效 肉：清热解毒，舒筋骨。用于腰腿痛，疮疖。

### 89280 鲂鳍科 Triglidae

#### 8928001

*Chelidonichthys kumu* (Lesson et Garnot)  
 动物名 绿鳍鱼《动物图谱·鱼》  
 药材名 绿鳍鱼《中国药用动物名录》  
 地方名 辽宁：绿翅鱼，莺莺鱼。  
 功效 全体：用于风湿性腰背痛，神经衰弱。

#### 8928002

*Lepidotrigla alata* (Houttuyn)  
 动物名 翼红娘鱼《拉汉海洋生物名称》  
 药材名 红鱼《中国海洋药物》  
 地方名 浙江：红头鱼。  
 功效 全体：健脾益气。

#### 8928003

*Lepidotrigla micropterus* Guenther

动物名 短鳍红娘鱼(拉汉海洋生物名称)  
 药材名 红鱼《中国海洋药物》  
 文献名 红娘鱼《动物图谱·鱼》  
 地方名 浙江:火鱼,红头鱼,红娘子,角鱼,穷头鱼。  
 功效 全体:健脾益气。

### 89281 六线鱼科 Hexagrammidae

#### 8928101

*Agrammus agrammus* (Temminck et Schlegel)

动物名 斑头鱼《动物图谱·鱼》  
 药材名 褐斑鱼《中国海洋药物》  
 功效 全体:用于消化不良。

#### 8928102

*Hexagrammos otakii* Jordan et Starks

动物名 六线鱼《动物图谱·鱼》  
 文献名 大泷六线鱼《中国海洋药物》,欧氏六线鱼《拉汉海洋生物名称》  
 地方名 浙江:黄鱼。  
 功效 全体:用于消化不良。

### 89282 鲷科 Platycephalidae

#### 8928201

*Platycephalus indicus* (L.)

动物名 鲷《动物图谱·鱼》  
 药材名 鲷鱼《海洋药物民间应用》  
 文献名 胀甲鱼、牛尾鱼《海洋药物民间应用》  
 地方名 浙江:刀鱼,竹甲,辫子鱼,拐子鱼。  
 功效 全体:消肿利水,消结去胀。用于肝硬化腹水,关节风湿痛。

#### 8928202

*Suggrundus meerderroorti* (Bleeker)

动物名 大眼鲷(拉汉海洋生物名称)  
 药材名 大眼鲷《中国海洋药物》  
 地方名 浙江:大眼泡。  
 功效 全体:清热解毒。

### 89283 杜父鱼科 Cottidae

#### 8928301

*Cottus pollux* Guenther

动物名 杜父鱼《脊椎动物分类学》  
 药材名 杜父鱼《本草拾遗》、《中药名汇》  
 文献名 渡父鱼、黄鲈鱼、船碇鱼、伏念鱼《纲目》,姆指杜父鱼《拉汉海洋生物名称》  
 功效 肉:止胃寒泄泻。

#### 8928302

*Trachidermus fasciatus* Heckel

动物名 松江鲈《动物图谱·鱼》  
 药材名 松江鲈鱼(江苏)、《中国药用动物志》  
 地方名 媳妇鱼(辽宁、浙江);山东:四鳃鲈。  
 功效 肉:健脾益气,益肝肾,安胎。用于慢性胃痛,脾虚泄泻,小儿疳积,消化不良,消瘦。  
 备考 此鱼虽称为鲈,实则与鲈迥不相同,江苏松

江古来以产此鱼著称。

### 89284 鲆科 Bothidae

#### 8928401

*Paralichthys olivaceus* (Temminck et Schlegel)

动物名 牙鲆《动物图谱·鱼》  
 药材名 牙鲆《中国药用动物志》  
 文献名 左偏、左口鱼、地鱼、地仔鱼《中国药用动物志》  
 地方名 偏口、比目鱼、沙地、左右(山东、浙江);山东:鲆;浙江:平鱼,地仔,牙片,牙鲷。  
 功效 肉:消炎解毒。用于急性肠胃炎,食鲆鱼中毒。

8928402 见 8928404a

#### 8928403

*Pseudorhombus arsius* (Hamilton)

动物名 斑鲆《动物图谱·鱼》  
 药材名 斑鲆《中国药用动物志》  
 文献名 鲆鱼《中国药用动物志》,大牙斑鲆《中国海洋药物》  
 地方名 浙江:地鱼,铁斧,土铁仔。  
 功效 肉:清热解毒。用于急性胃肠炎,食鲆鱼中毒。

#### 8928404

*Pseudorhombus cinnamomeus* (Temminck et Schlegel)

动物名 桂皮斑鲆《动物图谱·鱼》  
 药材名 地鱼《中国海洋药物》  
 功效 肉:益力气,补脾胃,催吐。用于急性胃肠炎,食鱼中毒。

#### 8928404a

*Pseudorhombus malayanus* (Bleeker)

动物名 马来斑鲆(拉汉脊椎动物名称)  
 药材名 马来斑鲆《中国药用海洋生物》  
 文献名 圆沸、歪嘴婆《海洋药物民间应用》,地甫鱼、地鱼《中国药用动物志》  
 功效 肉:催吐。用于食鲆鱼中毒。

#### 8928405

*Pseudorhombus oligodon* (Bleeker)

动物名 少牙斑鲆(拉汉脊椎动物名称)  
 药材名 少牙斑鲆《中国药用动物志》  
 文献名 地鱼、铁斧《中国药用动物志》  
 地方名 浙江:土铁仔。  
 功效 肉:催吐。用于食鲆鱼中毒。

### 89285 鲽科 Pleuronectidae

#### 8928501

*Eopsetta grigorjewi* (Herzenstein)

动物名 虫鲽(拉汉海洋生物名称)  
 药材名 鲽鱼《中国海洋药物》  
 地方名 浙江:右眼鱼。  
 功效 肉:壮阳补中。用于腰酸背痛。

#### 8928502

*Pleuromichthys cornutus* (Temminck et Schlegel)

动物名 木叶鲮《动物图谱·鱼》

文献名 角木叶鲮《中国海洋药物》

地方名 浙江:砂眼,溜仔,猴子鱼,角鲮,比目鱼

功效 全鱼:壮阳补气。

## 89286 鲷科 Soleidae

### 8928601

*Zebrias zebra* (Bloch)

动物名 条鲷《动物图谱·鱼》

药材名 带纹条鲷《中国海洋药物》

地方名 浙江:斑条鲷,花鲷,牛舌,花牛舌,花利,花鞋底,虎皮。

功效 全鱼:健脾补肾。

## 89287 舌鲷科 Cynoglossidae

### 8928701

*Cynoglossus abbreviatus* (Gray)

动物名 短吻三线舌鲷《中国海洋药物》

药材名 鲷鱼《中国海洋药物》

文献名 短吻舌鲷《拉汉海洋生物名称》

地方名 浙江:牛舌。

功效 全鱼:健脾胃,助消化。

### 8928702

*Cynoglossus gracilis* Guenther

动物名 窄体舌鲷《拉汉海洋生物名称》

药材名 窄体舌鲷《中国海洋药物》

地方名 浙江:狗舌。

功效 全鱼:补虚健脾,益气养血。

### 8928703

*Cynoglossus interruptus* Guenther

动物名 断线舌鲷《中国海洋药物》

地方名 浙江:舌鲷,鞋底。

功效 全鱼:益气开胃。

### 8928704

*Cynoglossus itinus* (Snyder)

动物名 单孔舌鲷《拉汉海洋生物名称》

药材名 鲷鱼《中国海洋药物》

文献名 东亚单孔舌鲷《中国海洋药物》

功效 全鱼:补虚健脾,益气养血。

### 8928705

*Cynoglossus joyneri* Guenther

动物名 短吻红舌鲷《中国海洋药物》

药材名 鲷鱼《中国海洋药物》

文献名 焦氏舌鲷、鲷目、牛舌、塔沙《动物图谱·鱼》

地方名 辽宁:风板鱼,舌头鱼;浙江:狗舌。

功效 全鱼:健脾益气。用于黄疸型肝炎。

### 8928706

*Cynoglossus melampetalus* Richardson --- *Cynoglossoides melampetalus* (Richardson)

动物名 黑尾舌鲷《动物图谱·鱼》

药材名 舌鲷《中国海洋药物》

文献名 狗舌、塔沙《动物图谱·鱼》,大鳞舌鲷《拉汉海洋生物名称》

地方名 浙江:牛舌,龙舌。

功效 全鱼:补虚健脾,益气养血。

### 8928707

*Cynoglossus robustus* Guenther --- *Cynoglossoides robustus* (Guenther)

动物名 宽体舌鲷《拉汉海洋生物名称》

药材名 宽体舌鲷《中国海洋药物》

地方名 浙江:贴沙,龙利,鞋底。

功效 全鱼:补虚健脾,益气养血。

### 8928708

*Cynoglossus semilaevis* Guenther

动物名 半滑舌鲷《动物图谱·鱼》

药材名 鲷鱼《中国海洋药物》

文献名 鲷目、箸鲷、龙舌《动物图谱·鱼》

地方名 浙江:鲷鲞,六目鲷,牛舌。

功效 全鱼:健脾益气。

### 8928709

*Cynoglossus trigrammus* Guenther

动物名 三线舌鲷《拉汉海洋生物名称》

药材名 舌鲷《中国海洋药物》

文献名 褐斑三线舌鲷《中国海洋药物》

地方名 浙江:条鲷,花牛舌。

功效 全鱼:补虚健脾,益气养血。

## 89288 鲷科 Echeneidae

### 8928801

*Echeneis naucrates* L.

动物名 鲷《动物图谱·鱼》

药材名 鲷《海洋药物》

文献名 鲷鱼《拉汉海洋生物名称》,印头鱼《脊椎动物分类学》

地方名 辽宁:鞋底鱼。

功效 全体:用于痢痢头。

### 8928802

*Remora albescent* (Temminck et Schlegel)

动物名 白短鲷《拉汉脊椎动物名称》

药材名 鲷鱼《中国药用动物志》

地方名 浙江:吸盘鱼。

功效 全体(去内脏):滋补强壮。用于肺癆,久病体虚。

### 8928803

*Remora remora* (L.)

动物名 短鲷《拉汉海洋生物名称》

药材名 鲷鱼(浙江)、《中国海洋药物》

地方名 浙江:印鱼,吸盘鱼。

功效 全鱼:滋补强壮。

## 89289 三刺鲀科 Triacanthidae

### 8928901

*Triacanthus brevirostris* Temminck et Schlegel

动物名 短吻三刺鲀《动物图谱·鱼》

药材名 三刺鲀《浙江中医学院学报》

地方名 辽宁:炮台架,机关枪;浙江:炮台鱼,羊鱼,皮匠刀,绒皮鱼。

功效 皮:消肿止痛。外用于手掌、足底皮下脓肿;肉:用于胃病咯血,乳腺炎,颈淋巴结核,中耳炎;肝:可制鱼肝油。

#### 8928902

*Triacanthus singilifer* Cantor

动物名 尖吻三刺鲀《中国有毒和药用鱼类》

功效 皮、肉:用于胃病咯血,乳腺炎,颈淋巴结核,中耳炎。

### 89290 鳞鲀科 Balistridae

#### 8929001

*Monacanthus sulcatus* Hollard

动物名 绒纹单角鲀《海洋药物》

功效 全体:消痰化食。用于肾炎,关节炎。

#### 8929002

*Navodon modestus* (Guenther) --- *Monacanthus modestus* (Guenther) --- *Cantherines septentrionalis* (Guenther) --- *Navodon septentrionalis* (Guenther)

动物名 绿鳍马面鲀《拉汉海洋生物名称》

药材名 橡皮鱼《常见药用动物》

文献名 马面鲀《中国药用动物志》

地方名 面包鱼,烧烧鱼(山东、浙江),皮匠鱼(辽宁、浙江);辽宁:扒皮鱼;山东:猪鱼,皮匠刀,剥皮郎;浙江:剥皮鱼,马面鱼;其他:羊鱼。

功效 肉:健胃消食。用于胃病;全鱼:解毒止血。用于乳腺炎,消化道出血。

### 89291 鲀科 Tetrodontidae

#### 8929101

*Fugu alboplumbeus* (Richardson) --- *Tetrodon alboplumbeus* Richardson --- *Spheroides alboplumbeus* (Richardson)

动物名 铅点东方鲀《拉汉脊椎动物名称》

文献名 铅点圆鲀《东北动物药》

地方名 辽宁:廷巴;浙江:艇巴,河豚,花龟鱼。

功效 全体:祛湿壮腰,消肿,镇痛。用于腰脚酸软;河豚毒素:镇痉,镇痛,止咳,壮阳,利尿,杀虫。用于痉挛,神经痛,跌打损伤疼痛,气喘,阳痿,遗尿,疥癣。

#### 8929102

*Fugu basilewskianus* (Basilewsky) --- *Tetrodon basilewskianus* Basilewsky

动物名 贝氏东方鲀《拉汉脊椎动物名称》

文献名 墨绿东方鲀《山东药用动物》

地方名 辽宁:廷巴。

功效 全体:祛湿壮腰,消肿,镇痛。可提取河豚毒素。

#### 8929103

*Fugu bimaculatus* (Behnatt)

动物名 双斑东方鲀《拉汉脊椎动物名称》

文献名 鸡抱《中药材科技》

地方名 浙江:花抱,乖鱼。

功效 全体:祛湿壮腰,消肿,镇痛。可提取河豚毒素。

#### 8929104

*Fugu flavidus* Li, Wang et Wang

动物名 菊黄东方鲀《中国有毒和药用鱼类》

文献名 星点圆鲀、星点东方鲀〔幼鱼〕《辽宁动物志》

地方名 辽宁:廷巴,腊头棒子。

功效 全体:祛湿壮腰,消肿,镇痛。可提取河豚毒素。

#### 8929105

*Fugu niphobies* (Jordan et Snyder) --- *Spheroides niphobies* Jordan et Snyder

动物名 星点东方鲀《拉汉脊椎动物名称》

药材名 河豚鱼《开宝本草》

文献名 河豚《纲目》,星点圆鲀《辽宁动物志》,艇巴《中国药用动物志》

地方名 辽宁:廷巴;浙江:蜡头,龟鱼。

功效 肉:滋补强壮。用于腰腿酸软,肢体无力;河豚毒素:镇痉,镇痛,止咳,壮阳,利尿,杀虫。用于痉挛,神经痛,癌症晚期疼痛,跌打损伤引起的疼痛,气喘,百日咳,阳痿,遗尿,疥癣;肝、卵及卵巢:有剧毒。清热解毒。外用于疥癣疮疖,无名肿毒;血:外用于刺毒鱼类刺伤及颈淋巴结核;河豚肝提制的肝油注射液:用于恶性淋巴肉瘤,胃癌,肺癌,结肠癌;肝油:外用于慢性皮肤溃疡;由河豚鱼肝提出的“新生油”:用于鼻咽癌。

#### 8929106

*Fugu oblongus* (Bloch)

动物名 横纹东方鲀《拉汉脊椎动物名称》

药材名 河豚鱼《开宝本草》

文献名 河豚《纲目》

地方名 沙龟鱼,花龙乖、乖鱼(浙江、广西);浙江:乌郎,长龟;广西:沙乖鱼,花龟。

功效 肉:滋补强壮,强腰膝。用于腰腿酸软;河豚毒素:用于神经痛,风湿病,皮肤瘙痒,痉挛,夜尿症。

#### 8929107

*Fugu obscurus* (Abe) --- *Spheroides ocellatus obscurus* Abe --- *Spheroides obscurus* Abe

动物名 暗色东方鲀《拉汉脊椎动物名称》

药材名 河豚《中国海洋药物》

文献名 暗纹东方鲀《山东药用动物》,星弓斑圆鲀《辽宁动物志》,衡鱼《中药材科技》

地方名 辽宁:廷巴。

功效 全体:祛湿壮腰,消肿,镇痛。用于腰脚酸软;河豚毒素:镇痉,镇痛止咳,壮阳,利尿,杀虫。用于痉挛,神经痛,跌打损伤引起的疼痛,癌痛,气喘,百日



咳,阳痿,遗尿,疥癣。

#### 8929108

*Fugu ocellatus* (Osbeck) --- *Spheroides ocellatus* (Osbeck)

动物名 弓斑东方鲀《拉汉脊椎动物名称》

药材名 河豚鱼《开宝本草》、《汇编》

文献名 鲀鱼《本草拾遗》, 鰐鰕、鲀鰕、鲀鱼、吹肚鱼、气包鱼《纲目》, 鲀鱼、斑圆鲀、眼斑河豚、河鲀、河豚《汇编》

地方名 浙江: 龟鱼; 广西: 抢锅, 气泡鱼, 皮球鱼。

功效 全体: 祛湿壮腰, 消肿, 镇痛。用于腰腿酸软; 河豚毒素: 有毒。用于神经痛, 风湿病, 皮肤瘙痒, 瘰疬, 夜尿症。

#### 8929109

*Fugu pardalis* (Temminck et Schlegel) --- *Tetrodon pardalis* Temminck et Schlegel

动物名 豹纹东方鲀《中国药用动物志》

文献名 豹东方鲀《拉汉脊椎动物名称》, 廷巴鱼《中国药用动物志》, 豹圆鲀《辽宁动物志》

地方名 辽宁: 廷巴。

功效 肉: 滋补强壮。用于腰腿酸软, 肢体无力; 河豚毒素: 镇痉, 镇痛, 止咳, 壮阳, 利尿, 杀虫。用于痉挛, 神经痛, 癌症晚期疼痛, 跌打损伤引起的疼痛, 气喘, 百日咳, 阳痿, 遗尿, 疥癣; 肝、卵、卵巢: 有剧毒。清热解毒。外用于疮疖, 无名肿毒, 疥癣, 虫疮; 血: 外用于刺毒鱼类刺伤, 颈淋巴结核; 河豚肝提制的肝油注射液: 用于恶性淋巴瘤肉瘤, 胃癌, 肺癌, 结肠癌; 肝油: 外用于慢性皮肤溃疡; 由河豚鱼肝提出的‘新生油’: 用于鼻咽癌。

#### 8929110

*Fugu porphyreus* (Temminck et Schlegel) --- *Tetrodon porphyreus* Temminck et Schlegel

动物名 紫色东方鲀《中国药用动物志》

文献名 阿氏东方鲀、细斑东方鲀《辽宁动物志》, 面艇巴《中国药用动物志》, 面廷巴《中药材科技》

功效 肉: 滋补强壮。用于腰腿酸软; 河豚毒素: 镇痉, 镇痛, 止咳, 壮阳, 利尿, 杀虫; 肝、卵、卵巢: 有剧毒。清热解毒。外用于疮疖, 无名肿毒, 疥癣; 血: 外用于刺毒鱼类刺伤, 颈淋巴结核; 肝油: 外用于慢性皮肤溃疡; 河豚肝提制的肝油注射液: 用于恶性淋巴瘤肉瘤, 胃癌, 肺癌, 结肠癌等; 河豚毒素: 用于神经痛, 创伤, 挫伤痛, 癌痛, 皮肤痒症, 气喘, 百日咳, 胃痉挛, 破伤风痉挛等。

#### 8929111

*Fugu pseudommus* (Chu) --- *Lagocephalus pseudommus* Chu

动物名 假睛东方鲀《中国有毒和药用鱼类》

文献名 中华东方鲀《辽宁动物志》

地方名 辽宁: 黑廷巴。

功效 全体: 祛湿壮腰, 消肿, 镇痛。可提取河豚毒素。

#### 8929112

*Fugu reticularis* Tien, Cheng et Wang

动物名 网纹东方鲀《中国有毒和药用鱼类》

地方名 辽宁: 面廷巴。

功效 全体: 祛湿壮腰, 消肿, 镇痛。可提取河豚毒素。

#### 8929113

*Fugu rubripes* (Temminck et Schlegel) --- *Tetrodon rubripes* Temminck et Schlegel --- *Spheroides rubripes* (Temminck et Schlegel)

动物名 红鳍东方鲀《动物图谱·鱼》

药材名 河鲀肉《中国药用动物志》

文献名 黑艇鲀《中国药用动物志》, 红鳍圆鲀《辽宁动物志》

地方名 浙江: 黑艇巴, 黑腊头; 辽宁: 黑廷巴。

功效 肉: 滋补强壮。用于腰腿酸软, 肢体无力; 河鲀毒素: 镇痉, 镇痛, 止咳, 壮阳, 利尿, 杀虫。用于痉挛, 神经痛, 跌打损伤引起的疼痛, 癌症晚期疼痛, 气喘, 百日咳, 阳痿, 遗尿, 疥癣。

#### 8929114

*Fugu vermicularis* (Temminck et Schlegel) --- *Tetrodon vermicularis* Temminck et Schlegel --- *Spheroides vermicularis* Temminck et Schlegel

动物名 虫纹东方鲀《动物图谱·鱼》

药材名 河豚鱼《开宝本草》、《汇编》

文献名 河豚肉《日华子本草》, 河豚子《纲目》, 河豚目《本经逢原》, 河豚鱼肝油《辽宁医学》, 虫纹圆鲀、辐斑《辽宁动物志》, 河鲀鱼、廷巴鱼、气泡鱼、红鳍东方鲀《汇编》, 气鼓鱼、腊头、花龟《中国药用动物志》

地方名 河鲀(东北), 气鼓子、河豚(山东、浙江); 辽宁: 面廷巴; 山东: 腊头鱼, 鸡抱, 龟鱼; 浙江: 乌郎, 面艇巴, 蜡头, 鸡枪。

功效 肉: 滋补强壮。用于腰腿酸软, 肢体无力; 河豚毒素: 镇痉, 镇痛, 止咳, 壮阳, 利尿, 杀虫。用于痉挛, 神经痛, 癌症晚期疼痛, 跌打损伤引起的疼痛, 气喘, 百日咳, 阳痿, 遗尿, 疥癣, 虫疮; 血: 外用于刺毒鱼类刺伤, 颈淋巴结核; 河豚肝提制的肝油注射液: 用于恶性淋巴瘤肉瘤, 胃癌, 肺癌, 结肠癌; 肝油: 外用于慢性皮肤溃疡; 由河豚鱼肝提取的‘新生油’: 用于鼻咽癌。

#### 8929115

*Fugu xanthopterus* (Temminck et Schlegel) --- *Tetrodon xanthopterus* Temminck et Schlegel --- *Spheroides xanthopterus* Temminck et Schlegel

动物名 条斑东方鲀《动物图谱·鱼》

药材名 河豚鱼《开宝本草》

文献名 条纹东方鲀、河鲀肉、花艇鲀、花腊头《中国药用动物志》, 黄鳍东方鲀《中国动物药》, 条东方鲀、条圆鲀《辽宁动物志》

地方名 辽宁: 花廷巴; 浙江: 河豚, 艇巴, 黄天霸, 花河豚, 花蜡头。

功效 肉: 滋补强壮。用于腰腿酸软, 肢体无力; 河鲀毒素: 镇痉, 镇痛, 止咳, 壮阳, 利尿, 杀虫。用于痉挛, 神经痛, 跌打损伤引起的疼痛, 气喘, 百日咳, 阳痿,

遗尿, 疥癣。

#### 8929116

*Gastrophysus lunaris* (Bloch et Schneider) --- *Tetrodon lunaris* Bloch et Schneider

动物名 月腹刺鲀《拉汉脊椎动物名称》

文献名 大眼兔头鲀《中国海洋药物》

地方名 辽宁: 迁巴; 浙江: 河豚, 龟鱼。

功效 鳔、皮: 健脾止痢, 润肺止咳, 用于胃病, 赤痢, 寒咳。

#### 8929117

*Gastrophysus spadiceus* (Richardson)

动物名 棕腹刺鲀《拉汉脊椎动物名称》

文献名 鸡抱、四方龟鱼、金龟鱼、青皮乖《中国药用动物志》, 棕斑腹刺鲀《中国海洋药物》

地方名 浙江: 棕斑兔头。

功效 鳔、皮: 健脾止痢, 润肺止咳。用于胃痛, 寒咳, 赤痢。

#### 8929118

*Lagocephalus inermis* (Temminck et Schlegel)

动物名 黑鳃兔头鲀《动物图谱·鱼》

药材名 光兔鲀《中国有毒和药用鱼类》

文献名 光兔头鲀《拉汉脊椎动物名称》

地方名 浙江: 河鲀, 河豚, 黑鳃鲀, 王鸡鱼, 金龟鱼。

功效 鳔、皮: 健脾止痢, 润肺止咳。用于胃病, 赤痢。

#### 8929119

*Lagocephalus lunaris* (Bloch et Schneider)

动物名 大眼兔头鲀《南海海洋药用生物》

功效 鳔: 用于咳嗽。

#### 8929120

*Lagocephalus lunaris spadiceus* (Richardson)

动物名 棕斑兔头鲀《南海海洋药用生物》

功效 鳔: 用于咳嗽。

### 89292 刺鲀科 Diodontidae

#### 8929201

*Chilomycterus echinatus* (Gronow)

动物名 刺额短刺鲀《拉汉海洋生物名称》

文献名 刺抱鲀、抱鲀、刺白、辣龟《中国药用动物志》

地方名 广西: 刺枪鲀, 刺乖, 辣乖。

功效 皮: 补肾益肝, 润肺。用于老年寒咳, 哮喘, 体弱多梦, 遗精, 遗尿, 神经衰弱, 浮肿, 血尿, 肝炎。

#### 8929202

*Chilomycterus orbicularis* (Bloch)

动物名 眶棘短刺鲀《动物图谱·鱼》

药材名 眶短刺鲀《中国海洋药物》

地方名 浙江: 刺鲀。

功效 皮: 润肺止咳, 补肾益肝, 催乳。用于肝炎, 小儿血尿。

#### 8929203

*Diodon holacanthus* L.

动物名 刺鲀《动物图谱·鱼》

药材名 刺河豚《南海》

文献名 六斑刺鲀、刺乖、刺龟《中国有毒和药用鱼类》

功效 皮: 健脾利湿。用于尿黄, 去湿。

#### 8929204

*Diodon novemaculatus* Bleeker

动物名 九斑刺鲀《拉汉脊椎动物名称》

药材名 九斑刺鲀《中国有毒和药用鱼类》

功效 皮: 润肺止咳, 营养滋补, 补肾益肝, 催乳。用于老人寒咳, 哮喘, 体弱遗尿, 神经衰弱, 浮肿, 小儿血尿, 肝炎。

### 89293 翻车鲀科 Molidae

#### 8929301

*Masturus lanceolatus* (Lienard)

动物名 矛尾翻车鲀《中国有毒和药用鱼类》

功效 肝: 用于跌打损伤, 刀伤, 烫火伤, 腹痛, 软骨病。

#### 8929302

*Mola mola* (L.) --- *Tetrodon mola* L.

动物名 翻车鲀《动物图谱·鱼》

药材名 翻车鲀《中国有毒和药用鱼类》

地方名 辽宁: 翻车鱼。

功效 全体、肝: 用于挫伤, 刀伤; 毒素: 有麻醉作用。

### 89294 鲛鲛科 Lophiidae

#### 8929401

*Lophiomus setigerus* (Vahl)

动物名 黑鲛鲛《拉汉脊椎动物名称》

药材名 黑鲛鲛《中国药用动物志》

地方名 浙江: 海蛤蟆, 蛤蟆鱼, 吞天王, 老头鱼。

功效 头骨: 消炎。用于疮疖, 牙龈脓肿, 牙痛; 胆: 清热解毒。用于目赤肿痛, 水肿, 黄疸; 胃内小鱼: 用于胃炎, 胃酸过多。

#### 8929402

*Lophius litulon* (Jordan) --- *Lophiomus litulon* Jordan

动物名 黄鲛鲛《动物图谱·鱼》

药材名 黄鲛鲛《中国药用动物志》

地方名 蛤蟆鱼(辽宁、浙江); 浙江: 吞天王, 老头鱼, 海蛤蟆, 结巴鱼。

功效 胆: 清热解毒。用于目赤肿痛, 水肿, 黄疸; 头骨: 消炎。用于疮疖, 牙痛, 牙龈脓肿等。

### 89295 蝙蝠鱼科 Oncocephalidae

#### 8929501

*Halimetus reticulatus* (Smith et Radcliffe)

动物名 牙棘茄鱼《拉汉脊椎动物名称》

文献名 红甲鱼《中国药用动物志》

功效 肉: 滋阴补肾。用于小儿遗尿。

#### 8929502

*Halimetus stellata* (Vahl)

动物名 棘茄鱼《动物图谱·鱼》

药材名 红壳鱼《中国海洋药物》

功效 肉:滋阴补肾。用于小儿遗尿。

**89296 海蛾鱼科 Pegasidae****8929601***Pegasus laternarius* Cuvier

动物名 短吻海蛾鱼《动物图谱·鱼》

药材名 海麻雀《中国有毒和药用鱼类》

文献名 海蛾《中国药用海洋生物》,海蛾鱼《中国动物药》

地方名 广西:〔海燕〕。

功效 全鱼(去内脏):化痰止咳,消癥散结。用于甲状腺肿瘤,小儿麻疹后腹泻,小儿气管炎,麻疹,喉头肿瘤等。

**8929602***Pegasus volitans* Cuvier

动物名 飞海蛾鱼(拉汉海洋生物名称)

文献名 飞海蛾《中国药用动物志》

功效 去内脏全体:化痰止咳,消癥散结。用于甲状腺肿瘤,小儿麻疹后腹泻,小儿气管炎,麻疹,喉头肿瘤等。

**89297 小鲵科 Hynobiidae****8929701***Batrachuperus pinchonii* (David)

动物名 山溪鲵《动物图谱·两栖》

药材名 雪鱼(云南)、《中药材科技》

文献名 羌活鱼《四川中药志》,角鞘山溪鲵《中国药用动物志》

地方名 杉木鱼(四川、陕西);陕西:虢湖鱼;四川:秉氏鲵,小娃娃鱼、白龙、接骨丹。

功效 全体:行气止痛,续断接骨,祛风除湿,补虚。用于跌打损伤,骨折,血虚脾弱,肝胃气痛。外用急性腮腺炎。

**8929702***Hynobius chinensis* Guenther

动物名 中国小鲵《浙江中医学院学报》

文献名 短尾鲵《脊椎动物分类学》

功效 全体:祛瘀止痛,续筋接骨。

**89298 隐鳃鲵科 Cryptobranchidae****8929801***Megalobatrachus davidianus* (Blanchard)

动物名 大鲵《动物图谱·两栖》

药材名 娃娃鱼(汇编)

文献名 海狗鱼、狗鱼(汇编),大娃娃鱼《中国药用动物志》,鲟鱼《经济两栖爬行动物》,鲵、啼鱼《常见药用动物》

地方名 陕西:鲵鱼。

功效 全体(去内脏):滋补,强壮,补气,截疟。用

于神经衰弱,贫血,痢疾,疟疾。

备考 本品为国家重点保护动物。

**89299 蝾螈科 Salamandridae****8929901***Cynops orientalis* (David)

动物名 东方蝾螈《中国药用动物志》

药材名 水狗子(汇编)

文献名 鲛鱼、四脚鱼《中国药用动物志》

功效 全体:清热解毒,除湿,止痒,镇痛。用于皮肤痒疹,烫火伤。

**8929902***Pachytriton brevipes* (Sauvage)

动物名 肥螈《动物图谱·两栖》

文献名 水和尚《动物图谱·两栖》

功效 肉:用于小儿疳积。

**8929903***Trituroides chinensis* (Gray)

动物名 中国瘰螈《中国动物药》

药材名 瘰螈《中药名汇》

地方名 湖南:山和尚(湘南山区),〔蛤蚧〕。

功效 全体:消积,清热,解毒。

备考 湖南收购蛤蚧中有此伪品。

**8929904***Tylotriton kweichowensis* Fang et Chang

动物名 贵州疣螈《中药材科技》

文献名 疣螈、上蛤蚧、苗婆蛇、描抱石《中药材科技》

备考 干燥全体:混充蛤蚧。

**8929905***Tylotriton taliangensis*

动物名 大凉疣螈《中药通报》

地方名 四川:〔蛤蚧〕。

备考 全体:四川伪充蛤蚧。

**8929906***Tylotriton verrucosus* Anderson

动物名 红瘰疣螈《动物图谱·两栖》

文献名 土蛤蚧、苗婆蛇、描抱石《中药材科技》

地方名 云南:〔蛤蚧〕。

备考 干燥全体:伪充蛤蚧。

**89300 盘舌蟾科 Discoglossidae****8930001***Bombina orientalis* (Boulenger)

动物名 东方铃蟾《动物图谱·两栖》

药材名 东方铃蟾《中国药用动物名录》

文献名 铃蛙、警蛙《长春中医学院学报》

地方名 辽宁:红肚皮蛤蟆。

功效 外皮鲜体或口中分泌物:消炎解毒。用于痔疮。

## 89301 蟾蜍科 Bufonidae

## 8930101

*Bufo bufo andrewsi* (Schmidt)

动物名 华西大蟾蜍《拉汉脊椎动物名称》

药材名 蟾酥、干蟾《中国药用动物志》

文献名 蟾蜍、癞蛤蟆《中国药用动物志》

功效 分泌物(蟾酥):解毒,止痛,开窍醒神;蛤蟆皮(干蟾):有小毒。消肿解毒,止痛,利尿;蟾蜍胆:镇咳,祛痰,平喘,消炎。用于早期淋巴结核,鼻痔。

## 8930102

*Bufo bufo asiaticus* Steindacher

动物名 亚洲蟾蜍《中药志》

药材名 蟾酥、干蟾《中药名汇》

文献名 蟾蜍、癞蛤蟆、癞猴蟆、蛤蟆、癞格宝、癞宝、正蛤蟆、正蟾蜍、疥蛤蟆、干蟾、甘蟾、赤蟆、蚬蟆、大千蟾、癞巴子、干蟾皮、癞头皮、全酥、虫酥、蟾宝、片蟾酥、杜蟾酥、东蟾酥、月精、月魂、月龙、蟾酥片、蟾酥饼、棋子酥、蓉酥、东酥、片酥、杜酥、光东酥《中药名汇》

功效 蟾酥:解毒,止痛,开窍醒神;干蟾:消肿解毒,止痛,利尿。

## 8930103

*Bufo bufo gargarizans* Cantor

动物名 中华大蟾蜍《拉汉脊椎动物名称》

药材名 蟾酥《药性论》、《药典》,干蟾、蟾蜍胆《中国药用动物志》

文献名 蟾蜍《别录》,蟾蜍眉脂、蟾《药性论》,蟾蜍眉酥《日华子本草》,蚬蟆《全要方论》,癞蛤蟆、石蚌《本草蒙筌》,蟾头《纲目》,蟾皮《本经逢原》,蟾舌《纲目拾遗》,蟾蜍肝《医林纂要》,华西大蟾蜍《动物图谱·两栖》,月魂、蟾宝《新纲》,癞蛤蟆《药材资料汇编》,蛤蟆皮《汇编》,大蟾蜍《贵州药录》,癞疙疤、癞宝、疥蛤蟆、干蟾皮《中国药用动物志》,团蟾酥、片蟾酥《中药志》

地方名 内蒙古:“巴哈”(蒙名);山东:蛤蟆蟆、疥巴子、癞疙疤、蛤蟆酥、光东酥;江苏:蛤蟆浆。

功效 蟾酥(分泌物):解毒,止痛。开窍醒神。用于痈疽疔疮,咽喉肿痛,中暑吐泻,腹痛神昏,手术麻醉;干蟾(蛤蟆皮):有小毒。消肿解毒,止痛,利尿。用于慢性气管炎,痈疽疔疮,咽喉肿痛,水肿,小便不利;蟾蜍胆:镇咳,祛痰,平喘,消炎。用于气管炎;蟾头:用于小儿疳疾;蟾舌:拔疔;蟾蜍肝:用于痈疽疔毒。

## 8930104

*Bufo melanostictus* Schneider

动物名 黑眶蟾蜍《动物图谱·两栖》

药材名 蟾酥《药性论》、《药典》,干蟾《汇编》

文献名 蟾蜍《别录》,蟾蜍眉脂、蟾《药性论》,蟾蜍眉酥《日华子本草》,蚬蟆《全要方论》,癞蛤蟆、石蚌《本草蒙筌》,蟾头《纲目》,蟾皮《本经逢原》,蟾舌《纲目拾遗》,蟾蜍肝《医林纂要》,蛤巴、癞疙疤《中国药用动物志》

地方名 山东:蛤蟆酥,光东酥;江苏:蛤蟆浆。

功效 蟾酥(分泌物):解毒,止痛,开窍醒神。用

于痈疽疔疮,咽喉肿痛,中暑吐泻,腹痛神昏,手术麻醉;干蟾(蛤蟆皮):有小毒。消肿解毒,止痛,利尿。用于慢性气管炎,痈疽疔疮,咽喉肿痛,水肿,小便不利;蟾蜍胆:镇咳,祛痰,平喘,消炎。用于气管炎;蟾头:用于小儿疳疾;蟾舌:拔疔;蟾蜍肝:用于痈疽疔毒。

## 8930105

*Bufo raddei* Strauch

动物名 花背蟾蜍《拉汉脊椎动物名称》

药材名 蟾酥、干蟾、蟾蜍胆《中国药用动物志》

功效 蟾酥(分泌物):解毒,止痛,开窍醒神。用于痈疽疔疮,咽喉肿痛,中暑吐泻,腹痛神昏,手术麻醉;干蟾(蛤蟆皮):有小毒。消肿解毒,止痛,利尿。用于慢性气管炎,痈疽疔疮,咽喉肿痛,水肿,小便不利;蟾蜍胆:镇咳,祛痰,平喘,消炎。用于气管炎;蟾头:用于小儿疳疾;蟾舌:拔疔。

## 8930106

*Bufo tibetanus* Zarevski

动物名 西藏蟾蜍《拉汉脊椎动物名称》

药材名 蟾酥、干蟾、蟾蜍胆《中国药用动物志》

功效 蟾酥:解毒,止痛,开窍醒神。用于痈疽疔疮,咽喉肿痛,中暑吐泻,腹痛神昏,手术麻醉;干蟾(蛤蟆皮):有小毒。消肿解毒,止痛,利尿。用于慢性气管炎,痈疽疔疮,咽喉肿痛,水肿,小便不利;蟾蜍胆:镇咳,祛痰,平喘,消炎。用于气管炎;蟾头:用于小儿疳疾;蟾舌:拔疔。

## 89302 雨蛙科 Hylidae

## 8930201

*Hyla annectans* (Jerdon)

动物名 华西雨蛙《动物图谱·两栖》

药材名 雨蛙《中国药用动物志》

功效 全体:活血止痛,生肌止血。用于跌打损伤,骨折,外伤出血等。

## 8930202

*Hyla arborea immaculata* Boettger

动物名 无斑雨蛙《中国药用动物志》

文献名 日本雨蛙《动物学杂志》,雨蛙《汇编》

地方名 辽宁:雨呱呱,梆梆狗,绿蛤蟆;湖北:蛤麻(神农架)。

功效 全蛙:解毒,杀虫。用于湿癣。

## 8930203

*Hyla arborea japonica* Guenther

动物名 日本雨蛙《东北动物药》

功效 全体:解毒杀虫。外用于湿癣。

## 8930204

*Hyla chinensis* Guenther

动物名 中国雨蛙《动物图谱·两栖》

药材名 金蛤蟆(湖北)、《汇编》

文献名 华雨蛙《脊椎动物分类学》

功效 全体:活血止痛,生肌,止血。用于跌打损伤,骨折,外伤出血。

## 8930205

*Hyla sanchiangensis* Pope

动物名 三港雨蛙《浙江中医学院学报》

功效 全体;用于骨折,创伤出血,跌打损伤。

### 89303 蛙科 Ranidae

#### 8930301

*Rana amurensis* Baulenger

动物名 黑龙江林蛙《辽宁动物志》

药材名 蛤士蟆油《中药志》

文献名 蛤什蟆、红肚田鸡、蛤蚂《中药通报》,蛤蟆油、雪蛤《药材资料汇编》,田鸡油、吧拉蛙油《汇编》

地方名 黑龙江:臭迷子;吉林:蛤蟆,吧拉蛙,山狗子;辽宁:田鸡,蛤什蚂;其他:蛤士蟆,石蛤蟆,赤蛙,赤蛤蟆,油蛤蟆,黄蛤蟆,蛤什蟆油。

功效 输卵管干制品;滋补强壮。用于身体虚弱,神经衰弱,肺虚咳嗽。

#### 8930302

*Rana guentheri* Boulenger

动物名 沼蛙《动物图谱·两栖》

药材名 沼蛙《中国药用动物名录》

功效 全体(去皮和内脏);活血消积。用于痞积。

#### 8930303

*Rana limnocharis* Boie

动物名 泽蛙《动物图谱·两栖》

药材名 蛤蟆《本经》、《中药大辞典》

文献名 蛙尾《国语》,蟪《周礼》,活师《山海经》,蟾蜍、蛭斗、活东《尔雅》,蛤蟆子、玄鱼、玄针《崔豹《古今注》》,蛤蟆脑《别录》,蝌蚪、蛤蟆儿《本草拾遗》,聒子、蛤蟆台、蛤蟆粘《尔雅翼》,蛤蟆肝、蛤蟆胆、悬针、水仙子《纲目》,蛤蟆皮《纲目拾遗》,土蛙《现代实用中药》,山蛤蟆《中国药用动物志》

功效 全体;清热解毒,健脾消积。用于痈肿,热疔,口疮,瘰癧,泻痢,痞积;皮:外用用于疔肿,瘰癧;肝:外用用于蛇咬伤,白屑疮,疔疮;胆汁(点舌上):外用用于小儿失音不语;脑髓:明目。用于青盲;幼体:清热解毒。用于热毒疮肿。

备考 据《新华字典》:繁体字蝦的简体有二,一为“蛤(蝦)hā,蛤蟆,为青蛙与癞蛤蟆之统称”,一为“虾(蝦)xiā,为节肢动物”,有些文献将蝦蟆(蛤蟆)、癞蝦蟆(癞蛤蟆)误作虾蟆、癞虾蟆,应予纠正。

#### 8930304

*Rana nigromaculata* Hallowell

动物名 黑斑蛙《动物图谱·两栖》

药材名 青蛙《日华子本草》、《中药大辞典》,蝌蚪《本草拾遗》、《汇编》,青蛙胆《吉林中草药》

文献名 鼃鱼《汉书》,鼃、长股《别录》,田鸡、青鸡、坐鱼、蛤鱼《纲目》

地方名 辽宁:青拐子;北京:蛤蟆咕哪;其他:水鸡,蚂蚱,蚰蚴虫。

功效 全体:清热解毒,补虚,利水消肿。用于劳热,浮肿,疟疾,水臌,噎膈,痢疾,蛤蟆瘟,小儿热疮;胆囊:清热解毒。用于咽喉肿痛、糜烂,麻疹并发肺炎;幼

体(蝌蚪):清热解毒。用于热结肿毒,疳积腹胀。

#### 8930305

*Rana plancyi* Lataste

动物名 金线蛙《动物图谱·两栖》

药材名 青蛙《日华子本草》、《中药大辞典》,蝌蚪《本草拾遗》、《汇编》,青蛙胆《吉林中草药》

文献名 活师《山海经》,蛭斗、活东《尔雅》,蛤蟆子、玄鱼、玄针《崔豹《古今注》》,蛤蟆儿《本草拾遗》,聒子、蛤蟆台、蛤蟆粘《尔雅翼》,悬针、水仙子《纲目》

地方名 北京:蛤蟆咕哪;湖北:膀膀(神农架),蚰蚴虫。

功效 全体:清热解毒,补虚,利水消肿。用于劳热,浮肿,疟疾,水臌,噎膈,痢疾,蛤蟆瘟,小儿热疮;胆囊:清热解毒。用于咽喉肿痛,糜烂,麻疹并发肺炎;幼体:清热解毒。用于热结肿毒,疳积腹胀。

#### 8930306

*Rana rugosa* (Schlegel)

动物名 粗皮蛙《辽宁动物志·两栖》

药材名 粗皮蛙《中国药用动物志》

文献名 癞皮蛙《中国药用动物志》

地方名 辽宁:铁蛤蟆(本溪),石蛤蟆(庄河)。

功效 全体:清热解毒。用于瘰癧,痈疽,脱肛。

#### 8930307

*Rana schmackeri* Boettger

动物名 花臭蛙《动物图谱·两栖》

药材名 花臭蛙《中国药用动物名录》

功效 胆囊:清热解毒。用于咽喉肿痛,糜烂,麻疹并发肺炎;幼体:清热解毒。用于热结肿毒,疳积腹胀;全体:利水,消肿,解毒,止嗽。用于水肿,臌胀,喘息,麻疹,痔疮。

#### 8930308

*Rana spinosa* David

动物名 棘胸蛙《动物图谱·两栖》

药材名 棘胸蛙《中国药用动物志》

文献名 谷冻《脊椎动物分类学》,石坑、石蛤蟆《中国药用动物志》

地方名 广西:山蚂蚱,山鸡,山蛙,石板蛙,石鸡;其他:石顿。

功效 肉:滋补强壮。用于小儿痠瘦,痞积,病后虚弱。

#### 8930309

*Rana temporaria chensinensis* David

动物名 中国林蛙《动物图谱·两栖》

药材名 蛤蟆油《药典》

文献名 山蛤《图经》,蛤士蟆《饮片新参》,蛤士蟆油《中药志》,蛤什蟆油、蛤蚧油、田鸡油、红肚田鸡、蛤蚂《中药通报》,雪蛤《药材资料汇编》,林蛙《内蒙古药用动物》,黄蛤蟆《常见药用动物》

地方名 蛤蟆(吉林、湖北);吉林:吧拉蛙;辽宁:田鸡;内蒙古:“漠勒黑”(蒙名),金鸡蛤蟆;其他:石蛤蟆,赤蛙,赤蛤蟆,山哈,油蛤蟆。

功效 输卵管(蛤蟆油):补肾益精,养阴润肺。用

于身体虚弱,病后失调,精神不足,心悸失眠,盗汗不止,癆嗽咳血。

#### 8930310

*Rana tigrina rugulosa weigmann*

动物名 虎纹蛙《动物图谱·两栖》

药材名 虎纹蛙《中国动物药》

地方名 福建:水鸡。

功效 全体:滋补强壮。用于小儿疳积,消瘦。

### 89304 树蛙科 Rhacophoridae

#### 8930401

*Rhacophorus dennysi* Blanford

动物名 大树蛙《动物图谱·两栖》

药材名 大树蛙《中国药用动物名录》

功效 全体(去内脏):活血祛瘀,健脾胃,止血。用于跌打损伤,小儿疳积,外伤出血。

#### 8930402

*Rhacophorus leucomystax* (Gravenhorst)

动物名 斑腿树蛙《动物图谱·两栖》

药材名 射尿蜥《中药大辞典》

文献名 变色树蛙(薛德培《系统动物学》),树蛙,三角上树蛙《中国药用动物志》

地方名 广西:上树拐,三角上树拐,三角蜥,游蛤,游蛙,竹溜,骑箭蜥,油蜥,青竹蜥;贵州:射尿蛙。

功效 全体(去内脏):活血祛瘀,健脾胃,止血。用于跌打损伤,小儿疳积,外伤出血。

### 89305 姬蛙科 Microhylidae

#### 8930501

*Microhyla pulchra* (Hallowell)

动物名 花姬蛙《动物图谱·两栖》

药材名 犁头蛙《中国药用动物志》

文献名 犁头蜥、三角蜥、三角犁头蜥、三跳蜥《中国药用动物志》,三角犁头蛙《常见药用动物》

地方名 广西:犁头拐,三角蚂拐。

功效 全体:祛风,活血,祛瘀生新,补筋骨。用于风湿骨痛,腰扭伤痛,跌打骨折。

### 89306 龟科 Testudinidae

#### 8930601

*Chinemys reevesii* (Gray)

动物名 乌龟《圣惠方》、《药典》

药材名 龟板《日华子本草》、《药典》,龟板胶《临床指南医案》、《药典》

文献名 龟《周礼》,水龟《尔雅》,龟壳《淮南子》,龟甲、神龟《本经》,元绪《崔豹《古今注》》,败龟甲《小品方》,龟血《药性论》,败将、败龟板《日华子本草》,漏天机《图经》,龟筒《本草衍义》,龟下甲(朱震亨),龟胆汁、玄衣督郎《纲目》,龟板膏《本草正》,龟胶《本草汇言》,龟底甲《药品化义》,龟腹甲《医林纂要》,元武版、坎版、拖泥版《药材学》,金龟《中药志》,金钱龟、草龟《中国药用动物志》,血板、烫板《中草药》,生龟板、血龟板《常用

中药名辨》,醋龟板《药典》

地方名 下甲(河北、山西、湖北),金头龟(浙江、广西);江西:乌龟板;湖南:乌龟壳;广东:泥龟;四川:龟甲胶。

功效 腹甲(龟板):滋阴潜阳,益肾强骨,养血补心。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,头晕目眩,虚风内动,筋骨痿软,心虚健忘;龟板胶:滋阴,养血,止血。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,腰膝酸软,血虚痿黄,崩漏带下;龟肉:益阴补血;龟血:用于脱肛;龟胆汁:用于痘后目肿。

#### 8930602

*Clemmys bealei* (Gray)

动物名 眼斑水龟《中国药用动物志》

药材名 龟板、龟板胶《中国药用动物志》

文献名 水龟《中国药用动物志》

功效 龟板:滋阴潜阳,补肾,退虚热。用于阴虚内热,阳亢头痛,久嗽咽干,遗精阳痿,崩漏带下,腰膝酸软;龟板胶:滋阴止血。用于阴虚火旺,迫血妄行,崩中,漏下。

#### 8930603

*Clemmys mutica* (Cantor)

动物名 黄喉水龟《中国药用动物志》

药材名 龟板、水龟胶《汇编》

文献名 水龟《中国药用动物志》,龟、玄衣督郎、龟甲、神龟、神板、败龟甲、败龟板、败将、漏天机、下甲、元武板、龟腹甲、纹龟板、纹将《中药名汇》

功效 龟板:滋阴潜阳,补肾,退虚热。用于阴虚内热,阳亢头痛,久嗽咽干,遗精阳痿,崩漏带下,腰膝酸软;龟板胶:滋阴止血。用于阴虚火旺,迫血妄行,崩中,漏下。

#### 8930604

*Cuora flavomarginata* (Gray) --- *Gyclemys flavomarginata* (Gray)

动物名 黄缘闭壳龟《中国药用动物志》

药材名 克蛇龟(江苏、浙江)

文献名 摄龟《尔雅》,陵龟《尔雅》郭璞注),蜃龟《抱朴子》,鸞龟《陶弘景》,呬蛇龟《唐本草》,夹蛇龟《蜀本草》,夹蛇龟肉《食性本草》,啖蛇龟《食疗本草》,腹甲、金龟炭、闭壳龟《中国药用动物志》

地方名 断板龟(陕西、江苏);湖北:夹板龟;浙江:驼背龟。

功效 龟板:用于骨结核,关节结核,痔瘕,癰症;腹甲:滋阴潜阳,退虚热。用于阴虚发热,阳亢头痛,久嗽,咽干,崩漏带下,遗精,腰膝痿弱;全龟炭:活血消肿,解毒。用于咽喉肿痛,瘰癧脓肿,风湿痹痛,慢性骨髓炎,肥大性脊椎炎,癌症辅助药,化疗引起的白血球下降有助升作用;龟肉(生捣):有毒。外用于蛇毒。

#### 8930605

*Cuora trifasciata* (Bell)

动物名 三线闭壳龟《中国药用动物志》

文献名 三棱闭壳龟、金钱龟、金头龟《中国药用动物志》

地方名 广西:红肚龟。

功效 腹甲:滋阴潜阳,退虚热。用于阴虚发热,阳亢头痛,久嗽,咽干,崩漏带下,遗精,腰膝痿弱;全龟炭:活血消肿,解毒。用于咽喉肿痛,瘰癧脓肿,风湿痹痛,慢性骨髓炎,肥大性脊椎炎,癌症辅助药,化疗引起的白血球下降有助升作用。

#### 8930606

*Cyclemys mouhotii* Gray

动物名 锯缘摄龟《广西药用动物》

药材名 龟板《广西药用动物》

地方名 广西:下甲。

功效 腹甲(龟板):滋阴降火,补心肾,壮筋骨,滋养强壮。用于肾虚遗精,骨蒸潮热,崩漏带下,久咳,久疟,痔瘕,小儿遗尿和囟门不合,结核病。

#### 8930607

*Geoemyda spengleri* (Gmelin)

动物名 泥龟《广西药用动物》

药材名 龟板(拟)

功效 腹甲:滋阴降火,补心肾,壮筋骨。用于肾虚遗精,骨蒸潮热,崩漏带下,久咳久疟,痔瘕漏症,小儿遗尿,小儿囟门不合,结核性疾病;龟板胶:滋阴养血。

#### 8930608

*Ocadia sinensis* (Gray)

动物名 花龟《中国药用动物志》

药材名 龟板、龟板胶《中国药用动物志》

文献名 中华花龟《中国药用动物志》

地方名 浙江:背甲,腹甲,甲桥。

功效 龟板:滋阴潜阳,补肾,退虚热。用于阴虚内热,阳亢头痛,久嗽咽干,遗精阳痿,崩漏带下,腰膝酸软;龟板胶:滋阴止血。用于阴虚火旺,迫血妄行,崩中,漏下。

#### 8930609

*Platysternon megacephalum* Gray

动物名 平胸龟《中国药用动物志》

药材名 平胸龟甲、平胸龟肉《中国药用动物志》

文献名 阴鼈《医林纂要》,大头平胸龟、大头龟、鹰龟、鹰嘴龟《中国药用动物志》

地方名 广西:山乌龟。

功效 全体:滋阴潜阳,宁心补肾。用于阴虚阳亢,血虚肾虚,眩晕心烦,失眠多梦,遗精腰酸;龟甲:滋阴潜阳,益肾强骨,养血补心;肉:滋润补肺。用于肺结核。

#### 8930610

*Testudo elongata* Blyth

动物名 缅甸陆龟《中国药用动物志》

药材名 龟板《中国药用动物志》

地方名 广西:陆龟。

功效 龟板:滋阴潜阳,补肾健骨。用于阴虚内热,眩晕头痛,遗精阳痿,崩漏带下,腰膝酸软等。

#### 8930611

*Testudo horsfieldi* (Gray)

动物名 四爪陆龟《中国药用动物志》

药材名 龟板《中国药用动物志》

文献名 陆龟《中国药用动物志》

功效 龟板:滋阴潜阳,补肾健骨。用于阴虚内热,眩晕头痛,遗精阳痿,崩漏带下,腰膝酸软等。

#### 8930612

*Testudo impressa* (Guenther)

动物名 凹甲陆龟《中国药用动物志》

药材名 龟板《中国药用动物志》

文献名 陆龟《中国药用动物志》

功效 龟板:滋阴潜阳,补肾健骨。用于阴虚内热,眩晕头痛,遗精阳痿,崩漏带下,腰膝酸软等。

### 89307 海龟科 Cheloniidae

#### 8930701

*Caretta olivacea* (Eschscholtz)

动物名 蠍龟《纲目》、《拉汉海洋生物名称》

药材名 蠍龟筒[皮]、蠍龟甲、蠍龟肉《纲目》、《中药大辞典》

文献名 灵龟《尔雅》,蠍、灵蠍《汉书》,蠍蠍《汉书》应劭注),鼈鼈《吴都赋》,蚶蚶《交州记》,鼈皮《日华子本草》,蠍蠍壳、蠍蠍甲《图经》,蠍龟血、鼈尿《纲目》,海龟《辽宁动物志》

地方名 浙江:红海龟。

功效 皮及鳞甲:滋阴潜阳,柔肝补肾,去火明目。用于血疾,中刀箭毒;肉:去风热,利肠胃。

#### 8930702

*Chelonia mydas* (L.)

动物名 海龟《拉汉海洋生物名称》

药材名 海龟板、海龟掌、海龟胶《中国药用动物志》

地方名 浙江:绿海龟。

功效 龟板和龟掌:滋阴,潜阳,柔肝补肾,清火明目。用于阴虚内热,阳亢眩晕,目赤目暗,肝硬化,气管炎,风湿性关节炎;血、胆、肉:润肺止咳。用于气管炎,哮喘,干咳;肝:用于慢性肠出血;蛋:用于痢疾;龟油:用于水火烫伤;海龟胶:用于胃病,癌肿。

#### 8930703

*Eretmochelys imbricata* (L.)

动物名 玳瑁《拉汉海洋生物名称》

药材名 玳瑁《纲目》、《药典》

文献名 瑇瑁《开宝本草》,玳瑁肉《食性本草》,瑇瑁《桂海虞衡志》,文甲、代尾、斑希、毒冒、实除双牙《新纲》,十三鳞龟、明玳瑁《中国药用动物志》,十三鳞《常见药用动物》

地方名 浙江:长命龟。

功效 背甲:定惊,清热解毒。用于热病,神昏,谵语,疮痍,痘毒发斑,痈疽疮毒;玳瑁肉:主诸风毒,行气血,去胸膈中风痰,镇心神,逐邪热,利大小肠,通妇人经脉。

### 89308 棱皮龟科 Dermochelyidae

#### 8930801

*Dermochelys coriacea* (L.)

动物名 棱皮龟《拉汉海洋生物名称》

药材名 海龟板、海龟胶《中国药用动物志》

地方名 浙江、绿海龟。

功效 龟板和龟掌：滋阴潜阳，柔肝补肾，去火明目。用于阴虚内热，阳亢眩晕，目赤目暗，肝硬化，气管炎，风湿性关节炎；血、胆、肉：润肺止咳。用于气管炎，哮喘，干咳；肝：用于慢性肠出血；蛋：用于痢疾；龟油：外用于水火烫伤；海龟胶：用于胃病，癌肿。

### 89309 鳖科 Trionychidae

#### 8930901

*Pelochelys bibroni* (Owen)

动物名 鼋《中国药用动物志》

药材名 鼋甲《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 鼋肉《本草经集注》，鼋膏《食疗本草》，鼋胆《纲目》，鼋脂《淮南万毕术》，沙鳖、蓝团鱼、绿团鱼、癞头鼋《中国药用动物志》

地方名 广西：沙扁。

功效 背甲：滋阴潜阳，除热散结，益肾健骨。用于阴虚阳亢，目眩头晕，腰膝酸软，瘰癧恶疮，痔瘕，顽癣；脂肪：摩风，恶疮；肉：补益，解毒。用于诸虚；胆、内脏：清热解毒。用于热毒，小儿高热惊风，喉痹。

#### 8930902

*Trionyx sinensis* Wiegmann --- *Amyda sinensis* (Wiegmann)

动物名 鳖《药典》

药材名 鳖甲《本经》、《药典》

文献名 鳖肉《别录》，鳖头《唐本草》，鳖膏《本草拾遗》，鳖甲胶《卫生宝鉴》，鳖卵《本草蒙筌》，鳖血、鳖脂、鳖胆、团鱼《纲目》，上甲《证治要诀》，鳖壳《医林纂要》，甲鱼《随息居饮食谱》，神守、孚乳甲、黑龙衣、鳖津甲《新纲》，鳖首《中药志》，鳖油《现代实用中药》，中华鳖《中药大辞典》，甲鱼头，脚鱼头、脚鱼壳、团鱼盖、团鱼头、团鱼血、别甲胶《汇编》，圆鱼《中国药用动物志》，醋鳖甲《药典》，生鳖甲、九肋鳖甲《常用中药名辨》

地方名 水鱼（山东、江苏、浙江、广东、广西），王八（河北、内蒙古），脚鱼（山东、湖北）；河北：团鱼甲；山西：鳖盖子；内蒙古：“拉格漠勒黑”（蒙名）；陕西：鳖盖；其他：土鳖，别甲，乳甲，土别甲，上鳖甲，河泊从事，水鱼壳，王八盖，王八头。

功效 背甲：滋阴潜阳，软坚散结，退热除蒸。用于阴虚发热，劳热骨蒸，虚风内动，经闭，瘕瘕，久疟疟母；头：用于久痢脱肛，产后子宫下垂，阴疮；肉：滋阴凉血。用于骨蒸劳热，久疟，久痢，崩漏带下，瘰癧；血：用于口眼喎斜，虚劳潮热，脱肛；卵：补阴虚。用于久泻，久痢；胆：用于痔漏；脂肪：滋养强壮；胶块：滋阴，补血，退热，消痰。用于阴虚潮热，久疟不愈，瘕瘕疟母，痔核肿痛。

#### 8930903

*Trionyx steindachneri* Siebenrock

动物名 山瑞鳖《中国药用动物志》

药材名 鳖甲《中国药用动物志》

地方名 广西：山瑞。

功效 背甲：补阴潜阳，清热散结，益肾健胃。用于骨蒸劳热，闭经，瘀血，瘕瘕等。外用于生肌收口，疮疡，鼠瘕等。

### 89310 蜥蜴科 Agamidae

#### 8931001

*Agama himalayana* (Steindachner)

动物名 三鳞环鬣蜥《拉汉脊椎动物名称》

药材名 喜山鬣蜥《中草药》

文献名 西藏蛤蚧《中草药》，藏蛤蚧《中国药用动物志》

功效 肉：滋补，壮阳。用于久病虚损，肾脏病；筋与胆（晒干，去净皮膜，研细末）：外用于敛伤生肌。

备考 《中草药》（1982）称：除去内脏的干燥全体，在西藏产地伪充蛤蚧入药。

#### 8931002

*Calotes versicolor* (Daudin)

动物名 变色树蜥《中国药用动物志》

药材名 鸡冠蛇（广西）

文献名 马鬃蛇、公鸡蛇、雷公蛇《中国药用动物志》，四脚蛇《广西药用动物》

功效 全体（去内脏或去皮浸酒）：祛风湿，壮筋骨。用于风湿病，腰痛，腿痛，筋骨痛，血虚，体弱，小儿疳积。

#### 8931003

*Draco maculatus* Gray

动物名 斑飞蜥《中国药用动物志》

文献名 飞蛇、飞龙、飞蜥《中草药》

功效 全体（去内脏）：清热解毒，透疹。用于麻疹不透，痘毒不消。

#### 8931004

*Japalura flaviceps* (Barbour et Dunn)

动物名 草绿龙蜥《中国药用动物志》

药材名 四脚蛇《四川中药志》

文献名 公蛇《中国药用动物志》

功效 全体：有毒。散结，解毒。用于瘰癧，结核，瘰癧。

#### 8931005

*Japalura polygonata* (Hall.)

动物名 马鬃蛇《中药大辞典》

药材名 马鬃蛇《汇编》

文献名 树蜥蜴《动物学大辞典》

地方名 广西：盐蛇、筒筒马、午时逢（陆川），雷公蛇；其他：树蜥。

功效 全体（除去内脏浸酒）：祛风湿。用于风湿关节痛。

#### 8931006

*Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens)

动物名 蜡皮蜥《中国药用动物志》

文献名 红点蛤蚧《中药材》



地方名 广东:[蛤蚧]。

功效 全体:滋补。用于小儿疳积。

备考 除去内脏的下燥全体,在广州伪充蛤蚧。

#### 8931007

*Phrynocephalus frontalis* Strauch

动物名 草原沙蜥《内蒙古药用动物》

药材名 蟾头蜥(内蒙古)

地方名 内蒙古:“好宁-古日布勒”(蒙名),沙和尚。

功效 全蜥:用于淋巴结核,癫痫;蒙医用除内脏、尾、爪之全体:滋补,生精,壮阳,除鲜,杀虫。用于肾寒,肾虚,腰痛,阳痿,以及由鲜症引起的牙痛,头痛,鼻痒。

#### 8931008

*Phrynocephalus vlangalii* (Strauch)

动物名 青海沙蜥《中国药用动物志》

药材名 沙蜥《中国药用动物志》

功效 全体:滋补壮阳,解毒。用于虚损,疳积,寄生虫病;血;用于内脏损伤。

#### 8931009

*Physignathus cocincinus* Cuvier

动物名 长鬣蜥《广西药用动物》

药材名 大马鬣蛇《广西药用动物》

地方名 广西:马鬣蛇,四脚蛇。

功效 去内脏之全体:祛风,活血,壮筋骨。用于风湿性关节炎,骨节疼痛,腰腿痛,肌肉酸软。

### 89311 壁虎科 Gekkonidae

#### 8931101

*Gekko chinensis* Gray

动物名 蹼趾壁虎《中药大辞典》

药材名 守宫《虫类药的应用》

文献名 壁虎《中国动物药》,中国壁虎《广西药用动物》

地方名 广东:盐蛇;其他:天龙。

功效 全体:有小毒。祛风,活络,散结。

#### 8931102

*Gekko gecko* (L.)

动物名 蛤蚧《药典》

药材名 蛤蚧《雷公炮炙论》、《药典》

文献名 蛤蜊《日华子本草》,仙蟾《纲目》,大壁虎《中药志》,蛤蚧蛇《中国药用动物志》

地方名 蚺蛇(广东、广西):广东:合蛇;广西:德多,握几,石牙,多格;其他:合介,天龙,大蛤蚧,南蚺蚺,尾蛤蚧,对蛤蚧。

功效 全体(去内脏):补肺益肾,纳气定喘,助阳益精。用于虚喘气促,劳嗽咳血,阳痿遗精;蛤蚧尾:补肺肾。用于久咳。

#### 8931103

*Gekko japonicus* (Dumeril et Bibron)

动物名 多疣壁虎《中国药用动物志》

药材名 守宫《中国药用动物志》

文献名 蛤蚧娃《中草药》,多疣壁虎、盐蛇(《药典》

附录)

地方名 陕西:蝎虎,壁虎,(蛤蚧)(山阳);其他:壁宫,蜥蜴,天虎。

功效 全体:有小毒。祛风,活络,散结。用于中风瘫痪,风湿关节痛,骨髓炎,淋巴结核。

#### 8931104

*Gekko subpalmatus* Guenther

动物名 无疣壁虎《汇编》

药材名 壁虎《汇编》

文献名 蹼趾壁虎《广西药用动物》

地方名 四川:守宫(南充)。

功效 全体:有小毒。祛风,活络,散结。用于中风瘫痪,风湿关节痛,骨髓炎,淋巴结核,肿瘤,历节风,破伤风。

#### 8931105

*Gekko swinhoana* Guenther

动物名 无蹼壁虎《中国药用动物志》

药材名 壁虎《纲目》、《中药大辞典》

文献名 守宫、蜥蜴《尔雅》,蚺蜥《方言》,蝎虎、壁宫《唐本草》,辟宫子《圣惠方》,地塘虫《摘元方》,天龙《饮片新参》

地方名 陕西:爬墙虎(西安);四川:爬壁虎。

功效 全体:祛风,定惊,散结,解毒。用于中风瘫痪,历节风痛,风痰惊痫,瘰癧,恶疮。

#### 8931106

*Hemidactylus bowringii* (Gray)

动物名 原尾蝎虎《中国药用动物志》

药材名 盐蛇《广西药用动物》

文献名 纵斑蜥虎《中国动物药》,壁虎、守宫《中药通报》,蜥虎《中国药用动物志》

地方名 广西:天龙。

功效 全体:祛风,活血,解毒,散结。用于中风瘫痪,小儿惊风,破伤风,历节风痛,手足不举,小儿疳积,瘰癧,瘰癧,蝎螫伤。

#### 8931107

*Hemidactylus brooki* Gray

动物名 密疣蜥虎《中国药用动物名录》

功效 全体:祛风,镇静,破血积。用于瘰癧结核,中风瘫痪。

#### 8931108

*Hemidactylus frenatus* Schlegel

动物名 棘尾蜥虎《中国药用动物志》

文献名 横斑蜥虎《中国动物药》,蜥虎《中国药用动物志》

功效 全体:解毒,消肿,止痛。用于痢疽疼痛,瘰癧,扁桃体炎。

#### 8931109

*Hemidactylus garnotii* Dumeril et Bibron

动物名 锯尾蜥虎《中国药用动物名录》

功效 全体:解毒,消肿,止痛。用于痢疽疼痛,瘰癧,扁桃体炎。

#### 8931110

*Hemiphyllodactylus yunnanensis* (Blgr.)

动物名 半叶趾虎《广西药用动物》

功效 全体:有小毒。祛风,镇痉,破血积,消瘰癧结核,抗癌或抑癌。用于中风瘫痪,手足不举,小儿疳积,破伤风,瘰癧,食道癌,宫颈癌,蝎蜇伤。

### 89312 石龙子科 Scincidae

#### 8931201

*Eumeces chinensis* (Gray)

动物名 石龙子《中国药用动物志》

药材名 石龙子《本经》、《中药大辞典》

文献名 蜥蜴《本经》,山龙子、守宫、石蜴《别录》,泉龙《春秋繁露》注,猪婆蛇《纲目》,中国石龙蜥《中国药用动物志》

地方名 广西:五寸棍(陆川);四川:四脚蛇。

功效 去内脏全体:有小毒。破结,行水。用于小便不利,石淋,恶疮,瘰癧,乳癌,肺瘤,风湿,瘰癧。

#### 8931202

*Eumeces elegans* Boulenger

动物名 蓝尾石龙子《中国药用动物志》

药材名 石龙子《中国药用动物志》

文献名 蓝尾四脚蛇《中国药用动物志》

功效 去内脏全体:有小毒。解毒,散结,行水。用于恶疮,瘰癧,乳癌,肺瘤,小便不利,石淋,风湿,皮肤瘙痒;肉(鲜品):用于小儿虚弱,疳瘦。

#### 8931203

*Leiopisma modestum* (Guenther)

动物名 宁波滑蜥《浙江中医学院学报》

功效 去内脏全体:有小毒。解毒,破结,行水。用于乳癌,肺瘤,风湿,疮毒。

#### 8931204

*Lygosoma indicum* (Gray)

动物名 蜥蜴《中国动物药》

药材名 蜥蜴《中国动物药》

文献名 肥仔蛇、猪仔蛇、石蜴《常见药用动物》,铜石龙子《浙江中医学院学报》

地方名 陕西:石蜥;湖北:蛇郎中、四脚蛇(神农架);贵州:石龙子。

功效 除去内脏的干全体:解毒,祛风,止痒。用于淋巴结核,风湿性关节炎。

#### 8931205

*Sphenomorphus indicus* (Gray)

动物名 铜楔蜥《中国药用动物志》

药材名 铜石龙子《汇编》

文献名 山龙子、石蜴《纲目》,石龙子《汇编》,蜥蜴《中国药用动物志》,铜石龙蜥《陕西中药名录》

地方名 广西:四脚蛇,肥仔蛇,猪婆蛇。

功效 去内脏之全体:解毒,祛风,止痒。用于肺瘤,淋巴结核,风湿性关节炎,皮肤发痒,疮毒。

备考 近年来临床用于乳腺癌,有一定的疗效。

#### 8931206

*Sphenomorphus maculatus* (Blyth)

动物名 花楔蜥《汇编》

功效 全体:解毒,祛风,止痒。

### 89313 蜥蜴科 Lacertidae

#### 8931301

*Eremias argus* Peters

动物名 丽斑麻蜥《中国药用动物志》

药材名 蜥蜴《中国药用动物志》

文献名 麻蜥《汇编》,蛇狮子《中国药用动物志》

地方名 马蛇子(辽宁、吉林);吉林:麻蛇子;内蒙古:“毛躁-古日布勒”(蒙名);湖北:马蛇(神农架)。

功效 全体:活血祛瘀,消癥散结,解毒镇静。用于骨折,淋巴结核,气管炎,羊痫风。

#### 8931302

*Eremias brenchleyi* (Guenther)

动物名 山地麻蜥《中国药用动物志》

药材名 蜥蜴《中国药用动物志》

文献名 山麻蜥《汇编》,华北麻蜥《山东药用动物》

功效 全体:活血祛瘀,消癥散结,解毒镇静。用于骨折,淋巴结核,气管炎,羊痫风。

#### 8931303

*Eremias multiocellata* (Guenther)

动物名 密点麻蜥《中国药用动物志》

药材名 蜥蜴《中国药用动物志》

地方名 辽宁:马蛇子。

功效 全体:活血祛瘀,消癥散结,解毒镇静。用于骨折,淋巴结核,气管炎,羊痫风。

#### 8931304

*Takydromus amurensis* (Peters)

动物名 黑龙江草蜥《中国药用动物志》

药材名 龙江草蜥《东北动物药》

文献名 山马蛇子、树马蛇子、蛇师《中国药用动物志》

地方名 辽宁:四脚蛇,马蛇子,长尾巴马蛇子。

功效 全体:祛风,除湿,止痛。用于风湿腰腿疼痛。

#### 8931305

*Takydromus septentrionalis* Guenther

动物名 北方草蜥《山东药用动物》

功效 全体:活血祛瘀,消癥散结,解毒镇静。用于骨折,淋巴结核,气管炎,羊痫风。

#### 8931306

*Takydromus wolteri* Fister

动物名 白条草蜥《中国药用动物志》

地方名 辽宁:马蛇子。

功效 全体:活血祛瘀,消癥散结,清热解毒,安神镇静。用于跌扑骨折,淋巴结核,气管炎,羊痫风等。

### 89314 蛇蜥科 Anguidae

#### 8931401

*Ophisaurus gracilis* (Gray)

动物名 细蛇蜥《中国药用动物志》

文献名 地鼈、云南蛇蜥《中国药用动物志》

功效 干燥全体：驱风除湿，舒筋活络。用于风湿疼痛，头晕目眩，跌打筋伤，接骨生肌，痈疽恶疮，麻风，疥癣。

#### 8931402

*Ophisaurus harti* (Boulenger)

动物名 脆蛇蜥《中国药用动物志》

药材名 蛇蜥《汇编》

文献名 金蛇《本草拾遗》，地鲜、蜴蛇《岭表录异》，银蛇《开宝本草》，金星地鼈《图经》，金星鼈《圣济总录》，脆蛇《纲目拾遗》，片蛇《真略》，无脚蜥《动物学大辞典》

地方名 碎蛇、地鼈（广西、四川）；四川：锡蛇，干黄鼈（洪雅）。

功效 干燥全体：驱风除湿，舒筋活络。用于风湿疼痛，头晕目眩，跌打损伤，接骨生肌，痈疽恶疮，麻风，疥癣。

### 89315 蟒科 Boidae

#### 8931501

*Python molurus bivittatus* (Schlegel)

动物名 蟒蛇《中国药用动物志》

药材名 蟒蛇肉《食疗本草》，蟒蛇胆《别录》、《中药大辞典》

文献名 蟒、王蛇《尔雅》，蟒蛇膏《别录》，南蛇、埋头蛇《纲目》，王字蛇、蟒油《纲目拾遗》，琴蛇《中药大辞典》，蚺、巴蛇《经济两栖爬行动物》，龙衣、蛇蛻、金花大蛇《中国药用动物志》

地方名 广西：金花大蟒，黑尾蟒，梅花蛇。

功效 肉：有小毒。祛风，杀虫。用于风痹，瘫痪，疔风，疥癣；胆：有毒。燥湿，杀虫，明目。用于脘腹虫痛，疳痢，痈疾，痔疮，目翳肿痛；脂肪（蟒蛇膏）：有小毒。用于风毒癩痔，漏疮；蛇蛻：杀虫。用于疥癣，恶疮；血：用于风湿病；皮：用于牙痛。

### 89316 游蛇科 Colubridae

#### 8931601

*Coluber spinalis* (Peters)

动物名 黄脊游蛇《中国药用动物志》

药材名 白线蛇《中国药用动物志》

文献名 黄脊蛇、白蛇《汇编》，黄线蛇《中国药用动物志》

地方名 辽宁：白线子，白带子，线长虫（清原）；内蒙古：“希日-苏打勒图-毛盖”（蒙名），白脊蛇。

功效 去内脏全体：祛风除湿，止痛。用于风湿性关节炎，肢体麻木不仁。

#### 8931602

*Dinodon rufozonatum* (Cantor)

动物名 赤链蛇《纲目》、《中国药用动物志》

药材名 火赤链蛇《中国药用动物志》

文献名 赤链《本草经集注》，赤楝蛇、桑根蛇《纲目》，火赤炼（陈义《动物学》），火练蛇（薛德煊《系统动

物学》），红斑蛇《生物学通报》

地方名 辽宁：火赤链、水长虫（盖县），火杠子（庄河），小豆粒子（宽甸、桓仁），红长虫（清原）；浙江：（乌梢蛇）；湖北：红蛇（神农架）。

功效 全蛇：祛风湿，止痛。用于风湿性关节炎，肢体麻木。

备考 有以本品蛇身伪充金钱白花蛇（*Bungarus multicinctus*）者。

#### 8931603

*Dinodon septentrionalis* (Guenther)

动物名 黄链蛇《浙江中医学院学报》

药材名 黄链蛇《中国药用动物名录》

功效 全蛇：祛风湿，止痛。用于风湿性关节炎，肢体麻木。

#### 8931604

*Elaphe bimaculata* Schmidt

动物名 双斑锦蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蛻《中国药用动物志》

功效 皮膜：祛风，解毒，杀虫，明目。用于惊痫，喉痹，诸疮痈肿，疥癣目翳。

#### 8931605

*Elaphe carinata* (Guenther)

动物名 锦蛇《药典》

药材名 蛇蛻《本经》、《药典》

文献名 龙子衣、蛇符、龙子单衣、弓皮《本经》，蛇脱、蛇附、蛇筋、龙皮、龙单衣《吴普本草》，龙子皮《别录》，蛇皮《药性赋》，蛇壳、龙退《纲目》，石龙衣、蛇脱皮、蛇退皮、局皮《新纲》，棱锦蛇、王锦蛇、臭黄颌、棱鳞锦蛇、王蛇、油菜花、黄蟒蛇《中国药用动物志》，松花蛇《中草药》，龙衣《简明中医辞典》

地方名 浙江：（乌梢蛇）。

功效 蛻下的表皮膜（蛇蛻）：祛风，定惊，解毒，退翳。用于小儿惊风，抽搐痉挛，角膜出翳，喉痹，疔肿，皮肤瘙痒。

#### 8931606

*Elaphe davidi* (Sauvage) --- *Tropidonotus davidi* Sauvage

动物名 团花锦蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蛻《中国药用动物志》

文献名 蓝颈锦蛇《东北动物药》，黑颈锦蛇《中国药用动物志》

地方名 辽宁：花长虫。

功效 皮膜：祛风，解毒，杀虫，明目。用于惊痫，喉痹，诸疮痈肿，疥癣，目翳等。

#### 8931607

*Elaphe dione* (Pallas) --- *Coluber dione* Pallas

动物名 枕纹锦蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蛻《中国药用动物志》

文献名 乌梢蛇《东北动物药》，白条锦蛇《山东药用动物》

地方名 辽宁：黑斑蛇、草梢子、黄点蛇、白带子、小豆粒子、香长虫（锦西）；内蒙古：“查干额日彦-毛盖”（蒙名）；其他：麻蛇。

功 效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931608

*Elaphe frenata* (Gray)

动物名 灰腹绿锦蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蜕《中国药用动物志》

功 效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931609

*Elaphe mandarina* (Cantor) - *Coluber mandarinus* Cantor

动物名 玉斑锦蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蜕《中国药用动物志》

地方名 辽宁:玉带蛇、花蛇(义县)。

功 效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931610

*Elaphe moellendorffi* (Boettger)

动物名 百花锦蛇《中国药用动物志》

药材名 百花锦蛇《中国药用动物志》

文献名 百花蛇、菊花蛇、花蛇、盘蛇、饼蛇、板蛇《中国药用动物志》

地方名 广西:白花蛇、金钱白花蛇〔幼蛇加工成饼状〕。

功 效 蛇肉:搜风胜湿,通经活络,定惊,强腰膝。用于中风半身不遂,口眼喎斜,筋脉拘急,湿痹不仁,骨节疼痛,麻风疥癣,小儿惊风,破伤风;蛇蜕:杀虫。外用于疥癣,恶疮;胆囊:祛风,除痰,止咳。用于咳嗽,风湿病;脂肪油:清热解毒,消肿止痛。用于烫伤,冻伤,皮肤皸裂。

#### 8931611

*Elaphe porphyracea* (Cantor)

动物名 紫灰锦蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蜕《中国药用动物志》

功 效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931612

*Elaphe radiata* (Schlegel)

动物名 三索锦蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇胆汁(《药典》附录)

文献名 三索线蛇(《药典》附录)

地方名 三索线、广蛇(广东、广西)。

功 效 肉:祛风除湿,舒筋活络。用于风湿性关节痛,神经衰弱,消化不良;蛇蜕:祛风,解毒,杀虫,明目。用于风湿瘙痒,皮肤疮疖,目赤翳障;蛇胆:清热祛痰,祛风明目。用于急性支气管炎,目赤肿痛。

#### 8931613

*Elaphe rufodorsata* (Cantor)

动物名 红点锦蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蜕《中国药用动物志》

文献名 黄颌蛇《动物学杂志》

地方名 辽宁:水蛇、铁树皮(宽甸),白带子(桓仁);内

蒙古:“乌兰道勒布图-毛躁”(蒙名);浙江:[乌梢蛇]。

功 效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931614

*Elaphe schrenckii* (Strauch)

动物名 棕黑锦蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蜕《中国药用动物志》

地方名 辽宁:乌虫,黄花松。

功 效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮,痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931615

*Elaphe taeniurus* Cope

动物名 黑眉锦蛇《药典》

药材名 蛇蜕《本经》、《药典》

文献名 龙子衣、蛇符、龙子单衣、弓皮《本经》,蛇脱、蛇附、蛇筋、龙皮、龙单衣《吴普本草》,龙子皮《别录》,蛇皮《药性赋》,黄颌蛇、黄颌蛇头、黄喉蛇、黄颌蛇骨、蛇壳、龙退《纲目》,蛇退皮、局皮、蛇衣、蛇脱皮、石龙衣《新纲》,慈鳗《生物学通报》

地方名 菜花蛇、秤星蛇(江苏、四川),龙衣(广西、四川);江苏:花广蛇;浙江:[乌梢蛇],黄长虫;广西:蛇退,蛇壳子,长早皮,双线蛇,三索线,广蛇,菜化蛇。

功 效 皮膜:祛风,定惊,解毒,退翳。用于小儿惊风,抽搐疹掌,角膜出翳,喉痹疗肿,皮肤瘙痒;肉:用于风癩,顽癣,恶疮;蛇头:用于久疔,小肠痈;骨:用于久疔,劳疔。

#### 8931616

*Enhydryis chinensis* (Gray)

动物名 中国水蛇《中国药用动物志》

药材名 水蛇《纲目》、《中药大辞典》

文献名 公蛻蛇《本草经集注》,水蛇皮《纲目》,泥蛇《中国药用动物志》

地方名 广西:金边泥蛇。

功 效 肉:除湿止痒。用于皮肤湿痒,毒痢,痔疮;蛇皮:用于小儿骨疽,出血流脓。

#### 8931617

*Enhydryis plumbea* (Boie)

动物名 铅色水蛇《中国药用动物志》

地方名 广西:水泡蛇。

功 效 肉:除湿止痒。用于皮肤湿痒,毒痢,痔疮;蛇皮:用于小儿骨疽,出血流脓。

备 考 金钱白花蛇之伪品,大多数为本品,应注意鉴别。

#### 8931618

*Natrix annularis* (Hallowell)

动物名 水赤链游蛇《中草药》

地方名 浙江:[乌梢蛇]。

备 考 浙江地区用本品之全蛇充乌梢蛇出售。

#### 8931619

*Natrix craspedogaster* (Boulenger)

动物名 锈链游蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蜕《中国药用动物志》

功效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931620

*Natrix muchalis* (Boulenger)

动物名 劲槽游蛇《中国药用动物名录》

药材名 蛇蜕(西北、西南)

功效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931621

*Natrix natrix* (L.)

动物名 游蛇《中国药用动物名录》

药材名 蛇蜕(新疆)

功效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931622

*Natrix percarinata* (Boulenger)

动物名 乌游蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蜕《中国药用动物志》

文献名 草赤链《中国药用动物志》

功效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931623

*Natrix piscator* (Schneider)

动物名 渔游蛇《中国药用动物志》

药材名 渔游蛇肉(广东、广西)

文献名 红槽蛇《中国药用动物志》

功效 肉:祛风除湿,舒筋活络。用于风湿性关节炎,神经衰弱,消化不良;皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于风湿痒痒,皮肤疮疖,目赤翳障;蛇胆:清热祛痰,祛风明目。用于急慢性支气管炎,目赤肿痛。

备考 有以本品伪充金钱白花蛇者。

#### 8931624

*Natrix storata* (L.)

动物名 草游蛇《中国药用动物志》

药材名 蛇蜕《中国药用动物志》

地方名 浙江:乌梢蛇;其他:花浪蛇,斑背蛇。

功效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931625

*Natrix tigrina lateralis* (Berthold)

动物名 虎斑游蛇《中国药用动物志》

药材名 虎斑游蛇《汇编》

地方名 野鸡脖子(山东、贵州);山东:竹竿青,雉鸡脖;湖北:野鸡项(神农架);其他:菜子蛇。

功效 全体:解毒,止痛,祛风湿。用于骨结核,骨质增生,风湿症。

#### 8931626

*Natrix vibakari* (Boie) --- *Tropidonotus vibakari* Boie ---

*Natrix vibakari* Stejneger

动物名 灰链游蛇《辽宁动物志》

药材名 蛇蜕《东北动物药》

文献名 灰锦游蛇《中国药用动物名录》

地方名 辽宁:水长蛇。

功效 皮膜:祛风,解毒,杀虫,明目。用于惊痫,喉痹,诸疮痈肿,疥癣,目翳。

#### 8931627

*Opheodrys major* (Guenther)

动物名 翠青蛇《药典》附录)

药材名 蛇肉《药典》附录)

功效 肉:祛风除湿,舒筋活络。

#### 8931628

*Ptyas korros* (Schlegel)

动物名 灰鼠蛇《中国药用动物志》

文献名 过树榕蛇、蛇胆汁《药典》附录),过树蛇、黄梢蛇、上竹龙《汇编》

地方名 过树龙、过树榕、榕蛇、索蛇、跳树标、黄梢蛇、黄肚仔、黄肚龙(广东、广西)。

功效 肉:祛风除湿,舒筋活络,止痛。用于半身不遂,风湿痹痛;蛇胆:清热祛痰。用于热痰壅盛,目赤。

#### 8931629

*Ptyas mucosus* (L.)

动物名 滑鼠蛇《中国药用动物志》

药材名 滑鼠蛇《中草药》

文献名 黄国蛇《中国药用动物志》

地方名 水律蛇、长标蛇(广东、广西);浙江:(乌梢蛇);广西:水南蛇。

功效 肉:祛风除湿,舒筋活络。用于风湿性关节炎,麻痺,瘫痪。

#### 8931630

*Zaocys dhumnades* (Cantor)

动物名 乌梢蛇《中国药用动物志》

药材名 乌梢蛇《纲目》、《药典》,蛇蜕《本经》、《药典》,蛇胆汁《药典》附录)

文献名 蛇符、龙子衣、龙子单衣、弓皮《本经》,蛇脱、蛇附、龙皮、龙单衣、蛇筋《吴普本草》,龙子皮《别录》,乌蛇《药性论》,剑脊乌梢《本草衍义》,黑花蛇、乌蛇皮、乌蛇卵、蛇壳、乌蛇胆、乌蛇膏《纲目》,局皮、蛇皮、蛇衣、龙退、石龙衣、蛇脱衣、黑风蛇、蛇退皮、乌风蛇《新纲》,黄风蛇、剑脊乌梢蛇、剑脊蛇《中药志》,乌峰蛇《陈义《动物学》》,青蛇《现代实用中药》,酒蛇蜕《药典》

地方名 陕西:乌花蛇;浙江:青大将;四川:黑乌梢,三棱子蛇蛋;其他:乌虫,长虫,蛇退,龙衣。

功效 蜕下的表皮膜(蛇蜕):祛风,定惊,解毒,退翳。用于小儿惊风,抽搐痉挛,角膜出翳,喉痹,疔肿,皮肤瘙痒;卵:用于大风癩疾;皮:用于风毒气,眼生翳,唇紧,唇疮;胆:祛风,清热,化痰,明目;脂肪:用于耳聋。

### 89317 眼镜蛇科 Elapidae

#### 8931701

*Bungarus fasciatus* (Schneider)

动物名 金环蛇《拉汉脊椎动物名称》

药材名 金环蛇《汇编》,蛇胆汁《药典》附录)

文献名 铁包金《中国药用动物志》,金脚带、黄金甲《鉴别手册》

地方名 广东:黄金格;广西:金蛇,金包铁,金角带,金报应,手巾蛇,半箕甲,黄节蛇,国公鞭。

功效 全体(去内脏):通关透节,祛风。用于风湿麻痹,手足瘫痪,肿痛;蛇毒:镇痛。用于神经痛,风湿关节痛,晚期癌痛等,蛇胆:清热除痰。用于热痰壅盛;蛇蜕:亦可入药。

#### 8931702

*Bungarus multicinctus multicinctus* (Blyth)

动物名 银环蛇《拉汉脊椎动物名称》

药材名 金钱白花蛇《饮片新参》、《药典》

文献名 白花蛇《中药志》,手巾蛇、百节蛇、白菊花、多条金甲带、断肌甲《中药志》,小白花蛇《鉴别手册》,金钱蛇、金钱蕲蛇《中药大辞典》,银脚带、白节黑、簸箕甲《中国药用动物志》,白花蛇肉、花蛇肉《常用中药名辨》

地方名 寸白蛇(浙江、广西),雨伞蛇(台湾、广西);湖北:竹节蛇;湖南:四十八节;广东:过基峡;广西:银蛇,银角带,银包铁,银报应,断基甲,过基甲,白节蛇,白吊蛇,白毛巾蛇,臭蛇,节节乌。

功效 蛇体:有毒。祛风,活络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口喎,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风症,麻风疥癣,瘰癧恶疮;胆汁:清热化痰,镇静。用于热痰壅盛,小儿惊风,目赤肿痛。

#### 8931703

*Naja naja atra* (L.)

动物名 眼镜蛇《中国药用动物志》

药材名 眼镜蛇肉、眼镜蛇毒《中国药用动物志》

文献名 五毒蛇《脊椎动物分类学》,白颈丫《汇编》,蛇胆汁《药典》附录,扁头蛇《中国药用动物志》

地方名 万蛇(福建、广东、广西),吹风蛇、蝙蝠蛇、饭铲头(广东、广西),膨颈蛇(福建、广西);福建:饭匙倩;广西:吹风鳖,饮匙头,扁头风,喷鸡蛇,琵琶蛇,乌肉蛇,犁头扑。

功效 全体(去内脏):有毒。通经络,祛风湿。用于风湿关节痛,脚气;胆汁也入药;眼镜蛇毒:止痛。

#### 8931704

*Ophiophagus hannah* (Cantor) --- *Naja hannah* (Cantor)

动物名 眼镜王蛇《中国药用动物志》

药材名 眼镜王蛇《中国动物药》

文献名 大扁颈蛇、大眼镜蛇、大饭匙倩、过山峰《中国药用动物志》

地方名 广西:山万蛇,过山风,大吹风蛇,蛇王,英雄蛇,麻骨乌,大膨颈蛇,扁颈蛇。

功效 蛇肉:祛风,通络,舒筋活血,强壮。用于风湿关节炎,类风湿性关节炎,瘫痪,半身不遂,腰肌劳损;蛇胆:解毒,祛风化湿,镇咳除痰,定惊。用于小儿百日咳、肺炎,支气管炎,咳嗽痰喘,痰热惊厥;蛇毒:镇痛。用于神经衰弱,风湿痛,晚期癌肿痛。

### 89318 海蛇科 Hydrophiidae

#### 8931801

*Acalyptophis peronii* Daudin

动物名 棘毗海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 蛇肉、蛇胆《中药材科技》

功效 蛇肉:用于小儿营养不良;蛇胆:补气血,壮筋骨。

#### 8931802

*Astrotia stokesi* (Gray)

动物名 棘鳞海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《纲目》、《汇编》

文献名 黄海蛇《汇编》

功效 肉:用于风湿性关节痛,支气管炎,咳嗽,疥癣;胆:补气血,壮筋骨;血:用于火烫伤;油:外用于伤处。

#### 8931803

*Emydocephalus ijimae* Stejneger

动物名 龟头海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《汇编》

功效 肉:用于支气管炎;胆:补气血,壮筋骨。用于风湿性关节痛;血:用于火烫伤;油:外用于伤处。

#### 8931804

*Hydrophis caeruleus* (Shaw)

动物名 青灰海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《纲目》、《汇编》

文献名 黄腹海蛇《汇编》

功效 肉:用于支气管炎咳嗽;胆:补气血,壮筋骨;血:用于火烫伤;油:外用于伤处。

#### 8931805

*Hydrophis cyanocinctus* (Daudin)

动物名 青环海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《纲目》、《汇编》

文献名 蛇婆《本草拾遗》,斑海蛇《中国药用动物志》,海青蛇《中药材科技》,蛇毒《海洋药物》

地方名 辽宁:海长虫。

功效 去内脏之蛇体:滋补强壮,祛风止痛,舒筋活络,除湿止痒。用于小儿营养不良,风湿性关节炎,腰腿酸痛,肌肤麻木,产后风,皮肤湿痒,疮疖等。

#### 8931806

*Hydrophis fasciatus* (Guenther)

动物名 环纹海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇(浙江)、《中国海洋药物》

地方名 浙江:蛇婆。

功效 蛇肉及海蛇干:用于小儿营养不良,风湿痛,诸风麻痹,半身不遂,破伤风,惊痫,麻风恶疮,慢性湿疹,荨麻疹,紫、白癜风,淋巴结核,关节结核。

#### 8931807

*Hydrophis melanocephalus* Gray

动物名 黑头海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《纲目》、《汇编》

文献名 蛇婆《本草拾遗》

功效 去内脏之蛇体；滋补强壮，祛风止痛，舒筋活络，除湿止痒。用于小儿营养不良，风湿性关节炎，腰腿酸痛，肌肤麻木，产后风，皮肤湿痒，疮疖等。

#### 8931808

*Hydrophis ornatus* (Gray)

动物名 黑点海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《山东、广东》、《汇编》

文献名 淡灰海蛇《中药材科技》

功效 去内脏之蛇体；滋补强壮，祛风止痛，舒筋活络，除湿止痒。用于小儿营养不良，风湿性关节炎，腰腿酸痛，肌肤麻木，产后风，皮肤湿痒，疮疖等。

#### 8931809

*Lapemis hardwickii* Gray

动物名 平颞海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《纲目》、《汇编》

文献名 蛇婆《本草拾遗》，棘海蛇《汇编》，哈氏平颞蛇《山东药用动物》

地方名 广西：平颞蛇。

功效 肉：用于支气管炎咳嗽；胆：补气血，壮筋骨；血：用于烫伤；油：外用于伤处。

#### 8931810

*Laticauda colubrina* (L.)

动物名 蓝灰扁尾蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《汇编》

文献名 大灰蛇《汇编》

功效 肉：用于支气管炎，咳嗽；胆：补气血，壮筋骨；血：用于火烫伤；油：外用于伤处。

#### 8931811

*Laticauda laticauda* (L.)

动物名 扁尾蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《汇编》

功效 肉：用于支气管炎，咳嗽；胆：补气血，壮筋骨；血：用于火烫伤；油：外用于伤处。

#### 8931812

*Laticauda semifasciata* (Reinwardt) --- *Platurus semifasciata* Rein.

动物名 半环扁尾蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《纲目》、《汇编》

文献名 蛇婆《本草拾遗》，半环扁尾海蛇《辽宁动物志》

地方名 辽宁：海长虫。

功效 肉：用于支气管炎，咳嗽；胆：补气血，壮筋骨；血：用于火烫伤；油：外用于伤处。

#### 8931813

*Microcephalophis gracilis* (Shaw)

动物名 小头海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《汇编》

功效 肉：用于支气管炎，咳嗽；胆：补气血，壮筋骨；血：用于火烫伤；油：外用于伤处。

#### 8931814

*Pelamis platurus* (L.)

动物名 长吻海蛇《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《汇编》

文献名 黑背海蛇《汇编》，细腹鳞海蛇《中国药用动物志》

地方名 广西：长吻蛇；其他：黄腹海蛇。

功效 全蛇：祛风燥湿，通络活血，滋补强壮。用于风湿腰腿痛，小儿营养不良。

#### 8931815

*Prasutata viperina* (Schmidt)

动物名 海蝰《拉汉海洋生物名称》

药材名 海蛇《中国药用动物志》

文献名 黑尾海蛇《中国药用动物志》

地方名 辽宁：海长虫。

功效 肉：除湿清热。用于皮肤湿疹，疮疖等。

### 89319 蝰科 Viperidae

#### 8931901

*Agkistrodon halys* (Pallas) --- *Trigonscephalus blomhoffii* Boie

动物名 蝮《拉汉脊椎动物名称》

药材名 蝮蛇胆《别录》

文献名 虺《诗经》，蝮蛇肉《别录》，蝮蛇皮、蝮蛇蜕皮《唐本草》，蝮蛇脂、蝮蛇骨《本草拾遗》，反鼻《经典释文》，土虺蛇《普济方》，反鼻蛇《纲目》，碧飞《湖州府志》，方胜板、土锦、灰地匾《纲目拾遗》，地扁蛇、反鼻霜、五八霜、五八草、十三草《新纲》，狗屎蝮《生物学通报》，土谷蛇、土布袋、土狗子蛇、土虺、灶土蛇、烂肚蝮《汇编》，狗屎蝮、烂土蛇、烂肚蝮《中国药用动物志》

地方名 土球子（东北）；内蒙古：“扎嘎勒卖图-毛盖”（蒙名），乌蛇；陕西：七寸蛇；江苏：七寸子；浙江：狗屎扑，灰链鞭，草上飞；安徽：土公蛇；江西：麻七寸，烂肚蛇；四川：土夫蛇；其他：土蝮蛇，赤蝮蛇，黑蝮蛇，土里蛇。

功效 去内脏全体：有毒。祛风，攻毒。用于麻风，癩疾，皮肤顽痹，瘰癧，痔疾；蝮蛇皮：用于疔肿，恶疮，骨疽；骨（灰）：用于赤痢；胆：用于龔疮；脂肪（绵裹）：用于塞耳聋，敷肿毒；蜕皮：用于身痒，疥癣等。

备考 据《常见药用动物》（1984）记载：蝮蛇做成蒸馏液，可治疗骨髓炎，骨结核，肺结核。用白酒泡活蛇，制成蝮蛇酒，可疗风湿症。

#### 8931902

*Agkistrodon halys brevicaudus* (Stejneger) --- *Agkistrodon blomhoffii brevicaudus* Stejneger

动物名 短尾蝮《拉汉脊椎动物名称》

药材名 蝮蛇《贵州药录》

文献名 白眉短尾蝮蛇《沈药学报》，白花蛇《浙江中医学院学报》

地方名 辽宁：贴树皮，土球子，花长虫，驴咒根子。

功效 去内脏全体：祛风，镇痛，解毒，补益，下乳。用于风湿痹痛，麻风，淋巴结核。

备考 据《沈药学报》(1985)报导:蛇毒可制备蝮蛇抗栓酶注射液,有显著的去纤、降脂、降血液粘度作用,是治疗闭塞性血管疾病很有前途的药物。

#### 8931903

*Agkistrodon halys intermedius* (Strauch)

动物名 介纹蝮《拉汉脊椎动物名称》

文献名 西伯利亚蝮蛇《中药材科技》

功效 全体(去内脏):祛风,镇痛,解毒,补益,下乳。

#### 8931904

*Agkistrodon monticola* Werner

动物名 山蝮《拉汉脊椎动物名称》

文献名 雪山蝮蛇《中药材科技》

功效 全体(去内脏):祛风,镇痛,解毒,补益,下乳。

#### 8931905

*Agkistrodon shedaoensis*

动物名 蛇岛蝮蛇《沈药学报》

药材名 蛇毒(辽宁蛇岛)

功效 蛇毒液:可制备蝮蛇抗栓酶注射液,是治疗闭塞性血管疾病的很有前途的药物。

#### 8931906

*Agkistrodon strauchi* Bedriaga

动物名 高原蝮《拉汉脊椎动物名称》

药材名 蝮蛇《中国药用动物志》

文献名 高山蝮蛇《中药材科技》,蛇肉(《药典》附录)

功效 全体(去内脏):祛风,镇痛,解毒,补益,下乳。用于风湿痹痛,麻风病,淋巴结核,疮疖,病后虚弱,多汗,神经衰弱,乳汁不足。

#### 8931907

*Dienagkistrodon acutus* (Guenther) --- *Agkistrodon acutus* (Guenther)

动物名 尖吻蝮《拉汉脊椎动物名称》

药材名 蕲蛇《纲目》、《药典》

文献名 赛鼻蛇、白蛇、棋盘蛇《开宝本草》,白花蛇头、白花蛇目睛《纲目》,黔蛇《新纲》,大白花蛇《鉴别手册》,五步跳、龙蛇、蕲蛇羞[撑开焙干者]、蕲蛇棍[直接焙干者]《中药大辞典》,蕲蛇肉、酒蕲蛇《药典》

地方名 五步蛇(安徽、广西),百步蛇(台湾、广西),翻身花(湖南、广西);浙江:放丝蛇;广西:聋婆蛇,饭匙倩,盘蛇;贵州:翘鼻蛇,犁头匠;其他:响尾蛇,花虫,花蛇,析蛇,奇蛇,正析蛇,红骨蛇,金星地鳞,百步龙。

功效 蛇体:有毒。祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼喎斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风症,麻风疥癣;头:用于癰疽毒瘰;眼睛:用于小儿夜啼。

备考 1. 经考证,李时珍《本草纲目》所称之蕲蛇为本品,而福建之蕲蛇则为 *Trimeresurus mucrosquamatus* (Cantor) (烙铁头),色淡灰,有黑花。2. 白花蛇亦有异物同名。五步蛇(尖吻蝮)即为古代所用的白花蛇。广大地区除用五步蛇外,又习惯以幼小的银环蛇

称金钱白花蛇药用,亦有较长的历史。为便于区别,称五步蛇为蕲蛇,称幼小的银环蛇为金钱白花蛇。

#### 8931908

*Trimeresurus albolabris* (Gray)

动物名 白唇竹叶青《中国药用动物志》

药材名 竹叶青《中国药用动物志》

文献名 青竹蛇、青竹标《中国药用动物志》

功效 全体:祛风止痛。用于风湿痹痛。

#### 8931909

*Trimeresurus monticola* (Guenther)

动物名 山竹叶青《中国药用动物志》

药材名 山蕲蛇《脊椎动物分类学》

文献名 黑斑竹叶青、山烙铁头《中国药用动物志》

功效 全体:祛风止痛。用于风湿痹痛。

#### 8931910

*Trimeresurus mucrosquamatus* (Cantor)

动物名 烙铁头《中国药用动物志》

文献名 龟壳花蛇、野猫种、蕲蛇盖、笋壳斑、老鼠蛇《中国药用动物志》

地方名 福建:蕲蛇。

功效 全体:祛风止痛。用于风湿痹痛。

#### 8931911

*Trimeresurus stejnegeri stejnegeri* (Schmidt)

动物名 竹叶青《中国药用动物志》

药材名 青竹蛇《陆川本草》

文献名 青竹丝《动物学大辞典》,焦尾巴、刁竹青、红眼睛蛇《中国药用动物志》

地方名 广西:竹叶青蛇。

功效 全体:祛风止痛。用于风湿痹痛,恶疮肿疔。

#### 8931912

*Vipera russeli siamensis* Smith

动物名 蝰蛇《中药材科技》

药材名 蛇毒《中药材科技》

功效 蛇毒:用于血友病等出血性疾病的局部止血。

### 89320 鼈科 Alligatoridae

#### 8932001

*Alligator sinensis* Fauvel

动物名 鼈《拉汉脊椎动物名称》

药材名 蛇鱼甲《本经》、《中药大辞典》,蛇鱼肉《别录》

文献名 鼈甲《本草经集注》,土龙《续博物志》,鼈龙《纲目》,扬子鳄、猪婆龙《中药大辞典》,鼈鱼甲《长春医学院学报》,鳄鱼、鳄鱼甲《中药名汇》

功效 鳞甲:有小毒。逐瘀,消积,杀虫。用于瘰癧积聚,瘰癧,顽癣,崩中带下,疮疥,恶疮;肉:有小毒。用于瘰癧,疔毒,恶疮溃烂。

### 89321 鸛鹬科 Podicipedidae

#### 8932101



*Podiceps ruficollis* (Pallas) --- *Colymbus ruficollis* (Vroeg)

动物名 小鸕鹚《中国药用动物志》

药材名 油鸭《纲目》、《汇编》

文献名 鸕、须臾《尔雅》，刁鸭《食疗本草》，鸕鹚《本草拾遗》，鸕顶《口用本草》，水鸭《饮膳正要》，水伶仃《医林纂要》，水葫芦《动物图谱·鸟》，水鸕《常见药用动物》，药葫芦《中国药用动物志》

地方名 内蒙古：“吉吉格-阿吉日”（蒙名），油葫芦；山东：王八鸭子；四川：潜水鸭子。

功效 肉：补中益气，收敛止痢。用于痔疮，脱肛，遗尿。

## 89322 鸕鹚科 Pelecanidae

### 8932201

*Pelecanus onocrotalus* L.

动物名 鸕鹚《内蒙古药用动物》

药材名 鸕鹚油（内蒙古）

地方名 内蒙古：鸕鹚图（蒙名），淘河，塘鹅。

功效 油：用于痢疮肿毒和风湿腿腿痛；毛皮（烧存性）：用于反胃吐食；嘴（烧存性）：用于赤、白久痢。

### 8932202

*Pelecanus philippensis* Gmelin

动物名 斑嘴鸕鹚《世界鸟类名称》

药材名 鸕鹚油《中国药用动物志》

文献名 鸕鹚《庄子》，鸕鹚《山海经》，鸕鹚《尔雅》，淘河《尔雅》郭璞注，逃河、鸕鹚嘴《嘉祐本草》，淘鹚《普济方》，犁鹚、淘鹚、犁涂、鸕鹚毛皮、鸕鹚脂油《纲目》，水流鸕《南越笔记》，塘鹅《常见药用动物》

功效 脂肪：消肿毒，祛风湿，通经络。用于痢疮肿毒，风湿腿腿痛，耳聋；毛皮（烧灰存性）：用于反胃吐食；嘴（烧灰存性）：用于赤白久痢成疳。

备考 《脊椎动物分类学》与《中药大辞典》之斑嘴鸕鹚学名为 *Pelecanus roseus* Gmelin

## 89323 鸕鹚科 Phalacrocoracidae

### 8932301

*Phalacrocorax carbo* (L.)

动物名 鸕鹚《世界鸟类名称》

药材名 鸕鹚《本草经集注》、《汇编》

文献名 鸕《尔雅》，鸕鹚矢、鸕鹚头、蜀水华《别录》，鸕鹚肉《雷公炮炙论》，鸕鹚骨《本草经集注》，鸕鹚翅羽、水老鸕《纲目》，摸鱼公、鸕鹚涎《纲目拾遗》，鱼鹰《动物图谱·鸟》，鱼鸟《常见药用动物》，鸕鹚、鱼鸕《汇编》，鱼老鸕、黑鱼郎《中国药用动物志》

地方名 内蒙古：“哈日-嘎鲁”（蒙名）；广西：摸鱼公；四川：水老鸕，鱼老鸕，“索夏”（藏名）。

功效 肉：利尿。用于腹水；喉囊：用于鱼刺哽咽；骨翅羽（烧灰）：用于鱼鲠喉中；口涎：用于百日咳。

## 89324 鹭科 Ardeidae

### 8932401

*Ardea cinerea* L.

动物名 苍鹭《世界鸟类名称》

药材名 苍鹭《四川资源动物志》

文献名 老等《脊椎动物分类学》

地方名 四川：青桩；其他：灰鹭，青庄。

功效 肉：用于水肿，骨折。

### 8932402

*Ardeola bacchus* (Bonaparte)

动物名 池鹭《动物图谱·鸟》

药材名 鹭肉《中国药用动物志》

文献名 沙鹭、红毛鹭、花洼子《动物图谱·鸟》，花洼子、鸕鹚、交驴、交鸡鸭、中国池鹭、紫鹄头、红毛鹭、沼鹭、花鸕、田螺鹭《中国药用动物志》，鹭鹭《四川资源动物志》

地方名 四川：半头红，青背心白鸕。

功效 肉：解毒。用于鱼虾中毒；肝脏：用于胃痛。

### 8932403

*Bubulcus ibis* (L.)

动物名 牛背鹭《脊椎动物分类学》

药材名 牛背鹭《中国药用动物志》

文献名 黄头鹭、尼鹭、家畜鹭鹭、红头鹭、畜鹭、红头官、放牛郎《中国药用动物志》

功效 肉：益气，解毒。用于虚瘦，疮肿等。

### 8932404

*Egretta alba* (L.) --- *Egretta alba modestus* (Gray)

动物名 大白鹭《脊椎动物分类学》

药材名 大白鹭《中国药用动物志》

文献名 白鹭鹭、鹭鹭、风漂公子、白漂鸟、冬庄、大白鸕、白鸕鹭、鹭满贯、白庄、白洼、雪客《中国药用动物志》，风标公子、白洼子《动物图谱·鸟》

功效 肉：解毒。用于痔疮痢肿。

### 8932405

*Egretta garzetta* (L.)

动物名 白鹭《中国药用动物志》

药材名 鹭肉《汪颖食物本草》、《中药大辞典》

文献名 春狙《尔雅》，鹭鹭《本经》，白鸟《陆玑诗疏》，丝禽《陆龟蒙》，雪客《李昉》，一杯鹭、小白鹭、白鹭鹭《中药大辞典》，极小白鹭《中国药用动物志》

地方名 湖北：青庄（神农架）。

功效 肉：补气益脾，解毒。用于脾虚泄泻，消化不良，食欲不振，崩漏，脱肛。外用于疔疮痢肿。

## 89325 鸕科 Ciconiidae

### 8932501

*Ciconia ciconia boyciana* Swinhoe

动物名 白鸕《动物图谱·鸟》

药材名 鸕肉《中药大辞典》，鸕骨《别录》、《中药大辞典》

文献名 冠雀《后汉书》，鸕雀、负釜、黑尻、背灶、皂裙《陆玑诗疏》，老鸕《动物图谱·鸟》，捞鱼鸕《中药大辞典》

功效 肉：滋养补虚。用于干血癆，闭经，身痛发

烧,咳嗽;骨髓:祛风,解毒,止痛。用于瘡癤,胸腹痛,喉痹,蛇咬。

备考 《中国药用动物志》(1983)、《四川资源动物志》(1985)白鸕的学名为 *Ciconia ciconia* (L.)

### 89326 鸭科 Anatidae

#### 8932601

*Aix galericulata* (L.)

动物名 鸳鸯《嘉祐本草》、《世界鸟类名称》

药材名 鸳鸯肉《纲目》、《中国药用动物志》

文献名 邓木鸟《荆楚岁时记》,匹鸟《禽经》,黄鸭《纲目》,官鸭《中国药用动物志》

功效 肉:清热解毒,止血,杀虫。用于痔瘡,疥癬,齿痛。

#### 8932602

*Anas crecca crecca* (L.)

动物名 绿翅鸭《世界鸟类名称》

药材名 绿翅鸭《中国药用动物志》

文献名 巴鸭《动物图谱·鸟》,小凫、小水鸭、小食鸭、八鸭《中国药用动物志》

地方名 广东:小蜆鸭;四川:小麻鸭,干八两。

功效 肉:补中益气。用于脾胃虚弱,脱肛,子宫脱垂。

#### 8932603

*Anas domestica* L. --- *Anas platyrhynchos domestica* (L.)

动物名 家鸭《中国药用动物志》

药材名 家鸭血《中国药用动物志》

文献名 鸭《周礼》,舒凫《尔雅》,鸭《说文》,鸭头、鸭肪、鸭肉《别录》,鸕、鸕《广雅》,鸭血、鸭卵《本草经集注》,鸭子《食疗本草》,鸭肉《千金·食治》,老鸭《滇南本草》,家凫、鸭胆、鸭涎、鸭肫衣《纲目》,鸭肫胫《经验广集》,鸭蛋《医钞类编》,鸭肫内皮《本草求真》,鸭内金《形色鉴别》,白鸭肉《中药大辞典》

地方名 北京:湖鸭;四川:野鸭,鸭肫壳,鸭肫皮。

功效 鲜血:清热止痉,解毒,补血。用于中风,劳伤吐血,痢疾;鸭头:用于水肿,通利小便;鸭卵:滋阴,清肺。用于膈热,咳嗽,喉痛,齿痛,泄痢;脂肪:用于水肿,瘰癧,漏疮;胆:外用于涂痔核,点目赤初起;鸭涎(唾涎):用于小儿痘风,头及四肢皆往后,以鸭涎滴之;肉:滋阴养胃,利水消肿。用于瘡热骨蒸,咳嗽,水肿;胃内壁(鸭内金):食积不消,噎膈翻胃;鸭毛:外用于烧烫伤;松花蛋:清凉,平肝,明目。用于高血压。

#### 8932604

*Anas platyrhynchos platyrhynchos* L.

动物名 绿头鸭《中国动物志》

药材名 绿头鸭《中国动物志》

文献名 凫《诗经》,鸕、沈凫《尔雅》,松凫《南越志》,鸕《膳王阁序》,野鸭、野鸕、晨凫、凫肉《纲目》,大野鸭、水鸭毛《中国药用动物志》,大鸭鸭、大麻鸭《汇编》,凫鸭《中药大辞典》,大绿头、大红腿鸭、对鸭《中国动物志》

地方名 内蒙古:“陶木-哈勒特口-诺古斯”(蒙名);山东:官鸭,青边;广西:水鸭,鬼羽(陆川)。

功效 肉:滋补。用于病后虚肿,疰疾长期不愈;脚掌、嘴壳:用于妇女产后受寒,腰背四肢疼痛;嘴壳:用于螺蛳疔;羽毛(烧灰存性):收敛,解毒。用于溃瘍及烫伤;口涎:用于鱼骨卡喉;水鸭血:涌吐药。用于食物中毒。

#### 8932605

*Anas poecilorhyncha* Forster

动物名 斑嘴鸭《中国动物志》

药材名 斑嘴鸭《中国药用动物志》

文献名 夏凫、火燎鸭《中国药用动物志》,谷鸭《中国动物志》

地方名 麻鸭(东北);内蒙古:大乌毛;福建:黄嘴尖鸭,败鸭;四川:蒲鸭。

功效 肉:补中益气。用于脾胃虚弱,脱肛,子宫脱垂。

#### 8932606

*Anser albifrons albifrons* (Scopoli)

动物名 白额雁《动物图谱·鸟》

药材名 雁肪《本经》、《中药大辞典》,雁肉《千金·食治》、《中药大辞典》

文献名 鵞肪《本经》,雁膏《食疗本草》,大雁《中国动物志》,雁《中药材科技》

地方名 湖北:花斑、明斑(洪湖)。

功效 脂肪:活血祛风,清热解毒。用于中风偏枯,手足拘挛,心胸结热,痞塞呕逆,疮痈,发脱不长;肉:祛风,壮筋骨。用于顽麻风痹。

#### 8932607

*Anser anser* (L.)

动物名 灰雁《中国动物志》

药材名 雁脂《贵州药录》

文献名 红嘴雁、灰腰雁《动物图谱·鸟》,雁肪《中国动物药》

地方名 大雁(北方);其他:沙鵞。

功效 脂肪:舒筋活血,益气解毒。用于气血不足,瘰癧拘急,肾虚脱发,痢肿疮毒。

#### 8932608

*Anser cygnoides* (L.)

动物名 鸿雁《中国动物志》

药材名 雁脂《汇编》

文献名 雁肪、鵞肪《本经》,雁膏《食疗本草》,大雁油、鸿雁油《汇编》,大雁、冠雁、雁油《中国药用动物志》

地方名 黑嘴雁、沙雁、草雁、奇鵞(湖北、湖南);山东:原鵞;湖北:随鵞(洪湖)。

功效 脂肪:舒筋活血,益气解毒。用于气血不足,筋挛,肾虚脱发,痢肿疮毒;雁肉:壮筋骨;雁毛(烧存性):用于小儿惊风。

#### 8932609

*Anser domestica* Geese

动物名 家鹅《中国动物志》

药材名 鹅油《中国药用动物志》

文献名 鹅舒雁《尔雅》，白鹅膏、白鹅毛、白鹅肉《别录》，鹅血《本草经集注》，白鹅脂《千金·食治》，鹅尾脂《日华子本草》，鹅、鹅胆、鹅掌上黄皮、鹅蛋、鹅毛《滇南本草》，鹅涎《本草蒙筌》，鹅臊〔尾肉〕《纲目》，鹅蛋壳、鹅喉管、鹅腿骨《纲目拾遗》，鹅内金、鹅脂、鹅羽炭《中药材科技》

地方名 广西：家雁，舒雁。

功效 脂肪：消肿解毒，润泽肌肤。用于痈肿疮毒，手足皸裂；鹅血：解毒。用于晚期血吸虫病，噎膈反胃，解毒；胆：解热，止咳，消痞疮；涎：用于骨刺咽喉，小儿鹅口疮；鹅毛（烧灰存性）：用于小儿惊痫；尾肉：用于聤耳，耳卒聤，手足皸裂；砂囊内壁（鹅内金）：健脾止痢，助消化；新鲜蛋壳（烧灰存性）：外用于出脓血；喉管：用于喉痹，哮喘，赤白带下；鹅腿骨：用于犬伤日久发者；鹅毛（烧灰存性）：用于痈疮肿毒，疥癣，瘰疬，噎膈，惊痫；肉：益气补虚，和胃止渴。用于虚羸，消渴；蛋：补中益气。用于痈疽无头。

备考 1.《中国动物志》(1979)称：欧洲鹅起源于灰雁 *Anser anser* L.，中国鹅的远祖则是鸿雁 *Anser cygnoides* L.。2.《汇编》(1978)、《中国药用动物志》(1979)、《中药大辞典》(1977)等文献，家鹅的学名为 *Anser cygnoides orientalis* (L.)

#### 8932610

*Anser fabalis* (Latham)

动物名 豆雁《中国动物志》

药材名 雁脂《中国动物药》

文献名 大雁、鸿、东方豆雁、西伯利亚豆雁《中国动物志》

地方名 普通大雁、麦鹅（陕西、四川）；陕西：麦鹅脂，大雁脂。

功效 脂肪：益气不饥，轻身耐老；肉：利脏腑，解丹石毒。

备考 《陕西中药名录》(1985)：豆雁的学名为 *Anser fabalis ressicus* Buturlin

#### 8932611

*Cairina moschata* L.

动物名 疣鼻栖鸭《世界鸟类名称》

药材名 麝鸭《中药大辞典》

文献名 洋鸭《纲目拾遗》，麝香鸭、旱鸭《生物学通报》

地方名 广西：西洋鸭，番鸭，关鸭。

功效 肉：助阳道，健腰膝，补命门，暖水脏。用于小儿遗尿，慢性肾炎，痿管。

#### 8932612

*Cygnus cygnus* (L.)

动物名 大天鹅《中国动物志》

药材名 天鹅毛《汇编》

文献名 天鹅油《通玄论》，鹄《史记》，天鹅、金头鹄《饮膳正要》，鹄绒毛《汪颖《食物本草》》，鹄油《纲目》，大鹄《中国药用动物志》

地方名 咳声天鹅（河北、内蒙古、山东）；山东：黄嘴天鹅；四川：大白鹅。

功效 飞羽（烧灰存性）：止血。外用于外伤出血；脂肪油：外用于痈肿，小儿耳瘡。

备考 本品为国家保护动物。

#### 8932613

*Cygnus olor* (Gmelin)

动物名 疣鼻天鹅《中国动物志》

药材名 天鹅胆汁（拟）

文献名 无声天鹅《中国药用动物志》

地方名 哑天鹅、赤嘴天鹅、白鹅（华北）；内蒙古：“洪嘎鲁”（蒙名），哑声天鹅，天鹅；四川：“昂哇”（藏名）。

功效 胆汁：清热解毒，消肿止痛。用于痈疽疮肿，烫火伤。

#### 8932614

*Mergus merganser* (L.)

动物名 普通秋沙鸭《中国动物志》

药材名 秋沙鸭肉《中国药用动物志》

文献名 秋沙鸭、黑头尖嘴鸭〔雄〕、棕头尖嘴鸭〔雌〕《中国药用动物志》，拉他鸭子《动物图谱·鸟》，潜水鹅《中国动物志》，鱼鸭子《中国动物药》

地方名 大锯嘴鸭子（北方）；湖北：鱼钻子（洪湖）。

功效 肉：温肾壮阳，滋补身体。用于贫血，体虚无力，头昏耳鸣，肾虚腰痛；胆：用于肝胆病，胆热症。外用于烫伤，烧伤；骨（制炭）：解毒，利水。用于全身性水肿，小腿肌红肿疼痛，药物、食物中毒；脑：用于神经衰弱。

#### 8932615

*Tadorna ferruginea* (Pallas)

动物名 赤麻鸭《动物图谱·鸟》

药材名 赤麻鸭肉《汇编》

文献名 黄鳧、浚鳧《动物图谱·鸟》，黄鸭《中国药用动物志》

地方名 内蒙古：“昂给日·诺古斯”（蒙名），红雁，喇嘛鸭。

功效 肉：补中益气。用于脾胃虚弱，脱肛，子宫脱垂。

### 89327 隼科 Falconidae

#### 8932701

*Falco peregrinus* Tunstall

动物名 游隼《脊椎动物分类学》

药材名 隼《纲目》

功效 头：用于头风目眩，颠倒痫疾；肉：用于癫痫。

#### 8932702

*Falco tinnunculus* L.

动物名 红隼《脊椎动物分类学》

药材名 隼《纲目》

文献名 鸭虎《脊椎动物分类学》

功效 头：用于头风目眩，颠倒痫疾；肉：用于癫痫。

## 89328 鹰科 Accipitridae

## 8932801

Accipiter gentilis (L.)

动物名 苍鹰《动物图谱·鸟》

药材名 鹰头、鹰眼睛《药性论》，鹰嘴爪《本草拾遗》，鹰骨《纲目》、《中药大辞典》

文献名 黄鹰《魏澹《文集》》，鸱鸺《尔雅翼》，角鹰《纲目》，车风《鹰头》《余居士选奇方》，牙鹰《中国药用动物志》，鸡鹰《动物图谱·鸟》

地方名 鸢鹰《广西、四川》；广西：鸢婆骨《陆川》；贵州：鹰；其他：雕头。

功效 头部：用于痔瘕，头目眩晕；骨骼：续筋骨，祛风湿。用于损伤骨折，筋骨疼痛；眼睛：明眼目，退翳障；嘴、脚爪：用于五痔。

## 8932802

Accipiter nisus (L.)

动物名 雀鹰《四川资源动物志》

药材名 鹰爪《广西药用动物》

文献名 鹞子、细胸、摩鹰、朵子《动物图谱·鸟》，鹞鹰《四川资源动物志》

功效 爪：用于小儿惊风；爪和脑髓：用于头昏晕；全体：用于风湿痛，头风痛，远年哮喘，神经性头痛。

备考 《动物图谱·鸟》(1964)雀鹰的学名为 *Accipiter nisus misosimilis* (Tickell)

## 8932803

Accipiter soloensis (Horsfield)

动物名 赤腹鹰《动物图谱·鸟》

药材名 赤腹鹰《骨骼》《神农架药录》

文献名 鸢鹰、红鼻土排鸢鹰《动物图谱·鸟》

地方名 湖北：鹰子《神农架》。

功效 骨骼：祛风胜湿，强筋健骨。

## 8932804

Aegypius monachus (L.)

动物名 秃鹫《动物图谱·鸟》

药材名 坐山雕《中国动物药》

文献名 狗头雕《脊椎动物分类学》，狗头鸢、座山雕《中国药用动物志》

地方名 内蒙古：“塔斯天勒”（蒙名）；四川：“夏果”（藏名）；其他：雕头，老雕头。

功效 肉：滋补养阴。用于肺结核，反胃呕吐；骨：软坚散结。用于甲状腺肿大，利尿；胆汁：用于肺结核；胆汁滴眼：用于目赤肿痛；喉头（焙酥研末）：用于健胃，消化不良。

## 8932805

Aquila chrysaetos (L.)

动物名 金雕《中国药用动物志》

药材名 雕骨《纲目》、《中国药用动物志》，雕头《汇编》

文献名 鸢《毛诗传》，鸢《山海经》，鸢《说文》，大山鸢《常见药用动物》

地方名 内蒙古：“套如格-布日占德”（蒙名），老雕，

老雕头；湖北：老鹰。

功效 雕骨：活血止痛。用于跌扑骨折；雕头：祛湿热，散头风。用于头风眩晕，五痔湿热；脚爪：强筋壮骨。用于风湿骨痛，跌打损伤。

## 8932806

Aquila chrysaetos daphanea Menzbier

动物名 华西金雕《神农架药录》

药材名 金雕骨《山东药用动物》

文献名 浩白雕、红头雕、鸢雕《山东药用动物》

地方名 湖北：老鹰《神农架》。

功效 骨骼：活血止痛，祛风胜湿。

## 8932807

Buteo buteo (L.)

动物名 鵟《脊椎动物分类学》

药材名 鹰爪《广西药用动物》

文献名 普通鵟《四川资源动物志》

地方名 广西：鹰，盗鸡鸢。

功效 爪：用于小儿惊风，头昏晕，痔疮；爪（和脑髓并用）：用于昏晕，老年头痛；全体（去内脏、羽毛）：用于远年哮喘，神经性头痛。

## 8932808

Buteo hemilasius (Temminck et Schlegel)

动物名 大鵟《动物图谱·鸟》

药材名 大鹰肉《拟》

文献名 豪豹、白鸢豹《动物图谱·鸟》，鵟肉《中国药用动物志》

地方名 内蒙古：“萨日·哈日查蹉”（蒙名），老鹰，花豹。

功效 肉：镇静安神，滋补，消肿。用于癫痫，癫狂，神志不宁，久病体虚，脸部浮肿；骨：舒筋活络。用于筋骨疼痛，骨折；羽毛：止血。用于外伤出血。

## 8932809

Circus cyaneus cyaneus (L.)

动物名 白尾鸢《动物图谱·鸟》

药材名 鸢头《别录》，鸢肉《食疗本草》，鸢骨《纲目》、《中药大辞典》

文献名 鸢《庄子》，鸢、负雀《尔雅》，雀鹰《陆玑《诗疏》》，鸢《尔雅》郭璞注，鸢鹰《说文解字》注，鸢头《唐本草》，灰鹰、白抓、灰鸢、鸡鸢《动物图谱·鸟》

功效 头：用于头风眩晕，痛疾；肉：用于癫痫；翅骨：用于鼻衄不止。

## 8932810

Gypaetus barbatus (L.)

动物名 胡兀鹫《中国药用动物志》

药材名 胡兀鹫《民族药志》

文献名 大胡子雕、髭兀鹫《中国药用动物志》，胡秃鹫《中国药用动物名录》

功效 肉：用于体弱，消化不良，体湿不足，疮疖瘰癧；胃：用于胃寒，胃痛，消化不良；喉头：用于咽喉疾病，吞咽不适，哽塞；脑：用于神经衰弱，失眠健忘，头痛，肺部疾病；尾羽（烧炭）：用于水肿病；粪（炭）：温胃化痞。用于消化不良，食积腹胀，胃溃疡。

8932811

*Haliaeetus leucoryphus* (Pallas)

动物名 玉带海雕《世界鸟类名称》

药材名 玉带海雕《中国药用动物志》

文献名 黑鹰《中国药用动物志》

功效 肉:镇静安神。用于惊痫,失眠,精神病。

8932812

*Milvus korschun* Gmelin - *Milvus korschun lineatus* (Gray)

动物名 鸢《中国药用动物志》

药材名 鸢脑《汇编》,鸢嘴、鸢翅骨、鸢油、鸢胆《四川中药志》,鸢爪《神农架药录》

文献名 鸢《诗经》,鸢《庄子》,老鸢、黑耳鸢《动物图谱·鸟》,雕头《汇编》,饿老刁《常见药用动物》

地方名 老鹰(内蒙古、湖北、广西),鸢鹰(湖北、广西);内蒙古:“额利也”(蒙名),鸢;湖北:普通鸢,鸢子,鸢脚爪,鸢脑髓,鸢翅;广西:鹰,牙鹰,岩鹰;四川:鹰爪,老鹰爪。

功效 脑髓:止痛,解毒。用于头风,痔瘕;鸢爪:清热止惊。用于小儿惊风;鸢骨:活血止痛。用于跌扑骨折;胆:用于心胃气痛;嘴:用于小儿惊风;鸢油:外用于癩子。

8932813

*Pandion haliaetus haliaetus* L.

动物名 鸢《动物图谱·鸟》

药材名 鱼鹰骨《中国药用动物志》

文献名 雕鸢《诗经》,王雕《尔雅》,沸波《淮南子》,鱼鹰《禽经》,下窟鸟《理伤续断秘方》,雕鸡、食鱼鹰、鸢骨《纲目》,水鹰《汇编》,鱼雕、鱼鸢《中国药用动物志》

功效 骨(焙干用):活血止痛。用于跌扑骨折。

## 89329 松鸡科 Tetraonidae

8932901

*Tetrastes bonasia* (L.)

动物名 花尾榛鸡《中国药用动物名录》

功效 肉:滋肾壮阳。

## 89330 雉科 Phasianidae

8933001

*Bambusicola fytchii* (Anderson)

动物名 棕胸竹鸡《中国药用动物志》

文献名 棕眉竹鸡、缅甸竹鸡、缅甸竹鹌鹑《中国药用动物志》

功效 肉:补中。用于久病虚损。

8933002

*Bambusicola thoracica thoracica* (Temminck)

动物名 竹鸡《动物图谱·鸟》

药材名 竹鸡《汪颖《食物本草》》、《中药大辞典》

文献名 山菌子《本草拾遗》,鸡头鹌《东坡诗集》,泥滑滑《纲目》,竹鹌鹑《动物图谱·鸟》,竹鸡子《四川资源动物志》,灰胸竹鸡《世界鸟类名称》

功效 肉:补中益气,杀虫。用于脾胃虚弱,消化

不良,便溏

8933003

*Chrysolophus amherstiae* (Leadbeater)

动物名 白腹锦鸡《动物图谱·鸟》

药材名 铜鸡《中国药用动物志》

文献名 食鸡、笋鸡《中国药用动物志》

地方名 四川:宽宽鸡,“哈”(彝语)。

功效 全体(烧存性):止血解毒。用于血痔,痢疮肿毒。

8933004

*Chrysolophus pictus* (L.)

动物名 金鸡《动物图谱·鸟》

药材名 金鸡《纲目》、《汇编》

文献名 赤鷩《山海经》,鷩鸡《汉书》,采鸡《逸周书》,锦鸡《禽经》,鷩雉《本草拾遗》,架鸡、毛毛鸡《中国药用动物》,红腹锦鸡《汇编》

地方名 湖北:锦鸡子(神农架);四川:红鸡,壳壳鸡。

功效 全体(烧存性):止血解毒。用于痢疮肿毒,血痔;肉:温中补虚,益肝和血。

8933005

*Coturnix coturnix* (L.)

动物名 鹌鹑《中国药用动物志》

药材名 鹌鹑(崔禹锡《食经》)、《中药大辞典》

文献名 鹌鸟《毛诗传》,循《禽经》注,宛鹑《广志》,赤喉鹌《动物学大辞典》,红面鹌鹑《动物图谱·鸟》,鹌鹑肉《中国药用动物志》

地方名 内蒙古:“布顿顿”(蒙名);山东:鹌;广西:鹌鹑,鹌鹑。

功效 肉:补中气,止泻痢。用于小儿疳积,下痢,百日咳;蛋:用于胃病,肺病,神经衰弱,肋膜炎。

备考 《山东药用动物》(1979)、《贵州药录》(1988)鹌鹑的学名为 *Coturnix coturnix japonica* Temminck et Schlegel

8933006

*Francolinus pintadeanus* (Scopoli)

动物名 鹧鸪《动物图谱·鸟》

药材名 鹧鸪《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 鹧鸪脂《图经》,鹧鸪脂膏《纲目》,越雉《禽经》,越鸟《医林纂要》,怀南、中国鹧鸪《中国药用动物志》,十二两平平《常见药用动物》

地方名 福建:鹧鸪血(福州);广西:鹧鸪鸟,鹧鸪脚(陆川);贵州:花鸡。

功效 肉或全体:滋阴补气,化痰。用于体虚乏力,咳嗽痰多;血:用于尿血;脚:有小毒。用于中耳炎;脂肪:用于皲裂;砂胃内壁:健胃。用于饮食不消化,胃脘作痛。

备考 叫称特殊,自称其体重为“十二两平平”故又以其为名。

8933007

*Gallus gallus* (L.) --- *Gallus gallus jabouillei* Delacour et Kinnear

动物名 原鸡《中国药用动物志》

药材名 山鸡《中药大辞典》

文献名 茶花鸡、烛夜、红原鸡《中国药用动物志》

功效 肉：补肾，益气血，清虚热。用于遗精、久泻、消渴，赤白带下，骨蒸劳热。

#### 8933008

*Gallus gallus domesticus* Brisson

动物名 家鸡《千金·食治》、《药典》

药材名 鸡内金《本草蒙筌》、《药典》，凤凰衣《医学入门》、《中药大辞典》，乌骨鸡《纲目》、《汇编》

文献名 鸡子、鸡头、鸡肉、鸡肠、鸡屎白、鸡翮羽、鸡肫里黄皮《本经》，鸡矢《素问》，鸡翅《肘后方》，鸡血、鸡肝、鸡胆、鸡子黄、鸡卵中白皮、鸡卵白、黑雌鸡《别录》，烛夜《崔豹〈古今注〉》，鸡子白、鸡肫里、鸡子羹《本草经集注》，鸡粪《千金方》，鸡脑《唐本草》，鸡卵、鸡子清《食疗本草》，鸡子白皮《孟诜〈必效方〉》，鸡肫内黄皮、鸡子壳《日华子本草》，凤凰退《本草蒙筌》，雄鸡、鸡肫皮《滇南本草》，乌鸡《普济方》，鸡卵壳《医学入门》，鸡喉咙《卫生易简方》，鸡蛋《随息居饮食谱》，混沌池、凤凰蛻、鸡卵黄、鸡翮翎《纲目》，混沌皮《医林纂要》，药鸡《动物学大辞典》，鸡蛋膜衣《现代实用中药》，武山鸡、羊毛鸡、绒毛鸡、松毛鸡、黑脚鸡、丛冠鸡、穿裤鸡《中药志》，九斤黄鸡、狼山鸡、大骨鸡、寿光鸡、萧山鸡、浦东鸡、桃源鸡、北京油鸡《中国药用动物志》，内金、鸡黄皮《常用中药名辨》，鸡蛋膜、鸡蛋壳《简明中医辞典》

地方名 山西：鸡中金，化石胆，化骨胆；内蒙古：“塔黑雅”（蒙古）；新疆：鸡嗽子；山东：鸡合子；福建：雄鸡口涎（南平）；河南：鸡食皮；广西：竹丝鸡（陆川）；四川：鸡肫壳；其他：白毛乌骨鸡，泰和乌骨鸡，泰和鸡，来杭鸡，五德灵禽，鸡膜子皮，鸡蛋皮，鸡蛋衣，鸡纳金，蛋膜衣，鸡肚，鸡肫子，鸡腰壳，鸡子蛻。

功效 沙囊内壁（鸡内金）：健胃消食，涩精止遗。用于食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精；卵膜（凤凰衣）：润肺，止咳。用于久咳，声音嘶哑；乌骨鸡（骨、肉）：补肝肾，益气血，清虚热。用于阴虚潮热，消渴，遗精，赤白带下；鸡胆：清肺止咳。用于百日咳；卵：滋阴润燥，养血安胎。用于热病烦闷，燥咳声哑，目赤咽痛，胎动不安，产后口渴，烫伤；醋浸鸡蛋：外用于涂神经性皮炎；鸡头：辟湿；鸡肉：温中，益气，补精，添髓。用于虚劳羸瘦，中虚胃呆食少，泄泻，下痢，消渴，水肿，小便频数，崩漏，带下，产后乳少，病后虚弱；母鸡肉（加苏子油，不放盐，炖食）：用于肝硬化腹水；鸡血：祛风，活血，通络。用于小儿惊风，口面喎斜，痿痹，折伤，目赤流泪，痼疽疮疥；鸡肝：补肝肾。用于肝虚目暗，夜盲症，小儿疳积，妇人胎漏；鸡肠：用于遗尿，遗精，白浊，痔漏；鸡脑：用于小儿鸡痛，难产；鸡嗽（喉囊）：用于膈膈不通，小便不禁，发背肿毒；蛋白：润肺利咽，清热解毒。用于咽痛，目赤，咳逆，烧伤，热毒肿痛；蛋黄：滋阴润燥，养血息风。用于心烦不得眠，热病痉厥，虚劳吐血，呕逆，胎漏下血，烫伤，热疮，肝炎，小儿消化不良；蛋黄油：外用于骨结核，烧烫伤，中耳炎；蛋壳：用于停饮脱痛，反胃，小儿佝偻病，各种出血，眼生翳膜，头身

疮疖，聃耳流脓；尿白（鸡屎上的白色部分）：利水，泄热，祛风，解毒。用于臌胀积聚，黄疸，淋病，风痹，破伤风，筋脉挛急；翅羽：破瘀消肿。用于血闭，小便不禁，痼疽，阴肿，骨哽；口涎：用于蜈蚣咬伤。

#### 8933009

*Lophura leucomelana* (Latham)

动物名 黑鹇《中国药用动物志》

药材名 黑鹇肉（拟）

文献名 鹇雉《中国药用动物志》

功效 肉：补中益肺。用于虚劳发热，咳嗽等。

#### 8933010

*Lophura nycthemera* (L.)

动物名 白鹇《中国药用动物志》

药材名 白鹇《图经》、《中药大辞典》

文献名 鹇雉、鹇雉《尔雅》，白鹇、白鹇、白雉《尔雅》郭璞注，闲客《纲目》，越禽《动物学大辞典》，银鸡《脊椎动物分类学》，银雉《动物图谱·鸟》，白鹇鸡、鹇《中国药用动物志》

功效 肉：补中益肺，解毒。用于虚劳发热，咳嗽，脾虚泄泻，消化不良。

#### 8933011

*Pavo muticus* (L.)

动物名 绿孔雀《中国药用动物志》

文献名 孔雀矢《别录》，越鸟《纲目》，孔雀尾《中国动物药》

功效 肉：解毒。用于痢肿，食物及药物中毒；粪便：解毒利水。用于妇女带下，小便不利，恶疮等；羽毛：消肿排脓。

#### 8933012

*Perdix daurica* (Pallas)

动物名 斑翅山鹑《青藏药图》

文献名 斑翅、斑鸡《动物图谱·鸟》

功效 全体：祛风湿。

#### 8933013

*Phasianus colchicus* L.

动物名 雉《动物图谱·鸟》

药材名 野鸡肉《汇编》

文献名 华虫《尚书》，疏趾《礼记》，野鸡《广雅》，雉肉《别录》，雉鸡《日华子本草》，雉肝《圣济总录》，雉尾、雉脑《纲目》，山鸡、项圈野鸡《动物图谱·鸟》，环颈雉《脊椎动物分类学》，山鸡肉、环颈雉肉《汇编》

地方名 内蒙古：“郭日古勒”（蒙名）；湖北：华东环颈雉，花锦鸡（神农架）；广西：石鸡；四川：窜草鸡，草鸡，咯咯鸡，“戴破”（藏名）。

功效 肉：益气，止泻。用于脾虚泄泻，胸腹胀满；脑：外用于冻疮；头（烧灰）：外用于丹毒；肝：用于小儿无辜疳；尾：用于丹毒。

备考 《中药大辞典》的雉、《广西药用动物》（1988）的环颈鸡、《神农架药录》（1987）的华东环颈雉学名均为 *Phasianus colchicus torquatus* Gmelin

#### 8933014

*Phasianus colchicus decollatus* Swinhoe

动物名 贵州环颈雉《神农架药录》  
 药材名 贵州野鸡肉(拟)  
 地方名 湖北:毛野鸡(神农架)。  
 功效 肉:补中益气。

## 8933015

*Syrnaticus reevesii* (Gray)

动物名 长尾雉《动物图谱·鸟》  
 药材名 鹌鹑《食疗本草》、《中药大辞典》  
 文献名 翟《尚书》,翟鸡、山鸡《禽经》,山雉《纲目》,长尾野鸡《动物图谱·鸟》,白冠长尾雉、鹌《中国药用动物志》

地方名 四川:花鸡,翅鸡,柴鸡;贵州:野鸡。  
 功效 肉:有小毒。补中益气,平喘。用于久病虚损,咳嗽。

## 8933016

*Tetraogallus himalayensis* G. R. Gray

动物名 高山雪鸡《民族药志》  
 药材名 雪鸡肉(拟)  
 功效 肉:滋补,壮阳。用于阳痿,遗精,妇女病,癫痫,狂犬病;羽毛:用于癫痫,狂犬病。

## 8933017

*Tetraogallus tibetanus* (Gould)

动物名 藏雪鸡《中国药用动物志》  
 药材名 雪鸡肉《中国动物药》  
 文献名 淡腹雪鸡、雪鸡、西藏雪雷鸟、恐姆《中国药用动物志》

功效 肉:滋补,壮阳。用于阳痿,遗精,妇女病,癫痫,狂犬病等;羽毛:用于癫痫,狂犬病。

## 89331 三趾鹑科 Turnicidae

## 8933101

*Turnix tanki* (Blyth)

动物名 黄脚三趾鹑《中国药用动物志》  
 药材名 鹑《本草拾遗》、《中药大辞典》  
 文献名 鹑《尔雅》,老鹑《左传》贾逵注,鹑雀《尔雅》郭璞注,鹑、鹑、鸕《纲目》,团鸡、水鸡《医林要要》,三爪爬、水鹑、黄地闷子《中国药用动物志》  
 功效 肉:补中,解毒。用于虚损,诸疮肿毒。

## 89332 鹑科 Gruidae

## 8933201

*Anthropoides vigro* L.

动物名 蓑羽鹑《内蒙古药用动物》  
 地方名 内蒙古:蓑鹑。  
 功效 油脂:外用于手麻症。

## 8933202

*Grus grus* (L.)

动物名 灰鹤《中国药用动物志》  
 药材名 灰鹤肉(拟)  
 文献名 吁吟子、灰鸕鹑、番鸕鹑《中国药用动物志》  
 功效 肉:益气。用于消渴。

## 8933203

*Grus japonensis* (P. L. S. Muller)

动物名 丹顶鹤《动物图谱·鸟》  
 药材名 鹤肉《医学入门》、《中药大辞典》  
 文献名 鹤《诗经》,白鹤《嘉祐本草》,仙鹤《日用本草》,仙禽、胎禽、鹤骨、鹤脑《纲目》,红顶子《中国药用动物志》  
 功效 肉:益气力;骨骼:壮筋骨,除痹痿,祛风辟邪,解鱼、蛇毒,化鱼骨鲠;脑髓:明目。

## 8933204

*Grus nigricollis* (Przevalski)

动物名 黑颈鹤《中国药用动物志》  
 药材名 黑头鹤骨《中国动物药》  
 文献名 鹤《中国药用动物志》  
 功效 肉:解热。用于发烧头痛,骨蒸劳热等;骨:利尿通淋。用于小便不利。

## 89333 秧鸡科 Rallidae

## 8933301

*Gallinula chloropus* (L.)

动物名 黑水鸡《中国药用动物志》  
 药材名 红骨顶《贵州药录》  
 文献名 鹌、江鸡《中国药用动物志》  
 功效 肉:滋补强壮,开胃。用于脾虚泄泻。  
 备考 《贵州药录》(1988)黑水鸡学名为 *Gallinula chloropus indica* Blyth

## 8933302

*Rallus aquaticus* (L.)

动物名 秧鸡《中国药用动物志》  
 药材名 秧鸡《汪颖(食物本草)》、《中药大辞典》  
 文献名 水鸡、秋鸡《动物学大辞典》,普通秧鸡《中国药用动物名录》  
 功效 肉:杀虫解毒,补中益气。用于蚊瘰,脾胃虚弱。

## 89334 鸨科 Otidae

## 8933401

*Otis tarda* L.

动物名 大鸨《动物图谱·鸟》  
 药材名 鸨油《汇编》  
 文献名 独豹(郭璞),鸨、鸨肉《饮膳正要》,硕鸨、羊鸨、青鸨《中国药用动物志》,地鸨油、老鸨膏《汇编》  
 地方名 内蒙古:“陶都格”(蒙名);山东:地鸨,野雁,鸡鸨。  
 功效 脂肪:补肾,解毒,润肤。用于脱发,痈疮肿毒,肌肤粗裂。

## 89335 鹞科 Scolopacidae

## 8933501

*Numenius madagascariensis* (L.)

动物名 红腰杓鹞《动物图谱·鸟》  
 药材名 鹞肉《中国动物药》

文献名 大杓鹬《本草拾遗》, 鸕鹚、红背大杓鹬、大鸕鹚、彭鸡《中国药用动物志》

功效 肉: 滋养补虚, 强胃健脾, 益精明目。用于肝肾不足, 脾胃虚弱。

#### 8933502

*Tringa ochropus* (L.)

动物名 白腰草鹬《动物图谱·鸟》

药材名 草鹬肉(拟)

文献名 白尾梢《动物图谱·鸟》, 绿鸕《中国药用动物志》

地方名 四川: 水斑鸠。

功效 肉: 清热解毒。用于麻疹。

#### 8933503

*Tringa totanus* (L.)

动物名 红脚鹬《中国药用动物志》

药材名 鹬肉《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 赤足鹬、东方红腿、红腿泥岸鹬、红腿鹬《中国药用动物志》

功效 肉: 补虚, 暖胃。用于久病虚损, 胃寒泻泄。

### 89336 鸥科 Laridae

#### 8933601

*Larus argentatus vegae* Palmen

动物名 银鸥《动物图谱·鸟》

药材名 银鸥肉(拟)

文献名 黑背鸥、红脚鲱鸥、淡红腿鸡、呵鱼郎、鱼鹰子、大康满《动物图谱·鸟》

功效 肉: 滋阴润燥。用于狂躁烦渴。

#### 8933602

*Larus ridibundus* L.

动物名 红嘴鸥《世界鸟类名称》

药材名 鸥《汪颖《食物本草》》、《中药大辞典》

文献名 鸕《诗经》, 水鸕《说文》, 江鸥、海鸥《南越志》, 笑鸥、钓鱼郎、普通海鸥、小康满《中国动物图谱》, 水鸽子《中国药用动物志》

功效 肉: 滋阴润燥。用于狂躁烦渴。

#### 8933603

*Sterna hirundo longipennis* Nordman

动物名 燕鸥《动物图谱·鸟》

药材名 燕鸥肉(拟)

文献名 长翅海燕、长翎海燕《动物图谱·鸟》, 普通燕鸥《四川资源动物志》

功效 肉: 滋阴润燥。用于狂躁烦渴。

### 89337 沙鸡科 Pteroclididae

#### 8933701

*Syrrhaptes paradoxus* (Pallas)

动物名 毛腿沙鸡《中国药用动物志》

药材名 沙斑鸡《汇编》

文献名 鹑鸡、寇雉《尔雅》, 沙鸡《尔雅义疏》, 突厥雀《本草拾遗》, 沙半鸡、沙半斤《汇编》

地方名 内蒙古: “脑格图如”(蒙名)。

功效 肉: 补益脾胃。用于脾胃虚寒, 肢体倦怠, 食少作泻。

### 89338 鸠鸽科 Columbidae

#### 8933801

*Columba livia* Gmelin

动物名 原鸽《汇编》

药材名 野鸽《图经》、《中药大辞典》

文献名 鹁鸽《食疗本草》

地方名 饒驴(东北、华北)。

功效 卵: 益气, 解毒。用于恶疮疥癣, 痘疹难出; 粪: 用于腹中痞块, 消肿, 杀虫; 肉: 用于妇女干血癆, 闭经, 肠风下血, 慢性肾炎, 头眩晕, 小儿疳积。

#### 8933802

*Columba livia domestica* L.

动物名 家鸽《中国药用动物志》

药材名 鸽卵《纲目》、《汇编》

文献名 鹁鸽《食疗本草》, 飞奴《开元天宝遗事》, 鸽《嘉祐本草》

地方名 内蒙古: “塔格塔”(蒙名); 陕西: 鸽子肉, 鸕肉, 鸕屎; 四川: 鸽蛋; 贵州: 鸽子。

功效 卵: 益气, 解毒。用于恶疮疥癣, 痘疹难出; 肉: 用于妇女干血癆, 闭经, 肠风下血, 慢性肾炎, 头眩晕, 小儿疳积; 屎: 消肿, 杀虫。

#### 8933803

*Columba rupestris* (Pallas)

动物名 岩鸽《世界鸟类名称》

药材名 岩鸽《中国药用动物志》

文献名 饒驴、山石鸽、横纹尾石鸽、野鸽子《中国药用动物志》

功效 肉: 滋肾益气, 祛风解毒。用于虚羸, 消渴, 久疟, 妇女血虚经闭, 恶疮疥癣。

#### 8933804

*Oenopelia ranquebarica* (Hermann)

动物名 火斑鸠《中国药用动物志》

药材名 斑鸠肉(拟)

文献名 红鸠、火鸕雕《动物图谱·鸟》, 小斑鸠《中国药用动物志》

功效 肉: 补肾, 益气, 明目。用于肾虚眼雾, 病后虚弱; 屎: 用于聾耳; 毛: 用于外伤出血。

#### 8933805

*Streptopelia chinensis* (Scopoli)

动物名 珠颈斑鸠《动物图谱·鸟》

药材名 斑鸠《四川中药志》

文献名 花脖斑鸠、鸕雕《中国药用动物志》

地方名 江苏: 百咕咕; 广西: 花斑鸠, 珍珠鸠; 四川: 打谷斑, 咕咕咕, 铁斑。

功效 肉: 补肾, 明目, 益气。用于久病虚弱, 肾虚眼雾; 屎: 用于聾耳; 羽毛: 用于外伤出血。

#### 8933806

*Streptopelia orientalis* (Latham)

动物名 山斑鸠《中国药用动物志》



药材名 斑鸠《嘉祐本草》、《中药大辞典》  
 文献名 斑雏、锦鸠《范江方》,斑鸪《本草衍义》,鸪鸠《六书故》,祝鸠《纲目》,雉鸠、棕背斑鸠、麦鸠、金背斑鸠《中药大辞典》,斑鸠肉《中国药用动物志》  
 地方名 广西:麒麟鸠,花翼,“薄鸪”(三江侗语);四川:狗沟等水,老山斑,蒲斑;其他:麦雕。  
 功效 肌肉:补肾,明目,益气。用于久病虚损,气虚,肾虚眼雾;斑鸠粪:外用于中耳炎;斑鸠毛(火煨):用于外伤出血。

### 89339 鸚鵡科 Psittacidae

#### 8933901

*Psittacula alexandri* (L.)

动物名 绯胸鸚鵡《中国药用动物志》  
 药材名 鸚鵡《纲目》、《中药大辞典》  
 文献名 鸚鵡(汪颖《食物本草》),干鼻、鸚哥《纲目》,红嘴绿鸚哥《中药名汇》  
 功效 肉:滋补。用于体虚咳嗽。

#### 8933902

*Psittacula derbiana* (Fraser) --- *Palaeornis derbiana* Fraser

动物名 大绯胸鸚鵡《四川资源动物志》  
 药材名 鸚鵡(四川)  
 地方名 四川:鸚哥,“耐作”(藏名)。  
 功效 肉:滋补。用于体虚咳嗽。

### 89340 杜鹃科 Cuculidae

#### 8934001

*Centropus sinensis sinensis* (Stephens)

动物名 褐翅鸚鵡《动物图谱·鸟》  
 药材名 红毛鸡《广西中药志》  
 文献名 毛鸡(《药典》附录),绿结鸡骨《中药大辞典》,红鸚、黄蜂《中国药用动物志》  
 地方名 广西:茅笼中鸟,绿结鸡(陆川),大毛鸡,落谷。

功效 去毛及内脏的干燥体:调经,补血,通乳,滋补养阴,祛风湿。用于妇女产后头痛,手足麻痹,乳汁少,跌打损伤。

#### 8934002

*Centropus toulou* (P. L. S. Muller)

动物名 小鸚鵡《中国药用动物志》  
 药材名 小毛鸡《中国药用动物志》  
 文献名 小黄蜂、小鸟雅雉《中国药用动物志》  
 地方名 广西:草鸚子,小雉喀咕。  
 功效 全体:滋补养阴,调经通乳,祛风湿。用于妇女产后头痛,手足麻痹,乳汁少,跌打损伤。  
 备考 《广西药用动物志》(1986)收录的小鸚鵡学名为 *Centropus bengalensis lignator* Swinhoe

#### 8934003

*Cuculus canorus* L.

动物名 大杜鹃《中国药用动物志》  
 药材名 杜鹃《中国药用动物志》

文献名 喀咕、郭公、布谷《动物图谱·鸟》

地方名 内蒙古:“呼活苟布”(蒙名);湖北:华东大杜鹃;四川:布谷鸟,包谷雀,“克修”(藏名);其他:咕咕鸟。

功效 去内脏的全体(烧存性):消瘰,通便,镇咳。用于淋巴结核,便秘,百日咳。

#### 8934004

*Cuculus canorus fallax* Stresemann

动物名 华东大杜鹃《神农架药录》  
 地方名 湖北:咕吐鸟(神农架)。  
 功效 全体(去内脏):消瘰,通便,镇咳。

#### 8934005

*Cuculus micropterus* Gould

动物名 四声杜鹃《中国药用动物志》  
 药材名 杜鹃《中国药用动物志》  
 文献名 光棍好过、光棍背钹、印度喀咕《动物图谱·鸟》

地方名 山东:光棍好苦,快快割麦,花喀咕;湖北:包谷雀子,华东大杜鹃,咕咕鸟;四川:豌豆包谷,割麦插禾。

功效 去内脏的全体(烧存性):消瘰,通便,镇咳。用于淋巴结核,便秘,百日咳。

#### 8934006

*Cuculus poliocephalus* Latham

动物名 小杜鹃《中国药用动物志》  
 药材名 杜鹃《本草拾遗》、《中药大辞典》  
 文献名 鸪鸠《楚辞》,鸪周《尔雅》子鸪鸟、周燕《说文》,鸪鸪《临海异物志》,杜宇、子规《禽经》,谢豹(《禽经》注),怨鸟《埤雅》,催归、阳雀《纲目》

地方名 湖北:包谷雀子;四川:点灯捉蛇蚤;其他:阴天打酒喝。

功效 去内脏全体:滋养补虚,解毒杀虫,活血止痛。用于病后体虚,气血不足,诸疮肿痛,跌扑瘀血作痛,关节不利。

#### 8934007

*Cuculus saturatus* Blyth

动物名 中杜鹃《汇编》  
 药材名 杜鹃《汇编》  
 功效 去内脏的全体:消瘰,通便,镇咳。用于淋巴结核,便秘,百日咳。

#### 8934008

*Cuculus saturatus horsfieldi* Moore

动物名 华北中杜鹃《神农架药录》  
 药材名 杜鹃(湖北)  
 地方名 湖北:咕咕鸟(神农架)。  
 功效 肉:消瘰,通便,镇咳。

#### 8934009

*Cuculus sparveroides* Vigors

动物名 鹰鸪《四川资源动物志》  
 药材名 鹰鸪肉《神农架药录》  
 文献名 鹰头杜鹃、大鹰鸪、打快乐《动物图谱·鸟》  
 地方名 湖北:洋鸪子(神农架);四川:阳雀,李贵

阳,催工雀,贵贵阳。

功效 肉:滋养补虚,强壮。

### 89341 鸱鸺科 Strigidae

#### 8934101

*Asio otus* (L.)

动物名 长耳鸱《动物图谱·鸟》

药材名 猫头鹰《中国药用动物志》

文献名 长耳猫头鹰、虎鸱、长耳木兔、有耳麦猫王《动物图谱·鸟》

地方名 内蒙古:“依勒格·希日·苟布”、“乌盖勒”(蒙名),夜猫子,拖死鬼;四川:猫狐,“牛夏”(藏名)。

功效 全体(去内脏):解毒,定惊。用于淋巴结结核,噎食,癫痫,肺结核。

#### 8934102

*Bubo bubo* (L.)

动物名 雕鸮《中国药用动物志》

药材名 猫头鹰《中国药用动物志》

文献名 角雕、老兔、恨狐、鸱鸺《动物图谱·鸟》,角鸮《中国药用动物志》,鸱鸺《汇编》

地方名 夜猫(山东、广西);四川:“欧瓜”(藏名),鬼瞪哥;广西:大猫王,夜猫子,咕咕雀。

功效 去内脏全体:解毒,定惊。用于淋巴结结核,噎食,癫痫,肺结核。

备考 雕鸮的学名,《动物图谱·鸟》(1959)为 *Bubo bubo inexpectatus* Bangs,《广西药用动物》(1976)为 *Bubo bubo swinhoei* Hartert,《中药材科技》(1981)为 *Bubo bubo ussuriensis*。猫头鹰类均为国家保护动物。

#### 8934103

*Bubo bubo kiautschensis* Reichenow

动物名 华南雕鸮(拟)

药材名 猫头鹰《贵州药录》

地方名 雕鸮(山东、贵州)。

功效 全体(去内脏):解毒,定惊。用于淋巴结结核,噎食,癫痫。

#### 8934104

*Glaucidium cuculoides* (Vigors)

动物名 斑头鸺鹠《中国药用动物志》

药材名 猫头鹰《汇编》

文献名 流离、鸺鹠《诗经》,土枭《尔雅》,服《汉书》,天鸟《周礼》郑玄注,训狐《巴蜀异物志》,山鸺《汉书》晋灼注,鸺《本草拾遗》,画鸟《埤雅》,幸狐、车载板、快扛鸟、春哥儿《纲目》,猫头鸟《随息居饮食谱》,鸺鹠、横纹小鸺、猫王鸟《动物图谱·鸟》,横纹小枭《汇编》

地方名 广西:鸺鹠雀;四川:鬼瞪哥,鬼东鸺,鬼东鸺,鬼瞪哥,夜食鹰;云南:小猫头鹰。

功效 骨骼、肉、舌:息风,散结,截疟。用于疟疾,瘰癧,结核,风虚头晕,噎膈病。

#### 8934105

*Glaucidium cuculoides whiteleyi* (Blyth) --- *Athene whiteleyi* Blyth

动物名 华南斑头鸺鹠(拟)

药材名 猫头鹰《汇编》

文献名 斑头鸺鹠、鸺《神农架药录》

地方名 湖北:翁头雀(神农架)。

功效 肉、骨骼:息风,散结,截疟。用于疟疾,瘰癧,风虚头晕,噎膈。

#### 8934106

*Otus scops* (L.)

动物名 红角鸮《脊椎动物分类学》

药材名 鸺鹠《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 怪鸺《尔雅》,钩鸺《本草拾遗》,大头鹰《便民食疗》,角鸮、轂鸺鹰、鸺鹠、呼伶鹰、夜食鹰《纲目》,猫头鹰《本经逢原》,鬼鸺《本草求原》,夜猫子、聒聒鸟《动物图谱·鸟》,普通角鸮《世界鸟类名称》

功效 肉或骨:祛风,定惊,解毒。用于眩晕,癫痫,瘰癧,疟疾,噎食。

#### 8934107

*Otus spilocephalus latouchi* (Rickett)

动物名 黄嘴角鸮《汇编》

药材名 猫头鹰《汇编》

文献名 木兔《汇编》

功效 骨骼、肉、舌:息风,散结,截疟。用于疟疾,瘰癧,结核,风虚头晕,噎膈病。

### 89342 夜鹰科 caprimulgidae

#### 8934201

*Caprimulgus indicus* (Latham)

动物名 普通夜鹰《中国药用动物志》

药材名 夜鹰油(拟)

文献名 蚊母鸟、贴树皮、鬼鸟、夜燕、鹰油《中国药用动物志》,夜鹰、怪鸺《脊椎动物分类学》

功效 脂肪油:滋补益阴。用于肢体倦怠,妇女不育;肉:用于妇女经闭,月经不调。

备考 《动物图谱·鸟》及《山东药用动物》的夜鹰,学名为 *Caprimulgus indicus jotaka* Temminck et Schlegel

### 89343 雨燕科 Apodidae

#### 8934301

*Apus apus* L.

动物名 雨燕《内蒙古药用动物》

药材名 楼燕《中国药用动物名录》

地方名 内蒙古:“毛仁·哈日·鸭切”(蒙名),马燕。

功效 肺:用于肺脓肿;粪(烤黄后研细):用于经脉病,赤痢。

#### 8934302

*Apus pacificus* (Latham)

动物名 白腰雨燕《四川资源动物志》

药材名 龙牙燕(四川)

文献名 野燕、大白腰雨燕、白尾根麻燕《动物图谱·鸟》

功效 燕窝(巢加工品):养肺阴,化痰止咳。用于肺虚癆嗽,哮喘,咯血,痿损潮热等症。

**8934303**

*Apus pacificus kanoi* (Yamashina) --- *Micropus pacificus kanoi* Yamashina

动物名 华南白腰雨燕(拟)

药材名 龙牙燕《四川资源动物志》

功效 燕窝(巢的加工品);养肺阴,化痰止咳。

**8934304**

*Collocalia brevirostris* (McClelland)

动物名 短嘴金丝燕《中国药用动物志》

药材名 土燕窝《中国药用动物志》

文献名 燕子《中国药用动物志》

功效 土燕窝:养阴润燥,补中益气。用于虚损,癆瘵,咳嗽,痰喘,咯血,久痢,久疟。

**8934305**

*Collocalia brevirostris innominata* Hume

动物名 四川短嘴金丝燕《神农架药录》

药材名 土燕窝《四川中药志》

地方名 湖北:燕子(神农架);四川:岩燕窝,岩燕子。

功效 土燕窝:滋养脾胃,化痰止咳。用于肺劳吐血,咳嗽痰多,胃阴不足。

**8934306**

*Collocalia esculenta* L.

动物名 金丝燕《中药大辞典》

药材名 燕窝《本经逢原》、《中药大辞典》

文献名 燕窝菜《闽部疏》,燕蔬菜《纲目拾遗》,燕菜《现代实用中药》,燕根《药材学》,白腹金丝燕《世界鸟类名称》,官燕、雪燕、缙燕、毛燕《中药名汇》

功效 燕窝:养阴润燥,益气补中。用于虚损,癆瘵,咳嗽,痰喘,咯血,吐血,久痢,久疟,噎膈反胃。

**8934307**

*Collocalia inexpectata* Hume

动物名 灰腰金丝燕《汇编》

药材名 燕窝《汇编》

文献名 官燕、白燕《汇编》

功效 燕窝:养肺阴,化痰止咳。用于肺虚癆咳,咳嗽,咯血,痿损潮热。

**8934308**

*Collocalia inopina* Thayer et Bangs

动物名 褐背金丝燕《汇编》

药材名 土燕窝《汇编》

功效 燕窝:养肺阴,开胃,止血。用于肺癆咯血,体弱遗精,咳嗽痰多及小便频数。

**8934309**

*Collocalia linchi affinis* Bearan.

动物名 南海金丝燕《汇编》

药材名 燕窝《汇编》

文献名 官燕、白燕《汇编》

功效 燕窝:养肺阴,化痰止咳。用于肺虚癆咳,咳嗽,咯血,痿损潮热。

**8934310**

*Collocalia thunbergi*

动物名 爪哇金丝燕《汇编》

药材名 燕窝《汇编》

文献名 官燕、白燕《汇编》

功效 燕窝:养肺阴。化痰止咳。用于肺虚癆咳,咳嗽,咯血,痿损潮热。

**8934311**

*Collocalia unicolor* Jordan.

动物名 单色金丝燕《汇编》

药材名 燕窝《汇编》

文献名 官燕、白燕《汇编》

功效 燕窝:养肺阴,化痰止咳。用于肺虚癆咳,咳嗽,咯血,痿损潮热。

**8934312**

*Collocalia vestita* L.

动物名 褐腰金丝燕《世界鸟类名称》

药材名 燕窝《中药大辞典》

功效 燕窝:养阴润燥,益气补中。

**89344 翠鸟科 Alcedinidae****8934401**

*Alcedo atthis* (L.)

动物名 翠鸟《本草拾遗》、《中国药用动物志》

药材名 翠鸟肉《中国药用动物志》

文献名 鸿、天狗《尔雅》,水狗(《尔雅》郭璞注),鱼虎、鱼师《禽经》,鱼狗《本草拾遗》,翠碧《埤雅》,翠碧鸟《纲目》,鱼翠《纲目拾遗》,钓鱼郎、金鸟仔、翠雀儿《动物图谱·鸟》,金鸟儿、小翠鱼狗《常见药用动物》,小鱼狗、钓鱼郎《中国药用动物志》

地方名 内蒙古:“呼格楚”(蒙名),小翠鸟;湖北:鱼老鸦;四川:打鱼子;广西:叮翠,钓鱼公,青翠,青翠鸟,打鱼郎,叮鱼鸟,叮鱼雀。

功效 全体或肉:止痛,解毒,定喘,通淋。用于痔疮,哮喘,淋痛,鱼骨哽喉。

**8934402**

*Alcedo atthis bengalensis* Gmelin

动物名 普通翠鸟《神农架药录》

药材名 鱼狗《神农架药录》

地方名 湖北:鱼老鸦(神农架)。

功效 全体或肉:用于鱼骨哽喉。

**8934403**

*Halcyon smyrnensis fokiensis* Laubmana et Gotz

动物名 白胸翡翠《动物图谱·鸟》

药材名 翡翠《纲目》、《中药大辞典》

文献名 鹇《尔雅》,白胸鱼狗、翠毛鸟、鱼虎、翠碧鸟《动物图谱·鸟》

功效 肉:利小便。用于水肿。

**89345 戴胜科 Upupidae****8934501**

*Upupa epops* L.

动物名 戴胜《动物图谱·鸟》

药材名 戴胜《汇编》

文献名 发伞头鸟《常见药用动物》

地方名 鸡冠鸟(山东、湖北), 屎咕咕(山东、云南、四川); 内蒙古: “布波格勒金”(蒙名), 根报嗤; 湖北: 普通戴胜; 山东: 臭姑咕, 呼噜噜; 四川: 鸡冠雀, “许布”(藏名), 和尚鸟, 山和尚。

功效 全鸟(去内脏、毛): 柔肝熄风, 宁心安神, 用于羊痫风, 癫狂, 疟疾等。

**8934502***Upupa epops saturata* Lonnberg

动物名 普通戴胜《神农架药录》

药材名 屎咕咕《四川中药志》

地方名 屎咕咕(四川、贵州), 戴胜(山东、贵州); 湖北: 鸡冠鸟(神农架); 四川: 鸡冠雀, 和尚鸟。

功效 全体(去内脏、毛): 柔肝熄风, 宁心安神, 用于羊痫风, 癫狂, 疟疾。

**89346 啄木鸟科 Picidae****8934601***Dendrocopos canicapillus scintilliceps* (Swinhoe)

动物名 星头啄木鸟《动物图谱·鸟》

文献名 火老鸦《纲目》, 一点红, 星斑头啄木鸟、小髯、火点奔打木《动物图谱·鸟》

地方名 湖北: 啄木冠(神农架)。

功效 肉: 滋阴补虚。

**8934602***Dendrocopos cathartus innixus* (Bangs et Peters)

动物名 湖北赤胸啄木鸟《神农架药录》

地方名 湖北: 啄木冠(神农架)。

功效 肉: 滋阴补虚。

**8934603***Dendrocopos hyperythrus* (Vigors)

动物名 棕腹啄木鸟《中国药用动物志》

药材名 啄木鸟《嘉祐本草》、《汇编》

文献名 横花背奔打木《动物图谱·鸟》, 奔打木《中药名汇》

功效 全体: 滋养补虚, 消肿止痛。用于肺结核, 小儿疳积, 痔疮肿痛, 龋齿痛。

备考 《动物图谱·鸟》(1959)、《山东药用动物》所载棕腹啄木鸟的学名为 *Dendrocopos hyperythrus sub-rufinus* (Cabanis et Heine)

**8934604***Dendrocopos leucotos* (Bechstein)

动物名 白背啄木鸟《中国药用动物志》

药材名 啄木鸟《汇编》

功效 全体: 滋养补虚。用于虚劳, 小儿疳积, 痔疮。

备考 《动物图谱·鸟》(1959), 白背啄木鸟的学名为 *D. leucotos sinicus* (Buturlin)

**8934605***Dendrocopos major* (L.)

动物名 斑啄木鸟《中国药用动物志》

药材名 啄木鸟《嘉祐本草》、《中国药用动物志》

文献名 鹭、斫木《尔雅》, 山啄木《嘉祐本草》, 火老鸦《纲目》, 大斑啄木鸟《中药大辞典》, 木冠子、啄树雀《汇编》, 臭奔打木、花奔打木、白花啄木鸟《动物图谱·鸟》, 赤鹭, 白花啄木鸟、明木冠子《中国药用动物志》

地方名 内蒙古: “敦包敦纳”、“佟希古勒·均布”(蒙名), 花啄木; 陕西: 列木鸟, 青鹭; 广西: 啄木雀。

功效 去内脏及羽毛的全体: 滋养补虚。用于虚劳, 小儿疳积, 痔疮。

**8934606***Dendrocopos major cabanisi* (Malherbe)

动物名 大斑啄木鸟《动物图谱·鸟》

药材名 啄木鸟《山东药用动物》

文献名 花啄木、臭奔打木、花奔打木、白花啄木鸟《动物图谱·鸟》

功效 肉: 滋养补虚。用于虚劳, 小儿疳积, 痔疮。

**8934607***Dendrocopos major mandarinus* (Malherbe)

动物名 东南斑啄木鸟《神农架药录》

药材名 啄木鸟(广西、湖北神农架)

文献名 斑啄木鸟、白花啄木鸟《广西药用动物》

地方名 湖北: 啄木冠(神农架); 广西: 啄木雀, 花啄木。

功效 去内脏羽毛的全体: 滋养补虚, 消肿止痛。用于痔疮, 牙痛。

**8934608***Jynx torquilla* L.

动物名 蚁鹭《中国药用动物志》

药材名 蛇皮鸟《中国动物药》

文献名 鸛颈、歪脖、地啄木《动物图谱·鸟》, 地啄鸟《中国药用动物志》

功效 肉: 滋养补虚, 消肿止痛。用于肺结核, 小儿疳积, 痔疮肿痛, 龋齿痛。

**8934609***Megalaima virens virens* (Boddaert)

动物名 大拟啄木鸟《广西药用动物志》

药材名 啄木鸟肉(拟)

功效 肉(烧灰存性): 外用于痔疮, 蛀牙痛。

**8934610***Picus canus* Gmelin

动物名 绿啄木鸟《脊椎动物分类学》

药材名 啄木鸟《嘉祐本草》、《中药大辞典》

文献名 鹭、斫木《尔雅》, 山啄木《嘉祐本草》, 火老鸦《纲目》, 黑枕绿啄木鸟、星斑头啄木鸟、小髯、火点奔打木《动物图谱·鸟》, 黄啄木、山鹭《中国药用动物志》

地方名 四川: 啄木馆。

功效 肉或全体: 补虚, 开郁, 平肝。用于虚劳, 疳积, 噎膈, 痢病, 痔瘡; 脑: 用于神经衰弱, 失眠。

**8934611***Picus canus guerini* (Malherbe)

动物名 华东黑枕绿啄木鸟《神农架药录》  
 药材名 啄木鸟《神农架药录》  
 地方名 湖北:啄米冠子(神农架)。  
 功效 肉或全体:补虚,开郁,平肝。

### 89347 百灵科 Alaudidae

#### 8934701

*Alauda arvensis* L.

动物名 云雀《中国动物志》  
 药材名 云雀肉《汇编》  
 文献名 云雀脑《纲目》,阿鹞《汇编》,小百灵、阿鹞儿、阿兰儿《中国药用动物志》,大鹞、天鹅、告天鸟《中国动物志》  
 地方名 内蒙古:“多歌图”、“包勒召莫日”(蒙名),好地溜;山东:阿兰,告天子,百灵,朝天柱;其他:阿鹞,大告天鸟。  
 功效 全体:解毒,缩尿。用于胎毒,赤痢,遗尿,肺结核;云雀脑:滋补,壮阳。

#### 8934702

*Alauda gulgula* Franklin

动物名 小云雀《中国动物志》  
 药材名 小云雀《中国药用动物志》  
 文献名 百灵、告天鸟、天鹅、朝天柱《中国药用动物志》,大鹞、阿兰、阿鹞《中国动物志》  
 地方名 四川:“焦尔”(藏名),地麻雀,告天子。  
 功效 肉:解毒,溼尿。用于赤痢,肺结核,胎毒,遗尿等。

#### 8934703

*Alauda gulgula weigoldii* Hartert

动物名 长江小云雀《神农架药录》  
 药材名 长江小云雀肉《神农架药录》  
 地方名 湖北:(黄莺)(神农架)。  
 功效 肉:解毒,缩尿。

### 89348 燕科 Hirundinidae

#### 8934801

*Delichon urbica* (L.)

动物名 毛脚燕《中国动物志》  
 药材名 白腰燕(河北)  
 文献名 白腰毛脚燕《脊椎动物分类学》  
 地方名 河北:石燕。  
 功效 全体:用于风湿病。

#### 8934802

*Hirundo daurica* L.

动物名 金腰燕《中国动物志》  
 药材名 土燕窝泥《汇编》  
 文献名 燕窝泥、巧燕、花燕、金尾根燕《中国药用动物志》,燕巢土《中药材科技》  
 地方名 赤腰燕、黄腰燕(山西、陕西、甘肃)。  
 功效 土燕窝泥:解毒清热。用于湿疹,恶疮,丹毒;燕肉:用于百日咳,痔疮;卵:用于营养性水肿。

#### 8934803

*Hirundo daurica japonica* Temminck et Schlegel

动物名 普通金腰燕《神农架药录》  
 药材名 胡燕卵《别录》、《中药大辞典》  
 文献名 胡燕、夏侯《本草经集注》,赤腰燕、巧燕、花燕儿、红腰家燕《中药大辞典》  
 地方名 陕西:金腰燕,燕子窝泥,胡燕巢土;湖北:家燕子(神农架);贵州:燕泥。  
 功效 卵:用于卒水浮肿;巢泥:清热解毒。用于湿疹,恶疮,丹毒。

#### 8934804

*Hirundo rustica* L.

动物名 家燕《中国动物志》  
 药材名 燕窝泥《中国药用动物志》  
 地方名 燕了(山西、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏);内蒙古:“哈口雅切”(蒙名),燕;其他:拙燕。  
 功效 巢泥:清热解毒。用于湿疹,恶疮,丹毒。

#### 8934805

*Hirundo rustica gutturalis* Scopoli

动物名 普通家燕《神农架药录》  
 药材名 燕子巢泥《广西药用动物》  
 文献名 家燕《山东药用动物》  
 地方名 湖北:家燕子(神农架);广西:燕子,拙燕。  
 功效 巢泥:清热解毒。用于哮喘,恶疮,丹毒,湿疹。

#### 8934806

*Riparia riparia* (L.)

动物名 灰沙燕《中国动物志》  
 药材名 七燕《中国动物药》  
 文献名 沙燕、穴沙燕、沙岩燕《中国药用动物志》  
 地方名 甘肃:水燕子。  
 功效 巢泥:清热解毒。用于湿疹,恶疮,丹毒。

### 89349 黄鹌科 Oriolidae

#### 8934901

*Oriolus chinensis* (L.)

动物名 黑枕黄鹌《中国药用动物志》  
 药材名 黄鹌《中国药用动物志》  
 文献名 黄莺、黄鸟《中国药用动物志》  
 功效 肉:补气壮阳,温脾。用于肢体倦怠,脾胃虚寒泄泻。

#### 8934902

*Oriolus chinensis diffusus* L.

动物名 普通黑枕黄鹌《神农架药录》  
 药材名 黄鹌(《禽经》张华注)、《中药大辞典》  
 文献名 黄鸟、仓庚《诗经》,皇、商庚、鶯黄、楚雀(尔雅),青鸟《左传》,鸛鹑《易通卦验》,黄鹌鸛、黄莺、黄袍(陆玕《诗疏》),莺(汪颖《食物本草》),黄伯劳《纲目》  
 地方名 湖北:黄格郎(神农架);四川:黄老鸦,黄八郎。  
 功效 肉:补益阳气,助脾。

**89350 椋鸟科 Sturnidae****8935001***Acridotheres cristatellus* (L.)

动物名 八哥《中国药用动物志》

药材名 八哥《纲目》、《中药大辞典》

文献名 鸛鸽《周礼》，鸛鸛《尔雅翼》，鸛鸛《唐本草》，凤头八哥《中国药用动物志》，寒皋《淮南万毕术》，花鸛《荆楚岁时记》，喇喇鸟《广韵》。

地方名 湖北：八哥子（神农架）；四川：黑拌儿。

功效 肉：下气，止血，止咳。用于久嗽，呃逆，痔疮出血。

**89351 鸦科 Corvidae****8935101***Corvus corax* (L.)

动物名 渡鸦《中国药用动物志》

文献名 渡鸟、老鸱《中国药用动物志》

功效 肉：滋养补虚。用于虚劳发热，咳嗽。

**8935102***Corvus corone* (L.)

动物名 小嘴乌鸦《中国药用动物志》

文献名 细嘴乌鸦《中国药用动物志》

功效 肉：滋养补虚。用于虚劳发热，咳嗽。

**8935103***Corvus frugilegus* L.

动物名 秃鼻乌鸦《中国药用动物志》

药材名 乌鸦肉《中国药用动物志》

文献名 老鸱、山鸟、山老公《中国药用动物志》

地方名 四川：黑老鸱，老鸦。

功效 肉：祛风定痛，滋养补虚。用于肺结核咳嗽，发烧，秃疮，止血，面神经震颤。

**8935104***Corvus frugilegus pastinator* Gould

动物名 普通秃乌鸦《神农架药录》

药材名 黑老鸦肉《神农架药录》

文献名 秃鼻乌鸦《山东药用动物》

地方名 湖北：黑老鸦（神农架）。

功效 肉：祛风定痛，滋养补虚，止血。

**8935105***Corvus macrorhynchus* Wagler.

动物名 大嘴乌鸦《中国药用动物志》

药材名 乌鸦《嘉祐本草》、《中药大辞典》，乌鸦肉《汇编》

文献名 巨喙鸟《禽经》，大嘴鸟（《禽经》注），鸦头《圣惠方》，乌鸦翅羽《图经》，乌鸦头《证类本草》，鸦翅《丹溪心法》，黑老鸦血《滇南本草》，乌鸦胆《纲目》，老鸦《痘疹论》

地方名 湖北：普通大咀乌鸦；四川：老鸱，“卡达”（藏名）。

功效 全体或肉：滋养补虚。用于虚劳发热，咳嗽；头：用于蜂螫；胆：用于风眼红烂；翅羽：用于跌打瘀

血，破伤风；黑老鸦血（晒干为末）；用于一切年深日久吼喘

备考 《山东药用动物》、《广西药用动物》等载的大嘴乌鸦学名为 *C. macrorhynchus colonorum* Swinhoe**8935106***Corvus monedula* L.

动物名 寒鸦《嘉祐本草》、《中国药用动物志》

药材名 慈乌《纲目》、《中药大辞典》

文献名 乌鸛《诗经》，鸛鸛《尔雅》，鸦、楚乌、孝乌《说文》，元乌《崔豹古今注》，鸛乌（《尔雅》郭璞注），慈鸦《嘉祐本草》，哺公《尔雅翼》，鸛鸛（《小尔雅》宋咸注），慈乌胆、乌鸦胆《纲目拾遗》，小山老鸱《中国药用动物志》

地方名 内蒙古：“塔占”（蒙名），老鸦、老鸱、黑老鸱。

功效 肉：滋养补虚。用于虚劳发热，咳嗽；胆：明目开翳。外用于青盲，解藤黄毒。

备考 《中药大辞典》（1977）寒鸦的学名为 *C. monedula dahuricus* Pallas**8935107***Corvus torquatus* Lesson

动物名 白颈鸦《脊椎动物分类学》

药材名 白颈鸦《中国药用动物名录》

文献名 白颈乌《神农架药录》

地方名 湖北：白颈老鸦（神农架）；四川：白颈子老鸱，老鸱。

功效 肉：祛风定痛，滋养补虚，止血，消食散结。

**8935108***Pica pica* (L.)

动物名 喜鹊《禽经》、《中国药用动物志》

药材名 喜鹊肉《汇编》

文献名 雄鹊肉《别录》，干鹊《西京杂记》，神女《崔豹古今注》，飞驳鸟《本草经集注》，客鹊《常见药用动物》

地方名 内蒙古：“沙嘎吉盖”（蒙名）；四川：鸦鹊，“阿喳”（彝名），“夹阿”（藏名）。

功效 肉：滋补，散热。用于虚劳发热，化脓性骨髓炎，鼻衄，消渴；肉（烧灰存性）：用于泌尿系结石。

备考 《中药大辞典》喜鹊学名为 *Pica pica sericea* Gould.**8935109***Podoces humilis* Hume

动物名 褐背地鸦《中国动物药》

药材名 地鸦《中国动物药》

功效 肉：祛风活血，镇惊止抽，用于神经麻痹，抽风。

**8935110***Pseudopodoces humilis* (Hume)

动物名 褐背拟地鸦《中国药用动物志》

地方名 四川：“豆豆”（藏名）。

功效 肉：滋养补虚。用于虚劳发热，咳嗽等。

**8935111***Pyrrhocorax pyrrhocorax* (L.)

动物名 红嘴山鸦《中国药用动物志》

药材名 山鸦肉(四川)

文献名 红嘴乌鸦、红嘴老鸦、山老鸦、山乌《中国药用动物志》

地方名 内蒙古：“乌兰-胡希古图·赫日也”(蒙名)，赤嘴乌；四川：山鸦，红嘴老鸦。

功效 肉：滋养补虚。用于虚劳发热，咳嗽等。

**89352 河乌科 Cinclidae****8935201***Cinclus cinclus* (L.)

动物名 河乌《中国动物志》

药材名 河乌《中国药用动物志》

文献名 水老鸱《中国动物药》

功效 肉：清热解毒，消肿散结。外用于淋巴结炎。

**8935202***Cinclus pallasi* Temminck

动物名 褐河乌《中国药用动物志》

文献名 水黑老婆、水老鸱《中国药用动物志》

功效 肉：清热解毒，消肿散结。外用于淋巴结炎。

**89353 鹈鹕科 Troglodytidae****8935301***Troglodytes troglodytes* (L.)

动物名 鹈鹕《中国药用动物志》

药材名 鹈鹕《纲目》

文献名 桃虫《诗经》，桃虫鹕、鹕(雌鸟)《尔雅》，蒙鹕《荀子》，桑飞、林雀、女匠、桃雀、巧雀、巧女、巧妇(杨雄《方言》)，巧如鸟《本草拾遗》，黄脰雀《纲目》，山蛭蛭儿《中国药用动物志》

地方名 四川：偷盐雀，偷屎雀。

功效 全体(去毛及脏)：补脾，益肺，滋肾。用于脾虚作泻，肺虚喘嗽。

备考 《贵州药录》(1988)记载的鹈鹕为亚种 *Troglodytes troglodytes talifuensis* (Sharpe)**89354 鹪科 Muscicapidae****8935401***Copsychus saularis* (L.)

动物名 鹪鹩《四川资源动物志》

地方名 四川：四喜，精鸦雀，屎鸦雀。

功效 肉：清热消痔。

**8935402***Myiophoneus caeruleus* (Scopoli)

动物名 紫啸鹪《中国药用动物志》

文献名 鸣鸡、山鸣鸡、乌精、箫声鹪、黑雀儿《中国药用动物志》，黑串子、水老鸱《常见药用动物》

功效 肉：解毒，止血，止咳。用于痔疮，吐血，咳

嗽。

**8935403***Terpsiphone paradisi* (L.)

动物名 寿带鸟《中国药用动物志》

药材名 练鹊肉《中国药用动物志》

文献名 练鹊《嘉祐本草》，拖白练《纲目》，绶带、长尾巴练、一枝花、长尾鹞、三光鸟、白带子、紫带子、紫长尾《中国药用动物志》，寿带《四川资源动物志》，普通寿带鸟《神农架药录》

地方名 湖北：胖头鸟(神农架)；四川：梁山伯(老雄鸟)，祝英台，蛇尾巴雀。

功效 去内脏全体：解毒杀虫，止血。用于痔疮，龋齿。

**8935404***Turdus merula* L.

动物名 乌鸫《中国药用动物志》

药材名 百舌鸟《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 反舌、反舌鸟《易通卦验》，交啄《春秋保乾图》，鹈鹕(《尔雅》郭璞注)，牛屎喇哥、百舌《纲目》，牛屎了《本草求原》，乌鸫《中国的鸟类》，黑鸫《中药大辞典》，黑鸟《中国药用动物志》，普通乌鸫《神农架药录》

地方名 四川：牛屎入，黑伴儿，黑洋雀，乌练儿。

功效 肉：用于F血虚头晕，胃痛，小儿语迟；巢及粪：外用于诸虫咬伤。

备考 《中药大辞典》(1977)、《神农架药录》(1987)《贵州药录》(1988)等记载的乌鸫为亚种 *Turdus merula mandarinus* Bonaparte**8935405***Turdus moupinensis* Larbmann

动物名 宝兴乌鸫《神农架药录》

地方名 湖北：铁甲子(神农架)。

功效 肉：补虚强壮。

**8935406***Turdus rubroanus gouldii* (Verreaux)

动物名 西南灰头鸫《神农架药录》

地方名 湖北：铁夹鸟。

功效 肉：补虚益气，镇静。

**89355 绣眼鸟科 Zosteropidae****8935501***Zosterops erythropleura* Swinhoe

动物名 红胁绣眼鸟《中国动物志》

药材名 绣眼肉(拟)

文献名 红胁粉眼、粉眼、北粉眼、白眼儿、红腿绣眼、绣眼儿、红胁白目眶、紫燕儿、褐色肋绣眼《中国动物志》

地方名 北京：粉眼儿。

功效 肉、骨：强心利尿。用于肾炎水肿，心脏病。

**8935502***Zosterops japonica* Temminck et Schlegel

动物名 暗绿绣眼鸟《中国药用动物志》

药材名 绣眼肉(拟)

文献名 白眼儿、粉眼儿、白眼儿、相思仔、金眼圈《中国药用动物志》，杨柳鸟《中国动物志》

地方名 江苏：柳穿子，柳穿儿；四川：绣眼儿，青燕，粉燕儿。

功效 肉、骨：强心利尿。用于肾炎水肿，心脏病。

### 89356 攀雀科 Remizidae

#### 8935601

*Remiz pendulinus* (L.)

动物名 攀雀《中国动物志》

药材名 攀雀巢《中国药用动物名录》

文献名 洋红儿《中国动物志》

功效 窝巢：用于寒疝作痛。

### 89357 文鸟科 Ploceidae

#### 8935701

*Passer montanus* (L.)

动物名 树麻雀《中药志》

药材名 白丁香〔粪便〕《滇南本草》、《中药大辞典》

文献名 雀卵、雀脑、雀头血、雄雀矢、雀矢《别录》，雀苏〔粪便〕《雷公炮炙论》，嘉宾《崔豹《古今注》》，青丹《本草拾遗》，家雀《普济方》，麻雀、瓦雀、公瓦雀尿《滇南本草》，宾雀《纲目》，麻雀雀《本草述》，雄雀尿《新纲》，老家贼、只只《中药志》，麻雀粪、家雀粪《汇编》，谷雀《常见药用动物》

地方名 黑龙江：雄家雀粪；吉林：“查母塞刀姆”（朝名）；内蒙古：“格仁·毕勒珠亥”、“包日·毕勒珠亥”（蒙名）；四川：麻雀子，小谷雀，“切尔哇”（藏名）。

功效 粪便：消积，明目，解毒。用于积聚，疝气。外用于目翳，痈疽，冻疮等；麻雀肉：用于防治小儿疳积，神经衰弱失眠，抵抗力差容易感冒者，夜盲症，脱肛，精力不足；麻雀脑：外用于冻疮；雀卵：补肾阳，益精血，调冲任。用于阳痿，女子血枯，崩漏，带下；雀头血：用于雀盲。

#### 8935702

*Passer montanus malaccensis* Dubois

动物名 马六甲树麻雀（拟）

药材名 白丁香〔粪便〕（云南）、《滇南本草》整理本）

功效 粪便：云南民间作白丁香用；肉：滋阴补肾。用于小儿疳积，肾虚，阳痿。

#### 8935703

*Passer montanus saturatus* Stejneger

动物名 麻雀《药典》

药材名 白丁香〔粪便〕《广西药用动物》，雀脑《《药典》附录》

文献名 麻雀《中药大辞典》，树麻雀《山东药用动物》，普通麻雀《神农架药录》

地方名 湖北：麻雀子（神农架）；广西：家雀，老家贼，只只，宾雀，瓦雀，麻雀粪，雀粪，雄雀尿，麻雀酒〔肉浸酒〕。

功效 粪便：有小毒。消积，明目，解毒。用于积

聚，疝气。外用于目翳，痈疽，冻疮；肉：壮阳益气，益精髓，暖腰膝。用于百日咳，妇女崩漏带下；卵：补肾阳，益精血。用于阳痿，妇女血枯，带下。

#### 8935704

*Passer rutilans* Temm.

动物名 山麻雀《中药志》

药材名 白丁香〔粪便〕《汇编》

地方名 麻雀（湖北、四川）；广西：黄雀，山只只，赭麻雀；四川：小谷雀。其他：红雀、赭麻雀。

功效 粪便：化积，消翳。

备考 《滇南本草》整理本（1978）注称：云南有一种山麻雀（*Passer rutilans intensior* Rothschild）也入药

### 89358 雀科 Fringillidae

#### 8935801

*Emberiza aureola* Pallas

动物名 黄胸鹀《中国药用动物志》

药材名 禾花雀《贵州药录》

文献名 黄肚囊《中国药用动物志》，黄豆瓣《常见药用动物》

地方名 山东：老铁背；广西：黄胆，麦黄雀。

功效 肉：滋补强壮，祛风湿，通经络，壮筋骨。用于年老体衰，肢体乏力，头晕目眩，风湿关节疼痛，阳痿，毒草中毒，酒精中毒。

#### 8935802

*Emberiza elegans elegantula* Swinhoe

动物名 西南黄喉鹀《神农架药录》

药材名 黄画眉《神农架药录》

功效 肉：补中益气，祛风湿，壮筋骨。

#### 8935803

*Emberiza spodocephala* Pallas

动物名 灰头鹀《中国药用动物志》

药材名 蒿雀《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 白头雀《东北动物药》，青头鹀、蒿雀肉《中国药用动物志》

地方名 山东：青头儿，黑脸鹀，蓬鹀；湖北：雷雀子（神农架）。

功效 肉：滋阴养胃，补肾强身。用于肺结核、肝炎以及病后体弱之食疗，酒精中毒，毒草中毒。

备考 本品之亚种 *Emberiza spodocephala personata* Temm.（*E. personata* Temm.）亦为蒿雀。

#### 8935804

*Emberiza spodocephala sordida* Blyth

动物名 西北灰头鹀《神农架药录》

药材名 雷雀子《神农架药录》

功效 肉：补虚，解毒。

#### 8935805

*Eophona migratoria* Hartert

动物名 黑尾蜡嘴雀《中国动物药》

药材名 蜡嘴《中国动物药》

功效 肉：滋养补虚。用于久病气虚，肌体衰弱无



力。

**8935806***Eophona personata magnirostris* Hartert

动物名 黑头腊嘴雀《中药大辞典》

药材名 桑扈(注颖《食物本草》)、《中药大辞典》

文献名 桑扈《诗经》, 青雀、窃脂(陆玕《诗疏》), 蜡嘴雀、蜡嘴《纲目》

功效 肉: 滋阴养胃, 补肾强身。用于虚损羸瘦

**89359 猬科 Erinaceidae****8935901***Erinaceus europaeus* L.

动物名 普通刺猬《动物图谱·兽》

药材名 刺猬皮《本草原始》、《中药大辞典》, 刺猬胆《中国药用动物志》

文献名 猬、毛刺《尔雅》, 猬皮《本经》, 白刺猬《杨氏家藏方》, 猬脂《本草经集注》, 猬肉《食疗本草》, 猬皮《本草衍义》, 猬脑、猬心肝、猬鼠《纲目》, 刺猬《本草原始》, 偷瓜贼(姚可成《食物本草》), 刺鼠《随息居饮食谱》, 偷瓜獐、刺血儿《中药大辞典》, 毛猬《常见药用动物》

地方名 刺球子(内蒙古、山东); 内蒙古: “扎日阿”(蒙名); 山东: 仙人衣, 刺鱼; 其他: 蜎皮, 汇皮, 毛刺皮, 蜎鼠皮, 虎鼠皮, 山积鼠皮, 猬蜎皮, 黑猬针, 黑猪针, 猪针, 刺皮, 鼠蜎皮, 蜎, 蜎皮, 蜎巢, 偷瓜畜, 偷瓜婆, 偷瓜獐皮, 刺球皮。

功效 外皮: 行瘀止痛, 止血, 固精。用于胃脘疼痛, 子宫出血, 便血, 痔瘡, 遗精, 遗尿。外用于颈淋巴结核; 胆: 消炎清热。外用于眼睑赤烂; 肉: 用于反胃, 胃脘痛, 痔瘡; 脂肪油: 用于肠风便血, 癰瘡, 耳聋; 脑: 用于狼瘡; 心、肝: 用于蚊瘡, 蜂瘡, 瘰癧恶疮。

备考 1. 刺蜎皮与蜎蛻之别名, 均有称“仙人衣”者, 北京中药店习惯处方写“仙人衣”, 付与蜎蛻, 而天津则不一致, 有的付与刺蜎皮, 有的付与蜎蛻, 按旧社会称猬为五大仙之一, 故仙人衣亦指刺蜎皮。2. 刺蜎皮的来源尚有: *Erinaceus amurensis amurensis* Schrenck; *E. dealbatus dealbatus* Swinhoe; *E. dealbatus generosus* Kishida; *E. dealbatus hughii* Thomas; *E. dealbatus miodon* Thomas; *E. dealbatus orientalis* Allen 等。**8935902***Hemiechinus auritus* Gmelin

动物名 大耳猬《拉汉兽类名称》

药材名 刺猬皮、刺猬胆《中国药用动物志》

文献名 猬鼠、刺球子、毛刺《中国药用动物志》

功效 皮刺: 行瘀止痛, 止血, 固精。用于胃脘疼痛, 子宫出血, 便血, 痔瘡, 遗精, 遗尿。外用于颈淋巴结核; 胆: 清热明目, 解毒。用于眼睑赤烂, 痔瘡。

**8935903***Hemiechinus dauricus* Sundevall

动物名 达乌尔刺猬《动物图谱·兽》

药材名 刺猬皮《汇编》, 刺猬胆《中国药用动物志》

文献名 达呼尔刺猬《中国动物药》, 短刺猬、猬皮、

刺鼠皮、刺球子皮《汇编》, 猬鼠、刺球子、毛刺《中国药用动物志》

功效 外皮: 行瘀止痛, 止血, 固精。用于胃脘疼痛, 子宫出血, 便血, 痔瘡, 遗精, 遗尿。外用于颈淋巴结核; 胆: 清热明目, 解毒。用于眼睑赤烂, 痔瘡。

**89360 鼯科 Talpidae****8936001***Mogera hainana* Thomas

动物名 海南缺齿鼯《拉汉兽类名称》

药材名 海南鼯《中药名汇》

地方名 海南: 鼯鼠。

功效 胴体(去内脏): 解毒, 理气。用于疔肿, 恶疮, 淋病, 哮喘。

**8936002***Mogera latouchei* (Thomas)

动物名 拉氏缺齿鼯《拉汉兽类名称》

药材名 华南鼯鼠(拟)

文献名 华南缺齿鼯、鼯鼠、瞎眼老鼠《中国药用动物志》

功效 胴体(去内脏): 解毒, 理气。用于疔肿, 恶疮, 淋病, 喘息。

**8936003***Mogera robusta* Nehring

动物名 缺齿鼯《动物图谱·兽》

药材名 鼯鼠《别录》、《汇编》

文献名 地爬子《中国药用动物志》

地方名 黑龙江: 瞎眼鼠(哈尔滨)。

功效 胴体(去内脏)及油: 解毒, 理气。用于疔肿, 恶疮, 淋病, 喘息。

**8936004***Mogera wogura* Temminck

动物名 小缺齿鼯《拉汉兽类名称》

药材名 鼯鼠《中国药用动物志》

功效 胴体(去内脏)及油: 解毒, 理气。用于疔肿, 恶疮, 淋病, 喘息等。

**8936005***Parascaptor leucurus* Blyth

动物名 白尾鼯《拉汉兽类名称》

药材名 白尾鼯鼠(拟)

文献名 鼯鼠、瞎眼老鼠、翻手老鼠《中国药用动物志》

功效 胴体: 解毒, 止血。用于刀伤, 弹伤, 伤口溃瘍。

**8936006***Scaptochirus moschatus* Milne-Edwards

动物名 麝鼯《动物图谱·兽》

药材名 鼯鼠《别录》

文献名 田鼠、鼯鼠、隐鼠《纲目》, 地爬子、瞎老鼠《山东药用动物》

地方名 内蒙古: “宝哈力各-胡鲁格纳”(蒙名), 地鼯子。

功效 胴体(去内脏)及油:解毒,理气。用于疗肿,痔疮,淋病,喘息。

#### 8936007

*Talpa longirostris* Milne-Edwards

动物名 长吻鼯(拉汉兽类名称)

文献名 鼯鼠、翻手老鼠《中国药用动物志》

功效 胴体:解毒,止血。用于刀伤,弹伤,伤口溃瘍。

### 89361 狐蝠科 Pteropidae

#### 8936101

*Barbastella darjelingensis* Dobson

动物名 亚洲阔耳蝠《中国药用动物名录》

药材名 夜明砂(甘肃、新疆、四川)

功效 粪:消积聚,去翳障。

#### 8936102

*Barbastella leucomelas* (Gretschmar)

动物名 阔耳蝠《中国药用动物志》

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 亚洲宽耳蝠(拉汉兽类名称),大耳蝠、亚洲阔耳蝠《中国药用动物志》

功效 粪:消积聚,去翳障。

#### 8936103

*Eptesicus andersoni* (Dobson)

动物名 华南棕蝠《中国药用动物志》

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 蝙蝠、安氏蝠、盐老鼠《中国药用动物志》,华南蝙蝠《中国药用动物名录》

功效 粪便:清热明目,消积。用于青盲雀,内外障翳,瘰癧,疳积,疟疾;胴体:滋补,平喘,止咳。用于哮喘,支气管炎。

#### 8936104

*Eptesicus nilasoni* Keyserling et Blasius

动物名 北棕蝠(拉汉兽类名称)

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 蝙蝠、盐老鼠《药用动物志》,北方蝙蝠《药用动物名录》

功效 粪便:清热明目,消积。用于青盲雀,内外障翳,瘰癧,疳积,疟疾;胴体:滋补,平喘,止咳。用于哮喘,支气管炎。

#### 8936105

*Eptesicus serotinus* (Schreber)

动物名 棕蝠(拉汉兽类名称)

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 大棕蝠、蝙蝠、欧洲棕蝠、盐老鼠《中国药用动物志》

功效 粪:消积聚,去翳障。用于夜盲症,白内障,间歇热及久疟。外用于齿病,耳漏,腋臭。

### 89362 菊头蝠科 Rhinolophidae

#### 8936201

*Rhinolophus affinis himalayanus* Andersen

动物名 西南中菊头蝠《神农架药录》

药材名 盐老鼠屎《神农架药录》

地方名 湖北:盐老鼠(神农架)。

功效 干燥粪便:消积,活血,明目。

#### 8936202

*Rhinolophus ferrumequinum* Schreber

动物名 菊头蝠《动物图谱·兽》

药材名 夜明砂《汇编》

文献名 马铁菊头蝠(拉汉兽类名称),盐老鼠《中国药用动物志》,大菊头蝠《东北动物药》,菊头蝠《汇编》

地方名 陕西:蝙蝠屎,天鼠屎。

功效 干燥粪便:活血消积,清热明目。用于夜盲症,白内障,角膜云翳。

#### 8936203

*Rhinolophus ferrumequinum nippon* Temminck

动物名 日本马铁菊头蝠《贵州药录》

药材名 夜明砂《贵州药录》

功效 粪便:清热明目,散血消积。用于青盲雀目,内外障阻翳,瘰癧,疳积,疟疾。

#### 8936204

*Rhinolophus iepidus*

动物名 短羽菊头蝠《神农架药录》

药材名 夜明砂(湖北)

地方名 湖北:盐老鼠(神农架)。

功效 干燥粪便:活血,明目,消积。

### 89363 蹄蝠科 Hipposideridae

#### 8936301

*Aselliscus wheeleri* Osgood

动物名 三叶小蹄蝠《中国药用动物志》

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 三叶蹄蝠(拉汉兽类名称)

功效 粪:消积聚,去翳障。用于夜盲症,白内障,间歇热,久疟。外用于齿病,耳漏,腋臭等。

#### 8936302

*Hipposideros armiger* Hodgson

动物名 大马蹄蝠《动物图谱·兽》

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 大蹄蝠(拉汉兽类名称),蝙蝠、盐老鼠《中国药用动物志》

功效 粪:消积聚,去翳障。用于夜盲症,白内障,间歇热,久疟。外用于齿病,耳漏,腋臭等。

### 89364 蝙蝠科 Vespertilionidae

#### 8936401

*Miniopterus schreibersi* Kuhl

动物名 长翼蝠《动物图谱·兽》

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 普通长翼蝠(拉汉兽类名称),长指蝠《中国药用动物名录》

功效 干燥粪便:活血消积,清热明目。用于夜盲症,白内障,角膜云翳。

**8936402***Murina leucogaster* Milne-Edwards

动物名 管鼻蝠《动物图谱·兽》

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 大管鼻蝠《东北动物药》,白腹管鼻蝠《拉汉兽类名称》

功效 干燥粪便:活血消积,清热明目。用于夜盲症,白内障,角膜云翳。

**8936403***Myotis ikonnikvi* Ognev

动物名 伊氏鼠耳蝠《拉汉兽类名称》

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 盐蝙蝠《中国药用动物志》

功效 干燥粪便:活血消积,清热明目。用于夜盲,翳障,小儿疳积,惊风,积聚。

**8936404***Myotis longicaudatus* Ognev

动物名 长尾鼠耳蝠《拉汉兽类名称》

药材名 夜明砂《东北动物药》

功效 干燥粪便:明目退翳,活血消积。用于夜盲,翳障,小儿疳积,惊风,积聚。

**8936405***Myotis mystacinus* Kuhl

动物名 须鼠耳蝠《拉汉兽类名称》

药材名 夜明砂《东北动物药》

地方名 湖北:飞鼠(神农架)。

功效 干燥粪便:明目退翳,活血消积。用于夜盲,翳障,小儿疳积,惊风,积聚。

**8936406***Myotis nathereei* Kuhl

动物名 纳氏鼠耳蝠《拉汉兽类名称》

药材名 夜明砂《东北动物药》

功效 干燥粪便:明目退翳,活血消积。用于夜盲,翳障,小儿疳积,惊风,积聚。

**8936407***Nyctalus noctula* Schreber

动物名 夜蝠《动物图谱·兽》

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 山蝠《拉汉兽类名称》,蝙蝠《内蒙古药用动物》

地方名 内蒙古:“巴格巴亥”(蒙名),夜蝙蝠。

功效 粪便:活血消积,清热明目。用于夜盲症,白内障,角膜云翳。

**8936408***Pipistrellus abramus* Temminck

动物名 家蝠《动物图谱·兽》

药材名 夜明砂《中国药用动物志》

文献名 普通伏翼《中国药用动物志》,伏翼《中国药用动物名录》

地方名 四川:檐老鼠屎;其他:石肝,鼠法,鼠真,蝙蝠屎,天鼠粪,〔千里光〕,烂紫精,烂砂星,黑砂星,飞鼠屎,夜燕屎。

功效 干燥粪便:活血消积,清热明目。用于夜盲症,白内障,角膜云翳,小儿疳积。

**8936409***Plecotus auritus* L.

动物名 大耳蝠《动物图谱·兽》

药材名 夜明砂《日华子本草》、《汇编》

文献名 兔蝠《中药志》,盐老鼠《中国药用动物志》

地方名 天鼠屎、蝙蝠粪(河南、江苏)。

功效 干燥粪便:活血消积,清热明目。用于夜盲症,白内障,角膜云翳。

**8936410***Vespertilio savii* Bonaparte

动物名 萨氏蝙蝠《东北动物药》

药材名 夜明砂《东北动物药》

文献名 萨氏鼠耳蝠《中国药用动物名录》

功效 干燥粪便:活血消积,清热明目。用于夜盲症,白内障,角膜云翳。

**8936411***Vespertilio serotinus* Schreber

动物名 小夜蝠《东北动物药》

药材名 夜明砂《东北动物药》

功效 干燥粪便:活血消积,清热明目。用于夜盲症,白内障,角膜云翳。

**8936412***Vespertilio superans* Thomas

动物名 蝙蝠《本经》、《动物图谱·兽》

药材名 夜明砂《日华子本草》、《汇编》

文献名 服翼《尔雅》,天鼠、伏翼、天鼠屎、鼠法、石肝、蝙蝠粉《本经》,飞鼠、老鼠、鼯鼠(方言),仙鼠(《尔雅》郭璞注),黑砂星、夜燕《纲目》,鼠真、千里光、天鼠矢、黑杀星、烂紫精、烂砂星《新纲》,挂鼠、天蝠《山东药用动物》,东方蝙蝠《拉汉兽类名称》,蝙蝠屎、天鼠屎《汇编》,方蝙蝠、盐老鼠《中国药用动物志》,盐蝙蝠《常见药用动物》

地方名 江西:檐老鼠屎。

功效 干燥粪便:消血消积,清热明目。用于夜盲症,白内障,角膜云翳。

**89365 懒猴科 Lorisidae****8936501***Nycticebus coucang* Boddaert

动物名 蜂猴《动物图谱·兽》

药材名 懒猴脑(拟)

文献名 风猴《动物图谱·兽》,风猩《中国药用动物志》

功效 脑:镇静息风。用于风疾;尿:息风。用于诸风,大风疾。

**89366 猴科 Cercopithecidae****8936601***Lyssodes speciosus* (Cuvier) --- *Lyssodes speciosus speciosus* --- *Macaca speciosa* F. Cuvier

动物名 短尾猴《拉汉兽类名称》

药材名 猴骨、猴血、猴胆、猴肉《中国药用动物志》

文献名 华南猴《脊椎动物分类学》，断尾猴《动物图谱·兽》，红面猴《中国药用动物志》，猴枣《广西药用动物》

地方名 湖北：猴子（神农架）；广西：红脸猴，黑猴，泥猴。

功效 骨骼（酥炙或打碎）：祛风除湿，镇惊。用于风寒湿痹，四肢麻木，小儿惊痫；结石（猴枣）：消痰镇惊，清热解暑。用于痰热咳嗽，小儿惊痫，癰疽痰核；猴胆：清热解暑，明目退翳。用于猴头红肿，青盲，夜盲；猴血：消痞化积。用于痞疾，消化不良；猴肉：补肾壮阳，收敛固精，祛风除湿。用于肾虚阳痿，遗精，遗尿，神经衰弱，风湿痹痛。

#### 8936602

*Lyssodes speciosus thibetanus* (Milne-Edwards)

动物名 藏酋猴《脊椎动物分类学》

药材名 猴骨（四川）

文献名 四川猴《脊椎动物分类学》，短尾猴、青猴《汇编》，猴胆、猴血《中药名汇》

功效 骨骼：祛风除湿，镇惊。用于风寒湿痹，四肢麻木，小儿惊痫；胆：清热解暑，明目退翳；血：消痞化积。

#### 8936603

*Macaca assamensis* Melelland

动物名 熊猴《动物图谱·兽》

药材名 猴骨《中国动物药》，猴枣《广西药用动物》

文献名 卷猴、阿萨姆猴《动物图谱·兽》

功效 骨骼：祛风湿，通经络，镇惊。用于风湿痹痛，四肢麻木，小儿惊痫，跌打损伤；结石（猴枣）：清热镇惊，豁痰定喘，解毒，消肿。用于痰热惊痫，小儿急惊，癰疽。

#### 8936604

*Macaca mulatta* Zimmermann

动物名 猴《动物图谱·兽》

药材名 猴肉、猴骨《证类本草》，猴枣《饮片新参》，《中药大辞典》

文献名 狙《庄子》，沐猴《史记》，猕猴（陆玑《诗疏》），上孙《柳河东集》，猢猻《圣惠方》，猕猴肉、猕猴骨《证类本草》，马留《倦游杂录》，猴子枣、羊肠枣《药物出产辨》，猴丹《中国医学大辞典》，申枣《药材资料汇编》，恒河猴、广西猴《动物图谱·兽》，马骝《中国药用动物志》，黄猴《汇编》

地方名 四川：申骨；贵州：猴子；其他：孝猴，胡孙，猴宝，猴结石。

功效 骨骼（酥炙或打碎）：祛风除湿，镇惊。用于风寒湿痹，四肢麻木，小儿惊痫；猴肉：补肾壮阳，收敛固精，祛风除湿。用于肾虚阳痿，遗精，遗尿，神经衰弱，风湿痹痛；结石（猴枣）：消痰镇惊，清热解暑。用于痰热咳嗽，小儿惊痫，癰疽痰核；猴胆：清热解暑，明目退翳。用于喉头红肿，青盲，夜盲；猴血：消痞化积。用于痞疾，消化不良。

#### 8936605

*Presbytis francoisi* Pousargues

动物名 黑叶猴《动物图谱·兽》

药材名 乌猿骨《中国药用动物志》

文献名 乌猿《动物图谱·兽》

地方名 广西：乌叶猴，叶猴。

功效 骨、肉、皮（浸酒）：滋补壮阳，驱风健骨，活血。用于体虚，阳痿，风湿痹痛，神经衰弱，半身不遂。

#### 8936606

*Rhinopithecus roxellanae* Milne-Edwards

动物名 金丝猴《动物图谱·兽》

药材名 玃《本草拾遗》，《中药大辞典》

文献名 玃、金线玃《纲目》

地方名 四川：仰鼻猴，金线猴，线子。

功效 猴肾（阴茎及睾丸）：补肾壮阳。用于阳痿，遗精；猴胆：清热解暑。用于百日咳，支气管炎，肝炎；脂肪油：外用于疮痂。

### 89367 猿科 Hylobatidae

#### 8936701

*Hylobates concolor* Harlan

动物名 黑长臂猿《动物图谱·兽》

药材名 猿骨《中国药用动物志》

文献名 乌猿、猿《中国药用动物志》

功效 猿骨：驱风，健骨，活血。用于风湿痹痛，半身不遂等。

### 89368 人科 Hominidae

#### 8936801

*Homo sapiens* L.

动物名 人《汇编》

药材名 脐带《本草拾遗》，《汇编》，紫河车《纲目》，《中药大辞典》，血余《本草蒙筌》，《中药大辞典》

文献名 脐带：初生脐带《本草拾遗》，命蒂《纲目》，坎气《本草从新》，坎炁《汇编》；胎盘：人胞、胞衣《本草拾遗》，混沌皮、混沌母《本草蒙筌》，胎衣、混沌衣、佛袈沙、仙人衣《纲目》，人胎盘《山东药用动物》，荷车、衣胞、胞星、白河车、杜河车、双河车《中药名汇》；头发：发髻《本经》，乱发《别录》，胎发《证治要诀》，人退《眼科龙木论》，发灰、血余炭《中药大辞典》；尿：人溺、人尿《别录》，轮回酒、還元汤《纲目》，童便《中药大辞典》，还魂酒、還元水《中药名汇》；尿垢：溺白垢《别录》，溺垢《本草经集注》，人中白《日华子本草》，白秋霜《积善堂经验方》，秋石《本草蒙筌》，秋白霜《医学入门》，秋冰《纲目》，粪霜《王圣俞手集》，尿壺垢、尿干子《四川中药志》，中白、人尿白、尿白碱、小便滓、千年冰、淡秋石《中药名汇》；粪清：人中黄《日华子本草》；粪渍甘草：甘草黄《医林纂要》，甘中黄《现代实用中药》；乳汁：人乳汁《别录》，乳汁、奶汁、仙人酒《纲目》；指甲：手爪甲《日华子本草》，人指甲《本草衍义》，爪甲、筋退《纲目》

功效 脐带：益肾，纳气。用于虚劳羸弱，气血不足，肾虚喘咳；胎盘（紫河车）：补气，养血，益精。用于

虚损,羸瘦,劳热骨蒸,咳嗽,咯血,盗汗,遗精,阳痿,妇女气血不足,不孕,乳少;人发(血余炭):消瘀,止血。用于吐血,鼻衄,齿龈出血,血痢,血淋,崩漏;人尿(童便):滋阴降火,止血消瘀。用于阴虚发热,劳伤咳血,吐血,衄血,产后血瘀,血晕,跌打损伤,血瘀作痛;尿垢(人中白):清热,降火,消瘀。用于劳热,肺痿,衄血,吐血,喉痹,牙疳,口舌生疮;粪渍甘草(人中黄):清热,凉血,解毒。用于伤寒热病,大热烦渴,热毒斑疹,丹毒,疮疡;乳汁:补血,润燥。用于虚劳羸瘦,虚风瘫痪,消渴,噎膈,大便燥结,血虚经闭,目赤眼昏;人指甲:用于鼻衄,尿血,喉蛾,目生翳障,中耳炎。

**备考** (1)秋石亦名秋冰,《中国药典》称“秋石分为二种,其一为淡秋石,是以童便加石膏而成,另一为咸秋石,产于湖北,系以岩盐煅之而成”。按日前市售咸秋石多呈碗状,一般是用洁净泉水与食盐煎煮,滤去其杂质,制成秋霜后用瓷碗装,再置炉中烤炼二小时,促其凝成固体,此即咸秋石,又称盆秋石,安徽桐城专门制造。但时珍曰:“近人以人中白炼成白质,亦名秋石。再加升打,其精致者,谓之秋冰,此盖仿海水煎盐之义。方士亦以盐入炉火煅成伪者,宜辨之。”据此,《纲目》之秋冰与现代市售之咸秋石,实为二物,功效不同,不可混淆。(2)市售之白河车有二,一为百合科植物重楼或万年青根茎,另一为人胞紫河车以酒泡去血者。

## 89369 鲛鲤科 Manidae

### 8936901

*Manis pentadactyla* L.

动物名 穿山甲《动物图谱·兽》

药材名 穿山甲《图经》、《药典》

文献名 鲛鲤甲《别录》,鱣鲤甲《补缺肘后方》,石鲛《临海异物志》,龙鲤(郭璞《江赋》),鳞鲤《图经》,鲛鲤角《本草衍义》,川山甲《三因方》,石鲛鱼《纲目》,鳖鲤甲《本草经疏》,山甲《本草求真》,甲片《疡科遗编》,石鲛甲、透石乌、鳞鲤甲、龙鲤甲《新纲》,炮甲珠、山甲珠《常用中药名辨》,钱鳞甲、地鳞(广西药用动物),山甲片《简明中医辞典》,钱鲤甲《中国药用动物志》

地方名 广西:麒麟片,鳞片,随碱片;其他:石鲤,石鲛鲤,甲珠,川甲珠,甲壳,原山甲,穿山甲片。

**功效** 鳞甲:通经下乳,消肿排脓,搜风通络。用于经闭癥瘕,乳汁不通,痈肿疮毒,关节痹痛,麻木拘挛;肉:滋阴,清热,解毒。用于久病体虚,瘰癧。

### 8936902

*Manis pentadactyla aurita* Hodgson

动物名 华南穿山甲《贵州药录》

药材名 穿山甲《贵州药录》

**功效** 鳞甲:通经下乳,消肿排脓,搜风通络。

### 8936903

*Manis pentadactyla damanni* Sundevall

动物名 四川穿山甲(拟)

药材名 穿山甲《四川中药志》

地方名 四川:川甲,陵鲤。

**功效** 鳞甲:通经下乳,消肿排脓,搜风通络。

## 89370 鼠兔科 Ochotonidae

### 8937001

*Ochotona alpina* (Pallas)

动物名 高山鼠兔《拉汉兽类名称》

文献名 阿尔泰鼠兔《拉汉兽类名称》

地方名 新疆:草灵脂。

**备考** 粪便:混充五灵脂。

### 8937002

*Ochotona cansus* (Lyon)

动物名 间颅鼠兔《中国药用动物志》

文献名 草灵脂、啼兔、鸣声兔《中国药用动物志》

**备考** 粪便:混充五灵脂。

### 8937003

*Ochotona curzoniae* (Hodgson)

动物名 黑唇鼠兔《中国药用动物志》

文献名 草灵脂、啼兔、鸣声兔《中国药用动物志》

**备考** 粪便:混充五灵脂。

### 8937004

*Ochotona daurica* Pallas

动物名 达乌尔鼠兔《动物图谱·兽》

文献名 蒿兔子、鸣声鼠、啼兔、达乌里啼兔、鸣鼠、耗兔子、蒙古鼠兔《中国药用动物志》

地方名 四川:草灵脂。

**备考** 粪便:混充五灵脂。

### 8937005

*Ochotona erythrotis* Buchner

动物名 红耳鼠兔《动物图谱·兽》

文献名 甘肃灵脂米、[灵脂]、[灵脂米]《中草药》,鸣声鼠、啼兔《中国药用动物志》

地方名 四川:草灵脂。

**备考** 粪便:混充五灵脂。

### 8937006

*Ochotona forresti* (Thomas)

动物名 灰颈鼠兔《中国药用动物志》

文献名 福氏鼠兔《汇编》,草灵脂、啼兔、鸣声兔《中国药用动物志》

地方名 西藏:“啊拉”(藏名)。

**备考** 粪便:混充五灵脂。

### 8937007

*Ochotona golveri* (Thomas)

动物名 川西鼠兔《中国药用动物志》

文献名 草灵脂、啼兔、葛氏鼠兔《中国药用动物志》

**备考** 粪便:混充五灵脂。

### 8937008

*Ochotona hyperborea* (Pallas)

动物名 东北鼠兔《动物图谱·兽》

药材名 东北鼠兔肉《常见药用动物》

文献名 北鼠兔《拉汉兽类名称》,石兔、高山兔、耗兔子、鸣声鼠《常见药用动物》

**功效** 全体:明目,益精,补血。用于肝肾虚弱,两

目昏花, 贫血, 神经衰弱, 阳痿, 遗精。

#### 8937009

*Ochotona koslowi* Buchner

动物名 柯氏鼠兔《拉汉兽类名称》

文献名 草灵脂、科氏鼠兔《汇编》

备考 粪便; 混充五灵脂。

#### 8937010

*Ochotona macrotis* Guenther

动物名 大耳鼠兔《拉汉兽类名称》

文献名 草灵脂《汇编》

备考 粪便; 混充五灵脂。

#### 8937011

*Ochotona pallasi* Gray

动物名 帕氏鼠兔《拉汉兽类名称》

文献名 蒙古鼠兔《汇编》

地方名 内蒙古: 草灵脂。

备考 粪便; 混充五灵脂。

#### 8937012

*Ochotona roylei* Ogilby

动物名 灰鼠兔《拉汉兽类名称》

文献名 草灵脂、啼兔、“阿拉”(藏名)《中国药用动物志》

备考 粪便; 混充五灵脂。

#### 8937013

*Ochotona thibetana* Milne-Edwards

动物名 西藏鼠兔《动物图谱·兽》

文献名 西藏鼠兔粪《汇编》, 草灵脂、藏鼠兔、啼兔、兔鼠子、西藏啼兔《中国药用动物志》

地方名 四川: 岩兔屎, 岩鼠粪。

备考 粪便; 混充五灵脂。

### 89371 兔科 Leporidae

#### 8937101

*Lepus capensis* L.

动物名 草兔《动物图谱·兽》

药材名 望月砂《本经逢原》、《汇编》

文献名 孙河兔《汇编》, 河孙兔《东北动物药》, 草原兔、蒙古兔、野兔、跳猫《动物图谱·兽》, 兔子、山兔、山跳子《中国药用动物志》

功效 粪便; 明目去翳, 解毒杀虫。用于目翳, 痔疮, 疳积。

#### 8937102

*Lepus europaeus aruigineus* Hollister

动物名 江西草兔《神农架药录》

药材名 望月砂《中药名汇》

文献名 山跳子粪、跳猫儿粪、月砂、明砂、明月砂、望月、兔仔粪、舍迦、兔草、山兔粪、野兔子粪、山兔子屎《中药名汇》

功效 粪便; 明目去翳, 解毒。

备考 望月砂指野兔粪而言, 家兔 (*Oryctolagus cuniculus domesticus*) 粪粒圆形色黑, 不供药用。野兔粪, 圆球, 黄褐色, 可与家兔粪相区别。

#### 8937103

*Lepus mandschuricus* Radde

动物名 东北兔《动物图谱·兽》

药材名 望月砂《本经逢原》、《汇编》

文献名 兔肉、兔骨、兔肝、兔脑、兔头骨《别录》, 兔毛皮《唐本草》, 兔血《纲目》, 野兔、草兔、山兔、黑兔、山跳子《动物图谱·兽》, 林兔《拉汉兽类名称》

功效 粪粒; 明目去翳, 解毒杀虫。用于目翳, 痔疮, 疳积; 兔脑: 用于催生, 难产; 兔毛(烧灰): 用于烧伤; 兔骨: 用于头昏眩晕, 疥疮; 肝: 补肝, 明目。用于肝虚眩晕, 目暗昏糊, 目翳, 目痛; 血: 凉血, 活血, 解胎中热毒, 催生易产; 肉: 补中益气, 凉血解毒。用于消渴羸瘦, 胃热呕吐, 便血; 头骨: 用于头痛眩晕, 消渴, 难产, 恶露不下, 小儿疳痢, 痈疽疮毒。

#### 8937104

*Lepus ciostolus* Hodgson

动物名 高原兔《动物图谱·兽》

药材名 望月砂《本经逢原》、《中国药用动物志》

文献名 兔肉、兔骨、兔肝、兔脑、兔头骨《别录》, 兔毛皮《唐本草》, 兔血《纲目》, 灰尾兔、长毛兔《动物图谱·兽》

地方名 四川: 明月砂, 野兔粪, 兔草。

功效 粪粒; 明目去翳, 解毒杀虫。用于目翳, 痔疮, 疳积; 兔脑: 用于催生, 难产; 兔毛(烧灰): 用于烧伤; 兔骨: 用于头昏眩晕, 疥疮; 肝: 补肝, 明目。用于肝虚眩晕, 目暗昏糊, 目翳, 目痛; 血: 凉血, 活血, 解胎中热毒, 催生易产; 肉: 补中益气, 凉血解毒。用于消渴羸瘦, 胃热呕吐, 便血; 头骨: 用于头痛眩晕, 消渴, 难产, 恶露不下, 小儿疳痢, 痈疽疮毒。

#### 8937105

*Lepus sinensis* Gray

动物名 华南兔《动物图谱·兽》

药材名 望月砂《本经逢原》、《中国药用动物志》

文献名 兔肉、兔骨、兔肝、兔脑、兔头骨《别录》, 兔毛皮《唐本草》, 兔血《纲目》, 短耳兔、粗毛兔《动物图谱·兽》, 山兔、草兔、硬毛兔《中国药用动物志》

地方名 四川: 明月砂, 野兔粪, 兔草(干粪), 野兔。

功效 粪便; 明目去翳, 解毒杀虫。用于目翳, 痔疮, 疳积; 兔脑: 用于催生难产; 兔毛(烧灰): 用于烧伤; 兔骨: 用于头昏眩晕, 疥疮; 肝: 补肝, 明目。用于肝虚眩晕, 目暗昏糊, 目翳, 目痛; 血: 凉血, 活血, 解胎中热毒, 催生易产; 肉: 补中益气, 凉血解毒。用于消渴羸瘦, 胃热呕吐, 便血; 头骨: 用于头痛眩晕, 消渴, 难产, 恶露不下, 小儿疳痢, 痈疽疮毒。

#### 8937106

*Lepus timidus* L.

动物名 雪兔《动物图谱·兽》

药材名 望月砂《中国药用动物志》

文献名 白兔《动物图谱·兽》

功效 粪便; 明目去翳, 解毒杀虫。用于目翳, 痔疮, 疳积; 兔脑: 用于催生难产; 兔毛(烧灰): 用于烧伤; 兔骨: 用于头昏眩晕, 疥疮; 肝: 补肝, 明目。用于肝虚

眩暈,目暗昏糊,目翳,目痛;血:凉血,活血,解胎中热毒,催生易产;肉:补中益气,凉血解毒。用于消渴羸瘦,胃热呕吐,便血;头骨:用于头痛眩暈,消渴,难产,恶露不下,小儿疳痢,痢疽疮毒。

## 8937107

*Lepus tolai* Pallas

动物名 蒙古兔《动物图谱·兽》

药材名 望月砂《本经逢原》,兔肉、兔肝、兔脑、兔骨、兔头骨《别录》,兔血《纲目》、《中药大辞典》

文献名 兔草《雷公炮炙论》,兔屎《补缺肘后方》,兔皮毛《唐本草》,玩月砂《姚僧坦集验方》,明月砂《圣惠方》,兔粪《苏沈良方》,跳猫《动物图谱·兽》,野兔粪《汇编》,草原兔《中药大辞典》

地方名 内蒙古:“托列”(蒙名),野兔,草兔。

功效 粪便:明目去翳,解毒杀虫。用于目翳,痔瘡,疳积;兔脑:用于催生难产;兔毛(烧灰):用于烧伤;兔骨:用于头昏眩暈,疥疮;肝:补肝,明目。用于肝虚眩暈,目暗昏糊,目翳,目痛;血:凉血,活血,解胎中热毒,催生易产;肉:补中益气,凉血解毒。用于消渴羸瘦,胃热呕吐,便血;头骨:用于头痛眩暈,消渴,难产,恶露不下,小儿疳痢,痢疽疮毒。

## 8937108

*Oryctolagus cuniculus domesticus* (Gmelin)

动物名 家兔《汇编》

药材名 兔骨、兔肝、兔脑、兔肉、兔头骨《别录》,兔皮毛《唐本草》,兔血《纲目》、《中药大辞典》

文献名 家兔骨《汇编》

地方名 兔子、兔、毛兔(山东、广西);广西:白兔。

功效 骨骼:用于头昏眩暈,疥疮;兔脑:用于催生难产;肉:补中益气,健脾,凉血,解热毒,利大肠;皮毛:用于烧伤;肝:补肝,明目;血:凉血,活血,解胎中热毒,催生易产;头骨:头痛眩暈,消渴,难产,恶露不下,小儿疳痢,痢疽疮毒。

## 89372 鼯鼠科 Petauristidae

## 8937201

*Aeretes malanopterus* Milne-Edwards

动物名 沟牙鼯鼠《拉汉兽类名称》

药材名 五灵脂《中国药用动物志》

功效 粪便:活血,化瘀,止痛。

## 8937202

*Belomys pearsoni* Gray

动物名 毛耳飞鼠《拉汉兽类名称》

药材名 五灵脂《中国药用动物志》

文献名 毛足飞鼠、丛耳飞鼠《中国药用动物志》

功效 粪便:活血,化瘀,止痛。用于心腹血气诸痛,妇女经闭,产后瘀血作痛,妇女血崩,经水过多,赤带。

## 8937203

*Hylopetes alboniger* (Hodgson)

动物名 黑白飞鼠《动物图谱·兽》

药材名 五灵脂《中国药用动物志》

文献名 黑白鼯鼠、小飞鼠《中国药用动物志》

功效 粪便:活血,化瘀,止痛。用于心腹血气诸痛,妇女经闭,产后瘀血作痛,妇女血崩,经水过多,赤带。

## 8937204

*Petaurista alborufus* (Milne-Edwards)

动物名 红白鼯鼠《中国药用动物志》

药材名 五灵脂《中国药用动物志》

文献名 白头鼯鼠、白额鼯鼠、飞虎、松猫儿《中国药用动物志》,湖北灵脂米《中草药》

功效 粪便:行血,止痛,止血。用于心腹血气诸痛,妇女经闭,产后瘀血作痛,妇女血崩,经水过多,赤带。

## 8937205

*Petaurista alborufus castaneus* Thomas

动物名 湖北红白鼯鼠《神农架药录》

地方名 湖北:催生子(神农架)。

功效 粪便:散瘀,止痛,调经。

## 8937206

*Petaurista elegans* Muller

动物名 小鼯鼠《拉汉兽类名称》

药材名 五灵脂《中国药用动物志》

文献名 灰头小鼯鼠、棕足鼯鼠、克氏鼯鼠《中国药用动物志》

功效 粪便:行血,止痛,止血。用于心腹血气诸痛,妇女经闭,产后瘀血作痛,妇女血崩,经水过多,赤带。

## 8937207

*Petaurista elegans clareii* Thomas

动物名 云南棕足鼯鼠《神农架药录》

药材名 催生子血《神农架药录》

功效 粪便结块:活血调经,散瘀止痛。

## 8937208

*Petaurista petaurista* (Pallas)

动物名 鼯鼠《动物图谱·兽》

药材名 五灵脂《中国药用动物志》

文献名 耳鼠《山海经》,鼯鼠、夷由《尔雅》,鸛鸭、飞鼯《广雅》,飞鼠《上林赋》张揖注,飞生《尔雅》郭璞注,鼯鼠《本经》,飞生虫《本草经集注》,飞生鸟《图经》,飞虎、松猫儿《中国经济动物志》,棕鼯鼠《中药大辞典》,橙鼠《中国动物药》,大鼯鼠《拉汉兽类名称》,灵脂块、糖灵脂、灵脂米、散灵脂《中国药用动物志》

功效 粪便:行血,止痛,止血。用于心腹血气诸痛,妇女经闭,产后瘀血作痛,妇女血崩,经水过多,赤带;骨(泡酒):用于腰膝酸痛,关节痛,产后腹痛,头痛等。

## 8937209

*Petaurista xanthotis* (Milne-Edwards)

动物名 灰鼯鼠《中国药用动物志》

药材名 五灵脂《中国药用动物志》

文献名 高地鼯鼠、黄耳斑鼯鼠、催生子《中国药用动物志》,橙足鼯鼠、窄搭拉虫《动物图谱·兽》

**功效** 肉：用于妇女病，催产，避孕；粪便：行血，止痛，止血。药效逊于复齿鼯鼠粪便。

#### 8937210

*Petaurista yunnanensis* (Anderson)

**动物名** 栗褐大鼯鼠《中国药用动物志》

**药材名** 五灵脂《中国药用动物志》

**文献名** 云南鼯鼠、大鼯鼠、飞虎《中国药用动物志》

**功效** 粪便：行血，止痛，止血。用于心腹血气诸痛，妇女经闭，产后瘀血作痛，妇女血崩，经水过多，赤带。

#### 8937211

*Pteromys volans* L.

**动物名** 小飞鼠《中国药用动物志》

**药材名** 五灵脂《开宝本草》、《中药大辞典》

**文献名** 飞鼠《动物图谱·兽》，灵脂、糖灵脂、灵脂米、灵脂块《汇编》，吉林灵脂米《中草药》

**功效** 粪便：活血调经，散瘀止痛。

**备考** 小飞鼠食性与复齿鼯鼠不同，粪粒成分也不一致，部分地区作五灵脂用，其确切疗效应作进一步研究。

#### 8937212

*Trogopterus xanthipes* Milne-Edwards

**动物名** 复齿鼯鼠《拉汉兽类名称》

**药材名** 五灵脂《开宝本草》、《药典》

**文献名** 鼯鼠《诗经》，鸛鸣《说文》，侃旦《广志》，渴旦《唐诗》，药本《侯宁极《药谱》》，寒号虫、寒号虫粪《开宝本草》，鸛鸣、独春《纲目》，鸛鸣尿、独春米《新纲》，寒号鸟《动物图谱·兽》，橙足鼯鼠、寒雀粪《中药志》，寒搭拉虫、灵脂块、糖灵脂、灵脂米、散灵脂《中药大辞典》，河北糖灵脂、河北灵脂米《中草药》，曷旦、城旦、会散灵、散灵芝、糖五灵、灵脂糖、九转子、寒灵脂、嫩老婆尿《中药名汇》

**功效** 粪便：活血，化瘀，止痛。用于胸胁、腕腹刺痛，痛经，经闭，产后瘀血疼痛，跌扑肿痛，蛇虫咬伤。

**备考** 《中国药用动物志》(1979)注称：过去本种中文名称曾称“橙足鼯鼠”。现据其牙齿脊具有复杂折皱的特征，改名为复齿鼯鼠。

#### 8937213

*Trogopterus xanthipes mordax* Thomas

**动物名** 湖北复齿鼯鼠《神农架药录》

**地方名** 湖北：催生子(神农架)。

**功效** 粪便：活血调经，散瘀止痛。

### 89373 松鼠科 Sciuridae

#### 8937301

*Callosciurus erythraeus* (Pallas)

**动物名** 赤腹松鼠《动物图谱·兽》

**药材名** 红腹松鼠《中国药用动物志》

**文献名** 松鼠《中国药用动物志》

**功效** 全体：理气调经。用于肺结核，月经不调。

#### 8937302

*Citellus dauricus* Brandt

**动物名** 黄鼠《饮膳正要》、《中药大辞典》

**药材名** 黄鼠肉《饮膳正要》、《中药大辞典》

**文献名** 鼯鼠《说文》，礼鼠、拱鼠《韩昌黎集》，猥狸《纲目》，达乌尔黄鼠《拉汉兽类名称》，达呼尔黄鼠、大眼贼、禾鼠、草原黄鼠、蒙古黄鼠《动物图谱·兽》，豆鼠《哈尔滨中医》，地松鼠《中药大辞典》

**功效** 肉：润肺生津，解毒止痛。外用于疮肿。

#### 8937303

*Dremomys pernyi* senex G. Allen

**动物名** 湖北珀氏长吻松鼠《神农架药录》

**药材名** 毛老鼠《神农架药录》

**功效** 肉：健脾开胃，消食。

#### 8937304

*Eutamias sibiricus* Laxmann - *Tamias sibiricus* (Laxmann)

**动物名** 花鼠《动物图谱·兽》

**药材名** 花鼠脑《中国动物药》，花鼠肉《中国药用动物志》

**文献名** 花黎棒《动物图谱·兽》，五道眉、花丽棒子《常见药用动物》，金花鼠、豹鼠、串树林、滑溜棒、花疙铃《中国药用动物志》

**功效** 脑：降血压。用于高血压病；肉：理气，调经。用于肺癆，肋膜炎，月经不调，痔疮等。

#### 8937305

*Marmota baibacina* (Brandt)

**动物名** 灰旱獭《拉汉兽类名称》

**药材名** 雪猪油《中国药用动物志》

**文献名** 阿尔泰旱獭《中国药用动物志》

**功效** 体内脂肪：除风湿，解疮毒。用于风湿肿痛，皮肤溃疡，疔疮，湿热疮毒。

#### 8937306

*Marmota bobac* (Muller)

**动物名** 旱獭《动物图谱·兽》

**药材名** 土拨鼠《本草拾遗》

**文献名** 答刺不花《饮膳正要》，鼯鼠《纲目》，草原旱獭、蒙古旱獭《拉汉兽类名称》，西伯利亚旱獭、塔尔巴干、灰旱獭、天山旱獭《动物图谱·兽》，雪猪油《中国药用动物志》

**地方名** 内蒙古：“塔日布嘎”(蒙名)，哈拉。

**功效** 体内脂肪：除风湿，解疮毒。用于风湿肿痛，皮肤溃疡，疔疮，湿热疮毒；肉：用于湿热身痒，风湿痹痛，脚膝肿痛。

#### 8937307

*Marmota caudata* Jacquemont

**动物名** 长尾旱獭《动物图谱·兽》

**药材名** 雪猪油《中国药用动物志》

**文献名** 长尾土拨鼠、长尾红旱獭《动物图谱·兽》，旱獭《中国药用动物志》

**功效** 体内脂肪：除风湿，解疮毒。用于风湿肿痛，皮肤溃疡，疔疮，湿热疮毒。

#### 8937308

*Marmota himalayana* Hodgson



动物名 喜马拉雅旱獭《动物图谱·兽》

药材名 上拔鼠《本草拾遗》、《汇编》

文献名 答刺不花《饮膳正要》, 鼯鼠《纲目》, 雪猪油、雪猪肉、雪猪骨《四川中药志》, 大旱獭《汇编》, 雪猪、雪里猪、“哈拉”(藏名)、四川旱獭《中药大辞典》, 塔尔巴干《中国药用动物志》

功效 体内脂肪: 除风湿, 解疮毒。用于风湿肿痛, 皮肤溃疡, 疔疮, 湿热疮毒; 肉: 用于湿热身痒, 风湿痹痛, 脚膝肿痛; 骨: 除风湿。用于筋骨疼痛, 四肢麻木。

#### 8937309

*Sciurotamias davidianus* Milne-Edwards

动物名 岩松鼠《动物图谱·兽》

药材名 岩松鼠骨《中国动物药》

文献名 扫毛子、石老鼠《动物图谱·兽》, 臊挠子、臊挠子骨《中国药用动物志》

地方名 湖北: 松鼠(神农架)。

功效 骨骼: 活血祛瘀, 止痛。用于跌打损伤, 瘀血作痛, 骨折。

#### 8937310

*Sciurotamias davidianus saltitans* Heude

动物名 湖北岩松鼠《神农架药录》

药材名 岩松鼠骨《神农架药录》

地方名 湖北: 松鼠(神农架)。

功效 骨骼: 活血祛瘀, 镇痛。

#### 8937311

*Sciurotamias forresti* (Thomas)

动物名 侧纹岩松鼠《拉汉兽类名称》

药材名 岩松鼠骨(拟)

文献名 白喉岩松鼠、弗氏岩松鼠《中国药用动物志》

功效 骨: 活血祛瘀。用于跌打损伤, 腰腿痹痛。

#### 8937312

*Sciurus vulgaris* L.

动物名 松鼠《中国药用动物志》

药材名 松鼠《医林纂要》、《汇编》

文献名 灰鼠、松狗子《动物图谱·兽》

功效 全体: 理气调经, 消积止痛。用于肺结核, 肋膜炎, 月经不调, 痔疮。

#### 8937313

*Tamias swinhoi* Milne-Edwards

动物名 隐纹花鼠《动物图谱·兽》

药材名 花松鼠肉(拟)

文献名 豹鼠、纵纹花鼠、金花鼠、花松鼠《动物图谱·兽》

功效 肉: 健脾消食, 开胃。

#### 8937314

*Tamias swinhoi maritimus* (Bonhote)

动物名 福建隐纹花鼠(拟)

药材名 花松鼠肉(拟)

文献名 福建隐纹松鼠《神农架药录》

地方名 湖北: 毛老鼠(神农架)。

功效 肉: 健脾消食, 开胃。

### 89374 河狸科 Castoridae

#### 8937401

*Castor fiber* L.

动物名 河狸《动物图谱·兽》

药材名 河狸香《新疆啮齿动物志》

文献名 海狸《中国药用动物名录》

功效 香囊分泌物: 用于瘫痪, 四肢麻木, 痉挛, 失眠。

### 89375 豪猪科 Hystricidae

#### 8937501

*Hystrix hodgsoni* (Gray)

动物名 豪猪《拉汉兽类名称》

药材名 豪猪肉《图经》, 豪猪肚《食疗本草》, 豪猪毛刺《中药大辞典》

文献名 豪豨《山海经》, 狙猪、弯猪(《山海经》郭璞注), 嵩猪《唐本草》, 山猪《通志》, 壁水獭、獾獭《纲目》, 箭猪《随息居饮食谱》, 刺猪、狼猪《动物图谱·兽》, 响铃猪《中药大辞典》, 豪猪棘刺《中国动物药》, 中国豪猪、狼猪《中国药用动物志》

地方名 贵州: 毫猪刺。

功效 毛刺: 行气, 止心气痛。用于单双乳蛾, 皮肤过敏; 胃: 清热利湿。用于黄疸, 水肿, 脾气, 奔豚; 肉: 有毒。润肠。用于大便不畅。

#### 8937502

*Hystrix hodgsoni subcristata* Swinhoe

动物名 华南豪猪《贵州药录》

药材名 豪猪刺《贵州药录》

文献名 毫猪肉、毫猪肚《神农架药录》

地方名 湖北: 毫猪子、毫猪毛刺(神农架)。

功效 棘刺: 行气, 止痛。用于胃痛, 皮肤过敏; 肉: 利大肠; 胃: 清热利湿。

### 89376 竹鼠科 Rhizomyidae

#### 8937601

*Rhizomys pruinosus* Blyth

动物名 银星竹鼠《动物图谱·兽》

药材名 竹鼠油《中国药用动物志》

文献名 竹鼯、竹狨《纲目》, 白花竹鼠《拉汉兽类名称》, 花白竹鼠、草鼯、粗毛竹鼠、拉氏竹鼠《中国药用动物志》

功效 脂肪油: 解毒排脓, 生肌止痛。用于烫火伤, 无名肿毒。

#### 8937602

*Rhizomys sinensis* Geay

动物名 中华竹鼠《动物图谱·兽》

药材名 竹鼠油《汇编》

文献名 鼯、竹鼠《说文》, 竹鼯、竹狨、竹鼯肉《纲目》, 篙鼠《本草求原》, 普通竹鼠《拉汉兽类名称》

地方名 陕西:竹鼯子油,竹鼯子牙;湖北:竹鼯子;  
广西:灰竹鼠;其他:竹鼯油。

功效 脂肪:解表排脓,生肌止痛。外用于烫火  
伤,无名肿毒;肉:益气养阴,解毒;牙:清热解  
毒。用于小儿破伤风。

#### 8937603

*Rhizomys sinensis vestitus* Milne-Edwards

动物名 四川中华竹鼠《神农架药录》

地方名 湖北:竹鼯子(神农架)。

功效 肉:补益强壮;牙:清热解  
毒。

#### 8937604

*Rhizomys sumatrensis* (Raffles)

动物名 大竹鼠《动物图谱·兽》

药材名 竹鼠油《中国药用动物志》

文献名 红颊竹鼠、红大竹鼠《中国药用动物志》

功效 脂肪:解毒排脓,生肌止痛。用于烧烫伤,  
无名肿毒。

#### 8937605

*Rhizomys wardi* Thomas

动物名 暗褐竹鼠《中国药用动物志》

药材名 竹鼠油《中国药用动物志》

文献名 竹鼯《中国药用动物志》

功效 脂肪:解毒排脓,生肌止痛。用于烧烫伤,  
无名肿毒。

### 89377 鼠科 Muridae

#### 8937701

*Mus musculus* L.

动物名 小家鼠《动物图谱·兽》

药材名 鼯鼠《本草拾遗》

文献名 甘口鼠《纲目》,小鼠、小耗子、米鼠仔《动物  
图谱·兽》

功效 全体或肉:用于虚劳羸瘦,臌胀,小儿疳  
积,烫伤,折伤,冻疮,疮肿;睾丸:用于小儿惊  
风,狐疝。

#### 8937702

*Rattus flavipectus* Milne-Edwards

动物名 黄胸鼠《动物图谱·兽》

药材名 鼠《别录》、《中药大辞典》

文献名 鼠肝、鼠胆《本草经集注》,鼠脂《图  
经》,鼠皮《纲目》,鼠肾《医林纂要》,黄腹鼠、长  
尾鼠《动物图谱·兽》,长尾吊《中国药用动物志》

地方名 江苏:老鼠,肉老鼠(未长毛的幼鼠);湖北:  
老鼠子(神农架);四川:耗子。

功效 未长毛的幼鼠:解毒,止血。用于烫、火  
伤,外伤出血;鼠肉:用于虚劳羸瘦,臌胀,小儿疳  
积,烫伤,折伤,冻疮,疮肿;鼠皮(烧灰):外用于封  
痈疽口冷不合者;生剥鼠皮:外用于贴附骨疽疮,  
即追脓出;鼠肝:用于难产;睾丸(鼠肾):用于小  
儿惊风,狐疝;鼠胆:用于青盲,雀目,聾耳;  
脂肪油(鼠脂):用于烫火伤。

#### 8937703

*Rattus norvegicus* Berkenhott

动物名 褐家鼠《动物图谱·兽》

药材名 鼠《别录》、《中药大辞典》

文献名 首鼠《史记》,牡鼠类《别录》,老鼠《斗  
门方》,鼠矢、两头尖、鼠肝、鼠胆《本草经集注》,  
雄鼠类《日华子本草》,鼯鼠《埤雅》,鼠印《崎  
岖神方》,鼠脂《图经》,鼠皮《纲目》,猯鼠类  
《类证活人书》,鼠肾《医林纂要》,白尾吊、沟  
鼠《动物图谱·兽》,大家鼠、挪威鼠《中国  
药用动物志》

地方名 耗子(内蒙古、四川);江苏:肉老鼠  
(未长毛的幼鼠);内蒙古:“格仁-霍鲁格纳”  
(蒙名);湖北:老鼠子(神农架)

功效 未长毛的幼鼠:解毒,止血。用于烫火  
伤,外伤出血;鼠肉:用于虚劳羸瘦,臌胀,小  
儿疳积,烫伤,折伤,冻疮,疮肿;鼠皮(烧灰):  
外用于封痈疽口冷不合者;生剥鼠皮:外用于  
贴附骨疽疮,即追脓出;鼠肝:用于难产;辜  
丸(鼠肾):用于小儿惊风,狐疝;鼠胆:用于  
青盲,雀目,聾耳;脂肪油(鼠脂):用于烫火  
伤。

#### 8937704

*Rattus rattoides exipuus* Howell

动物名 拟家鼠《神农架药录》

地方名 湖北:老鼠(神农架)。

功效 尾肌腱:接骨续筋。

#### 8937705

*Rattus rattus* L.

动物名 屋顶鼠《动物图谱·兽》

药材名 鼠《别录》、《中药大辞典》

文献名 鼠肝、鼠胆《本草经集注》,鼠脂《图  
经》,鼠皮《纲目》,鼠肾《医林纂要》,家鼠、  
黑鼠《动物图谱·兽》,黑家鼠《中药大辞典》

地方名 浙江:老鼠,黑老鼠。

功效 未长毛的幼鼠:解毒,止血。用于烫、火  
伤,外伤出血;鼠(全体或肉):用于虚劳羸瘦,  
臌胀,小儿疳积,烫伤,折伤,冻疮,疮肿;鼠皮  
(烧灰):外用于封痈疽口冷不合者;生剥鼠皮:  
外用于贴附骨疽疮,即追脓出;鼠肝:用于难  
产;辜丸(鼠肾):用于小儿惊风,狐疝;鼠胆:  
用于青盲,雀目,聾耳;脂肪油(鼠脂):用于  
烫、火伤。

### 89378 硬毛鼠科 Capromyidae

#### 8937801

*Myocastor coypus* Molina

动物名 海狸鼠《动物图谱·兽》

药材名 海狸香《汇编》

文献名 沼狸、狸獭《动物图谱·兽》,河狸鼠  
(拉汉兽类名称)

功效 下腹部分泌囊之分泌物:镇痉。用于神  
经病,能减轻疼痛及痉挛性症状。

### 89379 仓鼠科 Cricetidae

#### 8937901

*Myospalax aspalax* Pallas

动物名 草原鼯鼠《动物图谱·兽》

药材名 麝鼠(拟)

文献名 地羊、瞎老鼠、达乌尔麝鼠《中国药用动物志》

功效 全体(去内脏):清热解毒,活血祛瘀。用于红斑狼疮,慢性肝炎,胃溃疡。

#### 8937901a

*Myospalax baileyi* Thomas

动物名 高原麝鼠《新药品种资料汇编》

药材名 塞隆骨《新药品种资料汇编》

功效 骨:祛风散寒,除湿,通络止痛,补益肝肾。

#### 8937902

*Myospalax fontanieri* Milne-Edwards

动物名 中华麝鼠《动物图谱·兽》

药材名 麝鼠《中国药用动物志》

文献名 原麝鼠《内蒙古药用动物》,瞎老鼠、瞎伶、瞎瞎、仔隆《中国药用动物志》

地方名 内蒙古:“扫浩日·脑门”(蒙名),瞎老,地羊,盲鼠。

功效 全体(去内脏):清热解毒,活血去瘀。用于红斑狼疮,慢性肝炎,胃溃疡。

#### 8937903

*Myospalax psilurus* Milne-Edwards

动物名 东北麝鼠《动物图谱》

药材名 麝鼠《中国动物药》

文献名 地羊、瞎老鼠、盲鼠、瞎摸鼠子《汇编》,华北麝鼠、地排子、瞎摸老鼠《中国药用动物志》

功效 全体(去内脏):清热解毒,活血祛瘀。用于红斑狼疮,慢性肝炎,胃溃疡。

#### 8937904

*Myospalax rothschildi* Thoms

动物名 罗氏麝鼠《神农架药录》

药材名 地老鼠《神农架药录》

功效 肉:镇静镇痛,消肿解毒。

#### 8937905

*Ondatra zibethica* L.

动物名 麝鼠《拉汉兽类名称》

药材名 麝鼠香(拟)

文献名 水耗子《动物图谱·兽》

功效 《中草药》(1985)称:香囊中含麝香酮,有可能成为开辟天然麝香新来源。

### 89380 露脊鲸科 Balaenidae

#### 8938001

*Eubalaena glacialis* (Borowski)

动物名 黑露脊鲸《拉汉兽类名称》

药材名 鱼肝油《中药材科技》

文献名 黑真鲸《中药材科技》

功效 肝:制取鱼肝油;胰:制取胰岛素;其他内脏:提取多种激素。

### 89381 灰鲸科 Eschrichtiidae

#### 8938101

*Eschrichtius gibbosus* (Erxleben)

动物名 灰鲸《拉汉兽类名称》

药材名 鱼肝油《中药材科技》

文献名 克鲸《中药材科技》

功效 肝:提制鱼肝油;胰:提制胰岛素;其他内脏器官:提取多种激素。本品与真海豚等同入药。

### 89382 鲸科 Balaenopteridae

#### 8938201

*Balaenoptera acutorostrata* Lacepede

动物名 小鲸鲸《动物图谱·兽》

药材名 鲸骨《中草药通讯》

文献名 小须鲸《拉汉海洋生物名称》,缟鲸鲸《拉汉兽类名称》,明克鲸、尖头鲸《山东药用动物》

功效 骨骼:用于风湿性、类风湿性关节炎,改善免疫功能。

#### 8938202

*Balaenoptera borealis* Lesson

动物名 大须鲸《拉汉海洋生物名称》

药材名 鱼肝油《中药材科技》

文献名 鲸鲸《拉汉兽类名称》

功效 肝:可提制鱼肝油;胰:可提制胰岛素;其他内脏器官:可提制多种激素。

#### 8938203

*Balaenoptera musculus* (L.)

动物名 蓝须鲸《拉汉海洋生物名称》

药材名 鱼肝油《中药材科技》

文献名 蓝鲸《海洋药物》,蓝鲸鲸《拉汉兽类名称》,刺刀鲸《中药材科技》

功效 肝:可提制鱼肝油;胰:可提制胰岛素;其他内脏器官:可提取多种激素。

#### 8938204

*Balaenoptera physalus* L.

动物名 长须鲸《动物图谱·兽》

药材名 鱼肝油《中药材科技》

文献名 鲸鲸《中药材科技》

功效 肝:可提制鱼肝油;胰:可提制胰岛素;其他内脏器官:可提取多种激素。

#### 8938205

*Megaptera novaeangliae* Borowski

动物名 座头鲸《动物图谱·兽》

药材名 鱼肝油《中药材科技》

文献名 驼背鲸《中药材科技》

功效 肝:可提制鱼肝油;胰:可提制胰岛素;其他内脏器官:可提取多种激素。

### 89383 淡水豚科 Platanistidae

#### 8938301

*Lipotes vexillifer* Müller

动物名 白暨豚《拉汉海洋生物名称》

药材名 白暨脂《中国药用动物志》

文献名 白鳍豚、白旗、白鳍《动物图谱·兽》,白江猪

《中国药用动物志》

功效 脂肪:镇咳,清热解毒。用于咳嗽、烧、烫伤等。

### 89384 抹香鲸科 Physeteridae

8938401

*Physeter catodon* L.

动物名 抹香鲸《动物图谱·兽》

药材名 龙涎香《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 龙涎《酉阳杂俎》,龙涎《纲目》,龙涎、龙腹香、鲸涎香、鲸脂、鲸脑油、抹香鲸脑油《汇编》,真甲鲸、巨头鲸《中药大辞典》,鲸鱼《中药材科技》

功效 肠内分泌物的干燥品:开窍化痰,活血利气。用于神昏气闷,心腹诸痛,消散癥结,咳喘气逆;鲸蜡(骨腔中油质之固形成份精制物):以减少刺激为目的,催促咳嗽、下痢;鲸骨:祛风除湿,用于风湿性关节炎,类风湿性关节炎;鲸肝:养阴明目。用于贫血,恶性贫血。

备考 龙涎香是抹香鲸肠内分泌的灰褐色物质,干燥后,成琥珀色的软蜡状;间或可拾取浮漂在海上的龙涎香。据研究结果,认为龙涎香和胆襄结石或肠结石是同一类的性质。是它吃了乌贼以后,肠里面受到一种刺激,肝脏内的胆汁引起病变而产生龙涎香。

### 89385 海豚科 Delphinidae

8938501

*Delphinus delphis* L.

动物名 真海豚《拉汉海洋生物名称》

药材名 海狗鱼《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 海狗《临海异物志》,海豚《纲目》,海猪《海洋药物民间应用》

功效 肉或皮下脂肪:截疟,解毒。用于瘰疬,恶疮,疥癣,痔瘕。

8938502

*Tursiops truncatus* (Montagu)

动物名 宽吻海豚《拉汉兽类名称》

药材名 大海豚《中药材科技》

功效 肝:制鱼肝油;其他脏器:可提制多种激素;肉或皮下脂肪:截疟,解毒。用于瘰疬,恶疮,疥癣,痔瘕。

### 89386 独角鲸科 Monodontidae

8938601

*Monodon monoceros* L.

动物名 独角鲸《拉汉兽类名称》

药材名 一角《新纲》

文献名 一角兽、蛇角、独角、巴阿多《新纲》

功效 牙齿:昔时用作食物中毒等的解毒药。

### 89387 鼠海豚科 Phocaenidae

8938701

*Neomeris phocaenoides* G. Cuvier --- *Neophocaena pho-*

*caenoides* (G. Cuvier)

动物名 江豚《动物图谱·兽》

药材名 江猪《中国海洋药物》

地方名 海豚、海猪(山东、浙江);浙江:海和尚,白吴鱼、江猪子。

功效 皮下脂肪油:解毒,消炎,生肌,镇痛。用于癰疽头,疮疖,水火烫伤;豚肝:养阴,明目。用于贫血,夜盲,青盲。

8938702

*Phocoena phocoena* (L.)

动物名 鼠海豚《拉汉海洋生物名称》

药材名 鱼肝油《中药材科技》

功效 肝:制鱼肝油;其他脏器:可提制多种激素

### 89388 领航鲸科 Globicephalidae

8938801

*Globicephala scammoni* (Cope)

动物名 北太领航鲸《拉汉海洋生物名称》

药材名 圆头豚《中药材科技》

功效 肝:提制鱼肝油;胰:提制胰岛素;其他脏器:提取多种激素。

8938802

*Orcinus orca* (L.)

动物名 虎鲸《动物图谱·兽》

药材名 鱼肝油《中药材科技》

文献名 恶鲸《动物图谱·兽》,逆戟《拉汉兽类名称》

功效 肝:可提制鱼肝油;胰:可提制胰岛素;其他内脏器官:可提取多种激素。

### 89389 犬科 Canidae

8938901

*Canis familiaris* L.

动物名 犬《汇编》

药材名 狗肾《本草拾遗》,狗宝、狗骨《纲目》、《中药大辞典》

文献名 狗《左传》,牡狗阴茎、狗精、狗胆《本经》,狗心、狗肉、狗血、狗齿、狗头骨、狗骨灰、狗脑、狗四脚蹄《别录》,黄耳(崔豹《古今注》),狗四足、狗阴《本草经集注》,狗乳汁、狗肝《本草拾遗》,家犬《医林纂要》,狗脑髓《医学入门》,狗蹄《滇南本草》,地羊《纲目》,黄狗肾《饮片新参》,狗结石《药材学》,狗鞭《中药志》

地方名 内蒙古:“淖海”(蒙名);湖北:狗子(神农架);广西:白龙,乌龙。

功效 骨骼:祛风镇痛。用于风湿关节疼痛,四肢麻木;雄狗的阴茎和睾丸(狗肾):补肾,壮阳,益精。用于阳痿,遗精,肾阳衰弱,腰膝痿弱;胃中结石(狗宝):降气,开郁,消积,解毒。用于胸胁胀满,噎膈反胃,痈疽疮疡;狗肉:补中益气,温肾助阳。用于脾肾气虚,胸腹胀满,臃胀,浮肿,腰膝软弱,寒疝,败疮久不收敛。

8938902

*Canis lupus* L.

动物名 狼《本草拾遗》、《动物图谱·兽》

药材名 狼油《汇编》

文献名 狼喉结《圣惠方》，狼肉《饮膳正要》，狼膏、狼喉脂、毛狗《纲目》，狼脂《本经逢原》，中国狼《神农架药录》

地方名 内蒙古：“朝闹”（蒙名）；湖北：驴头狼（神农架）。

功效 脂肪（狼油）：补益，厚肠。用于肺结核，久嗽。外用于秃疮，皮肤皲裂；狼骨：用于眩晕，神经痛；狼肉：补五脏，厚肠胃；狼舌：清热，消肿。用于舌疹，舌肿，喉结，化脓性扁桃腺炎；狼胃：温胃消积；狼食道：除痰散结；狼毛（制炭）：用于脑膜炎；狼粪：用于抽筋。外用于瘰癧。

#### 8938903

*Cuon alpinus* Pallas

动物名 豺《唐本草》、《动物图谱·兽》

药材名 豺皮《唐本草》，豺肉《食疗本草》、《中药大辞典》

文献名 豺狗《纲目》，红狼、棒子狗《动物图谱·兽》，豺胃、赤狗《中国药用动物志》

地方名 陕西：红狼肉，豺狗子肉。

功效 皮：有毒。用于冷脾脚气；肉：有毒。补虚劳，攻坚积，长气力，消骨鲠。用于寒气引起的肌肉肿胀；豺胃：消食化积。用于积食。

#### 8938904

*Cuon alpinus lepturus* Heude

动物名 江西豺《神农架药录》

药材名 豺皮、豺肉《神农架药录》

地方名 湖北：豺狗子（神农架）。

功效 皮：外用于冷痹脚气；豺肉：补虚劳，攻坚积，长气力，消骨鲠。

#### 8938905

*Nyctereutes procyonoides* Gray --- *Canis procyonoides* Gray

动物名 貉《中国动物志》

药材名 貉肉《图经》、《中国药用动物志》

文献名 狹狻《尔雅》郭璞注，金毛獾《医林纂要》，狸《动物图谱·兽》

地方名 内蒙古：“额勒波格”（蒙名）；其他：貉子，土狗，椿尾巴，毛狗。

功效 肉：滋补强壮。用于虚癆。

#### 8938906

*Vulpes vulpes* L.

动物名 狐《诗经》、《动物图谱·兽》

药材名 狐《别录》

文献名 狐阴茎、狐肠、雄狐尿《别录》，狐肉《唐本草》，狐头《日华子本草》，狐四足《生草药性备要》，狐肝、狐胆《图经》，龙狗《中药大辞典》，狐狸、狐狸心、狐狸肺《中国药用动物志》，赤狐《中国动物志·兽》

地方名 红狐、草狐（山东、广西）；吉林：狐心；内蒙古：“乌呢格”（蒙名），草狐狸，赤狐狸；广西：毛狗。

功效 肉：补虚暖中，解疮毒。用于虚劳，健忘，惊

病，疥疮；胆：用于癫痫，心气痛，疟疾；肝：用于破伤风，中风瘫痪，心气痛；心：补益，镇静，利尿。用于癫狂，心悸，失眠，头晕，水肿；肺：补肺，化痰，定喘。用于慢性气管炎，肺气肿；阴茎：用于女子绝产，阴痒；肠：有毒，止痛。用于心胃气痛；狐头：用于瘰癧，头晕。

#### 8938907

*Vulpes vulpes* hoole Swinhoe

动物名 南狐《中国药用动物志》

文献名 狐、红狐、赤狐、草狐、蒲狗、毛狗、山狗、白毛狗、白尾狗《中国药用动物志》，华南狐《贵州药录》

地方名 贵州：狐狸。

功效 肺：理气解毒。用于肺结核，肺脓肿；胆：镇惊。用于癫痫，疟疾；肝：用于破伤风，中风瘫痪，心气痛；心：补益，镇痉。

### 89390 熊科 Ursidae

#### 8939001

*Helarctos malayanus* Raffles

动物名 马来熊《拉汉兽类名称》

药材名 熊胆、熊脂、熊骨《中国药用动物志》

文献名 狗熊、太阳熊《中国动物志》

功效 胆：清热，镇痉，明目，杀虫。用于阳黄，暑泻，小儿惊痫，疟疾，目翳，喉痹，疔瘡恶疮；脂肪：补虚强筋，润肌杀虫。用于风痹不仁，筋脉挛急，虚损羸瘦，头癣，白秃，臃疮；骨：祛风除湿。用于风湿痹痛，大骨节病。

#### 8939002

*Selenarctos thibetanus* G. Cuvier

动物名 黑熊《中国动物志》

药材名 熊胆《药性论》、《汇编》

文献名 熊《诗经》，熊蹯《左传》，熊脂《本经》，熊白、熊肉《本草经集注》，熊脑《唐本草》，熊骨《食疗本草》，猪熊《尔雅翼》，熊掌《日华子本草》，熊筋《本经逢原》，熊脂《汇编》，狗驼子《中药志》，月牙熊《中国药用动物志》，胆仁、铜胆、金胆、铁胆、墨胆、菜花胆《药典》

地方名 狗熊（内蒙古、山东、广东），黑瞎子（内蒙古、山东），登仓（东北）；内蒙古：“巴勒盖”（蒙名）。

功效 胆囊内的干燥胆汁：清热解毒，明目，止痉。用于小儿热盛惊风，癫痫，抽搐，黄疸。外用于痈肿，痔瘡，目赤云翳；熊掌：除风湿。用于风寒湿痹及诸虚损症；熊油：除风湿，缓筋急，补血杀虫。用于肿胀积聚。外用于肝瘤，臃疮，鹅掌风；熊骨：除风湿。用于风湿骨痛；熊肉：补虚损，强筋骨。用于脚气，风痹，手足不随，筋脉挛急；熊脑：用于耳聋；熊筋：壮筋强力，可代虎骨。

#### 8939003

*Selenarctos thibetanus mupinensis* Heude

动物名 西南黑熊《贵州药录》

药材名 熊胆《贵州药录》

地方名 湖北：老熊、黑子（神农架）；贵州：黑熊。

功效 胆汁：清热，镇痉，明目，杀虫。用于黄疸，暑泻，小儿惊痫，疳积；熊掌：益气力，除风湿，健胃；肉：补虚损，强筋骨；骨：祛风胜湿。

## 8939004

Ursus arctos L.

动物名 棕熊《中国动物志》

药材名 熊胆《药性论》、《简明中医辞典》

文献名 人熊、马熊《中药志》, 黑《中国动物志》, 熊掌、熊油、熊骨《汇编》, 胆仁、铜胆、金胆、铁胆、墨胆、菜花胆《药典》, 黑瞎子、熊瞎子、人熊掌、熊蹯《中药名汇》

功效 胆囊内的干燥胆汁; 清热解毒, 明目, 止疼。用于小儿热盛惊风, 癫痫, 抽搐, 黄疸。外用于痈肿, 痔疮, 目赤云翳; 熊掌: 除风湿。用于风寒湿痹及诸虚损症; 熊油: 除风湿, 缓筋急, 补血杀虫。用于肿胀积聚。外用于疔疮, 臁疮, 鹅掌风; 熊骨: 除风湿。用于风湿骨痛; 熊肉: 补虚损, 强筋骨。用于脚气, 风痹, 手足不随, 筋脉挛急; 熊脑: 用于耳聋; 熊筋: 壮筋强力, 可代虎骨。

## 8939005

Ursus pruinusosus Blyth

动物名 马熊《汇编》

文献名 熊胆、熊掌、熊油、熊骨《汇编》

功效 胆囊内的干燥胆汁; 清热解毒, 明目, 止疼。用于小儿热盛惊风, 癫痫, 抽搐, 黄疸。外用于痈肿, 痔疮, 目赤云翳; 熊掌: 除风湿。用于风寒湿痹及诸虚损症; 熊油: 除风湿, 缓筋急, 补血杀虫。用于肿胀积聚。外用于疔疮, 臁疮, 鹅掌风; 熊骨: 除风湿。用于风湿骨痛。

## 89391 鼬科 Mustelidae

## 8939101

Aonyx cinerea Illiger --- Lutra cinerea Illiger

动物名 小爪水獭《中国动物志》

药材名 獭肝《中国药用动物志》

文献名 小爪獭、水猫子《中国药用动物志》, 山獭、油獭、水獭《中国动物志》

功效 獭肝: 养阴, 除热, 宁嗽, 止血。用于虚劳, 骨蒸潮热, 盗汗, 咳嗽, 气喘, 咯血, 夜盲, 痔疮下血。

## 8939102

Arctonyx collaris F. Cuvier

动物名 猪獾《纲目》、《中国动物志》

药材名 獾油《中国药用动物志》, 獾骨《汇编》

文献名 獾《楚辞》, 獾《尔雅》郭璞注, 獾肉、獾膏《唐本草》, 獾骨《食疗本草》, 獾脂、獾纯《本草拾遗》, 獾猎膏《食医心鉴》, 獾猪肉《圣惠方》, 地猪《医林纂要》, 獾油《纲目拾遗》, 猪獾油《王珪桂《不药良方》》, 沙獾《动物图谱·兽》, 沙獾骨、上猪子骨《汇编》

地方名 陕西: 川猪, 狃; 甘肃: 串猪; 江苏: 猪鼻獾; 四川: 土猪骨, 土猪油, 獾猪, 拱猪。

功效 骨骼: 祛风湿, 止痛, 止咳。用于风湿筋骨疼痛, 皮肤瘙痒, 咳嗽; 獾油: 清热解毒, 消肿止痛, 润肠。用于烫火伤, 疥癣痔疮, 皮肤溃烂, 冻疮, 子宫颈糜烂, 大便干燥; 肉: 补脾胃, 利水道。用于虚劳羸瘦, 水胀, 久痢, 小儿疳积。

## 8939103

Arctonyx collaris alboquularis Blyth

动物名 华南猪獾《神农架药录》

药材名 猪獾《贵州药录》

文献名 獾肉、獾骨《神农架药录》

地方名 湖北: 猪獾子《神农架》。

功效 四肢骨: 祛风湿, 止痛, 止咳。用于风湿痛, 皮肤瘙痒, 咳嗽; 肉: 补脾胃, 利水道。

## 8939104

Lutra lutra L. --- Musiela lutra L.

动物名 水獭《中国动物志》

药材名 水獭肝《纲目》、《汇编》

文献名 獭肝、獭肉、獭四足《别录》, 水狗《广雅》, 獭、獭骨《本草经集注》, 獭皮毛《本草拾遗》, 獭胆《图经》, 獭爪《饮膳正要》, 水狗肝《汇编》, 獭猫、水毛子《中药大辞典》

地方名 内蒙古: “嗨力古”(蒙名); 其他: 水獭猫, 水獭胆。

功效 肝脏: 有小毒。补肝肾, 止咳。用于肺结核咳嗽, 气喘, 盗汗, 夜盲; 肉: 用于虚劳骨蒸, 水肿胀满, 二便秘涩, 妇女经闭; 獭骨: 用于食鱼骨鲠; 獭胆: 用于眼翳黑花; 獭四足: 用于手足皲裂; 獭皮毛: 用于水痢病。

## 8939105

Lutra lutra chinensis Gray

动物名 中国水獭《贵州药录》

药材名 獭肝、獭胆、獭骨《神农架药录》

文献名 中华水獭《神农架药录》

地方名 贵州: 水獭; 陕西: 水獭肝, 水狗肝。

功效 肝: 养阴, 除热, 宁嗽, 止血。用于虚劳, 盗汗, 咳嗽, 咯血, 夜盲; 胆: 用于夜翳黑花, 视物不明; 骨: 用于食鱼骨鲠。

## 8939106

Lutra perspicillata Geoffroy --- Lutra monticola Anderson

--- Lutra tarayensis Hodgson

动物名 江獭《中国动物志》

药材名 獭肝《广东、云南》

文献名 印度水獭《拉汉兽类名称》, 滑獭、咸水獭、海獭《中国药用动物志》

功效 獭肝: 养阴, 除热, 宁嗽, 止血。用于虚劳, 骨蒸潮热, 盗汗, 咳嗽, 气喘, 咯血, 夜盲, 痔疮下血。

## 8939107

Meles meles L. --- Ursus meles L.

动物名 狗獾《汪颖《食物本草》》、《中国动物志》

药材名 獾肉《图经》, 獾油《纲目拾遗》、《汇编》

文献名 獾、狃子、土猪、地猪《尔雅》, 獾《图经》, 天狗《纲目》, 山獾、山狗《东医宝鉴》, 狃《拉汉兽类名称》

地方名 黑龙江: “儿哦勒”(鄂温克族语), “巴尔梭克”(鄂伦春族语), “多罗空”(赫哲族语); 吉林: “纳古里”(朝名); 内蒙古: “忙给斯”、“咪格什”(蒙名); 新疆: “剥儿梭克”(维名); 云南: “命马”(傣名)。

功效 獾油: 清热解毒, 消肿止痛, 润肠。用于火伤, 疥癣痔疮, 大便干燥; 肉: 用于小儿疳瘦, 蛔虫; 头(煨炭): 用于肾病, 腰痛, 遗尿病; 血: 燥黄水。用于痛

风游症、关节黄水；肠：用于痢疾。

### 8939108

*Melogale moschata* Gray --- *Helictis moschata* Gray

动物名 鼬獾《中国动物志》

药材名 獾油《江南》

文献名 獾子、山獾《动物图谱·兽》，白鼻狸、白额狸、猪仔狸、鱼鳅猫《中国药用动物志》，白鼻猪、白獾《中国动物志》

地方名 台湾：山狙，山獾，鱼鳅，鲟鳅猫。

功效 脂肪：补中益气，解毒消肿。用于中气不足，子宫脱出，半身不遂，咯血，胃溃疡，烫火伤。

### 8939109

*Mustela altaica* Pallas

动物名 香鼬《中国动物志》

药材名 香鼠子《中国药用动物志》

文献名 香鼠《动物图谱·兽》，香鼬子《中国动物志》

功效 肉：解毒。用于唇疮，食物中毒，药物中毒。

### 8939110

*Mustela eversmanni* Lesson

动物名 艾鼬《中国动物志》

药材名 艾虎《中国药用动物志》

文献名 地狗、两头乌《动物图谱·兽》，臭狗子《中国药用动物志》，黑脚鼬《中国动物志》

地方名 内蒙古：“乌木黑·呼仍”（蒙名），马内猴。

功效 肉：镇惊。用于癫痫；脑：解毒。用于食物、药物中毒。

### 8939111

*Mustela kathiah kathiah* Hodgson

动物名 黄腹鼬《动物图谱·兽》

药材名 黄鼠狼《神农架药录》

文献名 香鼬狼、松狼《动物图谱·兽》

功效 肉：健脾开胃。

### 8939112

*Mustela sibirica* Pallas

动物名 黄鼬《广雅疏证》、《中国动物志》

药材名 黄鼠狼《纲目》、《中药大辞典》

文献名 鼬鼠肉《纲目》，鼬鼠、地猴、鼯鼠、元皮《动物图谱·兽》，黄鼬肉《中国药用动物志》，黄鼬粉《中国动物药》，黄皮子《汇编》，黄皮《中国动物志》

地方名 内蒙古：“扫龙嘎”（蒙名），黄鼬，黄狼；其他：谷鼠，黄鼠骨，北鼬。

功效 肉：解毒，利尿，升高血小板。用于淋巴结核，遗尿，淋病，血小板减少性紫癜，疮疥。

备考 日本民间将其全身黑烧研末内服，用于遗尿。

### 8939113

*Mustela sibirica moupinensis* (Milne-Edwards)

动物名 西南黄鼬《神农架药录》

药材名 鼬鼠《广西药用动物》

地方名 黄鼠狼《湖北、广西》；湖北：鼬鼠肉《神农架》；广西：黄狼，黄皮子，地猴。

功效 肉：用于遗尿，肝硬化，支气管炎，淋巴结

核；心、肝：用于心绞痛；舌（烧灰）：用于食伤；脂肪油：用于疮疥，杀虫。

## 89392 灵猫科 Viverridae

### 8939201

*Pauma larvata larvata* Hamilton-Smith

动物名 花面狸《神农架药录》

地方名 湖北：夜猫子《神农架》。

功效 骨骼：祛风除湿，舒筋活络。

### 8939202

*Viverra zibetha* L.

动物名 大灵猫《中国动物志》

药材名 灵猫肉《纲目》、《中药大辞典》，灵猫香《国药药理》

文献名 类《山海经》，文狸《楚辞》，神狸《离骚注》，灵狸《杨孚《异物志》》，灵猫、灵猫阴《本草拾遗》，香狸《酉阳杂俎》，香猫《丹铅杂录》，山狸《坤舆图说》，九江狸、九节狸、麝香猫《动物图谱·兽》，亚州灵猫、五间狸、送屎狸、五寸斑、七支狸、青麝、禾狸《中国药用动物志》

地方名 陕西：灵狸香。

功效 香囊中的分泌物（灵猫香）：通窍，行气，止痛。用于心腹卒痛，疝痛，骨折；肉：暖胃。

### 8939203

*Viverra zibetha ashtoni* Swinhoe

动物名 华南大灵猫《贵州药录》

药材名 灵猫香《神农架药录》

地方名 大灵猫《湖北、贵州》；湖北：九节狸《神农架》。

功效 香腺囊中的分泌物：通窍，行气，止痛。用于心腹卒痛，疝痛，骨折；肉：暖胃。

### 8939204

*Viverrivula indica* Desmarest

动物名 小灵猫《中国动物志》

药材名 灵猫香《汇编》

文献名 心月狐、文里香、灵狸香《新纲》，七间狸、香狸、乌脚狸、草狸《动物图谱·兽》，斑灵猫、灵狸、麝香猫、笔猫、灵猫骨《汇编》，麝猫、包公狸、果子狸《中国药用动物志》，七节狸、羌子猫、“呼麝浓”（傣名）《中国动物志》

地方名 湖北：黄阳狸《神农架》。

功效 香腺囊中的分泌物（灵猫香）：通窍，行气，止痛。用于心腹卒痛，疝痛，骨折；骨（灵猫骨）：温补助阳。

## 89393 猫科 Felidae

### 8939301

*Felis bengalensis* Kerr

动物名 豹猫《中国动物志》

药材名 山狸子骨《中国药用动物志》

文献名 狸《诗经》，狌狸《尔雅》郭璞注），狸肉、狸骨《别录》，野猫《圣惠方》，狸猫、石虎、麻狸《动物图谱·

兽》,狸子《中国药用动物志》

地方名 陕西:豹猫骨,豹猫肉;湖北:野猫子;广西:抓鸡虎,喷鸡虎,野狸,花猫,平头狸,猫狸,豹狸,斑猫,钱猫,山狸子。

功效 骨:安神,祛风湿。用于风湿性关节炎,淋巴结结核,失眠;肉或全体:用于肠风下血,痔漏,瘰癧,游风。

#### 8939302

*Felis bengalensis chinensis* Gray

动物名 华南豹猫《神农架药录》

药材名 山狸子骨《汇编》,狸肉《神农架药录》

地方名 湖北:野猫子(神农架)。

功效 骨:安神,祛风湿。用于风湿关节痛,淋巴结结核,失眠;肉:用于肠风下血,痔漏,瘰癧,游风。

#### 8939303

*Felis lynx* L. --- *Lynx lynx* L.

动物名 猞猁《中国动物志》

药材名 猞猁《内蒙古药用动物》

文献名 林麝、猞猁、马猞猁《中国药用动物志》,羊猞猁《中国动物志》

地方名 内蒙古:“希鲁古斯”(蒙名)。

功效 肠:消炎。用于肠炎。

#### 8939304

*Felis ocreata domestica* Brisson

动物名 猫《诗经》、《汇编》

药材名 猫骨《中国药用动物志》

文献名 猫狸《肘后方》,家狸《唐本草》,乌圆《千金方》,猫肝、猫肉、猫皮毛、猫胞衣、猫头《纲目》,家猫《中国动物志》

地方名 内蒙古:猫油;湖北:猫子(神农架);广西:猫公。

功效 猫骨:解毒,消肿,杀虫。用于瘰癧,水肿,虫积;猫肉:滋补,祛风,解毒。用于虚癆体瘦,瘰癧,风湿痹痛,溃疡,烫、火伤;猫肝:用于劳瘵,杀虫;猫肝烧灰:用于喘息;猫脂肪:外用于烫伤;皮毛:用于瘰癧,疮疡;猫头:用于噎膈反胃,胃脘痛;猫头:用于瘰癧,疔疽,恶疮,痔疾。

#### 8939305

*Felis temmincki* Vigors et Horsfield

动物名 金猫《动物图谱·兽》

药材名 金猫肉(拟)

文献名 原猫、山猫、芝麻豹、红春豹、乌云豹《动物图谱·兽》

功效 肉:补中益气。

备考 《神农架药录》所载之金猫学名为 *Felis temmincki tristis* Milne-Edwards 别名野猫子。

#### 8939306

*Neofelis nebulosa* Griffith --- *Felis nebulosa* Griffith

动物名 云豹《中国动物志》

药材名 云豹骨《汇编》

文献名 艾豹、什豹《中国药用动物志》

地方名 台湾:樟豹;广西:乌云豹,荷叶豹,龟纹豹。

功效 骨骼:强筋骨,祛风湿,止痛。用于风寒湿痹,筋骨疼痛,腰膝无力,四肢痉挛,小儿惊风、抽搐等。

#### 8939307

*Panthera pardus* L.

动物名 豹《拉汉兽类名称》

药材名 豹骨《医林纂要》、《药典》附录

文献名 程《庄子》,豹肉《别录》,失刺孙《梦溪笔谈》,金钱豹、银钱豹、文豹《动物图谱·兽》,“色”(藏名)《中国动物志》

地方名 山东:豹子;内蒙古:“伊日布斯”(蒙名)。

功效 骨骼:强筋骨,祛风湿,止痛。用于风寒湿痹,筋骨疼痛,腰膝软弱无力,四肢痉挛,小儿惊风、抽搐等。

备考 国家重点保护动物。

#### 8939308

*Panthera pardus fusca* Meyer

动物名 华南金钱豹《神农架药录》

药材名 豹骨《神农架药录》

文献名 印度豹《中药名汇》

地方名 湖北:豹子(神农架);贵州:金钱豹。

功效 骨骼:强筋骨,祛风湿,止痛。

#### 8939309

*Panthera tigris* L.

动物名 虎《诗经》、《中国动物志》

药材名 虎骨《别录》、《药典》附录

文献名 於菟《左传》,虎头骨、虎眼睛、虎牙、虎肉、虎膏、虎爪《别录》,大虫《肘后方》,虎睛《雷公炮炙论》,虎胆《本草拾遗》,虎肚、虎肾《纲目》,虎胶《医林纂要》,虎油《物理小识》,虎脂《本草新编》,威骨、大虫骨、伯都骨、李父骨、李耳骨、於兔骨、依兔骨、雾犬骨《新纲》,“打哈”(藏名)《中国动物志》,虎鞭、虎胃《中国药用动物志》

地方名 老虎、东北虎、白额虎(东北);其他:华北虎,扁担花,北虎,关虎。

功效 骨骼(虎骨):追风定痛,健骨,镇惊。用于痹节风痛,四肢拘挛,腰脚不随,惊悸癰癧,痔瘕脱肛;虎牙:用于丈夫阴头疮及疽瘰;爪甲(虎爪):外用于脱骨疽;虎肉:补脾胃,益气力,壮筋骨。用于脾胃虚弱,恶心呕吐,疟疾;胃(虎肚):用于反胃吐食;阴茎和睾丸(虎肾):用于瘰癧;虎胆:用于小儿惊痫,疳痢,跌打损伤;脚筋(虎筋):用于风湿性关节炎;虎睛:镇惊,明目。用于惊悸,癰癧,目翳;脂肪油(虎膏):用于反胃,头疮白秃,痔瘡下血;虎骨胶:补益气血,强健筋骨。用于中风瘫痪,筋骨受风拘挛,四肢麻木,不能屈伸及痿痹;虎血:壮神强志。

备考 国家重点保护动物。

#### 8939310

*Panthera tigris amoyensis* Hiltzheimer

动物名 华南虎《广西药用动物》

药材名 虎骨《广西药用动物》

地方名 老虎(湖北、广西);广西:虎,大虫。

功效 骨骼:追风定痛,健骨,镇惊。用于痹节风



痛,四肢拘挛,腰脚不随,惊悸癫痫,痔瘕脱肛;牙:用于丈夫阴头疮及疽瘰;爪甲(虎爪):用于脱骨疽;肉:补脾胃,益气力,壮筋骨。用于脾胃虚弱,恶心呕吐,疟疾;胃(虎肚):用于反胃吐食;胆:用于小儿惊痫;血:壮神强志。其他同东北虎。

备考 1.“南虎骨”往往不是华南虎的虎骨,而是豹骨的代名词。2.近十余年来,伪品虎骨时有发现,其中有熊骨、牛骨、猪骨等,尤以牛骨伪充虎骨出售较为常见,应注意鉴别。

## 8939311

*Panthera uncia* Schreber

动物名 雪豹《动物图谱·兽》

药材名 豹骨《中国药用动物志》

文献名 荷叶豹、艾叶豹《动物图谱·兽》

功效 骨骼:强筋骨,祛风湿,止痛。用于风寒湿痹,筋骨疼痛,腰膝软弱无力,四肢痿挛,小儿惊风、抽搐等。

## 89394 海狗科 Otariidae

## 8939401

*Callorhinus ursinus* L.

动物名 海狗《拉汉兽类名称》

药材名 鳔肭脐《药性论》、《中药志》

文献名 鳔肭兽《日华子本草》,海狗肾《图经》,豹兽《异物志》,海狗油《纲目拾遗》,北海熊、海狮《山东药用动物》,海熊《拉汉兽类名称》,骨猫、骨豹、猫兽、阿慈勒他《新纲》,鳔肭脐肉、鳔肭脐茎、海童脐《中药名汇》

功效 雄性生殖器:暖肾,壮阳,益精。用于肾阳衰弱,阳痿遗精,腰膝痿弱无力。

备考 《脊椎动物分类学》海狗亦称鳔肭兽学名为 *Callorhinus curilensis* Jordan et Clark

## 89395 海豹科 Phocidae

## 8939501

*Phoca virulina* L.

动物名 海豹《动物图谱·兽》

药材名 海狗肾《海洋药物》

文献名 海狗油《纲目拾遗》,斑海豹、港海豹《脊椎动物分类学》,〔鳔肭兽〕《中药材科技》,〔鳔肭脐〕《海洋药物》,海豹肾、港豹《中国药用动物志》

功效 雄性生殖器(阴茎、睾丸):补肝肾,暖腰膝。用于阳痿,遗精,腰膝酸软;海狗油:润肌肤,解毒。用于皮肤皲裂,冻伤;肝脏及胆:用于肋膜炎。

备考 现时商品海狗肾多为此种,但真正的海狗肾应为海狗科海狗 *Callorhinus ursinus* L. 的雄性生殖器。

## 89396 象科 Elephantidae

## 8939601

*Elephas africanus* Blumenbach

动物名 非洲象《拉汉兽类名称》

药材名 象牙屑《汇编》

功效 去毛的干燥皮:止血,敛疮。用于外伤出血,创伤、溃瘍;象牙:清热镇惊,解毒生肌。用于惊痫,骨蒸劳热,痈肿疮毒,痔漏;肉:用于秃疮;骨:解毒;象胆:清热解毒,清肝明目,止疼。用于惊痫,黄疸,目赤,恶疮肿毒。

备考 《汇编》非洲象学名为 *Elephas africanus capensis*

## 8939602

*Elephas maximus* L.

动物名 亚洲象《医学入门》、《拉汉兽类名称》

药材名 象皮《纲目》、《汇编》

文献名 象胆《雷公炮炙论》,象牙《药性论》,象肉《本草拾遗》,象骨《纲目》,野象《动物图谱·兽》,印度象、老象、大笨象《中国药用动物志》

功效 去毛的干燥皮:止血,敛疮。用于外伤出血,创伤、溃瘍;象牙:清热镇惊,解毒生肌。用于惊痫,骨蒸劳热,痈肿疮毒,痔漏;肉:用于秃疮;骨:解毒;象胆:清热解毒,清肝明目,止疼。用于惊痫,黄疸,目赤,恶疮肿毒。

备考 国家重点保护动物。

## 89397 儒艮科 Dugongidae

## 8939701

*Dugong dugon* (Muller)

动物名 儒艮《动物图谱·兽》

药材名 儒艮油(拟)

文献名 人鱼《动物图谱·兽》

功效 油(脂肪):滋养补虚。用于肺病,体质虚弱等。

## 89398 马科 Equidae

## 8939801

*Equus asinus* L.

动物名 驴《说文》、《汇编》

药材名 阿胶《本经》、《中药大辞典》

文献名 傅致胶《本经》,漠驢《纂文》,驴膏《外台秘要》,驴头、驴肉、驴乳《千金·食治》,驴毛、驴骨、驴脂《食疗本草》,驴蹄、驴阴茎《纲目》,盆胶、乌胶、驴胶、显明把、覆盆胶《新纲》,驴鞭《本草新编》,非洲野驴《拉汉兽类名称》,驴皮胶《汇编》,黑驴皮胶、东阿胶、陈阿胶、贡阿胶、阿胶珠《常用中药名辨》

地方名 毛驴、家驴、驴子、黑驴(山东、广西);河北:驴三件;山西:驴肾;内蒙古:“额勒吉格”(蒙名);湖北:土驴子(神农架)。

功效 雄性生殖器:补肾壮阳,滋阴补虚,强筋壮骨。用于阳痿,血虚,气弱,骨结核,骨髓炎,妇女乳汁不足;阿胶:滋补养血,补肺润燥,止血安胎。用于阴虚咳嗽,腰膝酸痛,心烦失眠,咯血,吐血,便血,崩漏带下,胎动下血;驴毛:用于头中一切风;驴头:用于中风头眩,消渴,黄疸;肉:补血,益气。用于劳损,风眩,心

烦;驴乳:用于消渴,黄疸,小儿惊痫,风热赤眼;驴脂:用于咳嗽,疟疾,耳聋,疮疥;驴骨(煮汤浴):用于历节风;牝驴骨(煮汁服):用于消渴;头骨(烧灰和油涂):用于小儿解烦;驴蹄(悬蹄烧灰):外用子痂疽,散脓水,小儿解烦。

## 8939802

*Equus asinus* L. × *Equus caballus orientalis* Noack

动物名 骡《中国药用动物志》

药材名 骡宝《汇编》

文献名 驮驢[马父驴母]《上林赋》,骡蹄甲《中国药用动物志》

地方名 山东:驴骡[驴父马母],马骡、矮骡[马父驴母];湖北:骡子;其他:盆胶,清胶,乌胶,驴驴,傅致胶,煮皮,上清胶,覆盆胶,阿胶。

功效 胃结石(骡宝);镇惊,化痰,清热解毒。用于惊痫,吐血,衄血,痈肿疮毒;骡蹄甲:祛风,通经络。用于关节疼痛,类风湿性关节炎。

备考 阿胶以驴皮胶为上,目前市售之阿胶除驴皮外,尚有以其它家畜的皮作原料。

## 8939803

*Equus caballus orientalis* Noack --- *Equus caballus* L.

动物名 马《中国药用动物志》

药材名 马宝《饮片新参》、《汇编》

文献名 白马茎、马眼、悬蹄《本经》,马乳、马肉、马齿、马心、马鬣头膏、马鬣毛、白马蹄、赤马蹄马毛《别录》,马鬣膏、马蹄甲、马肝《本草经集注》,马鬣《千金方》,马皮、马骨《食疗本草》,马牙《本草拾遗》,马鬣《日华子本草》,蚌壳《锻耕录》,白马阴茎、驹胞衣《纲目》,马膏《灵枢》,马脂《丹房镜源》,精丹、石粪《新纲》,马粪石《汇编》,家马《山东药用动物》

地方名 内蒙古:“矛瑞”(蒙名);广西:马肚石;四川:马结石;其他:西藏马宝,毛球。

功效 胃结石(马宝);清热化痰,镇惊安神,解毒。用于癫狂,惊痫,痈疮肿毒,吐血,衄血;鬣毛或尾毛:有毒。用于女子崩中,带下,疮痈;肉:用于除热下气,长筋骨,强腰膝;肺:用于寒热痿痹;乳汁:补血润燥,清热止渴。用于血虚烦热,虚劳骨蒸,消渴,牙疳;骨骼:用于头疮,耳疮,阴疮,瘰疬;牙齿:用于惊痫,疔疮,牙痛;肝:用于闭经,心腹滞闷,四肢疼痛;皮:用于小儿赤秃;蹄:用于崩漏带下,牙疳,秃疮,疥癣,脓疮;项上的皮下脂肪(马鬣膏):有小毒。用于生发;雄性外生殖器:补肾益气。用于阳痿精衰,虚弱羸瘦;胎盘:用于闭经;马心:用于遗忘。

备考 有一种劣品马宝,俗称“毛球”,质粗,体轻,剖后有黄色或褐色毛,不堪入药。

## 8939804

*Equus hemionus* Pallas

动物名 野驴《动物图谱·兽》

药材名 阿胶《中国药用动物志》

文献名 毒驴《拉汉兽类名称》,蒙古野驴、西藏野驴《动物图谱·兽》

功效 阿胶(驴皮加工品):滋补养血,补肺润燥,

止血安胎。用于阴虚咳嗽,腰膝酸痛,心烦失眠,咯血,吐血,便血,崩漏带下,胎动下血。

## 8939805

*Equus przewalskii* Poliakov

动物名 野马《动物图谱·兽》

药材名 野马肉《千金·食治》、《中药大辞典》

文献名 普氏马、蒙古野马《动物图谱·兽》

功效 肉:有毒。壮筋骨。用于癫痫,肌肉麻痹。

## 89399 犀科 Rhinocerotidae

## 8939901

*Rhinoceros bicornis* L.

动物名 黑犀《中药志》

药材名 广角《汇编》

文献名 奴角、兕角、毗沙擎《新纲》,犀牛角、广犀角、乌犀角尖《常用中药名辨》,双角犀、非洲犀角、白边角、黑边角、广角个、广角瓣《汇编》,天马角、柱角《中药大辞典》

功效 犀角:清热凉血,解毒定惊。用于热病神昏谵语,斑疹,吐血,衄血。

## 8939902

*Rhinoceros sinus* Cottoni

动物名 白犀《中药志》

药材名 广角《汇编》

文献名 奴角、兕角、毗沙擎《新纲》,方吻犀、犀牛角、广犀角、非洲犀角、白边角、黑边角、广角个、广角瓣《汇编》,天马角、柱角《中药名汇》

功效 角:清热凉血,解毒定惊。用于热病神昏谵语,斑疹,吐血,衄血。

## 8939903

*Rhinoceros sondaicus* Desmarest

动物名 小独角犀《拉汉兽类名称》

药材名 犀角《本经》、《汇编》

文献名 奴角、兕角、毗沙擎《新纲》,爪哇犀、小犀角、蘑菇头《汇编》,爪哇独角犀、夜明犀、低密、特犀、公犀角、母犀角、骨咄犀、二黑犀角片、芦花犀角片、西角、乌犀、火犀角、正犀角、黑犀角、正大犀角、香犀角《中药名汇》

功效 角:清热凉血,解毒定惊。用于热病神昏谵语,斑疹,吐血,衄血。

## 8939904

*Rhinoceros sumatrensis* Cuvier

动物名 苏门犀《中药志》

药材名 广角《中药大辞典》

文献名 奴角、兕角、毗沙擎《新纲》,双角犀《中药志》,暹罗角《亚洲犀角》,小犀角《蘑菇头》《汇编》

功效 角:清热凉血,解毒定惊。用于热病神昏谵语,斑疹,吐血,衄血。

## 8939905

*Rhinoceros unicornis* L.

动物名 独角犀《纲目》、《拉汉兽类名称》

药材名 犀角《本经》、《汇编》



药材名 鹿角《中国药用动物志》

文献名 鹿角花盘〔鹿角托〕《中国动物药》, 堪达罕、  
犴《动物图谱·兽》, 驼鹿角《中国药用动物志》

功效 骨化角或鹿角托: 滋肾补虚, 行血消肿。用于疮疡肿毒, 瘀血作痛, 乳汁不下, 乳房胀痛, 虚损内伤, 腰膝酸痛。

#### 8940202

*Capreolus capreolus* (L.)

动物名 麀《动物图谱·兽》

药材名 麀茸《中国药用动物志》

文献名 麀子、狍子、獐麀、獐孢《动物图谱·兽》, 狍  
《中国药用动物志》

功效 幼角(麀茸): 与鹿茸同, 功效稍逊; 干角  
(炭): 与鹿角同, 功效稍逊; 肺: 解毒。用于肺脓肿; 血:  
调经。用于月经过多。

备考 内蒙古称母麀为“朱日”, 不产茸。

#### 8940203

*Cervus albirostris* Przewalski

动物名 白唇鹿《动物图谱·兽》

药材名 岩茸、岩角(四川)、《中药大辞典》

文献名 鹿茸、鹿角《中国药用动物志》, 白唇鹿角  
《中药大辞典》, 鹿角胶、鹿角霜、鹿项骨、鹿筋、鹿冲、鹿  
尾、鹿胎、鹿血《四川中药志》

地方名 四川: 人字茸, 黄善茸, 畸形茸〔幼鹿初生茸  
或发育不全茸〕, 晒山子茸〔死鹿的茸〕。

功效 幼角(岩茸): 壮肾阳, 益精血, 强筋骨, 调冲  
任, 托疮毒; 骨化角(岩角): 温肾阳, 强筋骨, 行血消肿。

#### 8940204

*Cervus elaphus* L.

动物名 马鹿《纲目》、《动物图谱·兽》

药材名 鹿茸、鹿角、鹿角胶《本经》、《药典》, 鹿角霜  
《品汇精要》、《药典》, 鹿肉、鹿肾《别录》, 鹿血《千金·食  
治》, 鹿筋、鹿齿《唐本草》, 鹿皮《纲目》, 鹿胎《本草新  
编》, 鹿尾《青海药材》

文献名 白胶《本经》, 鹿骨、鹿髓《别录》, 鹿茎筋、鹿  
头肉、鹿蹄肉《千金·食治》, 鹿脂《唐本草》, 鹿角白霜  
《本草蒙筌》, 鹿皮、鹿胆、鹿膈《纲目》, 鹿胶《本经逢  
原》, 斑龙珠《澹寮方》, 鹿鞭、鹿阴茎《医林纂要》, 鹿袋  
角、囊角、茄子茸、冲天室、镇山威、斑龙角《新纲》, 带毛  
鹿尾、不带毛鹿尾《青海药材》, 马鹿茸、青毛茸、大挺  
〔主枝〕、单门〔一个侧枝〕、莲花〔二个分枝〕、三岔〔三个  
侧枝〕、四岔〔四个侧枝〕、东马茸、关马茸〔东北产〕、西  
马茸〔西北产〕《中药大辞典》, 马鹿角、东马鹿茸、西马  
鹿茸《药典》, 嫩鹿茸、鹿茸血片、血茸片、鹿茸粉片、鹿  
茸粉、青茸片、鹿角片、鹿角粉、鹿角屑《常用中药名  
辨》, 八叉鹿、黄臀赤鹿《动物图谱·兽》

地方名 内蒙古: “套如格·包格”(蒙名), 八杈鹿; 山  
东: 赤鹿、鹿外肾; 湖北: 草鹿、鹿子(神农架); 四川: 鹿  
冲、鹿冲肾。

功效 幼角(鹿茸): 壮肾阳, 益精血, 强筋骨, 调冲  
任, 托疮毒。用于阳痿滑精, 宫冷不孕, 羸瘦, 神疲, 畏  
寒, 眩晕耳鸣耳聋, 腰脊冷痛, 筋骨痿软, 崩漏带下, 阴

疽不敛; 已骨化角或锯茸后翌年春季脱落的角基(鹿角  
或鹿角脱盘): 温肾阳, 强筋骨, 行血消肿。用于阳痿遗  
精, 腰脊冷痛, 阴疽疮疡, 乳痈初起, 瘀血肿痛; 鹿角胶:  
温补肝肾, 益精养血。用于阳痿滑精, 腰膝酸冷, 虚劳  
羸瘦, 崩漏下血, 便血尿血, 阴疽肿痛; 鹿角去胶质的角  
块(鹿角霜): 温肾助阳, 收敛止血。用于脾肾阳虚, 食  
少吐泻, 白带, 遗尿尿频, 崩漏下血, 癰疽痰核; 肉(鹿  
肉): 补五脏, 调血脉。用于虚劳羸瘦, 产后无乳; 阴茎、  
睾丸(鹿肾): 补肾, 壮阳, 益精。用于肾虚阳痿, 耳鸣,  
宫冷不孕, 慢性睾丸炎; 鹿血: 补虚, 和血。用于虚损悒  
悒, 心悸, 失眠, 肺痿, 吐血, 崩中, 带下; 鹿筋: 壮筋骨,  
用于劳损, 风湿关节痛, 转筋; 鹿肉: 用于留血, 鼠瘻, 心  
腹痛; 鹿皮(去毛): 补气, 涩虚滑。用于妇女白带, 血崩  
漏不止, 肾虚滑精。外用于一切疮(烧灰和猪脂涂之);  
胎兽及胎盘(鹿胎): 补肾壮阳, 补虚生精。用于虚损劳  
瘵, 精血不足, 妇女虚冷, 崩漏带下; 鹿尾: 暖腰膝, 益肾  
精。用于腰痛, 阳痿, 遗精, 头昏耳鸣; 鹿骨: 补虚羸, 强  
筋骨。用于风湿四肢疼痛, 筋骨冷痹; 鹿胆: 消散肿毒;  
脂肪油(鹿脂): 用于痈肿死肌, 湿中, 四肢不随。外用  
于面疱疮; 甲状腺体(鹿膈): 用于瘰病; 骨髓或脊髓(鹿  
髓): 补阳益阴, 生精润燥。用于虚劳羸弱, 肺痿咳嗽,  
阳痿, 血枯; 鹿头肉: 补气益精。用于虚劳, 消渴; 鹿蹄  
肉: 用于风寒湿痹, 腰脚酸痛。

#### 8940205

*Cervus nippon* Temminck

动物名 梅花鹿《动物图谱·兽》

药材名 鹿茸、鹿角、鹿角胶《本经》、《药典》, 鹿肉、  
鹿肾《别录》, 鹿血《千金·食治》, 鹿筋、鹿齿《唐本草》,  
鹿角霜《品汇精要》、《药典》, 鹿皮《纲目》, 鹿胎《本草新  
编》, 鹿尾《青海药材》

文献名 白胶《本经》, 鹿骨、鹿髓《别录》, 鹿茎筋、鹿  
头肉、鹿蹄肉《千金·食治》, 鹿脂《唐本草》, 鹿角白霜  
《本草蒙筌》, 鹿皮、鹿胆、鹿膈《纲目》, 鹿胶《本经逢  
原》, 斑龙珠《澹寮方》, 鹿鞭、鹿阴茎《医林纂要》, 鹿袋  
角、囊角、茄子茸、冲天室、镇山威、斑龙角《新纲》, 花鹿  
《动物图谱·兽》, 带毛鹿尾、不带毛鹿尾《青海药材》, 花  
鹿角、花茸《中药志》, 花鹿茸、黄毛茸、锯茸、砍茸、二杠  
〔具一个分枝〕、大挺〔主枝〕、三岔〔具二个分枝〕、门庄  
〔离锯口一公分处分出的侧枝〕、鹿肾片、鹿肾粉《中  
药大辞典》, 嫩鹿茸、鹿茸血片、血茸片、鹿茸粉片、鹿茸  
粉、鹿角粉、鹿角屑《常用中药名辨》

地方名 广西: 鹿; 四川: 鹿冲、鹿冲肾; 其他: 茸角,  
挂角, 户子, 三叉, 四叉, 毛杠, 顶上嫩鹿茸, 丸女春, 鹿  
外肾, 全鹿。

功效 幼角(鹿茸): 壮肾阳, 益精血, 强筋骨, 调冲  
任, 托疮毒。用于阳痿滑精, 宫冷不孕, 羸瘦, 神疲, 畏  
寒, 眩晕耳鸣耳聋, 腰脊冷痛, 筋骨痿软, 崩漏带下, 阴  
疽不敛; 已骨化角或锯茸后翌年春季脱落的角基(鹿角  
或鹿角脱盘): 温肾阳, 强筋骨, 行血消肿。用于阳痿遗  
精, 腰脊冷痛, 阴疽疮疡, 乳痈初起, 瘀血肿痛; 鹿角胶:  
温补肝肾, 益精养血。用于阳痿滑精, 腰膝酸冷, 虚劳  
羸瘦, 崩漏下血, 便血尿血, 阴疽肿痛; 鹿角去胶质的角

块(鹿角霜);温肾助阳,收敛止血。用于脾肾阳虚,食少吐泻,白带,遗尿尿频,崩漏下血,痢疾痰核;肉(鹿肉):补五脏,调血脉。用于虚劳羸瘦,产后无乳;阴茎、睾丸(鹿肾):补肾,壮阳,益精。用于肾虚阳痿,耳鸣,宫冷不孕,慢性睾丸炎;鹿血:补虚,和血。用于虚损腰痛,心悸,失眠,肺痿,吐血,崩中,带下;鹿筋:壮筋骨。用于劳损,风湿关节痛,转筋;鹿齿:用于留血,鼠痿,心腹痛;鹿皮(去毛):补气,涩虚滑。用于妇女白带,血崩漏不止,肾虚滑精。外用一切疮(烧灰和猪脂涂之);胎兽及胎盘(鹿胎):补肾壮阳,补虚生精。用于虚损劳瘵,精血不足,妇女虚冷,崩漏带下;鹿尾:暖腰膝,益肾精。用于腰痛,阳痿,遗精,头昏耳鸣;鹿骨:补虚羸,强筋骨。用于风湿四肢疼痛,筋骨冷痹;鹿胆:消散肿毒;脂肪油(鹿脂):用于痢肿死肌,温中,四肢不随。外用面疱疮;甲状腺体(鹿腺):用于瘦病;骨髓或脊髓(鹿髓):补阳益阴,生精润燥。用于虚劳羸弱,肺痿咳嗽,阳痿,血枯;鹿头肉:补气益精。用于虚劳,消渴;鹿蹄肉:用于风寒湿痹,腰脚酸痛。

## 8940206

*Cervus unicolor* Kerr

动物名 水鹿《动物图谱·兽》

药材名 鹿茸《四川中药志》

文献名 水鹿角《中药大辞典》,鹿角、鹿角胶、鹿角霜、鹿顶骨、鹿筋、鹿冲、鹿尾、鹿胎、鹿血《四川中药志》,春鹿、山马、山牛、水牛鹿、麋、“哈那”(藏名)、春茸《中国药用动物志》

地方名 广西:〔马鹿〕,黑鹿;四川:春角,牛眼,人字,四平头,小鱼尾,大鱼尾,老鱼尾。

功效 鹿茸:同梅花鹿,但功力较逊。

## 8940207

*Elaphodus cephalophus ichangensis* Lydekker

动物名 湖北毛冠鹿《神农架药录》

药材名 青鹿子《神农架药录》

功效 肉:补中益气,暖肾壮阳。

## 8940208

*Elaphurus davidianus* Milne-Edwards

动物名 麋鹿《动物图谱·兽》

药材名 麋肉《本草经集注》

文献名 麋脂、官脂《本经》,麋角《别录》,麋茸《唐本草》,麋《庄子》,麋《说文》,麋骨《嘉祐本草》,麋膏《周礼》郑玄注,四不像《动物图谱·兽》

功效 肉(麋肉):益气,强筋。用于虚劳不足,腰脚软弱;骨化的老角(麋角):强筋骨,益血脉。用于虚劳内伤,腰膝不仁,筋骨疼痛;幼角(麋茸):壮阳,补精,强筋,益血。用于虚劳羸瘦,腰膝酸软,筋骨疼痛,男子阳痿,女子不孕;骨(麋骨):除虚劳;脂肪(麋脂):通血脉,润皮肤。用于风寒湿痹,恶疮痈肿。

## 8940209

*Hydropotes inermis* Swinhoe

动物名 獐《动物图谱·兽》

药材名 獐肉、獐骨、獐髓《别录》、《中药大辞典》

文献名 麋《说文》,麋《经典释文》,河獐、牙獐《动物

图谱·兽》,河鹿《中药大辞典》

功效 肉:补益五脏,祛风。用于久病虚损,腰腿痹痛;骨:用于虚损泄精;骨髓或脊髓:益气力,悦泽人面。

## 8940210

*Moschus berezovskii* Flerov

动物名 林麝《动物图谱·兽》

药材名 麝香《本经》、《药典》

文献名 射父《尔雅》,獐、香獐子、麝鹿《中国药用动物志》,毛壳麝香、银皮、麝香仁、当门子《药典》

地方名 湖北:獐子、香獐(神农架)。

功效 雄体香囊中的分泌物:开窍醒神,活血通经,消肿止痛。用于热病神昏,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,经闭,瘕瘕,难产死胎,心腹暴痛,痢肿,瘰疬,咽喉肿痛,跌扑伤痛,痹痛麻木。

## 8940211

*Moschus chrysogaster* Hodgson

动物名 高山麝《动物图谱·兽》

药材名 麝香《中国药用动物志》

文献名 喜马拉雅麝、獐子、香獐《中国药用动物志》,马麝《动物图谱·兽》

功效 雄麝香囊中的分泌物:芳香开窍,活血散瘀,止痛,催产。用于惊痫昏迷,中风痰厥,寒邪腹痛,痢疮肿痛,跌打损伤。

## 8940212

*Moschus moschiferus* L.

动物名 原麝《动物图谱·兽》

药材名 麝香《本经》、《药典》

文献名 麝父《尔雅》,当门子、脐香《雷公炮炙论》,麝肉《食疗本草》,麝胶香、香獐《纲目》,土獐《本草述》,四味臭《东医宝鉴》,脐堂、麝脐、麝脐香、拔萃团、莫河婆伽《新纲》,麝香壳《四川中药志》,臭子、蜡子《中药志》,香脐子《中药材手册》,元香、元寸《简明中医辞典》,毛壳麝香、银皮、麝香仁《药典》,拉石子、整麝香、毛香、散麝香、臭子壳、麝壳《中药大辞典》

地方名 内蒙古:“呼德热”(蒙名),香獐子;山东:獐子,山驴子,獐鹿;其他:射香,四味香,原寸香,银皮香,蛋皮香,养皮香,猪面麝香,上射香,金麝香,生射香,杜射香,明射香,干射香。

功效 雄麝香囊中的分泌物:芳香开窍,活血散瘀,止痛,催产。用于惊痫昏迷,中风痰厥,寒邪腹痛,痢疮肿痛,跌打损伤;香腺囊的外皮:通关利窍,消肿解毒;麝香银皮(内膜):散热解毒。用于痈疮疔疖,乳痈发背。

备考 据《中药通报》白凤氏报导:麝分灵獐、马獐和夹拱獐三种,灵獐(林獐)所产的香最好;夹拱獐(钻窝獐),即马獐和灵獐的杂交獐,所产的香次之;马獐(草遍獐)所产之香劣于夹拱獐。麝在未长香之前,一般称之为“白臊子”。

## 8940213

*Moschus sibiricus* Pallas

动物名 麝《哈尔滨中医》

药材名 麝香《哈尔滨中医》

地方名 黑龙江:香獐、山驴子(哈尔滨)。

功效 雄性香囊中的分泌物:镇痉,兴奋,强心。用于中风,昏迷摔倒等,作为苏醒药。

#### 8940214

*Moschus sifanicus* Przewalski

动物名 马麝《药典》

药材名 麝香《药典》

文献名 毛壳麝香、麝香仁、当门子《药典》,香獐子、獐《中国药用动物志》

功效 雄性香囊中的分泌物:开窍醒神,活血通经,消肿止痛。用于热病神昏,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,经闭,瘕瘕,难产死胎,心腹暴痛,痢肿,瘰癧,咽喉肿痛,跌扑伤痛,痹痛麻木。

#### 8940215

*Muntiacus crinifrons* Sclater

动物名 黑鹿《动物图谱·兽》

药材名 鹿肉(浙江、广东、云南)、《中国药用动物名录》

文献名 蓬头鹿、红头青鹿《动物图谱·兽》

功效 肉:补气,暖胃,化湿,祛风。用于腰腿疼,胃疼。

#### 8940216

*Muntiacus muntjak* (Zimmermann)

动物名 赤鹿《动物图谱·兽》

药材名 鹿肉、鹿茸、鹿骨膏《中国药用动物志》

文献名 黄鹿、黄獐《动物图谱·兽》,红鹿、印度鹿、角鹿、吠鹿、鹿骨膏《中国药用动物志》

功效 鹿肉:补气,暖胃,化湿,祛风。用于腰腿酸痛,胃痛;鹿茸:壮阳。

#### 8940217

*Muntiacus reevesi* Ogilby.

动物名 小鹿《动物图谱·兽》

药材名 鹿肉《本草拾遗》、《中药大辞典》,鹿茸、鹿骨膏《中国药用动物志》

文献名 黄獐《动物图谱·兽》,黄鹿《中药大辞典》,小黄獐、麻獐、茅獐《中国药用动物志》

地方名 湖北:黄鹿子(神农架);云南:“痴枢得”(楚雄彝名),鹿角,大赶药。

功效 鹿肉:补气,暖胃,耐饥,化湿祛风。用于腰腿痛,胃痛;鹿茸:壮阳。用于阳痿;鹿骨膏:祛风除湿。用于风湿痹痛。

#### 8940218

*Rangifer tarandus* L.

动物名 驯鹿《动物图谱·兽》

药材名 鹿角《中国药用动物志》

文献名 四不象、角鹿《动物图谱·兽》,驯鹿角、鹿筋、鹿肾、鹿尾、鹿角胶、鹿角霜《中国药用动物志》

功效 鹿角:温肾阳,强筋骨,行血消肿。用于阳痿遗精,腰脊冷痛,阴疽疮疡,乳瘤初起,瘀血肿痛;幼角(鹿茸):壮肾阳,益精血,强筋骨,调冲任,托疮毒。用于阳痿滑精,宫冷不孕,羸瘦,神疲,畏寒,眩晕,耳鸣,耳聩,腰脊冷痛,筋骨痿软,崩漏带下,阴疽不效。

备考 驯鹿的筋、肾、尾及鹿角胶、鹿角霜均入药,

功效见梅花鹿。

### 89403 牛科 Bovidae

#### 8940301

*Bos gaurus* H. Smith

动物名 野牛《动物图谱·兽》

药材名 牛黄《中药大辞典》

文献名 牯、野黄牛、“白袜子”《动物图谱·兽》

功效 肝胆结石;作牛黄用。

#### 8940302

*Bos grunniens* L. --- *Poephagus grunniens* (L.)

动物名 牦牛《山海经》、《动物图谱·兽》

药材名 牦牛角《纲目》、《中药大辞典》,酥油《纲目》

文献名 牦牛、牦牛《山海经》,犏牛、摩牛《尔雅》,毛犀《广志》,猫牛《汉书·颜师古注》,竹牛《昨梦录》,毛牛《水东日记》,犛牛、野牦牛《中国药用动物志》,牛犀、奶油、牦牛油《汇编》,牛黄《中药大辞典》

功效 角:清心解热,镇静,镇痉。用于高热神昏,惊狂谵妄,热毒入血分、营分,斑疹,痈疡,吐血,衄血;酥油(乳中炼出的脂肪):补五脏,益气血。用于肺痿咳嗽,吐血,消渴,缩小便,泽肌肤;肝胆结石;作牛黄用。

#### 8940303

*Bos taurus domesticus* Gmelin

动物名 牛《中国药用动物志》

药材名 牛黄《本经》、《药典》,牛角《本经》、《汇编》,牛胆《本经》、《中药大辞典》

文献名 牛髓《本经》,黄牛《说文》,牛肉、牛肝、牛齿、牛肾、牛脑、牛蹄、牛乳《别录》,牛喉咙《千金·食治》,牛涎《千金方》,牛肚、牛鼻、黄明胶《食疗本草》,牛面叶、牛口涎、牛肺、牛脾《本草拾遗》,水胶《外台秘要》,牛骨《日华子本草》,牛食系《圣惠方》,牛皮胶《图经》,黄牛肉《滇南本草》,震天膏《药性裁成》,牛血、牛肠《本草蒙筌》,牛肫、牛角胎、鲎草、牛转草、牛胞衣、牛角、牛脂、牛膈、牛蹄甲、牯牛卵囊《纲目》,犀黄《外科金生集》,胆黄、广胶、明胶《本经逢原》,牛筋《本草从新》,牛角笋《医林纂要》,牛菜、丑玄、丑宝、瞿卢折娜、阴兽当门《新纲》,肾经子《汇编》,天然牛黄《中药志》,西牛黄、西黄[产西北]、东牛黄、东黄[产东北]、京牛黄[产北京、天津]、金山牛黄[产美洲]、印度牛黄[产印度]《中药大辞典》

地方名 家牛、沙牛(山东、广西);内蒙古:“各一旺”、“西格格”、“乌呼热”(蒙名),牛羊草结,牛草结;陕西:土精;广西:黄沙牛;其他:蛋黄,卵黄,管黄,竹节黄,肝黄,粒黄,鸡屎黄,心黄,三原黄,关黄[产关中],京黄,澳洲黄、日本黄(产澳洲),金山黄,片黄,个黄,乌金黄[产加拿大、美国],印度黄,血黄,广黄,片广黄,个广黄,尖子黄,大片黄,小片黄,土牛黄,婆娑。

功效 胆结石(牛黄):清心,豁痰,开窍,凉肝,息风,解毒。用于热病神昏,中风痰迷,惊痫抽搐,癫病发狂,咽喉肿痛,口舌生疮,痈肿疔疮;牛角(牛角内部坚硬骨心):止血。用于血崩,便血,血痢,赤白带下;黄明胶(牛皮等提制的胶质):滋阴,止血。用于吐血,衄血,咯血,内脏出血;膀胱结石(肾精子):利尿;牛角(去掉角

腮):清热,凉血,解毒。用于温热病高烧头昏,吐血,血崩,疮毒;牛肉:补脾胃,益气血,强筋骨。用于虚损羸瘦,消渴,脾弱不运,痞积,水肿,腰膝酸软;牛血:理血,补中。用于便血,血痢,经闭,血虚羸瘦;牛肝:养血,补肝,明目。用于血虚萎黄,虚劳羸瘦,青盲,雀目;胃(牛肚):补虚,益脾胃。用于病后虚羸,气血不足,消渴,风眩;牛肠:厚肠。用于肠风痔漏;牛齿:用于小儿牛痫;牛肾:补肾气,益精;牛乳:补虚损,益脾胃,生津润肠。用于虚弱劳损,反胃噎膈,消渴,便秘;牛肺:补肺,止咳逆;牛骨(烧灰):用于吐血,鼻衄,崩中,带下,肠风,泻血,水泻;牛胆:清肝明目,利胆通肠,解毒消肿。用于风热目疾,黄疸,便秘,消渴,小儿惊风,痲肿,痔瘡;脂肪(牛脂):用于诸疮,疥癣,白秃;牛脑:用于头风眩晕,消渴,痞气;牛鼻:用于妇人无乳汁;甲状腺体(牛腐):用于喉痹,气壅;牛喉咙:用于反胃吐食;牛脾:健脾消积。用于消化不良,食积痞满;骨髓(牛髓):润肺,补肾,填髓。用于虚劳羸瘦,精血亏损,泄痢,消渴,跌打损伤,手足皸裂,唾涎;用于噎膈,反胃,呕吐;胃内草结块:镇静,降逆止呕。用于噎膈反胃,晕车晕船呕吐;胎盘(烧存性):外用用于瘰疬不敛;睾丸及阴囊(牯牛卵囊):用于疝气;牛蹄甲(烧灰):用于牛痫。外用用于瘰疬;研末贴脐:用于小儿夜啼;蹄筋:补肝强筋,益气力;肉熬炼成的膏(霞天膏):补气益血,健胃安中。用于虚劳羸瘦,中风偏废,脾虚痞积,消渴。

**备考** (1)牛黄价贵,多有伪品,如骆驼黄,马黄(广东黄),水牛黄(苏兴牛黄),以郁金粉、蒲黄或鸡子黄等与胶液的伪制品或以白泥和胆汁的炼合品等;(2)人工牛黄(机制牛黄):根据牛黄的主要成分配制而成,与天然牛黄不尽相同。

#### 8940304

*Bubalus bubalis* L.

**动物名** 水牛(纲目)、《药典》

**药材名** 水牛角《别录》、《药典》

**文献名** 牛角、牛胆、牛髓、牛黄《本经》,牛角、牛肉、牛肝、牛齿、牛肾、牛脑、牛蹄、牛乳《别录》,牛喉咙《千金·食治》,牛涎《千金方》,牛肚、牛鼻《食疗本草》,牛百叶、牛口涎、牛肺、牛脾《本草拾遗》,水胶《外台秘要》,牛骨《日华子本草》,牛食系《圣惠方》,牛皮胶《图经》,水牛肉、水牛连贴《滇南本草》,霞天膏《药性裁成》,牛血、牛肠《本草蒙筌》,牛肚、牛角胎、胎草、牛转草、牛胞衣、牛角、牛脂、牛膈、牛蹄甲、牛骨、牯牛卵囊《纲目》,犀黄《外科全生集》,胆黄、广胶、明胶《本经逢原》,牛筋《本草从新》,牛角笋《医林纂要》,土精、牛菜、丑玄、丑宝、鬻卢折娜、阴兽当门《新纲》,印度水牛《拉汉兽类名称》

**地方名** 内蒙古:牛羊结草;广西:家牛。

**功效** 水牛角(除去角塞):清热解暑,凉血定惊。用于温病高热,神昏谵语,发斑发疹,吐血衄血,惊风,癫狂;水牛皮:用于大腹浮肿,小便涩少;水牛尾:清热,凉血,解毒。用于热病头痛,壮热神昏,斑疹,吐衄,小儿惊风,喉痹咽肿;胆结石(牛黄):清心,豁痰,开窍,凉肝,息风,解毒。用于热病神昏,中风痰迷,惊痫抽搐,癫病发狂,咽喉肿痛,口舌生疮;牛角、牛角内坚硬骨心:止血。用于血崩,便血,血痢,赤白带下;明胶(牛皮等提制

的胶质):滋阴,止血。用于吐血,衄血,咯血,内脏出血;牛肉:补脾胃,益气血,强筋骨。用于虚损羸瘦,消渴,脾弱不运,痞积,水肿,腰膝酸软;牛血:理血,补中。用于便血,血痢,经闭,血虚羸瘦;牛肝:养血,补肝,明目。用于血虚萎黄,虚劳羸瘦,青盲,雀目;胃(牛肚):补虚,益脾胃。用于病后虚羸,气血不足,消渴,风眩;牛肠:厚肠。用于肠风痔漏;牛齿:用于小儿牛痫;牛肾:补肾气,益精;牛乳:补虚损,益脾胃,生津润肠。用于虚弱劳损,反胃噎膈,消渴,便秘;牛肺:补肺,止咳逆;牛骨(烧灰):用于吐血,鼻衄,崩中,带下,肠风,泻血,水泻;牛胆:清肝明目,利胆通肠,解毒消肿。用于风热目疾,黄疸,便秘,消渴,小儿惊风,痲肿,痔瘡;牛脑:用于头风眩晕,消渴,痞气;牛鼻:用于产后无乳汁;甲状腺体(牛腐):用于喉痹,气壅;牛喉咙:用于反胃吐食;牛脾:健脾消积。用于消化不良,食积痞满;骨髓(牛髓):润肺,补肾,填髓。用于虚劳羸瘦,精血亏损,泄痢,消渴,跌打损伤,手足皸裂,唾涎;用于噎膈,反胃,呕吐;胃内草结块:镇静,降逆止呕。用于噎膈反胃,晕车晕船呕吐;胎盘(烧存性):外用用于瘰疬不敛;睾丸及阴囊(牯牛卵囊):用于疝气;牛蹄甲(烧灰):用于牛痫。外用用于瘰疬;研末贴脐:用于小儿夜啼;蹄筋:补肝强筋,益气力,绝伤;肉熬炼成的膏(霞天膏):补气益血,健胃安中。用于虚劳羸瘦,中风偏废,脾虚痞积,消渴。

#### 8940305

*Capra hircus* L.

**动物名** 家山羊《拉汉兽类名称》

**药材名** 羊哀《辘轳录》,山羊血、羊角《汇编》

**文献名** 羖羊角《本经》,羊乳、羊心、羊肾、羊肺、羊骨、羊肉、羊齿、羊髓《别录》,山羊、羊胆《本草经集注》,羊肝《药性论》,羊肚、羊脂、羊脑、羊蹄肉《千金·食治》,羊胞《千金方》,羊血《唐本草》,羊胃(张文仲《随身备急方》),羊皮《食疗本草》,羊石子《本事方》,羊肾子《鸡峰普济方》,羊臊子、羊膈、羊肝、羊外肾、羊须、羊膜、羊肚脰《纲目》,羊腰子《本草述》,羊胎《本经逢原》,百草丹《纲目拾遗》,羊嚼子、羊咬子、山羊胃结石《汇编》,山羊胆《中国药用动物志》

**地方名** 内蒙古:“耶玛”(蒙名);湖北:羊子;广西:羊黄(陆川)。

**功效** 胃内草结(羊哀):降胃气,解毒。用于反胃吐食,噎膈噎气,解百草毒;羊心:解郁,补心。用于膈气,惊悸;羊皮(去毛):补虚劳。用于肺中虚风;羊肉:益气补虚,温中暖下。用于虚劳羸瘦,腰膝酸软,产后虚冷,腹疼,寒疝,中虚反胃;羊血:止血,祛瘀。用于吐血,衄血,肠风痔血,崩漏,产后血晕,外伤出血,跌打损伤;羊肝:益血,补肝,明目。用于血虚萎黄羸瘦,肝虚目暗昏花,雀目,青盲,翳障;胃(羊肚):补虚,健脾胃。用于虚劳羸瘦,不能饮食,消渴,盗汗,尿频;羊肾:补肾气,益精髓。用于肾虚劳损,腰脊疼痛,足膝痿弱,耳聋,消渴,阳痿,尿频,遗溺;羊乳:温润补虚。用于虚劳羸瘦,消渴,反胃,哕逆,口疮,漆疮;羊肺:补肺气,调水道。用于肺痿咳嗽,消渴,小便不利或频数;羊骨:补肾,强筋骨。用于虚劳羸瘦,腰膝无力,筋骨疼痛,白浊,淋痛,久泻,

久痢;山羊须;用于小儿口疮,小儿疳疮,羊须疮;羊胆:清火,明目,解毒。用于风热目赤,青盲,翳障,肺癆吐血,喉头红肿,黄痘,便秘,热毒疮疡;羊胎:调补肾虚羸瘦;羊胰:用于久咳,妇女带下;羊脂:补虚,润燥,祛风,化毒。用于虚劳羸瘦,肌肤枯焦,久痢,丹毒,癣疮;羊脑:用于风寒入脑,头痛久不愈。外用下润皮肤,去腐生肌,涂损伤,丹毒;山羊胆囊结石(羊黄):泻热,利痰,通窍,镇惊。用于风痰闭窍,痰火昏迷,热病谵妄,小儿惊痫。可代牛黄用;膀胱(羊脬):用于下虚遗尿;甲状腺体(羊膈):用于气瘰;羊髓(骨髓或脊髓):益阴补髓,润肺泽肌。用于虚劳羸弱,肺痿,骨蒸,咳嗽,消渴,皮毛憔悴,痈疽,疮疡,目赤,日翳;睾丸(羊外肾):补肾,益精,助阳。用于肾虚腰痛,遗精,带下,阳痿,消渴,小便频数,疝气,睾丸肿痛;羊蹄肉:补肾益精。用于肾虚劳损;雄羊的角(羴羊角):清热,镇惊,明目,解毒。用于小儿惊痫,风热头痛,烦闷,吐血,青盲,肿毒。

#### 8940306

*Capra ibex* L.

动物名 北山羊《动物图谱·兽》

药材名 山羊血、羊衰、山羊胆《中国药用动物志》

文献名 亚洲羴羊、悬羊、山羊《动物图谱·兽》,羴羊(拉汉兽类名称)

功效 山羊血:止血化瘀。用于跌打损伤,月经不调;胃结石(羊衰):降胃气,解毒。用于反胃吐食,噎膈,噎气等;山羊胆:清热解毒,明目退翳。用于青盲夜盲,喉头红肿等。

#### 8940307

*Capricornis sumatraensis* Bechstein

动物名 羴羚《动物图谱·兽》

药材名 羴羚角、羴羚骨《中国药用动物志》

文献名 羴羊《广志》,山驴《唐本草》,苏门羚、明鬃羊《动物图谱·兽》,山驴于《常见药用动物》,山驴骨《四川中药志》,各羴羚、[山羊]、石羊、岩羊《广西药用动物》

功效 角:清热解毒,平肝熄风。用于痼症,中风,小儿惊风,温热病等;骨骼:祛风,止痛。用于风湿肢节酸痛,麻木不仁。

#### 8940308

*Capricornis sumatraensis argyrochaetes* Heude

动物名 华南鬃羚《神农架药录》

药材名 山驴骨《神农架药录》

地方名 湖北:明鬃羊(神农架)。

功效 骨骼:祛风除湿,舒筋活络。

#### 8940309

*Gazella subgutturosa* Guldenstaedt

动物名 鹅喉羚《动物图谱·兽》

药材名 鹅喉羚角《中国药用动物志》

文献名 羚羊、长尾黄羊、驴尾黄羊《动物图谱·兽》

地方名 鹅喉羚羊(河北、内蒙古);内蒙古:“苏古勒图-古热斯”(蒙名),黑尾巴黄羊,长尾巴黄羊;其他:砂羊,羚羊角,砂羊角,九尾羊角,羴羊角,尖羚羊角,片羚羊角,莫河婆伽。

功效 角:清热解毒,平肝熄风。用于痼症,中风,

小儿惊风,温热病。

备考 有以黄羊角和其它羊角仿造,或用鱼鳔、松香伪制作假,亦有以羚羊与黄羊交配的仔代的角充代者。又有所谓紫羚羊角(黑羚羊角),全角呈紫黑色,一般不入药

#### 8940310

*Naemorhedus goral* Hardwicke

动物名 斑羚《动物图谱·兽》

药材名 青羊角《汇编》,青羊血《中国药用动物志》

文献名 青羊胆《别录》,野羊《字林》,山羊、山羊肉《日用本草》,山羊血《本草汇言》,山羊角《本草新编》,山羊油《纲目拾遗》,青羊《动物图谱·兽》

地方名 吉林:山羊肝;内蒙古:“耶曼-古热斯”、“呼和-耶玛”(蒙名),青山羊;广西:野山羊。

功效 角:镇静,退热,明目,止血。用于小儿惊痫,产后腹痛,痛经;青羊肝:用于夜盲;青羊胆(鲜汁):点眼。用于云翳;青羊血:活血散瘀,续筋接骨,止血。用于跌打损伤,筋骨疼痛,月经不调,崩漏下血,吐血,咯血;肉:补虚助阳。用于虚劳内伤,筋骨痹弱,腰脊酸软,阳痿,带下,不孕;脂肪油:用于心疝。

#### 8940311

*Naemorhedus goral arnouxiensis* (Heude)

动物名 华南斑羚《神农架药录》

药材名 山羊角、山羊油《神农架药录》

地方名 湖北:麻羊子(神农架)。

功效 山羊角:镇静,退热,明目,止血;山羊油:用于心疝。

#### 8940312

*Ovis ammon* L.

动物名 盘羊《动物图谱·兽》

药材名 盘羊角(拟)

文献名 山羊血《日用本草》,大角羊、羴羊《动物图谱·兽》,盘角子《中国药用动物志》

地方名 内蒙古:“浩您-古热斯”、“乌嘎勒扎”[公羊]、“阿日嘎拉”[母羊](蒙名),大头羊,蟠羊。

功效 角:解热。用于传染病引起的发烧;肺:调经止痛。用于月经不调引起的小腹痛;睾丸:滋补,壮阳。用于体弱肾虚,阳痿。

#### 8940313

*Ovis aries* L.

动物名 绵羊《纲目》、《中国药用动物志》

药材名 羴羊角《本经》、《中药大辞典》

文献名 羊乳、羊心、羊肾、羊肺、羊骨、羊肉、羊齿、羊髓《别录》,羊胆《本草经集注》,羊肝《药性论》,羊肚、羊脂、羊脑、羊蹄肉《千金·食治》,羊胞《千金方》,羊血《唐本草》,羊皮《食疗本草》,羊石子《本事方》,羊膈、羊脬、羊外肾、羊胰《纲目》,羊腰子《本草述》,羊胎《本经逢原》,绵羊肝《汇编》,羊角《药典》附录

地方名 内蒙古:“浩你”(蒙名)。

功效 雄羊的角(羴羊角):清热,镇惊,明目,解毒,用于小儿惊痫,风热头痛,烦闷,吐血,青盲,肿毒;羊心:解郁,补心。用于膈气,惊悸;羊皮(去毛):补虚



劳。用于肺中虚风；羊肉：益气补虚，温中暖下。用于虚劳羸瘦，腰膝酸软，产后虚冷，腹疼，寒疝，中虚反胃；羊血：止血，祛瘀。用于吐血，衄血，肠风痔血，崩漏，产后血晕，外伤出血，跌打损伤；羊肝：益血，补肝，明目。用于血虚萎黄羸瘦，肝虚目暗昏花，雀目，青盲，翳障；胃（羊肚）：补虚，健脾胃。用于虚劳羸瘦，不能饮食，消渴，盗汗，尿频；羊肾：补肾气，益精髓。用于肾虚劳损，腰脊疼痛，足膝痿弱，耳聋，消渴，阳痿，尿频，遗溺；羊乳：温润补虚。用于虚劳羸弱，消渴，反胃，啰逆，口疮，漆疮；羊肺：补肺气，调水道。用于肺痿咳嗽，消渴，小便不利或频数；羊骨：补肾，强筋骨。用于虚劳羸瘦，腰膝无力，筋骨疼痛，白浊，淋痛，久泻，久痢；羊胆：清火，明目，解毒。用于风热目赤，青盲，翳障，肺癆吐血，喉头红肿，黄疸，便秘，热毒疮疡；羊胎：调补肾虚羸瘦；羊膜：用于久咳，妇女带下；羊脂：补虚，润燥，祛风，化毒。用于虚劳羸瘦，肌肤枯槁，久痢，丹毒，癣疮；羊脑：用于风寒入脑，头痛久不愈。外用于润皮肤，去黥黯，涂损伤，丹毒；膀胱（羊脬）：用于下虚遗尿；甲状腺体（羊膈）：用于气瘰；羊髓（骨髓或脊髓）：益阴补髓，润肺泽肌。用于虚劳羸弱，肺痿，骨蒸，咳嗽，消渴，皮毛憔悴，痈疽，疮疡，目赤，目翳；睾丸（羊外肾）：补肾，益精，助阳。用于肾虚腰痛，遗精，带下，阳痿，消渴，小便频数，疝气，睾丸肿痛；羊蹄肉：补肾益精。用于肾虚劳损。

## 8940314

*Pantholops hodgsoni* Abel

动物名 藏羚《动物图谱·兽》

药材名 西藏羚羊角（拟）

文献名 羚羊《中国药用动物志》，一角兽《动物图谱·兽》，西藏羚羊《鉴别手册》

功效 角：清热解毒，消肿。用于胃炎，甲状腺肿大；血：止泻。

## 8940315

*Procapra gutturosa* Pallas

动物名 黄羊《动物图谱·兽》

药材名 黄羊角《汇编》，黄羊肉《饮膳正要》、《中药大辞典》

文献名 羴羊《尔雅》，羴耳羊《纲目》，黄羊油《吉林中草药》，黄砂羊《鉴别手册》，蒙古原羊、短尾巴黄羊《中国药用动物志》

地方名 内蒙古：“哲格热”（蒙名），蒙古黄羊，蒙古

随羚，蒙古原羚，瞪羚；湖北：岩羊子（神农架）。

功效 牡羊的角：平肝熄风，清热解毒。用于小儿感冒发热，小儿惊风，中风，温病发热；肉：补中益气，用于劳伤，虚寒；黄羊油：用于痔疮。

## 8940316

*Procapra picticaudata* Hodgson

动物名 原羚《动物图谱·兽》

药材名 原羚角《中国药用动物志》

文献名 小羚羊、西藏黄羊、西藏原羚《动物图谱·兽》，藏原羚、藏黄羊《拉汉兽类名称》，〔羚羊角〕《中国动物药》

功效 角：清热解毒，平肝熄风。用于痢症，中风，小儿惊风，温热病。

## 8940317

*Procapra przewalskii* Buchner

动物名 普氏原羚《拉汉兽类名称》

药材名 原羚角《中国药用动物志》

文献名 滩黄羊《中国药用动物志》

功效 角：清热解毒，平肝熄风。用于痢症，中风，小儿惊风，温热病。

## 8940318

*Pseudois nayaaur* (Hodgson)

动物名 岩羊《动物图谱·兽》

药材名 青羊角（拟）

文献名 青羊、半羊、石羊《中国药用动物志》，崖羊《拉汉兽类名称》

地方名 内蒙古：“杨格日·耶玛”（蒙名），石山羊。

功效 角：清热解毒。用于发烧，肠胃脓肿等。

## 8940319

*Saiga tatarica* L.

动物名 赛加羚羊《中药志》

药材名 羚羊角《本经》、《药典》

文献名 零羊角《本经》，羚羊肉《本草拾遗》，羚羊《新纲》，高鼻羚羊《中国药用动物志》，大鼻羚、大枝羚羊角、小枝羚羊角、青条、阴山羚羊、大头鬼、紫羚羊、老臂柴《鉴别手册》，高鼻羚、猪鼻羚羊《动物图谱·兽》

功效 角：平肝熄风，清肝明目，散血解毒。用于高热惊痫，神昏痉厥，子痫抽搐，癫痫发狂，头痛眩晕，目赤翳障，温毒发斑，痈肿疮毒；肉：用于筋骨急强，中风，蛇咬伤，恶疮。

## 九、矿物类

### （一）主含金属元素类

#### 9101 银(Ag) Argentum

9101001

Argentum Natura --- Native silver \*

矿物名 自然银《中国矿物药》

药材名 银箔《本草蒙筌》、《中药大辞典》

文献名 银、修《尔雅》，鑒《说文》，阿路巴《梵书》，银屑《别录》，银薄《药性论》，生银《开宝本草》，银牙、白金

《纲目》,“恶”(藏名)《中国药学杂志》

功效 银箔:有毒。安神,镇惊,祛风热。用于癫痫,心悸恍惚,夜不安寐,明日,安胎,解热,解毒。

备考 本品为用自然银(Ag)锤成的纸状薄片。

## 9102 铝(Al) Aluminium

### 9102001

Alumen --- Alunite \*

矿物名 明矾石《石药尔雅》、《药典》

药材名 白矾《雷公炮炙论》、《药典》,枯矾《金匱要略》、《药典》

文献名 白矾:石涅《山海经》,涅石、矾石、羽涅《本经》,羽泽《吴普本草》,理石《药性论》,白君、明矾、雪矾、云母矾、生矾《纲目》,马齿矾《中国矿物药》,白肌、生明肌、明石、阿石、镇风石、硫酸铝钾、钾明矾《中药名汇》;枯矾:巴石《煅枯者》,柳絮矾《轻白者》《纲目》,无水明矾《中国矿物药》,“嘎擦”(藏名)《中国药学杂志》

功效 明矾:止血止泻,祛除风痰。用于久泻不止,便血,崩漏,癫痫发狂;外用:解毒杀虫,燥湿止痒。用于湿疹,疥癣,脐耳流脓;枯矾:收湿敛疮止血化腐。用于湿疹湿疮,脐耳流脓,阴痒带下,鼻衄齿衄,鼻息肉。

备考 1.明矾石为硫酸盐类矿物。白矾主为含水硫酸铝钾 $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ 枯矾由白矾脱水而成,主为无水硫酸铝钾 $KAl(SO_4)_2$ ;2.《青藏药用矿物》的“明矾石”主要为碱性硫酸铝钾 $KAl_3(SO_4)_2(OH)_6$ ,以含水硫酸铝钾 $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ 作钾明矾(明矾、白矾),功效同。

### 9102002

Chrysoberyl \*

矿物名 金绿宝石《英汉矿物名称》

药材名 猫睛石《矿物性中药之研究》

文献名 猫儿眼、猫眼睛《矿物性中草之研究》,猫眼石、金绿猫眼石《迪庆藏药》,“蝎莫”(藏名)《中国药学杂志》

功效 猫睛石:解虫毒。

备考 本品主要成分为 $BeAl_2O_4$

### 9102003

Ruby \* --- Ruber \*

矿物名 红宝石《英汉矿物名称》

药材名 红宝石《迪庆藏药》

文献名 “拜若”(藏名)《中国药学杂志》

功效 红宝石:用于麻风,癫痫,中风,精神分裂症。

备考 红宝石为 $Al_2O_3$ ,为由国外进口者。

### 9102004

sapphire \*

矿物名 蓝宝石《英汉矿物名称》

药材名 蓝宝石《迪庆藏药》

文献名 “恶扎拉”(藏名)《中国药学杂志》

功效 宝石:用于三邪病。

备考 本品为铝类化合物( $Al_2O_3$ )。

### 9102005

Sapphirum Stellatum --- Star sapphire \* --- Xing-guanglanbaoshi \*\*

药材名 星光蓝宝石《中国药学杂志》

文献名 “拜马若嘎”(藏名)《中国药学杂志》

功效 宝石:用于三邪病。

备考 主成分为 $Al_2O_3$ 。

### 9102006

Turquoise \* --- Songershi \*\*

药材名 松儿石《中国药学杂志》

文献名 绿松石、松耳石、松石《迪庆藏药》,“也”(藏名)《中国药学杂志》

功效 松儿石:用于中毒及肝热症。

备考 本品为铝类化合物 $[CuAl_6(PO_4)_4(OH)_8 \cdot 5H_2O]$

## 9103 金(Au) Aurum

### 9103001

Aurum Natura --- Native gold \*

矿物名 自然金《中国矿物药》

药材名 金箔《本草蒙筌》、《中药大辞典》

文献名 金屑《别录》,生金、太真《本草经集注》,黄金屑、金薄《药性论》,金浆《本草拾遗》,苏伐罗《梵书》,“色儿”(藏名)《中国药学杂志》

功效 金箔:有毒。镇心,安神,解毒。用于惊痫,癫狂,心悸,疮毒。

备考 本品为黄金(Au)锤成的纸状薄片。

### 9103002

Jinyinkuangshi \*\*

矿物名 金银矿石《中国药学杂志》

药材名 “色斗”(藏名)《中国药学杂志》

功效 金银矿石:延年益寿,解宝石中毒。

备考 本品主成分为金(Au)。

## 9104 钡(Ba) Baryum

### 9104001

Barytum --- Baryte \*

矿物名 重晶石《青藏药用矿物》

药材名 硫酸钡《青藏药用矿物》

功效 硫酸钡:用作胃肠的伦琴射线的检查,诊断胃肠的一些疾病。

备考 重晶石主要为硫酸钡( $BaSO_4$ ),常含有少许钙、铝、粘土及有机物。加工后可得硫酸钡结晶。

## 9105 铋(Bi) Bismuthum

### 9105001

Bismuthinitum --- Bismuthinite \*

矿物名 辉铋矿《青藏药用矿物》

药材名 锡吝脂《本草纲目》

文献名 悉菌脂《纲目》,铋制剂《青藏药用矿物》

功效 铋剂:防腐,收敛,止泻。用于湿疹,腹泻,

胃肠溃疡,妇女哺乳期间乳头溃裂,婴儿肚脐潮湿并微

有溃烂、梅毒。

备 考 辉铋矿主含三硫化二铋( $\text{Bi}_2\text{S}_3$ )。

## 9106 钙(Ca) Calcium

### 9106001

Anhydritum --- Anhydrite \*

矿物名 硬石膏《纲目》、《英汉矿物名称》

药材名 长石《本经》、《中药大辞典》

文献名 方石《本经》、瓦石、上石《吴普本草》、白长石、“嘎布切特”(藏名)《中国药理学杂志》

功 效 矿石：利小便，止水渴，通血脉，明目，去翳眇。用于胃中结气，消渴，下气，除肺助肺间邪气。

备 考 本品为硫酸盐类矿物，主含无水硫酸钙 $[\text{CaSO}_4]$ 。

### 9106002

Aragonitum --- Aragonite \*

矿物名 文石《青藏药用矿物》

药材名 青藏寒水石(拟)

文献名 寒水石《青藏药用矿物》，“君西”(藏名)《中国药理学杂志》

功 效 青藏寒水石：清热降火，除烦止渴，消肿利水。用于时行热病烦渴，水肿，尿闭，丹毒，烫伤。

备 考 文石是碳酸钙( $\text{CaCO}_3$ )的不稳定变体，常转变为方解石，故远较方解石为少。

### 9106003

Calcaren --- Limestone \*

矿物名 石灰岩《矿物学》

药材名 石灰《本经》、《中药大辞典》

文献名 恶灰《本经》，希灰《别录》，石恶《本草经集注》，染灰、散灰、白灰、味灰《石药尔雅》，锻石《日华子本草》，石锻《图经》，矿灰、白虎《纲目》，生石灰、熟石灰、消石灰《中药大辞典》，石灰石、青石《矿物药与丹药》，风化石灰、石灰冰《青藏矿物药》，陈石灰《神农架药录》

功 效 石灰：燥湿，杀虫，止血，定痛，蚀恶肉。用于疥癣，湿疮，创伤出血，水火烫伤，痔疮，脱肛，赘疣。内服止泻痢，崩带。

备 考 石灰岩主要为碳酸钙( $\text{CaCO}_3$ )，常见夹杂物为氧化硅、铁、镁、铝等。石灰岩经煅烧成生石灰(氧化钙 $\text{CaO}$ )。生石灰遇水成熟石灰(氢氧化钙 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ )。熟石灰久置空气中成陈石灰或风化石灰(碳酸钙)，熟石灰的澄清液上之浮冰状物称石灰冰，均作药用。

### 9106004

Calcareous sinter \*

矿物名 石灰华《英汉矿物名称》

药材名 石灰华《汇编》

文献名 久康《汇编》，“结纲”(藏名)《中国药理学杂志》

功 效 粉状块：清热补肺。用于各种肺热病。

备 考 本品由水溶解岩石沉积而成的主含碳酸钙的粉状块。

### 9106005

Calcitum --- Calcite \* --- calcspar \*

矿物名 方解石《中国矿物药》

药材名 方解石《别录》、《中国矿物药》

文献名 黄石《别录》，冰洲石《中国矿物药》，“著屋嘎布”(藏名)《中国药理学杂志》

地方名 〔寒水石〕(华东、中南、西南)；四川：分解石。

功 效 矿石：用于胸中留热结气，黄疸，通血脉，去蛊毒。

备 考 1. 方解石为碳酸盐类矿物，主含碳酸钙( $\text{CaCO}_3$ )，常含有锰、镁、铁和微量的锶、锌、钡等。2. 据李时珍考证，自唐本草以下，如苏敬、苏颂、寇宗奭、陶孝忠四家所说寒水石，实系软石膏，而王隐君所述者为方解石。3. 今华东、中南、西南等地区销售的寒水石为方解石。

### 9106006

Creta --- Chalk \*

矿物名 白垩《中药大辞典》

药材名 白垩《本经》、《中药大辞典》

文献名 白涂《说文》，白蜡《吴普本草》，白善《别录》，白垩上、白土粉、白土子《本草衍义》，白土、画粉《纲目》，白垩土、白粉土《中国矿物药》

功 效 白垩：温中，涩肠，止血，敛疮。用于反胃，泻痢，吐血，衄血，眼弦赤烂，赘疮。

备 考 本品为沉积岩类岩石，主要为无晶形碳酸钙( $\text{CaCO}_3$ )。

### 9106007

Dolocitum --- Dolomite \*

矿物名 白云石《青藏药用矿物》

药材名 白云石《青藏药用矿物》

功 效 矿石：化瘀止血。用于吐血，衄血，便血，崩漏，产后血晕，死胎，胞衣不下，金疮出血。

备 考 白云石是钙、镁碳酸盐类矿石，主要为碳酸钙和碳酸镁( $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$ )。

### 9106008

Glauberitum --- Glauberite \*

矿物名 钙芒硝《中国矿物药》

药材名 玄精石《纲目》、《药材学》

文献名 太阴玄精《开宝本草》，太阴玄精石《本草衍义》，太乙玄精石、阴精石、玄英石《纲目》，龟背玄精石《中药志》，钙芒硝质玄精石《中国矿物药》

功 效 玄精石：滋阴降火，软坚，消痰。用于阳盛阴虚，壮热烦渴，头风脑痛，目赤障翳，重舌，木舌，咽喉生疮。

备 考 1. 本品原矿物以钙芒硝为主，杂有粘土矿物及石膏等，主含硫酸钠、硫酸钙( $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{CaSO}_4$ )。2. 《医林纂要》谓玄精石“略同朴硝”，盖指本品而言。

### 9106009

Gypsum

矿物名 石膏《药典》

药材名 石膏《本经》、《药典》

文献名 细石《别录》，软石膏《本草衍义补遗》，细理石、〔寒水石〕《纲目》，白虎《药品化义》，大石膏、冰石《中药志》，生石膏、煅石膏《药典》，中理石、直石、土石、石膏碱、玉灵片《中药名汇》

功效 生石膏：清热泻火，解肌发汗，除烦止渴。用于外感热病，高热烦渴，肺热喘咳，胃火亢盛，头痛，牙痛；煅石膏：生肌，敛疮，止血。外用于溃疡不敛，湿疹瘙痒，水火烫伤，外伤出血。

备考 石膏为硫酸盐类矿物，为主含二水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）的纤维状或块状结晶之集合体；煅石膏主为无水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4$ ）。

#### 9106010

Gypsum Fibrosum

矿物名 纤维石膏《中药大辞典》

药材名 理石《本经》、《中药大辞典》

文献名 立制石《本经》，肌石《别录》，长理石《本草经集注》，“导引”（藏名）《中国药学杂志》

功效 理石：清热，除烦，止渴。用于发热烦渴，咽喉肿痛，口舌生疮，牙痛，小便不利。外用于烧烫伤。

备考 1. 理石为硫酸盐类矿物石膏中的纤维石膏，主含二水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ），常与硬石膏（ $\text{CaSO}_4$ ）相伴生。所含微量元素与石膏、长石有所不同；2. 《纲目》云：软石膏中“明洁，色带微青，而文长细如白丝者，名理石也。与软石膏乃一物二种。”

#### 9106011

Gypsum Rubrum --- Red gypsum \*

矿物名 红石膏《中药志》

药材名 北寒水石（拟）

文献名 寒水石《中药志》

功效 北寒水石：清热降火，除烦止渴。用于壮热烦渴，口干舌燥，牙痛，小便不利等症。

备考 1. 寒水石原名凝水石，载于《神农本草经》，李时珍认为凝水石既非石膏之类，更非方解石之属。《中药志》（1961年）认为其性状、产地，似为天然的芒硝结晶；另据《中药材》报道，本草之寒水石主为白钠镁矾（ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ）2. 根据李时珍的考证，自唐本草以下，如苏敬、苏颂、寇宗奭、阎孝忠四家所谈寒水石，实系软石膏，而王隐君所述者为方解石；3. 今北京、天津、山东、辽宁、内蒙古、山西、甘肃等地销售的寒水石即红石膏。

#### 9106012

Loess \*

矿物名 黄土《中药大辞典》

药材名 黄土《本草经集注》、《中药大辞典》

文献名 好土《本草拾遗》，好黄土《东医宝鉴》

功效 黄土：和中解毒。用于中暑吐泻，痢疾，痢疽肿毒，跌扑损伤。

备考 本品为第四纪陆相沉积物。我国西北和华北等地广泛分布。本品富含钙盐及钙质结核。

#### 9106013

Opicalcitem --- Opicalcite \*

矿物名 蛇纹大理岩《药典》

药材名 花蕊石《嘉祐本草》、《药典》

文献名 花乳石《嘉祐本草》，白云石《汇编》，鸩粪石《矿物学》，含蛇纹大理岩《中药志》

功效 矿石：化瘀止血。用于咯血，吐血，外伤出血，跌扑伤。

备考 花蕊石为含蛇纹石多少不等的大理岩，其中晶莹的白点是方解石颗粒（ $\text{CaCO}_3$ ），黄色花纹是蛇纹石（ $\text{Mg}_6[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{H}_2\text{O})_2$ ）。

#### 9106014

Selenitum --- Selenite \*

矿物名 透石膏《矿物学》

药材名 玄精石《纲目》、《中药大辞典》

文献名 太阴玄精《开宝本草》，太阴玄精石《本草衍义》，太乙玄精石、阴精石、玄英石《纲目》，龟背玄精石《中药志》，透明石膏、盐根、明石膏、透日生石膏《中药名汇》，石膏质玄精石《中国矿物药》

功效 玄精石：滋阴降火，软坚，消痰。用于阳盛虚，壮热烦渴，头风脑痛，目赤障翳，重舌，木舌，咽喉生疮。

备考 1. 本品为年久所积的小形片状石膏矿石。主含含水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）；2. 玄精石，有异物同名品，但市售品多为此种；3. 《中国矿物药》（1988）认为：石膏质玄精石（杭州市售品），虽有较多量镁并可溶出而不同于石膏，但无钠，不具备“略同朴硝”的疗效，实属误用。从疗效看，玄精石原矿物应以钙芒硝（ $\text{Na}_2\text{Ca}[\text{SO}_4]_2$ ）为主。

#### 9106015

Stalactitum --- Stalactite \*

矿物名 钟乳石《英汉矿物名称》

药材名 钟乳石《本草崇原》、《药典》

文献名 石钟乳、殷孽、姜石《本经》，孔公孽、钟乳、虚中、夏《吴普本草》，公乳、芦石、夏石、通石、石脑、石饴饼《别录》，黄石砂《药性论》，石床、石花《唐本草》，卢布、夏乳根《石药尔雅》，石芝、化公石《纲目》，石笋《矿物性中药之研究》，乳石、石乳、石钟、石中乳、石栏干、石灰石、钟入石、钟石、竹乳、灵公乳《中药名汇》

地方名 湖北：岩浆石（神农架）。

功效 钟乳石：温肺，助阳，平喘，制酸。用于寒痰喘咳，阳虚冷喘，腰膝冷痛，胃痛泛酸，乳汁不通。

备考 1. 钟乳石为方解石类矿物中的一种钟乳状集合体，主含碳酸钙（ $\text{CaCO}_3$ ）；2. 我国医学上将钟乳石分为“石乳”、“竹乳”、“鹅管石”、“殷孽”、“孔公孽”、“石床”、“石脑”等大多系按外形差异而命名。

#### 9106016

Stalactitum Tubuliforme

矿物名 鹅管钟乳石《中药大辞典》

药材名 鹅管石《纲目》、《中药大辞典》

文献名 通石、芦石《别录》，虚中《吴普本草》，滴乳石《中药大辞典》

功效 鹅管石：温肺，助阳，平喘，制酸。用于寒痰喘咳，阳虚冷喘，腰膝冷痛，胃痛泛酸，乳汁不通。

备考 本品为钟乳石的细长尖端部分，主含碳酸

钙( $\text{CaCO}_3$ )。

### 9107 铜(Cu) Cuprum

#### 9107001

Atacamitum --- Atacamite \*

矿物名 氯铜矿《中国矿物药》

药材名 绿盐《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 石绿《海药本草》, 盐绿《纲目》, 绿胆《青藏药用矿物》

功效 矿石: 外用于眼目生翳, 赤涩昏暗, 泪多眵多。

备考 本品主要为碱式氯化铜( $2\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ , 或作  $\text{CuCl}_2 \cdot 3\text{Cu}(\text{OH})_2$ )。

#### 9107002

Aurichalum

药材名 黄铜《中国药杂志》

文献名 “渴儿哇”(藏名)《中国药杂志》

功效 黄铜: 用于眼病, 癰, 疔疮。

备考 本品为铜化物类( $\text{Cu}:\text{Zn}$  为 3:1)。

#### 9107003

Azuritum --- Azurite \*

矿物名 蓝铜矿《中国矿物药》

药材名 扁青、曾青、空青《本经》、《中药大辞典》

文献名 扁青: 白青《本经》, 碧青《唐本草》, 石青、大青《纲目》; 曾青: 朴青《石药尔雅》, 层青《造化指南》, 被膜状蓝铜矿《中国矿物药》; 空青: 青油羽、青神羽《石药尔雅》, 杨梅青《图经》

功效 矿石呈短柱状或板状晶体者(扁青): 有小毒。祛痰, 催吐, 破积, 明目。用于风痰癰, 惊风, 目痛, 目翳, 创伤, 痈肿; 矿石呈层状者(曾青): 明目, 镇惊, 杀虫。用于风热目赤, 疼痛, 涩痒, 眵多赤烂, 头风, 惊痫, 风痹; 矿石呈球形或中空者(空青): 明目, 去翳, 利窍。用于青盲, 雀目, 翳膜内障, 赤眼肿痛, 中风口喎, 手臂不仁, 头风, 耳聋。

备考 蓝铜矿为碳酸盐类矿物, 主要成分为碱式碳酸铜( $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ )。

#### 9107004

Bornitum --- Bornite \*

矿物名 斑铜矿《中药大辞典》

药材名 紫铜矿《药性考》、《中药大辞典》

功效 矿石: 镇心利肺, 降气坠痰。火煨末用, 可蜿蜒筋骨折伤。

备考 本品主成分为  $\text{Cu}_5\text{FeS}_4$ 。

#### 9107005

Chalcanthitum --- Chalcanthite \*

矿物名 胆矾《中国矿物药》

药材名 胆矾《品汇精要》、《中药大辞典》

文献名 石胆、毕石《本经》, 黑石、铜勒《吴普本草》, 墨石、棋石《别录》, 君石《李当之《药录》》, 立制石《本草经集注》, 石液、制石液《石药尔雅》, 鸭嘴胆矾《济生方》, 翠胆矾《本草蒙筌》, 蓝矾《中药材手册》, 云胆矾《药材学》, 青石于、丹矾、石矾、铜黄、硫酸铜、硫酸铜矿

《中药名汇》, “拜办”(藏名)《中国药杂志》

功效 胆矾: 有毒。催吐, 祛腐, 解毒。用于风痰壅塞, 喉痹, 癰, 牙疳, 口疮, 烂弦风眼, 痔疮, 肿毒。

备考 本品为硫酸盐矿物或为人工制成的含水硫酸铜。主含硫酸铜( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )。

#### 9107006

Chitongxie \*\*

药材名 赤铜屑《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 熟铜末《圣惠方》, 铜末《朝野金载》, 铜落、铜花、铜砂《纲目》, 红铜末《本草汇言》

功效 赤铜屑: 用于筋骨折伤, 外伤出血, 烂弦风眼, 狐臭。

备考 本品为煅铜时打落的铜屑, 主要成分为金属铜, 在空气中受水蒸气、氧气、二氧化碳的作用, 表面上常被覆着微量的碳酸铜、氧化铜等物质。

#### 9107007

Cupropyratum --- Cupropyrite \* --- Chalcoppyrite \*

矿物名 黄铜矿《英汉矿物名称》

药材名 自然铜《雷公炮炙论》、《中国矿物药》

文献名 石髓铅《雷公炮炙论》, 铜矿石《品汇精要》, 红铜、“桑”(藏名)《中国药杂志》

功效 矿石: 散瘀, 接骨, 止痛。用于跌扑肿痛, 筋骨折伤。

备考 1. 黄铜矿为富含铁、铜的硫化物矿物, 主含含铁硫化铜( $\text{CuFeS}_2$ ), 在自然界常与黄铁矿共存; 2. 自然铜的原矿物一说为黄铁矿( $\text{FeS}_2$ ), 一说为黄铜矿( $\text{CuFeS}_2$ )。《中国矿物药》(1988)认为: 黄铁矿和黄铜矿两者在自然界是共生矿物(共存于一块矿石之中), 不论是黄铁矿或黄铜矿均有多种金属离子和一些微量元素混入, 其散溶成分都含有铁、铜, 只是铁和铜的量比差不同而已。而铁、铜均为人体造血的重要成分, 内服可促进骨髓及其周围血液中网状血球和血色素增生, 促进外伤愈合。故铜、铁均为自然铜的复方里不可缺少的成分。原作者认为自然铜应是含铁及铜的硫化物矿物。黄铜矿若有分析结果查明无毒性成分, 则这种富含铜、铁的硫化物, 更有利于体现自然铜原方原药的效果。

#### 9107008

Malachitum --- Malachite \*

矿物名 孔雀石《中国矿物药》

药材名 绿青《别录》、《中药大辞典》

文献名 铜青《抱朴子》, 石绿《唐本草》, 石碌《本草衍义》, 铜绿、大绿《纲目》, 青铜《本草求真》, 铜锈《中药大辞典》, 铜醋矾、西碌《中药名汇》, “玛儿根”(藏名)《中国药杂志》

功效 绿青: 有毒。退翳, 去腐, 敛疮, 杀虫, 吐风痰。用于目翳, 烂弦风眼, 疽, 痔, 恶疮, 喉痹, 牙疳, 廉疮, 顽癣, 风痰卒中。

备考 1. 孔雀石为碳酸盐类矿物, 主要为碱式碳酸铜( $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ ); 2. 古代医学家认为绿青即铜锈, 也有用醋喷洒在铜上, 使其加快生成绿色锈, 待成, 刮下, 研细即可。近代多用其加工品。

## 9107009

## Qingtong \*\*

- 药材名 青铜《中国药学杂志》  
文献名 “渴儿哇”(藏名)《中国药学杂志》  
功效 青铜:用于眼病,癬,疳疮。  
备考 本品为铜化合物类[Cu:Sn为7:1]。

## 9107010

## Xiangtong \*\*

- 药材名 响铜《中国药学杂志》  
文献名 “勒”(藏名)《中国药学杂志》  
功效 响铜:用于眼病。  
备考 本品为铜化合物(Cu:Sn为6:1)。

## 9108 铁(Fe) Ferrum

## 9108001

## Ferrum --- Iron \*

- 矿物名 铁《青藏药用矿物》  
药材名 铁《本经》、《中药大辞典》  
文献名 黑金《说文》,生铁《别录》,铄铁《熟铁》《唐本草》,乌金《纲目》,“借”(藏名)《中国药学杂志》,生铁落《青藏药用矿物》  
功效 铁:镇心平肝,消痈解毒。用于惊痫,癫狂,痈毒。  
备考 本品基原包括生铁、熟铁、钢铁三种,由赤铁矿、褐铁矿、磁铁矿等炼出。

## 9108002

## Fibroferritum --- Fibroferrite \*

- 矿物名 纤铁矾《英汉矿物名称》  
药材名 黄矾《唐本草》、《中药大辞典》  
文献名 金线矾《海药本草》,鸡矢矾《本草蒙筌》,“色策儿”(藏名)《中国药学杂志》  
功效 黄矾:有毒。疗疮生肉。用于痔瘻,恶疮,疥癬。  
备考 黄矾为硫酸盐类矿物,主含十个结晶水的硫酸铁( $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )。

## 9108003

## Goethitum --- Goethite \*

- 矿物名 针铁矿《青藏药用矿物》  
药材名 针铁矿赭石(拟)  
文献名 代赭石《青藏药用矿物》,无丁头代赭石《中国矿物药》,“嘎布巴佳”(藏名)《中国药学杂志》  
功效 针铁矿赭石:平肝镇逆,凉血止血。用于肝阳上亢,头晕胀痛,噎气呃逆,噎膈反胃,喘逆,吐血衄血,肠风便血,妇人崩漏带下,小儿惊痫诸症。  
备考 本品主要成份为碱式氧化铁( $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{FeO}(\text{OH})$ )。与赤铁矿基本相同。经煅后,除去结晶水,可作为代赭石入药。

## 9108004

## Haematitum --- Hematite \* --- Blood stone \*

- 矿物名 赤铁矿《石药尔雅》、《药典》  
药材名 代赭石《纲目》、《中药大辞典》  
文献名 代赭、须丸《本经》,赤土《说文》,血师《别

录》,赤石《唐本草》,钉头代赭《图经》,土朱《仁斋直指方》,赭石、紫朱《普济方》,铁朱《纲目》,红石头《河北药材》,赤赭石《四川中药志》,钉头赭石、老式赭石、钉赭石、新式赭石、卵状赭石《中药志》,“嘎布巴佳”(藏名)《中国药学杂志》,大赭石、朱石、血石、镜铁、赭铁矿、红色铁矿、丁赭石《中药名汇》

地方名 湖北:红砂石;四川:生赭石。

功效 石块或粗粉:平肝潜阳,降逆,止血。用于眩晕耳鸣,呕吐,噎气,呃逆,喘息,吐血,衄血,崩漏下血。

备考 赤铁矿为氧化物类矿石,主含三氧化二铁( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )。

## 9108005

## Limonitum --- Limonite \*

- 矿物名 褐铁矿《中药志》  
药材名 禹馀粮《本经》、《中药大辞典》  
文献名 太馀粮、石脑《本经》,禹哀、太一禹馀粮《吴普本草》,白馀粮《别录》,石中黄子、石中黄《重刊本草衍义》,馀粮石、太乙馀粮《矿物药与丹药》,禹粮石《中药志》,于良石、余粮、粮石、良石、棕铁矿、朱铁矿、棕色铁矿、黄土铁、自然谷《中药名汇》,“色那洪若”(藏名)《中国药学杂志》  
功效 矿石:涩肠止泻,止血。用于久泻久痢,便血,脱肛,妇女崩漏带下。  
备考 本品为褐铁矿矿石,主成分为三氧化二铁( $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ )。

## 9108006

## Magnetitum --- Magnetite \*

- 矿物名 磁铁矿《石药尔雅》、《药典》  
药材名 磁石《吴普本草》、《药典》  
文献名 玄石、慈石《本经》,磁君《吴普本草》,处石《别录》,元武石《石药尔雅》,雄磁石、灵磁石《海药本草》,瓷石《太平圣惠方》,吸铁石《乾坤生意秘韞》,吸针石《纲目》,摄石《药物出产辨》,活磁石、灵磁石、磁铁石《汇编》,统磁石、母慈石、磁铁、磁石饼、净磁石粉、反经石《中药名汇》,“长勒”(藏名)《中国药学杂志》  
地方名 河北:指南石;四川:铁石,戏铁石。  
功效 矿石:平肝潜阳,聪耳明目,镇惊安神,纳气平喘。用于头晕目眩,视物昏花,耳鸣耳聋,惊悸失眠,肾虚气喘。  
备考 本品为氧化物类矿物,主含四氧化三铁( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ )。

## 9108007

## Melanteritum --- Melanterite \*

- 矿物名 水绿矾《中国矿物药》  
药材名 绿矾《日华子本草》、《中药大辞典》,绛矾《煅赤者》《中国矿物药》  
文献名 青矾《唐本草》,皂荚矾(刘禹锡《传信方》),皂矾、矾红《纲目》,濫矾《汇编》,上绿矾、青明矾《中药名汇》,“那策儿”(藏名)《中国药学杂志》  
功效 绿矾:化痰,消积,燥湿,杀虫,止血,收敛,腐恶肉。用于贫血萎黄症,黄肿痞块,肠风下血,口疮

喉痹,恶疮顽癣,疱疹,狐臭。

备考 1.水绿矾为硫酸盐类矿物,主为含水硫酸亚铁( $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ )。因产地不同,常含或多或少的铜、铝、镁、锌等夹杂物。市售绿矾多为人工制成的硫酸亚铁。2.绛矾(煅绿矾)为赤铁矿(或磁铁矿)与五水绿矾至无水绿矾的混合物。3.黑矾亦名皂矾,但黑矾有同名异物品存在。《本草求真》之“黑矾”,其原矿物为铁矾石《药物出产辨》。

#### 9108008

Pyritum --- Pyrite \*

矿物名 黄铁矿《药典》

药材名 金牙石《纲目》,自然铜《雷公炮炙论》、《药典》

文献名 金牙《别录》,方金牙《雷公炮炙论》,锺石《本草别录》,黄牙石《纲目》,方块铜《药材学》,接骨丹《中药志》,然铜、言同、川然铜、铜牙石、愚人金、铁硫、铁流上治《中药名汇》,“者也”(藏名)《中国药学杂志》

功效 金牙石:暖腰膝,补水脏。用于痹风风毒厥;自然铜:散瘀,接骨,止痛。用于跌扑肿痛,筋骨折伤。

备考 1.黄铁矿为硫化物类矿物,主含二硫化铁( $\text{FeS}_2$ );2.在自然界中,黄铁矿常与黄铜矿( $\text{CuFeS}_2$ )共存,故黄铁矿中亦有铜及一些微量元素混入而习用作自然铜入药。自然铜有接骨续筋作用,铁、铜均为不可缺少的成分,应以含铁及铜的硫化物矿物为正品。

#### 9108009

Pyritum Globuloforme --- Globular pyrite \*

矿物名 黄铁矿结核《中国矿物药》

药材名 蛇含石《纲目》、《中药志》

文献名 蛇黄《唐本草》

功效 蛇含石:镇惊,止痛。用于惊风,癫痫,骨节酸痛。外用于肿毒。

备考 1.蛇含石多为煤层中沉积的二硫化铁结核( $\text{FeS}_2$ )。市售品有少数为褐铁矿化黄铁矿结核,结核体表层均已风化为褐铁矿(主含 $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ),其内部仍为黄铁矿( $\text{FeS}_2$ )。2.《中国矿物药》(1988)认为:蛇含石应限指结核状二硫化铁。若已氧化、水化为褐铁矿,结核已属禹馀粮,功用已不同于蛇含石。

#### 9108010

Tiefen \*\* --- Iron powder \*

药材名 铁粉《本草拾遗》、《中药大辞典》

功效 铁粉:平肝,镇心。用于惊痫,发狂,脚气冲心,疔疮。

备考 本品为钢铁飞炼而成的粉末,主要含四氧化三铁( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ );或系生铁打碎成粉,用水漂出的细粉,主要含金属铁,及少量的碳、磷、硅等杂质。

#### 9108011

Tiehuafen \*\* --- Ferrous acetate \*

药材名 铁华粉《开宝本草》

文献名 铁胤粉《中华本草》,铁艳粉、铁霜《纲目》

功效 粉末:养血安神,平肝镇惊。用于血虚,惊悸,健忘,痢疾,痲疹,脱肛,痔漏。

备考 本品为铁与醋酸作用后生成的锈衣,主成分为醋酸亚铁( $\text{Fe}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )。

#### 9108012

Tiejiang \*\* --- Rust solution \*

药材名 铁浆《本草经集注》、《中药大辞典》

功效 铁浆:镇心定痛,解毒敛疮。用于癫痫狂乱,疔疮肿毒。

备考 本品为生铁浸于水中生锈后所成的一种溶液。

#### 9108013

Tiejing \*\* --- Iron ash \*

药材名 铁精《本经》、《中药大辞典》

文献名 铁精粉《子母秘录》,铁花《纲目》

功效 粉末:镇惊安神,消肿解毒。用于惊痛心悸,疔毒,阴肿,脱肛。

备考 本品为炼铁炉中的灰炆。

#### 9108014

Tieluo \*\* --- Iron fall \*

药材名 铁落《本经》、《中药大辞典》

文献名 生铁落《素问》,铁液《别录》,铁屎《千金方》,铁屑《唐本草》,铁花《图经》,铁蛾《纲目》,铁落花、铁叶《汇编》,铁合锈《中药名汇》

功效 铁落:平肝镇惊。用于癫狂,热病谵妄,心悸,易惊善怒,疮疡肿毒。

备考 本品为生铁煅到红赤,外层氧化时被锤落的铁屑,主含四氧化三铁( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ )。

#### 9108015

Tiexiu \*\* --- Rust \*

药材名 铁锈《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 铁衣《普济方》,铁线粉《养生经验合集》

功效 铁锈:清热解毒,镇心平肝。用于疔疮肿毒,口疮,重舌,疥癣,烫伤,毒虫螫伤,痛病。

备考 本品为铁露置于空气中氧化后生成的红褐色锈衣。

#### 9108016

Yuliangtu \*\*

药材名 禹粮土《汇编》

地方名 甘肃:申都拉,格艾尔明。

功效 本品:清热凉血,去瘀生新,消肿止痛。用于脉热,脏伤。外用于烫火伤。

备考 本品为一种含铁粘土。

#### 9108017

Zhensha \*\* --- Steel grit \*

矿物名 铁《中药大辞典》

药材名 针砂《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 钢砂《本草拾遗》,铁砂《医学入门》,钢砂粉《中药名汇》

功效 针砂粉:补血,除湿,利水。用于血虚黄胖,水肿。

备考 本品为制钢针时磨下的细屑。主含铁,杂质为氧化铁(水化物)等,但也常含碳、磷、硅、硫等元素。

## 9108018

Zijingdan \*\*

药材名 紫精丹《太平圣惠方》、《矿物药与丹药》

功效 紫精丹、聚冷气，暖脐腹，止疼痛。用于男人、女人一切风。

备考 本品为硫黄和铁粉制炼而成，主要成分为FeS。

## 9109 汞(Hg) Hydrargyrum

## 9109001

Baijiangdan \*\*

药材名 白降丹《医宗金鉴》、《中药大辞典》

文献名 降丹《药材学》，降药、水火丹《矿物药与丹药》

功效 白降丹：有毒。排毒去脓，去腐生肌。外用于痈疽发背，疔毒。

备考 本品为二氯化汞( $Hg_2Cl_2$ )和氯化亚汞( $Hg_2Cl_2$ )的混合结晶。

## 9109002

Calomelas --- Calomel \* --- Mercurous chloride \*

矿物名 氯化亚汞《药典》

药材名 轻粉《本草拾遗》、《药典》

文献名 汞粉《本草拾遗》，峭粉《日华子本草》，〔水银粉〕《嘉祐本草》，腻粉《传家秘宝方》，〔银粉〕《本草述》，扫盆《本草便读》，甘汞《药典》，单录粉、汞录、加路朱《中药名汇》，“擦嘎”（藏名）《中国药理学杂志》

功效 结晶或粉末：有毒。祛痰消积，逐水通便。用于痰涎积滞，水肿膨胀，二便不利；外用：杀虫，攻毒，敛疮。外用于疥疮，顽癣，臁疮，梅毒，疮疡，湿疹。

备考 本品为人工炼制的矿物药，主含氯化亚汞( $Hg_2Cl_2$ )。

## 9109003

Calomelas Depuratum

药材名 粉霜《品汇精要》、《中药大辞典》

文献名 白雪《抱朴子》，水银霜、白灵砂《纲目》，白粉霜《药材学》

功效 粉霜：有毒。攻毒，利水，通便。用于牙疳，梅毒恶疮，水肿，膨胀，大小便闭。

备考 本品为轻粉(氯化亚汞  $Hg_2Cl_2$ )的精制品。

## 9109004

Cinnabaris --- Cinnabar \* --- Cinnabarite \*

矿物名 辰砂《图经》、《中国矿物药》

药材名 朱砂《本草经集注》、《药典》

文献名 丹粟《山海经》，丹砂《本经》，赤丹《淮南子》，真朱《别录》，巴砂、越砂、云母砂、马齿砂《本草经集注》，妙硫砂、梅柏砂、白庭砂、神座砂、金座砂、玉座砂、白金砂、澄水砂、阴成砂、辰锦砂、芙蓉砂、镜面砂、箭簇砂、曹末砂、土砂、金星砂、平面砂、神末砂《雷公炮炙论》，石砂、光明砂、马牙砂、无重砂、块砂《唐本草》，汞砂《石药尔雅》，宜砂《图经》，紫灵砂《庚辛玉册》，肺砂、旧坑砂、新坑砂《纲目》，天然硫化汞《汇编》，豆瓣砂、劈砂、片砂、朱宝砂、洋尖砂、泽光砂《中药大辞典》，

朱砂粉《药典》，“玖拉”（藏名）《中国药理学杂志》，豆砂、汞黄、汞硫、汞矿、红汞矿、尖砂、陶砂、苏尖、羊尖砂、朱石、针砂、个砂、半面砂、珠宝砂、魁砂、白岩砂、赤色硫化汞《中药名汇》

功效 朱砂：有毒。清心镇惊，安神解毒。用于心悸易惊，失眠多梦，癫痫发狂，小儿惊风，视物昏花，口疮，喉痹，疮疡肿毒。

备考 1. 本品主要为硫化汞( $HgS$ )。2. 人工朱砂称“录砂”，在微量成分上虽与朱砂有异，毕竟仍不尽纯净。二者微量成分对疗效所起作用或是否有害，尚未查明。

## 9109005

Hydrargyri Oxydum Rubrum --- Mercuric oxide \* --- Red oxide of mercury \*

矿物名 红氧化汞《药典》

药材名 红粉《外科正宗》、《药典》

文献名 升药、三仙丹《外科正宗》，灵药《外科大成》，三白丹《张氏医通》，三仙散《吴氏医方汇编》，小升丹《疡医大全》，升丹《药夜启秘》，红升《外科传薪集》，三仙红升丹《集成良方三百种》，黄升、黄升丹《疡科遗编》，红升丹、大升丹、小金丹《矿物药与丹药》，红粉片《黑龙江省中药炮制标准》

功效 结晶体：有大毒。拔毒，除脓，去腐，生肌。外用于痈疽疔疮，梅毒下疳，一切恶疮，肉暗紫黑，腐肉不去，窦道痿管，脓水淋漓，久不收口。

备考 1. 本品为粗制氧化汞( $HgO$ )。2. 升药为水银、硝石、白矾之提炼品。因制造时成品在容器内的部位不同，颜色亦异，分为红粉、黄升和升药底三种规格，在疗效上亦略异。即红升、黄升(黄升丹)，功用相同，升药底力量较小，用于疥疮，能杀虫止痒。升药底为炼制升药后，留在锅底的残渣。

## 9109006

Hydrargyrum --- Mercury \* --- Quicksilver \*

矿物名 汞《别录》、《矿物学》

药材名 水银《本经》、《汇编》

文献名 白汞《淮南子》，姁女《参同契》，铅精、流珠《石药尔雅》，灵液《纲目》，活宝《药材资料汇编》，“恶切”（藏名）《中国药理学杂志》，自然汞、汞膏《英汉矿物名称》，生汞、贝汞、天生水银、活水银《中药名汇》

功效 汞：有毒。杀虫，攻毒。外用于皮肤疥疮，顽癣，梅毒，恶疮，痔瘻，痂疡，白秃，天头虱。

备考 本品为液态金属汞(Hg)，多系用辰砂矿石加热蒸馏而得，少数取自自然汞。

## 9109007

Shengyaodi \*\*

药材名 升药底《药材资料汇编》

功效 残渣：杀虫止痒。外用于疥癣。

备考 本品为炼制升药后留在锅底的残渣，含硫酸钾，硫酸铝，少量汞等。

## 9109008

Yinzhu \*\*

药材名 银朱《纲目》、《中药大辞典》



文献名 灵砂《证类本草》，心红《本草蒙筌》，水华朱《胡演升丹炼药秘诀》，猩红、紫粉霜《纲目》，辛红《中药炮制规范》，银珠、“打切”（藏名）《中国药学杂志》

功效 银朱：有毒。攻毒，杀虫，燥湿，劫痰。用于疥癣恶疮，痧气心腹痛。

备考 本品为人工制成的赤色硫化汞（HgS）。

### 9110 钾(K) Kalium

#### 9110001

Caomuhui \*\*

药材名 草木灰《中药大辞典》

文献名 冬灰、藜灰《本经》，薪柴灰《纲目》

功效 本品：用于大骨节病，蚀痈疽恶肉。

备考 因植物种类的不同，灰的分量及其组成也有差异。灰的组成，主要为氧化钾、二氧化硅、氧化钙，但亦常含钠、镁、磷、氯、硫及痕迹的锰、硼、铜等。

#### 9110002

Nitrum --- Niter \*

矿物名 硝石《本草蒙筌》、《青藏药用矿物》

药材名 消石《别录》、《中药大辞典》

文献名 苦消《药性论》，化金石、水石《石药尔雅》，焰消《土宿本草》，地霜《蜀本草》，生消、火消、北帝玄珠《纲目》，土砂《矿物药与丹药》，“色擦”（藏名）《中国药学杂志》，生消石、硝、盐消、河东野盐石、硝酸钾《中药名汇》

功效 消石：破坚散积，利尿泻下，解毒消肿。用于痧胀，心腹疼痛，吐泻，黄疸，淋病，便秘，目赤，喉痹，疗毒，癰肿。

备考 1. 本品主要成分为硝酸钾（KNO<sub>3</sub>）。2. 《本经》之消石为硫酸钠，与本品不同。

#### 9110003

Sylvite \*

矿物名 钾盐《青藏药用矿物》

药材名 氯化钾《青藏药用矿物》

功效 氯化钾：用于低钾血症。

备考 钾盐主含氯化钾（KCl），并含少量石盐及液体或气体的包裹物，如氮、二氧化碳、氢等。精制后可得氯化钾结晶。

### 9111 镁(Mg) Magnesium

#### 9111001

Epsomitum --- Epsomite \*

矿物名 硫酸镁石《青藏药用矿物》

药材名 泻利盐《青藏药用矿物》

文献名 硫酸镁《青藏药用矿物》

功效 硫酸镁：利胆，泻下，镇痉，减低颅内压。用于便秘，黄疸，慢性胆囊炎，破伤风等。

备考 本品为七水硫酸镁（MgSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O）。

#### 9111002

Lujian \*\*

药材名 卤碱《吉林中草药》

文献名 卤咸《本经》，卤盐、寒石《吴普本草》

功效 卤碱：解热，除烦，止呕，泻下，明目。用于克山病，大骨节病，甲状腺肿，高血压，风湿性心脏病，慢性支气管炎，皮炎，风热赤眼。

备考 本品为盐卤凝结而成的白色结晶，主含二氯化镁（MgCl<sub>2</sub>），此外，还含有少量的钠、钾、钙和硫酸根离子，其次为二氧化硅、锶、铁、硼及微量元素硒等。

### 9112 锰(Mn) Manganum

#### 9112001

Pyrolusitum --- Pyrolusite \*

矿物名 软锰矿《英汉矿物名称》

药材名 无名异《雷公炮炙论》、《中药大辞典》

文献名 土子《盛京通志》，干子《本草求真》，禿子《青海药材》，铁砂、黑石子《药材学》，催子、名异、明异、无异、末无名、棕铁矿、黄上铁、软锰铁、黑赭石、佛头青、回青、画烧青、碗青、氧化锰矿、黑锰、锰矿《中药名汇》，“懂丝”（藏名）《中国药学杂志》

功效 矿石：去瘀止痛，消肿生肌。用于跌打损伤，金疮，癰肿。

备考 1. 软锰矿为氧化物类矿物，主含二氧化锰（MnO<sub>2</sub>）。2. 无名异的原矿物尚有水锰矿。3. 无名异的外形和大小很象蛇黄，惟体轻，部分地区以此误作蛇黄（蛇含石）入药，应注意鉴别。

### 9113 钠(Na) Natrium

#### 9113001

Halitum --- Halite \* --- Rock salt \*

矿物名 石盐《石药尔雅》、《中药志》

药材名 大青盐《中药志》

文献名 戎盐《本经》，胡盐《别录》，禿登盐、阴土盐《唐本草》，寒盐、冰石《石药尔雅》，羌盐《日华子本草》，青盐《图经》，君王盐、崖盐《矿物性中药之研究》，岩盐《地质矿物大辞典》，“勒擦”、“佳木擦”（藏名）《中国药学杂志》

功效 大青盐：凉血，明目。用于尿血，吐血，衄齿出血，目赤痛，风眼烂弦，牙痛。

备考 大青盐为卤化物类石盐不纯矿盐结晶，主成分为氯化钠（NaCl）。

#### 9113002

Halitum Violaceum --- Red halite \*

矿物名 紫色石盐《中药志》

药材名 紫硃砂《中药志》

文献名 “卡如察”（藏名）《金珠本草》，咸硃砂、藏脑、脑砂《中药志》，藏红盐、红盐、藏硃砂《中国矿物药》，红硃砂《中药大辞典》

地方名 硃砂（青海、西藏）。

功效 紫硃砂：有毒。软坚消积，散瘀消肿。据报道，对食管癌和贲门癌有一定疗效。

备考 石盐因有少量硫和锂元素而现暗红色，即紫硃砂。主含氯化钠和铁。现有处方写硃砂，一般投制紫硃砂。本品多来自印度，过去在西藏集散，今则由青海省收购供销全国。

## 9113003

Mafenshi \*\*

药材名 马粪石《矿物性中药之研究》

文献名 鲊答、赭丹、毛球[轻度者]《矿物性中药之研究》

功效 马粪石：用于惊痫，毒疮。

备考 本品可能为碳酸石灰，碳酸镁，磷酸镁。

## 9113004

Mirabilitum --- Mirabilite \*

矿物名 芒硝《别录》、《中国矿物药》

药材名 朴硝《别录》、《中药大辞典》

文献名 朴消石《吴普本草》，消石朴、芒硝《别录》，海末《石药尔雅》，盆消《图经》，盐硝、皮硝、水硝《纲目》，海皮硝、毛硝《药材学》，马牙硝《矿物药与丹药》，英消、土朴消、小月、硫酸钠矿、钠硫强矾、粗制硫酸钠《中药名汇》，“呀哇叉”（藏名）《中国药学杂志》

功效 朴硝：泻热通便，润燥软坚，清火消肿。用于实热便秘，大便燥结，积滞腹痛，肠痈肿痛。外用于乳痈，痔疮肿痛。

备考 1. 朴硝为硫酸盐类矿物芒硝经加工而得的结晶体，主为十水硫酸钠( $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )。2. 据考证：《本经》之朴硝为硝酸钾，《别录》之朴硝为硫酸钠；《本经》之消石为硫酸钠，而《别录》之消石为硝酸钾。3. 《别录》的朴硝和芒硝虽分列为两条，但指出“芒硝，…生于朴硝”；唐代的芒硝则为马牙硝，化学成分为硫酸镁，实为芒硝之同名异物；宋《开宝本草》以后，芒硝、朴硝全并为一，明《纲目》强调芒硝即朴硝。

## 9113005

Natrii Chloridum --- Sodium chloride \*

矿物名 食盐《青藏高原药用矿物》

药材名 食盐《别录》、《中药大辞典》

文献名 卤《尔雅》，咸鹺《礼记》，咸《说文》，盐《别录》，硝、麟、鹺、鹺《广雅》，鹺《纲目》，海盐《矿物药与丹药》，大盐《青藏高原药用矿物》，盐巴、咸盐、卵盐、散盐、白盐、粗盐、精盐、氯化钠《中药名汇》

功效 食盐：涌吐，清火，凉血，解毒。用于食停上脘，心腹胀痛，胸中痰癖，二便不通，齿龈出血，喉痛，牙痛，目翳，疮疡，毒虫螫伤。

备考 本品为海水或盐井、盐池、盐泉中的盐水经煎晒而成的结晶，主为氯化钠( $\text{NaCl}$ )。此外还含有钾、镁、钙、碘等。

## 9113006

Sal Praeparatum

矿物名 咸秋石《中药志》

药材名 咸秋石《中药志》

文献名 秋石《药材学》，盆秋石《中药志》，秋冰《中药名汇》

功效 咸秋石：滋阴，除虚热，涩精。用于虚劳咳嗽，骨蒸劳热，遗精带下。

备考 古代所用秋石，与今之人中白近似，今之秋石全用食盐制成，主要含氯化钠( $\text{NaCl}$ )。

## 9113007

Sallucidum

矿物名 光明盐《唐本草》

药材名 光明盐《唐本草》、《中药大辞典》

文献名 圣石《雷公炮炙论》，石盐《唐本草》，水晶盐《纲目》

功效 天然食盐结晶：祛风明目。用于目赤肿痛，多泪，头痛等证。

备考 光明盐为天然食盐结晶，主要成分与大青盐相同，亦为氯化钠( $\text{NaCl}$ )，但其形成、入药与大青盐情况不同。

## 9113008

Shijian \*\*

药材名 石碱《本草衍义补遗》、《中药大辞典》

文献名 花碱《圣济总录》，碱《本草衍义补遗》，灰碱《纲目》，水碱《本经逢原》，视砂、干饼药《病科全书》

功效 石碱：软坚，消积，化痰，去翳。用于积块，噎膈反胃，目翳，疣赘。

备考 石碱为从蒿、蓼等草木灰中提取的碱汁，和以面粉，经加工而成之固体，主要成分为碳酸钠、碳酸钾。

## 9113009

Thenarditum --- Thenardite \* --- Natrii sulfas Exsiccatus --- Anhydrous sodium sulfate \*

矿物名 无水芒硝《青藏高原药用矿物》

药材名 玄明粉《药性论》、《药典》

文献名 白龙粉《御药院方》，风化硝《本草蒙筌》，元明粉《汇编》，明粉、元名粉《中药名汇》

功效 粉末：泻热通便，燥湿软坚，清火消肿。用于实热便秘，大便燥结，积滞腹痛。外用于咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，目赤，痈肿，丹毒。

备考 玄明粉为硫酸盐类矿物芒硝经煅制成风化失去结晶水的无水芒硝白色粉末。主要为无水硫酸钠( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ )。

## 9113010

Trona \*

矿物名 自然碱《英汉矿物名称》

药材名 碱花《汇编》

文献名 “浦多”（藏名）《药典》，“握斗”（藏名）《中国药学杂志》

功效 碱花：消滞。用于胃寒，消化不良。

备考 本品为结晶性粉末，为咸水湖边生成的主含碳酸钠的枝状结晶。系藏族习用药材。

## 9113011

Yandanshu \*\*

药材名 盐胆水《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 卤水《纲目》，滴卤《姚可成《食物本草》》，盐卤水《本草求真》

功效 盐胆水：有大毒。外用于疔痢，疥癣等。

备考 本品为食盐沥下的卤汁。

## 9114 铅(Pb) Plumbum

## 9114001

## Galenitum - Galenite \*

矿物名 方铅矿《青藏药用矿物》

药材名 黑锡丹《青藏药用矿物》

文献名 黑铅、黑锡《青藏药用矿物》

功效 黑锡丹：镇敛浮越，纳气归元，降逆坠痰，摄精止带。用于肾虚喘逆，气不归元，上盛下虚，痰积惊风，精滑带下。

备考 方铅矿主要为硫化铅(PbS)，并含微量铜、锌、银、锑、铋、硒、砷等。

## 9114002

## Hydrocerussitum --- Hydrocerussite \*

矿物名 水白铅矿《青藏药用矿物》

药材名 铅粉《开宝本草》、《中药大辞典》

文献名 粉锡、解锡《本经》，水粉《范子计然》，胡粉《参同契》，定粉《药性论》，锡粉、流丹、铅粉、白膏、铅白《石药尔雅》，光粉《日华子本草》，白粉、瓦粉《汤液本草》，铅华、官粉《纲目》，官粉《药材学》

功效 铅粉：有毒。消积，杀虫，解毒，生肌。用于疳积，下痢，虫积腹痛，痲疹，疟疾，疥癣，痈疽，溃瘍，口疮，丹毒，烫伤。

备考 铅粉系铅经过加工制成的白色粉末，主要为碱式碳酸铅[2PbCO<sub>3</sub>·Pb(OH)<sub>2</sub>]。

## 9114003

## Lithargyrum --- Litharge \* --- Litharge \* --- Lithargite \* --- Massicotite \*

矿物名 铅黄《青藏药用矿物》

药材名 密陀僧《唐本草》、《中药志》

文献名 密陀僧《雷公炮炙论》，没多僧《唐本草》，炉底《纲目》，银池、淡银《药物出产辨》，金炉底、银炉底《现代实用中药》，金陀僧、陀僧《中药志》，密陀僧、没陀僧、陀僧、陀生、陀羊、金生、铅脚、铅弱、黄丹、黄色氧化铅、铅氧、灰坯、理文石、氧化铅、幼团《中药名汇》，“微涩”(藏名)《中国药理学杂志》

功效 氧化铅：有毒。燥湿，杀虫，敛疮，坠痰镇惊。用于痰积惊风，疟疾，久痢。外用于湿疮，疥癣，金疮，溃瘍不收口。

备考 本品自然产者较少，多系加工制造，主要为氧化铅(PbO)。

## 9114004

## Native lead \*

矿物名 自然铅《青藏药用矿物》

药材名 铅《日华子本草》、《中药大辞典》

文献名 黑铅《范子计然》，青金《说文》，乌锡《孟诜《必效方》》，黑锡《本草拾遗》，铅精、水锡、素金、黑金《石药尔雅》，金公、水中金《纲目》，青铅《要药分剂》，乌铅《青藏药用矿物》，“下银”(藏名)《中国药理学杂志》

功效 铅：有毒。镇逆，坠痰，杀虫，解毒。用于痰气壅逆，上盛下虚，气短喘急，噎膈反胃，瘰癧，瘰癧，疔毒，恶疮。

备考 本品为灰白色金属铅，主含铅(Pb)，常含少许锑、银等杂质。

## 9114005

## Plumbi Acetas

药材名 铅霜《日华子本草》、《中药大辞典》

文献名 铅白霜《图经》

功效 铅霜：有毒。坠痰，镇惊，止血，敛疮。用于惊痫，鼻衄，喉痹，牙疳，口疮，溃瘍。

备考 本品用铅加工制成的白色结晶体，主为醋酸铅[Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>·3H<sub>2</sub>O]。《图经》所载铅霜，原料中杂有水银，故成品中可能含微量的汞。

## 9114006

## Plumbum Rubrum --- Minium \* --- Red lead \*

矿物名 铅丹《中国矿物药》

药材名 铅丹《本经》、《中药大辞典》

文献名 丹《范子计然》，黄丹《抱朴子》，真丹《肘后方》，铅华《别录》，丹粉《唐本草》，红丹、虢丹《续本事方》，国丹《秘传外科方》，朱粉、黄虢丹《纲目》，朱丹、陶丹、彰丹、松丹、铅黄、福来丹《药材学》，东丹《现代实用中药》，漳丹《汇编》，铅粉《本草纲目的矿物史料》，韦丹、红铅养、铅合锈、光明丹、红妙丹、长吉丹、彰红丹、章丹、樟丹、广丹、度丹、湘丹、羊丹《中药名汇》，菊丹《矿物性中药之研究》，“勒车”(藏名)《中国药理学杂志》

功效 铅丹：有毒。解毒，生肌，坠痰镇惊。用于痈疽，溃瘍，金疮出血，口疮，目翳，汤火灼伤，惊痫癫狂，疟疾，痢疾，吐逆反胃。

备考 天然产的铅丹不入药。本品为铅加工制成的红色粉末四氧化三铅(Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)，间杂有黄色PbO。

## 9114007

## Qianhui \* \*

药材名 铅灰《图经》、《中药大辞典》

文献名 黑锡灰《丹溪心法》

功效 铅灰：外用于瘰癧。

备考 《图经》引刘禹锡云：“取铅三两，铁器中熬之，久当有脚如黑灰”。

## 9115 锡(Sn) Stannum

## 9115001

## Cassiteritum --- Cassiterite \*

矿物名 锡石《石药尔雅》、《中国矿物药》

药材名 锡《本经》、《中药大辞典》，锡矿《奇效良方》、《中国矿物药》

文献名 白锡《山海经》，翎《尔雅》，粉锡、解锡《本经》，锡《周礼》郑玄注)，白锡《尔雅》郭璞注)，贺《纲目》，“泻嘎”(藏名)《中国药理学杂志》

功效 锡：用于恶毒风疮；锡矿：有毒。外用于磨涂疗肿。

备考 1. 锡石为氧化物类矿物。锡为一种银白色金属，主要由锡石中炼出；锡矿主为二氧化锡。2. 《中国矿物药》(1988)认为：锡矿的研磨液，有极微的锡石(SnO<sub>2</sub>)微粒分散，分散的不是金属锡，与锡不是同一味药材。

## 9116 锌(Zn) Zincum

## 9116001

## Hydrozincitum --- Hydrozincite \*

矿物名 水锌矿《中国矿物药》

药材名 炉甘石《外丹本草》、《中国矿物药》

文献名 甘石《品汇精要》, 炉先生《土宿本草》, 卢甘石《医学入门》, 浮水甘石、制甘石《中药志》, 羊肝石《现代实用中药》, 炉眼石《矿物药与丹药》, 炉山生《矿物性中药之研究》, 浮甘石、挥甘石《中药名汇》

地方名 广西: {浮石}, {浮水石}。

功效 矿石: 解毒明目退翳, 收湿止痒敛疮。用于目赤肿痛, 眼缘赤烂, 翳膜胬肉, 溃瘍不敛, 脓水淋漓, 湿疮, 皮肤瘙痒。

备考 水锌矿主含碱式碳酸锌  $[Zn_5(CO_3)_2(OH)_6]$ , 经煅制成炉甘石, 主含成分转变为氧化锌  $(ZnO)$ 。

## 9116002

## Smithsonitum --- Smithsonite \*

矿物名 菱锌矿《石药尔雅》、《中国矿物药》

药材名 炉甘石《外丹本草》、《药典》

文献名 甘石《品汇精要》, 炉先生《土宿本草》, 卢甘石《医学入门》, 浮水甘石《中药志》, 羊肝石《现代实用中药》, 炉眼石《矿物药与丹药》, 炉山生《矿物性中药之研究》, “刚特”(藏名)《中国药理学杂志》, 浮甘石、挥甘石《中药名汇》

地方名 广西: {浮石}, {浮水石}。

功效 矿石: 解毒明目退翳, 收湿止痒敛疮。用于目赤肿痛, 眼缘赤烂, 翳膜胬肉, 溃瘍不敛, 脓水淋漓, 湿疮, 皮肤瘙痒。

备考 菱锌矿为碳酸盐类矿物, 主含碳酸锌  $[ZnCO_3]$ , 经煅制成炉甘石, 主含成分转变为氧化锌  $(ZnO)$ 。

## (二) 主含非金属元素类

## 9201 砷(As) Arsenium

## 9201001

## Arsenolium --- Arsenolite \*

矿物名 砷华《中国矿物药》

药材名 信石《救急易方》、《中药志》

文献名 砒黄、砒霜《日华子本草》, 砒石《开宝本草》, 人言《本事方》, 信石《救急易方》, 红砒、白砒《药材学》, 红信石、白信石《中药志》, 红砒《中药大辞典》, “导德”(藏名)《中国药理学杂志》, 信砒、人信、白信、红信、毒石、金脚砒、中方、砒华、无水亚砷酸《中药名汇》

功效 砒石: 有大毒。劫痰截疟, 杀虫, 蚀恶肉。用于寒痰哮喘, 疟疾, 休息痢, 痔疮, 瘰疬, 走马牙疳, 癰疮, 溃瘍腐肉不脱。

备考 砷华为氧化物类矿物, 主要成分为三氧化二砷  $(As_2O_3)$ , 白色。红砒是除含  $As_2O_3$  外尚含红色矿物质的一种砒石。砒霜为白色粉末, 为砒石经升华而得的精制品。

## 9201002

## Arsenopyritum --- Arsenopyrite \* --- Arsenical pyrite \*

矿物名 毒砂《纲目》、《中药志》

药材名 砒石《本经》、《中药大辞典》

文献名 砒《山海经》, 立制石、青分石、固羊石《本经》, 白砒石、太白、泽乳、鼠乡、食盐《吴普本草》, 大白石《别录》, 神黄铁矿《中药大辞典》

功效 矿石: 有毒。消冷积, 祛寒湿, 蚀恶肉, 杀虫。用于瘤冷腹痛, 积聚坚癖, 风冷湿痹, 痔瘰息肉, 恶疮癰疾。

备考 毒砂为硫化物类矿物, 主成分为砷硫化铁  $[FeAsS]$ 。

## 9201003

## Orpimentum --- Orpiment \* --- Arsenblende \* --- Auripigment \*

矿物名 雌黄《中国矿物药》

药材名 雌黄《本经》、《中药大辞典》

文献名 黄安《石药尔雅》, 昆仑黄、砒黄《矿物药与丹药》, “哇拉”(藏名)《中国药理学杂志》, 黄砒、石黄、王雄、帝女血《中药名汇》

功效 矿石: 有毒。燥湿, 杀虫, 解毒。用于疥癣, 恶疮, 蛇虫螫伤, 癰瘤, 寒痰咳嗽, 虫积腹痛。

备考 1. 本品主含三硫化二砷  $(As_2S_3)$ , 常混入锑、铁, 还有微量的汞、铜、硒等。2. 本品与雄黄性状比较相似。但雄黄呈红色或橘红色, 雌黄则为黄色, 可资区别。

## 9201004

## Pifansan \*\*

药材名 砒矾散《矿物药与丹药》

文献名 枯痔散《矿物药与丹药》

功效 粉末: 杀菌, 腐蚀去赘肉。用于痔疮漏管, 赘瘤瘰疬, 痢疽溃后脓水流出不畅者。

备考 本品为砒石和白矾烧炼而成的砒制剂。主要成分为三氧化二砷  $(As_2O_3)$  和脱水硫酸钾铝  $[KAl(SO_4)_2]$ 。

## 9201005

## Realgar

矿物名 雄黄《药典》

药材名 雄黄《本经》、《药典》

文献名 黄食石《本经》, 石黄《唐本草》, 天阳石、鸡冠石《石药尔雅》, 熏黄《本草拾遗》, 黄石《品汇精要》, 苏雄黄、苏尖、明雄、雄黄精、腰黄、刁雄《中药志》, 南雄黄、雄精《中药大辞典》, 雄黄粉《药典》, 明雄黄《汇编》, “懂锐”(藏名)《中国药理学杂志》

功效 雄黄: 有毒。杀虫解毒, 燥湿祛痰, 截疟。用于痈肿疔疮, 蛇虫咬伤, 虫积腹痛, 惊痫, 疟疾。

备考 本品为硫化物类矿物, 主含二硫化二砷  $(As_2S_2)$ 。

## 9201006

## Taiyishenjingdan \*\*

药材名 太乙神精丹《矿物药与丹药》

功效 丹药: 杀菌, 强壮。用于疟疾, 痞块, 瘰疬积聚, 梅毒, 癰疾, 恶疮, 历节风痛, 瘁死, 癲狂, 霍乱。

备考 本品为一种含砷的丹药, 主要成分为三氧

化二砷( $\text{As}_2\text{O}_3$ )。

#### 9201007

Xiaolingdan \*\*

药材名 小灵丹《中药志》

文献名 人造雄黄《矿物药与丹药》

功效 小灵丹:散寒止痛。用于脾肾虚寒引起的偏坠疝气,脾虚久泻,胃寒腹痛,妇女血寒,行经腹痛,湿寒白带。

备考 小灵丹系由硫黄与雄黄经升华制成的非晶质砷硫化物。

### 9202 硼(B) Borium

#### 9202001

Borax \*

矿物名 硼砂《中药志》

药材名 硼砂《日华子本草》、《中药大辞典》

文献名 大硼砂《丹房鉴源》,蓬砂、麟砂《日华子本草》,月石《三因方》,盆砂《纲目》,川硼砂、白月石、西月石、洋月石、川月石、焦性硼酸钠《中药名汇》,“擦拉”(藏名)《中国药学杂志》

功效 结晶粉:清热消痰,解毒防腐。用于咽喉肿痛,口舌生疮,目赤翳障,骨哽,噎膈,咳嗽痰稠。

备考 本品为矿物硼砂经精制而成的结晶。成分为四硼酸钠( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )。

### 9203 碳(C) Carbonium

#### 9203001

Baicaoshuang \*\* --- Grass soot \*

药材名 百草霜《图经》、《中药大辞典》

文献名 灶突墨《千金方》,灶突中尘《外台秘要方》,灶额上墨《图经》,灶烟煤、灶煤《中国医学大辞典》

功效 粉末:止血,消积。用于吐血,衄血,便血,血崩,带下,泻痢,食积,咽喉口舌诸疮。

备考 本品为杂草经燃烧后附于灶突或烟囱内的烟灰。

#### 9203002

Baitan \*\*

矿物名 白炭《中药大辞典》

药材名 白炭《纲目》、《中药大辞典》

文献名 火炭《千金方》,无纹炭《圣济总录》,木炭《普济方》,煇炭《经验方》

功效 白炭:用于肠风下血,阴囊湿疹,烫伤。

备考 1.本品为本炭之坚紧无纹,焰发白色者;2.湖北神农架的白炭为“银炭”,用于声音嘶哑。

#### 9203003

Coal \*

矿物名 煤《青藏药用矿物》

药材名 乌金石《儒门事亲》、《青藏药用矿物》

文献名 石炭《医学集成》,铁炭《青藏药用矿物》

功效 煤粉:有毒。消积行滞,活血调气。用于妇人血气不和之腹痛,腹中积滞,产后少腹瘀痛。外用止血敛疮。

备考 主要为碳氢化合物,含少量硫、磷等。

#### 9203004

Diamond \*

药材名 金刚石《迪庆藏药》

文献名 “导则”(藏名)《中国药学杂志》

功效 金刚石:补身强体。用于三邪病。

备考 本品主含碳。

#### 9203005

Fuqimo \*\*

药材名 釜脐墨《四声本草》、《中药大辞典》

文献名 月下灰《补缺肘后方》,釜下墨《千金方》,釜月中墨《四声本草》,铛墨《开宝本草》,釜底墨《图经》,锅底墨《普济方》,铛脐墨《简便单方》,铛底煤《品汇精要》,釜煤、釜食《纲目》,锅底灰《本草再新》

功效 本品:用于吐血咯血,外伤出血,聾耳,口疮。

备考 本品为杂草经燃烧后,附于锅脐或锅底部之烟灰,主要成分为碳。

#### 9203006

Graphite --- Graphite \* --- Plumbago \*

矿物名 石墨《别录》、《英汉矿物名称》

药材名 黑石墨《本经》

文献名 黑符、石泥《吴普本草》,石涅《别录》

功效 黑石墨:养肾气,强阴。用于阴蚀疮,肠澼泄痢,口疮,咽痛。

备考 1.本品成分为碳。2.本品为《神农本草经》“五色石墨”之一。

#### 9203007

Petroleum --- Naphtha \* --- Mineral oil \* --- Crude petroleum \*

矿物名 石油《梦溪笔谈》、《中药大辞典》

药材名 石脑油《嘉祐本草》、《中药大辞典》

文献名 石漆《本草拾遗》,猛火油、雄黄油、硫黄油《纲目》,地脂《方镇编年录》,泥油《纲目拾遗》

功效 石油:有毒。外用于疮癣虫癞。

备考 本品为碳氢化合物类矿物石油的原油。

#### 9203008

Prepared ink \* --- Mo \*\*

药材名 墨《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 乌金、陈玄、玄香、乌玉块《纲目》,京墨、“佳那”(藏名)《中国药学杂志》

地方名 黑墨、香墨、陈香墨(华东)。

功效 墨:止血,消肿。用于吐血,衄血,崩中漏下,血痢,痢肿发背。

备考 墨为松烟和入胶汁、香料等加工制成。

#### 9203009

Yanjiao \*\*

药材名 烟胶《纲目》、《中药大辞典》

文献名 牛皮灶岸《纲目》,皮烟《药材资料汇编》

功效 烟胶:用于头疮白秃,疥疮风癣,痒痛流水。

备考 本品为老法熏硝牛皮过程中,牛皮受热后烘出的油状液体,淋漓于灶面上,日久积累而成的黑褐

色胶状物。本品主要成分为碳。

### 9203010

Yanyou \*\*

药材名 烟油《百草镜》、《中药大辞典》  
文献名 烟膏、太极膏、气泥、五行丹《纲目拾遗》  
功效 烟油：用于蛇虫咬伤，恶疮，顽癣。  
备考 本品为陈旧旱烟杆内积存的黑色膏油。主成分为碳。

## 9204 氟(F) Fluorum

### 9204001

Fluoritum --- Fluorite \*

矿物名 萤石《药典》  
药材名 紫石英《吴普本草》、《药典》  
文献名 氟石《中药大辞典》，萤石《汇编》，赤石英《浙江中草药炮制标准》，醋煅紫石英《药典》，紫石、水碧、水苍玉、芘石、紫玉英、蓝宝石、苍瑛、弗石《中药名汇》，“也”《藏名》《中国药理学杂志》  
功效 矿石：镇心安神，温肺，暖宫。用于失眠多梦，心悸易惊，肺虚咳嗽，宫寒不孕。  
备考 1. 本品为氟化物类矿物，主含氟化钙( $\text{CaF}_2$ )。2. 古代紫石英即有两类：《吴普本草》云：“紫石英生泰山及会稽”，生泰山者为紫水晶，生会稽者可能即为萤石。寇宗奭《本草衍义》云“紫石英明澈如水精，但色紫而不匀”，张璐《本草逢原》谓紫石英“经火则毒”，要“生研极细，水飞三次用”者，即指本品而言。

## 9205 硫(S) Sulphur

### 9205001

Sulphur --- Sulphurite \* --- Native sulfur \* --- Native sulphur \* --- Brim stone \*

矿物名 自然硫《药典》  
药材名 硫黄《吴普本草》、《药典》  
文献名 石硫黄《本经》，流黄《吴普本草》，石硫黄《别录》，黄牙《丹房秘要》，黄硫砂《海药本草》，石亭脂《图经》，船上硫黄《博济方》，冬结石、石硫赤、石硫青、石硫丹、石硫芝、将军、阳侯《纲目》，舶硫《遵生八笺》，白硫黄《百草镜》，冬结石、神惊石、天生黄《纲目拾遗》，倭硫黄《药材学》，硫黄矿《汇编》，“莫涅”《藏名》《中国药理学杂志》，硫磺、流黄、生黄、灵黄、真珠黄、倭硫、硫黄香、土硫黄、硫黄盆、黄英、黄碓石、英碓、焰叟、焰寥，山不在、九灵黄童《中药名汇》  
功效 硫黄：有毒。补火助阳通便。用于阳痿足冷，虚喘冷哮，虚寒便秘；外用：解毒杀虫，疗疮。外用子疥癣，秃疮，阴疽恶疮。  
备考 本品为自然元素类矿物，主含硫(S)。

## 9206 硅(Si)及硅酸盐( $\text{SiO}_2$ )

### Silicium & Sal Silicatum

### 9206001

Achatum --- Agate \*

矿物名 玛瑙《矿物性中药之研究》

药材名 玛瑙《本草蒙筌》、《中药大辞典》

文献名 马脑《嘉祐本草》，码瑙《拾遗记》，码瑙石《集韵》，摩罗迦隶《佛书》，文石《纲目》，马脑石《药材学》，“穷”《藏名》《中国药理学杂志》

功效 玛瑙：拨云退翳。用于眼目肿痛，目生障翳，视物不清。

备考 本品为矿物石英的隐晶质变种之一，主含二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )。

### 9206002

Actinolitum --- Actinolite \*

矿物名 透闪石《中国矿物药》

药材名 阳起石《本经》、《汇编》

文献名 白石《本经》，羊起石、石生《别录》，阳石、起阳石《炮炙大全》，“导吉”《藏名》《中国药理学杂志》，五精金、五精阴华、五色英药《中药名汇》

地方名 广东：石炭养《鹤山》。

功效 阳起石：温肾壮阳。用于阳痿不举，腰膝冷痹，肢体厥冷，女子宫冷，月经不调，崩漏。

备考 1. 透闪石为硅酸盐类矿物，主含 $[\text{Ca}_2(\text{Mg}, \text{Fe})_3[\text{Si}_4\text{O}_{11}](\text{OH})_2]$ ；2. 四川、湖北、山东、河南、北京等部分地区，有用阴起石(Actinolitum brevifibrum)作阳起石用。阴起石以火烧之不变红，易传热可与阳起石相区别。

### 9206003

Actinolitum Brevifibrum

矿物名 滑石片岩《中药志》

药材名 阴起石《中药志》

文献名 石生《中药炮炙规范》

功效 阴起石：起阴助阳，温暖子宫。用于子宫寒冷，久不受孕，白带白淫淋漓不止。

备考 滑石片岩为一种短纤维的石棉类矿物，差不多完全由滑石组成。此外也往往含有阳起石、绿泥石、水镁石等，为多矿集合体。主要组分为含镁、铁、钙的含水硅酸盐。

### 9206004

Amethystum --- Amethyst \*

矿物名 紫水晶《英汉矿物名称》

药材名 紫石英《本经》

功效 矿石：心腹咳逆，宫寒不孕。

备考 1. 紫色二氧化硅属 $\alpha$ -石英( $\alpha$ -Quartz)，透明晶体称紫水晶。主含二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )。五十年代北京药用紫石英主要为磨制眼镜片的紫水晶边角料，亦即紫色石英；2. 《嘉祐本草》载：“其色莹澈，随其大小皆五棱，两头如箭簇”。可知古代紫石英似为现在矿物学石英类，现时商品紫石英常为氟石，但四川、云南等地仍以石英类矿物作紫石英入药；3. 《千金翼方》所载炮制方法，要求将紫石英特殊细研，至到“七日研之”，所指应是紫水晶而非紫色萤石。萤石易研细，无须特别指出研法；4. 广西、山西部分地区所用的紫石英为方解石( $\text{CaCO}_3$ )。

### 9206005

Aquamarinum --- Hailanbaoshi \*\*

药材名 海蓝宝石《迪庆藏药》

功效 海蓝宝石:解毒。用于中毒病,肝病,麻风病。

备考 本品为硅酸盐类中绿柱石(又名绿宝石)的一种,主含  $\text{Be}_3\text{Al}_2[\text{Si}_6\text{O}_{18}]$ 。

#### 9206006

Asbestos Hornblendum --- Hornblende asbestos \*

矿物名 角闪石石棉《中药大辞典》

药材名 不灰木《开宝本草》、《中药大辞典》

文献名 无灰木《图经》,石棉矿《矿物性中药之研究》,石棉、石棉、石绒《中药名汇》

功效 纤维状物:清热,除烦,利尿。用于肺热咳嗽,咽喉肿痛,烦热阳厥,小便不利,热瘕疮。

备考 1. 本品为硅酸盐类矿物,主含水化硅酸镁  $[3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$ , 还有铝、铁、钠、钾、钙等杂质。2. 蒙医所用之不灰木为蓝石棉,以富钠贫钙不同于阳起石。

#### 9206007

Asbestos Serpentinum --- Serpentine asbestos \*

矿物名 蛇纹石石棉《中国矿物药》

药材名 不灰木《开宝本草》、《中国矿物药》

文献名 无灰木《图经》,滑石根《中国矿物药》,“导玛母”(藏名)《中国药学杂志》,石棉、石棉、石绒《中药名汇》

功效 纤维状物:清热,除烦,利尿。用于肺热咳嗽,咽喉肿痛,烦热阳厥,小便不利,热瘕疮。

备考 1. 蛇纹石石棉为硅酸盐类矿物,主含  $\text{Mg}_3[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{H}_2\text{O})_2$ , 还可含有铁、铝、锰等。2. 有的文献将蛇纹石石棉的主成分写成  $\text{Mg}_3\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4(\text{Mg}, \text{Fe})_3[\text{Si}_2\text{O}_5](\text{OH})_2$ 。

#### 9206008

Beryllus Roseus --- Rosy beryl \*

药材名 玫瑰绿宝石《迪庆藏药》

功效 宝石:清热解毒。用于外加毒物中毒,肝病。

备考 本品为硅酸盐类矿物绿柱石之一。主成分为  $\text{Be}_3\text{Al}[\text{Si}_6\text{O}_{18}]$ 。

#### 9206009

Calcaribus Nodus --- Calcareous nodule \*

矿物名 钙质结核《中国矿物药》

药材名 姜石《唐本草》、《中国矿物药》

文献名 硃砾石《纲目》,裂姜石《中药志》,“刚特”(藏名),《中国药学杂志》,黄土小僧《中国矿物药》

功效 姜石:用于产后气冲,气噎。外用于疔疮肿毒。

备考 1. 姜石为石灰岩经风化淋滤的钙质结核和黄土钙质结核。主要组成矿物均为方解石、石英、粘土矿物等,并富含微量元素;2. 《中国矿物药》(1988)称:姜石的部分特征和溶出成分特征将依成因、产地等地球化学背景值而异。邢台、涉县、漳县等地区所产姜石,含有人体和动物所需要的氟、碘、硅、铁、锌、铜、锰、钴、钼、铬、锡、钨、硒、钼

等14种微量元素,有的地区所产姜石成分有变化,而游离硅酸含量,应是姜石是否富含多种微量元素的一个指示性指标。

#### 9206010

Chlorite schist \*

矿物名 绿泥石片岩《中药志》

药材名 青礞石《圣惠方》、《药典》

文献名 礞石《嘉祐本草》,银礞石《矿物药与丹药》,“洪切那布”(藏名)《中国药学杂志》

功效 矿石:坠痰下气,平肝镇惊。用于顽痰胶结,咳逆喘急,癫痫发狂,烦躁胸闷,惊风抽搐。

备考 本品为变质岩类绿泥石化云母碳酸盐片岩,粉末为灰绿色鳞片(绿泥石化云母片)和颗粒(主为碳酸盐)。主含镁、铁、铝、硅酸和结晶水等。

#### 9206011

Fullers earth \*

矿物名 漂白土《中药大辞典》

药材名 甘土《本草拾遗》、《中药大辞典》

文献名 白单、白蜡《石药尔雅》,膨润土《黑龙江中药》

功效 矿土:吸着解毒。用于胃病,创口及生物碱中毒时,用作杆菌及毒质之吸着剂。

备考 本品为硅酸盐类矿物。主成分与高岭土(Kaolinite)相近,为水化硅酸铝及少量钙。

#### 9206012

Halloysitum Rubrum --- Bolus Rubra --- Halloysite \* ---

Halloylite \* --- Red bole \*

矿物名 多水高岭石《药典》

药材名 赤石脂《本经》、《药典》

文献名 赤符《吴普本草》,红高岭《增订伪药条辨》,赤石土《形色鉴别》,多水高岭土、吃油脂《中药志》,红土、石脂、红高岭土《药材学》,煅赤石脂《药典》,高岭石《中国矿物药》,赤脂、赤石髓、大红土《中药名汇》,“莫布巴佳”(藏名)《中国药学杂志》

功效 矿石:涩肠,止血,生肌敛疮。用于久泻久痢,大便出血,崩漏带下,遗精。外用于疮疡不敛,湿疹脓水浸淫。

备考 本品为硅酸盐类矿物。主含含水硅酸铝  $[\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}]$ , 尚含相当多的氧化铁及锰等物质。普通赤石脂是带红色的,但由于它所含氧化铁、氧化锰的多寡,颜色可以从白、灰以至青绿、黄红、褐等色。

#### 9206013

Hsianhuatitum --- Xianghuashi \*\*

药材名 香花石《中国药学杂志》

文献名 “导百”(藏名)《中国药学杂志》

功效 香花石:用于中毒症,并防治“凶曜病”(麻风、癫痫、中风、精神分裂症)。

备考 本品为硅酸盐类矿物主为  $[\text{Li}_2\text{Cu}_3(\text{BeSiO}_4)_3(\text{F}, \text{OH})_2]$ 。

#### 9206014

Huabannao \*\*

药材名 花斑瑙《中国药学杂志》  
文献名 “车满导”(藏名)《中国药学杂志》  
功效 花斑瑙:用于癫痫,辟邪。  
备考 本品为硅化合物类矿物,主含  $\text{SiO}_2$ 。

## 9206015

Hydrated mica \* --- Hydroglimmer \* --- Hydromica \*

矿物名 水云母《中国矿物药》  
药材名 黄石脂《本经》、《中国矿物药》  
文献名 黄符《别录》,石髓《本草拾遗》,水白云母、南石《中国矿物药》  
地方名 [赤石脂](黑龙江、湖南)。  
功效 黄石脂:养脾气,安五脏,调中。用于泄痢,肠下脓血,白虫,黄疸,痢症。

备考 1. 本品为《神农本草经》五色石脂之一。2. 黄石脂属次生粘土矿物的多矿物聚集体,以水云母和多水高岭石为主要组分。化学成分及可溶性等因具体矿物组份及其量比等而异。

## 9206016

Jadeitum --- Jadeite \*

矿物名 硬玉《中国矿物药》  
药材名 玉屑《别录》、《中国矿物药》  
文献名 玄真《纲目》,玉翡翠《中国矿物药》  
功效 玉屑:润心肺,清胃热。用于消渴,喘息烦满。外用于目翳。  
备考 硬玉属矿物学上的致密块状钠辉石  $\text{NaAl}(\text{Si}_2\text{O}_6)$ (即翡翠)。

## 9206017

Kaolinitum --- Kaolin \* --- Kaoline \* --- Kaolinite \* --- Clayite \*

矿物名 高岭石《汇编》  
药材名 白石脂《本经》、《中药大辞典》  
文献名 白符、随《吴普本草》,白陶土、高岭土《矿物药与丹药》,磁土《矿物学》,“嘎贡”(藏名)《中国药学杂志》,白泥、白色石脂、高岭、陶土、土磁石、瓷土《中药名汇》  
功效 白石脂:涩肠,止血。用于久泻,久痢,崩漏带下,遗精。外用于溃疡不敛。

备考 本品为硅酸盐类矿物。主要成分为水化硅酸铝  $[\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4]$ ,常含铁、镁、钙等杂质。

## 9206018

Lapis Chloriti --- Biotite schist \*

矿物名 黑云母片岩《药典》  
药材名 青礞石《圣惠方》、《药典》  
文献名 礞石《嘉祐本草》,黑云母《青藏药用矿物》  
功效 矿石:坠痰下气,平肝镇惊。用于顽痰胶结,咳逆喘息,癫痫发狂,烦躁胸闷,惊风抽搐。

备考 本品为变质岩类黑云母片岩,碎粉主为绿黑色鳞片(黑云母)。主为  $[(\text{H}, \text{K})_2(\text{Mg}, \text{Fe})_2\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3]$ 。

## 9206019

Lapis Micac Aureus --- Mica schist \*

矿物名 云母片岩《药典》

药材名 金礞石《药典》  
文献名 礞石《嘉祐本草》,煅金礞石《药典》  
地方名 山东:酥酥石;江苏:烂石。  
功效 风化物:坠痰下气,平肝镇惊。用于顽痰胶结,咳逆喘息,癫痫发狂,烦躁胸闷,惊风抽搐。

备考 本品为变质岩类云母片岩的风化物。主含钾、镁、铝、硅酸与结晶水。

## 9206020

Lapis Sapo --- Soap stone \*

矿物名 岫玉《中国矿物药》  
药材名 玉《中国矿物药》  
功效 玉屑:润心肺,清胃热。用于喘息烦满,消渴。外用于目翳。

备考 1. 岫玉主要矿物组份为蛇纹石  $\text{Mg}_6[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{OH})_8$ ,可含有透闪石和方解石;2. 古代岫玉仅被发现、应用于辽宁、吉林一带。

## 9206021

Lateritum

药材名 土牛黄《中国药学杂志》  
文献名 “守格旺”《中国药学杂志》  
功效 土牛黄:除瘟解毒。用于瘟毒病,肝病,六腑热病。

备考 本品为硅酸盐类  $[\text{Al}_4(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_8]$ 。

## 9206022

Lazuritum --- Lazurite \*

矿物名 青金石《英汉矿物名称》  
药材名 青金石《中国药学杂志》  
文献名 “莫阿”(藏名)《中国药学杂志》  
功效 青金石:用于麻风病,黄水病。  
备考 本品为铝的硅酸盐类,  $(\text{Na}, \text{Ca})[\text{AlSiO}_4]_6(\text{SO}_4, \text{Cl}, \text{S})_2$ 。

## 9206023

Maifanitum --- China maifanite \*

矿物名 中华麦饭石《中国道地药材》  
药材名 麦饭石《图经》、《中国道地药材》  
文献名 粗理黄色磨石《小品方》,粗理黄石《千金方》,粗黄石、麦饭石膏《图经》,白麦饭石《外科精义》,北票麦饭石《中国道地药材》,粗理黄色麻石《中国药学杂志》

功效 矿石:益气防衰,消肿去痈。外用于一切痈疽发背。

备考 本品为火山岩、次火山岩类及其蚀变岩石,成分有氧化硅( $\text{SiO}_2$ )、氧化铝( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )、氧化铁( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )、氧化亚铁( $\text{FeO}$ )、氧化钛( $\text{TiO}_2$ )、氧化钙( $\text{CaO}$ )、氧化镁( $\text{MgO}$ )、五氧化二磷( $\text{P}_2\text{O}_5$ )、氧化锰( $\text{MnO}$ )、氧化钾( $\text{K}_2\text{O}$ )、氧化钠( $\text{Na}_2\text{O}$ )、氟( $\text{F}$ )、硫( $\text{S}$ )及多种微量元素。

## 9206024

Montmorillonitum --- Montmorillonite \*

矿物名 蒙脱土《中药大辞典》  
药材名 甘土《本草拾遗》、《中药大辞典》  
文献名 白单、白蜡《石药尔雅》,膨润土《黑龙江中药》,蒙脱石《英汉矿物名称》,漂白粘土、微晶高岭土



## 《矿物学》

功效 矿土;吸着解毒。用于胃病,创口及生物碱中毒时,用作杆菌及毒质之吸着剂。

备考 蒙脱石为硅酸盐类矿物主为  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。

## 9206025

Muscovitum --- Muscovite \*

矿物名 白云母《千金方》、《药典》

药材名 云母《本经》、《西藏药用矿物》

文献名 云珠、云华、云英、云液、云沙、磷石《本经》,银精石《石药尔雅》,云母石《本草便读》,云粉石、千层玻《西藏药用矿物》,千层纸《中药志》,云精、云胆、云精石、云母片、火齐、千片石《中药名汇》,“洪切嘎布”(藏名)《中国药理学杂志》

地方名 甘肃:金星石;山东:老鸦金。

功效 云母:纳气坠痰,止血敛疮。用于虚喘,眩晕,惊悸,癫痫,寒疟,久痢,金疮出血,痈疽疮毒。

备考 本品为含铝硅酸盐类矿物,主要为  $[\text{KAl}_2(\text{AlSi})_3\text{O}_{10}(\text{OH},\text{F})_2]$ 。

## 9206026

Nephritum --- Nephrite \*

矿物名 软玉《矿物学》

药材名 玉屑《别录》、《中药大辞典》

文献名 白玉屑《太平圣惠方》,玄真《纲目》

功效 软玉碎粒:润心肺,清胃热。用于喘息烦满,消渴。外用于目翳。

备考 软玉主要矿物组份为透闪石  $\text{Ca}_2\text{Mg}_5(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2(\text{OH})_2$ 。

## 9206027

Pumex --- Pumice \*

矿物名 大海浮石《中国矿物药》

药材名 海浮石《本草从新》、《中药大辞典》

文献名 浮石《日华子本草》,海石《丹溪心法》,水泡石《东医宝鉴》,浮海石《玉楸药解》,浮水石《医林纂要》,羊肚石《药材资料汇编》,水石、轻石、玉脂芝、海南石、擦脚石《中药名汇》,“佳推斗哇”(藏名)《中国药理学杂志》

地方名 吉林:江石沫子。

功效 海浮石:清肺火,化老痰,软坚,通淋。用于痰热喘嗽,老痰积块,癭瘤,瘰癧,淋病,疝气,疮肿,目翳。

备考 1.大海浮石为火成岩类多孔隙熔结熔岩,主要成分为火山玻璃(含有最广泛的微量元素),入海后吸附有海水里多种元素而成。此为今海浮石市售品之主要来源。2.今市售海浮石尚有小海浮石与石花。小海浮石又称矽石,是以贝壳碎屑为核心,沉积形成的结核。主要成分为方解石及粘土矿物,还有藻类者,产山东烟台,为东北三省所习用。石花为石珊瑚、水生苔藓类动物胞孔科脊突苔虫的骨骼。

## 9206028

Quartz Album --- Quartz \*

矿物名 石英《中国矿物药》

药材名 白石英《本经》、《中药大辞典》

文献名 水精《太平圣惠方》,白砂、广石、水精石、银华眼镜石《中药名汇》,“水晶石”(藏名)《中国药理学杂志》

功效 矿石:温肺肾,安心神,利小便。用于肺寒咳嗽,阳痿,消渴,心神不安,惊悸善忘,小便不利,黄疸,石水,风寒湿痹。

备考 本品为氧化物类矿物,主含二氧化硅  $[\text{SiO}_2]$ ,常杂有铝、铁、镁、钙、锌、锰及其他微量元素。

## 9206029

Talcum --- Tale \*

矿物名 滑石《药典》

药材名 滑石《本经》、《药典》,滑石粉《药典》

文献名 液石、共石、脆石、番石《别录》,脱石、冷石《本草经集注》,夕冷《药性论》,留石《石药尔雅》,画石《本草衍义》,白滑石、桂府滑石《证治准绳》,北石《中国矿物药》,尽石《矿物药与丹药》,硬滑石、活石《中药志》,班石、嫩石、肥皂石、石绛、利旁、涂石、镁砂强矾、雷河督子、白滑、白玉粉、白仲宁、立制石、原滑石、飞滑石、快滑石《中药名汇》,“洪泻”(藏名)《中国药理学杂志》

功效 石块或粉末:利尿通淋,清热解暑,祛湿敛疮。用于热淋,石淋,尿热涩痛,暑湿烦渴,湿热水泻。外用于湿疹,湿疮,痱子。

备考 1.本品为硅酸盐类矿物,主为含水硅酸镁  $[\text{Mg}_3(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2]$ ,含有  $\text{MgO}$ 、 $\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$  等,此外还含有铝、铁、锰、镍和少量钾、钠、钙等元素;2.《中国矿物药》(1988)称:历代所用滑石既有本品滑石,也有粘土质滑石。现市售品北方多为滑石(含羟基的偏硅酸镁),南方多为粘土质滑石(含羟基的偏硅酸铝)。这两种滑石主成分镁、铝及次要成分铁、钙及微量元素和铅、锌等量比均有明显差异,宜加以区别。

## 9206030

Terra Flava Usta --- Earth in the hearth \*

矿物名 粘土矿物《中国矿物药》

药材名 伏龙肝《别录》

文献名 灶中黄土《金匱要略》,釜下土《肘后方》,釜月下土《补缺肘后方》,灶心土《纲目》,赤伏龙肝、伏龙、陈伏龙肝、灶心黄土《中国矿物药》,灶内黄土、黄土、灶灰柴火《中药名汇》

功效 土块:温中燥湿,止呕止血。用于呕吐反胃,妊娠恶阻,腹痛泄泻,吐血,衄血,便血,尿血,崩漏带下,痈肿溃瘍。

备考 本品为黄土久经柴草熏烧的灶底中心土块,主要成分为硅酸  $[\text{H}_2\text{SiO}_3]$ ,氧化铝  $[\text{Al}_2\text{O}_3]$ ,三氧化二铁  $[\text{Fe}_2\text{O}_3]$ ,碳酸钙  $[\text{CaCO}_3]$ 。

## 9206031

Vermiculitum --- Vermiculite \*

矿物名 蛭石《英汉矿物名称》

药材名 金精石《纲目》、《中药大辞典》

文献名 金星石《嘉祐本草》,金晶石《中药志》,猫金《中药大辞典》,“色时”(藏名)《中国药理学杂志》

功效 金精石:有小毒。镇惊安神,明目去翳。用

于目疾翳障,心悸怔忡,夜不安眠。

**备 考** 原矿物主要为金云母及其水化产物水金云母。矿物学上将水化并有 Ca 离子等对 Mg 有所交换的镁铁质云母称为蛭石。主含成分为  $[(Mg, Fe)_2(Si, Al)_2(OH)_2 \cdot 4H_2O]$ 。

#### 9206032

Yejiegang \*\*

**药材名** “业结纲”(藏名)(《中国药理学杂志》)

**地方名** 青海:(天竹黄)。

**功 效** 本品:用于肺热,黄疸。

**备 考** 本品为硅化合物( $SiO_2$ 及少量  $Al_2O_3$ , KOH)。

#### 9206033

Zumulu \*\* --- Emerald \*

**药材名** 祖母绿(迪庆藏药)

**文献名** “玛哈打”(藏名)(《中国药理学杂志》)

**功 效** 宝石:用于三邪病。

**备 考** 本品属于硅类化合物  $[Be_3Al_2Si_6O_{18}]$ 。由印度进口。

### (三) 化石类

#### 9300 化石类 Fossils

##### 9300001

Dens Draconis --- Fossilia Dentis Mastodi

**矿物名** 牙齿化石(《中国矿物药》)

**药材名** 龙齿(《本经》、《中药大辞典》)

**文献名** 真龙齿、正龙齿(《别录》),五花龙齿、白龙齿、白条牙、青龙齿、青条牙(《中药材手册》),五花龙骨(《中国矿物药》)

**功 效** 化石:镇惊安神,除烦热。用于惊痫癫狂,烦热不安,失眠多梦。

**备 考** 本品为古代哺乳类动物如象类、犀牛类、三趾马、骆驼、羚羊等的牙齿化石。由磷灰石(磷钙石)  $Ca_5[PO_4]_3(OH, F, Cl)$  氧化钙、五氧化二磷等组成,主含碳酸钙、磷酸钙等。

##### 9300002

Fossilia Chiton

**矿物名** 石鳖化石(《中药大辞典》)

**药材名** 石鳖(《纲目》、《中药大辞典》)

**功 效** 化石:用于淋疾,血病。

**备 考** 本品为石鳖科动物石鳖 Chiton sp. 的化石。

##### 9300003

Fossilia Cyrtospirifer --- Fossil shell of spirifer \*

**矿物名** 石燕化石(《中国矿物药》)

**药材名** 石燕(《唐本草》、《中药大辞典》)

**文献名** 石燕子(《圣惠方》),大石燕(《医宗说约》),燕子石、土燕(《矿物药与丹药》),“蝎苟”(藏名)(《中国药理学杂志》)

**功 效** 石燕化石:除湿,利小便,退目翳。用于淋病,小便不通,带下,尿血,肠风痔漏。外用于角膜云

翳。

**备 考** 本品为古生代蠕形动物石燕科石燕(Spirifer sp.)、中国石燕 Cyrtospirifer sinensis (Grabau.) (Sinospirifer sinensis) 及弓石燕(Cyrtopsis sp.) 等多种动物的化石。主要成分为碳酸钙,并含有微量成分磷、钾、钠、硅等

##### 9300004

Fossilia Tephusa --- Fossil crab \*

**矿物名** 蟹化石(《药材学》)

**药材名** 石蟹(《日华子本草》、《中药大辞典》)

**文献名** 大石蟹(《审视瑶函》),灵石蟹、全石蟹(《青海药用矿物》),石螃蟹(《汇编》)

**功 效** 化石:清热利湿,去翳明目。用于目赤,角膜云翳,尿路感染,白带,喉痹,痈肿,漆疮。

**备 考** 本品为古代节肢动物石蟹(Macrophthalmus latreilli Edw. 或 Tephusa sp.) 及其他近缘动物的化石。主含碳酸钙( $CaCO_3$ )及琥珀酸。

##### 9300005

Longjiao \*\*

**矿物名** 角骨化石(《中药大辞典》)

**药材名** 龙角(《别录》、《中药大辞典》)

**功 效** 化石:用于惊痫,身热如火。

**备 考** 本品为古代大型哺乳动物的角骨化石。主含碳酸钙、磷酸钙。

##### 9300006

Os Draconis --- Fossil fragments \*

**矿物名** 骨骼化石(《中国矿物药》)

**药材名** 龙骨(《本经》、《中药大辞典》)

**文献名** 白龙骨(《别录》),五花龙骨(《良朋汇集》),青化龙骨、花龙骨(《中药大辞典》),粉龙骨、土龙骨(《中药志》),“哲锐”(藏名)(《中国药理学杂志》)

**功 效** 化石:镇惊安神,敛汗固精,止血涩肠,生肌敛疮。用于惊痫癫狂,怔忡健忘,失眠多梦,自汗盗汗,遗精淋浊,吐衄便血,崩漏带下,泻痢脱肛,溃疡久不收口,阴囊湿痒。

**备 考** 本品为古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马、骆驼、羚羊等的骨骼化石。由磷灰石  $[Ca_5(PO_4)_3(OH, F, Cl)]$ 、方解石及少量粘土矿物组成。主含碳酸钙、磷酸钙。

##### 9300007

Songhuashi \*\*

**药材名** 松化石(《矿物性中药之研究》)

**文献名** 康子石、雷烧石(《矿物性中药之研究》)

**功 效** 松化石:用于情思抑郁,所欲不遂,神志忧闷,诸七情病。

**备 考** 本品为古松折入涧水中,后成为化石。

##### 9300008

Succinum --- Succinite \* --- Amber \* --- Succin \*

**矿物名** 琥珀(《青海药用矿物》)

**药材名** 琥珀(《雷公炮炙论》、《中药大辞典》)

**文献名** 育沛(《山海经》),虎珀(《汉书》),虎魄(《别录》),江珠(《博物志》),石珀、水珀、花珀、物象珀、翳珀(《雷公炮

炙论》, 兽魄、顿牟《隋书》, 真虎珀《太平圣惠方》, 血珀、金珀、蜡珀《大明一统志》, 琥魄《后汉书》, 明珀、香珀《纲目》, 西珀〔广西产〕、洋珀〔厦门产〕《增订伪药条辨》, 血琥珀、黑琥珀、煤珀《中药志》, 光珀《汇编》, 红琥珀《青藏药用矿物》, 丹珀、南珀、红珠、红松脂、大虫珀、阿湿摩、揭婆《中药名汇》

**功效** 琥珀: 镇惊安神, 散瘀止血, 利水通淋。用于惊风癫痫, 惊悸失眠, 血淋血尿, 小便不通, 妇女闭经, 产后停瘀腹痛, 痈疽疮毒, 跌打损伤。

**备考** 本品为古代松柏植物的树脂埋藏地下经久凝结而成的碳氢化合物, 主含树脂、挥发油。

## (四) 其他类

### 9400 其他类 The others

#### 9400001

Baoxinshi \*\*

**药材名** 保心石《本草拾遗》、《矿物性中药之研究》

**文献名** 宝石《本草拾遗》

**功效** 矿石: 用于大热燥渴, 小便不通, 泄泻, 心痛, 风寒气痛, 吐衄, 咳血, 吐血。

#### 9400002

Dijiang \*\*

**药材名** 地浆《本草经集注》、《中药大辞典》

**文献名** 土浆《本草经集注》, 地浆水《会约医镜》

**功效** 地浆: 清热, 解毒, 和中。用于中暑烦渴, 伤食吐泻, 脘腹胀痛, 痢疾, 食物中毒。

**备考** 掘黄土地作坎, 深约二尺许, 灌水搅混, 俟其沉淀, 取上面清液, 即为地浆。

#### 9400003

Ice \*

**矿物名** 冰《英汉矿物名称》

**药材名** 冰《本草拾遗》、《中药大辞典》

**文献名** 凌《纲目》

**功效** 冰块: 退热消暑, 解渴除烦。用于伤寒阳毒, 热甚昏迷, 中暑解渴。

**备考** 冰为水凝成的无色透明固体( $H_2O$ )。

#### 9400004

Jingdini \*\* --- Shaft boffom clay \*

**药材名** 井底泥《本草经集注》、《中药大辞典》

**文献名** 井底沙《证类本草》

**功效** 井底泥: 清热解毒。用于妊娠热病, 胎动不安, 头风热痛, 开泡疮, 热疖。

**备考** 井底泥为淤积在井底的灰黑色泥土。

#### 9400005

Maqishi \*\*

**药材名** 马起石《中国药理学杂志》

**文献名** “汤借”(藏名)《中国药理学杂志》

**功效** 马起石: 托引黄水, 固骨脂。

#### 9400006

Pijingshi \*\*

**药材名** 辟惊石《矿物性中药之研究》

**文献名** 避惊风石《矿物性中药之研究》

**功效** 辟惊石: 用于急慢惊风。

#### 9400007

Sal Ammoniacum -- Salammonice \*

**矿物名** 硃砂《唐本草》、《中药志》

**药材名** 白硃砂《中药志》

**文献名** 北庭砂《四声本草》, 黄砂《石药尔雅》, 狄盐《日华子本草》, 气砂《图经》, 透骨将军《纲目》, 淡硃砂《中药志》, 卤砂、盐砂、硃、氯化铵《中药名汇》, “佳擦”(藏名)《中国药理学杂志》

**功效** 矿石: 主积聚, 破结血, 烂胎, 止痛, 下气, 疗咳嗽宿冷, 去恶肉, 生好肌。

**备考** 1. 白硃砂来自卤化物类矿物硃砂的晶体, 主含氯化铵( $NH_4Cl$ ); 2. 历代本草所载硃砂多指白硃砂, 但市售商品硃砂则多为紫硃砂。

#### 9400008

Shejushi \*\*

**药材名** 蛇菊石《中国药理学杂志》

**文献名** “慢子”《中国药理学杂志》

**功效** 蛇菊石: 清骨热。

#### 9400009

Tadongtu \*\*

**药材名** 獭洞土《中国药理学杂志》

**文献名** “西沙”(藏名)《中国药理学杂志》

**功效** 獭洞土: 熏熨祛寒。用于胸腹胀满, 不思饮食。

#### 9400010

Tushanyao \*\*

**药材名** 土山药《中国药理学杂志》

**文献名** “沙结纲”(藏名)《中国药理学杂志》

**功效** 土山药: 用于肺热, 疮热, 利黄疸。

#### 9400011

Yinyou \*\*

**药材名** 银销《纲目拾遗》、《矿物性中药之研究》

**文献名** 银釉《纲目拾遗》

**功效** 本品: 有毒。外用于顽癣。

**备考** 本品为银铺熔银罐底所余黑色滓渣, 为万应膏、五云膏的原料。

#### 9400012

Yuxueshi \*\*

**药材名** 禹穴石《矿物性中药之研究》

**功效** 禹穴石: 催生。

**备考** 本品出陕西石泉县禹穴之下, 故名。以红如喷血者佳, 石皮如血染气腥, 以滚水沃饮之能催生。